

# Impfkalender

## (Standardimpfungen)

| Alter           | Schutzimpfung                                                                                                                                                            | Hinweis                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ab 6 Wochen     | Rotaviren                                                                                                                                                                | zwei bzw. drei Mal im Abstand von mind. vier Wochen                                                                                                                                                                                                |
| 2. und 4. Monat | Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus (Wundstarrkrampf), Poliomyelitis (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae Typ B, Hepatitis B (Gelbsucht)<br><br>Pneumokokken | zwei Mal; mit zwei und vier Monaten (bei Frühgeborenen eine zusätzliche Impfung mit drei Monaten)<br><br>Kombinationsimpfstoffe verfügbar<br><br>zwei Mal; mit zwei und vier Monaten (bei Frühgeborenen eine zusätzliche Impfung mit drei Monaten) |
| 11. – 14. Monat | Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ B, Hepatitis B<br><br>Pneumokokken<br><br>Masern, Mumps, Röteln<br>Varizellen (Windpocken)     | dritte Impfung (bei Frühgeborenen: vierte Impfung)<br><br>dritte Impfung (bei Frühgeborenen vierte Impfung)<br><br>erste Impfung (MMR-Kombinationsimpfstoff)<br>erste Immunisierung                                                                |
| ab 12. Monat    | Meningokokken Typ C                                                                                                                                                      | eine Impfung                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. – 23. Monat | Masern, Mumps, Röteln, Varizellen                                                                                                                                        | zweite Impfung entweder MMRV-Kombinationsimpfstoff oder Einzelimpfung MMR und Varizellen                                                                                                                                                           |
| 5 – 6 Jahre     | Tetanus, Diphtherie, Pertussis                                                                                                                                           | Auffrischimpfung                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 – 16 Jahre    | Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis                                                                                                                            | Auffrischimpfung                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 – 14 Jahre    | Gebärmutterhalskrebs (HPV)                                                                                                                                               | in der Regel zwei Impfungen innerhalb von sechs Monaten                                                                                                                                                                                            |
| ab 18 Jahren    | Masern                                                                                                                                                                   | einmalig für alle nach 1970 Geborenen mit unklarem Immunschutz                                                                                                                                                                                     |
| 18 – 60 Jahre   | Diphtherie, Tetanus<br><br>Pertussis                                                                                                                                     | Auffrischimpfung jeweils zehn Jahre nach der letzten Impfung<br><br>Auffrischimpfung einmalig in Kombination mit Diphtherie und Tetanus sowie in der Schwangerschaft                                                                               |
| ab 60 Jahren    | Influenza<br><br>Pneumokokken<br><br>Herpes Zoster (Gürtelrose)                                                                                                          | jährlich<br><br>Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen<br><br>zweimalige Impfung im Abstand von mind. zwei bis max. sechs Monaten. Gilt auch für bestimmte Risikogruppen ab 50 Jahren      |