

AOK Curaplan und "gut DABEI" der Knappschaft für Asthma bronchiale - bundesweite Age-Auswertungen

Berichtstyp: bundesweiter Evaluationsbericht - Age-Auswertungen

Auswertungshalbjahre: 2006-1 bis 2012-2

Abgabedatum: 31. März 2014

Evaluatoren:

infas infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn

prognos
Prognos AG
Schwanenmarkt 21
40231 Düsseldorf

WIAD Wissenschaftliches Institut der Ärzte
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.
Uhierstr. 78
53175 Bonn

0. Einleitung	4
Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation	5
0.1. Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten	7
Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard	7
Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche	9
0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung	10
Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Tabelle: Patienten <18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	10
0.3. Ausgewertete Teilgruppen	12
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	13
Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale	13
Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre	13
Tabelle 1.3a Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten <18 bzw. <12 Jahre (Werte kumuliert)	16
Tabelle 1.3b Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene männliche und weibliche Patienten <18 bzw. <12 Jahre (Werte kumuliert)	25
Tabelle 1.6 Patienten < 18 bzw. < 12 und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	39
Tabelle 1.7 Patienten < 18 bzw. < 12 und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	40
Tabelle 1.8 Patienten <18 bzw. <12 ohne medizinische Dokumentation	42
Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung	45
3.1 Risikofaktoren	46
Tabelle 3.1.1 Raucher $12 \leq t < 18$ Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	46
Tabelle 3.1.2 Raucherquote bei allen Patienten $12 \leq t < 18$ Jahre im Berichtshalbjahr	54
Tabelle 3.1.3 Patienten <18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	60
3.2 Symptomatik	88
Tabelle 3.2.1 Häufigkeit von Asthmasymptomen bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre	88
Tabelle 3.2.2 Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre	102
Tabelle 3.2.3 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	110
Tabelle 3.2.4 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	113
3.3 Klinische Verlaufparameter	116
Tabelle 3.3.1a Peak-Flow-Absolutwert bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre	116
Tabelle 3.3.1b Peak-Flow-Absolutwert bei männlichen und weiblichen Patienten <18 bzw. <12 Jahre	125
Tabelle 3.3.2 Entwicklung des Peak-Flow-Wertes bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre	139
3.4 Medikation	144
Tabelle 3.4.1 Patienten <18 bzw. <12 Jahre und ihre Medikation	145
Tabelle 3.4.2 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	173
3.5 Prozessparameter	178
Tabelle 3.5.1 Patienten <18 bzw. <12 Jahre und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	178
Tabelle 3.5.2 Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre	186
Tabelle 3.5.3 Schriftlicher Selbstmanagementplan bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre	189
Tabelle 3.5.4 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	194
Tabelle 3.5.5 Raucher $12 \leq t < 18$ Jahre im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht	198
Tabelle 3.5.6 Nichtraucher $12 \leq t < 18$ Jahre im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht	199
3.7 Sterberaten	200
Tabelle 3.7.1 Sterberaten bei Patienten <18 Jahre	200
Anhang A: Methodik und Datengrundlage	202
A.1 Datengrundlage	202
Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP Asthma bronchiale unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP	203
A.2 Qualitätssicherung	205
A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen	206
Tabelle A.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr	207

Anhang B: Glossar 208

0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patienten wird über den gesamten Verlauf einer (chronischen) Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patienten sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es, zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patienten durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Lebensqualitätsbefragung im Rahmen des Krankheitsbildes Asthma bronchiale werden erstmals in den Berichten zum 31.03.2010 ausgewiesen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrundeliegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Asthma bronchiale waren sämtliche DMP erstmalig zum 31.03.2010 zu evaluieren. Anschließend erfolgt alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 31.03.2012, zum 31.03.2014, etc.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welche Inhalte der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Der Bericht enthält die in den Evaluationskriterien vorgesehenen altersspezifischen Zusatzauswertungen, welche bundesweit und kassenarten-übergreifend (AOK, Knappschaft) vorgenommen werden.

Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	
1. Patientenzahlen und -merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) - Patienten und ihre mittlere Beobachtungszeit - Patienten ohne medizinische Dokumentation
3. Krankheitsverlauf nach Einschreibung	<p>Risikofaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raucherstatus - Gewichtsentwicklung (BMI) <p>Symptomatik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Häufigkeit von Asthmasymptomen - stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale <p>Klinische Verlaufsparmeter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peak-Flow-Werte <p>Medikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patienten und ihre Medikation <p>Prozessparameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen - Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik - Schriftlicher Selbstmanagementplan - Raucherstatus und Empfehlung zum Tabakverzicht <p>Sterberaten</p>
Anhang A: Methodik und Datengrundlage	
Anhang B: Glossar	

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den „Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme“ in der Version 5.4 am 04. Dezember 2012 veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbeobachtung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Evaluationsberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen. Um eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf die Patientenpopulation herzustellen, erfolgt dazu eine risikoadjustierte Schätzung der interessierenden Parameter.

Der vorliegende Bericht enthält bundesweite, altersspezifische Auswertungen für die Summe aller DMPs der AOK und der Knappschaft zur Behandlung von Asthma bronchiale. Die Akkreditierung für das erste dieser Programme erfolgte im Halbjahr 2006-1. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmer des Programms vom Zeitpunkt Ihres Beitritts bis einschließlich des Berichtshalbjahres 2012-2 beobachtet. Betrachtet werden Versicherte der jeweiligen AOK sowie gegebenenfalls länderübergreifend betreute Versicherte anderer AOKen und die Versicherten der Knappschaft, zu denen nach der Fusion beider Kassen auch die ehemaligen Versicherten der See-Krankenkasse gehören.

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.¹ Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs der Knappschaft teil. Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Berichtshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden Asthma-Berichten Daten aus eDMP enthalten sind. Ab dem Halbjahr 2008-2 kann daher - je nach Auswertungsinhalt - die Vergleichbarkeit der Auswertungsinhalte eingeschränkt sein. Zum einen werden seit eDMP einige Parameter auf geänderte Art und Weise erfasst. Zum anderen besteht - je nach Praxissoftware - seit eDMP die Möglichkeit, auf ergänzende Patienteninformationen zuzugreifen, so dass ggf. ein bisher möglicherweise unterrepräsentierter Parameter korrigiert dargestellt wird.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

Zur Vereinfachung wird im folgenden von „Patienten“, „Teilnehmern und „Personen“ usw. gesprochen. Damit sind jedoch stets männliche und weibliche Personen gemeint.

¹ Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

0.1. Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patienten in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patienten mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patienten und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patienten halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2006-1“, Kohorte „2006-2“, „Kohorte 2007-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt des einzelnen Teilnehmers in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1 verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2006-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc.. Zu beachten ist dabei, dass die Spaltenüberschriften sich auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patienten beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche **Kalenderhalbjahre**.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

Eintrittszeitpunkt	Teilnehmer im Beitrittsjahr	Teilnehmer im 2. Halbjahr	Teilnehmer im 3. Halbjahr	Teilnehmer im 4. Halbjahr	Teilnehmer im 5. Halbjahr	Teilnehmer im 6. Halbjahr	Teilnehmer im 7. Halbjahr	Teilnehmer im 8. Halbjahr	Teilnehmer im 9. Halbjahr	Teilnehmer im 10. Halbjahr	Teilnehmer im 11. Halbjahr	Teilnehmer im 12. Halbjahr	Teilnehmer im 13. Halbjahr	Teilnehmer im 14. Halbjahr	Teilnehmer im 15. Halbjahr
2006-1	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...
2006-2	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...	
2007-1	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...		
2007-2	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...			
2008-1	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...				
2008-2	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...					
2009-1	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...						
2009-2	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...							
2010-1	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...								
2010-2	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...									
2011-1	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...										
2011-2	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...											
2012-1	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...												
2012-2	Wert für 2012-2	...													
...	...														

Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt. Eine jährliche Auswertung erfolgt ebenfalls bei der Überprüfung der Inhalationstechnik.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patienten zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte der Patient zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2006 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2006-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2006 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2006-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patienten keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patienten bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet.

Ab dem zweiten Halbjahr ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patienten aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen zu einem Ausschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patienten, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patienten in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patienten.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patienten der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“ (vgl. Tabelle 0.1.2.) oder Angaben, die nicht den Plausibilitätskriterien des BVA genügen.

Zu beachten ist weiterhin, dass im Sommer 2010 in Abstimmung mit dem BVA erstmals Regelungen getroffen wurden, die festlegen welcher Wert beim Vorliegen mehrerer Erstdokumentationen pro Halbjahr zu verwenden ist. Zudem wurden auf Basis aktualisierter BVA-Vorgaben seit Herbst 2013 – also erstmalig im vorliegenden Bericht – Anpassungen bei der Aufbereitung der Patientendaten vorgenommen (siehe Kapitel A.2 bzw. A.3).

Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche

Parameter	definierter medizinischer Bereich*
Lebensalter (vollendete Jahre)	≥ 4 bis ≤ 110
Größe (m)	≥ 0,30 bis ≤ 2,50
Gewicht (kg)	≥ 2 bis ≤ 300
BMI (kg/m ²)	≥ 5 bis ≤ 180
Peak-Flow-Wert (l/min)	≥ 40 bis ≤ 998
Stationäre notfallmäßige Behandlung:	
FA: seit letzter Dokumentation	0 bis 8
FD: seit letzter Dokumentation	0 bis 98

*Basis: Expertenmeinungen nach Kenntnisstand November 2009. Wertebereiche sind vom BVA als Evaluationsgrundlage abgenommen und werden aufgrund der jeweils aktuellen Evaluationsergebnisse bei Bedarf angepasst.

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. nicht Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind. Diejenigen Patienten, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare**“ Patienten bezeichnet und in der Regel in den Tabellen gesondert ausgewiesen.² Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patienten zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

²Die „nicht auswertbaren“ Patienten ergeben sich als Differenz zwischen den „Patienten insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patienten.

0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der Kinder bzw. **Patienten <18 Jahre zur ED und ihrem Body-Mass-Index** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2.1). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, ist in diesem Bericht jede Tabelle mit einem entsprechenden Erläuterungstext versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patienten in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 die erste Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ Tabelle der **Patienten <18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index** mit der zweiten Spalte. Für jede Kohorte werden dort zunächst Angaben zu den Patienten gemacht. Zuerst wird unter

„Patienten <18 insgesamt“ sowie unter „männliche bzw. weibliche Patienten <18 insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch als Programmteilnehmer definiert werden.

Die „auswertbaren“ Patienten <18 Jahre, also diejenigen, für die im betrachteten Berichtshalbjahr plausible Angaben zum Body-Mass-Index vorlagen, bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der mittleren patientenbezogenen Differenz zwischen dem Body-Mass-Index im Berichtshalbjahr und Beitritts-halbjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus beiden Halbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren erwachsenen Patienten im Berichtshalbjahr und wird deswegen gesondert aufgeführt. Das Konfidenzintervall wird ausgewiesen, indem die untere und obere Grenze durch ein Semikolon getrennt in eckigen Klammern dargestellt werden.

Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Tabelle: Patienten <18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
Kohorte	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	auswertbar	Anzahl	373	338	307	273	240	237	210	192	181	165	149	135	123	110
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,34	19,52	19,77	20,03	20,41	21,57	21,22	21,22	21,62	21,89	21,77	22,06	22,23	22,06
		CI Mean	[18,92; 19,77]	[19,09; 19,96]	[19,29; 20,25]	[19,52; 20,54]	[19,86; 20,96]	[20,13; 23,01]	[20,59; 21,86]	[20,55; 21,88]	[20,91; 22,33]	[21,11; 22,68]	[21,00; 22,55]	[21,21; 22,92]	[21,37; 23,09]	[21,18; 22,93]
		Median	18,58	18,58	18,51	18,91	19,51	20,06	20,20	20,73	20,76	21,00	20,69	20,81	21,22	21,18
		Fallbasis mittlere Differenz		338	307	273	240	237	210	192	181	165	149	135	123	110
		Mittlere Differenz zur ED		0,40	0,78	1,12	1,50	2,49	2,13	2,19	2,64	2,94	2,96	3,36	3,73	3,62
		CI mittlere Differenz		[0,23; 0,57]	[0,55; 1,02]	[0,86; 1,37]	[1,22; 1,77]	[1,09; 3,89]	[1,75; 2,50]	[1,79; 2,59]	[2,21; 3,08]	[2,45; 3,42]	[2,47; 3,45]	[2,80; 3,91]	[3,14; 4,32]	[2,97; 4,26]
		Median mittlere Differenz		0,15	0,58	0,98	1,32	1,65	1,88	2,15	2,49	2,70	2,70	3,26	3,50	3,57
	untergewichtig	Anzahl	18	8	7	7	8	8	8	5	7	6	6	5	6	4
		Anteil in %	4,83	2,37	2,28	2,56	3,33	3,38	3,81	2,60	3,87	3,64	4,03	3,70	4,88	3,64
		CI Anteil in %	[2,65; 7,00]	[0,74; 3,99]	[0,61; 3,95]	[0,69; 4,44]	[1,06; 5,61]	[1,07; 5,68]	[1,21; 6,40]	[0,35; 4,86]	[1,05; 6,68]	[0,77; 6,50]	[0,86; 7,19]	[0,51; 6,90]	[1,06; 8,70]	[0,12; 7,15]
	normalgewichtig	Anzahl	245	221	215	180	163	152	133	119	114	105	100	86	76	74
		Anteil in %	65,68	65,38	70,03	65,93	67,92	64,14	63,33	61,98	62,98	63,64	67,11	63,70	61,79	67,27
		CI Anteil in %	[60,86; 70,51]	[60,31; 70,46]	[64,90; 75,17]	[60,30; 71,57]	[62,00; 73,83]	[58,02; 70,25]	[56,80; 69,87]	[55,09; 68,86]	[55,93; 70,04]	[56,27; 71,00]	[59,55; 74,68]	[55,56; 71,85]	[53,17; 70,41]	[58,46; 76,08]
	mäßig adipös	Anzahl	62	58	43	44	31	34	39	41	37	31	25	25	27	24
		Anteil in %	16,62	17,16	14,01	16,12	12,92	14,35	18,57	21,35	20,44	18,79	16,78	18,52	21,95	21,82
		CI Anteil in %	[12,84; 20,41]	[13,13; 21,19]	[10,12; 17,90]	[11,75; 20,49]	[8,66; 17,17]	[9,87; 18,82]	[13,30; 23,84]	[15,54; 27,17]	[14,55; 26,33]	[12,81; 24,77]	[10,76; 22,80]	[11,94; 25,10]	[14,61; 29,30]	[14,06; 29,57]
	stark adipös	Anzahl	48	51	42	42	38	43	30	27	23	23	18	19	14	8
		Anteil in %	12,87	15,09	13,68	15,38	15,83	18,14	14,29	14,06	12,71	13,94	12,08	14,07	11,38	7,27
		CI Anteil in %	[9,47; 16,27]	[11,27; 18,91]	[9,83; 17,53]	[11,10; 19,67]	[11,21; 20,46]	[13,23; 23,06]	[9,54; 19,03]	[9,13; 18,99]	[7,84; 17,57]	[8,64; 19,24]	[6,83; 17,33]	[8,19; 19,96]	[5,75; 17,02]	[2,40; 12,15]

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	245	237	211	193	175	161	140	124	117	108	102	90	81	73
	auswertbar	Anzahl	245	223	201	178	158	157	134	120	115	107	100	89	79	70
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	18,88	19,18	19,37	19,69	20,16	21,86	21,13	21,20	21,59	21,73	21,80	21,93	21,94	21,36
		CI Mean	[18,41; 19,34]	[18,70; 19,67]	[18,82; 19,93]	[19,09; 20,29]	[19,50; 20,82]	[19,76; 23,96]	[20,35; 21,92]	[20,36; 22,05]	[20,70; 22,48]	[20,75; 22,71]	[20,86; 22,75]	[20,89; 22,96]	[20,92; 22,95]	[20,43; 22,30]
		Median	18,11	18,38	18,13	18,60	19,23	20,03	20,08	20,30	20,25	20,28	20,36	20,31	20,96	20,73
		Fallbasis mittlere Differenz		223	201	178	158	157	134	120	115	107	100	89	79	70
		Mittlere Differenz zur ED		0,44	0,79	1,15	1,64	3,20	2,41	2,55	3,00	3,16	3,20	3,62	3,87	3,50
		CI mittlere Differenz		[0,21; 0,67]	[0,49; 1,08]	[0,82; 1,48]	[1,27; 2,01]	[1,10; 5,29]	[1,91; 2,92]	[2,00; 3,10]	[2,42; 3,58]	[2,51; 3,81]	[2,57; 3,84]	[2,90; 4,35]	[3,11; 4,64]	[2,66; 4,33]
		Median mittlere Differenz		0,23	0,57	1,00	1,49	1,95	2,15	2,42	2,95	2,94	2,88	3,35	3,46	3,40
	untergewichtig	Anzahl	11	5	4	4	5	3	3	0	3	4	3	2	3	2
		Anteil in %	4,49	2,24	1,99	2,25	3,16	1,91	2,24	0,00	2,61	3,74	3,00	2,25	3,80	2,86
		CI Anteil in %	[1,89; 7,09]	[0,29; 4,19]	[0,05; 3,93]	[0,06; 4,43]	[0,43; 5,90]	[0,00; 4,06]	[0,00; 4,75]	[0,00; 0,00]	[0,00; 5,53]	[0,13; 7,35]	[0,00; 6,36]	[0,00; 5,34]	[0,00; 8,04]	[0,00; 6,79]
	normalgewichtig	Anzahl	168	144	143	120	108	102	88	79	74	68	67	60	52	53
		Anteil in %	68,57	64,57	71,14	67,42	68,35	64,97	65,67	65,83	64,35	63,55	67,00	67,42	65,82	75,71
		CI Anteil in %	[62,75; 74,40]	[58,28; 70,87]	[64,86; 77,42]	[60,51; 74,32]	[61,08; 75,63]	[57,48; 72,45]	[57,60; 73,74]	[57,31; 74,35]	[55,56; 73,14]	[54,39; 72,71]	[57,74; 76,26]	[57,62; 77,21]	[55,30; 76,35]	[65,60; 85,83]
	mäßig adipös	Anzahl	41	42	30	30	22	24	25	24	20	20	18	15	16	12
		Anteil in %	16,73	18,83	14,93	16,85	13,92	15,29	18,66	20,00	17,39	18,69	18,00	16,85	20,25	17,14
		CI Anteil in %	[12,05; 21,42]	[13,69; 23,98]	[9,99; 19,86]	[11,34; 22,37]	[8,51; 19,34]	[9,64; 20,93]	[12,04; 25,28]	[12,81; 27,19]	[10,43; 24,35]	[11,27; 26,11]	[10,43; 25,57]	[9,03; 24,68]	[11,33; 29,17]	[8,25; 26,04]
	stark adipös	Anzahl	25	32	24	24	23	28	18	17	18	15	12	12	8	3
		Anteil in %	10,20	14,35	11,94	13,48	14,56	17,83	13,43	14,17	15,65	14,02	12,00	13,48	10,13	4,29
		CI Anteil in %	[6,41; 14,00]	[9,74; 18,96]	[7,45; 16,43]	[8,45; 18,51]	[9,04; 20,07]	[11,83; 23,84]	[7,64; 19,23]	[7,90; 20,43]	[8,98; 22,32]	[7,41; 20,63]	[5,60; 18,40]	[6,35; 20,62]	[3,43; 16,82]	[0,00; 9,06]
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	128	119	112	104	90	85	76	72	67	61	54	50	46	42
	auswertbar	Anzahl	128	115	106	95	82	80	76	72	66	58	49	46	44	40
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,24	20,18	20,51	20,67	20,88	21,00	21,38	21,24	21,68	22,20	21,72	22,33	22,76	23,26
		CI Mean	[19,41; 21,06]	[19,34; 21,03]	[19,62; 21,40]	[19,75; 21,59]	[19,89; 21,87]	[19,91; 22,09]	[20,31; 22,46]	[20,15; 22,33]	[20,49; 22,86]	[20,87; 23,52]	[20,34; 23,10]	[20,80; 23,86]	[21,19; 24,34]	[21,53; 24,99]
		Median	19,44	19,22	19,62	20,16	20,09	20,14	20,62	20,87	21,06	21,70	20,83	21,81	21,62	22,67
		Fallbasis mittlere Differenz		115	106	95	82	80	76	72	66	58	49	46	44	40
		Mittlere Differenz zur ED		0,33	0,77	1,06	1,22	1,09	1,62	1,58	2,02	2,53	2,46	2,84	3,46	3,82
		CI mittlere Differenz		[0,09; 0,57]	[0,37; 1,18]	[0,67; 1,44]	[0,84; 1,60]	[0,63; 1,56]	[1,12; 2,12]	[1,07; 2,10]	[1,43; 2,62]	[1,88; 3,19]	[1,74; 3,18]	[2,03; 3,64]	[2,54; 4,37]	[2,80; 4,84]
		Median mittlere Differenz		0,00	0,61	0,94	1,03	1,10	1,55	1,67	2,30	2,67	2,49	3,23	3,58	3,86
	untergewichtig	Anzahl	7	3	3	3	3	5	5	5	4	2	3	3	3	2
		Anteil in %	5,47	2,61	2,83	3,16	3,66	6,25	6,58	6,94	6,06	3,45	6,12	6,52	6,82	5,00
		CI Anteil in %	[1,51; 9,42]	[0,00; 5,53]	[0,00; 6,00]	[0,00; 6,69]	[0,00; 7,75]	[0,91; 11,59]	[0,97; 12,19]	[1,03; 12,86]	[0,26; 11,86]	[0,00; 8,19]	[0,00; 12,90]	[0,00; 13,74]	[0,00; 14,35]	[0,00; 11,84]
	normalgewichtig	Anzahl	77	77	72	60	55	50	45	40	40	37	33	26	24	21
		Anteil in %	60,16	66,96	67,92	63,16	67,07	62,50	59,21	55,56	60,61	63,79	67,35	56,52	54,55	52,50
		CI Anteil in %	[51,64; 68,67]	[58,32; 75,59]	[59,00; 76,85]	[53,41; 72,91]	[56,84; 77,31]	[51,82; 73,18]	[48,09; 70,33]	[44,00; 67,11]	[48,73; 72,48]	[51,32; 76,27]	[54,08; 80,61]	[42,04; 71,01]	[39,66; 69,43]	[36,83; 68,17]
	mäßig adipös	Anzahl	21	16	13	14	9	10	14	17	17	11	7	10	11	12
		Anteil in %	16,41	13,91	12,26	14,74	10,98	12,50	18,42	23,61	25,76	18,97	14,29	21,74	25,00	30,00
		CI Anteil in %	[9,97; 22,85]	[7,56; 20,27]	[5,99; 18,54]	[7,57; 21,90]	[4,17; 17,78]	[5,21; 19,79]	[9,65; 27,19]	[13,73; 33,49]	[15,13; 36,39]	[8,79; 29,14]	[4,39; 24,19]	[9,69; 33,79]	[12,06; 37,94]	[15,62; 44,38]
	stark adipös	Anzahl	23	19	18	18	15	15	12	10	5	8	6	7	6	5
Anteil in %		17,97	16,52	16,98	18,95	18,29	18,75	15,79	13,89	7,58	13,79	12,24	15,22	13,64	12,50	
CI Anteil in %		[11,29; 24,65]	[9,70; 23,34]	[9,80; 24,16]	[11,03; 26,87]	[9,87; 26,71]	[10,14; 27,36]	[7,54; 24,04]	[5,84; 21,93]	[1,14; 14,01]	[4,84; 22,75]	[2,97; 21,52]	[4,72; 25,71]	[3,38; 23,89]	[2,12; 22,88]	

0.3. Ausgewertete Teilgruppen

Bei der tabellarischen Darstellung wird zum einen danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patienten dem DMP beigetreten sind. Zum anderen wird im vorliegenden „Age-Bericht“ nach Altersgruppen und in den Tabellen zu Patientenmerkmalen und -zahlen (sowie in einem separaten „Gender-Bericht“) nach Frauen und Männern differenziert.

Für die Altersauswertungen ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1 des Auswertungsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Kindern, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts gerade 5 Jahre alt geworden waren (und somit die Altersbedingung für die Programmteilnahme erfüllen), das rechnerische Alter „4“ zugewiesen, wenn Sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 5 Jahre alt gewesen waren. Daher beginnt die unterste Alterskategorie mit 4 und nicht mit 5 Jahren.

Für einige weitere Aspekte wird zusätzlich nach „Kollektiven“ unterschieden. Die sich hierdurch ergebenden Patientengruppen unterliegen besonderen Risiken (z.B. Raucherstatus). Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei der zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt wiederum unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. So wird beispielsweise ein Patient dem Kollektiv der Raucher zugeordnet, wenn in der Erstdokumentation der entsprechende Raucherstatus vermerkt ist. Der Patient bleibt dann – sofern er nicht aus dem DMP ausscheidet – über den gesamten Berichtszeitraum hinweg Mitglied des Raucherkollektivs, selbst wenn er noch innerhalb dieses Zeitraums mit dem Rauchen aufhört.

Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte

Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten, Geschlecht und Alter ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten <18 bzw. <12 Jahre jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	Patienten <18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115	
	männlich	Anzahl	245	237	211	193	175	161	140	124	117	108	102	90	81	73	
		Anteil in %	65,68	66,57	65,33	64,98	66,04	65,45	64,81	63,27	63,59	63,91	65,38	64,29	63,78	63,48	
	weiblich	Anzahl	128	119	112	104	90	85	76	72	67	61	54	50	46	42	
		Anteil in %	34,32	33,43	34,67	35,02	33,96	34,55	35,19	36,73	36,41	36,09	34,62	35,71	36,22	36,52	
	Patienten <12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85	
	männlich	Anzahl	175	170	150	139	126	117	100	92	88	83	79	70	62	58	
		Anteil in %	70,00	70,83	69,12	68,81	70,00	70,06	68,97	68,15	69,84	70,34	71,17	69,31	68,13	68,24	
	weiblich	Anzahl	75	70	67	63	54	50	45	43	38	35	32	31	29	27	
		Anteil in %	30,00	29,17	30,88	31,19	30,00	29,94	31,03	31,85	30,16	29,66	28,83	30,69	31,87	31,76	
2006-2	Patienten <18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930		
	männlich	Anzahl	2080	1925	1710	1550	1419	1314	1171	1041	932	829	752	674	599		
		Anteil in %	62,67	62,72	62,25	62,83	62,79	62,93	62,92	63,44	63,14	63,09	64,33	64,50	64,41		
	weiblich	Anzahl	1239	1144	1037	917	841	774	690	600	544	485	417	371	331		
		Anteil in %	37,33	37,28	37,75	37,17	37,21	37,07	37,08	36,56	36,86	36,91	35,67	35,50	35,59		
	Patienten <12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770		
	männlich	Anzahl	1491	1397	1245	1146	1059	993	900	835	756	689	631	576	515		
		Anteil in %	64,83	64,74	64,11	65,04	64,89	65,03	65,26	66,11	65,63	65,87	66,56	66,82	66,88		
	weiblich	Anzahl	809	761	697	616	573	534	479	428	396	357	317	286	255		
		Anteil in %	35,17	35,26	35,89	34,96	35,11	34,97	34,74	33,89	34,38	34,13	33,44	33,18	33,12		
2007-1	Patienten <18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818			
	männlich	Anzahl	3716	3376	3002	2713	2451	2217	1974	1790	1583	1435	1294	1153			
		Anteil in %	61,43	61,59	61,81	62,07	62,21	62,42	62,61	62,92	63,09	63,72	63,62	63,42			
	weiblich	Anzahl	2333	2105	1855	1658	1489	1335	1179	1055	926	817	740	665			
		Anteil in %	38,57	38,41	38,19	37,93	37,79	37,58	37,39	37,08	36,91	36,28	36,38	36,58			
	Patienten <12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467			
	männlich	Anzahl	2474	2274	2038	1854	1709	1575	1450	1331	1215	1120	1033	946			
		Anteil in %	63,13	63,29	63,33	63,17	63,39	63,35	63,71	63,71	64,18	64,70	64,81	64,49			
	weiblich	Anzahl	1445	1319	1180	1081	987	911	826	758	678	611	561	521			
		Anteil in %	36,87	36,71	36,67	36,83	36,61	36,65	36,29	36,29	35,82	35,30	35,19	35,51			
2007-2	Patienten <18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138				
	männlich	Anzahl	6106	5468	4898	4394	3876	3451	3101	2773	2485	2226	1983				
		Anteil in %	62,52	62,32	62,22	62,31	62,44	62,67	62,95	62,99	63,07	63,40	63,19				
	weiblich	Anzahl	3661	3306	2974	2658	2332	2056	1825	1629	1455	1285	1155				
		Anteil in %	37,48	37,68	37,78	37,69	37,56	37,33	37,05	37,01	36,93	36,60	36,81				
	Patienten <12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497				
	männlich	Anzahl	4250	3854	3470	3146	2817	2566	2358	2174	1978	1800	1632				
		Anteil in %	65,29	65,08	64,81	64,85	64,70	64,60	64,89	65,09	65,09	65,36	65,36				
	weiblich	Anzahl	2259	2068	1884	1705	1537	1406	1276	1166	1061	954	865				
		Anteil in %	34,71	34,92	35,19	35,15	35,30	35,40	35,11	34,91	34,91	34,64	34,64				

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2008-1	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373				
	männlich	Anzahl	6438	5793	5197	4421	3839	3413	3030	2686	2367	2105					
		Anteil in %	61,67	61,57	61,95	61,89	61,83	62,22	62,38	62,51	62,47	62,41					
	weiblich	Anzahl	4001	3616	3192	2722	2370	2072	1827	1611	1422	1268					
		Anteil in %	38,33	38,43	38,05	38,11	38,17	37,78	37,62	37,49	37,53	37,59					
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538				
	männlich	Anzahl	4173	3820	3465	3020	2693	2434	2205	1992	1795	1632					
		Anteil in %	64,66	64,56	64,56	64,64	64,38	64,31	64,21	64,11	64,18	64,30					
weiblich	Anzahl	2281	2097	1902	1652	1490	1351	1229	1115	1002	906						
	Anteil in %	35,34	35,44	35,44	35,36	35,62	35,69	35,79	35,89	35,82	35,70						
2008-2	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370					
	männlich	Anzahl	5542	4981	4285	3735	3321	2936	2632	2329	2096						
		Anteil in %	60,88	61,16	61,25	61,28	61,51	61,75	61,89	62,07	62,20						
	weiblich	Anzahl	3561	3163	2711	2360	2078	1819	1621	1423	1274						
		Anteil in %	39,12	38,84	38,75	38,72	38,49	38,25	38,11	37,93	37,80						
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397					
	männlich	Anzahl	3620	3307	2906	2586	2344	2111	1925	1737	1584						
		Anteil in %	65,05	65,27	65,38	65,27	65,49	65,70	65,83	66,00	66,08						
weiblich	Anzahl	1945	1760	1539	1376	1235	1102	999	895	813							
	Anteil in %	34,95	34,73	34,62	34,73	34,51	34,30	34,17	34,00	33,92							
2009-1	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822						
	männlich	Anzahl	4438	3819	3270	2863	2483	2188	1973	1740							
		Anteil in %	61,41	61,40	61,30	61,49	61,57	61,32	61,69	61,66							
	weiblich	Anzahl	2789	2401	2064	1793	1550	1380	1225	1082							
		Anteil in %	38,59	38,60	38,70	38,51	38,43	38,68	38,31	38,34							
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016						
	männlich	Anzahl	2838	2516	2186	1930	1704	1532	1411	1277							
		Anteil in %	63,93	64,12	63,77	63,49	63,51	63,10	63,27	63,34							
weiblich	Anzahl	1601	1408	1242	1110	979	896	819	739								
	Anteil in %	36,07	35,88	36,23	36,51	36,49	36,90	36,73	36,66								
2009-2	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826							
	männlich	Anzahl	3997	3470	2906	2496	2216	1927	1701								
		Anteil in %	59,95	59,87	59,54	60,04	60,55	60,22	60,19								
	weiblich	Anzahl	2670	2326	1975	1661	1444	1273	1125								
		Anteil in %	40,05	40,13	40,46	39,96	39,45	39,78	39,81								
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005							
	männlich	Anzahl	2584	2303	1987	1753	1589	1414	1281								
		Anteil in %	63,40	63,10	62,74	63,10	63,56	63,49	63,89								
weiblich	Anzahl	1492	1347	1180	1025	911	813	724									
	Anteil in %	36,60	36,90	37,26	36,90	36,44	36,51	36,11									
2010-1	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291								
	männlich	Anzahl	4155	3567	3025	2614	2284	2023									
		Anteil in %	60,94	61,09	60,95	61,07	61,32	61,47									
	weiblich	Anzahl	2663	2272	1938	1666	1441	1268									
		Anteil in %	39,06	38,91	39,05	38,93	38,68	38,53									
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241								
	männlich	Anzahl	2712	2376	2047	1808	1605	1443									
		Anteil in %	64,71	64,78	64,33	64,41	64,38	64,39									
weiblich	Anzahl	1479	1292	1135	999	888	798										
	Anteil in %	35,29	35,22	35,67	35,59	35,62	35,61										
2010-2	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731									
	männlich	Anzahl	3936	3367	2919	2511	2217										
		Anteil in %	58,95	58,98	59,21	58,99	59,42										
	weiblich	Anzahl	2741	2342	2011	1746	1514										
		Anteil in %	41,05	41,02	40,79	41,01	40,58										
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591									
	männlich	Anzahl	2663	2331	2056	1816	1625										
		Anteil in %	62,75	62,38	62,78	62,71	62,72										
weiblich	Anzahl	1581	1406	1219	1080	966											
	Anteil in %	37,25	37,62	37,22	37,29	37,28											

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-1	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	6222	5297	4479	3847										
	männlich	Anzahl	3704	3173	2696	2304											
		Anteil in %	59,53	59,90	60,19	59,89											
	weiblich	Anzahl	2518	2124	1783	1543											
		Anteil in %	40,47	40,10	39,81	40,11											
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	3862	3376	2940	2581										
	männlich	Anzahl	2421	2120	1849	1613											
		Anteil in %	62,69	62,80	62,89	62,50											
weiblich	Anzahl	1441	1256	1091	968												
	Anteil in %	37,31	37,20	37,11	37,50												
2011-2	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	6269	5394	4553											
	männlich	Anzahl	3712	3183	2696												
		Anteil in %	59,21	59,01	59,21												
	weiblich	Anzahl	2557	2211	1857												
		Anteil in %	40,79	40,99	40,79												
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	3957	3484	3022											
	männlich	Anzahl	2513	2205	1917												
		Anteil in %	63,51	63,29	63,43												
weiblich	Anzahl	1444	1279	1105													
	Anteil in %	36,49	36,71	36,57													
2012-1	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	6684	5721												
	männlich	Anzahl	3983	3410													
		Anteil in %	59,59	59,60													
	weiblich	Anzahl	2701	2311													
		Anteil in %	40,41	40,40													
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	4314	3782												
	männlich	Anzahl	2690	2345													
		Anteil in %	62,36	62,00													
weiblich	Anzahl	1624	1437														
	Anteil in %	37,64	38,00														
2012-2	Patienten <18 insgesamt		Anzahl	5942													
	männlich	Anzahl	3611														
		Anteil in %	60,77														
	weiblich	Anzahl	2331														
		Anteil in %	39,23														
	Patienten <12 insgesamt		Anzahl	3748													
	männlich	Anzahl	2427														
		Anteil in %	64,75														
weiblich	Anzahl	1321															
	Anteil in %	35,25															

Tabelle 1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten <18 bzw. <12 bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss

durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitritts-halb-jahr.

Tabelle 1.3a Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten <18 bzw. <12 Jahre (Werte kumuliert)

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr		
2006-1	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	17	50	76	108	127	157	177	189	204	217	233	246	258	265	
		Anteil in %	4,56	13,40	20,38	28,95	34,05	42,09	47,45	50,67	54,69	58,18	62,47	65,95	69,17	71,05	
		CI Anteil in %	[2,44; 6,68]	[9,94; 16,87]	[16,28; 24,47]	[24,35; 33,56]	[29,23; 38,86]	[37,07; 47,11]	[42,38; 52,53]	[45,59; 55,75]	[49,63; 59,75]	[53,16; 63,19]	[57,55; 67,39]	[61,14; 70,77]	[64,48; 73,86]	[66,44; 75,65]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	17	47	71	94	108	134	150	161	173	184	197	208	218	223	
		Anteil in %	4,56	12,60	19,03	25,20	28,95	35,92	40,21	43,16	46,38	49,33	52,82	55,76	58,45	59,79	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	3	4	13	18	22	26	26	29	30	33	35	37	38	
		Anteil in %	0,00	0,80	1,07	3,49	4,83	5,90	6,97	6,97	7,77	8,04	8,85	9,38	9,92	10,19	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,54	0,54	0,80	0,80	0,80	0,80	1,07	
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115	108
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	10	33	48	70	83	105	115	124	132	139	149	159	165	168	
		Anteil in %	4,00	13,20	19,20	28,00	33,20	42,00	46,00	49,60	52,80	55,60	59,60	63,60	66,00	67,20	
		CI Anteil in %	[1,57; 6,43]	[9,00; 17,40]	[14,31; 24,09]	[22,42; 33,58]	[27,35; 39,05]	[35,87; 48,13]	[39,81; 52,19]	[43,39; 55,81]	[46,60; 59,00]	[49,43; 61,77]	[53,51; 65,69]	[57,62; 69,58]	[60,12; 71,88]	[61,37; 73,03]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	10	30	44	58	67	85	93	101	107	112	121	130	135	136	
		Anteil in %	4,00	12,00	17,60	23,20	26,80	34,00	37,20	40,40	42,80	44,80	48,40	52,00	54,00	54,40	
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	3	4	12	16	20	22	22	24	25	26	27	28	29		
	Anteil in %	0,00	1,20	1,60	4,80	6,40	8,00	8,80	8,80	9,60	10,00	10,40	10,80	11,20	11,60		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3		
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20		
Pat. < 12 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-2	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	250	572	852	1059	1231	1458	1678	1843	2005	2150	2274	2389	2469	
		Anteil in %	7,53	17,23	25,67	31,91	37,09	43,93	50,56	55,53	60,41	64,78	68,51	71,98	74,39	
		CI Anteil in %	[6,63; 8,43]	[15,95; 18,52]	[24,18; 27,16]	[30,32; 33,49]	[35,45; 38,73]	[42,24; 45,62]	[48,86; 52,26]	[53,84; 57,22]	[58,75; 62,07]	[63,15; 66,40]	[66,93; 70,10]	[70,45; 73,51]	[72,90; 75,88]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
		Anteil in %	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	232	485	697	846	969	1099	1256	1376	1502	1620	1705	1792	1835	
		Anteil in %	6,99	14,61	21,00	25,49	29,20	33,11	37,84	41,46	45,25	48,81	51,37	53,99	55,29	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	14	79	144	197	242	331	390	430	463	489	524	550	586	
		Anteil in %	0,42	2,38	4,34	5,94	7,29	9,97	11,75	12,96	13,95	14,73	15,79	16,57	17,66	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	7	9	14	18	26	30	35	38	39	42	44	45	
		Anteil in %	0,12	0,21	0,27	0,42	0,54	0,78	0,90	1,05	1,14	1,18	1,27	1,33	1,36	
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930	850
	2006-2	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	142	358	538	668	773	921	1037	1148	1254	1352	1438	1530	1602
Anteil in %			6,17	15,57	23,39	29,04	33,61	40,04	45,09	49,91	54,52	58,78	62,52	66,52	69,65	
CI Anteil in %			[5,19; 7,16]	[14,08; 17,05]	[21,66; 25,12]	[27,19; 30,90]	[31,68; 35,54]	[38,04; 42,05]	[43,05; 47,12]	[47,87; 51,96]	[52,49; 56,56]	[56,77; 60,79]	[60,54; 64,50]	[64,59; 68,45]	[67,77; 71,53]	
davon wegen Tod		Anzahl	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
		Anteil in %	0,00	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,13	0,13	0,13	
davon wegen Ausschluss		Anzahl	132	295	429	524	597	670	754	834	921	1003	1066	1139	1177	
		Anteil in %	5,74	12,83	18,65	22,78	25,96	29,13	32,78	36,26	40,04	43,61	46,35	49,52	51,17	
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	9	59	102	133	162	231	260	291	308	324	343	361	395	
		Anteil in %	0,39	2,57	4,43	5,78	7,04	10,04	11,30	12,65	13,39	14,09	14,91	15,70	17,17	
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	1	3	5	9	12	18	21	21	23	23	26	27	27	
		Anteil in %	0,04	0,13	0,22	0,39	0,52	0,78	0,91	0,91	1,00	1,00	1,13	1,17	1,17	
Pat. < 12 insges.:		zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770	698
2007-1		ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	568	1192	1678	2109	2497	2896	3204	3540	3797	4015	4231	4414	
	Anteil in %		9,39	19,71	27,74	34,87	41,28	47,88	52,97	58,52	62,77	66,37	69,95	72,97		
	CI Anteil in %		[8,65; 10,13]	[18,70; 20,71]	[26,61; 28,87]	[33,66; 36,07]	[40,04; 42,52]	[46,62; 49,13]	[51,71; 54,23]	[57,28; 59,76]	[61,55; 63,99]	[65,18; 67,57]	[68,79; 71,10]	[71,85; 74,09]		
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	2	4	5	5	5	6	6	6	6	6		
		Anteil in %	0,00	0,02	0,03	0,07	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	511	980	1327	1635	1882	2157	2382	2618	2812	2977	3124	3224		
		Anteil in %	8,45	16,20	21,94	27,03	31,11	35,66	39,38	43,28	46,49	49,21	51,64	53,30		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	55	203	331	447	570	686	762	852	911	959	1026	1104		
		Anteil in %	0,91	3,36	5,47	7,39	9,42	11,34	12,60	14,08	15,06	15,85	16,96	18,25		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	8	18	23	40	48	55	64	68	73	75	80		
		Anteil in %	0,03	0,13	0,30	0,38	0,66	0,79	0,91	1,06	1,12	1,21	1,24	1,32		
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818	
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818	1635	
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	326	701	984	1223	1433	1643	1830	2026	2188	2325	2452	2569		
Anteil in %		8,32	17,89	25,11	31,21	36,57	41,92	46,70	51,70	55,83	59,33	62,57	65,55			
CI Anteil in %		[7,45; 9,18]	[16,69; 19,09]	[23,75; 26,47]	[29,76; 32,66]	[35,06; 38,07]	[40,38; 43,47]	[45,13; 48,26]	[50,13; 53,26]	[54,28; 57,39]	[57,79; 60,86]	[61,05; 64,08]	[64,06; 67,04]			
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2			
	Anteil in %	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			
davon wegen Ausschluss	Anzahl	292	585	788	958	1084	1237	1381	1515	1640	1736	1823	1883			
	Anteil in %	7,45	14,93	20,11	24,45	27,66	31,56	35,24	38,66	41,85	44,30	46,52	48,05			
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	32	111	186	251	327	377	419	475	512	549	588	642			
	Anteil in %	0,82	2,83	4,75	6,40	8,34	9,62	10,69	12,12	13,06	14,01	15,00	16,38			
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	5	9	13	21	28	29	34	34	38	39	42			
	Anteil in %	0,05	0,13	0,23	0,33	0,54	0,71	0,74	0,87	0,87	0,97	1,00	1,07			
Pat. < 12 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467	1350		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr			
2007-2	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	993	1895	2715	3559	4260	4841	5365	5827	6256	6629	6927					
		Anteil in %	10,17	19,40	27,80	36,44	43,62	49,56	54,93	59,66	64,05	67,87	70,92					
		CI Anteil in %	[9,57; 10,77]	[18,62; 20,19]	[26,91; 28,69]	[35,48; 37,39]	[42,63; 44,60]	[48,57; 50,56]	[53,94; 55,92]	[58,69; 60,63]	[63,10; 65,00]	[66,95; 68,80]	[70,02; 71,82]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	2	2	4	5	6	6	6	7	7					
		Anteil in %	0,00	0,01	0,02	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	920	1593	2182	2725	3194	3618	3981	4337	4640	4914	5068					
		Anteil in %	9,42	16,31	22,34	27,90	32,70	37,04	40,76	44,40	47,51	50,31	51,89					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	68	283	496	772	990	1137	1294	1394	1514	1610	1745					
		Anteil in %	0,70	2,90	5,08	7,90	10,14	11,64	13,25	14,27	15,50	16,48	17,87					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	18	35	60	72	81	84	90	95	98	107					
		Anteil %	0,05	0,18	0,36	0,61	0,74	0,83	0,86	0,92	0,97	1,00	1,10					
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138				
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138	2840				
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	587	1155	1658	2155	2537	2875	3169	3470	3755	4012	4203				
			Anteil in %	9,02	17,74	25,47	33,11	38,98	44,17	48,69	53,31	57,69	61,64	64,57				
			CI Anteil in %	[8,32; 9,71]	[16,82; 18,67]	[24,41; 26,53]	[31,96; 34,25]	[37,79; 40,16]	[42,96; 45,38]	[47,47; 49,90]	[52,10; 54,52]	[56,49; 58,89]	[60,46; 62,82]	[63,41; 65,73]				
		davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2				
			Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
davon wegen Ausschluss		Anzahl	540	961	1327	1649	1917	2163	2373	2602	2816	3006	3097					
		Anteil in %	8,30	14,76	20,39	25,33	29,45	33,23	36,46	39,98	43,26	46,18	47,58					
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	44	182	307	473	578	666	749	817	886	951	1047					
		Anteil in %	0,68	2,80	4,72	7,27	8,88	10,23	11,51	12,55	13,61	14,61	16,09					
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	3	12	24	33	41	45	45	49	51	53	57					
		Anteil %	0,05	0,18	0,37	0,51	0,63	0,69	0,69	0,75	0,78	0,81	0,88					
Pat. < 12 insges.:		zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497	2306					
2008-1	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	1030	2050	3296	4230	4954	5582	6142	6650	7066	7387						
		Anteil in %	9,87	19,64	31,57	40,52	47,46	53,47	58,84	63,70	67,69	70,76						
		CI Anteil in %	[9,29; 10,44]	[18,88; 20,40]	[30,68; 32,47]	[39,58; 41,46]	[46,50; 48,41]	[52,52; 54,43]	[57,89; 59,78]	[62,78; 64,63]	[66,79; 68,59]	[69,89; 71,64]						
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	4	5	6	6	7	8	9	9						
		Anteil in %	0,00	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	963	1765	2547	3185	3726	4178	4612	4959	5259	5445						
		Anteil in %	9,23	16,91	24,40	30,51	35,69	40,02	44,18	47,50	50,38	52,16						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	65	269	702	984	1155	1321	1441	1598	1711	1842						
		Anteil in %	0,62	2,58	6,72	9,43	11,06	12,65	13,80	15,31	16,39	17,65						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	14	43	56	67	77	82	85	87	91						
		Anteil %	0,02	0,13	0,41	0,54	0,64	0,74	0,79	0,81	0,83	0,87						
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373					
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373	3052					
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	537	1087	1782	2271	2669	3020	3347	3657	3916	4118					
			Anteil in %	8,32	16,84	27,61	35,19	41,35	46,79	51,86	56,66	60,68	63,81					
			CI Anteil in %	[7,65; 8,99]	[15,93; 17,76]	[26,52; 28,70]	[34,02; 36,35]	[40,15; 42,56]	[45,58; 48,01]	[50,64; 53,08]	[55,45; 57,87]	[59,48; 61,87]	[62,63; 64,98]					
		davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1					
			Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02					
davon wegen Ausschluss		Anzahl	496	934	1388	1739	2036	2299	2551	2772	2965	3095						
		Anteil in %	7,69	14,47	21,51	26,94	31,55	35,62	39,53	42,95	45,94	47,95						
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	40	146	376	504	601	682	754	842	908	978						
		Anteil in %	0,62	2,26	5,83	7,81	9,31	10,57	11,68	13,05	14,07	15,15						
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	1	7	18	28	32	39	41	42	42	44						
		Anteil %	0,02	0,11	0,28	0,43	0,50	0,60	0,64	0,65	0,65	0,68						
Pat. < 12 insges.:		zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538	2336						

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr		
2008-2	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	959	2107	3008	3704	4348	4850	5351	5733	6048						
		Anteil in %	10,53	23,15	33,04	40,69	47,76	53,28	58,78	62,98	66,44						
		CI Anteil in %	[9,90; 11,17]	[22,28; 24,01]	[32,08; 34,01]	[39,68; 41,70]	[46,74; 48,79]	[52,25; 54,30]	[57,77; 59,79]	[61,99; 63,97]	[65,47; 67,41]						
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	2	2	2	3	4	5	5						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	888	1771	2384	2892	3345	3724	4095	4361	4542						
		Anteil in %	9,76	19,46	26,19	31,77	36,75	40,91	44,99	47,91	49,90						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	63	316	588	763	942	1057	1180	1291	1421						
		Anteil in %	0,69	3,47	6,46	8,38	10,35	11,61	12,96	14,18	15,61						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	8	20	34	47	59	66	72	76	80						
		Anteil %	0,09	0,22	0,37	0,52	0,65	0,73	0,79	0,83	0,88						
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370					
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370	3055					
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	498	1120	1603	1986	2352	2641	2933	3168	3361						
		Anteil in %	8,95	20,13	28,81	35,69	42,26	47,46	52,70	56,93	60,40						
		CI Anteil in %	[8,20; 9,70]	[19,07; 21,18]	[27,62; 29,99]	[34,43; 36,95]	[40,97; 43,56]	[46,15; 48,77]	[51,39; 54,02]	[55,63; 58,23]	[59,11; 61,68]						
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	1	2	2						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	455	947	1279	1564	1831	2051	2268	2441	2556						
		Anteil in %	8,18	17,02	22,98	28,10	32,90	36,86	40,75	43,86	45,93						
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	38	163	308	399	491	559	631	692	768							
	Anteil in %	0,68	2,93	5,53	7,17	8,82	10,04	11,34	12,43	13,80							
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	10	16	23	30	31	33	33	35							
	Anteil %	0,09	0,18	0,29	0,41	0,54	0,56	0,59	0,59	0,63							
Pat. < 12 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397						
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397	2204						
2009-1	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	1007	1893	2571	3194	3659	4029	4405	4645							
		Anteil in %	13,93	26,19	35,57	44,20	50,63	55,75	60,95	64,27							
		CI Anteil in %	[13,14; 14,73]	[25,18; 27,21]	[34,47; 36,68]	[43,05; 45,34]	[49,48; 51,78]	[54,60; 56,89]	[59,83; 62,08]	[63,17; 65,38]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	1	1	1	2	2							
		Anteil in %	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	953	1597	2094	2560	2926	3196	3475	3615							
		Anteil in %	13,19	22,10	28,97	35,42	40,49	44,22	48,08	50,02							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	50	265	437	588	685	781	871	967							
		Anteil in %	0,69	3,67	6,05	8,14	9,48	10,81	12,05	13,38							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	30	39	45	47	51	57	61							
		Anteil %	0,06	0,42	0,54	0,62	0,65	0,71	0,79	0,84							
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822						
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822	2582						
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	515	1011	1399	1756	2011	2209	2423	2568							
		Anteil in %	11,60	22,78	31,52	39,56	45,30	49,76	54,58	57,85							
		CI Anteil in %	[10,66; 12,54]	[21,54; 24,01]	[30,15; 32,88]	[38,12; 41,00]	[43,84; 46,77]	[48,29; 51,23]	[53,12; 56,05]	[56,40; 59,30]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	485	852	1135	1399	1602	1751	1916	2001							
		Anteil in %	10,93	19,19	25,57	31,52	36,09	39,45	43,16	45,08							
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	29	147	246	335	387	434	480	538								
	Anteil in %	0,65	3,31	5,54	7,55	8,72	9,78	10,81	12,12								
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	12	18	22	22	24	27	29								
	Anteil %	0,02	0,27	0,41	0,50	0,50	0,54	0,61	0,65								
Pat. < 12 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016							
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016	1871							

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2009-2	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	871	1786	2510	3007	3467	3841	4091							
		Anteil in %	13,06	26,79	37,65	45,10	52,00	57,61	61,36							
		CI Anteil in %	[12,26; 13,87]	[25,73; 27,85]	[36,49; 38,81]	[43,91; 46,30]	[50,80; 53,20]	[56,43; 58,80]	[60,19; 62,53]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	2	3	5	6	7							
		Anteil in %	0,00	0,03	0,03	0,04	0,07	0,09	0,10							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	824	1533	2070	2450	2788	3061	3215							
		Anteil in %	12,36	22,99	31,05	36,75	41,82	45,91	48,22							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	44	228	412	518	633	728	820							
		Anteil in %	0,66	3,42	6,18	7,77	9,49	10,92	12,30							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	23	26	36	41	46	49							
		Anteil %	0,04	0,34	0,39	0,54	0,61	0,69	0,73							
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826						
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	5796	4881	4157	3660	3200	2826	2576						
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	426	909	1298	1576	1849	2071	2216							
		Anteil in %	10,45	22,30	31,84	38,67	45,36	50,81	54,37							
		CI Anteil in %	[9,51; 11,39]	[21,02; 23,58]	[30,41; 33,28]	[37,17; 40,16]	[43,83; 46,89]	[49,27; 52,34]	[52,84; 55,90]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	1	1	2	2							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	401	769	1054	1262	1474	1634	1727							
		Anteil in %	9,84	18,87	25,86	30,96	36,16	40,09	42,37							
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	24	127	229	294	354	412	462								
	Anteil in %	0,59	3,12	5,62	7,21	8,68	10,11	11,33								
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	13	15	19	20	23	25								
	Anteil %	0,02	0,32	0,37	0,47	0,49	0,56	0,61								
Pat. < 12 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005							
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3650	3167	2778	2500	2227	2005	1860							
2010-1	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	979	1855	2538	3093	3527	3820								
		Anteil in %	14,36	27,21	37,22	45,37	51,73	56,03								
		CI Anteil in %	[13,53; 15,19]	[26,15; 28,26]	[36,08; 38,37]	[44,18; 46,55]	[50,54; 52,92]	[54,85; 57,21]								
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	2	3	4								
		Anteil in %	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,06								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	937	1608	2136	2552	2904	3085								
		Anteil in %	13,74	23,58	31,33	37,43	42,59	45,25								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	40	235	379	510	588	694								
		Anteil in %	0,59	3,45	5,56	7,48	8,62	10,18								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	11	22	29	32	37								
		Anteil %	0,03	0,16	0,32	0,43	0,47	0,54								
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291							
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	5839	4963	4280	3725	3291	2998							
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	523	1009	1384	1698	1950	2103								
		Anteil in %	12,48	24,08	33,02	40,52	46,53	50,18								
		CI Anteil in %	[11,48; 13,48]	[22,78; 25,37]	[31,60; 34,45]	[39,03; 42,00]	[45,02; 48,04]	[48,66; 51,69]								
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	2	2	3								
		Anteil in %	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,07								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	493	877	1157	1396	1601	1696								
		Anteil in %	11,76	20,93	27,61	33,31	38,20	40,47								
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	29	124	208	277	324	380									
	Anteil in %	0,69	2,96	4,96	6,61	7,73	9,07									
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	7	18	23	23	24									
	Anteil %	0,02	0,17	0,43	0,55	0,55	0,57									
Pat. < 12 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3668	3182	2807	2493	2241	2088								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	968	1747	2420	2946	3314									
		Anteil in %	14,50	26,16	36,24	44,12	49,63									
		CI Anteil in %	[13,65; 15,34]	[25,11; 27,22]	[35,09; 37,40]	[42,93; 45,31]	[48,43; 50,83]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	916	1551	2031	2426	2639									
		Anteil in %	13,72	23,23	30,42	36,33	39,52									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	46	184	374	498	644									
		Anteil in %	0,69	2,76	5,60	7,46	9,65									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	12	15	22	31									
		Anteil %	0,09	0,18	0,22	0,33	0,46									
	Pat. < 18	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731								
	insges.:	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5709	4930	4257	3731	3363								
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	507	969	1348	1653	1865									
		Anteil in %	11,95	22,83	31,76	38,95	43,94									
		CI Anteil in %	[10,97; 12,92]	[21,57; 24,10]	[30,36; 33,16]	[37,48; 40,42]	[42,45; 45,44]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	478	851	1137	1358	1474									
		Anteil in %	11,26	20,05	26,79	32,00	34,73									
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	25	109	200	279	370										
	Anteil in %	0,59	2,57	4,71	6,57	8,72										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	9	11	16	21										
	Anteil %	0,09	0,21	0,26	0,38	0,49										
Pat. < 12	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591									
insges.:	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3737	3275	2896	2591	2379									
2011-1	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	925	1743	2375	2787										
		Anteil in %	14,87	28,01	38,17	44,79										
		CI Anteil in %	[13,98; 15,75]	[26,90; 29,13]	[36,96; 39,38]	[43,56; 46,03]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	3	3										
		Anteil in %	0,00	0,03	0,05	0,05										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	880	1502	1954	2200										
		Anteil in %	14,14	24,14	31,40	35,36										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	39	227	404	557										
		Anteil in %	0,63	3,65	6,49	8,95										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	12	14	27										
		Anteil %	0,10	0,19	0,23	0,43										
	Pat. < 18	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6222	5297	4479	3847									
	insges.:	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5297	4479	3847	3435									
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	486	922	1281	1502										
		Anteil in %	12,58	23,87	33,17	38,89										
		CI Anteil in %	[11,54; 13,63]	[22,53; 25,22]	[31,68; 34,65]	[37,35; 40,43]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	2	2										
		Anteil in %	0,00	0,05	0,05	0,05										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	457	791	1046	1180										
		Anteil in %	11,83	20,48	27,08	30,55										
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	23	118	221	302											
	Anteil in %	0,60	3,06	5,72	7,82											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	11	12	18											
	Anteil %	0,16	0,28	0,31	0,47											
Pat. < 12	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3862	3376	2940	2581										
insges.:	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3376	2940	2581	2360										

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2011-2	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	875	1716	2275											
		Anteil in %	13,96	27,37	36,29											
		CI Anteil in %	[13,10; 14,82]	[26,27; 28,48]	[35,10; 37,48]											
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1											
		Anteil in %	0,00	0,02	0,02											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	822	1452	1805											
		Anteil in %	13,11	23,16	28,79											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	46	243	439											
		Anteil in %	0,73	3,88	7,00											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	7	20	30											
		Anteil %	0,11	0,32	0,48											
	<i>Pat. < 18 insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6269</i>	<i>5394</i>	<i>4553</i>										
		<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5394</i>	<i>4553</i>	<i>3994</i>										
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	473	935	1235											
		Anteil in %	11,95	23,63	31,21											
		CI Anteil in %	[10,94; 12,96]	[22,31; 24,95]	[29,77; 32,65]											
davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1												
	Anteil in %	0,00	0,03	0,03												
davon wegen Ausschluss	Anzahl	440	797	992												
	Anteil in %	11,12	20,14	25,07												
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	30	127	226												
	Anteil in %	0,76	3,21	5,71												
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	10	16												
	Anteil %	0,08	0,25	0,40												
<i>Pat. < 12 insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3957</i>	<i>3484</i>	<i>3022</i>											
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3484</i>	<i>3022</i>	<i>2722</i>											
2012-1	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	963	1611												
		Anteil in %	14,41	24,10												
		CI Anteil in %	[13,57; 15,25]	[23,08; 25,13]												
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1												
		Anteil in %	0,01	0,01												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	913	1371												
		Anteil in %	13,66	20,51												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	47	221												
		Anteil in %	0,70	3,31												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	18												
		Anteil %	0,03	0,27												
	<i>Pat. < 18 insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6684</i>	<i>5721</i>											
		<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5721</i>	<i>5073</i>											
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	532	912												
		Anteil in %	12,33	21,14												
		CI Anteil in %	[11,35; 13,31]	[19,92; 22,36]												
davon wegen Tod	Anzahl	1	1													
	Anteil in %	0,02	0,02													
davon wegen Ausschluss	Anzahl	495	767													
	Anteil in %	11,47	17,78													
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	35	134													
	Anteil in %	0,81	3,11													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	10													
	Anteil %	0,02	0,23													
<i>Pat. < 12 insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4314</i>	<i>3782</i>												
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3782</i>	<i>3402</i>												

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	ausgeschiedene Patienten < 18 insges.	Anzahl	595													
		Anteil in %	10,01													
		CI Anteil in %	[9,25; 10,78]													
	davon wegen Tod	Anzahl	0													
		Anteil in %	0,00													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	556													
		Anteil in %	9,36													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	34													
		Anteil in %	0,57													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5													
		Anteil %	0,08													
	Pat. < 18 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5942												
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	5347												
	ausgeschiedene Patienten < 12 insges.	Anzahl	316													
		Anteil in %	8,43													
		CI Anteil in %	[7,54; 9,32]													
	davon wegen Tod	Anzahl	0													
		Anteil in %	0,00													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	293													
		Anteil in %	7,82													
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	19														
	Anteil in %	0,51														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4														
	Anteil %	0,11														
Pat. < 12 insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3748													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3432													

In Tabelle 1.3b wird im Unterschied zur Tabelle 1.2a zusätzlich zwischen „männlichen“ und „weiblichen“ Patienten <18 bzw. <12 unterschieden.

Die Tabelle gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen männlichen bzw. weiblichen Patienten <18 bzw. <12 bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Tabelle 1.3b Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene männliche und weibliche Patienten <18 bzw. <12 Jahre (Werte kumuliert)

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr		
2006-1	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	8	34	52	70	84	105	121	128	137	143	155	164	172	177	
		Anteil in %	3,27	13,88	21,22	28,57	34,29	42,86	49,39	52,24	55,92	58,37	63,27	66,94	70,20	72,24	
		CI Anteil in %	[1,04; 5,50]	[9,54; 18,22]	[16,09; 26,36]	[22,90; 34,24]	[28,33; 40,24]	[36,65; 49,07]	[43,11; 55,66]	[45,98; 58,51]	[49,69; 62,15]	[52,18; 64,55]	[57,22; 69,31]	[61,04; 72,84]	[64,47; 75,94]	[66,63; 77,86]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	8	32	49	62	73	92	104	110	117	122	133	140	147	151	
		Anteil in %	3,27	13,06	20,00	25,31	29,80	37,55	42,45	44,90	47,76	49,80	54,29	57,14	60,00	61,63	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	2	7	10	12	16	16	18	18	19	21	22	23	
		Anteil in %	0,00	0,82	0,82	2,86	4,08	4,90	6,53	6,53	7,35	7,35	7,76	8,57	8,98	9,39	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	
		Anteil %	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,82	0,82	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	
	männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	245	237	211	193	175	161	140	124	117	108	102	90	81	73
			Anzahl	237	211	193	175	161	140	124	117	108	102	90	81	73	68
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	9	16	24	38	43	52	56	61	67	74	78	82	86	88	
		Anteil in %	7,03	12,50	18,75	29,69	33,59	40,63	43,75	47,66	52,34	57,81	60,94	64,06	67,19	68,75	
		CI Anteil in %	[2,58; 11,48]	[6,75; 18,25]	[11,96; 25,54]	[21,74; 37,63]	[25,38; 41,81]	[32,08; 49,17]	[35,12; 52,38]	[38,97; 56,34]	[43,66; 61,03]	[49,22; 66,40]	[52,45; 69,42]	[55,72; 72,41]	[59,02; 75,35]	[60,69; 76,81]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	9	15	22	32	35	42	46	51	56	62	64	68	71	72	
		Anteil in %	7,03	11,72	17,19	25,00	27,34	32,81	35,94	39,84	43,75	48,44	50,00	53,13	55,47	56,25	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	6	8	10	10	10	11	12	14	14	15	15	
		Anteil in %	0,00	0,78	1,56	4,69	6,25	7,81	7,81	7,81	8,59	9,38	10,94	10,94	11,72	11,72	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	
	weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	128	119	112	104	90	85	76	72	67	61	54	50	46	42
			Anzahl	119	112	104	90	85	76	72	67	61	54	50	46	42	40
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	5	25	36	49	58	75	83	87	92	96	105	113	117	119	
		Anteil in %	2,86	14,29	20,57	28,00	33,14	42,86	47,43	49,71	52,57	54,86	60,00	64,57	66,86	68,00	
CI Anteil in %		[0,38; 5,33]	[9,09; 19,49]	[14,57; 26,58]	[21,33; 34,67]	[26,15; 40,14]	[35,50; 50,21]	[40,01; 54,85]	[42,29; 57,14]	[45,15; 59,99]	[47,46; 62,25]	[52,72; 67,28]	[57,46; 71,68]	[59,86; 73,85]	[61,07; 74,93]		
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
davon wegen Ausschluss	Anzahl	5	23	34	43	50	65	71	74	78	81	89	96	99	100		
	Anteil in %	2,86	13,14	19,43	24,57	28,57	37,14	40,57	42,29	44,57	46,29	50,86	54,86	56,57	57,14		
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	2	6	8	10	12	12	13	13	14	15	16	17		
	Anteil in %	0,00	1,14	1,14	3,43	4,57	5,71	6,86	6,86	7,43	7,43	8,00	8,57	9,14	9,71		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2		
	Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14		
männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	175	170	150	139	126	117	100	92	88	83	79	70	62	58	
		Anzahl	170	150	139	126	117	100	92	88	83	79	70	62	58	56	
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	5	8	12	21	25	30	32	37	40	43	44	46	48	49		
	Anteil in %	6,67	10,67	16,00	28,00	33,33	40,00	42,67	49,33	53,33	57,33	58,67	61,33	64,00	65,33		
	CI Anteil in %	[0,98; 12,35]	[3,63; 17,70]	[7,65; 24,35]	[17,77; 38,23]	[22,59; 44,07]	[28,84; 51,16]	[31,40; 53,94]	[37,94; 60,72]	[41,97; 64,70]	[46,06; 68,60]	[47,45; 69,89]	[50,24; 72,43]	[53,06; 74,94]	[54,49; 76,18]		
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
davon wegen Ausschluss	Anzahl	5	7	10	15	17	20	22	27	29	31	32	34	36	36		
	Anteil in %	6,67	9,33	13,33	20,00	22,67	26,67	29,33	36,00	38,67	41,33	42,67	45,33	48,00	48,00		
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	6	8	10	10	10	11	12	12	12	12	12		
	Anteil in %	0,00	1,33	2,67	8,00	10,67	13,33	13,33	13,33	14,67	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33		
weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	75	70	67	63	54	50	45	43	38	35	32	31	29	27	
		Anzahl	70	67	63	54	50	45	43	38	35	32	31	29	27	26	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2006-2	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	155	370	530	661	766	909	1039	1148	1251	1328	1406	1481	1537	
		Anteil in %	7,45	17,79	25,48	31,78	36,83	43,70	49,95	55,19	60,14	63,85	67,60	71,20	73,89	
		CI Anteil in %	[6,32; 8,58]	[16,14; 19,43]	[23,61; 27,35]	[29,78; 33,78]	[34,75; 38,90]	[41,57; 45,83]	[47,80; 52,10]	[53,05; 57,33]	[58,04; 62,25]	[61,78; 65,91]	[65,58; 69,61]	[69,26; 73,15]	[72,01; 75,78]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
		Anteil in %	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	144	314	438	532	611	700	794	881	964	1031	1086	1142	1171	
		Anteil in %	6,92	15,10	21,06	25,58	29,38	33,65	38,17	42,36	46,35	49,57	52,21	54,90	56,30	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	10	52	86	120	144	195	229	250	269	279	299	318	345	
		Anteil in %	0,48	2,50	4,13	5,77	6,92	9,38	11,01	12,02	12,93	13,41	14,38	15,29	16,59	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	3	5	8	10	13	15	16	17	17	19	19	19	
		Anteil %	0,05	0,14	0,24	0,38	0,48	0,63	0,72	0,77	0,82	0,82	0,91	0,91	0,91	
	männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres	Anzahl	2080	1925	1710	1550	1419	1314	1171	1041	932	829	752	674	599	
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	95	202	322	398	465	549	639	695	754	822	868	908	932	
		Anteil in %	7,67	16,30	25,99	32,12	37,53	44,31	51,57	56,09	60,86	66,34	70,06	73,28	75,22	
		CI Anteil in %	[6,19; 9,15]	[14,25; 18,36]	[23,55; 28,43]	[29,52; 34,72]	[34,83; 40,23]	[41,54; 47,08]	[48,79; 54,36]	[53,33; 58,86]	[58,14; 63,57]	[63,71; 68,98]	[67,51; 72,61]	[70,82; 75,75]	[72,82; 77,63]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	88	171	259	314	358	399	462	495	538	589	619	650	664	
		Anteil in %	7,10	13,80	20,90	25,34	28,89	32,20	37,29	39,95	43,42	47,54	49,96	52,46	53,59	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	27	58	77	98	136	161	180	194	210	225	232	241	
		Anteil in %	0,32	2,18	4,68	6,21	7,91	10,98	12,99	14,53	15,66	16,95	18,16	18,72	19,45	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	4	4	6	8	13	15	19	21	22	23	25	26	
		Anteil %	0,24	0,32	0,32	0,48	0,65	1,05	1,21	1,53	1,69	1,78	1,86	2,02	2,10	
	weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres	Anzahl	1239	1144	1037	917	841	774	690	600	544	485	417	371	331	
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	94	246	345	432	498	591	656	735	802	860	915	976	1029	
		Anteil in %	6,30	16,50	23,14	28,97	33,40	39,64	44,00	49,30	53,79	57,68	61,37	65,46	69,01	
CI Anteil in %		[5,07; 7,54]	[14,61; 18,38]	[21,00; 25,28]	[26,67; 31,28]	[31,01; 35,80]	[37,15; 42,12]	[41,48; 46,52]	[46,76; 51,83]	[51,26; 56,32]	[55,17; 60,19]	[58,90; 63,84]	[63,04; 67,87]	[66,67; 71,36]		
davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		
	Anteil in %	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,13	0,13	0,13		
davon wegen Ausschluss	Anzahl	86	203	279	342	388	437	485	547	606	656	698	746	773		
	Anteil in %	5,77	13,62	18,71	22,94	26,02	29,31	32,53	36,69	40,64	44,00	46,81	50,03	51,84		
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	7	40	61	82	101	142	158	175	183	191	201	214	240		
	Anteil in %	0,47	2,68	4,09	5,50	6,77	9,52	10,60	11,74	12,27	12,81	13,48	14,35	16,10		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	2	4	7	8	11	12	12	12	12	14	14	14		
	Anteil %	0,07	0,13	0,27	0,47	0,54	0,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,94	0,94	0,94		
männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres	Anzahl	1491	1397	1245	1146	1059	993	900	835	756	689	631	576	515		
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	48	112	193	236	275	330	381	413	452	492	523	554	573		
	Anteil in %	5,93	13,84	23,86	29,17	33,99	40,79	47,10	51,05	55,87	60,82	64,65	68,48	70,83		
	CI Anteil in %	[4,30; 7,56]	[11,46; 16,23]	[20,92; 26,80]	[26,04; 32,31]	[30,73; 37,26]	[37,40; 44,18]	[43,65; 50,54]	[47,60; 54,50]	[52,45; 59,30]	[57,45; 64,18]	[61,35; 67,94]	[65,28; 71,68]	[67,69; 73,96]		
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Anteil in %	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		
davon wegen Ausschluss	Anzahl	46	92	150	182	209	233	269	287	315	347	368	393	404		
	Anteil in %	5,69	11,37	18,54	22,50	25,83	28,80	33,25	35,48	38,94	42,89	45,49	48,58	49,94		
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	19	41	51	61	89	102	116	125	133	142	147	155		
	Anteil in %	0,25	2,35	5,07	6,30	7,54	11,00	12,61	14,34	15,45	16,44	17,55	18,17	19,16		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	2	4	7	9	9	11	11	12	13	13		
	Anteil %	0,00	0,12	0,12	0,25	0,49	0,87	1,11	1,11	1,36	1,36	1,48	1,61	1,61		
weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres	Anzahl	809	761	697	616	573	534	479	428	396	357	317	286	255		
	Anzahl	761	697	616	573	534	479	428	396	357	317	286	255	236		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2007-1	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	340	714	1003	1265	1499	1742	1926	2133	2281	2422	2563	2687		
		Anteil in %	9,15	19,21	26,99	34,04	40,34	46,88	51,83	57,40	61,38	65,18	68,97	72,31		
		CI Anteil in %	[8,22; 10,08]	[17,95; 20,48]	[25,56; 28,42]	[32,52; 35,57]	[38,76; 41,92]	[45,27; 48,48]	[50,22; 53,44]	[55,81; 58,99]	[59,82; 62,95]	[63,65; 66,71]	[67,48; 70,46]	[70,87; 73,75]		
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	298	573	774	967	1109	1278	1415	1567	1675	1780	1878	1945		
		Anteil in %	8,02	15,42	20,83	26,02	29,84	34,39	38,08	42,17	45,08	47,90	50,54	52,34		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	41	135	216	279	358	427	470	520	557	588	630	682		
		Anteil in %	1,10	3,63	5,81	7,51	9,63	11,49	12,65	13,99	14,99	15,82	16,95	18,35		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	6	12	16	29	34	38	43	46	51	52	57		
		Anteil %	0,03	0,16	0,32	0,43	0,78	0,91	1,02	1,16	1,24	1,37	1,40	1,53		
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3716</i>	<i>3376</i>	<i>3002</i>	<i>2713</i>	<i>2451</i>	<i>2217</i>	<i>1974</i>	<i>1790</i>	<i>1583</i>	<i>1435</i>	<i>1294</i>	<i>1153</i>	<i>1029</i>
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	228	478	675	844	998	1154	1278	1407	1516	1593	1668	1727		
		Anteil in %	9,77	20,49	28,93	36,18	42,78	49,46	54,78	60,31	64,98	68,28	71,50	74,02		
		CI Anteil in %	[8,57; 10,98]	[18,85; 22,13]	[27,09; 30,77]	[34,23; 38,13]	[40,77; 44,79]	[47,43; 51,49]	[52,76; 56,80]	[58,32; 62,29]	[63,04; 66,92]	[66,39; 70,17]	[69,66; 73,33]	[72,25; 75,80]		
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3		
		Anteil in %	0,00	0,04	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	213	407	553	668	773	879	967	1051	1137	1197	1246	1279		
		Anteil in %	9,13	17,45	23,70	28,63	33,13	37,68	41,45	45,05	48,74	51,31	53,41	54,82		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	14	68	115	168	212	259	292	332	354	371	396	422		
		Anteil in %	0,60	2,91	4,93	7,20	9,09	11,10	12,52	14,23	15,17	15,90	16,97	18,09		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	2	6	7	11	14	17	21	22	22	23	23		
		Anteil %	0,04	0,09	0,26	0,30	0,47	0,60	0,73	0,90	0,94	0,94	0,99	0,99		
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2333</i>	<i>2105</i>	<i>1855</i>	<i>1658</i>	<i>1489</i>	<i>1335</i>	<i>1179</i>	<i>1055</i>	<i>926</i>	<i>817</i>	<i>740</i>	<i>665</i>	<i>606</i>
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	200	436	620	765	899	1024	1143	1259	1354	1441	1528	1612		
		Anteil in %	8,08	17,62	25,06	30,92	36,34	41,39	46,20	50,89	54,73	58,25	61,76	65,16		
		CI Anteil in %	[7,01; 9,16]	[16,12; 19,13]	[23,35; 26,77]	[29,10; 32,74]	[34,44; 38,23]	[39,45; 43,33]	[44,24; 48,17]	[48,92; 52,86]	[52,77; 56,69]	[56,30; 60,19]	[59,85; 63,68]	[63,28; 67,04]		
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Anteil in %	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
davon wegen Ausschluss	Anzahl	176	358	487	593	667	754	847	929	999	1059	1118	1161			
	Anteil in %	7,11	14,47	19,68	23,97	26,96	30,48	34,24	37,55	40,38	42,81	45,19	46,93			
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	23	74	125	161	213	247	273	304	329	352	380	418			
	Anteil in %	0,93	2,99	5,05	6,51	8,61	9,98	11,03	12,29	13,30	14,23	15,36	16,90			
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	4	7	10	18	22	22	25	25	29	29	32			
	Anteil %	0,04	0,16	0,28	0,40	0,73	0,89	0,89	1,01	1,01	1,17	1,17	1,29			
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2474</i>	<i>2274</i>	<i>2038</i>	<i>1854</i>	<i>1709</i>	<i>1575</i>	<i>1450</i>	<i>1331</i>	<i>1215</i>	<i>1120</i>	<i>1033</i>	<i>946</i>	<i>862</i>	
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	126	265	364	458	534	619	687	767	834	884	924	957			
	Anteil in %	8,72	18,34	25,19	31,70	36,96	42,84	47,54	53,08	57,72	61,18	63,94	66,23			
	CI Anteil in %	[7,26; 10,17]	[16,34; 20,34]	[22,95; 27,43]	[29,30; 34,10]	[34,47; 39,44]	[40,29; 45,39]	[44,97; 50,12]	[50,51; 55,65]	[55,17; 60,26]	[58,66; 63,69]	[61,47; 66,42]	[63,79; 68,67]			
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1			
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
davon wegen Ausschluss	Anzahl	116	227	301	365	417	483	534	586	641	677	705	722			
	Anteil in %	8,03	15,71	20,83	25,26	28,86	33,43	36,96	40,55	44,36	46,85	48,79	49,97			
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	9	37	61	90	114	130	146	171	183	197	208	224			
	Anteil in %	0,62	2,56	4,22	6,23	7,89	9,00	10,10	11,83	12,66	13,63	14,39	15,50			
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	2	3	3	6	7	9	9	9	10	10			
	Anteil %	0,07	0,07	0,14	0,21	0,21	0,42	0,48	0,62	0,62	0,62	0,69	0,69			
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1445</i>	<i>1319</i>	<i>1180</i>	<i>1081</i>	<i>987</i>	<i>911</i>	<i>826</i>	<i>758</i>	<i>678</i>	<i>611</i>	<i>561</i>	<i>521</i>	<i>488</i>	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2007-2	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	638	1208	1712	2230	2655	3005	3333	3621	3880	4123	4318			
		Anteil in %	10,45	19,78	28,04	36,52	43,48	49,21	54,59	59,30	63,54	67,52	70,72			
		CI Anteil in %	[9,68; 11,22]	[18,78; 20,78]	[26,91; 29,16]	[35,31; 37,73]	[42,24; 44,73]	[47,96; 50,47]	[53,34; 55,83]	[58,07; 60,53]	[62,34; 64,75]	[66,35; 68,70]	[69,58; 71,86]			
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	2	2	4	5	6	6	6	6	6			
		Anteil in %	0,00	0,02	0,03	0,03	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	596	1030	1402	1733	2021	2281	2504	2726	2923	3109	3206			
		Anteil in %	9,76	16,87	22,96	28,38	33,10	37,36	41,01	44,64	47,87	50,92	52,51			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	40	167	290	464	592	675	778	843	901	957	1050			
		Anteil in %	0,66	2,74	4,75	7,60	9,70	11,05	12,74	13,81	14,76	15,67	17,20			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	10	18	31	38	44	45	46	50	51	56			
		Anteil %	0,03	0,16	0,29	0,51	0,62	0,72	0,74	0,75	0,82	0,84	0,92			
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>6106</i>	<i>5468</i>	<i>4898</i>	<i>4394</i>	<i>3876</i>	<i>3451</i>	<i>3101</i>	<i>2773</i>	<i>2485</i>	<i>2226</i>	<i>1983</i>	<i>1788</i>	
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	355	687	1003	1329	1605	1836	2032	2206	2376	2506	2609			
		Anteil in %	9,70	18,77	27,40	36,30	43,84	50,15	55,50	60,26	64,90	68,45	71,26			
		CI Anteil in %	[8,74; 10,66]	[17,50; 20,03]	[25,95; 28,84]	[34,74; 37,86]	[42,23; 45,45]	[48,53; 51,77]	[53,89; 57,11]	[58,67; 61,84]	[63,35; 66,45]	[66,95; 69,96]	[69,80; 72,73]			
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	324	563	780	992	1173	1337	1477	1611	1717	1805	1862			
		Anteil in %	8,85	15,38	21,31	27,10	32,04	36,52	40,34	44,00	46,90	49,30	50,86			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	28	116	206	308	398	462	516	551	613	653	695			
		Anteil in %	0,76	3,17	5,63	8,41	10,87	12,62	14,09	15,05	16,74	17,84	18,98			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	8	17	29	34	37	39	44	45	47	51			
		Anteil %	0,08	0,22	0,46	0,79	0,93	1,01	1,07	1,20	1,23	1,28	1,39			
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3661</i>	<i>3306</i>	<i>2974</i>	<i>2658</i>	<i>2332</i>	<i>2056</i>	<i>1825</i>	<i>1629</i>	<i>1455</i>	<i>1285</i>	<i>1155</i>		
ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	396	780	1104	1433	1684	1892	2076	2272	2450	2618	2748				
	Anteil in %	9,32	18,35	25,98	33,72	39,62	44,52	48,85	53,46	57,65	61,60	64,66				
	CI Anteil in %	[8,44; 10,19]	[17,19; 19,52]	[24,66; 27,29]	[32,30; 35,14]	[38,15; 41,09]	[43,02; 46,01]	[47,34; 50,35]	[51,96; 54,96]	[56,16; 59,13]	[60,14; 63,06]	[63,22; 66,10]				
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2				
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05				
davon wegen Ausschluss	Anzahl	368	653	896	1109	1287	1443	1573	1721	1864	1997	2060				
	Anteil in %	8,66	15,36	21,08	26,09	30,28	33,95	37,01	40,49	43,86	46,99	48,47				
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	27	120	195	307	373	422	475	522	555	589	653				
	Anteil in %	0,64	2,82	4,59	7,22	8,78	9,93	11,18	12,28	13,06	13,86	15,36				
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	7	13	17	23	26	26	27	29	30	33				
	Anteil %	0,02	0,16	0,31	0,40	0,54	0,61	0,61	0,64	0,68	0,71	0,78				
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>4250</i>	<i>3854</i>	<i>3470</i>	<i>3146</i>	<i>2817</i>	<i>2566</i>	<i>2358</i>	<i>2174</i>	<i>1978</i>	<i>1800</i>	<i>1632</i>			
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	191	375	554	722	853	983	1093	1198	1305	1394	1455				
	Anteil in %	8,46	16,60	24,52	31,96	37,76	43,51	48,38	53,03	57,77	61,71	64,41				
	CI Anteil in %	[7,31; 9,60]	[15,07; 18,14]	[22,75; 26,30]	[30,04; 33,88]	[35,76; 39,76]	[41,47; 45,56]	[46,32; 50,45]	[50,97; 55,09]	[55,73; 59,81]	[59,70; 63,71]	[62,43; 66,38]				
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
davon wegen Ausschluss	Anzahl	172	308	431	540	630	720	800	881	952	1009	1037				
	Anteil in %	7,61	13,63	19,08	23,90	27,89	31,87	35,41	39,00	42,14	44,67	45,91				
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	17	62	112	166	205	244	274	295	331	362	394				
	Anteil in %	0,75	2,74	4,96	7,35	9,07	10,80	12,13	13,06	14,65	16,02	17,44				
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	5	11	16	18	19	19	22	22	23	24				
	Anteil %	0,09	0,22	0,49	0,71	0,80	0,84	0,84	0,97	0,97	1,02	1,06				
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2259</i>	<i>2068</i>	<i>1884</i>	<i>1705</i>	<i>1537</i>	<i>1406</i>	<i>1276</i>	<i>1166</i>	<i>1061</i>	<i>954</i>	<i>865</i>	<i>804</i>		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr		
2008-1	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	645	1241	2017	2599	3025	3408	3752	4071	4333	4547					
		Anteil in %	10,02	19,28	31,33	40,37	46,99	52,94	58,28	63,23	67,30	70,63					
		CI Anteil in %	[9,29; 10,75]	[18,31; 20,24]	[30,20; 32,46]	[39,17; 41,57]	[45,77; 48,21]	[51,72; 54,16]	[57,07; 59,48]	[62,06; 64,41]	[66,16; 68,45]	[69,51; 71,74]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	3	3	4	4	5	6	7						
		Anteil in %	0,00	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,11	0,11					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	606	1086	1566	1956	2274	2549	2812	3037	3223	3345					
		Anteil in %	9,41	16,87	24,32	30,38	35,32	39,59	43,68	47,17	50,06	51,96					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	38	148	427	610	712	815	890	982	1057	1147					
		Anteil in %	0,59	2,30	6,63	9,47	11,06	12,66	13,82	15,25	16,42	17,82					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	5	21	30	35	40	45	46	46	48					
		Anteil %	0,02	0,08	0,33	0,47	0,54	0,62	0,70	0,71	0,71	0,75					
	männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	6438	5793	5197	4421	3839	3413	3030	2686	2367	2105	1891			
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	385	809	1279	1631	1929	2174	2390	2579	2733	2840					
		Anteil in %	9,62	20,22	31,97	40,76	48,21	54,34	59,74	64,46	68,31	70,98					
		CI Anteil in %	[8,71; 10,54]	[18,98; 21,46]	[30,52; 33,41]	[39,24; 42,29]	[46,66; 49,76]	[52,79; 55,88]	[58,22; 61,25]	[62,98; 65,94]	[66,87; 69,75]	[69,58; 72,39]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	357	679	981	1229	1452	1629	1800	1922	2036	2100					
		Anteil in %	8,92	16,97	24,52	30,72	36,29	40,71	44,99	48,04	50,89	52,49					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	27	121	275	374	443	506	551	616	654	695					
		Anteil in %	0,67	3,02	6,87	9,35	11,07	12,65	13,77	15,40	16,35	17,37					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	9	22	26	32	37	37	39	41	43					
		Anteil %	0,02	0,22	0,55	0,65	0,80	0,92	0,92	0,97	1,02	1,07					
	weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	4001	3616	3192	2722	2370	2072	1827	1611	1422	1268	1161			
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	353	708	1153	1480	1739	1968	2181	2378	2541	2680					
		Anteil in %	8,46	16,97	27,63	35,47	41,67	47,16	52,26	56,99	60,89	64,22					
		CI Anteil in %	[7,61; 9,30]	[15,83; 18,11]	[26,27; 28,99]	[34,01; 36,92]	[40,18; 43,17]	[45,65; 48,68]	[50,75; 53,78]	[55,48; 58,49]	[59,41; 62,37]	[62,77; 65,68]					
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1						
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02						
davon wegen Ausschluss	Anzahl	327	611	890	1118	1311	1481	1645	1792	1909	1996						
	Anteil in %	7,84	14,64	21,33	26,79	31,42	35,49	39,42	42,94	45,75	47,83						
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	26	94	253	345	409	463	509	558	604	655						
	Anteil in %	0,62	2,25	6,06	8,27	9,80	11,10	12,20	13,37	14,47	15,70						
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	3	10	17	19	24	26	27	27	28						
	Anteil %	0,00	0,07	0,24	0,41	0,46	0,58	0,62	0,65	0,65	0,67						
männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	4173	3820	3465	3020	2693	2434	2205	1992	1795	1632	1493				
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	184	379	629	791	930	1052	1166	1279	1375	1438						
	Anteil in %	8,07	16,62	27,58	34,68	40,77	46,12	51,12	56,07	60,28	63,04						
	CI Anteil in %	[6,95; 9,18]	[15,09; 18,14]	[25,74; 29,41]	[32,72; 36,63]	[38,75; 42,79]	[44,07; 48,17]	[49,07; 53,17]	[54,03; 58,11]	[58,27; 62,29]	[61,06; 65,02]						
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
davon wegen Ausschluss	Anzahl	169	323	498	621	725	818	906	980	1056	1099						
	Anteil in %	7,41	14,16	21,83	27,22	31,78	35,86	39,72	42,96	46,30	48,18						
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	14	52	123	159	192	219	245	284	304	323						
	Anteil in %	0,61	2,28	5,39	6,97	8,42	9,60	10,74	12,45	13,33	14,16						
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	4	8	11	13	15	15	15	15	16						
	Anteil %	0,04	0,18	0,35	0,48	0,57	0,66	0,66	0,66	0,66	0,70						
weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres		Anzahl	2281	2097	1902	1652	1490	1351	1229	1115	1002	906	843				

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2008-2	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	561	1257	1807	2221	2606	2910	3213	3446	3649					
		Anteil in %	10,12	22,68	32,61	40,08	47,02	52,51	57,98	62,18	65,84					
		CI Anteil in %	[9,33; 10,92]	[21,58; 23,78]	[31,37; 33,84]	[38,79; 41,37]	[45,71; 48,34]	[51,19; 53,82]	[56,68; 59,28]	[60,90; 63,46]	[64,59; 67,09]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	2	2	2	3	3	4	4					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,07	0,07					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	524	1070	1446	1743	2014	2248	2473	2647	2766					
		Anteil in %	9,46	19,31	26,09	31,45	36,34	40,56	44,62	47,76	49,91					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	33	180	343	449	557	624	697	754	836					
		Anteil in %	0,60	3,25	6,19	8,10	10,05	11,26	12,58	13,61	15,08					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	7	16	27	33	35	40	41	43					
		Anteil %	0,07	0,13	0,29	0,49	0,60	0,63	0,72	0,74	0,78					
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>5542</i>	<i>4981</i>	<i>4285</i>	<i>3735</i>	<i>3321</i>	<i>2936</i>	<i>2632</i>	<i>2329</i>	<i>2096</i>				
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>4981</i>	<i>4285</i>	<i>3735</i>	<i>3321</i>	<i>2936</i>	<i>2632</i>	<i>2329</i>	<i>2096</i>	<i>1893</i>				
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	398	850	1201	1483	1742	1940	2138	2287	2399					
		Anteil in %	11,18	23,87	33,73	41,65	48,92	54,48	60,04	64,22	67,37					
		CI Anteil in %	[10,14; 12,21]	[22,47; 25,27]	[32,17; 35,28]	[40,03; 43,26]	[47,28; 50,56]	[52,84; 56,11]	[58,43; 61,65]	[62,65; 65,80]	[65,83; 68,91]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	1	1	1					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	364	701	938	1149	1331	1476	1622	1714	1776					
		Anteil in %	10,22	19,69	26,34	32,27	37,38	41,45	45,55	48,13	49,87					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	30	136	245	314	385	433	483	537	585					
		Anteil in %	0,84	3,82	6,88	8,82	10,81	12,16	13,56	15,08	16,43					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	13	18	20	26	31	32	35	37					
		Anteil %	0,11	0,37	0,51	0,56	0,73	0,87	0,90	0,98	1,04					
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3561</i>	<i>3163</i>	<i>2711</i>	<i>2360</i>	<i>2078</i>	<i>1819</i>	<i>1621</i>	<i>1423</i>	<i>1274</i>				
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3163</i>	<i>2711</i>	<i>2360</i>	<i>2078</i>	<i>1819</i>	<i>1621</i>	<i>1423</i>	<i>1274</i>	<i>1162</i>				
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	313	714	1034	1276	1509	1695	1883	2036	2168					
Anteil in %		8,65	19,72	28,56	35,25	41,69	46,82	52,02	56,24	59,89						
CI Anteil in %		[7,73; 9,56]	[18,43; 21,02]	[27,09; 30,04]	[33,69; 36,81]	[40,08; 43,29]	[45,20; 48,45]	[50,39; 53,64]	[54,63; 57,86]	[58,29; 61,49]						
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03						
davon wegen Ausschluss	Anzahl	286	609	827	1004	1172	1312	1451	1572	1653						
	Anteil in %	7,90	16,82	22,85	27,73	32,38	36,24	40,08	43,43	45,66						
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	24	100	199	258	319	364	411	442	492						
	Anteil in %	0,66	2,76	5,50	7,13	8,81	10,06	11,35	12,21	13,59						
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	5	8	14	18	19	21	21	22						
	Anteil %	0,08	0,14	0,22	0,39	0,50	0,52	0,58	0,58	0,61						
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3620</i>	<i>3307</i>	<i>2906</i>	<i>2586</i>	<i>2344</i>	<i>2111</i>	<i>1925</i>	<i>1737</i>	<i>1584</i>					
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3307</i>	<i>2906</i>	<i>2586</i>	<i>2344</i>	<i>2111</i>	<i>1925</i>	<i>1737</i>	<i>1584</i>	<i>1452</i>					
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	185	406	569	710	843	946	1050	1132	1193						
	Anteil in %	9,51	20,87	29,25	36,50	43,34	48,64	53,98	58,20	61,34						
	CI Anteil in %	[8,21; 10,82]	[19,07; 22,68]	[27,23; 31,28]	[34,36; 38,64]	[41,14; 45,54]	[46,42; 50,86]	[51,77; 56,20]	[56,01; 60,39]	[59,17; 63,50]						
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	1	1	1						
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05						
davon wegen Ausschluss	Anzahl	169	338	452	560	659	739	817	869	903						
	Anteil in %	8,69	17,38	23,24	28,79	33,88	37,99	42,01	44,68	46,43						
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	14	63	109	141	172	195	220	250	276						
	Anteil in %	0,72	3,24	5,60	7,25	8,84	10,03	11,31	12,85	14,19						
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	5	8	9	12	12	12	12	13						
	Anteil %	0,10	0,26	0,41	0,46	0,62	0,62	0,62	0,62	0,67						
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1945</i>	<i>1760</i>	<i>1539</i>	<i>1376</i>	<i>1235</i>	<i>1102</i>	<i>999</i>	<i>895</i>	<i>813</i>					
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1760</i>	<i>1539</i>	<i>1376</i>	<i>1235</i>	<i>1102</i>	<i>999</i>	<i>895</i>	<i>813</i>	<i>752</i>					

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2009-1	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	619	1168	1575	1955	2250	2465	2698	2849						
		Anteil in %	13,95	26,32	35,49	44,05	50,70	55,54	60,79	64,20						
		CI Anteil in %	[12,93; 14,97]	[25,02; 27,61]	[34,08; 36,90]	[42,59; 45,51]	[49,23; 52,17]	[54,08; 57,01]	[59,36; 62,23]	[62,78; 65,61]						
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	586	988	1282	1568	1799	1948	2121	2209						
		Anteil in %	13,20	22,26	28,89	35,33	40,54	43,89	47,79	49,77						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	31	161	268	358	422	486	542	603						
		Anteil in %	0,70	3,63	6,04	8,07	9,51	10,95	12,21	13,59						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	19	25	29	29	31	34	36						
		Anteil %	0,05	0,43	0,56	0,65	0,65	0,70	0,77	0,81						
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>4438</i>	<i>3819</i>	<i>3270</i>	<i>2863</i>	<i>2483</i>	<i>2188</i>	<i>1973</i>	<i>1740</i>					
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3819</i>	<i>3270</i>	<i>2863</i>	<i>2483</i>	<i>2188</i>	<i>1973</i>	<i>1740</i>	<i>1589</i>					
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	388	725	996	1239	1409	1564	1707	1796						
		Anteil in %	13,91	25,99	35,71	44,42	50,52	56,08	61,20	64,40						
		CI Anteil in %	[12,63; 15,20]	[24,37; 27,62]	[33,93; 37,49]	[42,58; 46,27]	[48,66; 52,38]	[54,24; 57,92]	[59,40; 63,01]	[62,62; 66,17]						
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1	1						
		Anteil in %	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	367	609	812	992	1127	1248	1354	1406						
		Anteil in %	13,16	21,84	29,11	35,57	40,41	44,75	48,55	50,41						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	19	104	169	230	263	295	329	364						
		Anteil in %	0,68	3,73	6,06	8,25	9,43	10,58	11,80	13,05						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	11	14	16	18	20	23	25						
		Anteil %	0,07	0,39	0,50	0,57	0,65	0,72	0,82	0,90						
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2789</i>	<i>2401</i>	<i>2064</i>	<i>1793</i>	<i>1550</i>	<i>1380</i>	<i>1225</i>	<i>1082</i>					
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2401</i>	<i>2064</i>	<i>1793</i>	<i>1550</i>	<i>1380</i>	<i>1225</i>	<i>1082</i>	<i>993</i>					
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	322	652	908	1134	1306	1427	1561	1653						
Anteil in %		11,35	22,97	31,99	39,96	46,02	50,28	55,00	58,25							
CI Anteil in %		[10,18; 12,51]	[21,43; 24,52]	[30,28; 33,71]	[38,16; 41,76]	[44,18; 47,85]	[48,44; 52,12]	[53,17; 56,83]	[56,43; 60,06]							
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
davon wegen Ausschluss	Anzahl	301	543	731	894	1029	1116	1218	1270							
	Anteil in %	10,61	19,13	25,76	31,50	36,26	39,32	42,92	44,75							
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20	99	162	222	259	292	323	361							
	Anteil in %	0,70	3,49	5,71	7,82	9,13	10,29	11,38	12,72							
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	10	15	18	18	19	20	22							
	Anteil %	0,04	0,35	0,53	0,63	0,63	0,67	0,70	0,78							
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2838</i>	<i>2516</i>	<i>2186</i>	<i>1930</i>	<i>1704</i>	<i>1532</i>	<i>1411</i>	<i>1277</i>						
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2516</i>	<i>2186</i>	<i>1930</i>	<i>1704</i>	<i>1532</i>	<i>1411</i>	<i>1277</i>	<i>1185</i>						
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	193	359	491	622	705	782	862	915							
	Anteil in %	12,05	22,42	30,67	38,85	44,03	48,84	53,84	57,15							
	CI Anteil in %	[10,46; 13,65]	[20,38; 24,47]	[28,41; 32,93]	[36,46; 41,24]	[41,60; 46,47]	[46,40; 51,29]	[51,40; 56,28]	[54,73; 59,58]							
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
davon wegen Ausschluss	Anzahl	184	309	404	505	573	635	698	731							
	Anteil in %	11,49	19,30	25,23	31,54	35,79	39,66	43,60	45,66							
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	9	48	84	113	128	142	157	177							
	Anteil in %	0,56	3,00	5,25	7,06	8,00	8,87	9,81	11,06							
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	3	4	4	5	7	7							
	Anteil %	0,00	0,12	0,19	0,25	0,25	0,31	0,44	0,44							
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1601</i>	<i>1408</i>	<i>1242</i>	<i>1110</i>	<i>979</i>	<i>896</i>	<i>819</i>	<i>739</i>						
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1408</i>	<i>1242</i>	<i>1110</i>	<i>979</i>	<i>896</i>	<i>819</i>	<i>739</i>	<i>686</i>						

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2009-2	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	527	1091	1501	1781	2070	2296	2448							
		Anteil in %	13,18	27,30	37,55	44,56	51,79	57,44	61,25							
		CI Anteil in %	[12,14; 14,23]	[25,91; 28,68]	[36,05; 39,05]	[43,02; 46,10]	[50,24; 53,34]	[55,91; 58,98]	[59,74; 62,76]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	1	3	4	5							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	0,10	0,13							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	501	938	1250	1466	1672	1833	1929							
		Anteil in %	12,53	23,47	31,27	36,68	41,83	45,86	48,26							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	24	139	236	297	374	433	487							
		Anteil in %	0,60	3,48	5,90	7,43	9,36	10,83	12,18							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	14	15	17	21	26	27							
		Anteil %	0,05	0,35	0,38	0,43	0,53	0,65	0,68							
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3997</i>	<i>3470</i>	<i>2906</i>	<i>2496</i>	<i>2216</i>	<i>1927</i>	<i>1701</i>						
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3470</i>	<i>2906</i>	<i>2496</i>	<i>2216</i>	<i>1927</i>	<i>1701</i>	<i>1549</i>						
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	344	695	1009	1226	1397	1545	1643							
		Anteil in %	12,88	26,03	37,79	45,92	52,32	57,87	61,54							
		CI Anteil in %	[11,61; 14,15]	[24,37; 27,69]	[35,95; 39,63]	[44,03; 47,81]	[50,43; 54,22]	[55,99; 59,74]	[59,69; 63,38]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	2	2	2	2	2							
		Anteil in %	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	323	595	820	984	1116	1228	1286							
		Anteil in %	12,10	22,28	30,71	36,85	41,80	45,99	48,16							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20	89	176	221	259	295	333							
		Anteil in %	0,75	3,33	6,59	8,28	9,70	11,05	12,47							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	9	11	19	20	20	22							
		Anteil %	0,04	0,34	0,41	0,71	0,75	0,75	0,82							
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2670</i>	<i>2326</i>	<i>1975</i>	<i>1661</i>	<i>1444</i>	<i>1273</i>	<i>1125</i>						
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2326</i>	<i>1975</i>	<i>1661</i>	<i>1444</i>	<i>1273</i>	<i>1125</i>	<i>1027</i>						
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	281	597	831	995	1170	1303	1400							
Anteil in %		10,87	23,10	32,16	38,51	45,28	50,43	54,18								
CI Anteil in %		[9,67; 12,08]	[21,48; 24,73]	[30,36; 33,96]	[36,63; 40,38]	[43,36; 47,20]	[48,50; 52,35]	[52,26; 56,10]								
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	1	1	2	2								
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,08								
davon wegen Ausschluss	Anzahl	268	504	678	798	927	1021	1083								
	Anteil in %	10,37	19,50	26,24	30,88	35,87	39,51	41,91								
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	12	82	141	182	227	262	296								
	Anteil in %	0,46	3,17	5,46	7,04	8,78	10,14	11,46								
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	11	12	14	15	18	19								
	Anteil %	0,04	0,43	0,46	0,54	0,58	0,70	0,74								
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2584</i>	<i>2303</i>	<i>1987</i>	<i>1753</i>	<i>1589</i>	<i>1414</i>	<i>1281</i>							
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2303</i>	<i>1987</i>	<i>1753</i>	<i>1589</i>	<i>1414</i>	<i>1281</i>	<i>1184</i>							
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	145	312	467	581	679	768	816								
	Anteil in %	9,72	20,91	31,30	38,94	45,51	51,47	54,69								
	CI Anteil in %	[8,21; 11,22]	[18,85; 22,98]	[28,95; 33,65]	[36,47; 41,42]	[42,98; 48,04]	[48,94; 54,01]	[52,16; 57,22]								
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0								
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
davon wegen Ausschluss	Anzahl	133	265	376	464	547	613	644								
	Anteil in %	8,91	17,76	25,20	31,10	36,66	41,09	43,16								
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	12	45	88	112	127	150	166								
	Anteil in %	0,80	3,02	5,90	7,51	8,51	10,05	11,13								
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	3	5	5	5	6								
	Anteil %	0,00	0,13	0,20	0,34	0,34	0,34	0,40								
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1492</i>	<i>1347</i>	<i>1180</i>	<i>1025</i>	<i>911</i>	<i>813</i>	<i>724</i>							
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1347</i>	<i>1180</i>	<i>1025</i>	<i>911</i>	<i>813</i>	<i>724</i>	<i>676</i>							

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2010-1	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	588	1130	1541	1871	2132	2311								
		Anteil in %	14,15	27,20	37,09	45,03	51,31	55,62								
		CI Anteil in %	[13,09; 15,21]	[25,84; 28,55]	[35,62; 38,56]	[43,52; 46,54]	[49,79; 52,83]	[54,11; 57,13]								
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	2	3	4								
		Anteil in %	0,00	0,02	0,02	0,05	0,07	0,10								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	565	969	1297	1536	1747	1856								
		Anteil in %	13,60	23,32	31,22	36,97	42,05	44,67								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	22	153	230	317	365	431								
		Anteil in %	0,53	3,68	5,54	7,63	8,78	10,37								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	7	13	16	17	20								
		Anteil %	0,02	0,17	0,31	0,39	0,41	0,48								
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>4155</i>	<i>3567</i>	<i>3025</i>	<i>2614</i>	<i>2284</i>	<i>2023</i>							
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	391	725	997	1222	1395	1509								
		Anteil in %	14,68	27,22	37,44	45,89	52,38	56,67								
		CI Anteil in %	[13,34; 16,03]	[25,53; 28,92]	[35,60; 39,28]	[44,00; 47,78]	[50,49; 54,28]	[54,78; 58,55]								
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	372	639	839	1016	1157	1229								
		Anteil in %	13,97	24,00	31,51	38,15	43,45	46,15								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	18	82	149	193	223	263								
		Anteil in %	0,68	3,08	5,60	7,25	8,37	9,88								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	4	9	13	15	17								
		Anteil %	0,04	0,15	0,34	0,49	0,56	0,64								
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2663</i>	<i>2272</i>	<i>1938</i>	<i>1666</i>	<i>1441</i>	<i>1268</i>							
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	336	665	904	1107	1269	1369								
		Anteil in %	12,39	24,52	33,33	40,82	46,79	50,48								
		CI Anteil in %	[11,15; 13,63]	[22,90; 26,14]	[31,56; 35,11]	[38,97; 42,67]	[44,91; 48,67]	[48,60; 52,36]								
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	2	2	3								
		Anteil in %	0,00	0,04	0,04	0,07	0,07	0,11								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	317	568	753	910	1040	1102								
Anteil in %		11,69	20,94	27,77	33,55	38,35	40,63									
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	18	91	139	182	214	250									
	Anteil in %	0,66	3,36	5,13	6,71	7,89	9,22									
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	5	11	13	13	14									
	Anteil %	0,04	0,18	0,41	0,48	0,48	0,52									
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2712</i>	<i>2376</i>	<i>2047</i>	<i>1808</i>	<i>1605</i>	<i>1443</i>								
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	187	344	480	591	681	734									
	Anteil in %	12,64	23,26	32,45	39,96	46,04	49,63									
	CI Anteil in %	[10,95; 14,34]	[21,11; 25,41]	[30,07; 34,84]	[37,46; 42,46]	[43,50; 48,59]	[47,08; 52,18]									
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
davon wegen Ausschluss	Anzahl	176	309	404	486	561	594									
	Anteil in %	11,90	20,89	27,32	32,86	37,93	40,16									
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	11	33	69	95	110	130									
	Anteil in %	0,74	2,23	4,67	6,42	7,44	8,79									
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	7	10	10	10									
	Anteil %	0,00	0,14	0,47	0,68	0,68	0,68									
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1479</i>	<i>1292</i>	<i>1135</i>	<i>999</i>	<i>888</i>	<i>798</i>								
		<i>Anzahl</i>	<i>1292</i>	<i>1135</i>	<i>999</i>	<i>888</i>	<i>798</i>	<i>745</i>								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2010-2	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	569	1017	1425	1719	1938									
		Anteil in %	14,46	25,84	36,20	43,67	49,24									
		CI Anteil in %	[13,36; 15,56]	[24,47; 27,21]	[34,70; 37,71]	[42,12; 45,22]	[47,68; 50,80]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	537	894	1192	1404	1532									
		Anteil in %	13,64	22,71	30,28	35,67	38,92									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	26	113	222	298	383									
		Anteil in %	0,66	2,87	5,64	7,57	9,73									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	10	11	17	23									
		Anteil %	0,15	0,25	0,28	0,43	0,58									
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3936</i>	<i>3367</i>	<i>2919</i>	<i>2511</i>	<i>2217</i>								
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.		Anzahl	399	730	995	1227	1376								
		Anteil in %	14,56	26,63	36,30	44,76	50,20									
		CI Anteil in %	[13,24; 15,88]	[24,98; 28,29]	[34,50; 38,10]	[42,90; 46,63]	[48,33; 52,07]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	379	657	839	1022	1107									
		Anteil in %	13,83	23,97	30,61	37,29	40,39									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20	71	152	200	261									
		Anteil in %	0,73	2,59	5,55	7,30	9,52									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	4	5	8									
		Anteil %	0,00	0,07	0,15	0,18	0,29									
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2741</i>	<i>2342</i>	<i>2011</i>	<i>1746</i>	<i>1514</i>	<i>1365</i>							
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.		Anzahl	332	607	847	1038	1174								
		Anteil in %	12,47	22,79	31,81	38,98	44,09									
		CI Anteil in %	[11,21; 13,72]	[21,20; 24,39]	[30,04; 33,58]	[37,13; 40,83]	[42,20; 45,97]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	312	527	709	842	918									
Anteil in %		11,72	19,79	26,62	31,62	34,47										
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	16	72	129	183	240										
	Anteil in %	0,60	2,70	4,84	6,87	9,01										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	8	9	13	16										
	Anteil %	0,15	0,30	0,34	0,49	0,60										
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2663</i>	<i>2331</i>	<i>2056</i>	<i>1816</i>	<i>1625</i>	<i>1489</i>								
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.		Anzahl	175	362	501	615	691									
	Anteil in %	11,07	22,90	31,69	38,90	43,71										
	CI Anteil in %	[9,52; 12,62]	[20,83; 24,97]	[29,39; 33,98]	[36,50; 41,30]	[41,26; 46,15]										
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0										
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
davon wegen Ausschluss	Anzahl	166	324	428	516	556										
	Anteil in %	10,50	20,49	27,07	32,64	35,17										
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	9	37	71	96	130										
	Anteil in %	0,57	2,34	4,49	6,07	8,22										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	2	3	5										
	Anteil %	0,00	0,06	0,13	0,19	0,32										
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres < 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1581</i>	<i>1406</i>	<i>1219</i>	<i>1080</i>	<i>966</i>	<i>890</i>								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2011-1	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	531	1008	1400	1660										
		Anteil in %	14,34	27,21	37,80	44,82										
		CI Anteil in %	[13,21; 15,46]	[25,78; 28,65]	[36,24; 39,36]	[43,21; 46,42]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,03	0,03										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	509	876	1166	1323										
		Anteil in %	13,74	23,65	31,48	35,72										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	18	123	222	317										
		Anteil in %	0,49	3,32	5,99	8,56										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	9	11	19										
		Anteil %	0,11	0,24	0,30	0,51										
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3704</i>	<i>3173</i>	<i>2696</i>	<i>2304</i>									
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3173</i>	<i>2696</i>	<i>2304</i>	<i>2044</i>									
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	394	735	975	1127										
		Anteil in %	15,65	29,19	38,72	44,76										
		CI Anteil in %	[14,23; 17,07]	[27,41; 30,97]	[36,82; 40,62]	[42,82; 46,70]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	2	2										
		Anteil in %	0,00	0,08	0,08	0,08										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	371	626	788	877										
		Anteil in %	14,73	24,86	31,29	34,83										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	21	104	182	240										
		Anteil in %	0,83	4,13	7,23	9,53										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	3	3	8										
		Anteil %	0,08	0,12	0,12	0,32										
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2518</i>	<i>2124</i>	<i>1783</i>	<i>1543</i>									
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2124</i>	<i>1783</i>	<i>1543</i>	<i>1391</i>									
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	301	572	808	954										
		Anteil in %	12,43	23,63	33,37	39,41										
		CI Anteil in %	[11,12; 13,75]	[21,93; 25,32]	[31,50; 35,25]	[37,46; 41,35]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0										
Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00											
davon wegen Ausschluss	Anzahl	285	499	671	758											
	Anteil in %	11,77	20,61	27,72	31,31											
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	12	65	128	183											
	Anteil in %	0,50	2,68	5,29	7,56											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	8	9	13											
	Anteil %	0,17	0,33	0,37	0,54											
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2421</i>	<i>2120</i>	<i>1849</i>	<i>1613</i>										
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2120</i>	<i>1849</i>	<i>1613</i>	<i>1467</i>										
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	185	350	473	548											
	Anteil in %	12,84	24,29	32,82	38,03											
	CI Anteil in %	[11,11; 14,57]	[22,07; 26,50]	[30,40; 35,25]	[35,52; 40,54]											
davon wegen Tod	Anzahl	0	2	2	2											
	Anteil in %	0,00	0,14	0,14	0,14											
davon wegen Ausschluss	Anzahl	172	292	375	422											
	Anteil in %	11,94	20,26	26,02	29,29											
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	11	53	93	119											
	Anteil in %	0,76	3,68	6,45	8,26											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	3	3	5											
	Anteil %	0,14	0,21	0,21	0,35											
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1441</i>	<i>1256</i>	<i>1091</i>	<i>968</i>										
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1256</i>	<i>1091</i>	<i>968</i>	<i>893</i>										

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2011-2	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	529	1016	1340											
		Anteil in %	14,25	27,37	36,10											
		CI Anteil in %	[13,13; 15,38]	[25,94; 28,81]	[34,55; 37,64]											
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1											
		Anteil in %	0,00	0,03	0,03											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	500	863	1068											
		Anteil in %	13,47	23,25	28,77											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	27	143	257											
		Anteil in %	0,73	3,85	6,92											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	9	14											
		Anteil %	0,05	0,24	0,38											
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3712</i>	<i>3183</i>	<i>2696</i>										
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3183</i>	<i>2696</i>	<i>2372</i>										
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	346	700	935											
		Anteil in %	13,53	27,38	36,57											
		CI Anteil in %	[12,21; 14,86]	[25,65; 29,10]	[34,70; 38,43]											
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	322	589	737											
		Anteil in %	12,59	23,03	28,82											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	19	100	182											
		Anteil in %	0,74	3,91	7,12											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	11	16											
		Anteil %	0,20	0,43	0,63											
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2557</i>	<i>2211</i>	<i>1857</i>										
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2211</i>	<i>1857</i>	<i>1622</i>										
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	308	596	792											
		Anteil in %	12,26	23,72	31,52											
		CI Anteil in %	[10,97; 13,54]	[22,05; 25,38]	[29,70; 33,33]											
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1											
Anteil in %		0,00	0,04	0,04												
davon wegen Ausschluss	Anzahl	286	503	634												
	Anteil in %	11,38	20,02	25,23												
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20	86	149												
	Anteil in %	0,80	3,42	5,93												
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	6	8												
	Anteil %	0,08	0,24	0,32												
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2513</i>	<i>2205</i>	<i>1917</i>											
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2205</i>	<i>1917</i>	<i>1721</i>											
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	165	339	443												
	Anteil in %	11,43	23,48	30,68												
	CI Anteil in %	[9,79; 13,07]	[21,29; 25,66]	[28,30; 33,06]												
davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0												
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
davon wegen Ausschluss	Anzahl	154	294	358												
	Anteil in %	10,66	20,36	24,79												
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	10	41	77												
	Anteil in %	0,69	2,84	5,33												
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	4	8												
	Anteil %	0,07	0,28	0,55												
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1444</i>	<i>1279</i>	<i>1105</i>											
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1279</i>	<i>1105</i>	<i>1001</i>											

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	573	940												
		Anteil in %	14,39	23,60												
		CI Anteil in %	[13,30; 15,48]	[22,28; 24,92]												
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	544	804												
		Anteil in %	13,66	20,19												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	28	123												
		Anteil in %	0,70	3,09												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	13												
		Anteil %	0,03	0,33												
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3983</i>	<i>3410</i>											
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3410</i>	<i>3043</i>											
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	390	671												
		Anteil in %	14,44	24,84												
		CI Anteil in %	[13,11; 15,76]	[23,21; 26,47]												
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1												
		Anteil in %	0,04	0,04												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	369	567												
		Anteil in %	13,66	20,99												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	19	98												
		Anteil in %	0,70	3,63												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	5												
		Anteil %	0,04	0,19												
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2701</i>	<i>2311</i>											
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2311</i>	<i>2030</i>											
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	345	569												
		Anteil in %	12,83	21,15												
		CI Anteil in %	[11,56; 14,09]	[19,61; 22,70]												
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0												
Anteil in %		0,00	0,00													
davon wegen Ausschluss	Anzahl	323	485													
	Anteil in %	12,01	18,03													
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	21	75													
	Anteil in %	0,78	2,79													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	9													
	Anteil %	0,04	0,33													
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2690</i>	<i>2345</i>												
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2345</i>	<i>2121</i>												
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	187	343													
	Anteil in %	11,51	21,12													
	CI Anteil in %	[9,96; 13,07]	[19,13; 23,11]													
davon wegen Tod	Anzahl	1	1													
	Anteil in %	0,06	0,06													
davon wegen Ausschluss	Anzahl	172	282													
	Anteil in %	10,59	17,36													
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	14	59													
	Anteil in %	0,86	3,63													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1													
	Anteil %	0,00	0,06													
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1624</i>	<i>1437</i>												
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1437</i>	<i>1281</i>												

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2012-2	ausgeschiedene männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	365													
		Anteil in %	10,11													
		CI Anteil in %	[9,12; 11,09]													
	davon wegen Tod	Anzahl	0													
		Anteil in %	0,00													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	341													
		Anteil in %	9,44													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20													
		Anteil in %	0,55													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4													
		Anteil %	0,11													
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3611</i>												
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3246</i>												
	ausgeschiedene weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	230													
		Anteil in %	9,87													
		CI Anteil in %	[8,66; 11,08]													
	davon wegen Tod	Anzahl	0													
		Anteil in %	0,00													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	215													
		Anteil in %	9,22													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	14													
		Anteil in %	0,60													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1													
		Anteil %	0,04													
	<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2331</i>												
	<i>< 18 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2101</i>												
	ausgeschiedene männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	209													
		Anteil in %	8,61													
		CI Anteil in %	[7,50; 9,73]													
	davon wegen Tod	Anzahl	0													
Anteil in %		0,00														
davon wegen Ausschluss	Anzahl	193														
	Anteil in %	7,95														
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	13														
	Anteil in %	0,54														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3														
	Anteil %	0,12														
<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2427</i>													
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2218</i>													
ausgeschiedene weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	107														
	Anteil in %	8,10														
	CI Anteil in %	[6,63; 9,57]														
davon wegen Tod	Anzahl	0														
	Anteil in %	0,00														
davon wegen Ausschluss	Anzahl	100														
	Anteil in %	7,57														
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6														
	Anteil in %	0,45														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1														
	Anteil %	0,08														
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1321</i>													
<i>< 12 insges.: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1214</i>													

In Tabelle 1.6 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **über alle Kohorten und alle Folgehalbjahre**. In diese Auswertung fließen alle Patienten < 18 bzw. < 12 Jahre unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der

Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Tabelle 1.6 Patienten < 18 bzw. < 12 und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	Folgehalbjahre	
Kohorte	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	3,93
		Median	3,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>336367</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,25
		Median	3,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>229679</i>	

In Tabelle 1.7 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten < 18 bzw. < 12 Jahre **pro Kohorte und über alle Folgehalbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Tabelle 1.7 Patienten < 18 bzw. < 12 und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
2006-1	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,36
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>2076</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,42
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>1373</i>
2006-2	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,65
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>22067</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,15
		Median	8,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>16441</i>
2007-1	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,09
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>36812</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,63
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>25978</i>
2007-2	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,66
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>55330</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,10
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>39717</i>
2008-1	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,07
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>52951</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,55
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>35800</i>
2008-2	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,70
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>42764</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,07
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>28219</i>
2009-1	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,13
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>29831</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,45
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>19749</i>
2009-2	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,68
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>24520</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,01
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>16327</i>

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
2010-1	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,24
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>22098</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,43
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>14391</i>
2010-2	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,79
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>18627</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,95
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>12499</i>
2011-1	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,19
		Median	3,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>13623</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,30
		Median	3,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>8897</i>
2011-2	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,59
		Median	2,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>9947</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,64
		Median	2,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>6506</i>
2012-1	Patienten < 18 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	0,86
		Median	1,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>5721</i>
	Patienten < 12 insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	0,88
		Median	1,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>3782</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

Tabelle 1.8 Patienten <18 bzw. <12 ohne medizinische Dokumentation

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		7	4	9	6	8	4	2	3	4	7	5	4	5	
		Anteil in %			1,97	1,24	3,03	2,26	3,25	1,85	1,02	1,63	2,37	4,49	3,57	3,15	4,35
		CI Anteil in %			[0,52; 3,41]	[0,03; 2,45]	[1,08; 4,98]	[0,47; 4,06]	[1,03; 5,47]	[0,05; 3,65]	[0,00; 2,43]	[0,00; 3,47]	[0,07; 4,67]	[1,23; 7,75]	[0,49; 6,66]	[0,10; 6,20]	[0,60; 8,09]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		4	1	6	5	6	2	2	2	3	3	3	2	4	
Anteil in %				1,67	0,46	2,97	2,78	3,59	1,38	1,48	1,59	2,54	2,70	2,97	2,20	4,71	
CI Anteil in %				[0,04; 3,29]	[0,00; 1,36]	[0,62; 5,32]	[0,37; 5,19]	[0,76; 6,42]	[0,00; 3,28]	[0,00; 3,53]	[0,00; 5,39]	[0,00; 5,73]	[0,00; 6,30]	[0,00; 5,23]	[0,18; 9,23]		
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		71	89	67	136	114	84	68	70	51	65	57	67		
		Anteil in %			2,31	3,24	2,72	6,02	5,46	4,51	4,14	4,74	3,88	5,56	5,45	7,20	
		CI Anteil in %			[1,78; 2,85]	[2,58; 3,90]	[2,07; 3,36]	[5,04; 7,00]	[4,49; 6,43]	[3,57; 5,46]	[3,18; 5,11]	[3,66; 5,83]	[2,84; 4,93]	[4,25; 6,87]	[4,08; 6,83]	[5,54; 8,87]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		49	55	38	94	80	50	49	47	36	45	41	60		
Anteil in %				2,27	2,83	2,16	5,76	5,24	3,63	3,88	4,08	3,44	4,75	4,76	7,79		
CI Anteil in %				[1,64; 2,90]	[2,09; 3,57]	[1,48; 2,84]	[4,63; 6,89]	[4,12; 6,36]	[2,64; 4,61]	[2,81; 4,95]	[2,94; 5,22]	[2,34; 4,55]	[3,39; 6,10]	[3,33; 6,18]	[5,90; 9,69]		
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		176	194	319	211	175	174	156	117	128	125	142			
		Anteil in %			3,21	3,99	7,30	5,36	4,93	5,52	5,48	4,66	5,68	6,15	7,81		
		CI Anteil in %			[2,74; 3,68]	[3,44; 4,54]	[6,53; 8,07]	[4,65; 6,06]	[4,21; 5,64]	[4,72; 6,32]	[4,65; 6,32]	[3,84; 5,49]	[4,73; 6,64]	[5,10; 7,19]	[6,58; 9,04]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		88	117	193	127	90	93	99	76	84	76	92			
Anteil in %				2,45	3,64	6,58	4,71	3,62	4,09	4,74	4,01	4,85	4,77	6,27			
CI Anteil in %				[1,94; 2,95]	[2,99; 4,28]	[5,68; 7,47]	[3,91; 5,51]	[2,89; 4,35]	[3,27; 4,90]	[3,83; 5,65]	[3,13; 4,90]	[3,84; 5,87]	[3,72; 5,81]	[5,03; 7,51]			
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		352	633	428	290	252	253	230	192	219	238				
		Anteil in %			4,01	8,04	6,07	4,67	4,58	5,14	5,22	4,87	6,24	7,58			
		CI Anteil in %			[3,60; 4,42]	[7,44; 8,64]	[5,51; 6,63]	[4,15; 5,20]	[4,02; 5,13]	[4,52; 5,75]	[4,57; 5,88]	[4,20; 5,55]	[5,44; 7,04]	[6,66; 8,51]			
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		191	374	234	160	147	160	164	117	157	168				
Anteil in %				3,23	6,99	4,82	3,67	3,70	4,40	4,91	3,85	5,70	6,73				
CI Anteil in %				[2,78; 3,68]	[6,30; 7,67]	[4,22; 5,43]	[3,12; 4,23]	[3,11; 4,29]	[3,74; 5,07]	[4,18; 5,64]	[3,17; 4,53]	[4,83; 6,57]	[5,75; 7,71]				
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		790	607	401	326	297	258	253	236	263					
		Anteil in %			8,40	7,24	5,61	5,25	5,41	5,31	5,89	6,23	7,80				
		CI Anteil in %			[7,84; 8,96]	[6,68; 7,79]	[5,08; 6,15]	[4,70; 5,81]	[4,82; 6,01]	[4,68; 5,94]	[5,18; 6,59]	[5,46; 7,00]	[6,89; 8,70]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		430	310	210	170	182	160	154	153	172					
Anteil in %				7,27	5,78	4,49	4,06	4,81	4,66	4,96	5,47	6,78					
CI Anteil in %				[6,61; 7,93]	[5,15; 6,40]	[3,90; 5,09]	[3,47; 4,66]	[4,13; 5,49]	[3,95; 5,36]	[4,19; 5,72]	[4,63; 6,31]	[5,80; 7,76]					
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		414	384	349	302	271	251	258	257						
		Anteil in %			5,08	5,49	5,73	5,59	5,70	5,90	6,88	7,63					
		CI Anteil in %			[4,61; 5,56]	[4,96; 6,02]	[5,14; 6,31]	[4,98; 6,21]	[5,04; 6,36]	[5,19; 6,61]	[6,07; 7,69]	[6,73; 8,52]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		184	202	181	160	159	147	148	157						
Anteil in %				3,63	4,54	4,57	4,47	4,95	5,03	5,62	6,55						
CI Anteil in %				[3,12; 4,15]	[3,93; 5,16]	[3,92; 5,22]	[3,79; 5,15]	[4,20; 5,70]	[4,24; 5,82]	[4,74; 6,50]	[5,56; 7,54]						

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		262	292	260	194	223	209	195					
		Anteil in %		4,21	5,47	5,58	4,81	6,25	6,54	6,91					
		CI Anteil in %		[3,71; 4,71]	[4,86; 6,08]	[4,92; 6,24]	[4,15; 5,47]	[5,46; 7,04]	[5,68; 7,39]	[5,97; 7,85]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		132	166	140	110	121	116	128					
Anteil in %			3,36	4,84	4,61	4,10	4,98	5,20	6,35						
CI Anteil in %			[2,80; 3,93]	[4,12; 5,56]	[3,86; 5,35]	[3,35; 4,85]	[4,12; 5,85]	[4,28; 6,12]	[5,28; 7,41]						
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		257	260	238	214	192	208						
		Anteil in %		4,43	5,33	5,73	5,85	6,00	7,36						
		CI Anteil in %		[3,90; 4,96]	[4,70; 5,96]	[5,02; 6,43]	[5,09; 6,61]	[5,18; 6,82]	[6,40; 8,32]						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		142	141	140	122	111	129						
Anteil in %			3,89	4,45	5,04	4,88	4,98	6,43							
CI Anteil in %			[3,26; 4,52]	[3,73; 5,17]	[4,23; 5,85]	[4,04; 5,72]	[4,08; 5,89]	[5,36; 7,51]							
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		255	236	213	183	215							
		Anteil in %		4,37	4,76	4,98	4,91	6,53							
		CI Anteil in %		[3,84; 4,89]	[4,16; 5,35]	[4,33; 5,63]	[4,22; 5,61]	[5,69; 7,38]							
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		139	134	128	109	127							
Anteil in %			3,79	4,21	4,56	4,37	5,67								
CI Anteil in %			[3,17; 4,41]	[3,51; 4,91]	[3,79; 5,33]	[3,57; 5,18]	[4,71; 6,62]								
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		213	294	231	257								
		Anteil in %		3,73	5,96	5,43	6,89								
		CI Anteil in %		[3,24; 4,22]	[5,30; 6,62]	[4,75; 6,11]	[6,08; 7,70]								
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		126	156	146	159								
Anteil in %			3,37	4,76	5,04	6,14									
CI Anteil in %			[2,79; 3,95]	[4,03; 5,49]	[4,24; 5,84]	[5,21; 7,06]									
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		221	265	283									
		Anteil in %		4,17	5,92	7,36									
		CI Anteil in %		[3,63; 4,71]	[5,23; 6,61]	[6,53; 8,18]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		116	140	154									
Anteil in %			3,44	4,76	5,97										
CI Anteil in %			[2,82; 4,05]	[3,99; 5,53]	[5,05; 6,88]										
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		247	308										
		Anteil in %		4,58	6,76										
		CI Anteil in %		[4,02; 5,14]	[6,04; 7,49]										
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		118	145										
Anteil in %			3,39	4,80											
CI Anteil in %			[2,79; 3,99]	[4,04; 5,56]											
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		291											
		Anteil in %		5,09											
		CI Anteil in %		[4,52; 5,66]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		153											
Anteil in %			4,05												
CI Anteil in %			[3,42; 4,67]												

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	Patienten < 18 insgesamt		Anzahl	5942													
	ohne medizinische Dokumentation		Anzahl														
			Anteil in %														
			CI Anteil in %														
	Patienten < 12 insgesamt		Anzahl	3748													
	ohne medizinische Dokumentation		Anzahl														
			Anteil in %														
			CI Anteil in %														

Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Raucherstatus
- Gewichtsentwicklung (BMI)

Symptomatik

- Asthmasymptome
- stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale

Klinische Verlaufsparemeter

- Peak-Flow-Wert

Medikation

- Medikation nach Medikamentengruppen

Prozessparameter

- Asthaschulungen
- Überprüfung der Inhalationstechnik
- Schriftlicher Selbstmanagementplan
- Tabakverzicht

Sterberaten

- Sterberaten

3.1 Risikofaktoren

Im Folgenden werden die Auswertungen für zwei Variablen dargestellt, die als Risikofaktoren entweder die Entstehung asthmatischer Erkrankungen begünstigen oder bei bereits Erkrankten Asthmaanfälle auslösen können: Rauchen und Gewicht (hier dargestellt anhand des Body-Mass-Index (BMI)).

Zunächst werden die Auswertungen zum Raucherstatus dargestellt. Rauchen gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Erkrankungen der Atemwege, somit auch für Asthma. Eine wichtige Zielsetzung des DMP in der Asthmatherapie ist demzufolge eine Veränderung des Rauchverhaltens der Patienten, die letztlich zur Reduktion des Raucheranteils unter den DMP-Teilnehmern führen soll. In der Auswertung werden nur die Raucher betrachtet, die zum Beitrittszeitpunkt 12-17 Jahre alt waren.

Daran anschließend werden die Auswertungen zur Gewichtsentwicklung anhand des BMI dargestellt. Der BMI ist eine Maßzahl zur Bewertung des Körpergewichts, in die auch die Körpergröße mit einbezogen wird. Er wird berechnet aus dem Körpergewicht in Kilogramm und der Körpergröße in Meter im Quadrat (BMI = kg/m²). BMI-Werte unter 18,5 kg/m² sind als

untergewichtig, BMI-Werte zwischen 18,5 und 25 kg/m² sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und 30 kg/m² als mäßig übergewichtig und BMI-Werte über 30 kg/m² als stark übergewichtig (adipös) einzustufen.

In Tabelle 3.1.1 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (12 ≤ t < 18 Jahre) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen erwachsenen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren. Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt“ und unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

Tabelle 3.1.1 Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2006-1	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	18	16	12	9	8	6	6	5	5	3	2	2	1	
	auswertbar	Anzahl		15	10	9	8	5	5	5	3	2	2	2	1	
	Raucher	Anzahl		12	6	6	5	3	4	4	4	3	2	2	2	1
		Anteil in %		80,00	60,00	66,67	62,50	60,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		CI Anteil in %		[59,05; 100,00]	[27,99; 92,01]	[34,00; 99,33]	[26,64; 98,36]	[11,99; 100,00]	[40,80; 100,00]	[40,80; 100,00]	[40,80; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>123</i>	<i>116</i>	<i>106</i>	<i>95</i>	<i>85</i>	<i>79</i>	<i>71</i>	<i>61</i>	<i>58</i>	<i>51</i>	<i>45</i>	<i>39</i>	<i>36</i>	<i>30</i>
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	9	9	6	4	4	3	3	2	2	1	0	0	0	0
	auswertbar	Anzahl		8	4	4	4	2	2	2	1	1				
	Raucher	Anzahl		6	1	1	2	1	1	1	1	1				
		Anteil in %		75,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
		CI Anteil in %		[42,92; 100,00]	[0,00; 74,00]	[0,00; 74,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>70</i>	<i>67</i>	<i>61</i>	<i>54</i>	<i>49</i>	<i>44</i>	<i>40</i>	<i>32</i>	<i>29</i>	<i>25</i>	<i>23</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>15</i>
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	9	7	6	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1
	auswertbar	Anzahl		7	6	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1
	Raucher	Anzahl		6	5	5	3	2	3	3	3	2	2	2	2	1
		Anteil in %		85,71	83,33	100,00	75,00	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CI Anteil in %			[57,71; 100,00]	[50,67; 100,00]	[100,00; 100,00]	[26,00; 100,00]	[1,33; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>53</i>	<i>49</i>	<i>45</i>	<i>41</i>	<i>36</i>	<i>35</i>	<i>31</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>26</i>	<i>22</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	117	101	88	73	65	53	45	38	31	27	25	22	18
	auswertbar	Anzahl		100	82	70	62	47	40	35	30	27	23	19	18
	Raucher	Anzahl		83	64	51	45	37	33	27	25	23	19	15	15
		Anteil in %		83,00	78,05	72,86	72,58	78,72	82,50	77,14	83,33	85,19	82,61	78,95	83,33
		CI Anteil in %		[75,60; 90,40]	[69,03; 87,06]	[62,36; 83,35]	[61,39; 83,78]	[66,90; 90,55]	[70,57; 94,43]	[63,03; 91,26]	[69,77; 96,90]	[71,53; 98,84]	[66,77; 98,45]	[60,11; 97,78]	[65,62; 100,00]
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1019</i>	<i>911</i>	<i>805</i>	<i>705</i>	<i>628</i>	<i>561</i>	<i>482</i>	<i>378</i>	<i>324</i>	<i>268</i>	<i>221</i>	<i>183</i>	<i>160</i>
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	59	51	42	33	30	23	19	17	16	13	13	11	10
	auswertbar	Anzahl		50	40	32	30	20	18	16	15	13	11	10	10
	Raucher	Anzahl		40	30	22	19	17	15	12	13	11	10	10	9
		Anteil in %		80,00	75,00	68,75	63,33	85,00	83,33	75,00	86,67	84,62	90,91	100,00	90,00
		CI Anteil in %		[68,80; 91,20]	[61,41; 88,59]	[52,43; 85,07]	[45,79; 80,87]	[68,94; 100,00]	[65,62; 100,00]	[53,09; 96,91]	[68,86; 100,00]	[64,20; 100,00]	[73,09; 100,00]	[100,00; 100,00]	[70,40; 100,00]
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>589</i>	<i>528</i>	<i>465</i>	<i>404</i>	<i>360</i>	<i>321</i>	<i>271</i>	<i>206</i>	<i>176</i>	<i>140</i>	<i>121</i>	<i>98</i>	<i>84</i>
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	58	50	46	40	35	30	26	21	15	14	12	11	8
	auswertbar	Anzahl		50	42	38	32	27	22	19	15	14	12	9	8
Raucher	Anzahl		43	34	29	26	20	18	15	12	12	9	5	6	
	Anteil in %		86,00	80,95	76,32	81,25	74,07	81,82	78,95	80,00	85,71	75,00	55,56	75,00	
	CI Anteil in %		[76,28; 95,72]	[68,93; 92,97]	[62,62; 90,01]	[67,51; 94,99]	[57,23; 90,92]	[65,32; 98,31]	[60,11; 97,78]	[59,05; 100,00]	[66,69; 100,00]	[49,41; 100,00]	[21,12; 89,99]	[42,92; 100,00]	
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>430</i>	<i>383</i>	<i>340</i>	<i>301</i>	<i>268</i>	<i>240</i>	<i>211</i>	<i>172</i>	<i>148</i>	<i>128</i>	<i>100</i>	<i>85</i>	<i>76</i>	
2007-1	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	229	196	159	135	101	81	66	58	50	41	38	31	
	auswertbar	Anzahl		179	148	116	90	76	64	55	49	39	35	26	
	Raucher	Anzahl		152	118	78	61	56	43	36	38	31	27	22	
		Anteil in %		84,92	79,73	67,24	67,78	73,68	67,19	65,45	77,55	79,49	77,14	84,62	
		CI Anteil in %		[79,66; 90,17]	[73,23; 86,23]	[58,66; 75,82]	[58,07; 77,49]	[63,72; 83,65]	[55,59; 78,78]	[52,77; 78,14]	[65,75; 89,35]	[66,65; 92,33]	[63,03; 91,26]	[70,47; 98,76]	
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2130</i>	<i>1888</i>	<i>1639</i>	<i>1436</i>	<i>1244</i>	<i>1066</i>	<i>877</i>	<i>756</i>	<i>616</i>	<i>521</i>	<i>440</i>	<i>351</i>	
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	121	104	84	73	59	49	39	34	27	23	21	19	
	auswertbar	Anzahl		97	78	64	53	46	37	31	26	22	20	17	
	Raucher	Anzahl		82	60	44	37	33	25	21	19	18	16	13	
		Anteil in %		84,54	76,92	68,75	69,81	71,74	67,57	67,74	73,08	81,82	80,00	76,47	
		CI Anteil in %		[77,30; 91,77]	[67,51; 86,33]	[57,30; 80,20]	[57,33; 82,29]	[58,58; 84,90]	[52,28; 82,86]	[51,01; 84,47]	[55,69; 90,46]	[65,32; 98,31]	[62,01; 97,99]	[55,69; 97,26]	
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1242</i>	<i>1102</i>	<i>964</i>	<i>859</i>	<i>742</i>	<i>642</i>	<i>524</i>	<i>459</i>	<i>368</i>	<i>315</i>	<i>261</i>	<i>207</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	108	92	75	62	42	32	27	24	23	18	17	12	
	auswertbar	Anzahl		82	70	52	37	30	27	24	23	17	15	9	
Raucher	Anzahl		70	58	34	24	23	18	15	19	13	11	9		
	Anteil in %		85,37	82,86	65,38	64,86	76,67	66,67	62,50	82,61	76,47	73,33	100,00		
	CI Anteil in %		[77,67; 93,06]	[73,96; 91,75]	[52,33; 78,44]	[49,27; 80,46]	[61,27; 92,06]	[48,55; 84,79]	[42,71; 82,29]	[66,77; 98,45]	[55,69; 97,26]	[50,17; 96,50]	[100,00; 100,00]		
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>888</i>	<i>786</i>	<i>675</i>	<i>577</i>	<i>502</i>	<i>424</i>	<i>353</i>	<i>297</i>	<i>248</i>	<i>206</i>	<i>179</i>	<i>144</i>		

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	381	315	265	222	180	141	112	90	75	64	54		
	auswertbar	Anzahl		295	241	200	164	133	102	85	72	59	53		
	Raucher	Anzahl		258	166	140	117	93	72	58	50	43	39		
		Anteil in %		87,46	68,88	70,00	71,34	69,92	70,59	68,24	69,44	72,88	73,58		
		CI Anteil in %		[83,67; 91,24]	[63,02; 74,74]	[63,63; 76,37]	[64,40; 78,28]	[62,10; 77,75]	[61,70; 79,47]	[58,28; 78,19]	[58,73; 80,16]	[61,44; 84,32]	[61,60; 85,57]		
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3258</i>	<i>2852</i>	<i>2518</i>	<i>2201</i>	<i>1854</i>	<i>1535</i>	<i>1292</i>	<i>1062</i>	<i>901</i>	<i>757</i>	<i>641</i>		
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	192	160	142	115	93	75	57	46	39	32	24		
	auswertbar	Anzahl		150	130	102	88	71	51	45	38	28	23		
	Raucher	Anzahl		131	95	74	61	50	37	32	28	21	17		
		Anteil in %		87,33	73,08	72,55	69,32	70,42	72,55	71,11	73,68	75,00	73,91		
		CI Anteil in %		[81,99; 92,67]	[65,42; 80,73]	[63,85; 81,25]	[59,63; 79,01]	[59,73; 81,11]	[60,18; 84,92]	[57,72; 84,50]	[59,50; 87,87]	[58,67; 91,33]	[55,56; 92,26]		
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1856</i>	<i>1614</i>	<i>1428</i>	<i>1248</i>	<i>1059</i>	<i>885</i>	<i>743</i>	<i>599</i>	<i>507</i>	<i>426</i>	<i>351</i>		
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	189	155	123	107	87	66	55	44	36	32	30		
	auswertbar	Anzahl		145	111	98	76	62	51	40	34	31	30		
Raucher	Anzahl		127	71	66	56	43	35	26	22	22	22			
	Anteil in %		87,59	63,96	67,35	73,68	69,35	68,63	65,00	64,71	70,97	73,33			
	CI Anteil in %		[82,20; 92,97]	[54,99; 72,94]	[58,01; 76,68]	[63,72; 83,65]	[57,79; 80,92]	[55,77; 81,49]	[50,03; 79,97]	[48,40; 81,01]	[54,72; 87,21]	[57,24; 89,43]			
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1402</i>	<i>1238</i>	<i>1090</i>	<i>953</i>	<i>795</i>	<i>650</i>	<i>549</i>	<i>463</i>	<i>394</i>	<i>331</i>	<i>290</i>			
2008-1	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	413	334	276	203	154	124	102	84	66	52			
	auswertbar	Anzahl		294	245	186	147	115	96	76	62	48			
	Raucher	Anzahl		234	176	133	105	78	63	50	42	36			
		Anteil in %		79,59	71,84	71,51	71,43	67,83	65,63	65,79	67,74	75,00			
		CI Anteil in %		[74,98; 84,21]	[66,19; 77,48]	[65,00; 78,01]	[64,10; 78,76]	[59,25; 76,40]	[56,07; 75,18]	[55,05; 76,53]	[56,01; 79,47]	[62,62; 87,38]			
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3985</i>	<i>3492</i>	<i>3022</i>	<i>2471</i>	<i>2026</i>	<i>1700</i>	<i>1423</i>	<i>1190</i>	<i>992</i>	<i>835</i>			
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	211	168	143	110	80	62	50	42	31	23			
	auswertbar	Anzahl		146	124	98	76	55	46	38	29	20			
	Raucher	Anzahl		111	90	71	55	39	28	24	19	16			
		Anteil in %		76,03	72,58	72,45	72,37	70,91	60,87	63,16	65,52	80,00			
		CI Anteil in %		[69,08; 82,98]	[64,70; 80,46]	[63,56; 81,34]	[62,25; 82,49]	[58,80; 83,02]	[46,61; 75,13]	[47,61; 78,70]	[47,91; 83,12]	[62,01; 97,99]			
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2265</i>	<i>1973</i>	<i>1732</i>	<i>1401</i>	<i>1146</i>	<i>979</i>	<i>825</i>	<i>694</i>	<i>572</i>	<i>473</i>			
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	202	166	133	93	74	62	52	42	35	29			
	auswertbar	Anzahl		148	121	88	71	60	50	38	33	28			
Raucher	Anzahl		123	86	62	50	39	35	26	23	20				
	Anteil in %		83,11	71,07	70,45	70,42	65,00	70,00	68,42	69,70	71,43				
	CI Anteil in %		[77,05; 89,17]	[62,96; 79,19]	[60,87; 80,04]	[59,73; 81,11]	[52,83; 77,17]	[57,17; 82,83]	[53,44; 83,40]	[53,77; 85,62]	[54,39; 88,47]				
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1720</i>	<i>1519</i>	<i>1290</i>	<i>1070</i>	<i>880</i>	<i>721</i>	<i>598</i>	<i>496</i>	<i>420</i>	<i>362</i>				

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
2008-2	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	463	385	293	244	201	166	139	113	102				
	auswertbar	Anzahl		353	263	217	183	154	131	97	93				
	Raucher	Anzahl		320	218	182	146	123	107	74	71				
		Anteil in %		90,65	82,89	83,87	79,78	79,87	81,68	76,29	76,34				
		CI Anteil in %		[87,61; 93,69]	[78,33; 87,45]	[78,97; 88,78]	[73,95; 85,62]	[73,52; 86,22]	[75,03; 88,33]	[67,78; 84,80]	[67,66; 85,03]				
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3538</i>	<i>3077</i>	<i>2551</i>	<i>2133</i>	<i>1820</i>	<i>1542</i>	<i>1329</i>	<i>1120</i>	<i>973</i>				
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	229	196	146	120	94	81	67	56	51				
	auswertbar	Anzahl		179	125	104	86	74	62	46	45				
	Raucher	Anzahl		164	104	88	70	56	51	34	34				
		Anteil in %		91,62	83,20	84,62	81,40	75,68	82,26	73,91	75,56				
		CI Anteil in %		[87,55; 95,69]	[76,62; 89,78]	[77,65; 91,58]	[73,12; 89,67]	[65,83; 85,52]	[72,67; 91,85]	[61,08; 86,74]	[62,86; 88,25]				
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1922</i>	<i>1674</i>	<i>1379</i>	<i>1149</i>	<i>977</i>	<i>825</i>	<i>707</i>	<i>592</i>	<i>512</i>				
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	234	189	147	124	107	85	72	57	51				
	auswertbar	Anzahl		174	138	113	97	80	69	51	48				
Raucher	Anzahl		156	114	94	76	67	56	40	37					
	Anteil in %		89,66	82,61	83,19	78,35	83,75	81,16	78,43	77,08					
	CI Anteil in %		[85,12; 94,19]	[76,26; 88,96]	[76,26; 90,11]	[70,11; 86,59]	[75,61; 91,89]	[71,87; 90,45]	[67,03; 89,83]	[65,07; 89,10]					
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1616</i>	<i>1403</i>	<i>1172</i>	<i>984</i>	<i>843</i>	<i>717</i>	<i>622</i>	<i>528</i>	<i>461</i>					
2009-1	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	237	189	149	105	88	70	60	48					
	auswertbar	Anzahl		175	139	101	84	62	56	46					
	Raucher	Anzahl		167	127	94	76	52	47	39					
		Anteil in %		95,43	91,37	93,07	90,48	83,87	83,93	84,78					
		CI Anteil in %		[92,33; 98,53]	[86,68; 96,05]	[88,09; 98,05]	[84,16; 96,79]	[74,64; 93,10]	[74,22; 93,63]	[74,29; 95,28]					
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2788</i>	<i>2296</i>	<i>1906</i>	<i>1616</i>	<i>1350</i>	<i>1140</i>	<i>968</i>	<i>806</i>					
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	120	94	81	55	49	38	33	23					
	auswertbar	Anzahl		88	73	53	47	32	29	22					
	Raucher	Anzahl		82	64	48	42	28	24	18					
		Anteil in %		93,18	87,67	90,57	89,36	87,50	82,76	81,82					
		CI Anteil in %		[87,89; 98,48]	[80,08; 95,27]	[82,62; 98,51]	[80,45; 98,27]	[75,86; 99,14]	[68,77; 96,75]	[65,32; 98,31]					
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1600</i>	<i>1303</i>	<i>1084</i>	<i>933</i>	<i>779</i>	<i>656</i>	<i>562</i>	<i>463</i>					
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	117	95	68	50	39	32	27	25					
	auswertbar	Anzahl		87	66	48	37	30	27	24					
Raucher	Anzahl		85	63	46	34	24	23	21						
	Anteil in %		97,70	95,45	95,83	91,89	80,00	85,19	87,50						
	CI Anteil in %		[94,53; 100,00]	[90,39; 100,00]	[90,12; 100,00]	[82,98; 100,00]	[65,44; 94,56]	[71,53; 98,84]	[73,98; 100,00]						
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1188</i>	<i>993</i>	<i>822</i>	<i>683</i>	<i>571</i>	<i>484</i>	<i>406</i>	<i>343</i>						

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-2	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	316	242	170	129	104	88	77						
	auswertbar	Anzahl		226	157	121	95	80	68						
	Raucher	Anzahl		212	139	104	82	69	56						
		Anteil in %		93,81	88,54	85,95	86,32	86,25	82,35						
		CI Anteil in %		[90,66; 96,96]	[83,54; 93,53]	[79,73; 92,17]	[79,37; 93,26]	[78,66; 93,84]	[73,22; 91,48]						
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2591</i>	<i>2146</i>	<i>1714</i>	<i>1379</i>	<i>1160</i>	<i>973</i>	<i>821</i>						
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	156	114	80	59	49	42	36						
	auswertbar	Anzahl		107	74	55	44	36	31						
	Raucher	Anzahl		103	66	49	41	32	25						
		Anteil in %		96,26	89,19	89,09	93,18	88,89	80,65						
		CI Anteil in %		[92,65; 99,87]	[82,07; 96,31]	[80,78; 97,41]	[85,65; 100,00]	[78,48; 99,30]	[66,51; 94,78]						
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1413</i>	<i>1167</i>	<i>919</i>	<i>743</i>	<i>627</i>	<i>513</i>	<i>420</i>						
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	160	128	90	70	55	46	41						
	auswertbar	Anzahl		119	83	66	51	44	37						
Raucher	Anzahl		109	73	55	41	37	31							
	Anteil in %		91,60	87,95	83,33	80,39	84,09	83,78							
	CI Anteil in %		[86,59; 96,60]	[80,91; 95,00]	[74,27; 92,39]	[69,39; 91,40]	[73,16; 95,02]	[71,74; 95,82]							
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1178</i>	<i>979</i>	<i>795</i>	<i>636</i>	<i>533</i>	<i>460</i>	<i>401</i>							
2010-1	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	224	166	129	100	83	69							
	auswertbar	Anzahl		160	124	93	78	61							
	Raucher	Anzahl		144	109	78	65	50							
		Anteil in %		90,00	87,90	83,87	83,33	81,97							
		CI Anteil in %		[85,34; 94,66]	[82,14; 93,67]	[76,36; 91,39]	[75,01; 91,66]	[72,24; 91,70]							
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2627</i>	<i>2171</i>	<i>1781</i>	<i>1473</i>	<i>1232</i>	<i>1050</i>							
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	100	79	61	51	43	36							
	auswertbar	Anzahl		75	58	48	40	32							
	Raucher	Anzahl		68	51	41	34	27							
		Anteil in %		90,67	87,93	85,42	85,00	84,38							
		CI Anteil in %		[84,04; 97,29]	[79,47; 96,39]	[75,33; 95,51]	[73,79; 96,21]	[71,59; 97,16]							
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1443</i>	<i>1191</i>	<i>978</i>	<i>806</i>	<i>679</i>	<i>580</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	124	87	68	49	40	33							
	auswertbar	Anzahl		85	66	45	38	29							
Raucher	Anzahl		76	58	37	31	23								
	Anteil in %		89,41	87,88	82,22	81,58	79,31								
	CI Anteil in %		[82,83; 95,99]	[79,94; 95,81]	[70,93; 93,52]	[69,09; 94,07]	[64,31; 94,31]								
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1184</i>	<i>980</i>	<i>803</i>	<i>667</i>	<i>553</i>	<i>470</i>								

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-2	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	261	192	154	114	99								
	auswertbar	Anzahl		187	138	108	87								
	Raucher	Anzahl		177	126	98	76								
		Anteil in %			94,65	91,30	90,74	87,36							
		CI Anteil in %			[91,42; 97,89]	[86,59; 96,02]	[85,25; 96,23]	[80,33; 94,38]							
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2433</i>	<i>1972</i>	<i>1655</i>	<i>1361</i>	<i>1140</i>								
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	117	87	72	52	45								
	auswertbar	Anzahl		87	67	50	41								
	Raucher	Anzahl		83	62	44	36								
		Anteil in %			95,40	92,54	88,00	87,80							
		CI Anteil in %			[90,98; 99,83]	[86,20; 98,88]	[78,90; 97,10]	[77,66; 97,95]							
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1273</i>	<i>1036</i>	<i>863</i>	<i>695</i>	<i>592</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	144	105	82	62	54								
	auswertbar	Anzahl		100	71	58	46								
Raucher	Anzahl		94	64	54	40									
	Anteil in %			94,00	90,14	93,10	86,96								
	CI Anteil in %			[89,32; 98,68]	[83,16; 97,12]	[86,53; 99,68]	[77,12; 96,80]								
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1160</i>	<i>936</i>	<i>792</i>	<i>666</i>	<i>548</i>									
2011-1	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	187	147	105	86									
	auswertbar	Anzahl		136	94	78									
	Raucher	Anzahl		127	84	68									
		Anteil in %			93,38	89,36	87,18								
		CI Anteil in %			[89,19; 97,58]	[83,10; 95,63]	[79,71; 94,65]								
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2360</i>	<i>1921</i>	<i>1539</i>	<i>1266</i>									
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	80	62	45	33									
	auswertbar	Anzahl		56	42	32									
	Raucher	Anzahl		51	37	27									
		Anteil in %			91,07	88,10	84,38								
		CI Anteil in %			[83,54; 98,61]	[78,18; 98,01]	[71,59; 97,16]								
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1283</i>	<i>1053</i>	<i>847</i>	<i>691</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	107	85	60	53									
	auswertbar	Anzahl		80	52	46									
Raucher	Anzahl		76	47	41										
	Anteil in %			95,00	90,38	89,13									
	CI Anteil in %			[90,19; 99,81]	[82,29; 98,48]	[80,04; 98,22]									
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1077</i>	<i>868</i>	<i>692</i>	<i>575</i>										

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2011-2	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	236	185	146										
	auswertbar	Anzahl		164	126										
	Raucher	Anzahl		146	107										
		Anteil in %			89,02	84,92									
		CI Anteil in %			[84,23; 93,82]	[78,65; 91,19]									
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2312</i>	<i>1910</i>	<i>1531</i>										
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	105	82	65										
	auswertbar	Anzahl		72	54										
	Raucher	Anzahl		66	49										
		Anteil in %			91,67	90,74									
		CI Anteil in %			[85,24; 98,10]	[82,94; 98,54]									
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1199</i>	<i>978</i>	<i>779</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	131	103	81										
	auswertbar	Anzahl		92	72										
Raucher	Anzahl		80	58											
	Anteil in %			86,96	80,56										
	CI Anteil in %			[80,04; 93,88]	[71,35; 89,76]										
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1113</i>	<i>932</i>	<i>752</i>											
2012-1	Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	166	129											
	auswertbar	Anzahl		121											
	Raucher	Anzahl		112											
		Anteil in %			92,56										
		CI Anteil in %			[87,87; 97,26]										
	<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2370</i>	<i>1939</i>											
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	71	57											
	auswertbar	Anzahl		53											
	Raucher	Anzahl		48											
		Anteil in %			90,57										
		CI Anteil in %			[82,62; 98,51]										
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1293</i>	<i>1065</i>											
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t < 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	95	72											
	auswertbar	Anzahl		68											
Raucher	Anzahl		64												
	Anteil in %			94,12											
	CI Anteil in %			[88,48; 99,75]											
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1077</i>	<i>874</i>												

EZ	Raucher 12 ≤ t <18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	Kollektivmitglieder 12 ≤ t <18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	204													
	auswertbar	Anzahl														
	Raucher	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	<i>Patienten 12 ≤ t <18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2194</i>													
	männliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t <18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	101													
	auswertbar	Anzahl														
	Raucher	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	<i>männl. Pat. 12 ≤ t <18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1184</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder 12 ≤ t <18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	103													
	auswertbar	Anzahl														
	Raucher	Anzahl														
Anteil in %																
CI Anteil in %																
<i>weibl. Pat. 12 ≤ t <18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1010</i>														

In Tabelle 3.1.2 werden Anzahl und Anteile der aktuell **Raucher (12 ≤ t < 18 Jahre)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt“ und unter „männliche bzw. weibliche Patienten 12

≤ t < 18 Jahre“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Berichtshalbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

Tabelle 3.1.2 Raucherquote bei allen Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr

EZ	Raucherquote bei allen Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	123	116	106	95	85	79	71	61	58	51	45	39	36	30
	auswertbar	Anzahl	123	113	103	92	84	77	69	61	57	50	41	37	34	29
	Raucher	Anzahl	18	15	10	10	8	8	8	8	9	7	6	5	6	5
		Anteil in %	14,63	13,27	9,71	10,87	9,52	10,39	11,59	13,11	15,79	14,00	14,63	13,51	17,65	17,24
		CI Anteil in %	[8,36; 20,91]	[6,99; 19,56]	[3,96; 15,45]	[4,47; 17,26]	[3,21; 15,84]	[3,53; 17,25]	[3,98; 19,20]	[4,57; 21,66]	[6,24; 25,34]	[4,28; 23,72]	[3,68; 25,59]	[2,35; 24,68]	[4,64; 30,65]	[3,25; 31,23]
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	70	67	61	54	49	44	40	32	29	25	23	20	19	15
	auswertbar	Anzahl	70	65	58	52	48	43	38	32	28	25	22	19	18	15
	Raucher	Anzahl	9	7	2	2	3	3	3	3	4	3	2	1	2	2
		Anteil in %	12,86	10,77	3,45	3,85	6,25	6,98	7,89	9,38	14,29	12,00	9,09	5,26	11,11	13,33
		CI Anteil in %	[4,96; 20,76]	[3,17; 18,36]	[0,00; 8,19]	[0,00; 9,12]	[0,00; 13,17]	[0,00; 14,68]	[0,00; 16,58]	[0,00; 19,64]	[1,09; 27,49]	[0,00; 25,00]	[0,00; 21,39]	[0,00; 15,58]	[0,00; 26,05]	[0,00; 31,14]
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	53	49	45	41	36	35	31	29	29	26	22	19	17	15
	auswertbar	Anzahl	53	48	45	40	36	34	31	29	29	25	19	18	16	14
Raucher	Anzahl	9	8	8	8	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	
	Anteil in %	16,98	16,67	17,78	20,00	13,89	14,71	16,13	17,24	17,24	16,00	21,05	22,22	25,00	21,43	
	CI Anteil in %	[6,78; 27,19]	[6,01; 27,32]	[6,48; 29,07]	[7,45; 32,55]	[2,43; 25,35]	[2,62; 26,79]	[2,97; 29,29]	[3,25; 31,23]	[3,25; 31,23]	[1,33; 30,67]	[2,22; 39,89]	[2,46; 41,99]	[3,09; 46,91]	[0,00; 43,73]	
2006-2	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1019	911	805	705	628	561	482	378	324	268	221	183	160	
	auswertbar	Anzahl	1019	889	771	676	586	527	448	359	301	253	201	167	153	
	Raucher	Anzahl	117	108	87	70	78	66	66	55	52	45	39	33	29	
		Anteil in %	11,48	12,15	11,28	10,36	13,31	12,52	14,73	15,32	17,28	17,79	19,40	19,76	18,95	
		CI Anteil in %	[9,52; 13,44]	[10,00; 14,30]	[9,05; 13,52]	[8,06; 12,65]	[10,56; 16,06]	[9,70; 15,35]	[11,45; 18,02]	[11,59; 19,05]	[13,00; 21,55]	[13,07; 22,51]	[13,92; 24,88]	[13,70; 25,82]	[12,72; 25,19]	
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	589	528	465	404	360	321	271	206	176	140	121	98	84	
	auswertbar	Anzahl	589	517	447	389	341	300	251	196	161	130	107	89	81	
	Raucher	Anzahl	59	56	42	34	39	33	32	28	26	21	20	19	16	
		Anteil in %	10,02	10,83	9,40	8,74	11,44	11,00	12,75	14,29	16,15	16,15	18,69	21,35	19,75	
		CI Anteil in %	[7,59; 12,44]	[8,15; 13,51]	[6,69; 12,10]	[5,93; 11,55]	[8,05; 14,82]	[7,45; 14,55]	[8,61; 16,88]	[9,37; 19,20]	[10,45; 21,85]	[9,80; 22,50]	[11,27; 26,11]	[12,79; 29,91]	[11,03; 28,48]	
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	430	383	340	301	268	240	211	172	148	128	100	85	76	
	auswertbar	Anzahl	430	372	324	287	245	227	197	163	140	123	94	78	72	
Raucher	Anzahl	58	52	45	36	39	33	34	27	26	24	19	14	13		
	Anteil in %	13,49	13,98	13,89	12,54	15,92	14,54	17,26	16,56	18,57	19,51	20,21	17,95	18,06		
	CI Anteil in %	[10,26; 16,72]	[10,45; 17,51]	[10,12; 17,66]	[8,70; 16,38]	[11,33; 20,51]	[9,94; 19,13]	[11,97; 22,55]	[10,84; 22,29]	[12,11; 25,04]	[12,48; 26,54]	[12,05; 28,37]	[9,38; 26,52]	[9,11; 27,00]		

EZ	Raucherquote bei allen Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
2007-1	Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2130	1888	1639	1436	1244	1066	877	756	616	521	440	351	
	auswertbar	Anzahl	2130	1800	1562	1310	1160	981	796	699	575	477	391	301	
	Raucher	Anzahl	229	221	190	148	131	118	97	88	75	59	49	36	
		Anteil in %	10,75	12,28	12,16	11,30	11,29	12,03	12,19	12,59	13,04	12,37	12,53	11,96	
		CI Anteil in %	[9,44; 12,07]	[10,76; 13,79]	[10,54; 13,79]	[9,58; 13,01]	[9,47; 13,12]	[9,99; 14,07]	[9,91; 14,46]	[10,13; 15,05]	[10,29; 15,80]	[9,41; 15,33]	[9,25; 15,82]	[8,29; 15,63]	
	männl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1242	1102	964	859	742	642	524	459	368	315	261	207	
	auswertbar	Anzahl	1242	1054	912	780	692	598	479	426	342	289	235	179	
	Raucher	Anzahl	121	114	93	73	66	57	51	47	36	30	27	18	
		Anteil in %	9,74	10,82	10,20	9,36	9,54	9,53	10,65	11,03	10,53	10,38	11,49	10,06	
		CI Anteil in %	[8,09; 11,39]	[8,94; 12,69]	[8,23; 12,16]	[7,31; 11,40]	[7,35; 11,73]	[7,18; 11,89]	[7,88; 13,41]	[8,05; 14,01]	[7,27; 13,78]	[6,86; 13,90]	[7,40; 15,58]	[5,64; 14,47]	
	weibl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	888	786	675	577	502	424	353	297	248	206	179	144	
	auswertbar	Anzahl	888	746	650	530	468	383	317	273	233	188	156	122	
Raucher	Anzahl	108	107	97	75	65	61	46	41	39	29	22	18		
	Anteil in %	12,16	14,34	14,92	14,15	13,89	15,93	14,51	15,02	16,74	15,43	14,10	14,75		
	CI Anteil in %	[10,01; 14,31]	[11,83; 16,86]	[12,18; 17,66]	[11,18; 17,12]	[10,75; 17,03]	[12,26; 19,60]	[10,63; 18,39]	[10,77; 19,26]	[11,93; 21,54]	[10,25; 20,60]	[8,62; 19,58]	[8,43; 21,07]		
2007-2	Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	3258	2852	2518	2201	1854	1535	1292	1062	901	757	641		
	auswertbar	Anzahl	3258	2691	2259	2007	1724	1430	1199	996	826	695	571		
	Raucher	Anzahl	381	336	269	236	195	160	140	118	106	101	83		
		Anteil in %	11,69	12,49	11,91	11,76	11,31	11,19	11,68	11,85	12,83	14,53	14,54		
		CI Anteil in %	[10,59; 12,80]	[11,24; 13,74]	[10,57; 13,24]	[10,35; 13,17]	[9,82; 12,81]	[9,55; 12,82]	[9,86; 13,49]	[9,84; 13,86]	[10,55; 15,12]	[11,91; 17,15]	[11,64; 17,43]		
	männl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1856	1614	1428	1248	1059	885	743	599	507	426	351		
	auswertbar	Anzahl	1856	1528	1271	1136	991	825	687	559	471	382	308		
	Raucher	Anzahl	192	177	155	125	101	82	73	62	53	50	39		
		Anteil in %	10,34	11,58	12,20	11,00	10,19	9,94	10,63	11,09	11,25	13,09	12,66		
		CI Anteil in %	[8,96; 11,73]	[9,98; 13,19]	[10,40; 13,99]	[9,18; 12,82]	[8,31; 12,08]	[7,90; 11,98]	[8,32; 12,93]	[8,49; 13,70]	[8,40; 14,11]	[9,70; 16,48]	[8,94; 16,38]		
	weibl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1402	1238	1090	953	795	650	549	463	394	331	290		
	auswertbar	Anzahl	1402	1163	988	871	733	605	512	437	355	313	263		
Raucher	Anzahl	189	159	114	111	94	78	67	56	53	51	44			
	Anteil in %	13,48	13,67	11,54	12,74	12,82	12,89	13,09	12,81	14,93	16,29	16,73			
	CI Anteil in %	[11,69; 15,27]	[11,70; 15,65]	[9,55; 13,53]	[10,53; 14,96]	[10,40; 15,25]	[10,22; 15,57]	[10,16; 16,01]	[9,68; 15,95]	[11,22; 18,64]	[12,20; 20,39]	[12,21; 21,25]			
2008-1	Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	3985	3492	3022	2471	2026	1700	1423	1190	992	835			
	auswertbar	Anzahl	3985	3132	2725	2280	1870	1585	1325	1091	909	744			
	Raucher	Anzahl	413	334	284	229	184	150	134	110	102	92			
		Anteil in %	10,36	10,66	10,42	10,04	9,84	9,46	10,11	10,08	11,22	12,37			
		CI Anteil in %	[9,42; 11,31]	[9,58; 11,75]	[9,27; 11,57]	[8,81; 11,28]	[8,49; 11,19]	[8,02; 10,91]	[8,49; 11,74]	[8,29; 11,87]	[9,17; 13,27]	[10,00; 14,73]			
	männl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2265	1973	1732	1401	1146	979	825	694	572	473			
	auswertbar	Anzahl	2265	1771	1553	1293	1057	904	770	634	518	413			
	Raucher	Anzahl	211	165	146	124	103	84	73	62	58	53			
		Anteil in %	9,32	9,32	9,40	9,59	9,74	9,29	9,48	9,78	11,20	12,83			
		CI Anteil in %	[8,12; 10,51]	[7,96; 10,67]	[7,95; 10,85]	[7,98; 11,20]	[7,96; 11,53]	[7,40; 11,19]	[7,41; 11,55]	[7,47; 12,09]	[8,48; 13,92]	[9,60; 16,06]			
	weibl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1720	1519	1290	1070	880	721	598	496	420	362			
	auswertbar	Anzahl	1720	1361	1172	987	813	681	555	457	391	331			
Raucher	Anzahl	202	169	138	105	81	66	61	48	44	39				
	Anteil in %	11,74	12,42	11,77	10,64	9,96	9,69	10,99	10,50	11,25	11,78				
	CI Anteil in %	[10,22; 13,27]	[10,66; 14,17]	[9,93; 13,62]	[8,71; 12,56]	[7,90; 12,02]	[7,47; 11,92]	[8,39; 13,60]	[7,69; 13,32]	[8,12; 14,39]	[8,30; 15,26]				

EZ	Raucherquote bei allen Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2008-2	Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	3538	3077	2551	2133	1820	1542	1329	1120	973						
	auswertbar	Anzahl	3538	2847	2369	1965	1678	1430	1225	1010	873						
	Raucher	Anzahl	463	375	283	239	216	197	184	144	133						
		Anteil in %	13,09	13,17	11,95	12,16	12,87	13,78	15,02	14,26	15,23						
		CI Anteil in %	[11,98; 14,20]	[11,93; 14,41]	[10,64; 13,25]	[10,72; 13,61]	[11,27; 14,48]	[11,99; 15,56]	[13,02; 17,02]	[12,10; 16,41]	[12,85; 17,62]						
	männl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1922	1674	1379	1149	977	825	707	592	512						
	auswertbar	Anzahl	1922	1545	1271	1047	892	761	652	532	453						
	Raucher	Anzahl	229	192	138	122	113	102	97	77	73						
		Anteil in %	11,91	12,43	10,86	11,65	12,67	13,40	14,88	14,47	16,11						
		CI Anteil in %	[10,47; 13,36]	[10,78; 14,07]	[9,15; 12,57]	[9,71; 13,60]	[10,48; 14,85]	[10,98; 15,83]	[12,14; 17,61]	[11,48; 17,47]	[12,73; 19,50]						
	weibl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1616	1403	1172	984	843	717	622	528	461						
	auswertbar	Anzahl	1616	1302	1098	918	786	669	573	478	420						
	Raucher	Anzahl	234	183	145	117	103	95	87	67	60						
		Anteil in %	14,48	14,06	13,21	12,75	13,10	14,20	15,18	14,02	14,29						
		CI Anteil in %	[12,76; 16,20]	[12,17; 15,94]	[11,20; 15,21]	[10,59; 14,90]	[10,74; 15,46]	[11,55; 16,85]	[12,24; 18,12]	[10,90; 17,13]	[10,94; 17,64]						
2009-1	Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2788	2296	1906	1616	1350	1140	968	806							
	auswertbar	Anzahl	2788	2166	1780	1496	1266	1038	875	739							
	Raucher	Anzahl	237	214	163	137	125	100	97	82							
		Anteil in %	8,50	9,88	9,16	9,16	9,87	9,63	11,09	11,10							
		CI Anteil in %	[7,47; 9,54]	[8,62; 11,14]	[7,82; 10,50]	[7,70; 10,62]	[8,23; 11,52]	[7,84; 11,43]	[9,00; 13,17]	[8,83; 13,36]							
	männl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1600	1303	1084	933	779	656	562	463							
	auswertbar	Anzahl	1600	1241	1004	869	725	592	508	422							
	Raucher	Anzahl	120	110	87	79	76	60	56	44							
		Anteil in %	7,50	8,86	8,67	9,09	10,48	10,14	11,02	10,43							
		CI Anteil in %	[6,21; 8,79]	[7,28; 10,45]	[6,92; 10,41]	[7,18; 11,00]	[8,25; 12,71]	[7,70; 12,57]	[8,30; 13,75]	[7,51; 13,35]							
	weibl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1188	993	822	683	571	484	406	343							
	auswertbar	Anzahl	1188	925	776	627	541	446	367	317							
	Raucher	Anzahl	117	104	76	58	49	40	41	38							
		Anteil in %	9,85	11,24	9,79	9,25	9,06	8,97	11,17	11,99							
		CI Anteil in %	[8,15; 11,54]	[9,21; 13,28]	[7,70; 11,89]	[6,98; 11,52]	[6,64; 11,48]	[6,31; 11,62]	[7,94; 14,40]	[8,41; 15,57]							
2009-2	Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2591	2146	1714	1379	1160	973	821								
	auswertbar	Anzahl	2591	2031	1595	1281	1068	892	742								
	Raucher	Anzahl	316	244	177	138	111	100	90								
		Anteil in %	12,20	12,01	11,10	10,77	10,39	11,21	12,13								
		CI Anteil in %	[10,94; 13,46]	[10,60; 13,43]	[9,56; 12,64]	[9,07; 12,47]	[8,56; 12,22]	[9,14; 13,28]	[9,78; 14,48]								
	männl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1413	1167	919	743	627	513	420								
	auswertbar	Anzahl	1413	1104	860	686	573	469	385								
	Raucher	Anzahl	156	122	82	71	56	50	43								
		Anteil in %	11,04	11,05	9,53	10,35	9,77	10,66	11,17								
		CI Anteil in %	[9,41; 12,67]	[9,20; 12,90]	[7,57; 11,50]	[8,07; 12,63]	[7,34; 12,21]	[7,86; 13,46]	[8,02; 14,32]								
	weibl. Patienten 12 ≤ t <18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1178	979	795	636	533	460	401								
	auswertbar	Anzahl	1178	927	735	595	495	423	357								
	Raucher	Anzahl	160	122	95	67	55	50	47								
		Anteil in %	13,58	13,16	12,93	11,26	11,11	11,82	13,17								
		CI Anteil in %	[11,63; 15,54]	[10,98; 15,34]	[10,50; 15,35]	[8,72; 13,80]	[8,34; 13,88]	[8,74; 14,90]	[9,65; 16,68]								

EZ	Raucherquote bei allen Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-1	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2627	2171	1781	1473	1232	1050									
	auswertbar	Anzahl	2627	2055	1679	1388	1158	962									
	Raucher	Anzahl	224	175	146	110	99	78									
		Anteil in %	8,53	8,52	8,70	7,93	8,55	8,11									
		CI Anteil in %	[7,46; 9,60]	[7,31; 9,72]	[7,35; 10,04]	[6,50; 9,35]	[6,94; 10,16]	[6,38; 9,83]									
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1443	1191	978	806	679	580									
	auswertbar	Anzahl	1443	1121	920	751	634	534									
	Raucher	Anzahl	100	88	74	62	57	46									
		Anteil in %	6,93	7,85	8,04	8,26	8,99	8,61									
		CI Anteil in %	[5,62; 8,24]	[6,27; 9,43]	[6,29; 9,80]	[6,29; 10,23]	[6,76; 11,22]	[6,23; 11,00]									
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1184	980	803	667	553	470									
	auswertbar	Anzahl	1184	934	759	637	524	428									
Raucher	Anzahl	124	87	72	48	42	32										
	Anteil in %	10,47	9,31	9,49	7,54	8,02	7,48										
	CI Anteil in %	[8,73; 12,22]	[7,45; 11,18]	[7,40; 11,57]	[5,48; 9,59]	[5,69; 10,34]	[4,98; 9,97]										
2010-2	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2433	1972	1655	1361	1140										
	auswertbar	Anzahl	2433	1885	1517	1276	1042										
	Raucher	Anzahl	261	211	168	131	123										
		Anteil in %	10,73	11,19	11,07	10,27	11,80										
		CI Anteil in %	[9,50; 11,96]	[9,77; 12,62]	[9,49; 12,65]	[8,60; 11,93]	[9,84; 13,76]										
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1273	1036	863	695	592										
	auswertbar	Anzahl	1273	992	788	659	544										
	Raucher	Anzahl	117	98	85	60	61										
		Anteil in %	9,19	9,88	10,79	9,10	11,21										
		CI Anteil in %	[7,60; 10,78]	[8,02; 11,74]	[8,62; 12,95]	[6,91; 11,30]	[8,56; 13,87]										
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1160	936	792	666	548										
	auswertbar	Anzahl	1160	893	729	617	498										
Raucher	Anzahl	144	113	83	71	62											
	Anteil in %	12,41	12,65	11,39	11,51	12,45											
	CI Anteil in %	[10,52; 14,31]	[10,47; 14,84]	[9,08; 13,69]	[8,99; 14,03]	[9,55; 15,35]											
2011-1	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2360	1921	1539	1266											
	auswertbar	Anzahl	2360	1816	1414	1137											
	Raucher	Anzahl	187	160	113	98											
		Anteil in %	7,92	8,81	7,99	8,62											
		CI Anteil in %	[6,83; 9,01]	[7,51; 10,11]	[6,58; 9,41]	[6,99; 10,25]											
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1283	1053	847	691											
	auswertbar	Anzahl	1283	995	779	612											
	Raucher	Anzahl	80	68	54	43											
		Anteil in %	6,24	6,83	6,93	7,03											
		CI Anteil in %	[4,91; 7,56]	[5,27; 8,40]	[5,15; 8,72]	[5,00; 9,05]											
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1077	868	692	575											
	auswertbar	Anzahl	1077	821	635	525											
Raucher	Anzahl	107	92	59	55												
	Anteil in %	9,94	11,21	9,29	10,48												
	CI Anteil in %	[8,15; 11,72]	[9,05; 13,36]	[7,03; 11,55]	[7,85; 13,10]												

EZ	Raucherquote bei allen Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2312	1910	1531												
	auswertbar	Anzahl	2312	1781	1368												
	Raucher	Anzahl	236	178	150												
		Anteil in %	10,21	9,99	10,96												
		CI Anteil in %	[8,97; 11,44]	[8,60; 11,39]	[9,31; 12,62]												
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1199	978	779												
	auswertbar	Anzahl	1199	912	693												
	Raucher	Anzahl	105	78	69												
		Anteil in %	8,76	8,55	9,96												
		CI Anteil in %	[7,16; 10,36]	[6,74; 10,37]	[7,73; 12,19]												
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1113	932	752												
	auswertbar	Anzahl	1113	869	675												
Raucher	Anzahl	131	100	81													
	Anteil in %	11,77	11,51	12,00													
	CI Anteil in %	[9,88; 13,66]	[9,38; 13,63]	[9,55; 14,45]													
2012-1	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2370	1939													
	auswertbar	Anzahl	2370	1801													
	Raucher	Anzahl	166	150													
		Anteil in %	7,00	8,33													
		CI Anteil in %	[5,98; 8,03]	[7,05; 9,61]													
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1293	1065													
	auswertbar	Anzahl	1293	990													
	Raucher	Anzahl	71	71													
		Anteil in %	5,49	7,17													
		CI Anteil in %	[4,25; 6,73]	[5,56; 8,78]													
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1077	874													
	auswertbar	Anzahl	1077	811													
Raucher	Anzahl	95	79														
	Anteil in %	8,82	9,74														
	CI Anteil in %	[7,13; 10,52]	[7,70; 11,78]														
2012-2	Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	2194														
	auswertbar	Anzahl	2194														
	Raucher	Anzahl	204														
		Anteil in %	9,30														
		CI Anteil in %	[8,08; 10,51]														
	männl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1184														
	auswertbar	Anzahl	1184														
	Raucher	Anzahl	101														
		Anteil in %	8,53														
		CI Anteil in %	[6,94; 10,12]														
	weibl. Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt	Anzahl	1010														
	auswertbar	Anzahl	1010														
Raucher	Anzahl	103															
	Anteil in %	10,20															
	CI Anteil in %	[8,33; 12,07]															

In Tabelle 3.1.3 wird auf den nachfolgenden Seiten die Entwicklung des **Body-Mass-Index** für Kinder zur Erstdokumentation (Patienten <18 Jahre zur ED) ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten <18 insgesamt“ sowie unter „männliche bzw. weibliche Patienten <18 insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Kinder, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Kinder bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnung und Kategorienbildung. Als Mittelwerte werden das arithmetische Mittel und dessen 95%-iges Konfidenzintervall, der Median, sowie die mittlere Differenz des aktuellen Wertes zum Wert laut Erstdokumentation ausgewiesen. Für die Berechnung dieser durchschnittlichen Differenz zwischen BMI im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die

Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Kinder im Berichtshalbjahr und wird deswegen gesondert aufgeführt. Abschließend werden die Kinder in den BMI-Kategorien (untergewichtig, normalgewichtig, mäßig übergewichtig, stark übergewichtig) dargestellt und es wird ausgewiesen wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

Für die Zuordnung auf die einzelnen Kategorien gelten gemäß der BVA Vorgaben die alters- und geschlechtsspezifischen Schwellenwerte, wie sie in den beiden nachfolgenden tabellarischen Übersichten zum BMI der Kinder ausgewiesen werden.

BMI: Alters- und geschlechtsspezifischen Kategoriengrenzen für Mädchen und Jungen <18 Jahre³

* Das rechnerische Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Auswertungsjahres kann bei 5-jährigen 4 Jahre betragen.

Mädchen

Alter	untergewichtig	normal	mäßig adipös	(stark) adipös
4 bis 5*	< 13,60	≥ 13,60 und <17,70	≥ 17,70 und <19,10	≥ 19,10
6	< 13,60	≥ 13,60 und <18,00	≥ 18,00 und <19,70	≥ 19,70
7	< 13,70	≥ 13,70 und <18,50	≥ 18,50 und <20,40	≥ 20,40
8	< 13,90	≥ 13,90 und <19,30	≥ 19,30 und <21,50	≥ 21,50
9	< 14,20	≥ 14,20 und <20,00	≥ 20,00 und <22,50	≥ 22,50
10	< 14,50	≥ 14,50 und <20,80	≥ 20,80 und <23,50	≥ 23,50
11	< 14,90	≥ 14,90 und <21,60	≥ 21,60 und <24,50	≥ 24,50
12	< 15,40	≥ 15,40 und <22,50	≥ 22,50 und <25,50	≥ 25,50
13	< 16,10	≥ 16,10 und <23,30	≥ 23,30 und <26,30	≥ 26,30
14	< 16,70	≥ 16,70 und <24,10	≥ 24,10 und <27,00	≥ 27,00
15	< 17,30	≥ 17,30 und <24,60	≥ 24,60 und <27,50	≥ 27,50
16	< 17,70	≥ 17,70 und <24,90	≥ 24,90 und <27,70	≥ 27,70
17	< 18,00	≥ 18,00 und <25,10	≥ 25,10 und <27,70	≥ 27,70
≥ 18	< 18,50	≥ 18,50 und <25,00	≥ 25,00 und <30,00	≥ 30,00

Jungen

Alter	untergewichtig	normal	mäßig adipös	(stark) adipös
4 bis 5*	< 13,80	≥ 13,80 und <17,60	≥ 17,60 und <19,00	≥ 19,00
6	< 13,80	≥ 13,80 und <17,90	≥ 17,90 und <19,40	≥ 19,40
7	< 13,90	≥ 13,90 und <18,30	≥ 18,30 und <20,20	≥ 20,20
8	< 14,10	≥ 14,10 und <19,00	≥ 19,00 und <21,10	≥ 21,10
9	< 14,30	≥ 14,30 und <19,80	≥ 19,80 und <22,20	≥ 22,20
10	< 14,60	≥ 14,60 und <20,60	≥ 20,60 und <23,40	≥ 23,40
11	< 15,00	≥ 15,00 und <21,40	≥ 21,40 und <24,50	≥ 24,50
12	< 15,40	≥ 15,40 und <22,30	≥ 22,30 und <25,40	≥ 25,40
13	< 15,90	≥ 15,90 und <23,00	≥ 23,00 und <26,30	≥ 26,30
14	< 16,50	≥ 16,50 und <23,70	≥ 23,70 und <27,00	≥ 27,00
15	< 17,00	≥ 17,00 und <24,40	≥ 24,40 und <27,50	≥ 27,50
16	< 17,60	≥ 17,60 und <24,90	≥ 24,90 und <28,00	≥ 28,00
17	< 18,10	≥ 18,10 und <25,40	≥ 25,40 und <28,40	≥ 28,40
≥ 18	< 18,50	≥ 18,50 und <25,00	≥ 25,00 und <30,00	≥ 30,00

³ Die Werte für den BMI richten sich nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA), die sich auf die Perzentilkurven von H. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al. beziehen, veröffentlicht in der Monatszeitschrift für Kinderheilkunde 149 (2001) 807-818. Die jeweils letzte Zeile (Alter ≥ 18) zeigt Werte gemäß Definition der WHO. Die Größe der Minderjährigen zur ED wird ab dem Zeitpunkt der ersten Dokumentation nach Erreichen des 18. Lebensjahres (vollständige Jahre) fixiert.

Tabelle 3.1.3 Patienten <18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115	
	auswertbar	Anzahl	373	338	307	273	240	237	210	192	181	165	149	135	123	110	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,34	19,52	19,77	20,03	20,41	21,57	21,22	21,22	21,62	21,89	21,77	22,06	22,23	22,06	22,06
		CI Mean	[18,92; 19,77]	[19,09; 19,96]	[19,29; 20,25]	[19,52; 20,54]	[19,86; 20,96]	[20,13; 23,01]	[20,59; 21,86]	[20,55; 21,88]	[20,91; 22,33]	[21,11; 22,68]	[21,00; 22,55]	[21,21; 22,92]	[21,37; 23,09]	[21,37; 23,09]	[21,18; 22,93]
		Median	18,58	18,58	18,51	18,91	19,51	20,06	20,20	20,73	20,76	21,00	20,69	20,81	21,22	21,18	21,18
		Fallbasis mittlere Differenz		338	307	273	240	237	210	192	181	165	149	135	123	110	
		Mittlere Differenz zur ED		0,40	0,78	1,12	1,50	2,49	2,13	2,19	2,64	2,94	2,96	3,36	3,73	3,62	
		CI mittlere Differenz		[0,23; 0,57]	[0,55; 1,02]	[0,86; 1,37]	[1,22; 1,77]	[1,09; 3,89]	[1,75; 2,50]	[1,79; 2,59]	[2,21; 3,08]	[2,45; 3,42]	[2,47; 3,45]	[2,80; 3,91]	[3,14; 4,32]	[2,97; 4,26]	
		Median mittlere Differenz		0,15	0,58	0,98	1,32	1,65	1,88	2,15	2,49	2,70	2,70	3,26	3,50	3,57	
	untergewichtig	Anzahl	18	8	7	7	8	8	8	5	7	6	6	5	6	4	
		Anteil in %	4,83	2,37	2,28	2,56	3,33	3,38	3,81	2,60	3,87	3,64	4,03	3,70	4,88	3,64	
		CI Anteil in %	[2,65; 7,00]	[0,74; 3,99]	[0,61; 3,95]	[0,69; 4,44]	[1,06; 5,61]	[1,07; 5,68]	[1,21; 6,40]	[0,35; 4,86]	[1,05; 6,68]	[0,77; 6,50]	[0,86; 7,19]	[0,51; 6,90]	[1,06; 8,70]	[0,12; 7,15]	
	normalgewichtig	Anzahl	245	221	215	180	163	152	133	119	114	105	100	86	76	74	
		Anteil in %	65,68	65,38	70,03	65,93	67,92	64,14	63,33	61,98	62,98	63,64	67,11	63,70	61,79	67,27	
		CI Anteil in %	[60,86; 70,51]	[60,31; 70,46]	[64,90; 75,17]	[60,30; 71,57]	[62,00; 73,83]	[58,02; 70,25]	[56,80; 69,87]	[55,09; 68,86]	[55,93; 70,04]	[56,27; 71,00]	[59,55; 74,68]	[55,56; 71,85]	[53,17; 70,41]	[58,46; 76,08]	
	mäßig adipös	Anzahl	62	58	43	44	31	34	39	41	37	31	25	25	27	24	
		Anteil in %	16,62	17,16	14,01	16,12	12,92	14,35	18,57	21,35	20,44	18,79	16,78	18,52	21,95	21,82	
		CI Anteil in %	[12,84; 20,41]	[13,13; 21,19]	[10,12; 17,90]	[11,75; 20,49]	[8,66; 17,17]	[9,87; 18,82]	[13,30; 23,84]	[15,54; 27,17]	[14,55; 26,33]	[12,81; 24,77]	[10,76; 22,80]	[11,94; 25,10]	[14,61; 29,30]	[14,06; 29,57]	
	stark adipös	Anzahl	48	51	42	42	38	43	30	27	23	23	18	19	14	8	
		Anteil in %	12,87	15,09	13,68	15,38	15,83	18,14	14,29	14,06	12,71	13,94	12,08	14,07	11,38	7,27	
		CI Anteil in %	[9,47; 16,27]	[11,27; 18,91]	[9,83; 17,53]	[11,10; 19,67]	[11,21; 20,46]	[13,23; 23,06]	[9,54; 19,03]	[9,13; 18,99]	[7,84; 17,57]	[8,64; 19,24]	[6,83; 17,33]	[8,19; 19,96]	[5,75; 17,02]	[2,40; 12,15]	

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	245	237	211	193	175	161	140	124	117	108	102	90	81	73
	auswertbar	Anzahl	245	223	201	178	158	157	134	120	115	107	100	89	79	70
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	18,88	19,18	19,37	19,69	20,16	21,86	21,13	21,20	21,59	21,73	21,80	21,93	21,94	21,36
		CI Mean	[18,41; 19,34]	[18,70; 19,67]	[18,82; 19,93]	[19,09; 20,29]	[19,50; 20,82]	[19,76; 23,96]	[20,35; 21,92]	[20,36; 22,05]	[20,70; 22,48]	[20,75; 22,71]	[20,86; 22,75]	[20,89; 22,96]	[20,92; 22,95]	[20,43; 22,30]
		Median	18,11	18,38	18,13	18,60	19,23	20,03	20,08	20,30	20,25	20,28	20,36	20,31	20,96	20,73
		Fallbasis mittlere Differenz		223	201	178	158	157	134	120	115	107	100	89	79	70
		Mittlere Differenz zur ED		0,44	0,79	1,15	1,64	3,20	2,41	2,55	3,00	3,16	3,20	3,62	3,87	3,50
		CI mittlere Differenz		[0,21; 0,67]	[0,49; 1,08]	[0,82; 1,48]	[1,27; 2,01]	[1,10; 5,29]	[1,91; 2,92]	[2,00; 3,10]	[2,42; 3,58]	[2,51; 3,81]	[2,57; 3,84]	[2,90; 4,35]	[3,11; 4,64]	[2,66; 4,33]
		Median mittlere Differenz		0,23	0,57	1,00	1,49	1,95	2,15	2,42	2,95	2,94	2,88	3,35	3,46	3,40
	untergewichtig	Anzahl	11	5	4	4	5	3	3	0	3	4	3	2	3	2
		Anteil in %	4,49	2,24	1,99	2,25	3,16	1,91	2,24	0,00	2,61	3,74	3,00	2,25	3,80	2,86
		CI Anteil in %	[1,89; 7,09]	[0,29; 4,19]	[0,05; 3,93]	[0,06; 4,43]	[0,43; 5,90]	[0,00; 4,06]	[0,00; 4,75]	[0,00; 0,00]	[0,00; 5,53]	[0,13; 7,35]	[0,00; 6,36]	[0,00; 5,34]	[0,00; 8,04]	[0,00; 6,79]
	normalgewichtig	Anzahl	168	144	143	120	108	102	88	79	74	68	67	60	52	53
		Anteil in %	68,57	64,57	71,14	67,42	68,35	64,97	65,67	65,83	64,35	63,55	67,00	67,42	65,82	75,71
		CI Anteil in %	[62,75; 74,40]	[58,28; 70,87]	[64,86; 77,42]	[60,51; 74,32]	[61,08; 75,63]	[57,48; 72,45]	[57,60; 73,74]	[57,31; 74,35]	[55,56; 73,14]	[54,39; 72,71]	[57,74; 76,26]	[57,62; 77,21]	[55,30; 76,35]	[65,60; 85,83]
	mäßig adipös	Anzahl	41	42	30	30	22	24	25	24	20	20	18	15	16	12
		Anteil in %	16,73	18,83	14,93	16,85	13,92	15,29	18,66	20,00	17,39	18,69	18,00	16,85	20,25	17,14
		CI Anteil in %	[12,05; 21,42]	[13,69; 23,98]	[9,99; 19,86]	[11,34; 22,37]	[8,51; 19,34]	[9,64; 20,93]	[12,04; 25,28]	[12,81; 27,19]	[10,43; 24,35]	[11,27; 26,11]	[10,43; 25,57]	[9,03; 24,68]	[11,33; 29,17]	[8,25; 26,04]
	stark adipös	Anzahl	25	32	24	24	23	28	18	17	18	15	12	12	8	3
		Anteil in %	10,20	14,35	11,94	13,48	14,56	17,83	13,43	14,17	15,65	14,02	12,00	13,48	10,13	4,29
		CI Anteil in %	[6,41; 14,00]	[9,74; 18,96]	[7,45; 16,43]	[8,45; 18,51]	[9,04; 20,07]	[11,83; 23,84]	[7,64; 19,23]	[7,90; 20,43]	[8,98; 22,32]	[7,41; 20,63]	[5,60; 18,40]	[6,35; 20,62]	[3,43; 16,82]	[0,00; 9,06]
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	128	119	112	104	90	85	76	72	67	61	54	50	46	42
	auswertbar	Anzahl	128	115	106	95	82	80	76	72	66	58	49	46	44	40
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,24	20,18	20,51	20,67	20,88	21,00	21,38	21,24	21,68	22,20	21,72	22,33	22,76	23,26
		CI Mean	[19,41; 21,06]	[19,34; 21,03]	[19,62; 21,40]	[19,75; 21,59]	[19,89; 21,87]	[19,91; 22,09]	[20,31; 22,46]	[20,15; 22,33]	[20,49; 22,86]	[20,87; 23,52]	[20,34; 23,10]	[20,80; 23,86]	[21,19; 24,34]	[21,53; 24,99]
		Median	19,44	19,22	19,62	20,16	20,09	20,14	20,62	20,87	21,06	21,70	20,83	21,81	21,62	22,67
		Fallbasis mittlere Differenz		115	106	95	82	80	76	72	66	58	49	46	44	40
		Mittlere Differenz zur ED		0,33	0,77	1,06	1,22	1,09	1,62	1,58	2,02	2,53	2,46	2,84	3,46	3,82
		CI mittlere Differenz		[0,09; 0,57]	[0,37; 1,18]	[0,67; 1,44]	[0,84; 1,60]	[0,63; 1,56]	[1,12; 2,12]	[1,07; 2,10]	[1,43; 2,62]	[1,88; 3,19]	[1,74; 3,18]	[2,03; 3,64]	[2,54; 4,37]	[2,80; 4,84]
		Median mittlere Differenz		0,00	0,61	0,94	1,03	1,10	1,55	1,67	2,30	2,67	2,49	3,23	3,58	3,86
	untergewichtig	Anzahl	7	3	3	3	3	5	5	5	4	2	3	3	3	2
		Anteil in %	5,47	2,61	2,83	3,16	3,66	6,25	6,58	6,94	6,06	3,45	6,12	6,52	6,82	5,00
		CI Anteil in %	[1,51; 9,42]	[0,00; 5,53]	[0,00; 6,00]	[0,00; 6,69]	[0,00; 7,75]	[0,91; 11,59]	[0,97; 12,19]	[1,03; 12,86]	[0,26; 11,86]	[0,00; 8,19]	[0,00; 12,90]	[0,00; 13,74]	[0,00; 14,35]	[0,00; 11,84]
	normalgewichtig	Anzahl	77	77	72	60	55	50	45	40	40	37	33	26	24	21
		Anteil in %	60,16	66,96	67,92	63,16	67,07	62,50	59,21	55,56	60,61	63,79	67,35	56,52	54,55	52,50
		CI Anteil in %	[51,64; 68,67]	[58,32; 75,59]	[59,00; 76,85]	[53,41; 72,91]	[56,84; 77,31]	[51,82; 73,18]	[48,09; 70,33]	[44,00; 67,11]	[48,73; 72,48]	[51,32; 76,27]	[54,08; 80,61]	[42,04; 71,01]	[39,66; 69,43]	[36,83; 68,17]
	mäßig adipös	Anzahl	21	16	13	14	9	10	14	17	17	11	7	10	11	12
		Anteil in %	16,41	13,91	12,26	14,74	10,98	12,50	18,42	23,61	25,76	18,97	14,29	21,74	25,00	30,00
		CI Anteil in %	[9,97; 22,85]	[7,56; 20,27]	[5,99; 18,54]	[7,57; 21,90]	[4,17; 17,78]	[5,21; 19,79]	[9,65; 27,19]	[13,73; 33,49]	[15,13; 36,39]	[8,79; 29,14]	[4,39; 24,19]	[9,69; 33,79]	[12,06; 37,94]	[15,62; 44,38]
	stark adipös	Anzahl	23	19	18	18	15	15	12	10	5	8	6	7	6	5
Anteil in %		17,97	16,52	16,98	18,95	18,29	18,75	15,79	13,89	7,58	13,79	12,24	15,22	13,64	12,50	
CI Anteil in %		[11,29; 24,65]	[9,70; 23,34]	[9,80; 24,16]	[11,03; 26,87]	[9,87; 26,71]	[10,14; 27,36]	[7,54; 24,04]	[5,84; 21,93]	[1,14; 14,01]	[4,84; 22,75]	[2,97; 21,52]	[4,72; 25,71]	[3,38; 23,89]	[2,12; 22,88]	

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930
	auswertbar	Anzahl	3312	2906	2539	2259	2117	1955	1759	1559	1397	1253	1095	985	858
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,60	19,93	20,15	20,38	20,72	20,93	21,20	21,45	21,77	21,97	22,20	22,58	22,66
		CI Mean	[19,39; 19,81]	[19,68; 20,19]	[19,91; 20,39]	[20,11; 20,64]	[20,50; 20,95]	[20,72; 21,14]	[20,97; 21,42]	[21,18; 21,71]	[21,46; 22,07]	[21,70; 22,25]	[21,90; 22,51]	[22,19; 22,97]	[22,31; 23,02]
		Median	18,59	18,88	19,14	19,43	19,90	20,18	20,44	20,54	20,90	20,90	21,11	21,36	21,64
		Fallbasis mittlere Differenz		2899	2532	2252	2110	1948	1752	1552	1390	1246	1090	982	855
		Mittlere Differenz zur ED		0,49	0,74	1,08	1,21	1,49	1,83	2,17	2,54	2,90	3,28	3,71	3,73
		CI mittlere Differenz		[0,26; 0,73]	[0,52; 0,96]	[0,82; 1,33]	[0,95; 1,47]	[1,26; 1,73]	[1,58; 2,09]	[1,85; 2,48]	[2,17; 2,91]	[2,60; 3,20]	[2,95; 3,61]	[3,29; 4,13]	[3,32; 4,14]
		Median mittlere Differenz		0,24	0,70	1,01	1,28	1,55	1,91	2,27	2,54	2,78	3,13	3,51	3,65
	untergewichtig	Anzahl	188	144	111	111	81	82	60	62	46	47	38	44	33
		Anteil in %	5,68	4,96	4,37	4,91	3,83	4,19	3,41	3,98	3,29	3,75	3,47	4,47	3,85
		CI Anteil in %	[4,89; 6,46]	[4,17; 5,74]	[3,58; 5,17]	[4,02; 5,81]	[3,01; 4,64]	[3,31; 5,08]	[2,56; 4,26]	[3,01; 4,95]	[2,36; 4,23]	[2,70; 4,80]	[2,39; 4,55]	[3,18; 5,76]	[2,56; 5,13]
	normalgewichtig	Anzahl	2120	1923	1600	1456	1353	1291	1127	1027	884	804	677	605	514
		Anteil in %	64,01	66,17	63,02	64,45	63,91	66,04	64,07	65,88	63,28	64,17	61,83	61,42	59,91
		CI Anteil in %	[62,37; 65,64]	[64,45; 67,89]	[61,14; 64,90]	[62,48; 66,43]	[61,86; 65,96]	[63,94; 68,14]	[61,83; 66,31]	[63,52; 68,23]	[60,75; 65,81]	[61,51; 66,82]	[58,95; 64,71]	[58,38; 64,46]	[56,63; 63,19]
	mäßig adipös	Anzahl	477	395	389	350	335	290	278	235	232	211	194	173	162
		Anteil in %	14,40	13,59	15,32	15,49	15,82	14,83	15,80	15,07	16,61	16,84	17,72	17,56	18,88
		CI Anteil in %	[13,21; 15,60]	[12,35; 14,84]	[13,92; 16,72]	[14,00; 16,99]	[14,27; 17,38]	[13,26; 16,41]	[14,10; 17,51]	[13,30; 16,85]	[14,65; 18,56]	[14,77; 18,91]	[15,45; 19,98]	[15,19; 19,94]	[16,26; 21,50]
	stark adipös	Anzahl	527	444	439	342	348	292	294	235	235	191	186	163	149
		Anteil in %	15,91	15,28	17,29	15,14	16,44	14,94	16,71	15,07	16,82	15,24	16,99	16,55	17,37
		CI Anteil in %	[14,67; 17,16]	[13,97; 16,59]	[15,82; 18,76]	[13,66; 16,62]	[14,86; 18,02]	[13,36; 16,52]	[14,97; 18,46]	[13,30; 16,85]	[14,86; 18,78]	[13,25; 17,23]	[14,76; 19,21]	[14,23; 18,87]	[14,83; 19,90]

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2080	1925	1710	1550	1419	1314	1171	1041	932	829	752	674	599
	auswertbar	Anzahl	2077	1839	1599	1442	1340	1234	1110	990	884	788	703	632	550
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,40	19,65	20,02	20,39	20,64	20,83	21,09	21,39	21,70	21,75	22,06	22,50	22,52
		CI Mean	[19,16; 19,64]	[19,40; 19,90]	[19,78; 20,26]	[20,05; 20,73]	[20,34; 20,94]	[20,56; 21,09]	[20,81; 21,37]	[21,03; 21,74]	[21,29; 22,12]	[21,42; 22,08]	[21,69; 22,43]	[21,99; 23,01]	[22,10; 22,93]
		Median	18,34	18,65	18,97	19,29	19,63	20,03	20,38	20,41	20,79	20,82	21,00	21,41	21,78
		Fallbasis mittlere Differenz		1836	1596	1439	1337	1231	1107	987	881	785	700	631	549
		Mittlere Differenz zur ED		0,38	0,73	1,19	1,35	1,65	1,99	2,40	2,79	2,95	3,39	3,90	3,85
		CI mittlere Differenz		[0,15; 0,60]	[0,51; 0,95]	[0,85; 1,54]	[1,06; 1,65]	[1,47; 1,84]	[1,79; 2,18]	[2,10; 2,70]	[2,42; 3,16]	[2,67; 3,22]	[3,10; 3,69]	[3,45; 4,35]	[3,51; 4,18]
		Median mittlere Differenz		0,27	0,75	1,02	1,29	1,56	1,97	2,39	2,61	2,82	3,12	3,59	3,74
		untergewichtig	Anzahl	131	100	70	72	49	48	35	35	25	27	17	26
		Anteil in %	6,31	5,44	4,38	4,99	3,66	3,89	3,15	3,54	2,83	3,43	2,42	4,11	3,45
		CI Anteil in %	[5,26; 7,35]	[4,40; 6,47]	[3,37; 5,38]	[3,87; 6,12]	[2,65; 4,66]	[2,81; 4,97]	[2,12; 4,18]	[2,38; 4,69]	[1,73; 3,92]	[2,16; 4,70]	[1,28; 3,55]	[2,56; 5,66]	[1,93; 4,98]
	normalgewichtig	Anzahl	1318	1205	1004	919	859	817	712	648	554	509	436	389	326
		Anteil in %	63,46	65,52	62,79	63,73	64,10	66,21	64,14	65,45	62,67	64,59	62,02	61,55	59,27
		CI Anteil in %	[61,39; 65,53]	[63,35; 67,70]	[60,42; 65,16]	[61,25; 66,21]	[61,54; 66,67]	[63,57; 68,85]	[61,32; 66,97]	[62,49; 68,42]	[59,48; 65,86]	[61,25; 67,94]	[58,43; 65,61]	[57,75; 65,35]	[55,16; 63,38]
	mäßig adipös	Anzahl	306	257	244	218	204	175	172	153	149	139	134	112	113
		Anteil in %	14,73	13,97	15,26	15,12	15,22	14,18	15,50	15,45	16,86	17,64	19,06	17,72	20,55
		CI Anteil in %	[13,21; 16,26]	[12,39; 15,56]	[13,50; 17,02]	[13,27; 16,97]	[13,30; 17,15]	[12,23; 16,13]	[13,37; 17,63]	[13,20; 17,71]	[14,39; 19,32]	[14,98; 20,30]	[16,16; 21,97]	[14,74; 20,70]	[17,17; 23,93]
	stark adipös	Anzahl	322	277	281	233	228	194	191	154	156	113	116	105	92
		Anteil in %	15,50	15,06	17,57	16,16	17,01	15,72	17,21	15,56	17,65	14,34	16,50	16,61	16,73
		CI Anteil in %	[13,95; 17,06]	[13,43; 16,70]	[15,71; 19,44]	[14,26; 18,06]	[15,00; 19,03]	[13,69; 17,75]	[14,99; 19,43]	[13,30; 17,81]	[15,13; 20,16]	[11,89; 16,79]	[13,75; 19,25]	[13,71; 19,52]	[13,61; 19,85]
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	1239	1144	1037	917	841	774	690	600	544	485	417	371	331
	auswertbar	Anzahl	1235	1067	940	817	777	721	649	569	513	465	392	353	308
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,93	20,42	20,38	20,36	20,87	21,10	21,39	21,55	21,87	22,35	22,47	22,73	22,93
		CI Mean	[19,55; 20,32]	[19,86; 20,98]	[19,88; 20,89]	[19,93; 20,78]	[20,53; 21,20]	[20,76; 21,45]	[21,01; 21,77]	[21,15; 21,95]	[21,43; 22,31]	[21,86; 22,85]	[21,94; 23,00]	[22,14; 23,32]	[22,28; 23,57]
		Median	18,92	19,22	19,44	19,61	20,16	20,44	20,61	20,89	21,09	21,08	21,46	21,30	21,39
		Fallbasis mittlere Differenz		1063	936	813	773	717	645	565	509	461	390	351	306
		Mittlere Differenz zur ED		0,70	0,77	0,86	0,96	1,22	1,57	1,76	2,12	2,83	3,08	3,36	3,53
		CI mittlere Differenz		[0,17; 1,22]	[0,31; 1,23]	[0,51; 1,22]	[0,45; 1,47]	[0,68; 1,77]	[0,96; 2,17]	[1,07; 2,45]	[1,34; 2,89]	[2,17; 3,49]	[2,32; 3,85]	[2,51; 4,22]	[2,55; 4,51]
		Median mittlere Differenz		0,20	0,64	0,96	1,24	1,54	1,83	2,06	2,41	2,74	3,20	3,47	3,54
untergewichtig		Anzahl	57	44	41	39	32	34	25	27	21	20	21	18	14
	Anteil in %	4,62	4,12	4,36	4,77	4,12	4,72	3,85	4,75	4,09	4,30	5,36	5,10	4,55	
	CI Anteil in %	[3,44; 5,79]	[2,93; 5,32]	[3,06; 5,67]	[3,31; 6,24]	[2,72; 5,52]	[3,17; 6,26]	[2,37; 5,33]	[3,00; 6,49]	[2,38; 5,81]	[2,46; 6,15]	[3,13; 7,59]	[2,80; 7,40]	[2,22; 6,88]	
normalgewichtig	Anzahl	802	718	596	537	494	474	415	379	330	295	241	216	188	
	Anteil in %	64,94	67,29	63,40	65,73	63,58	65,74	63,94	66,61	64,33	63,44	61,48	61,19	61,04	
	CI Anteil in %	[62,28; 67,60]	[64,48; 70,11]	[60,32; 66,49]	[62,47; 68,98]	[60,19; 66,96]	[62,28; 69,21]	[60,25; 67,64]	[62,73; 70,49]	[60,18; 68,48]	[59,06; 67,82]	[56,66; 66,30]	[56,10; 66,28]	[55,58; 66,49]	
mäßig adipös	Anzahl	171	138	145	132	131	115	106	82	83	72	60	61	49	
	Anteil in %	13,85	12,93	15,43	16,16	16,86	15,95	16,33	14,41	16,18	15,48	15,31	17,28	15,91	
	CI Anteil in %	[11,92; 15,77]	[10,92; 14,95]	[13,12; 17,74]	[13,63; 18,68]	[14,23; 19,49]	[13,28; 18,62]	[13,49; 19,18]	[11,52; 17,30]	[12,99; 19,37]	[12,19; 18,78]	[11,74; 18,87]	[13,33; 21,23]	[11,82; 20,00]	
stark adipös	Anzahl	205	167	158	109	120	98	103	81	79	78	70	58	57	
	Anteil in %	16,60	15,65	16,81	13,34	15,44	13,59	15,87	14,24	15,40	16,77	17,86	16,43	18,51	
	CI Anteil in %	[14,52; 18,68]	[13,47; 17,83]	[14,42; 19,20]	[11,01; 15,67]	[12,90; 17,99]	[11,09; 16,10]	[13,06; 18,68]	[11,36; 17,11]	[12,27; 18,53]	[13,37; 20,17]	[14,06; 21,65]	[12,56; 20,30]	[14,16; 22,85]	

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818	
	auswertbar	Anzahl	6036	5205	4495	4042	3713	3359	2964	2666	2375	2103	1888	1660	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,83	20,07	20,27	20,59	20,74	21,03	21,43	21,75	21,82	22,10	22,30	22,51	
		CI Mean	[19,69; 19,98]	[19,89; 20,24]	[20,08; 20,47]	[20,42; 20,76]	[20,59; 20,90]	[20,85; 21,22]	[21,21; 21,64]	[21,50; 22,01]	[21,60; 22,03]	[21,87; 22,33]	[22,07; 22,54]	[22,25; 22,76]	
		Median	18,77	18,97	19,15	19,71	19,90	20,12	20,48	20,79	20,83	20,99	21,36	21,55	
		Fallbasis mittlere Differenz		5196	4489	4034	3707	3353	2959	2661	2373	2101	1886	1658	
		Mittlere Differenz zur ED		0,41	0,69	1,02	1,24	1,64	2,17	2,54	2,70	3,07	3,38	3,69	
		CI mittlere Differenz		[0,25; 0,57]	[0,51; 0,88]	[0,89; 1,15]	[1,13; 1,35]	[1,49; 1,79]	[1,99; 2,35]	[2,32; 2,76]	[2,53; 2,86]	[2,89; 3,26]	[3,22; 3,54]	[3,50; 3,87]	
		Median mittlere Differenz		0,22	0,55	0,89	1,19	1,49	1,95	2,26	2,50	2,81	3,20	3,49	
	untergewichtig	Anzahl	358	228	230	152	178	136	134	99	110	80	87	59	
		Anteil in %	5,93	4,38	5,12	3,76	4,79	4,05	4,52	3,71	4,63	3,80	4,61	3,55	
		CI Anteil in %	[5,34; 6,53]	[3,82; 4,94]	[4,47; 5,76]	[3,17; 4,35]	[4,11; 5,48]	[3,38; 4,72]	[3,77; 5,27]	[3,00; 4,43]	[3,79; 5,48]	[2,99; 4,62]	[3,66; 5,55]	[2,66; 4,45]	
	normalgewichtig	Anzahl	3860	3208	2871	2502	2347	2045	1839	1613	1483	1284	1173	1007	
		Anteil in %	63,95	61,63	63,87	61,90	63,21	60,88	62,04	60,50	62,44	61,06	62,13	60,66	
		CI Anteil in %	[62,74; 65,16]	[60,31; 62,95]	[62,47; 65,28]	[60,40; 63,40]	[61,66; 64,76]	[59,23; 62,53]	[60,30; 63,79]	[58,65; 62,36]	[60,49; 64,39]	[58,97; 63,14]	[59,94; 64,32]	[58,31; 63,01]	
	mäßig adipös	Anzahl	865	831	689	663	609	604	503	464	388	357	313	288	
		Anteil in %	14,33	15,97	15,33	16,40	16,40	17,98	16,97	17,40	16,34	16,98	16,58	17,35	
		CI Anteil in %	[13,45; 15,21]	[14,97; 16,96]	[14,27; 16,38]	[15,26; 17,54]	[15,21; 17,59]	[16,68; 19,28]	[15,62; 18,32]	[15,96; 18,84]	[14,85; 17,82]	[15,37; 18,58]	[14,90; 18,26]	[15,53; 19,17]	
	stark adipös	Anzahl	953	938	705	725	579	574	488	490	394	382	315	306	
		Anteil in %	15,79	18,02	15,68	17,94	15,59	17,09	16,46	18,38	16,59	18,16	16,68	18,43	
		CI Anteil in %	[14,87; 16,71]	[16,98; 19,07]	[14,62; 16,75]	[16,75; 19,12]	[14,43; 16,76]	[15,82; 18,36]	[15,13; 17,80]	[16,91; 19,85]	[15,09; 18,09]	[16,52; 19,81]	[15,00; 18,37]	[16,57; 20,30]	

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3716	3376	3002	2713	2451	2217	1974	1790	1583	1435	1294	1153	
	auswertbar	Anzahl	3706	3219	2792	2522	2311	2103	1873	1682	1499	1338	1205	1053	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,75	19,94	20,17	20,52	20,74	21,06	21,55	21,82	21,88	22,21	22,35	22,59	
		CI Mean	[19,56; 19,94]	[19,73; 20,15]	[19,93; 20,40]	[20,33; 20,70]	[20,55; 20,94]	[20,82; 21,30]	[21,25; 21,85]	[21,49; 22,15]	[21,61; 22,15]	[21,90; 22,51]	[22,05; 22,64]	[22,26; 22,92]	
		Median	18,59	18,83	19,05	19,70	19,83	20,12	20,45	20,76	20,86	21,04	21,49	21,60	
		Fallbasis mittlere Differenz		3213	2788	2516	2306	2098	1869	1678	1498	1337	1204	1052	
		Mittlere Differenz zur ED		0,35	0,63	0,99	1,25	1,68	2,32	2,64	2,79	3,20	3,48	3,84	
		CI mittlere Differenz		[0,14; 0,56]	[0,38; 0,88]	[0,85; 1,13]	[1,11; 1,40]	[1,48; 1,88]	[2,06; 2,58]	[2,35; 2,94]	[2,58; 3,01]	[2,95; 3,44]	[3,30; 3,66]	[3,62; 4,06]	
		Median mittlere Differenz		0,23	0,58	0,93	1,20	1,54	1,99	2,30	2,58	2,89	3,27	3,51	
	untergewichtig	Anzahl	216	140	140	97	112	90	87	62	69	49	55	38	
		Anteil in %	5,83	4,35	5,01	3,85	4,85	4,28	4,64	3,69	4,60	3,66	4,56	3,61	
		CI Anteil in %	[5,07; 6,58]	[3,64; 5,05]	[4,20; 5,82]	[3,10; 4,60]	[3,97; 5,72]	[3,41; 5,14]	[3,69; 5,60]	[2,79; 4,59]	[3,54; 5,66]	[2,66; 4,67]	[3,39; 5,74]	[2,48; 4,74]	
	normalgewichtig	Anzahl	2364	1978	1756	1531	1430	1261	1145	1010	911	802	737	631	
		Anteil in %	63,79	61,45	62,89	60,71	61,88	59,96	61,13	60,05	60,77	59,94	61,16	59,92	
		CI Anteil in %	[62,24; 65,34]	[59,77; 63,13]	[61,10; 64,69]	[58,80; 62,61]	[59,90; 63,86]	[57,87; 62,06]	[58,92; 63,34]	[57,71; 62,39]	[58,30; 63,25]	[57,31; 62,57]	[58,41; 63,91]	[56,96; 62,89]	
	mäßig adipös	Anzahl	547	523	454	420	393	378	319	296	256	227	209	189	
		Anteil in %	14,76	16,25	16,26	16,65	17,01	17,97	17,03	17,60	17,08	16,97	17,34	17,95	
		CI Anteil in %	[13,62; 15,90]	[14,97; 17,52]	[14,89; 17,63]	[15,20; 18,11]	[15,47; 18,54]	[16,33; 19,62]	[15,33; 18,73]	[15,78; 19,42]	[15,17; 18,98]	[14,95; 18,98]	[15,21; 19,48]	[15,63; 20,27]	
	stark adipös	Anzahl	579	578	442	474	376	374	322	314	263	260	204	195	
		Anteil in %	15,62	17,96	15,83	18,79	16,27	17,78	17,19	18,67	17,55	19,43	16,93	18,52	
		CI Anteil in %	[14,45; 16,79]	[16,63; 19,28]	[14,48; 17,19]	[17,27; 20,32]	[14,76; 17,78]	[16,15; 19,42]	[15,48; 18,90]	[16,81; 20,53]	[15,62; 19,47]	[17,31; 21,55]	[14,81; 19,05]	[16,17; 20,87]	
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2333	2105	1855	1658	1489	1335	1179	1055	926	817	740	665	
	auswertbar	Anzahl	2330	1986	1703	1520	1402	1256	1091	984	876	765	683	607	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,96	20,27	20,44	20,72	20,75	20,99	21,22	21,63	21,71	21,91	22,23	22,36	
		CI Mean	[19,76; 20,17]	[19,96; 20,58]	[20,10; 20,79]	[20,40; 21,04]	[20,49; 21,00]	[20,71; 21,28]	[20,94; 21,50]	[21,24; 22,03]	[21,35; 22,06]	[21,56; 22,25]	[21,85; 22,60]	[21,97; 22,74]	
		Median	19,02	19,22	19,29	19,71	20,02	20,15	20,55	20,83	20,75	20,96	21,23	21,43	
		Fallbasis mittlere Differenz		1983	1701	1518	1401	1255	1090	983	875	764	682	606	
Mittlere Differenz zur ED			0,49	0,80	1,07	1,21	1,57	1,92	2,37	2,53	2,85	3,21	3,42		
CI mittlere Differenz			[0,25; 0,74]	[0,51; 1,08]	[0,83; 1,31]	[1,05; 1,37]	[1,36; 1,78]	[1,73; 2,12]	[2,02; 2,71]	[2,27; 2,80]	[2,57; 3,13]	[2,89; 3,53]	[3,08; 3,77]		
Median mittlere Differenz			0,20	0,49	0,84	1,15	1,40	1,87	2,22	2,36	2,70	3,04	3,44		
untergewichtig	Anzahl	142	88	90	55	66	46	47	37	41	31	32	21		
	Anteil in %	6,09	4,43	5,28	3,62	4,71	3,66	4,31	3,76	4,68	4,05	4,69	3,46		
	CI Anteil in %	[5,12; 7,07]	[3,53; 5,34]	[4,22; 6,35]	[2,68; 4,56]	[3,60; 5,82]	[2,62; 4,70]	[3,10; 5,51]	[2,57; 4,95]	[3,28; 6,08]	[2,65; 5,45]	[3,10; 6,27]	[2,00; 4,91]		
normalgewichtig	Anzahl	1496	1230	1115	971	917	784	694	603	572	482	436	376		
	Anteil in %	64,21	61,93	65,47	63,88	65,41	62,42	63,61	61,28	65,30	63,01	63,84	61,94		
	CI Anteil in %	[62,26; 66,15]	[59,80; 64,07]	[63,21; 67,73]	[61,47; 66,30]	[62,92; 67,90]	[59,74; 65,10]	[60,76; 66,47]	[58,24; 64,33]	[62,14; 68,45]	[59,58; 66,43]	[60,23; 67,44]	[58,08; 65,81]		
mäßig adipös	Anzahl	318	308	235	243	216	226	184	168	132	130	104	99		
	Anteil in %	13,65	15,51	13,80	15,99	15,41	17,99	16,87	17,07	15,07	16,99	15,23	16,31		
	CI Anteil in %	[12,25; 15,04]	[13,92; 17,10]	[12,16; 15,44]	[14,14; 17,83]	[13,52; 17,30]	[15,87; 20,12]	[14,64; 19,09]	[14,72; 19,43]	[12,70; 17,44]	[14,33; 19,66]	[12,53; 17,92]	[13,37; 19,25]		
stark adipös	Anzahl	374	360	263	251	203	200	166	176	131	122	111	111		
	Anteil in %	16,05	18,13	15,44	16,51	14,48	15,92	15,22	17,89	14,95	15,95	16,25	18,29		
	CI Anteil in %	[14,56; 17,54]	[16,43; 19,82]	[13,73; 17,16]	[14,65; 18,38]	[12,64; 16,32]	[13,90; 17,95]	[13,08; 17,35]	[15,49; 20,28]	[12,59; 17,32]	[13,35; 18,54]	[13,48; 19,02]	[15,21; 21,36]		

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138			
	auswertbar	Anzahl	9747	8140	7224	6596	5881	5229	4642	4148	3728	3276	2885			
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,73	19,83	20,32	20,55	20,70	21,02	21,20	21,34	21,51	21,79	21,99			
		CI Mean	[19,61; 19,85]	[19,71; 19,95]	[20,16; 20,48]	[20,40; 20,70]	[20,55; 20,84]	[20,86; 21,18]	[21,02; 21,38]	[21,18; 21,50]	[21,36; 21,67]	[21,62; 21,96]	[21,81; 22,17]			
		Median	18,75	18,91	19,32	19,60	19,84	20,20	20,29	20,45	20,70	21,04	21,21			
		Fallbasis mittlere Differenz		8123	7210	6582	5868	5216	4631	4137	3717	3266	2876			
		Mittlere Differenz zur ED		0,31	0,72	1,01	1,21	1,61	1,91	2,12	2,41	2,70	2,88			
		CI mittlere Differenz		[0,19; 0,43]	[0,56; 0,89]	[0,85; 1,17]	[1,05; 1,37]	[1,43; 1,79]	[1,71; 2,12]	[1,93; 2,32]	[2,20; 2,61]	[2,47; 2,93]	[2,63; 3,14]			
		Median mittlere Differenz		0,24	0,56	0,87	1,12	1,55	1,83	2,11	2,44	2,78	2,99			
	untergewichtig	Anzahl	496	434	314	337	249	250	196	222	181	201	147			
		Anteil in %	5,09	5,33	4,35	5,11	4,23	4,78	4,22	5,35	4,86	6,14	5,10			
		CI Anteil in %	[4,65; 5,53]	[4,84; 5,82]	[3,88; 4,82]	[4,58; 5,64]	[3,72; 4,75]	[4,20; 5,36]	[3,64; 4,80]	[4,67; 6,04]	[4,17; 5,55]	[5,31; 6,96]	[4,29; 5,90]			
	normalgewichtig	Anzahl	6288	5294	4547	4221	3656	3319	2884	2625	2295	2045	1760			
		Anteil in %	64,51	65,04	62,94	63,99	62,17	63,47	62,13	63,28	61,56	62,42	61,01			
		CI Anteil in %	[63,56; 65,46]	[64,00; 66,07]	[61,83; 64,06]	[62,83; 65,15]	[60,93; 63,41]	[62,17; 64,78]	[60,73; 63,52]	[61,82; 64,75]	[60,00; 63,12]	[60,76; 64,08]	[59,23; 62,79]			
	mäßig adipös	Anzahl	1432	1268	1214	1106	1047	884	782	700	640	532	514			
		Anteil in %	14,69	15,58	16,81	16,77	17,80	16,91	16,85	16,88	17,17	16,24	17,82			
		CI Anteil in %	[13,99; 15,39]	[14,79; 16,37]	[15,94; 17,67]	[15,87; 17,67]	[16,83; 18,78]	[15,89; 17,92]	[15,77; 17,92]	[15,74; 18,02]	[15,96; 18,38]	[14,98; 17,50]	[16,42; 19,21]			
	stark adipös	Anzahl	1531	1144	1149	932	929	776	780	601	612	498	464			
		Anteil in %	15,71	14,05	15,91	14,13	15,80	14,84	16,80	14,49	16,42	15,20	16,08			
		CI Anteil in %	[14,98; 16,43]	[13,30; 14,81]	[15,06; 16,75]	[13,29; 14,97]	[14,86; 16,73]	[13,88; 15,80]	[15,73; 17,88]	[13,42; 15,56]	[15,23; 17,61]	[13,97; 16,43]	[14,74; 17,42]			

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	6106	5468	4898	4394	3876	3451	3101	2773	2485	2226	1983		
	auswertbar	Anzahl	6097	5111	4502	4106	3679	3280	2922	2612	2368	2072	1816		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,50	19,74	20,19	20,36	20,63	20,94	21,00	21,20	21,39	21,71	21,90		
		CI Mean	[19,37; 19,63]	[19,57; 19,90]	[19,98; 20,40]	[20,19; 20,53]	[20,44; 20,82]	[20,74; 21,14]	[20,83; 21,18]	[21,01; 21,38]	[21,20; 21,59]	[21,50; 21,92]	[21,67; 22,13]		
		Median	18,50	18,75	19,15	19,43	19,71	20,11	20,12	20,34	20,57	20,98	21,20		
		Fallbasis mittlere Differenz		5102	4496	4099	3673	3274	2916	2606	2362	2066	1810		
		Mittlere Differenz zur ED		0,43	0,86	1,08	1,40	1,78	1,96	2,25	2,54	2,89	3,07		
		CI mittlere Differenz		[0,28; 0,57]	[0,66; 1,05]	[0,93; 1,23]	[1,22; 1,57]	[1,59; 1,96]	[1,80; 2,13]	[2,07; 2,43]	[2,34; 2,73]	[2,67; 3,11]	[2,82; 3,32]		
		Median mittlere Differenz		0,27	0,59	0,89	1,18	1,61	1,85	2,12	2,44	2,84	2,96		
	untergewichtig	Anzahl	315	272	187	204	138	138	108	139	108	113	85		
		Anteil in %	5,17	5,32	4,15	4,97	3,75	4,21	3,70	5,32	4,56	5,45	4,68		
		CI Anteil in %	[4,61; 5,72]	[4,71; 5,94]	[3,57; 4,74]	[4,30; 5,63]	[3,14; 4,37]	[3,52; 4,89]	[3,01; 4,38]	[4,46; 6,18]	[3,72; 5,40]	[4,48; 6,43]	[3,71; 5,65]		
	normalgewichtig	Anzahl	3935	3326	2831	2641	2301	2094	1824	1656	1474	1316	1116		
		Anteil in %	64,54	65,08	62,88	64,32	62,54	63,84	62,42	63,40	62,25	63,51	61,45		
		CI Anteil in %	[63,34; 65,74]	[63,77; 66,38]	[61,47; 64,29]	[62,86; 65,79]	[60,98; 64,11]	[62,20; 65,49]	[60,67; 64,18]	[61,55; 65,25]	[60,29; 64,20]	[61,44; 65,59]	[59,21; 63,69]		
	mäßig adipös	Anzahl	914	771	687	654	556	507	452	403	332	330			
		Anteil in %	14,99	15,87	17,13	16,73	17,78	16,95	17,35	17,30	17,02	16,02	18,17		
		CI Anteil in %	[14,09; 15,89]	[14,87; 16,87]	[16,03; 18,23]	[15,59; 17,87]	[16,54; 19,01]	[15,67; 18,24]	[15,98; 18,72]	[15,85; 18,76]	[15,50; 18,53]	[14,44; 17,60]	[16,40; 19,95]		
	stark adipös	Anzahl	933	702	713	574	586	492	483	365	383	311	285		
		Anteil in %	15,30	13,74	15,84	13,98	15,93	15,00	16,53	13,97	16,17	15,01	15,69		
		CI Anteil in %	[14,40; 16,21]	[12,79; 14,68]	[14,77; 16,90]	[12,92; 15,04]	[14,75; 17,11]	[13,78; 16,22]	[15,18; 17,88]	[12,64; 15,30]	[14,69; 17,66]	[13,47; 16,55]	[14,02; 17,37]		
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3661	3306	2974	2658	2332	2056	1825	1629	1455	1285	1155		
	auswertbar	Anzahl	3650	3029	2722	2490	2202	1949	1720	1536	1360	1204	1069		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,12	19,99	20,53	20,86	20,81	21,16	21,52	21,58	21,72	21,93	22,13		
		CI Mean	[19,90; 20,34]	[19,82; 20,15]	[20,28; 20,77]	[20,58; 21,15]	[20,59; 21,02]	[20,89; 21,44]	[21,14; 21,91]	[21,27; 21,88]	[21,46; 21,99]	[21,64; 22,21]	[21,83; 22,44]		
		Median	19,17	19,22	19,59	19,98	20,09	20,34	20,48	20,69	20,88	21,16	21,21		
		Fallbasis mittlere Differenz		3021	2714	2483	2195	1942	1715	1531	1355	1200	1066		
		Mittlere Differenz zur ED		0,11	0,50	0,91	0,90	1,32	1,83	1,91	2,18	2,38	2,57		
		CI mittlere Differenz		[-0,11; 0,32]	[0,21; 0,80]	[0,57; 1,25]	[0,60; 1,20]	[0,95; 1,70]	[1,36; 2,30]	[1,48; 2,34]	[1,75; 2,62]	[1,89; 2,87]	[2,02; 3,12]		
		Median mittlere Differenz		0,21	0,51	0,86	1,04	1,40	1,78	2,10	2,44	2,68	3,06		
	untergewichtig	Anzahl	181	162	127	133	111	112	88	83	73	88	62		
		Anteil in %	4,96	5,35	4,67	5,34	5,04	5,75	5,12	5,40	5,37	7,31	5,80		
		CI Anteil in %	[4,25; 5,66]	[4,55; 6,15]	[3,87; 5,46]	[4,46; 6,22]	[4,13; 5,95]	[4,71; 6,78]	[4,07; 6,16]	[4,27; 6,53]	[4,17; 6,57]	[5,84; 8,78]	[4,40; 7,20]		
normalgewichtig	Anzahl	2353	1968	1716	1580	1355	1225	1060	969	821	729	644			
	Anteil in %	64,47	64,97	63,04	63,45	61,53	62,85	61,63	63,09	60,37	60,55	60,24			
	CI Anteil in %	[62,91; 66,02]	[63,27; 66,67]	[61,23; 64,86]	[61,56; 65,35]	[59,50; 63,57]	[60,71; 65,00]	[59,33; 63,93]	[60,67; 65,50]	[57,77; 62,97]	[57,79; 63,31]	[57,31; 63,18]			
mäßig adipös	Anzahl	518	457	443	419	393	328	275	248	237	200	184			
	Anteil in %	14,19	15,09	16,27	16,83	17,85	16,83	15,99	16,15	17,43	16,61	17,21			
	CI Anteil in %	[13,06; 15,32]	[13,81; 16,36]	[14,89; 17,66]	[15,36; 18,30]	[16,25; 19,45]	[15,17; 18,49]	[14,26; 17,72]	[14,31; 17,99]	[15,41; 19,44]	[14,51; 18,71]	[14,95; 19,48]			
stark adipös	Anzahl	598	442	436	358	343	284	297	236	229	187	179			
	Anteil in %	16,38	14,59	16,02	14,38	15,58	14,57	17,27	15,36	16,84	15,53	16,74			
	CI Anteil in %	[15,18; 17,58]	[13,33; 15,85]	[14,64; 17,40]	[13,00; 15,76]	[14,06; 17,09]	[13,00; 16,14]	[15,48; 19,05]	[13,56; 17,17]	[14,85; 18,83]	[13,48; 17,58]	[14,51; 18,98]			

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373				
	auswertbar	Anzahl	10399	8593	7754	6712	5859	5153	4568	4014	3532	3086				
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,84	20,21	20,41	20,60	20,79	21,02	21,17	21,46	21,72	21,92				
		CI Mean	[19,72; 19,97]	[20,05; 20,36]	[20,25; 20,56]	[20,45; 20,76]	[20,63; 20,95]	[20,85; 21,18]	[21,01; 21,33]	[21,30; 21,62]	[21,55; 21,90]	[21,72; 22,12]				
		Median	18,82	19,18	19,46	19,68	19,93	20,19	20,34	20,65	20,89	21,10				
		Fallbasis mittlere Differenz		8565	7726	6687	5837	5133	4548	3995	3516	3069				
		Mittlere Differenz zur ED		0,51	0,75	0,99	1,30	1,59	1,82	2,21	2,50	2,76				
		CI mittlere Differenz		[0,35; 0,67]	[0,60; 0,90]	[0,82; 1,16]	[1,13; 1,48]	[1,39; 1,80]	[1,61; 2,03]	[2,01; 2,42]	[2,24; 2,75]	[2,48; 3,04]				
		Median mittlere Differenz		0,23	0,56	0,86	1,19	1,53	1,80	2,15	2,52	2,82				
	untergewichtig	Anzahl	606	371	403	291	286	209	219	144	152	104				
		Anteil in %	5,83	4,32	5,20	4,34	4,88	4,06	4,79	3,59	4,30	3,37				
		CI Anteil in %	[5,38; 6,28]	[3,89; 4,75]	[4,70; 5,69]	[3,85; 4,82]	[4,33; 5,43]	[3,52; 4,59]	[4,17; 5,41]	[3,01; 4,16]	[3,63; 4,97]	[2,73; 4,01]				
	normalgewichtig	Anzahl	6801	5435	5001	4164	3745	3160	2893	2439	2206	1908				
		Anteil in %	65,40	63,25	64,50	62,04	63,92	61,32	63,33	60,76	62,46	61,83				
		CI Anteil in %	[64,49; 66,31]	[62,23; 64,27]	[63,43; 65,56]	[60,88; 63,20]	[62,69; 65,15]	[59,99; 62,65]	[61,93; 64,73]	[59,25; 62,27]	[60,86; 64,05]	[60,11; 63,54]				
	mäßig adipös	Anzahl	1487	1325	1187	1144	957	909	792	729	620	564				
		Anteil in %	14,30	15,42	15,31	17,04	16,33	17,64	17,34	18,16	17,55	18,28				
		CI Anteil in %	[13,63; 14,97]	[14,66; 16,18]	[14,51; 16,11]	[16,14; 17,94]	[15,39; 17,28]	[16,60; 18,68]	[16,24; 18,44]	[16,97; 19,35]	[16,30; 18,81]	[16,91; 19,64]				
	stark adipös	Anzahl	1505	1462	1163	1113	871	875	664	702	554	510				
		Anteil in %	14,47	17,01	15,00	16,58	14,87	16,98	14,54	17,49	15,69	16,53				
		CI Anteil in %	[13,80; 15,15]	[16,22; 17,81]	[14,20; 15,79]	[15,69; 17,47]	[13,95; 15,78]	[15,96; 18,01]	[13,51; 15,56]	[16,31; 18,66]	[14,49; 16,88]	[15,22; 17,84]				

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	6438	5793	5197	4421	3839	3413	3030	2686	2367	2105				
	auswertbar	Anzahl	6417	5290	4795	4151	3621	3199	2854	2508	2199	1917				
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,71	20,02	20,23	20,50	20,75	20,95	21,14	21,48	21,75	21,91				
		CI Mean	[19,55; 19,87]	[19,84; 20,20]	[20,05; 20,41]	[20,31; 20,70]	[20,54; 20,95]	[20,75; 21,15]	[20,94; 21,35]	[21,29; 21,67]	[21,53; 21,97]	[21,66; 22,16]				
		Median	18,65	19,02	19,31	19,56	19,84	20,09	20,34	20,69	20,96	21,14				
		Fallbasis mittlere Differenz		5278	4781	4139	3611	3189	2844	2499	2192	1910				
		Mittlere Differenz zur ED		0,45	0,68	0,95	1,34	1,59	1,82	2,21	2,49	2,76				
		CI mittlere Differenz		[0,27; 0,64]	[0,52; 0,84]	[0,74; 1,16]	[1,10; 1,58]	[1,33; 1,85]	[1,55; 2,09]	[1,95; 2,48]	[2,15; 2,83]	[2,39; 3,13]				
		Median mittlere Differenz		0,22	0,57	0,88	1,22	1,55	1,85	2,18	2,56	2,85				
	untergewichtig	Anzahl	368	220	234	174	161	119	127	77	88	61				
		Anteil in %	5,73	4,16	4,88	4,19	4,45	3,72	4,45	3,07	4,00	3,18				
		CI Anteil in %	[5,17; 6,30]	[3,62; 4,70]	[4,27; 5,49]	[3,58; 4,80]	[3,77; 5,12]	[3,06; 4,38]	[3,69; 5,21]	[2,39; 3,75]	[3,18; 4,82]	[2,40; 3,97]				
	normalgewichtig	Anzahl	4149	3289	3056	2532	2298	1956	1808	1510	1366	1176				
		Anteil in %	64,66	62,17	63,73	61,00	63,46	61,14	63,35	60,21	62,12	61,35				
		CI Anteil in %	[63,49; 65,83]	[60,87; 63,48]	[62,37; 65,09]	[59,51; 62,48]	[61,89; 65,03]	[59,45; 62,83]	[61,58; 65,12]	[58,29; 62,12]	[60,09; 64,15]	[59,17; 63,53]				
	mäßig adipös	Anzahl	954	859	773	736	607	573	486	465	391	367				
		Anteil in %	14,87	16,24	16,12	17,73	16,76	17,91	17,03	18,54	17,78	19,14				
		CI Anteil in %	[14,00; 15,74]	[15,24; 17,23]	[15,08; 17,16]	[16,57; 18,89]	[15,55; 17,98]	[16,58; 19,24]	[15,65; 18,41]	[17,02; 20,06]	[16,18; 19,38]	[17,38; 20,91]				
	stark adipös	Anzahl	946	922	732	709	555	551	433	456	354	313				
		Anteil in %	14,74	17,43	15,27	17,08	15,33	17,22	15,17	18,18	16,10	16,33				
		CI Anteil in %	[13,87; 15,61]	[16,41; 18,45]	[14,25; 16,28]	[15,94; 18,23]	[14,15; 16,50]	[15,92; 18,53]	[13,86; 16,49]	[16,67; 19,69]	[14,56; 17,63]	[14,67; 17,98]				
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	4001	3616	3192	2722	2370	2072	1827	1611	1422	1268				
	auswertbar	Anzahl	3982	3303	2959	2561	2238	1954	1714	1506	1333	1169				
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,05	20,50	20,69	20,77	20,86	21,13	21,21	21,43	21,68	21,93				
		CI Mean	[19,84; 20,25]	[20,23; 20,77]	[20,40; 20,98]	[20,51; 21,02]	[20,62; 21,10]	[20,85; 21,41]	[20,95; 21,47]	[21,15; 21,71]	[21,37; 21,98]	[21,60; 22,26]				
		Median	19,11	19,48	19,67	19,90	20,00	20,29	20,34	20,54	20,70	21,05				
		Fallbasis mittlere Differenz		3287	2945	2548	2226	1944	1704	1496	1324	1159				
		Mittlere Differenz zur ED		0,61	0,87	1,06	1,25	1,60	1,82	2,22	2,52	2,76				
		CI mittlere Differenz		[0,32; 0,89]	[0,56; 1,17]	[0,77; 1,34]	[1,03; 1,47]	[1,26; 1,93]	[1,48; 2,16]	[1,89; 2,55]	[2,14; 2,89]	[2,33; 3,19]				
		Median mittlere Differenz		0,24	0,51	0,84	1,15	1,51	1,76	2,09	2,48	2,78				
untergewichtig	Anzahl	238	151	169	117	125	90	92	67	64	43					
	Anteil in %	5,98	4,57	5,71	4,57	5,59	4,61	5,37	4,45	4,80	3,68					
	CI Anteil in %	[5,24; 6,71]	[3,86; 5,28]	[4,88; 6,55]	[3,76; 5,38]	[4,63; 6,54]	[3,68; 5,54]	[4,30; 6,43]	[3,41; 5,49]	[3,65; 5,95]	[2,60; 4,76]					
normalgewichtig	Anzahl	2652	2146	1945	1632	1447	1204	1085	929	840	732					
	Anteil in %	66,60	64,97	65,73	63,73	64,66	61,62	63,30	61,69	63,02	62,62					
	CI Anteil in %	[65,13; 68,06]	[63,34; 66,60]	[64,02; 67,44]	[61,86; 65,59]	[62,67; 66,64]	[59,46; 63,77]	[61,02; 65,58]	[59,23; 64,14]	[60,42; 65,61]	[59,84; 65,39]					
mäßig adipös	Anzahl	533	466	414	408	350	336	306	264	229	197					
	Anteil in %	13,39	14,11	13,99	15,93	15,64	17,20	17,85	17,53	17,18	16,85					
	CI Anteil in %	[12,33; 14,44]	[12,92; 15,30]	[12,74; 15,24]	[14,51; 17,35]	[14,13; 17,14]	[15,52; 18,87]	[16,04; 19,67]	[15,61; 19,45]	[15,15; 19,20]	[14,71; 19,00]					
stark adipös	Anzahl	559	540	431	404	316	324	231	246	200	197					
	Anteil in %	14,04	16,35	14,57	15,78	14,12	16,58	13,48	16,33	15,00	16,85					
	CI Anteil in %	[12,96; 15,12]	[15,09; 17,61]	[13,29; 15,84]	[14,36; 17,19]	[12,68; 15,56]	[14,93; 18,23]	[11,86; 15,09]	[14,47; 18,20]	[13,09; 16,92]	[14,71; 19,00]					

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370					
	auswertbar	Anzahl	9055	7705	6567	5711	5062	4454	3971	3464	3081					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,47	20,49	20,60	20,90	21,08	21,27	21,44	21,65	21,76					
		CI Mean	[20,29; 20,66]	[20,33; 20,65]	[20,45; 20,75]	[20,74; 21,07]	[20,92; 21,24]	[21,09; 21,44]	[21,27; 21,61]	[21,47; 21,83]	[21,58; 21,94]					
		Median	19,26	19,49	19,72	20,05	20,28	20,44	20,66	20,81	20,93					
		Fallbasis mittlere Differenz		7679	6544	5687	5036	4432	3948	3444	3061					
		Mittlere Differenz zur ED		0,14	0,30	0,70	0,93	1,18	1,41	1,72	1,88					
		CI mittlere Differenz		[-0,06; 0,34]	[0,07; 0,52]	[0,45; 0,94]	[0,67; 1,18]	[0,90; 1,46]	[1,10; 1,71]	[1,39; 2,05]	[1,53; 2,23]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,39	0,76	1,12	1,39	1,67	2,03	2,19					
	untergewichtig	Anzahl	435	374	267	250	183	197	159	155	132					
		Anteil in %	4,80	4,85	4,07	4,38	3,62	4,42	4,00	4,47	4,28					
		CI Anteil in %	[4,36; 5,24]	[4,37; 5,33]	[3,59; 4,54]	[3,85; 4,91]	[3,10; 4,13]	[3,82; 5,03]	[3,39; 4,61]	[3,79; 5,16]	[3,57; 5,00]					
	normalgewichtig	Anzahl	5780	5000	4178	3658	3099	2809	2420	2154	1899					
		Anteil in %	63,83	64,89	63,62	64,05	61,22	63,07	60,94	62,18	61,64					
		CI Anteil in %	[62,84; 64,82]	[63,83; 65,96]	[62,46; 64,78]	[62,81; 65,30]	[59,88; 62,56]	[61,65; 64,48]	[59,42; 62,46]	[60,57; 63,80]	[59,92; 63,35]					
	mäßig adipös	Anzahl	1393	1198	1030	923	877	747	681	599	517					
		Anteil in %	15,38	15,55	15,68	16,16	17,33	16,77	17,15	17,29	16,78					
		CI Anteil in %	[14,64; 16,13]	[14,74; 16,36]	[14,80; 16,56]	[15,21; 17,12]	[16,28; 18,37]	[15,67; 17,87]	[15,98; 18,32]	[16,03; 18,55]	[15,46; 18,10]					
	stark adipös	Anzahl	1447	1133	1092	880	903	701	711	556	533					
		Anteil in %	15,98	14,70	16,63	15,41	17,84	15,74	17,90	16,05	17,30					
		CI Anteil in %	[15,23; 16,73]	[13,91; 15,50]	[15,73; 17,53]	[14,47; 16,35]	[16,78; 18,89]	[14,67; 16,81]	[16,71; 19,10]	[14,83; 17,27]	[15,96; 18,64]					

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	5542	4981	4285	3735	3321	2936	2632	2329	2096					
	auswertbar	Anzahl	5513	4723	4006	3501	3107	2755	2465	2158	1918					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,22	20,37	20,41	20,72	20,95	21,06	21,32	21,55	21,62					
		CI Mean	[19,99; 20,45]	[20,16; 20,59]	[20,21; 20,60]	[20,50; 20,94]	[20,73; 21,18]	[20,85; 21,26]	[21,10; 21,53]	[21,31; 21,78]	[21,40; 21,84]					
		Median	19,02	19,23	19,45	19,84	20,09	20,28	20,48	20,78	20,84					
		Fallbasis mittlere Differenz		4709	3993	3486	3093	2743	2452	2147	1906					
		Mittlere Differenz zur ED		0,27	0,34	0,78	1,05	1,19	1,49	1,74	1,80					
		CI mittlere Differenz		[0,01; 0,53]	[0,06; 0,62]	[0,47; 1,09]	[0,71; 1,38]	[0,84; 1,55]	[1,10; 1,88]	[1,30; 2,19]	[1,32; 2,28]					
		Median mittlere Differenz		0,07	0,45	0,83	1,22	1,48	1,76	2,11	2,28					
	untergewichtig	Anzahl	280	229	170	158	112	122	97	99	79					
		Anteil in %	5,08	4,85	4,24	4,51	3,60	4,43	3,94	4,59	4,12					
		CI Anteil in %	[4,50; 5,66]	[4,24; 5,46]	[3,62; 4,87]	[3,83; 5,20]	[2,95; 4,26]	[3,66; 5,20]	[3,17; 4,70]	[3,70; 5,47]	[3,23; 5,01]					
	normalgewichtig	Anzahl	3459	3029	2505	2209	1869	1707	1483	1323	1168					
		Anteil in %	62,74	64,13	62,53	63,10	60,15	61,96	60,16	61,31	60,90					
		CI Anteil in %	[61,47; 64,02]	[62,76; 65,50]	[61,03; 64,03]	[61,50; 64,69]	[58,43; 61,88]	[60,15; 63,77]	[58,23; 62,10]	[59,25; 63,36]	[58,71; 63,08]					
	mäßig adipös	Anzahl	891	764	659	587	548	487	436	388	338					
		Anteil in %	16,16	16,18	16,45	16,77	17,64	17,68	17,69	17,98	17,62					
		CI Anteil in %	[15,19; 17,13]	[15,13; 17,23]	[15,30; 17,60]	[15,53; 18,00]	[16,30; 18,98]	[16,25; 19,10]	[16,18; 19,19]	[16,36; 19,60]	[15,92; 19,33]					
	stark adipös	Anzahl	883	701	672	547	578	439	449	348	333					
		Anteil in %	16,02	14,84	16,77	15,62	18,60	15,93	18,22	16,13	17,36					
		CI Anteil in %	[15,05; 16,98]	[13,83; 15,86]	[15,62; 17,93]	[14,42; 16,83]	[17,23; 19,97]	[14,57; 17,30]	[16,69; 19,74]	[14,57; 17,68]	[15,67; 19,06]					
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3561	3163	2711	2360	2078	1819	1621	1423	1274					
	auswertbar	Anzahl	3542	2982	2561	2210	1955	1699	1506	1306	1163					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,87	20,67	20,91	21,19	21,27	21,61	21,64	21,83	22,00					
		CI Mean	[20,56; 21,17]	[20,44; 20,90]	[20,68; 21,14]	[20,94; 21,45]	[21,05; 21,50]	[21,29; 21,93]	[21,38; 21,90]	[21,55; 22,11]	[21,70; 22,31]					
		Median	19,68	19,84	20,08	20,32	20,54	20,70	20,78	20,89	21,05					
		Fallbasis mittlere Differenz		2970	2551	2201	1943	1689	1496	1297	1155					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,06	0,23	0,57	0,74	1,16	1,27	1,68	2,02					
		CI mittlere Differenz		[-0,39; 0,26]	[-0,13; 0,60]	[0,17; 0,97]	[0,34; 1,13]	[0,68; 1,63]	[0,79; 1,75]	[1,22; 2,15]	[1,54; 2,51]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,31	0,67	0,98	1,20	1,53	1,85	2,03					
	untergewichtig	Anzahl	155	145	97	92	71	75	62	56	53					
		Anteil in %	4,38	4,86	3,79	4,16	3,63	4,41	4,12	4,29	4,56					
		CI Anteil in %	[3,70; 5,05]	[4,09; 5,63]	[3,05; 4,53]	[3,33; 5,00]	[2,80; 4,46]	[3,44; 5,39]	[3,11; 5,12]	[3,19; 5,39]	[3,36; 5,76]					
	normalgewichtig	Anzahl	2321	1971	1673	1449	1230	1102	937	831	731					
		Anteil in %	65,53	66,10	65,33	65,57	62,92	64,86	62,22	63,63	62,85					
		CI Anteil in %	[63,96; 67,09]	[64,40; 67,80]	[63,48; 67,17]	[63,58; 67,55]	[60,77; 65,06]	[62,59; 67,13]	[59,77; 64,67]	[61,02; 66,24]	[60,08; 65,63]					
	mäßig adipös	Anzahl	502	434	371	336	329	260	245	211	179					
		Anteil in %	14,17	14,55	14,49	15,20	16,83	15,30	16,27	16,16	15,39					
		CI Anteil in %	[13,02; 15,32]	[13,29; 15,82]	[13,12; 15,85]	[13,71; 16,70]	[15,17; 18,49]	[13,59; 17,02]	[14,40; 18,13]	[14,16; 18,15]	[13,32; 17,47]					
	stark adipös	Anzahl	564	432	420	333	325	262	262	208	200					
Anteil in %		15,92	14,49	16,40	15,07	16,62	15,42	17,40	15,93	17,20						
CI Anteil in %		[14,72; 17,13]	[13,22; 15,75]	[14,97; 17,83]	[13,58; 16,56]	[14,97; 18,27]	[13,70; 17,14]	[15,48; 19,31]	[13,94; 17,91]	[15,03; 19,37]						

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822						
	auswertbar	Anzahl	7201	5946	5034	4386	3835	3338	2986	2616						
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,34	20,24	20,42	20,41	20,67	21,02	21,25	21,40						
		CI Mean	[20,10; 20,57]	[20,04; 20,44]	[20,22; 20,63]	[20,26; 20,57]	[20,49; 20,85]	[20,82; 21,22]	[21,03; 21,46]	[21,18; 21,62]						
		Median	18,90	19,10	19,33	19,50	19,82	20,13	20,42	20,55						
		Fallbasis mittlere Differenz		5931	5018	4374	3822	3327	2974	2607						
		Mittlere Differenz zur ED		0,17	0,56	0,56	0,78	1,14	1,52	1,80						
		CI mittlere Differenz		[-0,09; 0,42]	[0,31; 0,81]	[0,29; 0,83]	[0,49; 1,08]	[0,83; 1,45]	[1,18; 1,87]	[1,41; 2,18]						
		Median mittlere Differenz		0,05	0,45	0,78	1,03	1,41	1,75	1,98						
	untergewichtig	Anzahl	414	264	271	183	208	135	137	103						
		Anteil in %	5,75	4,44	5,38	4,17	5,42	4,04	4,59	3,94						
		CI Anteil in %	[5,21; 6,29]	[3,92; 4,96]	[4,76; 6,01]	[3,58; 4,76]	[4,71; 6,14]	[3,38; 4,71]	[3,84; 5,34]	[3,19; 4,68]						
	normalgewichtig	Anzahl	4702	3757	3209	2742	2436	2058	1865	1599						
		Anteil in %	65,30	63,19	63,75	62,52	63,52	61,65	62,46	61,12						
		CI Anteil in %	[64,20; 66,40]	[61,96; 64,41]	[62,42; 65,07]	[61,08; 63,95]	[62,00; 65,04]	[60,00; 63,30]	[60,72; 64,20]	[59,26; 62,99]						
	mäßig adipös	Anzahl	1012	922	803	718	623	558	522	468						
		Anteil in %	14,05	15,51	15,95	16,37	16,25	16,72	17,48	17,89						
		CI Anteil in %	[13,25; 14,86]	[14,59; 16,43]	[14,94; 16,96]	[15,28; 17,47]	[15,08; 17,41]	[15,45; 17,98]	[16,12; 18,84]	[16,42; 19,36]						
	stark adipös	Anzahl	1073	1003	751	743	568	587	462	446						
		Anteil in %	14,90	16,87	14,92	16,94	14,81	17,59	15,47	17,05						
		CI Anteil in %	[14,08; 15,72]	[15,92; 17,82]	[13,93; 15,90]	[15,83; 18,05]	[13,69; 15,94]	[16,29; 18,88]	[14,17; 16,77]	[15,61; 18,49]						

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	4438	3819	3270	2863	2483	2188	1973	1740					
	auswertbar	Anzahl	4422	3660	3079	2698	2351	2039	1837	1603					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,30	20,15	20,25	20,38	20,62	20,98	21,25	21,42					
		CI Mean	[19,98; 20,61]	[19,88; 20,42]	[20,01; 20,49]	[20,17; 20,59]	[20,39; 20,84]	[20,73; 21,23]	[20,98; 21,52]	[21,12; 21,72]					
		Median	18,61	18,88	19,15	19,39	19,57	20,01	20,34	20,43					
		Fallbasis mittlere Differenz		3650	3069	2689	2342	2031	1828	1596					
		Mittlere Differenz zur ED		0,16	0,54	0,69	0,90	1,31	1,72	1,93					
		CI mittlere Differenz		[-0,19; 0,51]	[0,26; 0,83]	[0,36; 1,01]	[0,54; 1,26]	[0,95; 1,66]	[1,30; 2,15]	[1,44; 2,41]					
		Median mittlere Differenz		0,06	0,48	0,82	1,06	1,45	1,76	2,01					
	untergewichtig	Anzahl	253	163	165	108	120	82	76	63					
		Anteil in %	5,72	4,45	5,36	4,00	5,10	4,02	4,14	3,93					
		CI Anteil in %	[5,04; 6,41]	[3,79; 5,12]	[4,56; 6,15]	[3,26; 4,74]	[4,21; 5,99]	[3,17; 4,87]	[3,23; 5,05]	[2,98; 4,88]					
	normalgewichtig	Anzahl	2852	2297	1927	1660	1479	1236	1141	968					
		Anteil in %	64,50	62,76	62,59	61,53	62,91	60,62	62,11	60,39					
		CI Anteil in %	[63,09; 65,91]	[61,19; 64,33]	[60,88; 64,29]	[59,69; 63,36]	[60,96; 64,86]	[58,50; 62,74]	[59,89; 64,33]	[57,99; 62,78]					
	mäßig adipös	Anzahl	639	577	509	448	393	347	332	287					
		Anteil in %	14,45	15,77	16,53	16,60	16,72	17,02	18,07	17,90					
		CI Anteil in %	[13,41; 15,49]	[14,58; 16,95]	[15,22; 17,84]	[15,20; 18,01]	[15,21; 18,22]	[15,39; 18,65]	[16,31; 19,83]	[16,03; 19,78]					
	stark adipös	Anzahl	678	623	478	482	359	374	288	285					
		Anteil in %	15,33	17,02	15,52	17,87	15,27	18,34	15,68	17,78					
		CI Anteil in %	[14,27; 16,39]	[15,80; 18,24]	[14,25; 16,80]	[16,42; 19,31]	[13,82; 16,72]	[16,66; 20,02]	[14,01; 17,34]	[15,91; 19,65]					
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2789	2401	2064	1793	1550	1380	1225	1082					
	auswertbar	Anzahl	2779	2286	1955	1688	1484	1299	1149	1013					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,40	20,37	20,70	20,46	20,76	21,07	21,24	21,37					
		CI Mean	[20,05; 20,75]	[20,08; 20,67]	[20,33; 21,07]	[20,23; 20,69]	[20,46; 21,06]	[20,74; 21,41]	[20,89; 21,60]	[21,06; 21,67]					
		Median	19,29	19,53	19,59	19,74	20,03	20,25	20,46	20,66					
		Fallbasis mittlere Differenz		2281	1949	1685	1480	1296	1146	1011					
		Mittlere Differenz zur ED		0,17	0,59	0,36	0,60	0,89	1,21	1,59					
		CI mittlere Differenz		[-0,20; 0,55]	[0,11; 1,06]	[-0,10; 0,82]	[0,11; 1,09]	[0,32; 1,45]	[0,61; 1,80]	[0,97; 2,21]					
		Median mittlere Differenz		0,02	0,40	0,71	0,96	1,35	1,74	1,96					
	untergewichtig	Anzahl	161	101	106	75	88	53	61	40					
		Anteil in %	5,79	4,42	5,42	4,44	5,93	4,08	5,31	3,95					
		CI Anteil in %	[4,92; 6,66]	[3,58; 5,26]	[4,42; 6,43]	[3,46; 5,43]	[4,73; 7,13]	[3,00; 5,16]	[4,01; 6,61]	[2,75; 5,15]					
normalgewichtig	Anzahl	1850	1460	1282	1082	957	822	724	631						
	Anteil in %	66,57	63,87	65,58	64,10	64,49	63,28	63,01	62,29						
	CI Anteil in %	[64,82; 68,32]	[61,90; 65,84]	[63,47; 67,68]	[61,81; 66,39]	[62,05; 66,92]	[60,66; 65,90]	[60,22; 65,80]	[59,30; 65,28]						
mäßig adipös	Anzahl	373	345	294	270	230	211	190	181						
	Anteil in %	13,42	15,09	15,04	16,00	15,50	16,24	16,54	17,87						
	CI Anteil in %	[12,15; 14,69]	[13,62; 16,56]	[13,45; 16,62]	[14,25; 17,74]	[13,66; 17,34]	[14,24; 18,25]	[14,39; 18,69]	[15,51; 20,23]						
stark adipös	Anzahl	395	380	273	261	209	213	174	161						
	Anteil in %	14,21	16,62	13,96	15,46	14,08	16,40	15,14	15,89						
	CI Anteil in %	[12,92; 15,51]	[15,10; 18,15]	[12,43; 15,50]	[13,74; 17,19]	[12,31; 15,85]	[14,38; 18,41]	[13,07; 17,22]	[13,64; 18,15]						

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826								
	auswertbar	Anzahl	6644	5526	4605	3910	3429	2999	2604								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,26	20,34	20,51	20,64	20,72	20,87	21,08								
		CI Mean	[20,07; 20,45]	[20,17; 20,51]	[20,34; 20,68]	[20,46; 20,82]	[20,55; 20,88]	[20,70; 21,04]	[20,88; 21,28]								
		Median	19,10	19,37	19,53	19,83	19,96	20,08	20,28								
		Fallbasis mittlere Differenz		5512	4594	3901	3421	2993	2598								
		Mittlere Differenz zur ED		0,22	0,55	0,71	0,92	1,27	1,52								
		CI mittlere Differenz		[0,00; 0,44]	[0,32; 0,78]	[0,44; 0,98]	[0,65; 1,19]	[1,00; 1,55]	[1,19; 1,85]								
		Median mittlere Differenz		0,06	0,49	0,73	1,06	1,40	1,59								
	untergewichtig	Anzahl	352	272	183	202	152	154	132								
		Anteil in %	5,30	4,92	3,97	5,17	4,43	5,14	5,07								
		CI Anteil in %	[4,76; 5,84]	[4,35; 5,49]	[3,41; 4,54]	[4,47; 5,86]	[3,74; 5,12]	[4,34; 5,93]	[4,23; 5,91]								
	normalgewichtig	Anzahl	4259	3617	2910	2493	2142	1929	1614								
		Anteil in %	64,10	65,45	63,19	63,76	62,47	64,32	61,98								
		CI Anteil in %	[62,95; 65,26]	[64,20; 66,71]	[61,80; 64,59]	[62,25; 65,27]	[60,85; 64,09]	[62,61; 66,04]	[60,12; 63,85]								
	mäßig adipös	Anzahl	958	831	728	628	562	503	444								
		Anteil in %	14,42	15,04	15,81	16,06	16,39	16,77	17,05								
		CI Anteil in %	[13,57; 15,26]	[14,10; 15,98]	[14,76; 16,86]	[14,91; 17,21]	[15,15; 17,63]	[15,43; 18,11]	[15,61; 18,50]								
	stark adipös	Anzahl	1075	806	784	587	573	413	414								
		Anteil in %	16,18	14,59	17,02	15,01	16,71	13,77	15,90								
		CI Anteil in %	[15,29; 17,07]	[13,65; 15,52]	[15,94; 18,11]	[13,89; 16,13]	[15,46; 17,96]	[12,54; 15,00]	[14,49; 17,30]								

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3997	3470	2906	2496	2216	1927	1701							
	auswertbar	Anzahl	3982	3303	2748	2340	2076	1806	1573							
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,08	20,17	20,31	20,45	20,53	20,66	20,90							
		CI Mean	[19,82; 20,34]	[19,94; 20,40]	[20,09; 20,53]	[20,22; 20,69]	[20,31; 20,74]	[20,45; 20,88]	[20,63; 21,17]							
		Median	18,81	19,13	19,24	19,55	19,66	19,81	19,96							
		Fallbasis mittlere Differenz		3294	2741	2333	2070	1802	1569							
		Mittlere Differenz zur ED		0,22	0,48	0,65	0,85	1,26	1,58							
		CI mittlere Differenz		[-0,09; 0,53]	[0,14; 0,81]	[0,27; 1,03]	[0,47; 1,23]	[0,90; 1,62]	[1,14; 2,02]							
		Median mittlere Differenz		0,15	0,55	0,79	1,06	1,43	1,64							
	untergewichtig	Anzahl	220	163	102	114	87	85	70							
		Anteil in %	5,52	4,93	3,71	4,87	4,19	4,71	4,45							
		CI Anteil in %	[4,82; 6,23]	[4,20; 5,67]	[3,00; 4,42]	[4,00; 5,74]	[3,33; 5,05]	[3,73; 5,68]	[3,43; 5,47]							
	normalgewichtig	Anzahl	2542	2160	1731	1493	1301	1161	985							
		Anteil in %	63,84	65,40	62,99	63,80	62,67	64,29	62,62							
		CI Anteil in %	[62,34; 65,33]	[63,77; 67,02]	[61,19; 64,80]	[61,86; 65,75]	[60,59; 64,75]	[62,08; 66,50]	[60,23; 65,01]							
	mäßig adipös	Anzahl	579	448	448	382	351	327	272							
		Anteil in %	14,54	15,26	16,30	16,32	16,91	18,11	17,29							
		CI Anteil in %	[13,45; 15,64]	[14,03; 16,49]	[14,92; 17,68]	[14,83; 17,82]	[15,29; 18,52]	[16,33; 19,88]	[15,42; 19,16]							
	stark adipös	Anzahl	641	476	467	351	337	233	246							
		Anteil in %	16,10	14,41	16,99	15,00	16,23	12,90	15,64							
		CI Anteil in %	[14,96; 17,24]	[13,21; 15,61]	[15,59; 18,40]	[13,55; 16,45]	[14,65; 17,82]	[11,35; 14,45]	[13,84; 17,43]							
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2670	2326	1975	1661	1444	1273	1125							
	auswertbar	Anzahl	2662	2223	1857	1570	1353	1193	1031							
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,53	20,59	20,80	20,91	21,01	21,18	21,36							
		CI Mean	[20,25; 20,81]	[20,34; 20,84]	[20,54; 21,06]	[20,62; 21,19]	[20,75; 21,27]	[20,90; 21,47]	[21,05; 21,66]							
		Median	19,49	19,72	19,90	20,11	20,35	20,43	20,70							
		Fallbasis mittlere Differenz		2218	1853	1568	1351	1191	1029							
		Mittlere Differenz zur ED		0,22	0,66	0,80	1,04	1,29	1,43							
		CI mittlere Differenz		[-0,08; 0,52]	[0,35; 0,97]	[0,45; 1,15]	[0,67; 1,41]	[0,87; 1,72]	[0,95; 1,92]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,41	0,67	1,06	1,35	1,52							
	untergewichtig	Anzahl	132	109	81	88	65	69	62							
		Anteil in %	4,96	4,90	4,36	5,61	4,80	5,78	6,01							
		CI Anteil in %	[4,13; 5,78]	[4,01; 5,80]	[3,43; 5,29]	[4,47; 6,74]	[3,66; 5,94]	[4,46; 7,11]	[4,56; 7,47]							
	normalgewichtig	Anzahl	1717	1457	1179	1000	841	768	629							
		Anteil in %	64,50	65,54	63,49	63,69	62,16	64,38	61,01							
		CI Anteil in %	[62,68; 66,32]	[63,57; 67,52]	[61,30; 65,68]	[61,31; 66,07]	[59,57; 64,74]	[61,66; 67,09]	[58,03; 63,99]							
	mäßig adipös	Anzahl	379	327	280	246	211	176	172							
		Anteil in %	14,24	14,71	15,08	15,67	15,59	14,75	16,68							
		CI Anteil in %	[12,91; 15,57]	[13,24; 16,18]	[13,45; 16,71]	[13,87; 17,47]	[13,66; 17,53]	[12,74; 16,77]	[14,41; 18,96]							
	stark adipös	Anzahl	434	330	317	236	236	180	168							
Anteil in %		16,30	14,84	17,07	15,03	17,44	15,09	16,29								
CI Anteil in %		[14,90; 17,71]	[13,37; 16,32]	[15,36; 18,78]	[13,26; 16,80]	[15,42; 19,47]	[13,06; 17,12]	[14,04; 18,55]								

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291								
	auswertbar	Anzahl	6799	5578	4719	4051	3531	3067								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,43	20,31	20,52	20,70	20,80	21,05								
		CI Mean	[20,20; 20,65]	[20,13; 20,50]	[20,31; 20,74]	[20,49; 20,91]	[20,62; 20,98]	[20,83; 21,27]								
		Median	19,12	19,23	19,44	19,62	19,96	20,17								
		Fallbasis mittlere Differenz		5567	4710	4043	3523	3059								
		Mittlere Differenz zur ED		0,05	0,31	0,62	0,76	1,05								
		CI mittlere Differenz		[-0,19; 0,30]	[0,02; 0,60]	[0,33; 0,91]	[0,45; 1,06]	[0,71; 1,40]								
		Median mittlere Differenz		0,01	0,35	0,72	1,05	1,40								
	untergewichtig	Anzahl	346	229	230	158	163	133								
		Anteil in %	5,09	4,11	4,87	3,90	4,62	4,34								
		CI Anteil in %	[4,57; 5,61]	[3,58; 4,63]	[4,26; 5,49]	[3,30; 4,50]	[3,92; 5,31]	[3,62; 5,06]								
	normalgewichtig	Anzahl	4351	3464	3033	2512	2222	1869								
		Anteil in %	63,99	62,10	64,27	62,01	62,93	60,94								
		CI Anteil in %	[62,85; 65,14]	[60,83; 63,37]	[62,90; 65,64]	[60,51; 63,50]	[61,33; 64,52]	[59,21; 62,67]								
	mäßig adipös	Anzahl	1043	881	722	664	567	513								
		Anteil in %	15,34	15,79	15,30	16,39	16,06	16,73								
		CI Anteil in %	[14,48; 16,20]	[14,84; 16,75]	[14,27; 16,33]	[15,25; 17,53]	[14,85; 17,27]	[15,41; 18,05]								
	stark adipös	Anzahl	1059	1004	734	717	579	552								
		Anteil in %	15,58	18,00	15,55	17,70	16,40	18,00								
		CI Anteil in %	[14,71; 16,44]	[16,99; 19,01]	[14,52; 16,59]	[16,52; 18,87]	[15,18; 17,62]	[16,64; 19,36]								

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	4155	3567	3025	2614	2284	2023							
	auswertbar	Anzahl	4143	3391	2880	2462	2163	1889							
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	20,25	20,16	20,46	20,60	20,65	20,86							
		CI Mean	[19,96; 20,53]	[19,91; 20,40]	[20,15; 20,77]	[20,30; 20,91]	[20,41; 20,88]	[20,60; 21,11]							
		Median	18,90	18,93	19,13	19,45	19,78	20,05							
		Fallbasis mittlere Differenz		3384	2875	2458	2159	1884							
		Mittlere Differenz zur ED		0,05	0,38	0,70	0,73	0,97							
		CI mittlere Differenz		[-0,28; 0,37]	[-0,01; 0,78]	[0,31; 1,09]	[0,33; 1,13]	[0,52; 1,42]							
		Median mittlere Differenz		0,08	0,35	0,74	1,05	1,36							
	untergewichtig	Anzahl	216	134	145	86	90	80							
		Anteil in %	5,21	3,95	5,03	3,49	4,16	4,24							
		CI Anteil in %	[4,54; 5,89]	[3,30; 4,61]	[4,24; 5,83]	[2,77; 4,22]	[3,32; 5,00]	[3,33; 5,14]							
	normalgewichtig	Anzahl	2594	2083	1826	1523	1374	1149							
		Anteil in %	62,61	61,43	63,40	61,86	63,52	60,83							
		CI Anteil in %	[61,14; 64,09]	[59,79; 63,07]	[61,64; 65,16]	[59,94; 63,78]	[61,49; 65,55]	[58,62; 63,03]							
	mäßig adipös	Anzahl	671	554	446	409	338	307							
		Anteil in %	16,20	16,34	15,49	16,61	15,63	16,25							
		CI Anteil in %	[15,07; 17,32]	[15,09; 17,58]	[14,16; 16,81]	[15,14; 18,08]	[14,10; 17,16]	[14,59; 17,92]							
	stark adipös	Anzahl	662	620	463	444	361	353							
		Anteil in %	15,98	18,28	16,08	18,03	16,69	18,69							
		CI Anteil in %	[14,86; 17,09]	[16,98; 19,58]	[14,73; 17,42]	[16,52; 19,55]	[15,12; 18,26]	[16,93; 20,45]							
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2663	2272	1938	1666	1441	1268							
	auswertbar	Anzahl	2656	2187	1839	1589	1368	1178							
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	20,71	20,56	20,63	20,84	21,04	21,36							
		CI Mean	[20,35; 21,07]	[20,29; 20,83]	[20,36; 20,89]	[20,58; 21,11]	[20,77; 21,31]	[20,95; 21,76]							
		Median	19,47	19,63	19,72	19,95	20,31	20,41							
		Fallbasis mittlere Differenz		2183	1835	1585	1364	1175							
		Mittlere Differenz zur ED		0,06	0,19	0,51	0,79	1,18							
		CI mittlere Differenz		[-0,31; 0,44]	[-0,23; 0,60]	[0,08; 0,94]	[0,34; 1,24]	[0,64; 1,72]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,35	0,68	1,07	1,44							
	untergewichtig	Anzahl	130	95	85	72	73	53							
		Anteil in %	4,89	4,34	4,62	4,53	5,34	4,50							
		CI Anteil in %	[4,07; 5,72]	[3,49; 5,20]	[3,66; 5,58]	[3,51; 5,55]	[4,14; 6,53]	[3,31; 5,68]							
normalgewichtig	Anzahl	1757	1381	1207	989	848	720								
	Anteil in %	66,15	63,15	65,63	62,24	61,99	61,12								
	CI Anteil in %	[64,35; 67,95]	[61,12; 65,17]	[63,46; 67,80]	[59,86; 64,62]	[59,42; 64,56]	[58,34; 63,91]								
mäßig adipös	Anzahl	372	327	276	255	229	206								
	Anteil in %	14,01	14,95	15,01	16,05	16,74	17,49								
	CI Anteil in %	[12,69; 15,33]	[13,46; 16,45]	[13,38; 16,64]	[14,24; 17,85]	[14,76; 18,72]	[15,32; 19,66]								
stark adipös	Anzahl	397	384	271	273	218	199								
	Anteil in %	14,95	17,56	14,74	17,18	15,94	16,89								
	CI Anteil in %	[13,59; 16,30]	[15,96; 19,15]	[13,12; 16,36]	[15,33; 19,04]	[14,00; 17,88]	[14,75; 19,03]								

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731									
	auswertbar	Anzahl	6643	5484	4624	4013	3460									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,34	20,40	20,36	20,58	20,76									
		CI Mean	[20,13; 20,54]	[20,20; 20,59]	[20,21; 20,52]	[20,41; 20,75]	[20,58; 20,94]									
		Median	19,07	19,22	19,51	19,62	19,95									
		Fallbasis mittlere Differenz		5461	4601	3995	3442									
		Mittlere Differenz zur ED		0,17	0,34	0,66	0,87									
		CI mittlere Differenz		[-0,07; 0,41]	[0,13; 0,55]	[0,43; 0,90]	[0,59; 1,14]									
		Median mittlere Differenz		0,03	0,42	0,74	1,01									
	untergewichtig	Anzahl	325	264	182	207	139									
		Anteil in %	4,89	4,81	3,94	5,16	4,02									
		CI Anteil in %	[4,37; 5,41]	[4,25; 5,38]	[3,38; 4,50]	[4,47; 5,84]	[3,36; 4,67]									
	normalgewichtig	Anzahl	4196	3536	2911	2533	2143									
		Anteil in %	63,16	64,48	62,95	63,12	61,94									
		CI Anteil in %	[62,00; 64,32]	[63,21; 65,75]	[61,56; 64,35]	[61,63; 64,61]	[60,32; 63,55]									
	mäßig adipös	Anzahl	954	821	725	634	559									
		Anteil in %	14,36	14,97	15,68	15,80	16,16									
		CI Anteil in %	[13,52; 15,20]	[14,03; 15,92]	[14,63; 16,73]	[14,67; 16,93]	[14,93; 17,38]									
	stark adipös	Anzahl	1168	863	806	639	619									
		Anteil in %	17,58	15,74	17,43	15,92	17,89									
		CI Anteil in %	[16,67; 18,50]	[14,77; 16,70]	[16,34; 18,52]	[14,79; 17,06]	[16,61; 19,17]									

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3936	3367	2919	2511	2217									
	auswertbar	Anzahl	3919	3234	2742	2371	2070									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,07	20,28	20,16	20,41	20,53									
		CI Mean	[19,82; 20,32]	[20,01; 20,56]	[19,97; 20,34]	[20,18; 20,64]	[20,31; 20,74]									
		Median	18,67	18,92	19,18	19,33	19,53									
		Fallbasis mittlere Differenz		3222	2729	2364	2063									
		Mittlere Differenz zur ED		0,26	0,46	0,81	1,00									
		CI mittlere Differenz		[-0,05; 0,58]	[0,24; 0,67]	[0,54; 1,09]	[0,71; 1,29]									
		Median mittlere Differenz		0,14	0,49	0,82	1,05									
	untergewichtig	Anzahl	208	157	111	123	83									
		Anteil in %	5,31	4,85	4,05	5,19	4,01									
		CI Anteil in %	[4,61; 6,01]	[4,11; 5,60]	[3,31; 4,79]	[4,29; 6,08]	[3,16; 4,86]									
	normalgewichtig	Anzahl	2431	2075	1707	1479	1274									
		Anteil in %	62,03	64,16	62,25	62,38	61,55									
		CI Anteil in %	[60,51; 63,55]	[62,51; 65,81]	[60,44; 64,07]	[60,43; 64,33]	[59,45; 63,64]									
	mäßig adipös	Anzahl	572	471	423	368	325									
		Anteil in %	14,60	14,56	15,43	15,52	15,70									
		CI Anteil in %	[13,49; 15,70]	[13,35; 15,78]	[14,07; 16,78]	[14,06; 16,98]	[14,13; 17,27]									
	stark adipös	Anzahl	708	531	501	401	388									
		Anteil in %	18,07	16,42	18,27	16,91	18,74									
		CI Anteil in %	[16,86; 19,27]	[15,14; 17,70]	[16,82; 19,72]	[15,40; 18,42]	[17,06; 20,43]									
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2741	2342	2011	1746	1514									
	auswertbar	Anzahl	2724	2250	1882	1642	1390									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,72	20,56	20,67	20,83	21,11									
		CI Mean	[20,37; 21,07]	[20,30; 20,82]	[20,41; 20,92]	[20,58; 21,08]	[20,80; 21,41]									
		Median	19,53	19,72	19,92	20,02	20,38									
		Fallbasis mittlere Differenz		2239	1872	1631	1379									
		Mittlere Differenz zur ED		0,03	0,17	0,45	0,66									
		CI mittlere Differenz		[-0,34; 0,40]	[-0,25; 0,58]	[0,03; 0,87]	[0,14; 1,18]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,36	0,62	0,88									
	untergewichtig	Anzahl	117	107	71	84	56									
		Anteil in %	4,30	4,76	3,77	5,12	4,03									
		CI Anteil in %	[3,53; 5,06]	[3,88; 5,64]	[2,91; 4,63]	[4,05; 6,18]	[2,99; 5,06]									
	normalgewichtig	Anzahl	1765	1461	1204	1054	869									
		Anteil in %	64,79	64,93	63,97	64,19	62,52									
		CI Anteil in %	[63,00; 66,59]	[62,96; 66,91]	[61,80; 66,14]	[61,87; 66,51]	[59,97; 65,06]									
	mäßig adipös	Anzahl	382	350	302	266	234									
		Anteil in %	14,02	15,56	16,05	16,20	16,83									
		CI Anteil in %	[12,72; 15,33]	[14,06; 17,05]	[14,39; 17,71]	[14,42; 17,98]	[14,87; 18,80]									
	stark adipös	Anzahl	460	332	305	238	231									
		Anteil in %	16,89	14,76	16,21	14,49	16,62									
CI Anteil in %		[15,48; 18,29]	[13,29; 16,22]	[14,54; 17,87]	[12,79; 16,20]	[14,66; 18,58]										

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847										
	auswertbar	Anzahl	6208	5073	4209	3556										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,11	20,36	20,66	20,59										
		CI Mean	[19,91; 20,31]	[20,15; 20,57]	[20,38; 20,93]	[20,34; 20,85]										
		Median	18,86	19,20	19,39	19,47										
		Fallbasis mittlere Differenz		5064	4200	3548										
		Mittlere Differenz zur ED		0,38	0,87	0,91										
		CI mittlere Differenz		[0,17; 0,60]	[0,58; 1,15]	[0,66; 1,17]										
		Median mittlere Differenz		0,11	0,49	0,78										
	untergewichtig	Anzahl	355	207	179	145										
		Anteil in %	5,72	4,08	4,25	4,08										
		CI Anteil in %	[5,14; 6,30]	[3,54; 4,62]	[3,64; 4,86]	[3,43; 4,73]										
	normalgewichtig	Anzahl	4021	3191	2735	2218										
		Anteil in %	64,77	62,90	64,98	62,37										
		CI Anteil in %	[63,58; 65,96]	[61,57; 64,23]	[63,54; 66,42]	[60,78; 63,97]										
	mäßig adipös	Anzahl	930	804	645	592										
		Anteil in %	14,98	15,85	15,32	16,65										
		CI Anteil in %	[14,09; 15,87]	[14,84; 16,85]	[14,24; 16,41]	[15,42; 17,87]										
	stark adipös	Anzahl	902	871	650	601										
		Anteil in %	14,53	17,17	15,44	16,90										
		CI Anteil in %	[13,65; 15,41]	[16,13; 18,21]	[14,35; 16,53]	[15,67; 18,13]										

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3704	3173	2696	2304										
	auswertbar	Anzahl	3695	3058	2540	2125										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,08	20,44	20,84	20,64										
		CI Mean	[19,79; 20,37]	[20,12; 20,76]	[20,42; 21,26]	[20,27; 21,01]										
		Median	18,62	19,03	19,20	19,26										
		Fallbasis mittlere Differenz		3050	2532	2119										
		Mittlere Differenz zur ED		0,52	1,10	1,04										
		CI mittlere Differenz		[0,20; 0,83]	[0,67; 1,53]	[0,70; 1,37]										
		Median mittlere Differenz		0,14	0,55	0,87										
	untergewichtig	Anzahl	202	121	107	85										
		Anteil in %	5,47	3,96	4,21	4,00										
		CI Anteil in %	[4,73; 6,20]	[3,27; 4,65]	[3,43; 4,99]	[3,17; 4,83]										
	normalgewichtig	Anzahl	2378	1885	1625	1308										
		Anteil in %	64,36	61,64	63,98	61,55										
		CI Anteil in %	[62,81; 65,90]	[59,92; 63,37]	[62,11; 65,84]	[59,48; 63,62]										
	mäßig adipös	Anzahl	550	495	397	345										
		Anteil in %	14,88	16,19	15,63	16,24										
		CI Anteil in %	[13,74; 16,03]	[14,88; 17,49]	[14,22; 17,04]	[14,67; 17,80]										
	stark adipös	Anzahl	565	557	411	387										
		Anteil in %	15,29	18,21	16,18	18,21										
		CI Anteil in %	[14,13; 16,45]	[16,85; 19,58]	[14,75; 17,61]	[16,57; 19,85]										
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2518	2124	1783	1543										
	auswertbar	Anzahl	2513	2015	1669	1431										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,15	20,23	20,37	20,52										
		CI Mean	[19,88; 20,42]	[20,02; 20,44]	[20,13; 20,61]	[20,21; 20,83]										
		Median	19,15	19,46	19,56	19,72										
		Fallbasis mittlere Differenz		2014	1668	1429										
		Mittlere Differenz zur ED		0,17	0,51	0,73										
		CI mittlere Differenz		[-0,07; 0,42]	[0,20; 0,82]	[0,33; 1,13]										
		Median mittlere Differenz		0,01	0,40	0,63										
	untergewichtig	Anzahl	153	86	72	60										
		Anteil in %	6,09	4,27	4,31	4,19										
		CI Anteil in %	[5,15; 7,02]	[3,39; 5,15]	[3,34; 5,29]	[3,15; 5,23]										
	normalgewichtig	Anzahl	1643	1306	1110	910										
		Anteil in %	65,38	64,81	66,51	63,59										
		CI Anteil in %	[63,52; 67,24]	[62,73; 66,90]	[64,24; 68,77]	[61,10; 66,09]										
	mäßig adipös	Anzahl	380	309	248	247										
		Anteil in %	15,12	15,33	14,86	17,26										
		CI Anteil in %	[13,72; 16,52]	[13,76; 16,91]	[13,15; 16,57]	[15,30; 19,22]										
	stark adipös	Anzahl	337	314	239	214										
Anteil in %		13,41	15,58	14,32	14,95											
CI Anteil in %		[12,08; 14,74]	[14,00; 17,17]	[12,64; 16,00]	[13,11; 16,80]											

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553											
	auswertbar	Anzahl	6246	5136	4221											
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,17	20,26	20,31											
		CI Mean	[19,98; 20,35]	[20,07; 20,45]	[20,10; 20,52]											
		Median	18,92	19,11	19,20											
		Fallbasis mittlere Differenz		5128	4213											
		Mittlere Differenz zur ED		0,24	0,50											
		CI mittlere Differenz		[0,03; 0,45]	[0,26; 0,75]											
		Median mittlere Differenz		0,00	0,36											
	untergewichtig	Anzahl	323	295	192											
		Anteil in %	5,17	5,74	4,55											
		CI Anteil in %	[4,62; 5,72]	[5,11; 6,38]	[3,92; 5,18]											
	normalgewichtig	Anzahl	3939	3271	2644											
		Anteil in %	63,06	63,69	62,64											
		CI Anteil in %	[61,87; 64,26]	[62,37; 65,00]	[61,18; 64,10]											
	mäßig adipös	Anzahl	942	787	676											
		Anteil in %	15,08	15,32	16,02											
		CI Anteil in %	[14,19; 15,97]	[14,34; 16,31]	[14,91; 17,12]											
	stark adipös	Anzahl	1042	783	709											
		Anteil in %	16,68	15,25	16,80											
		CI Anteil in %	[15,76; 17,61]	[14,26; 16,23]	[15,67; 17,92]											

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3712	3183	2696											
	auswertbar	Anzahl	3696	3036	2501											
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,87	19,93	20,00											
		CI Mean	[19,64; 20,09]	[19,70; 20,15]	[19,73; 20,26]											
		Median	18,51	18,76	18,73											
		Fallbasis mittlere Differenz		3030	2495											
		Mittlere Differenz zur ED		0,26	0,59											
		CI mittlere Differenz		[0,03; 0,49]	[0,29; 0,89]											
		Median mittlere Differenz		0,04	0,42											
	untergewichtig	Anzahl	198	175	114											
		Anteil in %	5,36	5,76	4,56											
		CI Anteil in %	[4,63; 6,08]	[4,93; 6,59]	[3,74; 5,38]											
	normalgewichtig	Anzahl	2324	1937	1579											
		Anteil in %	62,88	63,80	63,13											
		CI Anteil in %	[61,32; 64,44]	[62,09; 65,51]	[61,24; 65,03]											
	mäßig adipös	Anzahl	542	462	401											
		Anteil in %	14,66	15,22	16,03											
		CI Anteil in %	[13,52; 15,81]	[13,94; 16,50]	[14,60; 17,47]											
	stark adipös	Anzahl	632	462	407											
		Anteil in %	17,10	15,22	16,27											
		CI Anteil in %	[15,89; 18,31]	[13,94; 16,50]	[14,83; 17,72]											
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2557	2211	1857											
	auswertbar	Anzahl	2550	2100	1720											
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,60	20,74	20,77											
		CI Mean	[20,29; 20,92]	[20,41; 21,07]	[20,43; 21,10]											
		Median	19,47	19,61	19,75											
		Fallbasis mittlere Differenz		2098	1718											
		Mittlere Differenz zur ED		0,22	0,38											
		CI mittlere Differenz		[-0,17; 0,62]	[-0,03; 0,79]											
		Median mittlere Differenz		0,00	0,24											
	untergewichtig	Anzahl	125	120	78											
		Anteil in %	4,90	5,71	4,53											
		CI Anteil in %	[4,06; 5,74]	[4,72; 6,71]	[3,55; 5,52]											
normalgewichtig	Anzahl	1615	1334	1065												
	Anteil in %	63,33	63,52	61,92												
	CI Anteil in %	[61,46; 65,20]	[61,46; 65,58]	[59,62; 64,21]												
mäßig adipös	Anzahl	400	325	275												
	Anteil in %	15,69	15,48	15,99												
	CI Anteil in %	[14,27; 17,10]	[13,93; 17,02]	[14,26; 17,72]												
stark adipös	Anzahl	410	321	302												
	Anteil in %	16,08	15,29	17,56												
	CI Anteil in %	[14,65; 17,50]	[13,75; 16,83]	[15,76; 19,36]												

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721												
	auswertbar	Anzahl	6662	5425												
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,08	20,07												
		CI Mean	[19,88; 20,28]	[19,90; 20,25]												
		Median	18,85	18,97												
		Fallbasis mittlere Differenz		5414												
		Mittlere Differenz zur ED		0,14												
		CI mittlere Differenz		[-0,08; 0,36]												
		Median mittlere Differenz		0,05												
	untergewichtig	Anzahl	350	236												
		Anteil in %	5,25	4,35												
		CI Anteil in %	[4,72; 5,79]	[3,81; 4,89]												
	normalgewichtig	Anzahl	4249	3340												
		Anteil in %	63,78	61,57												
		CI Anteil in %	[62,63; 64,93]	[60,27; 62,86]												
	mäßig adipös	Anzahl	1006	864												
		Anteil in %	15,10	15,93												
		CI Anteil in %	[14,24; 15,96]	[14,95; 16,90]												
	stark adipös	Anzahl	1057	985												
		Anteil in %	15,87	18,16												
		CI Anteil in %	[14,99; 16,74]	[17,13; 19,18]												

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3983	3410												
	auswertbar	Anzahl	3968	3236												
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,91	19,85												
		CI Mean	[19,63; 20,18]	[19,62; 20,08]												
		Median	18,42	18,60												
		Fallbasis mittlere Differenz		3231												
		Mittlere Differenz zur ED		0,09												
		CI mittlere Differenz		[-0,23; 0,40]												
		Median mittlere Differenz		0,08												
	untergewichtig	Anzahl	224	147												
		Anteil in %	5,65	4,54												
		CI Anteil in %	[4,93; 6,36]	[3,83; 5,26]												
	normalgewichtig	Anzahl	2547	2023												
		Anteil in %	64,19	62,52												
		CI Anteil in %	[62,70; 65,68]	[60,85; 64,18]												
	mäßig adipös	Anzahl	604	506												
		Anteil in %	15,22	15,64												
		CI Anteil in %	[14,10; 16,34]	[14,38; 16,89]												
	stark adipös	Anzahl	593	560												
		Anteil in %	14,94	17,31												
		CI Anteil in %	[13,84; 16,05]	[16,00; 18,61]												
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2701	2311												
	auswertbar	Anzahl	2694	2189												
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,34	20,40												
		CI Mean	[20,07; 20,61]	[20,14; 20,67]												
		Median	19,39	19,71												
		Fallbasis mittlere Differenz		2183												
		Mittlere Differenz zur ED		0,23												
		CI mittlere Differenz		[-0,05; 0,50]												
		Median mittlere Differenz		0,00												
	untergewichtig	Anzahl	126	89												
		Anteil in %	4,68	4,07												
		CI Anteil in %	[3,88; 5,47]	[3,24; 4,89]												
	normalgewichtig	Anzahl	1702	1317												
		Anteil in %	63,18	60,16												
		CI Anteil in %	[61,36; 65,00]	[58,11; 62,22]												
	mäßig adipös	Anzahl	402	358												
		Anteil in %	14,92	16,35												
		CI Anteil in %	[13,58; 16,27]	[14,80; 17,90]												
	stark adipös	Anzahl	464	425												
Anteil in %		17,22	19,42													
CI Anteil in %		[15,80; 18,65]	[17,76; 21,07]													

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942													
	auswertbar	Anzahl	5919													
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,20													
		CI Mean	[20,03; 20,38]													
		Median	19,10													
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	untergewichtig	Anzahl	267													
		Anteil in %	4,51													
		CI Anteil in %	[3,98; 5,04]													
	normalgewichtig	Anzahl	3717													
		Anteil in %	62,80													
		CI Anteil in %	[61,57; 64,03]													
	mäßig adipös	Anzahl	934													
		Anteil in %	15,78													
		CI Anteil in %	[14,85; 16,71]													
	stark adipös	Anzahl	1001													
		Anteil in %	16,91													
CI Anteil in %		[15,96; 17,87]														

EZ	Patienten < 18 Jahre zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3611													
	auswertbar	Anzahl	3595													
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	19,94													
		CI Mean	[19,70; 20,18]													
		Median	18,67													
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	untergewichtig	Anzahl	166													
		Anteil in %	4,62													
		CI Anteil in %	[3,93; 5,30]													
	normalgewichtig	Anzahl	2268													
		Anteil in %	63,09													
		CI Anteil in %	[61,51; 64,67]													
	mäßig adipös	Anzahl	569													
		Anteil in %	15,83													
		CI Anteil in %	[14,63; 17,02]													
	stark adipös	Anzahl	592													
		Anteil in %	16,47													
		CI Anteil in %	[15,25; 17,68]													
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2331													
	auswertbar	Anzahl	2324													
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	20,61													
		CI Mean	[20,35; 20,87]													
		Median	19,64													
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	untergewichtig	Anzahl	101													
		Anteil in %	4,35													
		CI Anteil in %	[3,52; 5,18]													
normalgewichtig	Anzahl	1449														
	Anteil in %	62,35														
	CI Anteil in %	[60,38; 64,32]														
mäßig adipös	Anzahl	365														
	Anteil in %	15,71														
	CI Anteil in %	[14,23; 17,19]														
stark adipös	Anzahl	409														
	Anteil in %	17,60														
	CI Anteil in %	[16,05; 19,15]														

3.2 Symptomatik

Zu den wichtigsten Asthma-Symptomen zählen Atemnot (häufig anfallartig), Giemen (asthmatisches Atemgeräusch), Husten und ein Engegefühl über der Brust. Die Häufigkeit, mit der diese Symptome auftreten, dient der Schweregrad-Einteilung einer asthmatischen Erkrankung. Die Vermeidung akuter und chronischer Krankheitserscheinungen (Symptome und Asthmaanfälle) ist ein wichtiges Ziel in der Asthmatherapie. Im Folgenden wird in Tabelle 3.2.1 die Häufigkeit von Asthmasymptomen bei den eingeschriebenen Patienten ausgewiesen und zum anderen in Tabelle 3.2.2 die Entwicklung der Häufigkeit der auftretenden Asthmasymptome im Programmverlauf dargestellt. Eine Verschlechterung der Symptomatik bzw. ein Asthma-Anfall kann unter Umständen eine notfallmäßige stationäre Behandlung zur Folge haben.

Daher weisen die Tabellen 3.2.3 und 3.2.4 die Anzahl der Patienten aus, die mindestens einmal bzw. mehr als einmal im aktuellen Halbjahr wegen Asthma bronchiale notfallmäßig stationär behandelt wurden.

In Tabelle 3.2.1 wird für jede Kohorte die **Häufigkeit von Asthmasymptomen** bei den Programmteilnehmern dokumentiert. Hierbei wird unter „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Patienten angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend werden die Patienten in den Häufigkeitskategorien ihrer Asthmasymptome (täglich, wöchentlich, seltener als wöchentlich, keine) dargestellt und es wird der jeweilige Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ausgewiesen.

Tabelle 3.2.1 Häufigkeit von Asthmasymptomen bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts-	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-	11. Halb-	12. Halb-	13. Halb-	14. Halb-	
		Anzahl	halbjahr									jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt			373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	auswertbar		Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	täglich	Anzahl	52	21	23	13	9	7	9	7	9	6	6	7	7	6	
		Anteil in %	13,94	6,02	7,21	4,51	3,47	2,94	4,25	3,61	4,97	3,64	4,03	5,19	5,69	5,45	
		CI Anteil in %	[10,42; 17,46]	[3,52; 8,52]	[4,37; 10,05]	[2,11; 6,92]	[1,24; 5,71]	[0,79; 5,09]	[1,52; 6,97]	[0,98; 6,24]	[1,80; 8,15]	[0,77; 6,50]	[0,86; 7,19]	[1,43; 8,94]	[1,58; 9,80]	[1,19; 9,72]	
	wöchentlich	Anzahl	89	46	34	30	26	29	24	32	21	16	15	14	15	7	
		Anteil in %	23,86	13,18	10,66	10,42	10,04	12,18	11,32	16,49	11,60	9,70	10,07	10,37	12,20	6,36	
		CI Anteil in %	[19,53; 28,19]	[9,63; 16,73]	[7,27; 14,05]	[6,88; 13,95]	[6,37; 13,71]	[8,02; 16,35]	[7,05; 15,60]	[11,26; 21,73]	[6,92; 16,28]	[5,17; 14,23]	[5,22; 14,91]	[5,21; 15,53]	[6,39; 18,00]	[1,78; 10,95]	
	seltener als wöchentlich	Anzahl	186	166	153	145	136	124	110	93	84	75	66	62	51	57	
		Anteil in %	49,87	47,56	47,96	50,35	52,51	52,10	51,89	47,94	46,41	45,45	44,30	45,93	41,46	51,82	
		CI Anteil in %	[44,78; 54,95]	[42,32; 52,81]	[42,47; 53,45]	[44,56; 56,13]	[46,42; 58,60]	[45,74; 58,46]	[45,14; 58,63]	[40,89; 54,99]	[39,12; 53,69]	[37,83; 53,08]	[36,29; 52,30]	[37,49; 54,36]	[32,72; 50,21]	[42,44; 61,20]	
	keine	Anzahl	46	116	109	100	88	78	69	62	67	68	62	52	50	40	
		Anteil in %	12,33	33,24	34,17	34,72	33,98	32,77	32,55	31,96	37,02	41,21	41,61	38,52	40,65	36,36	
		CI Anteil in %	[8,99; 15,67]	[28,29; 38,19]	[28,96; 39,38]	[29,21; 40,23]	[28,20; 39,76]	[26,80; 38,75]	[26,22; 38,87]	[25,38; 38,54]	[29,96; 44,07]	[33,68; 48,75]	[33,67; 49,55]	[30,28; 46,76]	[31,93; 49,37]	[27,33; 45,39]	
	Patienten < 12 insgesamt		Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85
	auswertbar		Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	täglich	Anzahl	25	8	11	8	4	2	2	3	4	1	2	3	2	2	
		Anteil in %	10,00	3,39	5,09	4,08	2,29	1,24	1,40	2,26	3,23	0,87	1,85	3,06	2,25	2,47	
		CI Anteil in %	[6,27; 13,73]	[1,08; 5,70]	[2,15; 8,03]	[1,30; 6,86]	[0,07; 4,51]	[0,00; 2,96]	[0,00; 3,33]	[0,00; 4,79]	[0,10; 6,35]	[0,00; 2,57]	[0,00; 4,41]	[0,00; 6,49]	[0,00; 5,34]	[0,00; 5,87]	
	wöchentlich	Anzahl	59	32	22	22	17	18	14	21	11	6	10	11	10	4	
Anteil in %		23,60	13,56	10,19	11,22	9,71	11,18	9,79	15,79	8,87	5,22	9,26	11,22	11,24	4,94		
CI Anteil in %		[18,33; 28,87]	[9,18; 17,94]	[6,14; 14,23]	[6,79; 15,66]	[5,31; 14,11]	[6,30; 16,06]	[4,90; 14,68]	[9,57; 22,01]	[3,85; 13,90]	[1,14; 9,30]	[3,77; 14,75]	[4,94; 17,51]	[4,64; 17,83]	[0,19; 9,69]		
seltener als wöchentlich	Anzahl	134	112	103	97	93	92	77	62	58	55	46	45	38	47		
	Anteil in %	53,60	47,46	47,69	49,49	53,14	57,14	53,85	46,62	46,77	47,83	42,59	45,92	42,70	58,02		
	CI Anteil in %	[47,41; 59,79]	[41,07; 53,84]	[41,01; 54,36]	[42,47; 56,51]	[45,73; 60,56]	[49,47; 64,81]	[45,65; 62,05]	[38,11; 55,13]	[37,96; 55,59]	[38,66; 57,00]	[33,22; 51,96]	[36,00; 55,84]	[32,36; 53,03]	[47,21; 68,84]		
keine	Anzahl	32	84	80	69	61	49	50	47	51	53	50	39	39	28		
	Anteil in %	12,80	35,59	37,04	35,20	34,86	30,43	34,97	35,34	41,13	46,09	46,30	39,80	43,82	34,57		
	CI Anteil in %	[8,65; 16,95]	[29,47; 41,71]	[30,58; 43,49]	[28,50; 41,91]	[27,78; 41,94]	[23,30; 37,56]	[27,12; 42,81]	[27,18; 43,49]	[32,43; 49,83]	[36,94; 55,24]	[36,85; 55,74]	[30,05; 49,54]	[33,45; 54,19]	[24,15; 44,99]		

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930
	auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	988	863
	täglich	Anzahl	396	174	123	115	92	82	80	54	49	40	37	33	32
		Anteil in %	11,93	5,80	4,63	4,79	4,33	4,15	4,50	3,43	3,49	3,17	3,35	3,34	3,71
		CI Anteil in %	[10,83; 13,03]	[4,97; 6,64]	[3,83; 5,43]	[3,94; 5,65]	[3,47; 5,20]	[3,27; 5,03]	[3,54; 5,47]	[2,53; 4,33]	[2,53; 4,44]	[2,20; 4,13]	[2,29; 4,41]	[2,22; 4,46]	[2,45; 4,97]
	wöchentlich	Anzahl	664	390	338	250	199	180	168	152	111	116	90	78	68
		Anteil in %	20,01	13,01	12,72	10,42	9,37	9,12	9,45	9,66	7,89	9,18	8,15	7,89	7,88
		CI Anteil in %	[18,64; 21,37]	[11,80; 14,21]	[11,45; 13,98]	[9,19; 11,64]	[8,13; 10,61]	[7,85; 10,39]	[8,09; 10,81]	[8,20; 11,12]	[6,48; 9,30]	[7,59; 10,78]	[6,54; 9,77]	[6,21; 9,58]	[6,08; 9,68]
	seltener als wöchentlich	Anzahl	1910	1518	1285	1116	1040	947	830	760	704	640	562	487	408
		Anteil in %	57,55	50,63	48,34	46,50	48,96	47,97	46,71	48,32	50,07	50,67	50,91	49,29	47,28
		CI Anteil in %	[55,87; 59,23]	[48,84; 52,42]	[46,44; 50,24]	[44,50; 48,50]	[46,84; 51,09]	[45,77; 50,18]	[44,39; 49,03]	[45,85; 50,79]	[47,46; 52,69]	[47,91; 53,43]	[47,96; 53,86]	[46,17; 52,41]	[43,94; 50,61]
	keine	Anzahl	349	916	912	919	793	765	699	607	542	467	415	390	355
		Anteil in %	10,52	30,55	34,31	38,29	37,34	38,75	39,34	38,59	38,55	36,98	37,59	39,47	41,14
		CI Anteil in %	[9,47; 11,56]	[28,90; 32,20]	[32,51; 36,12]	[36,35; 40,24]	[35,28; 39,39]	[36,60; 40,90]	[37,06; 41,61]	[36,18; 41,00]	[36,00; 41,09]	[34,31; 39,64]	[34,73; 40,45]	[36,42; 42,52]	[37,85; 44,42]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710
	täglich	Anzahl	250	95	64	68	55	50	49	28	27	21	22	20	23
		Anteil in %	10,87	4,50	3,39	3,94	3,58	3,46	3,69	2,31	2,44	2,08	2,44	2,44	3,24
		CI Anteil in %	[9,60; 12,14]	[3,62; 5,39]	[2,57; 4,21]	[3,03; 4,86]	[2,65; 4,50]	[2,51; 4,40]	[2,67; 4,70]	[1,46; 3,15]	[1,53; 3,35]	[1,20; 2,96]	[1,43; 3,44]	[1,38; 3,49]	[1,94; 4,54]
	wöchentlich	Anzahl	420	235	218	146	112	102	113	102	70	73	53	44	42
		Anteil in %	18,26	11,14	11,55	8,47	7,28	7,05	8,50	8,40	6,33	7,23	5,87	5,36	5,92
		CI Anteil in %	[16,68; 19,84]	[9,80; 12,49]	[10,11; 13,00]	[7,15; 9,78]	[5,98; 8,58]	[5,73; 8,37]	[7,00; 10,00]	[6,84; 9,96]	[4,90; 7,77]	[5,63; 8,83]	[4,34; 7,40]	[3,82; 6,90]	[4,18; 7,65]
	seltener als wöchentlich	Anzahl	1408	1130	955	817	770	717	636	595	567	522	476	423	341
		Anteil in %	61,22	53,58	50,61	47,39	50,07	49,55	47,86	49,01	51,31	51,68	52,71	51,52	48,03
		CI Anteil in %	[59,23; 63,21]	[51,45; 55,71]	[48,35; 52,87]	[45,03; 49,75]	[47,57; 52,56]	[46,97; 52,13]	[45,17; 50,54]	[46,20; 51,82]	[48,36; 54,26]	[48,60; 54,77]	[49,45; 55,97]	[48,10; 54,94]	[44,35; 51,71]
	keine	Anzahl	222	649	650	693	601	578	531	489	441	394	352	334	304
		Anteil in %	9,65	30,77	34,45	40,20	39,08	39,94	39,95	40,28	39,91	39,01	38,98	40,68	42,82
CI Anteil in %		[8,45; 10,86]	[28,80; 32,74]	[32,30; 36,59]	[37,88; 42,51]	[36,64; 41,52]	[37,42; 42,47]	[37,32; 42,59]	[37,52; 43,04]	[37,02; 42,80]	[36,00; 42,02]	[35,80; 42,16]	[37,32; 44,04]	[39,17; 46,46]	

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818	
	auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4052	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676	
	täglich	Anzahl	767	278	227	171	149	136	119	97	100	72	64	49	
		Anteil in %	12,68	5,24	4,87	4,22	4,00	4,03	3,99	3,61	4,18	3,39	3,35	2,92	
		CI Anteil in %	[11,84; 13,52]	[4,64; 5,84]	[4,25; 5,49]	[3,60; 4,84]	[3,37; 4,62]	[3,36; 4,69]	[3,29; 4,70]	[2,90; 4,31]	[3,38; 4,98]	[2,62; 4,16]	[2,54; 4,16]	[2,12; 3,73]	
	wöchentlich	Anzahl	1271	658	504	423	386	333	286	220	194	144	144	111	
		Anteil in %	21,01	12,40	10,81	10,44	10,35	9,86	9,60	8,18	8,11	6,78	7,54	6,62	
		CI Anteil in %	[19,98; 22,04]	[11,52; 13,29]	[9,92; 11,70]	[9,50; 11,38]	[9,37; 11,33]	[8,86; 10,87]	[8,54; 10,66]	[7,15; 9,22]	[7,02; 9,20]	[5,71; 7,85]	[6,36; 8,73]	[5,43; 7,81]	
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3407	2701	2301	2008	1838	1682	1474	1367	1170	1087	961	832	
		Anteil in %	56,32	50,91	49,35	49,56	49,29	49,81	49,48	50,84	48,91	51,18	50,34	49,64	
		CI Anteil in %	[55,07; 57,57]	[49,57; 52,26]	[47,91; 50,78]	[48,02; 51,10]	[47,68; 50,89]	[48,12; 51,49]	[47,68; 51,28]	[48,95; 52,73]	[46,91; 50,92]	[49,05; 53,30]	[48,10; 52,58]	[47,25; 52,04]	
	keine	Anzahl	604	1668	1631	1450	1356	1226	1100	1005	928	821	740	684	
		Anteil in %	9,99	31,44	34,98	35,78	36,36	36,30	36,93	37,37	38,80	38,65	38,76	40,81	
		CI Anteil in %	[9,23; 10,74]	[30,19; 32,69]	[33,61; 36,35]	[34,31; 37,26]	[34,82; 37,91]	[34,68; 37,93]	[35,19; 38,66]	[35,55; 39,20]	[36,84; 40,75]	[36,58; 40,72]	[36,58; 40,95]	[38,46; 43,17]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375	
	täglich	Anzahl	466	159	119	104	84	73	66	55	59	40	36	29	
		Anteil in %	11,89	4,54	3,84	3,79	3,27	3,05	3,02	2,76	3,25	2,43	2,37	2,11	
		CI Anteil in %	[10,88; 12,90]	[3,85; 5,23]	[3,16; 4,51]	[3,08; 4,51]	[2,58; 3,96]	[2,36; 3,74]	[2,30; 3,74]	[2,04; 3,48]	[2,43; 4,06]	[1,68; 3,17]	[1,61; 3,14]	[1,35; 2,87]	
	wöchentlich	Anzahl	798	400	298	259	222	203	185	138	131	98	101	78	
		Anteil in %	20,36	11,41	9,61	9,45	8,64	8,47	8,47	6,93	7,21	5,95	6,65	5,67	
		CI Anteil in %	[19,10; 21,62]	[10,36; 12,47]	[8,57; 10,65]	[8,35; 10,54]	[7,55; 9,73]	[7,36; 9,59]	[7,31; 9,64]	[5,82; 8,05]	[6,02; 8,40]	[4,81; 7,09]	[5,40; 7,91]	[4,45; 6,90]	
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2309	1840	1571	1381	1311	1220	1125	1038	907	867	787	707	
		Anteil in %	58,92	52,50	50,66	50,36	51,03	50,92	51,53	52,16	49,92	52,64	51,84	51,42	
		CI Anteil in %	[57,38; 60,46]	[50,84; 54,15]	[48,90; 52,42]	[48,49; 52,24]	[49,10; 52,96]	[48,92; 52,92]	[49,44; 53,63]	[49,97; 54,36]	[47,62; 52,22]	[50,23; 55,05]	[49,33; 54,36]	[48,78; 54,06]	
	keine	Anzahl	346	1106	1113	998	952	900	807	759	720	642	594	561	
		Anteil in %	8,83	31,55	35,89	36,40	37,06	37,56	36,97	38,14	39,63	38,98	39,13	40,80	
CI Anteil in %		[7,94; 9,72]	[30,02; 33,09]	[34,20; 37,58]	[34,60; 38,20]	[35,19; 38,93]	[35,62; 39,50]	[34,94; 38,99]	[36,01; 40,28]	[37,38; 41,88]	[36,62; 41,34]	[36,67; 41,59]	[38,20; 43,40]		

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138		
	auswertbar	Anzahl	9767	8422	7239	6624	5918	5255	4673	4172	3748	3292	2900		
	täglich	Anzahl	1053	445	331	260	237	236	175	170	139	108	115		
		Anteil in %	10,78	5,28	4,57	3,93	4,00	4,49	3,74	4,07	3,71	3,28	3,97		
		CI Anteil in %	[10,17; 11,40]	[4,81; 5,76]	[4,09; 5,05]	[3,46; 4,39]	[3,51; 4,50]	[3,93; 5,05]	[3,20; 4,29]	[3,47; 4,67]	[3,10; 4,31]	[2,67; 3,89]	[3,26; 4,68]		
	wöchentlich	Anzahl	1990	1022	821	732	592	470	406	354	301	267	211		
		Anteil in %	20,37	12,13	11,34	11,05	10,00	8,94	8,69	8,49	8,03	8,11	7,28		
		CI Anteil in %	[19,58; 21,17]	[11,44; 12,83]	[10,61; 12,07]	[10,30; 11,81]	[9,24; 10,77]	[8,17; 9,72]	[7,88; 9,50]	[7,64; 9,33]	[7,16; 8,90]	[7,18; 9,04]	[6,33; 8,22]		
	seltener als wöchentlich	Anzahl	5652	4258	3635	3247	2952	2566	2277	1999	1777	1641	1390		
		Anteil in %	57,87	50,56	50,21	49,02	49,88	48,83	48,73	47,91	47,41	49,85	47,93		
		CI Anteil in %	[56,89; 58,85]	[49,49; 51,63]	[49,06; 51,37]	[47,81; 50,22]	[48,61; 51,16]	[47,48; 50,18]	[47,29; 50,16]	[46,40; 49,43]	[45,81; 49,01]	[48,14; 51,56]	[46,11; 49,75]		
	keine	Anzahl	1072	2697	2452	2385	2137	1983	1815	1649	1531	1276	1184		
		Anteil in %	10,98	32,02	33,87	36,01	36,11	37,74	38,84	39,53	40,85	38,76	40,83		
		CI Anteil in %	[10,36; 11,60]	[31,03; 33,02]	[32,78; 34,96]	[34,85; 37,16]	[34,89; 37,33]	[36,42; 39,05]	[37,44; 40,24]	[38,04; 41,01]	[39,27; 42,42]	[37,10; 40,43]	[39,04; 42,62]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497		
	auswertbar	Anzahl	6509	5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329		
	täglich	Anzahl	623	235	195	148	127	144	105	99	82	69	81		
		Anteil in %	9,57	4,10	3,92	3,21	3,03	3,76	3,02	3,12	2,81	2,66	3,48		
		CI Anteil in %	[8,86; 10,29]	[3,59; 4,61]	[3,38; 4,45]	[2,70; 3,71]	[2,51; 3,55]	[3,16; 4,37]	[2,45; 3,59]	[2,51; 3,72]	[2,21; 3,41]	[2,04; 3,28]	[2,73; 4,22]		
	wöchentlich	Anzahl	1288	615	526	455	370	316	274	240	212	194	160		
		Anteil in %	19,79	10,73	10,56	9,85	8,82	8,26	7,89	7,56	7,26	7,47	6,87		
		CI Anteil in %	[18,82; 20,76]	[9,93; 11,53]	[9,71; 11,42]	[9,00; 10,71]	[7,96; 9,68]	[7,39; 9,13]	[6,99; 8,78]	[6,64; 8,48]	[6,31; 8,20]	[6,46; 8,48]	[5,84; 7,90]		
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3961	3006	2570	2340	2201	1933	1738	1572	1437	1331	1138		
		Anteil in %	60,85	52,45	51,61	50,68	52,48	50,54	50,03	49,50	49,18	51,25	48,86		
		CI Anteil in %	[59,67; 62,04]	[51,16; 53,74]	[50,22; 52,99]	[49,24; 52,12]	[50,97; 53,99]	[48,95; 52,12]	[48,37; 51,69]	[47,76; 51,24]	[47,37; 50,99]	[49,33; 53,17]	[46,83; 50,89]		
	keine	Anzahl	637	1875	1689	1674	1496	1432	1357	1265	1191	1003	950		
		Anteil in %	9,79	32,72	33,92	36,26	35,67	37,44	39,06	39,83	40,76	38,62	40,79		
		CI Anteil in %	[9,06; 10,51]	[31,50; 33,93]	[32,60; 35,23]	[34,87; 37,64]	[34,22; 37,12]	[35,90; 38,97]	[37,44; 40,68]	[38,13; 41,53]	[38,98; 42,54]	[36,75; 40,49]	[38,79; 42,79]		

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373				
	auswertbar	Anzahl	10439	8619	7782	6742	5883	5188	4599	4044	3553	3110				
	täglich	Anzahl	1258	459	416	287	234	220	184	145	124	107				
		Anteil in %	12,05	5,33	5,35	4,26	3,98	4,24	4,00	3,59	3,49	3,44				
		CI Anteil in %	[11,43; 12,68]	[4,85; 5,80]	[4,85; 5,85]	[3,77; 4,74]	[3,48; 4,48]	[3,69; 4,79]	[3,43; 4,57]	[3,01; 4,16]	[2,89; 4,09]	[2,80; 4,08]				
	wöchentlich	Anzahl	2127	1062	849	651	545	461	410	311	286	241				
		Anteil in %	20,38	12,32	10,91	9,66	9,26	8,89	8,91	7,69	8,05	7,75				
		CI Anteil in %	[19,60; 21,15]	[11,63; 13,02]	[10,22; 11,60]	[8,95; 10,36]	[8,52; 10,00]	[8,11; 9,66]	[8,09; 9,74]	[6,87; 8,51]	[7,15; 8,94]	[6,81; 8,69]				
	seltener als wöchentlich	Anzahl	5855	4508	4003	3428	2987	2455	2192	1905	1654	1421				
		Anteil in %	56,09	52,30	51,44	50,85	50,77	47,32	47,66	47,11	46,55	45,69				
		CI Anteil in %	[55,14; 57,04]	[51,25; 53,36]	[50,33; 52,55]	[49,65; 52,04]	[49,50; 52,05]	[45,96; 48,68]	[46,22; 49,11]	[45,57; 48,65]	[44,91; 48,19]	[43,94; 47,44]				
	keine	Anzahl	1199	2590	2514	2376	2117	2052	1813	1683	1489	1341				
		Anteil in %	11,49	30,05	32,31	35,24	35,99	39,55	39,42	41,62	41,91	43,12				
		CI Anteil in %	[10,87; 12,10]	[29,08; 31,02]	[31,27; 33,34]	[34,10; 36,38]	[34,76; 37,21]	[38,22; 40,88]	[38,01; 40,83]	[40,10; 43,14]	[40,29; 43,53]	[41,38; 44,86]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538				
	auswertbar	Anzahl	6454	5487	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366				
	täglich	Anzahl	693	258	234	153	130	127	108	93	71	58				
		Anteil in %	10,74	4,70	4,63	3,43	3,24	3,52	3,30	3,15	2,69	2,45				
		CI Anteil in %	[9,98; 11,49]	[4,14; 5,26]	[4,05; 5,21]	[2,89; 3,96]	[2,69; 3,79]	[2,92; 4,13]	[2,69; 3,91]	[2,52; 3,78]	[2,07; 3,30]	[1,83; 3,07]				
	wöchentlich	Anzahl	1233	597	463	400	329	285	263	195	196	168				
		Anteil in %	19,10	10,88	9,16	8,96	8,20	7,91	8,03	6,60	7,41	7,10				
		CI Anteil in %	[18,15; 20,06]	[10,06; 11,70]	[8,36; 9,95]	[8,13; 9,80]	[7,35; 9,05]	[7,03; 8,79]	[7,10; 8,96]	[5,71; 7,50]	[6,41; 8,41]	[6,07; 8,14]				
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3810	2944	2735	2363	2150	1796	1623	1463	1286	1132				
		Anteil in %	59,03	53,65	54,08	52,96	53,58	49,85	49,57	49,54	48,64	47,84				
		CI Anteil in %	[57,83; 60,23]	[52,33; 54,97]	[52,71; 55,46]	[51,49; 54,42]	[52,03; 55,12]	[48,21; 51,48]	[47,86; 51,29]	[47,74; 51,35]	[46,73; 50,54]	[45,83; 49,86]				
	keine	Anzahl	718	1688	1625	1546	1404	1395	1280	1202	1091	1008				
		Anteil in %	11,12	30,76	32,13	34,65	34,99	38,72	39,10	40,70	41,26	42,60				
CI Anteil in %		[10,36; 11,89]	[29,54; 31,98]	[30,85; 33,42]	[33,25; 36,04]	[33,51; 36,46]	[37,13; 40,31]	[37,42; 40,77]	[38,93; 42,48]	[39,39; 43,14]	[40,61; 44,60]					

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370				
	auswertbar	Anzahl	9103	7730	6612	5746	5097	4484	4002	3494	3113				
	täglich	Anzahl	958	471	333	287	247	190	176	143	135				
		Anteil in %	10,52	6,09	5,04	4,99	4,85	4,24	4,40	4,09	4,34				
		CI Anteil in %	[9,89; 11,15]	[5,56; 6,63]	[4,51; 5,56]	[4,43; 5,56]	[4,26; 5,44]	[3,65; 4,83]	[3,76; 5,03]	[3,44; 4,75]	[3,62; 5,05]				
	wöchentlich	Anzahl	1932	1034	788	620	480	427	352	299	272				
		Anteil in %	21,22	13,38	11,92	10,79	9,42	9,52	8,80	8,56	8,74				
		CI Anteil in %	[20,38; 22,06]	[12,62; 14,14]	[11,14; 12,70]	[9,99; 11,59]	[8,62; 10,22]	[8,66; 10,38]	[7,92; 9,67]	[7,63; 9,49]	[7,75; 9,73]				
	seltener als wöchentlich	Anzahl	4957	4076	3461	2912	2570	2208	2004	1715	1489				
		Anteil in %	54,45	52,73	52,34	50,68	50,42	49,24	50,07	49,08	47,83				
		CI Anteil in %	[53,43; 55,48]	[51,62; 53,84]	[51,14; 53,55]	[49,39; 51,97]	[49,05; 51,79]	[47,78; 50,71]	[48,53; 51,62]	[47,43; 50,74]	[46,08; 49,59]				
	keine	Anzahl	1256	2149	2030	1927	1800	1659	1470	1337	1217				
		Anteil in %	13,80	27,80	30,70	33,54	35,31	37,00	36,73	38,27	39,09				
		CI Anteil in %	[13,09; 14,51]	[26,80; 28,80]	[29,59; 31,81]	[32,32; 34,76]	[34,00; 36,63]	[35,58; 38,41]	[35,24; 38,23]	[36,65; 39,88]	[37,38; 40,81]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397				
	auswertbar	Anzahl	5565	4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	täglich	Anzahl	517	242	155	137	133	92	97	83	66				
		Anteil in %	9,29	4,96	3,65	3,62	3,89	3,01	3,49	3,34	2,95				
		CI Anteil in %	[8,53; 10,05]	[4,35; 5,56]	[3,09; 4,22]	[3,03; 4,22]	[3,24; 4,54]	[2,41; 3,62]	[2,81; 4,18]	[2,63; 4,05]	[2,25; 3,65]				
	wöchentlich	Anzahl	1149	604	446	365	278	247	196	174	158				
		Anteil in %	20,65	12,37	10,51	9,65	8,13	8,09	7,06	7,00	7,05				
		CI Anteil in %	[19,58; 21,71]	[11,45; 13,29]	[9,59; 11,43]	[8,71; 10,60]	[7,21; 9,05]	[7,12; 9,05]	[6,11; 8,01]	[6,00; 8,01]	[5,99; 8,11]				
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3186	2721	2362	2011	1821	1584	1454	1283	1128				
		Anteil in %	57,25	55,72	55,67	53,19	53,26	51,87	52,36	51,65	50,36				
CI Anteil in %		[55,95; 58,55]	[54,33; 57,12]	[54,17; 57,16]	[51,60; 54,78]	[51,59; 54,93]	[50,09; 53,64]	[50,50; 54,22]	[49,68; 53,62]	[48,29; 52,43]					
keine	Anzahl	713	1316	1280	1268	1187	1131	1030	944	888					
	Anteil in %	12,81	26,95	30,17	33,54	34,72	37,03	37,09	38,00	39,64					
	CI Anteil in %	[11,93; 13,69]	[25,71; 28,20]	[28,79; 31,55]	[32,03; 35,04]	[33,12; 36,31]	[35,32; 38,75]	[35,29; 38,89]	[36,09; 39,91]	[37,62; 41,67]					

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822						
	auswertbar	Anzahl	7227	5958	5042	4396	3839	3345	2989	2627						
	täglich	Anzahl	887	288	279	197	166	139	114	83						
		Anteil in %	12,27	4,83	5,53	4,48	4,32	4,16	3,81	3,16						
		CI Anteil in %	[11,52; 13,03]	[4,29; 5,38]	[4,90; 6,16]	[3,87; 5,09]	[3,68; 4,97]	[3,48; 4,83]	[3,13; 4,50]	[2,49; 3,83]						
	wöchentlich	Anzahl	1580	789	594	440	374	296	262	217						
		Anteil in %	21,86	13,24	11,78	10,01	9,74	8,85	8,77	8,26						
		CI Anteil in %	[20,91; 22,82]	[12,38; 14,10]	[10,89; 12,67]	[9,12; 10,90]	[8,80; 10,68]	[7,89; 9,81]	[7,75; 9,78]	[7,21; 9,31]						
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3761	3151	2593	2287	1913	1649	1477	1289						
		Anteil in %	52,04	52,89	51,43	52,02	49,83	49,30	49,41	49,07						
		CI Anteil in %	[50,89; 53,19]	[51,62; 54,15]	[50,05; 52,81]	[50,55; 53,50]	[48,25; 51,41]	[47,60; 50,99]	[47,62; 51,21]	[47,16; 50,98]						
	keine	Anzahl	999	1730	1576	1472	1386	1261	1136	1038						
		Anteil in %	13,82	29,04	31,26	33,48	36,10	37,70	38,01	39,51						
		CI Anteil in %	[13,03; 14,62]	[27,88; 30,19]	[29,98; 32,54]	[32,09; 34,88]	[34,58; 37,62]	[36,06; 39,34]	[36,27; 39,75]	[37,64; 41,38]						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016						
	auswertbar	Anzahl	4439	3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888						
	täglich	Anzahl	508	163	154	111	86	79	60	40						
		Anteil in %	11,44	4,30	4,72	3,83	3,34	3,42	2,84	2,12						
		CI Anteil in %	[10,51; 12,38]	[3,65; 4,94]	[3,99; 5,45]	[3,13; 4,53]	[2,65; 4,04]	[2,68; 4,17]	[2,13; 3,55]	[1,47; 2,77]						
	wöchentlich	Anzahl	934	432	350	255	212	184	154	126						
		Anteil in %	21,04	11,39	10,73	8,79	8,24	7,98	7,28	6,67						
		CI Anteil in %	[19,84; 22,24]	[10,38; 12,40]	[9,67; 11,79]	[7,76; 9,82]	[7,18; 9,30]	[6,87; 9,08]	[6,18; 8,39]	[5,55; 7,80]						
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2441	2119	1755	1580	1357	1188	1096	973						
		Anteil in %	54,99	55,88	53,80	54,48	52,74	51,50	51,84	51,54						
CI Anteil in %		[53,53; 56,45]	[54,30; 57,46]	[52,09; 55,51]	[52,67; 56,30]	[50,81; 54,67]	[49,46; 53,54]	[49,71; 53,98]	[49,28; 53,79]							
keine	Anzahl	556	1078	1003	954	918	856	804	749							
	Anteil in %	12,53	28,43	30,75	32,90	35,68	37,10	38,03	39,67							
	CI Anteil in %	[11,55; 13,50]	[26,99; 29,86]	[29,16; 32,33]	[31,19; 34,61]	[33,83; 37,53]	[35,13; 39,08]	[35,96; 40,10]	[37,46; 41,88]							

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826							
	auswertbar	Anzahl	6667	5539	4621	3919	3446	3008	2618							
	täglich	Anzahl	852	349	254	196	155	133	104							
		Anteil in %	12,78	6,30	5,50	5,00	4,50	4,42	3,97							
		CI Anteil in %	[11,98; 13,58]	[5,66; 6,94]	[4,84; 6,15]	[4,32; 5,68]	[3,81; 5,19]	[3,69; 5,16]	[3,22; 4,72]							
	wöchentlich	Anzahl	1351	675	480	403	321	287	210							
		Anteil in %	20,26	12,19	10,39	10,28	9,32	9,54	8,02							
		CI Anteil in %	[19,30; 21,23]	[11,32; 13,05]	[9,51; 11,27]	[9,33; 11,23]	[8,34; 10,29]	[8,49; 10,59]	[6,98; 9,06]							
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3448	2894	2371	1991	1741	1535	1328							
		Anteil in %	51,72	52,25	51,31	50,80	50,52	51,03	50,73							
		CI Anteil in %	[50,52; 52,92]	[50,93; 53,56]	[49,87; 52,75]	[49,24; 52,37]	[48,85; 52,19]	[49,24; 52,82]	[48,81; 52,64]							
	keine	Anzahl	1016	1621	1516	1329	1229	1053	976							
		Anteil in %	15,24	29,27	32,81	33,91	35,66	35,01	37,28							
		CI Anteil in %	[14,38; 16,10]	[28,07; 30,46]	[31,45; 34,16]	[32,43; 35,39]	[34,06; 37,26]	[33,30; 36,71]	[35,43; 39,13]							
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005							
	auswertbar	Anzahl	4076	3508	3026	2638	2378	2116	1876							
	täglich	Anzahl	489	182	135	105	91	75	53							
		Anteil in %	12,00	5,19	4,46	3,98	3,83	3,54	2,83							
		CI Anteil in %	[11,00; 12,99]	[4,45; 5,92]	[3,73; 5,20]	[3,23; 4,73]	[3,06; 4,60]	[2,76; 4,33]	[2,08; 3,58]							
	wöchentlich	Anzahl	763	368	273	232	184	173	129							
		Anteil in %	18,72	10,49	9,02	8,79	7,74	8,18	6,88							
		CI Anteil in %	[17,52; 19,92]	[9,48; 11,50]	[8,00; 10,04]	[7,71; 9,88]	[6,66; 8,81]	[7,01; 9,34]	[5,73; 8,02]							
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2248	1937	1629	1421	1263	1112	985							
		Anteil in %	55,15	55,22	53,83	53,87	53,11	52,55	52,51							
CI Anteil in %		[53,63; 56,68]	[53,57; 56,86]	[52,06; 55,61]	[51,96; 55,77]	[51,11; 55,12]	[50,42; 54,68]	[50,24; 54,77]								
keine	Anzahl	576	1021	989	880	840	756	709								
	Anteil in %	14,13	29,10	32,68	33,36	35,32	35,73	37,79								
	CI Anteil in %	[13,06; 15,20]	[27,60; 30,61]	[31,01; 34,35]	[31,56; 35,16]	[33,40; 37,25]	[33,69; 37,77]	[35,60; 39,99]								

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291								
	auswertbar	Anzahl	6818	5584	4727	4067	3542	3076								
	täglich	Anzahl	787	298	221	189	162	124								
		Anteil in %	11,54	5,34	4,68	4,65	4,57	4,03								
		CI Anteil in %	[10,78; 12,30]	[4,75; 5,93]	[4,07; 5,28]	[4,00; 5,29]	[3,89; 5,26]	[3,34; 4,73]								
	wöchentlich	Anzahl	1468	619	513	355	319	253								
		Anteil in %	21,53	11,09	10,85	8,73	9,01	8,22								
		CI Anteil in %	[20,56; 22,51]	[10,26; 11,91]	[9,97; 11,74]	[7,86; 9,60]	[8,06; 9,95]	[7,25; 9,20]								
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3515	2937	2486	2141	1789	1515								
		Anteil in %	51,55	52,60	52,59	52,64	50,51	49,25								
		CI Anteil in %	[50,37; 52,74]	[51,29; 53,91]	[51,17; 54,02]	[51,11; 54,18]	[48,86; 52,15]	[47,49; 51,02]								
	keine	Anzahl	1048	1730	1507	1382	1272	1184								
		Anteil in %	15,37	30,98	31,88	33,98	35,91	38,49								
		CI Anteil in %	[14,51; 16,23]	[29,77; 32,19]	[30,55; 33,21]	[32,52; 35,44]	[34,33; 37,49]	[36,77; 40,21]								
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241								
	auswertbar	Anzahl	4191	3529	3048	2679	2384	2114								
	täglich	Anzahl	442	162	117	101	85	64								
		Anteil in %	10,55	4,59	3,84	3,77	3,57	3,03								
		CI Anteil in %	[9,62; 11,48]	[3,90; 5,28]	[3,16; 4,52]	[3,05; 4,49]	[2,82; 4,31]	[2,30; 3,76]								
	wöchentlich	Anzahl	901	347	296	211	192	160								
		Anteil in %	21,50	9,83	9,71	7,88	8,05	7,57								
		CI Anteil in %	[20,25; 22,74]	[8,85; 10,82]	[8,66; 10,76]	[6,86; 8,90]	[6,96; 9,15]	[6,44; 8,70]								
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2249	1929	1673	1475	1246	1066								
		Anteil in %	53,66	54,66	54,89	55,06	52,27	50,43								
		CI Anteil in %	[52,15; 55,17]	[53,02; 56,30]	[53,12; 56,66]	[53,17; 56,94]	[50,26; 54,27]	[48,29; 52,56]								
	keine	Anzahl	599	1091	962	892	861	824								
		Anteil in %	14,29	30,92	31,56	33,30	36,12	38,98								
CI Anteil in %		[13,23; 15,35]	[29,39; 32,44]	[29,91; 33,21]	[31,51; 35,08]	[34,19; 38,04]	[36,90; 41,06]									

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731									
	auswertbar	Anzahl	6677	5496	4636	4026	3474									
	täglich	Anzahl	750	293	205	180	133									
		Anteil in %	11,23	5,33	4,42	4,47	3,83									
		CI Anteil in %	[10,48; 11,99]	[4,74; 5,93]	[3,83; 5,01]	[3,83; 5,11]	[3,19; 4,47]									
	wöchentlich	Anzahl	1324	667	489	406	309									
		Anteil in %	19,83	12,14	10,55	10,08	8,89									
		CI Anteil in %	[18,87; 20,79]	[11,27; 13,00]	[9,66; 11,43]	[9,15; 11,01]	[7,95; 9,84]									
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3524	2925	2452	2130	1797									
		Anteil in %	52,78	53,22	52,89	52,91	51,73									
		CI Anteil in %	[51,58; 53,98]	[51,90; 54,54]	[51,45; 54,33]	[51,36; 54,45]	[50,07; 53,39]									
	keine	Anzahl	1079	1611	1490	1310	1235									
		Anteil in %	16,16	29,31	32,14	32,54	35,55									
		CI Anteil in %	[15,28; 17,04]	[28,11; 30,52]	[30,80; 33,48]	[31,09; 33,99]	[33,96; 37,14]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591									
	auswertbar	Anzahl	4244	3611	3119	2750	2432									
	täglich	Anzahl	433	162	117	95	72									
		Anteil in %	10,20	4,49	3,75	3,45	2,96									
		CI Anteil in %	[9,29; 11,11]	[3,81; 5,16]	[3,08; 4,42]	[2,77; 4,14]	[2,29; 3,63]									
	wöchentlich	Anzahl	824	375	285	256	177									
		Anteil in %	19,42	10,38	9,14	9,31	7,28									
		CI Anteil in %	[18,23; 20,61]	[9,39; 11,38]	[8,13; 10,15]	[8,22; 10,40]	[6,25; 8,31]									
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2343	2005	1723	1520	1323									
		Anteil in %	55,21	55,52	55,24	55,27	54,40									
		CI Anteil in %	[53,71; 56,70]	[53,90; 57,15]	[53,50; 56,99]	[53,41; 57,13]	[52,42; 56,38]									
	keine	Anzahl	644	1069	994	879	860									
		Anteil in %	15,17	29,60	31,87	31,96	35,36									
		CI Anteil in %	[14,09; 16,25]	[28,11; 31,09]	[30,23; 33,50]	[30,22; 33,71]	[33,46; 37,26]									

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847										
	auswertbar	Anzahl	6222	5076	4214	3564										
	täglich	Anzahl	750	269	204	140										
		Anteil in %	12,05	5,30	4,84	3,93										
		CI Anteil in %	[11,24; 12,86]	[4,68; 5,92]	[4,19; 5,49]	[3,29; 4,57]										
	wöchentlich	Anzahl	1178	626	427	345										
		Anteil in %	18,93	12,33	10,13	9,68										
		CI Anteil in %	[17,96; 19,91]	[11,43; 13,24]	[9,22; 11,04]	[8,71; 10,65]										
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3283	2641	2201	1802										
		Anteil in %	52,76	52,03	52,23	50,56										
		CI Anteil in %	[51,52; 54,00]	[50,65; 53,40]	[50,72; 53,74]	[48,92; 52,20]										
	keine	Anzahl	1011	1540	1382	1277										
		Anteil in %	16,25	30,34	32,80	35,83										
		CI Anteil in %	[15,33; 17,17]	[29,07; 31,60]	[31,38; 34,21]	[34,26; 37,41]										
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581										
	auswertbar	Anzahl	3862	3260	2800	2427										
	täglich	Anzahl	420	143	111	80										
		Anteil in %	10,88	4,39	3,96	3,30										
		CI Anteil in %	[9,89; 11,86]	[3,68; 5,09]	[3,24; 4,69]	[2,59; 4,01]										
	wöchentlich	Anzahl	714	356	254	197										
		Anteil in %	18,49	10,92	9,07	8,12										
		CI Anteil in %	[17,26; 19,71]	[9,85; 11,99]	[8,01; 10,14]	[7,03; 9,20]										
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2150	1796	1511	1281										
		Anteil in %	55,67	55,09	53,96	52,78										
CI Anteil in %		[54,10; 57,24]	[53,38; 56,80]	[52,12; 55,81]	[50,79; 54,77]											
keine	Anzahl	578	965	924	869											
	Anteil in %	14,97	29,60	33,00	35,81											
	CI Anteil in %	[13,84; 16,09]	[28,03; 31,17]	[31,26; 34,74]	[33,90; 37,71]											

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553											
	auswertbar	Anzahl	6269	5147	4245											
	täglich	Anzahl	737	287	205											
		Anteil in %	11,76	5,58	4,83											
		CI Anteil in %	[10,96; 12,55]	[4,95; 6,20]	[4,18; 5,47]											
	wöchentlich	Anzahl	1243	624	437											
		Anteil in %	19,83	12,12	10,29											
		CI Anteil in %	[18,84; 20,81]	[11,23; 13,02]	[9,38; 11,21]											
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3222	2719	2242											
		Anteil in %	51,40	52,83	52,82											
		CI Anteil in %	[50,16; 52,63]	[51,46; 54,19]	[51,31; 54,32]											
	keine	Anzahl	1067	1517	1361											
		Anteil in %	17,02	29,47	32,06											
		CI Anteil in %	[16,09; 17,95]	[28,23; 30,72]	[30,66; 33,47]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022											
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2877											
	täglich	Anzahl	407	147	109											
		Anteil in %	10,29	4,37	3,79											
		CI Anteil in %	[9,34; 11,23]	[3,68; 5,06]	[3,09; 4,49]											
	wöchentlich	Anzahl	751	348	258											
		Anteil in %	18,98	10,34	8,97											
		CI Anteil in %	[17,76; 20,20]	[9,31; 11,37]	[7,92; 10,01]											
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2202	1922	1602											
		Anteil in %	55,65	57,10	55,68											
CI Anteil in %		[54,10; 57,20]	[55,43; 58,77]	[53,87; 57,50]												
keine	Anzahl	597	949	908												
	Anteil in %	15,09	28,19	31,56												
	CI Anteil in %	[13,97; 16,20]	[26,67; 29,71]	[29,86; 33,26]												

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721												
	auswertbar	Anzahl	6684	5430												
	täglich	Anzahl	649	234												
		Anteil in %	9,71	4,31												
		CI Anteil in %	[9,00; 10,42]	[3,77; 4,85]												
	wöchentlich	Anzahl	1298	579												
		Anteil in %	19,42	10,66												
		CI Anteil in %	[18,47; 20,37]	[9,84; 11,48]												
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3547	2898												
		Anteil in %	53,07	53,37												
		CI Anteil in %	[51,87; 54,26]	[52,04; 54,70]												
	keine	Anzahl	1190	1719												
		Anteil in %	17,80	31,66												
		CI Anteil in %	[16,89; 18,72]	[30,42; 32,89]												
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782												
	auswertbar	Anzahl	4314	3629												
	täglich	Anzahl	387	139												
		Anteil in %	8,97	3,83												
		CI Anteil in %	[8,12; 9,82]	[3,21; 4,45]												
	wöchentlich	Anzahl	842	347												
		Anteil in %	19,52	9,56												
		CI Anteil in %	[18,33; 20,70]	[8,60; 10,52]												
	seltener als wöchentlich	Anzahl	2400	2026												
Anteil in %		55,63	55,83													
CI Anteil in %		[54,15; 57,12]	[54,21; 57,44]													
keine	Anzahl	685	1117													
	Anteil in %	15,88	30,78													
	CI Anteil in %	[14,79; 16,97]	[29,28; 32,28]													

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	Patienten < 18 insgesamt		Anzahl	5942													
	auswertbar		Anzahl	5942													
	täglich		Anzahl	617													
			Anteil in %	10,38													
			CI Anteil in %	[9,61; 11,16]													
	wöchentlich		Anzahl	1171													
			Anteil in %	19,71													
			CI Anteil in %	[18,70; 20,72]													
	seltener als wöchentlich		Anzahl	3072													
			Anteil in %	51,70													
			CI Anteil in %	[50,43; 52,97]													
	keine		Anzahl	1082													
			Anteil in %	18,21													
			CI Anteil in %	[17,23; 19,19]													
	Patienten < 12 insgesamt		Anzahl	3748													
	auswertbar		Anzahl	3748													
	täglich		Anzahl	327													
			Anteil in %	8,72													
			CI Anteil in %	[7,82; 9,63]													
wöchentlich		Anzahl	697														
		Anteil in %	18,60														
		CI Anteil in %	[17,35; 19,84]														
seltener als wöchentlich		Anzahl	2101														
		Anteil in %	56,06														
		CI Anteil in %	[54,47; 57,65]														
keine		Anzahl	623														
		Anteil in %	16,62														
		CI Anteil in %	[15,43; 17,81]														

Tabelle 3.2.2 gibt für die jeweiligen Berichtshalbjahre Auskunft über die **Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen** bzw. ob diese sich bei den Programmteilnehmern seit der letzten Dokumentation verbessert haben, gleichgeblieben sind oder sich verschlechtert haben. Für das Beitrittsjahr können - mangels einer vorherigen Dokumentation - keine Werte ausgewiesen werden. Betrachtet werden daher alle Versicherten, die jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Berichtshalbjahren Programmteilnehmer waren. Hierbei wird unter „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Pati-

enten angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den drei Kategorien (Verbesserung der Asthmasymptome, gleichbleibende Asthmasymptome, Verschlechterung der Asthmasymptome) über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Patienten angegeben.

Tabelle 3.2.2 Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt		Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	auswertbar		Anzahl		349	316	287	256	237	208	192	179	165	148	132	121	108
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl			146	61	69	51	45	37	41	40	41	24	15	21	17
		Anteil in %			41,83	19,30	24,04	19,92	18,99	17,79	21,35	22,35	24,85	16,22	11,36	17,36	15,74
		CI Anteil in %			[36,65; 47,02]	[14,95; 23,66]	[19,09; 28,99]	[15,02; 24,82]	[13,98; 23,99]	[12,58; 23,00]	[15,54; 27,17]	[16,23; 28,47]	[18,23; 31,46]	[10,26; 22,17]	[5,93; 16,80]	[10,58; 24,13]	[8,84; 22,64]
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl			163	190	155	160	140	134	111	111	97	100	96	81	73
		Anteil in %			46,70	60,13	54,01	62,50	59,07	64,42	57,81	62,01	58,79	67,57	72,73	66,94	67,59
		CI Anteil in %			[41,46; 51,95]	[54,72; 65,53]	[48,23; 59,78]	[56,56; 68,44]	[52,80; 65,35]	[57,90; 70,95]	[50,81; 64,82]	[54,88; 69,14]	[51,25; 66,32]	[60,00; 75,14]	[65,10; 80,35]	[58,53; 75,36]	[58,72; 76,46]
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl			40	65	63	45	52	37	40	28	27	24	21	19	18
		Anteil in %			11,46	20,57	21,95	17,58	21,94	17,79	20,83	15,64	16,36	16,22	15,91	15,70	16,67
		CI Anteil in %			[8,11; 14,81]	[16,11; 25,03]	[17,15; 26,75]	[12,91; 22,25]	[16,66; 27,22]	[12,58; 23,00]	[15,07; 26,59]	[10,31; 20,98]	[10,70; 22,03]	[10,26; 22,17]	[9,65; 22,17]	[9,19; 22,21]	[9,61; 23,73]
	Patienten < 12 insgesamt		Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85
	auswertbar		Anzahl		236	214	195	173	160	140	132	122	115	107	97	87	80
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl			102	45	46	41	27	31	29	31	28	17	11	20	14
		Anteil in %			43,22	21,03	23,59	23,70	16,88	22,14	21,97	25,41	24,35	15,89	11,34	22,99	17,50
		CI Anteil in %			[36,89; 49,55]	[15,56; 26,50]	[17,62; 29,56]	[17,34; 30,05]	[11,05; 22,70]	[15,24; 29,05]	[14,88; 29,06]	[17,65; 33,17]	[16,47; 32,23]	[8,93; 22,85]	[5,00; 17,68]	[14,10; 31,88]	[9,12; 25,88]
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl			103	121	102	98	99	85	70	70	71	72	66	52	50
		Anteil in %			43,64	56,54	52,31	56,65	61,88	60,71	53,03	57,38	61,74	67,29	68,04	59,77	62,50
		CI Anteil in %			[37,30; 49,99]	[49,88; 63,20]	[45,28; 59,34]	[49,24; 64,05]	[54,33; 69,42]	[52,60; 68,83]	[44,48; 61,58]	[48,57; 66,19]	[52,82; 70,66]	[58,36; 76,22]	[58,71; 77,37]	[49,41; 70,13]	[51,82; 73,18]
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl			31	48	47	34	34	24	33	21	16	18	20	15	16
Anteil in %				13,14	22,43	24,10	19,65	21,25	17,14	25,00	17,21	13,91	16,82	20,62	17,24	20,00	
CI Anteil in %				[8,82; 17,45]	[16,83; 28,03]	[18,08; 30,12]	[13,71; 25,59]	[14,89; 27,61]	[10,88; 23,41]	[17,58; 32,42]	[10,49; 23,94]	[7,56; 20,27]	[9,70; 23,94]	[12,53; 28,71]	[9,26; 25,22]	[11,18; 28,82]	

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930	
	auswertbar	Anzahl		2998	2622	2353	2100	1904	1744	1545	1377	1234	1087	965	846	
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1180	585	509	438	357	303	268	232	178	154	140	140	
		Anteil in %		39,36	22,31	21,63	20,86	18,75	17,37	17,35	16,85	14,42	14,17	14,51	16,55	
		CI Anteil in %		[37,61; 41,11]	[20,72; 23,91]	[19,97; 23,30]	[19,12; 22,60]	[17,00; 20,50]	[15,60; 19,15]	[15,46; 19,23]	[14,87; 18,83]	[12,46; 16,39]	[12,09; 16,24]	[12,28; 16,73]	[14,04; 19,05]	
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		1455	1570	1462	1229	1231	1147	1030	956	872	784	699	592	
		Anteil in %		48,53	59,88	62,13	58,52	64,65	65,77	66,67	69,43	70,66	72,13	72,44	69,98	
		CI Anteil in %		[46,74; 50,32]	[58,00; 61,75]	[60,17; 64,09]	[56,42; 60,63]	[62,51; 66,80]	[63,54; 68,00]	[64,32; 69,02]	[66,99; 71,86]	[68,12; 73,21]	[69,46; 74,79]	[69,61; 75,26]	[66,89; 73,07]	
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		363	467	382	433	316	294	247	189	184	149	126	114	
		Anteil in %		12,11	17,81	16,23	20,62	16,60	16,86	15,99	13,73	14,91	13,71	13,06	13,48	
		CI Anteil in %		[10,94; 13,28]	[16,35; 19,28]	[14,74; 17,72]	[18,89; 22,35]	[14,93; 18,27]	[15,10; 18,62]	[14,16; 17,82]	[11,91; 15,54]	[12,92; 16,90]	[11,66; 15,75]	[10,93; 15,18]	[11,17; 15,78]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770	
	auswertbar	Anzahl		2109	1862	1694	1523	1400	1309	1192	1086	985	891	804	698	
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		858	428	383	306	268	231	224	186	148	129	114	117	
		Anteil in %		40,68	22,99	22,61	20,09	19,14	17,65	18,79	17,13	15,03	14,48	14,18	16,76	
		CI Anteil in %		[38,59; 42,78]	[21,07; 24,90]	[20,62; 24,60]	[18,08; 22,10]	[17,08; 21,20]	[15,58; 19,71]	[16,57; 21,01]	[14,89; 19,37]	[12,79; 17,26]	[12,17; 16,79]	[11,77; 16,59]	[13,99; 19,54]	
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		1001	1089	1048	912	898	847	784	739	693	637	587	481	
		Anteil in %		47,46	58,49	61,87	59,88	64,14	64,71	65,77	68,05	70,36	71,49	73,01	68,91	
		CI Anteil in %		[45,33; 49,59]	[56,25; 60,72]	[59,55; 64,18]	[57,42; 62,34]	[61,63; 66,66]	[62,12; 67,30]	[63,08; 68,47]	[65,27; 70,82]	[67,50; 73,21]	[68,53; 74,46]	[69,94; 76,08]	[65,47; 72,35]	
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		250	345	263	305	234	231	184	161	144	125	103	100	
Anteil in %			11,85	18,53	15,53	20,03	16,71	17,65	15,44	14,83	14,62	14,03	12,81	14,33		
CI Anteil in %			[10,47; 13,23]	[16,76; 20,29]	[13,80; 17,25]	[18,02; 22,04]	[14,76; 18,67]	[15,58; 19,71]	[13,38; 17,49]	[12,71; 16,94]	[12,41; 16,83]	[11,75; 16,31]	[10,50; 15,12]	[11,73; 16,93]		
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818		
	auswertbar	Anzahl		5305	4579	3972	3562	3307	2923	2617	2340	2078	1861	1637		
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		2261	947	834	682	579	514	484	376	318	272	267		
		Anteil in %		42,62	20,68	21,00	19,15	17,51	17,58	18,49	16,07	15,30	14,62	16,31		
		CI Anteil in %		[41,29; 43,95]	[19,51; 21,85]	[19,73; 22,26]	[17,85; 20,44]	[16,21; 18,80]	[16,20; 18,97]	[17,01; 19,98]	[14,58; 17,56]	[13,75; 16,85]	[13,01; 16,22]	[14,52; 18,10]		
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2503	2900	2364	2274	2169	1946	1738	1614	1479	1318	1159		
		Anteil in %		47,18	63,33	59,52	63,84	65,59	66,58	66,41	68,97	71,17	70,82	70,80		
		CI Anteil in %		[45,84; 48,53]	[61,94; 64,73]	[57,99; 61,04]	[62,26; 65,42]	[63,97; 67,21]	[64,87; 68,29]	[64,60; 68,22]	[67,10; 70,85]	[69,23; 73,12]	[68,76; 72,89]	[68,60; 73,00]		
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		541	732	774	606	559	463	395	350	281	271	211		
		Anteil in %		10,20	15,99	19,49	17,01	16,90	15,84	15,09	14,96	13,52	14,56	12,89		
		CI Anteil in %		[9,38; 11,01]	[14,92; 17,05]	[18,25; 20,72]	[15,78; 18,25]	[15,63; 18,18]	[14,52; 17,16]	[13,72; 16,47]	[13,51; 16,40]	[12,05; 14,99]	[12,96; 16,17]	[11,27; 14,51]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467		
	auswertbar	Anzahl		3505	3055	2689	2461	2349	2149	1952	1779	1612	1484	1343		
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1529	673	554	488	431	369	377	290	253	210	223		
		Anteil in %		43,62	22,03	20,60	19,83	18,35	17,17	19,31	16,30	15,69	14,15	16,60		
		CI Anteil in %		[41,98; 45,27]	[20,56; 23,50]	[19,07; 22,13]	[18,25; 21,40]	[16,78; 19,91]	[15,58; 18,77]	[17,56; 21,07]	[14,58; 18,02]	[13,92; 17,47]	[12,38; 15,92]	[14,61; 18,60]		
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		1616	1890	1584	1555	1528	1421	1279	1221	1138	1061	946		
		Anteil in %		46,11	61,87	58,91	63,19	65,05	66,12	65,52	68,63	70,60	71,50	70,44		
		CI Anteil in %		[44,46; 47,76]	[60,14; 63,59]	[57,05; 60,77]	[61,28; 65,09]	[63,12; 66,98]	[64,12; 68,13]	[63,41; 67,63]	[66,48; 70,79]	[68,37; 72,82]	[69,20; 73,79]	[68,00; 72,88]		
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		360	492	551	418	390	359	296	268	221	213	174		
Anteil in %			10,27	16,10	20,49	16,98	16,60	16,71	15,16	15,06	13,71	14,35	12,96			
CI Anteil in %			[9,27; 11,28]	[14,80; 17,41]	[18,96; 22,02]	[15,50; 18,47]	[15,10; 18,11]	[15,13; 18,28]	[13,57; 16,76]	[13,40; 16,73]	[12,03; 15,39]	[12,57; 16,14]	[11,16; 14,75]			

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138				
	auswertbar	Anzahl		8422	7066	6298	5783	5155	4573	4069	3631	3230	2821				
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		3368	1572	1285	1003	890	815	643	548	455	405				
		Anteil in %		39,99	22,25	20,40	17,34	17,26	17,82	15,80	15,09	14,09	14,36				
		CI Anteil in %		[38,94; 41,04]	[21,28; 23,22]	[19,41; 21,40]	[16,37; 18,32]	[16,23; 18,30]	[16,71; 18,93]	[14,68; 16,92]	[13,93; 16,26]	[12,89; 15,29]	[13,06; 15,65]				
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		4237	4056	3934	3847	3494	3081	2828	2614	2343	2040				
		Anteil in %		50,31	57,40	62,46	66,52	67,78	67,37	69,50	71,99	72,54	72,31				
		CI Anteil in %		[49,24; 51,38]	[56,25; 58,55]	[61,27; 63,66]	[65,31; 67,74]	[66,50; 69,05]	[66,01; 68,73]	[68,09; 70,92]	[70,53; 73,45]	[71,00; 74,08]	[70,66; 73,97]				
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		817	1438	1079	933	771	677	598	469	432	376				
		Anteil in %		9,70	20,35	17,13	16,13	14,96	14,80	14,70	12,92	13,37	13,33				
		CI Anteil in %		[9,07; 10,33]	[19,41; 21,29]	[16,20; 18,06]	[15,19; 17,08]	[13,98; 15,93]	[13,77; 15,83]	[13,61; 15,78]	[11,83; 14,01]	[12,20; 14,55]	[12,07; 14,58]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497				
	auswertbar	Anzahl		5731	4883	4413	4118	3755	3408	3102	2838	2556	2266				
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		2391	1047	930	720	656	624	499	428	363	331				
		Anteil in %		41,72	21,44	21,07	17,48	17,47	18,31	16,09	15,08	14,20	14,61				
		CI Anteil in %		[40,44; 43,00]	[20,29; 22,59]	[19,87; 22,28]	[16,32; 18,64]	[16,26; 18,68]	[17,01; 19,61]	[14,79; 17,38]	[13,76; 16,40]	[12,85; 15,56]	[13,15; 16,06]				
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2805	2802	2730	2716	2514	2279	2157	2021	1834	1637				
		Anteil in %		48,94	57,38	61,86	65,95	66,95	66,87	69,54	71,21	71,75	72,24				
		CI Anteil in %		[47,65; 50,24]	[56,00; 58,77]	[60,43; 63,30]	[64,51; 67,40]	[65,45; 68,46]	[65,29; 68,45]	[67,92; 71,16]	[69,55; 72,88]	[70,01; 73,50]	[70,40; 74,09]				
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		535	1034	753	682	585	505	446	389	359	298				
Anteil in %			9,34	21,18	17,06	16,56	15,58	14,82	14,38	13,71	14,05	13,15					
CI Anteil in %			[8,58; 10,09]	[20,03; 22,32]	[15,95; 18,17]	[15,43; 17,70]	[14,42; 16,74]	[13,63; 16,01]	[13,14; 15,61]	[12,44; 14,97]	[12,70; 15,39]	[11,76; 14,54]					
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373					
	auswertbar	Anzahl		8619	7314	6583	5740	5037	4492	3936	3464	3019					
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		3422	1527	1307	1036	915	754	674	513	462					
		Anteil in %		39,70	20,88	19,85	18,05	18,17	16,79	17,12	14,81	15,30					
		CI Anteil in %		[38,67; 40,74]	[19,95; 21,81]	[18,89; 20,82]	[17,05; 19,04]	[17,10; 19,23]	[15,69; 17,88]	[15,95; 18,30]	[13,63; 15,99]	[14,02; 16,59]					
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		4178	4510	4257	3784	3389	3036	2723	2482	2148					
		Anteil in %		48,47	61,66	64,67	65,92	67,28	67,59	69,18	71,65	71,15					
		CI Anteil in %		[47,42; 49,53]	[60,55; 62,78]	[63,51; 65,82]	[64,70; 67,15]	[65,99; 68,58]	[66,22; 68,96]	[67,74; 70,62]	[70,15; 73,15]	[69,53; 72,77]					
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1019	1277	1019	920	733	702	539	469	409					
		Anteil in %		11,82	17,46	15,48	16,03	14,55	15,63	13,69	13,54	13,55					
		CI Anteil in %		[11,14; 12,50]	[16,59; 18,33]	[14,61; 16,35]	[15,08; 16,98]	[13,58; 15,53]	[14,57; 16,69]	[12,62; 14,77]	[12,40; 14,68]	[12,33; 14,77]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538					
	auswertbar	Anzahl		5487	4778	4371	3922	3519	3196	2880	2583	2296					
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		2197	992	868	707	644	551	492	376	355					
		Anteil in %		40,04	20,76	19,86	18,03	18,30	17,24	17,08	14,56	15,46					
		CI Anteil in %		[38,74; 41,34]	[19,61; 21,91]	[18,68; 21,04]	[16,82; 19,23]	[17,02; 19,58]	[15,93; 18,55]	[15,71; 18,46]	[13,20; 15,92]	[13,98; 16,94]					
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2667	2935	2796	2582	2362	2140	1979	1862	1633					
		Anteil in %		48,61	61,43	63,97	65,83	67,12	66,96	68,72	72,09	71,12					
		CI Anteil in %		[47,28; 49,93]	[60,05; 62,81]	[62,54; 65,39]	[64,35; 67,32]	[65,57; 68,67]	[65,33; 68,59]	[67,02; 70,41]	[70,36; 73,82]	[69,27; 72,98]					
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		623	851	707	633	513	505	409	345	308					
Anteil in %			11,35	17,81	16,17	16,14	14,58	15,80	14,20	13,36	13,41						
CI Anteil in %			[10,51; 12,19]	[16,73; 18,90]	[15,08; 17,27]	[14,99; 17,29]	[13,41; 15,74]	[14,54; 17,07]	[12,93; 15,48]	[12,04; 14,67]	[12,02; 14,81]						

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370					
	auswertbar	Anzahl		7730	6419	5615	4963	4388	3884	3400	3018					
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		2610	1330	1063	840	726	607	537	431					
		Anteil in %		33,76	20,72	18,93	16,93	16,55	15,63	15,79	14,28					
	CI Anteil in %			[32,71; 34,82]	[19,73; 21,71]	[17,91; 19,96]	[15,88; 17,97]	[15,45; 17,64]	[14,49; 16,77]	[14,57; 17,02]	[13,03; 15,53]					
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		4198	4060	3717	3408	3033	2687	2438	2185					
		Anteil in %		54,31	63,25	66,20	68,67	69,12	69,18	71,71	72,40					
	CI Anteil in %			[53,20; 55,42]	[62,07; 64,43]	[64,96; 67,44]	[67,38; 69,96]	[67,75; 70,49]	[67,73; 70,63]	[70,19; 73,22]	[70,80; 73,99]					
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		922	1029	835	715	629	590	425	402					
		Anteil in %		11,93	16,03	14,87	14,41	14,33	15,19	12,50	13,32					
	CI Anteil in %			[11,20; 12,65]	[15,13; 16,93]	[13,94; 15,80]	[13,43; 15,38]	[13,30; 15,37]	[14,06; 16,32]	[11,39; 13,61]	[12,11; 14,53]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397					
	auswertbar	Anzahl		4883	4159	3708	3343	2997	2703	2429	2182					
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1667	889	712	562	515	423	370	331					
		Anteil in %		34,14	21,38	19,20	16,81	17,18	15,65	15,23	15,17					
	CI Anteil in %			[32,81; 35,47]	[20,13; 22,62]	[17,93; 20,47]	[15,54; 18,08]	[15,83; 18,53]	[14,28; 17,02]	[13,80; 16,66]	[13,66; 16,68]					
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2630	2616	2435	2277	2074	1874	1755	1587					
		Anteil in %		53,86	62,90	65,67	68,11	69,20	69,33	72,25	72,73					
CI Anteil in %			[52,46; 55,26]	[61,43; 64,37]	[64,14; 67,20]	[66,53; 69,69]	[67,55; 70,86]	[67,59; 71,07]	[70,47; 74,03]	[70,86; 74,60]						
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		586	654	561	504	408	406	304	264						
	Anteil in %		12,00	15,72	15,13	15,08	13,61	15,02	12,52	12,10						
CI Anteil in %			[11,09; 12,91]	[14,62; 16,83]	[13,98; 16,28]	[13,86; 16,29]	[12,39; 14,84]	[13,67; 16,37]	[11,20; 13,83]	[10,73; 13,47]						
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822						
	auswertbar	Anzahl		5958	4957	4303	3744	3281	2919	2563						
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		2136	941	818	652	531	416	384						
		Anteil in %		35,85	18,98	19,01	17,41	16,18	14,25	14,98						
	CI Anteil in %			[34,63; 37,07]	[17,89; 20,08]	[17,84; 20,18]	[16,20; 18,63]	[14,92; 17,44]	[12,98; 15,52]	[13,60; 16,36]						
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		3205	3192	2857	2554	2303	2124	1863						
		Anteil in %		53,79	64,39	66,40	68,22	70,19	72,76	72,69						
	CI Anteil in %			[52,53; 55,06]	[63,06; 65,73]	[64,98; 67,81]	[66,72; 69,71]	[68,63; 71,76]	[71,15; 74,38]	[70,96; 74,41]						
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		617	824	628	538	447	379	316						
		Anteil in %		10,36	16,62	14,59	14,37	13,62	12,98	12,33						
	CI Anteil in %			[9,58; 11,13]	[15,59; 17,66]	[13,54; 15,65]	[13,25; 15,49]	[12,45; 14,80]	[11,76; 14,20]	[11,06; 13,60]						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016						
	auswertbar	Anzahl		3792	3222	2846	2530	2269	2073	1853						
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1408	612	548	458	358	317	280						
		Anteil in %		37,13	18,99	19,26	18,10	15,78	15,29	15,11						
	CI Anteil in %			[35,59; 38,67]	[17,64; 20,35]	[17,81; 20,70]	[16,60; 19,60]	[14,28; 17,28]	[13,74; 16,84]	[13,48; 16,74]						
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2006	2059	1870	1716	1593	1486	1352						
		Anteil in %		52,90	63,90	65,71	67,83	70,21	71,68	72,96						
CI Anteil in %			[51,31; 54,49]	[62,25; 65,56]	[63,96; 67,45]	[66,01; 69,65]	[68,32; 72,09]	[69,74; 73,62]	[70,94; 74,99]							
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		378	551	428	356	318	270	221							
	Anteil in %		9,97	17,10	15,04	14,07	14,01	13,02	11,93							
CI Anteil in %			[9,01; 10,92]	[15,80; 18,40]	[13,73; 16,35]	[12,72; 15,43]	[12,59; 15,44]	[11,58; 14,47]	[10,45; 13,40]							

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826								
	auswertbar	Anzahl		5539	4506	3833	3344	2939	2558								
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1896	886	642	594	453	431								
		Anteil in %		34,23	19,66	16,75	17,76	15,41	16,85								
		CI Anteil in %		[32,98; 35,48]	[18,50; 20,82]	[15,57; 17,93]	[16,47; 19,06]	[14,11; 16,72]	[15,40; 18,30]								
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		3061	2948	2603	2254	2046	1794								
		Anteil in %		55,26	65,42	67,91	67,40	69,62	70,13								
		CI Anteil in %		[53,95; 56,57]	[64,03; 66,81]	[66,43; 69,39]	[65,82; 68,99]	[67,95; 71,28]	[68,36; 71,91]								
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		582	672	588	496	440	333								
		Anteil in %		10,51	14,91	15,34	14,83	14,97	13,02								
		CI Anteil in %		[9,70; 11,31]	[13,87; 15,95]	[14,20; 16,48]	[13,63; 16,04]	[13,68; 16,26]	[11,71; 14,32]								
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005								
	auswertbar	Anzahl		3508	2957	2592	2313	2075	1841								
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1244	592	445	423	335	310								
		Anteil in %		35,46	20,02	17,17	18,29	16,14	16,84								
		CI Anteil in %		[33,88; 37,05]	[18,58; 21,46]	[15,72; 18,62]	[16,71; 19,86]	[14,56; 17,73]	[15,13; 18,55]								
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		1914	1907	1728	1530	1430	1292								
		Anteil in %		54,56	64,49	66,67	66,15	68,92	70,18								
		CI Anteil in %		[52,91; 56,21]	[62,77; 66,22]	[64,85; 68,48]	[64,22; 68,08]	[66,92; 70,91]	[68,09; 72,27]								
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		350	458	419	360	310	239								
Anteil in %			9,98	15,49	16,17	15,56	14,94	12,98									
CI Anteil in %			[8,99; 10,97]	[14,18; 16,79]	[14,75; 17,58]	[14,09; 17,04]	[13,41; 16,47]	[11,45; 14,52]									
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291									
	auswertbar	Anzahl		5584	4633	3970	3460	3001									
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1985	840	716	589	507									
		Anteil in %		35,55	18,13	18,04	17,02	16,89									
		CI Anteil in %		[34,29; 36,80]	[17,02; 19,24]	[16,84; 19,23]	[15,77; 18,28]	[15,55; 18,24]									
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		3029	3068	2681	2362	2084									
		Anteil in %		54,24	66,22	67,53	68,27	69,44									
		CI Anteil in %		[52,94; 55,55]	[64,86; 67,58]	[66,07; 68,99]	[66,71; 69,82]	[67,80; 71,09]									
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		570	725	573	509	410									
		Anteil in %		10,21	15,65	14,43	14,71	13,66									
		CI Anteil in %		[9,41; 11,00]	[14,60; 16,69]	[13,34; 15,53]	[13,53; 15,89]	[12,43; 14,89]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241									
	auswertbar	Anzahl		3529	2983	2621	2330	2064									
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1304	560	486	412	343									
		Anteil in %		36,95	18,77	18,54	17,68	16,62									
		CI Anteil in %		[35,36; 38,54]	[17,37; 20,17]	[17,05; 20,03]	[16,13; 19,23]	[15,01; 18,22]									
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		1870	1958	1741	1569	1443									
		Anteil in %		52,99	65,64	66,43	67,34	69,91									
		CI Anteil in %		[51,34; 54,64]	[63,93; 67,34]	[64,62; 68,23]	[65,43; 69,24]	[67,93; 71,89]									
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		355	465	394	349	278									
Anteil in %			10,06	15,59	15,03	14,98	13,47										
CI Anteil in %			[9,07; 11,05]	[14,29; 16,89]	[13,66; 16,40]	[13,53; 16,43]	[12,00; 14,94]										

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731										
	auswertbar	Anzahl		5496	4533	3918	3401										
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1795	818	612	582										
		Anteil in %		32,66	18,05	15,62	17,11										
		CI Anteil in %		[31,42; 33,90]	[16,93; 19,17]	[14,48; 16,76]	[15,85; 18,38]										
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		3142	3072	2746	2380										
		Anteil in %		57,17	67,77	70,09	69,98										
		CI Anteil in %		[55,86; 58,48]	[66,41; 69,13]	[68,65; 71,52]	[68,44; 71,52]										
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		559	643	560	439										
		Anteil in %		10,17	14,18	14,29	12,91										
		CI Anteil in %		[9,37; 10,97]	[13,17; 15,20]	[13,20; 15,39]	[11,78; 14,03]										
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591										
	auswertbar	Anzahl		3611	3056	2691	2384										
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1244	540	430	429										
		Anteil in %		34,45	17,67	15,98	17,99										
		CI Anteil in %		[32,90; 36,00]	[16,32; 19,02]	[14,59; 17,36]	[16,45; 19,54]										
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2004	2046	1874	1657										
		Anteil in %		55,50	66,95	69,64	69,51										
CI Anteil in %			[53,88; 57,12]	[65,28; 68,62]	[67,90; 71,38]	[67,66; 71,35]											
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		363	470	387	298											
	Anteil in %		10,05	15,38	14,38	12,50											
	CI Anteil in %		[9,07; 11,03]	[14,10; 16,66]	[13,06; 15,71]	[11,17; 13,83]											
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847											
	auswertbar	Anzahl		5076	4130	3488											
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1621	749	596											
		Anteil in %		31,93	18,14	17,09											
		CI Anteil in %		[30,65; 33,22]	[16,96; 19,31]	[15,84; 18,34]											
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2967	2809	2425											
		Anteil in %		58,45	68,01	69,52											
		CI Anteil in %		[57,10; 59,81]	[66,59; 69,44]	[68,00; 71,05]											
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		488	572	467											
		Anteil in %		9,61	13,85	13,39											
		CI Anteil in %		[8,80; 10,42]	[12,80; 14,90]	[12,26; 14,52]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581											
	auswertbar	Anzahl		3260	2747	2385											
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1069	502	412											
		Anteil in %		32,79	18,27	17,27											
		CI Anteil in %		[31,18; 34,40]	[16,83; 19,72]	[15,76; 18,79]											
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		1877	1864	1659											
		Anteil in %		57,58	67,86	69,56											
CI Anteil in %			[55,88; 59,27]	[66,11; 69,60]	[67,71; 71,41]												
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		314	381	314												
	Anteil in %		9,63	13,87	13,17												
	CI Anteil in %		[8,62; 10,64]	[12,58; 15,16]	[11,81; 14,52]												

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553												
	auswertbar	Anzahl		5147	4140												
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1614	745												
		Anteil in %			31,36	18,00											
		CI Anteil in %			[30,09; 32,63]	[16,82; 19,17]											
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		3032	2840												
		Anteil in %			58,91	68,60											
		CI Anteil in %			[57,56; 60,25]	[67,19; 70,01]											
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		501	555												
		Anteil in %			9,73	13,41											
		CI Anteil in %			[8,92; 10,54]	[12,37; 14,44]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022												
	auswertbar	Anzahl		3366	2813												
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1092	530												
		Anteil in %			32,44	18,84											
		CI Anteil in %			[30,86; 34,02]	[17,40; 20,29]											
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		1946	1896												
		Anteil in %			57,81	67,40											
CI Anteil in %				[56,14; 59,48]	[65,67; 69,13]												
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		328	387													
	Anteil in %			9,74	13,76												
	CI Anteil in %			[8,74; 10,75]	[12,48; 15,03]												
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721													
	auswertbar	Anzahl		5430													
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1772													
		Anteil in %			32,63												
		CI Anteil in %			[31,39; 33,88]												
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		3146													
		Anteil in %			57,94												
		CI Anteil in %			[56,62; 59,25]												
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		512													
		Anteil in %			9,43												
		CI Anteil in %			[8,65; 10,21]												
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782													
	auswertbar	Anzahl		3629													
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1219													
		Anteil in %			33,59												
		CI Anteil in %			[32,05; 35,13]												
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		2103													
		Anteil in %			57,95												
CI Anteil in %				[56,34; 59,56]													
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		307														
	Anteil in %			8,46													
	CI Anteil in %			[7,55; 9,37]													

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942														
	auswertbar	Anzahl															
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3748														
	auswertbar	Anzahl															
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
CI Anteil in %																	
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl																
	Anteil in %																
	CI Anteil in %																

Beginnend mit der ersten Folgedokumentation werden in Tabelle 3.2.3 für jede Kohorte die Programmteilnehmer ausgewiesen, bei denen **mindestens eine stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale** im Berichtshalbjahr dokumentiert ist. Zunächst wird unter „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ die Anzahl derjenigen Patienten angegeben, die

im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Patienten dokumentiert, die mindestens eine stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale hatten und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Patienten ist.

Tabelle 3.2.3 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale

EZ	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	auswertbar	Anzahl		349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		5	8	7	2	3	4	1	1	2	3	0	0	2
		Anteil in %		1,43	2,51	2,43	0,77	1,26	1,89	0,52	0,55	1,21	2,01	0,00	0,00	1,82
		CI Anteil in %		[0,18; 2,68]	[0,79; 4,23]	[0,65; 4,21]	[0,00; 1,84]	[0,00; 2,68]	[0,05; 3,72]	[0,00; 1,53]	[0,00; 1,64]	[0,00; 2,89]	[0,00; 4,28]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 4,33]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85
	auswertbar	Anzahl		236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		3	3	2	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1
		Anteil in %		1,27	1,39	1,02	0,57	0,62	1,40	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	1,23
		CI Anteil in %		[0,00; 2,70]	[0,00; 2,95]	[0,00; 2,43]	[0,00; 1,69]	[0,00; 1,84]	[0,00; 3,33]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,74]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 3,65]
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930	
	auswertbar	Anzahl		2998	2658	2400	2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	988	863	
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		62	36	32	28	21	21	11	5	7	6	4	3	
		Anteil in %		2,07	1,35	1,33	1,32	1,06	1,18	0,70	0,36	0,55	0,54	0,40	0,35	
		CI Anteil in %		[1,56; 2,58]	[0,91; 1,79]	[0,87; 1,79]	[0,83; 1,80]	[0,61; 1,52]	[0,68; 1,68]	[0,29; 1,11]	[0,04; 0,67]	[0,14; 0,96]	[0,11; 0,98]	[0,01; 0,80]	[0,00; 0,74]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770	
	auswertbar	Anzahl		2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710	
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		44	27	22	18	18	15	11	4	7	5	4	3	
		Anteil in %		2,09	1,43	1,28	1,17	1,24	1,13	0,91	0,36	0,69	0,55	0,49	0,42	
		CI Anteil in %		[1,48; 2,70]	[0,89; 1,97]	[0,75; 1,81]	[0,63; 1,71]	[0,67; 1,82]	[0,56; 1,70]	[0,37; 1,44]	[0,01; 0,72]	[0,18; 1,20]	[0,07; 1,04]	[0,01; 0,96]	[0,00; 0,90]	
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818		
	auswertbar	Anzahl		5305	4663	4052	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676		
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		87	54	55	35	21	19	15	13	10	8	4		
		Anteil in %		1,64	1,16	1,36	0,94	0,62	0,64	0,56	0,54	0,47	0,42	0,24		
		CI Anteil in %		[1,30; 1,98]	[0,85; 1,47]	[1,00; 1,71]	[0,63; 1,25]	[0,36; 0,89]	[0,35; 0,92]	[0,28; 0,84]	[0,25; 0,84]	[0,18; 0,76]	[0,13; 0,71]	[0,00; 0,47]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467		
	auswertbar	Anzahl		3505	3101	2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375		
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		68	38	45	19	14	15	12	12	9	5	4		
		Anteil in %		1,94	1,23	1,64	0,74	0,58	0,69	0,60	0,66	0,55	0,33	0,29		
		CI Anteil in %		[1,48; 2,40]	[0,84; 1,61]	[1,17; 2,12]	[0,41; 1,07]	[0,28; 0,89]	[0,34; 1,03]	[0,26; 0,94]	[0,29; 1,03]	[0,19; 0,90]	[0,04; 0,62]	[0,01; 0,58]		
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138			
	auswertbar	Anzahl		8422	7239	6624	5918	5255	4673	4172	3748	3292	2900			
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		132	92	77	45	41	31	23	17	8	16			
		Anteil in %		1,57	1,27	1,16	0,76	0,78	0,66	0,55	0,45	0,24	0,55			
		CI Anteil in %		[1,30; 1,83]	[1,01; 1,53]	[0,90; 1,42]	[0,54; 0,98]	[0,54; 1,02]	[0,43; 0,90]	[0,33; 0,78]	[0,24; 0,67]	[0,07; 0,41]	[0,28; 0,82]			
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497			
	auswertbar	Anzahl		5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329			
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		104	63	63	30	34	21	17	15	7	15			
		Anteil in %		1,81	1,27	1,36	0,72	0,89	0,60	0,54	0,51	0,27	0,64			
		CI Anteil in %		[1,47; 2,16]	[0,95; 1,58]	[1,03; 1,70]	[0,46; 0,97]	[0,59; 1,19]	[0,35; 0,86]	[0,28; 0,79]	[0,25; 0,77]	[0,07; 0,47]	[0,32; 0,97]			
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373				
	auswertbar	Anzahl		8619	7782	6742	5883	5188	4599	4044	3553	3110				
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		179	97	67	44	52	30	16	22	17				
		Anteil in %		2,08	1,25	0,99	0,75	1,00	0,65	0,40	0,62	0,55				
		CI Anteil in %		[1,78; 2,38]	[1,00; 1,49]	[0,76; 1,23]	[0,53; 0,97]	[0,73; 1,27]	[0,42; 0,89]	[0,20; 0,59]	[0,36; 0,88]	[0,29; 0,81]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538				
	auswertbar	Anzahl		5487	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366				
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		130	73	50	33	38	26	16	15	13				
		Anteil in %		2,37	1,44	1,12	0,82	1,05	0,79	0,54	0,57	0,55				
		CI Anteil in %		[1,97; 2,77]	[1,11; 1,77]	[0,81; 1,43]	[0,54; 1,10]	[0,72; 1,39]	[0,49; 1,10]	[0,28; 0,81]	[0,28; 0,85]	[0,25; 0,85]				

EZ	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370				
	auswertbar	Anzahl		7730	6612	5746	5097	4484	4002	3494	3113				
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		109	51	48	37	24	29	27	18				
		Anteil in %		1,41	0,77	0,84	0,73	0,54	0,72	0,77	0,58				
		CI Anteil in %		[1,15; 1,67]	[0,56; 0,98]	[0,60; 1,07]	[0,49; 0,96]	[0,32; 0,75]	[0,46; 0,99]	[0,48; 1,06]	[0,31; 0,84]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397				
	auswertbar	Anzahl		4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		71	35	31	24	15	22	14	13				
		Anteil in %		1,45	0,82	0,82	0,70	0,49	0,79	0,56	0,58				
		CI Anteil in %		[1,12; 1,79]	[0,55; 1,10]	[0,53; 1,11]	[0,42; 0,98]	[0,24; 0,74]	[0,46; 1,12]	[0,27; 0,86]	[0,27; 0,89]				
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822					
	auswertbar	Anzahl		5958	5042	4396	3839	3345	2989	2627					
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		73	39	34	22	17	14	11					
		Anteil in %		1,23	0,77	0,77	0,57	0,51	0,47	0,42					
		CI Anteil in %		[0,95; 1,50]	[0,53; 1,02]	[0,51; 1,03]	[0,33; 0,81]	[0,27; 0,75]	[0,22; 0,71]	[0,17; 0,67]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016					
	auswertbar	Anzahl		3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888					
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		50	30	20	16	14	12	10					
		Anteil in %		1,32	0,92	0,69	0,62	0,61	0,57	0,53					
		CI Anteil in %		[0,96; 1,68]	[0,59; 1,25]	[0,39; 0,99]	[0,32; 0,93]	[0,29; 0,92]	[0,25; 0,89]	[0,20; 0,86]					
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826						
	auswertbar	Anzahl		5539	4621	3919	3446	3008	2618						
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		88	49	35	16	21							
		Anteil in %		1,59	1,06	0,89	0,46	0,70	0,80						
		CI Anteil in %		[1,26; 1,92]	[0,77; 1,36]	[0,60; 1,19]	[0,24; 0,69]	[0,40; 1,00]	[0,46; 1,14]						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005						
	auswertbar	Anzahl		3508	3026	2638	2378	2116	1876						
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		56	36	22	12	19	17						
		Anteil in %		1,60	1,19	0,83	0,50	0,90	0,91						
		CI Anteil in %		[1,18; 2,01]	[0,80; 1,58]	[0,49; 1,18]	[0,22; 0,79]	[0,50; 1,30]	[0,48; 1,34]						
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291							
	auswertbar	Anzahl		5584	4727	4067	3542	3076							
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		74	34	29	27	32							
		Anteil in %		1,33	0,72	0,71	0,76	1,04							
		CI Anteil in %		[1,03; 1,63]	[0,48; 0,96]	[0,45; 0,97]	[0,48; 1,05]	[0,68; 1,40]							
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241							
	auswertbar	Anzahl		3529	3048	2679	2384	2114							
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		57	21	22	20	28							
		Anteil in %		1,62	0,69	0,82	0,84	1,32							
		CI Anteil in %		[1,20; 2,03]	[0,40; 0,98]	[0,48; 1,16]	[0,47; 1,21]	[0,84; 1,81]							
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731								
	auswertbar	Anzahl		5496	4636	4026	3474								
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		79	38	34	32								
		Anteil in %		1,44	0,82	0,84	0,92								
		CI Anteil in %		[1,12; 1,75]	[0,56; 1,08]	[0,56; 1,13]	[0,60; 1,24]								
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591								
	auswertbar	Anzahl		3611	3119	2750	2432								
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		61	28	19	27								
		Anteil in %		1,69	0,90	0,69	1,11								
		CI Anteil in %		[1,27; 2,11]	[0,57; 1,23]	[0,38; 1,00]	[0,69; 1,53]								
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847									
	auswertbar	Anzahl		5076	4214	3564									
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		37	23	28									
		Anteil in %		0,73	0,55	0,79									
		CI Anteil in %		[0,49; 0,96]	[0,32; 0,77]	[0,50; 1,08]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581									
	auswertbar	Anzahl		3260	2800	2427									
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		30	17	21									
		Anteil in %		0,92	0,61	0,87									
		CI Anteil in %		[0,59; 1,25]	[0,32; 0,89]	[0,50; 1,23]									

EZ	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553											
	auswertbar	Anzahl		5147	4245											
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		51	35											
		Anteil in %			0,99	0,82										
		CI Anteil in %			[0,72; 1,26]	[0,55; 1,10]										
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022											
	auswertbar	Anzahl		3366	2877											
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		41	23											
		Anteil in %			1,22	0,80										
		CI Anteil in %			[0,85; 1,59]	[0,47; 1,12]										
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721												
	auswertbar	Anzahl		5430												
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		30												
		Anteil in %			0,55											
		CI Anteil in %			[0,36; 0,75]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782												
	auswertbar	Anzahl		3629												
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		17												
		Anteil in %			0,47											
		CI Anteil in %			[0,25; 0,69]											
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942													
	auswertbar	Anzahl														
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3748													
	auswertbar	Anzahl														
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														

Beginnend mit der ersten Folgedokumentation werden in Tabelle 3.2.4 für jede Kohorte die Programmteilnehmer ausgewiesen, bei denen **mehr als eine stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale dokumentiert ist**. Zunächst wird unter „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ die Anzahl derjenigen Patienten angegeben, die im Berichtshalbjahr

noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Patienten dokumentiert, die mehr als eine stationäre notfallmäßige Behandlungen wegen Asthma bronchiale hatten und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Patienten ist.

Tabelle 3.2.4 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale

EZ	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	auswertbar	Anzahl		349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		2	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0
		Anteil in %		0,57	0,63	0,00	0,00	0,42	0,94	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %		[0,00; 1,37]	[0,00; 1,49]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,24]	[0,00; 2,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,99]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85
	auswertbar	Anzahl		236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,85	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %		[0,00; 2,02]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,84]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930	
	auswertbar	Anzahl		2998	2658	2400	2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	988	863	
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		14	11	12	4	4	8	4	1	1	2	1	1	
		Anteil in %		0,47	0,41	0,50	0,19	0,20	0,45	0,25	0,07	0,08	0,18	0,10	0,12	
		CI Anteil in %		[0,22; 0,71]	[0,17; 0,66]	[0,22; 0,78]	[0,00; 0,37]	[0,00; 0,40]	[0,14; 0,76]	[0,01; 0,50]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,43]	[0,00; 0,30]	[0,00; 0,34]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770	
	auswertbar	Anzahl		2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710	
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		10	7	9	1	2	5	4	1	1	2	1	1	
		Anteil in %		0,47	0,37	0,52	0,07	0,14	0,38	0,33	0,09	0,10	0,22	0,12	0,14	
		CI Anteil in %		[0,18; 0,77]	[0,10; 0,65]	[0,18; 0,86]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,33]	[0,05; 0,71]	[0,01; 0,65]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,53]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,42]	
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818		
	auswertbar	Anzahl		5305	4663	4052	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676		
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		18	16	8	5	6	1	2	1	2	1	0		
		Anteil in %		0,34	0,34	0,20	0,13	0,18	0,03	0,07	0,04	0,09	0,05	0,00		
		CI Anteil in %		[0,18; 0,50]	[0,18; 0,51]	[0,06; 0,33]	[0,02; 0,25]	[0,04; 0,32]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,00]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467		
	auswertbar	Anzahl		3505	3101	2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375		
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		15	10	7	3	3	1	2	1	2	0	0		
		Anteil in %		0,43	0,32	0,26	0,12	0,13	0,05	0,10	0,06	0,12	0,00	0,00		
		CI Anteil in %		[0,21; 0,64]	[0,12; 0,52]	[0,07; 0,44]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,24]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138			
	auswertbar	Anzahl		8422	7239	6624	5918	5255	4673	4172	3748	3292	2900			
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		30	22	18	11	4	4	7	2	1	3			
		Anteil in %		0,36	0,30	0,27	0,19	0,08	0,09	0,17	0,05	0,03	0,10			
		CI Anteil in %		[0,23; 0,48]	[0,18; 0,43]	[0,15; 0,40]	[0,08; 0,30]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,17]	[0,04; 0,29]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,22]			
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497			
	auswertbar	Anzahl		5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329			
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		23	16	12	7	3	1	3	1	1	3			
		Anteil in %		0,40	0,32	0,26	0,17	0,08	0,03	0,09	0,03	0,04	0,13			
		CI Anteil in %		[0,24; 0,57]	[0,16; 0,48]	[0,11; 0,41]	[0,04; 0,29]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,27]			
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373				
	auswertbar	Anzahl		8619	7782	6742	5883	5188	4599	4044	3553	3110				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		36	26	15	10	6	7	3	1	0				
		Anteil in %		0,42	0,33	0,22	0,17	0,12	0,15	0,07	0,03	0,00				
		CI Anteil in %		[0,28; 0,55]	[0,21; 0,46]	[0,11; 0,33]	[0,06; 0,28]	[0,02; 0,21]	[0,04; 0,26]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538				
	auswertbar	Anzahl		5487	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		28	20	10	6	4	5	3	0	0				
		Anteil in %		0,51	0,40	0,22	0,15	0,11	0,15	0,10	0,00	0,00				
		CI Anteil in %		[0,32; 0,70]	[0,22; 0,57]	[0,09; 0,36]	[0,03; 0,27]	[0,00; 0,22]	[0,02; 0,29]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]				

EZ	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370				
	auswertbar	Anzahl		7730	6612	5746	5097	4484	4002	3494	3113				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		24	10	16	11	7	7	7	4				
		Anteil in %		0,31	0,15	0,28	0,22	0,16	0,17	0,20	0,13				
		CI Anteil in %		[0,19; 0,43]	[0,06; 0,24]	[0,14; 0,41]	[0,09; 0,34]	[0,04; 0,27]	[0,05; 0,30]	[0,05; 0,35]	[0,00; 0,25]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397				
	auswertbar	Anzahl		4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		13	7	12	6	5	5	2	3				
		Anteil in %		0,27	0,16	0,32	0,18	0,16	0,18	0,08	0,13				
		CI Anteil in %		[0,12; 0,41]	[0,04; 0,29]	[0,14; 0,50]	[0,04; 0,32]	[0,02; 0,31]	[0,02; 0,34]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,29]				
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822					
	auswertbar	Anzahl		5958	5042	4396	3839	3345	2989	2627					
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		16	6	4	4	0	2	4					
		Anteil in %		0,27	0,12	0,09	0,10	0,00	0,07	0,15					
		CI Anteil in %		[0,14; 0,40]	[0,02; 0,21]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,30]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016					
	auswertbar	Anzahl		3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888					
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		10	3	2	4	0	2	3					
		Anteil in %		0,26	0,09	0,07	0,16	0,00	0,09	0,16					
		CI Anteil in %		[0,10; 0,43]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,31]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,34]					
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826						
	auswertbar	Anzahl		5539	4621	3919	3446	3008	2618						
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		14	6	9	4	4	0						
		Anteil in %		0,25	0,13	0,23	0,12	0,13	0,00						
		CI Anteil in %		[0,12; 0,38]	[0,03; 0,23]	[0,08; 0,38]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,00]						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005						
	auswertbar	Anzahl		3508	3026	2638	2378	2116	1876						
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		7	3	4	2	4	0						
		Anteil in %		0,20	0,10	0,15	0,08	0,19	0,00						
		CI Anteil in %		[0,05; 0,35]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,30]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,37]	[0,00; 0,00]						
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291							
	auswertbar	Anzahl		5584	4727	4067	3542	3076							
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		26	5	4	7	10							
		Anteil in %		0,47	0,11	0,10	0,20	0,33							
		CI Anteil in %		[0,29; 0,64]	[0,01; 0,20]	[0,00; 0,19]	[0,05; 0,34]	[0,12; 0,53]							
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241							
	auswertbar	Anzahl		3529	3048	2679	2384	2114							
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		16	1	3	5	8							
		Anteil in %		0,45	0,03	0,11	0,21	0,38							
		CI Anteil in %		[0,23; 0,68]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,24]	[0,03; 0,39]	[0,12; 0,64]							
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731								
	auswertbar	Anzahl		5496	4636	4026	3474								
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		15	9	5	5								
		Anteil in %		0,27	0,19	0,12	0,14								
		CI Anteil in %		[0,13; 0,41]	[0,07; 0,32]	[0,02; 0,23]	[0,02; 0,27]								
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591								
	auswertbar	Anzahl		3611	3119	2750	2432								
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		11	5	2	5								
		Anteil in %		0,30	0,16	0,07	0,21								
		CI Anteil in %		[0,12; 0,48]	[0,02; 0,30]	[0,00; 0,17]	[0,03; 0,39]								
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847									
	auswertbar	Anzahl		5076	4214	3564									
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		6	2	12									
		Anteil in %		0,12	0,05	0,34									
		CI Anteil in %		[0,02; 0,21]	[0,00; 0,11]	[0,15; 0,53]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581									
	auswertbar	Anzahl		3260	2800	2427									
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		5	1	10									
		Anteil in %		0,15	0,04	0,41									
		CI Anteil in %		[0,02; 0,29]	[0,00; 0,11]	[0,16; 0,67]									

EZ	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553										
	auswertbar	Anzahl		5147	4245										
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		10	6										
		Anteil in %			0,19	0,14									
		CI Anteil in %			[0,07; 0,31]	[0,03; 0,25]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022										
	auswertbar	Anzahl		3366	2877										
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		8	2										
		Anteil in %			0,24	0,07									
		CI Anteil in %			[0,07; 0,40]	[0,00; 0,17]									
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721											
	auswertbar	Anzahl		5430											
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		5											
		Anteil in %			0,09										
		CI Anteil in %			[0,01; 0,17]										
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782											
	auswertbar	Anzahl		3629											
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		1											
		Anteil in %			0,03										
		CI Anteil in %			[0,00; 0,08]										
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942												
	auswertbar	Anzahl													
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl													
		Anteil in %													
		CI Anteil in %													
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3748												
	auswertbar	Anzahl													
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl													
		Anteil in %													
		CI Anteil in %													

3.3 Klinische Verlaufsparmeter

Einer der wichtigsten Verlaufsparmeter zur Einschätzung des Therapieerfolges und zur Verlaufskontrolle bei Asthma ist der sogenannte Exspiratorische Spitzenfluss (**Peak Expiratory Flow, PEF**). Dabei handelt es sich um die maximale Atemstromstärke bei forcierter Ausatmung, gemessen in Liter/Sekunde. Der PEF korreliert gut mit dem Schweregrad einer asthmatischen Erkrankung. Je schlechter der PEF desto stärker ist die Verengung der Atemwege.

In den Tabellen 3.3.1a und 3.3.1b werden die Auswertungsergebnisse zum Peak-Flow-Absolutwert vorgestellt. Die notwendigen Informationen zum gemessenen Peak-Flow-Absolutwert liegen jedoch erst nach der Einführung von eDMP im Berichtshalbjahr 2008-2 vor. In den vorherigen Dokumentationsbögen konnte lediglich die Veränderung des Peak-Flow-Wertes dokumentiert werden (Verbesserung oder gleichbleiben bzw. Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes).

In Tabelle 3.3.2 wird anschließend die Entwicklung der Peak-Flow-Werte dargestellt.

In der Tabelle 3.3.1a werden die Auswertungsergebnisse zu den **Peak-Flow-Absolutwerten** ausgewiesen. Zunächst wird für jede Kohorte unter „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die

Anzahl der auswertbaren Patienten dokumentiert. Das sind diejenigen Patienten für die entweder ein plausible Peak-Flow-Wert dokumentiert ist oder für die angegeben ist, dass keine Peak-Flow-Messung durchgeführt wurde. Danach wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Patienten eine Peak-Flow-Messung durchgeführt wurde („mit Peak-Flow-Messung“) und wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist. Für die Gruppe der Patienten mit Peak-Flow-Messung wird nun der im jeweiligen Berichtshalbjahr gemessene durchschnittliche Peak-Flow-Wert sowie die mittlere Differenz zum Wert in der Erstdokumentation abgebildet. Für die Berechnung dieser durchschnittlichen Differenz zwischen Peak-Flow-Wert im Berichtshalbjahr und Beitritts-halbjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Erwachsenen im Berichtshalbjahr und wird deswegen gesondert aufgeführt.

Da die Dokumentation der gemessenen Absolutwerte zum Halbjahr 2008-2 eingeführt wurde, können für die Berichtshalbjahre bis 2008-1 keine Werte dargestellt werden. Der Ausweis der mittleren Differenz zur Erstdokumentation ist definitionsgemäß erst ab dem Berichtshalbjahr 2009-1 möglich.

Tabelle 3.3.1a Peak-Flow-Absolutwert bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr		
2006-1	Patienten < 18 insges.	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115	
	auswertbar	Anzahl						238	212	194	181	165	149	135	123	110	
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl						153	130	122	123	120	103	101	86	71	
		Anteil in %						64,29	61,32	62,89	67,96	72,73	69,13	74,81	69,92	64,55	
		CI Anteil in %						[58,19; 70,39]	[54,75; 67,89]	[56,07; 69,70]	[61,14; 74,77]	[65,91; 79,54]	[61,68; 76,57]	[67,47; 82,16]	[61,78; 78,06]	[55,56; 73,53]	
		Mean						308,44	314,28	316,79	344,20	346,50	360,55	365,62	395,36	405,73	
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Mean						[288,08; 328,80]	[295,24; 333,32]	[293,30; 340,27]	[318,70; 369,71]	[319,55; 373,45]	[332,65; 388,45]	[338,73; 392,52]	[364,55; 426,18]	[369,45; 442,02]	
		Median						300,00	300,00	300,00	320,00	328,50	340,00	350,00	366,00	370,00	
		Fallbasis mittlere Differenz															
		Mittlere Differenz zur ED															
		CI mittlere Differenz															
		Median mittlere Differenz															
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85	
	auswertbar	Anzahl							161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl							108	90	82	83	81	71	74	62	53
		Anteil in %							67,08	62,94	61,65	66,94	70,43	65,74	75,51	69,66	65,43
		CI Anteil in %							[59,80; 74,36]	[54,99; 70,88]	[53,36; 69,95]	[58,62; 75,25]	[62,06; 78,81]	[56,75; 74,73]	[66,95; 84,07]	[60,06; 79,27]	[55,01; 75,85]
		Mean							281,28	289,41	285,52	325,58	340,36	347,30	362,73	396,19	411,94
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Mean							[265,69; 296,87]	[272,01; 306,81]	[264,25; 306,79]	[297,94; 353,22]	[308,93; 371,79]	[315,58; 379,01]	[331,11; 394,34]	[362,60; 429,78]	[372,80; 451,08]
		Median							270,00	300,00	300,00	310,00	320,00	320,00	350,00	366,00	360,00
		Fallbasis mittlere Differenz															
		Mittlere Differenz zur ED															
		CI mittlere Differenz															
Median mittlere Differenz																	

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	Patienten < 18 insges.	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930
	auswertbar	Anzahl					2124	1974	1777	1572	1406	1263	1104	988	863
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl					1333	1272	1150	1029	929	833	745	688	589
		Anteil in %					62,76	64,44	64,72	65,46	66,07	65,95	67,48	69,64	68,25
		CI Anteil in %					[60,70; 64,82]	[62,33; 66,55]	[62,49; 66,94]	[63,11; 67,81]	[63,60; 68,55]	[63,34; 68,57]	[64,72; 70,25]	[66,77; 72,50]	[65,14; 71,36]
		Mean					318,07	324,93	335,98	348,15	353,80	360,06	376,06	382,10	393,68
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean					[311,33; 324,81]	[318,19; 331,68]	[328,96; 343,00]	[341,04; 355,27]	[345,78; 361,83]	[351,47; 368,66]	[366,91; 385,21]	[372,59; 391,61]	[383,57; 403,80]
		Median					300,00	310,00	320,00	340,00	340,00	350,00	350,00	364,50	380,00
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770
	auswertbar	Anzahl					1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl					1006	967	884	808	743	673	611	572	480
		Anteil in %					65,41	66,83	66,52	66,56	67,24	66,63	67,66	69,67	67,61
		CI Anteil in %					[63,03; 67,79]	[64,40; 69,25]	[63,98; 69,05]	[63,90; 69,21]	[64,47; 70,01]	[63,72; 69,54]	[64,61; 70,72]	[66,52; 72,82]	[64,16; 71,05]
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean					286,90	296,70	310,17	328,21	336,03	349,15	364,23	373,00	386,34
		CI Mean					[280,67; 293,12]	[290,33; 303,07]	[303,63; 316,72]	[321,36; 335,06]	[328,31; 343,75]	[340,43; 357,88]	[355,09; 373,36]	[363,04; 382,95]	[375,95; 396,73]
		Median					280,00	290,00	300,00	320,00	323,00	333,00	350,00	360,00	370,00
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
	Median mittlere Differenz														
2007-1	Patienten < 18 insges.	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818	
	auswertbar	Anzahl				4052	3728	3377	2977	2687	2390	2121	1907	1676	
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl				2418	2406	2155	1972	1746	1554	1385	1252	1114	
		Anteil in %				59,67	64,54	63,81	66,24	64,98	65,02	65,30	65,65	66,47	
		CI Anteil in %				[58,16; 61,18]	[63,00; 66,07]	[62,19; 65,44]	[64,54; 67,94]	[63,18; 66,78]	[63,11; 66,93]	[63,27; 67,33]	[63,52; 67,78]	[64,21; 68,73]	
		Mean				312,30	322,01	328,99	341,93	348,99	358,14	365,87	374,77	381,62	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean				[307,50; 317,10]	[316,98; 327,05]	[323,67; 334,32]	[336,41; 347,45]	[343,11; 354,87]	[352,15; 364,14]	[359,39; 372,35]	[367,72; 381,82]	[374,18; 389,07]	
		Median				300,00	300,00	310,00	330,00	340,00	350,00	350,00	355,00	369,50	
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467	
	auswertbar	Anzahl				2742	2569	2396	2183	1990	1816	1647	1518	1375	
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl				1729	1725	1581	1460	1321	1205	1088	1020	923	
		Anteil in %				63,06	67,15	65,98	66,88	66,38	66,35	66,06	67,19	67,13	
		CI Anteil in %				[61,25; 64,86]	[65,33; 68,96]	[64,09; 67,88]	[64,91; 68,86]	[64,31; 68,46]	[64,18; 68,53]	[63,77; 68,35]	[64,83; 69,56]	[64,64; 69,61]	
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean				279,08	289,43	298,21	314,39	324,60	338,86	346,88	359,59	369,68	
		CI Mean				[274,76; 283,41]	[284,83; 294,02]	[293,33; 303,09]	[309,17; 319,61]	[318,82; 330,38]	[332,90; 344,82]	[340,38; 353,37]	[352,48; 366,71]	[362,17; 377,20]	
		Median				270,00	280,00	291,00	300,00	310,00	326,00	338,50	350,00	350,00	
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
	Median mittlere Differenz														

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	Patienten < 18 insges.	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138		
	auswertbar	Anzahl			7239	6624	5918	5254	4672	4171	3747	3292	2897		
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			4313	4283	3865	3533	3096	2789	2534	2227	1932		
		Anteil in %			59,58	64,66	65,31	67,24	66,27	66,87	67,63	67,65	66,69		
		CI Anteil in %			[58,45; 60,71]	[63,51; 65,81]	[64,10; 66,52]	[65,97; 68,51]	[64,91; 67,62]	[65,44; 68,30]	[66,13; 69,13]	[66,05; 69,25]	[64,97; 68,41]		
		Mean			304,78	310,26	319,32	326,72	331,53	340,98	350,18	356,25	363,52		
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean			[301,13; 308,43]	[306,58; 313,95]	[315,42; 323,22]	[322,67; 330,78]	[327,22; 335,83]	[336,36; 345,60]	[345,40; 354,97]	[351,08; 361,42]	[358,09; 368,95]		
		Median			300,00	300,00	300,00	310,00	320,00	326,00	340,00	350,00	350,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497		
	auswertbar	Anzahl			4980	4617	4194	3825	3474	3176	2921	2597	2328		
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			3063	3073	2824	2652	2358	2173	2009	1778	1564		
		Anteil in %			61,51	66,56	67,33	69,33	67,88	68,42	68,78	68,46	67,18		
		CI Anteil in %			[60,15; 62,86]	[65,20; 67,92]	[65,91; 68,75]	[67,87; 70,79]	[66,32; 69,43]	[66,80; 70,04]	[67,10; 70,46]	[66,68; 70,25]	[65,27; 69,09]		
		Mean			265,63	274,35	285,20	297,15	305,21	319,23	331,15	338,82	349,17		
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean			[262,32; 268,93]	[270,95; 277,75]	[281,61; 288,79]	[293,35; 300,95]	[301,08; 309,35]	[314,60; 323,85]	[326,36; 335,94]	[333,68; 343,96]	[343,63; 354,72]		
		Median			250,00	260,00	280,00	290,00	300,00	300,00	320,00	330,00	340,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
2008-1	Patienten < 18 insges.	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373			
	auswertbar	Anzahl		7980	7781	6742	5881	5186	4598	4042	3552	3109			
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			5027	4882	4313	3869	3380	3047	2639	2323	2011		
		Anteil in %			62,99	62,74	63,97	65,79	65,18	66,27	65,29	65,40	64,68		
		CI Anteil in %			[61,94; 64,05]	[61,67; 63,82]	[62,83; 65,12]	[64,58; 67,00]	[63,88; 66,47]	[64,90; 67,63]	[63,82; 66,76]	[63,84; 66,96]	[63,00; 66,36]		
		Mean			291,71	299,31	305,88	314,62	323,70	331,87	344,27	348,66	357,35		
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean			[288,41; 295,02]	[295,94; 302,67]	[302,34; 309,42]	[310,89; 318,35]	[319,70; 327,71]	[327,63; 336,10]	[339,59; 348,95]	[343,67; 353,66]	[351,84; 362,86]		
		Median			280,00	285,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538			
	auswertbar	Anzahl		5091	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366			
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			3330	3258	2943	2700	2398	2223	1954	1756	1561		
		Anteil in %			65,41	64,43	65,96	67,28	66,56	67,90	66,17	66,41	65,98		
		CI Anteil in %			[64,10; 66,72]	[63,11; 65,75]	[64,57; 67,35]	[65,83; 68,73]	[65,01; 68,10]	[66,30; 69,50]	[64,46; 67,88]	[64,61; 68,22]	[64,07; 67,89]		
		Mean			247,79	258,06	266,89	278,95	291,09	301,80	317,29	325,74	338,25		
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean			[244,93; 250,65]	[254,95; 261,18]	[263,67; 270,11]	[275,46; 282,44]	[287,25; 294,93]	[297,77; 305,83]	[312,72; 321,86]	[320,91; 330,57]	[332,87; 343,63]		
		Median			243,00	250,00	250,00	270,00	280,00	300,00	300,50	320,00	330,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	Patienten < 18 insges.	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370				
	auswertbar	Anzahl	9101	7730	6612	5746	5096	4483	4001	3494	3113				
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	4690	5010	4268	3714	3341	2926	2604	2290	2042				
		Anteil in %	51,53	64,81	64,55	64,64	65,56	65,27	65,08	65,54	65,60				
		CI Anteil in %	[50,51; 52,56]	[63,75; 65,88]	[63,40; 65,70]	[63,40; 65,87]	[64,26; 66,87]	[63,87; 66,66]	[63,61; 66,56]	[63,96; 67,12]	[63,93; 67,26]				
		Mean	290,96	302,62	309,37	318,72	324,49	332,15	341,89	344,65	354,50				
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[287,11; 294,80]	[299,00; 306,24]	[305,52; 313,21]	[314,55; 322,89]	[320,12; 328,85]	[327,37; 336,93]	[336,84; 346,94]	[339,39; 349,92]	[348,83; 360,17]				
		Median	275,00	290,00	300,00	300,00	303,00	315,00	325,50	330,50	340,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		3602	3005	2571	2276	1973	1751	1535	1354				
		Mittlere Differenz zur ED		19,44	30,71	41,04	53,18	63,58	75,65	82,64	92,20				
		CI mittlere Differenz		[16,71; 22,18]	[27,38; 34,03]	[37,27; 44,82]	[49,20; 57,16]	[59,00; 68,16]	[70,71; 80,59]	[77,10; 88,19]	[86,24; 98,16]				
		Median mittlere Differenz		14,00	30,00	40,00	50,00	58,00	70,00	80,00	90,00				
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397				
	auswertbar	Anzahl	5565	4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2894	3257	2840	2543	2293	2066	1858	1671	1493				
		Anteil in %	52,00	66,70	66,93	67,26	67,07	67,65	66,91	67,27	66,65				
		CI Anteil in %	[50,69; 53,32]	[65,38; 68,02]	[65,52; 68,35]	[65,76; 68,75]	[65,49; 68,64]	[65,99; 69,31]	[65,16; 68,66]	[65,42; 69,12]	[64,70; 68,60]				
		Mean	239,53	253,86	264,79	276,63	287,55	297,23	311,84	317,48	330,15				
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[236,11; 242,94]	[250,65; 257,06]	[261,32; 268,27]	[272,76; 280,50]	[283,28; 291,83]	[292,57; 301,89]	[306,68; 317,01]	[312,21; 322,75]	[324,46; 335,85]				
		Median	230,00	250,00	250,00	260,00	276,00	283,00	300,00	300,00	318,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		2337	1986	1753	1570	1391	1248	1124	993				
		Mittlere Differenz zur ED		18,14	30,87	42,88	58,16	70,78	85,63	92,19	101,73				
		CI mittlere Differenz		[15,46; 20,81]	[27,75; 33,98]	[39,17; 46,59]	[54,36; 61,95]	[66,32; 75,24]	[80,73; 90,53]	[86,58; 97,81]	[95,98; 107,49]				
		Median mittlere Differenz		0,00	0,31	0,67	0,98	1,20	1,53	1,85	2,03				
2009-1	Patienten < 18 insges.	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822					
	auswertbar	Anzahl	7226	5957	5039	4394	3838	3344	2988	2627					
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	4054	4029	3331	2963	2623	2270	2020	1760					
		Anteil in %	56,10	67,63	66,10	67,43	68,34	67,88	67,60	67,00					
		CI Anteil in %	[54,96; 57,25]	[66,45; 68,82]	[64,80; 67,41]	[66,05; 68,82]	[66,87; 69,81]	[66,30; 69,47]	[65,93; 69,28]	[65,20; 68,80]					
		Mean	274,47	288,84	297,80	306,16	313,39	320,10	327,71	333,61					
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[270,66; 278,28]	[285,02; 292,67]	[293,57; 302,04]	[301,71; 310,61]	[308,53; 318,26]	[315,09; 325,12]	[322,28; 333,13]	[327,91; 339,31]					
		Median	250,00	270,00	280,00	300,00	300,00	300,00	313,50	320,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		3087	2531	2224	1948	1691	1482	1285					
		Mittlere Differenz zur ED		21,91	34,36	46,89	57,03	68,13	79,78	84,86					
		CI mittlere Differenz		[18,95; 24,87]	[31,12; 37,59]	[43,21; 50,57]	[52,91; 61,16]	[63,61; 72,64]	[74,62; 84,95]	[79,17; 90,54]					
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00	80,00					
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016					
	auswertbar	Anzahl	4439	3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888					
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2500	2639	2214	1995	1801	1608	1456	1280					
		Anteil in %	56,32	69,59	67,87	68,79	70,00	69,70	68,87	67,80					
		CI Anteil in %	[54,86; 57,78]	[68,13; 71,06]	[66,27; 69,48]	[67,11; 70,48]	[68,23; 71,77]	[67,83; 71,58]	[66,90; 70,85]	[65,69; 69,90]					
		Mean	224,61	242,62	253,91	264,11	273,95	286,50	296,76	305,94					
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[221,22; 228,00]	[239,27; 245,98]	[250,05; 257,78]	[260,03; 268,18]	[269,45; 278,44]	[281,80; 291,21]	[291,62; 301,89]	[300,30; 311,57]					
		Median	216,00	240,00	246,00	250,00	260,00	280,00	290,00	300,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		2017	1682	1493	1335	1204	1082	947					
		Mittlere Differenz zur ED		21,92	34,74	46,94	58,75	72,16	82,75	92,19					
		CI mittlere Differenz		[19,02; 24,83]	[31,20; 38,27]	[43,20; 50,68]	[54,61; 62,89]	[67,54; 76,77]	[77,52; 87,98]	[86,44; 97,94]					
		Median mittlere Differenz		0,02	0,40	0,71	0,96	1,35	1,74	1,96					

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-2	Patienten < 18 insges.	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826						
	auswertbar	Anzahl	6667	5538	4621	3919	3445	3008	2618						
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	3939	3756	3066	2642	2292	2022	1752						
		Anteil in %	59,08	67,82	66,35	67,42	66,53	67,22	66,92						
		CI Anteil in %	[57,90; 60,26]	[66,59; 69,05]	[64,99; 67,71]	[65,95; 68,88]	[64,96; 68,11]	[65,54; 68,90]	[65,12; 68,72]						
		Mean	279,74	294,68	301,18	310,12	315,24	322,56	325,97						
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[275,77; 283,71]	[290,73; 298,63]	[296,86; 305,50]	[305,41; 314,82]	[310,19; 320,28]	[317,20; 327,92]	[320,30; 331,64]						
		Median	260,00	280,00	290,00	300,00	300,00	300,00	310,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		2977	2408	2064	1777	1558	1357						
		Mittlere Differenz zur ED		23,36	33,10	46,61	56,12	66,39	72,04						
		CI mittlere Differenz		[20,47; 26,25]	[29,65; 36,56]	[42,85; 50,38]	[51,94; 60,30]	[61,66; 71,11]	[66,65; 77,43]						
		Median mittlere Differenz		19,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00						
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005						
	auswertbar	Anzahl	4076	3508	3026	2638	2377	2116	1876						
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2412	2422	2032	1800	1609	1443	1274						
		Anteil in %	59,18	69,04	67,15	68,23	67,69	68,19	67,91						
		CI Anteil in %	[57,67; 60,68]	[67,51; 70,57]	[65,48; 68,83]	[66,46; 70,01]	[65,81; 69,57]	[66,21; 70,18]	[65,80; 70,02]						
		Mean	227,36	246,33	256,00	268,31	279,06	291,01	299,56						
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[224,00; 230,72]	[242,94; 249,72]	[252,24; 259,77]	[264,10; 272,52]	[274,40; 283,71]	[285,93; 296,09]	[294,03; 305,10]						
		Median	220,00	240,00	250,00	250,00	260,00	276,00	287,50						
		Fallbasis mittlere Differenz		1885	1592	1395	1240	1116	994						
		Mittlere Differenz zur ED		22,58	34,19	48,92	59,70	72,18	80,50						
		CI mittlere Differenz		[19,74; 25,41]	[31,09; 37,29]	[45,28; 52,57]	[55,55; 63,86]	[67,49; 76,88]	[75,46; 85,54]						
		Median mittlere Differenz		0,00	0,41	0,67	1,06	1,35	1,52						
2010-1	Patienten < 18 insges.	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291							
	auswertbar	Anzahl	6818	5584	4727	4067	3541	3075							
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	4051	3855	3228	2781	2429	2118							
		Anteil in %	59,42	69,04	68,29	68,38	68,60	68,88							
		CI Anteil in %	[58,25; 60,58]	[67,82; 70,25]	[66,96; 69,62]	[66,95; 69,81]	[67,07; 70,13]	[67,24; 70,51]							
		Mean	272,31	289,25	297,87	303,82	314,08	323,22							
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[268,49; 276,13]	[285,26; 293,23]	[293,58; 302,17]	[299,21; 308,43]	[309,08; 319,08]	[317,77; 328,68]							
		Median	250,00	270,00	280,00	290,00	300,00	300,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		3077	2556	2180	1888	1634							
		Mittlere Differenz zur ED		22,64	34,00	43,24	58,48	68,43							
		CI mittlere Differenz		[19,94; 25,34]	[30,82; 37,18]	[39,90; 46,58]	[54,49; 62,47]	[64,14; 72,73]							
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	40,00	55,00	65,00							
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241							
	auswertbar	Anzahl	4191	3529	3048	2679	2384	2114							
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2475	2486	2113	1867	1661	1477							
		Anteil in %	59,06	70,44	69,32	69,69	69,67	69,87							
		CI Anteil in %	[57,57; 60,54]	[68,94; 71,95]	[67,69; 70,96]	[67,95; 71,43]	[67,83; 71,52]	[67,91; 71,82]							
		Mean	219,88	238,53	249,01	258,30	271,09	282,51							
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[216,62; 223,15]	[235,22; 241,83]	[245,33; 252,70]	[254,36; 262,25]	[266,73; 275,44]	[277,60; 287,42]							
		Median	207,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		1940	1646	1443	1271	1123							
		Mittlere Differenz zur ED		21,11	34,60	44,19	58,69	70,65							
		CI mittlere Differenz		[18,46; 23,76]	[31,37; 37,83]	[40,74; 47,64]	[54,84; 62,54]	[66,27; 75,03]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,35	0,68	1,07	1,44							

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	Patienten < 18 insges.	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731									
	auswertbar	Anzahl	6677	5496	4636	4026	3474									
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	4048	3820	3136	2758	2340									
		Anteil in %	60,63	69,51	67,64	68,50	67,36									
		CI Anteil in %	[59,45; 61,80]	[68,29; 70,72]	[66,30; 68,99]	[67,07; 69,94]	[65,80; 68,92]									
		Mean	276,92	284,26	295,81	299,52	306,50									
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[273,05; 280,80]	[280,35; 288,18]	[291,49; 300,12]	[295,04; 304,00]	[301,63; 311,36]									
		Median	258,50	264,50	280,00	280,00	290,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		3095	2545	2181	1852									
		Mittlere Differenz zur ED		19,29	30,43	38,46	48,19									
		CI mittlere Differenz		[16,56; 22,01]	[27,09; 33,77]	[34,87; 42,05]	[44,13; 52,26]									
		Median mittlere Differenz		12,00	30,00	36,00	47,00									
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591									
	auswertbar	Anzahl	4244	3611	3119	2750	2432									
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2559	2592	2168	1940	1678									
		Anteil in %	60,30	71,78	69,51	70,55	69,00									
		CI Anteil in %	[58,82; 61,77]	[70,31; 73,25]	[67,89; 71,13]	[68,84; 72,25]	[67,16; 70,84]									
		Mean	224,56	240,14	252,34	259,65	269,81									
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[221,11; 228,01]	[236,80; 243,49]	[248,58; 256,11]	[255,70; 263,60]	[265,42; 274,19]									
		Median	210,00	230,00	247,00	250,00	260,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		2063	1737	1511	1316									
		Mittlere Differenz zur ED		18,64	29,79	40,66	52,61									
		CI mittlere Differenz		[15,87; 21,40]	[26,52; 33,05]	[37,07; 44,26]	[48,64; 56,58]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,36	0,62	0,88									
2011-1	Patienten < 18 insges.	Anzahl	6222	5297	4479	3847										
	auswertbar	Anzahl	6221	5075	4213	3563										
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	3853	3546	2908	2435										
		Anteil in %	61,94	69,87	69,02	68,34										
		CI Anteil in %	[60,73; 63,14]	[68,61; 71,13]	[67,63; 70,42]	[66,81; 69,87]										
		Mean	270,82	285,00	290,92	297,28										
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[267,01; 274,62]	[280,97; 289,04]	[286,51; 295,32]	[292,51; 302,06]										
		Median	250,00	268,00	280,00	280,00										
		Fallbasis mittlere Differenz		2927	2371	1981										
		Mittlere Differenz zur ED		22,37	30,60	42,38										
		CI mittlere Differenz		[19,66; 25,09]	[27,44; 33,77]	[38,94; 45,83]										
		Median mittlere Differenz		13,00	30,00	40,00										
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	3862	3376	2940	2581										
	auswertbar	Anzahl	3862	3260	2800	2427										
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2376	2307	1936	1678										
		Anteil in %	61,52	70,77	69,14	69,14										
		CI Anteil in %	[59,99; 63,06]	[69,21; 72,33]	[67,43; 70,85]	[67,30; 70,98]										
		Mean	219,09	236,94	245,07	254,30										
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[215,73; 222,44]	[233,36; 240,53]	[241,23; 248,91]	[250,15; 258,45]										
		Median	210,00	230,00	240,00	250,00										
		Fallbasis mittlere Differenz		1882	1560	1345										
		Mittlere Differenz zur ED		21,21	30,79	41,07										
		CI mittlere Differenz		[18,30; 24,12]	[27,62; 33,96]	[37,48; 44,66]										
		Median mittlere Differenz		0,01	0,40	0,63										

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	Patienten < 18 insges.	Anzahl	6269	5394	4553											
	auswertbar	Anzahl	6268	5147	4244											
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	3781	3522	2814											
		Anteil in %	60,32	68,43	66,31											
		CI Anteil in %	[59,11; 61,53]	[67,16; 69,70]	[64,88; 67,73]											
		Mean	273,02	285,49	290,29											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[268,96; 277,08]	[281,46; 289,52]	[285,76; 294,82]											
		Median	250,00	270,00	270,00											
		Fallbasis mittlere Differenz		2893	2311											
		Mittlere Differenz zur ED		20,09	30,99											
		CI mittlere Differenz		[17,44; 22,73]	[27,76; 34,22]											
		Median mittlere Differenz		18,00	30,00											
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	3957	3484	3022											
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2877											
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2384	2362	1968											
		Anteil in %	60,25	70,17	68,40											
		CI Anteil in %	[58,72; 61,77]	[68,63; 71,72]	[66,71; 70,10]											
		Mean	220,36	238,28	247,48											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[216,86; 223,86]	[234,84; 241,73]	[243,56; 251,40]											
		Median	206,00	230,00	240,00											
		Fallbasis mittlere Differenz		1902	1578											
		Mittlere Differenz zur ED		20,87	32,76											
		CI mittlere Differenz		[18,13; 23,62]	[29,64; 35,88]											
		Median mittlere Differenz		0,00	0,24											
2012-1	Patienten < 18 insges.	Anzahl	6684	5721												
	auswertbar	Anzahl	6683	5430												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	4102	3792												
		Anteil in %	61,38	69,83												
		CI Anteil in %	[60,21; 62,55]	[68,61; 71,06]												
		Mean	268,39	277,99												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[264,65; 272,12]	[274,23; 281,75]												
		Median	250,00	250,00												
		Fallbasis mittlere Differenz		3115												
		Mittlere Differenz zur ED		19,13												
		CI mittlere Differenz		[16,60; 21,66]												
		Median mittlere Differenz		16,00												
	Patienten < 12 insges.	Anzahl	4314	3782												
	auswertbar	Anzahl	4314	3629												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2601	2576												
		Anteil in %	60,29	70,98												
		CI Anteil in %	[58,83; 61,75]	[69,51; 72,46]												
		Mean	215,55	231,42												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[212,36; 218,74]	[228,36; 234,48]												
		Median	200,00	220,00												
		Fallbasis mittlere Differenz		2064												
		Mittlere Differenz zur ED		18,38												
		CI mittlere Differenz		[15,72; 21,03]												
		Median mittlere Differenz		0,00												

EZ	Peak-Flow-Absolutwert		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2012-2	Patienten < 18 insges.	Anzahl	5942															
	auswertbar	Anzahl	5941															
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	3728															
		Anteil in %	62,75															
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[61,52; 63,98]															
		Mean	271,84															
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[267,85; 275,84]															
		Median	250,00															
		Fallbasis mittlere Differenz																
		Mittlere Differenz zur ED																
		CI mittlere Differenz																
	Peak-Flow- Mittelwert	Median mittlere Differenz																
		Patienten < 12 insges.	Anzahl	3748														
		auswertbar	Anzahl	3748														
		mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2314														
			Anteil in %	61,74														
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[60,18; 63,30]															
		Mean	219,12															
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[215,70; 222,53]															
		Median	210,00															
Fallbasis mittlere Differenz																		
Mittlere Differenz zur ED																		
CI mittlere Differenz																		
Peak-Flow- Mittelwert	Median mittlere Differenz																	

In Tabelle 3.3.1b wird im Unterschied zur Tabelle 3.3.1a zusätzlich zwischen „männlichen“ und „weiblichen“ Patienten <18 bzw. <12 unterschieden.

In der Tabelle 3.3.1b werden die Auswertungsergebnisse zu den **Peak-Flow-Absolutwerten** ausgewiesen. Zunächst wird für jede Kohorte unter „männliche bzw. weibliche Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der auswertbaren Patienten dokumentiert. Das sind diejenigen Patienten für die entweder ein plausible Peak-Flow-Wert dokumentiert ist oder angegeben ist, dass keine Peak-Flow-Messung durchgeführt wurde. Danach wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Patienten eine Peak-Flow-Messung durchgeführt wurde („mit Peak-Flow-Messung“) und wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

Für die Gruppe der Patienten mit Peak-Flow-Messung wird nun der im jeweiligen Berichtshalbjahr gemessene durchschnittliche Peak-Flow-Wert sowie die mittlere Differenz zum Wert in der Erstdokumentation abgebildet. Für die Berechnung dieser durchschnittlichen Differenz zwischen dem Peak-Flow-Wert im Berichtshalbjahr und Beitritts-halb-jahr (es handelt sich dabei nicht um die Differenz der Mittelwerte der beiden Berichtshalbjahre) müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Erwachsenen im Berichtshalbjahr und wird deswegen gesondert aufgeführt.

Da die Dokumentation der gemessenen Absolutwerte zum Halbjahr 2008-2 eingeführt wurde, können für die Berichtshalbjahre bis 2008-1 keine Werte dargestellt werden. Der Ausweis der mittleren Differenz zur Erstdokumentation ist definitionsgemäß erst ab dem Berichtshalbjahr 2009-1 möglich.

Tabelle 3.3.1b Peak-Flow-Absolutwert bei männlichen und weiblichen Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	245	237	211	193	175	161	140	124	117	108	102	90	81	73
	auswertbar	Anzahl						157	136	122	115	107	100	89	79	70
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl						105	87	75	81	79	69	67	55	46
		Anteil in %						66,88	63,97	61,48	70,43	73,83	69,00	75,28	69,62	65,71
		CI Anteil in %						[59,49; 74,26]	[55,87; 72,07]	[52,80; 70,15]	[62,06; 78,81]	[65,46; 82,20]	[59,89; 78,11]	[66,27; 84,29]	[59,41; 79,83]	[54,51; 76,91]
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean						320,73	328,56	322,65	358,80	359,16	383,36	383,99	421,78	436,96
		CI Mean						[293,91; 347,55]	[304,72; 352,41]	[291,18; 354,13]	[325,32; 392,29]	[321,63; 396,69]	[346,64; 420,08]	[346,94; 421,03]	[379,37; 464,19]	[389,64; 484,27]
		Median						300,00	330,00	307,00	350,00	340,00	360,00	360,00	374,00	401,00
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	128	119	112	104	90	85	76	72	67	61	54	50	46	42
	auswertbar	Anzahl						81	76	72	66	58	49	46	44	40
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl						48	43	47	42	41	34	34	31	25
		Anteil in %						59,26	56,58	65,28	63,64	70,69	69,39	73,91	70,45	62,50
		CI Anteil in %						[48,49; 70,03]	[45,36; 67,80]	[54,20; 76,35]	[51,94; 75,33]	[58,87; 82,51]	[56,35; 82,43]	[61,08; 86,74]	[56,82; 84,09]	[47,31; 77,69]
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean						281,54	285,37	307,43	316,05	322,10	314,26	329,44	348,48	348,28
		CI Mean						[254,99; 308,09]	[255,44; 315,30]	[272,62; 342,23]	[279,49; 352,60]	[291,38; 352,81]	[278,51; 350,02]	[299,91; 358,97]	[312,71; 384,25]	[299,64; 396,92]
		Median						278,00	300,00	300,00	300,00	320,00	324,00	335,00	360,00	350,00
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	175	170	150	139	126	117	100	92	88	83	79	70	62	58
	auswertbar	Anzahl						114	98	90	87	82	78	70	61	55
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl						78	64	54	61	61	52	54	44	37
		Anteil in %						68,42	65,31	60,00	70,11	74,39	66,67	77,14	72,13	67,27
		CI Anteil in %						[59,85; 76,99]	[55,83; 74,78]	[49,82; 70,18]	[60,44; 79,79]	[64,88; 83,90]	[56,14; 77,20]	[67,23; 87,05]	[60,79; 83,48]	[54,76; 79,79]
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean						284,92	297,14	282,89	335,56	349,74	364,81	374,67	419,05	435,51
		CI Mean						[265,82; 304,03]	[275,31; 318,97]	[255,58; 310,20]	[300,37; 370,75]	[309,84; 389,64]	[324,43; 405,19]	[333,41; 415,93]	[376,38; 461,71]	[387,85; 483,17]
		Median						280,00	300,00	300,00	320,00	325,00	335,00	350,00	372,00	400,00
		Fallbasis mittlere Differenz														
Mittlere Differenz zur ED																
CI mittlere Differenz																
Median mittlere Differenz																
weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	75	70	67	63	54	50	45	43	38	35	32	31	29	27	
auswertbar	Anzahl						47	45	43	37	33	30	28	28	26	
mit Peak-Flow- Messung	Anzahl						30	26	28	22	20	19	20	18	16	
	Anteil in %						63,83	57,78	65,12	59,46	60,61	63,33	71,43	64,29	61,54	
	CI Anteil in %						[49,94; 77,72]	[43,18; 72,37]	[50,70; 79,53]	[43,42; 75,50]	[43,68; 77,54]	[45,79; 80,87]	[54,39; 88,47]	[46,21; 82,36]	[42,47; 80,61]	
Peak-Flow- Mittelwert	Mean						271,80	270,38	290,61	297,91	311,75	299,37	330,50	340,33	357,44	
	CI Mean						[245,49; 298,11]	[244,01; 296,76]	[256,76; 324,46]	[262,53; 333,28]	[275,80; 347,70]	[263,30; 335,44]	[297,34; 363,66]	[299,15; 381,51]	[295,02; 419,86]	
	Median						252,50	265,00	287,50	300,00	300,00	300,00	335,00	360,00	350,00	
	Fallbasis mittlere Differenz															
	Mittlere Differenz zur ED															
	CI mittlere Differenz															
	Median mittlere Differenz															

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2080	1925	1710	1550	1419	1314	1171	1041	932	829	752	674	599
	auswertbar	Anzahl					1347	1243	1121	999	892	794	710	634	552
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl					847	794	749	679	609	540	492	451	388
		Anteil in %					62,88	63,88	66,82	67,97	68,27	68,01	69,30	71,14	70,29
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %					[60,30; 65,46]	[61,21; 66,55]	[64,06; 69,57]	[65,07; 70,86]	[65,22; 71,33]	[64,76; 71,26]	[65,90; 72,69]	[67,61; 74,67]	[66,47; 74,11]
		Mean					324,09	329,76	346,08	355,46	362,81	373,62	389,52	398,16	413,30
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean					[315,20; 332,98]	[320,72; 338,80]	[336,99; 355,17]	[346,35; 364,56]	[352,40; 373,21]	[362,44; 384,80]	[377,85; 401,18]	[385,97; 410,34]	[400,61; 425,98]
		Median					300,00	310,00	330,00	340,00	350,00	350,00	368,50	385,00	400,00
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	1239	1144	1037	917	841	774	690	600	544	485	417	371	331
	auswertbar	Anzahl					777	731	656	573	514	469	394	354	311
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl					486	478	401	350	320	293	253	237	201
		Anteil in %					62,55	65,39	61,13	61,08	62,26	62,47	64,21	66,95	64,63
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %					[59,14; 65,95]	[61,94; 68,84]	[57,39; 64,86]	[57,09; 65,08]	[58,06; 66,45]	[58,09; 66,86]	[59,47; 68,95]	[62,04; 71,86]	[59,31; 69,95]
		Mean					307,57	316,92	317,12	333,99	336,67	335,08	349,90	351,55	355,82
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean					[297,54; 317,61]	[307,11; 326,72]	[306,53; 327,72]	[322,90; 345,07]	[324,57; 348,76]	[322,39; 347,78]	[335,89; 363,91]	[337,32; 365,78]	[340,36; 371,28]
		Median					300,00	310,00	310,00	332,50	330,00	330,00	349,00	350,00	350,00
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1491	1397	1245	1146	1059	993	900	835	756	689	631	576	515
	auswertbar	Anzahl					1006	943	870	804	731	664	603	545	471
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl					662	625	598	554	505	455	422	388	330
		Anteil in %					65,81	66,28	68,74	68,91	69,08	68,52	69,98	71,19	70,06
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %					[62,87; 68,74]	[63,26; 69,30]	[65,65; 71,82]	[65,70; 72,11]	[65,73; 72,44]	[64,99; 72,06]	[66,32; 73,64]	[67,39; 75,00]	[65,92; 74,20]
		Mean					289,64	296,13	315,07	330,91	340,63	359,59	375,01	387,80	405,25
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean					[281,92; 297,36]	[288,18; 304,07]	[307,15; 322,99]	[322,59; 339,24]	[331,07; 350,19]	[348,75; 370,43]	[363,67; 386,36]	[375,53; 400,06]	[392,47; 418,04]
		Median					284,00	293,00	301,00	320,00	328,00	346,00	350,00	370,00	400,00
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	809	761	697	616	573	534	479	428	396	357	317	286	255
	auswertbar	Anzahl					532	504	459	410	374	346	300	276	239
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl					344	342	286	254	238	218	189	184	150
		Anteil in %					64,66	67,86	62,31	61,95	63,64	63,01	63,00	66,67	62,76
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %					[60,60; 68,73]	[63,78; 71,94]	[57,87; 66,75]	[57,25; 66,66]	[58,75; 68,52]	[57,91; 68,10]	[57,53; 68,47]	[61,10; 72,24]	[56,62; 68,90]
		Mean					281,62	297,74	299,94	322,32	326,26	327,37	340,14	341,79	344,73
Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean					[271,10; 292,13]	[287,07; 308,41]	[288,39; 311,49]	[310,29; 334,35]	[313,30; 339,22]	[313,15; 341,59]	[325,49; 354,78]	[325,66; 357,91]	[328,87; 360,60]	
	Median					270,00	290,00	299,00	320,00	320,00	320,00	330,00	340,00	350,00	
	Fallbasis mittlere Differenz														
	Mittlere Differenz zur ED														
	CI mittlere Differenz														
	Median mittlere Differenz														

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3716	3376	3002	2713	2451	2217	1974	1790	1583	1435	1294	1153	
	auswertbar	Anzahl				2529	2317	2111	1878	1697	1510	1350	1217	1063	
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl				1523	1497	1340	1244	1114	971	881	801	707	
		Anteil in %				60,22	64,61	63,48	66,24	65,65	64,30	65,26	65,82	66,51	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %				[58,31; 62,13]	[61,42; 66,56]	[61,42; 65,53]	[64,10; 68,38]	[63,39; 67,91]	[61,89; 66,72]	[62,72; 67,80]	[63,15; 68,48]	[63,67; 69,35]	
		Mean				320,89	330,46	339,95	351,79	359,61	368,15	374,84	384,51	394,27	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean				[314,42; 327,36]	[323,57; 337,35]	[332,66; 347,23]	[344,30; 359,28]	[351,68; 367,54]	[360,00; 376,30]	[366,06; 383,61]	[374,89; 394,14]	[384,19; 404,35]	
		Median				300,00	300,00	320,00	331,50	350,00	350,00	350,00	370,00	390,00	
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2333	2105	1855	1658	1489	1335	1179	1055	926	817	740	665	
	auswertbar	Anzahl				1523	1411	1266	1099	990	880	771	690	613	
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl				895	909	815	728	632	583	504	451	407	
		Anteil in %				58,77	64,42	64,38	66,24	63,84	66,25	65,37	65,36	66,39	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %				[56,29; 61,24]	[61,92; 66,92]	[61,74; 67,02]	[63,44; 69,04]	[60,84; 66,83]	[63,12; 69,38]	[62,01; 68,73]	[61,81; 68,92]	[62,65; 70,14]	
		Mean				297,69	308,10	310,99	325,08	330,27	341,48	350,20	357,47	359,66	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean				[290,93; 304,45]	[301,20; 315,00]	[303,75; 318,22]	[317,49; 332,67]	[322,19; 338,35]	[333,22; 349,75]	[341,32; 359,07]	[348,12; 366,82]	[349,56; 369,76]	
		Median				300,00	300,00	300,00	320,00	329,50	340,00	350,00	350,00	350,00	
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2474	2274	2038	1854	1709	1575	1450	1331	1215	1120	1033	946	
	auswertbar	Anzahl				1749	1626	1513	1401	1273	1169	1064	984	884	
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl				1105	1087	980	927	843	757	699	657	588	
		Anteil in %				63,18	66,85	64,77	66,17	66,22	64,76	65,70	66,77	66,52	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %				[60,92; 65,44]	[64,56; 69,14]	[62,36; 67,18]	[63,69; 68,65]	[63,62; 68,82]	[62,02; 67,50]	[62,84; 68,55]	[63,82; 69,71]	[63,40; 69,63]	
		Mean				281,22	289,65	300,47	315,78	327,88	342,02	351,60	365,63	377,37	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean				[275,69; 286,75]	[283,73; 295,56]	[294,12; 306,82]	[308,95; 322,61]	[320,28; 335,48]	[334,12; 349,92]	[343,03; 360,16]	[356,09; 375,17]	[367,39; 387,36]	
		Median				270,00	280,00	300,00	300,00	319,00	330,00	340,00	350,00	364,00	
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1445	1319	1180	1081	987	911	826	758	678	611	561	521	
	auswertbar	Anzahl				993	943	883	782	717	647	583	534	491	
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl				624	638	601	533	478	448	389	363	335	
		Anteil in %				62,84	67,66	68,06	68,16	66,67	69,24	66,72	67,98	68,23	
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %				[59,83; 65,85]	[64,67; 70,64]	[64,99; 71,14]	[64,89; 71,43]	[63,21; 70,12]	[65,68; 72,80]	[62,90; 70,55]	[64,02; 71,94]	[64,11; 72,35]	
		Mean				275,30	289,05	294,52	311,97	318,81	333,52	338,39	348,66	356,18	
Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean				[268,38; 282,22]	[281,79; 296,32]	[286,94; 302,11]	[304,01; 319,94]	[310,14; 327,48]	[324,63; 342,41]	[328,78; 348,00]	[338,67; 358,66]	[345,29; 367,07]		
	Median				260,00	280,00	290,00	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00		
	Fallbasis mittlere Differenz														
	Mittlere Differenz zur ED														
	CI mittlere Differenz														
	Median mittlere Differenz														

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	6106	5468	4898	4394	3876	3451	3101	2773	2485	2226	1983		
	auswertbar	Anzahl			4513	4122	3704	3296	2940	2626	2379	2081	1822		
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			2663	2633	2388	2201	1927	1748	1591	1380	1203		
		Anteil in %			59,01	63,88	64,47	66,78	65,54	66,57	66,88	66,31	66,03		
		CI Anteil in %			[57,57; 60,44]	[62,41; 65,34]	[62,93; 66,01]	[65,17; 68,39]	[63,83; 67,26]	[64,76; 68,37]	[64,99; 68,77]	[64,28; 68,35]	[63,85; 68,20]		
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean			306,65	317,08	327,99	335,73	341,91	354,46	362,97	369,36	376,32		
		CI Mean			[301,85; 311,46]	[312,15; 322,02]	[322,78; 333,20]	[330,31; 341,16]	[336,13; 347,69]	[348,26; 360,66]	[356,54; 369,40]	[362,26; 376,47]	[368,92; 383,71]		
		Median			290,00	300,00	300,00	310,00	320,00	338,50	350,00	350,00	360,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3661	3306	2974	2658	2332	2056	1825	1629	1455	1285	1155		
	auswertbar	Anzahl			2726	2502	2214	1958	1732	1545	1368	1211	1075		
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			1650	1650	1477	1332	1169	1041	943	847	729		
		Anteil in %			60,53	65,95	66,71	68,03	67,49	67,38	68,93	69,94	67,81		
		CI Anteil in %			[58,69; 62,36]	[64,09; 67,80]	[64,75; 68,68]	[65,96; 70,09]	[65,29; 69,70]	[65,04; 69,72]	[66,48; 71,39]	[67,36; 72,53]	[65,02; 70,61]		
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean			301,76	299,38	305,31	311,84	314,42	318,35	328,61	334,88	342,40		
		CI Mean			[296,18; 307,34]	[293,98; 304,77]	[299,61; 311,01]	[305,98; 317,70]	[308,27; 320,57]	[311,89; 324,81]	[321,93; 335,29]	[328,00; 341,76]	[335,00; 349,80]		
		Median			300,00	300,00	300,00	301,00	310,00	320,00	324,00	330,00	340,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	4250	3854	3470	3146	2817	2566	2358	2174	1978	1800	1632		
	auswertbar	Anzahl			3242	2986	2713	2472	2254	2067	1908	1699	1516		
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			1973	1967	1797	1707	1518	1406	1290	1136	1012		
		Anteil in %			60,86	65,87	66,24	69,05	67,35	68,02	67,61	66,86	66,75		
		CI Anteil in %			[59,18; 62,54]	[64,17; 67,57]	[64,46; 68,02]	[67,23; 70,88]	[65,41; 69,28]	[66,01; 70,03]	[65,51; 69,71]	[64,62; 69,10]	[64,38; 69,13]		
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean			266,32	277,17	288,75	301,83	310,43	327,11	339,55	346,70	358,37		
		CI Mean			[262,26; 270,37]	[272,92; 281,42]	[284,23; 293,28]	[296,97; 306,69]	[305,10; 315,77]	[321,16; 333,06]	[333,27; 345,83]	[339,83; 353,57]	[351,05; 365,69]		
		Median			250,00	270,00	280,00	298,00	300,00	310,00	320,00	330,00	350,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2259	2068	1884	1705	1537	1406	1276	1166	1061	954	865		
	auswertbar	Anzahl			1738	1631	1481	1353	1220	1109	1013	898	812		
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl			1090	1106	1027	945	840	767	719	642	552		
		Anteil in %			62,72	67,81	69,35	69,84	68,85	69,16	70,98	71,49	67,98		
		CI Anteil in %			[60,44; 64,99]	[65,54; 70,08]	[67,00; 71,69]	[67,40; 72,29]	[66,25; 71,45]	[66,44; 71,88]	[68,18; 73,77]	[68,54; 74,45]	[64,77; 71,19]		
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean			264,38	269,34	278,99	288,70	295,78	304,78	316,07	324,87	332,30		
		CI Mean			[258,70; 270,05]	[263,67; 275,01]	[273,11; 284,87]	[282,68; 294,73]	[289,36; 302,21]	[297,61; 311,94]	[308,99; 323,15]	[317,59; 332,16]	[324,31; 340,30]		
		Median			250,00	260,00	270,00	280,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-1	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	6438	5793	5197	4421	3839	3413	3030	2686	2367	2105			
	auswertbar	Anzahl		4904	4812	4170	3637	3220	2874	2523	2209	1930			
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl		3125	3021	2697	2430	2103	1904	1654	1460	1274			
		Anteil in %		63,72	62,78	64,68	66,81	65,31	66,25	65,56	66,09	66,01			
		CI Anteil in %		[62,38; 65,07]	[61,41; 64,15]	[63,23; 66,13]	[65,28; 68,34]	[63,67; 66,95]	[64,52; 67,98]	[63,70; 67,41]	[64,12; 68,07]	[63,90; 68,12]			
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean		294,52	302,92	310,74	320,94	331,15	340,28	354,85	359,38	369,78			
		CI Mean		[290,18; 298,85]	[298,42; 307,41]	[306,04; 315,45]	[315,98; 325,91]	[325,76; 336,53]	[334,57; 346,00]	[348,58; 361,12]	[352,60; 366,16]	[362,45; 377,10]			
		Median		280,00	280,00	295,00	300,00	310,00	320,00	345,00	350,00	350,00			
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	4001	3616	3192	2722	2370	2072	1827	1611	1422	1268			
	auswertbar	Anzahl		3076	2969	2572	2244	1966	1724	1519	1343	1179			
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl		1902	1861	1616	1439	1277	1143	985	863	737			
		Anteil in %		61,83	62,68	62,83	64,13	64,95	66,30	64,85	64,26	62,51			
		CI Anteil in %		[60,12; 63,55]	[60,94; 64,42]	[60,96; 64,70]	[62,14; 66,11]	[62,84; 67,06]	[64,07; 68,53]	[62,44; 67,25]	[61,70; 66,82]	[59,75; 65,28]			
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean		287,10	293,44	297,77	303,94	311,45	317,84	326,50	330,54	335,88			
		CI Mean		[282,04; 292,16]	[288,49; 298,39]	[292,54; 303,00]	[298,47; 309,41]	[305,70; 317,20]	[311,87; 323,81]	[319,85; 333,15]	[323,68; 337,40]	[328,00; 343,75]			
		Median		280,00	290,00	300,00	300,00	305,00	318,00	320,00	330,00	330,00			
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	4173	3820	3465	3020	2693	2434	2205	1992	1795	1632			
	auswertbar	Anzahl		3269	3260	2877	2582	2318	2105	1891	1692	1518			
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl		2172	2127	1926	1761	1549	1435	1258	1134	1010			
		Anteil in %		66,44	65,25	66,94	68,20	66,82	68,17	66,53	67,02	66,53			
		CI Anteil in %		[64,82; 68,06]	[63,61; 66,88]	[65,23; 68,66]	[66,41; 70,00]	[64,91; 68,74]	[66,18; 70,16]	[64,40; 68,65]	[64,78; 69,26]	[64,16; 68,91]			
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean		249,19	258,81	268,17	279,89	293,68	304,39	321,21	329,84	345,92			
		CI Mean		[245,66; 252,72]	[254,92; 262,70]	[264,19; 272,15]	[275,58; 284,19]	[288,84; 298,53]	[299,22; 309,57]	[315,36; 327,05]	[323,56; 336,11]	[338,90; 352,95]			
		Median		250,00	250,00	250,00	270,00	280,00	300,00	310,00	320,00	340,00			
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2281	2097	1902	1652	1490	1351	1229	1115	1002	906			
	auswertbar	Anzahl		1822	1797	1585	1431	1285	1169	1062	952	848			
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl		1158	1131	1017	939	849	788	696	622	551			
		Anteil in %		63,56	62,94	64,16	65,62	66,07	67,41	65,54	65,34	64,98			
		CI Anteil in %		[61,35; 65,77]	[60,70; 65,17]	[61,80; 66,53]	[63,16; 68,08]	[63,48; 68,66]	[64,72; 70,10]	[62,68; 68,40]	[62,31; 68,36]	[61,76; 68,19]			
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean		245,16	256,66	264,47	277,19	286,35	297,08	310,21	318,27	324,18			
		CI Mean		[240,27; 250,05]	[251,46; 261,87]	[258,98; 269,95]	[271,25; 283,13]	[280,08; 292,62]	[290,71; 303,45]	[302,98; 317,45]	[310,89; 325,65]	[316,15; 332,21]			
		Median		240,00	250,00	250,00	260,00	280,00	300,00	300,00	310,00	320,00			
Fallbasis mittlere Differenz															
Mittlere Differenz zur ED															
CI mittlere Differenz															
Median mittlere Differenz															

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	5542	4981	4285	3735	3321	2936	2632	2329	2096				
	auswertbar	Anzahl	5540	4737	4036	3524	3128	2775	2487	2179	1936				
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2841	3081	2611	2282	2041	1796	1597	1424	1263				
		Anteil in %	51,28	65,04	64,69	64,76	65,25	64,72	64,21	65,35	65,24				
		CI Anteil in %	[49,97; 52,60]	[63,68; 66,40]	[63,22; 66,17]	[63,18; 66,33]	[63,58; 66,92]	[62,94; 66,50]	[62,33; 66,10]	[63,35; 67,35]	[63,12; 67,36]				
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	294,46	305,79	313,98	324,60	334,33	341,57	353,98	357,79	370,60				
		CI Mean	[289,21; 299,71]	[300,97; 310,61]	[308,75; 319,21]	[318,94; 330,26]	[328,39; 340,26]	[334,99; 348,15]	[347,05; 360,91]	[350,65; 364,92]	[362,84; 378,37]				
		Median	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00	319,50	340,00	340,00	350,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		2208	1837	1585	1394	1209	1078	955	842				
		Mittlere Differenz zur ED		18,70	32,22	43,23	57,49	68,22	83,46	92,78	106,31				
		CI mittlere Differenz		[15,19; 22,21]	[27,87; 36,57]	[38,33; 48,12]	[52,41; 62,57]	[62,34; 74,10]	[77,04; 89,87]	[85,92; 99,65]	[98,87; 113,75]				
		Median mittlere Differenz		15,00	30,00	40,00	52,00	62,00	80,00	90,00	103,00				
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3561	3163	2711	2360	2078	1819	1621	1423	1274				
	auswertbar	Anzahl	3561	2993	2576	2222	1968	1708	1514	1315	1177				
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1849	1929	1657	1432	1300	1130	1007	866	779				
		Anteil in %	51,92	64,45	64,32	64,45	66,06	66,16	66,51	65,86	66,19				
		CI Anteil in %	[50,28; 53,56]	[62,74; 66,17]	[62,47; 66,17]	[62,46; 66,44]	[63,96; 68,15]	[63,91; 68,40]	[64,13; 68,89]	[63,29; 68,42]	[63,48; 68,89]				
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	285,58	297,54	302,10	309,35	309,04	317,17	322,72	323,06	328,39				
		CI Mean	[280,11; 291,05]	[292,15; 302,93]	[296,62; 307,58]	[303,39; 315,31]	[302,86; 315,21]	[310,65; 323,70]	[315,84; 329,61]	[315,77; 330,35]	[320,84; 335,94]				
		Median	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	314,00	320,00	324,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		1394	1168	986	882	764	673	580	512				
		Mittlere Differenz zur ED		20,62	28,33	37,53	46,37	56,24	63,15	65,95	69,00				
		CI mittlere Differenz		[16,26; 24,97]	[23,18; 33,47]	[31,63; 43,44]	[39,98; 52,76]	[48,97; 63,52]	[55,53; 70,76]	[56,74; 75,16]	[59,40; 78,60]				
		Median mittlere Differenz		10,00	29,50	30,50	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00				
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	3620	3307	2906	2586	2344	2111	1925	1737	1584				
	auswertbar	Anzahl	3620	3192	2765	2477	2237	2015	1836	1647	1483				
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1894	2144	1857	1648	1493	1337	1204	1098	994				
		Anteil in %	52,32	67,17	67,16	66,53	66,74	66,35	65,58	66,67	67,03				
		CI Anteil in %	[50,69; 53,95]	[65,54; 68,80]	[65,41; 68,91]	[64,67; 68,39]	[64,79; 68,69]	[64,29; 68,42]	[63,40; 67,75]	[64,39; 68,94]	[64,63; 69,42]				
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	238,70	253,99	263,56	276,87	290,46	299,84	316,53	324,23	339,83				
		CI Mean	[234,65; 242,75]	[250,15; 257,82]	[259,41; 267,71]	[272,07; 281,66]	[285,19; 295,73]	[294,02; 305,65]	[309,93; 323,12]	[317,47; 330,98]	[332,46; 347,20]				
		Median	230,00	250,00	250,00	260,00	280,00	290,00	300,00	301,00	320,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		1537	1298	1141	1028	900	820	745	667				
		Mittlere Differenz zur ED		17,36	29,44	42,84	58,00	70,67	87,34	95,27	108,21				
		CI mittlere Differenz		[14,12; 20,61]	[25,73; 33,15]	[38,43; 47,25]	[53,44; 62,56]	[65,41; 75,94]	[81,25; 93,43]	[88,50; 102,03]	[101,31; 115,10]				
		Median mittlere Differenz		15,00	28,00	40,00	50,00	65,00	80,00	90,00	105,00				
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1945	1760	1539	1376	1235	1102	999	895	813				
	auswertbar	Anzahl	1945	1691	1478	1304	1182	1039	941	837	757				
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1000	1113	983	895	800	729	654	573	499				
		Anteil in %	51,41	65,82	66,51	68,63	67,68	70,16	69,50	68,46	65,92				
		CI Anteil in %	[49,19; 53,64]	[63,56; 68,08]	[64,10; 68,92]	[66,12; 71,15]	[65,01; 70,35]	[67,38; 72,95]	[66,56; 72,44]	[65,31; 71,61]	[62,54; 69,30]				
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	241,09	253,61	267,12	276,20	282,14	292,45	303,22	304,55	310,87				
		CI Mean	[234,87; 247,31]	[247,82; 259,40]	[260,84; 273,39]	[269,63; 282,76]	[274,86; 289,41]	[284,66; 300,23]	[295,02; 311,41]	[296,33; 312,78]	[302,47; 319,27]				
		Median	230,00	246,00	250,00	260,00	263,00	280,00	298,00	300,00	300,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		800	688	612	542	491	428	379	326				
		Mittlere Differenz zur ED		19,63	33,56	42,94	58,45	70,98	82,35	86,15	88,48				
CI mittlere Differenz			[14,91; 24,34]	[27,92; 39,21]	[36,21; 49,68]	[51,66; 65,23]	[62,81; 79,15]	[74,11; 90,59]	[76,13; 96,17]	[78,21; 98,76]					
Median mittlere Differenz			11,00	30,00	40,00	50,00	63,00	78,00	80,00	90,00					

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	4438	3819	3270	2863	2483	2188	1973	1740					
	auswertbar	Anzahl	4437	3666	3080	2704	2354	2045	1839	1609					
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2482	2494	2055	1826	1608	1379	1226	1070					
		Anteil in %	55,94	68,03	66,72	67,53	68,31	67,43	66,67	66,50					
		CI Anteil in %	[54,48; 57,40]	[66,52; 69,54]	[65,06; 68,39]	[65,76; 69,29]	[66,43; 70,19]	[65,40; 69,46]	[64,51; 68,82]	[64,19; 68,81]					
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	279,00	293,70	304,08	314,09	322,82	328,25	342,91	349,98					
		CI Mean	[274,00; 284,01]	[288,66; 298,73]	[298,31; 309,85]	[308,10; 320,08]	[316,27; 329,37]	[321,42; 335,08]	[335,50; 350,31]	[342,10; 357,87]					
		Median	257,00	270,50	288,00	300,00	300,00	300,00	327,00	333,50					
		Fallbasis mittlere Differenz		1899	1548	1354	1200	1029	904	785					
		Mittlere Differenz zur ED		22,71	37,09	51,52	63,76	73,01	89,92	96,16					
		CI mittlere Differenz		[19,00; 26,42]	[32,97; 41,20]	[46,91; 56,13]	[58,40; 69,13]	[67,09; 78,94]	[83,28; 96,57]	[88,98; 103,34]					
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	47,50	60,00	70,00	80,00	90,00					
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2789	2401	2064	1793	1550	1380	1225	1082					
	auswertbar	Anzahl	2789	2291	1959	1690	1484	1299	1149	1018					
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1572	1535	1276	1137	1015	891	794	690					
		Anteil in %	56,36	67,00	65,14	67,28	68,40	68,59	69,10	67,78					
		CI Anteil in %	[54,52; 58,21]	[65,08; 68,93]	[63,02; 67,25]	[65,04; 69,52]	[66,03; 70,76]	[66,07; 71,12]	[66,43; 71,78]	[64,91; 70,65]					
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	267,32	280,96	287,70	293,43	298,46	307,49	304,23	308,21					
		CI Mean	[261,51; 273,12]	[275,16; 286,76]	[281,74; 293,65]	[286,99; 299,86]	[291,45; 305,48]	[300,38; 314,61]	[296,80; 311,67]	[300,72; 315,70]					
		Median	250,00	270,00	280,00	290,00	300,00	300,00	300,00	303,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		1188	983	870	748	662	578	500					
		Mittlere Differenz zur ED		20,64	30,05	39,69	46,24	60,53	63,93	67,11					
		CI mittlere Differenz		[15,74; 25,54]	[24,83; 35,28]	[33,62; 45,75]	[39,87; 52,61]	[53,62; 67,43]	[55,87; 71,98]	[58,00; 76,21]					
		Median mittlere Differenz		15,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00					
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2838	2516	2186	1930	1704	1532	1411	1277					
	auswertbar	Anzahl	2838	2426	2079	1837	1630	1454	1332	1187					
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1603	1695	1423	1271	1138	1009	908	797					
		Anteil in %	56,48	69,87	68,45	69,19	69,82	69,39	68,17	67,14					
		CI Anteil in %	[54,66; 58,31]	[68,04; 71,69]	[66,45; 70,44]	[67,08; 71,30]	[67,59; 72,05]	[67,03; 71,76]	[65,67; 70,67]	[64,47; 69,82]					
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	226,71	245,38	255,95	266,13	279,12	288,86	305,30	314,54					
		CI Mean	[222,60; 230,82]	[241,23; 249,53]	[251,01; 260,89]	[261,01; 271,24]	[273,42; 284,82]	[282,97; 294,74]	[298,63; 311,96]	[307,15; 321,93]					
		Median	220,00	240,00	250,00	250,00	261,00	280,00	300,00	300,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		1295	1077	945	851	755	677	589					
		Mittlere Differenz zur ED		22,75	34,65	46,86	61,65	72,45	88,61	98,86					
		CI mittlere Differenz		[19,27; 26,24]	[30,39; 38,92]	[42,45; 51,26]	[56,74; 66,55]	[66,75; 78,15]	[82,16; 95,06]	[91,73; 105,98]					
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	40,00	56,00	63,00	80,00	90,00					
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1601	1408	1242	1110	979	896	819	739					
	auswertbar	Anzahl	1601	1366	1183	1063	943	853	782	701					
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	897	944	791	724	663	599	548	483					
		Anteil in %	56,03	69,11	66,86	68,11	70,31	70,22	70,08	68,90					
		CI Anteil in %	[53,60; 58,46]	[66,66; 71,56]	[64,18; 69,55]	[65,31; 70,91]	[67,39; 73,23]	[67,15; 73,29]	[66,87; 73,29]	[65,47; 72,33]					
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	220,85	237,68	250,24	260,56	265,07	282,53	282,61	291,74					
		CI Mean	[214,91; 226,80]	[232,00; 243,36]	[244,08; 256,40]	[253,82; 267,30]	[257,81; 272,33]	[274,71; 290,35]	[274,72; 290,50]	[283,26; 300,22]					
		Median	210,00	230,00	240,00	250,00	250,00	280,00	280,00	286,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		722	605	548	484	449	405	358					
		Mittlere Differenz zur ED		20,44	34,88	47,08	53,66	71,67	72,95	81,22					
		CI mittlere Differenz		[15,25; 25,62]	[28,65; 41,11]	[40,28; 53,88]	[46,18; 61,14]	[63,84; 79,50]	[64,15; 81,75]	[71,62; 90,82]					
Median mittlere Differenz			20,00	40,00	40,00	50,00	70,00	80,00	81,50						

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-2	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3997	3470	2906	2496	2216	1927	1701						
	auswertbar	Anzahl	3997	3312	2760	2346	2083	1809	1579						
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2365	2279	1851	1577	1391	1230	1065						
		Anteil in %	59,17	68,81	67,07	67,22	66,78	67,99	67,45						
		CI Anteil in %	[57,65; 60,69]	[67,23; 70,39]	[65,31; 68,82]	[65,32; 69,12]	[64,76; 68,80]	[65,84; 70,14]	[65,14; 69,76]						
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	283,55	300,10	304,29	314,24	321,39	329,84	334,40						
		CI Mean	[278,18; 288,93]	[294,81; 305,39]	[298,53; 310,05]	[307,87; 320,61]	[314,59; 328,19]	[322,54; 337,15]	[326,70; 342,10]						
		Median	260,00	278,00	280,00	300,00	300,00	300,00	310,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		1784	1446	1226	1078	944	823						
		Mittlere Differenz zur ED		26,09	32,95	50,86	61,88	73,97	80,53						
		CI mittlere Differenz		[22,25; 29,92]	[28,21; 37,70]	[45,81; 55,92]	[56,50; 67,26]	[67,92; 80,03]	[73,54; 87,51]						
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	50,00	58,00	70,00	78,00						
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2670	2326	1975	1661	1444	1273	1125						
	auswertbar	Anzahl	2670	2226	1861	1573	1362	1199	1039						
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1574	1477	1215	1065	901	792	687						
		Anteil in %	58,95	66,35	65,29	67,71	66,15	66,06	66,12						
		CI Anteil in %	[57,09; 60,82]	[64,39; 68,32]	[63,12; 67,45]	[65,39; 70,02]	[63,64; 68,67]	[63,37; 68,74]	[63,24; 69,00]						
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	274,01	286,32	296,45	304,01	305,74	311,24	312,88						
		CI Mean	[268,25; 279,76]	[280,49; 292,14]	[289,99; 302,91]	[297,15; 310,86]	[298,39; 313,09]	[303,65; 318,83]	[304,81; 320,95]						
		Median	270,00	280,00	290,00	300,00	300,00	300,00	309,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		1193	962	838	699	614	534						
		Mittlere Differenz zur ED		19,28	33,32	40,40	47,24	54,72	58,96						
		CI mittlere Differenz		[14,90; 23,67]	[28,42; 38,22]	[34,82; 45,98]	[40,65; 53,83]	[47,27; 62,18]	[50,60; 67,31]						
		Median mittlere Differenz		10,00	26,00	36,00	49,00	51,50	59,50						
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2584	2303	1987	1753	1589	1414	1281						
	auswertbar	Anzahl	2584	2209	1900	1660	1510	1340	1194						
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1550	1565	1304	1150	1036	940	823						
		Anteil in %	59,98	70,85	68,63	69,28	68,61	70,15	68,93						
		CI Anteil in %	[58,10; 61,87]	[68,95; 72,74]	[66,54; 70,72]	[67,06; 71,50]	[66,27; 70,95]	[67,70; 72,60]	[66,30; 71,55]						
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	228,29	248,29	255,83	268,24	279,60	294,17	302,30						
		CI Mean	[224,11; 232,46]	[244,14; 252,44]	[251,18; 260,48]	[263,03; 273,45]	[273,81; 285,40]	[287,55; 300,79]	[295,15; 309,44]						
		Median	220,00	241,00	250,00	250,00	260,00	275,00	287,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		1212	1022	895	806	730	646						
		Mittlere Differenz zur ED		23,27	32,85	49,44	61,32	74,72	83,23						
		CI mittlere Differenz		[19,77; 26,78]	[28,89; 36,81]	[44,76; 54,13]	[56,20; 66,43]	[68,72; 80,71]	[76,95; 89,52]						
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	50,00	55,50	70,00	75,00						
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1492	1347	1180	1025	911	813	724						
	auswertbar	Anzahl	1492	1299	1126	978	867	776	682						
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	862	857	728	650	573	503	451						
		Anteil in %	57,77	65,97	64,65	66,46	66,09	64,82	66,13						
		CI Anteil in %	[55,27; 60,28]	[63,40; 68,55]	[61,86; 67,45]	[63,50; 69,42]	[62,94; 69,24]	[61,46; 68,18]	[62,57; 69,68]						
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	225,68	242,75	256,31	268,43	278,06	285,10	294,58						
		CI Mean	[220,02; 231,35]	[236,91; 248,59]	[249,88; 262,75]	[261,28; 275,58]	[270,27; 285,86]	[277,44; 292,77]	[285,95; 303,21]						
		Median	210,00	230,00	250,00	250,00	260,00	279,00	290,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		673	570	500	434	386	348						
		Mittlere Differenz zur ED		21,32	36,58	47,99	56,71	67,39	75,43						
CI mittlere Differenz			[16,49; 26,15]	[31,62; 41,54]	[42,25; 53,73]	[49,58; 63,84]	[59,95; 74,83]	[67,01; 83,84]							
Median mittlere Differenz			20,00	30,00	40,00	50,00	65,50	72,50							

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-1	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	4155	3567	3025	2614	2284	2023							
	auswertbar	Anzahl	4155	3396	2887	2470	2168	1893							
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2473	2368	2000	1717	1510	1319							
		Anteil in %	59,52	69,73	69,28	69,51	69,65	69,68							
		CI Anteil in %	[58,03; 61,01]	[68,18; 71,27]	[67,59; 70,96]	[67,70; 71,33]	[67,71; 71,59]	[67,61; 71,75]							
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	276,14	292,08	300,92	307,10	318,85	330,31							
		CI Mean	[271,05; 281,22]	[286,80; 297,36]	[295,22; 306,63]	[301,05; 313,16]	[312,24; 325,46]	[323,07; 337,56]							
		Median	250,00	265,00	271,50	284,00	300,00	300,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		1876	1575	1342	1174	1015							
		Mittlere Differenz zur ED		23,97	36,43	46,73	63,23	75,51							
		CI mittlere Differenz		[20,49; 27,45]	[32,40; 40,47]	[42,38; 51,09]	[58,08; 68,37]	[69,94; 81,07]							
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	46,00	60,00	70,00							
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2663	2272	1938	1666	1441	1268							
	auswertbar	Anzahl	2663	2188	1840	1597	1373	1182							
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1578	1487	1228	1064	919	799							
		Anteil in %	59,26	67,96	66,74	66,62	66,93	67,60							
		CI Anteil in %	[57,39; 61,12]	[66,01; 69,92]	[64,59; 68,89]	[64,31; 68,94]	[64,44; 69,42]	[64,93; 70,27]							
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	266,30	284,73	292,91	298,52	306,25	311,52							
		CI Mean	[260,61; 272,00]	[278,75; 290,71]	[286,49; 299,32]	[291,47; 305,56]	[298,75; 313,75]	[303,47; 319,56]							
		Median	250,00	275,00	290,00	300,00	300,00	300,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		1201	981	838	714	619							
		Mittlere Differenz zur ED		20,56	30,09	37,65	50,68	56,83							
		CI mittlere Differenz		[16,30; 24,83]	[24,94; 35,24]	[32,47; 42,82]	[44,42; 56,94]	[50,20; 63,47]							
		Median mittlere Differenz		20,00	28,00	30,00	50,00	60,00							
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2712	2376	2047	1808	1605	1443							
	auswertbar	Anzahl	2712	2275	1967	1719	1535	1360							
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1602	1613	1380	1208	1089	966							
		Anteil in %	59,07	70,90	70,16	70,27	70,94	71,03							
		CI Anteil in %	[57,22; 60,92]	[69,03; 72,77]	[68,13; 72,18]	[68,11; 72,43]	[68,67; 73,22]	[68,62; 73,44]							
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	221,07	237,88	248,47	258,17	271,22	284,52							
		CI Mean	[217,06; 225,09]	[233,90; 241,87]	[243,98; 252,96]	[253,41; 262,93]	[265,85; 276,58]	[278,37; 290,66]							
		Median	210,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		1251	1068	931	824	729							
		Mittlere Differenz zur ED		21,16	34,23	45,48	58,49	72,29							
		CI mittlere Differenz		[17,97; 24,34]	[30,21; 38,25]	[41,23; 49,73]	[53,53; 63,46]	[66,78; 77,80]							
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	43,00	60,00	70,00							
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1479	1292	1135	999	888	798							
	auswertbar	Anzahl	1479	1254	1081	960	849	754							
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	873	873	733	659	572	511							
		Anteil in %	59,03	69,62	67,81	68,65	67,37	67,77							
		CI Anteil in %	[56,52; 61,53]	[67,07; 72,16]	[65,02; 70,59]	[65,71; 71,58]	[64,22; 70,53]	[64,43; 71,11]							
	Peak-Flow- Mittelwert	Mean	217,70	239,71	250,03	258,55	270,84	278,71							
CI Mean		[212,10; 223,30]	[233,85; 245,58]	[243,59; 256,47]	[251,57; 265,53]	[263,37; 278,31]	[270,55; 286,87]								
Median		200,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00								
Fallbasis mittlere Differenz			689	578	512	447	394								
Mittlere Differenz zur ED			21,02	35,29	41,86	59,06	67,62								
CI mittlere Differenz			[16,31; 25,73]	[29,89; 40,68]	[35,97; 47,75]	[53,04; 65,08]	[60,43; 74,81]								
Median mittlere Differenz			20,00	30,00	40,00	60,00	64,50								

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-2	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3936	3367	2919	2511	2217								
	auswertbar	Anzahl	3936	3237	2747	2376	2076								
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2385	2255	1857	1615	1373								
		Anteil in %	60,59	69,66	67,60	67,97	66,14								
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[59,07; 62,12]	[68,08; 71,25]	[65,85; 69,35]	[66,09; 69,85]	[64,10; 68,17]								
		Mean	279,19	286,10	297,94	301,51	310,70								
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[273,98; 284,39]	[280,75; 291,45]	[292,02; 303,87]	[295,32; 307,71]	[304,07; 317,32]								
		Median	252,00	260,00	280,00	280,00	290,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		1827	1510	1274	1094								
		Mittlere Differenz zur ED		20,40	34,41	44,27	55,21								
		CI mittlere Differenz		[16,82; 23,97]	[30,02; 38,80]	[39,59; 48,95]	[49,87; 60,56]								
		Median mittlere Differenz		13,00	30,00	40,00	50,00								
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2741	2342	2011	1746	1514								
	auswertbar	Anzahl	2741	2259	1889	1650	1398								
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1663	1565	1279	1143	967								
		Anteil in %	60,67	69,28	67,71	69,27	69,17								
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,84; 62,50]	[67,38; 71,18]	[65,60; 69,82]	[67,05; 71,50]	[66,75; 71,59]								
		Mean	273,68	281,61	292,70	296,71	300,53								
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[267,91; 279,45]	[275,96; 287,26]	[286,55; 298,85]	[290,38; 303,04]	[293,46; 307,61]								
		Median	260,00	270,00	280,00	289,00	290,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		1268	1035	907	758								
		Mittlere Differenz zur ED		17,68	24,62	30,29	38,06								
		CI mittlere Differenz		[13,46; 21,90]	[19,50; 29,74]	[24,74; 35,84]	[31,88; 44,24]								
		Median mittlere Differenz		10,00	22,00	30,00	40,00								
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2663	2331	2056	1816	1625								
	auswertbar	Anzahl	2663	2245	1959	1717	1532								
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1597	1611	1362	1201	1030								
		Anteil in %	59,97	71,76	69,53	69,95	67,23								
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,11; 61,83]	[69,90; 73,62]	[67,49; 71,56]	[67,78; 72,12]	[64,88; 69,58]								
		Mean	225,68	239,26	252,22	259,41	271,82								
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[221,37; 229,98]	[235,00; 243,52]	[247,46; 256,98]	[254,30; 264,52]	[266,11; 277,53]								
		Median	220,00	230,00	250,00	250,00	260,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		1275	1084	929	810								
		Mittlere Differenz zur ED		17,07	29,57	41,09	54,04								
		CI mittlere Differenz		[13,74; 20,39]	[25,58; 33,57]	[36,72; 45,47]	[49,05; 59,03]								
		Median mittlere Differenz		13,00	30,00	40,00	50,00								
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1581	1406	1219	1080	966								
	auswertbar	Anzahl	1581	1366	1160	1033	900								
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	962	981	806	739	648								
		Anteil in %	60,85	71,82	69,48	71,54	72,00								
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,44; 63,25]	[69,43; 74,20]	[66,83; 72,13]	[68,79; 74,29]	[69,06; 74,94]								
		Mean	222,71	241,60	252,55	260,04	266,61								
Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[216,95; 228,47]	[236,19; 247,00]	[246,39; 258,71]	[253,82; 266,25]	[259,78; 273,43]									
	Median	210,00	240,00	240,00	250,00	260,00									
	Fallbasis mittlere Differenz		788	653	582	506									
	Mittlere Differenz zur ED		21,18	30,14	39,98	50,33									
	CI mittlere Differenz		[16,34; 26,03]	[24,54; 35,74]	[33,78; 46,18]	[43,79; 56,87]									
	Median mittlere Differenz		20,00	30,00	40,00	50,00									

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2011-1	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3704	3173	2696	2304									
	auswertbar	Anzahl	3703	3057	2541	2127									
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2278	2115	1734	1452									
		Anteil in %	61,52	69,19	68,24	68,27									
		CI Anteil in %	[59,95; 63,09]	[67,55; 70,82]	[66,43; 70,05]	[66,29; 70,24]									
		Mean	272,98	288,21	296,20	300,84									
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[267,77; 278,18]	[282,74; 293,69]	[290,18; 302,22]	[294,34; 307,34]									
		Median	250,00	260,00	275,00	280,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		1753	1424	1180									
		Mittlere Differenz zur ED		23,24	33,45	45,52									
		CI mittlere Differenz		[19,72; 26,76]	[29,38; 37,52]	[40,99; 50,05]									
		Median mittlere Differenz		18,00	30,00	40,00									
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2518	2124	1783	1543									
	auswertbar	Anzahl	2518	2018	1672	1436									
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1575	1431	1174	983									
		Anteil in %	62,55	70,91	70,22	68,45									
		CI Anteil in %	[60,66; 64,44]	[68,93; 72,89]	[68,02; 72,41]	[66,05; 70,86]									
		Mean	267,69	280,26	283,12	292,02									
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[262,22; 273,17]	[274,39; 286,13]	[276,81; 289,43]	[285,12; 298,92]									
		Median	260,00	275,00	280,00	290,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		1174	947	801									
		Mittlere Differenz zur ED		21,08	26,32	37,76									
		CI mittlere Differenz		[16,81; 25,35]	[21,31; 31,33]	[32,47; 43,04]									
		Median mittlere Differenz		10,00	25,00	40,00									
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2421	2120	1849	1613									
	auswertbar	Anzahl	2421	2063	1763	1516									
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1479	1443	1209	1051									
		Anteil in %	61,09	69,95	68,58	69,33									
		CI Anteil in %	[59,15; 63,03]	[67,97; 71,93]	[66,41; 70,74]	[67,01; 71,65]									
		Mean	220,32	237,23	246,26	252,88									
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[216,07; 224,56]	[232,73; 241,73]	[241,38; 251,14]	[247,69; 258,07]									
		Median	210,00	230,00	240,00	250,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		1184	982	843									
		Mittlere Differenz zur ED		19,02	29,93	39,50									
		CI mittlere Differenz		[15,33; 22,71]	[26,01; 33,85]	[35,06; 43,93]									
		Median mittlere Differenz		10,00	30,00	40,00									
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1441	1256	1091	968									
	auswertbar	Anzahl	1441	1197	1037	911									
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	897	864	727	627									
		Anteil in %	62,25	72,18	70,11	68,83									
		CI Anteil in %	[59,74; 64,75]	[69,64; 74,72]	[67,32; 72,89]	[65,82; 71,84]									
		Mean	217,06	236,47	243,09	256,67									
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[211,57; 222,55]	[230,53; 242,41]	[236,86; 249,32]	[249,75; 263,59]									
		Median	200,00	223,50	240,00	250,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		698	578	502									
		Mittlere Differenz zur ED		24,92	32,25	43,71									
		CI mittlere Differenz		[20,20; 29,65]	[26,87; 37,63]	[37,62; 49,79]									
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00	47,00									

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3712	3183	2696											
	auswertbar	Anzahl	3711	3043	2511											
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2239	2080	1677											
		Anteil in %	60,33	68,35	66,79											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,76; 61,91]	[66,70; 70,01]	[64,94; 68,63]											
		Mean	278,85	290,60	297,12											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[273,31; 284,39]	[285,07; 296,13]	[290,86; 303,37]											
		Median	250,00	270,00	270,00											
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		1710	1378											
		Mittlere Differenz zur ED		21,49	34,34											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[17,84; 25,14]	[29,97; 38,70]											
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00											
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2557	2211	1857											
	auswertbar	Anzahl	2557	2104	1733											
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1542	1442	1137											
		Anteil in %	60,31	68,54	65,61											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,41; 62,20]	[66,55; 70,52]	[63,37; 67,85]											
		Mean	264,55	278,11	280,23											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[258,71; 270,39]	[272,38; 283,85]	[273,90; 286,56]											
		Median	250,00	270,00	270,00											
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		1183	933											
		Mittlere Differenz zur ED		18,06	26,05											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[14,31; 21,80]	[21,30; 30,79]											
		Median mittlere Differenz		14,00	26,00											
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2513	2205	1917											
	auswertbar	Anzahl	2513	2131	1819											
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1507	1486	1244											
		Anteil in %	59,97	69,73	68,39											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,05; 61,88]	[67,78; 71,68]	[66,25; 70,53]											
		Mean	222,77	241,04	249,80											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[218,46; 227,08]	[236,70; 245,37]	[244,83; 254,78]											
		Median	210,00	230,00	240,00											
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		1201	997											
		Mittlere Differenz zur ED		20,98	34,17											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[17,24; 24,71]	[30,10; 38,23]											
		Median mittlere Differenz		20,00	30,00											
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1444	1279	1105											
	auswertbar	Anzahl	1444	1235	1058											
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	877	876	724											
		Anteil in %	60,73	70,93	68,43											
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,21; 63,25]	[68,40; 73,46]	[65,63; 71,23]											
		Mean	216,21	233,62	243,48											
Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[210,25; 222,18]	[227,94; 239,29]	[237,12; 249,85]												
	Median	200,00	227,50	240,00												
Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		701	581												
	Mittlere Differenz zur ED		20,70	30,35												
Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[16,88; 24,51]	[25,51; 35,18]												
	Median mittlere Differenz		20,00	30,00												

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3983	3410												
	auswertbar	Anzahl	3983	3240												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2453	2278												
		Anteil in %	61,59	70,31												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[60,08; 63,10]	[68,74; 71,88]												
		Mean	274,22	286,11												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[269,15; 279,28]	[280,93; 291,28]												
		Median	250,00	260,00												
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		1883												
		Mittlere Differenz zur ED		20,53												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[17,28; 23,79]												
		Median mittlere Differenz		20,00												
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2701	2311												
	auswertbar	Anzahl	2700	2190												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1649	1514												
		Anteil in %	61,07	69,13												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[59,23; 62,91]	[67,20; 71,07]												
		Mean	259,71	265,78												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[254,31; 265,10]	[260,56; 271,01]												
		Median	250,00	250,00												
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		1232												
		Mittlere Differenz zur ED		16,98												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[12,96; 21,00]												
		Median mittlere Differenz		10,00												
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2690	2345												
	auswertbar	Anzahl	2690	2250												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1626	1603												
		Anteil in %	60,45	71,24												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,60; 62,29]	[69,37; 73,12]												
		Mean	218,95	235,68												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[214,99; 222,91]	[231,78; 239,58]												
		Median	208,50	225,00												
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		1286												
		Mittlere Differenz zur ED		18,17												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[14,97; 21,37]												
		Median mittlere Differenz		20,00												
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1624	1437												
	auswertbar	Anzahl	1624	1379												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	975	973												
		Anteil in %	60,04	70,56												
Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[57,65; 62,42]	[68,15; 72,96]													
	Mean	209,89	224,40													
Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[204,54; 215,25]	[219,48; 229,33]													
	Median	200,00	216,00													
Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		778													
	Mittlere Differenz zur ED		18,71													
Peak-Flow- Mittelwert	CI mittlere Differenz		[14,07; 23,36]													
	Median mittlere Differenz		14,00													

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2012-2	männl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	3611												
	auswertbar	Anzahl	3610												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	2225												
		Anteil in %	61,63												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[60,05; 63,22]												
		Mean	275,28												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[269,87; 280,69]												
		Median	250,00												
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 18 insges.	Anzahl	2331												
	auswertbar	Anzahl	2331												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1503												
		Anteil in %	64,48												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[62,54; 66,42]												
		Mean	266,76												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[260,92; 272,59]												
		Median	250,00												
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	männl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	2427												
	auswertbar	Anzahl	2427												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	1472												
		Anteil in %	60,65												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[58,71; 62,60]												
		Mean	219,16												
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[214,90; 223,42]												
		Median	210,00												
	Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	weibl. Pat. < 12 insges.	Anzahl	1321												
	auswertbar	Anzahl	1321												
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	842												
		Anteil in %	63,74												
Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[61,15; 66,33]													
	Mean	219,04													
Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[213,33; 224,75]													
	Median	210,00													
Peak-Flow- Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz														
	Mittlere Differenz zur ED														
	CI mittlere Differenz														
	Median mittlere Differenz														

In der Tabelle 3.3.2 ist für die jeweiligen Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit sich die **Peak-Flow-Werte** seit der letzten Dokumentation verbessert haben bzw. gleichgeblieben sind oder sich verschlechtert haben. Für das Beitrittsjahr können mangels einer vorherigen Dokumentation - keine Werte ausgewiesen werden. Zunächst wird für jede Kohorte unter „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Untersuchung, ob eine Verbesserung der Peak-Flow-Werte bzw. gleichbleibende Peak-Flow-Werte oder eine Verschlechterung der Peak-Flow-Werte festge-

stellt werden konnte. Darüber hinaus werden Anzahl und Anteil der auswertbaren Patienten verteilt auf die beiden Kategorien (Verbesserung oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert, Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes) dargestellt.

Mit der Umstellung auf eDMP zum 1.7.2008 kam es zu einer Änderung in der Dokumentation. Während vorher die Veränderung dokumentiert wurde (Verbesserung oder gleichbleiben bzw. Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes) werden seitdem Absolutwerte erhoben. Daraus läßt sich nach zwei Meßzeitpunkten die Veränderung ermitteln. Erstmalig also ab dem Berichtshalbjahr 2009-1. Für das Berichtshalbjahr 2008-2 ist dagegen keine Aussage zur Veränderung gegenüber dem vorausgegangenen Berichtshalbjahr möglich. Daher werden für dieses Berichtshalbjahr keine Werte dargestellt.

Tabelle 3.3.2 Entwicklung des Peak-Flow-Wertes bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115	
	auswertbar	Anzahl		228	227	209	173	0	115	100	105	104	96	87	79	66	
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		211	201	182	158			82	63	79	61	71	68	53	36
		Anteil in %		92,54	88,55	87,08	91,33			71,30	63,00	75,24	58,65	73,96	78,16	67,09	54,55
		CI Anteil in %		[89,13; 95,96]	[84,39; 92,70]	[82,52; 91,64]	[87,12; 95,54]			[63,00; 79,61]	[53,49; 72,51]	[66,94; 83,53]	[49,14; 68,16]	[65,13; 82,78]	[69,43; 86,89]	[56,66; 77,52]	[42,44; 66,65]
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		17	26	27	15			33	37	26	43	25	19	26	30
		Anteil in %		7,46	11,45	12,92	8,67			28,70	37,00	24,76	41,35	26,04	21,84	32,91	45,45
		CI Anteil in %		[4,04; 10,87]	[7,30; 15,61]	[8,36; 17,48]	[4,46; 12,88]			[20,39; 37,00]	[27,49; 46,51]	[16,47; 33,06]	[31,84; 50,86]	[17,22; 34,87]	[13,11; 30,57]	[22,48; 43,34]	[33,35; 57,56]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85	
	auswertbar	Anzahl		158	161	150	124	0	81	68	69	72	65	63	57	49	
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		145	145	128	115			62	42	52	46	46	54	39	28
		Anteil in %		91,77	90,06	85,33	92,74			76,54	61,76	75,36	63,89	70,77	85,71	68,42	57,14
		CI Anteil in %		[87,47; 96,07]	[85,43; 94,70]	[79,65; 91,01]	[88,16; 97,33]			[67,26; 85,83]	[50,13; 73,40]	[65,12; 85,60]	[52,72; 75,06]	[59,63; 81,91]	[77,00; 94,42]	[56,25; 80,60]	[43,14; 71,14]
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		13	16	22	9			19	26	17	26	19	9	18	21
Anteil in %			8,23	9,94	14,67	7,26			23,46	38,24	24,64	36,11	29,23	14,29	31,58	42,86	
CI Anteil in %			[3,93; 12,53]	[5,30; 14,57]	[8,99; 20,35]	[2,67; 11,84]			[14,17; 32,74]	[26,60; 49,87]	[14,40; 34,88]	[24,94; 47,28]	[18,09; 40,37]	[5,58; 23,00]	[19,40; 43,75]	[28,86; 56,86]	
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930		
	auswertbar	Anzahl		2135	1907	1721	0	1065	1013	918	840	761	667	610	540		
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1926	1738	1600		694	647	641	558	496	475	432	364		
		Anteil in %		90,21	91,14	92,97		65,16	63,87	69,83	66,43	65,18	71,21	70,82	67,41		
		CI Anteil in %		[88,95; 91,47]	[89,86; 92,41]	[91,76; 94,18]		[62,30; 68,03]	[60,91; 66,83]	[66,85; 72,80]	[63,23; 69,62]	[61,79; 68,56]	[67,78; 74,65]	[67,21; 74,43]	[63,45; 71,36]		
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		209	169	121		371	366	277	282	265	192	178	176		
		Anteil in %		9,79	8,86	7,03		34,84	36,13	30,17	33,57	34,82	28,79	29,18	32,59		
		CI Anteil in %		[8,53; 11,05]	[7,59; 10,14]	[5,82; 8,24]		[31,97; 37,70]	[33,17; 39,09]	[27,20; 33,15]	[30,38; 36,77]	[31,44; 38,21]	[25,35; 32,22]	[25,57; 32,79]	[28,64; 36,55]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770		
	auswertbar	Anzahl		1558	1409	1296	0	817	784	725	677	619	551	509	439		
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1400	1284	1203		546	508	517	450	415	395	367	297		
		Anteil in %		89,86	91,13	92,82		66,83	64,80	71,31	66,47	67,04	71,69	72,10	67,65		
		CI Anteil in %		[88,36; 91,36]	[89,64; 92,61]	[91,42; 94,23]		[63,60; 70,06]	[61,45; 68,14]	[68,02; 74,61]	[62,91; 70,03]	[63,34; 70,75]	[67,92; 75,45]	[68,20; 76,00]	[63,27; 72,03]		
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		158	125	93		271	276	208	227	204	156	142	142		
Anteil in %			10,14	8,87	7,18		33,17	35,20	28,69	33,53	32,96	28,31	27,90	32,35			
CI Anteil in %			[8,64; 11,64]	[7,39; 10,36]	[5,77; 8,58]		[29,94; 36,40]	[31,86; 38,55]	[25,39; 31,98]	[29,97; 37,09]	[29,25; 36,66]	[24,55; 32,08]	[24,00; 31,80]	[27,97; 36,73]			

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818		
	auswertbar	Anzahl		3692	3194	0	1990	1941	1751	1605	1390	1250	1129	1010		
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		3376	2921		1257	1303	1182	1037	941	812	766	673		
		Anteil in %		91,44	91,45		63,17	67,13	67,50	64,61	67,70	64,96	67,85	66,63		
		CI Anteil in %		[90,54; 92,34]	[90,48; 92,42]		[61,05; 65,29]	[65,04; 69,22]	[65,31; 69,70]	[62,27; 66,95]	[65,24; 70,16]	[62,31; 67,61]	[65,12; 70,57]	[63,72; 69,54]		
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		316	273		733	638	569	568	449	438	363	337		
		Anteil in %		8,56	8,55		36,83	32,87	32,50	35,39	32,30	35,04	32,15	33,37		
		CI Anteil in %		[7,66; 9,46]	[7,58; 9,52]		[34,71; 38,95]	[30,78; 34,96]	[30,30; 34,69]	[33,05; 37,73]	[29,84; 34,76]	[32,39; 37,69]	[29,43; 34,88]	[30,46; 36,28]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467		
	auswertbar	Anzahl		2532	2233	0	1443	1433	1315	1215	1083	985	922	844		
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2285	2041		913	987	922	795	751	653	642	569		
		Anteil in %		90,24	91,40		63,27	68,88	70,11	65,43	69,34	66,29	69,63	67,42		
		CI Anteil in %		[89,09; 91,40]	[90,24; 92,56]		[60,78; 65,76]	[66,48; 71,27]	[67,64; 72,59]	[62,76; 68,11]	[66,60; 72,09]	[63,34; 69,25]	[66,66; 72,60]	[64,25; 70,58]		
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		247	192		530	446	393	420	332	332	280	275		
Anteil in %			9,76	8,60		36,73	31,12	29,89	34,57	30,66	33,71	30,37	32,58			
CI Anteil in %			[8,60; 10,91]	[7,44; 9,76]		[34,24; 39,22]	[28,73; 33,52]	[27,41; 32,36]	[31,89; 37,24]	[27,91; 33,40]	[30,75; 36,66]	[27,40; 33,34]	[29,42; 35,75]			
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138			
	auswertbar	Anzahl		5691	0	3463	3395	3163	2810	2507	2288	2034	1758			
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		5242		2244	2232	2116	1882	1704	1512	1382	1186			
		Anteil in %		92,11		64,80	65,74	66,90	66,98	67,97	66,08	67,94	67,46			
		CI Anteil in %		[91,41; 92,81]		[63,21; 66,39]	[64,15; 67,34]	[65,26; 68,54]	[65,24; 68,71]	[66,14; 69,80]	[64,14; 68,02]	[65,92; 69,97]	[65,27; 69,65]			
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		449		1219	1163	1047	928	803	776	652	572			
		Anteil in %		7,89		35,20	34,26	33,10	33,02	32,03	33,92	32,06	32,54			
		CI Anteil in %		[7,19; 8,59]		[33,61; 36,79]	[32,66; 35,85]	[31,46; 34,74]	[31,29; 34,76]	[30,20; 33,86]	[31,98; 35,86]	[30,03; 34,08]	[30,35; 34,73]			
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497			
	auswertbar	Anzahl		4028	0	2511	2501	2377	2152	1959	1827	1632	1428			
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		3710		1678	1671	1623	1473	1374	1241	1121	989			
		Anteil in %		92,11		66,83	66,81	68,28	68,45	70,14	67,93	68,69	69,26			
		CI Anteil in %		[91,27; 92,94]		[64,98; 68,67]	[64,97; 68,66]	[66,41; 70,15]	[66,48; 70,41]	[68,11; 72,16]	[65,78; 70,07]	[66,44; 70,94]	[66,86; 71,65]			
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		318		833	830	754	679	585	586	511	439			
Anteil in %			7,89		33,17	33,19	31,72	31,55	29,86	32,07	31,31	30,74				
CI Anteil in %			[7,06; 8,73]		[31,33; 35,02]	[31,34; 35,03]	[29,85; 33,59]	[29,59; 33,52]	[27,84; 31,89]	[29,93; 34,22]	[29,06; 33,56]	[28,35; 33,14]				
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373				
	auswertbar	Anzahl		0	3899	3732	3393	3038	2739	2415	2096	1820				
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl			2589	2479	2266	2049	1831	1652	1394	1242				
		Anteil in %			66,40	66,43	66,78	67,45	66,85	68,41	66,51	68,24				
		CI Anteil in %			[64,92; 67,88]	[64,91; 67,94]	[65,20; 68,37]	[65,78; 69,11]	[65,09; 68,61]	[66,55; 70,26]	[64,49; 68,53]	[66,10; 70,38]				
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl			1310	1253	1127	989	908	763	702	578				
		Anteil in %			33,60	33,57	33,22	32,55	33,15	31,59	33,49	31,76				
		CI Anteil in %			[32,12; 35,08]	[32,06; 35,09]	[31,63; 34,80]	[30,89; 34,22]	[31,39; 34,91]	[29,74; 33,45]	[31,47; 35,51]	[29,62; 33,90]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538				
	auswertbar	Anzahl		0	2654	2573	2381	2180	2008	1799	1594	1419				
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl			1797	1731	1617	1513	1370	1268	1084	1003				
		Anteil in %			67,71	67,28	67,91	69,40	68,23	70,48	68,01	70,68				
		CI Anteil in %			[65,93; 69,49]	[65,46; 69,09]	[66,04; 69,79]	[67,47; 71,34]	[66,19; 70,26]	[68,38; 72,59]	[65,71; 70,30]	[68,31; 73,05]				
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl			857	842	764	667	638	531	510	416				
Anteil in %				32,29	32,72	32,09	30,60	31,77	29,52	31,99	29,32					
CI Anteil in %				[30,51; 34,07]	[30,91; 34,54]	[30,21; 33,96]	[28,66; 32,53]	[29,74; 33,81]	[27,41; 31,62]	[29,70; 34,29]	[26,95; 31,69]					

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370						
	auswertbar	Anzahl		3602	3704	3287	2959	2622	2335	2054	1821						
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2447	2373	2204	1930	1717	1535	1353	1232						
		Anteil in %			67,93	64,07	67,05	65,22	65,48	65,74	65,87	67,66					
		CI Anteil in %			[66,41; 69,46]	[62,52; 65,61]	[65,44; 68,66]	[63,51; 66,94]	[63,66; 67,30]	[63,81; 67,66]	[63,82; 67,92]	[65,51; 69,80]					
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		1155	1331	1083	1029	905	800	701	589						
		Anteil in %			32,07	35,93	32,95	34,78	34,52	34,26	34,13	32,34					
		CI Anteil in %			[30,54; 33,59]	[34,39; 37,48]	[31,34; 34,56]	[33,06; 36,49]	[32,70; 36,34]	[32,34; 36,19]	[32,08; 36,18]	[30,20; 34,49]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397						
	auswertbar	Anzahl		2337	2494	2269	2055	1865	1688	1510	1356						
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1617	1647	1545	1383	1257	1165	1012	935						
		Anteil in %			69,19	66,04	68,09	67,30	67,40	69,02	67,02	68,95					
		CI Anteil in %			[67,32; 71,06]	[64,18; 67,90]	[66,17; 70,01]	[65,27; 69,33]	[65,27; 69,53]	[66,81; 71,22]	[64,65; 69,39]	[66,49; 71,42]					
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		720	847	724	672	608	523	498	421						
Anteil in %				30,81	33,96	31,91	32,70	32,60	30,98	32,98	31,05						
CI Anteil in %				[28,94; 32,68]	[32,10; 35,82]	[29,99; 33,83]	[30,67; 34,73]	[30,47; 34,73]	[28,78; 33,19]	[30,61; 35,35]	[28,58; 33,51]						
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822							
	auswertbar	Anzahl		3087	3020	2617	2353	2053	1818	1578							
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2186	2004	1737	1570	1393	1235	1027							
		Anteil in %			70,81	66,36	66,37	66,72	67,85	67,93	65,08						
		CI Anteil in %			[69,21; 72,42]	[64,67; 68,04]	[64,56; 68,18]	[64,82; 68,63]	[65,83; 69,87]	[65,79; 70,08]	[62,73; 67,44]						
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		901	1016	880	783	660	583	551							
		Anteil in %			29,19	33,64	33,63	33,28	32,15	32,07	34,92						
		CI Anteil in %			[27,58; 30,79]	[31,96; 35,33]	[31,82; 35,44]	[31,37; 35,18]	[30,13; 34,17]	[29,92; 34,21]	[32,56; 37,27]						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016							
	auswertbar	Anzahl		2017	2021	1766	1623	1468	1330	1161							
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1453	1371	1185	1115	1026	922	775							
		Anteil in %			72,04	67,84	67,10	68,70	69,89	69,32	66,75						
		CI Anteil in %			[70,08; 74,00]	[65,80; 69,87]	[64,91; 69,29]	[66,44; 70,96]	[67,54; 72,24]	[66,84; 71,80]	[64,04; 69,46]						
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		564	650	581	508	442	408	386							
Anteil in %				27,96	32,16	32,90	31,30	30,11	30,68	33,25							
CI Anteil in %				[26,00; 29,92]	[30,13; 34,20]	[30,71; 35,09]	[29,04; 33,56]	[27,76; 32,46]	[28,20; 33,16]	[30,54; 35,96]							
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826								
	auswertbar	Anzahl		2977	2743	2367	2066	1821	1592								
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2085	1795	1586	1337	1218	1026								
		Anteil in %			70,04	65,44	67,00	64,71	66,89	64,45							
		CI Anteil in %			[68,39; 71,68]	[63,66; 67,22]	[65,11; 68,90]	[62,65; 66,78]	[64,72; 69,05]	[62,10; 66,80]							
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		892	948	781	729	603	566								
		Anteil in %			29,96	34,56	33,00	35,29	33,11	35,55							
		CI Anteil in %			[28,32; 31,61]	[32,78; 36,34]	[31,10; 34,89]	[33,22; 37,35]	[30,95; 35,28]	[33,20; 37,90]							
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005								
	auswertbar	Anzahl		1885	1842	1627	1454	1302	1164								
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1363	1225	1121	972	898	783								
		Anteil in %			72,31	66,50	68,90	66,85	68,97	67,27							
		CI Anteil in %			[70,29; 74,33]	[64,35; 68,66]	[66,65; 71,15]	[64,43; 69,27]	[66,46; 71,48]	[64,57; 69,96]							
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		522	617	506	482	404	381								
Anteil in %				27,69	33,50	31,10	33,15	31,03	32,73								
CI Anteil in %				[25,67; 29,71]	[31,34; 35,65]	[28,85; 33,35]	[30,73; 35,57]	[28,52; 33,54]	[30,04; 35,43]								

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291									
	auswertbar	Anzahl		3077	2926	2512	2205	1942									
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2183	1984	1689	1494	1311									
		Anteil in %		70,95	67,81	67,24	67,76	67,51									
		CI Anteil in %		[69,34; 72,55]	[66,11; 69,50]	[65,40; 69,07]	[65,80; 69,71]	[65,42; 69,59]									
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		894	942	823	711	631									
		Anteil in %		29,05	32,19	32,76	32,24	32,49									
		CI Anteil in %		[27,45; 30,66]	[30,50; 33,89]	[30,93; 34,60]	[30,29; 34,20]	[30,41; 34,58]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241									
	auswertbar	Anzahl		1940	1924	1700	1525	1359									
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1415	1328	1173	1063	928									
		Anteil in %		72,94	69,02	69,00	69,70	68,29									
		CI Anteil in %		[70,96; 74,92]	[66,96; 71,09]	[66,80; 71,20]	[67,40; 72,01]	[65,81; 70,76]									
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		525	596	527	462	431									
Anteil in %			27,06	30,98	31,00	30,30	31,71										
CI Anteil in %			[25,08; 29,04]	[28,91; 33,04]	[28,80; 33,20]	[27,99; 32,60]	[29,24; 34,19]										
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731										
	auswertbar	Anzahl		3095	2870	2488	2158										
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2171	1912	1655	1397										
		Anteil in %		70,15	66,62	66,52	64,74										
		CI Anteil in %		[68,53; 71,76]	[64,89; 68,35]	[64,66; 68,37]	[62,72; 66,75]										
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		924	958	833	761										
		Anteil in %		29,85	33,38	33,48	35,26										
		CI Anteil in %		[28,24; 31,47]	[31,65; 35,11]	[31,63; 35,34]	[33,25; 37,28]										
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591										
	auswertbar	Anzahl		2063	2004	1777	1561										
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1482	1341	1225	1050										
		Anteil in %		71,84	66,92	68,94	67,26										
		CI Anteil in %		[69,90; 73,78]	[64,86; 68,98]	[66,78; 71,09]	[64,94; 69,59]										
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		581	663	552	511										
Anteil in %			28,16	33,08	31,06	32,74											
CI Anteil in %			[26,22; 30,10]	[31,02; 35,14]	[28,91; 33,22]	[30,41; 35,06]											
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847											
	auswertbar	Anzahl		2927	2653	2204											
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2099	1752	1477											
		Anteil in %		71,71	66,04	67,01											
		CI Anteil in %		[70,08; 73,34]	[64,24; 67,84]	[65,05; 68,98]											
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		828	901	727											
		Anteil in %		28,29	33,96	32,99											
		CI Anteil in %		[26,66; 29,92]	[32,16; 35,76]	[31,02; 34,95]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581											
	auswertbar	Anzahl		1882	1773	1516											
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1370	1184	1025											
		Anteil in %		72,79	66,78	67,61											
		CI Anteil in %		[70,78; 74,81]	[64,59; 68,97]	[65,26; 69,97]											
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		512	589	491											
Anteil in %			27,21	33,22	32,39												
CI Anteil in %			[25,19; 29,22]	[31,03; 35,41]	[30,03; 34,74]												

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553												
	auswertbar	Anzahl		2893	2590												
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2089	1739												
		Anteil in %			72,21	67,14											
		CI Anteil in %			[70,58; 73,84]	[65,33; 68,95]											
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		804	851												
		Anteil in %			27,79	32,86											
		CI Anteil in %			[26,16; 29,42]	[31,05; 34,67]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022												
	auswertbar	Anzahl		1902	1818												
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1405	1237												
		Anteil in %			73,87	68,04											
		CI Anteil in %			[71,89; 75,84]	[65,90; 70,19]											
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		497	581												
Anteil in %				26,13	31,96												
CI Anteil in %				[24,16; 28,11]	[29,81; 34,10]												
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721													
	auswertbar	Anzahl		3115													
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		2194													
		Anteil in %			70,43												
		CI Anteil in %			[68,83; 72,04]												
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		921													
		Anteil in %			29,57												
		CI Anteil in %			[27,96; 31,17]												
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782													
	auswertbar	Anzahl		2064													
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		1492													
		Anteil in %			72,29												
		CI Anteil in %			[70,36; 74,22]												
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		572													
Anteil in %				27,71													
CI Anteil in %				[25,78; 29,64]													
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942														
	auswertbar	Anzahl															
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3748														
	auswertbar	Anzahl															
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl															
Anteil in %																	
CI Anteil in %																	

3.4 Medikation

Um Asthma zu behandeln, werden unterschiedliche Wirkstoffe eingesetzt. Man unterscheidet bronchialerweiternde Wirkstoffe, antiallergisch wirkende und die bronchiale Überempfindlichkeit dämpfende Wirkstoffe und entzündungshemmende Wirkstoffe. Außerdem kann man die Medikamente in Dauermedikamente zur Langzeitkontrolle und in Bedarfs- bzw. Notfallmedikamente unterteilen.

Grundsätzlich können Asthmamedikamente inhalativ, oral oder parenteral verabreicht werden. Die meisten der in der Asthma-therapie eingesetzten Wirkstoffe sind jedoch sogenannte Inhalativa. Dabei handelt es sich um gasförmige Wirkstoffe, die eingeatmet werden und so gezielt in der Lunge wirken können. Häufig verwenden Patienten mehrere Medikamente gleichzeitig. Außer in leichten Fällen bilden inhalative Glukokortikosteroide die Basis der Dauermedikation. Glukokortikosteroide dämpfen die Entzündungsbereitschaft der Atemwege und wirken somit der Ursache der Asthma-Erkrankung entgegen. Die Wirkung stellt sich jedoch nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit ein. Bei akuten Asthmabeschwerden werden in der Regel als Notfallmedikation sogenannte rasch wirksame, inhalative Beta-2-Sympathomimetika gegeben. Diese Substanzen entspannen die Bronchialmuskulatur und erweitern damit die Atemwege.

In der Tabelle 3.4.1 ist die Entwicklung der **Medikation** der Patienten ausgewiesen. Sie gibt die Anzahl der Patienten wieder, die Glukokortikoide, Beta-2-Sympathomimetika oder andere asthmaspezifische Medikamente erhalten. Für jede Kohorte wird dazu zunächst unter „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für jede Medikationsart ausgewiesen, bei wie vielen Patienten diese spezifische Medikation erfolgte und welchem Anteil an den für diese spezifische Medikationsart „auswertbaren“ Patienten dies entspricht.⁴ Die solchermaßen gebildeten Kategorien sind nicht erschöpfend. Zudem sind Mehrfachzuordnungen der Patienten möglich.

Zu beachten ist, dass es durch die im Zuge der Umstellung auf eDMP zum 01.07.2008 eingeführten neuen Satzartbeschreibungen zu einer veränderten Dokumentation der Medikation mit systemischen Glukokortikosteroiden kommt. Ab diesem Zeitpunkt wird die Gabe von systemischen Glukokortikosteroiden über den Variablenblock „sonstige asthmaspezifische Medikation“ abgefragt. Dabei ist keine Differenzierung mehr möglich, ob es sich um eine Bedarfs- oder Dauermedikation handelt. Zudem ist keine explizite Dokumentation der Gabe von systemischen Glukokortikosteroiden mehr möglich. Es existiert nur die Dokumentationsmöglichkeit „keine sonstige asthmaspezifische Medikation“.

⁴ In den Berichten zum März 2010 wurden die Gruppe der für die Medikation auswertbaren Patienten über eine Angabe im gesamten Medikationsblock definiert. Im aktuell vorliegenden Bericht wird die Gruppe der auswertbaren Patienten für jede spezifische Medikationsart separat gebildet. Berücksichtigt werden hier Patienten mit mindestens einer Angabe (Dauermedikation, bei Bedarf, keine oder Kontraindikation) zur jeweils betrachteten Medikationsart. Daher sind die aktuell ausgewiesenen Ergebnisse nur bedingt mit den Berichtsergebnissen aus März 2010 vergleichbar.

Tabelle 3.4.1 Patienten <18 bzw. <12 Jahre und ihre Medikation

* Aufgrund einer geänderten Dokumentation zum 01.07.2008 sind die Werte ab dem Berichtshalbjahr 2008-2 nicht mehr mit den Werten der vorangegangenen Berichtshalbjahre vergleichbar, siehe Begleittext.

** Der Parameter „Kontraindikation“ wird erst seit 01.07.2008 (2008-2) dokumentiert. Die Tabelle enthält daher in den Berichtshalbjahren bis 2008-1 keine Werte zu diesem Parameter.

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	4	19	17	13	12	18	13	9	10	9	14	10	15	8
		Anteil in %	1,07	5,44	5,33	4,51	4,63	7,56	6,13	4,64	5,52	5,45	9,40	7,41	12,20	7,27
		CI Anteil in %	[0,03; 2,12]	[3,06; 7,83]	[2,86; 7,80]	[2,11; 6,92]	[2,07; 7,20]	[4,20; 10,93]	[2,89; 9,37]	[1,67; 7,61]	[2,19; 8,86]	[1,98; 8,93]	[4,70; 14,10]	[2,97; 11,84]	[6,39; 18,00]	[2,40; 12,15]
	auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	250	214	197	177	158	138	120	106	104	83	77	70	59	57
		Anteil in %	67,02	61,32	61,76	61,46	61,00	57,98	56,60	54,64	57,46	50,30	51,68	51,85	47,97	51,82
		CI Anteil in %	[62,25; 71,80]	[56,20; 66,44]	[56,41; 67,10]	[55,83; 67,09]	[55,05; 66,96]	[51,70; 64,27]	[49,92; 63,29]	[47,62; 61,66]	[50,24; 64,68]	[42,65; 57,96]	[43,63; 59,73]	[43,39; 60,31]	[39,10; 56,83]	[42,44; 61,20]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	100	120	105	97	90	88	81	79	66	73	60	54	51	44
		Anteil in %	26,81	34,38	32,92	33,68	34,75	36,97	38,21	40,72	36,46	44,24	40,27	40,00	41,46	40,00
		CI Anteil in %	[22,31; 31,31]	[29,39; 39,37]	[27,75; 38,08]	[28,21; 39,15]	[28,94; 40,56]	[30,83; 43,12]	[31,65; 44,76]	[33,79; 47,65]	[29,43; 43,50]	[36,64; 51,84]	[32,37; 48,17]	[31,71; 48,29]	[32,72; 50,21]	[30,80; 49,20]
	auswertbar	Anzahl						238	212	194	181	165	149	135	123	110
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl						0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %						[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	138	111	110	99	91	77	70	62	68	49	44	40	34	32
		Anteil in %	37,00	31,81	34,48	34,38	35,14	32,35	33,02	31,96	37,57	29,70	29,53	29,63	27,64	29,09
		CI Anteil in %	[32,09; 41,90]	[26,91; 36,70]	[29,26; 39,71]	[28,88; 39,87]	[29,31; 40,96]	[26,40; 38,31]	[26,67; 39,36]	[25,38; 38,54]	[30,49; 44,64]	[22,70; 36,69]	[22,18; 36,88]	[21,90; 37,36]	[19,71; 35,58]	[20,56; 37,62]
	auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	11	7	11	10	9	5	4	6	4	4	2	2	3	1
		Anteil in %	2,95	2,01	3,45	3,47	3,47	2,10	1,89	3,09	2,21	2,42	1,34	1,48	2,44	0,91
		CI Anteil in %	[1,23; 4,67]	[0,53; 3,48]	[1,44; 5,45]	[1,35; 5,59]	[1,24; 5,71]	[0,27; 3,93]	[0,05; 3,72]	[0,65; 5,54]	[0,06; 4,36]	[0,07; 4,78]	[0,00; 3,20]	[0,00; 3,53]	[0,00; 5,18]	[0,00; 2,69]
	auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	313	272	250	221	206	175	160	149	139	129	109	100	87	84
		Anteil in %	83,91	77,94	78,37	76,74	79,54	73,53	75,47	76,80	76,80	78,18	73,15	74,07	70,73	76,36
		CI Anteil in %	[80,18; 87,65]	[73,58; 82,29]	[73,84; 82,90]	[71,85; 81,62]	[74,61; 84,46]	[67,91; 79,15]	[69,67; 81,28]	[70,85; 82,76]	[70,63; 82,96]	[71,86; 84,50]	[66,01; 80,29]	[66,65; 81,49]	[62,66; 78,81]	[68,39; 84,34]
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	22	20	17	22	14	12	12	12	14	9	10	11	8	5
		Anteil in %	5,90	5,73	5,33	7,64	5,41	5,04	5,66	6,19	7,73	5,45	6,71	8,15	6,50	4,55
	CI Anteil in %	[3,50; 8,29]	[3,29; 8,17]	[2,86; 7,80]	[4,57; 10,71]	[2,65; 8,16]	[2,26; 7,83]	[2,54; 8,78]	[2,79; 9,58]	[3,83; 11,64]	[1,98; 8,93]	[2,68; 10,74]	[3,52; 12,78]	[2,13; 10,88]	[0,63; 8,46]	
auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110	
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	46	60	57	48	31	9	10	8	6	3	2	1	1	0	
	Anteil in %	12,33	17,19	17,87	16,67	11,97	3,78	4,72	4,12	3,31	1,82	1,34	0,74	0,81	0,00	
	CI Anteil in %	[8,99; 15,67]	[13,23; 21,16]	[13,66; 22,08]	[12,35; 20,98]	[8,01; 15,93]	[1,35; 6,21]	[1,86; 7,58]	[1,32; 6,93]	[0,70; 5,93]	[0,00; 3,86]	[0,00; 3,20]	[0,00; 2,19]	[0,00; 2,41]	[0,00; 0,00]	
auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110	
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	86	61	59	43	41	26	25	23	25	21	19	15	13	10	
	Anteil in %	23,06	17,48	18,50	14,93	15,83	10,92	11,79	11,86	13,81	12,73	12,75	11,11	10,57	9,09	
	CI Anteil in %	[18,78; 27,34]	[13,49; 21,47]	[14,23; 22,76]	[10,81; 19,05]	[11,38; 20,28]	[6,95; 14,90]	[7,44; 16,14]	[7,29; 16,42]	[8,77; 18,85]	[7,63; 17,83]	[7,38; 18,13]	[5,79; 16,43]	[5,11; 16,02]	[3,69; 14,49]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	2	16	11	10	9	12	8	4	4	4	10	6	11	6
		Anteil in %	0,80	6,78	5,09	5,10	5,14	7,45	5,59	3,01	3,23	3,48	9,26	6,12	12,36	7,41
		CI Anteil in %	[0,00; 1,91]	[3,57; 9,99]	[2,15; 8,03]	[2,01; 8,19]	[1,86; 8,42]	[3,38; 11,52]	[1,81; 9,37]	[0,09; 5,92]	[0,10; 6,35]	[0,11; 6,84]	[3,77; 14,75]	[1,35; 10,89]	[5,48; 19,24]	[1,67; 13,15]
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	171	145	138	122	107	98	83	74	73	56	54	51	44	43
		Anteil in %	68,40	61,44	63,89	62,24	61,14	60,87	58,04	55,64	58,87	48,70	50,00	52,04	49,44	53,09
		CI Anteil in %	[62,63; 74,17]	[55,22; 67,66]	[57,47; 70,31]	[55,44; 69,05]	[53,90; 68,39]	[53,31; 68,43]	[49,93; 66,16]	[47,16; 64,11]	[50,17; 67,57]	[39,52; 57,87]	[40,53; 59,47]	[42,10; 61,98]	[38,99; 59,88]	[42,15; 64,02]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	64	85	69	69	62	57	56	55	46	54	46	41	37	33
		Anteil in %	25,60	36,02	31,94	35,20	35,43	35,40	39,16	41,35	37,10	46,96	42,59	41,84	41,57	40,74
		CI Anteil in %	[20,18; 31,02]	[29,88; 42,15]	[25,71; 38,18]	[28,50; 41,91]	[28,32; 42,54]	[27,99; 42,81]	[31,13; 47,19]	[32,95; 49,75]	[28,56; 45,63]	[37,80; 56,12]	[33,22; 51,96]	[32,02; 51,65]	[31,28; 51,87]	[29,97; 51,51]
	auswertbar	Anzahl						161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl						0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %						[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	86	73	72	60	52	47	40	33	37	23	23	22	17	19
		Anteil in %	34,40	30,93	33,33	30,61	29,71	29,19	27,97	24,81	29,84	20,00	21,30	22,45	19,10	23,46
		CI Anteil in %	[28,50; 40,30]	[25,02; 36,84]	[27,03; 39,63]	[24,14; 37,08]	[22,92; 36,50]	[22,15; 36,24]	[20,59; 35,35]	[17,44; 32,18]	[21,75; 37,92]	[12,66; 27,34]	[13,54; 29,05]	[14,15; 30,75]	[10,89; 27,31]	[14,17; 32,74]
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4	3	6	5	5	2	2	3	1	1	0	0	0	0
		Anteil in %	1,60	1,27	2,78	2,55	2,86	1,24	1,40	2,26	0,81	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %	[0,04; 3,16]	[0,00; 2,70]	[0,58; 4,97]	[0,34; 4,76]	[0,38; 5,33]	[0,00; 2,96]	[0,00; 3,33]	[0,00; 4,79]	[0,00; 2,39]	[0,00; 2,57]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	222	195	174	156	145	128	117	112	108	101	87	80	69	67
		Anteil in %	88,80	82,63	80,56	79,59	82,86	79,50	81,82	84,21	87,10	87,83	80,56	81,63	77,53	82,72
		CI Anteil in %	[84,88; 92,72]	[77,78; 87,47]	[75,27; 85,85]	[73,93; 85,25]	[77,26; 88,46]	[73,25; 85,76]	[75,47; 88,16]	[77,99; 90,43]	[81,17; 93,02]	[81,82; 93,83]	[73,06; 88,05]	[73,93; 89,34]	[68,81; 86,25]	[74,43; 91,00]
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	10	6	11	14	8	4	3	6	6	3	5	6	4	3
		Anteil in %	4,00	2,54	5,09	7,14	4,57	2,48	2,10	4,51	4,84	2,61	4,63	6,12	4,49	3,70
		CI Anteil in %	[1,57; 6,43]	[0,53; 4,55]	[2,15; 8,03]	[3,53; 10,76]	[1,47; 7,67]	[0,07; 4,90]	[0,00; 4,46]	[0,97; 8,05]	[1,05; 8,63]	[0,00; 5,53]	[0,65; 8,61]	[1,35; 10,89]	[0,17; 8,82]	[0,00; 7,84]
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	33	47	42	36	21	3	4	3	2	1	0	0	0	0
		Anteil in %	13,20	19,92	19,44	18,37	12,00	1,86	2,80	2,26	1,61	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %	[9,00; 17,40]	[14,81; 25,02]	[14,15; 24,73]	[12,93; 23,80]	[7,17; 16,83]	[0,00; 3,96]	[0,09; 5,51]	[0,00; 4,79]	[0,00; 3,84]	[0,00; 2,57]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	58	40	37	26	24	10	11	10	10	8	7	6	4	3
		Anteil in %	23,20	16,95	17,13	13,27	13,71	6,21	7,69	7,52	8,06	6,96	6,48	6,12	4,49	3,70
		CI Anteil in %	[17,96; 28,44]	[12,15; 21,75]	[12,09; 22,17]	[8,50; 18,03]	[8,60; 18,83]	[2,47; 9,95]	[3,31; 12,08]	[3,02; 12,02]	[3,25; 12,88]	[2,29; 11,63]	[1,82; 11,15]	[1,35; 10,89]	[0,17; 8,82]	[0,00; 7,84]

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930
	auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	987	863
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	34	176	160	144	103	97	92	81	74	76	63	57	59
		Anteil in %	1,02	5,87	6,02	6,00	4,85	4,91	5,18	5,15	5,26	6,02	5,71	5,78	6,84
		CI Anteil in %	[0,68; 1,37]	[5,03; 6,71]	[5,12; 6,92]	[5,05; 6,95]	[3,94; 5,76]	[3,96; 5,87]	[4,15; 6,21]	[4,06; 6,24]	[4,10; 6,43]	[4,71; 7,33]	[4,34; 7,08]	[4,32; 7,23]	[5,15; 8,52]
	auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2123	1974	1777	1573	1406	1263	1104	987	863
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2195	1879	1617	1417	1118	1009	899	778	665	594	521	446	391
		Anteil in %	66,13	62,68	60,84	59,04	52,66	51,11	50,59	49,46	47,30	47,03	47,19	45,19	45,31
		CI Anteil in %	[64,52; 67,74]	[60,94; 64,41]	[58,98; 62,69]	[57,07; 61,01]	[50,54; 54,79]	[48,91; 53,32]	[48,27; 52,92]	[46,99; 51,93]	[44,69; 49,91]	[44,28; 49,78]	[44,25; 50,14]	[42,08; 48,29]	[41,98; 48,63]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	849	889	820	801	776	755	675	617	591	523	459	425	370
		Anteil in %	25,58	29,65	30,85	33,38	36,55	38,25	37,99	39,22	42,03	41,41	41,58	43,06	42,87
		CI Anteil in %	[24,10; 27,06]	[28,02; 31,29]	[29,09; 32,61]	[31,49; 35,26]	[34,50; 38,60]	[36,10; 40,39]	[35,73; 40,24]	[36,81; 41,64]	[39,45; 44,62]	[38,69; 44,13]	[38,67; 44,48]	[39,97; 46,15]	[39,57; 46,18]
	auswertbar	Anzahl					2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	988	863
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl					1	0	0	0	0	0	0	1	0
		Anteil in %					0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		CI Anteil in %					[0,00; 0,14]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,30]	[0,00; 0,00]
	auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2123	1974	1777	1572	1406	1263	1104	988	863
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1102	933	800	714	635	617	525	460	399	353	329	276	262
		Anteil in %	33,20	31,12	30,10	29,75	29,91	31,26	29,54	29,26	28,38	27,95	29,80	27,94	30,36
		CI Anteil in %	[31,60; 34,81]	[29,46; 32,78]	[28,35; 31,84]	[27,92; 31,58]	[27,96; 31,86]	[29,21; 33,30]	[27,42; 31,67]	[27,01; 31,51]	[26,02; 30,74]	[25,47; 30,43]	[27,10; 32,50]	[25,14; 30,73]	[27,29; 33,43]
	auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2123	1974	1777	1572	1406	1263	1104	987	863
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	57	53	34	39	65	61	52	44	48	45	36	33	29
		Anteil in %	1,72	1,77	1,28	1,63	3,06	3,09	2,93	2,80	3,41	3,56	3,26	3,34	3,36
		CI Anteil in %	[1,28; 2,16]	[1,30; 2,24]	[0,85; 1,71]	[1,12; 2,13]	[2,33; 3,79]	[2,33; 3,85]	[2,14; 3,71]	[1,98; 3,61]	[2,46; 4,36]	[2,54; 4,59]	[2,21; 4,31]	[2,22; 4,47]	[2,16; 4,56]
	auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2123	1973	1776	1572	1405	1262	1102	986	862
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	2725	2291	2055	1869	1678	1563	1409	1250	1104	977	859	776	676
		Anteil in %	82,10	76,42	77,31	77,88	79,04	79,22	79,34	79,52	78,58	77,42	77,95	78,70	78,42
		CI Anteil in %	[80,80; 83,41]	[74,90; 77,94]	[75,72; 78,91]	[76,21; 79,54]	[77,31; 80,77]	[77,43; 81,01]	[77,45; 81,22]	[77,52; 81,51]	[76,43; 80,72]	[75,11; 79,72]	[75,50; 80,40]	[76,14; 81,26]	[75,67; 81,17]
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	287	252	231	192	123	114	110	101	94	80	67	58	44
		Anteil in %	8,65	8,41	8,69	8,00	5,79	5,78	6,19	6,42	6,69	6,34	6,08	5,88	5,10
	CI Anteil in %	[7,69; 9,60]	[7,41; 9,40]	[7,62; 9,76]	[6,91; 9,09]	[4,80; 6,79]	[4,75; 6,81]	[5,07; 7,32]	[5,21; 7,64]	[5,38; 8,00]	[4,99; 7,68]	[4,67; 7,49]	[4,41; 7,35]	[3,63; 6,57]	
auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	988	863	
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	459	358	301	267	73	48	42	37	32	38	34	29	25	
	Anteil in %	13,83	11,94	11,32	11,13	3,44	2,43	2,36	2,35	2,28	3,01	3,08	2,94	2,90	
	CI Anteil in %	[12,65; 15,00]	[10,78; 13,10]	[10,12; 12,53]	[9,87; 12,38]	[2,66; 4,21]	[1,75; 3,11]	[1,66; 3,07]	[1,60; 3,10]	[1,50; 3,06]	[2,07; 3,95]	[2,06; 4,10]	[1,88; 3,99]	[1,78; 4,02]	
auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	988	863	
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	579	462	361	310	198	191	169	173	143	124	105	96	80	
	Anteil in %	17,45	15,41	13,58	12,92	9,32	9,68	9,51	11,00	10,17	9,82	9,51	9,72	9,27	
	CI Anteil in %	[16,15; 18,74]	[14,12; 16,70]	[12,28; 14,88]	[11,57; 14,26]	[8,09; 10,56]	[8,37; 10,98]	[8,15; 10,87]	[9,45; 12,54]	[8,59; 11,75]	[8,18; 11,46]	[7,78; 11,24]	[7,87; 11,56]	[7,33; 11,21]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	820	710
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	15	124	116	111	79	69	68	60	63	68	58	53	52
		Anteil in %	0,65	5,88	6,15	6,44	5,14	4,77	5,12	4,94	5,70	6,73	6,42	6,46	7,32
		CI Anteil in %	[0,32; 0,98]	[4,88; 6,88]	[5,06; 7,23]	[5,28; 7,60]	[4,03; 6,24]	[3,67; 5,87]	[3,93; 6,30]	[3,72; 6,16]	[4,33; 7,07]	[5,19; 8,28]	[4,82; 8,02]	[4,78; 8,15]	[5,41; 9,24]
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1537	1447	1329	1214	1105	1010	903	820	710
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	1580	1367	1168	1034	819	752	679	608	523	468	418	362	318
		Anteil in %	68,70	64,82	61,90	59,98	53,29	51,97	51,09	50,08	47,33	46,34	46,29	44,15	44,79
		CI Anteil in %	[66,80; 70,59]	[62,78; 66,86]	[59,71; 64,09]	[57,66; 62,29]	[50,79; 55,78]	[49,39; 54,54]	[48,40; 53,78]	[47,27; 52,90]	[44,39; 50,28]	[43,26; 49,41]	[43,04; 49,54]	[40,75; 47,55]	[41,13; 48,45]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	538	581	558	555	559	549	509	471	468	433	389	365	316
		Anteil in %	23,39	27,55	29,57	32,19	36,37	37,94	38,30	38,80	42,35	42,87	43,08	44,51	44,51
		CI Anteil in %	[21,66; 25,12]	[25,64; 29,46]	[27,51; 31,63]	[29,99; 34,40]	[33,96; 38,78]	[35,44; 40,44]	[35,68; 40,91]	[36,06; 41,54]	[39,44; 45,27]	[39,82; 45,92]	[39,85; 46,31]	[41,11; 47,92]	[40,85; 48,17]
	auswertbar	Anzahl					1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl					1	0	0	0	0	0	0	1	0
		Anteil in %					0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
		CI Anteil in %					[0,00; 0,19]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,00]
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1537	1447	1329	1213	1105	1010	903	821	710
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	689	586	501	446	411	412	368	327	282	248	232	197	191
		Anteil in %	29,96	27,79	26,55	25,87	26,74	28,47	27,69	26,96	25,52	24,55	25,69	24,00	26,90
		CI Anteil in %	[28,08; 31,83]	[25,87; 29,70]	[24,56; 28,54]	[23,80; 27,94]	[24,53; 28,95]	[26,15; 30,80]	[25,28; 30,10]	[24,46; 29,46]	[22,95; 28,09]	[21,90; 27,21]	[22,84; 28,54]	[21,07; 26,92]	[23,64; 30,17]
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1537	1447	1329	1213	1105	1010	903	820	710
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	24	24	13	9	33	36	32	26	27	28	19	20	16
		Anteil in %	1,04	1,14	0,69	0,52	2,15	2,49	2,41	2,14	2,44	2,77	2,10	2,44	2,25
		CI Anteil in %	[0,63; 1,46]	[0,69; 1,59]	[0,32; 1,06]	[0,18; 0,86]	[1,42; 2,87]	[1,69; 3,29]	[1,58; 3,23]	[1,33; 2,96]	[1,53; 3,35]	[1,76; 3,79]	[1,17; 3,04]	[1,38; 3,50]	[1,16; 3,35]
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	902	820	709
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	1922	1641	1468	1366	1253	1195	1091	1012	895	808	726	669	577
		Anteil in %	83,57	77,81	77,80	79,23	81,47	82,58	82,09	83,36	81,00	80,00	80,49	81,59	81,38
		CI Anteil in %	[82,05; 85,08]	[76,04; 79,58]	[75,92; 79,67]	[77,32; 81,15]	[79,53; 83,41]	[80,63; 84,54]	[80,03; 84,15]	[81,26; 85,46]	[78,68; 83,31]	[77,53; 82,47]	[77,90; 83,08]	[78,93; 84,24]	[78,51; 84,25]
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	198	168	162	127	71	67	65	57	56	45	41	39	31
		Anteil in %	8,61	7,97	8,59	7,37	4,62	4,63	4,89	4,70	5,07	4,46	4,55	4,76	4,37
		CI Anteil in %	[7,46; 9,76]	[6,81; 9,12]	[7,32; 9,85]	[6,13; 8,60]	[3,57; 5,67]	[3,55; 5,71]	[3,73; 6,05]	[3,50; 5,89]	[3,77; 6,36]	[3,18; 5,73]	[3,19; 5,91]	[3,30; 6,21]	[2,87; 5,88]
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	327	265	229	205	57	31	28	26	21	23	22	19	15
		Anteil in %	14,22	12,57	12,14	11,89	3,71	2,14	2,11	2,14	1,90	2,28	2,44	2,31	2,11
		CI Anteil in %	[12,79; 15,64]	[11,15; 13,98]	[10,66; 13,61]	[10,36; 13,42]	[2,76; 4,65]	[1,40; 2,89]	[1,33; 2,88]	[1,33; 2,96]	[1,10; 2,71]	[1,36; 3,20]	[1,43; 3,44]	[1,29; 3,34]	[1,05; 3,17]
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	424	335	265	237	141	137	117	126	104	88	78	75	59
		Anteil in %	18,43	15,88	14,04	13,75	9,17	9,47	8,80	10,38	9,41	8,71	8,64	9,14	8,31
		CI Anteil in %	[16,85; 20,02]	[14,32; 17,44]	[12,48; 15,61]	[12,12; 15,37]	[7,73; 10,61]	[7,96; 10,98]	[7,28; 10,33]	[8,66; 12,10]	[7,69; 11,13]	[6,97; 10,45]	[6,80; 10,47]	[7,16; 11,11]	[6,28; 10,34]

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818	
	auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4052	3727	3377	2978	2688	2392	2124	1909	1676	
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	53	260	235	177	151	155	132	131	126	103	97	102	
		Anteil in %	0,88	4,90	5,04	4,37	4,05	4,59	4,43	4,87	5,27	4,85	5,08	6,09	
		CI Anteil in %	[0,64; 1,11]	[4,32; 5,48]	[4,41; 5,67]	[3,74; 5,00]	[3,42; 4,68]	[3,88; 5,30]	[3,69; 5,17]	[4,06; 5,69]	[4,37; 6,16]	[3,94; 5,76]	[4,10; 6,07]	[4,94; 7,23]	
	auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4051	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676	
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	4076	3328	2849	2231	2052	1823	1581	1366	1232	1054	943	797	
		Anteil in %	67,38	62,73	61,10	55,07	55,03	53,98	53,07	50,80	51,51	49,62	49,40	47,55	
		CI Anteil in %	[66,20; 68,56]	[61,43; 64,03]	[59,70; 62,50]	[53,54; 56,60]	[53,43; 56,63]	[52,30; 55,66]	[51,28; 54,86]	[48,91; 52,69]	[49,50; 53,51]	[47,50; 51,75]	[47,15; 51,64]	[45,16; 49,95]	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1461	1620	1469	1416	1304	1233	1090	1027	904	867	781	699	
		Anteil in %	24,15	30,54	31,50	34,95	34,97	36,51	36,59	38,19	37,79	40,82	40,91	41,71	
		CI Anteil in %	[23,07; 25,23]	[29,30; 31,78]	[30,17; 32,84]	[33,49; 36,42]	[33,44; 36,50]	[34,89; 38,14]	[34,86; 38,32]	[36,36; 40,03]	[35,85; 39,74]	[38,73; 42,91]	[38,71; 43,12]	[39,35; 44,07]	
	auswertbar	Anzahl				4052	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676	
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl				3	2	2	4	2	2	2	1	1	
		Anteil in %				0,07	0,05	0,06	0,13	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	
		CI Anteil in %				[0,00; 0,16]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,18]	
	auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4051	3728	3377	2978	2689	2392	2124	1908	1676	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2010	1639	1460	1205	1127	1019	905	789	717	607	566	481	
		Anteil in %	33,23	30,90	31,31	29,75	30,23	30,17	30,39	29,34	29,97	28,58	29,66	28,70	
		CI Anteil in %	[32,04; 34,42]	[29,65; 32,14]	[29,98; 32,64]	[28,34; 31,15]	[28,76; 31,71]	[28,63; 31,72]	[28,74; 32,04]	[27,62; 31,06]	[28,14; 31,81]	[26,66; 30,50]	[27,61; 31,71]	[26,53; 30,87]	
	auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4050	3728	3377	2978	2689	2392	2124	1908	1676	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	138	102	88	96	87	76	71	60	49	32	42	33	
		Anteil in %	2,28	1,92	1,89	2,37	2,33	2,25	2,38	2,23	2,05	1,51	2,20	1,97	
		CI Anteil in %	[1,91; 2,66]	[1,55; 2,29]	[1,50; 2,28]	[1,90; 2,84]	[1,85; 2,82]	[1,75; 2,75]	[1,84; 2,93]	[1,67; 2,79]	[1,48; 2,62]	[0,99; 2,02]	[1,54; 2,86]	[1,30; 2,63]	
	auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4051	3728	3377	2978	2688	2392	2123	1909	1676	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	4909	4189	3727	3226	3019	2745	2432	2202	1935	1759	1572	1358	
		Anteil in %	81,15	78,96	79,93	79,63	80,98	81,29	81,67	81,92	80,89	82,85	82,35	81,03	
		CI Anteil in %	[80,17; 82,14]	[77,87; 80,06]	[78,78; 81,08]	[78,39; 80,87]	[79,72; 82,24]	[79,97; 82,60]	[80,28; 83,06]	[80,46; 83,37]	[79,32; 82,47]	[81,25; 84,46]	[80,64; 84,06]	[79,15; 82,90]	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	445	315	239	162	137	130	124	94	110	69	63	51	
		Anteil in %	7,36	5,94	5,13	4,00	3,67	3,85	4,16	3,50	4,60	3,25	3,30	3,04	
	CI Anteil in %	[6,70; 8,01]	[5,30; 6,57]	[4,49; 5,76]	[3,40; 4,60]	[3,07; 4,28]	[3,20; 4,50]	[3,45; 4,88]	[2,80; 4,19]	[3,76; 5,44]	[2,50; 4,00]	[2,50; 4,10]	[2,22; 3,87]		
auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4052	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676		
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	749	548	498	150	118	108	83	75	71	62	59	48		
	Anteil in %	12,38	10,33	10,68	3,70	3,16	3,20	2,79	2,79	2,97	2,92	3,09	2,86		
	CI Anteil in %	[11,55; 13,21]	[9,51; 11,15]	[9,79; 11,57]	[3,12; 4,28]	[2,60; 3,73]	[2,60; 3,79]	[2,20; 3,38]	[2,17; 3,41]	[2,29; 3,65]	[2,20; 3,64]	[2,31; 3,87]	[2,07; 3,66]		
auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4052	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676		
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1154	819	646	467	442	382	373	295	272	245	217	179		
	Anteil in %	19,08	15,44	13,85	11,53	11,85	11,31	12,52	10,97	11,37	11,53	11,37	10,68		
	CI Anteil in %	[18,09; 20,07]	[14,47; 16,41]	[12,86; 14,85]	[10,54; 12,51]	[10,82; 12,89]	[10,24; 12,38]	[11,33; 13,71]	[9,79; 12,15]	[10,10; 12,64]	[10,18; 12,89]	[9,94; 12,79]	[9,20; 12,16]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2742	2569	2396	2182	1990	1817	1647	1518	1375	
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	24	165	158	108	96	96	85	84	84	68	70	78	
		Anteil in %	0,61	4,71	5,10	3,94	3,74	4,01	3,90	4,22	4,62	4,13	4,61	5,67	
		CI Anteil in %	[0,37; 0,86]	[4,01; 5,41]	[4,32; 5,87]	[3,21; 4,67]	[3,00; 4,47]	[3,22; 4,79]	[3,08; 4,71]	[3,34; 5,10]	[3,66; 5,59]	[3,17; 5,09]	[3,56; 5,67]	[4,45; 6,90]	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375	
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2708	2238	1928	1539	1432	1308	1167	1017	940	813	739	645	
		Anteil in %	69,10	63,85	62,17	56,13	55,74	54,59	53,46	51,11	51,73	49,36	48,68	46,91	
		CI Anteil in %	[67,65; 70,55]	[62,26; 65,44]	[60,47; 63,88]	[54,27; 57,98]	[53,82; 57,66]	[52,60; 56,59]	[51,37; 55,55]	[48,91; 53,30]	[49,44; 54,03]	[46,95; 51,78]	[46,17; 51,20]	[44,27; 49,55]	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	886	1039	945	937	887	871	796	760	685	683	642	591	
		Anteil in %	22,61	29,64	30,47	34,17	34,53	36,35	36,46	38,19	37,70	41,47	42,29	42,98	
		CI Anteil in %	[21,30; 23,92]	[28,13; 31,16]	[28,85; 32,09]	[32,40; 35,95]	[32,69; 36,37]	[34,43; 38,28]	[34,44; 38,48]	[36,06; 40,33]	[35,47; 39,93]	[39,09; 43,85]	[39,81; 44,78]	[40,36; 45,60]	
	auswertbar	Anzahl				2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375	
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl				1	1	1	2	1	1	1	1	1	
		Anteil in %				0,04	0,04	0,04	0,09	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	
		CI Anteil in %				[0,00; 0,11]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,22]	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2741	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1517	1375	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1140	941	846	726	677	643	601	512	486	416	404	359	
		Anteil in %	29,09	26,85	27,28	26,49	26,35	26,84	27,53	25,73	26,75	25,26	26,63	26,11	
		CI Anteil in %	[27,67; 30,51]	[25,38; 28,31]	[25,71; 28,85]	[24,83; 28,14]	[24,65; 28,06]	[25,06; 28,61]	[25,66; 29,41]	[23,81; 27,65]	[24,71; 28,78]	[23,16; 27,36]	[24,41; 28,86]	[23,79; 28,43]	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2741	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1517	1375	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	63	44	40	58	52	46	46	38	31	22	31	25	
		Anteil in %	1,61	1,26	1,29	2,12	2,02	1,92	2,11	1,91	1,71	1,34	2,04	1,82	
		CI Anteil in %	[1,21; 2,00]	[0,89; 1,62]	[0,89; 1,69]	[1,58; 2,65]	[1,48; 2,57]	[1,37; 2,47]	[1,50; 2,71]	[1,31; 2,51]	[1,11; 2,30]	[0,78; 1,89]	[1,33; 2,76]	[1,11; 2,52]	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2741	2569	2396	2182	1990	1817	1646	1518	1375	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3254	2857	2552	2254	2162	2028	1833	1684	1514	1407	1296	1152	
		Anteil in %	83,03	81,51	82,30	82,23	84,16	84,64	84,01	84,62	83,32	85,48	85,38	83,78	
		CI Anteil in %	[81,86; 84,21]	[80,23; 82,80]	[80,95; 83,64]	[80,80; 83,66]	[82,74; 85,57]	[83,20; 86,09]	[82,47; 85,54]	[83,04; 86,21]	[81,61; 85,04]	[83,78; 87,18]	[83,60; 87,15]	[81,83; 85,73]	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	292	199	144	102	79	79	84	66	82	47	42	35	
		Anteil in %	7,45	5,68	4,64	3,72	3,08	3,30	3,85	3,32	4,51	2,86	2,77	2,55	
		CI Anteil in %	[6,63; 8,27]	[4,91; 6,44]	[3,90; 5,38]	[3,01; 4,43]	[2,41; 3,74]	[2,58; 4,01]	[3,04; 4,66]	[2,53; 4,10]	[3,56; 5,47]	[2,05; 3,66]	[1,94; 3,59]	[1,71; 3,38]	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375	
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	532	397	362	105	84	74	60	53	50	46	42	41	
		Anteil in %	13,57	11,33	11,67	3,83	3,27	3,09	2,75	2,66	2,75	2,79	2,77	2,98	
		CI Anteil in %	[12,50; 14,65]	[10,28; 12,38]	[10,54; 12,80]	[3,11; 4,55]	[2,58; 3,96]	[2,40; 3,78]	[2,06; 3,43]	[1,96; 3,37]	[2,00; 3,50]	[2,00; 3,59]	[1,94; 3,59]	[2,08; 3,88]	
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375	
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	815	585	463	330	322	296	290	231	220	198	178	150	
		Anteil in %	20,80	16,69	14,93	12,04	12,53	12,35	13,28	11,61	12,11	12,02	11,73	10,91	
		CI Anteil in %	[19,53; 22,07]	[15,46; 17,93]	[13,68; 16,19]	[10,82; 13,25]	[11,25; 13,81]	[11,04; 13,67]	[11,86; 14,71]	[10,20; 13,02]	[10,61; 13,61]	[10,45; 13,59]	[10,11; 13,34]	[9,26; 12,56]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138		
	auswertbar	Anzahl	9767	8422	7239	6624	5918	5255	4673	4171	3748	3292	2900		
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	149	596	320	300	250	235	203	186	170	138	120		
		Anteil in %	1,53	7,08	4,42	4,53	4,22	4,47	4,34	4,46	4,54	4,19	4,14		
		CI Anteil in %	[1,28; 1,77]	[6,53; 7,62]	[3,95; 4,89]	[4,03; 5,03]	[3,71; 4,74]	[3,91; 5,03]	[3,76; 4,93]	[3,83; 5,09]	[3,87; 5,20]	[3,51; 4,88]	[3,41; 4,86]		
	auswertbar	Anzahl	9767	8422	7236	6624	5918	5255	4673	4171	3748	3292	2899		
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	6097	4940	4008	3536	3122	2698	2359	2052	1794	1568	1366		
		Anteil in %	62,42	58,66	55,39	53,38	52,75	51,34	50,48	49,20	47,87	47,63	47,12		
		CI Anteil in %	[61,46; 63,39]	[57,60; 59,71]	[54,24; 56,54]	[52,18; 54,58]	[51,48; 54,03]	[49,99; 52,69]	[49,05; 51,92]	[47,68; 50,71]	[46,27; 49,47]	[45,92; 49,34]	[45,30; 48,94]		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2627	2753	2366	2243	2025	1897	1694	1562	1461	1294	1145		
		Anteil in %	26,90	32,69	32,70	33,86	34,22	36,10	36,25	37,45	38,98	39,31	39,50		
		CI Anteil in %	[26,02; 27,78]	[31,69; 33,69]	[31,62; 33,78]	[32,72; 35,00]	[33,01; 35,43]	[34,80; 37,40]	[34,87; 37,63]	[35,98; 38,92]	[37,42; 40,54]	[37,64; 40,98]	[37,72; 41,28]		
	auswertbar	Anzahl			7239	6624	5918	5255	4673	4172	3748	3292	2900		
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl			3	3	0	0	1	1	1	2	2		
		Anteil in %			0,04	0,05	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,06	0,07		
		CI Anteil in %			[0,00; 0,09]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,16]		
	auswertbar	Anzahl	9766	8422	7237	6622	5915	5253	4669	4170	3747	3291	2899		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2985	2447	2161	1912	1714	1533	1361	1179	1044	932	805		
		Anteil in %	30,57	29,05	29,86	28,87	28,98	29,18	29,15	28,27	27,86	28,32	27,77		
		CI Anteil in %	[29,65; 31,48]	[28,09; 30,02]	[28,81; 30,91]	[27,78; 29,97]	[27,82; 30,13]	[27,95; 30,41]	[27,85; 30,45]	[26,91; 29,64]	[26,43; 29,30]	[26,78; 29,86]	[26,14; 29,40]		
	auswertbar	Anzahl	9766	8422	7234	6622	5915	5253	4669	4169	3747	3291	2898		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	211	182	189	173	139	117	104	94	89	67	55		
		Anteil in %	2,16	2,16	2,61	2,61	2,35	2,23	2,23	2,25	2,38	2,04	1,90		
		CI Anteil in %	[1,87; 2,45]	[1,85; 2,47]	[2,25; 2,98]	[2,23; 3,00]	[1,96; 2,74]	[1,83; 2,63]	[1,80; 2,65]	[1,80; 2,71]	[1,89; 2,86]	[1,55; 2,52]	[1,40; 2,39]		
	auswertbar	Anzahl	9767	8422	7238	6623	5917	5254	4672	4170	3747	3291	2899		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	8001	6466	5660	5225	4733	4235	3832	3434	3084	2727	2368		
		Anteil in %	81,92	76,78	78,20	78,89	79,99	80,61	82,02	82,35	82,31	82,86	81,68		
		CI Anteil in %	[81,16; 82,68]	[75,87; 77,68]	[77,25; 79,15]	[77,91; 79,87]	[78,97; 81,01]	[79,54; 81,67]	[80,92; 83,12]	[81,19; 83,51]	[81,08; 83,53]	[81,57; 84,15]	[80,28; 83,09]		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	701	533	340	290	272	253	202	166	149	137	130		
		Anteil in %	7,18	6,33	4,70	4,38	4,60	4,82	4,32	3,98	3,98	4,16	4,48		
	CI Anteil in %	[6,67; 7,69]	[5,81; 6,85]	[4,21; 5,18]	[3,89; 4,87]	[4,06; 5,13]	[4,24; 5,39]	[3,74; 4,91]	[3,39; 4,57]	[3,35; 4,60]	[3,48; 4,85]	[3,73; 5,24]			
auswertbar	Anzahl	9766	8422	7239	6624	5918	5255	4673	4172	3748	3292	2900			
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1050	815	229	173	155	143	125	102	78	66	58			
	Anteil in %	10,75	9,68	3,16	2,61	2,62	2,72	2,67	2,44	2,08	2,00	2,00			
	CI Anteil in %	[10,14; 11,37]	[9,05; 10,31]	[2,76; 3,57]	[2,23; 3,00]	[2,21; 3,03]	[2,28; 3,16]	[2,21; 3,14]	[1,98; 2,91]	[1,62; 2,54]	[1,53; 2,48]	[1,49; 2,51]			
auswertbar	Anzahl	9766	8422	7239	6624	5918	5255	4673	4172	3748	3292	2900			
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1747	1231	982	978	855	821	701	660	547	502	447			
	Anteil in %	17,89	14,62	13,57	14,76	14,45	15,62	15,00	15,82	14,59	15,25	15,41			
	CI Anteil in %	[17,13; 18,65]	[13,86; 15,37]	[12,78; 14,35]	[13,91; 15,62]	[13,55; 15,34]	[14,64; 16,60]	[13,98; 16,03]	[14,71; 16,93]	[13,46; 15,72]	[14,02; 16,48]	[14,10; 16,73]			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497		
	auswertbar	Anzahl	6509	5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329		
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	68	381	210	204	164	160	148	142	130	103	95		
		Anteil in %	1,04	6,65	4,22	4,42	3,91	4,18	4,26	4,47	4,45	3,97	4,08		
		CI Anteil in %	[0,80; 1,29]	[6,00; 7,29]	[3,66; 4,78]	[3,83; 5,01]	[3,32; 4,50]	[3,55; 4,82]	[3,59; 4,93]	[3,75; 5,19]	[3,70; 5,20]	[3,22; 4,72]	[3,28; 4,88]		
	auswertbar	Anzahl	6509	5731	4979	4617	4194	3825	3474	3175	2922	2597	2329		
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	4181	3457	2815	2500	2242	1957	1726	1532	1373	1203	1071		
		Anteil in %	64,23	60,32	56,54	54,15	53,46	51,16	49,68	48,25	46,99	46,32	45,99		
		CI Anteil in %	[63,07; 65,40]	[59,05; 61,59]	[55,16; 57,91]	[52,71; 55,59]	[51,95; 54,97]	[49,58; 52,75]	[48,02; 51,35]	[46,51; 49,99]	[45,18; 48,80]	[44,40; 48,24]	[43,96; 48,01]		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1610	1785	1587	1547	1413	1396	1290	1223	1176	1058	951		
		Anteil in %	24,73	31,15	31,87	33,51	33,69	36,50	37,13	38,52	40,25	40,74	40,83		
		CI Anteil in %	[23,69; 25,78]	[29,95; 32,35]	[30,58; 33,17]	[32,14; 34,87]	[32,26; 35,12]	[34,97; 38,02]	[35,53; 38,74]	[36,83; 40,21]	[38,47; 42,02]	[38,85; 42,63]	[38,84; 42,83]		
	auswertbar	Anzahl			4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329		
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl			1	2	0	0	1	1	0	1	0		
		Anteil in %			0,02	0,04	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,04	0,00		
		CI Anteil in %			[0,00; 0,06]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]		
	auswertbar	Anzahl	6508	5731	4979	4615	4191	3823	3471	3174	2921	2596	2328		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1745	1475	1318	1190	1095	991	883	798	727	657	580		
		Anteil in %	26,81	25,74	26,47	25,79	26,13	25,92	25,44	25,14	24,89	25,31	24,91		
		CI Anteil in %	[25,74; 27,89]	[24,61; 26,87]	[25,25; 27,70]	[24,52; 27,05]	[24,80; 27,46]	[24,53; 27,31]	[23,99; 26,89]	[23,63; 26,65]	[23,32; 26,46]	[23,64; 26,98]	[23,16; 26,67]		
	auswertbar	Anzahl	6508	5731	4978	4615	4191	3823	3471	3173	2921	2596	2328		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	109	97	112	96	83	72	64	67	67	46	37		
		Anteil in %	1,67	1,69	2,25	2,08	1,98	1,88	1,84	2,11	2,29	1,77	1,59		
		CI Anteil in %	[1,36; 1,99]	[1,36; 2,03]	[1,84; 2,66]	[1,67; 2,49]	[1,56; 2,40]	[1,45; 2,31]	[1,40; 2,29]	[1,61; 2,61]	[1,75; 2,84]	[1,26; 2,28]	[1,08; 2,10]		
	auswertbar	Anzahl	6509	5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	5450	4508	3993	3732	3454	3180	2935	2682	2469	2218	1956		
		Anteil in %	83,73	78,66	80,18	80,83	82,36	83,14	84,48	84,45	84,50	85,41	83,98		
		CI Anteil in %	[82,83; 84,63]	[77,60; 79,72]	[79,07; 81,29]	[79,70; 81,97]	[81,20; 83,51]	[81,95; 84,32]	[83,28; 85,69]	[83,19; 85,71]	[83,18; 85,81]	[84,05; 86,76]	[82,49; 85,47]		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	464	350	208	171	167	157	125	104	100	93	91		
		Anteil in %	7,13	6,11	4,18	3,70	3,98	4,10	3,60	3,27	3,42	3,58	3,91		
		CI Anteil in %	[6,50; 7,75]	[5,49; 6,73]	[3,62; 4,73]	[3,16; 4,25]	[3,39; 4,57]	[3,48; 4,73]	[2,98; 4,22]	[2,66; 3,89]	[2,76; 4,08]	[2,87; 4,30]	[3,12; 4,69]		
	auswertbar	Anzahl	6508	5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329		
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	800	625	162	127	113	106	94	78	60	49	43		
		Anteil in %	12,29	10,91	3,25	2,75	2,69	2,77	2,71	2,46	2,05	1,89	1,85		
		CI Anteil in %	[11,49; 13,09]	[10,10; 11,71]	[2,76; 3,75]	[2,28; 3,22]	[2,20; 3,18]	[2,25; 3,29]	[2,17; 3,25]	[1,92; 2,99]	[1,54; 2,57]	[1,36; 2,41]	[1,30; 2,39]		
	auswertbar	Anzahl	6508	5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329		
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1335	958	736	741	650	638	560	530	452	408	367		
		Anteil in %	20,51	16,72	14,78	16,05	15,50	16,68	16,12	16,69	15,47	15,71	15,76		
		CI Anteil in %	[19,53; 21,49]	[15,75; 17,68]	[13,79; 15,76]	[14,99; 17,11]	[14,40; 16,59]	[15,50; 17,86]	[14,90; 17,34]	[15,39; 17,98]	[14,16; 16,78]	[14,31; 17,11]	[14,28; 17,24]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373			
	auswertbar	Anzahl	10439	8618	7782	6741	5883	5187	4599	4044	3553	3109			
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	182	323	320	288	278	261	246	211	173	162			
		Anteil in %	1,74	3,75	4,11	4,27	4,73	5,03	5,35	5,22	4,87	5,21			
		CI Anteil in %	[1,49; 1,99]	[3,35; 4,15]	[3,67; 4,55]	[3,79; 4,76]	[4,18; 5,27]	[4,44; 5,63]	[4,70; 6,00]	[4,53; 5,90]	[4,16; 5,58]	[4,43; 5,99]			
	auswertbar	Anzahl	10439	8619	7781	6740	5882	5187	4598	4043	3552	3108			
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	6247	4658	4070	3424	2924	2532	2180	1865	1594	1318			
		Anteil in %	59,84	54,04	52,31	50,80	49,71	48,81	47,41	46,13	44,88	42,41			
		CI Anteil in %	[58,90; 60,78]	[52,99; 55,10]	[51,20; 53,42]	[49,61; 51,99]	[48,43; 50,99]	[47,45; 50,17]	[45,97; 48,86]	[44,59; 47,67]	[43,24; 46,51]	[40,67; 44,14]			
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	3132	2980	2802	2511	2237	2010	1863	1680	1503	1395			
		Anteil in %	30,00	34,57	36,01	37,26	38,03	38,75	40,52	41,55	42,31	44,88			
		CI Anteil in %	[29,12; 30,88]	[33,57; 35,58]	[34,94; 37,08]	[36,10; 38,41]	[36,79; 39,27]	[37,42; 40,08]	[39,10; 41,94]	[40,03; 43,07]	[40,69; 43,94]	[43,14; 46,63]			
	auswertbar	Anzahl		8384	7782	6742	5883	5188	4599	4044	3553	3110			
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl		1	3	3	1	2	4	3	3	3			
		Anteil in %		0,01	0,04	0,04	0,02	0,04	0,09	0,07	0,08	0,10			
		CI Anteil in %		[0,00; 0,04]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,21]			
	auswertbar	Anzahl	10439	8614	7778	6739	5880	5183	4594	4039	3549	3107			
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2990	2427	2156	1818	1577	1372	1219	1060	922	785			
		Anteil in %	28,64	28,18	27,72	26,98	26,82	26,47	26,53	26,24	25,98	25,27			
		CI Anteil in %	[27,78; 29,51]	[27,23; 29,13]	[26,72; 28,71]	[25,92; 28,04]	[25,69; 27,95]	[25,27; 27,67]	[25,26; 27,81]	[24,89; 27,60]	[24,54; 27,42]	[23,74; 26,79]			
	auswertbar	Anzahl	10439	8614	7777	6738	5879	5183	4593	4038	3548	3105			
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	264	246	208	167	149	116	104	90	95	74			
		Anteil in %	2,53	2,86	2,67	2,48	2,53	2,24	2,26	2,23	2,68	2,38			
		CI Anteil in %	[2,23; 2,83]	[2,50; 3,21]	[2,32; 3,03]	[2,11; 2,85]	[2,13; 2,94]	[1,84; 2,64]	[1,83; 2,69]	[1,77; 2,68]	[2,15; 3,21]	[1,85; 2,92]			
	auswertbar	Anzahl	10439	8618	7782	6742	5882	5186	4597	4043	3552	3107			
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	8429	6727	6198	5360	4711	4212	3723	3280	2916	2553			
		Anteil in %	80,75	78,06	79,65	79,50	80,09	81,22	80,99	81,13	82,09	82,17			
		CI Anteil in %	[79,99; 81,50]	[77,18; 78,93]	[78,75; 80,54]	[78,54; 80,47]	[79,07; 81,11]	[80,16; 82,28]	[79,85; 82,12]	[79,92; 82,33]	[80,83; 83,36]	[80,82; 83,52]			
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	800	491	396	319	274	195	186	172	144	124			
		Anteil in %	7,66	5,70	5,09	4,73	4,66	3,76	4,05	4,25	4,05	3,99			
	CI Anteil in %	[7,15; 8,17]	[5,21; 6,19]	[4,60; 5,58]	[4,22; 5,24]	[4,12; 5,20]	[3,24; 4,28]	[3,48; 4,62]	[3,63; 4,88]	[3,41; 4,70]	[3,30; 4,68]				
auswertbar	Anzahl	10439	8619	7782	6742	5883	5188	4599	4044	3553	3110				
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1152	302	227	206	189	173	126	106	91	80				
	Anteil in %	11,04	3,50	2,92	3,06	3,21	3,33	2,74	2,62	2,56	2,57				
	CI Anteil in %	[10,43; 11,64]	[3,12; 3,89]	[2,54; 3,29]	[2,64; 3,47]	[2,76; 3,66]	[2,85; 3,82]	[2,27; 3,21]	[2,13; 3,11]	[2,04; 3,08]	[2,02; 3,13]				
auswertbar	Anzahl	10439	8619	7782	6742	5883	5188	4599	4044	3553	3110				
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1745	1106	1040	858	768	638	579	530	474	398				
	Anteil in %	16,72	12,83	13,36	12,73	13,05	12,30	12,59	13,11	13,34	12,80				
	CI Anteil in %	[16,00; 17,43]	[12,13; 13,54]	[12,61; 14,12]	[11,93; 13,52]	[12,19; 13,92]	[11,40; 13,19]	[11,63; 13,55]	[12,07; 14,15]	[12,22; 14,46]	[11,62; 13,97]				

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538			
	auswertbar	Anzahl	6454	5486	5057	4461	4013	3602	3274	2953	2644	2365			
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	83	204	203	183	186	185	180	152	130	118			
		Anteil in %	1,29	3,72	4,01	4,10	4,63	5,14	5,50	5,15	4,92	4,99			
		CI Anteil in %	[1,01; 1,56]	[3,22; 4,22]	[3,47; 4,56]	[3,52; 4,68]	[3,98; 5,29]	[4,42; 5,86]	[4,72; 6,28]	[4,35; 5,94]	[4,09; 5,74]	[4,11; 5,87]			
	auswertbar	Anzahl	6454	5487	5057	4460	4012	3602	3274	2953	2644	2365			
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3957	3009	2683	2276	2039	1772	1544	1345	1152	966			
		Anteil in %	61,31	54,84	53,06	51,03	50,82	49,19	47,16	45,55	43,57	40,85			
		CI Anteil in %	[60,12; 62,50]	[53,52; 56,16]	[51,68; 54,43]	[49,56; 52,50]	[49,28; 52,37]	[47,56; 50,83]	[45,45; 48,87]	[43,75; 47,34]	[41,68; 45,46]	[38,86; 42,83]			
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1831	1846	1796	1655	1504	1391	1337	1248	1151	1100			
		Anteil in %	28,37	33,64	35,52	37,11	37,49	38,62	40,84	42,26	43,53	46,51			
		CI Anteil in %	[27,27; 29,47]	[32,39; 34,89]	[34,20; 36,83]	[35,69; 38,53]	[35,99; 38,99]	[37,03; 40,21]	[39,15; 42,52]	[40,48; 44,04]	[41,64; 45,42]	[44,50; 48,52]			
	auswertbar	Anzahl		5354	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366			
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl		1	2	3	1	1	0	0	0	1			
		Anteil in %		0,02	0,04	0,07	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04			
		CI Anteil in %		[0,00; 0,06]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,13]			
	auswertbar	Anzahl	6454	5483	5054	4460	4011	3599	3271	2950	2640	2364			
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1521	1303	1223	1027	952	848	769	685	602	525			
		Anteil in %	23,57	23,76	24,20	23,03	23,73	23,56	23,51	23,22	22,80	22,21			
		CI Anteil in %	[22,53; 24,60]	[22,64; 24,89]	[23,02; 25,38]	[21,79; 24,26]	[22,42; 25,05]	[22,18; 24,95]	[22,06; 24,96]	[21,70; 24,74]	[21,20; 24,40]	[20,53; 23,88]			
	auswertbar	Anzahl	6454	5483	5054	4459	4010	3599	3271	2950	2640	2363			
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	119	129	125	95	90	71	63	57	59	52			
		Anteil in %	1,84	2,35	2,47	2,13	2,24	1,97	1,93	1,93	2,23	2,20			
		CI Anteil in %	[1,52; 2,17]	[1,95; 2,75]	[2,05; 2,90]	[1,71; 2,55]	[1,79; 2,70]	[1,52; 2,43]	[1,45; 2,40]	[1,44; 2,43]	[1,67; 2,80]	[1,61; 2,79]			
	auswertbar	Anzahl	6454	5486	5057	4462	4012	3601	3272	2952	2643	2364			
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	5369	4395	4137	3654	3300	3004	2713	2467	2231	1997			
		Anteil in %	83,19	80,11	81,81	81,89	82,25	83,42	82,92	83,57	84,41	84,48			
		CI Anteil in %	[82,28; 84,10]	[79,06; 81,17]	[80,74; 82,87]	[80,76; 83,02]	[81,07; 83,44]	[82,21; 84,64]	[81,63; 84,21]	[82,23; 84,91]	[83,03; 85,79]	[83,02; 85,94]			
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	495	305	245	204	187	123	118	112	97	89			
		Anteil in %	7,67	5,56	4,84	4,57	4,66	3,42	3,61	3,79	3,67	3,76			
		CI Anteil in %	[7,02; 8,32]	[4,95; 6,17]	[4,25; 5,44]	[3,96; 5,18]	[4,01; 5,31]	[2,82; 4,01]	[2,97; 4,25]	[3,10; 4,48]	[2,95; 4,39]	[3,00; 4,53]			
	auswertbar	Anzahl	6454	5487	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366			
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	826	199	149	136	118	111	86	74	66	61			
		Anteil in %	12,80	3,63	2,95	3,05	2,94	3,08	2,63	2,51	2,50	2,58			
		CI Anteil in %	[11,98; 13,61]	[3,13; 4,12]	[2,48; 3,41]	[2,54; 3,55]	[2,42; 3,46]	[2,52; 3,65]	[2,08; 3,17]	[1,94; 3,07]	[1,90; 3,09]	[1,94; 3,22]			
	auswertbar	Anzahl	6454	5487	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366			
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1247	759	739	611	558	465	430	393	365	308			
		Anteil in %	19,32	13,83	14,61	13,69	13,90	12,91	13,13	13,31	13,80	13,02			
		CI Anteil in %	[18,36; 20,28]	[12,92; 14,75]	[13,64; 15,59]	[12,68; 14,70]	[12,83; 14,98]	[11,81; 14,00]	[11,98; 14,29]	[12,08; 14,53]	[12,49; 15,12]	[11,66; 14,37]			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370				
	auswertbar	Anzahl	9103	7730	6612	5745	5097	4484	4001	3494	3113				
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	248	275	238	205	222	218	188	158	153				
		Anteil in %	2,72	3,56	3,60	3,57	4,36	4,86	4,70	4,52	4,91				
		CI Anteil in %	[2,39; 3,06]	[3,14; 3,97]	[3,15; 4,05]	[3,09; 4,05]	[3,80; 4,92]	[4,23; 5,49]	[4,04; 5,35]	[3,83; 5,21]	[4,16; 5,67]				
	auswertbar	Anzahl	9100	7728	6610	5744	5096	4482	3999	3493	3110				
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	5124	4192	3582	3025	2654	2264	1956	1723	1495				
		Anteil in %	56,31	54,24	54,19	52,66	52,08	50,51	48,91	49,33	48,07				
		CI Anteil in %	[55,29; 57,33]	[53,13; 55,36]	[52,99; 55,39]	[51,37; 53,95]	[50,71; 53,45]	[49,05; 51,98]	[47,36; 50,46]	[47,67; 50,99]	[46,31; 49,83]				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2751	2485	2163	1985	1813	1665	1533	1311	1242				
		Anteil in %	30,23	32,16	32,72	34,56	35,58	37,15	38,33	37,53	39,94				
		CI Anteil in %	[29,29; 31,17]	[31,11; 33,20]	[31,59; 33,85]	[33,33; 35,79]	[34,26; 36,89]	[35,73; 38,56]	[36,83; 39,84]	[35,93; 39,14]	[38,21; 41,66]				
	auswertbar	Anzahl	9103	7730	6612	5746	5097	4484	4002	3494	3113				
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	3	2	3	2	1	3	5	1	5				
		Anteil in %	0,03	0,03	0,05	0,03	0,02	0,07	0,12	0,03	0,16				
		CI Anteil in %	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,14]	[0,02; 0,23]	[0,00; 0,08]	[0,02; 0,30]				
	auswertbar	Anzahl	9090	7724	6606	5741	5093	4479	3997	3491	3110				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2761	2304	1972	1715	1473	1334	1157	1037	912				
		Anteil in %	30,37	29,83	29,85	29,87	28,92	29,78	28,95	29,70	29,32				
		CI Anteil in %	[29,43; 31,32]	[28,81; 30,85]	[28,75; 30,96]	[28,69; 31,06]	[27,68; 30,17]	[28,44; 31,12]	[27,54; 30,35]	[28,19; 31,22]	[27,72; 30,93]				
	auswertbar	Anzahl	9088	7723	6605	5740	5093	4479	3997	3491	3109				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	295	222	185	150	128	131	100	92	92				
		Anteil in %	3,25	2,87	2,80	2,61	2,51	2,92	2,50	2,64	2,96				
		CI Anteil in %	[2,88; 3,61]	[2,50; 3,25]	[2,40; 3,20]	[2,20; 3,03]	[2,08; 2,94]	[2,43; 3,42]	[2,02; 2,99]	[2,10; 3,17]	[2,36; 3,55]				
	auswertbar	Anzahl	9098	7728	6611	5745	5096	4483	3999	3493	3112				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	6957	6031	5216	4592	4029	3569	3194	2791	2491				
		Anteil in %	76,47	78,04	78,90	79,93	79,06	79,61	79,87	79,90	80,04				
		CI Anteil in %	[75,60; 77,34]	[77,12; 78,96]	[77,92; 79,88]	[78,89; 80,97]	[77,94; 80,18]	[78,43; 80,79]	[78,63; 81,11]	[78,57; 81,23]	[78,64; 81,45]				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	549	354	315	259	254	194	174	163	139				
		Anteil in %	6,03	4,58	4,76	4,51	4,98	4,33	4,35	4,67	4,47				
	CI Anteil in %	[5,54; 6,52]	[4,11; 5,05]	[4,25; 5,28]	[3,97; 5,04]	[4,39; 5,58]	[3,73; 4,92]	[3,72; 4,98]	[3,97; 5,37]	[3,74; 5,19]					
auswertbar	Anzahl	9103	7730	6612	5746	5097	4484	4002	3494	3113					
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	257	149	135	112	87	80	63	53	44					
	Anteil in %	2,82	1,93	2,04	1,95	1,71	1,78	1,57	1,52	1,41					
	CI Anteil in %	[2,48; 3,16]	[1,62; 2,23]	[1,70; 2,38]	[1,59; 2,31]	[1,35; 2,06]	[1,40; 2,17]	[1,19; 1,96]	[1,11; 1,92]	[1,00; 1,83]					
auswertbar	Anzahl	9103	7730	6612	5746	5097	4484	4002	3494	3113					
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1370	1051	860	769	657	597	516	455	414					
	Anteil in %	15,05	13,60	13,01	13,38	12,89	13,31	12,89	13,02	13,30					
	CI Anteil in %	[14,32; 15,78]	[12,83; 14,36]	[12,20; 13,82]	[12,50; 14,26]	[11,97; 13,81]	[12,32; 14,31]	[11,86; 13,93]	[11,91; 14,14]	[12,11; 14,49]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397				
	auswertbar	Anzahl	5565	4883	4243	3780	3419	3054	2776	2484	2240				
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	115	154	133	131	148	145	127	116	113				
		Anteil in %	2,07	3,15	3,13	3,47	4,33	4,75	4,57	4,67	5,04				
		CI Anteil in %	[1,69; 2,44]	[2,66; 3,64]	[2,61; 3,66]	[2,88; 4,05]	[3,65; 5,01]	[3,99; 5,50]	[3,80; 5,35]	[3,84; 5,50]	[4,14; 5,95]				
	auswertbar	Anzahl	5564	4882	4242	3779	3418	3053	2775	2483	2237				
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3250	2695	2343	2000	1782	1516	1326	1206	1035				
		Anteil in %	58,41	55,20	55,23	52,92	52,14	49,66	47,78	48,57	46,27				
		CI Anteil in %	[57,12; 59,71]	[53,81; 56,60]	[53,74; 56,73]	[51,33; 54,52]	[50,46; 53,81]	[47,88; 51,43]	[45,92; 49,64]	[46,60; 50,54]	[44,20; 48,33]				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1561	1510	1356	1321	1230	1177	1107	977	958				
		Anteil in %	28,06	30,93	31,97	34,96	35,99	38,55	39,89	39,35	42,83				
		CI Anteil in %	[26,87; 29,24]	[29,63; 32,23]	[30,56; 33,37]	[33,44; 36,48]	[34,38; 37,60]	[36,83; 40,28]	[38,07; 41,71]	[37,43; 41,27]	[40,77; 44,88]				
	auswertbar	Anzahl	5565	4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	1	1	2	2	1	2	2	1	4				
		Anteil in %	0,02	0,02	0,05	0,05	0,03	0,07	0,07	0,04	0,18				
		CI Anteil in %	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,35]				
	auswertbar	Anzahl	5556	4879	4239	3777	3416	3051	2773	2481	2237				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1391	1194	1057	950	824	776	691	645	566				
		Anteil in %	25,04	24,47	24,94	25,15	24,12	25,43	24,92	26,00	25,30				
		CI Anteil in %	[23,90; 26,18]	[23,27; 25,68]	[23,63; 26,24]	[23,77; 26,54]	[22,69; 25,56]	[23,89; 26,98]	[23,31; 26,53]	[24,27; 27,72]	[23,50; 27,10]				
	auswertbar	Anzahl	5556	4879	4239	3776	3416	3051	2773	2481	2236				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	126	94	72	64	58	71	48	51	52				
		Anteil in %	2,27	1,93	1,70	1,69	1,70	2,33	1,73	2,06	2,33				
		CI Anteil in %	[1,88; 2,66]	[1,54; 2,31]	[1,31; 2,09]	[1,28; 2,11]	[1,26; 2,13]	[1,79; 2,86]	[1,25; 2,22]	[1,50; 2,61]	[1,70; 2,95]				
	auswertbar	Anzahl	5562	4881	4242	3780	3418	3053	2774	2483	2239				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	4415	3961	3494	3163	2801	2542	2303	2070	1870				
		Anteil in %	79,38	81,15	82,37	83,68	81,95	83,26	83,02	83,37	83,52				
		CI Anteil in %	[78,31; 80,44]	[80,05; 82,25]	[81,22; 83,51]	[82,50; 84,86]	[80,66; 83,24]	[81,94; 84,59]	[81,62; 84,42]	[81,90; 84,83]	[81,98; 85,06]				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	349	209	186	149	160	111	103	99	84				
		Anteil in %	6,27	4,28	4,38	3,94	4,68	3,64	3,71	3,99	3,75				
		CI Anteil in %	[5,64; 6,91]	[3,71; 4,85]	[3,77; 5,00]	[3,32; 4,56]	[3,97; 5,39]	[2,97; 4,30]	[3,01; 4,42]	[3,22; 4,76]	[2,96; 4,54]				
	auswertbar	Anzahl	5565	4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	168	95	78	69	57	49	42	35	29				
		Anteil in %	3,02	1,95	1,84	1,82	1,67	1,60	1,51	1,41	1,29				
		CI Anteil in %	[2,57; 3,47]	[1,56; 2,33]	[1,43; 2,24]	[1,40; 2,25]	[1,24; 2,10]	[1,16; 2,05]	[1,06; 1,97]	[0,95; 1,87]	[0,83; 1,76]				
	auswertbar	Anzahl	5565	4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	938	751	628	573	489	448	390	348	301				
		Anteil in %	16,86	15,38	14,80	15,15	14,30	14,67	14,04	14,01	13,44				
		CI Anteil in %	[15,87; 17,84]	[14,37; 16,39]	[13,73; 15,87]	[14,01; 16,30]	[13,13; 15,48]	[13,41; 15,92]	[12,75; 15,34]	[12,64; 15,37]	[12,02; 14,85]				

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822					
	auswertbar	Anzahl	7225	5956	5041	4395	3839	3344	2989	2627					
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	204	217	193	161	162	141	131	124					
		Anteil in %	2,82	3,64	3,83	3,66	4,22	4,22	4,38	4,72					
		CI Anteil in %	[2,44; 3,21]	[3,17; 4,12]	[3,30; 4,36]	[3,11; 4,22]	[3,58; 4,86]	[3,54; 4,90]	[3,65; 5,12]	[3,91; 5,53]					
	auswertbar	Anzahl	7225	5955	5041	4396	3839	3344	2989	2625					
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	4152	3227	2666	2254	1903	1613	1422	1243					
		Anteil in %	57,47	54,19	52,89	51,27	49,57	48,24	47,57	47,35					
		CI Anteil in %	[56,33; 58,61]	[52,92; 55,46]	[51,51; 54,26]	[49,80; 52,75]	[47,99; 51,15]	[46,54; 49,93]	[45,78; 49,37]	[45,44; 49,26]					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2227	2024	1797	1618	1456	1322	1176	1030					
		Anteil in %	30,82	33,99	35,65	36,81	37,93	39,53	39,34	39,24					
		CI Anteil in %	[29,76; 31,89]	[32,79; 35,19]	[34,33; 36,97]	[35,38; 38,23]	[36,39; 39,46]	[37,88; 41,19]	[37,59; 41,10]	[37,37; 41,11]					
	auswertbar	Anzahl	7227	5958	5042	4396	3839	3345	2989	2627					
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	3	4	2	1	2	5	1	4					
		Anteil in %	0,04	0,07	0,04	0,02	0,05	0,15	0,03	0,15					
		CI Anteil in %	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,12]	[0,02; 0,28]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,30]					
	auswertbar	Anzahl	7222	5955	5039	4395	3836	3342	2988	2624					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2092	1669	1437	1224	1041	903	825	720					
		Anteil in %	28,97	28,03	28,52	27,85	27,14	27,02	27,61	27,44					
		CI Anteil in %	[27,92; 30,01]	[26,89; 29,17]	[27,27; 29,76]	[26,52; 29,18]	[25,73; 28,55]	[25,51; 28,53]	[26,01; 29,21]	[25,73; 29,15]					
	auswertbar	Anzahl	7220	5952	5038	4395	3836	3342	2988	2623					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	222	152	141	130	108	79	78	70					
		Anteil in %	3,07	2,55	2,80	2,96	2,82	2,36	2,61	2,67					
		CI Anteil in %	[2,68; 3,47]	[2,15; 2,95]	[2,34; 3,25]	[2,46; 3,46]	[2,29; 3,34]	[1,85; 2,88]	[2,04; 3,18]	[2,05; 3,29]					
	auswertbar	Anzahl	7223	5956	5039	4393	3837	3344	2988	2625					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	5465	4625	3956	3462	3039	2643	2348	2090					
		Anteil in %	75,66	77,65	78,51	78,81	79,20	79,04	78,58	79,62					
		CI Anteil in %	[74,67; 76,65]	[76,59; 78,71]	[77,37; 79,64]	[77,60; 80,02]	[77,92; 80,49]	[77,66; 80,42]	[77,11; 80,05]	[78,08; 81,16]					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	484	312	275	234	186	165	141	112					
		Anteil in %	6,70	5,24	5,46	5,33	4,85	4,93	4,72	4,27					
	CI Anteil in %	[6,12; 7,28]	[4,67; 5,80]	[4,83; 6,08]	[4,66; 5,99]	[4,17; 5,53]	[4,20; 5,67]	[3,96; 5,48]	[3,49; 5,04]						
auswertbar	Anzahl	7227	5958	5042	4396	3839	3345	2989	2627						
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	211	172	128	128	115	98	89	75						
	Anteil in %	2,92	2,89	2,54	2,91	3,00	2,93	2,98	2,85						
	CI Anteil in %	[2,53; 3,31]	[2,46; 3,31]	[2,10; 2,97]	[2,41; 3,41]	[2,46; 3,53]	[2,36; 3,50]	[2,37; 3,59]	[2,22; 3,49]						
auswertbar	Anzahl	7227	5958	5042	4396	3839	3345	2989	2627						
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1159	870	743	638	568	475	446	340						
	Anteil in %	16,04	14,60	14,74	14,51	14,80	14,20	14,92	12,94						
	CI Anteil in %	[15,19; 16,88]	[13,71; 15,50]	[13,76; 15,71]	[13,47; 15,55]	[13,67; 15,92]	[13,02; 15,38]	[13,64; 16,20]	[11,66; 14,23]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016					
	auswertbar	Anzahl	4438	3790	3261	2899	2573	2307	2114	1888					
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	89	115	106	95	98	87	85	86					
		Anteil in %	2,01	3,03	3,25	3,28	3,81	3,77	4,02	4,56					
		CI Anteil in %	[1,59; 2,42]	[2,49; 3,58]	[2,64; 3,86]	[2,63; 3,93]	[3,07; 4,55]	[2,99; 4,55]	[3,18; 4,86]	[3,61; 5,50]					
	auswertbar	Anzahl	4439	3790	3262	2900	2573	2307	2114	1886					
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2620	2095	1777	1535	1311	1137	1006	893					
		Anteil in %	59,02	55,28	54,48	52,93	50,95	49,28	47,59	47,35					
		CI Anteil in %	[57,58; 60,47]	[53,69; 56,86]	[52,77; 56,19]	[51,11; 54,75]	[49,02; 52,88]	[47,24; 51,33]	[45,46; 49,72]	[45,09; 49,60]					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1296	1249	1112	1034	946	904	832	747					
		Anteil in %	29,20	32,96	34,09	35,66	36,77	39,19	39,36	39,61					
		CI Anteil in %	[27,86; 30,53]	[31,46; 34,45]	[32,46; 35,72]	[33,91; 37,40]	[34,90; 38,63]	[37,19; 41,18]	[37,27; 41,44]	[37,40; 41,82]					
	auswertbar	Anzahl	4439	3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888					
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	0	2	0	0	0	1	0	3					
		Anteil in %	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,16					
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,34]					
	auswertbar	Anzahl	4436	3790	3259	2899	2571	2306	2113	1885					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1087	908	831	734	634	564	531	464					
		Anteil in %	24,50	23,96	25,50	25,32	24,66	24,46	25,13	24,62					
		CI Anteil in %	[23,24; 25,77]	[22,60; 25,32]	[24,00; 27,00]	[23,74; 26,90]	[22,99; 26,33]	[22,70; 26,21]	[23,28; 26,98]	[22,67; 26,56]					
	auswertbar	Anzahl	4436	3788	3259	2899	2571	2306	2113	1884					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	109	73	72	70	54	44	44	40					
		Anteil in %	2,46	1,93	2,21	2,41	2,10	1,91	2,08	2,12					
		CI Anteil in %	[2,00; 2,91]	[1,49; 2,37]	[1,70; 2,71]	[1,86; 2,97]	[1,55; 2,65]	[1,35; 2,47]	[1,47; 2,69]	[1,47; 2,77]					
	auswertbar	Anzahl	4436	3791	3261	2899	2573	2307	2114	1888					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3480	3074	2672	2381	2133	1898	1722	1556					
		Anteil in %	78,45	81,09	81,94	82,13	82,90	82,27	81,46	82,42					
		CI Anteil in %	[77,24; 79,66]	[79,84; 82,33]	[80,62; 83,26]	[80,74; 83,53]	[81,44; 84,35]	[80,71; 83,83]	[79,80; 83,11]	[80,70; 84,13]					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	303	189	160	136	99	96	84	70					
		Anteil in %	6,83	4,99	4,91	4,69	3,85	4,16	3,97	3,71					
		CI Anteil in %	[6,09; 7,57]	[4,29; 5,68]	[4,16; 5,65]	[3,92; 5,46]	[3,10; 4,59]	[3,35; 4,98]	[3,14; 4,81]	[2,86; 4,56]					
	auswertbar	Anzahl	4439	3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888					
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	135	100	79	80	70	64	57	45					
		Anteil in %	3,04	2,64	2,42	2,76	2,72	2,77	2,70	2,38					
		CI Anteil in %	[2,54; 3,55]	[2,13; 3,15]	[1,89; 2,95]	[2,16; 3,35]	[2,09; 3,35]	[2,10; 3,44]	[2,01; 3,39]	[1,70; 3,07]					
	auswertbar	Anzahl	4439	3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888					
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	780	597	507	450	407	338	329	247					
		Anteil in %	17,57	15,74	15,54	15,52	15,82	14,65	15,56	13,08					
		CI Anteil in %	[16,45; 18,69]	[14,58; 16,90]	[14,30; 16,79]	[14,20; 16,84]	[14,41; 17,23]	[13,21; 16,09]	[14,02; 17,11]	[11,56; 14,60]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826						
	auswertbar	Anzahl	6666	5539	4621	3919	3445	3006	2617						
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	228	233	190	162	169	127	125						
		Anteil in %	3,42	4,21	4,11	4,13	4,91	4,22	4,78						
		CI Anteil in %	[2,98; 3,86]	[3,68; 4,74]	[3,54; 4,68]	[3,51; 4,76]	[4,18; 5,63]	[3,51; 4,94]	[3,96; 5,59]						
	auswertbar	Anzahl	6664	5538	4617	3917	3444	3006	2617						
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3929	3098	2520	2096	1764	1526	1297						
		Anteil in %	58,96	55,94	54,58	53,51	51,22	50,77	49,56						
		CI Anteil in %	[57,78; 60,14]	[54,63; 57,25]	[53,14; 56,02]	[51,95; 55,07]	[49,55; 52,89]	[48,98; 52,55]	[47,64; 51,48]						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1947	1798	1561	1362	1255	1090	1004						
		Anteil in %	29,22	32,47	33,81	34,77	36,44	36,26	38,36						
		CI Anteil in %	[28,12; 30,31]	[31,23; 33,70]	[32,45; 35,17]	[33,28; 36,26]	[34,83; 38,05]	[34,54; 37,98]	[36,50; 40,23]						
	auswertbar	Anzahl	6667	5539	4621	3919	3446	3008	2618						
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	6	2	7	4	4	7	4						
		Anteil in %	0,09	0,04	0,15	0,10	0,12	0,23	0,15						
		CI Anteil in %	[0,02; 0,16]	[0,00; 0,09]	[0,04; 0,26]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,23]	[0,06; 0,40]	[0,00; 0,30]						
	auswertbar	Anzahl	6660	5535	4618	3915	3443	3003	2616						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1950	1592	1334	1130	966	877	744						
		Anteil in %	29,28	28,76	28,89	28,86	28,06	29,20	28,44						
		CI Anteil in %	[28,19; 30,37]	[27,57; 29,96]	[27,58; 30,19]	[27,44; 30,28]	[26,56; 29,56]	[27,58; 30,83]	[26,71; 30,17]						
	auswertbar	Anzahl	6658	5534	4614	3913	3441	3001	2615						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	167	140	112	97	73	79	52						
		Anteil in %	2,51	2,53	2,43	2,48	2,12	2,63	1,99						
		CI Anteil in %	[2,13; 2,88]	[2,12; 2,94]	[1,98; 2,87]	[1,99; 2,97]	[1,64; 2,60]	[2,06; 3,21]	[1,45; 2,52]						
	auswertbar	Anzahl	6663	5538	4620	3918	3445	3007	2616						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	5166	4380	3688	3155	2785	2446	2132						
		Anteil in %	77,53	79,09	79,83	80,53	80,84	81,34	81,50						
		CI Anteil in %	[76,53; 78,53]	[78,02; 80,16]	[78,67; 80,98]	[79,29; 81,77]	[79,53; 82,16]	[79,95; 82,74]	[80,01; 82,99]						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	386	264	196	152	144	129	104						
		Anteil in %	5,79	4,77	4,24	3,88	4,18	4,29	3,98						
		CI Anteil in %	[5,23; 6,35]	[4,21; 5,33]	[3,66; 4,82]	[3,27; 4,48]	[3,51; 4,85]	[3,57; 5,01]	[3,23; 4,72]						
	auswertbar	Anzahl	6667	5539	4621	3919	3446	3008	2618						
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	202	158	146	110	96	79	75							
	Anteil in %	3,03	2,85	3,16	2,81	2,79	2,63	2,86							
	CI Anteil in %	[2,62; 3,44]	[2,41; 3,29]	[2,66; 3,66]	[2,29; 3,32]	[2,24; 3,34]	[2,05; 3,20]	[2,23; 3,50]							
auswertbar	Anzahl	6667	5539	4621	3919	3446	3008	2618							
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	959	756	644	533	432	409	328							
	Anteil in %	14,38	13,65	13,94	13,60	12,54	13,60	12,53							
	CI Anteil in %	[13,54; 15,23]	[12,74; 14,55]	[12,94; 14,94]	[12,53; 14,67]	[11,43; 13,64]	[12,37; 14,82]	[11,26; 13,80]							

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005						
	auswertbar	Anzahl	4076	3508	3026	2638	2377	2114	1875						
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	93	116	111	104	109	88	85						
		Anteil in %	2,28	3,31	3,67	3,94	4,59	4,16	4,53						
		CI Anteil in %	[1,82; 2,74]	[2,71; 3,90]	[3,00; 4,34]	[3,20; 4,69]	[3,74; 5,43]	[3,31; 5,01]	[3,59; 5,48]						
	auswertbar	Anzahl	4075	3508	3024	2637	2377	2115	1876						
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2487	2046	1690	1432	1210	1066	907						
		Anteil in %	61,03	58,32	55,89	54,30	50,90	50,40	48,35						
		CI Anteil in %	[59,53; 62,53]	[56,69; 59,96]	[54,12; 57,66]	[52,40; 56,21]	[48,89; 52,91]	[48,27; 52,53]	[46,09; 50,61]						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1120	1083	1014	925	888	790	745						
		Anteil in %	27,48	30,87	33,53	35,08	37,36	37,35	39,71						
		CI Anteil in %	[26,11; 28,86]	[29,34; 32,40]	[31,85; 35,21]	[33,26; 36,90]	[35,41; 39,30]	[35,29; 39,41]	[37,50; 41,93]						
	auswertbar	Anzahl	4076	3508	3026	2638	2378	2116	1876						
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	3	0	3	1	2	5	3						
		Anteil in %	0,07	0,00	0,10	0,04	0,08	0,24	0,16						
		CI Anteil in %	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,20]	[0,03; 0,44]	[0,00; 0,34]						
	auswertbar	Anzahl	4073	3506	3024	2636	2377	2113	1875						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1020	867	739	656	565	527	452						
		Anteil in %	25,04	24,73	24,44	24,89	23,77	24,94	24,11						
		CI Anteil in %	[23,71; 26,37]	[23,30; 26,16]	[22,91; 25,97]	[23,24; 26,54]	[22,06; 25,48]	[23,10; 26,79]	[22,17; 26,04]						
	auswertbar	Anzahl	4072	3506	3022	2635	2376	2112	1875						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	82	67	58	51	35	40	22						
		Anteil in %	2,01	1,91	1,92	1,94	1,47	1,89	1,17						
		CI Anteil in %	[1,58; 2,45]	[1,46; 2,36]	[1,43; 2,41]	[1,41; 2,46]	[0,99; 1,96]	[1,31; 2,48]	[0,69; 1,66]						
	auswertbar	Anzahl	4075	3507	3025	2637	2377	2115	1874						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3312	2918	2507	2211	2003	1800	1599						
		Anteil in %	81,28	83,21	82,88	83,85	84,27	85,11	85,33						
		CI Anteil in %	[80,08; 82,47]	[81,97; 84,44]	[81,53; 84,22]	[82,44; 85,25]	[82,80; 85,73]	[83,59; 86,62]	[83,72; 86,93]						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	233	135	108	84	81	68	52						
		Anteil in %	5,72	3,85	3,57	3,19	3,41	3,22	2,77						
		CI Anteil in %	[5,00; 6,43]	[3,21; 4,49]	[2,91; 4,23]	[2,52; 3,86]	[2,68; 4,14]	[2,46; 3,97]	[2,03; 3,52]						
	auswertbar	Anzahl	4076	3508	3026	2638	2378	2116	1876						
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	110	82	75	59	48	41	43						
		Anteil in %	2,70	2,34	2,48	2,24	2,02	1,94	2,29						
		CI Anteil in %	[2,20; 3,20]	[1,84; 2,84]	[1,92; 3,03]	[1,67; 2,80]	[1,45; 2,58]	[1,35; 2,53]	[1,61; 2,97]						
	auswertbar	Anzahl	4076	3508	3026	2638	2378	2116	1876						
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	643	507	435	369	301	286	230						
		Anteil in %	15,78	14,45	14,38	13,99	12,66	13,52	12,26						
		CI Anteil in %	[14,66; 16,89]	[13,29; 15,62]	[13,13; 15,63]	[12,66; 15,31]	[11,32; 13,99]	[12,06; 14,97]	[10,78; 13,74]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291								
	auswertbar	Anzahl	6815	5584	4726	4063	3540	3074								
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	208	244	199	168	159	139								
		Anteil in %	3,05	4,37	4,21	4,13	4,49	4,52								
		CI Anteil in %	[2,64; 3,46]	[3,83; 4,91]	[3,64; 4,78]	[3,52; 4,75]	[3,81; 5,17]	[3,79; 5,26]								
	auswertbar	Anzahl	6815	5583	4726	4066	3540	3076								
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3972	2972	2435	2030	1768	1474								
		Anteil in %	58,28	53,23	51,52	49,93	49,94	47,92								
		CI Anteil in %	[57,11; 59,45]	[51,92; 54,54]	[50,10; 52,95]	[48,39; 51,46]	[48,30; 51,59]	[46,15; 49,69]								
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2091	1971	1718	1568	1391	1259								
		Anteil in %	30,68	35,30	36,35	38,56	39,29	40,93								
		CI Anteil in %	[29,59; 31,78]	[34,05; 36,56]	[34,98; 37,72]	[37,07; 40,06]	[37,68; 40,90]	[39,19; 42,67]								
	auswertbar	Anzahl	6818	5584	4727	4067	3542	3076								
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	8	1	3	3	5	4								
		Anteil in %	0,12	0,02	0,06	0,07	0,14	0,13								
		CI Anteil in %	[0,04; 0,20]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,16]	[0,02; 0,26]	[0,00; 0,26]								
	auswertbar	Anzahl	6814	5581	4722	4061	3537	3071								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2012	1507	1263	1070	966	812								
		Anteil in %	29,53	27,00	26,75	26,35	27,31	26,44								
		CI Anteil in %	[28,44; 30,61]	[25,84; 28,17]	[25,48; 28,01]	[24,99; 27,70]	[25,84; 28,78]	[24,88; 28,00]								
	auswertbar	Anzahl	6811	5580	4721	4060	3536	3071								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	212	156	117	85	73	66								
		Anteil in %	3,11	2,80	2,48	2,09	2,06	2,15								
		CI Anteil in %	[2,70; 3,53]	[2,36; 3,23]	[2,03; 2,92]	[1,65; 2,53]	[1,60; 2,53]	[1,64; 2,66]								
	auswertbar	Anzahl	6811	5583	4726	4064	3541	3076								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	5264	4415	3817	3322	2905	2538								
		Anteil in %	77,29	79,08	80,77	81,74	82,04	82,51								
		CI Anteil in %	[76,29; 78,28]	[78,01; 80,15]	[79,64; 81,89]	[80,55; 82,93]	[80,77; 83,30]	[81,17; 83,85]								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	493	307	221	167	143	119								
		Anteil in %	7,24	5,50	4,68	4,11	4,04	3,87								
		CI Anteil in %	[6,62; 7,85]	[4,90; 6,10]	[4,07; 5,28]	[3,50; 4,72]	[3,39; 4,69]	[3,19; 4,55]								
	auswertbar	Anzahl	6818	5584	4727	4067	3542	3076								
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	189	149	128	111	79	64									
	Anteil in %	2,77	2,67	2,71	2,73	2,23	2,08									
	CI Anteil in %	[2,38; 3,16]	[2,25; 3,09]	[2,25; 3,17]	[2,23; 3,23]	[1,74; 2,72]	[1,58; 2,59]									
auswertbar	Anzahl	6818	5584	4727	4067	3542	3076									
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	917	697	669	521	490	382									
	Anteil in %	13,45	12,48	14,15	12,81	13,83	12,42									
	CI Anteil in %	[12,64; 14,26]	[11,62; 13,35]	[13,16; 15,15]	[11,78; 13,84]	[12,70; 14,97]	[11,25; 13,58]									

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241							
	auswertbar	Anzahl	4188	3529	3047	2676	2383	2112							
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	98	139	112	104	98	90							
		Anteil in %	2,34	3,94	3,68	3,89	4,11	4,26							
		CI Anteil in %	[1,88; 2,80]	[3,30; 4,58]	[3,01; 4,34]	[3,15; 4,62]	[3,31; 4,91]	[3,40; 5,12]							
	auswertbar	Anzahl	4188	3528	3047	2678	2383	2114							
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2540	1944	1628	1370	1227	1020							
		Anteil in %	60,65	55,10	53,43	51,16	51,49	48,25							
		CI Anteil in %	[59,17; 62,13]	[53,46; 56,74]	[51,66; 55,20]	[49,26; 53,05]	[49,48; 53,50]	[46,12; 50,38]							
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1211	1210	1075	1026	928	884							
		Anteil in %	28,92	34,30	35,28	38,31	38,94	41,82							
		CI Anteil in %	[27,54; 30,29]	[32,73; 35,86]	[33,58; 36,98]	[36,47; 40,15]	[36,98; 40,90]	[39,71; 43,92]							
	auswertbar	Anzahl	4191	3529	3048	2679	2384	2114							
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	5	1	2	2	1	2							
		Anteil in %	0,12	0,03	0,07	0,07	0,04	0,09							
		CI Anteil in %	[0,01; 0,22]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,23]							
	auswertbar	Anzahl	4188	3527	3044	2675	2381	2110							
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1070	845	725	626	589	498							
		Anteil in %	25,55	23,96	23,82	23,40	24,74	23,60							
		CI Anteil in %	[24,23; 26,87]	[22,55; 25,37]	[22,30; 25,33]	[21,80; 25,01]	[23,00; 26,47]	[21,79; 25,41]							
	auswertbar	Anzahl	4185	3526	3043	2674	2380	2110							
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	98	78	65	47	38	38							
		Anteil in %	2,34	2,21	2,14	1,76	1,60	1,80							
		CI Anteil in %	[1,88; 2,80]	[1,73; 2,70]	[1,62; 2,65]	[1,26; 2,26]	[1,09; 2,10]	[1,23; 2,37]							
	auswertbar	Anzahl	4187	3529	3048	2678	2384	2114							
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3370	2892	2558	2264	2027	1805							
		Anteil in %	80,49	81,95	83,92	84,54	85,03	85,38							
		CI Anteil in %	[79,29; 81,69]	[80,68; 83,22]	[82,62; 85,23]	[83,17; 85,91]	[83,59; 86,46]	[83,88; 86,89]							
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	304	180	121	95	90	75							
		Anteil in %	7,26	5,10	3,97	3,55	3,78	3,55							
		CI Anteil in %	[6,47; 8,05]	[4,37; 5,83]	[3,28; 4,66]	[2,85; 4,25]	[3,01; 4,54]	[2,76; 4,34]							
	auswertbar	Anzahl	4191	3529	3048	2679	2384	2114							
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	126	104	83	67	49	41							
		Anteil in %	3,01	2,95	2,72	2,50	2,06	1,94							
		CI Anteil in %	[2,49; 3,52]	[2,39; 3,51]	[2,15; 3,30]	[1,91; 3,09]	[1,49; 2,63]	[1,35; 2,53]							
	auswertbar	Anzahl	4191	3529	3048	2679	2384	2114							
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	623	494	482	382	356	278							
		Anteil in %	14,87	14,00	15,81	14,26	14,93	13,15							
		CI Anteil in %	[13,79; 15,94]	[12,85; 15,14]	[14,52; 17,11]	[12,93; 15,58]	[13,50; 16,36]	[11,71; 14,59]							

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731									
	auswertbar	Anzahl	6676	5495	4636	4026	3474									
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	175	203	188	173	155									
		Anteil in %	2,62	3,69	4,06	4,30	4,46									
		CI Anteil in %	[2,24; 3,00]	[3,20; 4,19]	[3,49; 4,62]	[3,67; 4,92]	[3,78; 5,15]									
	auswertbar	Anzahl	6675	5495	4634	4026	3473									
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3958	3090	2496	2087	1746									
		Anteil in %	59,30	56,23	53,86	51,84	50,27									
		CI Anteil in %	[58,12; 60,47]	[54,92; 57,54]	[52,43; 55,30]	[50,29; 53,38]	[48,61; 51,94]									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1945	1767	1584	1425	1298									
		Anteil in %	29,14	32,16	34,18	35,39	37,37									
		CI Anteil in %	[28,05; 30,23]	[30,92; 33,39]	[32,82; 35,55]	[33,92; 36,87]	[35,76; 38,98]									
	auswertbar	Anzahl	6677	5496	4636	4026	3474									
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	2	1	4	1	2									
		Anteil in %	0,03	0,02	0,09	0,02	0,06									
		CI Anteil in %	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,14]									
	auswertbar	Anzahl	6669	5493	4630	4023	3469									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1915	1546	1283	1121	958									
		Anteil in %	28,71	28,14	27,71	27,86	27,62									
		CI Anteil in %	[27,63; 29,80]	[26,96; 29,33]	[26,42; 29,00]	[26,48; 29,25]	[26,13; 29,10]									
	auswertbar	Anzahl	6667	5492	4628	4023	3469									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	193	150	121	103	76									
		Anteil in %	2,89	2,73	2,61	2,56	2,19									
		CI Anteil in %	[2,49; 3,30]	[2,30; 3,16]	[2,15; 3,07]	[2,07; 3,05]	[1,70; 2,68]									
	auswertbar	Anzahl	6674	5495	4635	4025	3473									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	5226	4430	3755	3244	2799									
		Anteil in %	78,30	80,62	81,01	80,60	80,59									
		CI Anteil in %	[77,31; 79,29]	[79,57; 81,66]	[79,88; 82,14]	[79,37; 81,82]	[79,28; 81,91]									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	448	244	192	181	147									
		Anteil in %	6,71	4,44	4,14	4,50	4,23									
	CI Anteil in %	[6,11; 7,31]	[3,90; 4,99]	[3,57; 4,72]	[3,86; 5,14]	[3,56; 4,90]										
auswertbar	Anzahl	6677	5496	4636	4026	3474										
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	201	155	106	85	65										
	Anteil in %	3,01	2,82	2,29	2,11	1,87										
	CI Anteil in %	[2,60; 3,42]	[2,38; 3,26]	[1,86; 2,72]	[1,67; 2,56]	[1,42; 2,32]										
auswertbar	Anzahl	6677	5496	4636	4026	3474										
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	901	766	620	567	463										
	Anteil in %	13,49	13,94	13,37	14,08	13,33										
	CI Anteil in %	[12,67; 14,31]	[13,02; 14,85]	[12,39; 14,35]	[13,01; 15,16]	[12,20; 14,46]										

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591								
	auswertbar	Anzahl	4244	3610	3119	2750	2432								
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	77	109	101	101	98								
		Anteil in %	1,81	3,02	3,24	3,67	4,03								
		CI Anteil in %	[1,41; 2,22]	[2,46; 3,58]	[2,62; 3,86]	[2,97; 4,38]	[3,25; 4,81]								
	auswertbar	Anzahl	4243	3610	3117	2750	2431								
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2590	2085	1712	1467	1247								
		Anteil in %	61,04	57,76	54,92	53,35	51,30								
		CI Anteil in %	[59,57; 62,51]	[56,14; 59,37]	[53,18; 56,67]	[51,48; 55,21]	[49,31; 53,28]								
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1172	1112	1051	949	904								
		Anteil in %	27,62	30,80	33,72	34,51	37,19								
		CI Anteil in %	[26,28; 28,97]	[29,30; 32,31]	[32,06; 35,38]	[32,73; 36,29]	[35,26; 39,11]								
	auswertbar	Anzahl	4244	3611	3119	2750	2432								
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	1	1	3	0	1								
		Anteil in %	0,02	0,03	0,10	0,00	0,04								
		CI Anteil in %	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,12]								
	auswertbar	Anzahl	4238	3609	3114	2748	2428								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1017	865	748	682	593								
		Anteil in %	24,00	23,97	24,02	24,82	24,42								
		CI Anteil in %	[22,71; 25,28]	[22,57; 25,36]	[22,52; 25,52]	[23,20; 26,43]	[22,71; 26,13]								
	auswertbar	Anzahl	4237	3608	3112	2748	2428								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	85	64	57	50	32								
		Anteil in %	2,01	1,77	1,83	1,82	1,32								
		CI Anteil in %	[1,58; 2,43]	[1,34; 2,20]	[1,36; 2,30]	[1,32; 2,32]	[0,86; 1,77]								
	auswertbar	Anzahl	4242	3610	3118	2749	2431								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3458	3032	2640	2307	2037								
		Anteil in %	81,52	83,99	84,67	83,92	83,79								
		CI Anteil in %	[80,35; 82,69]	[82,79; 85,19]	[83,40; 85,93]	[82,55; 85,29]	[82,33; 85,26]								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	294	142	119	110	96								
		Anteil in %	6,93	3,93	3,82	4,00	3,95								
		CI Anteil in %	[6,17; 7,70]	[3,30; 4,57]	[3,14; 4,49]	[3,27; 4,73]	[3,17; 4,72]								
	auswertbar	Anzahl	4244	3611	3119	2750	2432								
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	135	103	68	48	44								
		Anteil in %	3,18	2,85	2,18	1,75	1,81								
		CI Anteil in %	[2,65; 3,71]	[2,31; 3,40]	[1,67; 2,69]	[1,26; 2,24]	[1,28; 2,34]								
	auswertbar	Anzahl	4244	3611	3119	2750	2432								
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	646	559	464	423	333								
		Anteil in %	15,22	15,48	14,88	15,38	13,69								
		CI Anteil in %	[14,14; 16,30]	[14,30; 16,66]	[13,63; 16,13]	[14,03; 16,73]	[12,33; 15,06]								

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847										
	auswertbar	Anzahl	6222	5076	4214	3564										
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	193	194	194	169										
		Anteil in %	3,10	3,82	4,60	4,74										
		CI Anteil in %	[2,67; 3,53]	[3,29; 4,35]	[3,97; 5,24]	[4,04; 5,44]										
	auswertbar	Anzahl	6219	5076	4213	3564										
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3714	2761	2247	1811										
		Anteil in %	59,72	54,39	53,33	50,81										
		CI Anteil in %	[58,50; 60,94]	[53,02; 55,76]	[51,83; 54,84]	[49,17; 52,46]										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1801	1691	1457	1323										
		Anteil in %	28,96	33,31	34,58	37,12										
		CI Anteil in %	[27,83; 30,09]	[32,02; 34,61]	[33,15; 36,02]	[35,53; 38,71]										
	auswertbar	Anzahl	6222	5076	4214	3564										
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	5	8	16	25										
		Anteil in %	0,08	0,16	0,38	0,70										
		CI Anteil in %	[0,01; 0,15]	[0,05; 0,27]	[0,19; 0,57]	[0,43; 0,98]										
	auswertbar	Anzahl	6216	5074	4212	3563										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1773	1344	1117	934										
		Anteil in %	28,52	26,49	26,52	26,21										
		CI Anteil in %	[27,40; 29,65]	[25,27; 27,70]	[25,19; 27,85]	[24,77; 27,66]										
	auswertbar	Anzahl	6215	5074	4211	3563										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	154	119	94	72										
		Anteil in %	2,48	2,35	2,23	2,02										
		CI Anteil in %	[2,09; 2,86]	[1,93; 2,76]	[1,79; 2,68]	[1,56; 2,48]										
	auswertbar	Anzahl	6220	5075	4213	3562										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	4945	4102	3425	2892										
		Anteil in %	79,50	80,83	81,30	81,19										
		CI Anteil in %	[78,50; 80,50]	[79,74; 81,91]	[80,12; 82,47]	[79,91; 82,47]										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	374	220	148	120										
		Anteil in %	6,01	4,33	3,51	3,37										
	CI Anteil in %	[5,42; 6,60]	[3,77; 4,90]	[2,96; 4,07]	[2,78; 3,96]											
auswertbar	Anzahl	6222	5076	4214	3564											
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	189	138	107	81											
	Anteil in %	3,04	2,72	2,54	2,27											
	CI Anteil in %	[2,61; 3,46]	[2,27; 3,17]	[2,06; 3,01]	[1,78; 2,76]											
auswertbar	Anzahl	6222	5076	4214	3564											
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	812	632	562	457											
	Anteil in %	13,05	12,45	13,34	12,82											
	CI Anteil in %	[12,21; 13,89]	[11,54; 13,36]	[12,31; 14,36]	[11,72; 13,92]											

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581									
	auswertbar	Anzahl	3862	3260	2800	2427									
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	72	96	109	104									
		Anteil in %	1,86	2,94	3,89	4,29									
		CI Anteil in %	[1,44; 2,29]	[2,36; 3,53]	[3,18; 4,61]	[3,48; 5,09]									
	auswertbar	Anzahl	3861	3260	2799	2427									
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2415	1830	1534	1275									
		Anteil in %	62,55	56,13	54,81	52,53									
		CI Anteil in %	[61,02; 64,08]	[54,43; 57,84]	[52,96; 56,65]	[50,55; 54,52]									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1005	1022	923	868									
		Anteil in %	26,03	31,35	32,98	35,76									
		CI Anteil in %	[24,65; 27,41]	[29,76; 32,94]	[31,23; 34,72]	[33,86; 37,67]									
	auswertbar	Anzahl	3862	3260	2800	2427									
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	2	2	6	11									
		Anteil in %	0,05	0,06	0,21	0,45									
		CI Anteil in %	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,15]	[0,04; 0,39]	[0,19; 0,72]									
	auswertbar	Anzahl	3860	3259	2800	2427									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	978	766	672	584									
		Anteil in %	25,34	23,50	24,00	24,06									
		CI Anteil in %	[23,96; 26,71]	[22,05; 24,96]	[22,42; 25,58]	[22,36; 25,76]									
	auswertbar	Anzahl	3859	3259	2799	2427									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	74	52	41	30									
		Anteil in %	1,92	1,60	1,46	1,24									
		CI Anteil in %	[1,48; 2,35]	[1,17; 2,03]	[1,02; 1,91]	[0,80; 1,68]									
	auswertbar	Anzahl	3861	3260	2800	2426									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3173	2719	2339	2025									
		Anteil in %	82,18	83,40	83,54	83,47									
		CI Anteil in %	[80,97; 83,39]	[82,13; 84,68]	[82,16; 84,91]	[81,99; 84,95]									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	235	131	90	69									
		Anteil in %	6,09	4,02	3,21	2,84									
		CI Anteil in %	[5,33; 6,84]	[3,34; 4,69]	[2,56; 3,87]	[2,18; 3,51]									
	auswertbar	Anzahl	3862	3260	2800	2427									
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	127	87	67	53									
		Anteil in %	3,29	2,67	2,39	2,18									
		CI Anteil in %	[2,73; 3,85]	[2,12; 3,22]	[1,83; 2,96]	[1,60; 2,77]									
	auswertbar	Anzahl	3862	3260	2800	2427									
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	565	455	405	330									
		Anteil in %	14,63	13,96	14,46	13,60									
		CI Anteil in %	[13,51; 15,74]	[12,77; 15,15]	[13,16; 15,77]	[12,23; 14,96]									

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553											
	auswertbar	Anzahl	6269	5147	4245											
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	198	195	171											
		Anteil in %	3,16	3,79	4,03											
		CI Anteil in %	[2,73; 3,59]	[3,27; 4,31]	[3,44; 4,62]											
	auswertbar	Anzahl	6268	5147	4244											
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3714	2895	2302											
		Anteil in %	59,25	56,25	54,24											
		CI Anteil in %	[58,04; 60,47]	[54,89; 57,60]	[52,74; 55,74]											
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1871	1688	1482											
		Anteil in %	29,85	32,80	34,92											
		CI Anteil in %	[28,72; 30,98]	[31,51; 34,08]	[33,49; 36,35]											
	auswertbar	Anzahl	6269	5147	4245											
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	13	11	17											
		Anteil in %	0,21	0,21	0,40											
		CI Anteil in %	[0,09; 0,32]	[0,09; 0,34]	[0,21; 0,59]											
	auswertbar	Anzahl	6263	5143	4242											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1876	1502	1235											
		Anteil in %	29,95	29,20	29,11											
		CI Anteil in %	[28,82; 31,09]	[27,96; 30,45]	[27,75; 30,48]											
	auswertbar	Anzahl	6262	5143	4241											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	198	151	130											
		Anteil in %	3,16	2,94	3,07											
		CI Anteil in %	[2,73; 3,60]	[2,47; 3,40]	[2,55; 3,58]											
	auswertbar	Anzahl	6267	5145	4242											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	4958	4188	3440											
		Anteil in %	79,11	81,40	81,09											
		CI Anteil in %	[78,11; 80,12]	[80,34; 82,46]	[79,92; 82,27]											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	390	238	181											
		Anteil in %	6,22	4,63	4,27											
	CI Anteil in %	[5,62; 6,82]	[4,05; 5,20]	[3,66; 4,88]												
auswertbar	Anzahl	6269	5147	4245												
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	189	145	122												
	Anteil in %	3,01	2,82	2,87												
	CI Anteil in %	[2,59; 3,44]	[2,37; 3,27]	[2,37; 3,38]												
auswertbar	Anzahl	6269	5147	4245												
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	773	670	515												
	Anteil in %	12,33	13,02	12,13												
	CI Anteil in %	[11,52; 13,14]	[12,10; 13,94]	[11,15; 13,11]												

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022										
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2877										
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	87	88	87										
		Anteil in %	2,20	2,61	3,02										
		CI Anteil in %	[1,74; 2,66]	[2,08; 3,15]	[2,40; 3,65]										
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2876										
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2426	1937	1578										
		Anteil in %	61,31	57,55	54,87										
		CI Anteil in %	[59,79; 62,83]	[55,88; 59,22]	[53,05; 56,69]										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1106	1056	986										
		Anteil in %	27,95	31,37	34,28										
		CI Anteil in %	[26,55; 29,35]	[29,80; 32,94]	[32,55; 36,02]										
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2877										
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	1	1	3										
		Anteil in %	0,03	0,03	0,10										
		CI Anteil in %	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,22]										
	auswertbar	Anzahl	3954	3364	2875										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1072	891	768										
		Anteil in %	27,11	26,49	26,71										
		CI Anteil in %	[25,73; 28,50]	[24,99; 27,98]	[25,10; 28,33]										
	auswertbar	Anzahl	3954	3364	2874										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	95	75	74										
		Anteil in %	2,40	2,23	2,57										
		CI Anteil in %	[1,93; 2,88]	[1,73; 2,73]	[2,00; 3,15]										
	auswertbar	Anzahl	3955	3364	2874										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3330	2917	2478										
		Anteil in %	84,20	86,71	86,22										
		CI Anteil in %	[83,06; 85,33]	[85,56; 87,86]	[84,96; 87,48]										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	215	126	94										
		Anteil in %	5,44	3,75	3,27										
		CI Anteil in %	[4,73; 6,14]	[3,10; 4,39]	[2,62; 3,92]										
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2877										
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	121	94	77										
		Anteil in %	3,06	2,79	2,68										
		CI Anteil in %	[2,52; 3,59]	[2,24; 3,35]	[2,09; 3,27]										
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2877										
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	554	469	363										
		Anteil in %	14,00	13,93	12,62										
		CI Anteil in %	[12,92; 15,08]	[12,76; 15,10]	[11,40; 13,83]										

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721												
	auswertbar	Anzahl	6683	5430												
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	220	213												
		Anteil in %	3,29	3,92												
		CI Anteil in %	[2,86; 3,72]	[3,41; 4,44]												
	auswertbar	Anzahl	6679	5430												
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3869	2879												
		Anteil in %	57,93	53,02												
		CI Anteil in %	[56,74; 59,11]	[51,69; 54,35]												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2060	1896												
		Anteil in %	30,84	34,92												
		CI Anteil in %	[29,74; 31,95]	[33,65; 36,19]												
	auswertbar	Anzahl	6684	5430												
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	8	6												
		Anteil in %	0,12	0,11												
		CI Anteil in %	[0,04; 0,20]	[0,02; 0,20]												
	auswertbar	Anzahl	6674	5426												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1836	1479												
		Anteil in %	27,51	27,26												
		CI Anteil in %	[26,44; 28,58]	[26,07; 28,44]												
	auswertbar	Anzahl	6671	5426												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	181	138												
		Anteil in %	2,71	2,54												
		CI Anteil in %	[2,32; 3,10]	[2,12; 2,96]												
	auswertbar	Anzahl	6680	5428												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	5361	4456												
		Anteil in %	80,25	82,09												
		CI Anteil in %	[79,30; 81,21]	[81,07; 83,11]												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	390	244												
		Anteil in %	5,84	4,50												
	CI Anteil in %	[5,28; 6,40]	[3,94; 5,05]													
auswertbar	Anzahl	6684	5430													
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	158	115													
	Anteil in %	2,36	2,12													
	CI Anteil in %	[2,00; 2,73]	[1,73; 2,50]													
auswertbar	Anzahl	6684	5430													
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	896	651													
	Anteil in %	13,41	11,99													
	CI Anteil in %	[12,59; 14,22]	[11,12; 12,85]													

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782											
	auswertbar	Anzahl	4313	3629											
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	104	116											
		Anteil in %	2,41	3,20											
		CI Anteil in %	[1,95; 2,87]	[2,62; 3,77]											
	auswertbar	Anzahl	4312	3629											
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2629	1991											
		Anteil in %	60,97	54,86											
		CI Anteil in %	[59,51; 62,43]	[53,24; 56,48]											
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1215	1220											
		Anteil in %	28,18	33,62											
		CI Anteil in %	[26,83; 29,52]	[32,08; 35,16]											
	auswertbar	Anzahl	4314	3629											
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	2	0											
		Anteil in %	0,05	0,00											
		CI Anteil in %	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]											
	auswertbar	Anzahl	4307	3625											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1089	913											
		Anteil in %	25,28	25,19											
		CI Anteil in %	[23,99; 26,58]	[23,77; 26,60]											
	auswertbar	Anzahl	4305	3625											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	99	74											
		Anteil in %	2,30	2,04											
		CI Anteil in %	[1,85; 2,75]	[1,58; 2,50]											
	auswertbar	Anzahl	4310	3627											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3576	3096											
		Anteil in %	82,97	85,36											
		CI Anteil in %	[81,85; 84,09]	[84,21; 86,51]											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	250	144											
		Anteil in %	5,80	3,97											
		CI Anteil in %	[5,10; 6,50]	[3,33; 4,61]											
	auswertbar	Anzahl	4314	3629											
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	109	74											
		Anteil in %	2,53	2,04											
		CI Anteil in %	[2,06; 3,00]	[1,58; 2,50]											
	auswertbar	Anzahl	4314	3629											
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	645	482											
		Anteil in %	14,95	13,28											
		CI Anteil in %	[13,89; 16,02]	[12,18; 14,39]											

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942													
	auswertbar	Anzahl	5942													
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	196													
		Anteil in %	3,30													
		CI Anteil in %	[2,84; 3,75]													
	auswertbar	Anzahl	5940													
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	3416													
		Anteil in %	57,51													
		CI Anteil in %	[56,25; 58,77]													
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1831													
		Anteil in %	30,82													
		CI Anteil in %	[29,65; 32,00]													
	auswertbar	Anzahl	5942													
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	4													
		Anteil in %	0,07													
		CI Anteil in %	[0,00; 0,13]													
	auswertbar	Anzahl	5937													
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1854													
		Anteil in %	31,23													
		CI Anteil in %	[30,05; 32,41]													
	auswertbar	Anzahl	5935													
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	195													
		Anteil in %	3,29													
		CI Anteil in %	[2,83; 3,74]													
	auswertbar	Anzahl	5941													
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	4820													
		Anteil in %	81,13													
CI Anteil in %		[80,14; 82,13]														
mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	288														
	Anteil in %	4,85														
	CI Anteil in %	[4,30; 5,39]														
auswertbar	Anzahl	5942														
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	124														
	Anteil in %	2,09														
	CI Anteil in %	[1,72; 2,45]														
auswertbar	Anzahl	5942														
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	694														
	Anteil in %	11,68														
	CI Anteil in %	[10,86; 12,50]														

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3748												
	auswertbar	Anzahl	3748												
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	87												
		Anteil in %	2,32												
		CI Anteil in %	[1,84; 2,80]												
	auswertbar	Anzahl	3746												
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	2242												
		Anteil in %	59,85												
		CI Anteil in %	[58,28; 61,42]												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1073												
		Anteil in %	28,64												
		CI Anteil in %	[27,20; 30,09]												
	auswertbar	Anzahl	3748												
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	3												
		Anteil in %	0,08												
		CI Anteil in %	[0,00; 0,17]												
	auswertbar	Anzahl	3744												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1033												
		Anteil in %	27,59												
		CI Anteil in %	[26,16; 29,02]												
	auswertbar	Anzahl	3742												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	99												
		Anteil in %	2,65												
		CI Anteil in %	[2,13; 3,16]												
	auswertbar	Anzahl	3748												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	3196												
		Anteil in %	85,27												
		CI Anteil in %	[84,14; 86,41]												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	166												
		Anteil in %	4,43												
		CI Anteil in %	[3,77; 5,09]												
	auswertbar	Anzahl	3748												
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	71												
		Anteil in %	1,89												
		CI Anteil in %	[1,46; 2,33]												
	auswertbar	Anzahl	3748												
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	492												
		Anteil in %	13,13												
		CI Anteil in %	[12,05; 14,21]												

In Tabelle 3.4.2 sind die **Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik ausgewiesen, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden**. Für jede Kohorte wird dazu zunächst die Gruppe der „Patienten <18 bzw. <12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik“ angegeben. Anschließend wird ausgewiesen, wie viele der „auswertbaren“ Patienten eine Dauermedikation mit inhalativen Glukokortikosteroiden erhielten und und welchem Anteil an den „auswertbaren“ Patienten dies entspricht.

Zu beachten ist, dass es durch die im Zuge der Umstellung auf eDMP zum 01.07.2008 eingeführten neuen Satzartbeschreibungen zu einer veränderten Dokumentation der Medikation mit inhalativen Glukokortikosteroiden kommt. Ab der Umstellung auf eDMP ist es dem Arzt auch möglich eine Kontraindikation des Patienten zu dokumentieren.⁵

⁵ Dies hat zur Folge, dass die Ergebnisse in den Berichtshalbjahren bis 2008-1 nur bedingt mit den Ergebnissen in den Berichtshalbjahren ab 2008-2 vergleichbar sind.

Tabelle 3.4.2 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-1	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	141	67	57	43	35	36	33	39	30	22	21	21	13	
	auswertbar	Anzahl	141	67	57	43	35	36	33	39	30	22	21	21	13	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	37	19	16	8	9	11	12	10	6	7	6	5	5	2
		Anteil in %	26,24	28,36	28,07	18,60	25,71	30,56	36,36	25,64	20,00	31,82	28,57	23,81	22,73	15,38
		CI Anteil in %	[18,95; 33,53]	[17,48; 39,23]	[16,30; 39,84]	[6,84; 30,37]	[11,02; 40,41]	[15,29; 45,82]	[19,70; 53,03]	[11,76; 39,52]	[5,44; 34,56]	[11,90; 51,74]	[8,77; 48,37]	[5,14; 42,48]	[4,80; 40,65]	[0,00; 35,80]
	Patienten <18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	84	40	33	30	21	20	16	24	15	7	12	14	12	6
	auswertbar	Anzahl	84	40	33	30	21	20	16	24	15	7	12	14	12	6
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	21	12	8	5	4	4	4	7	4	3	3	3	1	1
		Anteil in %	25,00	30,00	24,24	16,67	19,05	20,00	25,00	29,17	26,67	42,86	25,00	21,43	8,33	16,67
	CI Anteil in %	[15,68; 34,32]	[15,62; 44,38]	[9,39; 39,09]	[3,10; 30,23]	[1,84; 36,26]	[2,01; 37,99]	[3,09; 46,91]	[10,59; 47,74]	[3,50; 49,83]	[3,26; 82,46]	[0,00; 50,59]	[0,00; 43,73]	[0,00; 24,67]	[0,00; 49,33]	
Patienten <12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85	
2006-2	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1060	564	461	365	291	262	248	206	160	156	127	111	100	
	auswertbar	Anzahl	1060	564	461	365	290	262	248	206	160	156	127	111	100	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	248	128	123	86	85	94	79	76	55	57	45	41	39	
		Anteil in %	23,40	22,70	26,68	23,56	29,31	35,88	31,85	36,89	34,38	36,54	35,43	36,94	39,00	
		CI Anteil in %	[20,85; 25,95]	[19,24; 26,15]	[22,64; 30,72]	[19,20; 27,92]	[24,06; 34,56]	[30,06; 41,70]	[26,04; 37,67]	[30,29; 43,50]	[26,99; 41,76]	[28,96; 44,12]	[27,08; 43,78]	[27,92; 45,96]	[29,39; 48,61]	
	Patienten <18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930	
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	670	330	282	214	167	152	162	130	97	94	75	64	65	
	auswertbar	Anzahl	670	330	282	214	166	152	162	130	97	94	75	64	65	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	138	64	64	36	39	47	45	47	28	32	22	19	23	
		Anteil in %	20,60	19,39	22,70	16,82	23,49	30,92	27,78	36,15	28,87	34,04	29,33	29,69	35,38	
	CI Anteil in %	[17,53; 23,66]	[15,12; 23,67]	[17,80; 27,59]	[11,80; 21,85]	[17,02; 29,96]	[23,55; 38,29]	[20,86; 34,70]	[27,86; 44,44]	[19,80; 37,93]	[24,41; 43,67]	[18,96; 39,71]	[18,41; 40,97]	[23,67; 47,10]		
Patienten <12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770		
2007-1	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2038	936	731	594	535	469	405	317	294	216	208	160		
	auswertbar	Anzahl	2038	936	731	594	535	469	405	317	294	216	208	160		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	504	206	182	159	138	134	121	96	91	77	69	57		
		Anteil in %	24,73	22,01	24,90	26,77	25,79	28,57	29,88	30,28	30,95	35,65	33,17	35,63		
		CI Anteil in %	[22,86; 26,60]	[19,35; 24,66]	[21,76; 28,03]	[23,20; 30,33]	[22,08; 29,51]	[24,48; 32,66]	[25,41; 34,34]	[25,22; 35,35]	[25,66; 36,25]	[29,25; 42,05]	[26,76; 39,59]	[28,18; 43,07]		
	Patienten <18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818		
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1264	559	417	363	306	276	251	193	190	138	137	107		
	auswertbar	Anzahl	1264	559	417	363	306	276	251	193	190	138	137	107		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	283	113	99	85	69	70	63	49	53	44	41	34		
		Anteil in %	22,39	20,21	23,74	23,42	22,55	25,36	25,10	25,39	27,89	31,88	29,93	31,78		
	CI Anteil in %	[20,09; 24,69]	[16,88; 23,55]	[19,65; 27,83]	[19,05; 27,78]	[17,86; 27,24]	[20,22; 30,50]	[19,72; 30,47]	[19,23; 31,55]	[21,50; 34,29]	[24,08; 39,69]	[22,23; 37,62]	[22,91; 40,64]			
Patienten <12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467			

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3043	1467	1152	992	829	706	581	524	440	375	326		
	auswertbar	Anzahl	3043	1467	1152	992	829	706	581	524	440	375	325		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	733	381	320	283	222	191	149	153	153	115	100		
		Anteil in %	24,09	25,97	27,78	28,53	26,78	27,05	25,65	29,20	34,77	30,67	30,77		
		CI Anteil in %	[22,57; 25,61]	[23,73; 28,22]	[25,19; 30,37]	[25,72; 31,34]	[23,76; 29,80]	[23,77; 30,33]	[22,09; 29,20]	[25,30; 33,10]	[30,32; 39,23]	[25,99; 35,34]	[25,74; 35,79]		
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9767</i>	<i>8774</i>	<i>7872</i>	<i>7052</i>	<i>6208</i>	<i>5507</i>	<i>4926</i>	<i>4402</i>	<i>3940</i>	<i>3511</i>	<i>3138</i>		
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1911	850	721	603	497	460	379	339	294	263	241		
	auswertbar	Anzahl	1911	850	721	603	497	460	379	339	294	263	241		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	416	189	176	142	117	110	77	86	100	73	71		
		Anteil in %	21,77	22,24	24,41	23,55	23,54	23,91	20,32	25,37	34,01	27,76	29,46		
		CI Anteil in %	[19,92; 23,62]	[19,44; 25,03]	[21,27; 27,55]	[20,16; 26,94]	[19,81; 27,27]	[20,01; 27,82]	[16,26; 24,37]	[20,73; 30,01]	[28,59; 39,44]	[22,33; 33,18]	[23,69; 35,23]		
	<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6509</i>	<i>5922</i>	<i>5354</i>	<i>4851</i>	<i>4354</i>	<i>3972</i>	<i>3634</i>	<i>3340</i>	<i>3039</i>	<i>2754</i>	<i>2497</i>		
2008-1	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3385	1521	1265	938	779	681	594	456	410	348			
	auswertbar	Anzahl	3385	1521	1265	938	779	681	594	456	410	348			
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	958	457	402	284	260	215	192	163	159	126			
		Anteil in %	28,30	30,05	31,78	30,28	33,38	31,57	32,32	35,75	38,78	36,21			
		CI Anteil in %	[26,78; 29,82]	[27,74; 32,35]	[29,21; 34,35]	[27,34; 33,22]	[30,06; 36,69]	[28,08; 35,06]	[28,56; 36,09]	[31,34; 40,15]	[34,06; 43,50]	[31,15; 41,26]			
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10439</i>	<i>9409</i>	<i>8389</i>	<i>7143</i>	<i>6209</i>	<i>5485</i>	<i>4857</i>	<i>4297</i>	<i>3789</i>	<i>3373</i>			
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1926	855	697	553	459	412	371	288	267	226			
	auswertbar	Anzahl	1926	855	697	553	459	412	371	288	267	226			
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	533	237	208	157	141	121	105	98	103	83			
		Anteil in %	27,67	27,72	29,84	28,39	30,72	29,37	28,30	34,03	38,58	36,73			
		CI Anteil in %	[25,68; 29,67]	[24,72; 30,72]	[26,44; 33,24]	[24,63; 32,15]	[26,49; 34,94]	[24,97; 33,77]	[23,71; 32,89]	[28,55; 39,51]	[32,73; 44,43]	[30,43; 43,02]			
	<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6454</i>	<i>5917</i>	<i>5367</i>	<i>4672</i>	<i>4183</i>	<i>3785</i>	<i>3434</i>	<i>3107</i>	<i>2797</i>	<i>2538</i>			
2008-2	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2890	1505	1121	907	727	617	528	442	407				
	auswertbar	Anzahl	2889	1505	1121	907	727	617	528	442	407				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	869	484	360	295	222	190	181	140	135				
		Anteil in %	30,08	32,16	32,11	32,52	30,54	30,79	34,28	31,67	33,17				
		CI Anteil in %	[28,41; 31,75]	[29,80; 34,52]	[29,38; 34,85]	[29,47; 35,58]	[27,19; 33,89]	[27,15; 34,44]	[30,23; 38,33]	[27,33; 36,02]	[28,59; 37,75]				
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9103</i>	<i>8144</i>	<i>6996</i>	<i>6095</i>	<i>5399</i>	<i>4755</i>	<i>4253</i>	<i>3752</i>	<i>3370</i>				
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1666	846	601	502	411	339	293	257	224				
	auswertbar	Anzahl	1666	846	601	502	411	339	293	257	224				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	450	242	186	160	125	94	93	74	75				
		Anteil in %	27,01	28,61	30,95	31,87	30,41	27,73	31,74	28,79	33,48				
		CI Anteil in %	[24,88; 29,14]	[25,56; 31,65]	[27,25; 34,65]	[27,79; 35,95]	[25,96; 34,87]	[22,96; 32,50]	[26,40; 37,08]	[23,25; 34,34]	[27,29; 39,68]				
	<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5565</i>	<i>5067</i>	<i>4445</i>	<i>3962</i>	<i>3579</i>	<i>3213</i>	<i>2924</i>	<i>2632</i>	<i>2397</i>				

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2467	1077	873	637	540	435	376	300					
	auswertbar	Anzahl	2465	1077	872	637	540	435	376	300					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	763	330	296	219	187	156	140	114					
		Anteil in %	30,95	30,64	33,94	34,38	34,63	35,86	37,23	38,00					
		CI Anteil in %	[29,13; 32,78]	[27,89; 33,40]	[30,80; 37,09]	[30,69; 38,07]	[30,61; 38,65]	[31,35; 40,37]	[32,34; 42,13]	[32,50; 43,50]					
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7227</i>	<i>6220</i>	<i>5334</i>	<i>4656</i>	<i>4033</i>	<i>3568</i>	<i>3198</i>	<i>2822</i>					
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1442	595	504	366	298	263	214	166					
	auswertbar	Anzahl	1442	595	504	366	298	263	214	166					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	444	174	156	110	88	82	71	55					
		Anteil in %	30,79	29,24	30,95	30,05	29,53	31,18	33,18	33,13					
	CI Anteil in %	[28,41; 33,17]	[25,59; 32,90]	[26,91; 34,99]	[25,35; 34,76]	[24,34; 34,72]	[25,57; 36,79]	[26,85; 39,50]	[25,95; 40,31]						
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4439</i>	<i>3924</i>	<i>3428</i>	<i>3040</i>	<i>2683</i>	<i>2428</i>	<i>2230</i>	<i>2016</i>						
2009-2	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2203	1024	734	599	476	420	314						
	auswertbar	Anzahl	2203	1024	733	598	476	420	314						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	600	323	213	165	141	132	90						
		Anteil in %	27,24	31,54	29,06	27,59	29,62	31,43	28,66						
		CI Anteil in %	[25,38; 29,09]	[28,70; 34,39]	[25,77; 32,35]	[24,01; 31,18]	[25,52; 33,73]	[26,98; 35,87]	[23,65; 33,67]						
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6667</i>	<i>5796</i>	<i>4881</i>	<i>4157</i>	<i>3660</i>	<i>3200</i>	<i>2826</i>						
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1252	550	408	337	275	248	182						
	auswertbar	Anzahl	1252	550	407	337	275	248	182						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	308	148	111	76	71	67	50						
		Anteil in %	24,60	26,91	27,27	22,55	25,82	27,02	27,47						
	CI Anteil in %	[22,21; 26,99]	[23,20; 30,62]	[22,94; 31,60]	[18,08; 27,02]	[20,64; 31,00]	[21,48; 32,55]	[20,97; 33,98]							
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4076</i>	<i>3650</i>	<i>3167</i>	<i>2778</i>	<i>2500</i>	<i>2227</i>	<i>2005</i>							
2010-1	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2255	917	734	544	481	377							
	auswertbar	Anzahl	2254	917	733	543	481	377							
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	678	307	260	181	157	130							
		Anteil in %	30,08	33,48	35,47	33,33	32,64	34,48							
		CI Anteil in %	[28,19; 31,97]	[30,42; 36,53]	[32,00; 38,94]	[29,36; 37,30]	[28,45; 36,84]	[29,68; 39,29]							
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6818</i>	<i>5839</i>	<i>4963</i>	<i>4280</i>	<i>3725</i>	<i>3291</i>							
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1343	509	413	312	277	224							
	auswertbar	Anzahl	1342	509	412	311	277	224							
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	386	146	140	99	86	70							
		Anteil in %	28,76	28,68	33,98	31,83	31,05	31,25							
	CI Anteil in %	[26,34; 31,19]	[24,75; 32,62]	[29,40; 38,56]	[26,65; 37,02]	[25,59; 36,51]	[25,17; 37,33]								
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4191</i>	<i>3668</i>	<i>3182</i>	<i>2807</i>	<i>2493</i>	<i>2241</i>								

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-2	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2074	960	694	586	442								
	auswertbar	Anzahl	2073	959	693	586	442								
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	579	278	219	194	149								
		Anteil in %	27,93	28,99	31,60	33,11	33,71								
		CI Anteil in %	[26,00; 29,86]	[26,12; 31,86]	[28,14; 35,07]	[29,29; 36,92]	[29,30; 38,12]								
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6677</i>	<i>5709</i>	<i>4930</i>	<i>4257</i>	<i>3731</i>								
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1257	537	402	351	249								
	auswertbar	Anzahl	1256	536	401	351	249								
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	323	127	112	102	64								
		Anteil in %	25,72	23,69	27,93	29,06	25,70								
	CI Anteil in %	[23,30; 28,13]	[20,09; 27,30]	[23,53; 32,33]	[24,30; 33,82]	[20,26; 31,14]									
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4244</i>	<i>3737</i>	<i>3275</i>	<i>2896</i>	<i>2591</i>									
2011-1	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1928	895	631	485									
	auswertbar	Anzahl	1928	895	631	485									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	545	281	185	170									
		Anteil in %	28,27	31,40	29,32	35,05									
		CI Anteil in %	[26,26; 30,28]	[28,35; 34,44]	[25,76; 32,87]	[30,80; 39,30]									
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6222</i>	<i>5297</i>	<i>4479</i>	<i>3847</i>									
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1134	499	365	277									
	auswertbar	Anzahl	1134	499	365	277									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	284	133	100	79									
		Anteil in %	25,04	26,65	27,40	28,52									
	CI Anteil in %	[22,52; 27,57]	[22,77; 30,54]	[22,82; 31,98]	[23,19; 33,85]										
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3862</i>	<i>3376</i>	<i>2940</i>	<i>2581</i>										
2011-2	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1980	911	642										
	auswertbar	Anzahl	1980	911	641										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	570	302	203										
		Anteil in %	28,79	33,15	31,67										
		CI Anteil in %	[26,79; 30,78]	[30,09; 36,21]	[28,07; 35,27]										
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6269</i>	<i>5394</i>	<i>4553</i>										
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1158	495	367										
	auswertbar	Anzahl	1158	495	366										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	312	151	107										
		Anteil in %	26,94	30,51	29,23										
	CI Anteil in %	[24,39; 29,50]	[26,44; 34,57]	[24,57; 33,90]											
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3957</i>	<i>3484</i>	<i>3022</i>											

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1947	813												
	auswertbar	Anzahl	1945	813												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	580	255												
		Anteil in %	29,82	31,37												
		CI Anteil in %	[27,79; 31,85]	[28,17; 34,56]												
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6684</i>	<i>5721</i>												
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1229	486												
	auswertbar	Anzahl	1229	486												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	329	133												
		Anteil in %	26,77	27,37												
	CI Anteil in %	[24,29; 29,25]	[23,40; 31,33]													
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4314</i>	<i>3782</i>													
2012-2	Patienten < 18 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1788													
	auswertbar	Anzahl	1787													
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	532													
		Anteil in %	29,77													
		CI Anteil in %	[27,65; 31,89]													
	<i>Patienten <18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5942</i>													
	Patienten < 12 mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1024													
	auswertbar	Anzahl	1023													
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	270													
		Anteil in %	26,39													
	CI Anteil in %	[23,69; 29,10]														
<i>Patienten <12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3748</i>														

3.5 Prozessparameter

Nicht-medikamentöse Maßnahmen ergänzen die medikamentöse Asthmatherapie. In diesem Kapitel werden tabellarische Auswertungen zu den folgenden nicht medikamentösen Behandlungsmaßnahmen oder Prozessparametern dargestellt: Patientenschulungen, Asthma-Selbstmanagementplan, die jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik sowie Empfehlung zum Tabakverzicht.

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Asthma sollten Patientenschulungen Bestandteil einer jeden Therapie sein. Eine Patientenschulung sorgt für ein theoretisches Verständnis und schult den praktischen Umgang mit einer asthmatischen Erkrankung. Ziel ist es, den Patienten in die Lage zu versetzen, aktiv an der Bewältigung seiner Erkrankung mitzuwirken. Im Falle von Asthma ist es dafür erforderlich, dass der Patient ein so genanntes Asthma-Selbstmanagement erlernt. Das beinhaltet die Selbstkontrolle der Erkrankung mit dem Peak-Flow-Meter, die Führung eines Asthma-Tagebuchs sowie die selbständige (ärztlich kontrollierte) Anpassung der Medikation an den jeweiligen Schweregrad der Beschwerden.

Rein praktisch hängt die Kontrolle der Asthmabeschwerden davon ab, ob Patienten ihren Inhalator richtig bedienen können und die Bereitstellung der Wirkstoffdosis und das Einatmen richtig koordinieren können. Es sind verschiedene Inhalationssys-

teme im Handel und das Vorgehen bei der Inhalation ist abhängig vom verwendeten Gerätetyp. Daher ist es wichtig, dass die Inhalationstechnik des Patienten regelmäßig durch den Arzt überprüft wird. Da Tabakrauch Asthmabeschwerden verschlimmern kann, gehört eine Empfehlung zum Tabakverzicht durch den Arzt unbedingt zur Asthmatherapie.

In der Tabelle 3.5.1 ist für die jeweiligen Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlenen Asthma-Schulung** teilgenommen haben, aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten oder nicht teilgenommen haben. Für das Beitrittsjahr können mangels einer vorherigen Dokumentation keine Werte ausgewiesen werden. Zunächst wird unter „Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit empfohlener Asthaschulung“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Asthaschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Asthaschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

Tabelle 3.5.1 Patienten <18 bzw. <12 Jahre und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen

* „Auswertbar“ sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2006-1	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	185	137	98	73	49	36	36	31	26	22	21	18	13	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	50	37	31	19	25	18	18	17	15	13	12	5	9	
		Anteil in %	27,03	27,01	31,63	26,03	51,02	50,00	50,00	54,84	57,69	59,09	57,14	27,78	69,23	
		CI Anteil in %	[20,61; 33,44]	[19,55; 34,47]	[22,38; 40,89]	[15,89; 36,16]	[36,88; 65,16]	[33,43; 66,57]	[33,43; 66,57]	[37,03; 72,65]	[38,33; 77,06]	[38,06; 80,12]	[35,45; 78,83]	[6,49; 49,07]	[43,12; 95,34]	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	73	58	35	25	18	15	17	12	9	8	7	5	0	
		Anteil in %	39,46	42,34	35,71	34,25	36,73	41,67	47,22	38,71	34,62	36,36	33,33	27,78	0,00	
		CI Anteil in %	[32,40; 46,52]	[34,03; 50,64]	[26,18; 45,25]	[23,29; 45,21]	[23,10; 50,37]	[25,33; 58,00]	[30,68; 63,76]	[21,28; 56,14]	[15,97; 53,26]	[15,79; 56,94]	[12,67; 53,99]	[6,49; 49,07]	[0,00; 0,00]	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	62	42	32	29	6	3	1	2	2	1	2	8	4	
		Anteil in %	33,51	30,66	32,65	39,73	12,24	8,33	2,78	6,45	7,69	4,55	9,52	44,44	30,77	
		CI Anteil in %	[26,69; 40,33]	[22,91; 38,41]	[23,32; 41,99]	[28,42; 51,03]	[2,97; 21,52]	[0,00; 17,49]	[0,00; 8,22]	[0,00; 15,24]	[0,00; 18,14]	[0,00; 13,45]	[0,00; 22,39]	[20,82; 68,07]	[4,66; 56,88]	
	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	135	101	73	55	37	29	31	26	22	20	20	15	11	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	34	30	25	13	21	14	15	15	13	11	11	4	7	
		Anteil in %	25,19	29,70	34,25	23,64	56,76	48,28	48,39	57,69	59,09	55,00	55,00	26,67	63,64	
		CI Anteil in %	[17,84; 32,53]	[20,75; 38,66]	[23,29; 45,21]	[12,30; 34,97]	[40,57; 72,94]	[29,77; 66,79]	[30,50; 66,27]	[38,33; 77,06]	[38,06; 80,12]	[32,63; 77,37]	[32,63; 77,37]	[3,50; 49,83]	[33,82; 93,45]	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	57	40	27	21	14	12	15	9	7	8	7	5	0	
		Anteil in %	42,22	39,60	36,99	38,18	37,84	41,38	48,39	34,62	31,82	40,00	35,00	33,33	0,00	
		CI Anteil in %	[33,86; 50,59]	[30,02; 49,19]	[25,83; 48,14]	[25,22; 51,14]	[22,00; 53,68]	[23,14; 59,62]	[30,50; 66,27]	[15,97; 53,26]	[11,90; 51,74]	[17,97; 62,03]	[13,55; 56,45]	[8,64; 58,03]	[0,00; 0,00]	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	44	31	21	21	2	3	1	2	2	1	2	6	4	
		Anteil in %	32,59	30,69	28,77	38,18	5,41	10,34	3,23	7,69	9,09	5,00	10,00	40,00	36,36	
CI Anteil in %		[24,66; 40,53]	[21,65; 39,73]	[18,31; 39,22]	[25,22; 51,14]	[0,00; 12,79]	[0,00; 21,63]	[0,00; 9,55]	[0,00; 18,14]	[0,00; 21,39]	[0,00; 14,80]	[0,00; 23,49]	[14,34; 65,66]	[6,55; 66,18]		
Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	85		

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-2	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	1785	1169	857	672	594	472	399	342	281	245	210	176		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	510	355	283	299	271	261	234	205	175	149	130	114		
		Anteil in %	28,57	30,37	33,02	44,49	45,62	55,30	58,65	59,94	62,28	60,82	61,90	64,77		
		CI Anteil in %	[26,48; 30,67]	[27,73; 33,01]	[29,87; 36,17]	[40,73; 48,25]	[41,61; 49,63]	[50,81; 59,79]	[53,81; 63,48]	[54,74; 65,14]	[56,60; 67,95]	[54,69; 66,94]	[55,32; 68,49]	[57,70; 71,85]		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	689	382	263	215	206	140	106	90	83	74	51	40		
		Anteil in %	38,60	32,68	30,69	31,99	34,68	29,66	26,57	26,32	29,54	30,20	24,29	22,73		
		CI Anteil in %	[36,34; 40,86]	[29,99; 35,37]	[27,60; 33,78]	[28,46; 35,52]	[30,85; 38,51]	[25,54; 33,79]	[22,23; 30,91]	[21,64; 30,99]	[24,19; 34,88]	[24,44; 35,97]	[18,47; 30,10]	[16,52; 28,94]		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	586	432	311	158	117	71	59	47	23	22	29	22		
		Anteil in %	32,83	36,95	36,29	23,51	19,70	15,04	14,79	13,74	8,19	8,98	13,81	12,50		
		CI Anteil in %	[30,65; 35,01]	[34,19; 39,72]	[33,07; 39,51]	[20,30; 26,72]	[16,50; 22,90]	[11,81; 18,27]	[11,30; 18,27]	[10,09; 17,40]	[4,97; 11,40]	[5,39; 12,57]	[9,13; 18,49]	[7,60; 17,40]		
	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930	
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	1307	874	635	516	458	378	322	284	236	207	188	153		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	406	290	222	244	226	219	195	177	149	127	119	102		
		Anteil in %	31,06	33,18	34,96	47,29	49,34	57,94	60,56	62,32	63,14	61,35	63,30	66,67		
		CI Anteil in %	[28,55; 33,57]	[30,06; 36,30]	[31,25; 38,67]	[42,97; 51,60]	[44,76; 53,93]	[52,95; 62,92]	[55,21; 65,91]	[56,68; 67,97]	[56,97; 69,30]	[54,70; 68,00]	[56,39; 70,21]	[59,17; 74,16]		
Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	500	275	190	149	144	104	79	70	66	60	42	31			
	Anteil in %	38,26	31,46	29,92	28,88	31,44	27,51	24,53	24,65	27,97	28,99	22,34	20,26			
	CI Anteil in %	[35,62; 40,89]	[28,38; 34,55]	[26,36; 33,49]	[24,96; 32,79]	[27,18; 35,70]	[23,01; 32,02]	[19,83; 29,24]	[19,63; 29,67]	[22,23; 33,70]	[22,79; 35,18]	[16,37; 28,31]	[13,87; 26,65]			
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	401	309	223	123	88	55	48	37	21	20	27	20			
	Anteil in %	30,68	35,35	35,12	23,84	19,21	14,55	14,91	13,03	8,90	9,66	14,36	13,07			
	CI Anteil in %	[28,18; 33,18]	[32,18; 38,53]	[31,40; 38,83]	[20,16; 27,52]	[15,60; 22,83]	[10,99; 18,11]	[11,01; 18,80]	[9,11; 16,95]	[5,26; 12,54]	[5,63; 13,70]	[9,34; 19,39]	[7,71; 18,43]			
Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770		
2007-1	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	3062	2003	1509	1228	1019	894	782	655	597	523	420			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	800	600	567	519	488	455	412	354	307	286	225			
		Anteil in %	26,13	29,96	37,57	42,26	47,89	50,89	52,69	54,05	51,42	54,68	53,57			
		CI Anteil in %	[24,57; 27,68]	[27,95; 31,96]	[35,13; 40,02]	[39,50; 45,03]	[44,82; 50,96]	[47,62; 54,17]	[49,18; 56,19]	[50,23; 57,87]	[47,41; 55,44]	[50,41; 58,95]	[48,80; 58,35]			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1299	780	604	480	345	295	256	216	211	167	141			
		Anteil in %	42,42	38,94	40,03	39,09	33,86	33,00	32,74	32,98	35,34	31,93	33,57			
		CI Anteil in %	[40,67; 44,17]	[36,81; 41,08]	[37,55; 42,50]	[36,36; 41,82]	[30,95; 36,76]	[29,91; 36,08]	[29,45; 36,03]	[29,37; 36,58]	[31,51; 39,18]	[27,93; 35,93]	[29,05; 38,09]			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	963	623	338	229	186	144	114	85	79	70	54			
		Anteil in %	31,45	31,10	22,40	18,65	18,25	16,11	14,58	12,98	13,23	13,38	12,86			
		CI Anteil in %	[29,81; 33,09]	[29,08; 33,13]	[20,29; 24,50]	[16,47; 20,83]	[15,88; 20,63]	[13,70; 18,52]	[12,10; 17,05]	[10,40; 15,55]	[10,51; 15,95]	[10,46; 16,31]	[9,65; 16,06]			
	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818		
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	2129	1402	1079	901	775	680	600	516	480	443	360			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	593	441	420	403	390	354	330	287	255	251	197			
		Anteil in %	27,85	31,46	38,92	44,73	50,32	52,06	55,00	55,62	53,13	56,66	54,72			
		CI Anteil in %	[25,95; 29,76]	[29,02; 33,89]	[36,01; 41,84]	[41,48; 47,98]	[46,80; 53,85]	[48,30; 55,82]	[51,02; 58,98]	[51,33; 59,91]	[48,66; 57,59]	[52,04; 61,28]	[49,57; 59,87]			
Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	923	551	433	344	250	222	190	166	166	139	117				
	Anteil in %	43,35	39,30	40,13	38,18	32,26	32,65	31,67	32,17	34,58	31,38	32,50				
	CI Anteil in %	[41,25; 45,46]	[36,74; 41,86]	[37,20; 43,06]	[35,01; 41,35]	[28,96; 35,55]	[29,12; 36,17]	[27,94; 35,39]	[28,14; 36,21]	[30,32; 38,84]	[27,05; 35,70]	[27,65; 37,35]				
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	613	410	226	154	135	104	80	63	59	53	46				
	Anteil in %	28,79	29,24	20,95	17,09	17,42	15,29	13,33	12,21	12,29	11,96	12,78				
	CI Anteil in %	[26,87; 30,72]	[26,86; 31,63]	[18,52; 23,37]	[14,63; 19,55]	[14,75; 20,09]	[12,59; 18,00]	[10,61; 16,06]	[9,38; 15,04]	[9,35; 15,23]	[8,94; 14,99]	[9,32; 16,23]				
Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467			

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2007-2	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	4413	2772	2237	1888	1571	1355	1150	1000	877	723				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1165	883	780	780	666	626	566	467	421	373				
		Anteil in %	26,40	31,85	34,87	41,31	42,39	46,20	49,22	46,70	48,00	51,59				
		CI Anteil in %	[25,10; 27,70]	[30,12; 33,59]	[32,89; 36,84]	[39,09; 43,54]	[39,95; 44,84]	[43,54; 48,85]	[46,33; 52,11]	[43,61; 49,79]	[44,70; 51,31]	[47,95; 55,24]				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1610	1195	957	742	645	531	451	410	350	280				
		Anteil in %	36,48	43,11	42,78	39,30	41,06	39,19	39,22	41,00	39,91	38,73				
		CI Anteil in %	[35,06; 37,90]	[41,27; 44,95]	[40,73; 44,83]	[37,10; 41,50]	[38,62; 43,49]	[36,59; 41,79]	[36,39; 42,04]	[37,95; 44,05]	[36,67; 43,15]	[35,17; 42,28]				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1638	694	500	366	260	198	133	123	106	70				
		Anteil in %	37,12	25,04	22,35	19,39	16,55	14,61	11,57	12,30	12,09	9,68				
		CI Anteil in %	[35,69; 38,54]	[23,42; 26,65]	[20,62; 24,08]	[17,60; 21,17]	[14,71; 18,39]	[12,73; 16,49]	[9,72; 13,41]	[10,26; 14,34]	[9,93; 14,25]	[7,52; 11,84]				
	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138			
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	3124	2048	1693	1472	1259	1107	959	849	760	640				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	862	671	594	605	542	526	478	411	373	340				
		Anteil in %	27,59	32,76	35,09	41,10	43,05	47,52	49,84	48,41	49,08	53,13				
		CI Anteil in %	[26,03; 29,16]	[30,73; 34,80]	[32,81; 37,36]	[38,59; 43,61]	[40,31; 45,79]	[44,57; 50,46]	[46,68; 53,01]	[45,05; 51,77]	[45,52; 52,64]	[49,26; 56,99]				
Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1211	902	733	594	529	445	385	345	306	244					
	Anteil in %	38,76	44,04	43,30	40,35	42,02	40,20	40,15	40,64	40,26	38,13					
	CI Anteil in %	[37,06; 40,47]	[41,89; 46,19]	[40,93; 45,66]	[37,85; 42,86]	[39,29; 44,75]	[37,31; 43,09]	[37,04; 43,25]	[37,33; 43,94]	[36,77; 43,75]	[34,36; 41,89]					
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1051	475	366	273	188	136	96	93	81	56					
	Anteil in %	33,64	23,19	21,62	18,55	14,93	12,29	10,01	10,95	10,66	8,75					
	CI Anteil in %	[31,99; 35,30]	[21,36; 25,02]	[19,66; 23,58]	[16,56; 20,53]	[12,96; 16,90]	[10,35; 14,22]	[8,11; 11,91]	[8,85; 13,06]	[8,46; 12,85]	[6,56; 10,94]					
Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497				
2008-1	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	4438	3195	2434	1996	1635	1378	1187	1015	824					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1288	1091	991	856	770	672	602	534	456					
		Anteil in %	29,02	34,15	40,71	42,89	47,09	48,77	50,72	52,61	55,34					
		CI Anteil in %	[27,69; 30,36]	[32,50; 35,79]	[38,76; 42,67]	[40,71; 45,06]	[44,67; 49,52]	[46,13; 51,41]	[47,87; 53,56]	[49,54; 55,68]	[51,94; 58,74]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1899	1411	992	792	634	525	439	371	264					
		Anteil in %	42,79	44,16	40,76	39,68	38,78	38,10	36,98	36,55	32,04					
		CI Anteil in %	[41,33; 44,25]	[42,44; 45,88]	[38,80; 42,71]	[37,53; 41,83]	[36,41; 41,14]	[35,53; 40,66]	[34,24; 39,73]	[33,59; 39,52]	[28,85; 35,23]					
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1251	693	451	348	231	181	146	110	104					
		Anteil in %	28,19	21,69	18,53	17,43	14,13	13,13	12,30	10,84	12,62					
		CI Anteil in %	[26,86; 29,51]	[20,26; 23,12]	[16,99; 20,07]	[15,77; 19,10]	[12,44; 15,82]	[11,35; 14,92]	[10,43; 14,17]	[8,92; 12,75]	[10,35; 14,89]					
	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373				
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	3001	2233	1752	1499	1260	1079	960	833	693					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	910	807	759	671	618	537	503	452	397					
		Anteil in %	30,32	36,14	43,32	44,76	49,05	49,77	52,40	54,26	57,29					
		CI Anteil in %	[28,68; 31,97]	[34,15; 38,13]	[41,00; 45,64]	[42,25; 47,28]	[46,29; 51,81]	[46,78; 52,75]	[49,23; 55,56]	[50,88; 57,65]	[53,60; 60,97]					
Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1311	984	692	583	481	413	348	299	217						
	Anteil in %	43,69	44,07	39,50	38,89	38,17	38,28	36,25	35,89	31,31						
	CI Anteil in %	[41,91; 45,46]	[42,01; 46,13]	[37,21; 41,79]	[36,42; 41,36]	[35,49; 40,86]	[35,37; 41,18]	[33,21; 39,29]	[32,63; 39,15]	[27,86; 34,77]						
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	780	442	301	245	161	129	109	82	79						
	Anteil in %	25,99	19,79	17,18	16,34	12,78	11,96	11,35	9,84	11,40						
	CI Anteil in %	[24,42; 27,56]	[18,14; 21,45]	[15,41; 18,95]	[14,47; 18,22]	[10,93; 14,62]	[10,02; 13,89]	[9,35; 13,36]	[7,82; 11,87]	[9,03; 13,77]						
Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538					

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2008-2	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	3498	2556	1970	1662	1376	1196	988	857						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	970	855	738	695	614	543	468	400						
		Anteil in %	27,73	33,45	37,46	41,82	44,62	45,40	47,37	46,67						
		CI Anteil in %	[26,25; 29,21]	[31,62; 35,28]	[35,32; 39,60]	[39,44; 44,19]	[41,99; 47,25]	[42,58; 48,22]	[44,25; 50,48]	[43,33; 50,02]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1735	1151	854	667	503	435	355	296						
		Anteil in %	49,60	45,03	43,35	40,13	36,56	36,37	35,93	34,54						
		CI Anteil in %	[47,94; 51,26]	[43,10; 46,96]	[41,16; 45,54]	[37,78; 42,49]	[34,01; 39,10]	[33,64; 39,10]	[32,94; 38,92]	[31,35; 37,72]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	793	550	378	300	259	218	165	161						
		Anteil in %	22,67	21,52	19,19	18,05	18,82	18,23	16,70	18,79						
		CI Anteil in %	[21,28; 24,06]	[19,92; 23,11]	[17,45; 20,93]	[16,20; 19,90]	[16,76; 20,89]	[16,04; 20,42]	[14,37; 19,03]	[16,17; 21,40]						
	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370					
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	2426	1832	1468	1262	1054	928	776	673						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	714	646	573	550	482	433	371	317						
		Anteil in %	29,43	35,26	39,03	43,58	45,73	46,66	47,81	47,10						
		CI Anteil in %	[27,62; 31,25]	[33,07; 37,45]	[36,54; 41,53]	[40,84; 46,32]	[42,72; 48,74]	[43,45; 49,87]	[44,29; 51,33]	[43,33; 50,88]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1194	816	627	495	383	329	279	235						
		Anteil in %	49,22	44,54	42,71	39,22	36,34	35,45	35,95	34,92						
CI Anteil in %		[47,23; 51,21]	[42,26; 46,82]	[40,18; 45,24]	[36,53; 41,92]	[33,43; 39,24]	[32,37; 38,53]	[32,58; 39,33]	[31,31; 38,52]							
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	518	370	268	217	189	166	126	121							
	Anteil in %	21,35	20,20	18,26	17,19	17,93	17,89	16,24	17,98							
	CI Anteil in %	[19,72; 22,98]	[18,36; 22,04]	[16,28; 20,23]	[15,11; 19,28]	[15,61; 20,25]	[15,42; 20,36]	[13,64; 18,83]	[15,08; 20,88]							
Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397						
2009-1	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	2667	1910	1559	1265	1145	980	817							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	903	729	674	587	571	473	435							
		Anteil in %	33,86	38,17	43,23	46,40	49,87	48,27	53,24							
		CI Anteil in %	[32,06; 35,65]	[35,99; 40,35]	[40,77; 45,69]	[43,65; 49,15]	[46,97; 52,77]	[45,14; 51,40]	[49,82; 56,67]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1254	831	624	448	385	351	271							
		Anteil in %	47,02	43,51	40,03	35,42	33,62	35,82	33,17							
		CI Anteil in %	[45,12; 48,91]	[41,28; 45,73]	[37,59; 42,46]	[32,78; 38,05]	[30,89; 36,36]	[32,81; 38,82]	[29,94; 36,40]							
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	510	350	261	230	189	156	111							
		Anteil in %	19,12	18,32	16,74	18,18	16,51	15,92	13,59							
		CI Anteil in %	[17,63; 20,62]	[16,59; 20,06]	[14,89; 18,60]	[16,06; 20,31]	[14,36; 18,66]	[13,63; 18,21]	[11,24; 15,94]							
	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822						
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	1837	1371	1128	922	850	739	621							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	624	546	508	456	439	373	344							
		Anteil in %	33,97	39,82	45,04	49,46	51,65	50,47	55,39							
		CI Anteil in %	[31,80; 36,13]	[37,23; 42,42]	[42,13; 47,94]	[46,23; 52,69]	[48,29; 55,01]	[46,87; 54,08]	[51,48; 59,31]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	885	600	451	312	276	254	196							
		Anteil in %	48,18	43,76	39,98	33,84	32,47	34,37	31,56							
CI Anteil in %		[45,89; 50,46]	[41,14; 46,39]	[37,12; 42,84]	[30,78; 36,90]	[29,32; 35,62]	[30,94; 37,80]	[27,90; 35,22]								
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	328	225	169	154	135	112	81								
	Anteil in %	17,86	16,41	14,98	16,70	15,88	15,16	13,04								
	CI Anteil in %	[16,10; 19,61]	[14,45; 18,37]	[12,90; 17,07]	[14,29; 19,11]	[13,42; 18,34]	[12,57; 17,74]	[10,39; 15,69]								
Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016							

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2009-2	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	2395	1682	1280	1131	904	783								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	829	637	586	535	455	421								
		Anteil in %	34,61	37,87	45,78	47,30	50,33	53,77								
		CI Anteil in %	[32,71; 36,52]	[35,55; 40,19]	[43,05; 48,51]	[44,39; 50,21]	[47,07; 53,59]	[50,27; 57,26]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1138	779	522	446	328	260								
		Anteil in %	47,52	46,31	40,78	39,43	36,28	33,21								
		CI Anteil in %	[45,52; 49,52]	[43,93; 48,70]	[38,09; 43,47]	[36,58; 42,28]	[33,15; 39,42]	[29,90; 36,51]								
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	428	266	172	150	121	102								
		Anteil in %	17,87	15,81	13,44	13,26	13,38	13,03								
		CI Anteil in %	[16,34; 19,41]	[14,07; 17,56]	[11,57; 15,31]	[11,29; 15,24]	[11,16; 15,61]	[10,67; 15,39]								
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6667</i>	<i>5796</i>	<i>4881</i>	<i>4157</i>	<i>3660</i>	<i>3200</i>	<i>2826</i>							
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	1619	1192	948	858	696	597								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	588	479	449	428	373	344								
		Anteil in %	36,32	40,18	47,36	49,88	53,59	57,62								
		CI Anteil in %	[33,98; 38,66]	[37,40; 42,97]	[44,18; 50,54]	[46,54; 53,23]	[49,88; 57,30]	[53,65; 61,59]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	775	542	382	332	241	190								
		Anteil in %	47,87	45,47	40,30	38,69	34,63	31,83								
		CI Anteil in %	[45,43; 50,30]	[42,64; 48,30]	[37,17; 43,42]	[35,43; 41,96]	[31,09; 38,16]	[28,09; 35,57]								
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	256	171	117	98	82	63									
	Anteil in %	15,81	14,35	12,34	11,42	11,78	10,55									
	CI Anteil in %	[14,03; 17,59]	[12,35; 16,34]	[10,25; 14,44]	[9,29; 13,55]	[9,38; 14,18]	[8,09; 13,02]									
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4076</i>	<i>3650</i>	<i>3167</i>	<i>2778</i>	<i>2500</i>	<i>2227</i>	<i>2005</i>								
2010-1	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	2442	1772	1460	1174	989									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	956	790	682	587	529									
		Anteil in %	39,15	44,58	46,71	50,00	53,49									
		CI Anteil in %	[37,21; 41,08]	[42,27; 46,90]	[44,15; 49,27]	[47,14; 52,86]	[50,38; 56,60]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1132	746	567	447	344									
		Anteil in %	46,36	42,10	38,84	38,07	34,78									
		CI Anteil in %	[44,38; 48,33]	[39,80; 44,40]	[36,33; 41,34]	[35,30; 40,85]	[31,81; 37,75]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	354	236	211	140	116									
		Anteil in %	14,50	13,32	14,45	11,93	11,73									
		CI Anteil in %	[13,10; 15,89]	[11,74; 14,90]	[12,65; 16,26]	[10,07; 13,78]	[9,72; 13,74]									
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6818</i>	<i>5839</i>	<i>4963</i>	<i>4280</i>	<i>3725</i>	<i>3291</i>								
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	1704	1292	1102	894	764									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	685	601	536	469	431									
		Anteil in %	40,20	46,52	48,64	52,46	56,41									
		CI Anteil in %	[37,87; 42,53]	[43,80; 49,24]	[45,69; 51,59]	[49,19; 55,74]	[52,90; 59,93]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	812	533	425	334	259									
		Anteil in %	47,65	41,25	38,57	37,36	33,90									
		CI Anteil in %	[45,28; 50,02]	[38,57; 43,94]	[35,69; 41,44]	[34,19; 40,53]	[30,54; 37,26]									
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	207	158	141	91	74										
	Anteil in %	12,15	12,23	12,79	10,18	9,69										
	CI Anteil in %	[10,60; 13,70]	[10,44; 14,02]	[10,82; 14,77]	[8,20; 12,16]	[7,59; 11,78]										
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4191</i>	<i>3668</i>	<i>3182</i>	<i>2807</i>	<i>2493</i>	<i>2241</i>									

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2010-2	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	2282	1619	1308	1076										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	945	693	620	523										
		Anteil in %	41,41	42,80	47,40	48,61										
		CI Anteil in %	[39,39; 43,43]	[40,39; 45,22]	[44,69; 50,11]	[45,62; 51,59]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1017	685	530	409										
		Anteil in %	44,57	42,31	40,52	38,01										
		CI Anteil in %	[42,53; 46,61]	[39,90; 44,72]	[37,86; 43,18]	[35,11; 40,91]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	320	241	158	144										
		Anteil in %	14,02	14,89	12,08	13,38										
		CI Anteil in %	[12,60; 15,45]	[13,15; 16,62]	[10,31; 13,85]	[11,35; 15,42]										
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6677</i>	<i>5709</i>	<i>4930</i>	<i>4257</i>	<i>3731</i>									
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	1649	1219	997	836										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	704	536	492	419										
		Anteil in %	42,69	43,97	49,35	50,12										
		CI Anteil in %	[40,30; 45,08]	[41,18; 46,76]	[46,24; 52,45]	[46,73; 53,51]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	736	506	393	316										
		Anteil in %	44,63	41,51	39,42	37,80										
CI Anteil in %		[42,23; 47,03]	[38,74; 44,28]	[36,38; 42,45]	[34,51; 41,09]											
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	209	177	112	101											
	Anteil in %	12,67	14,52	11,23	12,08											
	CI Anteil in %	[11,07; 14,28]	[12,54; 16,50]	[9,27; 13,19]	[9,87; 14,29]											
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4244</i>	<i>3737</i>	<i>3275</i>	<i>2896</i>	<i>2591</i>										
2011-1	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	2185	1547	1185											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	831	653	544											
		Anteil in %	38,03	42,21	45,91											
		CI Anteil in %	[36,00; 40,07]	[39,75; 44,67]	[43,07; 48,75]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	999	649	470											
		Anteil in %	45,72	41,95	39,66											
		CI Anteil in %	[43,63; 47,81]	[39,49; 44,41]	[36,88; 42,45]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	355	245	171											
		Anteil in %	16,25	15,84	14,43											
		CI Anteil in %	[14,70; 17,79]	[14,02; 17,66]	[12,43; 16,43]											
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6222</i>	<i>5297</i>	<i>4479</i>	<i>3847</i>										
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	1516	1119	875											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	578	467	413											
		Anteil in %	38,13	41,73	47,20											
		CI Anteil in %	[35,68; 40,57]	[38,84; 44,62]	[43,89; 50,51]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	724	478	350											
		Anteil in %	47,76	42,72	40,00											
CI Anteil in %		[45,24; 50,27]	[39,82; 45,62]	[36,75; 43,25]												
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	214	174	112												
	Anteil in %	14,12	15,55	12,80												
	CI Anteil in %	[12,36; 15,87]	[13,43; 17,67]	[10,59; 15,01]												
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3862</i>	<i>3376</i>	<i>2940</i>	<i>2581</i>											

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2011-2	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		2217	1559											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		843	640											
		Anteil in %			38,02	41,05										
		CI Anteil in %			[36,00; 40,05]	[38,61; 43,49]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		1040	712											
		Anteil in %			46,91	45,67										
		CI Anteil in %			[44,83; 48,99]	[43,20; 48,14]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		334	207											
		Anteil in %			15,07	13,28										
		CI Anteil in %			[13,58; 16,55]	[11,59; 14,96]										
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6269</i>	<i>5394</i>	<i>4553</i>											
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		1599	1174											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		599	489											
		Anteil in %			37,46	41,65										
		CI Anteil in %			[35,09; 39,83]	[38,83; 44,47]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		765	548											
		Anteil in %			47,84	46,68										
CI Anteil in %				[45,39; 50,29]	[43,82; 49,53]											
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		235	137												
	Anteil in %			14,70	11,67											
	CI Anteil in %			[12,96; 16,43]	[9,83; 13,51]											
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3957</i>	<i>3484</i>	<i>3022</i>												
2012-1	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		2190												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		821												
		Anteil in %			37,49											
		CI Anteil in %			[35,46; 39,52]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		1036												
		Anteil in %			47,31											
		CI Anteil in %			[45,21; 49,40]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		333												
		Anteil in %			15,21											
		CI Anteil in %			[13,70; 16,71]											
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6684</i>	<i>5721</i>												
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		1611												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		624												
		Anteil in %			38,73											
		CI Anteil in %			[36,35; 41,11]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		780												
		Anteil in %			48,42											
CI Anteil in %				[45,98; 50,86]												
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		207													
	Anteil in %			12,85												
	CI Anteil in %			[11,21; 14,48]												
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4314</i>	<i>3782</i>													

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	Patienten < 18 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5942</i>													
	Patienten < 12 mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl														
		Anteil in %														
CI Anteil in %																
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3748</i>														

In der Tabelle 3.5.2 wird die **jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik** der Programmteilnehmer ausgewiesen. Die Auswertungen erfolgen also nicht im üblichen Halbjahresbezug. Da sich die Angaben aus der Erstdokumentation über einen unbestimmten Zeitraum erstrecken, können die Angaben des Beitrittsjahres nicht für die jährliche Betrachtungsweise verwendet werden. Der Jahresbezug wird folgendermaßen definiert: Eine Untersuchung im 1. bzw. 2. Auswertungsjahr gilt als gegeben, wenn eine Untersuchung im zweiten und/oder dritten Halbjahr dokumentiert ist bzw. im vierten und/oder fünften Halbjahr, etc. Betrachtet werden dabei alle Versicherten, die jeweils in beiden Halbjahren auswertbare Programmteilnehmer waren. Da eine

jährliche Auswertung vorgenommen werden soll, wird ausgewiesen, wie viele Patienten <18 bzw. <12 Jahre in der zweiten Hälfte des untersuchten Jahreszeitraumes (zweites/drittes Halbjahr, viertes/fünftes Halbjahr, etc.) noch Programmteilnehmer waren. Patienten, die lediglich in der ersten Jahreshälfte im Programm waren, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird dargestellt, für wie viele der „auswertbaren“ Patienten bzw. welchen Anteil im interessierenden Jahreszeitraum (= aktuelles Halbjahrespaar) eine Überprüfung der Inhalationstechnik erfolgte.

Tabelle 3.5.2 Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Auswertungs-jahr	Im 2. Auswertungs-jahr	Im 3. Auswertungs-jahr	Im 4. Auswertungs-jahr	Im 5. Auswertungs-jahr	Im 6. Auswertungs-jahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	323	265	216	184	156	127
	auswertbar	Anzahl		316	256	208	179	148	121
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		257	187	146	137	125	101
		Anteil in %		81,33	73,05	70,19	76,54	84,46	83,47
		CI Anteil in %		[77,03; 85,63]	[67,60; 78,49]	[63,96; 76,42]	[70,31; 82,76]	[78,60; 90,32]	[76,83; 90,12]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	217	180	145	126	111	91
	auswertbar	Anzahl		214	173	140	122	107	87
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		173	128	99	94	90	73
		Anteil in %		80,84	73,99	70,71	77,05	84,11	83,91
		CI Anteil in %		[75,56; 86,13]	[67,43; 80,54]	[63,15; 78,28]	[69,56; 84,54]	[77,15; 91,07]	[76,14; 91,67]
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	2747	2260	1861	1476	1169	930
	auswertbar	Anzahl		2622	2100	1744	1377	1087	846
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2246	1783	1445	1188	971	751
		Anteil in %		85,66	84,90	82,86	86,27	89,33	88,77
		CI Anteil in %		[84,32; 87,00]	[83,37; 86,44]	[81,09; 84,62]	[84,46; 88,09]	[87,49; 91,16]	[86,64; 90,90]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	1942	1632	1379	1152	948	770
	auswertbar	Anzahl		1862	1523	1309	1086	891	698
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		1631	1320	1102	948	803	624
		Anteil in %		87,59	86,67	84,19	87,29	90,12	89,40
		CI Anteil in %		[86,10; 89,09]	[84,96; 88,38]	[82,21; 86,16]	[85,31; 89,27]	[88,16; 92,08]	[87,11; 91,68]
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	4857	3940	3153	2509	2034	
	auswertbar	Anzahl		4579	3562	2923	2340	1861	
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		3968	2893	2478	2031	1631	
		Anteil in %		86,66	81,22	84,78	86,79	87,64	
		CI Anteil in %		[85,67; 87,64]	[79,94; 82,50]	[83,47; 86,08]	[85,42; 88,17]	[86,15; 89,14]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3218	2696	2276	1893	1594	
	auswertbar	Anzahl		3055	2461	2149	1779	1484	
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2715	2052	1872	1584	1334	
		Anteil in %		88,87	83,38	87,11	89,04	89,89	
		CI Anteil in %		[87,76; 89,99]	[81,91; 84,85]	[85,69; 88,53]	[87,59; 90,49]	[88,36; 91,43]	
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	7872	6208	4926	3940	3138	
	auswertbar	Anzahl		7066	5783	4573	3631	2821	
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		6141	4678	3850	3094	2385	
		Anteil in %		86,91	80,89	84,19	85,21	84,54	
		CI Anteil in %		[86,12; 87,70]	[79,88; 81,91]	[83,13; 85,25]	[84,06; 86,37]	[83,21; 85,88]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5354	4354	3634	3039	2497	
	auswertbar	Anzahl		4883	4118	3408	2838	2266	
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		4332	3432	2929	2461	1959	
		Anteil in %		88,72	83,34	85,94	86,72	86,45	
		CI Anteil in %		[87,83; 89,60]	[82,20; 84,48]	[84,78; 87,11]	[85,47; 87,96]	[85,04; 87,86]	

EZ	Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik	Teilnehmer im Beitritts-halb-jahr	Im 1. Auswertungs-jahr	Im 2. Auswertungs-jahr	Im 3. Auswertungs-jahr	Im 4. Auswertungs-jahr	Im 5. Auswertungs-jahr	Im 6. Auswertungs-jahr
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	8389	6209	4857	3789	
	auswertbar	Anzahl		7314	5740	4492	3464	
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		6124	4728	3762	2929	
		Anteil in %		83,73	82,37	83,75	84,56	
		CI Anteil in %		[82,88; 84,58]	[81,38; 83,36]	[82,67; 84,83]	[83,35; 85,76]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5367	4183	3434	2797	
	auswertbar	Anzahl		4778	3922	3196	2583	
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		4090	3305	2726	2244	
		Anteil in %		85,60	84,27	85,29	86,88	
		CI Anteil in %		[84,61; 86,60]	[83,13; 85,41]	[84,07; 86,52]	[85,57; 88,18]	
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	6996	5399	4253	3370	
	auswertbar	Anzahl		6419	4963	3884	3018	
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		5297	4070	3186	2487	
		Anteil in %		82,52	82,01	82,03	82,41	
		CI Anteil in %		[81,59; 83,45]	[80,94; 83,08]	[80,82; 83,24]	[81,05; 83,76]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	4445	3579	2924	2397	
	auswertbar	Anzahl		4159	3343	2703	2182	
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		3539	2832	2305	1855	
		Anteil in %		85,09	84,71	85,28	85,01	
		CI Anteil in %		[84,01; 86,18]	[83,49; 85,93]	[83,94; 86,61]	[83,52; 86,51]	
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	5334	4033	3198		
	auswertbar	Anzahl		4957	3744	2919		
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		4259	3221	2514		
		Anteil in %		85,92	86,03	86,13		
		CI Anteil in %		[84,95; 86,89]	[84,92; 87,14]	[84,87; 87,38]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3428	2683	2230		
	auswertbar	Anzahl		3222	2530	2073		
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2828	2227	1820		
		Anteil in %		87,77	88,02	87,80		
		CI Anteil in %		[86,64; 88,90]	[86,76; 89,29]	[86,39; 89,20]		
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	4881	3660	2826		
	auswertbar	Anzahl		4506	3344	2558		
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		3869	2904	2212		
		Anteil in %		85,86	86,84	86,47		
		CI Anteil in %		[84,85; 86,88]	[85,70; 87,99]	[85,15; 87,80]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3167	2500	2005		
	auswertbar	Anzahl		2957	2313	1841		
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2602	2050	1625		
		Anteil in %		87,99	88,63	88,27		
		CI Anteil in %		[86,82; 89,17]	[87,34; 89,92]	[86,80; 89,74]		
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	4963	3725			
	auswertbar	Anzahl		4633	3460			
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		4065	3032			
		Anteil in %		87,74	87,63			
		CI Anteil in %		[86,80; 88,68]	[86,53; 88,73]			
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3182	2493			
	auswertbar	Anzahl		2983	2330			
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2668	2066			
		Anteil in %		89,44	88,67			
		CI Anteil in %		[88,34; 90,54]	[87,38; 89,96]			

EZ	Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik	Teilnehmer im Beitritts-halb-jahr	Im 1. Auswertungs-jahr	Im 2. Auswertungs-jahr	Im 3. Auswertungs-jahr	Im 4. Auswertungs-jahr	Im 5. Auswertungs-jahr	Im 6. Auswertungs-jahr
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	4930	3731			
	auswertbar	Anzahl		4533	3401			
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		3955	2926			
		Anteil in %		87,25	86,03			
		CI Anteil in %		[86,28; 88,22]	[84,87; 87,20]			
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3275	2591			
	auswertbar	Anzahl		3056	2384			
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2722	2096			
		Anteil in %		89,07	87,92			
		CI Anteil in %		[87,96; 90,18]	[86,61; 89,23]			
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	4479				
	auswertbar	Anzahl		4130				
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		3652				
		Anteil in %		88,43				
		CI Anteil in %		[87,45; 89,40]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	2940				
	auswertbar	Anzahl		2747				
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2468				
		Anteil in %		89,84				
		CI Anteil in %		[88,71; 90,97]				
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	4553				
	auswertbar	Anzahl		4140				
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		3672				
		Anteil in %		88,70				
		CI Anteil in %		[87,73; 89,66]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3022				
	auswertbar	Anzahl		2813				
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		2579				
		Anteil in %		91,68				
		CI Anteil in %		[90,66; 92,70]				
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten < 18 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3748					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten < 12 mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						

In der Tabelle 3.5.3 wird die Erstellung eines **schriftlichen Selbstmanagementplans** und darin enthaltener Therapieziele für die Programmteilnehmer ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu die Gruppe der „Patienten < 18 bzw. < 12 insgesamt“ angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird ausge-

wiesen, für wie viele Patienten auswertbare Angaben vorliegen und für wie viele dieser „auswertbaren“ Patienten ein schriftlicher Selbstmanagementplan erstellt wurde oder die Erstellung eines schriftlichen Selbstmanagementsplans nicht durchführbar war. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Patienten angegeben.

Tabelle 3.5.3 Schriftlicher Selbstmanagementplan bei Patienten <18 bzw. <12 Jahre

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115
	auswertbar	Anzahl	373	349	319	288	259	238	212	194	181	165	149	135	123	110
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	197	235	215	197	176	170	150	146	141	131	123	111	100	89
		Anteil in %	52,82	67,34	67,40	68,40	67,95	71,43	70,75	75,26	77,90	79,39	82,55	82,22	81,30	80,91
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[47,74; 57,89]	[62,41; 72,26]	[62,25; 72,55]	[63,02; 73,78]	[62,26; 73,65]	[65,68; 77,18]	[64,62; 76,89]	[69,17; 81,35]	[71,84; 83,96]	[73,20; 85,58]	[76,44; 88,67]	[75,75; 88,70]	[74,38; 88,22]	[73,53; 88,29]
		Anzahl	32	19	11	9	6	9	5	3	2	4	1	3	2	1
		Anteil in %	8,58	5,44	3,45	3,13	2,32	3,78	2,36	1,55	1,10	2,42	0,67	2,22	1,63	0,91
		CI Anteil in %	[5,73; 11,43]	[3,06; 7,83]	[1,44; 5,45]	[1,11; 5,14]	[0,48; 4,15]	[1,35; 6,21]	[0,31; 4,41]	[0,00; 3,29]	[0,00; 2,63]	[0,07; 4,78]	[0,00; 1,99]	[0,00; 4,72]	[0,00; 3,87]	[0,00; 2,69]
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	250	240	217	202	180	167	145	135	126	118	111	101	91	85
	auswertbar	Anzahl	250	236	216	196	175	161	143	133	124	115	108	98	89	81
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	133	167	156	144	127	127	112	108	104	95	91	87	79	70
		Anteil in %	53,20	70,76	72,22	73,47	72,57	78,88	78,32	81,20	83,87	82,61	84,26	88,78	88,76	86,42
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[47,00; 59,40]	[64,95; 76,58]	[66,24; 78,21]	[67,27; 79,67]	[65,94; 79,20]	[72,56; 85,21]	[71,54; 85,10]	[74,54; 87,87]	[77,37; 90,37]	[75,65; 89,57]	[77,36; 91,16]	[82,49; 95,06]	[82,17; 95,36]	[78,91; 93,93]
		Anzahl	24	15	8	9	5	7	4	2	0	1	1	0	0	0
	Anteil in %	9,60	6,36	3,70	4,59	2,86	4,35	2,80	1,50	0,00	0,87	0,93	0,00	0,00	0,00	
	CI Anteil in %	[5,94; 13,26]	[3,24; 9,48]	[1,18; 6,23]	[1,65; 7,53]	[0,38; 5,33]	[1,19; 7,51]	[0,09; 5,51]	[0,00; 3,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,57]	[0,00; 2,74]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930	
	auswertbar	Anzahl	3319	2998	2658	2400	2124	1974	1777	1573	1406	1263	1104	988	863	
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1816	1931	1761	1682	1485	1429	1350	1225	1127	1017	896	813	687	
		Anteil in %	54,72	64,41	66,25	70,08	69,92	72,39	75,97	77,88	80,16	80,52	81,16	82,29	79,61	
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[53,02; 56,41]	[62,70; 66,12]	[64,45; 68,05]	[68,25; 71,92]	[67,96; 71,87]	[70,42; 74,36]	[73,98; 77,96]	[75,82; 79,93]	[78,07; 82,24]	[78,34; 82,71]	[78,85; 83,47]	[79,91; 84,67]	[76,92; 82,30]	
		Anzahl	200	154	111	96	83	61	52	35	21	24	14	10	13	
		Anteil in %	6,03	5,14	4,18	4,00	3,91	3,09	2,93	2,23	1,49	1,90	1,27	1,01	1,51	
		CI Anteil in %	[5,22; 6,84]	[4,35; 5,93]	[3,42; 4,94]	[3,22; 4,78]	[3,08; 4,73]	[2,33; 3,85]	[2,14; 3,71]	[1,50; 2,95]	[0,86; 2,13]	[1,15; 2,65]	[0,61; 1,93]	[0,39; 1,64]	[0,69; 2,32]	
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	2300	2158	1942	1762	1632	1527	1379	1263	1152	1046	948	862	770	
	auswertbar	Anzahl	2300	2109	1887	1724	1538	1447	1329	1214	1105	1010	903	821	710	
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1332	1441	1338	1292	1148	1122	1072	995	929	846	760	699	589	
		Anteil in %	57,91	68,33	70,91	74,94	74,64	77,54	80,66	81,96	84,07	83,76	84,16	85,14	82,96	
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[55,89; 59,93]	[66,34; 70,31]	[68,86; 72,96]	[72,90; 76,99]	[72,47; 76,82]	[75,39; 79,69]	[78,54; 82,79]	[79,80; 84,12]	[81,91; 86,23]	[81,49; 86,04]	[81,78; 86,55]	[82,71; 87,57]	[80,19; 85,73]	
		Anzahl	161	118	81	69	60	36	35	23	14	14	8	9	10	
	Anteil in %	7,00	5,60	4,29	4,00	3,90	2,49	2,63	1,89	1,27	1,39	0,89	1,10	1,41		
	CI Anteil in %	[5,96; 8,04]	[4,61; 6,58]	[3,38; 5,21]	[3,08; 4,93]	[2,93; 4,87]	[1,69; 3,29]	[1,77; 3,49]	[1,13; 2,66]	[0,61; 1,93]	[0,66; 2,11]	[0,27; 1,50]	[0,38; 1,81]	[0,54; 2,28]		
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818		
	auswertbar	Anzahl	6049	5305	4663	4052	3729	3377	2979	2689	2392	2124	1909	1676		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3306	3430	3046	2705	2579	2447	2181	2044	1832	1648	1487	1299		
		Anteil in %	54,65	64,66	65,32	66,76	69,16	72,46	73,21	76,01	76,59	77,59	77,89	77,51		
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[53,40; 55,91]	[63,37; 65,94]	[63,96; 66,69]	[65,31; 68,21]	[67,68; 70,64]	[70,95; 73,97]	[71,62; 74,80]	[74,40; 77,63]	[74,89; 78,29]	[75,82; 79,36]	[76,03; 79,76]	[75,51; 79,51]		
		Anzahl	348	285	203	170	117	91	84	46	53	38	36	28		
		Anteil in %	5,75	5,37	4,35	4,20	3,14	2,69	2,82	1,71	2,22	1,79	1,89	1,67		
		CI Anteil in %	[5,17; 6,34]	[4,77; 5,98]	[3,77; 4,94]	[3,58; 4,81]	[2,58; 3,70]	[2,15; 3,24]	[2,23; 3,41]	[1,22; 2,20]	[1,63; 2,81]	[1,23; 2,35]	[1,28; 2,50]	[1,06; 2,28]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3919	3593	3218	2935	2696	2486	2276	2089	1893	1731	1594	1467		
	auswertbar	Anzahl	3919	3505	3101	2742	2569	2396	2183	1990	1817	1647	1518	1375		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2268	2405	2155	1963	1898	1859	1701	1605	1472	1362	1258	1132		
		Anteil in %	57,87	68,62	69,49	71,59	73,88	77,59	77,92	80,65	81,01	82,70	82,87	82,33		
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[56,33; 59,42]	[67,08; 70,15]	[67,87; 71,11]	[69,90; 73,28]	[72,18; 75,58]	[75,92; 79,26]	[76,18; 79,66]	[78,92; 82,39]	[79,21; 82,82]	[80,87; 84,52]	[80,98; 84,77]	[80,31; 84,34]		
		Anzahl	247	190	135	118	77	54	58	33	34	25	19	19		
	Anteil in %	6,30	5,42	4,35	4,30	3,00	2,25	2,66	1,66	1,87	1,52	1,25	1,38			
	CI Anteil in %	[5,54; 7,06]	[4,67; 6,17]	[3,64; 5,07]	[3,54; 5,06]	[2,34; 3,66]	[1,66; 2,85]	[1,98; 3,33]	[1,10; 2,22]	[1,25; 2,49]	[0,93; 2,11]	[0,69; 1,81]	[0,76; 2,00]			

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138		
	auswertbar	Anzahl	9767	8422	7239	6624	5918	5255	4673	4172	3748	3292	2900		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	5380	5335	4639	4257	4016	3628	3334	3006	2738	2428	2119		
		Anteil in %	55,08	63,35	64,08	64,27	67,86	69,04	71,35	72,05	73,05	73,75	73,07		
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[54,10; 56,07]	[62,32; 64,38]	[62,98; 65,19]	[63,11; 65,42]	[66,67; 69,05]	[67,79; 70,29]	[70,05; 72,64]	[70,69; 73,41]	[71,63; 74,47]	[72,25; 75,26]	[71,45; 74,68]		
		Anzahl	636	509	343	285	205	189	138	99	72	59	59		
	auswertbar	Anteil in %	6,51	6,04	4,74	4,30	3,46	3,60	2,95	2,37	1,92	1,79	2,03		
		CI Anteil in %	[6,02; 7,00]	[5,53; 6,55]	[4,25; 5,23]	[3,81; 4,79]	[3,00; 3,93]	[3,09; 4,10]	[2,47; 3,44]	[1,91; 2,83]	[1,48; 2,36]	[1,34; 2,25]	[1,52; 2,55]		
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6509	5922	5354	4851	4354	3972	3634	3340	3039	2754	2497		
	auswertbar	Anzahl	6509	5731	4980	4617	4194	3825	3474	3176	2922	2597	2329		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3732	3838	3420	3189	3043	2822	2639	2452	2279	2047	1813		
		Anteil in %	57,34	66,97	68,67	69,07	72,56	73,78	75,96	77,20	77,99	78,82	77,84		
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[56,13; 58,54]	[65,75; 68,19]	[67,39; 69,96]	[67,74; 70,40]	[71,21; 73,91]	[72,38; 75,17]	[74,54; 77,39]	[75,74; 78,66]	[76,49; 79,50]	[77,25; 80,39]	[76,16; 79,53]		
		Anzahl	496	382	236	196	140	131	96	64	41	40	40		
auswertbar	Anteil in %	7,62	6,67	4,74	4,25	3,34	3,42	2,76	2,02	1,40	1,54	1,72			
	CI Anteil in %	[6,98; 8,26]	[6,02; 7,31]	[4,15; 5,33]	[3,66; 4,83]	[2,79; 3,88]	[2,85; 4,00]	[2,22; 3,31]	[1,53; 2,50]	[0,98; 1,83]	[1,07; 2,01]	[1,19; 2,25]			
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373			
	auswertbar	Anzahl	10438	8619	7782	6742	5883	5188	4599	4044	3553	3110			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	5477	5355	4714	4368	3919	3557	3189	2828	2531	2201			
		Anteil in %	52,47	62,13	60,58	64,79	66,62	68,56	69,34	69,93	71,24	70,77			
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[51,51; 53,43]	[61,11; 63,15]	[59,49; 61,66]	[63,65; 65,93]	[65,41; 67,82]	[67,30; 69,83]	[68,01; 70,67]	[68,52; 71,34]	[69,75; 72,72]	[69,17; 72,37]			
		Anzahl	778	564	403	301	271	192	167	151	110	82			
	auswertbar	Anteil in %	7,45	6,54	5,18	4,46	4,61	3,70	3,63	3,73	3,10	2,64			
		CI Anteil in %	[6,95; 7,96]	[6,02; 7,07]	[4,69; 5,67]	[3,97; 4,96]	[4,07; 5,14]	[3,19; 4,21]	[3,09; 4,17]	[3,15; 4,32]	[2,53; 3,67]	[2,07; 3,20]			
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	6454	5917	5367	4672	4183	3785	3434	3107	2797	2538			
	auswertbar	Anzahl	6453	5487	5057	4462	4013	3603	3274	2953	2644	2366			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3563	3641	3314	3128	2868	2657	2426	2214	2029	1790			
		Anteil in %	55,21	66,36	65,53	70,10	71,47	73,74	74,10	74,97	76,74	75,66			
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[54,00; 56,43]	[65,11; 67,61]	[64,22; 66,84]	[68,76; 71,45]	[70,07; 72,87]	[72,31; 75,18]	[72,60; 75,60]	[73,41; 76,54]	[75,13; 78,35]	[73,93; 77,38]			
		Anzahl	559	393	267	187	168	124	114	94	77	54			
auswertbar	Anteil in %	8,66	7,16	5,28	4,19	4,19	3,44	3,48	3,18	2,91	2,28				
	CI Anteil in %	[7,98; 9,35]	[6,48; 7,84]	[4,66; 5,90]	[3,60; 4,78]	[3,57; 4,81]	[2,85; 4,04]	[2,85; 4,11]	[2,55; 3,82]	[2,27; 3,55]	[1,68; 2,88]				
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370				
	auswertbar	Anzahl	9103	7730	6612	5746	5097	4484	4002	3494	3113				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4739	4663	4161	3676	3359	2962	2713	2380	2135				
		Anteil in %	52,06	60,32	62,93	63,97	65,90	66,06	67,79	68,12	68,58				
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[51,03; 53,09]	[59,23; 61,41]	[61,77; 64,10]	[62,73; 65,22]	[64,60; 67,20]	[64,67; 67,44]	[66,34; 69,24]	[66,57; 69,66]	[66,95; 70,21]				
		Anzahl	610	453	343	288	210	168	137	143	115				
	auswertbar	Anteil in %	6,70	5,86	5,19	5,01	4,12	3,75	3,42	4,09	3,69				
		CI Anteil in %	[6,19; 7,21]	[5,34; 6,38]	[4,65; 5,72]	[4,45; 5,58]	[3,57; 4,67]	[3,19; 4,30]	[2,86; 3,99]	[3,44; 4,75]	[3,03; 4,36]				
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	5565	5067	4445	3962	3579	3213	2924	2632	2397				
	auswertbar	Anzahl	5565	4883	4243	3781	3419	3054	2777	2484	2240				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3232	3314	2986	2695	2492	2236	2074	1862	1676				
		Anteil in %	58,08	67,87	70,37	71,28	72,89	73,22	74,68	74,96	74,82				
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[56,78; 59,37]	[66,56; 69,18]	[69,00; 71,75]	[69,83; 72,72]	[71,40; 74,38]	[71,64; 74,79]	[73,07; 76,30]	[73,26; 76,66]	[73,02; 76,62]				
		Anzahl	435	284	221	183	139	107	77	87	66				
auswertbar	Anteil in %	7,82	5,82	5,21	4,84	4,07	3,50	2,77	3,50	2,95					
	CI Anteil in %	[7,11; 8,52]	[5,16; 6,47]	[4,54; 5,88]	[4,16; 5,52]	[3,40; 4,73]	[2,85; 4,16]	[2,16; 3,38]	[2,78; 4,23]	[2,25; 3,65]					

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822					
	auswertbar	Anzahl	7227	5958	5042	4396	3839	3345	2989	2627					
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4010	3974	3318	2991	2680	2399	2185	1925					
		Anteil in %	55,49	66,70	65,81	68,04	69,81	71,72	73,10	73,28					
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[54,34; 56,63]	[65,50; 67,90]	[64,50; 67,12]	[66,66; 69,42]	[68,36; 71,26]	[70,19; 73,25]	[71,51; 74,69]	[71,58; 74,97]					
		Anzahl	437	274	231	180	140	100	84	83					
	nicht durchführbar	Anteil in %	6,05	4,60	4,58	4,09	3,65	2,99	2,81	3,16					
		CI Anteil in %	[5,50; 6,60]	[4,07; 5,13]	[4,00; 5,16]	[3,51; 4,68]	[3,05; 4,24]	[2,41; 3,57]	[2,22; 3,40]	[2,49; 3,83]					
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4439	3924	3428	3040	2683	2428	2230	2016					
	auswertbar	Anzahl	4439	3792	3262	2900	2573	2307	2114	1888					
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2632	2699	2318	2122	1919	1773	1650	1460					
		Anteil in %	59,29	71,18	71,06	73,17	74,58	76,85	78,05	77,33					
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[57,85; 60,74]	[69,73; 72,62]	[69,50; 72,62]	[71,56; 74,79]	[72,90; 76,26]	[75,13; 78,57]	[76,29; 79,82]	[75,44; 79,22]					
		Anzahl	314	190	157	116	95	64	57	59					
nicht durchführbar	Anteil in %	7,07	5,01	4,81	4,00	3,69	2,77	2,70	3,13						
	CI Anteil in %	[6,32; 7,83]	[4,32; 5,71]	[4,08; 5,55]	[3,29; 4,71]	[2,96; 4,42]	[2,10; 3,44]	[2,01; 3,39]	[2,34; 3,91]						
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826						
	auswertbar	Anzahl	6667	5539	4621	3919	3446	3008	2618						
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3842	3662	3141	2728	2441	2152	1884						
		Anteil in %	57,63	66,11	67,97	69,61	70,84	71,54	71,96						
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[56,44; 58,81]	[64,87; 67,36]	[66,63; 69,32]	[68,17; 71,05]	[69,32; 72,35]	[69,93; 73,16]	[70,24; 73,68]						
		Anzahl	337	276	195	132	123	101	82						
	nicht durchführbar	Anteil in %	5,05	4,98	4,22	3,37	3,57	3,36	3,13						
		CI Anteil in %	[4,53; 5,58]	[4,41; 5,56]	[3,64; 4,80]	[2,80; 3,93]	[2,95; 4,19]	[2,71; 4,00]	[2,46; 3,80]						
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4076	3650	3167	2778	2500	2227	2005						
	auswertbar	Anzahl	4076	3508	3026	2638	2378	2116	1876						
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2550	2541	2254	2007	1846	1651	1476						
		Anteil in %	62,56	72,43	74,49	76,08	77,63	78,02	78,68						
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[61,08; 64,05]	[70,96; 73,91]	[72,93; 76,04]	[74,45; 77,71]	[75,95; 79,30]	[76,26; 79,79]	[76,82; 80,53]						
		Anzahl	240	182	125	85	80	62	54						
nicht durchführbar	Anteil in %	5,89	5,19	4,13	3,22	3,36	2,93	2,88							
	CI Anteil in %	[5,17; 6,61]	[4,45; 5,92]	[3,42; 4,84]	[2,55; 3,90]	[2,64; 4,09]	[2,21; 3,65]	[2,12; 3,64]							
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291							
	auswertbar	Anzahl	6818	5584	4727	4067	3542	3076							
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4085	3855	3301	2933	2585	2274							
		Anteil in %	59,91	69,04	69,83	72,12	72,98	73,93							
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[58,75; 61,08]	[67,82; 70,25]	[68,52; 71,14]	[70,74; 73,50]	[71,52; 74,44]	[72,38; 75,48]							
		Anzahl	367	268	199	129	99	92							
	nicht durchführbar	Anteil in %	5,38	4,80	4,21	3,17	2,80	2,99							
		CI Anteil in %	[4,85; 5,92]	[4,24; 5,36]	[3,64; 4,78]	[2,63; 3,71]	[2,25; 3,34]	[2,39; 3,59]							
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4191	3668	3182	2807	2493	2241							
	auswertbar	Anzahl	4191	3529	3048	2679	2384	2114							
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2695	2633	2288	2076	1859	1663							
		Anteil in %	64,30	74,61	75,07	77,49	77,98	78,67							
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[62,85; 65,76]	[73,17; 76,05]	[73,53; 76,60]	[75,91; 79,07]	[76,31; 79,64]	[76,92; 80,41]							
		Anzahl	240	160	130	77	64	53							
nicht durchführbar	Anteil in %	5,73	4,53	4,27	2,87	2,68	2,51								
	CI Anteil in %	[5,02; 6,43]	[3,85; 5,22]	[3,55; 4,98]	[2,24; 3,51]	[2,04; 3,33]	[1,84; 3,17]								

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731									
	auswertbar	Anzahl	6677	5496	4636	4026	3474									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4162	3832	3233	2860	2487									
		Anteil in %	62,33	69,72	69,74	71,04	71,59									
	CI Anteil in %		[61,17; 63,50]	[68,51; 70,94]	[68,41; 71,06]	[69,64; 72,44]	[70,09; 73,09]									
	nicht durchführbar	Anzahl	292	203	175	123	109									
		Anteil in %	4,37	3,69	3,77	3,06	3,14									
		CI Anteil in %	[3,88; 4,86]	[3,19; 4,19]	[3,23; 4,32]	[2,52; 3,59]	[2,56; 3,72]									
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4244	3737	3275	2896	2591									
	auswertbar	Anzahl	4244	3611	3119	2750	2432									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2849	2720	2343	2113	1860									
		Anteil in %	67,13	75,33	75,12	76,84	76,48									
	CI Anteil in %		[65,72; 68,54]	[73,92; 76,73]	[73,60; 76,64]	[75,26; 78,41]	[74,79; 78,17]									
nicht durchführbar	Anzahl	203	123	114	76	71										
	Anteil in %	4,78	3,41	3,66	2,76	2,92										
	CI Anteil in %	[4,14; 5,43]	[2,81; 4,00]	[3,00; 4,31]	[2,15; 3,38]	[2,25; 3,59]										
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847										
	auswertbar	Anzahl	6222	5076	4214	3564										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4105	3696	3079	2615										
		Anteil in %	65,98	72,81	73,07	73,37										
	CI Anteil in %		[64,80; 67,15]	[71,59; 74,04]	[71,73; 74,41]	[71,92; 74,82]										
	nicht durchführbar	Anzahl	269	177	122	91										
		Anteil in %	4,32	3,49	2,90	2,55										
		CI Anteil in %	[3,82; 4,83]	[2,98; 3,99]	[2,39; 3,40]	[2,04; 3,07]										
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3862	3376	2940	2581										
	auswertbar	Anzahl	3862	3260	2800	2427										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2710	2526	2186	1900										
		Anteil in %	70,17	77,48	78,07	78,29										
	CI Anteil in %		[68,73; 71,61]	[76,05; 78,92]	[76,54; 79,60]	[76,65; 79,93]										
nicht durchführbar	Anzahl	178	106	78	57											
	Anteil in %	4,61	3,25	2,79	2,35											
	CI Anteil in %	[3,95; 5,27]	[2,64; 3,86]	[2,18; 3,40]	[1,75; 2,95]											
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553											
	auswertbar	Anzahl	6269	5147	4245											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4137	3737	3056											
		Anteil in %	65,99	72,61	71,99											
	CI Anteil in %		[64,82; 67,16]	[71,39; 73,82]	[70,64; 73,34]											
	nicht durchführbar	Anzahl	241	183	150											
		Anteil in %	3,84	3,56	3,53											
		CI Anteil in %	[3,37; 4,32]	[3,05; 4,06]	[2,98; 4,09]											
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3957	3484	3022											
	auswertbar	Anzahl	3957	3366	2877											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2841	2654	2252											
		Anteil in %	71,80	78,85	78,28											
	CI Anteil in %		[70,39; 73,20]	[77,47; 80,23]	[76,77; 79,78]											
nicht durchführbar	Anzahl	154	101	90												
	Anteil in %	3,89	3,00	3,13												
	CI Anteil in %	[3,29; 4,49]	[2,42; 3,58]	[2,49; 3,76]												

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721														
	auswertbar	Anzahl	6684	5430														
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4557	4020														
		Anteil in %		68,18	74,03													
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[67,06; 69,29]	[72,87; 75,20]													
		Anzahl	250	185														
	auswertbar	Anteil in %		3,74	3,41													
		CI Anteil in %		[3,29; 4,20]	[2,92; 3,89]													
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	4314	3782														
	auswertbar	Anzahl	4314	3629														
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3120	2894														
		Anteil in %		72,32	79,75													
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[70,99; 73,66]	[78,44; 81,05]													
		Anzahl	174	120														
auswertbar	Anteil in %		4,03	3,31														
	CI Anteil in %		[3,45; 4,62]	[2,72; 3,89]														
2012-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	5942															
	auswertbar	Anzahl	5942															
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	4084															
		Anteil in %		68,73														
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[67,55; 69,91]														
		Anzahl	233															
	auswertbar	Anteil in %		3,92														
		CI Anteil in %		[3,43; 4,41]														
	Patienten < 12 insgesamt	Anzahl	3748															
	auswertbar	Anzahl	3748															
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2771															
		Anteil in %		73,93														
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[72,53; 75,34]														
		Anzahl	154															
auswertbar	Anteil in %		4,11															
	CI Anteil in %		[3,47; 4,74]															

In der Tabelle 3.5.4 sind die **Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik ausgewiesen für die ein schriftlicher Selbstmanagementplan** erstellt wurde. Zunächst wird unter „auswertbare Patienten < 18 bzw. < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben. Dabei handelt es sich um diejenigen Patienten, die im

Berichtshalbjahr noch eingeschrieben sind und bei denen im Berichtshalbjahr eine tägliche Asthmasymptomatik dokumentiert wurde. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen dieser Patienten bzw. welchem Anteil ein schriftlicher Selbstmanagementplan vorliegt.

Tabelle 3.5.4 Patienten <18 bzw. <12 Jahre mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr		
2006-1	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	52	21	23	13	9	7	9	7	9	6	6	7	7	6	
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	29	13	16	12	8	4	6	5	2	5	6	6	6	6	3
		Anteil in %	55,77	61,90	69,57	92,31	88,89	57,14	66,67	71,43	22,22	83,33	100,00	85,71	85,71	50,00	
		CI Anteil in %	[42,14; 69,40]	[40,62; 83,19]	[50,34; 88,79]	[77,23; 100,00]	[67,11; 100,00]	[17,54; 96,74]	[34,00; 99,33]	[35,28; 100,00]	[0,00; 51,03]	[50,67; 100,00]	[100,00; 100,00]	[57,71; 100,00]	[57,71; 100,00]	[6,17; 93,83]	
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>373</i>	<i>356</i>	<i>323</i>	<i>297</i>	<i>265</i>	<i>246</i>	<i>216</i>	<i>196</i>	<i>184</i>	<i>169</i>	<i>156</i>	<i>140</i>	<i>127</i>	<i>115</i>	
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	25	8	11	8	4	2	2	3	4	1	2	3	2	2	
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	14	6	9	7	4	2	2	2	0	0	2	3	2	0	
		Anteil in %	56,00	75,00	81,82	87,50	100,00	100,00	100,00	66,67	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		CI Anteil in %	[36,14; 75,86]	[42,92; 100,00]	[57,91; 100,00]	[63,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[1,33; 100,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>250</i>	<i>240</i>	<i>217</i>	<i>202</i>	<i>180</i>	<i>167</i>	<i>145</i>	<i>135</i>	<i>126</i>	<i>118</i>	<i>111</i>	<i>101</i>	<i>91</i>	<i>85</i>	
2006-2	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	396	174	123	115	92	82	80	54	49	40	37	33	32		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	208	108	72	77	65	51	49	35	32	33	28	24	28		
		Anteil in %	52,53	62,07	58,54	66,96	70,65	62,20	61,25	64,81	65,31	82,50	75,68	72,73	87,50		
		CI Anteil in %	[47,60; 57,45]	[54,84; 69,30]	[49,79; 67,28]	[58,32; 75,59]	[61,30; 80,01]	[51,64; 72,76]	[50,51; 71,99]	[51,96; 77,67]	[51,84; 78,77]	[70,57; 94,43]	[61,66; 89,69]	[57,30; 88,16]	[75,86; 99,14]		
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3319</i>	<i>3069</i>	<i>2747</i>	<i>2467</i>	<i>2260</i>	<i>2088</i>	<i>1861</i>	<i>1641</i>	<i>1476</i>	<i>1314</i>	<i>1169</i>	<i>1045</i>	<i>930</i>		
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	250	95	64	68	55	50	49	28	27	21	22	20	23		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	144	71	43	49	43	39	35	20	19	20	18	16	20		
		Anteil in %	57,60	74,74	67,19	72,06	78,18	78,00	71,43	71,43	70,37	95,24	81,82	80,00	86,96		
		CI Anteil in %	[51,46; 63,74]	[65,95; 83,52]	[55,59; 78,78]	[61,31; 82,80]	[67,17; 89,20]	[66,40; 89,60]	[58,65; 84,21]	[54,39; 88,47]	[52,82; 87,92]	[85,90; 100,00]	[65,32; 98,31]	[62,01; 97,99]	[72,88; 100,00]		
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2300</i>	<i>2158</i>	<i>1942</i>	<i>1762</i>	<i>1632</i>	<i>1527</i>	<i>1379</i>	<i>1263</i>	<i>1152</i>	<i>1046</i>	<i>948</i>	<i>862</i>	<i>770</i>		
2007-1	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	767	278	227	171	149	136	119	97	100	72	64	49			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	403	169	123	97	83	81	72	56	75	53	46	35			
		Anteil in %	52,54	60,79	54,19	56,73	55,70	59,56	60,50	57,73	75,00	73,61	71,88	71,43			
		CI Anteil in %	[49,01; 56,08]	[55,04; 66,54]	[47,69; 60,68]	[49,28; 64,17]	[47,70; 63,71]	[51,28; 67,84]	[51,68; 69,32]	[47,85; 67,61]	[66,47; 83,53]	[63,36; 83,86]	[60,77; 82,98]	[58,65; 84,21]			
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6049</i>	<i>5481</i>	<i>4857</i>	<i>4371</i>	<i>3940</i>	<i>3552</i>	<i>3153</i>	<i>2845</i>	<i>2509</i>	<i>2252</i>	<i>2034</i>	<i>1818</i>			
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	466	159	119	104	84	73	66	55	59	40	36	29			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	256	108	72	67	54	50	43	35	46	33	30	25			
		Anteil in %	54,94	67,92	60,50	64,42	64,29	68,49	65,15	63,64	77,97	82,50	83,33	86,21			
		CI Anteil in %	[50,41; 59,46]	[60,65; 75,20]	[51,68; 69,32]	[55,18; 73,67]	[53,98; 74,59]	[57,76; 79,22]	[53,57; 76,74]	[50,81; 76,47]	[67,30; 88,63]	[70,57; 94,43]	[70,99; 95,68]	[73,43; 98,98]			
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3919</i>	<i>3593</i>	<i>3218</i>	<i>2935</i>	<i>2696</i>	<i>2486</i>	<i>2276</i>	<i>2089</i>	<i>1893</i>	<i>1731</i>	<i>1594</i>	<i>1467</i>			
2007-2	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1053	445	331	260	237	236	175	170	139	108	115				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	569	255	198	136	152	144	108	108	83	71	76				
		Anteil in %	54,04	57,30	59,82	52,31	64,14	61,02	61,71	63,53	59,71	65,74	66,09				
		CI Anteil in %	[51,02; 57,05]	[52,70; 61,90]	[54,53; 65,11]	[46,22; 58,39]	[58,02; 70,25]	[54,78; 67,25]	[54,49; 68,94]	[56,27; 70,79]	[51,53; 67,90]	[56,75; 74,73]	[57,40; 74,78]				
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9767</i>	<i>8774</i>	<i>7872</i>	<i>7052</i>	<i>6208</i>	<i>5507</i>	<i>4926</i>	<i>4402</i>	<i>3940</i>	<i>3511</i>	<i>3138</i>				
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	623	235	195	148	127	144	105	99	82	69	81				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	360	150	134	101	97	96	71	74	55	52	56				
		Anteil in %	57,78	63,83	68,72	68,24	76,38	66,67	67,62	74,75	67,07	75,36	69,14				
		CI Anteil in %	[53,90; 61,67]	[57,67; 69,99]	[62,19; 75,24]	[60,72; 75,77]	[68,96; 83,79]	[58,94; 74,39]	[58,63; 76,61]	[66,15; 83,35]	[56,84; 77,31]	[65,12; 85,60]	[59,01; 79,26]				
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6509</i>	<i>5922</i>	<i>5354</i>	<i>4851</i>	<i>4354</i>	<i>3972</i>	<i>3634</i>	<i>3340</i>	<i>3039</i>	<i>2754</i>	<i>2497</i>				

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2008-1	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1258	459	416	287	234	220	184	145	124	107				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	685	269	242	168	139	135	123	95	76	67				
		Anteil in %	54,45	58,61	58,17	58,54	59,40	61,36	66,85	65,52	61,29	62,62				
		CI Anteil in %	[51,70; 57,20]	[54,09; 63,12]	[53,43; 62,92]	[52,83; 64,25]	[53,10; 65,71]	[54,91; 67,81]	[60,03; 73,67]	[57,75; 73,28]	[52,68; 69,90]	[53,41; 71,83]				
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10439</i>	<i>9409</i>	<i>8389</i>	<i>7143</i>	<i>6209</i>	<i>5485</i>	<i>4857</i>	<i>4297</i>	<i>3789</i>	<i>3373</i>				
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	693	258	234	153	130	127	108	93	71	58				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	401	167	146	96	86	86	83	67	50	43				
		Anteil in %	57,86	64,73	62,39	62,75	66,15	67,72	76,85	72,04	70,42	74,14				
		CI Anteil in %	[54,19; 61,54]	[58,89; 70,57]	[56,17; 68,61]	[55,06; 70,43]	[57,99; 74,32]	[59,55; 75,88]	[68,86; 84,84]	[62,87; 81,21]	[59,73; 81,11]	[62,77; 85,51]				
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6454</i>	<i>5917</i>	<i>5367</i>	<i>4672</i>	<i>4183</i>	<i>3785</i>	<i>3434</i>	<i>3107</i>	<i>2797</i>	<i>2538</i>				
2008-2	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	958	471	333	287	247	190	176	143	135					
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	505	265	187	164	157	122	116	91	90					
		Anteil in %	52,71	56,26	56,16	57,14	63,56	64,21	65,91	63,64	66,67					
		CI Anteil in %	[49,55; 55,88]	[51,78; 60,75]	[50,82; 61,49]	[51,41; 62,88]	[57,55; 69,58]	[57,38; 71,05]	[58,89; 72,93]	[55,72; 71,55]	[58,68; 74,65]					
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9103</i>	<i>8144</i>	<i>6996</i>	<i>6095</i>	<i>5399</i>	<i>4755</i>	<i>4253</i>	<i>3752</i>	<i>3370</i>					
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	517	242	155	137	133	92	97	83	66					
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	301	172	104	94	93	66	69	56	45					
		Anteil in %	58,22	71,07	67,10	68,61	69,92	71,74	71,13	67,47	68,18					
		CI Anteil in %	[53,97; 62,48]	[65,35; 76,80]	[59,68; 74,52]	[60,81; 76,41]	[62,10; 77,75]	[62,49; 80,99]	[62,07; 80,20]	[57,33; 77,61]	[56,86; 79,51]					
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5565</i>	<i>5067</i>	<i>4445</i>	<i>3962</i>	<i>3579</i>	<i>3213</i>	<i>2924</i>	<i>2632</i>	<i>2397</i>					
2009-1	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	887	288	279	197	166	139	114	83						
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	510	171	160	112	111	90	81	57						
		Anteil in %	57,50	59,38	57,35	56,85	66,87	64,75	71,05	68,67						
		CI Anteil in %	[54,24; 60,75]	[53,69; 65,06]	[51,53; 63,16]	[49,92; 63,79]	[59,69; 74,05]	[56,78; 72,72]	[62,69; 79,41]	[58,64; 78,71]						
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7227</i>	<i>6220</i>	<i>5334</i>	<i>4656</i>	<i>4033</i>	<i>3568</i>	<i>3198</i>	<i>2822</i>						
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	508	163	154	111	86	79	60	40						
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	312	103	100	73	65	57	46	30						
		Anteil in %	61,42	63,19	64,94	65,77	75,58	72,15	76,67	75,00						
		CI Anteil in %	[57,18; 65,65]	[55,76; 70,62]	[57,37; 72,50]	[56,90; 74,63]	[66,45; 84,71]	[62,20; 82,10]	[65,87; 87,46]	[61,41; 88,59]						
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4439</i>	<i>3924</i>	<i>3428</i>	<i>3040</i>	<i>2683</i>	<i>2428</i>	<i>2230</i>	<i>2016</i>						
2009-2	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	852	349	254	196	155	133	104							
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	543	236	165	128	107	91	70							
		Anteil in %	63,73	67,62	64,96	65,31	69,03	68,42	67,31							
		CI Anteil in %	[60,50; 66,96]	[62,71; 72,54]	[59,08; 70,84]	[58,63; 71,99]	[61,73; 76,33]	[60,49; 76,35]	[58,25; 76,37]							
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6667</i>	<i>5796</i>	<i>4881</i>	<i>4157</i>	<i>3660</i>	<i>3200</i>	<i>2826</i>							
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	489	182	135	105	91	75	53							
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	332	133	99	73	68	52	40							
		Anteil in %	67,89	73,08	73,33	69,52	74,73	69,33	75,47							
		CI Anteil in %	[63,75; 72,04]	[66,61; 79,54]	[65,85; 80,82]	[60,68; 78,37]	[65,75; 83,70]	[58,83; 79,84]	[63,78; 87,17]							
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4076</i>	<i>3650</i>	<i>3167</i>	<i>2778</i>	<i>2500</i>	<i>2227</i>	<i>2005</i>							

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2010-1	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	787	298	221	189	162	124								
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	471	203	146	127	103	82								
		Anteil in %	59,85	68,12	66,06	67,20	63,58	66,13								
		CI Anteil in %	[56,42; 63,27]	[62,82; 73,42]	[59,81; 72,32]	[60,48; 73,91]	[56,15; 71,01]	[57,77; 74,49]								
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6818</i>	<i>5839</i>	<i>4963</i>	<i>4280</i>	<i>3725</i>	<i>3291</i>								
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	442	162	117	101	85	64								
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	290	126	90	76	61	48								
		Anteil in %	65,61	77,78	76,92	75,25	71,76	75,00								
		CI Anteil in %	[61,18; 70,04]	[71,36; 84,20]	[69,26; 84,59]	[66,79; 83,71]	[62,14; 81,39]	[64,31; 85,69]								
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4191</i>	<i>3668</i>	<i>3182</i>	<i>2807</i>	<i>2493</i>	<i>2241</i>								
2010-2	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	750	293	205	180	133									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	462	192	135	115	86									
		Anteil in %	61,60	65,53	65,85	63,89	64,66									
		CI Anteil in %	[58,12; 65,08]	[60,08; 70,98]	[59,35; 72,36]	[56,85; 70,93]	[56,51; 72,82]									
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6677</i>	<i>5709</i>	<i>4930</i>	<i>4257</i>	<i>3731</i>									
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	433	162	117	95	72									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	294	115	85	61	49									
		Anteil in %	67,90	70,99	72,65	64,21	68,06									
		CI Anteil in %	[63,50; 72,30]	[63,98; 78,00]	[64,54; 80,76]	[54,52; 73,90]	[57,21; 78,90]									
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4244</i>	<i>3737</i>	<i>3275</i>	<i>2896</i>	<i>2591</i>									
2011-1	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	750	269	204	140										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	506	198	148	95										
		Anteil in %	67,47	73,61	72,55	67,86										
		CI Anteil in %	[64,11; 70,82]	[68,33; 78,88]	[66,41; 78,69]	[60,09; 75,62]										
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6222</i>	<i>5297</i>	<i>4479</i>	<i>3847</i>										
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	420	143	111	80										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	308	113	86	55										
		Anteil in %	73,33	79,02	77,48	68,75										
		CI Anteil in %	[69,10; 77,57]	[72,32; 85,72]	[69,67; 85,28]	[58,53; 78,97]										
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3862</i>	<i>3376</i>	<i>2940</i>	<i>2581</i>										
2011-2	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	737	287	205											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	465	177	130											
		Anteil in %	63,09	61,67	63,41											
		CI Anteil in %	[59,61; 66,58]	[56,04; 67,31]	[56,80; 70,02]											
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6269</i>	<i>5394</i>	<i>4553</i>											
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	407	147	109											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	284	96	77											
		Anteil in %	69,78	65,31	70,64											
		CI Anteil in %	[65,31; 74,25]	[57,58; 73,03]	[62,05; 79,23]											
	<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3957</i>	<i>3484</i>	<i>3022</i>											

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2012-1	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	649	234												
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	423	160												
		Anteil in %	65,18	68,38												
		CI Anteil in %	[61,51; 68,85]	[62,41; 74,35]												
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6684</i>	<i>5721</i>												
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	387	139												
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	270	102												
		Anteil in %	69,77	73,38												
CI Anteil in %		[65,19; 74,35]	[66,01; 80,76]													
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4314</i>	<i>3782</i>													
2012-2	auswertbare Patienten < 18 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	617													
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	436													
		Anteil in %	70,66													
		CI Anteil in %	[67,07; 74,26]													
	<i>Patienten < 18 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5942</i>													
	auswertbare Patienten < 12 mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	327													
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	259													
		Anteil in %	79,20													
CI Anteil in %		[74,80; 83,61]														
<i>Patienten < 12 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3748</i>														

In der Tabelle 3.5.5 werden **Raucher (12 ≤ t < 18 Jahre) im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht** ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu die Gruppe der „Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr“ angegeben, d.h. derjenigen noch im Programm verbliebenen erwachsenen Patienten, die im aktuellen Berichtshalbjahr rauchten. Anschließend wird ausgewiesen, wie viele der „auswertbaren“ Patienten im aktuellen Berichtshalbjahr Raucher waren und gleichzeitig eine Emp-

fehlung zum Tabakverzicht erhielten und welchem prozentualen Anteil dies an den „auswertbaren“ Patienten entspricht. Da Angaben zur Empfehlung zum Tabakverzicht seit der Umstellung auf eDMP und die entsprechenden neuen Satzartbeschreibungen zum 1.7.2008 nicht mehr erhoben werden, können diese Auswertungen nur bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 vorgenommen werden.

Tabelle 3.5.5 Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht

EZ	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr
2006-1	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	18	15	10	8
	auswertbar	Anzahl	18	15	10	8
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	18	14	10	8
		Anteil in %	100,00	93,33	100,00	100,00
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[80,27; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>123</i>	<i>116</i>	<i>106</i>	<i>95</i>	<i>85</i>
2006-2	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	117	108	87	70
	auswertbar	Anzahl	117	108	87	70
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	109	106	84	67
		Anteil in %	93,16	98,15	96,55	95,71
	CI Anteil in %	[88,57; 97,76]	[95,59; 100,00]	[92,70; 100,00]	[90,94; 100,00]	
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1019</i>	<i>911</i>	<i>805</i>	<i>705</i>	
2007-1	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	229	221	190	
	auswertbar	Anzahl	229	221	190	
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	217	212	174	
		Anteil in %	94,76	95,93	91,58	
	CI Anteil in %	[91,87; 97,65]	[93,32; 98,54]	[87,62; 95,54]		
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2130</i>	<i>1888</i>	<i>1639</i>		
2007-2	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	381	336		
	auswertbar	Anzahl	381	336		
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	358	311		
		Anteil in %	93,96	92,56		
	CI Anteil in %	[91,57; 96,36]	[89,75; 95,37]			
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3258</i>	<i>2852</i>			
2008-1	Raucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	413			
	auswertbar	Anzahl	413			
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	392			
		Anteil in %	94,92			
	CI Anteil in %	[92,79; 97,04]				
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3985</i>				

In der Tabelle 3.5.6 sind die **Nichtraucher (12 ≤ t < 18 Jahre) im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht** ausgewiesen. Zunächst wird unter „Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen“ die auswertbare Patientenanzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren, im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen. Eine Differenzierung danach, ob die auswertbaren Patienten im Vorgängerhalbjahr Ketten- oder Gelegenheitsraucher waren, ist dabei nicht möglich. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patienten bzw. welcher

Anteil dieser Patienten im aktuellen Berichtshalbjahr Nichtraucher ist. Definitionsgemäß liegen für das Beitrittsjahr nicht die nötigen Informationen vor, so dass nur die entsprechende Gesamtpatientenzahl der jeweiligen Kohorte dargestellt wird.

Da die notwendigen Informationen zur Empfehlung zum Tabakverzicht seit der Umstellung auf eDMP zum 01.07.2008 nicht mehr erhoben werden, ist diese Auswertung letztmalig für das Berichtshalbjahr 2008-2 möglich.

Tabelle 3.5.6 Nichtraucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht

EZ	Nichtraucher 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-1	Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl	15	11	9	9	6								
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl	3	3	0	2	0								
		Anteil in %	20,00	27,27	0,00	22,22	0,00								
		CI Anteil in %	[0,00; 40,95]	[0,00; 54,88]	[0,00; 0,00]	[0,00; 51,03]	[0,00; 0,00]								
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>123</i>	<i>116</i>	<i>106</i>	<i>95</i>	<i>85</i>	<i>79</i>							
2006-2	Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl	95	85	68	62									
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl	14	10	12	15									
		Anteil in %	14,74	11,76	17,65	24,19									
		CI Anteil in %	[7,57; 21,90]	[4,87; 18,65]	[8,52; 26,78]	[13,45; 34,94]									
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>1019</i>	<i>911</i>	<i>805</i>	<i>705</i>	<i>628</i>								
2007-1	Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl	169	172	131										
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl	24	33	33										
		Anteil in %	14,20	19,19	25,19										
		CI Anteil in %	[8,92; 19,48]	[13,28; 25,09]	[17,73; 32,65]										
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>2130</i>	<i>1888</i>	<i>1639</i>	<i>1436</i>									
2007-2	Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl	277	244											
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl	35	71											
		Anteil in %	12,64	29,10											
		CI Anteil in %	[8,72; 16,56]	[23,39; 34,81]											
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3258</i>	<i>2852</i>	<i>2518</i>										
2008-1	Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl	276												
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl	55												
		Anteil in %	19,93												
		CI Anteil in %	[15,21; 24,65]												
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3985</i>	<i>3492</i>											
2008-2	Pat. 12 ≤ t < 18 Jahre im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl													
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl													
		Anteil in %													
		CI Anteil in %													
<i>Patienten 12 ≤ t < 18 Jahre insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3538</i>												

3.7 Sterberaten

In der Tabelle 3.7.1 wird die Anzahl der **verstorbenen Asthmapatienten** pro Halbjahr wiedergegeben.

viele von ihnen bzw. welcher Anteil im Berichtshalbjahr laut den PM-Daten verstorben ist. Da in den PM-Daten entweder die Information „verstorben“ oder „nicht verstorben“ enthalten ist, sind für die Darstellung der Sterberaten definitionsgemäß alle Patienten auswertbar.

Die Entwicklung der Häufigkeit von Begleit- oder Folgeerkrankungen oder der Anzahl verstorbener Patienten kann als Indikator für die Versorgungs- und Behandlungsqualität herangezogen werden. Für alle Kohorten und Berichtshalbjahre wird zunächst die Zahl der im Programm verbliebenen Patienten < 18 Jahre ausgewiesen. Anschließend wird dokumentiert, wie

Tabelle 3.7.1 Sterberaten bei Patienten <18 Jahre

EZ	Sterberaten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2006-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	373	356	323	297	265	246	216	196	184	169	156	140	127	115	
	verstorben	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
2006-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	3319	3069	2747	2467	2260	2088	1861	1641	1476	1314	1169	1045	930		
	verstorben	Anzahl	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00		
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
2007-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6049	5481	4857	4371	3940	3552	3153	2845	2509	2252	2034	1818			
	verstorben	Anzahl	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,02	0,02	0,05	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
2007-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9767	8774	7872	7052	6208	5507	4926	4402	3940	3511	3138				
	verstorben	Anzahl	0	1	1	0	2	1	1	0	1	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,02	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00				
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,03]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			
2008-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	10439	9409	8389	7143	6209	5485	4857	4297	3789	3373					
	verstorben	Anzahl	0	2	2	1	1	0	1	1	1	0					
		Anteil in %	0,00	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,03	0,00					
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]				
2008-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	9103	8144	6996	6095	5399	4755	4253	3752	3370						
	verstorben	Anzahl	0	0	2	0	0	1	1	1	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,00						
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
2009-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	7227	6220	5334	4656	4033	3568	3198	2822							
	verstorben	Anzahl	0	1	0	0	0	0	1	0							
		Anteil in %	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00							
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
2009-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6667	5796	4881	4157	3660	3200	2826								
	verstorben	Anzahl	0	2	0	1	2	1	1								
		Anteil in %	0,00	0,03	0,00	0,02	0,05	0,03	0,04								
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,10]								
2010-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6818	5839	4963	4280	3725	3291									
	verstorben	Anzahl	0	1	0	1	1	1									
		Anteil in %	0,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,03									
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,09]									
2010-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6677	5709	4930	4257	3731										
	verstorben	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]										
2011-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6222	5297	4479	3847											
	verstorben	Anzahl	0	2	1	0											
		Anteil in %	0,00	0,04	0,02	0,00											
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]											
2011-2	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6269	5394	4553												
	verstorben	Anzahl	0	1	0												
		Anteil in %	0,00	0,02	0,00												
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]												
2012-1	Patienten < 18 insgesamt	Anzahl	6684	5721													
	verstorben	Anzahl	1	0													
		Anteil in %	0,01	0,00													
		CI Anteil in %	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]													

EZ	Sterberaten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2012-2	Patienten < 18 insgesamt		Anzahl	5942												
			Anzahl	0												
	verstorben		Anteil in %	0,00												
			CI Anteil in %	[0,00; 0,00]												

Anhang A: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Age-Evaluationsbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Asthma bronchiale herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um zwei Arten von Datensätzen, die jeweils für einen Patienten erhoben wurden:


- Patientenmerkmale
- Medizinische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung A.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Asthma bronchiale von AOK und Knappschaft.

A.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung eines Patienten in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten.

Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP Asthma bronchiale unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP



Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) ab Juli 2008 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen **medizinischen Behandlungsdaten** sowie die **personenbezogenen Merkmale** enthält.⁶ Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Asthma bronchiale finden die Satzartbeschreibungen SA500EA/FA und SA500ED/FD⁷ Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA500ED/SA500FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 500EA/FA übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2008-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA500ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jedem Patienten vorhandenen **Patientenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patienten fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 500 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass ein Patient in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für ihn eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt.

Der damit beschriebene Datenfluss ist schematisch in Abbildung A.1.1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmern“ und „Patienten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientenbezogenen Auswertung würde hingegen der Patient weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Der Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschlossen werden mussten und sich in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP ein Teilnehmer der Kohorte 2006-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit Sicherheit geschlossen werden, dass er sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat der betreffende Patient „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patienten dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswer-

tungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergeben sich zwei Besonderheiten. Erstens werden die Patienten verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen. Zweitens kann eine unveränderte Patientengruppe bei den berechneten Mittelwerten innerhalb eines Auswertungsjahres nicht „altern“, da sich die vollendeten Lebensjahre auf den Stichtag 1.1. des Auswertungsjahres beziehen. Unterschiedliche Mittelwerte im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patienten die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

⁶ Bis zum 30.06.2008 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patienten bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

⁷ Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „A“ (alt) und „D“ wird unterschieden, ob sich die Dokumentation auf die Zeit vor oder nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen bezieht.

A.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung der Datenverarbeitung kam es zu Abweichungen bei der erwarteten Datenqualität. Diese Abweichungen traten insbesondere zu Beginn der Programmlaufzeit, z.B. aufgrund der allgemeinen Anlaufschwierigkeiten, auf. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf (PM-Datensätze)

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.⁸ Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln und den medizinischen Plausibilitätskriterien des BVA (siehe Tabelle 0.1.2) folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen kein Regelverstoß vorlag und die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen Regelverstöße vorlagen oder die gemäß Rechenregeln nicht auswertbar waren, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden **„Komplett-Dubletten“** aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden **„Auswertungsdubletten“** aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung (**„Matching“**) von Personenmerkmalen und medizinischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patienten ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine **Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf** vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis sind die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (bis zum Berichtshalbjahr 2012-2)
- Sie werden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung werden auch dann berücksichtigt, wenn sie sich auf bereits veröffentlichte Kohorten bzw. Halbjahre beziehen.

Der letzte Punkt stellt eine Änderung gegenüber den bisherigen Berichten dar, die gemäß der Abstimmung mit dem BVA zum 30.09.2013 sowohl für die medizinischen als auch für die stichprobenbasierten Auswertungen umzusetzen war. Im Kern wird dabei zugunsten einer aktuelleren Datenbasis die Reproduzierbarkeit der Berichte aufgehoben. Durch die rückwirkende Bereinigung der Datenbasis kann es im Vergleich zu den bisherigen Berichten insbesondere zu folgenden Änderungen kommen: Die Restkohorte kann durch die rückwirkende Bereinigung im Zeitverlauf stärker absinken als in bisherigen Berichten. Da diese Bereinigung im Wesentlichen Patienten ohne medizinische Dokumentation betrifft, ist in der Regel jedoch mit keinen oder nur geringen Auswirkungen auf die **Anzahl der auswertbaren Patienten und ihre Auswertungsergebnisse** (Durchschnittswerte, Patientenanteile) zu rechnen. Dagegen ist davon auszugehen, dass der **Anteil** der auswertbaren Patienten an allen Patienten steigt, wenn die Restkohorte als Bezugsgröße kleiner ausfällt als in bisherigen Berichten. Analog ist in diesem Fall auch ein Anstieg der Anteilswerte aus anderen Auswertungen zu erwarten, deren Bezugsgröße die Restkohorte darstellt.

⁸ Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für einen DMP-Teilnehmer für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kam es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu Abweichungen von diesem Schema. Im Folgenden wird beschrieben, wie bei diesen Sonderfällen in der Auswertung vorgegangen wurde:

- **1. Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**
Liegen für das Beitrittsjahr eines Patienten eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führt dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugerechnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle A.3.1.
- **2. Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **3. Mehrere Folgedokumentationen in einem Halbjahr**
Lagen für ein Halbjahr mehrere Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle A.3.1 Anwendung.
- **4. Mehrere Erstdokumentationen im Beitrittsjahr**
Lagen für das Beitrittsjahr zwei oder mehr Erstdokumentationen vor, wurde grundsätzlich diejenige mit dem frühesten Unterschriftsdatum des Arztes herangezogen. Sofern zwei oder mehr Erstdokumentationen mit diesem Datum vorliegen, werden die auszuwertenden medizinischen Werte gemäß Tabelle A.3.1 festgelegt.
- **5. Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später**
Lagen Erstdokumentationen für Halbjahre nach dem Beitrittsjahr vor, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die beiden letztgenannten Punkte wurden im Herbst 2010 neu in die Berechnungsvorschriften aufgenommen.⁹ In den Fällen, in denen die Datenlage widersprüchlich ist, kann es dadurch zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen. Da in einer chronologisch ersten Erstdokumentation nicht zwangsläufig alle Parameter gleich dokumentiert sind, wie in etwaigen weiteren Erstdokumentationen im Beitrittsjahr, kann es aufgrund der Neuregelung in Punkt 4 zu einer Änderung medizinischer Parameter im *Beitrittsjahr* und infolgedessen auch zu Änderungen der Basis von kollektivbasierten Auswertungen kommen. Die Neuregelung unter Punkt 5 kann zu einer Änderung medizinischer Parameter in den *Folgehalbjahren* führen.¹⁰ Darüber hinaus wurden die Berechnungsvorschriften bezüglich Tabelle A.3.1 dahingehend geändert, dass bei den Laborparametern/Messwerten nicht mehr der letzte chronologisch verfügbare, sondern der letzte *plausible* Wert zu verwenden ist. Dadurch kann es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen.

⁹ Zuvor war in den Berechnungsvorschriften des BVA nur definiert, wie bei Sonderfällen bezüglich der Folgedokumentationen zu verfahren ist (mehrerer Folgedokumentationen in einem Halbjahr, Folgedokumentationen im „falschen“ Halbjahr). Die Handhabung von Sonderfällen bei den Erstdokumentationen war nicht geregelt. Sie wurden bislang weitestgehend analog zu den Sonderfällen bei den Folgedokumentationen in die Auswertung einbezogen.

¹⁰ Da medizinische Informationen aus Erstdokumentationen in den Folgehalbjahren explizit zu ignorieren sind, entfällt nun in den betroffenen Fällen und Halbjahren ein medizinischer Wert. Sofern im betroffenen Halbjahr aus einer oder mehreren Folgedokumentationen abweichende Werte vorliegen, kann es – je nach Auswahl gemäß Tabelle A.3.1 – zu veränderten medizinischen Parametern führen. Sofern im betroffenen Halbjahr keine Folgedokumentationen vorliegen, kommt es durch die Neuregelung zu fehlenden Angaben.

Tabelle A.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr

Parameter	Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr
Häufigkeit der Asthma-Symptome	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres **
Entwicklung der Peakflow-Werte	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres **
Stationäre notfallmäßige Behandlung (mindestens 1 mal pro Halbjahr)	Höchster Wert des Auswertungshalbjahres (worst case)
Stationäre notfallmäßige Behandlung (mehr als 1 mal pro Halbjahr)	Summe der Werte aus allen Dokumentationen des Auswertungshalbjahres
Definition „Raucher“	Für das betreffende Halbjahr als „Raucher“ zu bewerten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
BMI	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres (in FDx bis 20081 nur für Kinder möglich, ab 20082 Werte in FDx auch für Erwachsene) **
Medikation	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres **
Asthma-Schulung empfohlen	Als empfohlen zu werten, wenn in einer Dokumentation „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ angegeben wurde
Wahrnehmung empfohlener Asthma-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine empfohlene Asthma-Schulung mindestens einmal in derselben FD als wahrgenommen („ja“) dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“)
Inhalationstechnik überprüft *	Ist in einem Halbjahr die Überprüfung der Inhalationstechnik mindestens einmal als durchgeführt („ja“) dokumentiert worden, ist dies unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“)
Schriftlicher Selbstmanagement-Plan	Als durchgeführt zu werten, wenn in mindestens einer Dokumentation „ja“ angegeben wurde
Empfehlung Tabakverzicht bei Rauchern	Als durchgeführt zu werten, wenn in mindestens einer Dokumentation „ja“ angegeben wurde

* Dieser Parameter kann halbjährlich pro Folgedokumentation dokumentiert werden, er wird aber nicht halbjährlich sondern jährlich ausgewertet, sodass immer zwei aufeinanderfolgende Halbjahre ein Berichtsjahr ergeben. Berichtsjahre sind dabei NICHT gleichzusetzen mit Kalenderjahren, (Auswertungsmodi, s. Berichtsteil I, Einleitungstext zu Tabelle 3.5.2 „Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik“).

** Der „letzte“ Wert wird anhand des Unterschriftsdatums des Arztes identifiziert. War diese Definition nicht eindeutig, weil für ein Halbjahr mehrere Dokumentationen mit dem gleichen Datum vorlagen, wurde folgendermaßen verfahren: War die Dokumentation in verschiedenen Datenlieferungen enthalten, wurde diejenige aus der letzten Datenlieferung verwendet. Lagen danach immer noch zwei oder mehrere Dokumentationen mit demselben Unterschriftsdatum vor, wurde der medizinisch ungünstigste Wert in die Auswertung einbezogen.

Anhang B: Glossar

Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung) – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

Antragsregion – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

arithmetisches Mittel – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

Asthma (bronchiale) – Asthma ist eine entzündliche Erkrankung der Atemwege, die durch anfallsweise auftretende Atemnot gekennzeichnet ist. Ursächlich sind eine Entzündung sowie eine erhöhte Empfindlichkeit der Bronchien (Atemwege). Asthmaanfälle können durch spezifische und unspezifische Reize ausgelöst werden.

Asthmaanfall – Bei einem Asthmaanfall nehmen die Beschwerden innerhalb weniger Stunden zu und führen zu einer akuten Verschlechterung des Zustands des Patienten, eventuell sogar zum Tod.

auswertbare Patienten – Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

Auswertungs(halb)jahr – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmer erfolgen.

Bedarfsmedikation/Bedarfsmedikamente – Bedarfs- bzw. Notfallmedikamente dienen der schnellen Beseitigung akuter Beschwerden.

Beitrittsjahr – Kalenderjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

Beta-2-Sympathomimetika – Hierbei handelt es sich um eine Medikamentengruppe, die die bei Asthma verengten Bronchien (Luftäste) entspannt und dadurch erweitert. Beta-2-Sympathomimetika werden in lang- und kurzwirkende Medikamente unterteilt.

BMI (Body-Mass-Index) – Verhältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts, berechnet durch Körpergewicht in Kilogramm dividiert durch Körpergröße in Meter zum Quadrat.

Body-Mass-Index – siehe BMI

Bronchien – Mit Bronchien bezeichnet man die Luftäste in der Lunge.

Brummen – asthmatypisches Atemgeräusch

CI (confidence interval) – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

Dauermedikation – Zur regelmäßigen Einnahme bestimmte Medikamente. Dauermedikamente dienen in der Asthmathherapie der Langzeitkontrolle der Erkrankung. Sie wirken der Ursache der Asthma-Erkrankung entgegen.

DMP (Disease-Management-Programm[e]) – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

ED – siehe Erstdokumentation

Eintrittszeitpunkt (EZ) – In allen tabellarischen Auswertungen wird in der ersten Spalte ausgewiesen, in welchem Kalenderhalbjahr der Eintrittszeitpunkt des Patienten in das Programm fiel bzw. welcher Halbjahreskohorte er angehört.

Erstdokumentation – Mit der Einschreibung des Patienten in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

Erstmanifestation – Erstmaliges Erkennbarwerden z.B. einer Erkrankung oder einer Erbanlage.

Exazerbation – Exazerbation bezeichnet die akute Verschlechterung von Krankheitssymptomen.

EZ – siehe Eintrittszeitpunkt

FD – siehe Folgedokumentation

Folgedokumentation – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

Giemen – asthmatypisches Atemgeräusch

Glukokortikosteroide – Glukokortikosteroide sind eine Gruppe von Medikamenten, die zu den wirkungsvollsten in der Asthmathherapie zählen. U.a. wirken sie entzündungshemmend und antiallergisch. In der Therapie asthmatischer Erkrankungen werden sie als Dauermedikation verwendet. Glucocortcosteroide können als Inhalativum (zur Einatmung), parenteral (als Injektion) oder oral (in Tablettenform) verabreicht werden.

Häusliche Krankenpflege – In der Wohnung der Patienten erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungspflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

Heilmittel – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen oder einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) und Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

Hilfsmittel – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

Inhalation – Inhalation bezeichnet das Einatmen gasförmiger (Wirk)Stoffe. Durch Inhalation gelangen Wirkstoffe direkt in die Atemwege.

Inhalativum – Medikament zur Einatmung (Inhalation).

Inhalator – Gerät zur Einatmung (Inhalation) gasförmiger Medikamente.

Kohorte bzw. Halbjahreskohorte – Gesamtheit der Teilnehmer eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patienten, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

Kollektiv – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Konfidenzintervall – siehe CI

Krankengeld – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstaufschlag ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

Mean – siehe arithmetisches Mittel

Median – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

Medizinische Datensätze – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 500 EA und (ab der 12. RSA-ÄndV) SA 500 ED sowie für die Folgedokumentationen die SA 500 FA und (ab der 12. RSA-ÄndV) SA 500 FD.

Monotherapie – Unter einer Monotherapie versteht man die Behandlung mit einem Medikament, das nur eine Wirksubstanz enthält. Eine Kombinationstherapie arbeitet dagegen mit Medikamenten mit zwei oder mehr Wirksubstanzen.

OD-Daten – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmer verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmer vor. Diese Daten werden als Satzart 100 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patient und Jahr vor.

Oral – Ein Medikament kann oral gegeben werden, d.h. durch den Mund z.B. in Form einer Tablette.

Parenteral – Ein Medikament kann parenteral gegeben werden, d.h. unter Umgehung des Verdauungstraktes als Injektion oder Infusion.

Peak-Flow – Der Peak-Flow -Wert bezeichnet die Atemstromstärke, mit der eine Person bei maximaler Anstrengung ausatmen kann.

Pfeifen – asthmatypisches Atemgeräusch

PM-Daten – Patientenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientenmerkmale wie Geschlecht und Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

Programtteilnehmer – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

Restkohorte – Gesamtheit der Patienten einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programtteilnehmer sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV) – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidität) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

Selbstmanagementplan – Ein mit dem behandelnden Arzt erstellter Plan, der den Patienten in die Lage versetzen soll, sich bei Verschlechterung seines Krankheitszustands richtig zu verhalten.

Subkohorte – Untergruppe der Patienten einer Kohorte. Alle Patienten werden zum Zeitpunkt der Erstdokumentation nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen in drei Subkohorten unterteilt. Diese Einteilung bleibt über den gesamten Berichtszeitraum bestehen, auch wenn sich der Schweregrad der Begleit- oder Folgeerkrankungen im Zeitverlauf ändert.