

AOK Curaplan und "gut DABEI" der Knappschaft für Asthma bronchiale - bundesweite Gender-Auswertungen

Berichtstyp: bundesweiter Evaluationsbericht - Gender-Auswertungen

Auswertungshalbjahre: 2006-1 bis 2012-2

Abgabedatum: 31. März 2014

Evaluatoren:

infas infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn

prognos
Prognos AG
Schwanenmarkt 21
40231 Düsseldorf

WIAD Wissenschaftliches Institut der Ärzte
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.
Uhierstr. 78
53175 Bonn

0. Einleitung	3
Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation	4
0.1. Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten	6
Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard	6
Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche	8
0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung	9
Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Tabelle: Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	9
0.3. Ausgewertete Teilgruppen	10
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	11
Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale	11
Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung	11
Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	14
Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	22
Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres	25
Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	28
Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	29
Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation	31
Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung	34
3.1 Risikofaktoren	35
Tabelle 3.1.1 Raucher ≥ 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	35
Tabelle 3.1.2 Raucherquote bei allen Patienten ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	39
Tabelle 3.1.3 Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	43
3.2 Symptomatik	57
Tabelle 3.2.1 Häufigkeit von Asthmasymptomen	57
Tabelle 3.2.2 Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen	71
Tabelle 3.2.3 Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	79
Tabelle 3.2.4 Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	82
3.3 Klinische Verlaufsparemeter	85
Tabelle 3.3.1 Peak-Flow-Absolutwert	85
Tabelle 3.3.2 Entwicklung des Peak-Flow-Wertes	93
3.4 Medikation	98
Tabelle 3.4.1 Patienten und ihre Medikation	99
Tabelle 3.4.2 Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	127
3.5 Prozessparameter	132
Tabelle 3.5.1 Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	132
Tabelle 3.5.2 Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik	140
Tabelle 3.5.3 Schriftlicher Selbstmanagementplan	143
Tabelle 3.5.4 Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	148
Tabelle 3.5.5 Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht	152
Tabelle 3.5.6 Nichtraucher im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht	154
3.7 Sterberaten	156
Tabelle 3.7.1 Sterberaten	156
Anhang A: Methodik und Datengrundlage	159
A.1 Datengrundlage	159
Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP Asthma bronchiale unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP	160
A.2 Qualitätssicherung	162
A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen	163
Tabelle A.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr	164
Anhang B: Glossar	165

0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patienten wird über den gesamten Verlauf einer (chronischen) Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patienten sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es, zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patienten durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Lebensqualitätsbefragung im Rahmen des Krankheitsbildes Asthma bronchiale werden erstmals in den Berichten zum 31.03.2010 ausgewiesen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrundeliegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Asthma bronchiale waren sämtliche DMP erstmalig zum 31.03.2010 zu evaluieren. Anschließend erfolgt alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 31.03.2012, zum 31.03.2014, etc.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welche Inhalte der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Der Bericht enthält die in den Evaluationskriterien vorgesehenen geschlechtsspezifischen Zusatzauswertungen, welche bundesweit und kassenartenübergreifend (AOK, Knappschaft) vorgenommen werden.

Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	
1. Patientenzahlen und -merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) - Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Alter - Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Patienten und ihre mittlere Beobachtungszeit - Patienten ohne medizinische Dokumentation
3. Krankheitsverlauf nach Einschreibung	<p>Risikofaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raucherstatus - Gewichtsentwicklung (BMI) <p>Symptomatik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Häufigkeit von Asthmasymptomen - stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale <p>Klinische Verlaufsparmter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peak-Flow-Werte <p>Medikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patienten und ihre Medikation <p>Prozessparameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen - Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik - Schriftlicher Selbstmanagementplan - Raucherstatus und Empfehlung zum Tabakverzicht <p>Sterberaten</p>
Anhang A: Methodik und Datengrundlage	
Anhang B: Glossar	

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den „Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme“ in der Version 5.4 am 04. Dezember 2012 veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbeobachtung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Evaluationsberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen. Um eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf die Patientenpopulation herzustellen, erfolgt dazu eine risikoadjustierte Schätzung der interessierenden Parameter.

Der vorliegende Bericht enthält bundesweite, genderspezifische Auswertungen für die Summe aller DMPs der AOK und der Knappschaft zur Behandlung von Asthma bronchiale. Die Akkreditierung für das erste dieser Programme erfolgte im Halbjahr 2006-1. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmer des Programms vom Zeitpunkt Ihres Beitritts bis einschließlich des Berichtshalbjahres 2012-2 beobachtet. Betrachtet werden Versicherte der jeweiligen AOK sowie gegebenenfalls länderübergreifend betreute Versicherte anderer AOKen und die Versicherten der Knappschaft, zu denen nach der Fusion beider Kassen auch die ehemaligen Versicherten der See-Krankenkasse gehören.

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.¹ Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs der Knappschaft teil. Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Berichtshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden Asthma-Berichten Daten aus eDMP enthalten sind. Ab dem Halbjahr 2008-2 kann daher - je nach Auswertungsinhalt - die Vergleichbarkeit der Auswertungsinhalte eingeschränkt sein. Zum einen werden seit eDMP einige Parameter auf geänderte Art und Weise erfasst. Zum anderen besteht - je nach Praxissoftware - seit eDMP die Möglichkeit, auf ergänzende Patienteninformationen zuzugreifen, so dass ggf. ein bisher möglicherweise unterrepräsentierter Parameter korrigiert dargestellt wird.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

Zur Vereinfachung wird im folgenden von „Patienten“, „Teilnehmern und „Personen“ usw. gesprochen. Damit sind jedoch stets männliche und weibliche Personen gemeint.

¹ Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

0.1. Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patienten in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patienten mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patienten und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patienten halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2006-1“, Kohorte „2006-2“, „Kohorte 2007-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt des einzelnen Teilnehmers in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1 verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2006-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc.. Zu beachten ist dabei, dass die Spaltenüberschriften sich auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patienten beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche **Kalenderhalbjahre**.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

Eintrittszeitpunkt	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Teilnehmer im 2. Halb-jahr	Teilnehmer im 3. Halb-jahr	Teilnehmer im 4. Halb-jahr	Teilnehmer im 5. Halb-jahr	Teilnehmer im 6. Halb-jahr	Teilnehmer im 7. Halb-jahr	Teilnehmer im 8. Halb-jahr	Teilnehmer im 9. Halb-jahr	Teilnehmer im 10. Halb-jahr	Teilnehmer im 11. Halb-jahr	Teilnehmer im 12. Halb-jahr	Teilnehmer im 13. Halb-jahr	Teilnehmer im 14. Halb-jahr	Teilnehmer im 15. Halb-jahr
2006-1	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...
2006-2	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...	
2007-1	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...		
2007-2	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...			
2008-1	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...				
2008-2	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...					
2009-1	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...						
2009-2	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...							
2010-1	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...								
2010-2	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...									
2011-1	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...										
2011-2	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...											
2012-1	Wert für 2012-1	Wert für 2012-2	...												
2012-2	Wert für 2012-2	...													
...	...														

Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt. Eine jährliche Auswertung erfolgt ebenfalls bei der Überprüfung der Inhalationstechnik.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patienten zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte der Patient zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2006 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2006-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2006 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2006-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patienten keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patienten bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet.

Ab dem zweiten Halbjahr ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patienten aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen zu einem Ausschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patienten, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patienten in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patienten.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patienten der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“ (vgl. Tabelle 0.1.2.) oder Angaben, die nicht den Plausibilitätskriterien des BVA genügen.

Zu beachten ist weiterhin, dass im Sommer 2010 in Abstimmung mit dem BVA erstmals Regelungen getroffen wurden, die festlegen welcher Wert beim Vorliegen mehrerer Erstdokumentationen pro Halbjahr zu verwenden ist. Zudem wurden auf Basis aktualisierter BVA-Vorgaben seit Herbst 2013 – also erstmalig im vorliegenden Bericht – Anpassungen bei der Aufbereitung der Patientendaten vorgenommen (siehe Kapitel A.2 bzw. A.3).

Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche

Parameter	definierter medizinischer Bereich*
Lebensalter (vollendete Jahre)	≥ 4 bis ≤ 110
Größe (m)	≥ 0,30 bis ≤ 2,50
Gewicht (kg)	≥ 2 bis ≤ 300
BMI (kg/m ²)	≥ 5 bis ≤ 180
Peak-Flow-Wert (l/min)	≥ 40 bis ≤ 998
Stationäre notfallmäßige Behandlung:	
FA: seit letzter Dokumentation	0 bis 8
FD: seit letzter Dokumentation	0 bis 98

*Basis: Expertenmeinungen nach Kenntnisstand November 2009. Wertebereiche sind vom BVA als Evaluationsgrundlage abgenommen und werden aufgrund der jeweils aktuellen Evaluationsergebnisse bei Bedarf angepasst.

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. nicht Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind. Diejenigen Patienten, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare**“ Patienten bezeichnet und in der Regel in den Tabellen gesondert ausgewiesen.² Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patienten zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

²Die „nicht auswertbaren“ Patienten ergeben sich als Differenz zwischen den „Patienten insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patienten.

0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der **erwachsenen Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2.1). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, ist in diesem Bericht jede Tabelle mit einem entsprechenden Erläuterungstext versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patienten in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 die erste Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ Tabelle der **erwachsenen Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index** mit der zweiten Spalte. Für jede Kohorte werden dort zunächst Angaben zu den Patienten gemacht. Zuerst wird

unter „erwachsene männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch als Programmteilnehmer definiert werden.

Die „auswertbaren“ erwachsenen Patienten, also diejenigen, für die im betrachteten Berichtshalbjahr plausible Angaben zum Body-Mass-Index vorlagen, bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der mittleren patientenbezogenen Differenz zwischen dem Body-Mass-Index im Berichtshalbjahr und Beitritts-halbjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus beiden Halbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren erwachsenen Patienten im Berichtshalbjahr und wird deswegen gesondert aufgeführt. Das Konfidenzintervall wird ausgewiesen, indem die untere und obere Grenze durch ein Semikolon getrennt in eckigen Klammern dargestellt werden.

Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Tabelle: Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
Kohorte	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	641	603	547	506	475	450	429	401	386	357	340	327	310	297
	auswertbar	Anzahl	641	0	0	0	0	441	419	394	378	350	334	319	303	290
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	27,58					28,27	28,34	28,34	28,48	28,46	28,55	28,72	28,72	28,55
		CI Mean	[27,22; 27,94]					[27,80; 28,74]	[27,86; 28,82]	[27,85; 28,82]	[27,97; 28,99]	[27,94; 28,98]	[28,01; 29,10]	[28,16; 29,29]	[28,16; 29,28]	[27,98; 29,12]
		Median	26,78					27,34	27,55	27,65	27,74	27,68	27,77	27,76	28,06	27,90
		Fallbasis mittlere Differenz						441	419	394	378	350	334	319	303	290
		Mittlere Differenz zur ED						0,22	0,26	0,18	0,27	0,22	0,28	0,48	0,52	0,44
		CI mittlere Differenz						[-0,01; 0,45]	[0,04; 0,49]	[-0,05; 0,42]	[0,02; 0,52]	[-0,05; 0,48]	[0,01; 0,55]	[0,20; 0,75]	[0,24; 0,79]	[0,15; 0,72]
	Median mittlere Differenz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	179					114	104	99	92	81	80	71	75	75
		Anteil in %	27,93					25,85	24,82	25,13	24,34	23,14	23,95	22,26	24,75	25,86
		CI Anteil in %	[24,45; 31,40]					[21,76; 29,94]	[20,68; 28,96]	[20,84; 29,42]	[20,01; 28,67]	[18,72; 27,57]	[19,37; 28,54]	[17,69; 26,83]	[19,88; 29,62]	[20,81; 30,91]
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	299					189	180	169	163	156	145	135	118	114
		Anteil in %	46,65					42,86	42,96	42,89	43,12	44,57	43,41	42,32	38,94	39,31
		CI Anteil in %	[42,78; 50,51]					[38,23; 47,48]	[38,21; 47,71]	[38,00; 47,79]	[38,12; 48,12]	[39,36; 49,79]	[38,09; 48,74]	[36,89; 47,75]	[33,44; 44,44]	[33,68; 44,94]
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	163					138	135	126	123	113	109	113	110	101
		Anteil in %	25,43					31,29	32,22	31,98	32,54	32,29	32,63	35,42	36,30	34,83
		CI Anteil in %	[22,06; 28,80]					[26,96; 35,63]	[27,74; 36,70]	[27,37; 36,59]	[27,81; 37,27]	[27,38; 37,19]	[27,60; 37,67]	[30,17; 40,68]	[30,88; 41,73]	[29,33; 40,32]
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	1137	1096	1009	941	908	875	843	802	765	735	701	677	656	639
	auswertbar	Anzahl	1135	0	0	0	0	860	834	785	757	720	684	661	644	620
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	28,65					28,96	29,15	29,09	29,19	29,37	29,29	29,27	29,14	29,26
		CI Mean	[28,29; 29,01]					[28,45; 29,47]	[28,62; 29,67]	[28,56; 29,62]	[28,63; 29,75]	[28,72; 30,01]	[28,69; 29,89]	[28,63; 29,92]	[28,48; 29,79]	[28,59; 29,94]
		Median	27,78					27,87	28,22	28,20	28,31	28,34	28,40	28,36	28,22	28,40
		Fallbasis mittlere Differenz						859	833	784	756	719	683	660	643	619
		Mittlere Differenz zur ED						-0,04	0,12	0,04	0,09	0,33	0,25	0,23	0,18	0,18
		CI mittlere Differenz						[-0,25; 0,17]	[-0,11; 0,34]	[-0,18; 0,26]	[-0,14; 0,33]	[-0,06; 0,73]	[-0,01; 0,50]	[-0,01; 0,48]	[-0,07; 0,44]	[-0,07; 0,43]
	Median mittlere Differenz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	321					237	230	213	204	192	178	174	175	161
Anteil in %		28,28					27,56	27,58	27,13	26,95	26,67	26,02	26,32	27,17	25,97	
CI Anteil in %		[25,66; 30,90]					[24,57; 30,55]	[24,54; 30,61]	[24,02; 30,25]	[23,79; 30,11]	[23,43; 29,90]	[22,73; 29,31]	[22,96; 29,68]	[23,74; 30,61]	[22,51; 29,42]	
mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	411					297	280	270	254	240	231	220	218	205	
	Anteil in %	36,21					34,53	33,57	34,39	33,55	33,33	33,77	33,28	33,85	33,06	
	CI Anteil in %	[33,41; 39,01]					[31,36; 37,71]	[30,37; 36,78]	[31,07; 37,72]	[30,19; 36,92]	[29,89; 36,78]	[30,23; 37,32]	[29,69; 36,88]	[30,19; 37,51]	[29,36; 36,77]	
stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	403					326	324	302	299	288	275	267	251	254	
	Anteil in %	35,51					37,91	38,85	38,47	39,50	40,00	40,20	40,39	38,98	40,97	
	CI Anteil in %	[32,72; 38,29]					[34,66; 41,15]	[35,54; 42,16]	[35,07; 41,88]	[36,01; 42,98]	[36,42; 43,58]	[36,53; 43,88]	[36,65; 44,14]	[35,21; 42,74]	[37,09; 44,84]	

0.3. Ausgewertete Teilgruppen

Bei der tabellarischen Darstellung wird zum einen danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patienten dem DMP beigetreten sind. Zum anderen wird im vorliegenden „Gender-Bericht“ nach Frauen und Männern und in den Tabellen zu Patientenmerkmalen und -zahlen (sowie in einem separaten „Age-Bericht“) nach Altersgruppen differenziert.

Für die Altersauswertungen ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1 des Auswertungsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Kindern, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts gerade 5 Jahre alt geworden waren (und somit die Altersbedingung für die Programmteilnahme erfüllen), das rechnerische Alter „4“ zugewiesen, wenn Sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 5 Jahre alt gewesen waren. Daher beginnt die unterste Alterskategorie mit 4 und nicht mit 5 Jahren.

Für einige weitere Aspekte wird zusätzlich nach „Kollektiven“ unterschieden. Die sich hierdurch ergebenden Patientengruppen unterliegen besonderen Risiken (z.B. Raucherstatus). Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei der zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt wiederum unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. So wird beispielsweise ein Patient dem Kollektiv der Raucher zugeordnet, wenn in der Erstdokumentation der entsprechende Raucherstatus vermerkt ist. Der Patient bleibt dann – sofern er nicht aus dem DMP ausscheidet – über den gesamten Berichtszeitraum hinweg Mitglied des Raucherkollektivs, selbst wenn er noch innerhalb dieses Zeitraums mit dem Rauchen aufhört.

Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte

Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten, Geschlecht und Alter ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten insgesamt bzw. Patienten ≥18 Jahre jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2151	2055	1879	1744	1648	1571	1488	1399	1335	1261	1197	1144	1093	1051
	männlich	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
		Anteil in %	41,19	40,88	40,34	40,08	39,44	38,89	38,24	37,53	37,68	36,88	36,93	36,45	35,77	35,20
	weiblich	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
		Anteil in %	58,81	59,12	59,66	59,92	60,56	61,11	61,76	62,47	62,32	63,12	63,07	63,55	64,23	64,80
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	1778	1699	1556	1447	1383	1325	1272	1203	1151	1092	1041	1004	966	936
	männlich	Anzahl	641	603	547	506	475	450	429	401	386	357	340	327	310	297
		Anteil in %	36,05	35,49	35,15	34,97	34,35	33,96	33,73	33,33	33,54	32,69	32,66	32,57	32,09	31,73
	weiblich	Anzahl	1137	1096	1009	941	908	875	843	802	765	735	701	677	656	639
		Anteil in %	63,95	64,51	64,85	65,03	65,65	66,04	66,27	66,67	66,46	67,31	67,34	67,43	67,91	68,27
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	17487	16238	14752	13645	12938	12257	11501	10777	10126	9576	9047	8608	8177	
	männlich	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124	
		Anteil in %	41,10	40,99	40,70	40,53	40,27	40,04	39,59	39,37	39,12	38,85	38,74	38,52	38,20	
	weiblich	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	
		Anteil in %	58,90	59,01	59,30	59,47	59,73	59,96	60,41	60,63	60,88	61,15	61,26	61,48	61,80	
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	14168	13169	12005	11178	10678	10169	9640	9136	8650	8262	7878	7563	7247	
	männlich	Anzahl	5108	4731	4294	3980	3791	3594	3382	3202	3029	2891	2753	2642	2525	
		Anteil in %	36,05	35,93	35,77	35,61	35,50	35,34	35,08	35,05	35,02	34,99	34,95	34,93	34,84	
	weiblich	Anzahl	9060	8438	7711	7198	6887	6575	6258	5934	5621	5371	5125	4921	4722	
		Anteil in %	63,95	64,07	64,23	64,39	64,50	64,66	64,92	64,95	64,98	65,01	65,05	65,07	65,16	
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	36594	33413	30266	27986	26066	24096	22381	21028	19735	18643	17661	16674		
	männlich	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136		
		Anteil in %	39,90	39,50	39,07	38,79	38,59	38,40	38,05	37,89	37,60	37,34	37,18	36,80		
	weiblich	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538		
		Anteil in %	60,10	60,50	60,93	61,21	61,41	61,60	61,95	62,11	62,40	62,66	62,82	63,20		
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	30545	27932	25409	23615	22126	20544	19228	18183	17226	16391	15627	14856		
	männlich	Anzahl	10884	9823	8824	8143	7609	7036	6543	6178	5837	5527	5272	4983		
		Anteil in %	35,63	35,17	34,73	34,48	34,39	34,25	34,03	33,98	33,88	33,72	33,74	33,54		
	weiblich	Anzahl	19661	18109	16585	15472	14517	13508	12685	12005	11389	10864	10355	9873		
		Anteil in %	64,37	64,83	65,27	65,52	65,61	65,75	65,97	66,02	66,12	66,28	66,26	66,46		
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	46537	42312	38626	35455	32221	29627	27549	25684	24062	22567	21145			
	männlich	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054			
		Anteil in %	41,41	40,88	40,56	40,14	39,87	39,63	39,47	39,13	38,77	38,49	38,09			
	weiblich	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091			
		Anteil in %	58,59	59,12	59,44	59,86	60,13	60,37	60,53	60,87	61,23	61,51	61,91			
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	36770	33538	30754	28403	26013	24120	22623	21282	20122	19056	18007			
	männlich	Anzahl	13164	11828	10769	9836	8972	8290	7773	7278	6843	6460	6071			
		Anteil in %	35,80	35,27	35,02	34,63	34,49	34,37	34,36	34,20	34,01	33,90	33,71			
	weiblich	Anzahl	23606	21710	19985	18567	17041	15830	14850	14004	13279	12596	11936			
		Anteil in %	64,20	64,73	64,98	65,37	65,51	65,63	65,64	65,80	65,99	66,10	66,29			

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	57216	52179	47350	41574	37655	34608	32069	29863	27949	26196				
	männlich	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888				
		Anteil in %	40,93	40,47	40,25	39,74	39,34	39,13	38,71	38,41	38,11	37,75				
	weiblich	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308				
		Anteil in %	59,07	59,53	59,75	60,26	60,66	60,87	61,29	61,59	61,89	62,25				
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	46777	42770	38961	34431	31446	29123	27212	25566	24160	22823				
	männlich	Anzahl	16982	15323	13863	12099	10976	10130	9384	8783	8284	7783				
		Anteil in %	36,30	35,83	35,58	35,14	34,90	34,78	34,48	34,35	34,29	34,10				
	weiblich	Anzahl	29795	27447	25098	22332	20470	18993	17828	16783	15876	15040				
		Anteil in %	63,70	64,17	64,42	64,86	65,10	65,22	65,52	65,65	65,71	65,90				
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	53186	47656	42080	37956	34833	32209	30138	28230	26525					
	männlich	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023					
		Anteil in %	40,11	39,76	39,28	38,78	38,63	38,32	38,06	37,96	37,79					
	weiblich	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502					
		Anteil in %	59,89	60,24	60,72	61,22	61,37	61,68	61,94	62,04	62,21					
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	44083	39512	35084	31861	29434	27454	25885	24478	23155					
	männlich	Anzahl	15792	13969	12246	10985	10136	9407	8838	8388	7927					
		Anteil in %	35,82	35,35	34,90	34,48	34,44	34,26	34,14	34,27	34,23					
	weiblich	Anzahl	28291	25543	22838	20876	19298	18047	17047	16090	15228					
		Anteil in %	64,18	64,65	65,10	65,52	65,56	65,74	65,86	65,73	65,77					
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	41933	36034	31600	28142	25536	23546	21848	20316						
	männlich	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675						
		Anteil in %	40,88	40,35	39,77	39,20	38,82	38,40	38,06	37,78						
	weiblich	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641						
		Anteil in %	59,12	59,65	60,23	60,80	61,18	61,60	61,94	62,22						
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	34706	29814	26266	23486	21503	19978	18650	17494						
	männlich	Anzahl	12705	10720	9296	8170	7430	6854	6342	5935						
		Anteil in %	36,61	35,96	35,39	34,79	34,55	34,31	34,01	33,93						
	weiblich	Anzahl	22001	19094	16970	15316	14073	13124	12308	11559						
		Anteil in %	63,39	64,04	64,61	65,21	65,45	65,69	65,99	66,07						
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	35506	30515	26418	23343	21220	19393	17943							
	männlich	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818							
		Anteil in %	40,83	40,06	39,47	39,07	38,71	38,33	38,00							
	weiblich	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125							
		Anteil in %	59,17	59,94	60,53	60,93	61,29	61,67	62,00							
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	28839	24719	21537	19186	17560	16193	15117							
	männlich	Anzahl	10500	8753	7522	6624	5999	5506	5117							
		Anteil in %	36,41	35,41	34,93	34,53	34,16	34,00	33,85							
	weiblich	Anzahl	18339	15966	14015	12562	11561	10687	10000							
		Anteil in %	63,59	64,59	65,07	65,47	65,84	66,00	66,15							
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	38971	33390	28946	25816	23510	21517								
	männlich	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281								
		Anteil in %	40,73	40,01	39,50	39,13	38,82	38,49								
	weiblich	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236								
		Anteil in %	59,27	59,99	60,50	60,87	61,18	61,51								
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	32153	27551	23983	21536	19785	18226								
	männlich	Anzahl	11718	9792	8409	7489	6843	6258								
		Anteil in %	36,44	35,54	35,06	34,77	34,59	34,34								
	weiblich	Anzahl	20435	17759	15574	14047	12942	11968								
		Anteil in %	63,56	64,46	64,94	65,23	65,41	65,66								
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	36684	31381	27427	24398	22147									
	männlich	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568									
		Anteil in %	40,77	40,12	39,49	39,04	38,69									
	weiblich	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579									
		Anteil in %	59,23	59,88	60,51	60,96	61,31									
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	30007	25672	22497	20141	18416									
	männlich	Anzahl	11021	9222	7913	7013	6351									
		Anteil in %	36,73	35,92	35,17	34,82	34,49									
weiblich	Anzahl	18986	16450	14584	13128	12065										
	Anteil in %	63,27	64,08	64,83	65,18	65,51										

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	38606	33049	28802	25523											
	männlich	Anzahl	15409	12971	11106	9678											
		Anteil in %		39,91	39,25	38,56	37,92										
	weiblich	Anzahl	23197	20078	17696	15845											
		Anteil in %		60,09	60,75	61,44	62,08										
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	32384	27752	24323	21676											
	männlich	Anzahl	11705	9798	8410	7374											
		Anteil in %		36,14	35,31	34,58	34,02										
weiblich	Anzahl	20679	17954	15913	14302												
	Anteil in %		63,86	64,69	65,42	65,98											
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	34563	29652	25696												
	männlich	Anzahl	14050	11811	10082												
		Anteil in %		40,65	39,83	39,24											
	weiblich	Anzahl	20513	17841	15614												
		Anteil in %		59,35	60,17	60,76											
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	28294	24258	21143												
	männlich	Anzahl	10338	8628	7386												
		Anteil in %		36,54	35,57	34,93											
weiblich	Anzahl	17956	15630	13757													
	Anteil in %		63,46	64,43	65,07												
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	39846	34153													
	männlich	Anzahl	16002	13484													
		Anteil in %		40,16	39,48												
	weiblich	Anzahl	23844	20669													
		Anteil in %		59,84	60,52												
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	33162	28432													
	männlich	Anzahl	12019	10074													
		Anteil in %		36,24	35,43												
weiblich	Anzahl	21143	18358														
	Anteil in %		63,76	64,57													
2012-2	Patienten insgesamt	Anzahl	34647														
	männlich	Anzahl	14102														
		Anteil in %		40,70													
	weiblich	Anzahl	20545														
		Anteil in %		59,30													
	Patienten ≥18 Jahre insgesamt	Anzahl	28705														
	männlich	Anzahl	10491														
		Anteil in %		36,55													
weiblich	Anzahl	18214															
	Anteil in %		63,45														

Tabelle 1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen männlichen bzw. weiblichen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod,

Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2006-1	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	46	128	187	236	275	317	361	383	421	444	469	495	516	532	
		Anteil in %	5,19	14,45	21,11	26,64	31,04	35,78	40,74	43,23	47,52	50,11	52,93	55,87	58,24	60,05	
		CI Anteil in %	[3,73; 6,65]	[12,13; 16,76]	[18,42; 23,79]	[23,72; 29,55]	[27,99; 34,09]	[32,62; 38,94]	[37,51; 43,98]	[39,96; 46,49]	[44,23; 50,81]	[46,82; 53,41]	[49,65; 56,22]	[52,60; 59,14]	[54,99; 61,49]	[56,82; 63,27]	
	davon wegen Tod	Anzahl	1	3	8	15	19	21	24	27	32	36	38	43	48	51	
		Anteil in %	0,11	0,34	0,90	1,69	2,14	2,37	2,71	3,05	3,61	4,06	4,29	4,85	5,42	5,76	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	44	112	157	185	210	242	270	282	308	321	337	351	362	373	
		Anteil in %	4,97	12,64	17,72	20,88	23,70	27,31	30,47	31,83	34,76	36,23	38,04	39,62	40,86	42,10	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	8	11	25	32	37	47	52	59	61	65	70	74	76	
		Anteil in %	0,00	0,90	1,24	2,82	3,61	4,18	5,30	5,87	6,66	6,88	7,34	7,90	8,35	8,58	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	5	11	11	14	17	20	22	22	26	29	31	32	32	
		Anteil %	0,11	0,56	1,24	1,24	1,58	1,92	2,26	2,48	2,48	2,93	3,27	3,50	3,61	3,61	
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370	354
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	50	144	220	267	305	346	391	433	469	510	538	563	584	611	
		Anteil in %	3,95	11,38	17,39	21,11	24,11	27,35	30,91	34,23	37,08	40,32	42,53	44,51	46,17	48,30	
		CI Anteil in %	[2,88; 5,03]	[9,63; 13,13]	[15,30; 19,48]	[18,86; 23,36]	[21,75; 26,47]	[24,89; 29,81]	[28,36; 33,46]	[31,61; 36,85]	[34,41; 39,74]	[37,61; 43,02]	[39,80; 45,26]	[41,77; 47,25]	[43,42; 48,91]	[45,55; 51,06]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	4	6	10	13	17	22	27	31	36	39	44	46	50	
		Anteil in %	0,00	0,32	0,47	0,79	1,03	1,34	1,74	2,13	2,45	2,85	3,08	3,48	3,64	3,95	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	50	127	188	218	241	273	308	337	362	390	408	424	440	456	
		Anteil in %	3,95	10,04	14,86	17,23	19,05	21,58	24,35	26,64	28,62	30,83	32,25	33,52	34,78	36,05	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	10	20	31	40	43	46	52	56	62	67	70	73	77	
		Anteil in %	0,00	0,79	1,58	2,45	3,16	3,40	3,64	4,11	4,43	4,90	5,30	5,53	5,77	6,09	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	3	6	8	11	13	15	17	20	22	24	25	25	28	
		Anteil %	0,00	0,24	0,47	0,63	0,87	1,03	1,19	1,34	1,58	1,74	1,90	1,98	1,98	2,21	
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681	654	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-2	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	532	1184	1658	1978	2280	2635	2945	3227	3468	3683	3872	4064	4227	
		Anteil in %	7,40	16,47	23,07	27,52	31,72	36,66	40,97	44,89	48,25	51,24	53,87	56,54	58,81	
		CI Anteil in %	[6,80; 8,01]	[15,61; 17,33]	[22,09; 24,04]	[26,49; 28,55]	[30,64; 32,80]	[35,54; 37,77]	[39,83; 42,11]	[43,74; 46,04]	[47,09; 49,40]	[50,08; 52,39]	[52,72; 55,02]	[55,39; 57,68]	[57,67; 59,94]	
	davon wegen Tod	Anzahl	6	35	59	83	109	139	168	188	215	237	250	279	304	
		Anteil in %	0,08	0,49	0,82	1,15	1,52	1,93	2,34	2,62	2,99	3,30	3,48	3,88	4,23	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	486	977	1314	1510	1706	1900	2096	2296	2454	2603	2726	2848	2927	
		Anteil in %	6,76	13,59	18,28	21,01	23,73	26,43	29,16	31,94	34,14	36,21	37,92	39,62	40,72	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	33	143	237	313	380	487	564	617	662	690	728	760	808	
		Anteil in %	0,46	1,99	3,30	4,35	5,29	6,78	7,85	8,58	9,21	9,60	10,13	10,57	11,24	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	7	29	48	72	85	109	117	126	137	153	168	177	188	
		Anteil %	0,10	0,40	0,67	1,00	1,18	1,52	1,63	1,75	1,91	2,13	2,34	2,46	2,62	
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124	2961
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	717	1551	2184	2571	2950	3351	3765	4134	4443	4757	5007	5246	5430	
		Anteil in %	6,96	15,06	21,21	24,96	28,64	32,54	36,56	40,14	43,14	46,19	48,62	50,94	52,72	
		CI Anteil in %	[6,47; 7,45]	[14,37; 15,75]	[20,42; 22,00]	[24,13; 25,80]	[27,77; 29,52]	[31,63; 33,44]	[35,63; 37,49]	[39,19; 41,09]	[42,18; 44,10]	[45,23; 47,15]	[47,65; 49,58]	[49,97; 51,90]	[51,76; 53,69]	
	davon wegen Tod	Anzahl	6	36	68	97	120	148	183	216	252	299	326	359	387	
		Anteil in %	0,06	0,35	0,66	0,94	1,17	1,44	1,78	2,10	2,45	2,90	3,17	3,49	3,76	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	665	1299	1726	1953	2202	2420	2684	2925	3135	3337	3498	3644	3747	
		Anteil in %	6,46	12,61	16,76	18,96	21,38	23,50	26,06	28,40	30,44	32,40	33,96	35,38	36,38	
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	28	163	296	394	487	619	721	796	841	893	942	981	1024		
	Anteil in %	0,27	1,58	2,87	3,83	4,73	6,01	7,00	7,73	8,17	8,67	9,15	9,53	9,94		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	18	53	94	127	141	164	177	197	215	228	241	262	272		
	Anteil %	0,17	0,51	0,91	1,23	1,37	1,59	1,72	1,91	2,09	2,21	2,34	2,54	2,64		
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	4869	
2007-1	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	1401	2774	3744	4540	5347	6083	6632	7180	7638	8034	8464	8781		
		Anteil in %	9,60	19,00	25,64	31,10	36,62	41,66	45,42	49,18	52,32	55,03	57,97	60,14		
		CI Anteil in %	[9,12; 10,07]	[18,36; 19,64]	[24,94; 26,35]	[30,35; 31,85]	[35,84; 37,40]	[40,86; 42,46]	[44,62; 46,23]	[48,37; 49,99]	[51,50; 53,13]	[54,22; 55,83]	[57,17; 58,77]	[59,35; 60,94]		
	davon wegen Tod	Anzahl	27	71	123	179	236	293	345	390	437	486	530	568		
		Anteil in %	0,18	0,49	0,84	1,23	1,62	2,01	2,36	2,67	2,99	3,33	3,63	3,89		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1240	2225	2803	3341	3810	4281	4653	5015	5316	5572	5843	6005		
		Anteil in %	8,49	15,24	19,20	22,88	26,10	29,32	31,87	34,35	36,41	38,16	40,02	41,13		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	114	397	642	796	1008	1180	1286	1395	1481	1546	1634	1735		
		Anteil in %	0,78	2,72	4,40	5,45	6,90	8,08	8,81	9,55	10,14	10,59	11,19	11,88		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	20	81	176	224	293	329	348	380	404	430	457	473		
		Anteil %	0,14	0,55	1,21	1,53	2,01	2,25	2,38	2,60	2,77	2,95	3,13	3,24		
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136	
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136	5819	
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	1780	3554	4864	5988	7151	8130	8934	9679	10313	10899	11456	11938		
		Anteil in %	8,09	16,16	22,12	27,23	32,51	36,96	40,62	44,01	46,89	49,55	52,09	54,28		
		CI Anteil in %	[7,73; 8,45]	[15,67; 16,65]	[21,57; 22,66]	[26,64; 27,81]	[31,89; 33,13]	[36,33; 37,60]	[39,97; 41,27]	[43,35; 44,66]	[46,23; 47,55]	[48,89; 50,22]	[51,43; 52,75]	[53,62; 54,94]		
	davon wegen Tod	Anzahl	25	85	165	229	310	382	451	512	574	637	707	778		
		Anteil in %	0,11	0,39	0,75	1,04	1,41	1,74	2,05	2,33	2,61	2,90	3,21	3,54		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1612	2881	3656	4413	5099	5711	6216	6708	7119	7499	7860	8098		
		Anteil in %	7,33	13,10	16,62	20,06	23,18	25,97	28,26	30,50	32,37	34,10	35,74	36,82		
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	109	448	794	1022	1332	1584	1767	1923	2043	2161	2254	2395			
	Anteil in %	0,50	2,04	3,61	4,65	6,06	7,20	8,03	8,74	9,29	9,83	10,25	10,89			
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	34	140	249	324	410	453	500	536	577	602	635	667			
	Anteil %	0,15	0,64	1,13	1,47	1,86	2,06	2,27	2,44	2,62	2,74	2,89	3,03			
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538	10056		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2007-2	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	1974	3603	5040	6422	7529	8396	9219	9942	10584	11216	11713			
		Anteil in %	10,24	18,70	26,15	33,33	39,07	43,57	47,84	51,59	54,92	58,20	60,78			
		CI Anteil in %	[9,82; 10,67]	[18,15; 19,25]	[25,53; 26,78]	[32,66; 33,99]	[38,38; 39,76]	[42,87; 44,27]	[47,14; 48,55]	[50,89; 52,30]	[54,22; 55,63]	[57,51; 58,90]	[60,09; 61,47]			
	davon wegen Tod	Anzahl	25	94	167	231	290	345	406	478	528	597	652			
		Anteil in %	0,13	0,49	0,87	1,20	1,50	1,79	2,11	2,48	2,74	3,10	3,38			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1779	2917	3898	4710	5415	5990	6520	7007	7450	7862	8120			
		Anteil in %	9,23	15,14	20,23	24,44	28,10	31,08	33,83	36,36	38,66	40,80	42,14			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	146	477	776	1205	1506	1712	1918	2046	2169	2294	2457			
		Anteil in %	0,76	2,48	4,03	6,25	7,82	8,88	9,95	10,62	11,26	11,90	12,75			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	24	115	199	276	318	349	375	411	437	463	484			
		Anteil %	0,12	0,60	1,03	1,43	1,65	1,81	1,95	2,13	2,27	2,40	2,51			
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054		
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054	7557		
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	2251	4308	6042	7894	9381	10592	11634	12533	13386	14176	14760			
		Anteil in %	8,26	15,80	22,16	28,95	34,40	38,85	42,67	45,96	49,09	51,99	54,13			
		CI Anteil in %	[7,93; 8,58]	[15,37; 16,23]	[21,67; 22,65]	[28,41; 29,49]	[33,84; 34,97]	[38,27; 39,42]	[42,08; 43,25]	[45,37; 46,56]	[48,50; 49,69]	[51,40; 52,58]	[53,54; 54,72]			
	davon wegen Tod	Anzahl	24	106	173	245	307	388	457	550	625	696	765			
		Anteil in %	0,09	0,39	0,63	0,90	1,13	1,42	1,68	2,02	2,29	2,55	2,81			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2031	3406	4535	5621	6578	7372	8086	8683	9223	9746	10053			
		Anteil in %	7,45	12,49	16,63	20,61	24,12	27,04	29,65	31,84	33,82	35,74	36,87			
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	152	596	1025	1589	1984	2253	2464	2624	2825	2978	3152				
	Anteil in %	0,56	2,19	3,76	5,83	7,28	8,26	9,04	9,62	10,36	10,92	11,56				
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	44	200	309	439	512	579	627	676	713	756	790				
	Anteil %	0,16	0,73	1,13	1,61	1,88	2,12	2,30	2,48	2,61	2,77	2,90				
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091	12507			
2008-1	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2304	4360	6900	8605	9877	11006	11951	12769	13532	14160				
		Anteil in %	9,84	18,62	29,46	36,74	42,17	46,99	51,03	54,52	57,78	60,46				
		CI Anteil in %	[9,46; 10,22]	[18,12; 19,12]	[28,88; 30,05]	[36,12; 37,36]	[41,54; 42,81]	[46,35; 47,63]	[50,39; 51,67]	[53,88; 55,16]	[57,15; 58,41]	[59,83; 61,09]				
	davon wegen Tod	Anzahl	28	102	200	254	325	395	458	511	570	624				
		Anteil in %	0,12	0,44	0,85	1,08	1,39	1,69	1,96	2,18	2,43	2,66				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2089	3574	5034	6142	7028	7791	8475	9005	9517	9871				
		Anteil in %	8,92	15,26	21,49	26,23	30,01	33,27	36,19	38,45	40,64	42,15				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	139	526	1387	1878	2145	2404	2566	2767	2932	3122				
		Anteil in %	0,59	2,25	5,92	8,02	9,16	10,26	10,96	11,81	12,52	13,33				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	48	158	279	331	379	416	452	486	513	543				
		Anteil %	0,20	0,67	1,19	1,41	1,62	1,78	1,93	2,08	2,19	2,32				
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888			
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888	9260			
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	2733	5506	8742	10956	12731	14141	15402	16498	17488	18270				
		Anteil in %	8,09	16,29	25,87	32,42	37,67	41,84	45,57	48,82	51,75	54,06				
		CI Anteil in %	[7,80; 8,38]	[15,90; 16,69]	[25,40; 26,33]	[31,92; 32,92]	[37,15; 38,19]	[41,32; 42,37]	[45,04; 46,10]	[48,28; 49,35]	[51,21; 52,28]	[53,53; 54,59]				
	davon wegen Tod	Anzahl	19	100	194	274	349	419	502	578	669	745				
		Anteil in %	0,06	0,30	0,57	0,81	1,03	1,24	1,49	1,71	1,98	2,20				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2474	4479	6360	7829	9085	10057	10972	11706	12365	12820				
		Anteil in %	7,32	13,25	18,82	23,17	26,88	29,76	32,47	34,64	36,59	37,93				
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	174	721	1803	2379	2746	3051	3257	3481	3663	3880					
	Anteil in %	0,51	2,13	5,33	7,04	8,13	9,03	9,64	10,30	10,84	11,48					
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	66	206	385	474	551	614	671	733	791	825					
	Anteil %	0,20	0,61	1,14	1,40	1,63	1,82	1,99	2,17	2,34	2,44					
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308	15526				

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2008-2	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2384	4803	6614	7877	8991	9864	10617	11311	11869					
		Anteil in %	11,17	22,51	31,00	36,92	42,14	46,24	49,77	53,02	55,63					
		CI Anteil in %	[10,75; 11,60]	[21,95; 23,07]	[30,38; 31,62]	[36,27; 37,57]	[41,48; 42,81]	[45,57; 46,91]	[49,09; 50,44]	[52,35; 53,69]	[54,97; 56,30]					
	davon wegen Tod	Anzahl	24	99	174	229	293	365	419	488	540					
		Anteil in %	0,11	0,46	0,82	1,07	1,37	1,71	1,96	2,29	2,53					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2217	3969	5202	6096	6863	7490	8019	8487	8822					
		Anteil in %	10,39	18,60	24,38	28,57	32,17	35,11	37,59	39,78	41,35					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	110	615	1061	1324	1567	1710	1850	1980	2132					
		Anteil in %	0,52	2,88	4,97	6,21	7,35	8,02	8,67	9,28	9,99					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	33	120	177	228	268	299	329	356	375					
		Anteil %	0,15	0,56	0,83	1,07	1,26	1,40	1,54	1,67	1,76					
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt:</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21334</i>	<i>18950</i>	<i>16531</i>	<i>14720</i>	<i>13457</i>	<i>12343</i>	<i>11470</i>	<i>10717</i>	<i>10023</i>					
		<i>Anzahl</i>	<i>18950</i>	<i>16531</i>	<i>14720</i>	<i>13457</i>	<i>12343</i>	<i>11470</i>	<i>10717</i>	<i>10023</i>	<i>9465</i>					
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	3146	6303	8616	10476	11986	13184	14339	15350	16123					
		Anteil in %	9,88	19,79	27,05	32,89	37,63	41,39	45,02	48,19	50,62					
		CI Anteil in %	[9,55; 10,20]	[19,35; 20,23]	[26,56; 27,54]	[32,37; 33,41]	[37,10; 38,16]	[40,85; 41,93]	[44,47; 45,56]	[47,64; 48,74]	[50,07; 51,17]					
	davon wegen Tod	Anzahl	31	116	196	275	360	444	521	601	681					
		Anteil in %	0,10	0,36	0,62	0,86	1,13	1,39	1,64	1,89	2,14					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2912	5139	6687	7990	9051	9872	10667	11356	11809					
		Anteil in %	9,14	16,13	20,99	25,08	28,42	30,99	33,49	35,65	37,07					
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	156	857	1452	1854	2152	2379	2612	2808	3021						
	Anteil in %	0,49	2,69	4,56	5,82	6,76	7,47	8,20	8,82	9,48						
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	47	191	281	357	423	489	539	585	612						
	Anteil %	0,15	0,60	0,88	1,12	1,33	1,54	1,69	1,84	1,92						
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt:</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31852</i>	<i>28706</i>	<i>25549</i>	<i>23236</i>	<i>21376</i>	<i>19866</i>	<i>18668</i>	<i>17513</i>	<i>16502</i>						
	<i>Anzahl</i>	<i>28706</i>	<i>25549</i>	<i>23236</i>	<i>21376</i>	<i>19866</i>	<i>18668</i>	<i>17513</i>	<i>16502</i>	<i>15729</i>						
2009-1	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2604	4577	6110	7230	8101	8828	9468	9936						
		Anteil in %	15,19	26,70	35,64	42,17	47,26	51,50	55,23	57,96						
		CI Anteil in %	[14,65; 15,73]	[26,04; 27,36]	[34,92; 36,36]	[41,44; 42,91]	[46,51; 48,00]	[50,75; 52,24]	[54,49; 55,97]	[57,22; 58,70]						
	davon wegen Tod	Anzahl	21	62	108	156	195	234	267	303						
		Anteil in %	0,12	0,36	0,63	0,91	1,14	1,36	1,56	1,77						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2455	3881	4992	5819	6486	6994	7461	7734						
		Anteil in %	14,32	22,64	29,12	33,94	37,83	40,80	43,52	45,11						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	102	544	862	1080	1220	1369	1490	1623						
		Anteil in %	0,59	3,17	5,03	6,30	7,12	7,99	8,69	9,47						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	26	90	148	175	200	231	250	276						
		Anteil %	0,15	0,52	0,86	1,02	1,17	1,35	1,46	1,61						
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt:</i>	<i>Anzahl</i>	<i>17143</i>	<i>14539</i>	<i>12566</i>	<i>11033</i>	<i>9913</i>	<i>9042</i>	<i>8315</i>	<i>7675</i>						
		<i>Anzahl</i>	<i>14539</i>	<i>12566</i>	<i>11033</i>	<i>9913</i>	<i>9042</i>	<i>8315</i>	<i>7675</i>	<i>7207</i>						
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	3295	5756	7681	9167	10286	11257	12149	12804						
		Anteil in %	13,29	23,22	30,98	36,98	41,49	45,41	49,01	51,65						
		CI Anteil in %	[12,87; 13,71]	[22,69; 23,74]	[30,41; 31,56]	[36,38; 37,58]	[40,88; 42,11]	[44,79; 46,03]	[48,39; 49,63]	[51,03; 52,27]						
	davon wegen Tod	Anzahl	20	80	151	194	244	299	349	407						
		Anteil in %	0,08	0,32	0,61	0,78	0,98	1,21	1,41	1,64						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	3119	4908	6303	7383	8199	8901	9531	9922						
		Anteil in %	12,58	19,80	25,43	29,78	33,07	35,91	38,45	40,02						
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	120	639	1021	1326	1531	1702	1874	2055							
	Anteil in %	0,48	2,58	4,12	5,35	6,18	6,87	7,56	8,29							
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	36	129	206	264	312	355	395	420							
	Anteil %	0,15	0,52	0,83	1,06	1,26	1,43	1,59	1,69							
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt:</i>	<i>Anzahl</i>	<i>24790</i>	<i>21495</i>	<i>19034</i>	<i>17109</i>	<i>15623</i>	<i>14504</i>	<i>13533</i>	<i>12641</i>							
	<i>Anzahl</i>	<i>21495</i>	<i>19034</i>	<i>17109</i>	<i>15623</i>	<i>14504</i>	<i>13533</i>	<i>12641</i>	<i>11986</i>							

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2009-2	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2274	4069	5377	6282	7064	7679	8129							
		Anteil in %	15,69	28,07	37,09	43,33	48,73	52,97	56,07							
		CI Anteil in %	[15,09; 16,28]	[27,34; 28,80]	[36,30; 37,88]	[42,53; 44,14]	[47,91; 49,54]	[52,16; 53,78]	[55,27; 56,88]							
	davon wegen Tod	Anzahl	17	57	95	134	169	205	240							
		Anteil in %	0,12	0,39	0,66	0,92	1,17	1,41	1,66							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2125	3470	4421	5103	5645	6083	6368							
		Anteil in %	14,66	23,94	30,50	35,20	38,94	41,96	43,93							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	107	465	744	893	1063	1186	1303							
		Anteil in %	0,74	3,21	5,13	6,16	7,33	8,18	8,99							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	25	77	117	152	187	205	218							
		Anteil %	0,17	0,53	0,81	1,05	1,29	1,41	1,50							
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14497</i>	<i>12223</i>	<i>10428</i>	<i>9120</i>	<i>8215</i>	<i>7433</i>	<i>6818</i>							
		<i>Anzahl</i>	<i>12223</i>	<i>10428</i>	<i>9120</i>	<i>8215</i>	<i>7433</i>	<i>6818</i>	<i>6368</i>							
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	2717	5019	6786	8004	9049	9884	10547							
		Anteil in %	12,93	23,89	32,30	38,10	43,07	47,05	50,20							
		CI Anteil in %	[12,48; 13,39]	[23,31; 24,47]	[31,67; 32,93]	[37,44; 38,75]	[42,40; 43,74]	[46,37; 47,72]	[49,53; 50,88]							
	davon wegen Tod	Anzahl	15	80	130	177	218	259	309							
		Anteil in %	0,07	0,38	0,62	0,84	1,04	1,23	1,47							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2535	4224	5479	6383	7129	7727	8137							
		Anteil in %	12,07	20,11	26,08	30,38	33,93	36,78	38,73							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	126	567	967	1184	1402	1568	1740							
Anteil in %		0,60	2,70	4,60	5,64	6,67	7,46	8,28								
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	41	148	210	260	300	330	361								
	Anteil %	0,20	0,70	1,00	1,24	1,43	1,57	1,72								
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21009</i>	<i>18292</i>	<i>15990</i>	<i>14223</i>	<i>13005</i>	<i>11960</i>	<i>11125</i>								
	<i>Anzahl</i>	<i>18292</i>	<i>15990</i>	<i>14223</i>	<i>13005</i>	<i>11960</i>	<i>11125</i>	<i>10462</i>								
2010-1	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2514	4439	5770	6746	7592	8214								
		Anteil in %	15,84	27,97	36,35	42,50	47,83	51,75								
		CI Anteil in %	[15,27; 16,41]	[27,27; 28,66]	[35,60; 37,10]	[41,73; 43,27]	[47,05; 48,61]	[50,97; 52,53]								
	davon wegen Tod	Anzahl	18	55	100	136	182	214								
		Anteil in %	0,11	0,35	0,63	0,86	1,15	1,35								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2385	3828	4833	5531	6141	6541								
		Anteil in %	15,03	24,12	30,45	34,85	38,69	41,21								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	83	469	698	905	1074	1240								
		Anteil in %	0,52	2,95	4,40	5,70	6,77	7,81								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	28	87	139	174	195	219								
		Anteil %	0,18	0,55	0,88	1,10	1,23	1,38								
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15873</i>	<i>13359</i>	<i>11434</i>	<i>10103</i>	<i>9127</i>	<i>8281</i>								
		<i>Anzahl</i>	<i>13359</i>	<i>11434</i>	<i>10103</i>	<i>9127</i>	<i>8281</i>	<i>7659</i>								
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	3067	5586	7385	8715	9862	10693								
		Anteil in %	13,28	24,18	31,97	37,73	42,70	46,29								
		CI Anteil in %	[12,84; 13,72]	[23,63; 24,74]	[31,37; 32,57]	[37,11; 38,36]	[42,06; 43,33]	[45,65; 46,94]								
	davon wegen Tod	Anzahl	8	75	129	178	230	289								
		Anteil in %	0,03	0,32	0,56	0,77	1,00	1,25								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2914	4801	6170	7132	7971	8507								
		Anteil in %	12,62	20,79	26,71	30,88	34,51	36,83								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	114	598	897	1154	1365	1567								
Anteil in %		0,49	2,59	3,88	5,00	5,91	6,78									
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	31	112	189	251	296	330									
	Anteil %	0,13	0,48	0,82	1,09	1,28	1,43									
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23098</i>	<i>20031</i>	<i>17512</i>	<i>15713</i>	<i>14383</i>	<i>13236</i>									
	<i>Anzahl</i>	<i>20031</i>	<i>17512</i>	<i>15713</i>	<i>14383</i>	<i>13236</i>	<i>12405</i>									

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2010-2	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2368	4125	5433	6389	7058									
		Anteil in %	15,83	27,58	36,32	42,72	47,19									
		CI Anteil in %	[15,25; 16,42]	[26,86; 28,30]	[35,55; 37,09]	[41,92; 43,51]	[46,39; 47,99]									
	davon wegen Tod	Anzahl	13	67	119	156	197									
		Anteil in %	0,09	0,45	0,80	1,04	1,32									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2234	3559	4482	5178	5584									
		Anteil in %	14,94	23,79	29,97	34,62	37,33									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	90	415	701	892	1086									
		Anteil in %	0,60	2,77	4,69	5,96	7,26									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	31	84	131	163	191									
		Anteil %	0,21	0,56	0,88	1,09	1,28									
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14957</i>	<i>12589</i>	<i>10832</i>	<i>9524</i>	<i>8568</i>									
	<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12589</i>	<i>10832</i>	<i>9524</i>	<i>8568</i>	<i>7899</i>									
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	2935	5132	6853	8148	9077									
		Anteil in %	13,51	23,62	31,54	37,50	41,78									
		CI Anteil in %	[13,05; 13,96]	[23,06; 24,19]	[30,92; 32,16]	[36,86; 38,15]	[41,12; 42,43]									
	davon wegen Tod	Anzahl	18	68	118	178	217									
		Anteil in %	0,08	0,31	0,54	0,82	1,00									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2774	4503	5734	6681	7261									
		Anteil in %	12,77	20,73	26,39	30,75	33,42									
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	116	459	840	1088	1355										
	Anteil in %	0,53	2,11	3,87	5,01	6,24										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	27	102	161	201	244										
	Anteil %	0,12	0,47	0,74	0,93	1,12										
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21727</i>	<i>18792</i>	<i>16595</i>	<i>14874</i>	<i>13579</i>										
<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18792</i>	<i>16595</i>	<i>14874</i>	<i>13579</i>	<i>12650</i>										
2011-1	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2438	4303	5731	6600										
		Anteil in %	15,82	27,93	37,19	42,83										
		CI Anteil in %	[15,25; 16,40]	[27,22; 28,63]	[36,43; 37,96]	[42,05; 43,61]										
	davon wegen Tod	Anzahl	11	47	92	134										
		Anteil in %	0,07	0,31	0,60	0,87										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2320	3688	4738	5272										
		Anteil in %	15,06	23,93	30,75	34,21										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	85	487	787	1042										
		Anteil in %	0,55	3,16	5,11	6,76										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	22	81	114	152										
		Anteil %	0,14	0,53	0,74	0,99										
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15409</i>	<i>12971</i>	<i>11106</i>	<i>9678</i>										
	<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12971</i>	<i>11106</i>	<i>9678</i>	<i>8809</i>										
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	3119	5501	7352	8536										
		Anteil in %	13,45	23,71	31,69	36,80										
		CI Anteil in %	[13,01; 13,88]	[23,17; 24,26]	[31,09; 32,29]	[36,18; 37,42]										
	davon wegen Tod	Anzahl	28	75	125	175										
		Anteil in %	0,12	0,32	0,54	0,75										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2938	4697	6036	6762										
		Anteil in %	12,67	20,25	26,02	29,15										
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	125	619	1029	1375											
	Anteil in %	0,54	2,67	4,44	5,93											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	28	110	162	224											
	Anteil %	0,12	0,47	0,70	0,97											
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23197</i>	<i>20078</i>	<i>17696</i>	<i>15845</i>											
<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20078</i>	<i>17696</i>	<i>15845</i>	<i>14661</i>											

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2239	3968	5023											
		Anteil in %	15,94	28,24	35,75											
		CI Anteil in %	[15,33; 16,54]	[27,50; 28,99]	[34,96; 36,54]											
	davon wegen Tod	Anzahl	15	62	98											
		Anteil in %	0,11	0,44	0,70											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2108	3396	4043											
		Anteil in %	15,00	24,17	28,78											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	93	447	773											
		Anteil in %	0,66	3,18	5,50											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	23	63	109											
		Anteil %	0,16	0,45	0,78											
	<i>männl. Pat.</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14050</i>	<i>11811</i>	<i>10082</i>										
	<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11811</i>	<i>10082</i>	<i>9027</i>										
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	2672	4899	6364											
		Anteil in %	13,03	23,88	31,02											
		CI Anteil in %	[12,57; 13,49]	[23,30; 24,47]	[30,39; 31,66]											
	davon wegen Tod	Anzahl	22	77	121											
		Anteil in %	0,11	0,38	0,59											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2516	4210	5141											
		Anteil in %	12,27	20,52	25,06											
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	102	512	927												
	Anteil in %	0,50	2,50	4,52												
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	32	100	175												
	Anteil %	0,16	0,49	0,85												
<i>weibl. Pat.</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20513</i>	<i>17841</i>	<i>15614</i>											
<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>17841</i>	<i>15614</i>	<i>14149</i>											
2012-1	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	2518	4104												
		Anteil in %	15,74	25,65												
		CI Anteil in %	[15,17; 16,30]	[24,97; 26,32]												
	davon wegen Tod	Anzahl	11	49												
		Anteil in %	0,07	0,31												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2388	3474												
		Anteil in %	14,92	21,71												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	101	491												
		Anteil in %	0,63	3,07												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	18	90												
		Anteil %	0,11	0,56												
	<i>männl. Pat.</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16002</i>	<i>13484</i>											
	<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13484</i>	<i>11898</i>											
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	3175	5305												
		Anteil in %	13,32	22,25												
		CI Anteil in %	[12,88; 13,75]	[21,72; 22,78]												
	davon wegen Tod	Anzahl	17	75												
		Anteil in %	0,07	0,31												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2996	4450												
		Anteil in %	12,57	18,66												
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	123	670													
	Anteil in %	0,52	2,81													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	39	110													
	Anteil %	0,16	0,46													
<i>weibl. Pat.</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23844</i>	<i>20669</i>												
<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20669</i>	<i>18539</i>												

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2012-2	ausgeschiedene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	1618													
		Anteil in %	11,47													
		CI Anteil in %	[10,95; 12,00]													
	davon wegen Tod	Anzahl	10													
		Anteil in %	0,07													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1477													
		Anteil in %	10,47													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	110													
		Anteil in %	0,78													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	21													
		Anteil %	0,15													
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>14102</i>												
	<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>12484</i>												
	ausgeschiedene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	2021													
		Anteil in %	9,84													
		CI Anteil in %	[9,43; 10,24]													
	davon wegen Tod	Anzahl	18													
		Anteil in %	0,09													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1839													
		Anteil in %	8,95													
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	129														
	Anteil in %	0,63														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	35														
	Anteil %	0,17														
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>20545</i>													
<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	<i>18524</i>													

In Tabelle 1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebens-

jahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Kindern, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **12 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „11“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 12 Jahre alt waren.

Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2006-1	männliche Patienten	Mean	40,51
		CI Mean	[38,96; 42,06]
		Median	43,00
		<i>Fallbasis</i>	886
	weibliche Patienten	Mean	49,19
		CI Mean	[48,09; 50,28]
Median		52,00	
	<i>Fallbasis</i>	1265	
2006-2	männliche Patienten	Mean	39,77
		CI Mean	[39,22; 40,32]
		Median	43,00
		<i>Fallbasis</i>	7188
	weibliche Patienten	Mean	48,99
		CI Mean	[48,59; 49,39]
Median		53,00	
	<i>Fallbasis</i>	10299	
2007-1	männliche Patienten	Mean	41,43
		CI Mean	[41,05; 41,81]
		Median	44,00
		<i>Fallbasis</i>	14600
	weibliche Patienten	Mean	50,08
		CI Mean	[49,81; 50,36]
Median		53,00	
	<i>Fallbasis</i>	21994	
2007-2	männliche Patienten	Mean	37,45
		CI Mean	[37,12; 37,78]
		Median	39,00
		<i>Fallbasis</i>	19270
	weibliche Patienten	Mean	47,24
		CI Mean	[46,99; 47,49]
Median		50,00	
	<i>Fallbasis</i>	27267	
2008-1	männliche Patienten	Mean	38,57
		CI Mean	[38,28; 38,86]
		Median	40,00
		<i>Fallbasis</i>	23420
	weibliche Patienten	Mean	47,49
		CI Mean	[47,27; 47,71]
Median		49,00	
	<i>Fallbasis</i>	33796	

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2008-2	männliche Patienten	Mean	38,96
		CI Mean	[38,65; 39,26]
		Median	41,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>21334</i>
	weibliche Patienten	Mean	47,27
		CI Mean	[47,04; 47,50]
		Median	49,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>31852</i>
2009-1	männliche Patienten	Mean	37,78
		CI Mean	[37,45; 38,12]
		Median	39,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>17143</i>
	weibliche Patienten	Mean	46,54
		CI Mean	[46,28; 46,80]
		Median	48,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>24790</i>
2009-2	männliche Patienten	Mean	36,47
		CI Mean	[36,11; 36,83]
		Median	37,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>14497</i>
	weibliche Patienten	Mean	45,14
		CI Mean	[44,86; 45,43]
		Median	46,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>21009</i>
2010-1	männliche Patienten	Mean	37,71
		CI Mean	[37,36; 38,06]
		Median	39,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>15873</i>
	weibliche Patienten	Mean	45,89
		CI Mean	[45,62; 46,16]
		Median	47,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>23098</i>
2010-2	männliche Patienten	Mean	37,14
		CI Mean	[36,78; 37,50]
		Median	38,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>14957</i>
	weibliche Patienten	Mean	45,21
		CI Mean	[44,93; 45,49]
		Median	47,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>21727</i>
2011-1	männliche Patienten	Mean	37,79
		CI Mean	[37,44; 38,13]
		Median	39,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>15409</i>
	weibliche Patienten	Mean	45,78
		CI Mean	[45,51; 46,04]
		Median	47,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>23197</i>

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2011-2	männliche Patienten	Mean	36,81
		CI Mean	[36,44; 37,17]
		Median	37,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>14050</i>
	weibliche Patienten	Mean	45,04
		CI Mean	[44,75; 45,32]
		Median	46,00
<i>Fallbasis</i>		<i>20513</i>	
2012-1	männliche Patienten	Mean	37,44
		CI Mean	[37,10; 37,78]
		Median	38,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>16002</i>
	weibliche Patienten	Mean	45,41
		CI Mean	[45,15; 45,68]
		Median	47,00
<i>Fallbasis</i>		<i>23844</i>	
2012-2	männliche Patienten	Mean	36,59
		CI Mean	[36,23; 36,95]
		Median	37,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>14102</i>
	weibliche Patienten	Mean	44,77
		CI Mean	[44,49; 45,05]
		Median	46,00
<i>Fallbasis</i>		<i>20545</i>	

In Tabelle 1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter

in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Kindern, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **12 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „11“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 12 Jahre alt waren.

Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2006-1	männliche Patienten	4 bis 11	175
		12 bis 17	70
		18 bis 40	160
		41 bis 65	326
		66 und älter	155
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	886
	weibliche Patienten	4 bis 11	75
		12 bis 17	53
		18 bis 40	244
		41 bis 65	591
66 und älter		302	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	1265	
2006-2	männliche Patienten	4 bis 11	1491
		12 bis 17	589
		18 bis 40	1302
		41 bis 65	2548
		66 und älter	1258
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	7188
	weibliche Patienten	4 bis 11	809
		12 bis 17	430
		18 bis 40	1882
		41 bis 65	4505
66 und älter		2673	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	10299	
2007-1	männliche Patienten	4 bis 11	2474
		12 bis 17	1242
		18 bis 40	2866
		41 bis 65	5089
		66 und älter	2929
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	14600
	weibliche Patienten	4 bis 11	1445
		12 bis 17	888
		18 bis 40	4133
		41 bis 65	9163
66 und älter		6365	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	21994	
2007-2	männliche Patienten	4 bis 11	4250
		12 bis 17	1856
		18 bis 40	3890
		41 bis 65	6210
		66 und älter	3064
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	19270
	weibliche Patienten	4 bis 11	2259
		12 bis 17	1402
		18 bis 40	5719
		41 bis 65	11232
66 und älter		6655	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	27267	

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2008-1	männliche Patienten	4 bis 11	4173
		12 bis 17	2265
		18 bis 40	5308
		41 bis 65	7990
		66 und älter	3684
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	23420
	weibliche Patienten	4 bis 11	2281
		12 bis 17	1720
		18 bis 40	7555
		41 bis 65	13972
66 und älter		8268	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	33796	
2008-2	männliche Patienten	4 bis 11	3620
		12 bis 17	1922
		18 bis 40	5030
		41 bis 65	7408
		66 und älter	3354
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	21334
	weibliche Patienten	4 bis 11	1945
		12 bis 17	1616
		18 bis 40	7555
		41 bis 65	13112
66 und älter		7624	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	31852	
2009-1	männliche Patienten	4 bis 11	2838
		12 bis 17	1600
		18 bis 40	4533
		41 bis 65	5832
		66 und älter	2340
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	17143
	weibliche Patienten	4 bis 11	1601
		12 bis 17	1188
		18 bis 40	6239
		41 bis 65	10231
66 und älter		5531	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	24790	
2009-2	männliche Patienten	4 bis 11	2584
		12 bis 17	1413
		18 bis 40	4038
		41 bis 65	4603
		66 und älter	1859
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	14497
	weibliche Patienten	4 bis 11	1492
		12 bis 17	1178
		18 bis 40	5629
		41 bis 65	8364
66 und älter		4346	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	21009	
2010-1	männliche Patienten	4 bis 11	2712
		12 bis 17	1443
		18 bis 40	4178
		41 bis 65	5335
		66 und älter	2205
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	15873
	weibliche Patienten	4 bis 11	1479
		12 bis 17	1184
		18 bis 40	6185
		41 bis 65	9334
66 und älter		4916	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	23098	

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2010-2	männliche Patienten	4 bis 11	2663
		12 bis 17	1273
		18 bis 40	4075
		41 bis 65	4939
		66 und älter	2007
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	14957
	weibliche Patienten	4 bis 11	1581
		12 bis 17	1160
		18 bis 40	5709
		41 bis 65	8817
66 und älter		4460	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	21727	
2011-1	männliche Patienten	4 bis 11	2421
		12 bis 17	1283
		18 bis 40	4424
		41 bis 65	5268
		66 und älter	2013
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	15409
	weibliche Patienten	4 bis 11	1441
		12 bis 17	1077
		18 bis 40	6327
		41 bis 65	9613
66 und älter		4739	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	23197	
2011-2	männliche Patienten	4 bis 11	2513
		12 bis 17	1199
		18 bis 40	3917
		41 bis 65	4653
		66 und älter	1768
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	14050
	weibliche Patienten	4 bis 11	1444
		12 bis 17	1113
		18 bis 40	5584
		41 bis 65	8240
66 und älter		4132	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	20513	
2012-1	männliche Patienten	4 bis 11	2690
		12 bis 17	1293
		18 bis 40	4528
		41 bis 65	5541
		66 und älter	1950
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	16002
	weibliche Patienten	4 bis 11	1624
		12 bis 17	1077
		18 bis 40	6525
		41 bis 65	9999
66 und älter		4619	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	23844	
2012-2	männliche Patienten	4 bis 11	2427
		12 bis 17	1184
		18 bis 40	4132
		41 bis 65	4754
		66 und älter	1605
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	14102
	weibliche Patienten	4 bis 11	1321
		12 bis 17	1010
		18 bis 40	5947
		41 bis 65	8438
66 und älter		3829	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	20545	

In Tabelle 1.6 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **über alle Kohorten und alle Folgehalbjahre**. In diese Auswertung fließen alle Patienten unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet

zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	Folgehalbjahre	
Kohorte	männliche Patienten insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,14
		Median	3,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>805558</i>
	weibliche Patienten insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,41
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>1254119</i>

In Tabelle 1.7 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **pro Kohorte und über alle Folgehalbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
2006-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,20
		Median	10,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>5499</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	9,33
		Median	13,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>9483</i>	
2006-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,61
		Median	9,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>54730</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,05
		Median	11,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>82912</i>	
2007-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,76
		Median	8,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>98598</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,24
		Median	10,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>158876</i>	
2007-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,16
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>118775</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,62
		Median	9,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>180473</i>	
2008-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,53
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>129476</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,92
		Median	8,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>199967</i>	
2008-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,07
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>108211</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,38
		Median	8,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>171416</i>	
2009-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,26
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>73083</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,60
		Median	7,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>113939</i>	
2009-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,74
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>54237</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,03
		Median	6,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>84595</i>	

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	Folgehalbjahre	
2010-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,30
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>52304</i>
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,50
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>80875</i>
2010-2	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,78
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>41513</i>
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,94
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>63840</i>
2011-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,19
		Median	3,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>33755</i>
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,31
		Median	3,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>53619</i>
2011-2	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,56
		Median	2,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>21893</i>
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,63
		Median	2,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>33455</i>
2012-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	0,84
		Median	1,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>13484</i>
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	0,87
		Median	1,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>20669</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation

EZ	Patients ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		24	10	13	16	12	11	6	10	8	8	9	9	10	
		Anteil in %			2,86	1,32	1,86	2,46	1,96	1,93	1,14	1,99	1,72	1,81	2,16	2,30	2,70
		CI Anteil in %			[1,73; 3,98]	[0,51; 2,13]	[0,86; 2,86]	[1,27; 3,65]	[0,86; 3,07]	[0,80; 3,07]	[0,23; 2,05]	[0,77; 3,21]	[0,54; 2,90]	[0,57; 3,05]	[0,76; 3,55]	[0,81; 3,79]	[1,05; 4,36]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		36	19	18	6	17	6	14	8	17	21	19	13	20	
Anteil in %				2,96	1,69	1,72	0,60	1,77	0,65	1,60	0,96	2,14	2,78	2,61	1,85	2,94	
CI Anteil in %				[2,01; 3,92]	[0,94; 2,45]	[0,93; 2,51]	[0,12; 1,08]	[0,94; 2,61]	[0,13; 1,17]	[0,77; 2,43]	[0,30; 1,62]	[1,13; 3,14]	[1,61; 3,96]	[1,45; 3,77]	[0,85; 2,85]	[1,67; 4,21]	
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		204	160	158	245	188	141	106	118	111	108	114	127		
		Anteil in %			3,06	2,66	2,86	4,70	3,83	3,10	2,50	2,98	2,98	3,08	3,44	4,07	
		CI Anteil in %			[2,65; 3,48]	[2,26; 3,07]	[2,42; 3,30]	[4,13; 5,28]	[3,29; 4,37]	[2,59; 3,60]	[2,03; 2,97]	[2,45; 3,51]	[2,44; 3,53]	[2,51; 3,65]	[2,82; 4,06]	[3,37; 4,76]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		286	246	209	324	234	183	136	163	145	134	131	144		
Anteil in %				2,98	2,81	2,58	4,19	3,18	2,63	2,08	2,64	2,48	2,42	2,48	2,85		
CI Anteil in %				[2,64; 3,33]	[2,47; 3,16]	[2,23; 2,92]	[3,75; 4,64]	[2,78; 3,59]	[2,26; 3,01]	[1,74; 2,43]	[2,24; 3,04]	[2,08; 2,87]	[2,01; 2,82]	[2,06; 2,89]	[2,39; 3,31]		
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		559	564	707	491	325	301	305	273	264	237	264			
		Anteil in %			4,24	4,77	6,51	4,88	3,51	3,53	3,83	3,68	3,79	3,61	4,30		
		CI Anteil in %			[3,89; 4,58]	[4,39; 5,15]	[6,05; 6,98]	[4,46; 5,30]	[3,14; 3,89]	[3,14; 3,93]	[3,41; 4,25]	[3,25; 4,11]	[3,34; 4,24]	[3,16; 4,06]	[3,79; 4,81]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		808	846	1111	754	542	514	485	393	368	368	429			
Anteil in %				4,00	4,59	6,49	4,71	3,65	3,71	3,19	3,15	3,32	4,07				
CI Anteil in %				[3,73; 4,27]	[4,29; 4,89]	[6,12; 6,85]	[4,38; 5,04]	[3,35; 3,95]	[3,39; 4,02]	[3,39; 4,04]	[2,88; 3,50]	[2,83; 3,47]	[2,98; 3,65]	[3,69; 4,45]			
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		829	1193	866	550	482	479	429	340	396	416				
		Anteil in %			4,79	7,61	6,09	4,28	4,11	4,41	4,27	3,64	4,56	5,17			
		CI Anteil in %			[4,47; 5,11]	[7,20; 8,03]	[5,69; 6,48]	[3,93; 4,63]	[3,75; 4,46]	[4,02; 4,79]	[3,87; 4,66]	[3,26; 4,03]	[4,12; 5,00]	[4,68; 5,65]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1204	1629	1169	799	693	611	585	549	544	552				
Anteil in %				4,81	7,10	5,51	4,12	3,87	3,66	3,74	3,73	3,92	4,22				
CI Anteil in %				[4,55; 5,08]	[6,76; 7,43]	[5,20; 5,81]	[3,84; 4,40]	[3,59; 4,16]	[3,38; 3,95]	[3,44; 4,04]	[3,42; 4,03]	[3,60; 4,24]	[3,87; 4,56]				
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1784	1433	820	661	619	522	471	488	509					
		Anteil in %			8,45	7,52	4,96	4,46	4,57	4,20	4,11	4,58	5,15				
		CI Anteil in %			[8,07; 8,82]	[7,14; 7,89]	[4,63; 5,29]	[4,13; 4,79]	[4,22; 4,92]	[3,85; 4,56]	[3,74; 4,47]	[4,18; 4,98]	[4,71; 5,58]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2371	1900	1156	821	754	698	612	637	659					
Anteil in %				7,63	6,72	4,61	3,59	3,58	3,55	3,33	3,68	4,04					
CI Anteil in %				[7,34; 7,93]	[6,42; 7,01]	[4,35; 4,87]	[3,35; 3,84]	[3,33; 3,83]	[3,29; 3,81]	[3,07; 3,59]	[3,40; 3,96]	[3,74; 4,34]					
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1104	877	697	606	518	479	517	490						
		Anteil in %			5,83	5,31	4,74	4,50	4,20	4,18	4,82	4,89					
		CI Anteil in %			[5,49; 6,16]	[4,96; 5,65]	[4,39; 5,08]	[4,15; 4,85]	[3,84; 4,55]	[3,81; 4,54]	[4,42; 5,23]	[4,47; 5,31]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1564	1185	1018	912	838	736	753	768						
Anteil in %				5,45	4,64	4,38	4,27	4,22	3,94	4,30	4,65						
CI Anteil in %				[5,19; 5,71]	[4,38; 4,90]	[4,12; 4,64]	[4,00; 4,54]	[3,94; 4,50]	[3,66; 4,22]	[4,00; 4,60]	[4,33; 4,98]						

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		734	687	538	438	436	446	431					
		Anteil in %			5,05	5,47	4,88	4,42	4,82	5,36	5,62				
		CI Anteil in %			[4,69; 5,40]	[5,07; 5,86]	[4,47; 5,28]	[4,01; 4,82]	[4,38; 5,26]	[4,88; 5,85]	[5,10; 6,13]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		990	880	769	628	591	593	595					
Anteil in %				4,61	4,62	4,49	4,02	4,07	4,38	4,71					
CI Anteil in %				[4,33; 4,89]	[4,32; 4,92]	[4,18; 4,81]	[3,71; 4,33]	[3,75; 4,40]	[4,04; 4,73]	[4,34; 5,08]					
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		637	578	491	412	392	365						
		Anteil in %			5,21	5,54	5,38	5,02	5,27	5,35					
		CI Anteil in %			[4,82; 5,61]	[5,10; 5,98]	[4,92; 5,85]	[4,54; 5,49]	[4,77; 5,78]	[4,82; 5,89]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		876	839	692	586	597	602						
Anteil in %				4,79	5,25	4,87	4,51	4,99	5,41						
CI Anteil in %				[4,48; 5,10]	[4,90; 5,59]	[4,51; 5,22]	[4,15; 4,86]	[4,60; 5,38]	[4,99; 5,83]						
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		711	552	495	487	479							
		Anteil in %			5,32	4,83	4,90	5,34	5,78						
		CI Anteil in %			[4,94; 5,70]	[4,43; 5,22]	[4,48; 5,32]	[4,87; 5,80]	[5,28; 6,29]						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		925	795	681	656	698							
Anteil in %				4,62	4,54	4,33	4,56	5,27							
CI Anteil in %				[4,33; 4,91]	[4,23; 4,85]	[4,02; 4,65]	[4,22; 4,90]	[4,89; 5,65]							
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		630	628	521	506								
		Anteil in %			5,00	5,80	5,47	5,91							
		CI Anteil in %			[4,62; 5,39]	[5,36; 6,24]	[5,01; 5,93]	[5,41; 6,40]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		783	834	719	771								
Anteil in %				4,17	5,03	4,83	5,68								
CI Anteil in %				[3,88; 4,45]	[4,69; 5,36]	[4,49; 5,18]	[5,29; 6,07]								
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15409	12971	11106	9678									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		685	632	677									
		Anteil in %			5,28	5,69	7,00								
		CI Anteil in %			[4,90; 5,67]	[5,26; 6,12]	[6,49; 7,50]								
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23197	20078	17696	15845									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		981	941	917									
Anteil in %				4,89	5,32	5,79									
CI Anteil in %				[4,59; 5,18]	[4,99; 5,65]	[5,42; 6,15]									
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14050	11811	10082										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		616	706										
		Anteil in %			5,22	7,00									
		CI Anteil in %			[4,81; 5,62]	[6,50; 7,50]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20513	17841	15614										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		860	936										
Anteil in %				4,82	5,99										
CI Anteil in %				[4,51; 5,13]	[5,62; 6,37]										
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16002	13484											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		913											
		Anteil in %			6,77										
		CI Anteil in %			[6,35; 7,20]										
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23844	20669											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1356											
Anteil in %				6,56											
CI Anteil in %				[6,22; 6,90]											

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2012-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14102													
		Anzahl														
	ohne medizinische Dokumentation	Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20545													
		Anzahl														
	ohne medizinische Dokumentation	Anteil in %														
		CI Anteil in %														

Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Raucherstatus
- Gewichtsentwicklung (BMI)

Symptomatik

- Asthmasymptome
- stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale

Klinische Verlaufsparemeter

- Peak-Flow-Wert

Medikation

- Medikation nach Medikamentengruppen

Prozessparameter

- Asthaschulungen
- Überprüfung der Inhalationstechnik
- Schriftlicher Selbstmanagementplan
- Tabakverzicht

Sterberaten

- Sterberaten

3.1 Risikofaktoren

Im Folgenden werden die Auswertungen für zwei Variablen dargestellt, die als Risikofaktoren entweder die Entstehung asthmatischer Erkrankungen begünstigen oder bei bereits Erkrankten Asthmaanfälle auslösen können: Rauchen und Gewicht (hier dargestellt anhand des Body-Mass-Index (BMI)).

Zunächst werden die Auswertungen zum Raucherstatus dargestellt. Rauchen gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Erkrankungen der Atemwege, somit auch für Asthma. Eine wichtige Zielsetzung des DMP in der Asthmatherapie ist demzufolge eine Veränderung des Rauchverhaltens der Patienten, die letztlich zur Reduktion des Raucheranteils unter den DMP-Teilnehmern führen soll. In der Auswertung werden nur die Raucher betrachtet, die zum Beitrittszeitpunkt 18 Jahre oder älter waren.

Daran anschließend werden die Auswertungen zur Gewichtsentwicklung anhand des BMI dargestellt. Der BMI ist eine Maßzahl zur Bewertung des Körpergewichts, in die auch die Körpergröße mit einbezogen wird. Er wird berechnet aus dem Körper-

gewicht in Kilogramm und der Körpergröße in Meter im Quadrat ($BMI = \text{kg/m}^2$). BMI-Werte unter $18,5 \text{ kg/m}^2$ sind als untergewichtig, BMI-Werte zwischen $18,5$ und 25 kg/m^2 sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und 30 kg/m^2 sind als mäßig übergewichtig und BMI-Werte über 30 kg/m^2 als stark übergewichtig (adipös) einzustufen.

In Tabelle 3.1.1 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **erwachsenen Raucher (≥ 18 Jahre) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen erwachsenen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren. Zunächst wird für jede Kohorte unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definationsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

Tabelle 3.1.1 Raucher ≥ 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation

EZ	Raucher ≥ 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2006-1	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	139	123	110	101	92	88	81	73	68	62	59	55	53	50
	auswertbar	Anzahl		120	108	98	89	84	77	71	66	62	58	53	52	50
	Raucher	Anzahl		102	82	69	64	56	49	48	43	39	36	32	34	33
		Anteil in %		85,00	75,93	70,41	71,91	66,67	63,64	67,61	65,15	62,90	62,07	60,38	65,38	66,00
		CI Anteil in %		[78,58; 91,42]	[67,83; 84,03]	[61,32; 79,49]	[62,52; 81,30]	[56,52; 76,81]	[52,82; 74,45]	[56,64; 78,57]	[53,57; 76,74]	[50,78; 75,03]	[49,47; 74,67]	[47,08; 73,67]	[52,33; 78,44]	[52,74; 79,26]
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>641</i>	<i>603</i>	<i>547</i>	<i>506</i>	<i>475</i>	<i>450</i>	<i>429</i>	<i>401</i>	<i>386</i>	<i>357</i>	<i>340</i>	<i>327</i>	<i>310</i>	<i>297</i>
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	196	184	166	153	149	141	132	124	120	117	112	108	108	104
	auswertbar	Anzahl		177	163	149	149	139	131	123	120	116	112	107	104	102
	Raucher	Anzahl		154	127	113	108	84	81	78	71	67	65	65	65	63
		Anteil in %		87,01	77,91	75,84	72,48	60,43	61,83	63,41	59,17	57,76	58,04	60,75	62,50	61,76
CI Anteil in %			[82,04; 91,97]	[71,53; 84,30]	[68,94; 82,74]	[65,29; 79,68]	[52,27; 68,59]	[53,48; 70,18]	[54,87; 71,96]	[50,34; 68,00]	[48,73; 66,79]	[48,85; 67,22]	[51,45; 70,04]	[53,15; 71,85]	[52,29; 71,24]	
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1137</i>	<i>1096</i>	<i>1009</i>	<i>941</i>	<i>908</i>	<i>875</i>	<i>843</i>	<i>802</i>	<i>765</i>	<i>735</i>	<i>701</i>	<i>677</i>	<i>656</i>	<i>639</i>	
2006-2	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	1062	931	811	719	675	637	585	547	519	491	460	435	406	
	auswertbar	Anzahl		893	796	691	630	608	573	542	504	477	448	422	390	
	Raucher	Anzahl		805	682	575	459	431	398	374	337	319	302	280	256	
		Anteil in %		90,15	85,68	83,21	72,86	70,89	69,46	69,00	66,87	66,88	67,41	66,35	65,64	
		CI Anteil in %		[88,19; 92,10]	[83,24; 88,11]	[80,42; 86,00]	[69,38; 76,33]	[67,27; 74,50]	[65,68; 73,23]	[65,11; 72,90]	[62,75; 70,98]	[62,65; 71,10]	[63,07; 71,76]	[61,84; 70,86]	[60,92; 70,36]	
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5108</i>	<i>4731</i>	<i>4294</i>	<i>3980</i>	<i>3791</i>	<i>3594</i>	<i>3382</i>	<i>3202</i>	<i>3029</i>	<i>2891</i>	<i>2753</i>	<i>2642</i>	<i>2525</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	1429	1285	1128	1029	965	909	866	808	747	702	665	622	583	
	auswertbar	Anzahl		1233	1105	1009	926	886	839	782	733	686	649	603	567	
	Raucher	Anzahl		1081	908	792	658	611	572	523	476	438	421	390	363	
		Anteil in %		87,67	82,17	78,49	71,06	68,96	68,18	66,88	64,94	63,85	64,87	64,68	64,02	
CI Anteil in %			[85,84; 89,51]	[79,91; 84,43]	[75,96; 81,03]	[68,14; 73,98]	[65,91; 72,01]	[65,02; 71,33]	[63,58; 70,18]	[61,48; 68,40]	[60,25; 67,45]	[61,19; 68,54]	[60,86; 68,49]	[60,07; 67,98]		
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9060</i>	<i>8438</i>	<i>7711</i>	<i>7198</i>	<i>6887</i>	<i>6575</i>	<i>6258</i>	<i>5934</i>	<i>5621</i>	<i>5371</i>	<i>5125</i>	<i>4921</i>	<i>4722</i>		

EZ	Raucher ≥ 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
2007-1	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2183	1872	1601	1458	1349	1216	1113	1039	968	899	849	792	
	auswertbar	Anzahl		1777	1512	1373	1274	1174	1075	1004	928	872	824	767	
	Raucher	Anzahl		1569	1226	941	850	781	695	650	592	540	511	470	
		Anteil in %		88,29	81,08	68,54	66,72	66,52	64,65	64,74	63,79	61,93	62,01	61,28	
		CI Anteil in %		[86,80; 89,79]	[79,11; 83,06]	[66,08; 70,99]	[64,13; 69,31]	[63,82; 69,23]	[61,79; 67,51]	[61,78; 67,70]	[60,70; 66,89]	[58,70; 65,15]	[58,70; 65,33]	[57,83; 64,73]	
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10884</i>	<i>9823</i>	<i>8824</i>	<i>8143</i>	<i>7609</i>	<i>7036</i>	<i>6543</i>	<i>6178</i>	<i>5837</i>	<i>5527</i>	<i>5272</i>	<i>4983</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3014	2707	2369	2166	1968	1792	1649	1557	1446	1362	1280	1190	
	auswertbar	Anzahl		2589	2248	2004	1850	1731	1588	1505	1394	1321	1233	1148	
	Raucher	Anzahl		2309	1855	1413	1291	1189	1056	980	909	840	791	710	
		Anteil in %		89,19	82,52	70,51	69,78	68,69	66,50	65,12	65,21	63,59	64,15	61,85	
		CI Anteil in %		[87,99; 90,38]	[80,95; 84,09]	[68,51; 72,51]	[67,69; 71,88]	[66,50; 70,87]	[64,18; 68,82]	[62,71; 67,53]	[62,71; 67,71]	[60,99; 66,18]	[61,47; 66,83]	[59,04; 64,66]	
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>19661</i>	<i>18109</i>	<i>16585</i>	<i>15472</i>	<i>14517</i>	<i>13508</i>	<i>12685</i>	<i>12005</i>	<i>11389</i>	<i>10864</i>	<i>10355</i>	<i>9873</i>	
2007-2	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2993	2571	2238	1975	1735	1557	1430	1316	1219	1138	1051		
	auswertbar	Anzahl		2412	2044	1820	1643	1484	1359	1258	1177	1097	1010		
	Raucher	Anzahl		2106	1474	1298	1152	1012	939	847	788	731	660		
		Anteil in %		87,31	72,11	71,32	70,12	68,19	69,09	67,33	66,95	66,64	65,35		
		CI Anteil in %		[85,98; 88,64]	[70,17; 74,06]	[69,24; 73,40]	[67,90; 72,33]	[65,82; 70,56]	[66,64; 71,55]	[64,74; 69,92]	[64,26; 69,64]	[63,84; 69,43]	[62,41; 68,28]		
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13164</i>	<i>11828</i>	<i>10769</i>	<i>9836</i>	<i>8972</i>	<i>8290</i>	<i>7773</i>	<i>7278</i>	<i>6843</i>	<i>6460</i>	<i>6071</i>		
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	4123	3654	3270	2952	2636	2356	2165	2010	1872	1744	1623		
	auswertbar	Anzahl		3446	3001	2746	2516	2265	2082	1940	1794	1679	1548		
	Raucher	Anzahl		3047	2261	2020	1835	1601	1461	1343	1220	1124	1040		
		Anteil in %		88,42	75,34	73,56	72,93	70,68	70,17	69,23	68,00	66,94	67,18		
		CI Anteil in %		[87,35; 89,49]	[73,80; 76,88]	[71,91; 75,21]	[71,20; 74,67]	[68,81; 72,56]	[68,21; 72,14]	[67,17; 71,28]	[65,85; 70,16]	[64,69; 69,20]	[64,84; 69,52]		
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23606</i>	<i>21710</i>	<i>19985</i>	<i>18567</i>	<i>17041</i>	<i>15830</i>	<i>14850</i>	<i>14004</i>	<i>13279</i>	<i>12596</i>	<i>11936</i>		
2008-1	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3886	3346	2920	2392	2054	1839	1657	1533	1406	1290			
	auswertbar	Anzahl		3020	2605	2252	1955	1743	1599	1469	1343	1240			
	Raucher	Anzahl		2513	1982	1698	1430	1259	1124	1020	924	845			
		Anteil in %		83,21	76,08	75,40	73,15	72,23	70,29	69,43	68,80	68,15			
		CI Anteil in %		[81,88; 84,55]	[74,45; 77,72]	[73,62; 77,18]	[71,18; 75,11]	[70,13; 74,33]	[68,05; 72,53]	[67,08; 71,79]	[66,32; 71,28]	[65,55; 70,74]			
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16982</i>	<i>15323</i>	<i>13863</i>	<i>12099</i>	<i>10976</i>	<i>10130</i>	<i>9384</i>	<i>8783</i>	<i>8284</i>	<i>7783</i>			
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	5497	4918	4375	3688	3296	2983	2747	2541	2332	2180			
	auswertbar	Anzahl		4484	3983	3471	3167	2877	2654	2445	2237	2110			
	Raucher	Anzahl		3797	3033	2617	2333	2098	1908	1735	1579	1470			
		Anteil in %		84,68	76,15	75,40	73,67	72,92	71,89	70,96	70,59	69,67			
		CI Anteil in %		[83,62; 85,73]	[74,82; 77,47]	[73,96; 76,83]	[72,13; 75,20]	[71,30; 74,55]	[70,18; 73,60]	[69,16; 72,76]	[68,70; 72,47]	[67,71; 71,63]			
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>29795</i>	<i>27447</i>	<i>25098</i>	<i>22332</i>	<i>20470</i>	<i>18993</i>	<i>17828</i>	<i>16783</i>	<i>15876</i>	<i>15040</i>			
2008-2	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3371	2839	2341	2015	1804	1637	1507	1408	1323				
	auswertbar	Anzahl		2648	2200	1914	1726	1572	1436	1348	1257				
	Raucher	Anzahl		2451	1953	1649	1459	1287	1159	1062	977				
		Anteil in %		92,56	88,77	86,15	84,53	81,87	80,71	78,78	77,72				
		CI Anteil in %		[91,56; 93,56]	[87,45; 90,09]	[84,61; 87,70]	[82,82; 86,24]	[79,97; 83,78]	[78,67; 82,75]	[76,60; 80,97]	[75,42; 80,03]				
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15792</i>	<i>13969</i>	<i>12246</i>	<i>10985</i>	<i>10136</i>	<i>9407</i>	<i>8838</i>	<i>8388</i>	<i>7927</i>				
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	4645	4006	3371	2956	2649	2418	2235	2063	1918				
	auswertbar	Anzahl		3733	3175	2797	2520	2308	2139	1960	1832				
	Raucher	Anzahl		3422	2805	2388	2100	1895	1708	1544	1396				
		Anteil in %		91,67	88,35	85,38	83,33	82,11	79,85	78,78	76,20				
		CI Anteil in %		[90,78; 92,56]	[87,23; 89,46]	[84,07; 86,69]	[81,88; 84,79]	[80,54; 83,67]	[78,15; 81,55]	[76,96; 80,59]	[74,25; 78,15]				
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>28291</i>	<i>25543</i>	<i>22838</i>	<i>20876</i>	<i>19298</i>	<i>18047</i>	<i>17047</i>	<i>16090</i>	<i>15228</i>				

EZ	Raucher ≥ 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2775	2247	1857	1550	1373	1246	1117	1027					
	auswertbar	Anzahl		2106	1731	1457	1310	1186	1046	963					
	Raucher	Anzahl		1968	1560	1285	1121	1003	879	797					
		Anteil in %		93,45	90,12	88,19	85,57	84,57	84,03	82,76					
		CI Anteil in %		[92,39; 94,50]	[88,72; 91,53]	[86,54; 89,85]	[83,67; 87,48]	[82,51; 86,63]	[81,81; 86,26]	[80,38; 85,15]					
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12705</i>	<i>10720</i>	<i>9296</i>	<i>8170</i>	<i>7430</i>	<i>6854</i>	<i>6342</i>	<i>5935</i>					
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3618	3028	2561	2216	1993	1826	1691	1563					
	auswertbar	Anzahl		2852	2416	2118	1918	1744	1604	1495					
	Raucher	Anzahl		2656	2153	1849	1649	1454	1306	1207					
		Anteil in %		93,13	89,11	87,30	85,97	83,37	81,42	80,74					
		CI Anteil in %		[92,20; 94,06]	[87,87; 90,36]	[85,88; 88,72]	[84,42; 87,53]	[81,62; 85,12]	[79,52; 83,33]	[78,74; 82,74]					
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>22001</i>	<i>19094</i>	<i>16970</i>	<i>15316</i>	<i>14073</i>	<i>13124</i>	<i>12308</i>	<i>11559</i>					
2009-2	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2510	1984	1602	1359	1199	1070	962						
	auswertbar	Anzahl		1857	1504	1276	1141	1003	909						
	Raucher	Anzahl		1738	1357	1137	997	869	781						
		Anteil in %		93,59	90,23	89,11	87,38	86,64	85,92						
		CI Anteil in %		[92,48; 94,71]	[88,72; 91,73]	[87,40; 90,82]	[85,45; 89,31]	[84,53; 88,75]	[83,66; 88,18]						
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10500</i>	<i>8753</i>	<i>7522</i>	<i>6624</i>	<i>5999</i>	<i>5506</i>	<i>5117</i>						
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3314	2741	2300	1971	1777	1611	1486						
	auswertbar	Anzahl		2581	2160	1884	1698	1530	1411						
	Raucher	Anzahl		2414	1941	1657	1473	1311	1184						
		Anteil in %		93,53	89,86	87,95	86,75	85,69	83,91						
		CI Anteil in %		[92,58; 94,48]	[88,59; 91,13]	[86,48; 89,42]	[85,14; 88,36]	[83,93; 87,44]	[81,99; 85,83]						
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18339</i>	<i>15966</i>	<i>14015</i>	<i>12562</i>	<i>11561</i>	<i>10687</i>	<i>10000</i>						
2010-1	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2544	2003	1640	1410	1254	1114							
	auswertbar	Anzahl		1881	1552	1325	1166	1046							
	Raucher	Anzahl		1790	1411	1190	1025	903							
		Anteil in %		95,16	90,91	89,81	87,91	86,33							
		CI Anteil in %		[94,19; 96,13]	[89,48; 92,35]	[88,18; 91,44]	[86,04; 89,78]	[84,25; 88,41]							
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11718</i>	<i>9792</i>	<i>8409</i>	<i>7489</i>	<i>6843</i>	<i>6258</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3469	2892	2407	2106	1893	1724							
	auswertbar	Anzahl		2750	2287	2009	1782	1636							
	Raucher	Anzahl		2584	2072	1792	1566	1405							
		Anteil in %		93,96	90,60	89,20	87,88	85,88							
		CI Anteil in %		[93,07; 94,85]	[89,40; 91,80]	[87,84; 90,56]	[86,36; 89,39]	[84,19; 87,57]							
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20435</i>	<i>17759</i>	<i>15574</i>	<i>14047</i>	<i>12942</i>	<i>11968</i>							
2010-2	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2544	1962	1600	1372	1234								
	auswertbar	Anzahl		1860	1500	1303	1157								
	Raucher	Anzahl		1748	1373	1157	1014								
		Anteil in %		93,98	91,53	88,80	87,64								
		CI Anteil in %		[92,90; 95,06]	[90,12; 92,94]	[87,08; 90,51]	[85,74; 89,54]								
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11021</i>	<i>9222</i>	<i>7913</i>	<i>7013</i>	<i>6351</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3481	2877	2478	2171	1938								
	auswertbar	Anzahl		2730	2349	2041	1839								
	Raucher	Anzahl		2587	2139	1791	1579								
		Anteil in %		94,76	91,06	87,75	85,86								
		CI Anteil in %		[93,93; 95,60]	[89,91; 92,21]	[86,33; 89,17]	[84,27; 87,45]								
	<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18986</i>	<i>16450</i>	<i>14584</i>	<i>13128</i>	<i>12065</i>								

EZ	Raucher ≥ 18 Jahre zur ED in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
2011-1	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2590	2070	1713	1465									
	auswertbar	Anzahl		1947	1596	1359									
	Raucher	Anzahl		1856	1454	1227									
		Anteil in %		95,33	91,10	90,29									
		CI Anteil in %		[94,39; 96,26]	[89,71; 92,50]	[88,71; 91,86]									
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11705</i>	<i>9798</i>	<i>8410</i>	<i>7374</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3689	3090	2630	2288									
	auswertbar	Anzahl		2927	2487	2129									
	Raucher	Anzahl		2794	2286	1911									
		Anteil in %		95,46	91,92	89,76									
	CI Anteil in %		[94,70; 96,21]	[90,85; 92,99]	[88,47; 91,05]										
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20679</i>	<i>17954</i>	<i>15913</i>	<i>14302</i>										
2011-2	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2396	1855	1539										
	auswertbar	Anzahl		1732	1415										
	Raucher	Anzahl		1652	1319										
		Anteil in %		95,38	93,22										
		CI Anteil in %		[94,39; 96,37]	[91,90; 94,53]										
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10338</i>	<i>8628</i>	<i>7386</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3210	2681	2258										
	auswertbar	Anzahl		2536	2118										
	Raucher	Anzahl		2399	1917										
		Anteil in %		94,60	90,51										
	CI Anteil in %		[93,72; 95,48]	[89,26; 91,76]											
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>17956</i>	<i>15630</i>	<i>13757</i>											
2012-1	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2630	2090											
	auswertbar	Anzahl		1902											
	Raucher	Anzahl		1812											
		Anteil in %		95,27											
		CI Anteil in %		[94,31; 96,22]											
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12019</i>	<i>10074</i>											
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3808	3189											
	auswertbar	Anzahl		2943											
	Raucher	Anzahl		2801											
		Anteil in %		95,17											
	CI Anteil in %		[94,40; 95,95]												
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21143</i>	<i>18358</i>												
2012-2	männliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	2499												
	auswertbar	Anzahl													
	Raucher	Anzahl													
		Anteil in %													
		CI Anteil in %													
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10491</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder ≥ 18 Jahre zur ED insgesamt	Anzahl	3434												
	auswertbar	Anzahl													
	Raucher	Anzahl													
		Anteil in %													
	CI Anteil in %														
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18214</i>													

In Tabelle 3.1.2 werden Anzahl und Anteile der aktuell **erwachsenen Raucher (≥ 18 Jahre)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insgesamt“ angegeben, wie viele

Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Berichtshalbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

Tabelle 3.1.2 Raucherquote bei allen Patienten ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr

EZ	Raucherquote bei allen Patienten ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	641	603	556	514	489	461	442	411	401	369	357	343	329	312
	auswertbar	Anzahl	641	585	549	507	477	452	434	407	392	362	350	335	321	305
	Raucher	Anzahl	139	121	99	91	84	77	73	68	62	59	54	45	51	50
		Anteil in %	21,68	20,68	18,03	17,95	17,61	17,04	16,82	16,71	15,82	16,30	15,43	13,43	15,89	16,39
		CI Anteil in %	[18,49; 24,88]	[17,40; 23,97]	[14,81; 21,25]	[14,60; 21,29]	[14,19; 21,03]	[13,57; 20,51]	[13,30; 20,34]	[13,08; 20,34]	[12,20; 19,43]	[12,49; 20,11]	[11,64; 19,22]	[9,78; 17,09]	[11,88; 19,89]	[12,23; 20,56]
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	1137	1096	1014	944	914	880	853	812	782	751	716	689	673	654
	auswertbar	Anzahl	1137	1061	996	929	910	867	847	798	775	736	698	673	661	635
	Raucher	Anzahl	196	181	165	149	142	111	111	108	102	93	89	89	92	88
		Anteil in %	17,24	17,06	16,57	16,04	15,60	12,80	13,11	13,53	13,16	12,64	12,75	13,22	13,92	13,86
		CI Anteil in %	[15,04; 19,43]	[14,79; 19,32]	[14,26; 18,88]	[13,68; 18,40]	[13,25; 17,96]	[10,58; 15,03]	[10,83; 15,38]	[11,16; 15,91]	[10,78; 15,54]	[10,23; 15,04]	[10,27; 15,23]	[10,66; 15,79]	[11,28; 16,56]	[11,17; 16,55]
2006-2	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	5108	4788	4343	4059	3865	3701	3468	3294	3110	2989	2842	2740	2609	
	auswertbar	Anzahl	5108	4622	4231	3940	3690	3576	3369	3222	3029	2905	2768	2657	2526	
	Raucher	Anzahl	1062	958	811	714	616	580	533	503	453	430	409	386	353	
		Anteil in %	20,79	20,73	19,17	18,12	16,69	16,22	15,82	15,61	14,96	14,80	14,78	14,53	13,97	
		CI Anteil in %	[19,68; 21,90]	[19,56; 21,90]	[17,98; 20,35]	[16,92; 19,32]	[15,49; 17,90]	[15,01; 17,43]	[14,59; 17,05]	[14,36; 16,86]	[13,69; 16,23]	[13,51; 16,09]	[13,45; 16,10]	[13,19; 15,87]	[12,62; 15,33]	
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	9060	8500	7762	7287	6967	6671	6340	6022	5698	5462	5200	5006	4798	
	auswertbar	Anzahl	9060	8242	7551	7100	6701	6473	6183	5908	5561	5328	5085	4885	4670	
	Raucher	Anzahl	1429	1298	1112	1005	865	814	773	707	664	615	581	542	515	
		Anteil in %	15,77	15,75	14,73	14,15	12,91	12,58	12,50	11,97	11,94	11,54	11,43	11,10	11,03	
		CI Anteil in %	[15,02; 16,52]	[14,96; 16,54]	[13,93; 15,53]	[13,34; 14,97]	[12,11; 13,71]	[11,77; 13,38]	[11,68; 13,33]	[11,14; 12,79]	[11,09; 12,79]	[10,68; 12,40]	[10,55; 12,30]	[10,21; 11,98]	[10,13; 11,93]	
2007-1	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	10884	9823	8932	8232	7768	7168	6707	6323	6006	5675	5447	5135		
	auswertbar	Anzahl	10884	9370	8479	7705	7399	6939	6484	6098	5788	5482	5270	4948		
	Raucher	Anzahl	2183	1798	1444	1210	1113	1023	918	861	804	745	710	662		
		Anteil in %	20,06	19,19	17,03	15,70	15,04	14,74	14,16	14,12	13,89	13,59	13,47	13,38		
		CI Anteil in %	[19,30; 20,81]	[18,39; 19,99]	[16,23; 17,83]	[14,89; 16,52]	[14,23; 15,86]	[13,91; 15,58]	[13,31; 15,01]	[13,25; 14,99]	[13,00; 14,78]	[12,68; 14,50]	[12,55; 14,39]	[12,43; 14,33]		
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	19661	18109	16713	15577	14660	13628	12827	12128	11529	10982	10493	9985		
	auswertbar	Anzahl	19660	17371	15932	14594	13970	13143	12383	11701	11172	10654	10157	9593		
	Raucher	Anzahl	3014	2654	2224	1803	1693	1565	1424	1342	1259	1169	1101	1013		
		Anteil in %	15,33	15,28	13,96	12,35	12,12	11,91	11,50	11,47	11,27	10,97	10,84	10,56		
		CI Anteil in %	[14,83; 15,83]	[14,74; 15,81]	[13,42; 14,50]	[11,82; 12,89]	[11,58; 12,66]	[11,35; 12,46]	[10,94; 12,06]	[10,89; 12,05]	[10,68; 11,86]	[10,38; 11,57]	[10,24; 11,44]	[9,94; 11,17]		
2007-2	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	13164	12034	10955	10117	9212	8582	8017	7550	7084	6747	6317			
	auswertbar	Anzahl	13164	11413	10127	9494	8818	8229	7680	7252	6833	6469	6037			
	Raucher	Anzahl	2993	2437	1855	1665	1508	1357	1246	1143	1083	1003	906			
		Anteil in %	22,74	21,35	18,32	17,54	17,10	16,49	16,22	15,76	15,85	15,50	15,01			
		CI Anteil in %	[22,02; 23,45]	[20,60; 22,10]	[17,56; 19,07]	[16,77; 18,30]	[16,32; 17,89]	[15,69; 17,29]	[15,40; 17,05]	[14,92; 16,60]	[14,98; 16,72]	[14,62; 16,39]	[14,11; 15,91]			
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	23606	21943	20179	18867	17295	16106	15084	14272	13507	12842	12164			
	auswertbar	Anzahl	23605	20851	18782	17826	16595	15485	14549	13752	13024	12357	11672			
	Raucher	Anzahl	4123	3518	2788	2530	2291	2041	1885	1752	1615	1520	1426			
		Anteil in %	17,47	16,87	14,84	14,19	13,81	13,18	12,96	12,74	12,40	12,30	12,22			
		CI Anteil in %	[16,98; 17,95]	[16,36; 17,38]	[14,34; 15,35]	[13,68; 14,71]	[13,28; 14,33]	[12,65; 13,71]	[12,41; 13,50]	[12,18; 13,30]	[11,83; 12,97]	[11,72; 12,88]	[11,62; 12,81]			

EZ	Raucherquote bei allen Patienten ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
2008-1	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	16982	15323	14091	12283	11236	10355	9658	9015	8551	8010			
	auswertbar	Anzahl	16982	14024	13016	11703	10753	9911	9266	8688	8199	7647			
	Raucher	Anzahl	3886	3010	2463	2124	1853	1636	1484	1370	1268	1176			
		Anteil in %	22,88	21,46	18,92	18,15	17,23	16,51	16,02	15,77	15,47	15,38			
		CI Anteil in %	[22,25; 23,51]	[20,78; 22,14]	[18,25; 19,60]	[17,45; 18,85]	[16,52; 17,95]	[15,78; 17,24]	[15,27; 16,76]	[15,00; 16,54]	[14,68; 16,25]	[14,57; 16,19]			
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	29795	27447	25326	22512	20749	19224	18097	17006	16130	15271			
	auswertbar	Anzahl	29795	25381	23626	21488	20033	18564	17478	16469	15559	14685			
	Raucher	Anzahl	5497	4522	3746	3279	2974	2677	2449	2259	2068	1931			
		Anteil in %	18,45	17,82	15,86	15,26	14,85	14,42	14,01	13,72	13,29	13,15			
		CI Anteil in %	[18,01; 18,89]	[17,35; 18,29]	[15,39; 16,32]	[14,78; 15,74]	[14,35; 15,34]	[13,92; 14,93]	[13,50; 14,53]	[13,19; 14,24]	[12,76; 13,82]	[12,60; 13,70]			
2008-2	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	15792	14301	12512	11363	10461	9819	9197	8766	8258				
	auswertbar	Anzahl	15792	13406	11854	10841	10012	9426	8835	8364	7894				
	Raucher	Anzahl	3371	2788	2246	1965	1745	1598	1453	1332	1236				
		Anteil in %	21,35	20,80	18,95	18,13	17,43	16,95	16,45	15,93	15,66				
		CI Anteil in %	[20,71; 21,99]	[20,11; 21,48]	[18,24; 19,65]	[17,40; 18,85]	[16,69; 18,17]	[16,20; 17,71]	[15,67; 17,22]	[15,14; 16,71]	[14,86; 16,46]				
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	28291	25874	23121	21272	19646	18442	17394	16470	15566				
	auswertbar	Anzahl	28291	24457	22048	20364	18819	17688	16735	15787	14866				
	Raucher	Anzahl	4645	3873	3238	2841	2546	2358	2157	1979	1813				
		Anteil in %	16,42	15,84	14,69	13,95	13,53	13,33	12,89	12,54	12,20				
		CI Anteil in %	[15,99; 16,85]	[15,38; 16,29]	[14,22; 15,15]	[13,48; 14,43]	[13,04; 14,02]	[12,83; 13,83]	[12,38; 13,40]	[12,02; 13,05]	[11,67; 12,72]				
2009-1	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	12705	10720	9455	8304	7631	7022	6550	6108					
	auswertbar	Anzahl	12705	10138	8939	7916	7306	6712	6210	5789					
	Raucher	Anzahl	2775	2181	1796	1511	1353	1224	1098	995					
		Anteil in %	21,84	21,51	20,09	19,09	18,52	18,24	17,68	17,19					
		CI Anteil in %	[21,12; 22,56]	[20,71; 22,31]	[19,26; 20,92]	[18,22; 19,95]	[17,63; 19,41]	[17,31; 19,16]	[16,73; 18,63]	[16,22; 18,16]					
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	22001	19094	17137	15455	14259	13292	12509	11736					
	auswertbar	Anzahl	22001	18214	16352	14782	13686	12764	11972	11191					
	Raucher	Anzahl	3618	2967	2513	2191	1986	1797	1633	1504					
		Anteil in %	16,44	16,29	15,37	14,82	14,51	14,08	13,64	13,44					
		CI Anteil in %	[15,95; 16,93]	[15,75; 16,83]	[14,82; 15,92]	[14,25; 15,39]	[13,92; 15,10]	[13,48; 14,68]	[13,03; 14,25]	[12,81; 14,07]					
2009-2	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	10500	8933	7661	6818	6165	5703	5275						
	auswertbar	Anzahl	10500	8439	7211	6461	5870	5402	5017						
	Raucher	Anzahl	2510	1945	1534	1301	1151	1030	935						
		Anteil in %	23,90	23,05	21,27	20,14	19,61	19,07	18,64						
		CI Anteil in %	[23,09; 24,72]	[22,15; 23,95]	[20,33; 22,22]	[19,16; 21,11]	[18,59; 20,62]	[18,02; 20,11]	[17,56; 19,71]						
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	18339	16195	14197	12796	11756	10918	10209						
	auswertbar	Anzahl	18339	15412	13458	12177	11236	10381	9677						
	Raucher	Anzahl	3314	2721	2231	1946	1748	1600	1469						
		Anteil in %	18,07	17,66	16,58	15,98	15,56	15,41	15,18						
		CI Anteil in %	[17,51; 18,63]	[17,05; 18,26]	[15,95; 17,21]	[15,33; 16,63]	[14,89; 16,23]	[14,72; 16,11]	[14,47; 15,90]						

EZ	Raucherquote bei allen Patienten ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-1	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	11718	9792	8531	7594	7011	6396								
	auswertbar	Anzahl	11718	9252	8110	7234	6626	6035								
	Raucher	Anzahl	2544	1974	1616	1387	1228	1106								
		Anteil in %	21,71	21,34	19,93	19,17	18,53	18,33								
		CI Anteil in %	[20,96; 22,46]	[20,50; 22,17]	[19,06; 20,80]	[18,27; 20,08]	[17,60; 19,47]	[17,35; 19,30]								
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	20435	17759	15741	14176	13129	12129								
	auswertbar	Anzahl	20435	16918	15029	13558	12529	11499								
	Raucher	Anzahl	3469	2835	2334	2065	1841	1664								
		Anteil in %	16,98	16,76	15,53	15,23	14,69	14,47								
		CI Anteil in %	[16,46; 17,49]	[16,19; 17,32]	[14,95; 16,11]	[14,63; 15,84]	[14,07; 15,31]	[13,83; 15,11]								
2010-2	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	11021	9404	8060	7216	6523									
	auswertbar	Anzahl	11021	8891	7590	6819	6143									
	Raucher	Anzahl	2544	1954	1567	1357	1189									
		Anteil in %	23,08	21,98	20,65	19,90	19,36									
		CI Anteil in %	[22,30; 23,87]	[21,12; 22,84]	[19,73; 21,56]	[18,95; 20,85]	[18,37; 20,34]									
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	18986	16680	14775	13407	12293									
	auswertbar	Anzahl	18986	15973	14048	12763	11611									
	Raucher	Anzahl	3481	2842	2375	2067	1847									
		Anteil in %	18,33	17,79	16,91	16,20	15,91									
		CI Anteil in %	[17,78; 18,88]	[17,20; 18,39]	[16,29; 17,53]	[15,56; 16,83]	[15,24; 16,57]									
2011-1	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	11705	9798	8536	7482										
	auswertbar	Anzahl	11705	9228	8047	6968										
	Raucher	Anzahl	2590	2013	1636	1391										
		Anteil in %	22,13	21,81	20,33	19,96										
		CI Anteil in %	[21,38; 22,88]	[20,97; 22,66]	[19,45; 21,21]	[19,02; 20,90]										
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	20679	17954	16050	14413										
	auswertbar	Anzahl	20679	17079	15205	13590										
	Raucher	Anzahl	3689	3071	2565	2188										
		Anteil in %	17,84	17,98	16,87	16,10										
		CI Anteil in %	[17,32; 18,36]	[17,41; 18,56]	[16,27; 17,46]	[15,48; 16,72]										
2011-2	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	10338	8813	7529											
	auswertbar	Anzahl	10338	8323	6992											
	Raucher	Anzahl	2396	1817	1491											
		Anteil in %	23,18	21,83	21,32											
		CI Anteil in %	[22,36; 23,99]	[20,94; 22,72]	[20,36; 22,28]											
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	17956	15865	13942											
	auswertbar	Anzahl	17956	15091	13105											
	Raucher	Anzahl	3210	2606	2137											
		Anteil in %	17,88	17,27	16,31											
		CI Anteil in %	[17,32; 18,44]	[16,67; 17,87]	[15,67; 16,94]											

EZ	Raucherquote bei allen Patienten ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	12019	10074													
	auswertbar	Anzahl	12019	9331													
	Raucher	Anzahl	2630	1941													
		Anteil in %	21,88	20,80													
		CI Anteil in %	[21,14; 22,62]	[19,98; 21,63]													
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	21143	18358													
	auswertbar	Anzahl	21143	17123													
	Raucher	Anzahl	3808	3009													
Anteil in %		18,01	17,57														
	CI Anteil in %	[17,49; 18,53]	[17,00; 18,14]														
2012-2	männl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	10491														
	auswertbar	Anzahl	10491														
	Raucher	Anzahl	2499														
		Anteil in %	23,82														
		CI Anteil in %	[23,01; 24,64]														
	weibl. Pat. ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr insges.	Anzahl	18214														
	auswertbar	Anzahl	18214														
	Raucher	Anzahl	3434														
Anteil in %		18,85															
	CI Anteil in %	[18,29; 19,42]															

In Tabelle 3.1.3 ist die Entwicklung des **Body-Mass-Index** für erwachsene Patienten zur Erstdokumentation (ED) ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „erwachsene männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen erwachsenen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnung und Kategorienbildung. Als Mittelwerte werden das arithmetische Mittel und dessen 95%-iges Konfidenzintervall, der Median, sowie die mittlere Differenz des aktuellen Wertes zum Wert laut Erstdokumentation ausgewiesen. Für die Berechnung dieser durchschnittlichen Differenz zwischen BMI im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen

als die Anzahl der auswertbaren Erwachsenen im Berichtshalbjahr und wird deswegen gesondert aufgeführt. Abschließend werden die Patienten in den BMI-Kategorien (normalgewichtig, mäßig übergewichtig, stark übergewichtig) dargestellt und es wird ausgewiesen wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

Vor der Einführung der neuen eDMP-Dokumentationsbögen im Halbjahr 2008-2 konnten für Erwachsene die BMI-Werte nur im Beitrittsjahr, nicht aber in den Folgehalbjahren ermittelt werden. Durchgängige Werte können daher erst ab der Kohorte 2009-1 ausgewiesen werden, da die medizinischen Dokumentationsbögen ab dieser Kohorte erstmalig für die Folgehalbjahre die benötigten Werte enthielten.

Tabelle 3.1.3 Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr		
2006-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	641	603	547	506	475	450	429	401	386	357	340	327	310	297	
	auswertbar	Anzahl	641	0	0	0	0	441	419	394	378	350	334	319	303	290	
		Mean	27,58					28,27	28,34	28,34	28,48	28,46	28,55	28,72	28,72	28,55	
	Auswertungsergebnisse zum BMI		CI Mean	[27,22; 27,94]					[27,80; 28,74]	[27,86; 28,82]	[27,85; 28,82]	[27,97; 28,99]	[27,94; 28,98]	[28,01; 29,10]	[28,16; 29,29]	[28,16; 29,28]	[27,98; 29,12]
			Median	26,78					27,34	27,55	27,65	27,74	27,68	27,77	27,76	28,06	27,90
			Fallbasis mittlere Differenz						441	419	394	378	350	334	319	303	290
			Mittlere Differenz zur ED						0,22	0,26	0,18	0,27	0,22	0,28	0,48	0,52	0,44
			CI mittlere Differenz						[-0,01; 0,45]	[0,04; 0,49]	[-0,05; 0,42]	[0,02; 0,52]	[-0,05; 0,48]	[0,01; 0,55]	[0,20; 0,75]	[0,24; 0,79]	[0,15; 0,72]
			Median mittlere Differenz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	normalgewichtig: BMI < 25		Anzahl	179					114	104	99	92	81	80	71	75	75
			Anteil in %	27,93					25,85	24,82	25,13	24,34	23,14	23,95	22,26	24,75	25,86
			CI Anteil in %	[24,45; 31,40]					[21,76; 29,94]	[20,68; 28,96]	[20,84; 29,42]	[20,01; 28,67]	[18,72; 27,57]	[19,37; 28,54]	[17,69; 26,83]	[19,88; 29,62]	[20,81; 30,91]
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	299					189	180	169	163	156	145	135	118	114
			Anteil in %	46,65					42,86	42,96	42,89	43,12	44,57	43,41	42,32	38,94	39,31
			CI Anteil in %	[42,78; 50,51]					[38,23; 47,48]	[38,21; 47,71]	[38,00; 47,79]	[38,12; 48,12]	[39,36; 49,79]	[38,09; 48,74]	[36,89; 47,75]	[33,44; 44,44]	[33,68; 44,94]
	stark adipös: BMI ≥ 30		Anzahl	163					138	135	126	123	113	109	113	110	101
			Anteil in %	25,43					31,29	32,22	31,98	32,54	32,29	32,63	35,42	36,30	34,83
			CI Anteil in %	[22,06; 28,80]					[26,96; 35,63]	[27,74; 36,70]	[27,37; 36,59]	[27,81; 37,27]	[27,38; 37,19]	[27,60; 37,67]	[30,17; 40,68]	[30,88; 41,73]	[29,33; 40,32]
		erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	1137	1096	1009	941	908	875	843	802	765	735	701	677	656	639
	auswertbar	Anzahl	1135	0	0	0	0	860	834	785	757	720	684	661	644	620	
		Mean	28,65					28,96	29,15	29,09	29,19	29,37	29,29	29,27	29,14	29,26	
	Auswertungsergebnisse zum BMI		CI Mean	[28,29; 29,01]					[28,45; 29,47]	[28,62; 29,67]	[28,56; 29,62]	[28,63; 29,75]	[28,72; 30,01]	[28,69; 29,89]	[28,63; 29,92]	[28,48; 29,79]	[28,59; 29,94]
			Median	27,78					27,87	28,22	28,20	28,31	28,34	28,40	28,36	28,22	28,40
			Fallbasis mittlere Differenz						859	833	784	756	719	683	660	643	619
			Mittlere Differenz zur ED						-0,04	0,12	0,04	0,09	0,33	0,25	0,23	0,18	0,18
			CI mittlere Differenz						[-0,25; 0,17]	[-0,11; 0,34]	[-0,18; 0,26]	[-0,14; 0,33]	[-0,06; 0,73]	[-0,01; 0,50]	[-0,01; 0,48]	[-0,07; 0,44]	[-0,07; 0,43]
			Median mittlere Differenz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	normalgewichtig: BMI < 25		Anzahl	321					237	230	213	204	192	178	174	175	161
			Anteil in %	28,28					27,56	27,58	27,13	26,95	26,67	26,02	26,32	27,17	25,97
			CI Anteil in %	[25,66; 30,90]					[24,57; 30,55]	[24,54; 30,61]	[24,02; 30,25]	[23,79; 30,11]	[23,43; 29,90]	[22,73; 29,31]	[22,96; 29,68]	[23,74; 30,61]	[22,51; 29,42]
mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	411					297	280	270	254	240	231	220	218	205	
		Anteil in %	36,21					34,53	33,57	34,39	33,55	33,33	33,77	33,28	33,85	33,06	
		CI Anteil in %	[33,41; 39,01]					[31,36; 37,71]	[30,37; 36,78]	[31,07; 37,72]	[30,19; 36,92]	[29,89; 36,78]	[30,23; 37,32]	[29,69; 36,88]	[30,19; 37,51]	[29,36; 36,77]	
stark adipös: BMI ≥ 30		Anzahl	403					326	324	302	299	288	275	267	251	254	
		Anteil in %	35,51					37,91	38,85	38,47	39,50	40,00	40,20	40,39	38,98	40,97	
		CI Anteil in %	[32,72; 38,29]					[34,66; 41,15]	[35,54; 42,16]	[35,07; 41,88]	[36,01; 42,98]	[36,42; 43,58]	[36,53; 43,88]	[36,65; 44,14]	[35,21; 42,74]	[37,09; 44,84]	

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	5108	4731	4294	3980	3791	3594	3382	3202	3029	2891	2753	2642	2525
	auswertbar	Anzahl	5101	0	0	0	3594	3450	3265	3126	2942	2807	2680	2562	2439
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	27,98				28,36	28,43	28,39	28,54	28,59	28,74	28,75	28,77	28,78
		CI Mean	[27,82; 28,13]				[28,14; 28,58]	[28,21; 28,66]	[28,17; 28,60]	[28,31; 28,77]	[28,34; 28,83]	[28,48; 29,01]	[28,49; 29,01]	[28,52; 29,01]	[28,53; 29,04]
		Median	27,28				27,47	27,68	27,51	27,73	27,74	27,76	27,76	27,76	27,78
		Fallbasis mittlere Differenz					3590	3446	3262	3122	2938	2803	2676	2560	2437
		Mittlere Differenz zur ED					0,07	0,15	0,15	0,24	0,26	0,34	0,32	0,41	0,39
		CI mittlere Differenz					[0,00; 0,14]	[0,07; 0,23]	[0,06; 0,23]	[0,15; 0,33]	[0,16; 0,35]	[0,23; 0,45]	[0,22; 0,42]	[0,31; 0,51]	[0,29; 0,50]
		Median mittlere Differenz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	1393				910	868	819	777	723	670	646	581	565
		Anteil in %	27,31				25,32	25,16	25,08	24,86	24,58	23,87	24,10	22,68	23,17
		CI Anteil in %	[26,09; 28,53]				[23,90; 26,74]	[23,71; 26,61]	[23,60; 26,57]	[23,34; 26,37]	[23,02; 26,13]	[22,29; 25,45]	[22,48; 25,72]	[21,06; 24,30]	[21,49; 24,84]
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	2313				1638	1577	1472	1392	1316	1257	1177	1148	1081
		Anteil in %	45,34				45,58	45,71	45,08	44,53	44,73	44,78	43,92	44,81	44,32
		CI Anteil in %	[43,98; 46,71]				[43,95; 47,20]	[44,05; 47,37]	[43,38; 46,79]	[42,79; 46,27]	[42,93; 46,53]	[42,94; 46,62]	[42,04; 45,80]	[42,88; 46,73]	[42,35; 46,29]
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	1395				1046	1005	974	957	903	880	857	833	793
		Anteil in %	27,35				29,10	29,13	29,83	30,61	30,69	31,35	31,98	32,51	32,51
		CI Anteil in %	[26,12; 28,57]				[27,62; 30,59]	[27,61; 30,65]	[28,26; 31,40]	[29,00; 32,23]	[29,03; 32,36]	[29,63; 33,07]	[30,21; 33,74]	[30,70; 34,33]	[30,65; 34,37]
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	9060	8438	7711	7198	6887	6575	6258	5934	5621	5371	5125	4921	4722
	auswertbar	Anzahl	9048	0	0	0	6582	6324	6055	5801	5469	5225	4998	4791	4581
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,69				28,88	28,89	28,88	28,99	28,98	28,99	29,03	29,02	29,05
		CI Mean	[28,56; 28,82]				[28,73; 29,04]	[28,73; 29,05]	[28,72; 29,04]	[28,82; 29,16]	[28,80; 29,15]	[28,81; 29,17]	[28,85; 29,22]	[28,84; 29,21]	[28,85; 29,24]
		Median	27,78				27,92	27,92	27,99	28,00	28,04	28,04	28,07	28,07	28,04
		Fallbasis mittlere Differenz					6576	6320	6050	5796	5465	5221	4994	4787	4577
		Mittlere Differenz zur ED					0,04	0,07	0,06	0,15	0,12	0,12	0,13	0,11	0,13
		CI mittlere Differenz					[-0,02; 0,11]	[0,00; 0,14]	[-0,01; 0,13]	[0,07; 0,23]	[0,04; 0,21]	[0,04; 0,21]	[0,04; 0,22]	[0,02; 0,20]	[0,03; 0,22]
		Median mittlere Differenz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	2756				1945	1829	1751	1666	1602	1505	1454	1390	1340
		Anteil in %	30,46				29,55	28,92	28,92	28,72	29,29	28,80	29,09	29,01	29,25
		CI Anteil in %	[29,51; 31,41]				[28,45; 30,65]	[27,80; 30,04]	[27,78; 30,06]	[27,55; 29,88]	[28,09; 30,50]	[27,58; 30,03]	[27,83; 30,35]	[27,73; 30,30]	[27,93; 30,57]
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	2978				2181	2142	2049	1928	1800	1747	1646	1594	1505
		Anteil in %	32,91				33,14	33,87	33,84	33,24	32,91	33,44	32,93	33,27	32,85
		CI Anteil in %	[31,95; 33,88]				[32,00; 34,27]	[32,70; 35,04]	[32,65; 35,03]	[32,02; 34,45]	[31,67; 34,16]	[32,16; 34,71]	[31,63; 34,24]	[31,94; 34,61]	[31,49; 34,21]
stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	3314				2456	2353	2255	2207	2067	1973	1898	1807	1736	
	Anteil in %	36,63				37,31	37,21	37,24	38,05	37,79	37,76	37,98	37,72	37,90	
	CI Anteil in %	[35,63; 37,62]				[36,15; 38,48]	[36,02; 38,40]	[36,02; 38,46]	[36,80; 39,29]	[36,51; 39,08]	[36,45; 39,08]	[36,63; 39,32]	[36,34; 39,09]	[36,49; 39,30]	

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
2007-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10884	9823	8824	8143	7609	7036	6543	6178	5837	5527	5272	4983	
	auswertbar	Anzahl	10862	0	0	7568	7189	6768	6305	5943	5621	5331	5098	4798	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	27,99			28,26	28,35	28,36	28,47	28,48	28,51	28,59	28,67	28,69	
		CI Mean	[27,88; 28,09]			[28,13; 28,39]	[28,21; 28,49]	[28,22; 28,50]	[28,33; 28,62]	[28,32; 28,63]	[28,36; 28,67]	[28,43; 28,75]	[28,50; 28,84]	[28,51; 28,87]	
		Median	27,38			27,47	27,64	27,66	27,72	27,72	27,74	27,77	27,78	27,78	
		Fallbasis mittlere Differenz				7558	7179	6758	6296	5934	5612	5323	5090	4790	
		Mittlere Differenz zur ED				0,04	0,10	0,09	0,16	0,12	0,12	0,18	0,23	0,20	
		CI mittlere Differenz				[-0,01; 0,10]	[0,05; 0,16]	[0,03; 0,15]	[0,10; 0,22]	[0,06; 0,18]	[0,05; 0,18]	[0,11; 0,25]	[0,15; 0,30]	[0,12; 0,28]	
		Median mittlere Differenz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	2957			1921	1782	1657	1514	1399	1344	1230	1163	1116	
		Anteil in %	27,22			25,38	24,79	24,48	24,01	23,54	23,91	23,07	22,81	23,26	
		CI Anteil in %	[26,39; 28,06]			[24,40; 26,36]	[23,79; 25,79]	[23,46; 25,51]	[22,96; 25,07]	[22,46; 24,62]	[22,80; 25,03]	[21,94; 24,20]	[21,66; 23,96]	[22,06; 24,46]	
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	4875			3407	3245	3088	2832	2742	2550	2415	2303	2136	
		Anteil in %	44,88			45,02	45,14	45,63	44,92	46,14	45,37	45,30	45,17	44,52	
		CI Anteil in %	[43,95; 45,82]			[43,90; 46,14]	[43,99; 46,29]	[44,44; 46,81]	[43,69; 46,14]	[44,87; 47,41]	[44,06; 46,67]	[43,96; 46,64]	[43,81; 46,54]	[43,11; 45,92]	
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	3030			2240	2162	2023	1959	1802	1727	1686	1632	1546	
		Anteil in %	27,90			29,60	30,07	29,89	31,07	30,32	30,72	31,63	32,01	32,22	
		CI Anteil in %	[27,05; 28,74]			[28,57; 30,63]	[29,01; 31,13]	[28,80; 30,98]	[29,93; 32,21]	[29,15; 31,49]	[29,52; 31,93]	[30,38; 32,87]	[30,73; 33,29]	[30,90; 33,54]	
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	19661	18109	16585	15472	14517	13508	12685	12005	11389	10864	10355	9873	
	auswertbar	Anzahl	19632	0	0	14414	13746	12950	12198	11542	11011	10514	10011	9473	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,66			28,83	28,91	28,92	29,02	29,02	29,00	29,04	29,08	29,07	
		CI Mean	[28,57; 28,75]			[28,72; 28,94]	[28,80; 29,02]	[28,80; 29,04]	[28,89; 29,14]	[28,89; 29,14]	[28,88; 29,13]	[28,91; 29,17]	[28,95; 29,22]	[28,94; 29,21]	
		Median	27,77			27,97	28,04	28,00	28,09	28,13	28,13	28,13	28,20	28,23	
		Fallbasis mittlere Differenz				14401	13731	12937	12185	11530	10999	10504	10001	9465	
		Mittlere Differenz zur ED				-0,01	0,02	0,01	0,07	0,05	0,06	0,04	0,07	0,06	
		CI mittlere Differenz				[-0,05; 0,04]	[-0,03; 0,06]	[-0,04; 0,05]	[0,02; 0,11]	[0,01; 0,10]	[0,01; 0,11]	[-0,01; 0,10]	[0,01; 0,13]	[0,00; 0,12]	
		Median mittlere Differenz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	5903			4160	3902	3656	3365	3189	3032	2893	2755	2608	
		Anteil in %	30,07			28,86	28,39	28,23	27,59	27,63	27,54	27,52	27,52	27,53	
		CI Anteil in %	[29,43; 30,71]			[28,12; 29,60]	[27,63; 29,14]	[27,46; 29,01]	[26,79; 28,38]	[26,81; 28,45]	[26,70; 28,37]	[26,66; 28,37]	[26,64; 28,39]	[26,63; 28,43]	
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	6554			4923	4685	4447	4192	3953	3731	3562	3355	3183	
		Anteil in %	33,38			34,15	34,08	34,34	34,37	34,25	33,88	33,88	33,51	33,60	
		CI Anteil in %	[32,72; 34,04]			[33,38; 34,93]	[33,29; 34,88]	[33,52; 35,16]	[33,52; 35,21]	[33,38; 35,11]	[33,00; 34,77]	[32,97; 34,78]	[32,59; 34,44]	[32,65; 34,55]	
stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	7175			5331	5159	4847	4641	4400	4248	4059	3901	3682		
	Anteil in %	36,55			36,98	37,53	37,43	38,05	38,12	38,58	38,61	38,97	38,87		
	CI Anteil in %	[35,87; 37,22]			[36,20; 37,77]	[36,72; 38,34]	[36,60; 38,26]	[37,19; 38,91]	[37,24; 39,01]	[37,67; 39,49]	[37,68; 39,54]	[38,01; 39,92]	[37,89; 39,85]		

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	13164	11828	10769	9836	8972	8290	7773	7278	6843	6460	6071		
	auswertbar	Anzahl	13140	0	9897	9180	8540	7931	7425	6974	6588	6189	5797		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	27,91		28,16	28,26	28,32	28,35	28,38	28,43	28,44	28,51	28,50		
		CI Mean	[27,82; 28,01]		[28,04; 28,28]	[28,14; 28,38]	[28,19; 28,44]	[28,23; 28,48]	[28,25; 28,50]	[28,29; 28,56]	[28,30; 28,57]	[28,37; 28,65]	[28,35; 28,65]		
		Median	27,17		27,40	27,45	27,55	27,64	27,68	27,68	27,68	27,72	27,68		
		Fallbasis mittlere Differenz			9885	9169	8529	7924	7419	6969	6583	6184	5792		
		Mittlere Differenz zur ED			0,01	0,07	0,09	0,13	0,15	0,17	0,15	0,23	0,20		
		CI mittlere Differenz			[-0,04; 0,05]	[0,03; 0,12]	[0,05; 0,14]	[0,08; 0,18]	[0,10; 0,21]	[0,11; 0,23]	[0,09; 0,21]	[0,16; 0,29]	[0,13; 0,27]		
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	3726		2633	2359	2167	1932	1799	1673	1579	1460	1378		
		Anteil in %	28,36		26,60	25,70	25,37	24,36	24,23	23,99	23,97	23,59	23,77		
		CI Anteil in %	[27,59; 29,13]		[25,73; 27,47]	[24,80; 26,59]	[24,45; 26,30]	[23,42; 25,30]	[23,25; 25,20]	[22,99; 24,99]	[22,94; 25,00]	[22,53; 24,65]	[22,68; 24,87]		
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	5818		4421	4087	3834	3611	3386	3181	2996	2780	2593		
		Anteil in %	44,28		44,67	44,52	44,89	45,53	45,60	45,61	45,48	44,92	44,73		
		CI Anteil in %	[43,43; 45,13]		[43,69; 45,65]	[43,50; 45,54]	[43,84; 45,95]	[44,43; 46,63]	[44,47; 46,74]	[44,44; 46,78]	[44,27; 46,68]	[43,68; 46,16]	[43,45; 46,01]		
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	3596		2843	2734	2539	2388	2240	2120	2013	1949	1826		
		Anteil in %	27,37		28,73	29,78	29,73	30,11	30,17	30,40	30,56	31,49	31,50		
		CI Anteil in %	[26,60; 28,13]		[27,83; 29,62]	[28,85; 30,72]	[28,76; 30,70]	[29,10; 31,12]	[29,12; 31,21]	[29,32; 31,48]	[29,44; 31,67]	[30,33; 32,65]	[30,30; 32,69]		
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	23606	21710	19985	18567	17041	15830	14850	14004	13279	12596	11936		
	auswertbar	Anzahl	23561	0	18506	17437	16264	15164	14270	13442	12763	12076	11420		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,59		28,75	28,85	28,85	28,91	28,92	28,95	28,97	29,01	28,98		
		CI Mean	[28,50; 28,68]		[28,65; 28,85]	[28,75; 28,96]	[28,74; 28,96]	[28,80; 29,03]	[28,81; 29,04]	[28,83; 29,07]	[28,85; 29,10]	[28,89; 29,14]	[28,85; 29,12]		
		Median	27,64		27,73	27,82	27,82	27,89	27,89	27,94	27,97	28,00	28,01		
		Fallbasis mittlere Differenz			18490	17421	16249	15149	14256	13432	12752	12065	11411		
		Mittlere Differenz zur ED			0,03	0,08	0,05	0,10	0,08	0,09	0,10	0,12	0,10		
		CI mittlere Differenz			[-0,01; 0,07]	[0,04; 0,12]	[0,01; 0,10]	[0,06; 0,15]	[0,03; 0,12]	[0,04; 0,14]	[0,04; 0,15]	[0,07; 0,18]	[0,04; 0,16]		
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	7497		5594	5197	4867	4457	4125	3828	3629	3415	3260		
		Anteil in %	31,82		30,23	29,80	29,92	29,39	28,91	28,48	28,43	28,28	28,55		
		CI Anteil in %	[31,22; 32,41]		[29,57; 30,89]	[29,13; 30,48]	[29,22; 30,63]	[28,67; 30,12]	[28,16; 29,65]	[27,71; 29,24]	[27,65; 29,22]	[27,48; 29,08]	[27,72; 29,37]		
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	7736		6296	5906	5494	5179	4920	4658	4422	4181	3934		
		Anteil in %	32,83		34,02	33,87	33,78	34,15	34,48	34,65	34,65	34,62	34,45		
		CI Anteil in %	[32,23; 33,43]		[33,34; 34,70]	[33,17; 34,57]	[33,05; 34,51]	[33,40; 34,91]	[33,70; 35,26]	[33,85; 35,46]	[33,82; 35,47]	[33,77; 35,47]	[33,58; 35,32]		
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	8328		6616	6334	5903	5528	5225	4956	4712	4480	4226		
		Anteil in %	35,35		35,75	36,33	36,29	36,45	36,62	36,87	36,92	37,10	37,01		
		CI Anteil in %	[34,74; 35,96]		[35,06; 36,44]	[35,61; 37,04]	[35,56; 37,03]	[35,69; 37,22]	[35,82; 37,41]	[36,05; 37,69]	[36,08; 37,76]	[36,24; 37,96]	[36,12; 37,89]		

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr
2008-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	16982	15323	13863	12099	10976	10130	9384	8783	8284	7783			
	auswertbar	Anzahl	16949	13816	12752	11480	10475	9673	8991	8447	7932	7425			
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	27,94	28,06	28,17	28,21	28,33	28,38	28,44	28,49	28,57	28,60			
		CI Mean	[27,85; 28,02]	[27,96; 28,16]	[28,07; 28,27]	[28,10; 28,31]	[28,22; 28,44]	[28,26; 28,49]	[28,31; 28,56]	[28,37; 28,62]	[28,44; 28,70]	[28,47; 28,74]			
		Median	27,28	27,38	27,47	27,47	27,64	27,68	27,72	27,74	27,76	27,77			
		Fallbasis mittlere Differenz		13803	12742	11470	10465	9664	8982	8438	7923	7417			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,03	0,03	0,01	0,09	0,08	0,11	0,14	0,18	0,19			
		CI mittlere Differenz		[-0,06; 0,00]	[-0,01; 0,07]	[-0,03; 0,06]	[0,04; 0,13]	[0,04; 0,13]	[0,06; 0,17]	[0,09; 0,20]	[0,12; 0,24]	[0,13; 0,25]			
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	4772	3828	3378	2993	2643	2425	2211	2026	1853	1724			
		Anteil in %	28,16	27,71	26,49	26,07	25,23	25,07	24,59	23,98	23,36	23,22			
		CI Anteil in %	[27,48; 28,83]	[26,96; 28,45]	[25,72; 27,26]	[25,27; 26,87]	[24,40; 26,06]	[24,21; 25,93]	[23,70; 25,48]	[23,07; 24,90]	[22,43; 24,29]	[22,26; 24,18]			
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	7455	6121	5700	5123	4708	4333	4029	3798	3579	3339			
		Anteil in %	43,98	44,30	44,70	44,63	44,95	44,79	44,81	44,96	45,12	44,97			
		CI Anteil in %	[43,24; 44,73]	[43,48; 45,13]	[43,84; 45,56]	[43,72; 45,53]	[43,99; 45,90]	[43,80; 45,79]	[43,78; 45,84]	[43,90; 46,02]	[44,03; 46,22]	[43,84; 46,10]			
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	4722	3867	3674	3364	3124	2915	2751	2623	2500	2362			
		Anteil in %	27,86	27,99	28,81	29,30	29,82	30,14	30,60	31,05	31,52	31,81			
		CI Anteil in %	[27,19; 28,54]	[27,24; 28,74]	[28,03; 29,60]	[28,47; 30,14]	[28,95; 30,70]	[29,22; 31,05]	[29,64; 31,55]	[30,07; 32,04]	[30,50; 32,54]	[30,75; 32,87]			
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	29795	27447	25098	22332	20470	18993	17828	16783	15876	15040			
	auswertbar	Anzahl	29726	25004	23299	21219	19693	18277	17167	16205	15267	14420			
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	28,62	28,75	28,84	28,84	28,93	28,94	29,00	29,03	29,06	29,09			
		CI Mean	[28,54; 28,69]	[28,67; 28,84]	[28,75; 28,93]	[28,75; 28,94]	[28,83; 29,02]	[28,84; 29,05]	[28,89; 29,10]	[28,92; 29,14]	[28,94; 29,17]	[28,97; 29,21]			
		Median	27,68	27,78	27,89	27,89	27,99	27,99	28,04	28,07	28,08	28,13			
		Fallbasis mittlere Differenz		24970	23272	21191	19666	18251	17142	16180	15244	14398			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,01	0,04	0,02	0,08	0,04	0,07	0,09	0,08	0,11			
		CI mittlere Differenz		[-0,04; 0,02]	[0,00; 0,07]	[-0,01; 0,06]	[0,04; 0,11]	[0,00; 0,08]	[0,02; 0,11]	[0,04; 0,13]	[0,04; 0,13]	[0,06; 0,16]			
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	9334	7646	6986	6297	5721	5268	4905	4616	4332	4069			
		Anteil in %	31,40	30,58	29,98	29,68	29,05	28,82	28,57	28,49	28,37	28,22			
		CI Anteil in %	[30,87; 31,93]	[30,01; 31,15]	[29,40; 30,57]	[29,06; 30,29]	[28,42; 29,69]	[28,17; 29,48]	[27,90; 29,25]	[27,79; 29,18]	[27,66; 29,09]	[27,48; 28,95]			
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	9720	8231	7760	7113	6631	6195	5784	5440	5118	4810			
		Anteil in %	32,70	32,92	33,31	33,52	33,67	33,90	33,69	33,57	33,52	33,36			
		CI Anteil in %	[32,17; 33,23]	[32,34; 33,50]	[32,70; 33,91]	[32,89; 34,16]	[33,01; 34,33]	[33,21; 34,58]	[32,99; 34,40]	[32,84; 34,30]	[32,77; 34,27]	[32,59; 34,13]			
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	10672	9127	8553	7809	7341	6814	6478	6149	5817	5541			
		Anteil in %	35,90	36,50	36,71	36,80	37,28	37,28	37,74	37,95	38,10	38,43			
		CI Anteil in %	[35,36; 36,45]	[35,91; 37,10]	[36,09; 37,33]	[36,15; 37,45]	[36,60; 37,95]	[36,58; 37,98]	[37,01; 38,46]	[37,20; 38,69]	[37,33; 38,87]	[37,63; 39,22]			

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2008-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	15792	13969	12246	10985	10136	9407	8838	8388	7927					
	auswertbar	Anzahl	15694	13010	11527	10412	9650	8978	8445	7964	7544					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	27,75	27,99	28,10	28,16	28,20	28,31	28,33	28,33	28,37	28,36				
		CI Mean	[27,67; 27,83]	[27,90; 28,08]	[28,00; 28,20]	[28,06; 28,26]	[28,09; 28,31]	[28,19; 28,42]	[28,22; 28,45]	[28,26; 28,49]	[28,24; 28,48]					
		Median	27,14	27,40	27,44	27,47	27,47	27,64	27,68	27,70	27,69					
		Fallbasis mittlere Differenz		13004	11522	10408	9646	8974	8441	7960	7540					
		Mittlere Differenz zur ED		0,07	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,24	0,21					
		CI mittlere Differenz		[0,05; 0,10]	[0,08; 0,14]	[0,10; 0,17]	[0,11; 0,20]	[0,14; 0,23]	[0,15; 0,25]	[0,20; 0,29]	[0,16; 0,26]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	4688	3650	3107	2750	2506	2280	2122	1942	1831					
		Anteil in %	29,87	28,06	26,95	26,41	25,97	25,40	25,13	24,38	24,27					
		CI Anteil in %	[29,16; 30,59]	[27,28; 28,83]	[26,14; 27,76]	[25,56; 27,26]	[25,09; 26,84]	[24,49; 26,30]	[24,20; 26,05]	[23,44; 25,33]	[23,30; 25,24]					
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	6925	5727	5169	4668	4361	4053	3818	3641	3447					
		Anteil in %	44,13	44,02	44,84	44,83	45,19	45,14	45,21	45,72	45,69					
		CI Anteil in %	[43,35; 44,90]	[43,17; 44,87]	[43,93; 45,75]	[43,88; 45,79]	[44,20; 46,18]	[44,11; 46,17]	[44,15; 46,27]	[44,62; 46,81]	[44,57; 46,82]					
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	4081	3633	3251	2994	2783	2645	2505	2381	2266					
		Anteil in %	26,00	27,92	28,20	28,76	28,84	29,46	29,66	29,90	30,04					
		CI Anteil in %	[25,32; 26,69]	[27,15; 28,70]	[27,38; 29,02]	[27,89; 29,62]	[27,94; 29,74]	[28,52; 30,40]	[28,69; 30,64]	[28,89; 30,90]	[29,00; 31,07]					
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	28291	25543	22838	20876	19298	18047	17047	16090	15228					
	auswertbar	Anzahl	28160	24006	21662	19890	18397	17232	16340	15368	14484					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,44	28,61	28,68	28,76	28,78	28,82	28,83	28,89	28,92					
		CI Mean	[28,37; 28,52]	[28,53; 28,70]	[28,59; 28,78]	[28,66; 28,86]	[28,68; 28,88]	[28,72; 28,92]	[28,73; 28,94]	[28,78; 28,99]	[28,81; 29,03]					
		Median	27,48	27,64	27,68	27,76	27,82	27,82	27,85	27,94	27,99					
		Fallbasis mittlere Differenz		23995	21649	19880	18388	17227	16335	15363	14480					
		Mittlere Differenz zur ED		0,07	0,07	0,13	0,11	0,12	0,11	0,14	0,12					
		CI mittlere Differenz		[0,05; 0,09]	[0,05; 0,10]	[0,10; 0,15]	[0,07; 0,14]	[0,09; 0,16]	[0,08; 0,15]	[0,10; 0,18]	[0,08; 0,17]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	9188	7581	6717	6031	5480	5103	4796	4463	4141					
		Anteil in %	32,63	31,58	31,01	30,32	29,79	29,61	29,35	29,04	28,59					
		CI Anteil in %	[32,08; 33,18]	[30,99; 32,17]	[30,39; 31,62]	[29,68; 30,96]	[29,13; 30,45]	[28,93; 30,30]	[28,65; 30,05]	[28,32; 29,76]	[27,85; 29,33]					
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	9248	7949	7202	6685	6266	5881	5603	5259	4942					
		Anteil in %	32,84	33,11	33,25	33,61	34,06	34,13	34,29	34,22	34,12					
		CI Anteil in %	[32,29; 33,39]	[32,52; 33,71]	[32,62; 33,87]	[32,95; 34,27]	[33,38; 34,74]	[33,42; 34,84]	[33,56; 35,02]	[33,47; 34,97]	[33,35; 34,89]					
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	9724	8476	7743	7174	6651	6248	5941	5646	5401					
		Anteil in %	34,53	35,31	35,74	36,07	36,15	36,26	36,36	36,74	37,29					
		CI Anteil in %	[33,98; 35,09]	[34,70; 35,91]	[35,11; 36,38]	[35,40; 36,74]	[35,46; 36,85]	[35,54; 36,98]	[35,62; 37,10]	[35,98; 37,50]	[36,50; 38,08]					

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	12705	10720	9296	8170	7430	6854	6342	5935						
	auswertbar	Anzahl	12644	10094	8757	7755	7088	6532	6003	5613						
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	27,89	28,01	28,17	28,19	28,24	28,33	28,47	28,49						
		CI Mean	[27,79; 27,99]	[27,90; 28,12]	[28,06; 28,29]	[28,07; 28,32]	[28,12; 28,37]	[28,20; 28,47]	[28,33; 28,62]	[28,34; 28,64]						
		Median	27,17	27,38	27,47	27,47	27,64	27,71	27,74	27,76						
		Fallbasis mittlere Differenz		10086	8752	7752	7085	6528	5999	5610						
		Mittlere Differenz zur ED		0,00	0,07	0,05	0,08	0,10	0,12	0,13						
		CI mittlere Differenz		[-0,03; 0,03]	[0,03; 0,11]	[0,00; 0,10]	[0,02; 0,13]	[0,03; 0,16]	[0,05; 0,18]	[0,06; 0,19]						
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	3757	2827	2312	2039	1813	1644	1456	1361						
		Anteil in %	29,71	28,01	26,40	26,29	25,58	25,17	24,25	24,25						
		CI Anteil in %	[28,92; 30,51]	[27,13; 28,88]	[25,48; 27,33]	[25,31; 27,27]	[24,56; 26,59]	[24,12; 26,22]	[23,17; 25,34]	[23,13; 25,37]						
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	5407	4412	3889	3464	3172	2917	2683	2484						
		Anteil in %	42,76	43,71	44,41	44,67	44,75	44,66	44,69	44,25						
		CI Anteil in %	[41,90; 43,63]	[42,74; 44,68]	[43,37; 45,45]	[43,56; 45,77]	[43,59; 45,91]	[43,45; 45,86]	[43,44; 45,95]	[42,95; 45,55]						
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	3480	2855	2556	2252	2103	1971	1864	1768						
		Anteil in %	27,52	28,28	29,19	29,04	29,67	30,17	31,05	31,50						
		CI Anteil in %	[26,74; 28,30]	[27,41; 29,16]	[28,24; 30,14]	[28,03; 30,05]	[28,61; 30,73]	[29,06; 31,29]	[29,88; 32,22]	[30,28; 32,71]						
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	22001	19094	16970	15316	14073	13124	12308	11559						
	auswertbar	Anzahl	21913	18135	16121	14588	13447	12551	11730	10973						
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	28,49	28,55	28,69	28,71	28,84	28,86	28,91	28,92						
		CI Mean	[28,40; 28,58]	[28,45; 28,65]	[28,58; 28,79]	[28,60; 28,82]	[28,73; 28,96]	[28,75; 28,98]	[28,79; 29,04]	[28,80; 29,05]						
		Median	27,47	27,55	27,64	27,70	27,76	27,82	27,92	27,89						
		Fallbasis mittlere Differenz		18128	16115	14585	13443	12547	11726	10970						
		Mittlere Differenz zur ED		0,01	0,06	0,05	0,08	0,09	0,11	0,10						
		CI mittlere Differenz		[-0,01; 0,03]	[0,03; 0,09]	[0,02; 0,09]	[0,05; 0,12]	[0,05; 0,14]	[0,07; 0,15]	[0,05; 0,14]						
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	7241	5871	5083	4491	4061	3779	3484	3239						
		Anteil in %	33,04	32,37	31,53	30,79	30,20	30,11	29,70	29,52						
		CI Anteil in %	[32,42; 33,67]	[31,69; 33,05]	[30,81; 32,25]	[30,04; 31,53]	[29,42; 30,98]	[29,31; 30,91]	[28,87; 30,53]	[28,66; 30,37]						
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	6951	5836	5178	4804	4435	4119	3844	3619						
		Anteil in %	31,72	32,18	32,12	32,93	32,98	32,82	32,77	32,98						
		CI Anteil in %	[31,10; 32,34]	[31,50; 32,86]	[31,40; 32,84]	[32,17; 33,69]	[32,19; 33,78]	[32,00; 33,64]	[31,92; 33,62]	[32,10; 33,86]						
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	7721	6428	5860	5293	4951	4653	4402	4115						
		Anteil in %	35,23	35,45	36,35	36,28	36,82	37,07	37,53	37,50						
		CI Anteil in %	[34,60; 35,87]	[34,75; 36,14]	[35,61; 37,09]	[35,50; 37,06]	[36,00; 37,63]	[36,23; 37,92]	[36,65; 38,40]	[36,60; 38,41]						

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr		
2009-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10500	8753	7522	6624	5999	5506	5117								
	auswertbar	Anzahl	10466	8243	7059	6254	5694	5208	4853								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	27,81	28,07	28,19	28,30	28,35	28,48	28,58								
		CI Mean	[27,70; 27,92]	[27,94; 28,20]	[28,05; 28,34]	[28,15; 28,44]	[28,20; 28,50]	[28,32; 28,63]	[28,41; 28,75]								
		Median	27,12	27,38	27,43	27,60	27,68	27,74	27,77								
		Fallbasis mittlere Differenz		8240	7055	6250	5691	5205	4849								
		Mittlere Differenz zur ED		0,06	0,09	0,12	0,12	0,17	0,15								
		CI mittlere Differenz		[0,03; 0,09]	[0,05; 0,12]	[0,08; 0,16]	[0,07; 0,16]	[0,12; 0,22]	[0,10; 0,21]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	3186	2299	1903	1613	1449	1272	1158								
		Anteil in %	30,44	27,89	26,96	25,79	25,45	24,42	23,86								
		CI Anteil in %	[29,56; 31,32]	[26,92; 28,86]	[25,92; 27,99]	[24,71; 26,88]	[24,32; 26,58]	[23,26; 25,59]	[22,66; 25,06]								
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	4452	3596	3117	2778	2526	2315	2155								
		Anteil in %	42,54	43,62	44,16	44,42	44,36	44,45	44,41								
		CI Anteil in %	[41,59; 43,48]	[42,55; 44,70]	[43,00; 45,31]	[43,19; 45,65]	[43,07; 45,65]	[43,10; 45,80]	[43,01; 45,80]								
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	2828	2348	2039	1863	1719	1621	1540								
		Anteil in %	27,02	28,48	28,89	29,79	30,19	31,13	31,73								
		CI Anteil in %	[26,17; 27,87]	[27,51; 29,46]	[27,83; 29,94]	[28,66; 30,92]	[29,00; 31,38]	[29,87; 32,38]	[30,42; 33,04]								
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	18339	15966	14015	12562	11561	10687	10000								
	auswertbar	Anzahl	18268	15128	13237	11906	11005	10119	9437								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,42	28,61	28,68	28,75	28,82	28,86	28,90								
		CI Mean	[28,32; 28,52]	[28,49; 28,72]	[28,56; 28,80]	[28,62; 28,87]	[28,69; 28,95]	[28,72; 29,00]	[28,76; 29,05]								
		Median	27,34	27,55	27,64	27,73	27,82	27,89	27,94								
		Fallbasis mittlere Differenz		15121	13231	11903	11001	10116	9434								
		Mittlere Differenz zur ED		0,06	0,10	0,11	0,11	0,13	0,12								
		CI mittlere Differenz		[0,04; 0,09]	[0,07; 0,13]	[0,07; 0,14]	[0,07; 0,15]	[0,09; 0,18]	[0,08; 0,17]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	6231	4912	4162	3642	3329	3006	2760								
		Anteil in %	34,11	32,47	31,44	30,59	30,25	29,71	29,25								
		CI Anteil in %	[33,42; 34,80]	[31,72; 33,22]	[30,65; 32,23]	[29,76; 31,42]	[29,39; 31,11]	[28,82; 30,60]	[28,33; 30,16]								
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	5788	4912	4343	3958	3660	3364	3158								
		Anteil in %	31,68	32,47	32,81	33,24	33,26	33,24	33,46								
		CI Anteil in %	[31,01; 32,36]	[31,72; 33,22]	[32,01; 33,61]	[32,40; 34,09]	[32,38; 34,14]	[32,33; 34,16]	[32,51; 34,42]								
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	6249	5304	4732	4306	4016	3749	3519								
		Anteil in %	34,21	35,06	35,75	36,17	36,49	37,05	37,29								
		CI Anteil in %	[33,52; 34,90]	[34,30; 35,82]	[34,93; 36,56]	[35,30; 37,03]	[35,59; 37,39]	[36,11; 37,99]	[36,31; 38,27]								

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
2010-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	11718	9792	8409	7489	6843	6258							
	auswertbar	Anzahl	11681	9224	7973	7123	6455	5893							
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,12	28,27	28,40	28,42	28,54	28,57							
		CI Mean	[28,01; 28,23]	[28,14; 28,39]	[28,26; 28,53]	[28,29; 28,55]	[28,40; 28,68]	[28,42; 28,72]							
		Median	27,41	27,47	27,68	27,71	27,76	27,76							
		Fallbasis mittlere Differenz		9219	7969	7119	6452	5890							
		Mittlere Differenz zur ED		0,00	0,03	0,02	0,08	0,08							
		CI mittlere Differenz		[-0,02; 0,03]	[-0,01; 0,07]	[-0,03; 0,07]	[0,03; 0,14]	[0,02; 0,15]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	3323	2533	2085	1830	1585	1433							
		Anteil in %	28,45	27,46	26,15	25,69	24,55	24,32							
		CI Anteil in %	[27,63; 29,27]	[26,55; 28,37]	[25,19; 27,12]	[24,68; 26,71]	[23,50; 25,60]	[23,22; 25,41]							
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	4960	3943	3435	3095	2820	2601							
		Anteil in %	42,46	42,75	43,08	43,45	43,69	44,14							
		CI Anteil in %	[41,57; 43,36]	[41,74; 43,76]	[42,00; 44,17]	[42,30; 44,60]	[42,48; 44,90]	[42,87; 45,41]							
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	3398	2748	2453	2198	2050	1859							
		Anteil in %	29,09	29,79	30,77	30,86	31,76	31,55							
		CI Anteil in %	[28,27; 29,91]	[28,86; 30,73]	[29,75; 31,78]	[29,79; 31,93]	[30,62; 32,89]	[30,36; 32,73]							
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	20435	17759	15574	14047	12942	11968							
	auswertbar	Anzahl	20360	16857	14822	13384	12316	11321							
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,57	28,71	28,76	28,80	28,89	28,90							
		CI Mean	[28,47; 28,66]	[28,60; 28,81]	[28,65; 28,87]	[28,68; 28,92]	[28,76; 29,01]	[28,77; 29,03]							
		Median	27,51	27,64	27,69	27,69	27,89	27,83							
		Fallbasis mittlere Differenz		16850	14815	13379	12310	11315							
		Mittlere Differenz zur ED		0,00	0,03	0,03	0,05	0,03							
		CI mittlere Differenz		[-0,02; 0,03]	[0,00; 0,07]	[-0,01; 0,06]	[0,01; 0,09]	[-0,01; 0,08]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	6723	5398	4681	4183	3797	3492							
		Anteil in %	33,02	32,02	31,58	31,25	30,83	30,85							
		CI Anteil in %	[32,37; 33,67]	[31,32; 32,73]	[30,83; 32,33]	[30,47; 32,04]	[30,01; 31,65]	[29,99; 31,70]							
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	6386	5361	4747	4306	3976	3645							
		Anteil in %	31,37	31,80	32,03	32,17	32,28	32,20							
		CI Anteil in %	[30,73; 32,00]	[31,10; 32,51]	[31,28; 32,78]	[31,38; 32,96]	[31,46; 33,11]	[31,34; 33,06]							
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	7251	6098	5394	4895	4543	4184							
		Anteil in %	35,61	36,17	36,39	36,57	36,89	36,96							
		CI Anteil in %	[34,96; 36,27]	[35,45; 36,90]	[35,62; 37,17]	[35,76; 37,39]	[36,03; 37,74]	[36,07; 37,85]							

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	11021	9222	7913	7013	6351									
	auswertbar	Anzahl	10986	8694	7434	6606	5966									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	27,86	28,07	28,18	28,27	28,36									
		CI Mean	[27,75; 27,97]	[27,94; 28,19]	[28,04; 28,32]	[28,12; 28,42]	[28,20; 28,51]									
		Median	27,10	27,17	27,40	27,43	27,47									
		Fallbasis mittlere Differenz		8689	7429	6601	5961									
		Mittlere Differenz zur ED		0,03	0,05	0,09	0,08									
		CI mittlere Differenz		[-0,01; 0,06]	[0,01; 0,09]	[0,03; 0,14]	[0,02; 0,14]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00									
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	3291	2461	2038	1743	1525									
		Anteil in %	29,96	28,31	27,41	26,39	25,56									
		CI Anteil in %	[29,10; 30,81]	[27,36; 29,25]	[26,40; 28,43]	[25,32; 27,45]	[24,45; 26,67]									
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	4752	3828	3311	2973	2715									
		Anteil in %	43,26	44,03	44,54	45,00	45,51									
		CI Anteil in %	[42,33; 44,18]	[42,99; 45,07]	[43,41; 45,67]	[43,80; 46,20]	[44,24; 46,77]									
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	2943	2405	2085	1890	1726									
		Anteil in %	26,79	27,66	28,05	28,61	28,93									
		CI Anteil in %	[25,96; 27,62]	[26,72; 28,60]	[27,03; 29,07]	[27,52; 29,70]	[27,78; 30,08]									
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	18986	16450	14584	13128	12065									
	auswertbar	Anzahl	18923	15702	13831	12463	11368									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,55	28,79	28,84	28,94	28,96									
		CI Mean	[28,45; 28,64]	[28,68; 28,90]	[28,72; 28,96]	[28,82; 29,07]	[28,83; 29,09]									
		Median	27,55	27,70	27,83	27,89	27,94									
		Fallbasis mittlere Differenz		15697	13823	12455	11361									
		Mittlere Differenz zur ED		0,09	0,08	0,12	0,10									
		CI mittlere Differenz		[0,07; 0,12]	[0,05; 0,11]	[0,08; 0,16]	[0,06; 0,14]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00									
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	6278	5015	4307	3804	3408									
		Anteil in %	33,18	31,94	31,14	30,52	29,98									
		CI Anteil in %	[32,51; 33,85]	[31,21; 32,67]	[30,37; 31,91]	[29,71; 31,33]	[29,14; 30,82]									
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	5953	4917	4393	3994	3691									
		Anteil in %	31,46	31,31	31,76	32,05	32,47									
		CI Anteil in %	[30,80; 32,12]	[30,59; 32,04]	[30,99; 32,54]	[31,23; 32,87]	[31,61; 33,33]									
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	6692	5770	5131	4665	4269									
		Anteil in %	35,36	36,75	37,10	37,43	37,55									
		CI Anteil in %	[34,68; 36,05]	[35,99; 37,50]	[36,29; 37,90]	[36,58; 38,28]	[36,66; 38,44]									

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2011-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	11705	9798	8410	7374									
	auswertbar	Anzahl	11657	9197	7904	6849									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	27,97	28,19	28,34	28,40									
		CI Mean	[27,86; 28,08]	[28,05; 28,32]	[28,20; 28,49]	[28,25; 28,55]									
		Median	27,17	27,41	27,55	27,68									
		Fallbasis mittlere Differenz		9187	7895	6840									
		Mittlere Differenz zur ED		0,05	0,08	0,06									
		CI mittlere Differenz		[0,02; 0,08]	[0,05; 0,11]	[0,02; 0,10]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00									
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	3408	2571	2115	1759									
		Anteil in %	29,24	27,95	26,76	25,68									
		CI Anteil in %	[28,41; 30,06]	[27,04; 28,87]	[25,78; 27,73]	[24,65; 26,72]									
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	4970	3962	3409	3003									
		Anteil in %	42,64	43,08	43,13	43,85									
		CI Anteil in %	[41,74; 43,53]	[42,07; 44,09]	[42,04; 44,22]	[42,67; 45,02]									
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	3279	2664	2380	2087									
		Anteil in %	28,13	28,97	30,11	30,47									
		CI Anteil in %	[27,31; 28,95]	[28,04; 29,89]	[29,10; 31,12]	[29,38; 31,56]									
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	20679	17954	15913	14302									
	auswertbar	Anzahl	20597	17018	15026	13436									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	28,52	28,66	28,73	28,83									
		CI Mean	[28,43; 28,62]	[28,55; 28,77]	[28,61; 28,85]	[28,70; 28,95]									
		Median	27,43	27,55	27,64	27,69									
		Fallbasis mittlere Differenz		17003	15012	13423									
		Mittlere Differenz zur ED		0,02	0,04	0,04									
		CI mittlere Differenz		[0,00; 0,05]	[0,01; 0,07]	[0,00; 0,08]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00									
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	6941	5587	4824	4210									
		Anteil in %	33,70	32,83	32,10	31,33									
		CI Anteil in %	[33,05; 34,34]	[32,12; 33,54]	[31,36; 32,85]	[30,55; 32,12]									
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	6441	5344	4766	4284									
		Anteil in %	31,27	31,40	31,72	31,88									
CI Anteil in %		[30,64; 31,90]	[30,70; 32,10]	[30,97; 32,46]	[31,10; 32,67]										
stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	7215	6087	5436	4942										
	Anteil in %	35,03	35,77	36,18	36,78										
	CI Anteil in %	[34,38; 35,68]	[35,05; 36,49]	[35,41; 36,95]	[35,97; 37,60]										

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2011-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10338	8628	7386										
	auswertbar	Anzahl	10300	8125	6840										
		Mean	28,00	28,24	28,36										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	CI Mean	[27,89; 28,11]	[28,11; 28,37]	[28,21; 28,50]										
		Median	27,34	27,46	27,68										
		Fallbasis mittlere Differenz		8120	6835										
		Mittlere Differenz zur ED		0,07	0,07										
		CI mittlere Differenz		[0,04; 0,10]	[0,03; 0,10]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00										
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	3089	2322	1884										
		Anteil in %	29,99	28,58	27,54										
		CI Anteil in %	[29,11; 30,88]	[27,60; 29,56]	[26,49; 28,60]										
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	4242	3381	2863										
		Anteil in %	41,18	41,61	41,86										
		CI Anteil in %	[40,23; 42,14]	[40,54; 42,68]	[40,69; 43,03]										
	stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	2969	2422	2093										
		Anteil in %	28,83	29,81	30,60										
		CI Anteil in %	[27,95; 29,70]	[28,81; 30,80]	[29,51; 31,69]										
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	17956	15630	13757										
	auswertbar	Anzahl	17885	14820	12890										
		Mean	28,50	28,69	28,78										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	CI Mean	[28,40; 28,60]	[28,58; 28,80]	[28,66; 28,90]										
		Median	27,47	27,64	27,69										
		Fallbasis mittlere Differenz		14814	12884										
		Mittlere Differenz zur ED		0,05	0,06										
		CI mittlere Differenz		[0,03; 0,07]	[0,03; 0,09]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00										
	normalgewichtig: BMI < 25	Anzahl	5991	4797	4039										
		Anteil in %	33,50	32,37	31,33										
		CI Anteil in %	[32,81; 34,19]	[31,62; 33,12]	[30,53; 32,14]										
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	5615	4686	4158										
		Anteil in %	31,40	31,62	32,26										
		CI Anteil in %	[30,71; 32,08]	[30,87; 32,37]	[31,45; 33,06]										
stark adipös: BMI ≥ 30	Anzahl	6279	5337	4693											
	Anteil in %	35,11	36,01	36,41											
	CI Anteil in %	[34,41; 35,81]	[35,24; 36,79]	[35,58; 37,24]											

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	12019	10074												
	auswertbar	Anzahl	11976	9306												
		Mean	28,03	28,16												
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI		CI Mean	[27,93; 28,14]	[28,05; 28,28]											
			Median	27,40	27,46											
			Fallbasis mittlere Differenz		9301											
			Mittlere Differenz zur ED		0,01											
			CI mittlere Differenz		[-0,01; 0,04]											
			Median mittlere Differenz		0,00											
	normalgewichtig: BMI < 25		Anzahl	3509	2580											
			Anteil in %	29,30	27,72											
			CI Anteil in %	[28,49; 30,12]	[26,81; 28,63]											
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	4965	3949											
			Anteil in %	41,46	42,43											
			CI Anteil in %	[40,58; 42,34]	[41,43; 43,44]											
	stark adipös: BMI ≥ 30		Anzahl	3502	2777											
			Anteil in %	29,24	29,84											
			CI Anteil in %	[28,43; 30,06]	[28,91; 30,77]											
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	21143	18358												
	auswertbar	Anzahl	21082	17074												
		Mean	28,56	28,69												
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI		CI Mean	[28,47; 28,65]	[28,58; 28,79]											
			Median	27,53	27,66											
			Fallbasis mittlere Differenz		17066											
			Mittlere Differenz zur ED		0,00											
			CI mittlere Differenz		[-0,03; 0,02]											
			Median mittlere Differenz		0,00											
	normalgewichtig: BMI < 25		Anzahl	7044	5545											
			Anteil in %	33,41	32,48											
			CI Anteil in %	[32,78; 34,05]	[31,77; 33,18]											
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	6477	5299											
			Anteil in %	30,72	31,04											
			CI Anteil in %	[30,10; 31,35]	[30,34; 31,73]											
stark adipös: BMI ≥ 30		Anzahl	7561	6230												
		Anteil in %	35,86	36,49												
		CI Anteil in %	[35,22; 36,51]	[35,77; 37,21]												

EZ	Erwachsene Patienten zur ED und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10491													
	auswertbar	Anzahl	10457													
		Mean	27,97													
	Auswertungsergebnisse zum BMI		CI Mean	[27,86; 28,08]												
			Median	27,18												
			Fallbasis mittlere Differenz													
			Mittlere Differenz zur ED													
			CI mittlere Differenz													
			Median mittlere Differenz													
	normalgewichtig: BMI < 25		Anzahl	3100												
			Anteil in %	29,65												
			CI Anteil in %	[28,77; 30,52]												
	mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	4386												
			Anteil in %	41,94												
			CI Anteil in %	[41,00; 42,89]												
	stark adipös: BMI ≥ 30		Anzahl	2971												
			Anteil in %	28,41												
			CI Anteil in %	[27,55; 29,28]												
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	18214													
	auswertbar	Anzahl	18155													
		Mean	28,55													
	Auswertungsergebnisse zum BMI		CI Mean	[28,44; 28,65]												
			Median	27,48												
			Fallbasis mittlere Differenz													
			Mittlere Differenz zur ED													
			CI mittlere Differenz													
			Median mittlere Differenz													
	normalgewichtig: BMI < 25		Anzahl	6131												
			Anteil in %	33,77												
			CI Anteil in %	[33,08; 34,46]												
mäßig adipös: 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	5597													
		Anteil in %	30,83													
		CI Anteil in %	[30,16; 31,50]													
stark adipös: BMI ≥ 30		Anzahl	6427													
		Anteil in %	35,40													
		CI Anteil in %	[34,71; 36,10]													

3.2 Symptomatik

Zu den wichtigsten Asthma-Symptomen zählen Atemnot (häufig anfallartig), Giemen (asthmatisches Atemgeräusch), Husten und ein Engegefühl über der Brust. Die Häufigkeit, mit der diese Symptome auftreten, dient der Schweregrad-Einteilung einer asthmatischen Erkrankung. Die Vermeidung akuter und chronischer Krankheitserscheinungen (Symptome und Asthmaanfälle) ist ein wichtiges Ziel in der Asthmatherapie.

Im Folgenden wird in Tabelle 3.2.1 die Häufigkeit von Asthmasymptomen bei den eingeschriebenen Patienten ausgewiesen und zum anderen in Tabelle 3.2.2 die Entwicklung der Häufigkeit der auftretenden Asthmasymptome im Programmverlauf dargestellt. Eine Verschlechterung der Symptomatik bzw. ein Asthma-Anfall kann unter Umständen eine notfallmäßige stationäre

Behandlung zur Folge haben. Daher weisen die Tabellen 3.2.3 und 3.2.4 die Anzahl der Patienten aus, die mindestens einmal bzw. mehr als einmal im aktuellen Halbjahr wegen Asthma bronchiale notfallmäßig stationär behandelt wurden.

In Tabelle 3.2.1 wird für jede Kohorte die **Häufigkeit von Asthmasymptomen** bei den Programmteilnehmern dokumentiert. Hierbei wird unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Patienten angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend werden die Patienten in den Häufigkeitskategorien ihrer Asthmasymptome (täglich, wöchentlich, seltener als wöchentlich, keine) dargestellt und es wird der jeweilige Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ausgewiesen.

Tabelle 3.2.1 Häufigkeit von Asthmasymptomen

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360
	täglich	Anzahl	208	153	134	122	114	94	77	82	74	70	69	61	65	56
		Anteil in %	23,48	18,75	17,91	17,78	17,98	15,69	13,80	15,80	15,01	15,32	15,90	14,95	17,02	15,56
		CI Anteil in %	[20,68; 26,27]	[16,07; 21,43]	[15,16; 20,66]	[14,92; 20,65]	[14,99; 20,97]	[12,78; 18,61]	[10,94; 16,66]	[12,66; 18,94]	[11,85; 18,17]	[12,01; 18,62]	[12,45; 19,34]	[11,49; 18,42]	[13,24; 20,79]	[11,81; 19,30]
	wöchentlich	Anzahl	218	160	133	102	92	101	96	78	82	58	68	57	54	57
		Anteil in %	24,60	19,61	17,78	14,87	14,51	16,86	17,20	15,03	16,63	12,69	15,67	13,97	14,14	15,83
		CI Anteil in %	[21,77; 27,44]	[16,88; 22,33]	[15,04; 20,52]	[12,20; 17,53]	[11,77; 17,25]	[13,86; 19,86]	[14,07; 20,34]	[11,95; 18,11]	[13,34; 19,92]	[9,64; 15,75]	[12,24; 19,09]	[10,60; 17,34]	[10,64; 17,63]	[12,06; 19,61]
	seltener als wöchentlich	Anzahl	386	349	328	299	275	247	214	209	207	194	180	178	148	147
		Anteil in %	43,57	42,77	43,85	43,59	43,38	41,24	38,35	40,27	41,99	42,45	41,47	43,63	38,74	40,83
		CI Anteil in %	[40,30; 46,83]	[39,37; 46,17]	[40,29; 47,41]	[39,87; 47,30]	[39,51; 47,24]	[37,29; 45,18]	[34,31; 42,39]	[36,05; 44,49]	[37,63; 46,35]	[37,91; 46,99]	[36,83; 46,12]	[38,81; 48,45]	[33,85; 43,64]	[35,75; 45,92]
	keine	Anzahl	74	154	153	163	153	157	171	150	130	135	117	112	115	100
		Anteil in %	8,35	18,87	20,45	23,76	24,13	26,21	30,65	28,90	26,37	29,54	26,96	27,45	30,10	27,78
		CI Anteil in %	[6,53; 10,17]	[16,19; 21,56]	[17,56; 23,35]	[20,57; 26,95]	[20,80; 27,47]	[22,69; 29,74]	[26,82; 34,47]	[25,00; 32,81]	[22,48; 30,26]	[25,35; 33,73]	[22,78; 31,14]	[23,12; 31,79]	[25,50; 34,71]	[23,14; 32,41]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	täglich	Anzahl	319	235	235	193	207	189	159	155	152	125	114	102	103	97
		Anteil in %	25,22	19,93	21,32	18,79	20,87	20,04	17,42	18,02	18,45	16,05	15,53	14,41	14,95	14,67
		CI Anteil in %	[22,82; 27,61]	[17,65; 22,21]	[18,91; 23,74]	[16,40; 21,18]	[18,34; 23,40]	[17,49; 22,60]	[14,95; 19,88]	[15,45; 20,59]	[15,80; 21,10]	[13,47; 18,63]	[12,91; 18,15]	[11,82; 17,00]	[12,28; 17,61]	[11,98; 17,37]
	wöchentlich	Anzahl	354	290	216	229	189	187	184	177	146	153	134	129	127	112
		Anteil in %	27,98	24,60	19,60	22,30	19,05	19,83	20,15	20,58	17,72	19,64	18,26	18,22	18,43	16,94
		CI Anteil in %	[25,51; 30,46]	[22,14; 27,06]	[17,26; 21,95]	[19,75; 24,84]	[16,61; 21,50]	[17,28; 22,38]	[17,55; 22,76]	[17,88; 23,29]	[15,11; 20,33]	[16,85; 22,43]	[15,46; 21,05]	[15,37; 21,07]	[15,54; 21,33]	[14,08; 19,81]
	seltener als wöchentlich	Anzahl	492	453	455	387	392	356	343	343	336	307	299	287	256	270
		Anteil in %	38,89	38,42	41,29	37,68	39,52	37,75	37,57	39,88	40,78	39,41	40,74	40,54	37,16	40,85
CI Anteil in %		[36,21; 41,58]	[35,64; 41,20]	[38,38; 44,20]	[34,72; 40,65]	[36,47; 42,56]	[34,66; 40,85]	[34,43; 40,71]	[36,61; 43,16]	[37,42; 44,13]	[35,98; 42,84]	[37,18; 44,29]	[36,92; 44,16]	[33,54; 40,77]	[37,10; 44,60]	
keine	Anzahl	100	201	196	218	204	211	227	185	190	194	187	190	203	182	
	Anteil in %	7,91	17,05	17,79	21,23	20,56	22,38	24,86	21,51	23,06	24,90	25,48	26,84	29,46	27,53	
	CI Anteil in %	[6,42; 9,39]	[14,90; 19,20]	[15,53; 20,04]	[18,72; 23,73]	[18,05; 23,08]	[19,71; 25,04]	[22,06; 27,67]	[18,76; 24,26]	[20,18; 25,94]	[21,86; 27,94]	[22,32; 28,63]	[23,57; 30,10]	[26,06; 32,87]	[24,13; 30,94]	

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124
	auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997
	täglich	Anzahl	1582	1150	945	864	729	675	612	587	523	505	469	432	416
		Anteil in %	22,01	17,82	16,17	16,08	14,68	14,30	13,87	14,19	13,61	13,99	13,81	13,49	13,88
		CI Anteil in %	[21,05; 22,97]	[16,89; 18,76]	[15,23; 17,11]	[15,10; 17,07]	[13,70; 15,67]	[13,30; 15,30]	[12,85; 14,89]	[13,13; 15,25]	[12,52; 14,69]	[12,86; 15,12]	[12,65; 14,97]	[12,31; 14,68]	[12,64; 15,12]
	wöchentlich	Anzahl	1673	1250	1089	993	869	795	746	654	554	523	486	488	449
		Anteil in %	23,27	19,37	18,63	18,48	17,50	16,84	16,91	15,81	14,42	14,49	14,31	15,24	14,98
		CI Anteil in %	[22,30; 24,25]	[18,41; 20,34]	[17,64; 19,63]	[17,45; 19,52]	[16,45; 18,56]	[15,78; 17,91]	[15,80; 18,01]	[14,70; 16,92]	[13,31; 15,53]	[13,34; 15,64]	[13,13; 15,48]	[14,00; 16,49]	[13,70; 16,26]
	seltener als wöchentlich	Anzahl	3164	2682	2353	2105	2137	1961	1813	1718	1622	1526	1446	1382	1258
		Anteil in %	44,02	41,57	40,26	39,18	43,04	41,55	41,09	41,53	42,21	42,28	42,57	43,16	41,98
		CI Anteil in %	[42,87; 45,17]	[40,37; 42,77]	[39,01; 41,52]	[37,88; 40,49]	[41,66; 44,42]	[40,14; 42,95]	[39,64; 42,54]	[40,03; 43,03]	[40,64; 43,77]	[40,67; 43,90]	[40,90; 44,23]	[41,44; 44,88]	[40,21; 43,74]
	keine	Anzahl	769	1370	1457	1410	1230	1289	1241	1178	1144	1055	996	900	874
		Anteil in %	10,70	21,23	24,93	26,25	24,77	27,31	28,13	28,47	29,77	29,23	29,32	28,11	29,16
		CI Anteil in %	[9,98; 11,41]	[20,24; 22,23]	[23,82; 26,04]	[25,07; 27,42]	[23,57; 25,97]	[26,04; 28,58]	[26,80; 29,45]	[27,10; 29,85]	[28,32; 31,21]	[27,75; 30,72]	[27,79; 30,85]	[26,55; 29,66]	[27,53; 30,79]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7404	7115	6765	6398	6002	5711	5408	5161	4909
	täglich	Anzahl	2668	1948	1627	1535	1289	1264	1152	1099	966	907	828	815	801
		Anteil in %	25,91	20,96	19,14	19,42	17,41	17,77	17,03	17,18	16,09	15,88	15,31	15,79	16,32
		CI Anteil in %	[25,06; 26,75]	[20,13; 21,78]	[18,30; 19,97]	[18,54; 20,29]	[16,55; 18,27]	[16,88; 18,65]	[16,13; 17,92]	[16,25; 18,10]	[15,16; 17,02]	[14,93; 16,83]	[14,35; 16,27]	[14,80; 16,79]	[15,28; 17,35]
	wöchentlich	Anzahl	2589	1932	1767	1621	1547	1441	1304	1202	1076	1044	1001	963	884
		Anteil in %	25,14	20,78	20,78	20,50	20,89	20,25	19,28	18,79	17,93	18,28	18,51	18,66	18,01
		CI Anteil in %	[24,30; 25,98]	[19,96; 21,61]	[19,92; 21,65]	[19,61; 21,39]	[19,97; 21,82]	[19,32; 21,19]	[18,34; 20,22]	[17,83; 19,74]	[16,96; 18,90]	[17,28; 19,28]	[17,47; 19,54]	[17,60; 19,72]	[16,93; 19,08]
	seltener als wöchentlich	Anzahl	4056	3625	3333	3031	2928	2733	2633	2561	2357	2283	2141	1971	1882
		Anteil in %	39,38	39,00	39,20	38,34	39,55	38,41	38,92	40,03	39,27	39,98	39,59	38,19	38,34
		CI Anteil in %	[38,44; 40,33]	[38,00; 39,99]	[38,16; 40,24]	[37,27; 39,41]	[38,43; 40,66]	[37,28; 39,54]	[37,76; 40,08]	[38,83; 41,23]	[38,03; 40,51]	[38,70; 41,25]	[38,29; 40,89]	[36,86; 39,52]	[36,98; 39,70]
	keine	Anzahl	986	1791	1775	1719	1640	1677	1676	1536	1603	1477	1438	1412	1342
		Anteil in %	9,57	19,27	20,88	21,74	22,15	23,57	24,77	24,01	26,71	25,86	26,59	27,36	27,34
		CI Anteil in %	[9,01; 10,14]	[18,46; 20,07]	[20,01; 21,74]	[20,83; 22,65]	[21,20; 23,10]	[22,58; 24,56]	[23,75; 25,80]	[22,96; 25,05]	[25,59; 27,83]	[24,73; 27,00]	[25,41; 27,77]	[26,14; 28,58]	[26,09; 28,58]

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136	
	auswertbar	Anzahl	14600	12640	11262	10149	9569	8928	8216	7663	7147	6698	6329	5872	
	täglich	Anzahl	3587	2104	1853	1366	1291	1168	1072	982	961	825	800	682	
		Anteil in %	24,57	16,65	16,45	13,46	13,49	13,08	13,05	12,81	13,45	12,32	12,64	11,61	
		CI Anteil in %	[23,87; 25,27]	[16,00; 17,29]	[15,77; 17,14]	[12,80; 14,12]	[12,81; 14,18]	[12,38; 13,78]	[12,32; 13,78]	[12,07; 13,56]	[12,66; 14,24]	[11,53; 13,10]	[11,82; 13,46]	[10,79; 12,43]	
	wöchentlich	Anzahl	3484	2453	2081	1816	1653	1475	1351	1177	1106	1031	992	901	
		Anteil in %	23,86	19,41	18,48	17,89	17,27	16,52	16,44	15,36	15,48	15,39	15,67	15,34	
		CI Anteil in %	[23,17; 24,55]	[18,72; 20,10]	[17,76; 19,19]	[17,15; 18,64]	[16,52; 18,03]	[15,75; 17,29]	[15,64; 17,25]	[14,55; 16,17]	[14,55; 16,31]	[14,53; 16,26]	[14,78; 16,57]	[14,42; 16,27]	
	seltener als wöchentlich	Anzahl	6166	5394	4703	4459	4187	3949	3611	3407	3082	2876	2753	2542	
		Anteil in %	42,23	42,67	41,76	43,94	43,76	44,23	43,95	44,46	43,12	42,94	43,50	43,29	
		CI Anteil in %	[41,43; 43,03]	[41,81; 43,54]	[40,85; 42,67]	[42,97; 44,90]	[42,76; 44,75]	[43,20; 45,26]	[42,88; 45,02]	[43,35; 45,57]	[41,97; 44,27]	[41,75; 44,12]	[42,28; 44,72]	[42,02; 44,56]	
	keine	Anzahl	1363	2689	2625	2508	2438	2336	2182	2097	1998	1966	1784	1747	
		Anteil in %	9,34	21,27	23,31	24,71	25,48	26,16	26,56	27,37	27,96	29,35	28,19	29,75	
		CI Anteil in %	[8,86; 9,81]	[20,56; 21,99]	[22,53; 24,09]	[23,87; 25,55]	[24,60; 26,35]	[25,25; 27,08]	[25,60; 27,51]	[26,37; 28,36]	[26,92; 29,00]	[28,26; 30,44]	[27,08; 29,30]	[28,58; 30,92]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538	
	auswertbar	Anzahl	21993	19406	17594	16019	15252	14301	13350	12575	11922	11313	10727	10109	
	täglich	Anzahl	5941	3662	3320	2490	2429	2136	2001	1846	1771	1591	1536	1376	
		Anteil in %	27,01	18,87	18,87	15,54	15,93	14,94	14,99	14,68	14,85	14,06	14,32	13,61	
		CI Anteil in %	[26,43; 27,60]	[18,32; 19,42]	[18,29; 19,45]	[14,98; 16,11]	[15,35; 16,51]	[14,35; 15,52]	[14,38; 15,59]	[14,06; 15,30]	[14,22; 15,49]	[13,42; 14,70]	[13,66; 14,98]	[12,94; 14,28]	
	wöchentlich	Anzahl	5591	4373	3828	3300	3031	2659	2606	2301	2117	2043	1846	1729	
		Anteil in %	25,42	22,53	21,76	20,60	19,87	18,59	19,52	18,30	17,76	18,06	17,21	17,10	
		CI Anteil in %	[24,85; 26,00]	[21,95; 23,12]	[21,15; 22,37]	[19,97; 21,23]	[19,24; 20,51]	[17,96; 19,23]	[18,85; 20,19]	[17,62; 18,97]	[17,07; 18,44]	[17,35; 18,77]	[16,49; 17,92]	[16,37; 17,84]	
	seltener als wöchentlich	Anzahl	8505	7920	7033	6760	6322	6039	5523	5170	4968	4716	4484	4248	
		Anteil in %	38,67	40,81	39,97	42,20	41,45	42,23	41,37	41,11	41,67	41,69	41,80	42,02	
		CI Anteil in %	[38,03; 39,32]	[40,12; 41,50]	[39,25; 40,70]	[41,44; 42,96]	[40,67; 42,23]	[41,42; 43,04]	[40,54; 42,21]	[40,25; 41,97]	[40,79; 42,56]	[40,78; 42,60]	[40,87; 42,73]	[41,06; 42,98]	
	keine	Anzahl	1956	3451	3413	3469	3470	3467	3220	3258	3066	2963	2861	2756	
		Anteil in %	8,89	17,78	19,40	21,66	22,75	24,24	24,12	25,91	25,72	26,19	26,67	27,26	
CI Anteil in %		[8,52; 9,27]	[17,25; 18,32]	[18,81; 19,98]	[21,02; 22,29]	[22,09; 23,42]	[23,54; 24,95]	[23,39; 24,85]	[25,14; 26,67]	[24,93; 26,50]	[25,38; 27,00]	[25,83; 27,51]	[26,39; 28,13]		

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054		
	auswertbar	Anzahl	19270	16467	14474	13364	12298	11259	10395	9622	8988	8290	7638		
	täglich	Anzahl	4232	2623	1875	1738	1517	1464	1318	1229	1065	1009	894		
		Anteil in %	21,96	15,93	12,95	13,01	12,34	13,00	12,68	12,77	11,85	12,17	11,70		
		CI Anteil in %	[21,38; 22,55]	[15,37; 16,49]	[12,41; 13,50]	[12,43; 13,58]	[11,75; 12,92]	[12,38; 13,62]	[12,04; 13,32]	[12,11; 13,44]	[11,18; 12,52]	[11,47; 12,88]	[10,98; 12,43]		
	wöchentlich	Anzahl	4433	3139	2633	2306	2043	1763	1561	1463	1318	1206	1101		
		Anteil in %	23,00	19,06	18,19	17,26	16,61	15,66	15,02	15,20	14,66	14,55	14,41		
		CI Anteil in %	[22,41; 23,60]	[18,46; 19,66]	[17,56; 18,82]	[16,61; 17,90]	[15,95; 17,27]	[14,99; 16,33]	[14,33; 15,70]	[14,49; 15,92]	[13,93; 15,40]	[13,79; 15,31]	[13,63; 15,20]		
	seltener als wöchentlich	Anzahl	8581	6897	6193	5609	5161	4714	4318	3949	3679	3427	3174		
		Anteil in %	44,53	41,88	42,79	41,97	41,97	41,87	41,54	41,04	40,93	41,34	41,56		
		CI Anteil in %	[43,83; 45,23]	[41,13; 42,64]	[41,98; 43,59]	[41,13; 42,81]	[41,09; 42,84]	[40,96; 42,78]	[40,59; 42,49]	[40,06; 42,02]	[39,92; 41,95]	[40,28; 42,40]	[40,45; 42,66]		
	keine	Anzahl	2024	3808	3773	3711	3577	3318	3198	2981	2926	2648	2469		
		Anteil in %	10,50	23,13	26,07	27,77	29,09	29,47	30,76	30,98	32,55	31,94	32,33		
		CI Anteil in %	[10,07; 10,94]	[22,48; 23,77]	[25,35; 26,78]	[27,01; 28,53]	[28,28; 29,89]	[28,63; 30,31]	[29,88; 31,65]	[30,06; 31,91]	[31,59; 33,52]	[30,94; 32,95]	[31,28; 33,37]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091		
	auswertbar	Anzahl	27266	23812	21330	20056	18574	17193	16064	15048	14185	13337	12539		
	täglich	Anzahl	7026	4774	3492	3314	2792	2601	2406	2319	2074	1871	1712		
		Anteil in %	25,77	20,05	16,37	16,52	15,03	15,13	14,98	15,41	14,62	14,03	13,65		
		CI Anteil in %	[25,25; 26,29]	[19,54; 20,56]	[15,87; 16,87]	[16,01; 17,04]	[14,52; 15,55]	[14,59; 15,66]	[14,43; 15,53]	[14,83; 15,99]	[14,04; 15,20]	[13,44; 14,62]	[13,05; 14,25]		
	wöchentlich	Anzahl	6632	4924	4281	3882	3425	3089	2756	2583	2428	2193	2054		
		Anteil in %	24,32	20,68	20,07	19,36	18,44	17,97	17,16	17,17	17,12	16,44	16,38		
		CI Anteil in %	[23,81; 24,83]	[20,16; 21,19]	[19,53; 20,61]	[18,81; 19,90]	[17,88; 19,00]	[17,39; 18,54]	[16,57; 17,74]	[16,56; 17,77]	[16,50; 17,74]	[15,81; 17,07]	[15,73; 17,03]		
	seltener als wöchentlich	Anzahl	10912	9505	8791	7978	7673	7055	6526	6015	5686	5500	5075		
		Anteil in %	40,02	39,92	41,21	39,78	41,31	41,03	40,63	39,97	40,08	41,24	40,47		
		CI Anteil in %	[39,44; 40,60]	[39,29; 40,54]	[40,55; 41,87]	[39,10; 40,46]	[40,60; 42,02]	[40,30; 41,77]	[39,87; 41,38]	[39,19; 40,75]	[39,28; 40,89]	[40,40; 42,07]	[39,61; 41,33]		
	keine	Anzahl	2696	4609	4766	4882	4684	4448	4376	4131	3997	3773	3698		
		Anteil in %	9,89	19,36	22,34	24,34	25,22	25,87	27,24	27,45	28,18	28,29	29,49		
CI Anteil in %		[9,53; 10,24]	[18,85; 19,86]	[21,79; 22,90]	[23,75; 24,94]	[24,59; 25,84]	[25,22; 26,53]	[26,55; 27,93]	[26,74; 28,17]	[27,44; 28,92]	[27,53; 29,05]	[28,69; 30,29]			

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888			
	auswertbar	Anzahl	23420	19332	17627	15700	14154	12924	11892	10998	10163	9379			
	täglich	Anzahl	5430	2635	2392	1882	1725	1553	1466	1262	1116	1029			
		Anteil in %	23,19	13,63	13,57	11,99	12,19	12,02	12,33	11,47	10,98	10,97			
		CI Anteil in %	[22,64; 23,73]	[13,15; 14,11]	[13,06; 14,08]	[11,48; 12,50]	[11,65; 12,73]	[11,46; 12,58]	[11,74; 12,92]	[10,88; 12,07]	[10,37; 11,59]	[10,34; 11,60]			
	wöchentlich	Anzahl	5453	3642	3096	2628	2318	2048	1830	1635	1531	1364			
		Anteil in %	23,28	18,84	17,56	16,74	16,38	15,85	15,39	14,87	15,06	14,54			
		CI Anteil in %	[22,74; 23,82]	[18,29; 19,39]	[17,00; 18,13]	[16,15; 17,32]	[15,77; 16,99]	[15,22; 16,48]	[14,74; 16,04]	[14,20; 15,53]	[14,37; 15,76]	[13,83; 15,26]			
	seltener als wöchentlich	Anzahl	9978	8414	7520	6699	5998	5279	4883	4520	4192	3837			
		Anteil in %	42,60	43,52	42,66	42,67	42,38	40,85	41,06	41,10	41,25	40,91			
		CI Anteil in %	[41,97; 43,24]	[42,82; 44,22]	[41,93; 43,39]	[41,90; 43,44]	[41,56; 43,19]	[40,00; 41,69]	[40,18; 41,95]	[40,18; 42,02]	[40,29; 42,20]	[39,92; 41,91]			
	keine	Anzahl	2559	4641	4619	4491	4113	4044	3713	3581	3324	3149			
		Anteil in %	10,93	24,01	26,20	28,61	29,06	31,29	31,22	32,56	32,71	33,58			
		CI Anteil in %	[10,53; 11,33]	[23,40; 24,61]	[25,55; 26,85]	[27,90; 29,31]	[28,31; 29,81]	[30,49; 32,09]	[30,39; 32,06]	[31,68; 33,44]	[31,79; 33,62]	[32,62; 34,53]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308			
	auswertbar	Anzahl	33795	28692	26390	23898	22019	20311	18957	17782	16661	15649			
	täglich	Anzahl	8838	4795	4291	3515	3296	2851	2672	2424	2305	2052			
		Anteil in %	26,15	16,71	16,26	14,71	14,97	14,04	14,10	13,63	13,83	13,11			
		CI Anteil in %	[25,68; 26,62]	[16,28; 17,14]	[15,81; 16,71]	[14,26; 15,16]	[14,50; 15,44]	[13,56; 14,51]	[13,60; 14,59]	[13,13; 14,14]	[13,31; 14,36]	[12,58; 13,64]			
	wöchentlich	Anzahl	8427	5966	5282	4469	4094	3606	3377	3026	2922	2607			
		Anteil in %	24,94	20,79	20,02	18,70	18,59	17,75	17,81	17,02	17,54	16,66			
		CI Anteil in %	[24,47; 25,40]	[20,32; 21,26]	[19,53; 20,50]	[18,21; 19,19]	[18,08; 19,11]	[17,23; 18,28]	[17,27; 18,36]	[16,46; 17,57]	[16,96; 18,12]	[16,08; 17,24]			
	seltener als wöchentlich	Anzahl	13143	11934	10715	9914	8913	8322	7775	7195	6681	6188			
		Anteil in %	38,89	41,59	40,60	41,48	40,48	40,97	41,01	40,46	40,10	39,54			
		CI Anteil in %	[38,37; 39,41]	[41,02; 42,16]	[40,01; 41,20]	[40,86; 42,11]	[39,83; 41,13]	[40,30; 41,65]	[40,31; 41,71]	[39,74; 41,18]	[39,36; 40,84]	[38,78; 40,31]			
	keine	Anzahl	3387	5997	6102	6000	5716	5532	5133	5137	4753	4802			
		Anteil in %	10,02	20,90	23,12	25,11	25,96	27,24	27,08	28,89	28,53	30,69			
		CI Anteil in %	[9,70; 10,34]	[20,43; 21,37]	[22,61; 23,63]	[24,56; 25,66]	[25,38; 26,54]	[26,62; 27,85]	[26,44; 27,71]	[28,22; 29,55]	[27,84; 29,21]	[29,96; 31,41]			

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023					
	auswertbar	Anzahl	21334	17846	15654	14023	12851	11825	10991	10200	9533					
	täglich	Anzahl	3749	2300	1780	1578	1381	1317	1149	1094	980					
		Anteil in %	17,57	12,89	11,37	11,25	10,75	11,14	10,45	10,73	10,28					
		CI Anteil in %	[17,06; 18,08]	[12,40; 13,38]	[10,87; 11,87]	[10,73; 11,78]	[10,21; 11,28]	[10,57; 11,70]	[9,88; 11,03]	[10,12; 11,33]	[9,67; 10,89]					
	wöchentlich	Anzahl	5065	3361	2686	2417	2093	1898	1706	1596	1477					
		Anteil in %	23,74	18,83	17,16	17,24	16,29	16,05	15,52	15,65	15,49					
		CI Anteil in %	[23,17; 24,31]	[18,26; 19,41]	[16,57; 17,75]	[16,61; 17,86]	[15,65; 16,93]	[15,39; 16,71]	[14,84; 16,20]	[14,94; 16,35]	[14,77; 16,22]					
	seltener als wöchentlich	Anzahl	9653	7972	7130	6205	5646	5132	4851	4441	4022					
		Anteil in %	45,25	44,67	45,55	44,25	43,93	43,40	44,14	43,54	42,19					
		CI Anteil in %	[44,58; 45,91]	[43,94; 45,40]	[44,77; 46,33]	[43,43; 45,07]	[43,08; 44,79]	[42,51; 44,29]	[43,21; 45,06]	[42,58; 44,50]	[41,20; 43,18]					
	keine	Anzahl	2867	4213	4058	3823	3731	3478	3285	3069	3054					
		Anteil in %	13,44	23,61	25,92	27,26	29,03	29,41	29,89	30,09	32,04					
		CI Anteil in %	[12,98; 13,90]	[22,98; 24,23]	[25,24; 26,61]	[26,53; 28,00]	[28,25; 29,82]	[28,59; 30,23]	[29,03; 30,74]	[29,20; 30,98]	[31,10; 32,97]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502					
	auswertbar	Anzahl	31852	27142	24364	22218	20464	19028	17932	16760	15734					
	täglich	Anzahl	6459	4219	3341	3145	2693	2499	2228	2077	1899					
		Anteil in %	20,28	15,54	13,71	14,16	13,16	13,13	12,42	12,39	12,07					
		CI Anteil in %	[19,84; 20,72]	[15,11; 15,98]	[13,28; 14,14]	[13,70; 14,61]	[12,70; 13,62]	[12,65; 13,61]	[11,94; 12,91]	[11,89; 12,89]	[11,56; 12,58]					
	wöchentlich	Anzahl	8220	5813	4773	4212	3724	3375	3115	2980	2634					
		Anteil in %	25,81	21,42	19,59	18,96	18,20	17,74	17,37	17,78	16,74					
		CI Anteil in %	[25,33; 26,29]	[20,93; 21,91]	[19,09; 20,09]	[18,44; 19,47]	[17,67; 18,73]	[17,19; 18,28]	[16,82; 17,93]	[17,20; 18,36]	[16,16; 17,32]					
	seltener als wöchentlich	Anzahl	13450	11442	10611	9567	8814	8168	7632	6971	6540					
		Anteil in %	42,23	42,16	43,55	43,06	43,07	42,93	42,56	41,59	41,57					
		CI Anteil in %	[41,68; 42,77]	[41,57; 42,74]	[42,93; 44,17]	[42,41; 43,71]	[42,39; 43,75]	[42,22; 43,63]	[41,84; 43,28]	[40,85; 42,34]	[40,80; 42,34]					
	keine	Anzahl	3723	5668	5639	5294	5233	4986	4957	4732	4661					
		Anteil in %	11,69	20,88	23,14	23,83	25,57	26,20	27,64	28,23	29,62					
CI Anteil in %		[11,34; 12,04]	[20,40; 21,37]	[22,62; 23,67]	[23,27; 24,39]	[24,97; 26,17]	[25,58; 26,83]	[26,99; 28,30]	[27,55; 28,92]	[28,91; 30,34]						

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675						
	auswertbar	Anzahl	17143	13805	11879	10495	9475	8606	7869	7244						
	täglich	Anzahl	3250	1583	1330	1095	998	862	814	699						
		Anteil in %	18,96	11,47	11,20	10,43	10,53	10,02	10,34	9,65						
		CI Anteil in %	[18,37; 19,54]	[10,94; 12,00]	[10,63; 11,76]	[9,85; 11,02]	[9,91; 11,15]	[9,38; 10,65]	[9,67; 11,02]	[8,97; 10,33]						
	wöchentlich	Anzahl	4166	2522	2070	1668	1541	1319	1183	1071						
		Anteil in %	24,30	18,27	17,43	15,89	16,26	15,33	15,03	14,78						
		CI Anteil in %	[23,66; 24,94]	[17,62; 18,91]	[16,74; 18,11]	[15,19; 16,59]	[15,52; 17,01]	[14,57; 16,09]	[14,24; 15,82]	[13,97; 15,60]						
	seltener als wöchentlich	Anzahl	7402	6200	5295	4672	4140	3705	3435	3144						
		Anteil in %	43,18	44,91	44,57	44,52	43,69	43,05	43,65	43,40						
		CI Anteil in %	[42,44; 43,92]	[44,08; 45,74]	[43,68; 45,47]	[43,57; 45,47]	[42,70; 44,69]	[42,01; 44,10]	[42,56; 44,75]	[42,26; 44,54]						
	keine	Anzahl	2325	3500	3184	3060	2796	2720	2437	2330						
		Anteil in %	13,56	25,35	26,80	29,16	29,51	31,61	30,97	32,16						
		CI Anteil in %	[13,05; 14,07]	[24,63; 26,08]	[26,01; 27,60]	[28,29; 30,03]	[28,59; 30,43]	[30,62; 32,59]	[29,95; 31,99]	[31,09; 33,24]						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641						
	auswertbar	Anzahl	24790	20505	18154	16340	14995	13913	12940	12046						
	täglich	Anzahl	5531	2988	2584	2117	1976	1720	1596	1427						
		Anteil in %	22,31	14,57	14,23	12,96	13,18	12,36	12,33	11,85						
		CI Anteil in %	[21,79; 22,83]	[14,09; 15,06]	[13,73; 14,74]	[12,44; 13,47]	[12,64; 13,72]	[11,82; 12,91]	[11,77; 12,90]	[11,27; 12,42]						
	wöchentlich	Anzahl	6072	4060	3442	2926	2715	2456	2249	2033						
		Anteil in %	24,49	19,80	18,96	17,91	18,11	17,65	17,38	16,88						
		CI Anteil in %	[23,96; 25,03]	[19,25; 20,35]	[18,39; 19,53]	[17,32; 18,49]	[17,49; 18,72]	[17,02; 18,29]	[16,73; 18,03]	[16,21; 17,55]						
	seltener als wöchentlich	Anzahl	10066	8707	7758	6940	6314	5908	5494	5012						
		Anteil in %	40,61	42,46	42,73	42,47	42,11	42,46	42,46	41,61						
		CI Anteil in %	[39,99; 41,22]	[41,79; 43,14]	[42,01; 43,45]	[41,71; 43,23]	[41,32; 42,90]	[41,64; 43,29]	[41,61; 43,31]	[40,73; 42,49]						
	keine	Anzahl	3121	4750	4370	4357	3990	3829	3601	3574						
		Anteil in %	12,59	23,17	24,07	26,66	26,61	27,52	27,83	29,67						
		CI Anteil in %	[12,18; 13,00]	[22,59; 23,74]	[23,45; 24,69]	[25,99; 27,34]	[25,90; 27,32]	[26,78; 28,26]	[27,06; 28,60]	[28,85; 30,49]						

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818							
	auswertbar	Anzahl	14497	11586	9850	8629	7803	7041	6453							
	täglich	Anzahl	2632	1388	1127	942	797	674	606							
		Anteil in %	18,16	11,98	11,44	10,92	10,21	9,57	9,39							
		CI Anteil in %	[17,53; 18,78]	[11,39; 12,57]	[10,81; 12,07]	[10,26; 11,57]	[9,54; 10,89]	[8,89; 10,26]	[8,68; 10,10]							
	wöchentlich	Anzahl	3262	1989	1538	1353	1141	1079	903							
		Anteil in %	22,50	17,17	15,61	15,68	14,62	15,32	13,99							
		CI Anteil in %	[21,82; 23,18]	[16,48; 17,85]	[14,90; 16,33]	[14,91; 16,45]	[13,84; 15,41]	[14,48; 16,17]	[13,15; 14,84]							
	seltener als wöchentlich	Anzahl	6409	5248	4420	3841	3450	3135	2833							
		Anteil in %	44,21	45,30	44,87	44,51	44,21	44,52	43,90							
		CI Anteil in %	[43,40; 45,02]	[44,39; 46,20]	[43,89; 45,86]	[43,46; 45,56]	[43,11; 45,32]	[43,36; 45,69]	[42,69; 45,11]							
	keine	Anzahl	2194	2961	2765	2493	2415	2153	2111							
		Anteil in %	15,13	25,56	28,07	28,89	30,95	30,58	32,71							
		CI Anteil in %	[14,55; 15,72]	[24,76; 26,35]	[27,18; 28,96]	[27,93; 29,85]	[29,92; 31,98]	[29,50; 31,65]	[31,57; 33,86]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125							
	auswertbar	Anzahl	21009	17416	15151	13531	12419	11363	10523							
	täglich	Anzahl	4267	2578	1983	1757	1555	1451	1252							
		Anteil in %	20,31	14,80	13,09	12,98	12,52	12,77	11,90							
		CI Anteil in %	[19,77; 20,85]	[14,28; 15,33]	[12,55; 13,63]	[12,42; 13,55]	[11,94; 13,10]	[12,16; 13,38]	[11,28; 12,52]							
	wöchentlich	Anzahl	4948	3304	2678	2433	2137	1926	1673							
		Anteil in %	23,55	18,97	17,68	17,98	17,21	16,95	15,90							
		CI Anteil in %	[22,98; 24,13]	[18,39; 19,55]	[17,07; 18,28]	[17,33; 18,63]	[16,54; 17,87]	[16,26; 17,64]	[15,20; 16,60]							
	seltener als wöchentlich	Anzahl	8852	7530	6573	5790	5278	4787	4514							
		Anteil in %	42,13	43,24	43,38	42,79	42,50	42,13	42,90							
		CI Anteil in %	[41,47; 42,80]	[42,50; 43,97]	[42,59; 44,17]	[41,96; 43,62]	[41,63; 43,37]	[41,22; 43,04]	[41,95; 43,84]							
	keine	Anzahl	2942	4004	3917	3551	3449	3199	3084							
		Anteil in %	14,00	22,99	25,85	26,24	27,77	28,15	29,31							
CI Anteil in %		[13,53; 14,47]	[22,37; 23,62]	[25,16; 26,55]	[25,50; 26,98]	[26,98; 28,56]	[27,33; 28,98]	[28,44; 30,18]								

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281							
	auswertbar	Anzahl	15873	12648	10882	9608	8640	7802							
	täglich	Anzahl	2912	1467	1295	1015	900	786							
		Anteil in %	18,35	11,60	11,90	10,56	10,42	10,07							
		CI Anteil in %	[17,74; 18,95]	[11,04; 12,16]	[11,29; 12,51]	[9,95; 11,18]	[9,77; 11,06]	[9,41; 10,74]							
	wöchentlich	Anzahl	3625	2115	1759	1452	1320	1149							
		Anteil in %	22,84	16,72	16,16	15,11	15,28	14,73							
		CI Anteil in %	[22,18; 23,49]	[16,07; 17,37]	[15,47; 16,86]	[14,40; 15,83]	[14,52; 16,04]	[13,94; 15,51]							
	seltener als wöchentlich	Anzahl	6934	5613	4781	4245	3774	3365							
		Anteil in %	43,68	44,38	43,93	44,18	43,68	43,13							
		CI Anteil in %	[42,91; 44,46]	[43,51; 45,24]	[43,00; 44,87]	[43,19; 45,17]	[42,63; 44,73]	[42,03; 44,23]							
	keine	Anzahl	2402	3453	3047	2896	2646	2502							
		Anteil in %	15,13	27,30	28,00	30,14	30,63	32,07							
		CI Anteil in %	[14,58; 15,69]	[26,52; 28,08]	[27,16; 28,84]	[29,22; 31,06]	[29,65; 31,60]	[31,03; 33,10]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236							
	auswertbar	Anzahl	23098	19106	16717	15032	13727	12538							
	täglich	Anzahl	4779	2562	2261	1838	1648	1464							
		Anteil in %	20,69	13,41	13,53	12,23	12,01	11,68							
		CI Anteil in %	[20,17; 21,21]	[12,93; 13,89]	[13,01; 14,04]	[11,70; 12,75]	[11,46; 12,55]	[11,11; 12,24]							
	wöchentlich	Anzahl	5499	3561	3029	2651	2457	2111							
		Anteil in %	23,81	18,64	18,12	17,64	17,90	16,84							
		CI Anteil in %	[23,26; 24,36]	[18,09; 19,19]	[17,54; 18,70]	[17,03; 18,25]	[17,26; 18,54]	[16,18; 17,49]							
	seltener als wöchentlich	Anzahl	9526	8249	7118	6372	5748	5249							
		Anteil in %	41,24	43,17	42,58	42,39	41,87	41,86							
		CI Anteil in %	[40,61; 41,88]	[42,47; 43,88]	[41,83; 43,33]	[41,60; 43,18]	[41,05; 42,70]	[41,00; 42,73]							
	keine	Anzahl	3294	4734	4309	4171	3874	3714							
		Anteil in %	14,26	24,78	25,78	27,75	28,22	29,62							
		CI Anteil in %	[13,81; 14,71]	[24,17; 25,39]	[25,11; 26,44]	[27,03; 28,46]	[27,47; 28,97]	[28,82; 30,42]							

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568								
	auswertbar	Anzahl	14957	11959	10204	9003	8062								
	täglich	Anzahl	2556	1399	1078	903	753								
		Anteil in %	17,09	11,70	10,56	10,03	9,34								
		CI Anteil in %	[16,49; 17,69]	[11,12; 12,27]	[9,97; 11,16]	[9,41; 10,65]	[8,70; 9,98]								
	wöchentlich	Anzahl	3272	2004	1614	1374	1152								
		Anteil in %	21,88	16,76	15,82	15,26	14,29								
		CI Anteil in %	[21,21; 22,54]	[16,09; 17,43]	[15,11; 16,53]	[14,52; 16,00]	[13,53; 15,05]								
	seltener als wöchentlich	Anzahl	6619	5354	4574	4073	3639								
		Anteil in %	44,25	44,77	44,83	45,24	45,14								
		CI Anteil in %	[43,46; 45,05]	[43,88; 45,66]	[43,86; 45,79]	[44,21; 46,27]	[44,05; 46,22]								
	keine	Anzahl	2510	3202	2938	2653	2518								
		Anteil in %	16,78	26,77	28,79	29,47	31,23								
		CI Anteil in %	[16,18; 17,38]	[25,98; 27,57]	[27,91; 29,67]	[28,53; 30,41]	[30,22; 32,24]								
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579								
	auswertbar	Anzahl	21727	18009	15761	14155	12808								
	täglich	Anzahl	4118	2437	1886	1698	1433								
		Anteil in %	18,95	13,53	11,97	12,00	11,19								
		CI Anteil in %	[18,43; 19,47]	[13,03; 14,03]	[11,46; 12,47]	[11,46; 12,53]	[10,64; 11,73]								
	wöchentlich	Anzahl	4910	3347	2741	2421	2008								
		Anteil in %	22,60	18,59	17,39	17,10	15,68								
		CI Anteil in %	[22,04; 23,15]	[18,02; 19,15]	[16,80; 17,98]	[16,48; 17,72]	[15,05; 16,31]								
	seltener als wöchentlich	Anzahl	9266	7754	6879	6120	5541								
		Anteil in %	42,65	43,06	43,65	43,24	43,26								
		CI Anteil in %	[41,99; 43,31]	[42,33; 43,78]	[42,87; 44,42]	[42,42; 44,05]	[42,40; 44,12]								
	keine	Anzahl	3433	4471	4255	3916	3826								
		Anteil in %	15,80	24,83	27,00	27,67	29,87								
		CI Anteil in %	[15,32; 16,29]	[24,20; 25,46]	[26,30; 27,69]	[26,93; 28,40]	[29,08; 30,66]								

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15409	12971	11106	9678										
	auswertbar	Anzahl	15409	12286	10474	9001										
	täglich	Anzahl	2797	1351	1141	858										
		Anteil in %	18,15	11,00	10,89	9,53										
		CI Anteil in %	[17,54; 18,76]	[10,44; 11,55]	[10,30; 11,49]	[8,93; 10,14]										
	wöchentlich	Anzahl	3343	1983	1576	1361										
		Anteil in %	21,70	16,14	15,05	15,12										
		CI Anteil in %	[21,04; 22,35]	[15,49; 16,79]	[14,36; 15,73]	[14,38; 15,86]										
	seltener als wöchentlich	Anzahl	6649	5496	4678	3984										
		Anteil in %	43,15	44,73	44,66	44,26										
		CI Anteil in %	[42,37; 43,93]	[43,85; 45,61]	[43,71; 45,62]	[43,24; 45,29]										
	keine	Anzahl	2620	3456	3079	2798										
		Anteil in %	17,00	28,13	29,40	31,09										
		CI Anteil in %	[16,41; 17,60]	[27,33; 28,92]	[28,52; 30,27]	[30,13; 32,04]										
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23197	20078	17696	15845										
	auswertbar	Anzahl	23197	19097	16755	14928										
	täglich	Anzahl	4725	2552	2186	1759										
		Anteil in %	20,37	13,36	13,05	11,78										
		CI Anteil in %	[19,85; 20,89]	[12,88; 13,85]	[12,54; 13,56]	[11,27; 12,30]										
	wöchentlich	Anzahl	5336	3526	3036	2639										
		Anteil in %	23,00	18,46	18,12	17,68										
		CI Anteil in %	[22,46; 23,54]	[17,91; 19,01]	[17,54; 18,70]	[17,07; 18,29]										
	seltener als wöchentlich	Anzahl	9527	8039	7043	6239										
		Anteil in %	41,07	42,10	42,04	41,79										
		CI Anteil in %	[40,44; 41,70]	[41,40; 42,80]	[41,29; 42,78]	[41,00; 42,59]										
	keine	Anzahl	3609	4980	4490	4291										
		Anteil in %	15,56	26,08	26,80	28,74										
		CI Anteil in %	[15,09; 16,02]	[25,45; 26,70]	[26,13; 27,47]	[28,02; 29,47]										

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14050	11811	10082											
	auswertbar	Anzahl	14050	11195	9376											
	täglich	Anzahl	2260	1196	958											
		Anteil in %	16,09	10,68	10,22											
		CI Anteil in %	[15,48; 16,69]	[10,11; 11,26]	[9,60; 10,83]											
	wöchentlich	Anzahl	2952	1841	1428											
		Anteil in %	21,01	16,44	15,23											
		CI Anteil in %	[20,34; 21,68]	[15,76; 17,13]	[14,50; 15,96]											
	seltener als wöchentlich	Anzahl	6274	5083	4160											
		Anteil in %	44,65	45,40	44,37											
		CI Anteil in %	[43,83; 45,48]	[44,48; 46,33]	[43,36; 45,37]											
	keine	Anzahl	2564	3075	2830											
		Anteil in %	18,25	27,47	30,18											
		CI Anteil in %	[17,61; 18,89]	[26,64; 28,29]	[29,25; 31,11]											
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20513	17841	15614											
	auswertbar	Anzahl	20513	16981	14678											
	täglich	Anzahl	3708	2134	1700											
		Anteil in %	18,08	12,57	11,58											
		CI Anteil in %	[17,55; 18,60]	[12,07; 13,07]	[11,06; 12,10]											
	wöchentlich	Anzahl	4655	3131	2588											
		Anteil in %	22,69	18,44	17,63											
		CI Anteil in %	[22,12; 23,27]	[17,85; 19,02]	[17,02; 18,25]											
	seltener als wöchentlich	Anzahl	8732	7434	6408											
		Anteil in %	42,57	43,78	43,66											
CI Anteil in %		[41,89; 43,24]	[43,03; 44,52]	[42,85; 44,46]												
keine	Anzahl	3418	4282	3982												
	Anteil in %	16,66	25,22	27,13												
	CI Anteil in %	[16,15; 17,17]	[24,56; 25,87]	[26,41; 27,85]												

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16002	13484												
	auswertbar	Anzahl	16002	12571												
	täglich	Anzahl	2468	1227												
		Anteil in %		15,42	9,76											
		CI Anteil in %		[14,86; 15,98]	[9,24; 10,28]											
	wöchentlich	Anzahl	3373	1954												
		Anteil in %		21,08	15,54											
		CI Anteil in %		[20,45; 21,71]	[14,91; 16,18]											
	seltener als wöchentlich	Anzahl	7108	5642												
		Anteil in %		44,42	44,88											
		CI Anteil in %		[43,65; 45,19]	[44,01; 45,75]											
	keine	Anzahl	3053	3748												
		Anteil in %		19,08	29,81											
		CI Anteil in %		[18,47; 19,69]	[29,01; 30,61]											
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23844	20669												
	auswertbar	Anzahl	23844	19313												
	täglich	Anzahl	4246	2357												
		Anteil in %		17,81	12,20											
		CI Anteil in %		[17,32; 18,29]	[11,74; 12,67]											
	wöchentlich	Anzahl	5246	3386												
		Anteil in %		22,00	17,53											
		CI Anteil in %		[21,48; 22,53]	[17,00; 18,07]											
	seltener als wöchentlich	Anzahl	10150	8315												
		Anteil in %		42,57	43,05											
CI Anteil in %			[41,94; 43,20]	[42,36; 43,75]												
keine	Anzahl	4202	5255													
	Anteil in %		17,62	27,21												
	CI Anteil in %		[17,14; 18,11]	[26,58; 27,84]												

EZ	Häufigkeit von Asthmasymptomen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14102													
	auswertbar	Anzahl	14102													
	täglich	Anzahl	2213													
		Anteil in %	15,69													
		CI Anteil in %	[15,09; 16,29]													
		Anzahl	3017													
	wöchentlich	Anteil in %	21,39													
		CI Anteil in %	[20,72; 22,07]													
		Anzahl	6254													
		Anteil in %	44,35													
	seltener als wöchentlich	CI Anteil in %	[43,53; 45,17]													
		Anzahl	2618													
	keine	Anteil in %	18,56													
		CI Anteil in %	[17,92; 19,21]													
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20545													
	auswertbar	Anzahl	20545													
	täglich	Anzahl	3671													
		Anteil in %	17,87													
		CI Anteil in %	[17,34; 18,39]													
		Anzahl	4618													
	wöchentlich	Anteil in %	22,48													
		CI Anteil in %	[21,91; 23,05]													
		Anzahl	8537													
		Anteil in %	41,55													
seltener als wöchentlich	CI Anteil in %	[40,88; 42,23]														
	Anzahl	3719														
keine	Anteil in %	18,10														
	CI Anteil in %	[17,58; 18,63]														

Tabelle 3.2.2 gibt für die jeweiligen Berichtshalbjahre Auskunft über die **Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen** bzw. ob diese sich bei den Programmteilnehmern seit der letzten Dokumentation verbessert haben, gleichgeblieben sind oder sich verschlechtert haben. Für das Beitrittsjahr können - mangels einer vorherigen Dokumentation - keine Werte ausgewiesen werden. Betrachtet werden daher alle Versicherten, die jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Berichtshalbjahren Programmteilnehmer waren. Hierbei wird unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Anzahl derjeni-

gen Patienten angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den drei Kategorien (Verbesserung der Asthmasymptome, gleichbleibende Asthmasymptome, Verschlechterung der Asthmasymptome) über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Patienten angegeben.

Tabelle 3.2.2 Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	auswertbar	Anzahl		816	737	684	631	592	553	515	491	456	430	406	379	356
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		235	136	141	100	127	112	87	70	74	58	62	55	48
		Anteil in %		28,80	18,45	20,61	15,85	21,45	20,25	16,89	14,26	16,23	13,49	15,27	14,51	13,48
		CI Anteil in %		[25,69; 31,91]	[15,65; 21,26]	[17,58; 23,65]	[13,00; 18,70]	[18,14; 24,76]	[16,90; 23,61]	[13,65; 20,13]	[11,16; 17,35]	[12,84; 19,62]	[10,26; 16,72]	[11,77; 18,77]	[10,96; 18,06]	[9,93; 17,04]
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		479	483	434	443	343	360	336	336	318	295	289	272	257
		Anteil in %		58,70	65,54	63,45	70,21	57,94	65,10	65,24	68,43	69,74	68,60	71,18	71,77	72,19
		CI Anteil in %		[55,32; 62,08]	[62,10; 68,97]	[59,84; 67,06]	[66,63; 73,78]	[53,96; 61,92]	[61,12; 69,08]	[61,13; 69,36]	[64,32; 72,55]	[65,52; 73,96]	[64,21; 73,00]	[66,77; 75,59]	[67,23; 76,31]	[67,53; 76,85]
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		102	118	109	88	122	81	92	85	64	77	55	52	51
		Anteil in %		12,50	16,01	15,94	13,95	20,61	14,65	17,86	17,31	14,04	17,91	13,55	13,72	14,33
		CI Anteil in %		[10,23; 14,77]	[13,36; 18,66]	[13,19; 18,68]	[11,24; 16,65]	[17,35; 23,87]	[11,70; 17,60]	[14,55; 21,18]	[13,96; 20,66]	[10,84; 17,23]	[14,28; 21,54]	[10,21; 16,88]	[10,25; 17,19]	[10,68; 17,97]
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
	auswertbar	Anzahl		1179	1089	1019	984	940	901	857	820	777	728	699	681	657
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		358	199	216	156	225	168	133	147	136	110	108	91	99
		Anteil in %		30,36	18,27	21,20	15,85	23,94	18,65	15,52	17,93	17,50	15,11	15,45	13,36	15,07
		CI Anteil in %		[27,74; 32,99]	[15,98; 20,57]	[18,69; 23,71]	[13,57; 18,14]	[21,21; 26,67]	[16,10; 21,19]	[13,09; 17,94]	[15,30; 20,55]	[14,83; 20,18]	[12,51; 17,71]	[12,77; 18,13]	[10,81; 15,92]	[12,33; 17,81]
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		634	710	638	674	518	586	562	563	530	528	500	503	459
		Anteil in %		53,77	65,20	62,61	68,50	55,11	65,04	65,58	68,66	68,21	72,53	71,53	73,86	69,86
		CI Anteil in %		[50,93; 56,62]	[62,37; 68,03]	[59,64; 65,58]	[65,59; 71,40]	[51,92; 58,29]	[61,92; 68,15]	[62,39; 68,76]	[65,48; 71,84]	[64,93; 71,49]	[69,28; 75,77]	[68,18; 74,88]	[70,56; 77,16]	[66,35; 73,37]
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		187	180	165	154	197	147	162	110	111	90	91	87	99
		Anteil in %		15,86	16,53	16,19	15,65	20,96	16,32	18,90	13,41	14,29	12,36	13,02	12,78	15,07
		CI Anteil in %		[13,77; 17,95]	[14,32; 18,74]	[13,93; 18,46]	[13,38; 17,92]	[18,35; 23,56]	[13,90; 18,73]	[16,28; 21,53]	[11,08; 15,75]	[11,82; 16,75]	[9,97; 14,76]	[10,52; 15,52]	[10,27; 15,28]	[12,33; 17,81]

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124	
	auswertbar	Anzahl		6452	5734	5288	4892	4587	4348	4081	3796	3553	3347	3158	2961	
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		1933	1184	862	1046	868	774	648	603	508	486	418	451	
		Anteil in %		29,96	20,65	16,30	21,38	18,92	17,80	15,88	15,89	14,30	14,52	13,24	15,23	
		CI Anteil in %		[28,84; 31,08]	[19,60; 21,70]	[15,31; 17,30]	[20,23; 22,53]	[17,79; 20,06]	[16,66; 18,94]	[14,76; 17,00]	[14,72; 17,05]	[13,15; 15,45]	[13,33; 15,71]	[12,05; 14,42]	[13,94; 16,53]	
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		3605	3712	3648	2820	2962	2883	2808	2655	2532	2409	2255	2110	
		Anteil in %		55,87	64,74	68,99	57,65	64,57	66,31	68,81	69,94	71,26	71,97	71,41	71,26	
		CI Anteil in %		[54,66; 57,09]	[63,50; 65,97]	[67,74; 70,23]	[56,26; 59,03]	[63,19; 65,96]	[64,90; 67,71]	[67,39; 70,23]	[68,48; 71,40]	[69,78; 72,75]	[70,45; 73,50]	[69,83; 72,98]	[69,63; 72,89]	
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		914	838	778	1026	757	691	625	538	513	452	485	400	
		Anteil in %		14,17	14,61	14,71	20,97	16,50	15,89	15,31	14,17	14,44	13,50	15,36	13,51	
		CI Anteil in %		[13,32; 15,02]	[13,70; 15,53]	[13,76; 15,67]	[19,83; 22,11]	[15,43; 17,58]	[14,81; 16,98]	[14,21; 16,42]	[13,06; 15,28]	[13,28; 15,59]	[12,35; 14,66]	[13,35; 16,62]	[14,10; 16,62]	[12,28; 14,74]
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	
	auswertbar	Anzahl		9296	8342	7794	7310	6918	6673	6326	5953	5620	5340	5093	4849	
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		2880	1646	1269	1644	1237	1202	1005	1027	840	787	689	706	
		Anteil in %		30,98	19,73	16,28	22,49	17,88	18,01	15,89	17,25	14,95	14,74	13,53	14,56	
		CI Anteil in %		[30,04; 31,92]	[18,88; 20,59]	[15,46; 17,10]	[21,53; 23,45]	[16,98; 18,78]	[17,09; 18,94]	[14,99; 16,79]	[16,29; 18,21]	[14,01; 15,88]	[13,79; 15,69]	[12,59; 14,47]	[13,57; 15,55]	
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		5030	5361	5301	4144	4504	4442	4313	4112	3939	3809	3703	3435	
		Anteil in %		54,11	64,27	68,01	56,69	65,11	66,57	68,18	69,07	70,09	71,33	72,71	70,84	
CI Anteil in %			[53,10; 55,12]	[63,24; 65,29]	[66,98; 69,05]	[55,55; 57,83]	[63,98; 66,23]	[65,43; 67,70]	[67,03; 69,33]	[67,90; 70,25]	[68,89; 71,29]	[70,12; 72,54]	[71,48; 73,93]	[69,56; 72,12]		
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1386	1335	1224	1522	1177	1029	1008	814	841	744	701	708		
	Anteil in %		14,91	16,00	15,70	20,82	17,01	15,42	15,93	13,67	14,96	13,93	13,76	14,60		
	CI Anteil in %		[14,19; 15,63]	[15,22; 16,79]	[14,90; 16,51]	[19,89; 21,75]	[16,13; 17,90]	[14,55; 16,29]	[15,03; 16,84]	[12,80; 14,55]	[14,03; 15,90]	[13,00; 14,86]	[12,82; 14,71]	[13,61; 15,59]		
2007-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136		
	auswertbar	Anzahl		12640	10951	9898	9153	8719	8082	7518	7005	6556	6190	5770		
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		4328	1967	2357	1668	1490	1315	1250	1080	1010	825	901		
		Anteil in %		34,24	17,96	23,81	18,22	17,09	16,27	16,63	15,42	15,41	13,33	15,62		
		CI Anteil in %		[33,41; 35,07]	[17,24; 18,68]	[22,97; 24,65]	[17,43; 19,01]	[16,30; 17,88]	[15,47; 17,47]	[15,79; 17,47]	[14,57; 16,26]	[14,53; 16,28]	[12,48; 14,17]	[14,68; 16,55]		
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		6807	7280	5656	5946	5888	5496	5182	4911	4701	4517	4138		
		Anteil in %		53,85	66,48	57,14	64,96	67,53	68,00	68,93	70,11	71,71	72,97	71,72		
		CI Anteil in %		[52,98; 54,72]	[65,59; 67,36]	[56,17; 58,12]	[63,98; 65,94]	[66,55; 68,51]	[66,99; 69,02]	[67,88; 69,97]	[69,03; 71,18]	[70,61; 72,80]	[71,87; 74,08]	[70,55; 72,88]		
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1505	1704	1885	1539	1341	1271	1086	1014	845	848	731		
		Anteil in %		11,91	15,56	19,04	16,81	15,38	15,73	14,45	14,48	12,89	13,70	12,67		
		CI Anteil in %		[11,34; 12,47]	[14,88; 16,24]	[18,27; 19,82]	[16,05; 17,58]	[14,62; 16,14]	[14,93; 16,52]	[13,65; 15,24]	[13,65; 15,30]	[12,08; 13,70]	[12,84; 14,56]	[11,81; 13,53]		
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538		
	auswertbar	Anzahl		19406	17116	15623	14613	13979	13078	12297	11646	11091	10530	9909		
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		6284	3123	3927	2662	2636	2053	2125	1779	1700	1566	1542		
		Anteil in %		32,38	18,25	25,14	18,22	18,86	15,70	17,28	15,28	15,33	14,87	15,56		
		CI Anteil in %		[31,72; 33,04]	[17,67; 18,82]	[24,46; 25,82]	[17,59; 18,84]	[18,21; 19,51]	[15,07; 16,32]	[16,61; 17,95]	[14,62; 15,93]	[14,66; 16,00]	[14,19; 15,55]	[14,85; 16,28]		
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		10565	11243	8636	9327	9184	8902	8366	8099	7855	7468	6986		
		Anteil in %		54,44	65,69	55,28	63,83	65,70	68,07	68,03	69,54	70,82	70,92	70,50		
CI Anteil in %			[53,74; 55,14]	[64,98; 66,40]	[54,50; 56,06]	[63,05; 64,61]	[64,91; 66,49]	[67,27; 68,87]	[67,21; 68,86]	[68,71; 70,38]	[69,98; 71,67]	[70,05; 71,79]	[69,60; 71,40]			
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2557	2750	3060	2624	2159	2123	1806	1768	1536	1496	1381			
	Anteil in %		13,18	16,07	19,59	17,96	15,44	16,23	14,69	15,18	13,85	14,21	13,94			
	CI Anteil in %		[12,70; 13,65]	[15,52; 16,62]	[18,96; 20,21]	[17,33; 18,58]	[14,85; 16,04]	[15,60; 16,87]	[14,06; 15,31]	[14,53; 15,83]	[13,21; 14,49]	[13,54; 14,87]	[13,25; 14,62]			

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054			
	auswertbar	Anzahl		16467	14057	12765	11977	11031	10176	9401	8756	8125	7458			
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		5327	3526	2476	2156	1795	1693	1420	1367	1124	1082			
		Anteil in %		32,35	25,08	19,40	18,00	16,27	16,64	15,10	15,61	13,83	14,51			
		CI Anteil in %		[31,63; 33,06]	[24,37; 25,80]	[18,71; 20,08]	[17,31; 18,69]	[15,58; 16,96]	[15,91; 17,36]	[14,38; 15,83]	[14,85; 16,37]	[13,08; 14,58]	[13,71; 15,31]			
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		9084	7727	8140	7968	7501	6995	6588	6281	5886	5349			
		Anteil in %		55,16	54,97	63,77	66,53	68,00	68,74	70,08	71,73	72,44	71,72			
		CI Anteil in %		[54,41; 55,92]	[54,15; 55,79]	[62,93; 64,60]	[65,68; 67,37]	[67,13; 68,87]	[67,84; 69,64]	[69,15; 71,00]	[70,79; 72,68]	[71,47; 73,41]	[70,70; 72,74]			
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2056	2804	2149	1853	1735	1488	1393	1108	1115	1027			
		Anteil in %		12,49	19,95	16,84	15,47	15,73	14,62	14,82	12,65	13,72	13,77			
		CI Anteil in %		[11,98; 12,99]	[19,29; 20,61]	[16,19; 17,48]	[14,82; 16,12]	[15,05; 16,41]	[13,94; 15,31]	[14,10; 15,54]	[11,96; 13,35]	[12,97; 14,47]	[12,99; 14,55]			
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091			
	auswertbar	Anzahl		23811	20683	19180	18115	16836	15720	14717	13860	13065	12270			
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		7243	5331	3812	3427	2826	2633	2265	2198	2033	1935			
		Anteil in %		30,42	25,77	19,87	18,92	16,79	16,75	15,39	15,86	15,56	15,77			
		CI Anteil in %		[29,83; 31,00]	[25,18; 26,37]	[19,31; 20,44]	[18,35; 19,49]	[16,22; 17,35]	[16,17; 17,33]	[14,81; 15,97]	[15,25; 16,47]	[14,94; 16,18]	[15,13; 16,42]			
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		13351	11303	11975	11782	11345	10782	10228	9666	9163	8594			
		Anteil in %		56,07	54,65	62,43	65,04	67,39	68,59	69,50	69,74	70,13	70,04			
		CI Anteil in %		[55,44; 56,70]	[53,97; 55,33]	[61,75; 63,12]	[64,35; 65,73]	[66,68; 68,09]	[67,86; 69,31]	[68,75; 70,24]	[68,98; 70,51]	[69,35; 70,92]	[69,23; 70,85]			
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		3217	4049	3393	2906	2665	2305	2224	1996	1869	1741			
Anteil in %			13,51	19,58	17,69	16,04	15,83	14,66	15,11	14,40	14,31	14,19				
CI Anteil in %			[13,08; 13,94]	[19,04; 20,12]	[17,15; 18,23]	[15,51; 16,58]	[15,28; 16,38]	[14,11; 15,22]	[14,53; 15,69]	[13,82; 14,99]	[13,70; 14,91]	[13,57; 14,81]				
2008-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888				
	auswertbar	Anzahl		19332	16630	15268	13818	12588	11616	10733	9947	9152				
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		7295	3383	3096	2373	2184	1782	1718	1485	1405				
		Anteil in %		37,74	20,34	20,28	17,17	17,35	15,34	16,01	14,93	15,35				
		CI Anteil in %		[37,05; 38,42]	[19,73; 20,95]	[19,64; 20,92]	[16,54; 17,80]	[16,69; 18,01]	[14,69; 16,00]	[15,31; 16,70]	[14,23; 15,63]	[14,61; 16,09]				
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		9291	10319	9793	9134	8570	8006	7548	7102	6437				
		Anteil in %		48,06	62,05	64,14	66,10	68,08	68,92	70,33	71,40	70,33				
		CI Anteil in %		[47,36; 48,76]	[61,31; 62,79]	[63,38; 64,90]	[65,31; 66,89]	[67,27; 68,90]	[68,08; 69,76]	[69,46; 71,19]	[70,51; 72,29]	[69,40; 71,27]				
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2746	2928	2379	2311	1834	1828	1467	1360	1310				
		Anteil in %		14,20	17,61	15,58	16,72	14,57	15,74	13,67	13,67	14,31				
		CI Anteil in %		[13,71; 14,70]	[17,03; 18,19]	[15,01; 16,16]	[16,10; 17,35]	[13,95; 15,19]	[15,07; 16,40]	[13,02; 14,32]	[13,00; 14,35]	[13,60; 15,03]				
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308				
	auswertbar	Anzahl		28692	25030	23296	21485	19921	18560	17374	16372	15323				
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		10456	5212	4704	3751	3532	2919	2927	2356	2541				
		Anteil in %		36,44	20,82	20,19	17,46	17,73	15,73	16,85	14,39	16,58				
		CI Anteil in %		[35,89; 37,00]	[20,32; 21,33]	[19,68; 20,71]	[16,95; 17,97]	[17,20; 18,26]	[15,20; 16,25]	[16,29; 17,40]	[13,85; 14,93]	[15,99; 17,17]				
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		13860	15236	14803	14200	13372	12656	11988	11537	10658				
		Anteil in %		48,31	60,87	63,54	66,09	67,13	68,19	69,00	70,47	69,56				
		CI Anteil in %		[47,73; 48,88]	[60,27; 61,48]	[62,93; 64,16]	[65,46; 66,73]	[66,47; 67,78]	[67,52; 68,86]	[68,31; 69,69]	[69,77; 71,17]	[68,83; 70,28]				
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		4376	4582	3789	3534	3017	2985	2459	2479	2124				
Anteil in %			15,25	18,31	16,26	16,45	15,14	16,08	14,15	15,14	13,86					
CI Anteil in %			[14,84; 15,67]	[17,83; 18,79]	[15,79; 16,74]	[15,95; 16,94]	[14,65; 15,64]	[15,55; 16,61]	[13,63; 14,67]	[14,59; 15,69]	[13,31; 14,41]					

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2008-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023						
	auswertbar	Anzahl		17846	15115	13650	12537	11554	10726	9967	9285						
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		5399	3052	2451	2198	1818	1716	1486	1439						
		Anteil in %			30,25	20,19	17,96	17,53	15,73	16,00	14,91	15,50					
		CI Anteil in %			[29,58; 30,93]	[19,55; 20,83]	[17,31; 18,60]	[16,87; 18,20]	[15,07; 16,40]	[15,30; 16,69]	[14,21; 15,61]	[14,76; 16,23]					
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		9917	9647	8994	8468	7959	7486	7078	6619						
		Anteil in %			55,57	63,82	65,89	67,54	68,89	69,79	71,01	71,29					
		CI Anteil in %			[54,84; 56,30]	[63,06; 64,59]	[65,09; 66,69]	[66,72; 68,36]	[68,04; 69,73]	[68,92; 70,66]	[70,12; 71,91]	[70,37; 72,21]					
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2530	2416	2205	1871	1777	1524	1403	1227						
		Anteil in %			14,18	15,98	16,15	14,92	15,38	14,21	14,08	13,21					
		CI Anteil in %			[13,67; 14,69]	[15,40; 16,57]	[15,54; 16,77]	[14,30; 15,55]	[14,72; 16,04]	[13,55; 14,87]	[13,39; 14,76]	[12,53; 13,90]					
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502						
	auswertbar	Anzahl		27142	23522	21680	19957	18550	17472	16361	15331						
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		8149	5040	3824	3576	2993	2908	2470	2561						
		Anteil in %			30,02	21,43	17,64	17,92	16,13	16,64	15,10	16,70					
		CI Anteil in %			[29,48; 30,57]	[20,90; 21,95]	[17,13; 18,15]	[17,39; 18,45]	[15,61; 16,66]	[16,09; 17,20]	[14,55; 15,65]	[16,11; 17,30]					
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		14979	14725	14130	13361	12699	12017	11512	10579						
		Anteil in %			55,19	62,60	65,18	66,95	68,46	68,78	70,36	69,00					
		CI Anteil in %			[54,60; 55,78]	[61,98; 63,22]	[64,54; 65,81]	[66,30; 67,60]	[67,79; 69,13]	[68,09; 69,47]	[69,66; 71,06]	[68,27; 69,74]					
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		4014	3757	3726	3020	2858	2547	2379	2191						
Anteil in %				14,79	15,97	17,19	15,13	15,41	14,58	14,54	14,29						
CI Anteil in %				[14,37; 15,21]	[15,50; 16,44]	[16,68; 17,69]	[14,64; 15,63]	[14,89; 15,93]	[14,05; 15,10]	[14,00; 15,08]	[13,74; 14,85]						
2009-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675							
	auswertbar	Anzahl		13805	11539	10199	9217	8395	7685	7040							
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		4445	2111	1830	1426	1352	1069	1107							
		Anteil in %			32,20	18,29	17,94	15,47	16,10	13,91	15,72						
		CI Anteil in %			[31,42; 32,98]	[17,59; 19,00]	[17,20; 18,69]	[14,73; 16,21]	[15,32; 16,89]	[13,14; 14,68]	[14,87; 16,57]						
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		7759	7524	6888	6358	5922	5492	4985							
		Anteil in %			56,20	65,20	67,54	68,98	70,54	71,46	70,81						
		CI Anteil in %			[55,38; 57,03]	[64,34; 66,07]	[66,63; 68,44]	[68,04; 69,93]	[69,57; 71,52]	[70,45; 72,47]	[69,75; 71,87]						
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1601	1904	1481	1433	1121	1124	948							
		Anteil in %			11,60	16,50	14,52	15,55	13,35	14,63	13,47						
		CI Anteil in %			[11,06; 12,13]	[15,82; 17,18]	[13,84; 15,20]	[14,81; 16,29]	[12,63; 14,08]	[13,84; 15,42]	[12,67; 14,26]						
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641							
	auswertbar	Anzahl		20505	17626	15958	14597	13586	12645	11772							
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		6477	3255	2966	2325	2315	1901	1915							
		Anteil in %			31,59	18,47	18,59	15,93	17,04	15,03	16,27						
		CI Anteil in %			[30,95; 32,22]	[17,89; 19,04]	[17,98; 19,19]	[15,33; 16,52]	[16,41; 17,67]	[14,41; 15,66]	[15,60; 16,93]						
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		11399	11441	10593	9921	9311	8885	8216							
		Anteil in %			55,59	64,91	66,38	67,97	68,53	70,26	69,79						
		CI Anteil in %			[54,91; 56,27]	[64,21; 65,61]	[65,65; 67,11]	[67,21; 68,72]	[67,75; 69,31]	[69,47; 71,06]	[68,96; 70,62]						
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2629	2930	2399	2351	1960	1859	1641							
Anteil in %				12,82	16,62	15,03	16,11	14,43	14,70	13,94							
CI Anteil in %				[12,36; 13,28]	[16,07; 17,17]	[14,48; 15,59]	[15,51; 16,70]	[13,84; 15,02]	[14,08; 15,32]	[13,31; 14,57]							

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2009-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818								
	auswertbar	Anzahl		11586	9549	8380	7558	6874	6270								
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		3508	1770	1332	1289	991	1018								
		Anteil in %		30,28	18,54	15,89	17,05	14,42	16,24								
		CI Anteil in %		[29,44; 31,11]	[17,76; 19,32]	[15,11; 16,68]	[16,21; 17,90]	[13,59; 15,25]	[15,32; 17,15]								
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		6653	6352	5771	5235	4887	4470								
		Anteil in %		57,42	66,52	68,87	69,26	71,09	71,29								
		CI Anteil in %		[56,52; 58,32]	[65,57; 67,47]	[67,87; 69,86]	[68,22; 70,30]	[70,02; 72,17]	[70,17; 72,41]								
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1425	1427	1277	1034	996	782								
		Anteil in %		12,30	14,94	15,24	13,68	14,49	12,47								
		CI Anteil in %		[11,70; 12,90]	[14,23; 15,66]	[14,47; 16,01]	[12,91; 14,46]	[13,66; 15,32]	[11,65; 13,29]								
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125								
	auswertbar	Anzahl		17416	14730	13162	12050	11088	10218								
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		4922	2866	2182	1998	1771	1710								
		Anteil in %		28,26	19,46	16,58	16,58	15,97	16,74								
		CI Anteil in %		[27,59; 28,93]	[18,82; 20,10]	[15,94; 17,21]	[15,92; 17,24]	[15,29; 16,65]	[16,01; 17,46]								
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		10178	9705	8942	8342	7625	7072								
		Anteil in %		58,44	65,89	67,94	69,23	68,77	69,21								
		CI Anteil in %		[57,71; 59,17]	[65,12; 66,65]	[67,14; 68,74]	[68,40; 70,05]	[67,91; 69,63]	[68,32; 70,11]								
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2316	2159	2038	1710	1692	1436								
Anteil in %			13,30	14,66	15,48	14,19	15,26	14,05									
CI Anteil in %			[12,79; 13,80]	[14,09; 15,23]	[14,87; 16,10]	[13,57; 14,81]	[14,59; 15,93]	[13,38; 14,73]									
2010-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281									
	auswertbar	Anzahl		12648	10530	9338	8408	7571									
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		3909	1753	1682	1304	1183									
		Anteil in %		30,91	16,65	18,01	15,51	15,63									
		CI Anteil in %		[30,10; 31,71]	[15,94; 17,36]	[17,23; 18,79]	[14,74; 16,28]	[14,81; 16,44]									
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		7332	7096	6376	5879	5357									
		Anteil in %		57,97	67,39	68,28	69,92	70,76									
		CI Anteil in %		[57,11; 58,83]	[66,49; 68,28]	[67,34; 69,22]	[68,94; 70,90]	[69,73; 71,78]									
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1407	1681	1280	1225	1031									
		Anteil in %		11,12	15,96	13,71	14,57	13,62									
		CI Anteil in %		[10,58; 11,67]	[15,26; 16,66]	[13,01; 14,41]	[13,82; 15,32]	[12,85; 14,39]									
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236									
	auswertbar	Anzahl		19106	16207	14610	13377	12189									
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		5805	2752	2503	2086	1982									
		Anteil in %		30,38	16,98	17,13	15,59	16,26									
		CI Anteil in %		[29,73; 31,04]	[16,40; 17,56]	[16,52; 17,74]	[14,98; 16,21]	[15,61; 16,92]									
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		11033	10920	10130	9340	8500									
		Anteil in %		57,75	67,38	69,34	69,82	69,74									
		CI Anteil in %		[57,05; 58,45]	[66,66; 68,10]	[68,59; 70,08]	[69,04; 70,60]	[68,92; 70,55]									
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2268	2535	1977	1951	1707									
Anteil in %			11,87	15,64	13,53	14,58	14,00										
CI Anteil in %			[11,41; 12,33]	[15,08; 16,20]	[12,98; 14,09]	[13,99; 15,18]	[13,39; 14,62]										

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568									
	auswertbar	Anzahl		11959	9884	8723	7827									
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		3334	1699	1339	1299									
		Anteil in %		27,88	17,19	15,35	16,60									
		CI Anteil in %		[27,07; 28,68]	[16,45; 17,93]	[14,59; 16,11]	[15,77; 17,42]									
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		7221	6828	6165	5495									
		Anteil in %		60,38	69,08	70,68	70,21									
		CI Anteil in %		[59,50; 61,26]	[68,17; 69,99]	[69,72; 71,63]	[69,19; 71,22]									
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1404	1357	1219	1033									
		Anteil in %		11,74	13,73	13,97	13,20									
		CI Anteil in %		[11,16; 12,32]	[13,05; 14,41]	[13,25; 14,70]	[12,45; 13,95]									
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579									
	auswertbar	Anzahl		18009	15302	13736	12446									
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		4923	2744	2122	2167									
		Anteil in %		27,34	17,93	15,45	17,41									
		CI Anteil in %		[26,69; 27,99]	[17,32; 18,54]	[14,84; 16,05]	[16,74; 18,08]									
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		10845	10401	9573	8616									
		Anteil in %		60,22	67,97	69,69	69,23									
CI Anteil in %			[59,51; 60,93]	[67,23; 68,71]	[68,92; 70,46]	[68,42; 70,04]										
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2241	2157	2041	1663										
	Anteil in %		12,44	14,10	14,86	13,36										
	CI Anteil in %		[11,96; 12,93]	[13,54; 14,65]	[14,26; 15,45]	[12,76; 13,96]										
2011-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	15409	12971	11106	9678										
	auswertbar	Anzahl		12286	10127	8743										
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		3604	1609	1425										
		Anteil in %		29,33	15,89	16,30										
		CI Anteil in %		[28,53; 30,14]	[15,18; 16,60]	[15,52; 17,07]										
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		7441	7111	6131										
		Anteil in %		60,56	70,22	70,12										
		CI Anteil in %		[59,70; 61,43]	[69,33; 71,11]	[69,17; 71,08]										
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1241	1407	1187										
		Anteil in %		10,10	13,89	13,58										
		CI Anteil in %		[9,57; 10,63]	[13,22; 14,57]	[12,86; 14,29]										
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	23197	20078	17696	15845										
	auswertbar	Anzahl		19097	16207	14490										
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		5542	2711	2531										
		Anteil in %		29,02	16,73	17,47										
		CI Anteil in %		[28,38; 29,66]	[16,15; 17,30]	[16,85; 18,09]										
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		11457	11019	9862										
		Anteil in %		59,99	67,99	68,06										
CI Anteil in %			[59,30; 60,69]	[67,27; 68,71]	[67,30; 68,82]											
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2098	2477	2097											
	Anteil in %		10,99	15,28	14,47											
	CI Anteil in %		[10,54; 11,43]	[14,73; 15,84]	[13,90; 15,04]											

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14050	11811	10082												
	auswertbar	Anzahl		11195	9079												
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		2927	1605												
		Anteil in %			26,15	17,68											
		CI Anteil in %			[25,33; 26,96]	[16,89; 18,46]											
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		7043	6216												
		Anteil in %			62,91	68,47											
		CI Anteil in %			[62,02; 63,81]	[67,51; 69,42]											
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1225	1258												
		Anteil in %			10,94	13,86											
		CI Anteil in %			[10,36; 11,52]	[13,15; 14,57]											
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	20513	17841	15614												
	auswertbar	Anzahl		16981	14213												
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		4527	2537												
Anteil in %				26,66	17,85												
CI Anteil in %				[25,99; 27,32]	[17,22; 18,48]												
gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		10437	9630													
	Anteil in %			61,46	67,75												
	CI Anteil in %			[60,73; 62,19]	[66,99; 68,52]												
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2017	2046													
	Anteil in %			11,88	14,40												
	CI Anteil in %			[11,39; 12,36]	[13,82; 14,97]												
2012-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	16002	13484													
	auswertbar	Anzahl		12571													
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		3564													
		Anteil in %			28,35												
		CI Anteil in %			[27,56; 29,14]												
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		7617													
		Anteil in %			60,59												
		CI Anteil in %			[59,74; 61,45]												
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		1390													
		Anteil in %			11,06												
		CI Anteil in %			[10,51; 11,61]												
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	23844	20669													
	auswertbar	Anzahl		19313													
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl		5317													
Anteil in %				27,53													
CI Anteil in %				[26,90; 28,16]													
gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl		11721														
	Anteil in %			60,69													
	CI Anteil in %			[60,00; 61,38]													
Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl		2275														
	Anteil in %			11,78													
	CI Anteil in %			[11,32; 12,23]													

EZ	Entwicklung der Häufigkeit von Asthmasymptomen		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14102														
	auswertbar	Anzahl															
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	20545														
	auswertbar	Anzahl															
	Verbesserung der Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	gleichbleibende Asthmasymptome	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Verschlechterung der Asthmasymptome	Anzahl															
Anteil in %																	
CI Anteil in %																	

Beginnend mit der ersten Folgedokumentation werden in Tabelle 3.2.3 für jede Kohorte die Programmteilnehmer ausgewiesen, bei denen **mindestens eine stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale** im Berichtshalbjahr dokumentiert ist. Zunächst wird unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Anzahl derjenigen Patienten ange-

geben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Patienten dokumentiert, die mindestens eine stationäre notfallmäßige Behandlungen wegen Asthma bronchiale hatten und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Patienten ist.

Tabelle 3.2.3 Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale

EZ	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	auswertbar	Anzahl		816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		8	14	13	7	14	10	6	9	7	8	1	3	3
		Anteil in %		0,98	1,87	1,90	1,10	2,34	1,79	1,16	1,83	1,53	1,84	0,25	0,79	0,83
		CI Anteil in %		[0,30; 1,66]	[0,90; 2,84]	[0,87; 2,92]	[0,29; 1,92]	[1,13; 3,55]	[0,69; 2,89]	[0,24; 2,08]	[0,64; 3,01]	[0,40; 2,66]	[0,58; 3,11]	[0,00; 0,73]	[0,00; 1,67]	[0,00; 1,77]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
	auswertbar	Anzahl		1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		12	13	10	3	14	20	7	10	12	8	6	11	9
		Anteil in %		1,02	1,18	0,97	0,30	1,48	2,19	0,81	1,21	1,54	1,09	0,85	1,60	1,36
		CI Anteil in %		[0,44; 1,59]	[0,54; 1,82]	[0,37; 1,57]	[0,00; 0,64]	[0,71; 2,26]	[1,24; 3,14]	[0,21; 1,41]	[0,47; 1,96]	[0,68; 2,41]	[0,34; 1,84]	[0,17; 1,52]	[0,66; 2,53]	[0,48; 2,25]
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124	
	auswertbar	Anzahl		6452	5844	5372	4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997	
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		129	69	74	70	64	48	59	38	48	36	42	38	
		Anteil in %		2,00	1,18	1,38	1,41	1,36	1,09	1,43	0,99	1,33	1,06	1,31	1,27	
		CI Anteil in %		[1,66; 2,34]	[0,90; 1,46]	[1,07; 1,69]	[1,08; 1,74]	[1,03; 1,69]	[0,78; 1,39]	[1,06; 1,79]	[0,68; 1,30]	[0,96; 1,70]	[0,72; 1,40]	[0,92; 1,71]	[0,87; 1,67]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	
	auswertbar	Anzahl		9296	8502	7906	7404	7115	6765	6398	6002	5711	5408	5161	4909	
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		169	110	112	102	118	86	72	47	54	43	55	35	
		Anteil in %		1,82	1,29	1,42	1,38	1,66	1,27	1,13	0,78	0,95	0,80	1,07	0,71	
		CI Anteil in %		[1,55; 2,09]	[1,05; 1,53]	[1,16; 1,68]	[1,11; 1,64]	[1,36; 1,96]	[1,00; 1,54]	[0,87; 1,38]	[0,56; 1,01]	[0,69; 1,20]	[0,56; 1,03]	[0,79; 1,35]	[0,48; 0,95]	
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136		
	auswertbar	Anzahl		12640	11262	10149	9569	8928	8216	7663	7147	6698	6329	5872		
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		187	141	126	127	84	75	82	105	65	62	45		
		Anteil in %		1,48	1,25	1,24	1,33	0,94	0,91	1,07	1,47	0,97	0,98	0,77		
		CI Anteil in %		[1,27; 1,69]	[1,05; 1,46]	[1,03; 1,46]	[1,10; 1,56]	[0,74; 1,14]	[0,71; 1,12]	[0,84; 1,30]	[1,19; 1,75]	[0,74; 1,21]	[0,74; 1,22]	[0,54; 0,99]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538		
	auswertbar	Anzahl		19406	17594	16019	15252	14301	13350	12575	11922	11313	10727	10109		
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		269	190	225	221	126	146	125	131	105	107	87		
		Anteil in %		1,39	1,08	1,40	1,45	0,88	1,09	0,99	1,10	0,93	1,00	0,86		
		CI Anteil in %		[1,22; 1,55]	[0,93; 1,23]	[1,22; 1,59]	[1,26; 1,64]	[0,73; 1,03]	[0,92; 1,27]	[0,82; 1,17]	[0,91; 1,29]	[0,75; 1,10]	[0,81; 1,19]	[0,68; 1,04]		
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054			
	auswertbar	Anzahl		16467	14474	13364	12298	11259	10395	9622	8988	8290	7638			
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		229	205	176	126	126	97	103	66	68	50			
		Anteil in %		1,39	1,42	1,32	1,02	1,12	0,93	1,07	0,73	0,82	0,65			
		CI Anteil in %		[1,21; 1,57]	[1,22; 1,61]	[1,12; 1,51]	[0,85; 1,20]	[0,92; 1,31]	[0,75; 1,12]	[0,86; 1,28]	[0,56; 0,91]	[0,63; 1,01]	[0,47; 0,84]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091			
	auswertbar	Anzahl		23812	21330	20056	18574	17193	16064	15048	14185	13337	12539			
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		308	281	282	195	183	164	151	130	144	114			
		Anteil in %		1,29	1,32	1,41	1,05	1,06	1,02	1,00	0,92	1,08	0,91			
		CI Anteil in %		[1,15; 1,44]	[1,16; 1,47]	[1,24; 1,57]	[0,90; 1,20]	[0,91; 1,22]	[0,87; 1,18]	[0,84; 1,16]	[0,76; 1,07]	[0,90; 1,26]	[0,74; 1,08]			
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888				
	auswertbar	Anzahl		19332	17627	15700	14154	12924	11892	10998	10163	9379				
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		297	236	139	143	132	114	90	99	77				
		Anteil in %		1,54	1,34	0,89	1,01	1,02	0,96	0,82	0,97	0,82				
		CI Anteil in %		[1,36; 1,71]	[1,17; 1,51]	[0,74; 1,03]	[0,85; 1,18]	[0,85; 1,19]	[0,78; 1,13]	[0,65; 0,99]	[0,78; 1,17]	[0,64; 1,00]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308				
	auswertbar	Anzahl		28692	26390	23898	22019	20311	18957	17782	16661	15649				
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		494	382	249	227	211	189	137	167	125				
		Anteil in %		1,72	1,45	1,04	1,03	1,04	1,00	0,77	1,00	0,80				
		CI Anteil in %		[1,57; 1,87]	[1,30; 1,59]	[0,91; 1,17]	[0,90; 1,16]	[0,90; 1,18]	[0,86; 1,14]	[0,64; 0,90]	[0,85; 1,15]	[0,66; 0,94]				

EZ	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023				
	auswertbar	Anzahl		17846	15654	14023	12851	11825	10991	10200	9533				
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		252	151	129	107	107	105	84	73				
		Anteil in %		1,41	0,96	0,92	0,83	0,90	0,96	0,82	0,77				
		CI Anteil in %		[1,24; 1,59]	[0,81; 1,12]	[0,76; 1,08]	[0,68; 0,99]	[0,73; 1,08]	[0,77; 1,14]	[0,65; 1,00]	[0,59; 0,94]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502				
	auswertbar	Anzahl		27142	24364	22218	20464	19028	17932	16760	15734				
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		384	205	181	173	162	131	143	112				
		Anteil in %		1,41	0,84	0,81	0,85	0,85	0,73	0,85	0,71				
		CI Anteil in %		[1,27; 1,56]	[0,73; 0,96]	[0,70; 0,93]	[0,72; 0,97]	[0,72; 0,98]	[0,61; 0,86]	[0,71; 0,99]	[0,58; 0,84]				
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675					
	auswertbar	Anzahl		13805	11879	10495	9475	8606	7869	7244					
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		149	92	86	76	50	48	41					
		Anteil in %		1,08	0,77	0,82	0,80	0,58	0,61	0,57					
		CI Anteil in %		[0,91; 1,25]	[0,62; 0,93]	[0,65; 0,99]	[0,62; 0,98]	[0,42; 0,74]	[0,44; 0,78]	[0,39; 0,74]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641					
	auswertbar	Anzahl		20505	18154	16340	14995	13913	12940	12046					
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		222	172	105	123	94	94	61					
		Anteil in %		1,08	0,95	0,64	0,82	0,68	0,73	0,51					
		CI Anteil in %		[0,94; 1,22]	[0,81; 1,09]	[0,52; 0,77]	[0,68; 0,96]	[0,54; 0,81]	[0,58; 0,87]	[0,38; 0,63]					
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818						
	auswertbar	Anzahl		11586	9850	8629	7803	7041	6453						
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		148	79	70	53	69	49						
		Anteil in %		1,28	0,80	0,81	0,68	0,98	0,76						
		CI Anteil in %		[1,07; 1,48]	[0,63; 0,98]	[0,62; 1,00]	[0,50; 0,86]	[0,75; 1,21]	[0,55; 0,97]						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125						
	auswertbar	Anzahl		17416	15151	13531	12419	11363	10523						
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		208	134	118	85	86	63						
		Anteil in %		1,19	0,88	0,87	0,68	0,76	0,60						
		CI Anteil in %		[1,03; 1,36]	[0,74; 1,03]	[0,72; 1,03]	[0,54; 0,83]	[0,60; 0,92]	[0,45; 0,75]						
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281							
	auswertbar	Anzahl		12648	10882	9608	8640	7802							
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		144	82	85	68	57							
		Anteil in %		1,14	0,75	0,88	0,79	0,73							
		CI Anteil in %		[0,95; 1,32]	[0,59; 0,92]	[0,70; 1,07]	[0,60; 0,97]	[0,54; 0,92]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236							
	auswertbar	Anzahl		19106	16717	15032	13727	12538							
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		195	153	107	112	91							
		Anteil in %		1,02	0,92	0,71	0,82	0,73							
		CI Anteil in %		[0,88; 1,16]	[0,77; 1,06]	[0,58; 0,85]	[0,67; 0,97]	[0,58; 0,87]							
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568								
	auswertbar	Anzahl		11959	10204	9003	8062								
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		131	73	65	57								
		Anteil in %		1,10	0,72	0,72	0,71								
		CI Anteil in %		[0,91; 1,28]	[0,55; 0,88]	[0,55; 0,90]	[0,52; 0,89]								
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579								
	auswertbar	Anzahl		18009	15761	14155	12808								
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		216	111	129	92								
		Anteil in %		1,20	0,70	0,91	0,72								
		CI Anteil in %		[1,04; 1,36]	[0,57; 0,83]	[0,75; 1,07]	[0,57; 0,86]								
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15409	12971	11106	9678									
	auswertbar	Anzahl		12286	10474	9001									
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		103	85	65									
		Anteil in %		0,84	0,81	0,72									
		CI Anteil in %		[0,68; 1,00]	[0,64; 0,98]	[0,55; 0,90]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23197	20078	17696	15845									
	auswertbar	Anzahl		19097	16755	14928									
	Patienten mit mindestens einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		162	133	90									
		Anteil in %		0,85	0,79	0,60									
		CI Anteil in %		[0,72; 0,98]	[0,66; 0,93]	[0,48; 0,73]									

EZ	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14050	11811	10082											
	auswertbar	Anzahl		11195	9376											
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		116	50											
		Anteil in %			1,04	0,53										
		CI Anteil in %			[0,85; 1,22]	[0,39; 0,68]										
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20513	17841	15614											
	auswertbar	Anzahl		16981	14678											
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		166	111											
		Anteil in %			0,98	0,76										
		CI Anteil in %			[0,83; 1,13]	[0,62; 0,90]										
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16002	13484												
	auswertbar	Anzahl		12571												
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		108												
		Anteil in %			0,86											
		CI Anteil in %			[0,70; 1,02]											
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23844	20669												
	auswertbar	Anzahl		19313												
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		148												
		Anteil in %			0,77											
		CI Anteil in %			[0,64; 0,89]											
2012-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14102													
	auswertbar	Anzahl														
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20545													
	auswertbar	Anzahl														
	Patienten mit mindestens einer stationären Notfallmäßigen Behandlung	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														

Beginnend mit der ersten Folgedokumentation werden in Tabelle 3.2.4 für jede Kohorte die Programmteilnehmer ausgewiesen, bei denen **mehr als eine stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Asthma bronchiale dokumentiert ist**. Zunächst wird unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Anzahl derjenigen Patienten angegeben, die im

Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Patienten dokumentiert, die mehr als eine stationäre notfallmäßige Behandlungen wegen Asthma bronchiale hatten und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Patienten ist.

Tabelle 3.2.4 Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale

EZ	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	auswertbar	Anzahl		816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		1	5	1	2	1	6	1	2	1	2	0	1	1
		Anteil in %		0,12	0,67	0,15	0,32	0,17	1,08	0,19	0,41	0,22	0,46	0,00	0,26	0,28
		CI Anteil in %		[0,00; 0,36]	[0,08; 1,25]	[0,00; 0,43]	[0,00; 0,75]	[0,00; 0,49]	[0,22; 1,93]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,97]	[0,00; 0,65]	[0,00; 1,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,82]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
	auswertbar	Anzahl		1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		4	1	2	2	4	5	5	1	2	1	1	4	1
		Anteil in %		0,34	0,09	0,19	0,20	0,42	0,55	0,58	0,12	0,26	0,14	0,14	0,58	0,15
		CI Anteil in %		[0,01; 0,67]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,46]	[0,00; 0,48]	[0,01; 0,84]	[0,07; 1,03]	[0,07; 1,09]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,42]	[0,01; 1,15]	[0,00; 0,45]
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124	
	auswertbar	Anzahl		6452	5844	5372	4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997	
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		32	18	20	19	17	15	14	13	14	9	7	4	
		Anteil in %		0,50	0,31	0,37	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,39	0,26	0,22	0,13	
		CI Anteil in %		[0,32; 0,67]	[0,17; 0,45]	[0,21; 0,54]	[0,21; 0,55]	[0,19; 0,53]	[0,17; 0,51]	[0,16; 0,52]	[0,15; 0,52]	[0,19; 0,59]	[0,09; 0,44]	[0,06; 0,38]	[0,00; 0,26]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	
	auswertbar	Anzahl		9296	8502	7906	7404	7115	6765	6398	6002	5711	5408	5161	4909	
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		51	25	22	23	32	25	21	12	10	6	11	4	
		Anteil in %		0,55	0,29	0,28	0,31	0,45	0,37	0,33	0,20	0,18	0,11	0,21	0,08	
		CI Anteil in %		[0,40; 0,70]	[0,18; 0,41]	[0,16; 0,39]	[0,18; 0,44]	[0,29; 0,61]	[0,22; 0,51]	[0,19; 0,47]	[0,09; 0,31]	[0,07; 0,28]	[0,02; 0,20]	[0,09; 0,34]	[0,00; 0,16]	
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136		
	auswertbar	Anzahl		12640	11262	10149	9569	8928	8216	7663	7147	6698	6329	5872		
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		41	32	18	15	19	19	23	21	18	13	9		
		Anteil in %		0,32	0,28	0,18	0,16	0,21	0,23	0,30	0,29	0,27	0,21	0,15		
		CI Anteil in %		[0,23; 0,42]	[0,19; 0,38]	[0,10; 0,26]	[0,08; 0,24]	[0,12; 0,31]	[0,13; 0,34]	[0,18; 0,42]	[0,17; 0,42]	[0,14; 0,39]	[0,09; 0,32]	[0,05; 0,25]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538		
	auswertbar	Anzahl		19406	17594	16019	15252	14301	13350	12575	11922	11313	10727	10109		
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		49	44	47	36	31	34	27	26	26	24	16		
		Anteil in %		0,25	0,25	0,29	0,24	0,22	0,25	0,21	0,22	0,23	0,22	0,16		
		CI Anteil in %		[0,18; 0,32]	[0,18; 0,32]	[0,21; 0,38]	[0,16; 0,31]	[0,14; 0,29]	[0,17; 0,34]	[0,13; 0,30]	[0,13; 0,30]	[0,14; 0,32]	[0,13; 0,31]	[0,08; 0,24]		
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054			
	auswertbar	Anzahl		16467	14474	13364	12298	11259	10395	9622	8988	8290	7638			
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		52	44	37	31	23	20	26	16	14	9			
		Anteil in %		0,32	0,30	0,28	0,25	0,20	0,19	0,27	0,18	0,17	0,12			
		CI Anteil in %		[0,23; 0,40]	[0,21; 0,39]	[0,19; 0,37]	[0,16; 0,34]	[0,12; 0,29]	[0,11; 0,28]	[0,17; 0,37]	[0,09; 0,27]	[0,08; 0,26]	[0,04; 0,19]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091			
	auswertbar	Anzahl		23812	21330	20056	18574	17193	16064	15048	14185	13337	12539			
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		74	58	45	41	33	24	31	26	31	31			
		Anteil in %		0,31	0,27	0,22	0,22	0,19	0,15	0,21	0,18	0,23	0,25			
		CI Anteil in %		[0,24; 0,38]	[0,20; 0,34]	[0,16; 0,29]	[0,15; 0,29]	[0,13; 0,26]	[0,09; 0,21]	[0,13; 0,28]	[0,11; 0,25]	[0,15; 0,31]	[0,16; 0,33]			
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888				
	auswertbar	Anzahl		19332	17627	15700	14154	12924	11892	10998	10163	9379				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		58	53	26	26	26	25	18	15	18				
		Anteil in %		0,30	0,30	0,17	0,18	0,20	0,21	0,16	0,15	0,19				
		CI Anteil in %		[0,22; 0,38]	[0,22; 0,38]	[0,10; 0,23]	[0,11; 0,25]	[0,12; 0,28]	[0,13; 0,29]	[0,09; 0,24]	[0,07; 0,22]	[0,10; 0,28]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308				
	auswertbar	Anzahl		28692	26390	23898	22019	20311	18957	17782	16661	15649				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		113	64	58	45	40	35	20	31	21				
		Anteil in %		0,39	0,24	0,24	0,20	0,20	0,18	0,11	0,19	0,13				
		CI Anteil in %		[0,32; 0,47]	[0,18; 0,30]	[0,18; 0,31]	[0,14; 0,26]	[0,14; 0,26]	[0,12; 0,25]	[0,06; 0,16]	[0,12; 0,25]	[0,08; 0,19]				

EZ	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023				
	auswertbar	Anzahl		17846	15654	14023	12851	11825	10991	10200	9533				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		59	24	32	27	18	26	15	13				
		Anteil in %		0,33	0,15	0,23	0,21	0,15	0,24	0,15	0,14				
		CI Anteil in %		[0,25; 0,41]	[0,09; 0,21]	[0,15; 0,31]	[0,13; 0,29]	[0,08; 0,22]	[0,15; 0,33]	[0,07; 0,22]	[0,06; 0,21]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502				
	auswertbar	Anzahl		27142	24364	22218	20464	19028	17932	16760	15734				
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		76	47	40	22	38	25	34	21				
		Anteil in %		0,28	0,19	0,18	0,11	0,20	0,14	0,20	0,13				
		CI Anteil in %		[0,22; 0,34]	[0,14; 0,25]	[0,12; 0,24]	[0,06; 0,15]	[0,14; 0,26]	[0,08; 0,19]	[0,13; 0,27]	[0,08; 0,19]				
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675					
	auswertbar	Anzahl		13805	11879	10495	9475	8606	7869	7244					
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		40	15	13	17	10	5	8					
		Anteil in %		0,29	0,13	0,12	0,18	0,12	0,06	0,11					
		CI Anteil in %		[0,20; 0,38]	[0,06; 0,19]	[0,06; 0,19]	[0,09; 0,26]	[0,04; 0,19]	[0,01; 0,12]	[0,03; 0,19]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641					
	auswertbar	Anzahl		20505	18154	16340	14995	13913	12940	12046					
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		38	32	27	14	17	17	8					
		Anteil in %		0,19	0,18	0,17	0,09	0,12	0,13	0,07					
		CI Anteil in %		[0,13; 0,24]	[0,12; 0,24]	[0,10; 0,23]	[0,04; 0,14]	[0,06; 0,18]	[0,07; 0,19]	[0,02; 0,11]					
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818						
	auswertbar	Anzahl		11586	9850	8629	7803	7041	6453						
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		28	11	18	12	13	3						
		Anteil in %		0,24	0,11	0,21	0,15	0,18	0,05						
		CI Anteil in %		[0,15; 0,33]	[0,05; 0,18]	[0,11; 0,30]	[0,07; 0,24]	[0,08; 0,28]	[0,00; 0,10]						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125						
	auswertbar	Anzahl		17416	15151	13531	12419	11363	10523						
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		45	23	26	24	10	5						
		Anteil in %		0,26	0,15	0,19	0,19	0,09	0,05						
		CI Anteil in %		[0,18; 0,33]	[0,09; 0,21]	[0,12; 0,27]	[0,12; 0,27]	[0,03; 0,14]	[0,01; 0,09]						
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281							
	auswertbar	Anzahl		12648	10882	9608	8640	7802							
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		29	15	16	14	11							
		Anteil in %		0,23	0,14	0,17	0,16	0,14							
		CI Anteil in %		[0,15; 0,31]	[0,07; 0,21]	[0,08; 0,25]	[0,08; 0,25]	[0,06; 0,22]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236							
	auswertbar	Anzahl		19106	16717	15032	13727	12538							
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		50	32	23	23	16							
		Anteil in %		0,26	0,19	0,15	0,17	0,13							
		CI Anteil in %		[0,19; 0,33]	[0,13; 0,26]	[0,09; 0,22]	[0,10; 0,24]	[0,07; 0,19]							
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568								
	auswertbar	Anzahl		11959	10204	9003	8062								
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		27	17	9	9								
		Anteil in %		0,23	0,17	0,10	0,11								
		CI Anteil in %		[0,14; 0,31]	[0,09; 0,25]	[0,03; 0,17]	[0,04; 0,18]								
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579								
	auswertbar	Anzahl		18009	15761	14155	12808								
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		50	18	27	12								
		Anteil in %		0,28	0,11	0,19	0,09								
		CI Anteil in %		[0,20; 0,35]	[0,06; 0,17]	[0,12; 0,26]	[0,04; 0,15]								
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15409	12971	11106	9678									
	auswertbar	Anzahl		12286	10474	9001									
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		28	18	18									
		Anteil in %		0,23	0,17	0,20									
		CI Anteil in %		[0,14; 0,31]	[0,09; 0,25]	[0,11; 0,29]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23197	20078	17696	15845									
	auswertbar	Anzahl		19097	16755	14928									
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		32	29	13									
		Anteil in %		0,17	0,17	0,09									
		CI Anteil in %		[0,11; 0,23]	[0,11; 0,24]	[0,04; 0,13]									

EZ	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung wegen Asthma bronchiale	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14050	11811	10082											
	auswertbar	Anzahl		11195	9376											
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		26	11											
		Anteil in %			0,23	0,12										
		CI Anteil in %			[0,14; 0,32]	[0,05; 0,19]										
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20513	17841	15614											
	auswertbar	Anzahl		16981	14678											
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		24	16											
		Anteil in %			0,14	0,11										
		CI Anteil in %			[0,08; 0,20]	[0,06; 0,16]										
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16002	13484												
	auswertbar	Anzahl		12571												
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		20												
		Anteil in %			0,16											
		CI Anteil in %			[0,09; 0,23]											
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23844	20669												
	auswertbar	Anzahl		19313												
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl		24												
		Anteil in %			0,12											
		CI Anteil in %			[0,07; 0,17]											
2012-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14102													
	auswertbar	Anzahl														
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20545													
	auswertbar	Anzahl														
	Patienten mit mehr als einer stationären notfallmäßigen Behandlung	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														

3.3 Klinische Verlaufsparemeter

Einer der wichtigsten Verlaufsparemeter zur Einschätzung des Therapieerfolges und zur Verlaufskontrolle bei Asthma ist der sogenannte Exspiratorische Spitzenfluss (**Peak Expiratory Flow, PEF**). Dabei handelt es sich um die maximale Atemstromstärke bei forcierter Ausatmung, gemessen in Liter/Sekunde. Der PEF korreliert gut mit dem Schweregrad einer asthmatischen Erkrankung. Je schlechter der PEF desto stärker ist die Verengung der Atemwege.

In Tabelle 3.3.1 werden die Auswertungsergebnisse zum Peak-Flow-Absolutwert vorgestellt. Die notwendigen Informationen zum gemessenen Peak-Flow-Absolutwert liegen jedoch erst nach der Einführung von eDMP im Berichtshalbjahr 2008-2 vor. In den vorherigen Dokumentationsbögen konnte lediglich die Veränderung des Peak-Flow-Wertes dokumentiert werden (Verbesserung oder gleichbleiben bzw. Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes). In Tabelle 3.3.2 wird anschließend die Entwicklung der Peak-Flow-Werte dargestellt.

In der Tabelle 3.3.1 werden die Auswertungsergebnisse zu den **Peak-Flow-Absolutwerten** ausgewiesen. Zunächst wird für jede Kohorte unter „erwachsene männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen

Berichtshalbjahre die Anzahl der auswertbaren Patienten dokumentiert. Das sind diejenigen Patienten für die entweder ein plausible Peak-Flow-Wert dokumentiert ist oder für die angegeben ist, dass keine Peak-Flow-Messung durchgeführt wurde. Danach wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Patienten eine Peak-Flow-Messung durchgeführt wurde („mit Peak-Flow-Messung“) und wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist. Für die Gruppe der Patienten mit Peak-Flow-Messung wird nun der im jeweiligen Berichtshalbjahr gemessene durchschnittliche Peak-Flow-Wert sowie die mittlere Differenz zum Wert in der Erstdokumentation abgebildet. Für die Berechnung dieser durchschnittlichen Differenz zwischen Peak-Flow-Wert im Berichtshalbjahr und Beitritts-halbjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Erwachsenen im Berichtshalbjahr und wird deswegen gesondert aufgeführt.

Da die Dokumentation der gemessenen Absolutwerte zum Halbjahr 2008-2 eingeführt wurde, können für die Berichtshalbjahre bis 2008-1 keine Werte dargestellt werden. Der Ausweis der mittleren Differenz zur Erstdokumentation ist definitionsgemäß erst ab dem Berichtshalbjahr 2009-1 möglich.

Tabelle 3.3.1 Peak-Flow-Absolutwert

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	641	603	547	506	475	450	429	401	386	357	340	327	310	297
	auswertbar	Anzahl						441	421	396	378	348	334	319	303	290
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl						212	208	210	217	209	202	182	180	165
		Anteil in %						48,07	49,41	53,03	57,41	60,06	60,48	57,05	59,41	56,90
		CI Anteil in %						[43,40; 52,74]	[44,62; 54,19]	[48,11; 57,95]	[52,42; 62,40]	[54,90; 65,21]	[55,23; 65,73]	[51,61; 62,49]	[53,87; 64,94]	[51,19; 62,61]
		Mean						351,81	361,25	375,75	365,11	363,75	366,19	368,02	360,11	358,95
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Mean						[328,34; 375,27]	[337,99; 384,51]	[352,77; 398,73]	[341,17; 389,04]	[341,51; 385,99]	[341,67; 390,71]	[343,86; 392,17]	[336,55; 383,67]	[333,75; 384,14]
		Median						360,00	360,00	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	363,00
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
	Median mittlere Differenz															
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	1137	1096	1009	941	908	875	843	802	765	735	701	677	656	639
	auswertbar	Anzahl						862	837	788	758	721	685	662	645	621
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl						419	434	429	438	453	436	408	399	385
		Anteil in %						48,61	51,85	54,44	57,78	62,83	63,65	61,63	61,86	62,00
		CI Anteil in %						[45,27; 51,95]	[48,46; 55,24]	[50,96; 57,92]	[54,27; 61,30]	[59,30; 66,36]	[60,04; 67,25]	[57,92; 65,34]	[58,11; 65,61]	[58,18; 65,82]
		Mean						276,32	284,58	287,67	284,25	282,12	284,53	290,74	280,50	279,81
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Mean						[263,94; 288,71]	[272,49; 296,66]	[276,06; 299,29]	[272,20; 296,31]	[270,97; 293,27]	[273,02; 296,05]	[279,21; 302,26]	[269,39; 291,60]	[269,63; 290,00]
		Median						280,00	288,50	290,00	280,00	290,00	285,50	298,50	290,00	280,00
Fallbasis mittlere Differenz																
Mittlere Differenz zur ED																
CI mittlere Differenz																
Median mittlere Differenz																

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	5108	4731	4294	3980	3791	3594	3382	3202	3029	2891	2753	2642	2525	
	auswertbar	Anzahl					3618	3476	3290	3136	2944	2811	2684	2566	2445	
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl					1776	1853	1817	1805	1764	1665	1625	1556	1473	
		Anteil in %					49,09	53,31	55,23	57,56	59,92	59,23	60,54	60,64	60,25	
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %					[47,46; 50,72]	[51,65; 54,97]	[53,53; 56,93]	[55,83; 59,29]	[58,15; 61,69]	[57,41; 61,05]	[58,69; 62,39]	[58,75; 62,53]	[58,31; 62,19]	
		Mean					378,62	377,58	383,76	386,30	382,52	381,14	387,36	384,05	385,39	
		CI Mean					[370,88; 386,36]	[370,13; 385,02]	[376,06; 391,47]	[378,55; 394,04]	[374,99; 390,05]	[373,46; 388,81]	[379,73; 394,98]	[376,28; 391,83]	[377,37; 393,41]	
		Median					380,00	370,00	370,00	380,00	380,00	380,00	390,00	380,00	383,00	
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	9060	8438	7711	7198	6887	6575	6258	5934	5621	5371	5125	4921	4722	
	auswertbar	Anzahl					6627	6384	6109	5825	5488	5241	5013	4807	4598	
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl					3261	3443	3376	3382	3252	3171	3059	2965	2787	
		Anteil in %					49,21	53,93	55,26	58,06	59,26	60,50	61,02	61,68	60,61	
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %					[48,00; 50,41]	[52,71; 55,15]	[54,02; 56,51]	[56,79; 59,33]	[57,96; 60,56]	[59,18; 61,83]	[59,67; 62,37]	[60,31; 63,06]	[59,20; 62,03]	
		Mean					292,13	297,44	299,60	298,52	295,30	296,80	297,07	299,51	293,68	
		CI Mean					[287,70; 296,56]	[293,21; 301,67]	[295,33; 303,87]	[294,39; 302,64]	[291,12; 299,48]	[292,55; 301,04]	[292,82; 301,32]	[295,18; 303,84]	[289,45; 297,91]	
		Median					298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Fallbasis mittlere Differenz																
Mittlere Differenz zur ED																
CI mittlere Differenz																
Median mittlere Differenz																
2007-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10884	9823	8824	8143	7609	7036	6543	6178	5837	5527	5272	4983		
	auswertbar	Anzahl				7615	7250	6816	6331	5963	5633	5342	5109	4806		
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl				4024	4165	4019	3825	3649	3517	3320	3220	3047		
		Anteil in %				52,84	57,45	58,96	60,42	61,19	62,44	62,15	63,03	63,40		
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %				[51,72; 53,96]	[56,31; 58,59]	[57,80; 60,13]	[59,21; 61,62]	[59,96; 62,43]	[61,17; 63,70]	[60,85; 63,45]	[61,70; 64,35]	[62,04; 64,76]		
		Mean				386,68	387,80	385,41	382,64	381,85	385,62	384,40	384,55	382,35		
		CI Mean				[381,55; 391,81]	[382,89; 392,70]	[380,42; 390,39]	[377,53; 387,75]	[376,69; 387,01]	[380,30; 390,94]	[379,03; 389,77]	[379,13; 389,96]	[376,86; 387,84]		
		Median				380,00	390,00	382,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00		
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	19661	18109	16585	15472	14517	13508	12685	12005	11389	10864	10355	9873		
	auswertbar	Anzahl				14496	13841	13035	12251	11584	11042	10541	10037	9496		
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl				7891	8069	7816	7435	7179	6893	6592	6274	5927		
		Anteil in %				54,44	58,30	59,96	60,69	61,97	62,43	62,54	62,51	62,42		
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %				[53,62; 55,25]	[57,48; 59,12]	[59,12; 60,80]	[59,82; 61,55]	[61,09; 62,86]	[61,52; 63,33]	[61,61; 63,46]	[61,56; 63,46]	[61,44; 63,39]		
		Mean				301,23	298,27	298,47	295,51	297,30	297,24	297,14	295,22	294,29		
		CI Mean				[298,42; 304,04]	[295,55; 300,99]	[295,76; 301,19]	[292,74; 298,27]	[294,49; 300,12]	[294,37; 300,12]	[294,21; 300,06]	[292,29; 298,16]	[291,34; 297,23]		
		Median				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	298,00	300,00		
Fallbasis mittlere Differenz																
Mittlere Differenz zur ED																
CI mittlere Differenz																
Median mittlere Differenz																

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	13164	11828	10769	9836	8972	8290	7773	7278	6843	6460	6071		
	auswertbar	Anzahl			9955	9238	8587	7959	7445	6988	6602	6203	5809		
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl			5099	5255	5069	4790	4547	4314	4110	3858	3591		
		Anteil in %			51,22	56,88	59,03	60,18	61,07	61,73	62,25	62,20	61,82		
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %			[50,24; 52,20]	[55,87; 57,89]	[57,99; 60,07]	[59,11; 61,26]	[59,97; 62,18]	[60,59; 62,87]	[61,08; 63,42]	[60,99; 63,40]	[60,57; 63,07]		
		Mean			391,96	396,77	396,70	394,59	394,80	395,46	396,60	391,57	392,13		
		CI Mean			[387,40; 396,53]	[392,37; 401,17]	[392,26; 401,14]	[390,00; 399,17]	[390,09; 399,51]	[390,67; 400,25]	[391,77; 401,44]	[386,66; 396,48]	[386,98; 397,28]		
		Median			394,00	400,00	400,00	393,00	399,00	400,00	400,00	390,00	390,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	23606	21710	19985	18567	17041	15830	14850	14004	13279	12596	11936		
	auswertbar	Anzahl			18604	17554	16359	15233	14332	13500	12817	12126	11464		
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl			9788	10176	9809	9328	8828	8424	7928	7616	7129		
		Anteil in %			52,61	57,97	59,96	61,24	61,60	62,40	61,86	62,81	62,19		
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %			[51,89; 53,33]	[57,24; 58,70]	[59,21; 60,71]	[60,46; 62,01]	[60,80; 62,39]	[61,58; 63,22]	[61,01; 62,70]	[61,95; 63,67]	[61,30; 63,07]		
		Mean			301,67	301,22	301,97	302,48	300,61	301,60	300,92	299,45	298,03		
		CI Mean			[299,16; 304,17]	[298,84; 303,60]	[299,56; 304,39]	[300,01; 304,96]	[298,06; 303,15]	[299,05; 304,14]	[298,29; 303,55]	[296,77; 302,13]	[295,26; 300,80]		
		Median			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
Fallbasis mittlere Differenz															
Mittlere Differenz zur ED															
CI mittlere Differenz															
Median mittlere Differenz															
2008-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	16982	15323	13863	12099	10976	10130	9384	8783	8284	7783			
	auswertbar	Anzahl		13069	12810	11525	10511	9694	9010	8468	7946	7443			
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl		6940	7254	6838	6349	5964	5598	5228	4913	4675			
		Anteil in %			53,10	56,63	59,33	60,40	61,52	62,13	61,74	61,83	62,81		
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %			[52,25; 53,96]	[55,77; 57,49]	[58,44; 60,23]	[59,47; 61,34]	[60,55; 62,49]	[61,13; 63,13]	[60,70; 62,77]	[60,76; 62,90]	[61,71; 63,91]		
		Mean			391,34	395,77	395,26	397,16	395,60	396,32	397,95	397,14	398,23		
		CI Mean			[387,30; 395,39]	[391,93; 399,61]	[391,34; 399,17]	[393,08; 401,25]	[391,45; 399,74]	[392,05; 400,59]	[393,54; 402,36]	[392,60; 401,69]	[393,66; 402,80]		
		Median			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
		Fallbasis mittlere Differenz													
		Mittlere Differenz zur ED													
		CI mittlere Differenz													
		Median mittlere Differenz													
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	29795	27447	25098	22332	20470	18993	17828	16783	15876	15040			
	auswertbar	Anzahl		23705	23420	21325	19775	18344	17232	16263	15318	14470			
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl		12431	13239	12457	11833	11172	10642	10019	9470	8900			
		Anteil in %			52,44	56,53	58,42	59,84	60,90	61,76	61,61	61,82	61,51		
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %			[51,80; 53,08]	[55,89; 57,16]	[57,75; 59,08]	[59,15; 60,52]	[60,20; 61,61]	[61,03; 62,48]	[60,86; 62,35]	[61,05; 62,59]	[60,71; 62,30]		
		Mean			300,85	301,94	302,94	302,79	302,57	302,49	301,15	301,14	301,02		
		CI Mean			[298,62; 303,08]	[299,83; 304,06]	[300,76; 305,11]	[300,56; 305,01]	[300,27; 304,87]	[300,14; 304,85]	[298,79; 303,52]	[298,69; 303,60]	[298,53; 303,51]		
		Median			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
Fallbasis mittlere Differenz															
Mittlere Differenz zur ED															
CI mittlere Differenz															
Median mittlere Differenz															

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	15792	13969	12246	10985	10136	9407	8838	8388	7927				
	auswertbar	Anzahl	15782	13103	11607	10487	9707	9037	8494	8007	7582				
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	8105	8030	7203	6672	6326	5947	5563	5292	5005				
		Anteil in %	51,36	61,28	62,06	63,62	65,17	65,81	65,49	66,09	66,01				
		CI Anteil in %	[50,58; 52,14]	[60,45; 62,12]	[61,17; 62,94]	[62,70; 64,54]	[64,22; 66,12]	[64,83; 66,79]	[64,48; 66,50]	[65,06; 67,13]	[64,95; 67,08]				
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	392,40	402,40	407,12	407,85	408,28	409,38	406,95	406,06	409,27				
		CI Mean	[388,67; 396,14]	[398,77; 406,04]	[403,27; 410,96]	[403,84; 411,86]	[404,21; 412,35]	[405,19; 413,58]	[402,66; 411,25]	[401,73; 410,39]	[404,75; 413,78]				
		Median	392,00	400,00	400,00	400,00	404,00	400,00	400,00	400,00	400,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		5879	5111	4608	4284	4003	3773	3545	3333				
		Mittlere Differenz zur ED		14,17	16,17	17,83	15,51	17,13	12,33	16,02	18,01				
		CI mittlere Differenz		[10,75; 17,58]	[12,41; 19,93]	[13,72; 21,93]	[11,16; 19,87]	[12,57; 21,69]	[7,52; 17,13]	[11,12; 20,91]	[12,88; 23,14]				
		Median mittlere Differenz		1,00	7,00	8,50	10,00	10,00	5,00	7,00	8,00				
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	28291	25543	22838	20876	19298	18047	17047	16090	15228				
	auswertbar	Anzahl	28288	24148	21788	19994	18496	17319	16417	15444	14557				
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	14596	14913	13603	12767	12010	11473	10780	10234	9561				
		Anteil in %	51,60	61,76	62,43	63,85	64,93	66,25	65,66	66,27	65,68				
		CI Anteil in %	[51,02; 52,18]	[61,14; 62,37]	[61,79; 63,08]	[63,19; 64,52]	[64,25; 65,62]	[65,54; 66,95]	[64,94; 66,39]	[65,52; 67,01]	[64,91; 66,45]				
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	299,14	307,51	309,28	309,04	308,35	307,88	306,98	306,80	306,64				
		CI Mean	[297,08; 301,20]	[305,53; 309,50]	[307,20; 311,35]	[306,90; 311,19]	[306,17; 310,53]	[305,67; 310,10]	[304,69; 309,27]	[304,48; 309,12]	[304,20; 309,09]				
		Median	300,00	300,00	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
Fallbasis mittlere Differenz			10903	9685	8799	8134	7731	7189	6763	6306					
Mittlere Differenz zur ED			9,45	10,17	11,34	10,22	9,60	6,79	7,52	7,07					
CI mittlere Differenz			[7,55; 11,36]	[8,00; 12,34]	[9,04; 13,64]	[7,82; 12,63]	[7,08; 12,12]	[4,20; 9,39]	[4,76; 10,28]	[4,14; 10,00]					
Median mittlere Differenz			0,00	4,00	4,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
2009-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	12705	10720	9296	8170	7430	6854	6342	5935					
	auswertbar	Anzahl	12682	10127	8776	7776	7112	6554	6023	5625					
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	7049	6210	5477	4858	4561	4206	3842	3577					
		Anteil in %	55,58	61,32	62,41	62,47	64,13	64,17	63,79	63,59					
		CI Anteil in %	[54,72; 56,45]	[60,37; 62,27]	[61,40; 63,42]	[61,40; 63,55]	[63,02; 65,25]	[63,01; 65,34]	[62,57; 65,00]	[62,33; 64,85]					
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	393,45	402,91	406,75	408,84	408,10	412,90	411,75	410,24					
		CI Mean	[389,43; 397,46]	[398,72; 407,11]	[402,27; 411,23]	[404,11; 413,57]	[403,26; 412,94]	[407,88; 417,92]	[406,50; 417,00]	[404,91; 415,58]					
		Median	400,00	400,00	402,00	409,00	408,00	411,50	410,00	410,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		4906	4211	3625	3354	3078	2784	2561					
		Mittlere Differenz zur ED		13,43	16,00	15,79	15,88	21,25	22,38	19,23					
		CI mittlere Differenz		[9,91; 16,95]	[11,97; 20,03]	[11,38; 20,19]	[11,17; 20,58]	[16,23; 26,26]	[17,07; 27,68]	[13,63; 24,83]					
		Median mittlere Differenz		0,00	5,00	7,00	7,00	10,00	9,00	10,00					
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	22001	19094	16970	15316	14073	13124	12308	11559					
	auswertbar	Anzahl	22001	18214	16195	14650	13511	12614	11791	11028					
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	12178	11210	10050	9184	8617	8042	7570	7059					
		Anteil in %	55,35	61,55	62,06	62,69	63,78	63,75	64,20	64,01					
		CI Anteil in %	[54,70; 56,01]	[60,84; 62,25]	[61,31; 62,80]	[61,91; 63,47]	[62,97; 64,59]	[62,92; 64,59]	[63,34; 65,07]	[63,11; 64,91]					
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	302,17	310,77	310,59	310,15	309,35	308,51	311,07	308,04					
		CI Mean	[299,90; 304,44]	[308,42; 313,11]	[308,13; 313,06]	[307,56; 312,74]	[306,69; 312,01]	[305,80; 311,22]	[308,20; 313,94]	[305,14; 310,94]					
		Median	300,00	306,00	304,00	303,00	303,00	303,00	302,50	301,00					
Fallbasis mittlere Differenz			8821	7710	6865	6388	5884	5487	5098						
Mittlere Differenz zur ED			10,47	10,25	10,78	10,18	8,97	10,56	7,50						
CI mittlere Differenz			[8,39; 12,56]	[7,93; 12,57]	[8,19; 13,38]	[7,46; 12,90]	[6,07; 11,87]	[7,45; 13,66]	[4,34; 10,65]						
Median mittlere Differenz			2,00	2,00	4,00	5,00	3,00	4,00	2,00						

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10500	8753	7522	6624	5999	5506	5117						
	auswertbar	Anzahl	10488	8267	7080	6277	5716	5226	4865						
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	6083	5226	4443	3974	3661	3418	3148						
		Anteil in %	58,00	63,22	62,75	63,31	64,05	65,40	64,71						
		CI Anteil in %	[57,05; 58,94]	[62,18; 64,25]	[61,63; 63,88]	[62,12; 64,50]	[62,80; 65,29]	[64,11; 66,69]	[63,36; 66,05]						
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	400,64	411,15	411,74	413,12	414,27	412,61	414,85						
		CI Mean	[396,37; 404,91]	[406,52; 415,79]	[406,76; 416,73]	[407,82; 418,41]	[408,84; 419,70]	[407,11; 418,11]	[409,09; 420,62]						
		Median	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		4213	3512	3123	2825	2627	2390						
		Mittlere Differenz zur ED		17,92	17,29	18,37	18,32	14,61	15,09						
		CI mittlere Differenz		[14,15; 21,69]	[12,80; 21,79]	[13,31; 23,44]	[13,02; 23,62]	[9,22; 20,01]	[9,24; 20,93]						
		Median mittlere Differenz		1,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00						
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	18339	15966	14015	12562	11561	10687	10000						
	auswertbar	Anzahl	18337	15190	13290	11958	11056	10163	9484						
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	10616	9650	8416	7691	7139	6651	6085						
		Anteil in %	57,89	63,53	63,33	64,32	64,57	65,44	64,16						
		CI Anteil in %	[57,18; 58,61]	[62,76; 64,29]	[62,51; 64,15]	[63,46; 65,18]	[63,68; 65,46]	[64,52; 66,37]	[63,20; 65,13]						
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	302,53	309,49	312,35	312,83	309,51	311,52	310,05						
		CI Mean	[300,14; 304,92]	[307,00; 311,98]	[309,72; 314,97]	[310,05; 315,61]	[306,68; 312,35]	[308,60; 314,45]	[307,01; 313,09]						
		Median	300,00	306,00	310,00	310,00	306,00	310,00	306,00						
Fallbasis mittlere Differenz			7788	6602	5961	5489	5037	4596							
Mittlere Differenz zur ED			9,88	10,25	12,06	9,42	13,55	9,53							
CI mittlere Differenz			[7,72; 12,03]	[7,79; 12,72]	[9,41; 14,72]	[6,65; 12,19]	[10,59; 16,52]	[6,41; 12,65]							
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	4,00	1,00	5,00	2,00							
2010-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	11718	9792	8409	7489	6843	6258							
	auswertbar	Anzahl	11698	9237	7979	7128	6460	5897							
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	6774	5806	5048	4523	4145	3782							
		Anteil in %	57,91	62,86	63,27	63,45	64,16	64,13							
		CI Anteil in %	[57,01; 58,80]	[61,87; 63,84]	[62,21; 64,32]	[62,34; 64,57]	[62,99; 65,33]	[62,91; 65,36]							
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	400,69	409,84	412,68	411,60	413,55	411,55							
		CI Mean	[396,74; 404,65]	[405,50; 414,18]	[408,01; 417,36]	[406,80; 416,41]	[408,46; 418,64]	[406,31; 416,79]							
		Median	400,00	405,00	408,00	408,00	410,00	405,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		4722	4033	3577	3254	2939							
		Mittlere Differenz zur ED		13,21	13,99	14,24	18,08	13,64							
		CI mittlere Differenz		[9,69; 16,72]	[9,99; 17,98]	[9,86; 18,63]	[13,47; 22,69]	[8,65; 18,62]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	3,00	7,00	4,00							
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	20435	17759	15574	14047	12942	11968							
	auswertbar	Anzahl	20434	16916	14877	13433	12353	11355							
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	12018	10734	9444	8565	7891	7300							
		Anteil in %	58,81	63,45	63,48	63,76	63,88	64,29							
		CI Anteil in %	[58,14; 59,49]	[62,73; 64,18]	[62,71; 64,25]	[62,95; 64,57]	[63,03; 64,73]	[63,41; 65,17]							
	Peak-Flow-Mittelwert	Mean	305,01	314,17	313,89	313,93	314,22	313,37							
		CI Mean	[302,77; 307,25]	[311,77; 316,58]	[311,33; 316,46]	[311,28; 316,59]	[311,48; 316,97]	[310,53; 316,22]							
		Median	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00							
Fallbasis mittlere Differenz			8704	7575	6762	6164	5640								
Mittlere Differenz zur ED			10,19	10,68	9,25	9,76	10,14								
CI mittlere Differenz			[8,18; 12,19]	[8,48; 12,89]	[8,48; 11,69]	[7,21; 12,32]	[7,41; 12,88]								
Median mittlere Differenz			0,00	3,00	1,00	3,00	3,00								

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	11021	9222	7913	7013	6351								
	auswertbar	Anzahl	11007	8714	7450	6622	5981								
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	6475	5387	4632	4150	3720								
		Anteil in %	58,83	61,82	62,17	62,67	62,20								
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %	[57,91; 59,75]	[60,80; 62,84]	[61,07; 63,28]	[61,50; 63,83]	[60,97; 63,43]								
		Mean	399,33	411,95	412,61	413,04	409,25								
		CI Mean	[395,33; 403,33]	[407,52; 416,38]	[407,85; 417,38]	[408,13; 417,95]	[403,98; 414,51]								
		Median	400,00	406,00	409,50	410,00	407,50								
		Fallbasis mittlere Differenz		4497	3807	3340	2959								
		Mittlere Differenz zur ED		13,48	14,57	12,50	8,66								
		CI mittlere Differenz		[9,86; 17,10]	[10,49; 18,66]	[7,87; 17,13]	[3,62; 13,71]								
		Median mittlere Differenz		0,00	2,00	1,00	0,00								
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	18986	16450	14584	13128	12065								
	auswertbar	Anzahl	18982	15750	13871	12505	11409								
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	11303	10060	8748	7943	7256								
		Anteil in %	59,55	63,87	63,07	63,52	63,60								
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %	[58,85; 60,24]	[63,12; 64,62]	[62,26; 63,87]	[62,67; 64,36]	[62,72; 64,48]								
		Mean	306,99	314,66	314,68	315,29	313,35								
		CI Mean	[304,71; 309,27]	[312,22; 317,11]	[312,09; 317,28]	[312,61; 317,97]	[310,57; 316,14]								
		Median	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00								
Fallbasis mittlere Differenz			8401	7199	6439	5794									
Mittlere Differenz zur ED			8,60	9,51	8,06	8,12									
CI mittlere Differenz			[6,62; 10,58]	[7,30; 11,71]	[5,63; 10,49]	[5,49; 10,74]									
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00									
2011-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	11705	9798	8410	7374									
	auswertbar	Anzahl	11692	9220	7920	6858									
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	7039	5816	4998	4311									
		Anteil in %	60,20	63,08	63,11	62,86									
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %	[59,32; 61,09]	[62,10; 64,07]	[62,04; 64,17]	[61,72; 64,00]									
		Mean	405,07	419,22	420,80	420,85									
		CI Mean	[401,17; 408,96]	[414,79; 423,65]	[416,18; 425,42]	[415,86; 425,83]									
		Median	400,00	420,00	420,00	420,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		4924	4166	3568									
		Mittlere Differenz zur ED		18,95	19,37	19,03									
		CI mittlere Differenz		[15,47; 22,44]	[15,49; 23,25]	[14,64; 23,42]									
		Median mittlere Differenz		1,50	5,00	8,50									
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	20679	17954	15913	14302									
	auswertbar	Anzahl	20677	17079	15082	13492									
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	12674	11077	9637	8678									
		Anteil in %	61,30	64,86	63,90	64,32									
	Peak-Flow-Mittelwert	CI Anteil in %	[60,63; 61,96]	[64,14; 65,57]	[63,13; 64,66]	[63,51; 65,13]									
		Mean	308,99	316,12	318,75	318,24									
		CI Mean	[306,80; 311,17]	[313,76; 318,48]	[316,28; 321,22]	[315,60; 320,88]									
		Median	300,00	310,00	315,00	315,00									
Fallbasis mittlere Differenz			9295	8065	7150										
Mittlere Differenz zur ED			9,28	12,33	10,88										
CI mittlere Differenz			[7,45; 11,11]	[10,29; 14,37]	[8,58; 13,18]										
Median mittlere Differenz			0,00	4,00	5,00										

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10338	8628	7386											
	auswertbar	Anzahl	10318	8136	6848											
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	6325	5222	4295											
		Anteil in %	61,30	64,18	62,72											
	CI Anteil in %	[60,36; 62,24]	[63,14; 65,23]	[61,57; 63,86]												
		Mean	410,09	417,09	417,36											
	CI Mean	[405,95; 414,23]	[412,51; 421,67]	[412,31; 422,42]												
		Median	403,00	410,00	417,00											
	Peak-Flow-Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		4412	3624											
		Mittlere Differenz zur ED		11,20	10,21											
		CI mittlere Differenz		[7,67; 14,72]	[6,15; 14,28]											
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00											
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	17956	15630	13757											
	auswertbar	Anzahl	17954	14876	12942											
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	10978	9579	8144											
		Anteil in %	61,15	64,39	62,93											
	CI Anteil in %	[60,43; 61,86]	[63,62; 65,16]	[62,09; 63,76]												
		Mean	310,03	316,23	315,82											
	CI Mean	[307,69; 312,37]	[313,67; 318,79]	[313,10; 318,54]												
		Median	300,00	310,00	311,00											
Peak-Flow-Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		8121	6864												
	Mittlere Differenz zur ED		7,59	7,75												
	CI mittlere Differenz		[5,63; 9,55]	[5,52; 9,98]												
	Median mittlere Differenz		0,00	1,00												
2012-1	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	12019	10074												
	auswertbar	Anzahl	11995	9315												
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	7316	5935												
		Anteil in %	60,99	63,71												
	CI Anteil in %	[60,12; 61,87]	[62,74; 64,69]													
		Mean	410,07	421,83												
	CI Mean	[406,26; 413,88]	[417,58; 426,09]													
		Median	404,00	420,00												
	Peak-Flow-Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		5024												
		Mittlere Differenz zur ED		14,88												
		CI mittlere Differenz		[11,51; 18,26]												
		Median mittlere Differenz		2,00												
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	21143	18358												
	auswertbar	Anzahl	21140	17123												
	mit Peak-Flow-Messung	Anzahl	12948	11072												
		Anteil in %	61,25	64,66												
	CI Anteil in %	[60,59; 61,91]	[63,95; 65,38]													
		Mean	313,52	320,71												
	CI Mean	[311,37; 315,68]	[318,36; 323,07]													
		Median	307,00	320,00												
Peak-Flow-Mittelwert	Fallbasis mittlere Differenz		9279													
	Mittlere Differenz zur ED		7,63													
	CI mittlere Differenz		[5,76; 9,49]													
	Median mittlere Differenz		0,00													

EZ	Peak-Flow-Absolutwert	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	erwachsene männl. Pat. insgesamt	Anzahl	10491													
	auswertbar	Anzahl	10471													
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	6323													
		Anteil in %	60,39													
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[59,45; 61,32]													
		Mean	409,52													
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[405,42; 413,62]													
		Median	403,00													
		Fallbasis mittlere Differenz														
		Mittlere Differenz zur ED														
		CI mittlere Differenz														
		Median mittlere Differenz														
	erwachsene weibl. Pat. insgesamt	Anzahl	18214													
	auswertbar	Anzahl	18213													
	mit Peak-Flow- Messung	Anzahl	11179													
		Anteil in %	61,38													
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Anteil in %	[60,67; 62,09]													
		Mean	313,12													
	Peak-Flow- Mittelwert	CI Mean	[310,80; 315,44]													
		Median	308,00													
Fallbasis mittlere Differenz																
Mittlere Differenz zur ED																
CI mittlere Differenz																
Median mittlere Differenz																

In der Tabelle 3.3.2 ist für die jeweiligen Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit sich die **Peak-Flow-Werte** seit der letzten Dokumentation verbessert haben bzw. gleichgeblieben sind oder sich verschlechtert haben. Für das Beitrittsjahr können - mangels einer vorherigen Dokumentation - keine Werte ausgewiesen werden. Zunächst wird für jede Kohorte unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Untersuchung, ob eine Verbesserung der Peak-Flow-Werte bzw. gleichbleibende Peak-Flow-Werte oder eine Verschlechterung der Peak-Flow-Werte festgestellt werden konnte. Darüber hinaus werden Anzahl und Anteil der auswertbaren Patienten verteilt auf die

beiden Kategorien (Verbesserung oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert, Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes) dargestellt.

Mit der Umstellung auf eDMP zum 1.7.2008 kam es zu einer Änderung in der Dokumentation. Während vorher die Veränderung dokumentiert wurde (Verbesserung oder gleichbleiben bzw. Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes) werden seitdem Absolutwerte erhoben. Daraus läßt sich nach zwei Meßzeitpunkten die Veränderung ermitteln. Erstmals also ab dem Berichtshalbjahr 2009-1. Für das Berichtshalbjahr 2008-2 ist dagegen keine Aussage zur Veränderung gegenüber dem vorangegangenen Berichtshalbjahr möglich. Daher werden für dieses Berichtshalbjahr keine Werte dargestellt.

Tabelle 3.3.2 Entwicklung des Peak-Flow-Wertes

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-1	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	auswertbar	Anzahl		482	494	447	412	0	248	238	247	247	242	229	203	192
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		428	435	395	369		149	137	154	148	151	142	122	95
		Anteil in %		88,80	88,06	88,37	89,56		60,08	57,56	62,35	59,92	62,40	62,01	60,10	49,48
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	CI Anteil in %		[85,98; 91,62]	[85,19; 90,92]	[85,39; 91,34]	[86,61; 92,52]		[53,97; 66,19]	[51,27; 63,86]	[56,29; 68,40]	[53,79; 66,04]	[56,28; 68,51]	[55,71; 68,31]	[53,35; 66,85]	[42,39; 56,57]
		Anzahl		54	59	52	43		99	101	93	99	91	87	81	97
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anteil in %		11,20	11,94	11,63	10,44		39,92	42,44	37,65	40,08	37,60	37,99	39,90	50,52
		CI Anteil in %		[8,38; 14,02]	[9,08; 14,81]	[8,66; 14,61]	[7,48; 13,39]		[33,81; 46,03]	[36,14; 48,73]	[31,60; 43,71]	[33,96; 46,21]	[31,49; 43,72]	[31,69; 44,29]	[33,15; 46,65]	[43,43; 57,61]
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
	auswertbar	Anzahl		696	737	701	661	0	390	392	402	418	416	389	377	364
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		623	656	635	593		229	225	249	227	247	216	203	220
		Anteil in %		89,51	89,01	90,58	89,71		58,72	57,40	61,94	54,31	59,38	55,53	53,85	60,44
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	CI Anteil in %		[87,23; 91,79]	[86,75; 91,27]	[88,42; 92,75]	[87,39; 92,03]		[53,83; 63,61]	[52,50; 62,30]	[57,19; 66,69]	[49,52; 59,09]	[54,65; 64,10]	[50,58; 60,47]	[48,81; 58,89]	[55,41; 65,47]
		Anzahl		73	81	66	68		161	167	153	191	169	173	174	144
Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anteil in %		10,49	10,99	9,42	10,29		41,28	42,60	38,06	45,69	40,63	44,47	46,15	39,56	
	CI Anteil in %		[8,21; 12,77]	[8,73; 13,25]	[7,25; 11,58]	[7,97; 12,61]		[36,39; 46,17]	[37,70; 47,50]	[33,31; 42,81]	[40,91; 50,48]	[35,90; 45,35]	[39,53; 49,42]	[41,11; 51,19]	[34,53; 44,59]	
2006-2	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124	
	auswertbar	Anzahl		4018	3768	3517	0	2143	2207	2167	2094	1974	1858	1792	1663	
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		3647	3382	3181		1288	1353	1340	1259	1206	1159	1067	990	
		Anteil in %		90,77	89,76	90,45		60,10	61,30	61,84	60,12	61,09	62,38	59,54	59,53	
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	CI Anteil in %		[89,87; 91,66]	[88,79; 90,72]	[89,47; 91,42]		[58,03; 62,18]	[59,27; 63,34]	[59,79; 63,88]	[58,03; 62,22]	[58,94; 63,25]	[60,18; 64,58]	[57,27; 61,82]	[57,17; 61,89]	
		Anzahl		371	386	336		855	854	827	835	768	699	725	673	
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anteil in %		9,23	10,24	9,55		39,90	38,70	38,16	39,88	38,91	37,62	40,46	40,47	
		CI Anteil in %		[8,34; 10,13]	[9,28; 11,21]	[8,58; 10,53]		[37,82; 41,97]	[36,66; 40,73]	[36,12; 40,21]	[37,78; 41,97]	[36,75; 41,06]	[35,42; 39,82]	[38,18; 42,73]	[38,11; 42,83]	
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	
	auswertbar	Anzahl		5448	5266	5055	0	3052	3222	3183	3132	3013	2925	2829	2683	
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		4893	4698	4565		1860	1918	1876	1781	1741	1652	1700	1525	
		Anteil in %		89,81	89,21	90,31		60,94	59,53	58,94	56,86	57,78	56,48	60,09	56,84	
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	CI Anteil in %		[89,01; 90,62]	[88,38; 90,05]	[89,49; 91,12]		[59,21; 62,67]	[57,83; 61,22]	[57,23; 60,65]	[55,13; 58,60]	[56,02; 59,55]	[54,68; 58,28]	[58,29; 61,90]	[54,96; 58,71]	
		Anzahl		555	568	490		1192	1304	1307	1351	1272	1273	1129	1158	
Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anteil in %		10,19	10,79	9,69		39,06	40,47	41,06	43,14	42,22	43,52	39,91	43,16		
	CI Anteil in %		[9,38; 10,99]	[9,95; 11,62]	[8,88; 10,51]		[37,33; 40,79]	[38,78; 42,17]	[39,35; 42,77]	[41,40; 44,87]	[40,45; 43,98]	[41,72; 45,32]	[38,10; 41,71]	[41,29; 45,04]		

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136		
	auswertbar	Anzahl		7812	7164	0	4525	4643	4422	4253	3989	3769	3571	3399		
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		6965	6356		2558	2782	2557	2439	2351	2185	2079	1981		
		Anteil in %		89,16	88,72		56,53	59,92	57,82	57,35	58,94	57,97	58,22	58,28		
		CI Anteil in %		[88,47; 89,85]	[87,99; 89,45]		[55,09; 57,97]	[58,51; 61,33]	[56,37; 59,28]	[55,86; 58,83]	[57,41; 60,46]	[56,40; 59,55]	[56,60; 59,84]	[56,62; 59,94]		
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		847	808		1967	1861	1865	1814	1638	1584	1492	1418		
		Anteil in %		10,84	11,28		43,47	40,08	42,18	42,65	41,06	42,03	41,78	41,72		
		CI Anteil in %		[10,15; 11,53]	[10,55; 12,01]		[42,03; 44,91]	[38,67; 41,49]	[40,72; 43,63]	[41,17; 44,14]	[39,54; 42,59]	[40,45; 43,60]	[40,16; 43,40]	[40,06; 43,38]		
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538		
	auswertbar	Anzahl		11715	11094	0	7185	7459	7162	6872	6618	6315	6025	5618		
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		10420	9875		4058	4305	4081	3964	3801	3624	3403	3212		
		Anteil in %		88,95	89,01		56,48	57,72	56,98	57,68	57,43	57,39	56,48	57,17		
		CI Anteil in %		[88,38; 89,51]	[88,43; 89,59]		[55,33; 57,63]	[56,59; 58,84]	[55,83; 58,13]	[56,52; 58,85]	[56,24; 58,63]	[56,17; 58,61]	[55,23; 57,73]	[55,88; 58,47]		
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		1295	1219		3127	3154	3081	2908	2817	2691	2622	2406		
Anteil in %			11,05	10,99		43,52	42,28	43,02	42,32	42,57	42,61	43,52	42,83			
CI Anteil in %			[10,49; 11,62]	[10,41; 11,57]		[42,37; 44,67]	[41,16; 43,41]	[41,87; 44,17]	[41,15; 43,48]	[41,37; 43,76]	[41,39; 43,83]	[42,27; 44,77]	[41,53; 44,12]			
2007-2	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054			
	auswertbar	Anzahl		9905	0	6187	6383	6123	5711	5375	5085	4713	4308			
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		8971		3689	3794	3694	3403	3249	2971	2796	2541			
		Anteil in %		90,57		59,63	59,44	60,33	59,59	60,45	58,43	59,33	58,98			
		CI Anteil in %		[89,99; 91,15]		[58,40; 60,85]	[58,23; 60,64]	[59,10; 61,56]	[58,31; 60,86]	[59,14; 61,75]	[57,07; 59,78]	[57,92; 60,73]	[57,51; 60,45]			
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		934		2498	2589	2429	2308	2126	2114	1917	1767			
		Anteil in %		9,43		40,37	40,56	39,67	40,41	39,55	41,57	40,67	41,02			
		CI Anteil in %		[8,85; 10,01]		[39,15; 41,60]	[39,36; 41,77]	[38,44; 40,90]	[39,14; 41,69]	[38,25; 40,86]	[40,22; 42,93]	[39,27; 42,08]	[39,55; 42,49]			
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091			
	auswertbar	Anzahl		13880	0	9294	9614	9305	8861	8368	7873	7503	7029			
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		12397		5269	5589	5404	5114	4944	4526	4343	4021			
		Anteil in %		89,32		56,69	58,13	58,08	57,71	59,08	57,49	57,88	57,21			
		CI Anteil in %		[88,80; 89,83]		[55,69; 57,70]	[57,15; 59,12]	[57,07; 59,08]	[56,68; 58,74]	[58,03; 60,14]	[56,40; 58,58]	[56,77; 59,00]	[56,05; 58,36]			
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		1483		4025	4025	3901	3747	3424	3347	3160	3008			
Anteil in %			10,68		43,31	41,87	41,92	42,29	40,92	42,51	42,12	42,79				
CI Anteil in %			[10,17; 11,20]		[42,30; 44,31]	[40,88; 42,85]	[40,92; 42,93]	[41,26; 43,32]	[39,86; 41,97]	[41,42; 43,60]	[41,00; 43,23]	[41,64; 43,95]				
2008-1	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888				
	auswertbar	Anzahl		0	7804	8070	7683	7101	6642	6136	5685	5280				
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl			4643	4768	4571	4201	3953	3720	3414	3151				
		Anteil in %			59,50	59,08	59,49	59,16	59,52	60,63	60,05	59,68				
		CI Anteil in %			[58,41; 60,58]	[58,01; 60,16]	[58,40; 60,59]	[58,02; 60,30]	[58,33; 60,70]	[59,40; 61,85]	[58,78; 61,33]	[58,35; 61,00]				
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl			3161	3302	3112	2900	2689	2416	2271	2129				
		Anteil in %			40,50	40,92	40,51	40,84	40,48	39,37	39,95	40,32				
		CI Anteil in %			[39,42; 41,59]	[39,84; 41,99]	[39,41; 41,60]	[39,70; 41,98]	[39,30; 41,67]	[38,15; 40,60]	[38,67; 41,22]	[39,00; 41,65]				
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308				
	auswertbar	Anzahl		0	11269	11862	11383	10822	10315	9760	9194	8550				
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl			6502	6873	6580	6254	6050	5560	5346	4872				
		Anteil in %			57,70	57,94	57,81	57,79	58,65	56,97	58,15	56,98				
		CI Anteil in %			[56,79; 58,61]	[57,05; 58,83]	[56,90; 58,71]	[56,86; 58,72]	[57,70; 59,60]	[55,98; 57,95]	[57,14; 59,16]	[55,93; 58,03]				
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl			4767	4989	4803	4568	4265	4200	3848	3678				
Anteil in %				42,30	42,06	42,19	42,21	41,35	43,03	41,85	43,02					
CI Anteil in %				[41,39; 43,21]	[41,17; 42,95]	[41,29; 43,10]	[41,28; 43,14]	[40,40; 42,30]	[42,05; 44,02]	[40,84; 42,86]	[41,97; 44,07]					

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023					
	auswertbar	Anzahl		8087	8380	7770	7280	6841	6417	5965	5570					
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		4979	4944	4604	4233	4001	3663	3503	3255					
		Anteil in %		61,57	59,00	59,25	58,15	58,49	57,08	58,73	58,44					
		CI Anteil in %		[60,51; 62,63]	[57,94; 60,05]	[58,16; 60,35]	[57,01; 59,28]	[57,32; 59,65]	[55,87; 58,29]	[57,48; 59,98]	[57,14; 59,73]					
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		3108	3436	3166	3047	2840	2754	2462	2315					
		Anteil in %		38,43	41,00	40,75	41,85	41,51	42,92	41,27	41,56					
		CI Anteil in %		[37,37; 39,49]	[39,95; 42,06]	[39,65; 41,84]	[40,72; 42,99]	[40,35; 42,68]	[41,71; 44,13]	[40,02; 42,52]	[40,27; 42,86]					
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502					
	auswertbar	Anzahl		12297	13009	12293	11613	11086	10481	9831	9175					
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		7448	7563	7095	6679	6355	5961	5680	5266					
		Anteil in %		60,57	58,14	57,72	57,51	57,32	56,87	57,78	57,40					
		CI Anteil in %		[59,70; 61,43]	[57,29; 58,98]	[56,84; 58,59]	[56,61; 58,41]	[56,40; 58,25]	[55,93; 57,82]	[56,80; 58,75]	[56,38; 58,41]					
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		4849	5446	5198	4934	4731	4520	4151	3909					
Anteil in %			39,43	41,86	42,28	42,49	42,68	43,13	42,22	42,60						
CI Anteil in %			[38,57; 40,30]	[41,02; 42,71]	[41,41; 43,16]	[41,59; 43,39]	[41,75; 43,60]	[42,18; 44,07]	[41,25; 43,20]	[41,59; 43,62]						
2009-1	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675						
	auswertbar	Anzahl		6805	6536	5783	5383	4936	4501	4058						
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		4378	3909	3478	3208	3005	2683	2350						
		Anteil in %		64,34	59,81	60,14	59,60	60,88	59,61	57,91						
		CI Anteil in %		[63,20; 65,47]	[58,62; 61,00]	[58,88; 61,40]	[58,28; 60,91]	[59,52; 62,24]	[58,18; 61,04]	[56,39; 59,43]						
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		2427	2627	2305	2175	1931	1818	1708						
		Anteil in %		35,66	40,19	39,86	40,40	39,12	40,39	42,09						
		CI Anteil in %		[34,53; 36,80]	[39,00; 41,38]	[38,60; 41,12]	[39,09; 41,72]	[37,76; 40,48]	[38,96; 41,82]	[40,57; 43,61]						
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641						
	auswertbar	Anzahl		10009	9793	8929	8388	7890	7380	6871						
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		6272	5642	5156	4876	4602	4272	3913						
		Anteil in %		62,66	57,61	57,74	58,13	58,33	57,89	56,95						
		CI Anteil in %		[61,72; 63,61]	[56,63; 58,59]	[56,72; 58,77]	[57,07; 59,19]	[57,24; 59,41]	[56,76; 59,01]	[55,78; 58,12]						
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		3737	4151	3773	3512	3288	3108	2958						
Anteil in %			37,34	42,39	42,26	41,87	41,67	42,11	43,05							
CI Anteil in %			[36,39; 38,28]	[41,41; 43,37]	[41,23; 43,28]	[40,81; 42,93]	[40,59; 42,76]	[40,99; 43,24]	[41,88; 44,22]							
2009-2	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818							
	auswertbar	Anzahl		5997	5536	4862	4421	4104	3729							
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		3855	3271	2915	2578	2425	2177							
		Anteil in %		64,28	59,09	59,95	58,31	59,09	58,38							
		CI Anteil in %		[63,07; 65,50]	[57,79; 60,38]	[58,58; 61,33]	[56,86; 59,77]	[57,58; 60,59]	[56,80; 59,96]							
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		2142	2265	1947	1843	1679	1552							
		Anteil in %		35,72	40,91	40,05	41,69	40,91	41,62							
		CI Anteil in %		[34,50; 36,93]	[39,62; 42,21]	[38,67; 41,42]	[40,23; 43,14]	[39,41; 42,42]	[40,04; 43,20]							
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125							
	auswertbar	Anzahl		8981	8350	7577	7044	6533	6005							
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		5506	4891	4417	4020	3842	3374							
		Anteil in %		61,31	58,57	58,29	57,07	58,81	56,19							
		CI Anteil in %		[60,30; 62,31]	[57,52; 59,63]	[57,18; 59,41]	[55,91; 58,23]	[57,62; 60,00]	[54,93; 57,44]							
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		3475	3459	3160	3024	2691	2631							
Anteil in %			38,69	41,43	41,71	42,93	41,19	43,81								
CI Anteil in %			[37,69; 39,70]	[40,37; 42,48]	[40,59; 42,82]	[41,77; 44,09]	[40,00; 42,38]	[42,56; 45,07]								

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2010-1	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281								
	auswertbar	Anzahl		6598	6153	5497	4979	4507								
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		4145	3682	3269	2999	2649								
		Anteil in %		62,82	59,84	59,47	60,23	58,78								
		CI Anteil in %		[61,66; 63,99]	[58,62; 61,07]	[58,17; 60,77]	[58,87; 61,59]	[57,34; 60,21]								
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		2453	2471	2228	1980	1858								
		Anteil in %		37,18	40,16	40,53	39,77	41,22								
		CI Anteil in %		[36,01; 38,34]	[38,93; 41,38]	[39,23; 41,83]	[38,41; 41,13]	[39,79; 42,66]								
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236								
	auswertbar	Anzahl		9905	9267	8389	7726	7092								
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		6135	5369	4886	4520	4081								
		Anteil in %		61,94	57,94	58,24	58,50	57,54								
		CI Anteil in %		[60,98; 62,89]	[56,93; 58,94]	[57,19; 59,30]	[57,40; 59,60]	[56,39; 58,69]								
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		3770	3898	3503	3206	3011								
Anteil in %			38,06	42,06	41,76	41,50	42,46									
CI Anteil in %			[37,11; 39,02]	[41,06; 43,07]	[40,70; 42,81]	[40,40; 42,60]	[41,31; 43,61]									
2010-2	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568									
	auswertbar	Anzahl		6324	5694	5076	4496									
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		4013	3417	3039	2620									
		Anteil in %		63,46	60,01	59,87	58,27									
		CI Anteil in %		[62,27; 64,64]	[58,74; 61,28]	[58,52; 61,22]	[56,83; 59,72]									
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		2311	2277	2037	1876									
		Anteil in %		36,54	39,99	40,13	41,73									
		CI Anteil in %		[35,36; 37,73]	[38,72; 41,26]	[38,78; 41,48]	[40,28; 43,17]									
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579									
	auswertbar	Anzahl		9669	8850	7929	7226									
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		5928	5028	4590	4153									
		Anteil in %		61,31	56,81	57,89	57,47									
		CI Anteil in %		[60,34; 62,28]	[55,78; 57,85]	[56,80; 58,98]	[56,33; 58,61]									
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		3741	3822	3339	3073									
Anteil in %			38,69	43,19	42,11	42,53										
CI Anteil in %			[37,72; 39,66]	[42,15; 44,22]	[41,02; 43,20]	[41,39; 43,67]										
2011-1	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	15409	12971	11106	9678										
	auswertbar	Anzahl		6677	5928	5085										
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		4303	3566	3017										
		Anteil in %		64,45	60,16	59,33										
		CI Anteil in %		[63,30; 65,59]	[58,91; 61,40]	[57,98; 60,68]										
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		2374	2362	2068										
		Anteil in %		35,55	39,84	40,67										
		CI Anteil in %		[34,41; 36,70]	[38,60; 41,09]	[39,32; 42,02]										
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	23197	20078	17696	15845										
	auswertbar	Anzahl		10469	9512	8472										
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		6491	5637	4877										
		Anteil in %		62,00	59,26	57,57										
		CI Anteil in %		[61,07; 62,93]	[58,27; 60,25]	[56,51; 58,62]										
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		3978	3875	3595										
Anteil in %			38,00	40,74	42,43											
CI Anteil in %			[37,07; 38,93]	[39,75; 41,73]	[41,38; 43,49]											

EZ	Entwicklung des Peak-Flow-Wertes		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	14050	11811	10082												
	auswertbar	Anzahl		6122	5317												
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		3876	3141												
		Anteil in %			63,31	59,07											
		CI Anteil in %			[62,11; 64,52]	[57,75; 60,40]											
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		2246	2176												
		Anteil in %			36,69	40,93											
		CI Anteil in %			[35,48; 37,89]	[39,60; 42,25]											
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	20513	17841	15614												
	auswertbar	Anzahl		9304	8198												
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		5698	4752												
		Anteil in %			61,24	57,97											
		CI Anteil in %			[60,25; 62,23]	[56,90; 59,03]											
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		3606	3446												
Anteil in %				38,76	42,03												
CI Anteil in %				[37,77; 39,75]	[40,97; 43,10]												
2012-1	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	16002	13484													
	auswertbar	Anzahl		6907													
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		4385													
		Anteil in %			63,49												
		CI Anteil in %			[62,35; 64,62]												
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		2522													
		Anteil in %			36,51												
		CI Anteil in %			[35,38; 37,65]												
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	23844	20669													
	auswertbar	Anzahl		10511													
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl		6341													
		Anteil in %			60,33												
		CI Anteil in %			[59,39; 61,26]												
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl		4170													
Anteil in %				39,67													
CI Anteil in %				[38,74; 40,61]													
2012-2	männliche Pat. insgesamt	Anzahl	14102														
	auswertbar	Anzahl															
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	weibliche Pat. insgesamt	Anzahl	20545														
	auswertbar	Anzahl															
	verbessertes oder gleichbleibender Peak-Flow-Wert	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes	Anzahl															
Anteil in %																	
CI Anteil in %																	

3.4 Medikation

Um Asthma zu behandeln, werden unterschiedliche Wirkstoffe eingesetzt. Man unterscheidet bronchialerweiternde Wirkstoffe, antiallergisch wirkende und die bronchiale Überempfindlichkeit dämpfende Wirkstoffe und entzündungshemmende Wirkstoffe. Außerdem kann man die Medikamente in Dauermedikamente zur Langzeitkontrolle und in Bedarfs- bzw. Notfallmedikamente unterteilen.

Grundsätzlich können Asthmamedikamente inhalativ, oral oder parenteral verabreicht werden. Die meisten der in der Asthma-therapie eingesetzten Wirkstoffe sind jedoch sogenannte Inhalativa. Dabei handelt es sich um gasförmige Wirkstoffe, die eingeatmet werden und so gezielt in der Lunge wirken können. Häufig verwenden Patienten mehrere Medikamente gleichzeitig. Außer in leichten Fällen bilden inhalative Glukokortikosteroide die Basis der Dauermedikation. Glukokortikosteroide dämpfen die Entzündungsbereitschaft der Atemwege und wirken somit der Ursache der Asthma-Erkrankung entgegen. Die Wirkung stellt sich jedoch nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit ein. Bei akuten Asthmabeschwerden werden in der Regel als Notfallmedikation sogenannte rasch wirksame, inhalative Beta-2-Sympathomimetika gegeben. Diese Substanzen entspannen die Bronchialmuskulatur und erweitern damit die Atemwege.

In der Tabelle 3.4.1 ist die Entwicklung der **Medikation** der Patienten ausgewiesen. Sie gibt die Anzahl der Patienten wieder, die Glukokortikoide, Beta-2-Sympathomimetika oder andere asthmaspezifische Medikamente erhalten. Für jede Kohorte wird dazu zunächst unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für jede Medikationsart ausgewiesen, bei wie vielen Patienten diese spezifische Medikation erfolgte und welchem Anteil an den für diese spezifische Medikationsart „auswertbaren“ Patienten dies entspricht.³ Die solchermaßen gebildeten Kategorien sind nicht erschöpfend. Zudem sind Mehrfachzuordnungen der Patienten möglich.

Zu beachten ist, dass es durch die im Zuge der Umstellung auf eDMP zum 01.07.2008 eingeführten neuen Satzartbeschreibungen zu einer veränderten Dokumentation der Medikation mit systemischen Glukokortikosteroiden kommt. Ab diesem Zeitpunkt wird die Gabe von systemischen Glukokortikosteroiden über den Variablenblock „sonstige asthmaspezifische Medikation“ abgefragt. Dabei ist keine Differenzierung mehr möglich, ob es sich um eine Bedarfs- oder Dauermedikation handelt. Zudem ist keine explizite Dokumentation der Gabe von systemischen Glukokortikosteroiden mehr möglich. Es existiert nur die Dokumentationsmöglichkeit „keine sonstige asthmaspezifische Medikation“.

³ In den Berichten zum März 2010 wurden die Gruppe der für die Medikation auswertbaren Patienten über eine Angabe im gesamten Medikationsblock definiert. Im aktuell vorliegenden Bericht wird die Gruppe der auswertbaren Patienten für jede spezifische Medikationsart separat gebildet. Berücksichtigt werden hier Patienten mit mindestens einer Angabe (Dauermedikation, bei Bedarf, keine oder Kontraindikation) zur jeweils betrachteten Medikationsart. Daher sind die aktuell ausgewiesenen Ergebnisse nur bedingt mit den Berichtsergebnissen aus März 2010 vergleichbar.

Tabelle 3.4.1 Patienten und ihre Medikation

* Aufgrund einer geänderten Dokumentation zum 01.07.2008 sind die Werte ab dem Berichtshalbjahr 2008-2 nicht mehr mit den Werten der vorangegangenen Berichtshalbjahre vergleichbar, siehe Begleittext.

** Der Parameter „Kontraindikation“ wird erst seit 01.07.2008 (2008-2) dokumentiert. Die Tabelle enthält daher in den Berichtshalbjahren bis 2008-1 keine Werte zu diesem Parameter.

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	26	33	35	29	35	40	32	26	23	25	33	33	28	22
		Anteil in %	2,93	4,04	4,68	4,23	5,52	6,68	5,73	5,01	4,67	5,47	7,60	8,09	7,33	6,11
		CI Anteil in %	[1,82; 4,05]	[2,69; 5,40]	[3,16; 6,19]	[2,72; 5,73]	[3,74; 7,30]	[4,68; 8,68]	[3,80; 7,67]	[3,13; 6,89]	[2,80; 6,53]	[3,38; 7,56]	[5,11; 10,10]	[5,44; 10,74]	[4,71; 9,95]	[3,63; 8,59]
	auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	492	456	433	407	381	360
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	550	500	453	418	365	349	320	298	277	254	233	221	215	
		Anteil in %	62,08	61,27	60,56	60,93	57,57	58,26	57,35	57,42	61,59	60,75	58,66	57,25	58,01	59,72
		CI Anteil in %	[58,88; 65,27]	[57,93; 64,62]	[57,06; 64,07]	[57,28; 64,59]	[53,72; 61,42]	[54,31; 62,22]	[53,24; 61,45]	[53,16; 61,68]	[57,28; 65,89]	[56,26; 65,23]	[54,02; 63,30]	[52,44; 62,06]	[53,04; 62,97]	[54,65; 64,80]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	276	268	254	237	237	196	186	167	138	133	125	131	110	101
		Anteil in %	31,15	32,84	33,96	34,55	37,38	32,72	33,33	32,18	28,05	29,17	28,87	32,19	28,87	28,06
		CI Anteil in %	[28,10; 34,20]	[29,62; 36,07]	[30,56; 37,35]	[30,99; 38,11]	[33,61; 41,15]	[28,96; 36,48]	[29,42; 37,25]	[28,15; 36,20]	[24,08; 32,02]	[24,99; 33,34]	[24,60; 33,14]	[27,64; 36,73]	[24,32; 33,43]	[23,41; 32,70]
	auswertbar	Anzahl						599	558	519	493	457	434	408	382	360
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl						0	0	0	1	1	1	1	1	1
		Anteil in %						0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28
		CI Anteil in %						[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,60]	[0,00; 0,65]	[0,00; 0,68]	[0,00; 0,73]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,82]
	auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	434	373	348	332	303	295	271	254	250	228	213	205	192	185
		Anteil in %	48,98	45,71	46,52	48,40	47,79	49,25	48,57	48,94	50,71	49,89	49,08	50,25	50,26	51,39
		CI Anteil in %	[45,69; 52,28]	[42,29; 49,13]	[42,95; 50,10]	[44,65; 52,14]	[43,90; 51,68]	[45,24; 53,26]	[44,42; 52,72]	[44,64; 53,25]	[46,29; 55,13]	[45,30; 54,48]	[44,37; 53,79]	[45,39; 55,10]	[45,24; 55,28]	[46,22; 56,56]
	auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	492	456	433	407	381	360
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	80	55	62	62	61	54	49	43	31	25	22	29	27	24
		Anteil in %	9,03	6,74	8,29	9,04	9,62	9,02	8,78	8,29	6,30	5,48	5,08	7,13	7,09	6,67
		CI Anteil in %	[7,14; 10,92]	[5,02; 8,46]	[6,31; 10,27]	[6,89; 11,19]	[7,32; 11,92]	[6,72; 11,31]	[6,43; 11,13]	[5,91; 10,66]	[4,15; 8,45]	[3,39; 7,57]	[3,01; 7,15]	[4,62; 9,63]	[4,51; 9,67]	[4,09; 9,25]
	auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	569	517	480	442	401	366	357	332	308	291	266	252	234	228
		Anteil in %	64,22	63,36	64,17	64,43	63,25	61,10	63,98	63,97	62,47	63,68	61,29	61,76	61,26	63,33
		CI Anteil in %	[61,06; 67,38]	[60,05; 66,67]	[60,73; 67,61]	[60,85; 68,02]	[59,49; 67,01]	[57,19; 65,01]	[59,99; 67,97]	[59,83; 68,10]	[58,20; 66,75]	[59,26; 68,09]	[56,70; 65,88]	[57,04; 66,49]	[56,36; 66,15]	[58,35; 68,32]
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	119	112	97	93	89	63	56	56	56	45	42	35	34	29
		Anteil in %	13,43	13,73	12,97	13,56	14,04	10,52	10,04	10,79	11,36	9,85	9,68	8,58	8,90	8,06
	CI Anteil in %	[11,18; 15,68]	[11,36; 16,09]	[10,56; 15,38]	[10,99; 16,12]	[11,33; 16,74]	[8,06; 12,98]	[7,54; 12,53]	[8,12; 13,46]	[8,56; 14,16]	[7,11; 12,58]	[6,89; 12,46]	[5,86; 11,30]	[6,04; 11,76]	[5,24; 10,87]	
auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360	
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	138	135	114	111	93	46	45	40	41	34	32	28	28	23	
	Anteil in %	15,58	16,54	15,24	16,18	14,67	7,68	8,06	7,71	8,32	7,44	7,37	6,86	7,33	6,39	
	CI Anteil in %	[13,19; 17,96]	[13,99; 19,10]	[12,66; 17,82]	[13,42; 18,94]	[11,91; 17,42]	[5,55; 9,81]	[5,80; 10,33]	[5,41; 10,00]	[5,88; 10,76]	[5,03; 9,85]	[4,91; 9,83]	[4,41; 9,32]	[4,71; 9,95]	[3,86; 8,92]	
auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360	
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	250	210	191	157	151	87	90	92	88	84	70	69	63	53	
	Anteil in %	28,22	25,74	25,53	22,89	23,82	14,52	16,13	17,73	17,85	18,38	16,13	16,91	16,49	14,72	
	CI Anteil in %	[25,25; 31,18]	[22,73; 28,74]	[22,41; 28,66]	[19,74; 26,03]	[20,50; 27,14]	[11,70; 17,35]	[13,07; 19,18]	[14,44; 21,02]	[14,47; 21,23]	[14,83; 21,94]	[12,66; 19,59]	[13,27; 20,55]	[12,77; 20,22]	[11,06; 18,39]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	42	54	50	46	43	41	49	47	45	39	34	33	35	39
		Anteil in %	3,32	4,58	4,54	4,48	4,33	4,35	5,37	5,47	5,46	5,01	4,63	4,66	5,08	5,90
		CI Anteil in %	[2,33; 4,31]	[3,39; 5,77]	[3,31; 5,77]	[3,21; 5,74]	[3,07; 5,60]	[3,05; 5,65]	[3,90; 6,83]	[3,95; 6,99]	[3,91; 7,01]	[3,47; 6,54]	[3,11; 6,15]	[3,11; 6,21]	[3,44; 6,72]	[4,10; 7,70]
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	942	912	860	824	779	734	708	689	661
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	837	778	725	663	649	579	582	546	539	509	489	472	439	423
		Anteil in %	66,17	65,99	65,79	64,56	65,42	61,46	63,82	63,49	65,41	65,34	66,62	66,67	63,72	63,99
		CI Anteil in %	[63,56; 68,77]	[63,28; 68,69]	[62,99; 68,59]	[61,63; 67,48]	[62,46; 68,38]	[58,36; 64,57]	[60,70; 66,94]	[60,27; 66,71]	[62,16; 68,66]	[62,00; 68,68]	[63,21; 70,04]	[63,19; 70,14]	[60,12; 67,31]	[60,33; 67,66]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	359	343	325	311	292	287	268	256	225	197	170	170	177	172
		Anteil in %	28,38	29,09	29,49	30,28	29,44	30,47	29,39	29,77	27,31	25,29	23,16	24,01	25,69	26,02
		CI Anteil in %	[25,89; 30,86]	[26,50; 31,69]	[26,80; 32,19]	[27,47; 33,09]	[26,60; 32,27]	[27,53; 33,41]	[26,43; 32,34]	[26,71; 32,83]	[24,26; 30,35]	[22,23; 28,34]	[20,11; 26,21]	[20,86; 27,16]	[22,42; 28,95]	[22,67; 29,37]
	auswertbar	Anzahl						943	913	860	824	779	734	708	689	661
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl						1	1	0	1	1	1	3	4	4
		Anteil in %						0,11	0,11	0,00	0,12	0,13	0,14	0,42	0,58	0,61
		CI Anteil in %						[0,00; 0,31]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,90]	[0,01; 1,15]	[0,01; 1,20]
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	661	601	558	543	528	534	512	495	476	443	424	412	403	389
		Anteil in %	52,25	50,98	50,64	52,87	53,23	56,63	56,08	57,56	57,77	56,87	57,77	58,19	58,49	58,85
		CI Anteil in %	[49,50; 55,01]	[48,12; 53,83]	[47,68; 53,59]	[49,82; 55,93]	[50,12; 56,33]	[53,46; 59,79]	[52,86; 59,30]	[54,25; 60,86]	[54,39; 61,14]	[53,39; 60,35]	[54,19; 61,34]	[54,56; 61,83]	[54,81; 62,17]	[55,10; 62,60]
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	942	912	860	824	779	734	708	689	661
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	86	78	74	94	78	97	77	80	58	46	44	43	49	43
		Anteil in %	6,80	6,62	6,72	9,15	7,86	10,30	8,44	9,30	7,04	5,91	5,99	6,07	7,11	6,51
		CI Anteil in %	[5,41; 8,19]	[5,20; 8,04]	[5,24; 8,19]	[7,39; 10,92]	[6,19; 9,54]	[8,36; 12,24]	[6,64; 10,25]	[7,36; 11,24]	[5,29; 8,79]	[4,25; 7,56]	[4,28; 7,71]	[4,31; 7,83]	[5,19; 9,03]	[4,62; 8,39]
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	767	706	681	630	615	568	549	506	483	472	431	417	405	390
		Anteil in %	60,63	59,88	61,80	61,34	62,00	60,23	60,13	58,84	58,62	60,59	58,72	58,90	58,78	59,00
		CI Anteil in %	[57,94; 63,33]	[57,08; 62,68]	[58,93; 64,67]	[58,36; 64,32]	[58,97; 65,02]	[57,11; 63,36]	[56,95; 63,31]	[55,55; 62,13]	[55,25; 61,98]	[57,16; 64,02]	[55,16; 62,28]	[55,27; 62,53]	[55,10; 62,46]	[55,25; 62,75]
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	183	172	146	141	132	111	104	104	96	89	79	76	75	69
		Anteil in %	14,47	14,59	13,25	13,73	13,31	11,77	11,39	12,09	11,65	11,42	10,76	10,73	10,89	10,44
		CI Anteil in %	[12,53; 16,41]	[12,57; 16,60]	[11,25; 15,25]	[11,62; 15,84]	[11,19; 15,42]	[9,71; 13,83]	[9,33; 13,45]	[9,91; 14,27]	[9,46; 13,84]	[9,19; 13,66]	[8,52; 13,01]	[8,45; 13,02]	[8,56; 13,21]	[8,11; 12,77]
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	227	203	194	164	159	94	86	83	81	68	71	72	68	69
		Anteil in %	17,94	17,22	17,60	15,97	16,03	9,97	9,42	9,65	9,83	8,73	9,67	10,17	9,87	10,44
		CI Anteil in %	[15,83; 20,06]	[15,06; 19,37]	[15,35; 19,85]	[13,73; 18,21]	[13,74; 18,31]	[8,06; 11,88]	[7,52; 11,32]	[7,68; 11,63]	[7,80; 11,86]	[6,75; 10,71]	[7,53; 11,81]	[7,94; 12,40]	[7,64; 12,10]	[8,11; 12,77]
	auswertbar	Anzahl	1265	1179	1102	1027	992	943	913	860	824	779	734	708	689	661
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	330	297	261	230	215	141	147	133	138	133	127	123	116	113
		Anteil in %	26,09	25,19	23,68	22,40	21,67	14,95	16,10	15,47	16,75	17,07	17,30	17,37	16,84	17,10
		CI Anteil in %	[23,67; 28,51]	[22,71; 27,67]	[21,17; 26,20]	[19,84; 24,95]	[19,11; 24,24]	[12,68; 17,23]	[13,72; 18,49]	[13,05; 17,88]	[14,20; 19,30]	[14,43; 19,72]	[14,56; 20,04]	[14,58; 20,17]	[14,04; 19,63]	[14,22; 19,97]

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124
	auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	137	274	219	207	202	192	179	171	153	152	148	131	132
		Anteil in %	1,91	4,25	3,75	3,85	4,07	4,07	4,06	4,13	3,98	4,21	4,36	4,09	4,40
		CI Anteil in %	[1,59; 2,22]	[3,75; 4,74]	[3,26; 4,23]	[3,34; 4,37]	[3,52; 4,62]	[3,50; 4,63]	[3,47; 4,64]	[3,53; 4,74]	[3,36; 4,60]	[3,56; 4,87]	[3,67; 5,04]	[3,40; 4,78]	[3,67; 5,14]
	auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4963	4720	4412	4136	3843	3609	3395	3201	2995
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	4815	4280	3901	3596	3025	2897	2721	2595	2401	2274	2141	2012	1873
		Anteil in %	66,99	66,34	66,75	66,94	60,95	61,38	61,67	62,74	62,48	63,01	63,06	62,86	62,54
		CI Anteil in %	[65,90; 68,07]	[65,18; 67,49]	[65,54; 67,96]	[65,68; 68,20]	[59,59; 62,31]	[59,99; 62,77]	[60,24; 63,11]	[61,27; 64,22]	[60,95; 64,01]	[61,43; 64,58]	[61,44; 64,69]	[61,18; 64,53]	[60,80; 64,27]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1824	1719	1548	1435	1426	1358	1226	1124	1056	961	885	837	784
		Anteil in %	25,38	26,64	26,49	26,71	28,73	28,77	27,79	27,18	27,48	26,63	26,07	26,15	26,18
		CI Anteil in %	[24,37; 26,38]	[25,56; 27,72]	[25,36; 27,62]	[25,53; 27,90]	[27,47; 29,99]	[27,48; 30,06]	[26,47; 29,11]	[25,82; 28,53]	[26,07; 28,89]	[25,19; 28,07]	[24,59; 27,54]	[24,63; 27,67]	[24,60; 27,75]
	auswertbar	Anzahl					4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl					4	1	2	2	4	2	4	5	8
		Anteil in %					0,08	0,02	0,05	0,05	0,10	0,06	0,12	0,16	0,27
		CI Anteil in %					[0,00; 0,16]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,23]	[0,02; 0,29]	[0,08; 0,45]
	auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4958	4718	4410	4134	3839	3605	3394	3200	2994
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	3528	3137	2883	2715	2565	2492	2329	2215	2073	1958	1869	1781	1703
		Anteil in %	49,08	48,62	49,33	50,54	51,73	52,82	52,81	53,58	54,00	54,31	55,07	55,66	56,88
		CI Anteil in %	[47,93; 50,24]	[47,40; 49,84]	[48,05; 50,61]	[49,20; 51,88]	[50,34; 53,13]	[51,39; 54,24]	[51,34; 54,29]	[52,06; 55,10]	[52,42; 55,58]	[52,69; 55,94]	[53,39; 56,74]	[53,93; 57,38]	[55,11; 58,65]
	auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4958	4718	4410	4133	3839	3605	3392	3199	2992
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	375	310	285	285	325	327	292	258	230	216	201	194	186
		Anteil in %	5,22	4,80	4,88	5,31	6,56	6,93	6,62	6,24	5,99	5,99	5,93	6,06	6,22
		CI Anteil in %	[4,70; 5,73]	[4,28; 5,33]	[4,32; 5,43]	[4,71; 5,90]	[5,87; 7,24]	[6,21; 7,66]	[5,89; 7,36]	[5,50; 6,98]	[5,24; 6,74]	[5,22; 6,77]	[5,13; 6,72]	[5,24; 6,89]	[5,35; 7,08]
	auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4962	4718	4409	4133	3839	3605	3393	3197	2993
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	4907	4210	3863	3565	3193	3053	2840	2674	2457	2299	2170	2060	1918
		Anteil in %	68,27	65,25	66,10	66,36	64,35	64,71	64,41	64,70	64,00	63,77	63,96	64,44	64,08
		CI Anteil in %	[67,19; 69,34]	[64,09; 66,41]	[64,89; 67,32]	[65,10; 67,63]	[63,02; 65,68]	[63,35; 66,07]	[63,00; 65,83]	[63,24; 66,16]	[62,48; 65,52]	[62,20; 65,34]	[62,34; 65,57]	[62,78; 66,10]	[62,36; 65,80]
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	878	814	735	648	527	505	495	463	429	393	364	344	315
		Anteil in %	12,21	12,62	12,58	12,06	10,62	10,70	11,23	11,20	11,17	10,90	10,73	10,76	10,52
	CI Anteil in %	[11,46; 12,97]	[11,81; 13,43]	[11,73; 13,43]	[11,19; 12,93]	[9,76; 11,48]	[9,82; 11,59]	[10,30; 12,16]	[10,24; 12,16]	[10,18; 12,17]	[9,88; 11,92]	[9,69; 11,77]	[9,69; 11,83]	[9,42; 11,62]	
auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997	
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1108	918	855	785	412	367	339	335	295	290	281	270	263	
	Anteil in %	15,41	14,23	14,63	14,61	8,30	7,78	7,68	8,10	7,68	8,04	8,27	8,43	8,78	
	CI Anteil in %	[14,58; 16,25]	[13,38; 15,08]	[13,72; 15,54]	[13,67; 15,56]	[7,53; 9,07]	[7,01; 8,54]	[6,90; 8,47]	[7,27; 8,93]	[6,83; 8,52]	[7,15; 8,92]	[7,35; 9,20]	[7,47; 9,39]	[7,76; 9,79]	
auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997	
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1677	1411	1234	1089	751	746	703	692	673	624	588	566	538	
	Anteil in %	23,33	21,87	21,12	20,27	15,13	15,81	15,93	16,73	17,51	17,29	17,31	17,68	17,95	
	CI Anteil in %	[22,35; 24,31]	[20,86; 22,88]	[20,07; 22,16]	[19,20; 21,35]	[14,13; 16,12]	[14,76; 16,85]	[14,85; 17,01]	[15,59; 17,86]	[16,31; 18,71]	[16,06; 18,52]	[16,04; 18,58]	[16,35; 19,00]	[16,58; 19,33]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7403	7115	6764	6398	6002	5711	5406	5160	4909
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	180	358	319	276	241	249	227	201	189	178	171	164	164
		Anteil in %	1,75	3,85	3,75	3,49	3,26	3,50	3,36	3,14	3,15	3,12	3,16	3,18	3,34
		CI Anteil in %	[1,49; 2,00]	[3,46; 4,24]	[3,35; 4,16]	[3,09; 3,90]	[2,85; 3,66]	[3,07; 3,93]	[2,93; 3,79]	[2,71; 3,57]	[2,71; 3,59]	[2,67; 3,57]	[2,70; 3,63]	[2,70; 3,66]	[2,84; 3,84]
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7398	7109	6758	6392	5996	5705	5404	5156	4906
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	7215	6417	5905	5515	4917	4738	4548	4350	4092	3931	3738	3588	3416
		Anteil in %	70,06	69,03	69,45	69,76	66,46	66,65	67,30	68,05	68,25	68,90	69,17	69,59	69,63
		CI Anteil in %	[69,17; 70,94]	[68,09; 69,97]	[68,48; 70,43]	[68,74; 70,77]	[65,39; 67,54]	[65,55; 67,74]	[66,18; 68,42]	[66,91; 69,20]	[67,07; 69,42]	[67,70; 70,11]	[67,94; 70,40]	[68,33; 70,84]	[68,34; 70,92]
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2349	2246	2009	1867	1746	1675	1581	1453	1340	1227	1147	1069	1023
		Anteil in %	22,81	24,16	23,63	23,61	23,60	23,56	23,39	22,73	22,35	21,51	21,23	20,73	20,85
		CI Anteil in %	[22,00; 23,62]	[23,29; 25,03]	[22,73; 24,53]	[22,68; 24,55]	[22,63; 24,57]	[22,58; 24,55]	[22,39; 24,40]	[21,70; 23,76]	[21,29; 23,40]	[20,44; 22,57]	[20,13; 22,32]	[19,63; 21,84]	[19,72; 21,99]
	auswertbar	Anzahl					7404	7115	6765	6398	6002	5711	5408	5161	4909
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl					8	9	10	13	13	11	15	10	11
		Anteil in %					0,11	0,13	0,15	0,20	0,22	0,19	0,28	0,19	0,22
		CI Anteil in %					[0,03; 0,18]	[0,04; 0,21]	[0,06; 0,24]	[0,09; 0,31]	[0,10; 0,33]	[0,08; 0,31]	[0,14; 0,42]	[0,07; 0,31]	[0,09; 0,36]
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7395	7105	6757	6389	5994	5705	5405	5159	4905
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	5358	4897	4607	4379	4166	4039	3882	3691	3458	3344	3219	3069	2934
		Anteil in %	52,02	52,68	54,19	55,39	56,34	56,85	57,45	57,77	57,69	58,62	59,56	59,49	59,82
		CI Anteil in %	[51,06; 52,99]	[51,66; 53,69]	[53,13; 55,25]	[54,29; 56,48]	[55,20; 57,47]	[55,70; 58,00]	[56,27; 58,63]	[56,56; 58,98]	[56,44; 58,94]	[57,34; 59,89]	[58,25; 60,86]	[58,15; 60,83]	[58,44; 61,19]
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7392	7102	6753	6386	5991	5702	5403	5155	4903
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	521	490	443	431	448	399	391	348	304	298	289	251	256
		Anteil in %	5,06	5,27	5,21	5,45	6,06	5,62	5,79	5,45	5,07	5,23	5,35	4,87	5,22
		CI Anteil in %	[4,64; 5,48]	[4,82; 5,73]	[4,74; 5,68]	[4,95; 5,95]	[5,52; 6,60]	[5,08; 6,15]	[5,23; 6,35]	[4,89; 6,01]	[4,52; 5,63]	[4,65; 5,80]	[4,75; 5,95]	[4,28; 5,46]	[4,60; 5,84]
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7399	7108	6757	6389	5990	5701	5399	5155	4905
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	6862	5950	5468	5184	4673	4515	4328	4128	3883	3700	3519	3375	3174
		Anteil in %	66,63	64,01	64,31	65,57	63,16	63,52	64,05	64,61	64,82	64,90	65,18	65,47	64,71
		CI Anteil in %	[65,72; 67,54]	[63,03; 64,98]	[63,30; 65,33]	[64,52; 66,62]	[62,06; 64,26]	[62,40; 64,64]	[62,91; 65,20]	[63,44; 65,78]	[63,62; 66,03]	[63,66; 66,14]	[63,91; 66,45]	[64,17; 66,77]	[63,37; 66,05]
	auswertbar	Anzahl	1283	1202	1041	957	861	805	752	693	639	608	562	532	529
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1283	1202	1041	957	861	805	752	693	639	608	562	532	529
		Anteil in %	12,46	12,93	12,24	12,10	11,64	11,33	11,13	10,85	10,67	10,66	10,41	10,32	10,78
		CI Anteil in %	[11,82; 13,10]	[12,25; 13,61]	[11,55; 12,94]	[11,39; 12,82]	[10,91; 12,37]	[10,59; 12,06]	[10,38; 11,88]	[10,08; 11,61]	[9,89; 11,45]	[9,86; 11,47]	[9,59; 11,22]	[9,49; 11,15]	[9,92; 11,65]
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7404	7115	6765	6398	6002	5711	5408	5161	4909
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1642	1404	1284	1210	683	662	638	615	508	497	447	430	415
		Anteil in %	15,94	15,10	15,10	15,30	9,22	9,30	9,43	9,61	8,46	8,70	8,27	8,33	8,45
		CI Anteil in %	[15,24; 16,65]	[14,38; 15,83]	[14,34; 15,86]	[14,51; 16,10]	[8,57; 9,88]	[8,63; 9,98]	[8,73; 10,13]	[8,89; 10,33]	[7,76; 9,17]	[7,97; 9,43]	[7,53; 9,00]	[7,58; 9,09]	[7,68; 9,23]
	auswertbar	Anzahl	10299	9296	8502	7906	7404	7115	6765	6398	6002	5711	5408	5161	4909
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2365	2059	1825	1701	1190	1189	1135	1097	1035	1002	934	924	894
		Anteil in %	22,96	22,15	21,47	21,52	16,07	16,71	16,78	17,15	17,24	17,55	17,27	17,90	18,21
		CI Anteil in %	[22,15; 23,78]	[21,31; 22,99]	[20,59; 22,34]	[20,61; 22,42]	[15,24; 16,91]	[15,84; 17,58]	[15,89; 17,67]	[16,22; 18,07]	[16,29; 18,20]	[16,56; 18,53]	[16,26; 18,28]	[16,86; 18,95]	[17,13; 19,29]

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136	
	auswertbar	Anzahl	14600	12640	11262	10149	9568	8926	8213	7662	7146	6697	6327	5871	
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	196	465	386	332	298	292	264	238	233	208	186	179	
		Anteil in %	1,34	3,68	3,43	3,27	3,11	3,27	3,21	3,11	3,26	3,11	2,94	3,05	
		CI Anteil in %	[1,16; 1,53]	[3,35; 4,01]	[3,09; 3,76]	[2,93; 3,62]	[2,77; 3,46]	[2,90; 3,64]	[2,83; 3,60]	[2,72; 3,49]	[2,85; 3,67]	[2,69; 3,52]	[2,52; 3,36]	[2,61; 3,49]	
	auswertbar	Anzahl	14599	12640	11262	10143	9564	8925	8212	7658	7142	6694	6324	5867	
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	10275	8789	7828	6740	6372	6001	5538	5192	4891	4577	4337	3994	
		Anteil in %	70,38	69,53	69,51	66,45	66,62	67,24	67,44	67,80	68,48	68,37	68,58	68,08	
		CI Anteil in %	[69,64; 71,12]	[68,73; 70,34]	[68,66; 70,36]	[65,53; 67,37]	[65,68; 67,57]	[66,26; 68,21]	[66,42; 68,45]	[66,75; 68,84]	[67,40; 69,56]	[67,26; 69,49]	[67,44; 69,72]	[66,88; 69,27]	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	3314	3108	2767	2525	2347	2135	1945	1781	1626	1537	1435	1346	
		Anteil in %	22,70	24,59	24,57	24,89	24,54	23,92	23,68	23,26	22,77	22,96	22,69	22,94	
		CI Anteil in %	[22,02; 23,38]	[23,84; 25,34]	[23,77; 25,36]	[24,05; 25,74]	[23,68; 25,40]	[23,04; 24,81]	[22,77; 24,60]	[22,31; 24,20]	[21,79; 23,74]	[21,95; 23,97]	[21,66; 23,72]	[21,87; 24,02]	
	auswertbar	Anzahl				10149	9569	8928	8216	7663	7147	6698	6329	5872	
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl				7	8	6	6	6	8	7	10	11	
		Anteil in %				0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,11	0,10	0,16	0,19	
		CI Anteil in %				[0,02; 0,12]	[0,03; 0,14]	[0,01; 0,12]	[0,01; 0,13]	[0,02; 0,14]	[0,03; 0,19]	[0,03; 0,18]	[0,06; 0,26]	[0,08; 0,30]	
	auswertbar	Anzahl	14599	12640	11262	10135	9559	8920	8207	7657	7137	6692	6322	5866	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	7483	6420	5866	5367	5156	4905	4598	4301	4069	3829	3661	3400	
		Anteil in %	51,26	50,79	52,09	52,96	53,94	54,99	56,03	56,17	57,01	57,22	57,91	57,96	
		CI Anteil in %	[50,45; 52,07]	[49,92; 51,66]	[51,16; 53,01]	[51,98; 53,93]	[52,94; 54,94]	[53,96; 56,02]	[54,95; 57,10]	[55,06; 57,28]	[55,86; 58,16]	[56,03; 58,40]	[56,69; 59,13]	[56,70; 59,22]	
	auswertbar	Anzahl	14599	12640	11262	10132	9556	8919	8204	7654	7133	6688	6317	5861	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	725	578	526	529	499	448	429	386	350	319	319	292	
		Anteil in %	4,97	4,57	4,67	5,22	5,22	5,02	5,23	5,04	4,91	4,77	5,05	4,98	
		CI Anteil in %	[4,61; 5,32]	[4,21; 4,94]	[4,28; 5,06]	[4,79; 5,65]	[4,78; 5,67]	[4,57; 5,48]	[4,75; 5,71]	[4,55; 5,53]	[4,41; 5,41]	[4,26; 5,28]	[4,51; 5,59]	[4,43; 5,54]	
	auswertbar	Anzahl	14600	12640	11262	10139	9560	8920	8206	7655	7140	6692	6324	5868	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	10228	8702	7894	6943	6612	6185	5713	5358	4980	4721	4437	4110	
		Anteil in %	70,05	68,84	70,09	68,48	69,16	69,34	69,62	69,99	69,75	70,55	70,16	70,04	
		CI Anteil in %	[69,31; 70,80]	[68,04; 69,65]	[69,25; 70,94]	[67,57; 69,38]	[68,24; 70,09]	[68,38; 70,30]	[68,62; 70,61]	[68,97; 71,02]	[68,68; 70,81]	[69,45; 71,64]	[69,03; 71,29]	[68,87; 71,21]	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1466	1274	1077	832	783	767	692	628	621	552	536	501	
		Anteil in %	10,04	10,08	9,56	8,21	8,19	8,60	8,43	8,20	8,70	8,25	8,48	8,54	
	CI Anteil in %	[9,55; 10,53]	[9,55; 10,60]	[9,02; 10,11]	[7,67; 8,74]	[7,64; 8,74]	[8,02; 9,18]	[7,83; 9,03]	[7,59; 8,82]	[8,04; 9,35]	[7,59; 8,91]	[7,79; 9,16]	[7,82; 9,25]		
auswertbar	Anzahl	14599	12640	11262	10149	9569	8928	8216	7663	7147	6698	6329	5872		
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	2179	1706	1569	778	711	674	633	586	555	524	502	482		
	Anteil in %	14,93	13,50	13,93	7,67	7,43	7,55	7,70	7,65	7,77	7,82	7,93	8,21		
	CI Anteil in %	[14,35; 15,50]	[12,90; 14,09]	[13,29; 14,57]	[7,15; 8,18]	[6,90; 7,96]	[7,00; 8,10]	[7,13; 8,28]	[7,05; 8,24]	[7,14; 8,39]	[7,18; 8,47]	[7,27; 8,60]	[7,51; 8,91]		
auswertbar	Anzahl	14599	12640	11262	10149	9569	8928	8216	7663	7147	6698	6329	5872		
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	3256	2711	2394	1693	1671	1530	1465	1349	1298	1260	1195	1102		
	Anteil in %	22,30	21,45	21,26	16,68	17,46	17,14	17,83	17,60	18,16	18,81	18,88	18,77		
	CI Anteil in %	[21,63; 22,98]	[20,73; 22,16]	[20,50; 22,01]	[15,96; 17,41]	[16,70; 18,22]	[16,36; 17,92]	[17,00; 18,66]	[16,75; 18,46]	[17,27; 19,06]	[17,88; 19,75]	[17,92; 19,85]	[17,77; 19,77]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538	
	auswertbar	Anzahl	21994	19406	17594	16019	15251	14300	13348	12574	11921	11313	10727	10109	
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	312	599	497	422	415	369	337	327	305	280	270	280	
		Anteil in %	1,42	3,09	2,82	2,63	2,72	2,58	2,52	2,60	2,56	2,48	2,52	2,77	
		CI Anteil in %	[1,26; 1,57]	[2,84; 3,33]	[2,58; 3,07]	[2,39; 2,88]	[2,46; 2,98]	[2,32; 2,84]	[2,26; 2,79]	[2,32; 2,88]	[2,28; 2,84]	[2,19; 2,76]	[2,22; 2,81]	[2,45; 3,09]	
	auswertbar	Anzahl	21994	19406	17594	16011	15247	14292	13344	12568	11914	11304	10719	10103	
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	16034	14098	12888	11212	10748	10223	9611	9086	8644	8195	7784	7286	
		Anteil in %	72,90	72,65	73,25	70,03	70,49	71,53	72,02	72,29	72,55	72,50	72,62	72,12	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4532	4232	3710	3471	3252	2949	2690	2508	2318	2230	2089	1998	
		Anteil in %	20,61	21,81	21,09	21,68	21,33	20,63	20,16	19,96	19,46	19,73	19,49	19,78	
	auswertbar	CI Anteil in %	[20,07; 21,14]	[21,23; 22,39]	[20,48; 21,69]	[21,04; 22,32]	[20,68; 21,98]	[19,97; 21,30]	[19,48; 20,84]	[19,26; 20,65]	[18,75; 20,17]	[18,99; 20,46]	[18,74; 20,24]	[19,00; 20,55]	
		Anzahl				16019	15252	14301	13350	12575	11922	11313	10727	10109	
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl				12	8	16	14	15	16	19	21	23	
		Anteil in %				0,07	0,05	0,11	0,10	0,12	0,13	0,17	0,20	0,23	
		CI Anteil in %				[0,03; 0,12]	[0,02; 0,09]	[0,06; 0,17]	[0,05; 0,16]	[0,06; 0,18]	[0,07; 0,20]	[0,09; 0,24]	[0,11; 0,28]	[0,13; 0,32]	
	auswertbar	Anzahl	21994	19406	17594	15992	15233	14284	13332	12562	11910	11300	10715	10097	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	11840	10512	9789	9131	8864	8372	7902	7502	7214	6840	6549	6187	
		Anteil in %	53,83	54,17	55,64	57,10	58,19	58,61	59,27	59,72	60,57	60,53	61,12	61,28	
		CI Anteil in %	[53,17; 54,49]	[53,47; 54,87]	[54,90; 56,37]	[56,33; 57,86]	[57,41; 58,97]	[57,80; 59,42]	[58,44; 60,10]	[58,86; 60,58]	[59,69; 61,45]	[59,63; 61,43]	[60,20; 62,04]	[60,33; 62,23]	
	auswertbar	Anzahl	21994	19406	17594	15987	15229	14278	13328	12557	11905	11293	10710	10093	
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1077	881	816	902	851	757	700	610	580	542	519	509	
		Anteil in %	4,90	4,54	4,64	5,64	5,59	5,30	5,25	4,86	4,87	4,80	4,85	5,04	
		CI Anteil in %	[4,61; 5,18]	[4,25; 4,83]	[4,33; 4,95]	[5,28; 6,00]	[5,22; 5,95]	[4,93; 5,67]	[4,87; 5,63]	[4,48; 5,23]	[4,49; 5,26]	[4,41; 5,19]	[4,44; 5,25]	[4,62; 5,47]	
	auswertbar	Anzahl	21993	19406	17594	16010	15242	14290	13339	12564	11911	11301	10714	10095	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	15068	13060	12069	10865	10447	9840	9170	8703	8246	7879	7466	7029	
		Anteil in %	68,51	67,30	68,60	67,86	68,54	68,86	68,75	69,27	69,23	69,72	69,68	69,63	
		CI Anteil in %	[67,90; 69,13]	[66,64; 67,96]	[67,91; 69,28]	[67,14; 68,59]	[67,80; 69,28]	[68,10; 69,62]	[67,96; 69,53]	[68,46; 70,08]	[68,40; 70,06]	[68,87; 70,57]	[68,81; 70,55]	[68,73; 70,53]	
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2223	2000	1696	1346	1259	1213	1176	1065	1033	948	891	796	
		Anteil in %	10,11	10,31	9,64	8,41	8,26	8,49	8,82	8,48	8,67	8,39	8,32	7,89	
		CI Anteil in %	[9,71; 10,51]	[9,88; 10,73]	[9,20; 10,08]	[7,98; 8,84]	[7,82; 8,70]	[8,03; 8,95]	[8,34; 9,30]	[7,99; 8,96]	[8,17; 9,18]	[7,88; 8,90]	[7,79; 8,84]	[7,36; 8,41]	
	auswertbar	Anzahl	21993	19406	17594	16019	15252	14301	13350	12575	11922	11313	10727	10109	
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	3179	2599	2442	1199	1141	1034	1015	923	887	868	844	769	
		Anteil in %	14,45	13,39	13,88	7,48	7,48	7,23	7,60	7,34	7,44	7,67	7,87	7,61	
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	21993	19406	17594	16019	15252	14301	13350	12575	11922	11313	10727	10109	
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	4801	4023	3666	2666	2643	2451	2366	2293	2211	2126	2017	1925	
		Anteil in %	21,83	20,73	20,84	16,64	17,33	17,14	17,72	18,23	18,55	18,79	18,80	19,04	
		CI Anteil in %	[21,28; 22,38]	[20,16; 21,30]	[20,24; 21,44]	[16,07; 17,22]	[16,73; 17,93]	[16,52; 17,76]	[17,08; 18,37]	[17,56; 18,91]	[17,85; 19,24]	[18,07; 19,51]	[18,06; 19,54]	[18,28; 19,81]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054		
	auswertbar	Anzahl	19270	16467	14469	13362	12297	11259	10395	9622	8988	8290	7638		
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	356	829	483	441	391	368	326	298	285	239	214		
		Anteil in %	1,85	5,03	3,34	3,30	3,18	3,27	3,14	3,10	3,17	2,88	2,80		
		CI Anteil in %	[1,66; 2,04]	[4,70; 5,37]	[3,05; 3,63]	[3,00; 3,60]	[2,87; 3,49]	[2,94; 3,60]	[2,80; 3,47]	[2,75; 3,44]	[2,81; 3,53]	[2,52; 3,24]	[2,43; 3,17]		
	auswertbar	Anzahl	19270	16467	14473	13360	12296	11257	10394	9620	8986	8289	7635		
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	12816	10754	9114	8441	7878	7271	6732	6203	5764	5319	4919		
		Anteil in %	66,51	65,31	62,97	63,18	64,07	64,59	64,77	64,48	64,14	64,17	64,43		
		CI Anteil in %	[65,84; 67,17]	[64,58; 66,03]	[62,19; 63,76]	[62,36; 64,00]	[63,22; 64,92]	[63,71; 65,47]	[63,85; 65,69]	[63,52; 65,44]	[63,15; 65,14]	[63,14; 65,20]	[63,35; 65,50]		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4845	4526	3827	3499	3155	2893	2623	2434	2313	2092	1908		
		Anteil in %	25,14	27,49	26,44	26,19	25,66	25,70	25,24	25,30	25,74	25,24	24,99		
		CI Anteil in %	[24,53; 25,76]	[26,80; 28,17]	[25,72; 27,16]	[25,44; 26,94]	[24,89; 26,43]	[24,89; 26,51]	[24,40; 26,17]	[24,43; 26,17]	[24,84; 26,64]	[24,30; 26,17]	[24,02; 25,96]		
	auswertbar	Anzahl			14474	13364	12298	11259	10395	9622	8988	8290	7638		
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl			2	8	8	6	6	6	8	11	13		
		Anteil in %			0,01	0,06	0,07	0,05	0,06	0,06	0,09	0,13	0,17		
		CI Anteil in %			[0,00; 0,03]	[0,02; 0,10]	[0,02; 0,11]	[0,01; 0,10]	[0,01; 0,10]	[0,01; 0,11]	[0,03; 0,15]	[0,05; 0,21]	[0,08; 0,26]		
	auswertbar	Anzahl	19270	16467	14464	13354	12291	11256	10390	9619	8986	8287	7634		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	9205	7844	7221	6743	6367	5901	5548	5167	4878	4531	4215		
		Anteil in %	47,77	47,63	49,92	50,49	51,80	52,43	53,40	53,72	54,28	54,68	55,21		
		CI Anteil in %	[47,06; 48,47]	[46,87; 48,40]	[49,11; 50,74]	[49,65; 51,34]	[50,92; 52,69]	[51,50; 53,35]	[52,44; 54,36]	[52,72; 54,71]	[53,25; 55,31]	[53,60; 55,75]	[54,10; 56,33]		
	auswertbar	Anzahl	19270	16467	14463	13352	12289	11254	10389	9617	8984	8286	7631		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	933	772	760	723	652	553	520	492	483	439	416		
		Anteil in %	4,84	4,69	5,25	5,41	5,31	4,91	5,01	5,12	5,38	5,30	5,45		
		CI Anteil in %	[4,54; 5,14]	[4,37; 5,01]	[4,89; 5,62]	[5,03; 5,80]	[4,91; 5,70]	[4,51; 5,31]	[4,59; 5,42]	[4,68; 5,56]	[4,91; 5,84]	[4,82; 5,78]	[4,94; 5,96]		
	auswertbar	Anzahl	19270	16467	14466	13358	12295	11256	10392	9619	8984	8286	7634		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	13782	11280	9959	9275	8600	7925	7402	6851	6403	5941	5475		
		Anteil in %	71,52	68,50	68,84	69,43	69,95	70,41	71,23	71,22	71,27	71,70	71,72		
		CI Anteil in %	[70,88; 72,16]	[67,79; 69,21]	[68,09; 69,60]	[68,65; 70,22]	[69,14; 70,76]	[69,56; 71,25]	[70,36; 72,10]	[70,32; 72,13]	[70,34; 72,21]	[70,73; 72,67]	[70,71; 72,73]		
	auswertbar	Anzahl	1823	1590	1134	1076	971	911	828	751	710	641	578		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	9,46	9,66	7,84	8,06	7,90	8,09	7,97	7,81	7,90	7,74	7,57		
	Anteil in %														
	CI Anteil in %	[9,05; 9,87]	[9,20; 10,11]	[7,40; 8,28]	[7,59; 8,52]	[7,42; 8,37]	[7,59; 8,60]	[7,45; 8,49]	[7,27; 8,34]	[7,35; 8,46]	[7,16; 8,31]	[6,98; 8,16]			
auswertbar	Anzahl	19270	16467	14474	13364	12298	11259	10395	9622	8988	8290	7638			
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	2567	2040	904	797	732	691	652	618	553	531	512			
	Anteil in %	13,32	12,39	6,25	5,96	5,95	6,14	6,27	6,42	6,15	6,41	6,70			
	CI Anteil in %	[12,84; 13,80]	[11,89; 12,89]	[5,85; 6,64]	[5,56; 6,37]	[5,53; 6,37]	[5,69; 6,58]	[5,81; 6,74]	[5,93; 6,91]	[5,66; 6,65]	[5,88; 6,93]	[6,14; 7,26]			
auswertbar	Anzahl	19270	16467	14474	13364	12298	11259	10395	9622	8988	8290	7638			
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	3812	3061	2263	2150	1992	1863	1761	1647	1515	1394	1294			
	Anteil in %	19,78	18,59	15,63	16,09	16,20	16,55	16,94	17,12	16,86	16,82	16,94			
	CI Anteil in %	[19,22; 20,34]	[17,99; 19,18]	[15,04; 16,23]	[15,47; 16,71]	[15,55; 16,85]	[15,86; 17,23]	[16,22; 17,66]	[16,36; 17,87]	[16,08; 17,63]	[16,01; 17,62]	[16,10; 17,78]			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091		
	auswertbar	Anzahl	27267	23812	21329	20055	18573	17193	16062	15047	14185	13336	12538		
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	501	1016	634	613	536	498	440	441	398	373	346		
		Anteil in %	1,84	4,27	2,97	3,06	2,89	2,90	2,74	2,93	2,81	2,80	2,76		
		CI Anteil in %	[1,68; 2,00]	[4,01; 4,52]	[2,74; 3,20]	[2,82; 3,29]	[2,65; 3,13]	[2,65; 3,15]	[2,49; 2,99]	[2,66; 3,20]	[2,53; 3,08]	[2,52; 3,08]	[2,47; 3,05]		
	auswertbar	Anzahl	27266	23811	21321	20045	18569	17182	16054	15039	14175	13328	12529		
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	19112	16577	14494	13691	12738	11800	11030	10393	9850	9256	8739		
		Anteil in %	70,09	69,62	67,98	68,30	68,60	68,68	68,71	69,11	69,49	69,45	69,75		
		CI Anteil in %	[69,55; 70,64]	[69,03; 70,20]	[67,35; 68,61]	[67,66; 68,95]	[67,93; 69,27]	[67,98; 69,37]	[67,99; 69,42]	[68,37; 69,85]	[68,73; 70,25]	[68,67; 70,23]	[68,95; 70,55]		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	6114	5740	4879	4535	4134	3822	3545	3288	3064	2872	2660		
		Anteil in %	22,42	24,11	22,88	22,62	22,26	22,24	22,08	21,86	21,62	21,55	21,23		
		CI Anteil in %	[21,93; 22,92]	[23,56; 24,65]	[22,32; 23,45]	[22,04; 23,20]	[21,66; 22,86]	[21,62; 22,87]	[21,44; 22,72]	[21,20; 22,52]	[20,94; 22,29]	[20,85; 22,25]	[20,51; 21,95]		
	auswertbar	Anzahl			21330	20056	18574	17193	16064	15048	14185	13337	12539		
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl			14	19	13	17	17	17	22	24	27		
		Anteil in %			0,07	0,09	0,07	0,10	0,11	0,11	0,16	0,18	0,22		
		CI Anteil in %			[0,03; 0,10]	[0,05; 0,14]	[0,03; 0,11]	[0,05; 0,15]	[0,06; 0,16]	[0,06; 0,17]	[0,09; 0,22]	[0,11; 0,25]	[0,13; 0,30]		
	auswertbar	Anzahl	27265	23811	21313	20039	18554	17175	16046	15029	14165	13318	12519		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	14162	12525	11753	11148	10497	9770	9195	8658	8213	7768	7324		
		Anteil in %	51,94	52,60	55,14	55,63	56,58	56,89	57,30	57,61	57,98	58,33	58,50		
		CI Anteil in %	[51,35; 52,54]	[51,97; 53,24]	[54,48; 55,81]	[54,94; 56,32]	[55,86; 57,29]	[56,14; 57,63]	[56,54; 58,07]	[56,82; 58,40]	[57,17; 58,79]	[57,49; 59,16]	[57,64; 59,37]		
	auswertbar	Anzahl	27265	23811	21305	20031	18550	17165	16038	15024	14160	13313	12513		
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1309	1135	1196	1090	1009	912	850	791	743	681	620		
		Anteil in %	4,80	4,77	5,61	5,44	5,44	5,31	5,30	5,26	5,25	5,12	4,95		
		CI Anteil in %	[4,55; 5,05]	[4,50; 5,04]	[5,30; 5,92]	[5,13; 5,76]	[5,11; 5,77]	[4,98; 5,65]	[4,95; 5,65]	[4,91; 5,62]	[4,88; 5,61]	[4,74; 5,49]	[4,57; 5,34]		
	auswertbar	Anzahl	27267	23812	21316	20044	18562	17182	16053	15033	14170	13321	12526		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	18958	16011	14286	13623	12689	11773	11018	10344	9779	9278	8725		
		Anteil in %	69,53	67,24	67,02	67,97	68,36	68,52	68,64	68,81	69,01	69,65	69,66		
		CI Anteil in %	[68,98; 70,07]	[66,64; 67,84]	[66,39; 67,65]	[67,32; 68,61]	[67,69; 69,03]	[67,82; 69,21]	[67,92; 69,35]	[68,07; 69,55]	[68,25; 69,77]	[68,87; 70,43]	[68,85; 70,46]		
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2541	2329	1771	1667	1550	1422	1311	1222	1137	1050	971		
		Anteil in %	9,32	9,78	8,31	8,32	8,35	8,28	8,17	8,13	8,02	7,88	7,75		
		CI Anteil in %	[8,97; 9,66]	[9,40; 10,16]	[7,94; 8,68]	[7,93; 8,70]	[7,95; 8,75]	[7,86; 8,69]	[7,74; 8,59]	[7,69; 8,57]	[7,58; 8,47]	[7,42; 8,34]	[7,28; 8,22]		
	auswertbar	Anzahl	27266	23811	21330	20056	18574	17193	16064	15048	14185	13337	12539		
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	3677	3068	1466	1335	1245	1212	1071	1006	931	890	833		
		Anteil in %	13,49	12,88	6,87	6,66	6,70	7,05	6,67	6,69	6,56	6,67	6,64		
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	27266	23811	21330	20056	18574	17193	16064	15048	14185	13337	12539		
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	5138	4320	3242	3062	2897	2765	2567	2490	2329	2248	2121		
		Anteil in %	18,84	18,14	15,20	15,27	15,60	16,08	15,98	16,55	16,42	16,86	16,92		
		CI Anteil in %	[18,38; 19,31]	[17,65; 18,63]	[14,72; 15,68]	[14,77; 15,77]	[15,08; 16,12]	[15,53; 16,63]	[15,41; 16,55]	[15,95; 17,14]	[15,81; 17,03]	[16,22; 17,49]	[16,26; 17,57]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr			
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888						
	auswertbar	Anzahl	23418	19330	17626	15697	14152	12923	11892	10998	10163	9378						
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	563	670	638	573	505	478	453	427	380	351						
		Anteil in %	2,40	3,47	3,62	3,65	3,57	3,70	3,81	3,88	3,74	3,74						
		CI Anteil in %	[2,21; 2,60]	[3,21; 3,72]	[3,34; 3,90]	[3,36; 3,94]	[3,26; 3,87]	[3,37; 4,02]	[3,47; 4,15]	[3,52; 4,24]	[3,37; 4,11]	[3,36; 4,13]						
	auswertbar	Anzahl	23418	19327	17621	15691	14145	12917	11883	10989	10153	9373						
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	14799	11716	10691	9565	8693	7958	7373	6775	6274	5739						
		Anteil in %	63,19	60,62	60,67	60,96	61,46	61,61	62,05	61,65	61,79	61,23						
		CI Anteil in %	[62,58; 63,81]	[59,93; 61,31]	[59,95; 61,39]	[60,20; 61,72]	[60,65; 62,26]	[60,77; 62,45]	[61,17; 62,92]	[60,74; 62,56]	[60,85; 62,74]	[60,24; 62,22]						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	6557	5508	5037	4439	3914	3589	3231	3028	2760	2587						
		Anteil in %	28,00	28,50	28,59	28,29	27,67	27,79	27,19	27,55	27,18	27,60						
		CI Anteil in %	[27,42; 28,57]	[27,86; 29,14]	[27,92; 29,25]	[27,59; 28,99]	[26,93; 28,41]	[27,01; 28,56]	[26,39; 27,99]	[26,72; 28,39]	[26,32; 28,05]	[26,70; 28,51]						
	auswertbar	Anzahl		18898	17627	15700	14154	12924	11892	10998	10163	9379						
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl		10	21	21	20	19	25	23	27	23						
		Anteil in %		0,05	0,12	0,13	0,14	0,15	0,21	0,21	0,27	0,25						
		CI Anteil in %		[0,02; 0,09]	[0,07; 0,17]	[0,08; 0,19]	[0,08; 0,20]	[0,08; 0,21]	[0,13; 0,29]	[0,12; 0,29]	[0,17; 0,37]	[0,15; 0,35]						
	auswertbar	Anzahl	23418	19321	17617	15690	14145	12913	11884	10991	10157	9373						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	10841	9139	8525	7641	7012	6480	6008	5613	5235	4839						
		Anteil in %	46,29	47,30	48,39	48,70	49,57	50,18	50,56	51,07	51,54	51,63						
		CI Anteil in %	[45,65; 46,93]	[46,60; 48,00]	[47,65; 49,13]	[47,92; 49,48]	[48,75; 50,40]	[49,32; 51,04]	[49,66; 51,45]	[50,13; 52,00]	[50,57; 52,51]	[50,62; 52,64]						
	auswertbar	Anzahl	23418	19319	17612	15683	14138	12909	11877	10984	10149	9369						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1297	1107	1014	861	782	703	615	581	553	503						
		Anteil in %	5,54	5,73	5,76	5,49	5,53	5,45	5,18	5,29	5,45	5,37						
		CI Anteil in %	[5,25; 5,83]	[5,40; 6,06]	[5,41; 6,10]	[5,13; 5,85]	[5,15; 5,91]	[5,05; 5,84]	[4,78; 5,58]	[4,87; 5,71]	[5,01; 5,89]	[4,91; 5,83]						
	auswertbar	Anzahl	23418	19326	17622	15693	14147	12918	11884	10993	10159	9373						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	16169	12832	11835	10582	9633	8798	8146	7519	6979	6449						
		Anteil in %	69,05	66,40	67,16	67,43	68,09	68,11	68,55	68,40	68,70	68,80						
		CI Anteil in %	[68,45; 69,64]	[65,73; 67,06]	[66,47; 67,85]	[66,70; 68,16]	[67,32; 68,86]	[67,30; 68,91]	[67,71; 69,38]	[67,53; 69,27]	[67,80; 69,60]	[67,87; 69,74]						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2270	1705	1521	1322	1207	1063	980	895	808	745						
		Anteil in %	9,69	8,82	8,63	8,42	8,53	8,23	8,25	8,14	7,95	7,95						
	CI Anteil in %	[9,31; 10,07]	[8,42; 9,22]	[8,22; 9,05]	[7,99; 8,86]	[8,07; 8,99]	[7,75; 8,70]	[7,75; 8,74]	[7,63; 8,65]	[7,43; 8,48]	[7,40; 8,50]							
auswertbar	Anzahl	23418	19332	17627	15700	14154	12924	11892	10998	10163	9379							
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	2840	1142	987	880	806	777	721	663	625	571							
	Anteil in %	12,13	5,91	5,60	5,61	5,69	6,01	6,06	6,03	6,15	6,09							
	CI Anteil in %	[11,71; 12,55]	[5,57; 6,24]	[5,26; 5,94]	[5,25; 5,96]	[5,31; 6,08]	[5,60; 6,42]	[5,63; 6,49]	[5,58; 6,47]	[5,68; 6,62]	[5,60; 6,57]							
auswertbar	Anzahl	23418	19332	17627	15700	14154	12924	11892	10998	10163	9379							
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	4025	2708	2536	2249	2104	1886	1780	1655	1571	1436							
	Anteil in %	17,19	14,01	14,39	14,32	14,87	14,59	14,97	15,05	15,46	15,31							
	CI Anteil in %	[16,70; 17,67]	[13,52; 14,50]	[13,87; 14,91]	[13,78; 14,87]	[14,28; 15,45]	[13,98; 15,20]	[14,33; 15,61]	[14,38; 15,72]	[14,76; 16,16]	[14,58; 16,04]							

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308			
	auswertbar	Anzahl	33796	28687	26386	23894	22014	20306	18955	17781	16660	15648			
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	802	942	853	752	680	599	576	532	489	497			
		Anteil in %	2,37	3,28	3,23	3,15	3,09	2,95	3,04	2,99	2,94	3,18			
		CI Anteil in %	[2,21; 2,54]	[3,08; 3,49]	[3,02; 3,45]	[2,93; 3,37]	[2,86; 3,32]	[2,72; 3,18]	[2,79; 3,28]	[2,74; 3,24]	[2,68; 3,19]	[2,90; 3,45]			
	auswertbar	Anzahl	33796	28679	26379	23885	22007	20298	18944	17770	16646	15632			
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	22517	18473	17173	15650	14580	13514	12648	11869	11154	10419			
		Anteil in %	66,63	64,41	65,10	65,52	66,25	66,58	66,77	66,79	67,01	66,65			
		CI Anteil in %	[66,12; 67,13]	[63,86; 64,97]	[64,53; 65,68]	[64,92; 66,13]	[65,63; 66,88]	[65,93; 67,23]	[66,09; 67,44]	[66,10; 67,48]	[66,29; 67,72]	[65,91; 67,39]			
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	8509	7291	6502	5777	5193	4697	4362	4083	3795	3573			
		Anteil in %	25,18	25,42	24,65	24,19	23,60	23,14	23,03	22,98	22,80	22,86			
		CI Anteil in %	[24,71; 25,64]	[24,92; 25,93]	[24,13; 25,17]	[23,64; 24,73]	[23,04; 24,16]	[22,56; 23,72]	[22,43; 23,63]	[22,36; 23,60]	[22,16; 23,44]	[22,20; 23,52]			
	auswertbar	Anzahl		28093	26390	23898	22019	20311	18957	17782	16661	15649			
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl		24	23	31	26	29	37	40	44	48			
		Anteil in %		0,09	0,09	0,13	0,12	0,14	0,20	0,22	0,26	0,31			
		CI Anteil in %		[0,05; 0,12]	[0,05; 0,12]	[0,08; 0,18]	[0,07; 0,16]	[0,09; 0,19]	[0,13; 0,26]	[0,16; 0,29]	[0,19; 0,34]	[0,22; 0,39]			
	auswertbar	Anzahl	33796	28674	26370	23876	21996	20283	18927	17755	16637	15628			
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	17012	14838	13940	12770	11986	11170	10507	9972	9405	8847			
		Anteil in %	50,34	51,75	52,86	53,48	54,49	55,07	55,51	56,16	56,53	56,61			
		CI Anteil in %	[49,80; 50,87]	[51,17; 52,33]	[52,26; 53,47]	[52,85; 54,12]	[53,83; 55,15]	[54,39; 55,76]	[54,81; 56,22]	[55,43; 56,89]	[55,78; 57,28]	[55,83; 57,39]			
	auswertbar	Anzahl	33796	28666	26360	23868	21988	20273	18918	17748	16627	15616			
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1846	1659	1448	1275	1176	1060	994	957	905	831			
		Anteil in %	5,46	5,79	5,49	5,34	5,35	5,23	5,25	5,39	5,44	5,32			
		CI Anteil in %	[5,22; 5,70]	[5,52; 6,06]	[5,22; 5,77]	[5,06; 5,63]	[5,05; 5,65]	[4,92; 5,54]	[4,94; 5,57]	[5,06; 5,72]	[5,10; 5,79]	[4,97; 5,67]			
	auswertbar	Anzahl	33796	28680	26368	23876	21996	20289	18941	17765	16647	15629			
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	22803	18650	17419	15885	14691	13627	12722	12013	11325	10607			
		Anteil in %	67,47	65,03	66,06	66,53	66,79	67,16	67,17	67,62	68,03	67,87			
		CI Anteil in %	[66,97; 67,97]	[64,48; 65,58]	[65,49; 66,63]	[65,93; 67,13]	[66,17; 67,41]	[66,52; 67,81]	[66,50; 67,84]	[66,93; 68,31]	[67,32; 68,74]	[67,14; 68,60]			
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	3241	2466	2250	2003	1797	1618	1532	1413	1321	1222			
		Anteil in %	9,59	8,60	8,53	8,39	8,17	7,97	8,09	7,95	7,94	7,82			
		CI Anteil in %	[9,28; 9,90]	[8,27; 8,92]	[8,20; 8,87]	[8,04; 8,74]	[7,81; 8,53]	[7,60; 8,35]	[7,70; 8,48]	[7,56; 8,35]	[7,52; 8,35]	[7,40; 8,24]			
	auswertbar	Anzahl	33796	28692	26390	23898	22019	20311	18957	17782	16661	15649			
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	4270	1762	1588	1407	1374	1271	1205	1143	1077	1008			
		Anteil in %	12,63	6,14	6,02	5,89	6,24	6,26	6,36	6,43	6,46	6,44			
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	33796	28692	26390	23898	22019	20311	18957	17782	16661	15649			
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	5677	4058	3749	3407	3212	2989	2837	2670	2550	2419			
		Anteil in %	16,80	14,14	14,21	14,26	14,59	14,72	14,97	15,02	15,31	15,46			
		CI Anteil in %	[16,40; 17,20]	[13,74; 14,55]	[13,78; 14,63]	[13,81; 14,70]	[14,12; 15,05]	[14,23; 15,20]	[14,46; 15,47]	[14,49; 15,54]	[14,76; 15,85]	[14,89; 16,02]			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023				
	auswertbar	Anzahl	21332	17844	15651	14020	12848	11823	10988	10198	9531				
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	648	575	495	427	398	373	344	313	278				
		Anteil in %	3,04	3,22	3,16	3,05	3,10	3,15	3,13	3,07	2,92				
		CI Anteil in %	[2,81; 3,27]	[2,96; 3,48]	[2,89; 3,44]	[2,76; 3,33]	[2,80; 3,40]	[2,84; 3,47]	[2,81; 3,46]	[2,73; 3,40]	[2,58; 3,25]				
	auswertbar	Anzahl	21322	17833	15643	14013	12843	11817	10983	10194	9525				
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	13310	11249	9942	8951	8209	7607	7099	6641	6189				
		Anteil in %	62,42	63,08	63,56	63,88	63,92	64,37	64,64	65,15	64,98				
		CI Anteil in %	[61,77; 63,07]	[62,37; 63,79]	[62,80; 64,31]	[63,08; 64,67]	[63,09; 64,75]	[63,51; 65,24]	[63,74; 65,53]	[64,22; 66,07]	[64,02; 65,93]				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	5637	4680	4025	3578	3286	3024	2793	2524	2359				
		Anteil in %	26,44	26,24	25,73	25,53	25,59	25,59	25,43	24,76	24,77				
		CI Anteil in %	[25,85; 27,03]	[25,60; 26,89]	[25,05; 26,42]	[24,81; 26,26]	[24,83; 26,34]	[24,80; 26,38]	[24,62; 26,24]	[23,92; 25,60]	[23,90; 25,63]				
	auswertbar	Anzahl	21334	17846	15654	14023	12851	11825	10991	10200	9533				
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	17	19	18	17	12	10	12	10	15				
		Anteil in %	0,08	0,11	0,11	0,12	0,09	0,08	0,11	0,10	0,16				
		CI Anteil in %	[0,04; 0,12]	[0,06; 0,15]	[0,06; 0,17]	[0,06; 0,18]	[0,04; 0,15]	[0,03; 0,14]	[0,05; 0,17]	[0,04; 0,16]	[0,08; 0,24]				
	auswertbar	Anzahl	21313	17832	15639	14014	12841	11815	10981	10192	9526				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	10135	8676	7788	7085	6540	6144	5785	5432	5104				
		Anteil in %	47,55	48,65	49,80	50,56	50,93	52,00	52,68	53,30	53,58				
		CI Anteil in %	[46,88; 48,22]	[47,92; 49,39]	[49,01; 50,58]	[49,73; 51,38]	[50,07; 51,80]	[51,10; 52,90]	[51,75; 53,62]	[52,33; 54,27]	[52,58; 54,58]				
	auswertbar	Anzahl	21306	17823	15632	14007	12836	11809	10976	10188	9520				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1156	911	820	688	656	595	550	507	487				
		Anteil in %	5,43	5,11	5,25	4,91	5,11	5,04	5,01	4,98	5,12				
		CI Anteil in %	[5,12; 5,73]	[4,79; 5,43]	[4,90; 5,60]	[4,55; 5,27]	[4,73; 5,49]	[4,64; 5,43]	[4,60; 5,42]	[4,55; 5,40]	[4,67; 5,56]				
	auswertbar	Anzahl	21325	17839	15645	14014	12839	11812	10980	10190	9523				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	14061	12055	10606	9600	8799	8166	7623	7086	6675				
		Anteil in %	65,94	67,58	67,79	68,50	68,53	69,13	69,43	69,54	70,09				
		CI Anteil in %	[65,30; 66,57]	[66,89; 68,26]	[67,06; 68,52]	[67,73; 69,27]	[67,73; 69,34]	[68,30; 69,97]	[68,56; 70,29]	[68,65; 70,43]	[69,17; 71,01]				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1603	1297	1149	993	924	856	773	724	659				
		Anteil in %	7,52	7,27	7,34	7,09	7,20	7,25	7,04	7,11	6,92				
	CI Anteil in %	[7,16; 7,87]	[6,89; 7,65]	[6,94; 7,75]	[6,66; 7,51]	[6,75; 7,64]	[6,78; 7,71]	[6,56; 7,52]	[6,61; 7,60]	[6,41; 7,43]					
auswertbar	Anzahl	21334	17846	15654	14023	12851	11825	10991	10200	9533					
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1058	855	749	677	634	597	551	519	478					
	Anteil in %	4,96	4,79	4,78	4,83	4,93	5,05	5,01	5,09	5,01					
	CI Anteil in %	[4,67; 5,25]	[4,48; 5,10]	[4,45; 5,12]	[4,47; 5,18]	[4,56; 5,31]	[4,65; 5,44]	[4,61; 5,42]	[4,66; 5,51]	[4,58; 5,45]					
auswertbar	Anzahl	21334	17846	15654	14023	12851	11825	10991	10200	9533					
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	3301	2750	2392	2199	2041	1900	1733	1645	1581					
	Anteil in %	15,47	15,41	15,28	15,68	15,88	16,07	15,77	16,13	16,58					
	CI Anteil in %	[14,99; 15,96]	[14,88; 15,94]	[14,72; 15,84]	[15,08; 16,28]	[15,25; 16,51]	[15,41; 16,73]	[15,09; 16,45]	[15,41; 16,84]	[15,84; 17,33]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502				
	auswertbar	Anzahl	31848	27139	24361	22215	20460	19027	17930	16756	15731				
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	978	801	714	635	573	541	490	459	421				
		Anteil in %	3,07	2,95	2,93	2,86	2,80	2,84	2,73	2,74	2,68				
		CI Anteil in %	[2,88; 3,26]	[2,75; 3,15]	[2,72; 3,14]	[2,64; 3,08]	[2,57; 3,03]	[2,61; 3,08]	[2,49; 2,97]	[2,49; 2,99]	[2,42; 2,93]				
	auswertbar	Anzahl	31825	27124	24345	22203	20451	19011	17919	16741	15723				
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	20745	18009	16310	15015	13866	12937	12253	11508	10835				
		Anteil in %	65,18	66,40	67,00	67,63	67,80	68,05	68,38	68,74	68,91				
		CI Anteil in %	[64,66; 65,71]	[65,83; 66,96]	[66,40; 67,59]	[67,01; 68,24]	[67,16; 68,44]	[67,39; 68,71]	[67,70; 69,06]	[68,04; 69,44]	[68,19; 69,64]				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	7822	6410	5614	5031	4606	4224	3915	3637	3386				
		Anteil in %	24,58	23,63	23,06	22,66	22,52	22,22	21,85	21,73	21,54				
		CI Anteil in %	[24,11; 25,05]	[23,13; 24,14]	[22,53; 23,59]	[22,11; 23,21]	[21,95; 23,09]	[21,63; 22,81]	[21,24; 22,45]	[21,10; 22,35]	[20,89; 22,18]				
	auswertbar	Anzahl	31852	27142	24364	22218	20464	19028	17932	16760	15734				
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	37	29	32	28	26	30	31	36	31				
		Anteil in %	0,12	0,11	0,13	0,13	0,13	0,16	0,17	0,21	0,20				
		CI Anteil in %	[0,08; 0,15]	[0,07; 0,15]	[0,09; 0,18]	[0,08; 0,17]	[0,08; 0,18]	[0,10; 0,21]	[0,11; 0,23]	[0,14; 0,28]	[0,13; 0,27]				
	auswertbar	Anzahl	31819	27113	24345	22195	20443	19011	17917	16747	15724				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	16047	14179	12926	11967	11137	10509	9966	9352	8845				
		Anteil in %	50,43	52,30	53,10	53,92	54,48	55,28	55,62	55,84	56,25				
		CI Anteil in %	[49,88; 50,98]	[51,70; 52,89]	[52,47; 53,72]	[53,26; 54,57]	[53,80; 55,16]	[54,57; 55,99]	[54,90; 56,35]	[55,09; 56,59]	[55,48; 57,03]				
	auswertbar	Anzahl	31801	27101	24331	22187	20434	19000	17909	16736	15719				
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1920	1566	1375	1208	1133	1042	949	854	802				
		Anteil in %	6,04	5,78	5,65	5,44	5,54	5,48	5,30	5,10	5,10				
		CI Anteil in %	[5,78; 6,30]	[5,50; 6,06]	[5,36; 5,94]	[5,15; 5,74]	[5,23; 5,86]	[5,16; 5,81]	[4,97; 5,63]	[4,77; 5,44]	[4,76; 5,45]				
	auswertbar	Anzahl	31823	27127	24346	22199	20444	19011	17914	16748	15724				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	20369	17801	16149	14847	13748	12775	12179	11465	10746				
		Anteil in %	64,01	65,62	66,33	66,88	67,25	67,20	67,99	68,46	68,34				
		CI Anteil in %	[63,48; 64,53]	[65,06; 66,19]	[65,74; 66,92]	[66,26; 67,50]	[66,60; 67,89]	[66,53; 67,87]	[67,30; 68,67]	[67,75; 69,16]	[67,61; 69,07]				
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	2259	1920	1689	1494	1425	1301	1220	1130	1087				
		Anteil in %	7,10	7,08	6,94	6,73	6,97	6,84	6,81	6,75	6,91				
		CI Anteil in %	[6,82; 7,38]	[6,77; 7,38]	[6,62; 7,26]	[6,40; 7,06]	[6,62; 7,32]	[6,48; 7,20]	[6,44; 7,18]	[6,37; 7,13]	[6,52; 7,31]				
	auswertbar	Anzahl	31852	27142	24364	22218	20464	19028	17932	16760	15734				
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1638	1355	1203	1188	1089	1052	980	922	871				
		Anteil in %	5,14	4,99	4,94	5,35	5,32	5,53	5,47	5,50	5,54				
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	31852	27142	24364	22218	20464	19028	17932	16760	15734				
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	4765	3976	3590	3395	3142	2998	2833	2701	2537				
		Anteil in %	14,96	14,65	14,73	15,28	15,35	15,76	15,80	16,12	16,12				
		CI Anteil in %	[14,57; 15,35]	[14,23; 15,07]	[14,29; 15,18]	[14,81; 15,75]	[14,86; 15,85]	[15,24; 16,27]	[15,26; 16,33]	[15,56; 16,67]	[15,55; 16,70]				

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675					
	auswertbar	Anzahl	17140	13803	11879	10492	9473	8603	7868	7244					
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	673	546	447	394	358	331	306	287					
		Anteil in %	3,93	3,96	3,76	3,76	3,78	3,85	3,89	3,96					
		CI Anteil in %	[3,64; 4,22]	[3,63; 4,28]	[3,42; 4,11]	[3,39; 4,12]	[3,40; 4,16]	[3,44; 4,25]	[3,46; 4,32]	[3,51; 4,41]					
	auswertbar	Anzahl	17129	13793	11868	10483	9466	8596	7863	7236					
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	10233	8161	7101	6234	5654	5148	4716	4329					
		Anteil in %	59,74	59,17	59,83	59,47	59,73	59,89	59,98	59,83					
		CI Anteil in %	[59,01; 60,48]	[58,35; 59,99]	[58,95; 60,72]	[58,53; 60,41]	[58,74; 60,72]	[58,85; 60,92]	[58,89; 61,06]	[58,70; 60,96]					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4949	4065	3476	3041	2726	2502	2249	2059					
		Anteil in %	28,89	29,47	29,29	29,01	28,80	29,11	28,60	28,45					
		CI Anteil in %	[28,21; 29,57]	[28,71; 30,23]	[28,47; 30,11]	[28,14; 29,88]	[27,89; 29,71]	[28,15; 30,07]	[27,60; 29,60]	[27,42; 29,49]					
	auswertbar	Anzahl	17143	13805	11879	10495	9475	8606	7869	7244					
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	20	17	17	18	16	21	13	18					
		Anteil in %	0,12	0,12	0,14	0,17	0,17	0,24	0,17	0,25					
		CI Anteil in %	[0,07; 0,17]	[0,06; 0,18]	[0,08; 0,21]	[0,09; 0,25]	[0,09; 0,25]	[0,14; 0,35]	[0,08; 0,25]	[0,13; 0,36]					
	auswertbar	Anzahl	17127	13792	11868	10484	9464	8593	7861	7235					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	7773	6264	5494	4882	4481	4172	3854	3558					
		Anteil in %	45,38	45,42	46,29	46,57	47,35	48,55	49,03	49,18					
		CI Anteil in %	[44,64; 46,13]	[44,59; 46,25]	[45,40; 47,19]	[45,61; 47,52]	[46,34; 48,35]	[47,49; 49,61]	[47,92; 50,13]	[48,03; 50,33]					
	auswertbar	Anzahl	17115	13783	11860	10474	9457	8587	7857	7230					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1009	806	676	586	524	487	446	388					
		Anteil in %	5,90	5,85	5,70	5,59	5,54	5,67	5,68	5,37					
		CI Anteil in %	[5,54; 6,25]	[5,46; 6,24]	[5,28; 6,12]	[5,15; 6,03]	[5,08; 6,00]	[5,18; 6,16]	[5,16; 6,19]	[4,85; 5,89]					
	auswertbar	Anzahl	17131	13794	11874	10487	9469	8600	7863	7238					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	11108	9047	7915	7002	6384	5806	5309	4971					
		Anteil in %	64,84	65,59	66,66	66,77	67,42	67,51	67,52	68,68					
		CI Anteil in %	[64,13; 65,56]	[64,79; 66,38]	[65,81; 67,51]	[65,87; 67,67]	[66,48; 68,36]	[66,52; 68,50]	[66,48; 68,55]	[67,61; 69,75]					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1271	999	886	743	666	606	535	464					
		Anteil in %	7,42	7,24	7,46	7,08	7,03	7,05	6,80	6,41					
	CI Anteil in %	[7,03; 7,81]	[6,81; 7,67]	[6,99; 7,93]	[6,59; 7,58]	[6,52; 7,55]	[6,51; 7,59]	[6,25; 7,36]	[5,85; 6,97]						
auswertbar	Anzahl	17143	13805	11879	10495	9475	8606	7869	7244						
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	872	705	596	540	516	441	415	382						
	Anteil in %	5,09	5,11	5,02	5,15	5,45	5,12	5,27	5,27						
	CI Anteil in %	[4,76; 5,42]	[4,74; 5,47]	[4,62; 5,41]	[4,72; 5,57]	[4,99; 5,90]	[4,66; 5,59]	[4,78; 5,77]	[4,76; 5,79]						
auswertbar	Anzahl	17143	13805	11879	10495	9475	8606	7869	7244						
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2492	1986	1759	1540	1428	1291	1207	1079						
	Anteil in %	14,54	14,39	14,81	14,67	15,07	15,00	15,34	14,90						
	CI Anteil in %	[14,01; 15,06]	[13,80; 14,97]	[14,17; 15,45]	[14,00; 15,35]	[14,35; 15,79]	[14,25; 15,76]	[14,54; 16,13]	[14,08; 15,72]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641					
	auswertbar	Anzahl	24782	20501	18146	16334	14990	13906	12936	12043					
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	965	780	679	570	516	484	460	438					
		Anteil in %	3,89	3,80	3,74	3,49	3,44	3,48	3,56	3,64					
		CI Anteil in %	[3,65; 4,13]	[3,54; 4,07]	[3,47; 4,02]	[3,21; 3,77]	[3,15; 3,73]	[3,18; 3,79]	[3,24; 3,88]	[3,30; 3,97]					
	auswertbar	Anzahl	24774	20490	18138	16329	14983	13902	12932	12037					
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	15557	12808	11384	10307	9516	8849	8207	7719					
		Anteil in %	62,80	62,51	62,76	63,12	63,51	63,65	63,46	64,13					
		CI Anteil in %	[62,19; 63,40]	[61,85; 63,17]	[62,06; 63,47]	[62,38; 63,86]	[62,74; 64,28]	[62,85; 64,45]	[62,63; 64,29]	[63,27; 64,98]					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	6557	5453	4729	4197	3798	3500	3267	2973					
		Anteil in %	26,47	26,61	26,07	25,70	25,35	25,18	25,26	24,70					
		CI Anteil in %	[25,92; 27,02]	[26,01; 27,22]	[25,43; 26,71]	[25,03; 26,37]	[24,65; 26,05]	[24,45; 25,90]	[24,51; 26,01]	[23,93; 25,47]					
	auswertbar	Anzahl	24790	20505	18154	16340	14995	13913	12940	12046					
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	30	25	28	24	27	28	26	26					
		Anteil in %	0,12	0,12	0,15	0,15	0,18	0,20	0,20	0,22					
		CI Anteil in %	[0,08; 0,16]	[0,07; 0,17]	[0,10; 0,21]	[0,09; 0,21]	[0,11; 0,25]	[0,13; 0,28]	[0,12; 0,28]	[0,13; 0,30]					
	auswertbar	Anzahl	24765	20485	18132	16325	14982	13897	12926	12033					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	12097	10196	9174	8338	7675	7175	6736	6351					
		Anteil in %	48,85	49,77	50,60	51,08	51,23	51,63	52,11	52,78					
		CI Anteil in %	[48,22; 49,47]	[49,09; 50,46]	[49,87; 51,32]	[50,31; 51,84]	[50,43; 52,03]	[50,80; 52,46]	[51,25; 52,97]	[51,89; 53,67]					
	auswertbar	Anzahl	24752	20474	18120	16316	14972	13889	12918	12024					
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1484	1225	1098	971	889	797	745	676					
		Anteil in %	6,00	5,98	6,06	5,95	5,94	5,74	5,77	5,62					
		CI Anteil in %	[5,70; 6,29]	[5,66; 6,31]	[5,71; 6,41]	[5,59; 6,31]	[5,56; 6,32]	[5,35; 6,13]	[5,37; 6,17]	[5,21; 6,03]					
	auswertbar	Anzahl	24772	20492	18141	16331	14986	13907	12936	12040					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	15424	12986	11600	10491	9708	9066	8484	7983					
		Anteil in %	62,26	63,37	63,94	64,24	64,78	65,19	65,58	66,30					
		CI Anteil in %	[61,66; 62,87]	[62,71; 64,03]	[63,24; 64,64]	[63,50; 64,97]	[64,02; 65,55]	[64,40; 65,98]	[64,77; 66,40]	[65,46; 67,15]					
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1905	1536	1339	1185	1082	1010	917	829					
		Anteil in %	7,69	7,50	7,38	7,26	7,22	7,26	7,09	6,89					
		CI Anteil in %	[7,36; 8,02]	[7,14; 7,86]	[7,00; 7,76]	[6,86; 7,65]	[6,81; 7,63]	[6,83; 7,69]	[6,65; 7,53]	[6,43; 7,34]					
	auswertbar	Anzahl	24790	20505	18154	16340	14995	13913	12940	12046					
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1266	1040	940	841	798	711	696	631					
		Anteil in %	5,11	5,07	5,18	5,15	5,32	5,11	5,38	5,24					
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	24790	20505	18154	16340	14995	13913	12940	12046					
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	3441	2828	2580	2319	2205	2041	1912	1745					
		Anteil in %	13,88	13,79	14,21	14,19	14,70	14,67	14,78	14,49					
		CI Anteil in %	[13,45; 14,31]	[13,32; 14,26]	[13,70; 14,72]	[13,66; 14,73]	[14,14; 15,27]	[14,08; 15,26]	[14,16; 15,39]	[13,86; 15,11]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818						
	auswertbar	Anzahl	14495	11585	9849	8627	7801	7038	6450						
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	608	491	392	340	322	272	262						
		Anteil in %	4,19	4,24	3,98	3,94	4,13	3,86	4,06						
		CI Anteil in %	[3,87; 4,52]	[3,87; 4,61]	[3,59; 4,37]	[3,53; 4,35]	[3,69; 4,57]	[3,41; 4,32]	[3,58; 4,54]						
	auswertbar	Anzahl	14485	11579	9838	8621	7795	7033	6444						
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	8821	7010	5978	5266	4783	4333	3965						
		Anteil in %	60,90	60,54	60,76	61,08	61,36	61,61	61,53						
		CI Anteil in %	[60,10; 61,69]	[59,65; 61,43]	[59,80; 61,73]	[60,05; 62,11]	[60,28; 62,44]	[60,47; 62,75]	[60,34; 62,72]						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4087	3320	2809	2422	2188	1940	1797						
		Anteil in %	28,22	28,67	28,55	28,09	28,07	27,58	27,89						
		CI Anteil in %	[27,48; 28,95]	[27,85; 29,50]	[27,66; 29,45]	[27,15; 29,04]	[27,07; 29,07]	[26,54; 28,63]	[26,79; 28,98]						
	auswertbar	Anzahl	14497	11586	9850	8629	7803	7041	6453						
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	15	10	15	13	18	19	16						
		Anteil in %	0,10	0,09	0,15	0,15	0,23	0,27	0,25						
		CI Anteil in %	[0,05; 0,16]	[0,03; 0,14]	[0,08; 0,23]	[0,07; 0,23]	[0,12; 0,34]	[0,15; 0,39]	[0,13; 0,37]						
	auswertbar	Anzahl	14476	11576	9843	8622	7797	7035	6448						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	6438	5204	4514	4029	3680	3385	3166						
		Anteil in %	44,47	44,96	45,86	46,73	47,20	48,12	49,10						
		CI Anteil in %	[43,66; 45,28]	[44,05; 45,86]	[44,88; 46,84]	[45,68; 47,78]	[46,09; 48,31]	[46,95; 49,28]	[47,88; 50,32]						
	auswertbar	Anzahl	14468	11571	9832	8615	7789	7028	6440						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	809	619	517	477	399	371	347						
		Anteil in %	5,59	5,35	5,26	5,54	5,12	5,28	5,39						
		CI Anteil in %	[5,22; 5,97]	[4,94; 5,76]	[4,82; 5,70]	[5,05; 6,02]	[4,63; 5,61]	[4,76; 5,80]	[4,84; 5,94]						
	auswertbar	Anzahl	14475	11581	9846	8624	7797	7035	6446						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	9600	7821	6683	5915	5397	4890	4485						
		Anteil in %	66,32	67,53	67,88	68,59	69,22	69,51	69,58						
		CI Anteil in %	[65,55; 67,09]	[66,68; 68,39]	[66,95; 68,80]	[67,61; 69,57]	[68,19; 70,24]	[68,43; 70,59]	[68,45; 70,70]						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1088	801	677	558	510	442	415						
		Anteil in %	7,52	6,92	6,88	6,47	6,54	6,28	6,44						
	CI Anteil in %	[7,09; 7,95]	[6,45; 7,38]	[6,38; 7,38]	[5,95; 6,99]	[5,99; 7,09]	[5,72; 6,85]	[5,84; 7,04]							
auswertbar	Anzahl	14497	11586	9850	8629	7803	7041	6453							
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	619	475	418	365	328	307	295							
	Anteil in %	4,27	4,10	4,24	4,23	4,20	4,36	4,57							
	CI Anteil in %	[3,94; 4,60]	[3,74; 4,46]	[3,85; 4,64]	[3,81; 4,65]	[3,76; 4,65]	[3,88; 4,84]	[4,06; 5,08]							
auswertbar	Anzahl	14497	11586	9850	8629	7803	7041	6453							
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1893	1556	1393	1217	1074	988	899							
	Anteil in %	13,06	13,43	14,14	14,10	13,76	14,03	13,93							
	CI Anteil in %	[12,51; 13,61]	[12,81; 14,05]	[13,45; 14,83]	[13,37; 14,84]	[13,00; 14,53]	[13,22; 14,84]	[13,09; 14,78]							

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125						
	auswertbar	Anzahl	21000	17410	15145	13527	12412	11356	10517						
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	910	733	590	521	479	430	378						
		Anteil in %	4,33	4,21	3,90	3,85	3,86	3,79	3,59						
		CI Anteil in %	[4,06; 4,61]	[3,91; 4,51]	[3,59; 4,20]	[3,53; 4,18]	[3,52; 4,20]	[3,44; 4,14]	[3,24; 3,95]						
	auswertbar	Anzahl	20997	17402	15139	13521	12408	11353	10514						
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	13279	11061	9637	8730	7952	7274	6765						
		Anteil in %	63,24	63,56	63,66	64,57	64,09	64,07	64,34						
		CI Anteil in %	[62,59; 63,89]	[62,85; 64,28]	[62,89; 64,42]	[63,76; 65,37]	[63,24; 64,93]	[63,19; 64,95]	[63,43; 65,26]						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	5533	4546	3872	3370	3110	2844	2615						
		Anteil in %	26,35	26,12	25,58	24,92	25,06	25,05	24,87						
		CI Anteil in %	[25,76; 26,95]	[25,47; 26,78]	[24,88; 26,27]	[24,20; 25,65]	[24,30; 25,83]	[24,25; 25,85]	[24,05; 25,70]						
	auswertbar	Anzahl	21009	17416	15151	13531	12419	11363	10523						
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	20	20	19	22	24	25	25						
		Anteil in %	0,10	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,24						
		CI Anteil in %	[0,05; 0,14]	[0,06; 0,17]	[0,07; 0,18]	[0,09; 0,23]	[0,12; 0,27]	[0,13; 0,31]	[0,14; 0,33]						
	auswertbar	Anzahl	20986	17401	15132	13515	12403	11346	10510						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	10102	8601	7585	6855	6360	5888	5473						
		Anteil in %	48,14	49,43	50,13	50,72	51,28	51,89	52,07						
		CI Anteil in %	[47,46; 48,81]	[48,69; 50,17]	[49,33; 50,92]	[49,88; 51,56]	[50,40; 52,16]	[50,98; 52,81]	[51,12; 53,03]						
	auswertbar	Anzahl	20980	17393	15125	13509	12396	11340	10506						
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1191	996	859	738	679	638	575						
		Anteil in %	5,68	5,73	5,68	5,46	5,48	5,63	5,47						
		CI Anteil in %	[5,36; 5,99]	[5,38; 6,07]	[5,31; 6,05]	[5,08; 5,85]	[5,08; 5,88]	[5,20; 6,05]	[5,04; 5,91]						
	auswertbar	Anzahl	20977	17403	15138	13519	12406	11350	10508						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	13391	11305	9933	8963	8238	7637	7107						
		Anteil in %	63,84	64,96	65,62	66,30	66,40	67,29	67,63						
		CI Anteil in %	[63,19; 64,49]	[64,25; 65,67]	[64,86; 66,37]	[65,50; 67,10]	[65,57; 67,23]	[66,42; 68,15]	[66,74; 68,53]						
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1530	1213	1016	899	847	741	663						
		Anteil in %	7,29	6,97	6,71	6,65	6,83	6,53	6,31						
		CI Anteil in %	[6,94; 7,65]	[6,59; 7,35]	[6,31; 7,11]	[6,23; 7,07]	[6,38; 7,27]	[6,07; 6,98]	[5,84; 6,77]						
	auswertbar	Anzahl	21009	17416	15151	13531	12419	11363	10523						
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1000	819	730	665	606	575	530						
		Anteil in %	4,76	4,70	4,82	4,91	4,88	5,06	5,04						
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	21009	17416	15151	13531	12419	11363	10523						
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2642	2279	2020	1826	1660	1510	1431						
		Anteil in %	12,58	13,09	13,33	13,49	13,37	13,29	13,60						
		CI Anteil in %	[12,13; 13,02]	[12,58; 13,59]	[12,79; 13,87]	[12,92; 14,07]	[12,77; 13,97]	[12,66; 13,91]	[12,94; 14,25]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281								
	auswertbar	Anzahl	15870	12646	10880	9605	8637	7799								
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	689	590	488	448	383	337								
		Anteil in %	4,34	4,67	4,49	4,66	4,43	4,32								
		CI Anteil in %	[4,02; 4,66]	[4,30; 5,03]	[4,10; 4,87]	[4,24; 5,09]	[4,00; 4,87]	[3,87; 4,77]								
	auswertbar	Anzahl	15858	12640	10876	9603	8635	7798								
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	9563	7487	6476	5681	5145	4628								
		Anteil in %	60,30	59,23	59,54	59,16	59,58	59,35								
		CI Anteil in %	[59,54; 61,07]	[58,38; 60,09]	[58,62; 60,47]	[58,18; 60,14]	[58,55; 60,62]	[58,26; 60,44]								
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4543	3739	3142	2827	2510	2272								
		Anteil in %	28,65	29,58	28,89	29,44	29,07	29,14								
		CI Anteil in %	[27,94; 29,35]	[28,78; 30,38]	[28,04; 29,74]	[28,53; 30,35]	[28,11; 30,03]	[28,13; 30,14]								
	auswertbar	Anzahl	15873	12648	10882	9608	8640	7802								
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	25	13	15	17	19	19								
		Anteil in %	0,16	0,10	0,14	0,18	0,22	0,24								
		CI Anteil in %	[0,10; 0,22]	[0,05; 0,16]	[0,07; 0,21]	[0,09; 0,26]	[0,12; 0,32]	[0,13; 0,35]								
	auswertbar	Anzahl	15852	12636	10869	9598	8633	7796								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	7269	5738	5037	4488	4130	3765								
		Anteil in %	45,86	45,41	46,34	46,76	47,84	48,29								
		CI Anteil in %	[45,08; 46,63]	[44,54; 46,28]	[45,41; 47,28]	[45,76; 47,76]	[46,79; 48,89]	[47,18; 49,40]								
	auswertbar	Anzahl	15841	12631	10865	9594	8629	7793								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	959	737	614	523	472	422								
		Anteil in %	6,05	5,83	5,65	5,45	5,47	5,42								
		CI Anteil in %	[5,68; 6,43]	[5,43; 6,24]	[5,22; 6,09]	[5,00; 5,91]	[4,99; 5,95]	[4,91; 5,92]								
	auswertbar	Anzahl	15861	12639	10875	9603	8637	7797								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	10364	8397	7303	6479	5842	5311								
		Anteil in %	65,34	66,44	67,15	67,47	67,64	68,12								
		CI Anteil in %	[64,60; 66,08]	[65,61; 67,26]	[66,27; 68,04]	[66,53; 68,41]	[66,65; 68,63]	[67,08; 69,15]								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1253	917	752	635	595	515								
		Anteil in %	7,90	7,26	6,91	6,61	6,89	6,61								
	CI Anteil in %	[7,48; 8,32]	[6,80; 7,71]	[6,44; 7,39]	[6,12; 7,11]	[6,35; 7,42]	[6,05; 7,16]									
auswertbar	Anzahl	15873	12648	10882	9608	8640	7802									
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	682	532	484	426	392	354									
	Anteil in %	4,30	4,21	4,45	4,43	4,54	4,54									
	CI Anteil in %	[3,98; 4,61]	[3,86; 4,56]	[4,06; 4,84]	[4,02; 4,85]	[4,10; 4,98]	[4,08; 5,00]									
auswertbar	Anzahl	15873	12648	10882	9608	8640	7802									
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2030	1619	1495	1293	1215	1085									
	Anteil in %	12,79	12,80	13,74	13,46	14,06	13,91									
	CI Anteil in %	[12,27; 13,31]	[12,22; 13,38]	[13,09; 14,39]	[12,78; 14,14]	[13,33; 14,80]	[13,14; 14,67]									

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236							
	auswertbar	Anzahl	23092	19103	16715	15028	13723	12534							
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	965	782	656	553	528	491							
		Anteil in %	4,18	4,09	3,92	3,68	3,85	3,92							
		CI Anteil in %	[3,92; 4,44]	[3,81; 4,37]	[3,63; 4,22]	[3,38; 3,98]	[3,53; 4,17]	[3,58; 4,26]							
	auswertbar	Anzahl	23077	19094	16704	15018	13712	12523							
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	14467	11954	10559	9501	8689	7929							
		Anteil in %	62,69	62,61	63,21	63,26	63,37	63,32							
		CI Anteil in %	[62,07; 63,31]	[61,92; 63,29]	[62,48; 63,94]	[62,49; 64,04]	[62,56; 64,17]	[62,47; 64,16]							
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	6141	5067	4360	3881	3530	3254							
		Anteil in %	26,61	26,54	26,10	25,84	25,74	25,98							
		CI Anteil in %	[26,04; 27,18]	[25,91; 27,16]	[25,44; 26,77]	[25,14; 26,54]	[25,01; 26,48]	[25,22; 26,75]							
	auswertbar	Anzahl	23098	19106	16717	15032	13727	12538							
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	30	21	24	40	52	61							
		Anteil in %	0,13	0,11	0,14	0,27	0,38	0,49							
		CI Anteil in %	[0,08; 0,18]	[0,06; 0,16]	[0,09; 0,20]	[0,18; 0,35]	[0,28; 0,48]	[0,36; 0,61]							
	auswertbar	Anzahl	23068	19092	16701	15017	13715	12522							
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	11156	9349	8298	7521	6879	6335							
		Anteil in %	48,36	48,97	49,69	50,08	50,16	50,59							
		CI Anteil in %	[47,72; 49,01]	[48,26; 49,68]	[48,93; 50,44]	[49,28; 50,88]	[49,32; 50,99]	[49,72; 51,47]							
	auswertbar	Anzahl	23055	19084	16690	15004	13702	12510							
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1401	1149	997	869	764	706							
		Anteil in %	6,08	6,02	5,97	5,79	5,58	5,64							
		CI Anteil in %	[5,77; 6,39]	[5,68; 6,36]	[5,61; 6,33]	[5,42; 6,17]	[5,19; 5,96]	[5,24; 6,05]							
	auswertbar	Anzahl	23072	19089	16706	15021	13718	12531							
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	14852	12535	11073	10031	9174	8359							
		Anteil in %	64,37	65,67	66,28	66,78	66,88	66,71							
		CI Anteil in %	[63,75; 64,99]	[64,99; 66,34]	[65,56; 67,00]	[66,03; 67,53]	[66,09; 67,66]	[65,88; 67,53]							
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1740	1349	1148	1034	949	861							
		Anteil in %	7,54	7,07	6,87	6,88	6,92	6,87							
		CI Anteil in %	[7,20; 7,88]	[6,70; 7,43]	[6,49; 7,26]	[6,48; 7,29]	[6,49; 7,34]	[6,43; 7,31]							
	auswertbar	Anzahl	23098	19106	16717	15032	13727	12538							
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1042	866	777	712	681	633							
		Anteil in %	4,51	4,53	4,65	4,74	4,96	5,05							
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	23098	19106	16717	15032	13727	12538							
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2857	2384	2228	1987	1821	1670							
		Anteil in %	12,37	12,48	13,33	13,22	13,27	13,32							
		CI Anteil in %	[11,94; 12,79]	[12,01; 12,95]	[12,81; 13,84]	[12,68; 13,76]	[12,70; 13,83]	[12,72; 13,91]							

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568									
	auswertbar	Anzahl	14954	11958	10203	9003	8062									
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	618	491	422	376	352									
		Anteil in %	4,13	4,11	4,14	4,18	4,37									
		CI Anteil in %	[3,81; 4,45]	[3,75; 4,46]	[3,75; 4,52]	[3,76; 4,59]	[3,92; 4,81]									
	auswertbar	Anzahl	14944	11948	10195	8998	8055									
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	8984	7112	6075	5325	4767									
		Anteil in %	60,12	59,52	59,59	59,18	59,18									
		CI Anteil in %	[59,33; 60,90]	[58,64; 60,40]	[58,64; 60,54]	[58,16; 60,20]	[58,11; 60,25]									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4327	3513	2954	2627	2397									
		Anteil in %	28,95	29,40	28,97	29,20	29,76									
		CI Anteil in %	[28,23; 29,68]	[28,59; 30,22]	[28,09; 29,86]	[28,26; 30,13]	[28,76; 30,76]									
	auswertbar	Anzahl	14957	11959	10204	9003	8062									
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	16	15	11	10	9									
		Anteil in %	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11									
		CI Anteil in %	[0,05; 0,16]	[0,06; 0,19]	[0,04; 0,17]	[0,04; 0,18]	[0,04; 0,18]									
	auswertbar	Anzahl	14942	11955	10197	9000	8054									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	6753	5468	4723	4188	3806									
		Anteil in %	45,19	45,74	46,32	46,53	47,26									
		CI Anteil in %	[44,40; 45,99]	[44,85; 46,63]	[45,35; 47,29]	[45,50; 47,56]	[46,17; 48,35]									
	auswertbar	Anzahl	14932	11944	10188	8995	8048									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	942	754	628	541	477									
		Anteil in %	6,31	6,31	6,16	6,01	5,93									
		CI Anteil in %	[5,92; 6,70]	[5,88; 6,75]	[5,70; 6,63]	[5,52; 6,51]	[5,41; 6,44]									
	auswertbar	Anzahl	14948	11953	10198	8998	8056									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	9814	7961	6850	6035	5415									
		Anteil in %	65,65	66,60	67,17	67,07	67,22									
		CI Anteil in %	[64,89; 66,42]	[65,76; 67,45]	[66,26; 68,08]	[66,10; 68,04]	[66,19; 68,24]									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1132	868	684	642	540									
		Anteil in %	7,57	7,26	6,71	7,13	6,70									
	CI Anteil in %	[7,15; 8,00]	[6,80; 7,73]	[6,22; 7,19]	[6,60; 7,67]	[6,16; 7,25]										
auswertbar	Anzahl	14957	11959	10204	9003	8062										
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	590	498	407	374	325										
	Anteil in %	3,94	4,16	3,99	4,15	4,03										
	CI Anteil in %	[3,63; 4,26]	[3,81; 4,52]	[3,61; 4,37]	[3,74; 4,57]	[3,60; 4,46]										
auswertbar	Anzahl	14957	11959	10204	9003	8062										
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1965	1650	1370	1281	1143										
	Anteil in %	13,14	13,80	13,43	14,23	14,18										
	CI Anteil in %	[12,60; 13,68]	[13,18; 14,42]	[12,76; 14,09]	[13,51; 14,95]	[13,42; 14,94]										

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579								
	auswertbar	Anzahl	21723	18005	15760	14153	12806								
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	907	724	642	550	510								
		Anteil in %	4,18	4,02	4,07	3,89	3,98								
		CI Anteil in %	[3,91; 4,44]	[3,73; 4,31]	[3,76; 4,38]	[3,57; 4,20]	[3,64; 4,32]								
	auswertbar	Anzahl	21707	17993	15745	14143	12791								
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	13694	11451	9988	8948	8088								
		Anteil in %	63,09	63,64	63,44	63,27	63,23								
		CI Anteil in %	[62,44; 63,73]	[62,94; 64,34]	[62,68; 64,19]	[62,47; 64,06]	[62,40; 64,07]								
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	5844	4688	4154	3687	3350								
		Anteil in %	26,92	26,05	26,38	26,07	26,19								
		CI Anteil in %	[26,33; 27,51]	[25,41; 26,70]	[25,69; 27,07]	[25,35; 26,79]	[25,43; 26,95]								
	auswertbar	Anzahl	21727	18009	15761	14155	12808								
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	26	25	24	25	32								
		Anteil in %	0,12	0,14	0,15	0,18	0,25								
		CI Anteil in %	[0,07; 0,17]	[0,08; 0,19]	[0,09; 0,21]	[0,11; 0,25]	[0,16; 0,34]								
	auswertbar	Anzahl	21693	17983	15735	14136	12785								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	10451	8820	7793	7032	6444								
		Anteil in %	48,18	49,05	49,53	49,75	50,40								
		CI Anteil in %	[47,51; 48,84]	[48,32; 49,78]	[48,75; 50,31]	[48,92; 50,57]	[49,54; 51,27]								
	auswertbar	Anzahl	21682	17975	15725	14129	12774								
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1363	1080	910	820	762								
		Anteil in %	6,29	6,01	5,79	5,80	5,97								
		CI Anteil in %	[5,96; 6,61]	[5,66; 6,36]	[5,42; 6,15]	[5,42; 6,19]	[5,55; 6,38]								
	auswertbar	Anzahl	21708	17998	15754	14147	12798								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	14202	12008	10567	9548	8686								
		Anteil in %	65,42	66,72	67,08	67,49	67,87								
		CI Anteil in %	[64,79; 66,06]	[66,03; 67,41]	[66,34; 67,81]	[66,72; 68,26]	[67,06; 68,68]								
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1514	1183	1049	935	811								
		Anteil in %	6,97	6,57	6,66	6,61	6,34								
		CI Anteil in %	[6,64; 7,31]	[6,21; 6,94]	[6,27; 7,05]	[6,20; 7,02]	[5,91; 6,76]								
	auswertbar	Anzahl	21727	18009	15761	14155	12808								
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	992	819	710	633	593								
		Anteil in %	4,57	4,55	4,50	4,47	4,63								
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	21727	18009	15761	14155	12808								
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2710	2364	2068	1917	1719								
		Anteil in %	12,47	13,13	13,12	13,54	13,42								
		CI Anteil in %	[12,03; 12,91]	[12,63; 13,62]	[12,59; 13,65]	[12,98; 14,11]	[12,83; 14,01]								

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15409	12971	11106	9678										
	auswertbar	Anzahl	15404	12285	10473	8998										
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	733	607	508	434										
		Anteil in %	4,76	4,94	4,85	4,82										
		CI Anteil in %	[4,42; 5,09]	[4,56; 5,32]	[4,44; 5,26]	[4,38; 5,27]										
	auswertbar	Anzahl	15404	12285	10470	8995										
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	9320	7224	6221	5331										
		Anteil in %	60,50	58,80	59,42	59,27										
		CI Anteil in %	[59,73; 61,28]	[57,93; 59,67]	[58,48; 60,36]	[58,25; 60,28]										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4469	3699	3089	2640										
		Anteil in %	29,01	30,11	29,50	29,35										
		CI Anteil in %	[28,30; 29,73]	[29,30; 30,92]	[28,63; 30,38]	[28,41; 30,29]										
	auswertbar	Anzahl	15409	12286	10474	9001										
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	14	32	36	49										
		Anteil in %	0,09	0,26	0,34	0,54										
		CI Anteil in %	[0,04; 0,14]	[0,17; 0,35]	[0,23; 0,46]	[0,39; 0,70]										
	auswertbar	Anzahl	15391	12276	10462	8992										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	6887	5411	4697	4103										
		Anteil in %	44,75	44,08	44,90	45,63										
		CI Anteil in %	[43,96; 45,53]	[43,20; 44,96]	[43,94; 45,85]	[44,60; 46,66]										
	auswertbar	Anzahl	15388	12275	10458	8987										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	916	697	566	464										
		Anteil in %	5,95	5,68	5,41	5,16										
		CI Anteil in %	[5,58; 6,33]	[5,27; 6,09]	[4,98; 5,85]	[4,71; 5,62]										
	auswertbar	Anzahl	15400	12283	10471	8998										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	10220	8247	7089	6115										
		Anteil in %	66,36	67,14	67,70	67,96										
		CI Anteil in %	[65,62; 67,11]	[66,31; 67,97]	[66,81; 68,60]	[67,00; 68,92]										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1129	853	700	578										
		Anteil in %	7,33	6,94	6,69	6,42										
	CI Anteil in %	[6,92; 7,74]	[6,49; 7,39]	[6,21; 7,16]	[5,92; 6,93]											
auswertbar	Anzahl	15409	12286	10474	9001											
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	691	541	449	370											
	Anteil in %	4,48	4,40	4,29	4,11											
	CI Anteil in %	[4,16; 4,81]	[4,04; 4,77]	[3,90; 4,67]	[3,70; 4,52]											
auswertbar	Anzahl	15409	12286	10474	9001											
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1877	1500	1386	1199											
	Anteil in %	12,18	12,21	13,23	13,32											
	CI Anteil in %	[11,66; 12,70]	[11,63; 12,79]	[12,58; 13,88]	[12,62; 14,02]											

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23197	20078	17696	15845									
	auswertbar	Anzahl	23192	19094	16751	14925									
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	1057	821	724	679									
		Anteil in %	4,56	4,30	4,32	4,55									
		CI Anteil in %	[4,29; 4,83]	[4,01; 4,59]	[4,01; 4,63]	[4,22; 4,88]									
	auswertbar	Anzahl	23170	19085	16745	14919									
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	14575	11875	10396	9221									
		Anteil in %	62,90	62,22	62,08	61,81									
		CI Anteil in %	[62,28; 63,53]	[61,53; 62,91]	[61,35; 62,82]	[61,03; 62,59]									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	6234	5150	4472	4020									
		Anteil in %	26,91	26,98	26,71	26,95									
		CI Anteil in %	[26,33; 27,48]	[26,35; 27,61]	[26,04; 27,38]	[26,23; 27,66]									
	auswertbar	Anzahl	23197	19097	16755	14928									
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	41	49	69	81									
		Anteil in %	0,18	0,26	0,41	0,54									
		CI Anteil in %	[0,12; 0,23]	[0,18; 0,33]	[0,31; 0,51]	[0,42; 0,66]									
	auswertbar	Anzahl	23168	19088	16744	14921									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	11261	9328	8215	7421									
		Anteil in %	48,61	48,87	49,06	49,74									
		CI Anteil in %	[47,96; 49,25]	[48,16; 49,58]	[48,31; 49,82]	[48,93; 50,54]									
	auswertbar	Anzahl	23149	19078	16737	14914									
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1473	1180	993	882									
		Anteil in %	6,36	6,19	5,93	5,91									
		CI Anteil in %	[6,05; 6,68]	[5,84; 6,53]	[5,58; 6,29]	[5,54; 6,29]									
	auswertbar	Anzahl	23178	19080	16737	14909									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	15105	12684	11187	10001									
		Anteil in %	65,17	66,48	66,84	67,08									
		CI Anteil in %	[64,56; 65,78]	[65,81; 67,15]	[66,13; 67,55]	[66,33; 67,83]									
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1724	1345	1140	976									
		Anteil in %	7,44	7,05	6,81	6,55									
		CI Anteil in %	[7,10; 7,78]	[6,69; 7,41]	[6,43; 7,19]	[6,15; 6,94]									
	auswertbar	Anzahl	23197	19097	16755	14928									
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	1072	857	760	674									
		Anteil in %	4,62	4,49	4,54	4,52									
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	23197	19097	16755	14928									
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2683	2258	2080	1876									
		Anteil in %	11,57	11,82	12,41	12,57									
		CI Anteil in %	[11,15; 11,98]	[11,37; 12,28]	[11,91; 12,91]	[12,04; 13,10]									

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14050	11811	10082											
	auswertbar	Anzahl	14046	11192	9373											
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	687	555	485											
		Anteil in %	4,89	4,96	5,17											
		CI Anteil in %	[4,53; 5,25]	[4,56; 5,36]	[4,73; 5,62]											
	auswertbar	Anzahl	14039	11185	9364											
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	8428	6681	5552											
		Anteil in %	60,03	59,73	59,29											
		CI Anteil in %	[59,22; 60,84]	[58,82; 60,64]	[58,30; 60,29]											
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4106	3286	2783											
		Anteil in %	29,25	29,38	29,72											
		CI Anteil in %	[28,49; 30,00]	[28,53; 30,22]	[28,79; 30,65]											
	auswertbar	Anzahl	14050	11195	9376											
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	29	35	44											
		Anteil in %	0,21	0,31	0,47											
		CI Anteil in %	[0,13; 0,28]	[0,21; 0,42]	[0,33; 0,61]											
	auswertbar	Anzahl	14036	11190	9370											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	6215	5017	4268											
		Anteil in %	44,28	44,83	45,55											
		CI Anteil in %	[43,46; 45,10]	[43,91; 45,76]	[44,54; 46,56]											
	auswertbar	Anzahl	14027	11182	9361											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	794	609	507											
		Anteil in %	5,66	5,45	5,42											
		CI Anteil in %	[5,28; 6,04]	[5,03; 5,87]	[4,96; 5,87]											
	auswertbar	Anzahl	14040	11187	9367											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	9376	7575	6348											
		Anteil in %	66,78	67,71	67,77											
		CI Anteil in %	[66,00; 67,56]	[66,85; 68,58]	[66,82; 68,72]											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1011	780	603											
		Anteil in %	7,20	6,97	6,44											
	CI Anteil in %	[6,77; 7,63]	[6,50; 7,44]	[5,94; 6,93]												
auswertbar	Anzahl	14050	11195	9376												
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	558	444	377												
	Anteil in %	3,97	3,97	4,02												
	CI Anteil in %	[3,65; 4,29]	[3,60; 4,33]	[3,62; 4,42]												
auswertbar	Anzahl	14050	11195	9376												
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1685	1421	1173												
	Anteil in %	11,99	12,69	12,51												
	CI Anteil in %	[11,46; 12,53]	[12,08; 13,31]	[11,84; 13,18]												

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20513	17841	15614										
	auswertbar	Anzahl	20513	16980	14677										
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	954	778	649										
		Anteil in %	4,65	4,58	4,42										
		CI Anteil in %	[4,36; 4,94]	[4,27; 4,90]	[4,09; 4,75]										
	auswertbar	Anzahl	20500	16969	14668										
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	12727	10507	9037										
		Anteil in %	62,08	61,92	61,61										
		CI Anteil in %	[61,42; 62,75]	[61,19; 62,65]	[60,82; 62,40]										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	5653	4659	4051										
		Anteil in %	27,58	27,46	27,62										
		CI Anteil in %	[26,96; 28,19]	[26,78; 28,13]	[26,89; 28,34]										
	auswertbar	Anzahl	20513	16981	14678										
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	45	52	61										
		Anteil in %	0,22	0,31	0,42										
		CI Anteil in %	[0,16; 0,28]	[0,22; 0,39]	[0,31; 0,52]										
	auswertbar	Anzahl	20493	16971	14667										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	9904	8277	7244										
		Anteil in %	48,33	48,77	49,39										
		CI Anteil in %	[47,64; 49,01]	[48,02; 49,52]	[48,58; 50,20]										
	auswertbar	Anzahl	20484	16962	14660										
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1323	1030	897										
		Anteil in %	6,46	6,07	6,12										
		CI Anteil in %	[6,12; 6,80]	[5,71; 6,43]	[5,73; 6,51]										
	auswertbar	Anzahl	20493	16968	14663										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	13333	11207	9694										
		Anteil in %	65,06	66,05	66,11										
		CI Anteil in %	[64,41; 65,71]	[65,34; 66,76]	[65,35; 66,88]										
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1474	1167	997										
		Anteil in %	7,19	6,88	6,80										
		CI Anteil in %	[6,84; 7,55]	[6,50; 7,26]	[6,39; 7,21]										
	auswertbar	Anzahl	20513	16981	14678										
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	916	742	648										
		Anteil in %	4,47	4,37	4,41										
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	20513	16981	14678										
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2388	2075	1824										
		Anteil in %	11,64	12,22	12,43										
		CI Anteil in %	[11,20; 12,08]	[11,73; 12,71]	[11,89; 12,96]										

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16002	13484												
	auswertbar	Anzahl	15996	12570												
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	839	674												
		Anteil in %	5,25	5,36												
		CI Anteil in %	[4,90; 5,59]	[4,97; 5,76]												
	auswertbar	Anzahl	15990	12566												
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	9423	7222												
		Anteil in %	58,93	57,47												
		CI Anteil in %	[58,17; 59,69]	[56,61; 58,34]												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4676	3794												
		Anteil in %	29,24	30,19												
		CI Anteil in %	[28,54; 29,95]	[29,39; 31,00]												
	auswertbar	Anzahl	16002	12571												
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	29	24												
		Anteil in %	0,18	0,19												
		CI Anteil in %	[0,12; 0,25]	[0,11; 0,27]												
	auswertbar	Anzahl	15984	12562												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	7066	5527												
		Anteil in %	44,21	44,00												
		CI Anteil in %	[43,44; 44,98]	[43,13; 44,87]												
	auswertbar	Anzahl	15977	12558												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	892	687												
		Anteil in %	5,58	5,47												
		CI Anteil in %	[5,23; 5,94]	[5,07; 5,87]												
	auswertbar	Anzahl	15993	12564												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	10675	8523												
		Anteil in %	66,75	67,84												
		CI Anteil in %	[66,02; 67,48]	[67,02; 68,65]												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1105	754												
		Anteil in %	6,91	6,00												
	CI Anteil in %	[6,52; 7,30]	[5,59; 6,42]													
auswertbar	Anzahl	16002	12571													
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	593	465													
	Anteil in %	3,71	3,70													
	CI Anteil in %	[3,41; 4,00]	[3,37; 4,03]													
auswertbar	Anzahl	16002	12571													
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1991	1514													
	Anteil in %	12,44	12,04													
	CI Anteil in %	[11,93; 12,95]	[11,47; 12,61]													

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23844	20669											
	auswertbar	Anzahl	23837	19308											
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	1218	982											
		Anteil in %	5,11	5,09											
		CI Anteil in %	[4,83; 5,39]	[4,78; 5,40]											
	auswertbar	Anzahl	23809	19292											
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	14534	11631											
		Anteil in %	61,04	60,29											
		CI Anteil in %	[60,42; 61,66]	[59,60; 60,98]											
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	6626	5492											
		Anteil in %	27,83	28,47											
		CI Anteil in %	[27,26; 28,40]	[27,83; 29,10]											
	auswertbar	Anzahl	23844	19313											
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	58	49											
		Anteil in %	0,24	0,25											
		CI Anteil in %	[0,18; 0,31]	[0,18; 0,32]											
	auswertbar	Anzahl	23812	19294											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	11182	9191											
		Anteil in %	46,96	47,64											
		CI Anteil in %	[46,33; 47,59]	[46,93; 48,34]											
	auswertbar	Anzahl	23790	19280											
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1461	1171											
		Anteil in %	6,14	6,07											
		CI Anteil in %	[5,84; 6,45]	[5,74; 6,41]											
	auswertbar	Anzahl	23817	19295											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	15632	12744											
		Anteil in %	65,63	66,05											
		CI Anteil in %	[65,03; 66,24]	[65,38; 66,72]											
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1558	1186											
		Anteil in %	6,54	6,15											
		CI Anteil in %	[6,23; 6,86]	[5,81; 6,49]											
	auswertbar	Anzahl	23844	19313											
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	919	752											
		Anteil in %	3,85	3,89											
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	23844	19313											
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2781	2265											
		Anteil in %	11,66	11,73											
		CI Anteil in %	[11,26; 12,07]	[11,27; 12,18]											

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14102													
	auswertbar	Anzahl	14101													
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	697													
		Anteil in %	4,94													
		CI Anteil in %	[4,59; 5,30]													
	auswertbar	Anzahl	14098													
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	8295													
		Anteil in %	58,84													
		CI Anteil in %	[58,03; 59,65]													
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4140													
		Anteil in %	29,37													
		CI Anteil in %	[28,61; 30,12]													
	auswertbar	Anzahl	14102													
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	22													
		Anteil in %	0,16													
		CI Anteil in %	[0,09; 0,22]													
	auswertbar	Anzahl	14090													
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	6318													
		Anteil in %	44,84													
		CI Anteil in %	[44,02; 45,66]													
	auswertbar	Anzahl	14087													
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	808													
		Anteil in %	5,74													
		CI Anteil in %	[5,35; 6,12]													
	auswertbar	Anzahl	14091													
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	9604													
		Anteil in %	68,16													
CI Anteil in %		[67,39; 68,93]														
mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	923														
	Anteil in %	6,55														
	CI Anteil in %	[6,14; 6,96]														
auswertbar	Anzahl	14102														
mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	480														
	Anteil in %	3,40														
	CI Anteil in %	[3,10; 3,70]														
auswertbar	Anzahl	14102														
mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	1623														
	Anteil in %	11,51														
	CI Anteil in %	[10,98; 12,04]														

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20545												
	auswertbar	Anzahl	20534												
	ohne aktuelle diagnose- spezifische Medikation *	Anzahl	1047												
		Anteil in %	5,10												
		CI Anteil in %	[4,80; 5,40]												
	auswertbar	Anzahl	20520												
	mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation	Anzahl	12556												
		Anteil in %	61,19												
		CI Anteil in %	[60,52; 61,86]												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	5609												
		Anteil in %	27,33												
		CI Anteil in %	[26,72; 27,94]												
	auswertbar	Anzahl	20545												
	mit Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide **	Anzahl	43												
		Anteil in %	0,21												
		CI Anteil in %	[0,15; 0,27]												
	auswertbar	Anzahl	20513												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	9727												
		Anteil in %	47,42												
		CI Anteil in %	[46,74; 48,10]												
	auswertbar	Anzahl	20499												
	mit inhalativen lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation und ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1228												
		Anteil in %	5,99												
		CI Anteil in %	[5,67; 6,32]												
	auswertbar	Anzahl	20518												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika im Bedarfsfall	Anzahl	13530												
		Anteil in %	65,94												
		CI Anteil in %	[65,29; 66,59]												
	mit kurz wirksamen Beta-2-Sympathomimetika als Dauermedikation	Anzahl	1371												
		Anteil in %	6,68												
		CI Anteil in %	[6,34; 7,02]												
	auswertbar	Anzahl	20545												
	mit systemischen Glukokortikosteroiden *	Anzahl	753												
		Anteil in %	3,67												
		CI Anteil in %													
	auswertbar	Anzahl	20545												
	mit sonstigen asthmaspezi- fischen Medikamenten (außer systemischen Glukokortikosteroiden) *	Anzahl	2253												
		Anteil in %	10,97												
		CI Anteil in %	[10,54; 11,39]												

In Tabelle 3.4.2 sind die **Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik ausgewiesen, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden**. Für jede Kohorte wird dazu zunächst die Gruppe der „männlichen bzw. weiblichen Patienten mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik“ angegeben. Anschließend wird ausgewiesen, wie viele der „auswertbaren“ Patienten eine Dauermedikation mit inhalativen Glukokortikosteroiden erhielten und welchem Anteil an den „auswertbaren“ Patienten dies entspricht.

Zu beachten ist, dass es durch die im Zuge der Umstellung auf eDMP zum 01.07.2008 eingeführten neuen Satzartbeschreibungen zu einer veränderten Dokumentation der Medikation mit inhalativen Glukokortikosteroiden kommt. Ab der Umstellung auf eDMP ist es dem Arzt auch möglich eine Kontraindikation des Patienten zu dokumentieren.⁴

⁴ Dies hat zur Folge, dass die Ergebnisse in den Berichtshalbjahren bis 2008-1 nur bedingt mit den Ergebnissen in den Berichtshalbjahren ab 2008-2 vergleichbar sind.

Tabelle 3.4.2 Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2006-1	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	426	313	267	224	206	195	173	160	156	128	137	118	119	113
	auswertbar	Anzahl	426	313	267	224	206	195	173	160	156	127	137	118	119	113
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	135	104	85	70	80	66	60	52	48	37	35	38	38	40
		Anteil in %	31,69	33,23	31,84	31,25	38,83	33,85	34,68	32,50	30,77	29,13	25,55	32,20	31,93	35,40
		CI Anteil in %	[27,27; 36,11]	[28,00; 38,45]	[26,24; 37,43]	[25,17; 37,33]	[32,16; 45,51]	[27,19; 40,50]	[27,57; 41,80]	[25,22; 39,78]	[23,50; 38,04]	[21,20; 37,07]	[18,22; 32,88]	[23,74; 40,67]	[23,52; 40,34]	[26,54; 44,25]
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>886</i>	<i>840</i>	<i>758</i>	<i>699</i>	<i>650</i>	<i>611</i>	<i>569</i>	<i>525</i>	<i>503</i>	<i>465</i>	<i>442</i>	<i>417</i>	<i>391</i>	<i>370</i>
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	673	525	451	422	396	376	343	332	298	278	248	231	230	209
	auswertbar	Anzahl	673	525	451	422	396	375	342	332	298	278	248	231	230	209
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	188	145	123	129	119	120	100	100	76	64	60	60	67	61
		Anteil in %	27,93	27,62	27,27	30,57	30,05	32,00	29,24	30,12	25,50	23,02	24,19	25,97	29,13	29,19
	CI Anteil in %	[24,54; 31,33]	[23,79; 31,45]	[23,16; 31,39]	[26,17; 34,97]	[25,53; 34,57]	[27,27; 36,73]	[24,41; 34,07]	[25,18; 35,06]	[20,55; 30,46]	[18,06; 27,98]	[18,85; 29,53]	[20,31; 31,64]	[23,25; 35,02]	[23,01; 35,36]	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1265</i>	<i>1215</i>	<i>1121</i>	<i>1045</i>	<i>998</i>	<i>960</i>	<i>919</i>	<i>874</i>	<i>832</i>	<i>796</i>	<i>755</i>	<i>727</i>	<i>702</i>	<i>681</i>	
2006-2	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3255	2400	2034	1857	1598	1470	1358	1241	1077	1028	955	920	865	
	auswertbar	Anzahl	3255	2400	2034	1857	1596	1470	1358	1241	1077	1028	955	920	865	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	857	632	552	466	485	458	403	358	302	304	273	265	268	
		Anteil in %	26,33	26,33	27,14	25,09	30,39	31,16	29,68	28,85	28,04	29,57	28,59	28,80	30,98	
		CI Anteil in %	[24,82; 27,84]	[24,57; 28,10]	[25,21; 29,07]	[23,12; 27,07]	[28,13; 32,65]	[28,79; 33,52]	[27,25; 32,11]	[26,33; 31,37]	[25,36; 30,72]	[26,78; 32,36]	[25,72; 31,45]	[25,88; 31,73]	[27,90; 34,07]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7188</i>	<i>6656</i>	<i>6004</i>	<i>5530</i>	<i>5210</i>	<i>4908</i>	<i>4553</i>	<i>4243</i>	<i>3961</i>	<i>3720</i>	<i>3505</i>	<i>3316</i>	<i>3124</i>	
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5257	3880	3394	3156	2836	2705	2456	2301	2042	1951	1829	1778	1685	
	auswertbar	Anzahl	5257	3880	3394	3156	2835	2702	2452	2296	2037	1949	1828	1778	1684	
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1230	975	797	740	780	741	651	578	491	496	459	438	394	
		Anteil in %	23,40	25,13	23,48	23,45	27,51	27,42	26,55	25,17	24,10	25,45	25,11	24,63	23,40	
	CI Anteil in %	[22,25; 24,54]	[23,76; 26,49]	[22,06; 24,91]	[21,97; 24,93]	[25,87; 29,16]	[25,74; 29,11]	[24,80; 28,30]	[23,40; 26,95]	[22,25; 25,96]	[23,51; 27,38]	[23,12; 27,10]	[22,63; 26,64]	[21,37; 25,42]		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10299</i>	<i>9582</i>	<i>8748</i>	<i>8115</i>	<i>7728</i>	<i>7349</i>	<i>6948</i>	<i>6534</i>	<i>6165</i>	<i>5856</i>	<i>5542</i>	<i>5292</i>	<i>5053</i>		
2007-1	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	7071	4557	3934	3182	2944	2643	2423	2159	2067	1856	1792	1583		
	auswertbar	Anzahl	7071	4557	3934	3179	2940	2641	2422	2158	2066	1855	1791	1583		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1701	1052	888	806	712	629	559	497	470	422	419	376		
		Anteil in %	24,06	23,09	22,57	25,35	24,22	23,82	23,08	23,03	22,75	22,75	23,39	23,75		
		CI Anteil in %	[23,06; 25,05]	[21,86; 24,31]	[21,27; 23,88]	[23,84; 26,87]	[22,67; 25,77]	[22,19; 25,44]	[21,40; 24,76]	[21,25; 24,81]	[20,94; 24,56]	[20,84; 24,66]	[21,43; 25,36]	[21,66; 25,85]		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14600</i>	<i>13199</i>	<i>11826</i>	<i>10856</i>	<i>10060</i>	<i>9253</i>	<i>8517</i>	<i>7968</i>	<i>7420</i>	<i>6962</i>	<i>6566</i>	<i>6136</i>		
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	11532	8035	7148	5790	5460	4795	4607	4147	3888	3634	3382	3105		
	auswertbar	Anzahl	11532	8035	7148	5784	5457	4793	4606	4144	3884	3630	3380	3104		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2522	1688	1435	1268	1195	1032	975	861	810	759	705	665		
		Anteil in %	21,87	21,01	20,08	21,92	21,90	21,53	21,17	20,78	20,85	20,91	20,86	21,42		
	CI Anteil in %	[21,12; 22,62]	[20,12; 21,90]	[19,15; 21,00]	[20,86; 22,99]	[20,80; 23,00]	[20,37; 22,70]	[19,99; 22,35]	[19,54; 22,01]	[19,58; 22,13]	[19,59; 22,23]	[19,49; 22,23]	[19,98; 22,87]			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21994</i>	<i>20214</i>	<i>18440</i>	<i>17130</i>	<i>16006</i>	<i>14843</i>	<i>13864</i>	<i>13060</i>	<i>12315</i>	<i>11681</i>	<i>11095</i>	<i>10538</i>			

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
2007-2	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	8665	5762	4508	4044	3560	3227	2879	2692	2383	2215	1995		
	auswertbar	Anzahl	8665	5762	4508	4043	3558	3226	2878	2691	2382	2214	1992		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2177	1513	1274	1136	984	848	748	720	633	595	546		
		Anteil in %	25,12	26,26	28,26	28,10	27,66	26,29	25,99	26,76	26,57	26,87	27,41		
		CI Anteil in %	[24,21; 26,04]	[25,12; 27,39]	[26,95; 29,58]	[26,71; 29,48]	[26,19; 29,13]	[24,77; 27,81]	[24,39; 27,59]	[25,08; 28,43]	[24,80; 28,35]	[25,03; 28,72]	[25,45; 29,37]		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>19270</i>	<i>17296</i>	<i>15667</i>	<i>14230</i>	<i>12848</i>	<i>11741</i>	<i>10874</i>	<i>10051</i>	<i>9328</i>	<i>8686</i>	<i>8054</i>		
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	13658	9698	7773	7196	6217	5690	5162	4902	4502	4064	3766		
	auswertbar	Anzahl	13657	9698	7768	7194	6215	5686	5158	4899	4498	4061	3765		
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	3089	2237	1890	1761	1453	1349	1223	1148	1076	948	886		
		Anteil in %	22,62	23,07	24,33	24,48	23,38	23,72	23,71	23,43	23,92	23,34	23,53		
		CI Anteil in %	[21,92; 23,32]	[22,23; 23,91]	[23,38; 25,28]	[23,49; 25,47]	[22,33; 24,43]	[22,62; 24,83]	[22,55; 24,87]	[22,25; 24,62]	[22,67; 25,17]	[22,04; 24,65]	[22,18; 24,89]		
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>27267</i>	<i>25016</i>	<i>22959</i>	<i>21225</i>	<i>19373</i>	<i>17886</i>	<i>16675</i>	<i>15633</i>	<i>14734</i>	<i>13881</i>	<i>13091</i>		
2008-1	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	10883	6277	5488	4510	4043	3601	3296	2897	2647	2393			
	auswertbar	Anzahl	10882	6276	5486	4509	4039	3599	3294	2894	2646	2392			
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	3165	1877	1614	1333	1187	1047	926	852	789	726			
		Anteil in %	29,08	29,91	29,42	29,56	29,39	29,09	28,11	29,44	29,82	30,35			
		CI Anteil in %	[28,23; 29,94]	[28,77; 31,04]	[28,21; 30,63]	[28,23; 30,90]	[27,98; 30,79]	[27,61; 30,58]	[26,58; 29,65]	[27,78; 31,10]	[28,08; 31,56]	[28,51; 32,19]			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23420</i>	<i>21116</i>	<i>19060</i>	<i>16520</i>	<i>14815</i>	<i>13543</i>	<i>12414</i>	<i>11469</i>	<i>10651</i>	<i>9888</i>			
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	17265	10761	9573	7984	7390	6457	6049	5450	5227	4659			
	auswertbar	Anzahl	17265	10758	9569	7980	7384	6452	6045	5446	5221	4656			
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	4542	3013	2674	2157	1968	1692	1587	1431	1354	1208			
		Anteil in %	26,31	28,01	27,94	27,03	26,65	26,22	26,25	26,28	25,93	25,95			
		CI Anteil in %	[25,65; 26,96]	[27,16; 28,86]	[27,05; 28,84]	[26,06; 28,00]	[25,64; 27,66]	[25,15; 27,30]	[25,14; 27,36]	[25,11; 27,45]	[24,74; 27,12]	[24,69; 27,20]			
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>33796</i>	<i>31063</i>	<i>28290</i>	<i>25054</i>	<i>22840</i>	<i>21065</i>	<i>19655</i>	<i>18394</i>	<i>17298</i>	<i>16308</i>			
2008-2	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	8814	5661	4466	3995	3474	3215	2855	2690	2457				
	auswertbar	Anzahl	8811	5655	4461	3991	3471	3211	2853	2688	2456				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2533	1644	1268	1095	946	877	787	736	689				
		Anteil in %	28,75	29,07	28,42	27,44	27,25	27,31	27,58	27,38	28,05				
		CI Anteil in %	[27,80; 29,69]	[27,89; 30,26]	[27,10; 29,75]	[26,05; 28,82]	[25,77; 28,74]	[25,77; 28,85]	[25,94; 29,23]	[25,69; 29,07]	[26,28; 29,83]				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21334</i>	<i>18950</i>	<i>16531</i>	<i>14720</i>	<i>13457</i>	<i>12343</i>	<i>11470</i>	<i>10717</i>	<i>10023</i>				
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	14679	10032	8114	7357	6417	5874	5343	5057	4533				
	auswertbar	Anzahl	14663	10025	8106	7350	6414	5871	5341	5054	4531				
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	3940	2678	2187	1905	1679	1526	1394	1299	1173				
		Anteil in %	26,87	26,71	26,98	25,92	26,18	25,99	26,10	25,70	25,89				
		CI Anteil in %	[26,15; 27,59]	[25,85; 27,58]	[26,01; 27,95]	[24,92; 26,92]	[25,10; 27,25]	[24,87; 27,11]	[24,92; 27,28]	[24,50; 26,91]	[24,61; 27,16]				
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31852</i>	<i>28706</i>	<i>25549</i>	<i>23236</i>	<i>21376</i>	<i>19866</i>	<i>18668</i>	<i>17513</i>	<i>16502</i>				

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
2009-1	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	7416	4105	3400	2763	2539	2181	1997	1770					
	auswertbar	Anzahl	7411	4103	3396	2759	2537	2179	1996	1769					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2279	1347	1073	896	815	704	638	557					
		Anteil in %	30,75	32,83	31,60	32,48	32,12	32,31	31,96	31,49					
		CI Anteil in %	[29,70; 31,80]	[31,39; 34,27]	[30,03; 33,16]	[30,73; 34,22]	[30,31; 33,94]	[30,34; 34,27]	[29,92; 34,01]	[29,32; 33,65]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>17143</i>	<i>14539</i>	<i>12566</i>	<i>11033</i>	<i>9913</i>	<i>9042</i>	<i>8315</i>	<i>7675</i>					
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	11603	7048	6026	5043	4691	4176	3845	3460					
	auswertbar	Anzahl	11599	7041	6021	5040	4689	4173	3844	3458					
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	3293	2086	1780	1454	1377	1211	1109	962					
		Anteil in %	28,39	29,63	29,56	28,85	29,37	29,02	28,85	27,82					
	CI Anteil in %	[27,57; 29,21]	[28,56; 30,69]	[28,41; 30,72]	[27,60; 30,10]	[28,06; 30,67]	[27,64; 30,40]	[27,42; 30,28]	[26,33; 29,31]						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>24790</i>	<i>21495</i>	<i>19034</i>	<i>17109</i>	<i>15623</i>	<i>14504</i>	<i>13533</i>	<i>12641</i>						
2009-2	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5894	3377	2665	2295	1938	1753	1509						
	auswertbar	Anzahl	5889	3376	2661	2291	1936	1750	1506						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1712	1048	796	702	580	506	431						
		Anteil in %	29,07	31,04	29,91	30,64	29,96	28,91	28,62						
		CI Anteil in %	[27,91; 30,23]	[29,48; 32,60]	[28,17; 31,65]	[28,75; 32,53]	[27,92; 32,00]	[26,79; 31,04]	[26,34; 30,90]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14497</i>	<i>12223</i>	<i>10428</i>	<i>9120</i>	<i>8215</i>	<i>7433</i>	<i>6818</i>						
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	9215	5882	4661	4190	3692	3377	2925						
	auswertbar	Anzahl	9210	5878	4659	4188	3691	3376	2924						
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2545	1709	1320	1146	1031	984	834						
		Anteil in %	27,63	29,07	28,33	27,36	27,93	29,15	28,52						
	CI Anteil in %	[26,72; 28,55]	[27,91; 30,24]	[27,04; 29,63]	[26,01; 28,71]	[26,49; 29,38]	[27,61; 30,68]	[26,89; 30,16]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21009</i>	<i>18292</i>	<i>15990</i>	<i>14223</i>	<i>13005</i>	<i>11960</i>	<i>11125</i>							
2010-1	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	6537	3582	3054	2467	2220	1935							
	auswertbar	Anzahl	6530	3581	3052	2465	2220	1934							
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2008	1145	971	798	699	605							
		Anteil in %	30,75	31,97	31,82	32,37	31,49	31,28							
		CI Anteil in %	[29,63; 31,87]	[30,45; 33,50]	[30,16; 33,47]	[30,53; 34,22]	[29,55; 33,42]	[29,22; 33,35]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15873</i>	<i>13359</i>	<i>11434</i>	<i>10103</i>	<i>9127</i>	<i>8281</i>							
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	10278	6123	5290	4489	4105	3575							
	auswertbar	Anzahl	10266	6117	5287	4486	4101	3573							
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	3020	1851	1575	1340	1227	1073							
		Anteil in %	29,42	30,26	29,79	29,87	29,92	30,03							
	CI Anteil in %	[28,54; 30,30]	[29,11; 31,41]	[28,56; 31,02]	[28,53; 31,21]	[28,52; 31,32]	[28,53; 31,53]								
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23098</i>	<i>20031</i>	<i>17512</i>	<i>15713</i>	<i>14383</i>	<i>13236</i>								

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2010-2	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5828	3403	2692	2277	1905									
	auswertbar	Anzahl	5822	3399	2688	2275	1903									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1824	1106	891	750	630									
		Anteil in %	31,33	32,54	33,15	32,97	33,11									
		CI Anteil in %	[30,14; 32,52]	[30,96; 34,11]	[31,37; 34,93]	[31,03; 34,90]	[30,99; 35,22]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14957</i>	<i>12589</i>	<i>10832</i>	<i>9524</i>	<i>8568</i>									
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	9028	5784	4627	4119	3441									
	auswertbar	Anzahl	9021	5779	4623	4116	3440									
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2562	1675	1351	1250	1034									
		Anteil in %	28,40	28,98	29,22	30,37	30,06									
CI Anteil in %		[27,47; 29,33]	[27,81; 30,15]	[27,91; 30,53]	[28,96; 31,77]	[28,53; 31,59]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21727</i>	<i>18792</i>	<i>16595</i>	<i>14874</i>	<i>13579</i>										
2011-1	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	6140	3334	2717	2219										
	auswertbar	Anzahl	6139	3333	2717	2218										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1762	1064	885	702										
		Anteil in %	28,70	31,92	32,57	31,65										
		CI Anteil in %	[27,57; 29,83]	[30,34; 33,51]	[30,81; 34,34]	[29,71; 33,59]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15409</i>	<i>12971</i>	<i>11106</i>	<i>9678</i>										
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	10061	6078	5222	4398										
	auswertbar	Anzahl	10051	6073	5219	4397										
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2844	1773	1578	1314										
		Anteil in %	28,30	29,19	30,24	29,88										
CI Anteil in %		[27,42; 29,18]	[28,05; 30,34]	[28,99; 31,48]	[28,53; 31,24]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23197</i>	<i>20078</i>	<i>17696</i>	<i>15845</i>											
2011-2	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5212	3037	2386											
	auswertbar	Anzahl	5207	3032	2379											
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1549	966	760											
		Anteil in %	29,75	31,86	31,95											
		CI Anteil in %	[28,51; 30,99]	[30,20; 33,52]	[30,07; 33,82]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14050</i>	<i>11811</i>	<i>10082</i>											
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	8363	5265	4288											
	auswertbar	Anzahl	8356	5263	4284											
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2376	1638	1373											
		Anteil in %	28,43	31,12	32,05											
CI Anteil in %		[27,47; 29,40]	[29,87; 32,37]	[30,65; 33,45]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20513</i>	<i>17841</i>	<i>15614</i>												

EZ	Patienten mit schwerer Beschwerdesymptomatik, die nicht mit inhalativen Glukokortikosteroiden als Dauermedikation behandelt werden	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5841	3181												
	auswertbar	Anzahl	5835	3179												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1791	1058												
		Anteil in %	30,69	33,28												
		CI Anteil in %	[29,51; 31,88]	[31,64; 34,92]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16002</i>	<i>13484</i>												
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	9492	5743												
	auswertbar	Anzahl	9477	5736												
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2727	1836												
		Anteil in %	28,77	32,01												
	CI Anteil in %	[27,86; 29,69]	[30,80; 33,22]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23844</i>	<i>20669</i>													
2012-2	männliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5230													
	auswertbar	Anzahl	5227													
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	1639													
		Anteil in %	31,36													
		CI Anteil in %	[30,10; 32,61]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14102</i>													
	weibliche Pat. mit täglicher oder wöchentlicher Asthmasymptomatik	Anzahl	8289													
	auswertbar	Anzahl	8280													
	ohne inhalative Glukokortikosteroide als Dauermedikation	Anzahl	2458													
		Anteil in %	29,69													
	CI Anteil in %	[28,70; 30,67]														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20545</i>														

3.5 Prozessparameter

Nicht-medikamentöse Maßnahmen ergänzen die medikamentöse Asthmatherapie. In diesem Kapitel werden tabellarische Auswertungen zu den folgenden nicht medikamentösen Behandlungsmaßnahmen oder Prozessparametern dargestellt: Patientenschulungen, Asthma-Selbstmanagementplan, die jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik sowie Empfehlung zum Tabakverzicht.

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Asthma sollten Patientenschulungen Bestandteil einer jeden Therapie sein. Eine Patientenschulung sorgt für ein theoretisches Verständnis und schult den praktischen Umgang mit einer asthmatischen Erkrankung. Ziel ist es, den Patienten in die Lage zu versetzen, aktiv an der Bewältigung seiner Erkrankung mitzuwirken. Im Falle von Asthma ist es dafür erforderlich, dass der Patient ein so genanntes Asthma-Selbstmanagement erlernt. Das beinhaltet die Selbstkontrolle der Erkrankung mit dem Peak-Flow-Meter, die Führung eines Asthma-Tagebuchs sowie die selbständige (ärztlich kontrollierte) Anpassung der Medikation an den jeweiligen Schweregrad der Beschwerden.

Rein praktisch hängt die Kontrolle der Asthmabeschwerden davon ab, ob Patienten ihren Inhalator richtig bedienen können und die Bereitstellung der Wirkstoffdosis und das Einatmen richtig koordinieren können. Es sind verschiedene Inhalationssys-

teme im Handel und das Vorgehen bei der Inhalation ist abhängig vom verwendeten Gerätetyp. Daher ist es wichtig, dass die Inhalationstechnik des Patienten regelmäßig durch den Arzt überprüft wird. Da Tabakrauch Asthmabeschwerden verschlimmern kann, gehört eine Empfehlung zum Tabakverzicht durch den Arzt unbedingt zur Asthmatherapie.

In der Tabelle 3.5.1 ist für die jeweiligen Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlenen Asthma-Schulung** teilgenommen haben, aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten oder nicht teilgenommen haben. Für das Beitrittsjahr können mangels einer vorherigen Dokumentation keine Werte ausgewiesen werden. Zunächst wird unter „männliche bzw. weibliche Patienten mit empfohlener Asthmaschulung“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Asthmaschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Asthmaschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

Tabelle 3.5.1 Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen

* „Auswertbar“ sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	398	313	247	192	153	113	105	92	83	66	67	57	49	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	101	76	70	60	59	51	48	44	41	32	34	25	22	
		Anteil in %	25,38	24,28	28,34	31,25	38,56	45,13	45,71	47,83	49,40	48,48	50,75	43,86	44,90	
		CI Anteil in %	[21,10; 29,66]	[19,52; 29,04]	[22,71; 33,97]	[24,68; 37,82]	[30,82; 46,30]	[35,92; 54,35]	[36,14; 55,29]	[37,56; 58,09]	[38,58; 60,22]	[36,34; 60,63]	[38,68; 62,81]	[30,86; 56,86]	[30,83; 58,97]	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	143	117	86	59	60	48	42	35	29	25	25	23	16	
		Anteil in %	35,93	37,38	34,82	30,73	39,22	42,48	40,00	38,04	34,94	37,88	37,31	40,35	32,65	
		CI Anteil in %	[31,21; 40,65]	[32,01; 42,75]	[28,86; 40,77]	[24,19; 37,27]	[31,45; 46,98]	[33,32; 51,63]	[30,58; 49,42]	[28,07; 48,02]	[24,62; 45,26]	[26,09; 49,67]	[25,65; 48,98]	[27,50; 53,20]	[19,39; 45,92]	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	154	120	91	73	34	14	15	13	13	9	8	9	11	
		Anteil in %	38,69	38,34	36,84	38,02	22,22	12,39	14,29	14,13	15,66	13,64	11,94	15,79	22,45	
		CI Anteil in %	[33,90; 43,48]	[32,94; 43,73]	[30,81; 42,87]	[31,14; 44,91]	[15,61; 28,83]	[6,29; 18,49]	[7,56; 21,01]	[6,97; 21,29]	[7,80; 23,53]	[5,29; 21,98]	[4,12; 19,76]	[6,24; 25,34]	[10,65; 34,25]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>886</i>	<i>840</i>	<i>758</i>	<i>699</i>	<i>650</i>	<i>611</i>	<i>569</i>	<i>525</i>	<i>503</i>	<i>465</i>	<i>442</i>	<i>417</i>	<i>391</i>	<i>370</i>
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	555	441	329	287	252	189	161	154	144	115	105	110	95	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	116	130	93	87	113	86	83	76	79	55	56	56	53	
		Anteil in %	20,90	29,48	28,27	30,31	44,84	45,50	51,55	49,35	54,86	47,83	53,33	50,91	55,79	
		CI Anteil in %	[17,52; 24,29]	[25,22; 33,74]	[23,39; 33,14]	[24,99; 35,64]	[38,69; 50,99]	[38,38; 52,62]	[43,81; 59,30]	[41,43; 57,27]	[46,70; 63,02]	[38,66; 57,00]	[43,75; 62,92]	[41,52; 60,29]	[45,75; 65,83]	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	170	119	87	74	91	70	62	59	49	46	38	34	34	
		Anteil in %	30,63	26,98	26,44	25,78	36,11	37,04	38,51	38,31	34,03	40,00	36,19	30,91	35,79	
		CI Anteil in %	[26,79; 34,47]	[22,84; 31,13]	[21,67; 31,22]	[20,71; 30,85]	[30,17; 42,05]	[30,13; 43,94]	[30,97; 46,05]	[30,61; 46,01]	[26,26; 41,79]	[31,01; 48,99]	[26,95; 45,43]	[22,23; 39,58]	[26,10; 45,48]	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	269	192	149	126	48	33	16	19	16	14	11	20	8	
		Anteil in %	48,47	43,54	45,29	43,90	19,05	17,46	9,94	12,34	11,11	12,17	10,48	18,18	8,42	
CI Anteil in %		[44,31; 52,63]	[38,90; 48,17]	[39,90; 50,68]	[38,15; 49,65]	[14,19; 23,91]	[12,03; 22,89]	[5,30; 14,57]	[7,13; 17,55]	[5,96; 16,26]	[6,17; 18,18]	[4,59; 16,36]	[10,94; 25,42]	[2,81; 14,04]		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1265</i>	<i>1215</i>	<i>1121</i>	<i>1045</i>	<i>998</i>	<i>960</i>	<i>919</i>	<i>874</i>	<i>832</i>	<i>796</i>	<i>755</i>	<i>727</i>	<i>702</i>	<i>681</i>	

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-2	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	3352	2336	1876	1442	1255	1087	939	851	771	714	652	573		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	872	707	666	599	560	558	529	487	464	418	401	359		
		Anteil in %	26,01	30,27	35,50	41,54	44,62	51,33	56,34	57,23	60,18	58,54	61,50	62,65		
		CI Anteil in %	[24,53; 27,50]	[28,40; 32,13]	[33,34; 37,67]	[39,00; 44,08]	[41,87; 47,37]	[48,36; 54,31]	[53,16; 59,51]	[53,90; 60,55]	[56,72; 63,64]	[54,93; 62,16]	[57,77; 65,24]	[58,69; 66,62]		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1112	652	443	423	426	323	248	213	188	173	160	136		
		Anteil in %	33,17	27,91	23,61	29,33	33,94	29,71	26,41	25,03	24,38	24,23	24,54	23,73		
		CI Anteil in %	[31,58; 34,77]	[26,09; 29,73]	[21,69; 25,54]	[26,98; 31,69]	[31,32; 36,57]	[27,00; 32,43]	[23,59; 29,23]	[22,12; 27,94]	[21,35; 27,42]	[21,08; 27,37]	[21,23; 27,85]	[20,25; 27,22]		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1368	977	767	420	269	206	162	151	119	123	91	78		
		Anteil in %	40,81	41,82	40,88	29,13	21,43	18,95	17,25	17,74	15,43	17,23	13,96	13,61		
		CI Anteil in %	[39,15; 42,48]	[39,82; 43,82]	[38,66; 43,11]	[26,78; 31,47]	[19,16; 23,71]	[16,62; 21,28]	[14,83; 19,67]	[15,18; 20,31]	[12,88; 17,99]	[14,46; 20,00]	[11,29; 16,62]	[10,80; 16,42]		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7188</i>	<i>6656</i>	<i>6004</i>	<i>5530</i>	<i>5210</i>	<i>4908</i>	<i>4553</i>	<i>4243</i>	<i>3961</i>	<i>3720</i>	<i>3505</i>	<i>3316</i>	<i>3124</i>	
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	4856	3360	2756	2107	1770	1523	1324	1253	1159	1061	1000	926		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1275	1116	1011	926	806	772	730	674	659	617	572	539		
		Anteil in %	26,26	33,21	36,68	43,95	45,54	50,69	55,14	53,79	56,86	58,15	57,20	58,21		
		CI Anteil in %	[25,02; 27,49]	[31,62; 34,81]	[34,88; 38,48]	[41,83; 46,07]	[43,22; 47,86]	[48,18; 53,20]	[52,46; 57,82]	[51,03; 56,55]	[54,01; 59,71]	[55,18; 61,12]	[54,13; 60,27]	[55,03; 61,39]		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1536	892	656	583	519	412	338	307	285	247	256	229		
		Anteil in %	31,63	26,55	23,80	27,67	29,32	27,05	25,53	24,50	24,59	23,28	25,60	24,73		
		CI Anteil in %	[30,32; 32,94]	[25,05; 28,04]	[22,21; 25,39]	[25,76; 29,58]	[27,20; 31,44]	[24,82; 29,28]	[23,18; 27,88]	[22,12; 26,88]	[22,11; 27,07]	[20,74; 25,82]	[22,89; 28,31]	[21,95; 27,51]		
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	2045	1352	1089	598	445	339	256	272	215	197	172	158			
	Anteil in %	42,11	40,24	39,51	28,38	25,14	22,26	19,34	21,71	18,55	18,57	17,20	17,06			
	CI Anteil in %	[40,72; 43,50]	[38,58; 41,90]	[37,69; 41,34]	[26,46; 30,31]	[23,12; 27,16]	[20,17; 24,35]	[17,21; 21,46]	[19,42; 23,99]	[16,31; 20,79]	[16,23; 20,91]	[14,86; 19,54]	[14,64; 19,49]			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10299</i>	<i>9582</i>	<i>8748</i>	<i>8115</i>	<i>7728</i>	<i>7349</i>	<i>6948</i>	<i>6534</i>	<i>6165</i>	<i>5856</i>	<i>5542</i>	<i>5292</i>	<i>5053</i>		
2007-1	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	6625	4616	3345	2793	2394	2161	1970	1779	1618	1484	1325			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1729	1459	1381	1261	1192	1105	1028	962	842	809	733			
		Anteil in %	26,10	31,61	41,29	45,15	49,79	51,13	52,18	54,08	52,04	54,51	55,32			
		CI Anteil in %	[25,04; 27,16]	[30,27; 32,95]	[39,62; 42,95]	[43,30; 46,99]	[47,79; 51,79]	[49,03; 53,24]	[49,98; 54,39]	[51,76; 56,39]	[49,60; 54,47]	[51,98; 57,05]	[52,64; 58,00]			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2324	1502	1170	977	746	643	573	504	507	445	403			
		Anteil in %	35,08	32,54	34,98	34,98	31,16	29,75	29,09	28,33	31,33	29,99	30,42			
		CI Anteil in %	[33,93; 36,23]	[31,19; 33,89]	[33,36; 36,59]	[33,21; 36,75]	[29,31; 33,02]	[27,83; 31,68]	[27,08; 31,09]	[26,24; 30,43]	[29,07; 33,60]	[27,65; 32,32]	[27,94; 32,89]			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	2572	1655	794	555	456	413	369	313	269	230	189			
		Anteil in %	38,82	35,85	23,74	19,87	19,05	19,11	18,73	17,59	16,63	15,50	14,26			
		CI Anteil in %	[37,65; 40,00]	[34,47; 37,24]	[22,29; 25,18]	[18,39; 21,35]	[17,47; 20,62]	[17,45; 20,77]	[17,01; 20,45]	[15,82; 19,36]	[14,81; 18,44]	[13,66; 17,34]	[12,38; 16,15]			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14600</i>	<i>13199</i>	<i>11826</i>	<i>10856</i>	<i>10060</i>	<i>9253</i>	<i>8517</i>	<i>7968</i>	<i>7420</i>	<i>6962</i>	<i>6566</i>	<i>6136</i>		
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	10020	7301	5249	4265	3754	3421	3082	2820	2648	2431	2265			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2830	2477	2347	2118	2024	1863	1685	1565	1455	1355	1284			
		Anteil in %	28,24	33,93	44,71	49,66	53,92	54,46	54,67	55,50	54,95	55,74	56,69			
		CI Anteil in %	[27,36; 29,13]	[32,84; 35,01]	[43,37; 46,06]	[48,16; 51,16]	[52,32; 55,51]	[52,79; 56,13]	[52,91; 56,43]	[53,66; 57,33]	[53,05; 56,84]	[53,76; 57,71]	[54,65; 58,73]			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3369	2201	1732	1403	1111	961	871	782	766	699	679			
		Anteil in %	33,62	30,15	33,00	32,90	29,60	28,09	28,26	27,73	28,93	28,75	29,98			
		CI Anteil in %	[32,70; 34,55]	[29,09; 31,20]	[31,72; 34,27]	[31,49; 34,31]	[28,13; 31,06]	[26,58; 29,60]	[26,67; 29,85]	[26,08; 29,38]	[27,20; 30,65]	[26,95; 30,55]	[28,09; 31,87]			
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3821	2623	1170	744	619	597	526	473	427	377	302				
	Anteil in %	38,13	35,93	22,29	17,44	16,49	17,45	17,07	16,77	16,13	15,51	13,33				
	CI Anteil in %	[37,18; 39,08]	[34,83; 37,03]	[21,16; 23,42]	[16,31; 18,58]	[15,30; 17,68]	[16,18; 18,72]	[15,74; 18,40]	[15,39; 18,15]	[14,72; 17,53]	[14,07; 16,95]	[11,93; 14,73]				
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21994</i>	<i>20214</i>	<i>18440</i>	<i>17130</i>	<i>16006</i>	<i>14843</i>	<i>13864</i>	<i>13060</i>	<i>12315</i>	<i>11681</i>	<i>11095</i>	<i>10538</i>			

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2007-2	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	8309	4805	3795	3246	2798	2491	2141	1944	1757	1546				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2267	1759	1487	1401	1251	1171	1050	932	868	774				
		Anteil in %	27,28	36,61	39,18	43,16	44,71	47,01	49,04	47,94	49,40	50,06				
		CI Anteil in %	[26,33; 28,24]	[35,25; 37,97]	[37,63; 40,74]	[41,46; 44,87]	[42,87; 46,55]	[45,05; 48,97]	[46,92; 51,16]	[45,72; 50,16]	[47,06; 51,74]	[47,57; 52,56]				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2552	1764	1393	1139	956	787	686	653	571	489				
		Anteil in %	30,71	36,71	36,71	35,09	34,17	31,59	32,04	33,59	32,50	31,63				
		CI Anteil in %	[29,72; 31,71]	[35,35; 38,07]	[35,17; 38,24]	[33,45; 36,73]	[32,41; 35,92]	[29,77; 33,42]	[30,06; 34,02]	[31,49; 35,69]	[30,31; 34,69]	[29,31; 33,95]				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3490	1282	915	706	591	533	405	359	318	283				
		Anteil in %	42,00	26,68	24,11	21,75	21,12	21,40	18,92	18,47	18,10	18,31				
		CI Anteil in %	[40,94; 43,06]	[25,43; 27,93]	[22,75; 25,47]	[20,33; 23,17]	[19,61; 22,63]	[19,79; 23,01]	[17,26; 20,58]	[16,74; 20,19]	[16,30; 19,90]	[16,38; 20,23]				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>19270</i>	<i>17296</i>	<i>15667</i>	<i>14230</i>	<i>12848</i>	<i>11741</i>	<i>10874</i>	<i>10051</i>	<i>9328</i>	<i>8686</i>	<i>8054</i>			
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	11921	6986	5476	4629	4073	3691	3288	3016	2749	2530				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3490	2763	2461	2213	2030	1903	1716	1592	1500	1377				
		Anteil in %	29,28	39,55	44,94	47,81	49,84	51,56	52,19	52,79	54,57	54,43				
		CI Anteil in %	[28,46; 30,09]	[38,40; 40,70]	[43,62; 46,26]	[46,37; 49,25]	[48,30; 51,38]	[49,95; 53,17]	[50,48; 53,90]	[51,00; 54,57]	[52,70; 56,43]	[52,49; 56,37]				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3488	2427	1807	1476	1215	1035	903	855	792	714				
Anteil in %		29,26	34,74	33,00	31,89	29,83	28,04	27,46	28,35	28,81	28,22					
CI Anteil in %		[28,44; 30,08]	[33,62; 35,86]	[31,75; 34,24]	[30,54; 33,23]	[28,43; 31,24]	[26,59; 29,49]	[25,94; 28,99]	[26,74; 29,96]	[27,12; 30,50]	[26,47; 29,98]					
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4943	1796	1208	940	828	753	669	569	457	439					
	Anteil in %	41,46	25,71	22,06	20,31	20,33	20,40	20,35	18,87	16,62	17,35					
	CI Anteil in %	[40,58; 42,35]	[24,68; 26,73]	[20,96; 23,16]	[19,15; 21,47]	[19,09; 21,57]	[19,10; 21,70]	[18,97; 21,72]	[17,47; 20,26]	[15,23; 18,02]	[15,88; 18,83]					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>27267</i>	<i>25016</i>	<i>22959</i>	<i>21225</i>	<i>19373</i>	<i>17886</i>	<i>16675</i>	<i>15633</i>	<i>14734</i>	<i>13881</i>	<i>13091</i>				
2008-1	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	8423	5532	4313	3592	3003	2692	2370	2124	1897					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2577	2058	1821	1573	1444	1340	1185	1096	988					
		Anteil in %	30,59	37,20	42,22	43,79	48,09	49,78	50,00	51,60	52,08					
		CI Anteil in %	[29,61; 31,58]	[35,93; 38,48]	[40,75; 43,70]	[42,17; 45,41]	[46,30; 49,87]	[47,89; 51,67]	[47,99; 52,01]	[49,47; 53,73]	[49,83; 54,33]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3099	2125	1540	1255	941	813	711	640	533					
		Anteil in %	36,79	38,41	35,71	34,94	31,34	30,20	30,00	30,13	28,10					
		CI Anteil in %	[35,76; 37,82]	[37,13; 39,69]	[34,28; 37,14]	[33,38; 36,50]	[29,68; 32,99]	[28,47; 31,94]	[28,15; 31,85]	[28,18; 32,08]	[26,07; 30,12]					
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	2747	1349	952	764	618	539	474	388	376					
		Anteil in %	32,61	24,39	22,07	21,27	20,58	20,02	20,00	18,27	19,82					
		CI Anteil in %	[31,61; 33,61]	[23,25; 25,52]	[20,83; 23,31]	[19,93; 22,61]	[19,13; 22,03]	[18,51; 21,53]	[18,39; 21,61]	[16,62; 19,91]	[18,03; 21,62]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23420</i>	<i>21116</i>	<i>19060</i>	<i>16520</i>	<i>14815</i>	<i>13543</i>	<i>12414</i>	<i>11469</i>	<i>10651</i>	<i>9888</i>				
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	12318	7897	6223	5241	4533	4082	3607	3293	3020					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3992	3152	2774	2465	2236	2040	1820	1676	1531					
		Anteil in %	32,41	39,91	44,58	47,03	49,33	49,98	50,46	50,90	50,70					
		CI Anteil in %	[31,58; 33,23]	[38,83; 40,99]	[43,34; 45,81]	[45,68; 48,38]	[47,87; 50,78]	[48,44; 51,51]	[48,83; 52,09]	[49,19; 52,60]	[48,91; 52,48]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4377	2895	2102	1664	1330	1179	1052	958	867					
Anteil in %		35,53	36,66	33,78	31,75	29,34	28,88	29,17	29,09	28,71						
CI Anteil in %		[34,69; 36,38]	[35,60; 37,72]	[32,60; 34,95]	[30,49; 33,01]	[28,01; 30,67]	[27,49; 30,27]	[27,68; 30,65]	[27,54; 30,64]	[27,09; 30,32]						
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3949	1850	1347	1112	967	863	735	659	622						
	Anteil in %	32,06	23,43	21,65	21,22	21,33	21,14	20,38	20,01	20,60						
	CI Anteil in %	[31,23; 32,88]	[22,49; 24,36]	[20,62; 22,67]	[20,11; 22,32]	[20,14; 22,53]	[19,89; 22,39]	[19,06; 21,69]	[18,65; 21,38]	[19,15; 22,04]						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>33796</i>	<i>31063</i>	<i>28290</i>	<i>25054</i>	<i>22840</i>	<i>21065</i>	<i>19655</i>	<i>18394</i>	<i>17298</i>	<i>16308</i>					

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2008-2	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	6810	4972	3886	3263	2956	2577	2290	2045						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2287	1924	1714	1515	1441	1265	1155	1076						
		Anteil in %	33,58	38,70	44,11	46,43	48,75	49,09	50,44	52,62						
		CI Anteil in %	[32,46; 34,70]	[37,34; 40,05]	[42,55; 45,67]	[44,72; 48,14]	[46,95; 50,55]	[47,16; 51,02]	[48,39; 52,48]	[50,45; 54,78]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3052	2040	1445	1128	961	821	729	599						
		Anteil in %	44,82	41,03	37,18	34,57	32,51	31,86	31,83	29,29						
		CI Anteil in %	[43,64; 46,00]	[39,66; 42,40]	[35,67; 38,70]	[32,94; 36,20]	[30,82; 34,20]	[30,06; 33,66]	[29,93; 33,74]	[27,32; 31,26]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1471	1008	727	620	554	491	406	370						
		Anteil in %	21,60	20,27	18,71	19,00	18,74	19,05	17,73	18,09						
		CI Anteil in %	[20,62; 22,58]	[19,16; 21,39]	[17,48; 19,93]	[17,65; 20,35]	[17,33; 20,15]	[17,54; 20,57]	[16,16; 19,29]	[16,42; 19,76]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21334</i>	<i>18950</i>	<i>16531</i>	<i>14720</i>	<i>13457</i>	<i>12343</i>	<i>11470</i>	<i>10717</i>	<i>10023</i>					
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	10478	7646	5860	5030	4458	3942	3658	3242						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3760	3273	2782	2450	2299	2102	1998	1781						
		Anteil in %	35,88	42,81	47,47	48,71	51,57	53,32	54,62	54,94						
		CI Anteil in %	[34,97; 36,80]	[41,70; 43,92]	[46,20; 48,75]	[47,33; 50,09]	[50,10; 53,04]	[51,77; 54,88]	[53,01; 56,23]	[53,22; 56,65]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4592	3015	2035	1646	1356	1124	1009	892						
		Anteil in %	43,83	39,43	34,73	32,72	30,42	28,51	27,58	27,51						
CI Anteil in %		[42,88; 44,78]	[38,34; 40,53]	[33,51; 35,95]	[31,43; 34,02]	[29,07; 31,77]	[27,10; 29,92]	[26,13; 29,03]	[25,98; 29,05]							
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	2126	1358	1043	934	803	716	651	569							
	Anteil in %	20,29	17,76	17,80	18,57	18,01	18,16	17,80	17,55							
	CI Anteil in %	[19,52; 21,06]	[16,90; 18,62]	[16,82; 18,78]	[17,49; 19,64]	[16,88; 19,14]	[16,96; 19,37]	[16,56; 19,04]	[16,24; 18,86]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31852</i>	<i>28706</i>	<i>25549</i>	<i>23236</i>	<i>21376</i>	<i>19866</i>	<i>18668</i>	<i>17513</i>	<i>16502</i>						
2009-1	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	5143	3633	2921	2500	2223	1932	1684							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1974	1463	1319	1187	1072	955	879							
		Anteil in %	38,38	40,27	45,16	47,48	48,22	49,43	52,20							
		CI Anteil in %	[37,05; 39,71]	[38,67; 41,86]	[43,35; 46,96]	[45,52; 49,44]	[46,15; 50,30]	[47,20; 51,66]	[49,81; 54,58]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2140	1422	1063	844	727	638	541							
		Anteil in %	41,61	39,14	36,39	33,76	32,70	33,02	32,13							
		CI Anteil in %	[40,26; 42,96]	[37,55; 40,73]	[34,65; 38,14]	[31,91; 35,61]	[30,75; 34,65]	[30,93; 35,12]	[29,89; 34,36]							
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1029	748	539	469	424	339	264							
		Anteil in %	20,01	20,59	18,45	18,76	19,07	17,55	15,68							
		CI Anteil in %	[18,91; 21,10]	[19,27; 21,90]	[17,05; 19,86]	[17,23; 20,29]	[17,44; 20,71]	[15,85; 19,24]	[13,94; 17,41]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>17143</i>	<i>14539</i>	<i>12566</i>	<i>11033</i>	<i>9913</i>	<i>9042</i>	<i>8315</i>	<i>7675</i>						
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	7524	5358	4387	3818	3381	2962	2648							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3151	2426	2075	1928	1781	1580	1480							
		Anteil in %	41,88	45,28	47,30	50,50	52,68	53,34	55,89							
		CI Anteil in %	[40,76; 42,99]	[43,95; 46,61]	[45,82; 48,78]	[48,91; 52,08]	[50,99; 54,36]	[51,55; 55,14]	[54,00; 57,78]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3016	1918	1479	1167	962	851	715							
		Anteil in %	40,09	35,80	33,71	30,57	28,45	28,73	27,00							
CI Anteil in %		[38,98; 41,19]	[34,51; 37,08]	[32,31; 35,11]	[29,10; 32,03]	[26,93; 29,97]	[27,10; 30,36]	[25,31; 28,69]								
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1357	1014	833	723	638	531	453								
	Anteil in %	18,04	18,92	18,99	18,94	18,87	17,93	17,11								
	CI Anteil in %	[17,17; 18,90]	[17,88; 19,97]	[17,83; 20,15]	[17,69; 20,18]	[17,55; 20,19]	[16,55; 19,31]	[15,67; 18,54]								
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>24790</i>	<i>21495</i>	<i>19034</i>	<i>17109</i>	<i>15623</i>	<i>14504</i>	<i>13533</i>	<i>12641</i>							

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	
2009-2	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	4294	3008	2426	2118	1772	1577								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1721	1274	1107	979	875	829								
		Anteil in %	40,08	42,35	45,63	46,22	49,38	52,57								
		CI Anteil in %	[38,61; 41,55]	[40,59; 44,12]	[43,65; 47,61]	[44,10; 48,35]	[47,05; 51,71]	[50,10; 55,03]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1717	1112	832	703	567	457								
		Anteil in %	39,99	36,97	34,30	33,19	32,00	28,98								
		CI Anteil in %	[38,52; 41,45]	[35,24; 38,69]	[32,41; 36,18]	[31,19; 35,20]	[29,83; 34,17]	[26,74; 31,22]								
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	856	622	487	436	330	291								
		Anteil in %	19,93	20,68	20,07	20,59	18,62	18,45								
		CI Anteil in %	[18,74; 21,13]	[19,23; 22,13]	[18,48; 21,67]	[18,86; 22,31]	[16,81; 20,44]	[16,54; 20,37]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14497</i>	<i>12223</i>	<i>10428</i>	<i>9120</i>	<i>8215</i>	<i>7433</i>	<i>6818</i>							
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	6469	4552	3694	3156	2787	2528								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2755	2062	1775	1595	1428	1365								
		Anteil in %	42,59	45,30	48,05	50,54	51,24	54,00								
		CI Anteil in %	[41,38; 43,79]	[43,85; 46,75]	[46,44; 49,66]	[48,79; 52,28]	[49,38; 53,09]	[52,05; 55,94]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2476	1635	1192	935	824	700								
		Anteil in %	38,27	35,92	32,27	29,63	29,57	27,69								
		CI Anteil in %	[37,09; 39,46]	[34,52; 37,31]	[30,76; 33,78]	[28,03; 31,22]	[27,87; 31,26]	[25,95; 29,43]								
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1238	855	727	626	535	463									
	Anteil in %	19,14	18,78	19,68	19,84	19,20	18,31									
	CI Anteil in %	[18,18; 20,10]	[17,65; 19,92]	[18,40; 20,96]	[18,44; 21,23]	[17,73; 20,66]	[16,81; 19,82]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21009</i>	<i>18292</i>	<i>15990</i>	<i>14223</i>	<i>13005</i>	<i>11960</i>	<i>11125</i>								
2010-1	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	4571	3232	2588	2184	1933									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1896	1431	1191	1055	999									
		Anteil in %	41,48	44,28	46,02	48,31	51,68									
		CI Anteil in %	[40,05; 42,91]	[42,56; 45,99]	[44,10; 47,94]	[46,21; 50,40]	[49,45; 53,91]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1810	1165	863	726	587									
		Anteil in %	39,60	36,05	33,35	33,24	30,37									
		CI Anteil in %	[38,18; 41,02]	[34,39; 37,70]	[31,53; 35,16]	[31,27; 35,22]	[28,32; 32,42]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	865	636	534	403	347									
		Anteil in %	18,92	19,68	20,63	18,45	17,95									
		CI Anteil in %	[17,79; 20,06]	[18,31; 21,05]	[19,07; 22,19]	[16,83; 20,08]	[16,24; 19,66]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15873</i>	<i>13359</i>	<i>11434</i>	<i>10103</i>	<i>9127</i>	<i>8281</i>								
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	6934	4846	4037	3424	3023									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3085	2217	1965	1744	1591									
		Anteil in %	44,49	45,75	48,67	50,93	52,63									
		CI Anteil in %	[43,32; 45,66]	[44,35; 47,15]	[47,13; 50,22]	[49,26; 52,61]	[50,85; 54,41]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2617	1708	1304	1078	893									
		Anteil in %	37,74	35,25	32,30	31,48	29,54									
		CI Anteil in %	[36,60; 38,88]	[33,90; 36,59]	[30,86; 33,74]	[29,93; 33,04]	[27,91; 31,17]									
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1232	921	768	602	539										
	Anteil in %	17,77	19,01	19,02	17,58	17,83										
	CI Anteil in %	[16,87; 18,67]	[17,90; 20,11]	[17,81; 20,23]	[16,31; 18,86]	[16,47; 19,19]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23098</i>	<i>20031</i>	<i>17512</i>	<i>15713</i>	<i>14383</i>	<i>13236</i>									

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	4193	2888	2326	1979										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1733	1265	1067	923										
		Anteil in %	41,33	43,80	45,87	46,64										
		CI Anteil in %	[39,84; 42,82]	[41,99; 45,61]	[43,85; 47,90]	[44,44; 48,84]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1614	1038	830	679										
		Anteil in %	38,49	35,94	35,68	34,31										
		CI Anteil in %	[37,02; 39,97]	[34,19; 37,69]	[33,74; 37,63]	[32,22; 36,40]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	846	585	429	377										
		Anteil in %	20,18	20,26	18,44	19,05										
		CI Anteil in %	[18,96; 21,39]	[18,79; 21,72]	[16,87; 20,02]	[17,32; 20,78]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14957</i>	<i>12589</i>	<i>10832</i>	<i>9524</i>	<i>8568</i>									
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	6257	4385	3662	3189										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2891	2137	1856	1670										
		Anteil in %	46,20	48,73	50,68	52,37										
		CI Anteil in %	[44,97; 47,44]	[47,25; 50,21]	[49,06; 52,30]	[50,63; 54,10]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2257	1395	1165	955										
		Anteil in %	36,07	31,81	31,81	29,95										
		CI Anteil in %	[34,88; 37,26]	[30,43; 33,19]	[30,30; 33,32]	[28,36; 31,54]										
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1109	853	641	564											
	Anteil in %	17,72	19,45	17,50	17,69											
	CI Anteil in %	[16,78; 18,67]	[18,28; 20,62]	[16,27; 18,74]	[16,36; 19,01]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21727</i>	<i>18792</i>	<i>16595</i>	<i>14874</i>	<i>13579</i>										
2011-1	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	4378	3083	2423											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1830	1378	1157											
		Anteil in %	41,80	44,70	47,75											
		CI Anteil in %	[40,34; 43,26]	[42,94; 46,45]	[45,76; 49,74]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1694	1116	835											
		Anteil in %	38,69	36,20	34,46											
		CI Anteil in %	[37,25; 40,14]	[34,50; 37,90]	[32,57; 36,35]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	854	589	431											
		Anteil in %	19,51	19,10	17,79											
		CI Anteil in %	[18,33; 20,68]	[17,72; 20,49]	[16,26; 19,31]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15409</i>	<i>12971</i>	<i>11106</i>	<i>9678</i>										
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl	6497	4746	3888											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3073	2315	2050											
		Anteil in %	47,30	48,78	52,73											
		CI Anteil in %	[46,08; 48,51]	[47,36; 50,20]	[51,16; 54,30]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2281	1573	1217											
		Anteil in %	35,11	33,14	31,30											
		CI Anteil in %	[33,95; 36,27]	[31,80; 34,48]	[29,84; 32,76]											
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1143	858	621												
	Anteil in %	17,59	18,08	15,97												
	CI Anteil in %	[16,67; 18,52]	[16,98; 19,17]	[14,82; 17,12]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23197</i>	<i>20078</i>	<i>17696</i>	<i>15845</i>											

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2011-2	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		3997	2753											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		1658	1208											
		Anteil in %			41,48	43,88										
		CI Anteil in %			[39,95; 43,01]	[42,03; 45,73]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		1620	1094											
		Anteil in %			40,53	39,74										
		CI Anteil in %			[39,01; 42,05]	[37,91; 41,57]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		719	451											
		Anteil in %			17,99	16,38										
		CI Anteil in %			[16,80; 19,18]	[15,00; 17,76]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14050</i>	<i>11811</i>	<i>10082</i>											
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		5898	4271											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		2598	2004											
		Anteil in %			44,05	46,92										
		CI Anteil in %			[42,78; 45,32]	[45,42; 48,42]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		2264	1530											
Anteil in %				38,39	35,82											
CI Anteil in %				[37,14; 39,63]	[34,38; 37,26]											
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		1036	737												
	Anteil in %			17,57	17,26											
	CI Anteil in %			[16,59; 18,54]	[16,12; 18,39]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20513</i>	<i>17841</i>	<i>15614</i>												
2012-1	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		4187												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		1745												
		Anteil in %			41,68											
		CI Anteil in %			[40,18; 43,17]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		1666												
		Anteil in %			39,79											
		CI Anteil in %			[38,31; 41,27]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		776												
		Anteil in %			18,53											
		CI Anteil in %			[17,36; 19,71]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16002</i>	<i>13484</i>												
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl		6354												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		2776												
		Anteil in %			43,69											
		CI Anteil in %			[42,47; 44,91]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		2498												
Anteil in %				39,31												
CI Anteil in %				[38,11; 40,51]												
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		1080													
	Anteil in %			17,00												
	CI Anteil in %			[16,07; 17,92]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23844</i>	<i>20669</i>													

EZ	Patienten und ihre Teilnahme an empfohlenen Asthma-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-2	männl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14102</i>													
	weibl. Patienten mit empfohlener Asthma-Schulung (auswertbar)*	Anzahl														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl														
		Anteil in %														
CI Anteil in %																
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl															
	Anteil in %															
	CI Anteil in %															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20545</i>														

In der Tabelle 3.5.2 wird die **jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik** der Programmteilnehmer ausgewiesen. Die Auswertungen erfolgen also nicht im üblichen Halbjahresbezug. Da sich die Angaben aus der Erstdokumentation über einen unbestimmten Zeitraum erstrecken, können die Angaben des Beitrittsjahres nicht für die jährliche Betrachtungsweise verwendet werden. Der Jahresbezug wird folgendermaßen definiert: Eine Untersuchung im 1. bzw. 2. Auswertungsjahr gilt als gegeben, wenn eine Untersuchung im zweiten und/oder dritten Halbjahr dokumentiert ist bzw. im vierten und/oder fünften Halbjahr, etc. Betrachtet werden dabei alle Versicherten, die jeweils in beiden Halbjahren auswertbare Programmteilnehmer waren. Da eine

jährliche Auswertung vorgenommen werden soll, wird ausgewiesen, wie viele männliche bzw. weibliche Patienten in der zweiten Hälfte des untersuchten Jahreszeitraumes (zweites/drittes Halbjahr, viertes/fünftes Halbjahr, etc.) noch Programmteilnehmer waren. Patienten, die lediglich in der ersten Jahreshälfte im Programm waren, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird dargestellt, für wie viele der „auswertbaren“ Patienten bzw. welchen Anteil im interessierenden Jahreszeitraum (= aktuelles Halbjahrespaar) eine Überprüfung der Inhalationstechnik erfolgte.

Tabelle 3.5.2 Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik

EZ	Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Auswertungs-jahr	Im 2. Auswertungs-jahr	Im 3. Auswertungs-jahr	Im 4. Auswertungs-jahr	Im 5. Auswertungs-jahr	Im 6. Auswertungs-jahr	
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	886	758	650	569	503	442	391
	auswertbar	Anzahl		737	631	553	491	430	379
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		595	442	359	352	319	290
		Anteil in %		80,73	70,05	64,92	71,69	74,19	76,52
		CI Anteil in %		[77,88; 83,58]	[66,47; 73,62]	[60,94; 68,90]	[67,70; 75,68]	[70,04; 78,33]	[72,24; 80,79]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	1265	1121	998	919	832	755	702
	auswertbar	Anzahl		1089	984	901	820	728	681
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		846	678	598	599	556	519
Anteil in %			77,69	68,90	66,37	73,05	76,37	76,21	
	CI Anteil in %		[75,21; 80,16]	[66,01; 71,80]	[63,28; 69,46]	[70,01; 76,09]	[73,29; 79,46]	[73,01; 79,41]	
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7188	6004	5210	4553	3961	3505	3124
	auswertbar	Anzahl		5734	4892	4348	3796	3347	2961
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		4543	3939	3295	3005	2753	2413
		Anteil in %		79,23	80,52	75,78	79,16	82,25	81,49
		CI Anteil in %		[78,18; 80,28]	[79,41; 81,63]	[74,51; 77,06]	[77,87; 80,45]	[80,96; 83,55]	[80,09; 82,89]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	10299	8748	7728	6948	6165	5542	5053
	auswertbar	Anzahl		8342	7310	6673	5953	5340	4849
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		6468	5758	4993	4652	4311	3904
Anteil in %			77,54	78,77	74,82	78,15	80,73	80,51	
	CI Anteil in %		[76,64; 78,43]	[77,83; 79,71]	[73,78; 75,87]	[77,10; 79,20]	[79,67; 81,79]	[79,40; 81,63]	
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14600	11826	10060	8517	7420	6566	
	auswertbar	Anzahl		10951	9153	8082	7005	6190	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		8802	6999	6275	5621	5010	
		Anteil in %		80,38	76,47	77,64	80,24	80,94	
		CI Anteil in %		[79,63; 81,12]	[75,60; 77,34]	[76,73; 78,55]	[79,31; 81,18]	[79,96; 81,92]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21994	18440	16006	13864	12315	11095	
	auswertbar	Anzahl		17116	14613	13078	11646	10530	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		13714	11138	10107	9266	8531	
Anteil in %			80,12	76,22	77,28	79,56	81,02		
	CI Anteil in %		[79,53; 80,72]	[75,53; 76,91]	[76,56; 78,00]	[78,83; 80,30]	[80,27; 81,77]		
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	19270	15667	12848	10874	9328	8054	
	auswertbar	Anzahl		14057	11977	10176	8756	7458	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		11718	9114	7959	6927	5919	
		Anteil in %		83,36	76,10	78,21	79,11	79,36	
		CI Anteil in %		[82,74; 83,98]	[75,33; 76,86]	[77,41; 79,02]	[78,26; 79,96]	[78,45; 80,28]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	27267	22959	19373	16675	14734	13091	
	auswertbar	Anzahl		20683	18115	15720	13860	12270	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		17172	13529	12167	10949	9729	
Anteil in %			83,02	74,68	77,40	79,00	79,29		
	CI Anteil in %		[82,51; 83,54]	[74,05; 75,32]	[76,74; 78,05]	[78,32; 79,68]	[78,57; 80,01]		

EZ	Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Auswertungs-jahr	Im 2. Auswertungs-jahr	Im 3. Auswertungs-jahr	Im 4. Auswertungs-jahr	Im 5. Auswertungs-jahr	Im 6. Auswertungs-jahr
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	23420	19060	14815	12414	10651	
	auswertbar	Anzahl		16630	13818	11616	9947	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		12881	10513	9021	7730	
		Anteil in %		77,46	76,08	77,66	77,71	
		CI Anteil in %		[76,82; 78,09]	[75,37; 76,79]	[76,90; 78,42]	[76,89; 78,53]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	33796	28290	22840	19655	17298	
	auswertbar	Anzahl		25030	21485	18560	16372	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		19137	15879	14103	12461	
		Anteil in %		76,46	73,91	75,99	76,11	
		CI Anteil in %		[75,93; 76,98]	[73,32; 74,49]	[75,37; 76,60]	[75,46; 76,76]	
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21334	16531	13457	11470	10023	
	auswertbar	Anzahl		15115	12537	10726	9285	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		11820	9803	8492	7368	
		Anteil in %		78,20	78,19	79,17	79,35	
		CI Anteil in %		[77,54; 78,86]	[77,47; 78,92]	[78,40; 79,94]	[78,53; 80,18]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	31852	25549	21376	18668	16502	
	auswertbar	Anzahl		23522	19957	17472	15331	
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		18480	15613	13775	12135	
		Anteil in %		78,56	78,23	78,84	79,15	
		CI Anteil in %		[78,04; 79,09]	[77,66; 78,81]	[78,23; 79,45]	[78,51; 79,80]	
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	17143	12566	9913	8315		
	auswertbar	Anzahl		11539	9217	7685		
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		9318	7450	6234		
		Anteil in %		80,75	80,83	81,12		
		CI Anteil in %		[80,03; 81,47]	[80,03; 81,63]	[80,24; 81,99]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	24790	19034	15623	13533		
	auswertbar	Anzahl		17626	14597	12645		
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		13939	11524	10101		
		Anteil in %		79,08	78,95	79,88		
		CI Anteil in %		[78,48; 79,68]	[78,29; 79,61]	[79,18; 80,58]		
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14497	10428	8215	6818		
	auswertbar	Anzahl		9549	7558	6270		
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		7681	6113	5075		
		Anteil in %		80,44	80,88	80,94		
		CI Anteil in %		[79,64; 81,23]	[79,99; 81,77]	[79,97; 81,91]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21009	15990	13005	11125		
	auswertbar	Anzahl		14730	12050	10218		
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		11827	9722	8235		
		Anteil in %		80,29	80,68	80,59		
		CI Anteil in %		[79,65; 80,93]	[79,98; 81,39]	[79,83; 81,36]		
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	11434	9127			
	auswertbar	Anzahl		10530	8408			
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		8542	6794			
		Anteil in %		81,12	80,80			
		CI Anteil in %		[80,37; 81,87]	[79,96; 81,65]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23098	17512	14383			
	auswertbar	Anzahl		16207	13377			
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		13054	10753			
		Anteil in %		80,55	80,38			
		CI Anteil in %		[79,94; 81,15]	[79,71; 81,06]			

EZ	Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Auswertungs-jahr	Im 2. Auswertungs-jahr	Im 3. Auswertungs-jahr	Im 4. Auswertungs-jahr	Im 5. Auswertungs-jahr	Im 6. Auswertungs-jahr
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14957	10832	8568			
	auswertbar	Anzahl		9884	7827			
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		8007	6290			
		Anteil in %		81,01	80,36			
		CI Anteil in %		[80,24; 81,78]	[79,48; 81,24]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21727	16595	13579			
	auswertbar	Anzahl		15302	12446			
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		12456	9975			
		Anteil in %		81,40	80,15			
		CI Anteil in %		[80,78; 82,02]	[79,45; 80,85]			
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15409	11106				
	auswertbar	Anzahl		10127				
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		8299				
		Anteil in %		81,95				
		CI Anteil in %		[81,20; 82,70]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23197	17696				
	auswertbar	Anzahl		16207				
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		13165				
		Anteil in %		81,23				
		CI Anteil in %		[80,63; 81,83]				
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14050	10082				
	auswertbar	Anzahl		9079				
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		7423				
		Anteil in %		81,76				
		CI Anteil in %		[80,97; 82,55]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20513	15614				
	auswertbar	Anzahl		14213				
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl		11562				
		Anteil in %		81,35				
		CI Anteil in %		[80,71; 81,99]				
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16002					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23844					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						
2012-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14102					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20545					
	auswertbar	Anzahl						
	Patienten mit Überprüfung der Inhalationstechnik im Auswertungsjahr	Anzahl						
		Anteil in %						
		CI Anteil in %						

In der Tabelle 3.5.3 wird die Erstellung eines **schriftlichen Selbstmanagementplans** und darin enthaltener Therapieziele für die Programmteilnehmer ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu die Gruppe der „männlichen bzw. weiblichen Patienten insgesamt“ angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird

ausgewiesen, für wie viele Patienten auswertbare Angaben vorliegen und für wie viele dieser „auswertbaren“ Patienten ein schriftlicher Selbstmanagementplan erstellt wurde oder die Erstellung eines schriftlichen Selbstmanagementsplans nicht durchführbar war. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Patienten angegeben.

Tabelle 3.5.3 Schriftlicher Selbstmanagementplan

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	auswertbar	Anzahl	886	816	748	686	634	599	558	519	493	457	434	408	382	360
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	310	384	346	334	308	310	284	277	280	262	248	234	235	213
		Anteil in %	34,99	47,06	46,26	48,69	48,58	51,75	50,90	53,37	56,80	57,33	57,14	57,35	61,52	59,17
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[31,85; 38,13]	[43,63; 50,49]	[42,68; 49,83]	[44,94; 52,43]	[44,69; 52,47]	[47,75; 55,76]	[46,74; 55,05]	[49,08; 57,67]	[52,42; 61,17]	[52,79; 61,87]	[52,48; 61,80]	[52,55; 62,16]	[56,63; 66,40]	[54,08; 64,25]
		Anzahl	76	58	51	44	36	26	17	15	16	15	11	11	13	12
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	8,58	7,11	6,82	6,41	5,68	4,34	3,05	2,89	3,25	3,28	2,53	2,70	3,40	3,33
		CI Anteil in %	[6,73; 10,42]	[5,34; 8,87]	[5,01; 8,63]	[4,58; 8,25]	[3,88; 7,48]	[2,71; 5,97]	[1,62; 4,47]	[1,45; 4,33]	[1,68; 4,81]	[1,65; 4,92]	[1,05; 4,01]	[1,12; 4,27]	[1,58; 5,22]	[1,48; 5,19]
	2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124
		auswertbar	Anzahl	7188	6452	5844	5372	4965	4720	4412	4137	3843	3609	3397	3202	2997
		mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2802	2912	2690	2564	2386	2432	2456	2390	2266	2175	2073	1982	1794
			Anteil in %	38,98	45,13	46,03	47,73	48,06	51,53	55,67	57,77	58,96	60,27	61,02	61,90	59,86
		nicht durchführbar	CI Anteil in %	[37,85; 40,11]	[43,92; 46,35]	[44,75; 47,31]	[46,39; 49,06]	[46,67; 49,45]	[50,10; 52,95]	[54,20; 57,13]	[56,27; 59,28]	[57,41; 60,52]	[58,67; 61,86]	[59,38; 62,66]	[60,22; 63,58]	[58,10; 61,62]
			Anzahl	537	531	433	383	340	252	213	218	180	174	158	154	157
weibliche Patienten insgesamt		Anteil in %	7,47	8,23	7,41	7,13	6,85	5,34	4,83	5,27	4,68	4,82	4,65	4,81	5,24	
		CI Anteil in %	[6,86; 8,08]	[7,56; 8,90]	[6,74; 8,08]	[6,44; 7,82]	[6,15; 7,55]	[4,70; 5,98]	[4,20; 5,46]	[4,59; 5,95]	[4,02; 5,35]	[4,12; 5,52]	[3,94; 5,36]	[4,07; 5,55]	[4,44; 6,04]	
2007-1		männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136	
		auswertbar	Anzahl	14600	12640	11262	10149	9569	8928	8216	7663	7147	6698	6329	5872	
		mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	6069	6232	5555	5124	4970	4876	4620	4447	4241	4046	3908	3634	
			Anteil in %	41,57	49,30	49,33	50,49	51,94	54,61	56,23	58,03	59,34	60,41	61,75	61,89	
		nicht durchführbar	CI Anteil in %	[40,77; 42,37]	[48,43; 50,18]	[48,40; 50,25]	[49,51; 51,46]	[50,94; 52,94]	[53,58; 55,65]	[55,16; 57,30]	[56,93; 59,14]	[58,20; 60,48]	[59,23; 61,58]	[60,55; 62,94]	[60,64; 63,13]	
			Anzahl	1082	1054	825	714	578	474	381	333	300	278	266	254	
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	7,41	8,34	7,33	7,04	6,04	5,31	4,64	4,35	4,20	4,15	4,20	4,33		
		CI Anteil in %	[6,99; 7,84]	[7,86; 8,82]	[6,84; 7,81]	[6,54; 7,53]	[5,56; 6,52]	[4,84; 5,77]	[4,18; 5,09]	[3,89; 4,80]	[3,73; 4,66]	[3,67; 4,63]	[3,71; 4,70]	[3,81; 4,85]		
	2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538	
		auswertbar	Anzahl	21994	19406	17594	16019	15252	14301	13350	12575	11922	11313	10727	10109	
		mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	8659	9117	8306	7659	7626	7514	7279	7088	6907	6679	6386	6128	
			Anteil in %	39,37	46,98	47,21	47,81	50,00	52,54	54,52	56,37	57,93	59,04	59,53	60,62	
		nicht durchführbar	CI Anteil in %	[38,72; 40,02]	[46,28; 47,68]	[46,47; 47,95]	[47,04; 48,59]	[49,21; 50,79]	[51,72; 53,36]	[53,68; 55,37]	[55,50; 57,23]	[57,05; 58,82]	[58,13; 59,94]	[58,60; 60,46]	[59,67; 61,57]	
			Anzahl	1687	1674	1331	1205	1014	773	671	631	595	535	512	483	
weibliche Patienten insgesamt		Anteil in %	7,67	8,63	7,57	7,52	6,65	5,41	5,03	5,02	4,99	4,73	4,77	4,78		
		CI Anteil in %	[7,32; 8,02]	[8,23; 9,02]	[7,17; 7,96]	[7,11; 7,93]	[6,25; 7,04]	[5,03; 5,78]	[4,66; 5,40]	[4,64; 5,40]	[4,60; 5,38]	[4,34; 5,12]	[4,37; 5,18]	[4,36; 5,19]		

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054		
	auswertbar	Anzahl	19270	16467	14474	13364	12298	11259	10395	9622	8988	8290	7638		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	8200	8075	7085	6672	6518	6063	5798	5440	5150	4810	4428		
		Anteil in %	42,55	49,04	48,95	49,93	53,00	53,85	55,78	56,54	57,30	58,02	57,97		
		CI Anteil in %	[41,86; 43,25]	[48,27; 49,80]	[48,14; 49,76]	[49,08; 50,77]	[52,12; 53,88]	[52,93; 54,77]	[54,82; 56,73]	[55,55; 57,53]	[56,28; 58,32]	[56,96; 59,08]	[56,87; 59,08]		
	nicht durchführbar	Anzahl	1444	1300	1011	823	704	616	555	466	427	378	369		
		Anteil in %	7,49	7,89	6,98	6,16	5,72	5,47	5,34	4,84	4,75	4,56	4,83		
		CI Anteil in %	[7,12; 7,87]	[7,48; 8,31]	[6,57; 7,40]	[5,75; 6,57]	[5,31; 6,14]	[5,05; 5,89]	[4,91; 5,77]	[4,41; 5,27]	[4,31; 5,19]	[4,11; 5,01]	[4,35; 5,31]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091		
	auswertbar	Anzahl	27267	23812	21330	20056	18574	17193	16064	15048	14185	13337	12539		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	11043	11125	9984	9533	9421	8965	8572	8165	7752	7407	7000		
		Anteil in %	40,50	46,72	46,81	47,53	50,72	52,14	53,36	54,26	54,65	55,54	55,83		
		CI Anteil in %	[39,92; 41,08]	[46,09; 47,35]	[46,14; 47,48]	[46,84; 48,22]	[50,00; 51,44]	[51,40; 52,89]	[52,59; 54,13]	[53,46; 55,06]	[53,83; 55,47]	[54,69; 56,38]	[54,96; 56,70]		
	nicht durchführbar	Anzahl	2053	1912	1527	1286	1081	958	879	794	754	724	670		
Anteil in %		7,53	8,03	7,16	6,41	5,82	5,57	5,47	5,28	5,32	5,43	5,34			
CI Anteil in %		[7,22; 7,84]	[7,68; 8,37]	[6,81; 7,50]	[6,07; 6,75]	[5,48; 6,16]	[5,23; 5,91]	[5,12; 5,82]	[4,92; 5,63]	[4,95; 5,68]	[5,04; 5,81]	[4,95; 5,74]			
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888			
	auswertbar	Anzahl	23419	19332	17627	15700	14154	12924	11892	10998	10163	9379			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	9273	8899	7913	7560	7037	6594	6200	5742	5402	5008			
		Anteil in %	39,60	46,03	44,89	48,15	49,72	51,02	52,14	52,21	53,15	53,40			
		CI Anteil in %	[38,97; 40,22]	[45,33; 46,74]	[44,16; 45,63]	[47,37; 48,93]	[48,89; 50,54]	[50,16; 51,88]	[51,24; 53,03]	[51,28; 53,14]	[52,18; 54,12]	[52,39; 54,41]			
	nicht durchführbar	Anzahl	1862	1678	1263	1025	933	724	655	626	539	522			
		Anteil in %	7,95	8,68	7,17	6,53	6,59	5,60	5,51	5,69	5,30	5,57			
		CI Anteil in %	[7,60; 8,30]	[8,28; 9,08]	[6,78; 7,55]	[6,14; 6,92]	[6,18; 7,00]	[5,21; 6,00]	[5,10; 5,92]	[5,26; 6,12]	[4,87; 5,74]	[5,10; 6,03]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308			
	auswertbar	Anzahl	33796	28692	26390	23898	22019	20311	18957	17782	16661	15649			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	12498	12554	11206	10904	10398	9791	9309	8744	8324	7812			
		Anteil in %	36,98	43,75	42,46	45,63	47,22	48,21	49,11	49,17	49,96	49,92			
		CI Anteil in %	[36,47; 37,50]	[43,18; 44,33]	[41,87; 43,06]	[45,00; 46,26]	[46,56; 47,88]	[47,52; 48,89]	[48,39; 49,82]	[48,44; 49,91]	[49,20; 50,72]	[49,14; 50,70]			
	nicht durchführbar	Anzahl	2706	2623	2013	1615	1408	1246	1156	1050	1017	971			
Anteil in %		8,01	9,14	7,63	6,76	6,39	6,13	6,10	5,90	6,10	6,20				
CI Anteil in %		[7,72; 8,30]	[8,81; 9,48]	[7,31; 7,95]	[6,44; 7,08]	[6,07; 6,72]	[5,80; 6,46]	[5,76; 6,44]	[5,56; 6,25]	[5,74; 6,47]	[5,83; 6,58]				
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023				
	auswertbar	Anzahl	21334	17846	15654	14023	12851	11825	10991	10200	9533				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	8034	7935	7318	6739	6369	5997	5753	5413	5104				
		Anteil in %	37,66	44,46	46,75	48,06	49,56	50,71	52,34	53,07	53,54				
		CI Anteil in %	[37,01; 38,31]	[43,73; 45,19]	[45,97; 47,53]	[47,23; 48,88]	[48,70; 50,42]	[49,81; 51,62]	[51,41; 53,28]	[52,10; 54,04]	[52,54; 54,54]				
	nicht durchführbar	Anzahl	1519	1334	949	825	708	631	588	552	540				
		Anteil in %	7,12	7,48	6,06	5,88	5,51	5,34	5,35	5,41	5,66				
		CI Anteil in %	[6,77; 7,47]	[7,09; 7,86]	[5,69; 6,44]	[5,49; 6,27]	[5,11; 5,90]	[4,93; 5,74]	[4,93; 5,77]	[4,97; 5,85]	[5,20; 6,13]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502				
	auswertbar	Anzahl	31852	27142	24364	22218	20464	19028	17932	16760	15734				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	11203	11611	10875	10335	9731	9252	8981	8552	8090				
		Anteil in %	35,17	42,78	44,64	46,52	47,55	48,62	50,08	51,03	51,42				
		CI Anteil in %	[34,65; 35,70]	[42,19; 43,37]	[44,01; 45,26]	[45,86; 47,17]	[46,87; 48,24]	[47,91; 49,33]	[49,35; 50,82]	[50,27; 51,78]	[50,64; 52,20]				
	nicht durchführbar	Anzahl	2304	2039	1537	1305	1160	1077	1020	990	923				
Anteil in %		7,23	7,51	6,31	5,87	5,67	5,66	5,69	5,91	5,87					
CI Anteil in %		[6,95; 7,52]	[7,20; 7,83]	[6,00; 6,61]	[5,56; 6,18]	[5,35; 5,99]	[5,33; 5,99]	[5,35; 6,03]	[5,55; 6,26]	[5,50; 6,23]					

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675					
	auswertbar	Anzahl	17143	13805	11879	10495	9475	8606	7869	7244					
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	7029	6817	5936	5391	5043	4729	4449	4089					
		Anteil in %	41,00	49,38	49,97	51,37	53,22	54,95	56,54	56,45					
	nicht durchführbar	CI Anteil in %	[40,27; 41,74]	[48,55; 50,21]	[49,07; 50,87]	[50,41; 52,32]	[52,22; 54,23]	[53,90; 56,00]	[55,44; 57,63]	[55,30; 57,59]					
		Anzahl	1099	893	689	579	505	475	407	399					
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	6,41	6,47	5,80	5,52	5,33	5,52	5,17	5,51					
		CI Anteil in %	[6,04; 6,78]	[6,06; 6,88]	[5,38; 6,22]	[5,08; 5,95]	[4,88; 5,78]	[5,04; 6,00]	[4,68; 5,66]	[4,98; 6,03]					
	2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818					
		auswertbar	Anzahl	14497	11586	9850	8629	7803	7041	6453					
		mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	6280	5861	5034	4588	4359	3990	3702					
			Anteil in %	43,32	50,59	51,11	53,17	55,86	56,67	57,37					
		nicht durchführbar	CI Anteil in %	[42,51; 44,13]	[49,68; 51,50]	[50,12; 52,09]	[52,12; 54,22]	[54,76; 56,96]	[55,51; 57,83]	[56,16; 58,58]					
			Anzahl	806	722	557	423	426	351	330					
weibliche Patienten insgesamt		Anteil in %	5,56	6,23	5,65	4,90	5,46	4,99	5,11						
		CI Anteil in %	[5,19; 5,93]	[5,79; 6,67]	[5,20; 6,11]	[4,45; 5,36]	[4,96; 5,96]	[4,48; 5,49]	[4,58; 5,65]						
2010-1		männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281						
		auswertbar	Anzahl	15873	12648	10882	9608	8640	7802						
		mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	7190	6471	5676	5171	4772	4353						
			Anteil in %	45,30	51,16	52,16	53,82	55,23	55,79						
		nicht durchführbar	CI Anteil in %	[44,52; 46,07]	[50,29; 52,03]	[51,22; 53,10]	[52,82; 54,82]	[54,18; 56,28]	[54,69; 56,90]						
			Anzahl	941	846	618	525	453	451						
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	5,93	6,69	5,68	5,46	5,24	5,78							
		CI Anteil in %	[5,56; 6,30]	[6,25; 7,12]	[5,24; 6,11]	[5,01; 5,92]	[4,77; 5,71]	[5,26; 6,30]							
	2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281						
		auswertbar	Anzahl	15873	12648	10882	9608	8640	7802						
		mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	7190	6471	5676	5171	4772	4353						
			Anteil in %	45,30	51,16	52,16	53,82	55,23	55,79						
		nicht durchführbar	CI Anteil in %	[44,52; 46,07]	[50,29; 52,03]	[51,22; 53,10]	[52,82; 54,82]	[54,18; 56,28]	[54,69; 56,90]						
			Anzahl	941	846	618	525	453	451						
weibliche Patienten insgesamt		Anteil in %	5,93	6,69	5,68	5,46	5,24	5,78							
		CI Anteil in %	[5,56; 6,30]	[6,25; 7,12]	[5,24; 6,11]	[5,01; 5,92]	[4,77; 5,71]	[5,26; 6,30]							

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568									
	auswertbar	Anzahl	14957	11959	10204	9003	8062									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	7067	6283	5405	4840	4418									
		Anteil in %	47,25	52,54	52,97	53,76	54,80									
	CI Anteil in %	[46,45; 48,05]	[51,64; 53,43]	[52,00; 53,94]	[52,73; 54,79]	[53,71; 55,89]										
	nicht durchführbar	Anzahl	833	702	622	492	454									
		Anteil in %	5,57	5,87	6,10	5,46	5,63									
		CI Anteil in %	[5,20; 5,94]	[5,45; 6,29]	[5,63; 6,56]	[5,00; 5,93]	[5,13; 6,13]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579									
	auswertbar	Anzahl	21727	18009	15761	14155	12808									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	9747	9244	8123	7451	6898									
		Anteil in %	44,86	51,33	51,54	52,64	53,86									
	CI Anteil in %	[44,20; 45,52]	[50,60; 52,06]	[50,76; 52,32]	[51,82; 53,46]	[52,99; 54,72]										
nicht durchführbar	Anzahl	1250	1167	950	792	725										
	Anteil in %	5,75	6,48	6,03	5,60	5,66										
	CI Anteil in %	[5,44; 6,06]	[6,12; 6,84]	[5,66; 6,40]	[5,22; 5,97]	[5,26; 6,06]										
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	15409	12971	11106	9678										
	auswertbar	Anzahl	15409	12286	10474	9001										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	7472	6602	5641	4927										
		Anteil in %	48,49	53,74	53,86	54,74										
	CI Anteil in %	[47,70; 49,28]	[52,85; 54,62]	[52,90; 54,81]	[53,71; 55,77]											
	nicht durchführbar	Anzahl	794	683	535	467										
		Anteil in %	5,15	5,56	5,11	5,19										
		CI Anteil in %	[4,80; 5,50]	[5,15; 5,96]	[4,69; 5,53]	[4,73; 5,65]										
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23197	20078	17696	15845										
	auswertbar	Anzahl	23197	19097	16755	14928										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	10755	9972	8723	8024										
		Anteil in %	46,36	52,22	52,06	53,75										
	CI Anteil in %	[45,72; 47,01]	[51,51; 52,93]	[51,31; 52,82]	[52,95; 54,55]											
nicht durchführbar	Anzahl	1247	1178	964	855											
	Anteil in %	5,38	6,17	5,75	5,73											
	CI Anteil in %	[5,09; 5,67]	[5,83; 6,51]	[5,40; 6,11]	[5,35; 6,10]											
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14050	11811	10082											
	auswertbar	Anzahl	14050	11195	9376											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	7277	6338	5319											
		Anteil in %	51,79	56,61	56,73											
	CI Anteil in %	[50,97; 52,62]	[55,70; 57,53]	[55,73; 57,73]												
	nicht durchführbar	Anzahl	645	620	513											
		Anteil in %	4,59	5,54	5,47											
		CI Anteil in %	[4,24; 4,94]	[5,11; 5,96]	[5,01; 5,93]											
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	20513	17841	15614											
	auswertbar	Anzahl	20513	16981	14678											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	9956	9156	7917											
		Anteil in %	48,54	53,92	53,94											
	CI Anteil in %	[47,85; 49,22]	[53,17; 54,67]	[53,13; 54,74]												
nicht durchführbar	Anzahl	1059	1012	843												
	Anteil in %	5,16	5,96	5,74												
	CI Anteil in %	[4,86; 5,47]	[5,60; 6,32]	[5,37; 6,12]												

EZ	Schriftlicher Selbstmanagementplan		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16002	13484													
	auswertbar	Anzahl	16002	12571													
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	8276	7050													
		Anteil in %		51,72	56,08												
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[50,94; 52,49]	[55,21; 56,95]												
		Anzahl	766	744													
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %		4,79	5,92												
		CI Anteil in %		[4,46; 5,12]	[5,51; 6,33]												
	auswertbar	Anzahl	23844	20669													
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	11730	10402													
		Anteil in %		49,19	53,86												
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[48,56; 49,83]	[53,16; 54,56]												
		Anzahl	1229	1231													
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %		5,15	6,37												
CI Anteil in %			[4,87; 5,43]	[6,03; 6,72]													
2012-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	14102														
	auswertbar	Anzahl	14102														
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	7434														
		Anteil in %		52,72													
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[51,89; 53,54]													
		Anzahl	691														
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %		4,90													
		CI Anteil in %		[4,54; 5,26]													
	auswertbar	Anzahl	20545														
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	10399														
		Anteil in %		50,62													
	nicht durchführbar	CI Anteil in %		[49,93; 51,30]													
		Anzahl	1026														
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %		4,99													
CI Anteil in %			[4,70; 5,29]														

In der Tabelle 3.5.4 sind die **Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik ausgewiesen für die ein schriftlicher Selbstmanagementplan** erstellt wurde. Zunächst wird unter „auswertbare männliche bzw. weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben. Dabei handelt es sich um diejenigen Patienten, die

im Berichtshalbjahr noch eingeschrieben sind und bei denen im Berichtshalbjahr eine tägliche Asthmasymptomatik dokumentiert wurde. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen dieser Patienten bzw. welchem Anteil ein schriftlicher Selbstmanagementplan vorliegt.

Tabelle 3.5.4 Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2006-1	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	208	153	134	122	114	94	77	82	74	70	69	61	65	56
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	74	61	56	54	53	51	39	40	36	36	37	32	36	25
		Anteil in %	35,58	39,87	41,79	44,26	46,49	54,26	50,65	48,78	48,65	51,43	53,62	52,46	55,38	44,64
		CI Anteil in %	[29,05; 42,10]	[32,09; 47,65]	[33,41; 50,17]	[35,41; 53,11]	[37,29; 55,69]	[44,13; 64,38]	[39,41; 61,89]	[37,89; 59,67]	[37,18; 60,11]	[39,64; 63,22]	[41,77; 65,48]	[39,82; 65,10]	[43,21; 67,56]	[31,50; 57,78]
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>886</i>	<i>840</i>	<i>758</i>	<i>699</i>	<i>650</i>	<i>611</i>	<i>569</i>	<i>525</i>	<i>503</i>	<i>465</i>	<i>442</i>	<i>417</i>	<i>391</i>	<i>370</i>
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	319	235	235	193	207	189	159	155	152	125	114	102	103	97
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	124	104	96	81	100	92	80	77	79	80	65	56	64	55
		Anteil in %	38,87	44,26	40,85	41,97	48,31	48,68	50,31	49,68	51,97	64,00	57,02	54,90	62,14	56,70
		CI Anteil in %	[33,51; 44,23]	[37,89; 50,62]	[34,55; 47,15]	[34,99; 48,95]	[41,49; 55,13]	[41,53; 55,82]	[42,52; 58,11]	[41,78; 57,57]	[44,00; 59,94]	[55,55; 72,45]	[47,89; 66,15]	[45,20; 64,61]	[52,72; 71,55]	[46,79; 66,61]
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1265</i>	<i>1215</i>	<i>1121</i>	<i>1045</i>	<i>998</i>	<i>960</i>	<i>919</i>	<i>874</i>	<i>832</i>	<i>796</i>	<i>755</i>	<i>727</i>	<i>702</i>	<i>681</i>
2006-2	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	1582	1150	945	864	729	675	612	587	523	505	469	432	416	
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	632	471	396	368	316	321	301	304	266	269	263	252	245	
		Anteil in %	39,95	40,96	41,90	42,59	43,35	47,56	49,18	51,79	50,86	53,27	56,08	58,33	58,89	
		CI Anteil in %	[37,54; 42,36]	[38,11; 43,80]	[38,76; 45,05]	[39,29; 45,89]	[39,75; 46,95]	[43,79; 51,33]	[45,22; 53,15]	[47,74; 55,83]	[46,57; 55,15]	[48,91; 57,62]	[51,58; 60,57]	[53,68; 62,99]	[54,16; 63,63]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7188</i>	<i>6656</i>	<i>6004</i>	<i>5530</i>	<i>5210</i>	<i>4908</i>	<i>4553</i>	<i>4243</i>	<i>3961</i>	<i>3720</i>	<i>3505</i>	<i>3316</i>	<i>3124</i>	
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2668	1948	1627	1535	1289	1264	1152	1099	966	907	828	815	801	
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1042	853	716	685	593	631	611	616	547	517	487	499	509	
		Anteil in %	39,06	43,79	44,01	44,63	46,00	49,92	53,04	56,05	56,63	57,00	58,82	61,23	63,55	
		CI Anteil in %	[37,20; 40,91]	[41,58; 45,99]	[41,59; 46,42]	[42,14; 47,11]	[43,28; 48,73]	[47,16; 52,68]	[50,15; 55,92]	[53,12; 58,99]	[53,50; 59,75]	[53,78; 60,22]	[55,46; 62,17]	[57,88; 64,57]	[60,21; 66,88]	
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10299</i>	<i>9582</i>	<i>8748</i>	<i>8115</i>	<i>7728</i>	<i>7349</i>	<i>6948</i>	<i>6534</i>	<i>6165</i>	<i>5856</i>	<i>5542</i>	<i>5292</i>	<i>5053</i>	
2007-1	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3587	2104	1853	1366	1291	1168	1072	982	961	825	800	682		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1545	1014	865	651	641	601	588	551	556	474	494	416		
		Anteil in %	43,07	48,19	46,68	47,66	49,65	51,46	54,85	56,11	57,86	57,45	61,75	61,00		
		CI Anteil in %	[41,45; 44,69]	[46,06; 50,33]	[44,41; 48,95]	[45,01; 50,31]	[46,92; 52,38]	[48,59; 54,32]	[51,87; 57,83]	[53,00; 59,22]	[54,73; 60,98]	[54,08; 60,83]	[58,38; 65,12]	[57,33; 64,66]		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14600</i>	<i>13199</i>	<i>11826</i>	<i>10856</i>	<i>10060</i>	<i>9253</i>	<i>8517</i>	<i>7968</i>	<i>7420</i>	<i>6962</i>	<i>6566</i>	<i>6136</i>		
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5941	3662	3320	2490	2429	2136	2001	1846	1771	1591	1536	1376		
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2474	1736	1559	1209	1236	1103	1099	1059	1036	925	917	835		
		Anteil in %	41,64	47,41	46,96	48,55	50,89	51,64	54,92	57,37	58,50	58,14	59,70	60,68		
		CI Anteil in %	[40,39; 42,90]	[45,79; 49,02]	[45,26; 48,66]	[46,59; 50,52]	[48,90; 52,87]	[49,52; 53,76]	[52,74; 57,10]	[55,11; 59,62]	[56,20; 60,79]	[55,71; 60,56]	[57,25; 62,15]	[58,10; 63,26]		
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21994</i>	<i>20214</i>	<i>18440</i>	<i>17130</i>	<i>16006</i>	<i>14843</i>	<i>13864</i>	<i>13060</i>	<i>12315</i>	<i>11681</i>	<i>11095</i>	<i>10538</i>		
2007-2	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	4232	2623	1875	1738	1517	1464	1318	1229	1065	1009	894			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1745	1187	846	792	752	749	678	652	549	539	501			
		Anteil in %	41,23	45,25	45,12	45,57	49,57	51,16	51,44	53,05	51,55	53,42	56,04			
		CI Anteil in %	[39,75; 42,72]	[43,35; 47,16]	[42,87; 47,37]	[43,23; 47,91]	[47,05; 52,09]	[48,60; 53,72]	[48,74; 54,14]	[50,26; 55,84]	[48,55; 54,55]	[50,34; 56,50]	[52,78; 59,30]			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>19270</i>	<i>17296</i>	<i>15667</i>	<i>14230</i>	<i>12848</i>	<i>11741</i>	<i>10874</i>	<i>10051</i>	<i>9328</i>	<i>8686</i>	<i>8054</i>			
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	7026	4774	3492	3314	2792	2601	2406	2319	2074	1871	1712			
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3053	2268	1682	1555	1418	1341	1298	1263	1126	1032	969			
		Anteil in %	43,45	47,51	48,17	46,92	50,79	51,56	53,95	54,46	54,29	55,16	56,60			
		CI Anteil in %	[42,29; 44,61]	[46,09; 48,92]	[46,51; 49,82]	[45,22; 48,62]	[48,93; 52,64]	[49,64; 53,48]	[51,96; 55,94]	[52,44; 56,49]	[52,15; 56,44]	[52,90; 57,41]	[54,25; 58,95]			
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>27267</i>	<i>25016</i>	<i>22959</i>	<i>21225</i>	<i>19373</i>	<i>17886</i>	<i>16675</i>	<i>15633</i>	<i>14734</i>	<i>13881</i>	<i>13091</i>			

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2008-1	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5430	2635	2392	1882	1725	1553	1466	1262	1116	1029				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2289	1126	1007	812	739	711	685	584	534	497				
		Anteil in %	42,15	42,73	42,10	43,15	42,84	45,78	46,73	46,28	47,85	48,30				
		CI Anteil in %	[40,84; 43,47]	[40,84; 44,62]	[40,12; 44,08]	[40,91; 45,38]	[40,50; 45,18]	[43,30; 48,26]	[44,17; 49,28]	[43,52; 49,03]	[44,92; 50,78]	[45,24; 51,35]				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23420</i>	<i>21116</i>	<i>19060</i>	<i>16520</i>	<i>14815</i>	<i>13543</i>	<i>12414</i>	<i>11469</i>	<i>10651</i>	<i>9888</i>				
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	8838	4795	4291	3515	3296	2851	2672	2424	2305	2052				
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	3557	2141	1842	1585	1540	1369	1308	1183	1115	1017				
		Anteil in %	40,25	44,65	42,93	45,09	46,72	48,02	48,95	48,80	48,37	49,56				
		CI Anteil in %	[39,22; 41,27]	[43,24; 46,06]	[41,45; 44,41]	[43,45; 46,74]	[45,02; 48,43]	[46,18; 49,85]	[47,06; 50,85]	[46,81; 50,79]	[46,33; 50,41]	[47,40; 51,73]				
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>33796</i>	<i>31063</i>	<i>28290</i>	<i>25054</i>	<i>22840</i>	<i>21065</i>	<i>19655</i>	<i>18394</i>	<i>17298</i>	<i>16308</i>				
2008-2	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3749	2300	1780	1578	1381	1317	1149	1094	980					
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1515	1024	809	730	665	651	585	542	492					
		Anteil in %	40,41	44,52	45,45	46,26	48,15	49,43	50,91	49,54	50,20					
		CI Anteil in %	[38,84; 41,98]	[42,49; 46,55]	[43,14; 47,76]	[43,80; 48,72]	[45,52; 50,79]	[46,73; 52,13]	[48,02; 53,81]	[46,58; 52,51]	[47,07; 53,34]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21334</i>	<i>18950</i>	<i>16531</i>	<i>14720</i>	<i>13457</i>	<i>12343</i>	<i>11470</i>	<i>10717</i>	<i>10023</i>					
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	6459	4219	3341	3145	2693	2499	2228	2077	1899					
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2559	1913	1533	1489	1306	1226	1099	1017	959					
		Anteil in %	39,62	45,34	45,88	47,34	48,50	49,06	49,33	48,96	50,50					
		CI Anteil in %	[38,43; 40,81]	[43,84; 46,84]	[44,19; 47,57]	[45,60; 49,09]	[46,61; 50,38]	[47,10; 51,02]	[47,25; 51,40]	[46,81; 51,12]	[48,25; 52,75]					
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31852</i>	<i>28706</i>	<i>25549</i>	<i>23236</i>	<i>21376</i>	<i>19866</i>	<i>18668</i>	<i>17513</i>	<i>16502</i>					
2009-1	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3250	1583	1330	1095	998	862	814	699						
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1457	769	629	533	503	430	415	369						
		Anteil in %	44,83	48,58	47,29	48,68	50,40	49,88	50,98	52,79						
		CI Anteil in %	[43,12; 46,54]	[46,12; 51,04]	[44,61; 49,98]	[45,71; 51,64]	[47,30; 53,50]	[46,54; 53,22]	[47,55; 54,42]	[49,09; 56,49]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>17143</i>	<i>14539</i>	<i>12566</i>	<i>11033</i>	<i>9913</i>	<i>9042</i>	<i>8315</i>	<i>7675</i>						
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	5531	2988	2584	2117	1976	1720	1596	1427						
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2407	1432	1278	1062	982	881	834	721						
		Anteil in %	43,52	47,93	49,46	50,17	49,70	51,22	52,26	50,53						
		CI Anteil in %	[42,21; 44,83]	[46,13; 49,72]	[47,53; 51,39]	[48,03; 52,30]	[47,49; 51,90]	[48,86; 53,58]	[49,80; 54,71]	[47,93; 53,12]						
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>24790</i>	<i>21495</i>	<i>19034</i>	<i>17109</i>	<i>15623</i>	<i>14504</i>	<i>13533</i>	<i>12641</i>						
2009-2	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2632	1388	1127	942	797	674	606							
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1272	731	569	481	400	361	322							
		Anteil in %	48,33	52,67	50,49	51,06	50,19	53,56	53,14							
		CI Anteil in %	[46,42; 50,24]	[50,04; 55,29]	[47,57; 53,41]	[47,87; 54,26]	[46,71; 53,66]	[49,79; 57,33]	[49,16; 57,11]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14497</i>	<i>12223</i>	<i>10428</i>	<i>9120</i>	<i>8215</i>	<i>7433</i>	<i>6818</i>							
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	4267	2578	1983	1757	1555	1451	1252							
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1930	1291	1013	911	822	771	694							
		Anteil in %	45,23	50,08	51,08	51,85	52,86	53,14	55,43							
		CI Anteil in %	[43,74; 46,72]	[48,15; 52,01]	[48,88; 53,28]	[49,51; 54,19]	[50,38; 55,34]	[50,57; 55,70]	[52,68; 58,19]							
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21009</i>	<i>18292</i>	<i>15990</i>	<i>14223</i>	<i>13005</i>	<i>11960</i>	<i>11125</i>							

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2010-1	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2912	1467	1295	1015	900	786								
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1425	751	657	510	459	418								
		Anteil in %	48,94	51,19	50,73	50,25	51,00	53,18								
		CI Anteil in %	[47,12; 50,75]	[48,63; 53,75]	[48,01; 53,46]	[47,17; 53,32]	[47,73; 54,27]	[49,69; 56,67]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15873</i>	<i>13359</i>	<i>11434</i>	<i>10103</i>	<i>9127</i>	<i>8281</i>								
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	4779	2562	2261	1838	1648	1464								
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2258	1367	1156	965	859	781								
		Anteil in %	47,25	53,36	51,13	52,50	52,12	53,35								
		CI Anteil in %	[45,83; 48,66]	[51,42; 55,29]	[49,07; 53,19]	[50,22; 54,79]	[49,71; 54,54]	[50,79; 55,90]								
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23098</i>	<i>20031</i>	<i>17512</i>	<i>15713</i>	<i>14383</i>	<i>13236</i>								
2010-2	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2556	1399	1078	903	753									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1310	716	554	484	390									
		Anteil in %	51,25	51,18	51,39	53,60	51,79									
		CI Anteil in %	[49,31; 53,19]	[48,56; 53,80]	[48,41; 54,38]	[50,34; 56,85]	[48,22; 55,36]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14957</i>	<i>12589</i>	<i>10832</i>	<i>9524</i>	<i>8568</i>									
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	4118	2437	1886	1698	1433									
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2080	1302	1011	918	744									
		Anteil in %	50,51	53,43	53,61	54,06	51,92									
		CI Anteil in %	[48,98; 52,04]	[51,45; 55,41]	[51,35; 55,86]	[51,69; 56,43]	[49,33; 54,51]									
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>21727</i>	<i>18792</i>	<i>16595</i>	<i>14874</i>	<i>13579</i>									
2011-1	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2797	1351	1141	858										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1472	726	604	475										
		Anteil in %	52,63	53,74	52,94	55,36										
		CI Anteil in %	[50,78; 54,48]	[51,08; 56,40]	[50,04; 55,83]	[52,03; 58,69]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15409</i>	<i>12971</i>	<i>11106</i>	<i>9678</i>										
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	4725	2552	2186	1759										
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2373	1360	1132	962										
		Anteil in %	50,22	53,29	51,78	54,69										
		CI Anteil in %	[48,80; 51,65]	[51,36; 55,23]	[49,69; 53,88]	[52,36; 57,02]										
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23197</i>	<i>20078</i>	<i>17696</i>	<i>15845</i>										
2011-2	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2260	1196	958											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1242	627	493											
		Anteil in %	54,96	52,42	51,46											
		CI Anteil in %	[52,90; 57,01]	[49,59; 55,26]	[48,29; 54,63]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14050</i>	<i>11811</i>	<i>10082</i>											
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3708	2134	1700											
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1926	1152	925											
		Anteil in %	51,94	53,98	54,41											
		CI Anteil in %	[50,33; 53,55]	[51,87; 56,10]	[52,04; 56,78]											
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20513</i>	<i>17841</i>	<i>15614</i>											

EZ	Patienten mit schriftlichem Selbstmanagementplan bei täglicher Asthmasymptomatik	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	
2012-1	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2468	1227												
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1335	677												
		Anteil in %	54,09	55,18												
		CI Anteil in %	[52,13; 56,06]	[52,39; 57,96]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16002</i>	<i>13484</i>												
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	4246	2357												
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	2286	1278												
		Anteil in %	53,84	54,22												
CI Anteil in %		[52,34; 55,34]	[52,21; 56,23]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23844</i>	<i>20669</i>													
2012-2	auswertbare männliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	2213													
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1240													
		Anteil in %	56,03													
		CI Anteil in %	[53,96; 58,10]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14102</i>													
	auswertbare weibliche Patienten mit täglicher Asthmasymptomatik	Anzahl	3671													
	mit schriftlichem Selbstmanagementplan	Anzahl	1982													
		Anteil in %	53,99													
CI Anteil in %		[52,38; 55,60]														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>20545</i>														

In der Tabelle 3.5.5 werden **Raucher ab 18 Jahren im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht** ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu die Gruppe der „männlichen bzw. weiblichen Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr“ angegeben, d.h. derjenigen noch im Programm verbliebenen erwachsenen Patienten, die im aktuellen Berichtshalbjahr rauchten. Anschließend wird ausgewiesen, wie viele der „auswertbaren“ Patienten im aktuellen Berichtshalbjahr Raucher waren und gleichzeitig

eine Empfehlung zum Tabakverzicht erhielten und welchem prozentualen Anteil dies an den „auswertbaren“ Patienten entspricht. Da Angaben zur Empfehlung zum Tabakverzicht seit der Umstellung auf eDMP und die entsprechenden neuen Satzartbeschreibungen zum 1.7.2008 nicht mehr erhoben werden, können diese Auswertungen nur bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 vorgenommen werden.

Tabelle 3.5.5 Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht

EZ	Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	
2006-1	männliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	139	121	99	91	84
	auswertbar	Anzahl	139	121	99	91	84
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	124	110	87	81	75
		Anteil in %	89,21	90,91	87,88	89,01	89,29
		CI Anteil in %	[84,03; 94,39]	[85,77; 96,05]	[81,42; 94,34]	[82,55; 95,47]	[82,63; 95,94]
	<i>männliche Pat. ≥18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>641</i>	<i>603</i>	<i>556</i>	<i>514</i>	<i>489</i>
	weibliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	196	181	165	149	142
	auswertbar	Anzahl	196	181	165	149	142
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	176	166	155	137	129
		Anteil in %	89,80	91,71	93,94	91,95	90,85
CI Anteil in %		[85,55; 94,04]	[87,69; 95,74]	[90,29; 97,59]	[87,56; 96,33]	[86,08; 95,61]	
<i>weibliche Pat. ≥18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1137</i>	<i>1096</i>	<i>1014</i>	<i>944</i>	<i>914</i>	
2006-2	männliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	1062	958	811	714	
	auswertbar	Anzahl	1062	958	811	714	
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	998	883	732	647	
		Anteil in %	93,97	92,17	90,26	90,62	
		CI Anteil in %	[92,54; 95,41]	[90,47; 93,87]	[88,22; 92,30]	[88,48; 92,76]	
	<i>männliche Pat. ≥18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5108</i>	<i>4788</i>	<i>4343</i>	<i>4059</i>	
	weibliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	1429	1298	1112	1005	
	auswertbar	Anzahl	1429	1298	1112	1005	
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	1314	1177	1000	906	
		Anteil in %	91,95	90,68	89,93	90,15	
CI Anteil in %		[90,54; 93,36]	[89,10; 92,26]	[88,16; 91,70]	[88,31; 91,99]		
<i>weibliche Pat. ≥18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9060</i>	<i>8500</i>	<i>7762</i>	<i>7287</i>		
2007-1	männliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	2183	1798	1444		
	auswertbar	Anzahl	2183	1798	1444		
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	2049	1675	1327		
		Anteil in %	93,86	93,16	91,90		
		CI Anteil in %	[92,85; 94,87]	[91,99; 94,33]	[90,49; 93,31]		
	<i>männliche Pat. ≥18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10884</i>	<i>9823</i>	<i>8932</i>		
	weibliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	3014	2654	2224		
	auswertbar	Anzahl	3014	2654	2224		
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	2828	2486	2056		
		Anteil in %	93,83	93,67	92,45		
CI Anteil in %		[92,97; 94,69]	[92,74; 94,60]	[91,35; 93,54]			
<i>weibliche Pat. ≥18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>19661</i>	<i>18109</i>	<i>16713</i>			

EZ	Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr
2007-2	männliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	2993	2437		
	auswertbar	Anzahl	2993	2437		
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	2808	2287		
		Anteil in %	93,82	93,84		
		CI Anteil in %	[92,96; 94,68]	[92,89; 94,80]		
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13164</i>	<i>12034</i>		
	weibliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	4123	3518		
	auswertbar	Anzahl	4123	3518		
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	3874	3294		
		Anteil in %	93,96	93,63		
	CI Anteil in %	[93,23; 94,69]	[92,83; 94,44]			
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23606</i>	<i>21943</i>			
2008-1	männliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	3886			
	auswertbar	Anzahl	3886			
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	3650			
		Anteil in %	93,93			
		CI Anteil in %	[93,18; 94,68]			
	<i>männliche Pat. ≥ 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16982</i>			
	weibliche Raucher ≥ 18 Jahre im Berichtshalbjahr	Anzahl	5497			
	auswertbar	Anzahl	5497			
	mit Empfehlung zum Tabakverzicht	Anzahl	5183			
		Anteil in %	94,29			
	CI Anteil in %	[93,67; 94,90]				
<i>weibliche Pat. ≥ 18 Jahre insges.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>29795</i>				

In der Tabelle 3.5.6 sind die **Nichtraucher im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht** ausgewiesen. Zunächst wird unter „erwachsene männliche bzw. weibliche Patienten im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen“ die auswertbare Patientenanzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren, im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen. Eine Differenzierung danach, ob die auswertbaren Patienten im Vorgängerhalbjahr Ketten- oder Gelegenheitsraucher waren, ist dabei nicht möglich. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patienten bzw. wel-

cher Anteil dieser Patienten im aktuellen Berichtshalbjahr Nichtraucher ist. Definitionsgemäß liegen für das Beitrittsjahr nicht die nötigen Informationen vor, so dass nur die entsprechende Gesamtpatientenzahl der jeweiligen Kohorte dargestellt wird.

Da die notwendigen Informationen zur Empfehlung zum Tabakverzicht seit der Umstellung auf eDMP zum 01.07.2008 nicht mehr erhoben werden, ist diese Auswertung letztmalig für das Berichtshalbjahr 2008-2 möglich.

Tabelle 3.5.6 Nichtraucher im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht

EZ	Nichtraucher im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	erwachsene männl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl	108	100	76	75	70									
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl	16	21	6	8	13									
		Anteil in %		14,81	21,00	7,89	10,67	18,57								
		CI Anteil in %		[8,08; 21,55]	[12,98; 29,02]	[1,79; 14,00]	[3,63; 17,70]	[9,40; 27,75]								
	erwachsene männliche Patienten insges.	Anzahl	641	603	556	514	489	461								
	erwachsene weibl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		158	151	143	137	126								
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		19	18	17	12	35								
		Anteil in %		12,03	11,92	11,89	8,76	27,78								
CI Anteil in %			[6,94; 17,11]	[6,73; 17,11]	[6,56; 17,21]	[4,01; 13,51]	[19,93; 35,63]									
erwachsene weibliche Patienten insges.	Anzahl	1137	1096	1014	944	914	880									
2006-2	erwachsene männl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		857	769	636	574									
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		85	83	38	114									
		Anteil in %		9,92	10,79	5,97	19,86									
		CI Anteil in %		[7,92; 11,92]	[8,60; 12,99]	[4,13; 7,82]	[16,59; 23,13]									
	erwachsene männliche Patienten insges.	Anzahl	5108	4788	4343	4059	3865									
	erwachsene weibl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		1146	1030	909	828									
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		137	112	88	166									
		Anteil in %		11,95	10,87	9,68	20,05									
CI Anteil in %			[10,08; 13,83]	[8,97; 12,78]	[7,76; 11,60]	[17,32; 22,78]										
erwachsene weibliche Patienten insges.	Anzahl	9060	8500	7762	7287	6967										
2007-1	erwachsene männl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		1666	1394	1155										
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		184	191	269										
		Anteil in %		11,04	13,70	23,29										
		CI Anteil in %		[9,54; 12,55]	[11,90; 15,51]	[20,85; 25,73]										
	erwachsene männliche Patienten insges.	Anzahl	10884	9823	8932	8232										
	erwachsene weibl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		2435	2144	1795										
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		249	253	401										
		Anteil in %		10,23	11,80	22,34										
CI Anteil in %			[9,02; 11,43]	[10,43; 13,17]	[20,41; 24,27]											
erwachsene weibliche Patienten insges.	Anzahl	19661	18109	16713	15577											

EZ	Nichtraucher im Berichtshalbjahr nach Empfehlung zum Tabakverzicht	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr
2007-2	erwachsene männl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		2304	1891										
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		275	417										
		Anteil in %			11,94	22,05									
		CI Anteil in %			[10,61; 13,26]	[20,18; 23,92]									
	erwachsene männliche Patienten insges.	Anzahl	13164	12034	10955										
	erwachsene weibl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		3290	2796										
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		363	576										
Anteil in %				11,03	20,60										
CI Anteil in %				[9,96; 12,10]	[19,10; 22,10]										
erwachsene weibliche Patienten insges.	Anzahl	23606	21943	20179											
2008-1	erwachsene männl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		2843											
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		463											
		Anteil in %			16,29										
		CI Anteil in %			[14,93; 17,64]										
	erwachsene männliche Patienten insges.	Anzahl	16982	15323											
	erwachsene weibl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl		4228											
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl		614											
Anteil in %				14,52											
CI Anteil in %				[13,46; 15,58]											
erwachsene weibliche Patienten insges.	Anzahl	29795	27447												
2008-2	erwachsene männl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl													
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl													
		Anteil in %													
		CI Anteil in %													
	erwachsene männliche Patienten insges.	Anzahl	15792												
	erwachsene weibl. Pat. im Berichtshalbjahr, die im Vorgängerhalbjahr rauchten und eine Empfehlung zum Tabakverzicht bekamen	Anzahl													
	davon Nichtraucher im aktuellen Berichtshalbjahr	Anzahl													
Anteil in %															
CI Anteil in %															
erwachsene weibliche Patienten insges.	Anzahl	28291													

3.7 Sterberaten

In der Tabelle 3.7.1 wird die Anzahl der **verstorbenen Asthmapatienten** pro Halbjahr wiedergegeben.

dokumentiert, wie viele von ihnen bzw. welcher Anteil im Berichtshalbjahr laut den PM-Daten verstorben ist. Da in den PM-Daten entweder die Information „verstorben“ oder „nicht verstorben“ enthalten ist, sind für die Darstellung der Sterberaten definitionsgemäß alle Patienten auswertbar.

Die Entwicklung der Häufigkeit von Begleit- oder Folgeerkrankungen oder der Anzahl verstorbener Patienten kann als Indikator für die Versorgungs- und Behandlungsqualität herangezogen werden. Für alle Kohorten und Berichtshalbjahre wird zunächst die Zahl der im Programm verbliebenen männlichen bzw. weiblichen Patienten ausgewiesen. Anschließend wird

Tabelle 3.7.1 Sterberaten

EZ	Sterberaten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	
2006-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	886	840	758	699	650	611	569	525	503	465	442	417	391	370
	verstorben	Anzahl	1	2	5	7	4	2	3	3	5	4	2	5	5	3
		Anteil in %	0,11	0,24	0,66	1,00	0,62	0,33	0,53	0,57	0,99	0,86	0,45	1,20	1,28	0,81
		CI Anteil in %	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,57]	[0,08; 1,24]	[0,26; 1,74]	[0,01; 1,22]	[0,00; 0,78]	[0,00; 1,12]	[0,00; 1,22]	[0,13; 1,86]	[0,02; 1,70]	[0,00; 1,08]	[0,15; 2,24]	[0,16; 2,39]	[0,00; 1,73]
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	1265	1215	1121	1045	998	960	919	874	832	796	755	727	702	681
	verstorben	Anzahl	0	4	2	4	3	4	5	5	4	5	3	5	2	4
Anteil in %		0,00	0,33	0,18	0,38	0,30	0,42	0,54	0,57	0,48	0,63	0,40	0,69	0,28	0,59	
CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,01; 0,65]	[0,00; 0,43]	[0,01; 0,76]	[0,00; 0,64]	[0,01; 0,82]	[0,07; 1,02]	[0,07; 1,07]	[0,01; 0,95]	[0,08; 1,18]	[0,00; 0,85]	[0,09; 1,29]	[0,00; 0,68]	[0,01; 1,16]	
2006-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	7188	6656	6004	5530	5210	4908	4553	4243	3961	3720	3505	3316	3124	
	verstorben	Anzahl	6	29	24	24	26	30	29	20	27	22	13	29	25	
		Anteil in %	0,08	0,44	0,40	0,43	0,50	0,61	0,64	0,47	0,68	0,59	0,37	0,87	0,80	
		CI Anteil in %	[0,02; 0,15]	[0,28; 0,59]	[0,24; 0,56]	[0,26; 0,61]	[0,31; 0,69]	[0,39; 0,83]	[0,41; 0,87]	[0,27; 0,68]	[0,43; 0,94]	[0,34; 0,84]	[0,17; 0,57]	[0,56; 1,19]	[0,49; 1,11]	
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	10299	9582	8748	8115	7728	7349	6948	6534	6165	5856	5542	5292	5053	
	verstorben	Anzahl	6	30	32	29	23	28	35	33	36	47	27	33	28	
Anteil in %		0,06	0,31	0,37	0,36	0,30	0,38	0,50	0,51	0,58	0,80	0,49	0,62	0,55		
CI Anteil in %		[0,01; 0,10]	[0,20; 0,42]	[0,24; 0,49]	[0,23; 0,49]	[0,18; 0,42]	[0,24; 0,52]	[0,34; 0,67]	[0,33; 0,68]	[0,39; 0,77]	[0,57; 1,03]	[0,30; 0,67]	[0,41; 0,84]	[0,35; 0,76]		
2007-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	14600	13199	11826	10856	10060	9253	8517	7968	7420	6962	6566	6136		
	verstorben	Anzahl	27	44	52	56	57	57	52	45	47	49	44	38		
		Anteil in %	0,18	0,33	0,44	0,52	0,57	0,62	0,61	0,56	0,63	0,70	0,67	0,62		
		CI Anteil in %	[0,12; 0,25]	[0,24; 0,43]	[0,32; 0,56]	[0,38; 0,65]	[0,42; 0,71]	[0,46; 0,78]	[0,45; 0,78]	[0,40; 0,73]	[0,45; 0,81]	[0,51; 0,90]	[0,47; 0,87]	[0,42; 0,82]		
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	21994	20214	18440	17130	16006	14843	13864	13060	12315	11681	11095	10538		
	verstorben	Anzahl	25	60	80	64	81	72	69	61	62	63	70	71		
Anteil in %		0,11	0,30	0,43	0,37	0,51	0,49	0,50	0,47	0,50	0,54	0,63	0,67			
CI Anteil in %		[0,07; 0,16]	[0,22; 0,37]	[0,34; 0,53]	[0,28; 0,46]	[0,40; 0,62]	[0,37; 0,60]	[0,38; 0,61]	[0,35; 0,58]	[0,38; 0,63]	[0,41; 0,67]	[0,48; 0,78]	[0,52; 0,83]			
2007-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	19270	17296	15667	14230	12848	11741	10874	10051	9328	8686	8054			
	verstorben	Anzahl	25	69	73	64	59	55	61	72	50	69	55			
		Anteil in %	0,13	0,40	0,47	0,45	0,46	0,47	0,56	0,72	0,54	0,79	0,68			
		CI Anteil in %	[0,08; 0,18]	[0,30; 0,49]	[0,36; 0,57]	[0,34; 0,56]	[0,34; 0,58]	[0,34; 0,59]	[0,42; 0,70]	[0,55; 0,88]	[0,39; 0,68]	[0,61; 0,98]	[0,50; 0,86]			
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	27267	25016	22959	21225	19373	17886	16675	15633	14734	13881	13091			
	verstorben	Anzahl	24	82	67	72	62	81	69	93	75	71	69			
Anteil in %		0,09	0,33	0,29	0,34	0,32	0,45	0,41	0,59	0,51	0,51	0,53				
CI Anteil in %		[0,05; 0,12]	[0,26; 0,40]	[0,22; 0,36]	[0,26; 0,42]	[0,24; 0,40]	[0,35; 0,55]	[0,32; 0,51]	[0,47; 0,72]	[0,39; 0,62]	[0,39; 0,63]	[0,40; 0,65]				
2008-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	23420	21116	19060	16520	14815	13543	12414	11469	10651	9888				
	verstorben	Anzahl	28	74	98	54	71	70	63	53	59	54				
		Anteil in %	0,12	0,35	0,51	0,33	0,48	0,52	0,51	0,46	0,55	0,55				
		CI Anteil in %	[0,08; 0,16]	[0,27; 0,43]	[0,41; 0,62]	[0,24; 0,41]	[0,37; 0,59]	[0,40; 0,64]	[0,38; 0,63]	[0,34; 0,59]	[0,41; 0,69]	[0,40; 0,69]				
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	33796	31063	28290	25054	22840	21065	19655	18394	17298	16308				
	verstorben	Anzahl	19	81	94	80	75	70	83	76	91	76				
Anteil in %		0,06	0,26	0,33	0,32	0,33	0,33	0,42	0,41	0,53	0,47					
CI Anteil in %		[0,03; 0,08]	[0,20; 0,32]	[0,27; 0,40]	[0,25; 0,39]	[0,25; 0,40]	[0,25; 0,41]	[0,33; 0,51]	[0,32; 0,51]	[0,42; 0,63]	[0,36; 0,57]					
2008-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	21334	18950	16531	14720	13457	12343	11470	10717	10023					
	verstorben	Anzahl	24	75	75	55	64	72	54	69	52					
		Anteil in %	0,11	0,40	0,45	0,37	0,48	0,58	0,47	0,64	0,52					
		CI Anteil in %	[0,07; 0,16]	[0,31; 0,49]	[0,35; 0,56]	[0,28; 0,47]	[0,36; 0,59]	[0,45; 0,72]	[0,35; 0,60]	[0,49; 0,80]	[0,38; 0,66]					
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	31852	28706	25549	23236	21376	19866	18668	17513	16502					
	verstorben	Anzahl	31	85	80	79	85	84	77	80	80					
Anteil in %		0,10	0,30	0,31	0,34	0,40	0,42	0,41	0,46	0,48						
CI Anteil in %		[0,06; 0,13]	[0,23; 0,36]	[0,24; 0,38]	[0,27; 0,41]	[0,31; 0,48]	[0,33; 0,51]	[0,32; 0,50]	[0,36; 0,56]	[0,38; 0,59]						

EZ	Sterberaten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2009-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	17143	14539	12566	11033	9913	9042	8315	7675					
	verstorben	Anzahl	21	41	46	48	39	39	33	36					
		Anteil in %	0,12	0,28	0,37	0,44	0,39	0,43	0,40	0,47					
		CI Anteil in %	[0,07; 0,17]	[0,20; 0,37]	[0,26; 0,47]	[0,31; 0,56]	[0,27; 0,52]	[0,30; 0,57]	[0,26; 0,53]	[0,32; 0,62]					
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	24790	21495	19034	17109	15623	14504	13533	12641					
	verstorben	Anzahl	20	60	71	43	50	55	50	58					
Anteil in %		0,08	0,28	0,37	0,25	0,32	0,38	0,37	0,46						
CI Anteil in %		[0,05; 0,12]	[0,21; 0,35]	[0,29; 0,46]	[0,18; 0,33]	[0,23; 0,41]	[0,28; 0,48]	[0,27; 0,47]	[0,34; 0,58]						
2009-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14497	12223	10428	9120	8215	7433	6818						
	verstorben	Anzahl	17	40	38	39	35	36	35						
		Anteil in %	0,12	0,33	0,36	0,43	0,43	0,48	0,51						
		CI Anteil in %	[0,06; 0,17]	[0,23; 0,43]	[0,25; 0,48]	[0,29; 0,56]	[0,29; 0,57]	[0,33; 0,64]	[0,34; 0,68]						
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	21009	18292	15990	14223	13005	11960	11125						
	verstorben	Anzahl	15	65	50	47	41	41	50						
Anteil in %		0,07	0,36	0,31	0,33	0,32	0,34	0,45							
CI Anteil in %		[0,04; 0,11]	[0,27; 0,44]	[0,23; 0,40]	[0,24; 0,42]	[0,22; 0,41]	[0,24; 0,45]	[0,33; 0,57]							
2010-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	15873	13359	11434	10103	9127	8281							
	verstorben	Anzahl	18	37	45	36	46	32							
		Anteil in %	0,11	0,28	0,39	0,36	0,50	0,39							
		CI Anteil in %	[0,06; 0,17]	[0,19; 0,37]	[0,28; 0,51]	[0,24; 0,47]	[0,36; 0,65]	[0,25; 0,52]							
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	23098	20031	17512	15713	14383	13236							
	verstorben	Anzahl	8	67	54	49	52	59							
Anteil in %		0,03	0,33	0,31	0,31	0,36	0,45								
CI Anteil in %		[0,01; 0,06]	[0,25; 0,41]	[0,23; 0,39]	[0,22; 0,40]	[0,26; 0,46]	[0,33; 0,56]								
2010-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14957	12589	10832	9524	8568								
	verstorben	Anzahl	13	54	52	37	41								
		Anteil in %	0,09	0,43	0,48	0,39	0,48								
		CI Anteil in %	[0,04; 0,13]	[0,31; 0,54]	[0,35; 0,61]	[0,26; 0,51]	[0,33; 0,62]								
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	21727	18792	16595	14874	13579								
	verstorben	Anzahl	18	50	50	60	39								
Anteil in %		0,08	0,27	0,30	0,40	0,29									
CI Anteil in %		[0,04; 0,12]	[0,19; 0,34]	[0,22; 0,38]	[0,30; 0,51]	[0,20; 0,38]									
2011-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	15409	12971	11106	9678									
	verstorben	Anzahl	11	36	45	42									
		Anteil in %	0,07	0,28	0,41	0,43									
		CI Anteil in %	[0,03; 0,11]	[0,19; 0,37]	[0,29; 0,52]	[0,30; 0,56]									
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	23197	20078	17696	15845									
	verstorben	Anzahl	28	47	50	50									
Anteil in %		0,12	0,23	0,28	0,32										
CI Anteil in %		[0,08; 0,17]	[0,17; 0,30]	[0,20; 0,36]	[0,23; 0,40]										
2011-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14050	11811	10082										
	verstorben	Anzahl	15	47	36										
		Anteil in %	0,11	0,40	0,36										
		CI Anteil in %	[0,05; 0,16]	[0,28; 0,51]	[0,24; 0,47]										
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	20513	17841	15614										
	verstorben	Anzahl	22	55	44										
Anteil in %		0,11	0,31	0,28											
CI Anteil in %		[0,06; 0,15]	[0,23; 0,39]	[0,20; 0,36]											
2012-1	männliche Patienten insges.	Anzahl	16002	13484											
	verstorben	Anzahl	11	38											
		Anteil in %	0,07	0,28											
		CI Anteil in %	[0,03; 0,11]	[0,19; 0,37]											
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	23844	20669											
	verstorben	Anzahl	17	58											
Anteil in %		0,07	0,28												
CI Anteil in %		[0,04; 0,11]	[0,21; 0,35]												

EZ	Sterberaten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr
2012-2	männliche Patienten insges.	Anzahl	14102													
	verstorben	Anzahl	10													
		Anteil in %	0,07													
		CI Anteil in %	[0,03; 0,11]													
	weibliche Patienten insges.	Anzahl	20545													
	verstorben	Anzahl	18													
Anteil in %		0,09														
CI Anteil in %		[0,05; 0,13]														

Anhang A: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Gender-Evaluationsbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Asthma bronchiale herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um zwei Arten von Datensätzen, die jeweils für einen Patienten erhoben wurden:

- Patientenmerkmale
- Medizinische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung A.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Asthma bronchiale von AOK und Knappschaft.

A.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung eines Patienten in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten.

Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) ab Juli 2008 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen **medizinischen Behandlungsdaten** sowie die **personenbezogenen Merkmale** enthält.⁵ Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Asthma bronchiale finden die Satzartbeschreibungen SA500EA/FA und SA500ED/FD⁶ Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA500ED/SA500FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 500EA/FA übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2008-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA500ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jedem Patienten vorhandenen **Patientenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patienten fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 500 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass ein Patient in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für ihn eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt.

Der damit beschriebene Datenfluss ist schematisch in Abbildung A.1.1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmern“ und „Patienten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientenbezogenen Auswertung würde hingegen der Patient weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Der Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschlossen werden mussten und sich in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP ein Teilnehmer der Kohorte 2006-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit Sicherheit geschlossen werden, dass er sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat der betreffende Patient „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patienten dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswer-

tungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergeben sich zwei Besonderheiten. Erstens werden die Patienten verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen. Zweitens kann eine unveränderte Patientengruppe bei den berechneten Mittelwerten innerhalb eines Auswertungsjahres nicht „altern“, da sich die vollendeten Lebensjahre auf den Stichtag 1.1. des Auswertungsjahres beziehen. Unterschiedliche Mittelwerte im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patienten die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

⁵ Bis zum 30.06.2008 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patienten bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

⁶ Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „A“ (alt) und „D“ wird unterschieden, ob sich die Dokumentation auf die Zeit vor oder nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen bezieht.

A.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung der Datenverarbeitung kam es zu Abweichungen bei der erwarteten Datenqualität. Diese Abweichungen traten insbesondere zu Beginn der Programmlaufzeit, z.B. aufgrund der allgemeinen Anlaufschwierigkeiten, auf. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf (PM-Datensätze)

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.⁷ Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln und den medizinischen Plausibilitätskriterien des BVA (siehe Tabelle 0.1.2) folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen kein Regelverstoß vorlag und die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen Regelverstöße vorlagen oder die gemäß Rechenregeln nicht auswertbar waren, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden **„Komplett-Dubletten“** aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden **„Auswertungsdubletten“** aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung (**„Matching“**) von Personenmerkmalen und medizinischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patienten ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine **Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf** vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis sind die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (bis zum Berichtshalbjahr 2012-2)
- Sie werden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung werden auch dann berücksichtigt, wenn sie sich auf bereits veröffentlichte Kohorten bzw. Halbjahre beziehen.

Der letzte Punkt stellt eine Änderung gegenüber den bisherigen Berichten dar, die gemäß der Abstimmung mit dem BVA zum 30.09.2013 sowohl für die medizinischen als auch für die stichprobenbasierten Auswertungen umzusetzen war. Im Kern wird dabei zugunsten einer aktuelleren Datenbasis die Reproduzierbarkeit der Berichte aufgehoben. Durch die rückwirkende Bereinigung der Datenbasis kann es im Vergleich zu den bisherigen Berichten insbesondere zu folgenden Änderungen kommen: Die Restkohorte kann durch die rückwirkende Bereinigung im Zeitverlauf stärker absinken als in bisherigen Berichten. Da diese Bereinigung im Wesentlichen Patienten ohne medizinische Dokumentation betrifft, ist in der Regel jedoch mit keinen oder nur geringen Auswirkungen auf die **Anzahl der auswertbaren Patienten und ihre Auswertungsergebnisse** (Durchschnittswerte, Patientenanteile) zu rechnen. Dagegen ist davon auszugehen, dass der **Anteil** der auswertbaren Patienten an allen Patienten steigt, wenn die Restkohorte als Bezugsgröße kleiner ausfällt als in bisherigen Berichten. Analog ist in diesem Fall auch ein Anstieg der Anteilswerte aus anderen Auswertungen zu erwarten, deren Bezugsgröße die Restkohorte darstellt.

⁷ Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für einen DMP-Teilnehmer für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kam es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu Abweichungen von diesem Schema. Im Folgenden wird beschrieben, wie bei diesen Sonderfällen in der Auswertung vorgegangen wurde:

- **1. Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**
Liegen für das Beitrittsjahr eines Patienten eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führt dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugerechnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle A.3.1.
- **2. Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **3. Mehrere Folgedokumentationen in einem Halbjahr**
Lagen für ein Halbjahr mehrere Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle A.3.1 Anwendung.
- **4. Mehrere Erstdokumentationen im Beitrittsjahr**
Lagen für das Beitrittsjahr zwei oder mehr Erstdokumentationen vor, wurde grundsätzlich diejenige mit dem frühesten Unterschriftsdatum des Arztes herangezogen. Sofern zwei oder mehr Erstdokumentationen mit diesem Datum vorliegen, werden die auszuwertenden medizinischen Werte gemäß Tabelle A.3.1 festgelegt.
- **5. Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später**
Lagen Erstdokumentationen für Halbjahre nach dem Beitrittsjahr vor, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die beiden letztgenannten Punkte wurden im Herbst 2010 neu in die Berechnungsvorschriften aufgenommen.⁸ In den Fällen, in denen die Datenlage widersprüchlich ist, kann es dadurch zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen. Da in einer chronologisch ersten Erstdokumentation nicht zwangsläufig alle Parameter gleich dokumentiert sind, wie in etwaigen weiteren Erstdokumentationen im Beitrittsjahr, kann es aufgrund der Neuregelung in Punkt 4 zu einer Änderung medizinischer Parameter im *Beitrittsjahr* und infolgedessen auch zu Änderungen der Basis von kollektivbasierten Auswertungen kommen. Die Neuregelung unter Punkt 5 kann zu einer Änderung medizinischer Parameter in den *Folgehalbjahren* führen.⁹ Darüber hinaus wurden die Berechnungsvorschriften bezüglich Tabelle A.3.1 dahingehend geändert, dass bei den Laborparametern/Messwerten nicht mehr der letzte chronologisch verfügbare, sondern der letzte *plausible* Wert zu verwenden ist. Dadurch kann es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen.

⁸ Zuvor war in den Berechnungsvorschriften des BVA nur definiert, wie bei Sonderfällen bezüglich der Folgedokumentationen zu verfahren ist (mehrerer Folgedokumentationen in einem Halbjahr, Folgedokumentationen im „falschen“ Halbjahr). Die Handhabung von Sonderfällen bei den Erstdokumentationen war nicht geregelt. Sie wurden bislang weitestgehend analog zu den Sonderfällen bei den Folgedokumentationen in die Auswertung einbezogen.

⁹ Da medizinische Informationen aus Erstdokumentationen in den Folgehalbjahren explizit zu ignorieren sind, entfällt nun in den betroffenen Fällen und Halbjahren ein medizinischer Wert. Sofern im betroffenen Halbjahr aus einer oder mehreren Folgedokumentationen abweichende Werte vorliegen, kann es – je nach Auswahl gemäß Tabelle A.3.1 – zu veränderten medizinischen Parametern führen. Sofern im betroffenen Halbjahr keine Folgedokumentationen vorliegen, kommt es durch die Neuregelung zu fehlenden Angaben.

Tabelle A.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr

Parameter	Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr
Häufigkeit der Asthma-Symptome	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres **
Entwicklung der Peakflow-Werte	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres **
Stationäre notfallmäßige Behandlung (mindestens 1 mal pro Halbjahr)	Höchster Wert des Auswertungshalbjahres (worst case)
Stationäre notfallmäßige Behandlung (mehr als 1 mal pro Halbjahr)	Summe der Werte aus allen Dokumentationen des Auswertungshalbjahres
Definition „Raucher“	Für das betreffende Halbjahr als „Raucher“ zu bewerten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
BMI	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres (in FDx bis 20081 nur für Kinder möglich, ab 20082 Werte in FDx auch für Erwachsene) **
Medikation	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres **
Asthma-Schulung empfohlen	Als empfohlen zu werten, wenn in einer Dokumentation „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ angegeben wurde
Wahrnehmung empfohlener Asthma-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine empfohlene Asthma-Schulung mindestens einmal in derselben FD als wahrgenommen („ja“) dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“)
Inhalationstechnik überprüft *	Ist in einem Halbjahr die Überprüfung der Inhalationstechnik mindestens einmal als durchgeführt („ja“) dokumentiert worden, ist dies unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“)
Schriftlicher Selbstmanagement-Plan	Als durchgeführt zu werten, wenn in mindestens einer Dokumentation „ja“ angegeben wurde
Empfehlung Tabakverzicht bei Rauchern	Als durchgeführt zu werten, wenn in mindestens einer Dokumentation „ja“ angegeben wurde

* Dieser Parameter kann halbjährlich pro Folgedokumentation dokumentiert werden, er wird aber nicht halbjährlich sondern jährlich ausgewertet, sodass immer zwei aufeinanderfolgende Halbjahre ein Berichtsjahr ergeben. Berichtsjahre sind dabei NICHT gleichzusetzen mit Kalenderjahren, (Auswertungsmodi, s. Berichtsteil I, Einleitungstext zu Tabelle 3.5.2 „Jährliche Überprüfung der Inhalationstechnik“).

** Der „letzte“ Wert wird anhand des Unterschriftsdatums des Arztes identifiziert. War diese Definition nicht eindeutig, weil für ein Halbjahr mehrere Dokumentationen mit dem gleichen Datum vorlagen, wurde folgendermaßen verfahren: War die Dokumentation in verschiedenen Datenlieferungen enthalten, wurde diejenige aus der letzten Datenlieferung verwendet. Lagen danach immer noch zwei oder mehrere Dokumentationen mit demselben Unterschriftsdatum vor, wurde der medizinisch ungünstigste Wert in die Auswertung einbezogen.

Anhang B: Glossar

Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung) – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

Antragsregion – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

arithmetisches Mittel – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

Asthma (bronchiale) – Asthma ist eine entzündliche Erkrankung der Atemwege, die durch anfallsweise auftretende Atemnot gekennzeichnet ist. Ursächlich sind eine Entzündung sowie eine erhöhte Empfindlichkeit der Bronchien (Atemwege). Asthmaanfälle können durch spezifische und unspezifische Reize ausgelöst werden.

Asthmaanfall – Bei einem Asthmaanfall nehmen die Beschwerden innerhalb weniger Stunden zu und führen zu einer akuten Verschlechterung des Zustands des Patienten, eventuell sogar zum Tod.

auswertbare Patienten – Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

Auswertungs(halb)jahr – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmer erfolgen.

Bedarfsmedikation/Bedarfsmedikamente – Bedarfs- bzw. Notfallmedikamente dienen der schnellen Beseitigung akuter Beschwerden.

Beitritts(halb)jahr – Kalenderhalbjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

Beta-2-Sympathomimetika – Hierbei handelt es sich um eine Medikamentengruppe, die die bei Asthma verengten Bronchien (Luftäste) entspannt und dadurch erweitert. Beta-2-Sympathomimetika werden in lang- und kurzwirkende Medikamente unterteilt.

BMI (Body-Mass-Index) – Verhältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts, berechnet durch Körpergewicht in Kilogramm dividiert durch Körpergröße in Meter zum Quadrat.

Body-Mass-Index – siehe BMI

Bronchien – Mit Bronchien bezeichnet man die Luftäste in der Lunge.

Brummen – asthmatypisches Atemgeräusch

CI (confidence interval) – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

Dauermedikation – Zur regelmäßigen Einnahme bestimmte Medikamente. Dauermedikamente dienen in der Asthmathherapie der Langzeitkontrolle der Erkrankung. Sie wirken der Ursache der Asthma-Erkrankung entgegen.

DMP (Disease-Management-Programm[e]) – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

ED – siehe Erstdokumentation

Eintrittszeitpunkt (EZ) – In allen tabellarischen Auswertungen wird in der ersten Spalte ausgewiesen, in welchem Kalenderhalbjahr der Eintrittszeitpunkt des Patienten in das Programm fiel bzw. welcher Halbjahreskohorte er angehört.

Erstdokumentation – Mit der Einschreibung des Patienten in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

Erstmanifestation – Erstmaliges Erkennbarwerden z.B. einer Erkrankung oder einer Erbanlage.

Exazerbation – Exazerbation bezeichnet die akute Verschlechterung von Krankheitssymptomen.

EZ – siehe Eintrittszeitpunkt

FD – siehe Folgedokumentation

Folgedokumentation – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

Giemen – asthmatypisches Atemgeräusch

Glukokortikosteroide – Glukokortikosteroide sind eine Gruppe von Medikamenten, die zu den wirkungsvollsten in der Asthmathherapie zählen. U.a. wirken sie entzündungshemmend und antiallergisch. In der Therapie asthmatischer Erkrankungen werden sie als Dauermedikation verwendet. Glucocorticosteroide können als Inhalativum (zur Einatmung), parenteral (als Injektion) oder oral (in Tablettenform) verabreicht werden.

Häusliche Krankenpflege – In der Wohnung der Patienten erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungspflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

Heilmittel – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen oder einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) und Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

Hilfsmittel – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

Inhalation – Inhalation bezeichnet das Einatmen gasförmiger (Wirk)Stoffe. Durch Inhalation gelangen Wirkstoffe direkt in die Atemwege.

Inhalativum – Medikament zur Einatmung (Inhalation).

Inhalator – Gerät zur Einatmung (Inhalation) gasförmiger Medikamente.

Kohorte bzw. Halbjahreskohorte – Gesamtheit der Teilnehmer eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patienten, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

Kollektiv – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Konfidenzintervall – siehe CI

Krankengeld – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstaufschlag ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

Mean – siehe arithmetisches Mittel

Median – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

Medizinische Datensätze – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 500 EA und (ab der 12. RSA-ÄndV) SA 500 ED sowie für die Folgedokumentationen die SA 500 FA und (ab der 12. RSA-ÄndV) SA 500 FD.

Monotherapie – Unter einer Monotherapie versteht man die Behandlung mit einem Medikament, das nur eine Wirksubstanz enthält. Eine Kombinationstherapie arbeitet dagegen mit Medikamenten mit zwei oder mehr Wirksubstanzen.

OD-Daten – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmer verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmer vor. Diese Daten werden als Satzart 100 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patient und Jahr vor.

Oral – Ein Medikament kann oral gegeben werden, d.h. durch den Mund z.B. in Form einer Tablette.

Parenteral – Ein Medikament kann parenteral gegeben werden, d.h. unter Umgehung des Verdauungstraktes als Injektion oder Infusion.

Peak-Flow – Der Peak-Flow -Wert bezeichnet die Atemstromstärke, mit der eine Person bei maximaler Anstrengung ausatmen kann.

Pfeifen – asthmatypisches Atemgeräusch

PM-Daten – Patientenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientenmerkmale wie Geschlecht und Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

Programtteilnehmer – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

Restkohorte – Gesamtheit der Patienten einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programtteilnehmer sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV) – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidität) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

Selbstmanagementplan – Ein mit dem behandelnden Arzt erstellter Plan, der den Patienten in die Lage versetzen soll, sich bei Verschlechterung seines Krankheitszustands richtig zu verhalten.

Subkohorte – Untergruppe der Patienten einer Kohorte. Alle Patienten werden zum Zeitpunkt der Erstdokumentation nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen in drei Subkohorten unterteilt. Diese Einteilung bleibt über den gesamten Berichtszeitraum bestehen, auch wenn sich der Schweregrad der Begleit- oder Folgeerkrankungen im Zeitverlauf ändert.