

AOK Curaplan Brustkrebs der AOK Brandenburg - Die Gesundheitskasse

Berichtstyp: Evaluationsbericht

Auswertungshalbjahre: 2004-1 bis 2011-1

Abgabedatum: 30. September 2012

Evaluatoren:

infas infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn

prognos
Prognos AG
Schwanenmarkt 21
40231 Düsseldorf

WIAD Wissenschaftliches Institut der Ärzte
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.
Uhierstr. 78
53175 Bonn

Zusammenfassung	6
0. Einleitung	8
Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation	9
0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten	12
Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard	13
0.2 Beispiel für eine tabellarische Darstellung	15
Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patientinnenzahlen und UICC-Stadien	15
0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Auswertungsgruppen und Kollektive	16
Tabelle 0.3.1 Abgrenzung der Auswertungsgruppen vor und nach der 13. RSA-ÄndV	17
Tabelle 0.3.2 Definition der UICC-Stadien	17
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	18
Auswertungskapitel 1: Patientinnenzahlen und -merkmale insgesamt	18
Tabelle 1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien	18
Tabelle 1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	21
Tabelle 1.3 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	26
Tabelle 1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	27
Tabelle 1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren	31
Tabelle 1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	32
Tabelle 1.7 Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren	36
Tabelle 1.8 Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien	37
Tabelle 1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	39
Tabelle 1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	40
Tabelle 1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation	41
Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer	43
Tabelle 2.1 Leistungserbringer	44
Auswertungskapitel 3: Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)	45
3.1 Patientinnenzahlen und –merkmale	45
Tabelle 3.1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1	45
Tabelle 3.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	48
Tabelle 3.1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	53
Tabelle 3.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 1	57
Tabelle 3.1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	58
Tabelle 3.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 1	62
Tabelle 3.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 1	63
Tabelle 3.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1	64
Tabelle 3.1.12 TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	66
Tabelle 3.1.13 TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	74
Tabelle 3.1.14 TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium, Auswertungsgruppe 1	82
Tabelle 3.1.15 Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	86
3.2 Medizinische Auswertungen	90
Tabelle 3.2.1 Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1	90
Tabelle 3.2.2 Patientinnen mit Tumgröße pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1	92
Tabelle 3.2.3 Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1	94
Tabelle 3.2.4 Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	96
Tabelle 3.2.5 Patientinnen mit Tumgröße pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	98
Tabelle 3.2.6 Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	100
Tabelle 3.2.7 Patientinnen nach Mastektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach axillärer Lymphonodektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	102
Tabelle 3.2.8 Patientinnen mit einem niedrigen Risiko: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1	104

3.3 Überlebenszeiten	106
Tabelle 3.3.1 Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	106
Tabelle 3.3.1.1 Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	108
Tabelle 3.3.1.2 Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	110
Tabelle 3.3.1.3 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	112
Tabelle 3.3.1.4 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	114
Tabelle 3.3.1.5 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	116
Tabelle 3.3.1.6 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1	118
Tabelle 3.3.1.7 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	120
Tabelle 3.3.1.8 Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	122
Tabelle 3.3.2 Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	124
Tabelle 3.3.2.1 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	127
Tabelle 3.3.2.2 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	130
Tabelle 3.3.2.3 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	133
Tabelle 3.3.2.4 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	136
Tabelle 3.3.2.5 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	139
Tabelle 3.3.2.6 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1	142
Tabelle 3.3.2.7 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	145
Tabelle 3.3.2.8 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	148
Tabelle 3.3.3 Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	151
Auswertungskapitel 4: Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)	154
4.1 Patientinnenzahlen und -merkmale	154
Tabelle 4.1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2	154
Tabelle 4.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	157
Tabelle 4.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 2	162
Tabelle 4.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 2	163
Tabelle 4.1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	164
Tabelle 4.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 2	168
Tabelle 4.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 2	169
Tabelle 4.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2	170
Auswertungskapitel 5: Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 3)	172
5.1 Patientinnenzahlen und -merkmale	172
Tabelle 5.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 3	172
Tabelle 5.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	173
Tabelle 5.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 3	177
Tabelle 5.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 3	178
Tabelle 5.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 3	179
Tabelle 5.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 3	180
Tabelle 5.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3	181
Auswertungskapitel 6: Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 4)	183
6.1 Patientinnenzahlen und -merkmale	183
Tabelle 6.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 4	183
Tabelle 6.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	184
Tabelle 6.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 4	188
Tabelle 6.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 4	189
Tabelle 6.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 4	190
Tabelle 6.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 4	191
Tabelle 6.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4	192

Auswertungskapitel 7: Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 5)	194
7.1 Patientinnenzahlen und -merkmale.....	194
Tabelle 7.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 5.....	194
Tabelle 7.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5.....	195
Tabelle 7.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 5.....	200
Tabelle 7.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 5.....	201
Tabelle 7.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 5.....	202
Tabelle 7.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 5.....	203
Tabelle 7.1.11 Patientinnen ohne medizinischen Dokumentationsbogen im Halbjahr, Auswertungsgruppe 5.....	204
Auswertungskapitel 8: Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 und 2	206
8.3 Überlebenszeiten der Auswertungsgruppen 1 und 2.....	207
Tabelle 8.3.1 Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2.....	207
Tabelle 8.3.2 Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2.....	209
Tabelle 8.3.3 Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2.....	212
Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte	215
Auswertungskapitel 9: Patientinnenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben	216
Tabelle 9.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl).....	216
Auswertungskapitel 10: Leistungsausgaben	218
Tabelle 10.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe).....	218
Tabelle 10.2 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe).....	220
Tabelle 10.3 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe).....	222
Tabelle 10.4 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe).....	224
Tabelle 10.5 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe).....	226
Tabelle 10.6 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe).....	228
Tabelle 10.7 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe).....	230
Tabelle 10.8 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe).....	232
Tabelle 10.9 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe).....	234
Tabelle 10.10 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe).....	238
Auswertungskapitel 11: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung	240
Tabelle 11.1 Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmerin und Jahr und Versichertenjahre.....	240
Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität	241
Abb. III.1 Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex.....	243
Auswertungskapitel 12: Rücklaufstatistik	244
Tabelle 12.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl).....	244
Auswertungskapitel 13: Auswertungen zur Lebensqualität	246
Tabelle 13.1 Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	246
Tabelle 13.2 SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	249
Tabelle 13.3 SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	252
Tabelle 13.4 SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	255
Tabelle 13.5 SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	258
Tabelle 13.6 SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	261
Tabelle 13.7 SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	264
Tabelle 13.8 SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	267
Tabelle 13.9 SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	270
Tabelle 13.10 Körperliche Summenskala, Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	273
Tabelle 13.11 Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	276
Tabelle 13.12 SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse.....	279

Anhang A: Methodik und Datengrundlage	283
A.1 Datengrundlage	283
Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP Brustkrebs unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall - ab eDMP)	284
A.2 Qualitätssicherung	286
A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen	288
A.3.1 Präoperative und postoperative Dokumentationen	288
A.3.2 Dokumentationen	289
Tabelle A.3.2.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr	290
A.4 Erläuterung zu Klassifikationen bei Brustkrebs	291
A.4.1 TNM-Klassifikation der Brust in Detail	292
A.4.1.1 pT - Primärtumor	292
A.4.1.2 pN - Regionäre Lymphknoten	292
A.4.1.3 M - Fernmetastasen	293
A.4.1.4 Ergänzungen	293
Anhang B: Glossar	294

Zusammenfassung

Auswertungsgruppen

Die Ergebnisdarstellung des Berichts unterscheidet zwischen fünf Patientinnengruppen mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf bzw. Prognose. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Auswertungsgruppe ‚Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs‘ erst seit dem zweiten Halbjahr 2006 ausgewiesen wird und alle Patientinnen vorher nur in vier Auswertungsgruppen eingeteilt wurden. Die Verteilung der Patientinnen in den Beitrittsjahrgängen ist wie folgt: In die Auswertungsgruppe 1 werden Patientinnen mit einer zum Zeitpunkt der Diagnosestellung des Primärtumors zeitnahen Einschreibung in das DMP eingeordnet. Der Auswertungsgruppe 2 werden Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte, zugeordnet. In der Auswertungsgruppe 3 finden sich Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung. Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs werden erst seit dem zweiten Halbjahr 2006 erfasst und der Auswertungsgruppe 4 zugeteilt. In die Auswertungsgruppe 5 werden Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung eingeordnet.

Ausgeschiedene Patientinnen*

Eine Patientin kann im Zeitverlauf aus dem Programm ausscheiden. Als Gründe für das Ausscheiden kommen das Versterben der Patientin, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung des Programms durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (Heilung bzw. Tumorfreiheit) in Betracht. Die meisten der ausgeschiedenen Patientinnen wurden aus dem Programm ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien sind durch das BVA festgelegt. Wird eine Patientin - bei kontinuierlicher Teilnahme am DMP - aus technischen Gründen aus dem DMP ausgeschrieben und im Anschluss wieder eingeschrieben, so wird dies als Ausscheiden und Teilnahme eines neuen Falls gewertet.

Sentinel-Lymphknoten-Biopsie*

Die Entfernung und Analyse des Sentinel-Lymphknotens (Wächterlymphknoten) während der Tumoroperation ist die schonendere Alternative zur sogenannten Axilladissektion, bei der alle Achsellymphknoten entfernt werden. Der Wächterlymphknoten wird noch während der Operation auf Krebszellen untersucht. Ist er frei von Krebszellen, werden die anderen Lymphknoten in der Achsel belassen, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht befallen sind. Der Vorteil dieser Methode ist u.a., dass es nach der Operation seltener zu einem Lymphödem des betroffenen Armes kommt.

Brusterhaltende Therapie*

Sofern das Größenverhältnis von Brust und Tumor es zulässt und keine tumorbiologischen Faktoren dagegen sprechen, ist die brusterhaltende Therapie heute das operative Standardverfahren. Dies gilt auch für große Tumore. Entscheidend ist jedoch, dass der Tumor mit ausreichendem Sicherheitsabstand entfernt werden kann und im Anschluss eine Strahlentherapie durchgeführt wird.

Strahlentherapie*

Die Strahlentherapie ist neben Operation und medikamentöser Behandlung die am häufigsten angewandte Therapieform bei Brustkrebs. Die Bestrahlung schädigt das Erbgut der Zellen. Tumorzellen können im Gegensatz zu gesunden Zellen die entstandenen Schäden jedoch nicht reparieren und gehen zugrunde. Ziel der Strahlentherapie ist es, das Risiko für ein Rezidiv (Wiederauftreten) zu senken. Nach einer brusterhaltenden Operation gehört die Bestrahlung zur Standardtherapie. Nach einer kompletten Entfernung der Brust (Mastektomie) ist eine Bestrahlung u.a. angezeigt, wenn der Tumor sehr groß war (pT3 oder pT4-Tumoren) oder eine vollständige Entfernung nicht oder nur mit geringem Sicherheitsabstand möglich war (R1 / R2-Resektion).

Chemotherapie*

Nach einer Brustkrebs-Operation wird eine Chemotherapie eingesetzt, um evtl. noch im Körper vorhandene Tumorzellen zu zerstören. Bei Patientinnen mit einem niedrigen Rückfallrisiko kann ggf. jedoch auf eine Chemotherapie verzichtet werden. Zur Entscheidung über das Rückfallrisiko werden die Tumorgroße, der Lymphknotenbefall, das Grading (Entartungsgrad), der Rezeptorstatus, der Menopausestatus, andere Erkrankungen und das Alter der Patientin berücksichtigt.

Rezidiv- Metastasen- und Sterberaten*

Von wesentlicher prognostischer Bedeutung bei der Erkrankung Brustkrebs ist das Auftreten von Rezidiven des Tumors am Ort des Ersttumors oder in seiner unmittelbaren Nähe sowie das Auftreten eines kontralateralen Tumors in der zunächst nicht befallenen Brust (diese Gruppe wird in ihrem weiteren Verlauf in der Auswertungsgruppe 4 dargestellt). Weiterhin sind das Auftreten von Metastasen (diese Gruppe wird in ihrem weiteren Verlauf in der Auswertungsgruppe 5 dargestellt) und letztendlich auch das Versterben der Patientinnen wichtige Indikatoren des Behandlungserfolgs oder auch -misserfolgs.

* Sollten in der nachfolgenden tabellarischen Zusammenfassung einzelne Zellen nicht befüllt sein, liegt der Grund in zu geringen Patientinnenanzahlen, aufgrund derer die jeweilige Auswertung nicht durchgeführt werden konnte.

Tabellarische Zusammenfassung

Disease-Management-Programm AOK Curaplan Brustkrebs der AOK Brandenburg - Die Gesundheitskasse					
Variablen			Messzeitpunkt		Nummer/Link zur Tabelle im Bericht
Allgemeine Programm- und Patientendaten	Programmlaufzeit	Starthalbjahr		2004-1	
		Letztes Berichtshalbjahr		2011-1	
		Gesamtlaufzeit bis letztes Berichtshalbjahr (in Jahren)		7,5	
	Teilnehmerinnen insgesamt	Anzahl im letzten Berichtshalbjahr		2.128	1.1
		Insgesamt seit dem Start eingeschriebene Patientinnen		3.159	1.1
		Kumulierter Anteil der ausgeschiedenen Patientinnen (in %)	letztes Folgehalbjahr	36,5	1.2
		Mittleres Alter der Patientinnen bei Eintritt in das DMP (in Jahren)	alle Beitrittsjahre	66,5	1.3
		Mittleres Alter bei Erstmanifestation (in Jahren)	alle Beitrittsjahre	65,5	1.5
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 (in %)	alle Beitrittsjahre	49,3	3.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 2 (in %)	alle Beitrittsjahre	42,6	4.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 3 (in %)	alle Beitrittsjahre	2,3	5.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 4 (in %)	alle Beitrittsjahre	1,3	6.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 5 (in %)	alle Beitrittsjahre	4,4	7.1.1
Medizinische Inhalte (Auswertungsgruppe 1)	Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	Anteil der Patientinnen mit einem negativen (unauffälligen) Lymphknotenbefund an allen Patientinnen mit Sentinel-Lymphknotenbiopsie laut Erstdokumentation (ab 2006-2) (in %)	alle Beitrittsjahre	52,0	3.2.1
	Brusterhaltende Therapie	Anteil der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie an den Patientinnen mit Tumorgroße pTis und pT1 laut Erstdokumentation (in %)	alle Beitrittsjahre	74,9	3.2.2
	Strahlentherapie	Anteil der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie, die innerhalb von 18 Monaten nach dem Beitrittsjahr eine Strahlentherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmejahre	63,2	3.2.4
		Anteil der Patientinnen mit Tumorgroße pT3/pT4 nach Mastektomie, die innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmejahre	42,4	3.2.5
		Anteil der Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie, die innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmejahre	20,0	3.2.6
	Chemotherapie	Anteil der Patientinnen mit geringem Risiko, die innerhalb der ersten 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres keine Chemotherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmejahre	88,6	3.2.8
Rezidiv-, Metastase- und Sterberaten (Auswertungsgruppe 1)	Rezidiv / kontralateraler Tumor	Kumulierter Anteil der Patientinnen mit neu aufgetretenem lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor (in %)	letztes Folgehalbjahr	1,9	3.3.3
	Metastasierung	Kumulierter Anteil der Patientinnen mit neu aufgetretenen Metastasen (in %)	letztes Folgehalbjahr	6,2	3.3.3
	Verstorbene Patientinnen	Anteil der seit DMP-Beginn verstorbenen Patientinnen (in %)	letztes Folgehalbjahr	11,2	1.2

0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patientinnen wird über den gesamten Verlauf einer (chronischen) Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert, sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patientinnen sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen, sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patientinnen durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrunde liegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientinnenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Brustkrebs waren demnach sämtliche DMP zum 30.09.2009 zu evaluieren. Anschließend soll alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 30.09.2011, zum 30.09.2013, etc. erfolgen. Im September 2011 wurde durch das BVA beschlossen, die Erstellung der Evaluationsberichte für die Indikation Brustkrebs um ein Jahr auf den 30.09.2012 zu verschieben, so dass die vorliegenden Berichte die Aktualisierung der Evaluationsberichte aus September 2009 darstellen.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welche Inhalte der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Es ist zu beachten, dass sich entsprechend der Vorgaben des BVA die durchgeführten Auswertungen hinsichtlich Anzahl und Art zwischen den einzelnen Auswertungsgruppen bzw. zwischen den Auswertungsgruppen und der Gesamtheit der Patientinnen unterscheiden.

Quantitativ bedeutsam ist jedoch vor allem die Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008, die für die Programmteilnehmer zum 31.03.2008 relevant wurde. Vor der Fusion nahmen die Versicherten der Seekrankenkasse an den AOK-Programmen teil, seit der Fusion an den Knappschafts-Programmen. Gemäß der aktuell gültigen Evaluationskriterien des BVA gilt diesbezüglich: „Von Fusionen und Dienstleisterwechseln betroffene Patienten sind mit ihrer gesamten DMP-Historie in der Programmauswertung zu führen, der sie aufgrund ihrer aktuellen Programmteilnahme zuzuordnen sind.“

In allen Berichten der Indikation Brustkrebs, die ab dem 30.09.2009 einzureichen sind, werden daher – anders als in den vorigen Berichten – die Versicherten der ehemaligen See-Krankenkasse von Beginn an nicht mehr in den AOK-Berichten evaluiert, sondern in den Knappschaftsberichten – also auch für Halbjahre vor der Fusion. Folglich können fusionsbedingt in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 die Patientinnenzahlen in den AOK Berichten z.T. deutlich geringer ausfallen als in früheren Berichten, die Patientinnenzahlen in den Knappschaftsberichten dagegen z.T. deutlich höher. Somit können für diese Halbjahre auch die ausgewiesenen Evaluationsergebnisse von denen voriger Berichte abweichen.

Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	
1. Patientinnenzahlen und –merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen und UICC-Stadien - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen gemäß für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren - Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
2. Leistungserbringer	<ul style="list-style-type: none"> - Ärzte - Gynäkologen - onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte - Stationäre Einrichtungen
3. Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)	<ul style="list-style-type: none"> Patientinnenzahlen und UICC-Stadien - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen gemäß für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren - Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation - mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie - Brusterhaltende Therapie - Entfernte Lymphknoten - Strahlentherapie - unterbliebene Chemotherapie - (Tumorfreie) Überlebenszeit - Rezidiv- und Sterberaten
4. Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen und UICC-Stadien - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
5. Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
6. Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
7. Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 5)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen gemäß für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren - Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte	
8. Patientinnenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Ausscheiden aus dem Programm
9. Leistungsausgaben (Stichprobe)	Leistungsausgaben für die nachfolgenden Bereiche insgesamt (inklusive Diaylse-Sachkosten) und einzeln: <ul style="list-style-type: none"> - ambulante ärztliche Behandlung - Krankenhausbehandlung - Patientinnen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt - Arzneimittel - Heilmittel - Hilfsmittel - Anschlussrehabilitation - häusliche Krankenpflege - Krankengeld
10. Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung	Durchschnittliche Kosten pro Patientinnenjahr
Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität*	
11. Patientinnenzahlen der Stichprobe für den SF36	- Patientinnenzahlen und Rücklaufquote
12. Veränderung der subjektiven Lebensqualität (Stichprobe)*	Gesundheitszustand im Vergleich zum Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> - Körperliche Funktionsfähigkeit - Körperliche Rollenfunktion - Körperliche Schmerzen - Allgemeine Gesundheitswahrnehmung - Vitalität - Soziale Funktionsfähigkeit - Emotionale Rollenfunktion - Psychisches Wohlbefinden - Körperliche Summenskala - Psychische Summenskala - SF-6D-Gesamtindex
Anhang A: Methodik und Datengrundlage (einschl. Erläuterung zu Klassifikationen bei Brustkrebs)	
Anhang B: Glossar	

*Die Lebensqualitätsbefragung wird vom BVA erstmalig ab der 2. Halbjahreskohorte 2006 gefordert.

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den „Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme bei Brustkrebs“ am 05.10.2011 (Version 5.4) veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbetrachtung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Abschlussberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen.

Der vorliegende Bericht evaluiert das Disease-Management-Programm „AOK Curaplan Brustkrebs“ der AOK zur Behandlung von Brustkrebs in der Antragsregion Brandenburg. Die Akkreditierung für das Programm wurde am 24.11.2004, also im Halbjahr 2004-1 erteilt. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmerinnen des Programms vom Zeitpunkt Ihres Beitritts bis einschließlich des Halbjahres 2011-1 beobachtet. Am AOK Curaplan Brustkrebs nehmen die Versicherten der AOK Brandenburg und gegebenenfalls länderübergreifend betreute AOK-Versicherte anderer Regionen teil..

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.¹ Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs der Knappschaft teil. Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

¹ Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patientinnen mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patientinnen und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patientinnen halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2003-1“, „Kohorte 2003-2“, „Kohorte 2004-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt der einzelnen Teilnehmerin in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1. verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2003-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc. Zu beachten ist dabei, dass sich die Spaltenüberschriften auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patientinnen beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche Kalenderhalbjahre.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

Eintrittszeitpunkt	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr
2003-1	Wert für 2003-1	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...
2003-2	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...	
2004-1	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...		
2004-2	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...			
2005-1	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...				
2005-2	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...					
2006-1	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...						
2006-2	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...							
2007-1	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...								
2007-2	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...									
2008-1	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...										
2008-2	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...											
2009-1	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...												
2009-2	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...													
2010-1	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...														
2010-2	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...															
2011-1	Wert für 2011-1	...																
...	...																	

Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patientinnen zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte die Patientin zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2005 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2005-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2005 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2005-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patientinnen keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patientinnen bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientinnenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit die Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Dennoch wird im Folgenden in der Regel vereinfachend von „Patientinnen“, „Teilnehmerinnen“ oder „Versicherten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Darüber hinaus ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patientinnen aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinander folgenden Dokumentationen zu einem Ausschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patientinnen, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind, als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patientinnen in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patientinnen.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patientinnen der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“.

Diejenigen Patientinnen, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare Patientinnen**“ bezeichnet.² Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patientinnen zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

²Die „nicht auswertbaren“ Patientinnen ergeben sich als Differenz zwischen den „Patientinnen insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patientinnen.

0.2 Beispiel für eine tabellarische Darstellung

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der **Patientinnenzahlen und UICC-Stadien** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, sind auch in den Auswertungskapiteln die Tabellen mit einem entsprechenden Erläuterungstext und Lesebeispiel versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

Die Lesebeispiele werden automatisch befüllt und beziehen sich unabhängig vom jeweils betrachteten Bericht immer auf dieselben Tabellenzellen. Da die Inhalte dieser Tabellenzellen zwischen den Evaluationsberichten abweichen, können hinsichtlich der Befüllung der Lesebeispiele zwei Besonderheiten auftreten.

1. Die Lesebeispiele enthalten -- anstatt Zahlen. Dies ist der Fall, wenn in der Kohorte überhaupt keine Patientinnen eingeschrieben sind. Dann enthalten die Lesebeispiele zwangsläufig keine Ergebnisse. Aus Datenschutzgründen werden die Lesebeispiele zu den Patientinnenmerkmalen - ausgenommen ist hier die Tabelle mit den Angaben zu den eingeschriebenen Patientinnen - ebenfalls mit -- gefüllt, wenn die Kohorten weniger als 10 Patientinnen enthalten.

2. Die Lesebeispiele sind leer, d.h. ohne Angaben. In diesen Fällen liegen für das betrachtete Halbjahr und den betrachteten Parameter keine Angaben mehr vor, weil zu diesem Zeitpunkt keine Teilnehmerin mehr in das Programm eingeschrieben ist. Daher können in diesen Fällen auch die Lesebeispiele keine Angaben enthalten.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patientinnen in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 die erste Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ Tabelle zu den **Patientinnenzahlen und UICC-Stadien** mit der zweiten Spalte. In der Beispieltabelle 0.2.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 229 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 44 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des zehnten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 110 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des zehnten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im zehnten Berichtshalbjahr noch 21.

Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patientinnenzahlen und UICC-Stadien

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
Kohorte	Patientinnen insgesamt	Anzahl	229	213	205	171	161	151	140	134	120	110					
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3					
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	44	42	41	36	34	32	30	28	25	21					
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	50	46	46	36	34	32	30	30	25	24					
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	22	21	21	21	20	19	18	17	14	13					
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	22	20	20	19	18	17	16	14	12	11					
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4	2	2	1	1	1	1	1					
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	12	11	10	8	7	7	6	6	5	5					
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	9	7	7	5	5	5	3	3	3	3						

0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Auswertungsgruppen und Kollektive

Bei der tabellarischen Darstellung wird nicht nur danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patientinnen dem DMP beigetreten sind, sondern – in den Tabellen zu Patientinnenmerkmalen und -zahlen – auch nach Altersgruppen. Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach

- Auswertungsgruppen und
- Kollektiven

Bei der Erkrankung Brustkrebs fällt sowohl die Art der bösartig veränderten Zellen, dem (möglichst frühzeitigen) Zeitpunkt der Entdeckung bzw. Diagnosestellung sowie dem Vorhandensein von Rezidiven bzw. Nah- und Fernmetastasen eine ganz erhebliche prognostische Bedeutung zu. Daher wird nachfolgend die Gesamtgruppe der Erkrankten gemäß der BVA-Kriterien in fünf **Auswertungsgruppen** unterteilt. Abgrenzungskriterien sind dabei das Datum der feingeweblichen Untersuchung (Histologie) und der Schweregrad der Erkrankung. Diese Einteilung wird anhand der Angaben in der Erstdokumentation vorgenommen und bleibt unabhängig vom weiteren Krankheitsverlauf über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. Im vorliegenden Bericht werden gemäß der Evaluationskriterien des BVA folgende fünf Auswertungsgruppen gebildet:

- **Auswertungsgruppe 1:** Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte
- **Auswertungsgruppe 2:** Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte
- **Auswertungsgruppe 3:** Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung
- **Auswertungsgruppe 4:** Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung
- **Auswertungsgruppe 5:** Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung

Zu beachten ist dabei, dass durch die mit der 13. RSA-ÄndV verbundenen Änderungen lediglich die Auswertungsgruppe 5 unverändert gebildet wird. Die Auswertungsgruppe 4 wird dagegen mit der Kohorte 2006-2 erstmalig gebildet. Sie setzt sich zusammen aus Patientinnen, die vor der 13. RSA-ÄndV den Auswertungsgruppen 1 bis 3 zugeordnet worden wären. Dies führt zu einem Bruch in der Zeitreihe: In den Kohorten bis 2006-1 wurden die Auswertungsgruppen 1 bis 3 systematisch anders abgegrenzt als in den Kohorten ab 2006-2 (siehe auch Tabelle 0.3).

Neben dieser Aufteilung nach Patientinnengruppen mit unterschiedlichen Prognosen zum Zeitpunkt der Einschreibung in das DMP werden in jeder Gruppe die neu aufgetretenen Anteile von Patientinnen ausgewiesen, bei denen Lokalrezidive oder Metastasierung festgestellt oder das Versterben dokumentiert wurde.

Zu beachten ist, dass für die Bildung der Auswertungsgruppen 1 und 2 Angaben zur Histologie erforderlich sind. Patientinnen ohne Metastasen und ohne Rezidive, bei denen die Angabe zur Histologie fehlt oder unplausibel ist, können daher keiner Auswertungsgruppe zugeordnet werden. Folglich kann die Summe der Patientinnen über die fünf Auswertungsgruppen geringer ausfallen als die Anzahl der Patientinnen insgesamt.

Innerhalb der Auswertungsgruppen wird für einige Auswertungen zusätzlich nach „**Kollektiven**“ unterschieden. Einem Kollektiv wird diejenige Teilgruppe der Patientinnen einer Auswertungsgruppe zugeordnet, bei der in der Erstdokumentation eine bestimmte Therapie, ein bestimmter Befund oder ein bestimmtes Risiko dokumentiert war. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Tabelle 0.3.1 Abgrenzung der Auswertungsgruppen vor und nach der 13. RSA-ÄndV

Nr.	Auswertungsgruppe	Definition vor 13. RSA-ÄndV	Definition nach 13. RSA-ÄndV
1	Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation bis zu 12 Wochen und gleichzeitig - kein lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation bis zu 12 Wochen und gleichzeitig - keine lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen - kein kontralateraler Brustkrebs (sonst Gruppe 4)
2	Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (fortgeschrittene Primärtherapie);	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation größer als 12 Wochen und gleichzeitig - kein lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation größer als 12 Wochen und gleichzeitig - kein lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen - kein kontralateraler Brustkrebs (sonst Gruppe 4)
3	Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung;	gesicherter Nachweis eines lokoregionären Rezidivs liegt vor und gleichzeitig - kein gesicherter Nachweis zu Fernmetastasen liegt vor	gesicherter Nachweis eines lokoregionären Rezidivs liegt vor und gleichzeitig - kein gesicherter Nachweis zu Fernmetastasen liegt vor - kein kontralateraler Brustkrebs, wenn das Lokalrezidiv älter als 4,5 Jahre ist (sonst Gruppe 4)
4	Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (nur ab 13. RSA-ÄndV)	-----	Befund eines kontralateralen Brustkrebses liegt vor und gleichzeitig - kein Nachweis eines lokoregionären Rezidivs, (Ausnahme: Angabe in diesem Feld liegt länger als 4,5 Jahre zurück) - kein gesicherter Nachweis zu Fernmetastasen
5	Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung;	gesicherter Nachweis von Fernmetastasen liegt vor	

Tabelle 0.3.2 Definition der UICC-Stadien³

Stadium	Tumorgröße	Nodalstatus	Metastasierung
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
IIA	T0, T1	N1	M0
IIB	T2	N0	M0
IIB	T2	N1	M0
IIB	T3	N0	M0
IIIA	T0, T1, T2	N2	M0
IIIA	T3	N1, N2	M0
IIIB	T4	N0, N1, N2	M0
IIIC	Jedes T	N3	M0
IV	Jedes T	Jedes N	M1

³ Union internationale contre le cancer

Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte

Auswertungskapitel 1: Patientinnenzahlen und -merkmale insgesamt

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der **Patientinnenzahlen und UICC-Stadien** ab dem Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patientinnen eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen. Wenn eine Kohorte keine Patientinnen mit auswertbaren Angaben für den ersten Berichtsteil umfasst, sind die entsprechenden Felder mit - - gefüllt. In allen anderen Fällen sind in der folgenden Tabelle die Patientinnenzahlen der Kohorten ausgewiesen. Diese Angabe erfolgt hier zur Information unabhängig davon, ob die Kohorte die Mindestgröße von 10 Patientinnen erreicht. Sofern eine Kohorte diese Mindestgröße nicht erreicht, sind in allen anderen Auswertungen die entsprechenden Felder mit „-“ gefüllt.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2004-2 insgesamt 278 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 73 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 40 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 7 Patientin/Patientinnen.

Tabelle 1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien⁴

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0	0											
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0												
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	278	233	211	189	158	145	131	121	111	94	77	63	40	40
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	7	7	7	6	5	5	5	5	4	4	4	2	2	2
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	73	62	58	55	48	44	38	37	33	29	20	13	7	7
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	69	59	55	50	40	36	33	32	30	26	21	19	12	12
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	45	34	31	25	22	21	18	14	12	10	9	8	4	4
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	18	15	11	10	10	10	10	10	10	7	5	5	3	3
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	12	9	7	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	16	14	13	12	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	197	168	161	151	137	130	122	115	103	88	79	69	42	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	7	7	7	6	6	6	5	5	5	4	3	2	2	
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	45	37	37	35	29	26	26	25	20	16	15	11	7	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	44	38	36	34	30	30	30	27	26	23	21	20	14	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	20	17	15	15	14	12	10	10	6	2	2	2	2	
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	11	8	8	8	7	7	7	7	7	6	5	4	4	
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	8	7	7	5	5	5	4	3	3	3	3	3	2	
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	17	14	11	9	8	7	6	5	5	5	5	5	5		
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	180	169	150	145	141	136	127	120	111	106	104	91		
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2		
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	29	28	25	25	25	25	20	18	17	17	17	15		
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	37	36	33	32	31	30	28	27	25	23	22	16		
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	16	16	15	15	15	15	15	14	13	13	13	10		
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	18	14	12	12	12	12	12	11	10	9	9	8		
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3		
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	9	9	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5		
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	13	11	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7			

⁴ Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass die Summe der Patientinnen aus den UICC-Kategorien in der Regel kleiner ausfällt als die Anzahl der Patientinnen insgesamt. Mögliche Abweichungen entstehen, weil die Patientinnen für die UICC-Stadien nicht auswertbar sind (keine Angaben bzw. die TNM-Kombination kann keinem UICC-Stadium zugeordnet werden) und weil Patientinnen mit der Angabe ‚keine OP‘ nicht für die Kategorien IIIC und IV berücksichtigt wurden.

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	266	259	235	223	213	204	191	182	166	156	140			
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0			
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	59	56	54	53	53	50	46	46	42	39	32			
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	53	51	45	42	40	40	40	38	34	30	28			
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	26	26	23	22	20	20	20	19	17	17	15			
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	23	23	22	21	20	18	16	16	15	13	12			
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	0			
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	10	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	14	14	11	10	9	7	6	6	5	5	4				
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	229	213	205	171	161	151	140	134	120	110				
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3				
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	44	42	41	36	34	32	30	28	25	21				
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	50	46	46	36	34	32	30	30	25	24				
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	22	21	21	21	20	19	18	17	14	13				
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	22	20	20	19	18	17	16	14	12	11				
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4	2	2	1	1	1	1	1				
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	12	11	10	8	7	7	6	6	5	5				
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	9	7	7	5	5	5	3	3	3	3					
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	284	279	267	239	229	219	201	191	177					
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	5	5	4	4	4	3	3	3	3					
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	59	59	57	51	46	43	39	37	35					
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	69	69	66	63	61	60	56	52	48					
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	31	30	28	20	19	17	13	13	12					
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	14	12	12	10	10	10	8	7	6					
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	12	12	12	10	10	8	8	8	8					
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	22	21	20	16	15	15	15	13	12						
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	227	222	215	205	185	176	168	159						
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	8	8	8	7	4	4	3	3						
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	42	42	41	41	37	34	30	29						
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	44	43	43	40	40	36	36	33						
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	30	29	29	26	19	18	18	18						
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	13	13	11	11	11	11	10	7						
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3						
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	12	12	11	11	10	10	10	10						
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	17	15	13	13	10	10	10	9							
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	249	242	233	228	220	208	200							
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	5	5	5	5	4	4	4							
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	51	51	51	51	50	48	47							
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	59	59	59	57	55	51	48							
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	16	16	15	15	15	14	13							
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11							
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4	3	3	3	3							
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	15	14	14	14	13	12	11							
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	14	10	8	8	8	6	6								
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	194	191	182	180	175	166								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3	3								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	49	48	46	46	46	43								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	46	45	44	43	41	40								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	18	18	17	17	17	16								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	6	6	6	6	5	4								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4	4	3	3								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	10	10	9	9	9	9								
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	8	8	8	8	7	5									

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	210	209	208	203	199										
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	9	9	9	9	9										
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	60	59	59	57	57										
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	44	44	43	43	42										
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	23	23	23	23	23										
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	10	10	10	10	10										
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	1	1										
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	6	6	6	5	5										
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4	4											
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	228	223	213	202											
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3											
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	52	52	50	49											
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	46	44	41	40											
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	21	21	21	18											
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	13	13	12	10											
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	3	3											
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	11	10	9	9											
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	12	11	10	9												
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	222	216	212												
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	9	9	9												
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	61	61	59												
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	46	45	44												
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	18	18	17												
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	6	6	6												
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	3												
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4	4												
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	8	7	7													
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	206	202													
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	9	9													
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	54	54													
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	42	41													
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	18	18													
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	6													
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	7	6													
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4													
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	10	10														
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	188														
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3														
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	57														
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	33														
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	20														
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	14														
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3														
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	8														
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	7															

Tabelle 1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Kranken-

kasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2004-2 mit 278 Teilnehmerinnen. 238 von ihnen bzw. 85,61 Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Tabelle 1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2004-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	45	67	89	120	133	147	157	167	184	201	215	238	238	238	
		Anteil in %	16,19	24,10	32,01	43,17	47,84	52,88	56,47	60,07	66,19	72,30	77,34	85,61	85,61	85,61	
		CI Anteil in %	[11,85; 20,52]	[19,06; 29,14]	[26,52; 37,51]	[37,33; 49,00]	[41,96; 53,72]	[47,00; 58,76]	[50,64; 62,31]	[54,30; 65,84]	[60,62; 71,76]	[67,03; 77,57]	[72,41; 82,27]	[81,48; 89,74]	[81,48; 89,74]	[81,48; 89,74]	
	davon wegen Tod	Anzahl	2	6	12	23	28	30	32	34	36	36	37	37	37	37	
		Anteil in %	0,72	2,16	4,32	8,27	10,07	10,79	11,51	12,23	12,95	12,95	13,31	13,31	13,31	13,31	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	42	52	57	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
		Anteil in %	15,11	18,71	20,50	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	3	4	4	6	7	8	9	10	11	11	11	11	
		Anteil in %	0,00	0,36	1,08	1,44	1,44	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60	3,96	3,96	3,96	3,96	
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	7	15	22	30	40	47	54	68	84	96	119	119	119	
		Anteil in %	0,36	2,52	5,40	7,91	10,79	14,39	16,91	19,42	24,46	30,22	34,53	42,81	42,81	42,81	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Anteil in %	0,00	0,36	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	278	233	211	189	158	145	131	121	111	94	77	63	40	40	
Anzahl		233	211	189	158	145	131	121	111	94	77	63	40	40	40		
2005-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	29	36	46	60	67	75	82	94	109	118	128	155	155		
		Anteil in %	14,72	18,27	23,35	30,46	34,01	38,07	41,62	47,72	55,33	59,90	64,97	78,68	78,68		
		CI Anteil in %	[9,76; 19,68]	[12,86; 23,68]	[17,43; 29,27]	[24,01; 36,90]	[27,38; 40,64]	[31,27; 44,87]	[34,72; 48,53]	[40,72; 54,71]	[48,37; 62,29]	[53,04; 66,76]	[58,30; 71,65]	[72,95; 84,41]	[72,95; 84,41]		
	davon wegen Tod	Anzahl	6	8	14	15	18	23	24	27	30	30	30	30	30		
		Anteil in %	3,05	4,06	7,11	7,61	9,14	11,68	12,18	13,71	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	22	22	25	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
		Anteil in %	11,17	11,17	12,69	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52		
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	3	4	11	15	18	23	32	44	53	63	90	90		
		Anteil in %	0,00	1,52	2,03	5,58	7,61	9,14	11,68	16,24	22,34	26,90	31,98	45,69	45,69		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Anteil in %	0,51	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52		
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	197	168	161	151	137	130	122	115	103	88	79	69	42		
Anzahl		168	161	151	137	130	122	115	103	88	79	69	42	42			

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2005-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	11	30	35	39	44	53	60	69	74	76	89	123		
		Anteil in %	6,11	16,67	19,44	21,67	24,44	29,44	33,33	38,33	41,11	42,22	49,44	68,33		
		CI Anteil in %	[2,60; 9,62]	[11,21; 22,13]	[13,65; 25,24]	[15,63; 27,70]	[18,15; 30,74]	[22,77; 36,12]	[26,43; 40,24]	[31,21; 45,46]	[33,90; 48,32]	[34,99; 49,46]	[42,12; 56,77]	[61,52; 75,15]		
	davon wegen Tod	Anzahl	4	9	10	13	15	18	23	23	25	25	27	30		
		Anteil in %	2,22	5,00	5,56	7,22	8,33	10,00	12,78	12,78	13,89	13,89	15,00	16,67		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	3	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		Anteil in %	1,67	6,11	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7		
		Anteil in %	1,11	2,78	2,78	3,33	3,33	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89		
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	2	5	5	8	13	15	24	27	29	40	71		
		Anteil in %	0,56	1,11	2,78	2,78	4,44	7,22	8,33	13,33	15,00	16,11	22,22	39,44		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Anteil in %		0,56	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67			
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	180	169	150	145	141	136	127	120	111	106	104	91		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	169	150	145	141	136	127	120	111	106	104	91	57		
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	7	31	43	53	62	75	84	100	110	126	139			
		Anteil in %	2,63	11,65	16,17	19,92	23,31	28,20	31,58	37,59	41,35	47,37	52,26			
		CI Anteil in %	[0,70; 4,56]	[7,79; 15,52]	[11,73; 20,60]	[15,12; 24,73]	[18,22; 28,40]	[22,78; 33,61]	[25,98; 37,18]	[31,76; 43,43]	[35,42; 47,28]	[41,36; 53,38]	[46,24; 58,27]			
	davon wegen Tod	Anzahl	2	11	18	21	23	29	32	34	36	39	42			
		Anteil in %	0,75	4,14	6,77	7,89	8,65	10,90	12,03	12,78	13,53	14,66	15,79			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	3	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11			
		Anteil in %	1,13	3,76	3,76	3,76	3,76	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	4	5	8	12	13	13	13	13	13	13			
		Anteil in %	0,38	1,50	1,88	3,01	4,51	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89			
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	5	9	13	16	21	27	41	49	62	72			
		Anteil in %	0,00	1,88	3,38	4,89	6,02	7,89	10,15	15,41	18,42	23,31	27,07			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Anteil in %		0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38				
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	266	259	235	223	213	204	191	182	166	156	140			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	259	235	223	213	204	191	182	166	156	140	127			
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	16	24	58	68	78	89	95	109	119	130				
		Anteil in %	6,99	10,48	25,33	29,69	34,06	38,86	41,48	47,60	51,97	56,77				
		CI Anteil in %	[3,68; 10,30]	[6,50; 14,46]	[19,68; 30,97]	[23,76; 35,63]	[27,91; 40,21]	[32,54; 45,19]	[35,09; 47,88]	[41,12; 54,08]	[45,48; 58,45]	[50,34; 63,20]				
	davon wegen Tod	Anzahl	5	10	18	21	28	35	36	40	42	44				
		Anteil in %	2,18	4,37	7,86	9,17	12,23	15,28	15,72	17,47	18,34	19,21				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
		Anteil in %	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	18	24	24	24	24	24	24	24				
		Anteil in %	0,00	0,00	7,86	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	4	7	8	11	15	20	30	37	46				
		Anteil in %	0,44	1,75	3,06	3,49	4,80	6,55	8,73	13,10	16,16	20,09				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	5	5	5	5	5	5	6	6				
Anteil in %		0,00	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,62	2,62					
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	229	213	205	171	161	151	140	134	120	110				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	213	205	171	161	151	140	134	120	110	99				

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	5	17	45	55	65	83	93	107	121					
		Anteil in %	1,76	5,99	15,85	19,37	22,89	29,23	32,75	37,68	42,61					
		CI Anteil in %	[0,23; 3,29]	[3,22; 8,75]	[11,59; 20,10]	[14,76; 23,97]	[17,99; 27,78]	[23,93; 34,52]	[27,28; 38,21]	[32,03; 43,32]	[36,84; 48,37]					
	davon wegen Tod	Anzahl	4	8	15	20	25	31	34	39	42					
		Anteil in %	1,41	2,82	5,28	7,04	8,80	10,92	11,97	13,73	14,79					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	5	26	26	26	26	26	27	27					
		Anteil in %	0,35	1,76	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,51	9,51					
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	4	4	9	14	26	33	41	52					
		Anteil in %	0,00	1,41	1,41	3,17	4,93	9,15	11,62	14,44	18,31					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	284	279	267	239	229	219	201	191	177					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	279	267	239	229	219	201	191	177	163					
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	5	12	22	42	51	59	68	72						
		Anteil in %	2,20	5,29	9,69	18,50	22,47	25,99	29,96	31,72						
		CI Anteil in %	[0,29; 4,12]	[2,37; 8,20]	[5,83; 13,55]	[13,44; 23,56]	[17,03; 27,91]	[20,27; 31,71]	[23,98; 35,93]	[25,65; 37,79]						
	davon wegen Tod	Anzahl	3	7	15	25	28	30	34	35						
		Anteil in %	1,32	3,08	6,61	11,01	12,33	13,22	14,98	15,42						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	1	1	2	2	2						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,88	0,88	0,88						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	4	6	7	7	7	9	10						
		Anteil in %	0,44	1,76	2,64	3,08	3,08	3,08	3,96	4,41						
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	1	1	9	15	20	23	25						
		Anteil in %	0,44	0,44	0,44	3,96	6,61	8,81	10,13	11,01						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0						
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	227	222	215	205	185	176	168	159						
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	222	215	205	185	176	168	159	155						
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	7	16	21	29	41	49	61							
		Anteil in %	2,81	6,43	8,43	11,65	16,47	19,68	24,50							
		CI Anteil in %	[0,75; 4,87]	[3,37; 9,48]	[4,98; 11,89]	[7,65; 15,64]	[11,85; 21,08]	[14,73; 24,63]	[19,15; 29,85]							
	davon wegen Tod	Anzahl	6	13	16	19	25	27	29							
		Anteil in %	2,41	5,22	6,43	7,63	10,04	10,84	11,65							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1	1	1	1	1	5							
		Anteil in %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,01							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	2	4	9	15	21	27							
		Anteil in %	0,00	0,80	1,61	3,61	6,02	8,43	10,84							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0							
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	249	242	233	228	220	208	200							
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	242	233	228	220	208	200	188							

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	12	14	19	28	31									
		Anteil in %	1,55	6,19	7,22	9,79	14,43	15,98									
		CI Anteil in %	[0,00; 3,29]	[2,79; 9,58]	[3,57; 10,87]	[5,60; 13,99]	[9,47; 19,39]	[10,81; 21,15]									
	davon wegen Tod	Anzahl	2	10	12	15	19	20									
		Anteil in %	1,03	5,15	6,19	7,73	9,79	10,31									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	2	2	2	4	4									
		Anteil in %	0,52	1,03	1,03	1,03	2,06	2,06									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	2	5	7									
Anteil in %		0,00	0,00	0,00	1,03	2,58	3,61										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0										
	Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	194	191	182	180	175	166									
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	191	182	180	175	166	163									
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	2	7	11	19										
		Anteil in %	0,48	0,95	3,33	5,24	9,05										
		CI Anteil in %	[0,00; 1,41]	[0,00; 2,27]	[0,90; 5,77]	[2,22; 8,26]	[5,16; 12,94]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	2	4	9										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,95	1,90	4,29										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	2	4	5	6										
		Anteil in %	0,48	0,95	1,90	2,38	2,86										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	1	2	4										
Anteil in %		0,00	0,00	0,48	0,95	1,90											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0											
	Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	210	209	208	203	199										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	209	208	203	199	191										
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	5	15	26	33											
		Anteil in %	2,19	6,58	11,40	14,47											
		CI Anteil in %	[0,29; 4,10]	[3,35; 9,80]	[7,27; 15,54]	[9,90; 19,05]											
	davon wegen Tod	Anzahl	5	8	15	19											
		Anteil in %	2,19	3,51	6,58	8,33											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	3	3											
		Anteil in %	0,00	0,88	1,32	1,32											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	5	8	11											
Anteil in %		0,00	2,19	3,51	4,82												
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0												
	Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00												
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	228	223	213	202											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	223	213	202	195											

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	6	10	18												
		Anteil in %	2,70	4,50	8,11												
		CI Anteil in %	[0,56; 4,84]	[1,77; 7,24]	[4,51; 11,71]												
	davon wegen Tod	Anzahl	4	5	10												
		Anteil in %	1,80	2,25	4,50												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	2	3												
		Anteil in %	0,45	0,90	1,35												
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	1	3												
Anteil in %		0,00	0,45	1,35													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	2	2													
	Anteil %	0,45	0,90	0,90													
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	222	216	212												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	216	212	204												
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	4	12													
		Anteil in %	1,94	5,83													
		CI Anteil in %	[0,05; 3,83]	[2,62; 9,03]													
	davon wegen Tod	Anzahl	2	8													
		Anteil in %	0,97	3,88													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0													
		Anteil in %	0,00	0,00													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	2													
		Anteil in %	0,97	0,97													
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	1													
Anteil in %		0,00	0,49														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1														
	Anteil %	0,00	0,49														
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	206	202													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	202	194													
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2														
		Anteil in %	1,06														
		CI Anteil in %	[0,00; 2,53]														
	davon wegen Tod	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1														
Anteil in %		0,53															
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1															
	Anteil %	0,53															
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	188														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	186														

In Tabelle 1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 starteten 278 Teilnehmerinnen in das Programm. Das durchschnittliche Alter betrug im Beitrittsjahr 65,72 Jahre, der Median lag bei 67,50 Jahren.

Tabelle 1.3 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	65,72
	Median	67,50
	Fallbasis	278
2005-1	Mean	66,31
	Median	68,00
	Fallbasis	197
2005-2	Mean	66,12
	Median	68,00
	Fallbasis	180
2006-1	Mean	67,48
	Median	70,00
	Fallbasis	266
2006-2	Mean	66,13
	Median	69,00
	Fallbasis	229
2007-1	Mean	67,67
	Median	69,00
	Fallbasis	284
2007-2	Mean	67,53
	Median	70,00
	Fallbasis	227
2008-1	Mean	67,51
	Median	70,00
	Fallbasis	249
2008-2	Mean	67,05
	Median	69,00
	Fallbasis	194
2009-1	Mean	65,16
	Median	67,00
	Fallbasis	210
2009-2	Mean	66,97
	Median	68,00
	Fallbasis	228
2010-1	Mean	65,78
	Median	68,50
	Fallbasis	222
2010-2	Mean	65,80
	Median	68,00
	Fallbasis	206
2011-1	Mean	66,23
	Median	68,00
	Fallbasis	188

In Tabelle 1.4 ist die **Altersverteilung nach Altersklassen** für alle Patientinnen, die im Beitritts halbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“), ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung war nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Auswertungsjahres“ vorzunehmen. Unterschiedliche Altersverteilungen im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patientinnen die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

In der Kohorte 2004-2 entfielen im Beitritts halbjahr 19 Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Tabelle 1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	0-14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15-34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35-39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	40-44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	45-49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	50-54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	55-59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	60-64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	65-69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70-74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75-79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	80-84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	85 und älter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Patientinnen zusammen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	7	5	5	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0
	40-44	12	12	12	8	7	5	5	3	3	3	3	1	1	0	0
	45-49	17	11	10	11	9	8	8	7	6	4	4	2	2	3	3
	50-54	19	15	14	12	9	7	6	4	3	3	3	3	2	2	2
	55-59	12	10	8	8	7	5	5	8	8	6	4	4	2	0	0
	60-64	40	31	28	18	17	17	15	12	11	5	4	2	1	3	3
	65-69	53	39	37	35	30	27	26	22	21	15	13	11	7	3	3
	70-74	43	42	38	34	26	23	22	19	18	22	17	11	6	9	9
	75-79	53	41	34	22	19	18	18	19	18	14	11	10	7	8	8
	80-84	16	23	22	33	27	26	21	20	18	18	14	13	7	6	6
	85 und älter	6	4	3	5	4	6	2	5	4	4	4	6	5	6	6
	Patientinnen zusammen	278	233	211	189	158	145	131	121	111	94	77	63	40	40	
2005-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44	9	7	4	4	5	5	4	4	2	2	1	1	1	1	1
	45-49	12	11	10	9	5	5	5	5	6	5	5	5	3	3	3
	50-54	13	12	12	12	11	11	9	9	9	8	7	6	4	4	4
	55-59	12	10	8	7	8	8	10	10	9	7	7	7	5	5	5
	60-64	27	26	18	17	12	9	6	6	5	5	4	4	2	2	2
	65-69	34	32	32	31	24	22	21	18	15	13	9	6	4	4	4
	70-74	36	31	31	30	33	32	31	30	26	22	16	15	5	5	5
	75-79	29	21	24	21	17	17	16	15	15	12	15	11	9	9	9
	80-84	14	11	14	13	14	14	12	11	10	9	10	9	4	4	4
	85 und älter	8	6	7	6	8	7	8	7	6	5	5	5	5	5	5
	Patientinnen zusammen	197	168	161	151	137	130	122	115	103	88	79	69	42	42	

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2005-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	40-44	9	6	6	6	6	5	4	2	1	1	1	1	2	2	2
	45-49	13	14	13	12	11	11	11	9	9	7	7	5	5	5	5
	50-54	11	10	9	7	7	9	9	10	8	10	10	9	9	9	9
	55-59	7	8	8	11	9	7	7	8	7	5	5	4	4	4	4
	60-64	24	19	17	14	13	9	9	4	4	3	2	3	3	3	3
	65-69	33	27	23	19	19	19	18	18	16	15	14	12	12	12	12
	70-74	32	29	26	27	27	22	21	22	22	20	20	13	13	13	13
	75-79	20	24	22	16	16	22	20	19	17	20	20	18	18	18	18
	80-84	21	21	15	21	21	19	15	13	12	10	10	10	10	10	10
	85 und älter	6	7	7	9	9	11	11	14	14	14	14	15	15	15	15
	Patientinnen zusammen	180	169	150	145	141	136	127	120	111	106	104	91	91	91	91
2006-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	35-39	7	7	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	40-44	16	16	12	10	8	8	7	7	5	5	4	4	4	4	4
	45-49	9	8	13	13	13	12	10	9	9	9	9	9	9	9	9
	50-54	16	16	16	15	11	9	9	9	4	3	2	2	2	2	2
	55-59	13	10	9	9	13	13	11	11	11	10	6	6	6	6	6
	60-64	28	28	19	18	12	12	9	9	9	9	5	5	5	5	5
	65-69	42	42	38	38	35	35	27	27	19	17	17	17	17	17	17
	70-74	32	32	31	30	30	30	36	34	35	32	26	26	26	26	26
	75-79	55	53	50	47	41	39	35	32	25	23	18	18	18	18	18
	80-84	38	37	30	28	34	32	28	26	25	25	27	27	27	27	27
	85 und älter	9	9	13	11	13	11	16	16	22	21	25	25	25	25	25
	Patientinnen zusammen	266	259	235	223	213	204	191	182	166	156	140	140	140	140	140
2006-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	35-39	7	5	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44	10	9	8	8	7	6	6	5	5	3	3	3	3	3	3
	45-49	13	11	10	10	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5
	50-54	11	14	14	12	12	12	12	10	9	7	7	7	7	7	7
	55-59	7	7	6	8	7	5	5	7	6	7	7	7	7	7	7
	60-64	31	18	16	11	11	9	9	4	3	3	3	3	3	3	3
	65-69	37	37	37	28	26	25	22	21	19	14	14	14	14	14	14
	70-74	52	51	50	42	40	37	35	30	25	16	16	16	16	16	16
	75-79	41	36	34	27	27	27	25	28	26	30	30	30	30	30	30
	80-84	16	20	20	18	18	18	18	20	18	20	20	20	20	20	20
	85 und älter	3	4	4	4	3	3	1	2	2	4	4	4	4	4	4
	Patientinnen zusammen	229	213	205	171	161	151	140	134	120	110	110	110	110	110	110
2007-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44	10	10	5	4	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	45-49	15	15	15	15	13	13	14	14	10	10	10	10	10	10	10
	50-54	14	13	15	14	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	55-59	29	29	26	24	25	23	14	14	13	13	13	13	13	13	13
	60-64	18	18	13	13	12	12	19	19	18	18	18	18	18	18	18
	65-69	57	57	52	49	43	41	24	22	16	16	16	16	16	16	16
	70-74	61	59	57	52	46	44	47	46	42	42	42	42	42	42	42
	75-79	49	48	43	37	43	41	40	37	32	32	32	32	32	32	32
	80-84	22	22	29	23	25	23	22	20	25	25	25	25	25	25	25
	85 und älter	9	8	12	8	7	7	10	8	11	11	11	11	11	11	11
	Patientinnen zusammen	284	279	267	239	229	219	201	191	177	177	177	177	177	177	177

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2007-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	2	1	1	1	1	1	1	1							
	35-39	6	5	5	4	4	2	2	1							
	40-44	12	10	9	5	5	7	7	6							
	45-49	13	14	13	16	15	13	12	9							
	50-54	6	5	5	6	5	7	6	8							
	55-59	9	9	9	8	8	5	5	6							
	60-64	24	18	18	15	14	12	12	10							
	65-69	32	35	34	34	29	26	24	20							
	70-74	42	41	40	40	34	30	30	28							
	75-79	41	38	36	32	28	28	27	26							
	80-84	35	36	35	31	29	29	26	24							
	85 und älter	5	10	10	13	13	16	16	20							
	Patientinnen zusammen	227	222	215	205	185	176	168	159							
2008-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0							
	35-39	4	4	3	3	3	3	1	1							
	40-44	7	7	7	7	6	5	4	4							
	45-49	14	13	13	12	7	7	7	7							
	50-54	17	17	12	12	15	13	9	9							
	55-59	15	14	15	15	15	14	15	15							
	60-64	12	12	11	11	8	7	10	10							
	65-69	50	49	44	44	35	34	20	20							
	70-74	59	58	56	55	55	53	54	54							
	75-79	45	43	47	46	46	43	44	44							
	80-84	20	19	16	15	20	20	25	25							
	85 und älter	6	6	9	8	10	9	11	11							
	Patientinnen zusammen	249	242	233	228	220	208	200								
2008-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	2	2	1	1	1	1	1	1							
	35-39	2	1	1	0	0	0	0	0							
	40-44	2	2	2	3	3	3	3	3							
	45-49	13	12	12	9	9	3	3	3							
	50-54	13	12	12	12	12	12	12	12							
	55-59	24	21	20	18	17	11	11	11							
	60-64	14	14	14	15	15	22	22	22							
	65-69	33	29	29	23	23	13	13	13							
	70-74	34	34	32	33	31	34	34	34							
	75-79	30	31	29	34	34	33	33	33							
	80-84	19	24	21	19	18	21	21	21							
	85 und älter	8	9	9	13	12	13	13	13							
	Patientinnen zusammen	194	191	182	180	175	166									
2009-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	2	2	2	2	2	2	2	2							
	35-39	2	2	2	2	1	1	1	1							
	40-44	4	4	4	4	3	3	3	3							
	45-49	10	10	8	8	8	8	8	8							
	50-54	21	20	17	17	13	13	13	13							
	55-59	33	33	31	30	29	29	29	29							
	60-64	19	19	23	23	23	23	23	23							
	65-69	40	40	35	35	32	32	32	32							
	70-74	28	28	28	27	28	28	28	28							
	75-79	31	31	32	30	32	32	32	32							
	80-84	14	14	18	18	20	20	20	20							
	85 und älter	6	6	8	7	8	8	8	8							
	Patientinnen zusammen	210	209	208	203	199										

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2009-2	0-14	0	0	0	0											
	15-34	0	0	0	0											
	35-39	3	2	2	1											
	40-44	8	8	8	6											
	45-49	14	9	7	9											
	50-54	16	17	16	15											
	55-59	19	23	22	18											
	60-64	16	16	16	16											
	65-69	52	43	41	34											
	70-74	35	29	28	30											
	75-79	29	36	36	34											
	80-84	25	25	22	21											
	85 und älter	11	15	15	18											
	Patientinnen zusammen	228	223	213	202											
2010-1	0-14	0	0	0												
	15-34	3	3	3												
	35-39	1	1	0												
	40-44	9	9	8												
	45-49	13	13	10												
	50-54	21	20	21												
	55-59	24	24	22												
	60-64	16	16	17												
	65-69	35	33	25												
	70-74	40	40	44												
	75-79	40	38	34												
	80-84	13	12	19												
	85 und älter	7	7	9												
	Patientinnen zusammen	222	216	212												
2010-2	0-14	0	0													
	15-34	1	1													
	35-39	3	2													
	40-44	9	9													
	45-49	18	15													
	50-54	16	19													
	55-59	19	17													
	60-64	21	21													
	65-69	25	20													
	70-74	29	27													
	75-79	32	36													
	80-84	25	24													
	85 und älter	8	11													
	Patientinnen zusammen	206	202													
2011-1	0-14	0														
	15-34	2														
	35-39	2														
	40-44	6														
	45-49	12														
	50-54	20														
	55-59	15														
	60-64	17														
	65-69	33														
	70-74	22														
	75-79	32														
	80-84	16														
	85 und älter	11														
	Patientinnen zusammen	188														

In Tabelle 1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 lagen im Beitrittsjahr für 278 Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Das durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation betrug 64,36 Jahre, der Median lag bei 66,00 Jahren.

Tabelle 1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren	Beitritts-halbjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	64,36
	Median	66,00
	Fallbasis	278
2005-1	Mean	64,76
	Median	66,00
	Fallbasis	197
2005-2	Mean	65,10
	Median	67,00
	Fallbasis	178
2006-1	Mean	65,88
	Median	67,50
	Fallbasis	266
2006-2	Mean	65,26
	Median	68,00
	Fallbasis	219
2007-1	Mean	65,99
	Median	68,00
	Fallbasis	275
2007-2	Mean	66,64
	Median	69,00
	Fallbasis	223
2008-1	Mean	66,10
	Median	68,00
	Fallbasis	241
2008-2	Mean	66,37
	Median	68,00
	Fallbasis	188
2009-1	Mean	64,35
	Median	65,00
	Fallbasis	208
2009-2	Mean	66,15
	Median	67,50
	Fallbasis	224
2010-1	Mean	64,76
	Median	67,00
	Fallbasis	220
2010-2	Mean	65,21
	Median	67,50
	Fallbasis	202
2011-1	Mean	65,37
	Median	68,00
	Fallbasis	186

In Tabelle 1.6 ist die **Altersverteilung bei Erstmanifestation** der Patientinnen nach Alterskategorien ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Die Altersverteilung bezieht sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts- halbjahr noch Programmteil-

nehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zum Alter bei Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“).

In der Kohorte 2004-2 entfielen im Beitritts- halbjahr 20 Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Tabelle 1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2004-1	0-14	--
	15-34	--
	35-39	--
	40-44	--
	45-49	--
	50-54	--
	55-59	--
	60-64	--
	65-69	--
	70-74	--
	75-79	--
	80-84	--
	85 und älter	--
	zusammen	--
ohne benötigte Angaben	--	
2004-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	9
	40-44	11
	45-49	17
	50-54	20
	55-59	19
	60-64	47
	65-69	44
	70-74	44
	75-79	49
	80-84	11
	85 und älter	5
	zusammen	278
ohne benötigte Angaben	0	
2005-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	4
	40-44	7
	45-49	15
	50-54	13
	55-59	20
	60-64	28
	65-69	37
	70-74	29
	75-79	24
	80-84	14
	85 und älter	5
	zusammen	197
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2005-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	3
	40-44	9
	45-49	16
	50-54	13
	55-59	7
	60-64	25
	65-69	32
	70-74	29
	75-79	16
	80-84	21
	85 und älter	5
	zusammen	178
ohne benötigte Angaben	2	
2006-1	0-14	0
	15-34	3
	35-39	7
	40-44	19
	45-49	10
	50-54	18
	55-59	13
	60-64	32
	65-69	39
	70-74	44
	75-79	43
	80-84	29
	85 und älter	9
	zusammen	266
ohne benötigte Angaben	0	
2006-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	7
	40-44	9
	45-49	13
	50-54	13
	55-59	8
	60-64	29
	65-69	41
	70-74	49
	75-79	32
	80-84	13
	85 und älter	3
	zusammen	219
ohne benötigte Angaben	10	
2007-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	15
	45-49	12
	50-54	20
	55-59	25
	60-64	28
	65-69	55
	70-74	56
	75-79	39
	80-84	17
	85 und älter	7
	zusammen	275
ohne benötigte Angaben	9	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2007-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	6
	40-44	13
	45-49	14
	50-54	5
	55-59	12
	60-64	24
	65-69	38
	70-74	38
	75-79	36
	80-84	30
	85 und älter	5
	zusammen	223
ohne benötigte Angaben	4	
2008-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	7
	40-44	7
	45-49	14
	50-54	17
	55-59	17
	60-64	16
	65-69	56
	70-74	51
	75-79	37
	80-84	14
	85 und älter	5
	zusammen	241
ohne benötigte Angaben	8	
2008-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	3
	40-44	4
	45-49	12
	50-54	12
	55-59	24
	60-64	13
	65-69	36
	70-74	31
	75-79	27
	80-84	17
	85 und älter	7
	zusammen	188
ohne benötigte Angaben	6	
2009-1	0-14	0
	15-34	2
	35-39	2
	40-44	6
	45-49	11
	50-54	21
	55-59	35
	60-64	21
	65-69	37
	70-74	26
	75-79	30
	80-84	12
	85 und älter	5
	zusammen	208
ohne benötigte Angaben	2	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2009-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	4
	40-44	10
	45-49	13
	50-54	17
	55-59	20
	60-64	17
	65-69	49
	70-74	31
	75-79	33
	80-84	19
	85 und älter	11
	zusammen	224
ohne benötigte Angaben	4	
2010-1	0-14	0
	15-34	3
	35-39	2
	40-44	12
	45-49	11
	50-54	21
	55-59	25
	60-64	20
	65-69	39
	70-74	34
	75-79	35
	80-84	12
	85 und älter	6
	zusammen	220
ohne benötigte Angaben	2	
2010-2	0-14	0
	15-34	4
	35-39	2
	40-44	8
	45-49	19
	50-54	16
	55-59	19
	60-64	19
	65-69	27
	70-74	26
	75-79	31
	80-84	24
	85 und älter	7
	zusammen	202
ohne benötigte Angaben	4	
2011-1	0-14	0
	15-34	2
	35-39	2
	40-44	9
	45-49	13
	50-54	17
	55-59	15
	60-64	21
	65-69	29
	70-74	26
	75-79	28
	80-84	14
	85 und älter	10
	zusammen	186
ohne benötigte Angaben	2	

In Tabelle 1.7 ist die **mittlere Dauer der Erkrankung** vor der Einschreibung in Jahren ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zur Erkrankungsdauer vor Einschreibung vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 lagen im Beitrittsjahr für 278 Patientinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer vor Einschreibung betrug 1,36 Jahre, der Median lag bei 1,00 Jahren.

Tabelle 1.7 Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren

EZ	Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren	Beitritts-halbjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	1,36
	Median	1,00
	Fallbasis	278
2005-1	Mean	1,55
	Median	1,00
	Fallbasis	197
2005-2	Mean	0,98
	Median	0,00
	Fallbasis	178
2006-1	Mean	1,61
	Median	1,00
	Fallbasis	266
2006-2	Mean	0,83
	Median	0,00
	Fallbasis	219
2007-1	Mean	1,33
	Median	1,00
	Fallbasis	275
2007-2	Mean	0,87
	Median	0,00
	Fallbasis	223
2008-1	Mean	1,34
	Median	1,00
	Fallbasis	241
2008-2	Mean	0,62
	Median	0,00
	Fallbasis	188
2009-1	Mean	0,82
	Median	0,00
	Fallbasis	208
2009-2	Mean	0,71
	Median	0,00
	Fallbasis	224
2010-1	Mean	1,10
	Median	1,00
	Fallbasis	220
2010-2	Mean	0,52
	Median	0,00
	Fallbasis	202
2011-1	Mean	0,77
	Median	0,00
	Fallbasis	186

Ergänzend zur mittleren Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren erfolgt in Tabelle 1.8 der **Ausweis der Erkrankungsdauer in Kategorien**. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen pro Kategorie. Berücksichtigt werden alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die ein medizinischer Datensatz mit Angaben zur Erkrankungsdauer vor Einschreibung vorlag.

In der Kohorte 2004-2 betrug im Beitrittsjahr bei 12 Patientinnen die Erkrankungsdauer vor Einschreibung "5 bis 9" Jahre.

Tabelle 1.8 Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien

EZ	Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien	Beitritts-halbjahr
2004-1	bis unter 5	--
	5 bis 9	--
	10 bis 14	--
	15 bis 19	--
	20 bis 24	--
	25 und älter	--
	Patientinnen zusammen	--
2004-2	bis unter 5	265
	5 bis 9	12
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	278
2005-1	bis unter 5	183
	5 bis 9	12
	10 bis 14	2
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	197
2005-2	bis unter 5	171
	5 bis 9	3
	10 bis 14	3
	15 bis 19	1
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	180
2006-1	bis unter 5	244
	5 bis 9	18
	10 bis 14	2
	15 bis 19	1
	20 bis 24	1
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	266
2006-2	bis unter 5	213
	5 bis 9	6
	10 bis 14	0
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	229
2007-1	bis unter 5	260
	5 bis 9	14
	10 bis 14	0
	15 bis 19	1
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	284

EZ	Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien	Beitritts- halbjahr
2007-2	bis unter 5	217
	5 bis 9	4
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	1
	Patientinnen zusammen	227
2008-1	bis unter 5	230
	5 bis 9	7
	10 bis 14	2
	15 bis 19	1
	20 bis 24	0
	25 und älter	1
	Patientinnen zusammen	249
2008-2	bis unter 5	182
	5 bis 9	3
	10 bis 14	3
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	194
2009-1	bis unter 5	201
	5 bis 9	6
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	210
2009-2	bis unter 5	215
	5 bis 9	6
	10 bis 14	1
	15 bis 19	1
	20 bis 24	0
	25 und älter	1
	Patientinnen zusammen	228
2010-1	bis unter 5	212
	5 bis 9	6
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	1
	Patientinnen zusammen	222
2010-2	bis unter 5	196
	5 bis 9	5
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	206
2011-1	bis unter 5	181
	5 bis 9	4
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	188

In Tabelle 1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine

halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,81 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Tabelle 1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,81
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>15198</i>

In Tabelle 1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2004-2 sind im Durchschnitt 5,80 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 5,00.

Tabelle 1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Halbjahre
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,80
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1613
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,93
		Median	8,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1365
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,78
		Median	11,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1400
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,40
		Median	10,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1969
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,14
		Median	8,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1405
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,35
		Median	8,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1802
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,86
		Median	7,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1330
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,35
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	1331
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,61
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	894
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,90
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	819
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,80
		Median	3,00
		<i>Halbjahressumme</i>	638
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,93
		Median	2,00
		<i>Halbjahressumme</i>	428
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	0,98
		Median	1,00
		<i>Halbjahressumme</i>	202

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

In der Kohorte 2004-2 waren zu Beginn des letzten Halbjahres 40 Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei 32 von Ihnen bzw. 80,00 Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

Tabelle 1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	278	233	211	189	158	145	131	121	111	94	77	63	40	40
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		63	43	31	25	31	29	30	36	37	38	44	32	32
		Anteil in %		27,04	20,38	16,40	15,82	21,38	22,14	24,79	32,43	39,36	49,35	69,84	80,00	80,00
		CI Anteil in %		[21,32; 32,75]	[14,93; 25,83]	[11,11; 21,70]	[10,11; 21,53]	[14,68; 28,08]	[15,00; 29,27]	[17,07; 32,52]	[23,68; 41,18]	[29,43; 49,29]	[38,11; 60,59]	[58,42; 81,27]	[67,45; 92,55]	[67,45; 92,55]
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	197	168	161	151	137	130	122	115	103	88	79	69	42	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		57	39	35	33	39	33	35	38	29	33	42	34	
		Anteil in %		33,93	24,22	23,18	24,09	30,00	27,05	30,43	36,89	32,95	41,77	60,87	80,95	
		CI Anteil in %		[26,75; 41,11]	[17,58; 30,86]	[16,43; 29,93]	[16,90; 31,27]	[22,09; 37,91]	[19,13; 34,96]	[21,99; 38,88]	[27,53; 46,26]	[23,08; 42,83]	[30,83; 52,72]	[49,27; 72,47]	[68,93; 92,97]	
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	180	169	150	145	141	136	127	120	111	106	104	91		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		67	52	43	47	49	48	53	46	47	55	71		
		Anteil in %		39,65	34,67	29,66	33,33	36,03	37,80	44,17	41,44	44,34	52,88	78,02		
		CI Anteil in %		[32,25; 47,04]	[27,03; 42,31]	[22,20; 37,12]	[25,52; 41,14]	[27,93; 44,13]	[29,33; 46,26]	[35,24; 53,09]	[32,24; 50,65]	[34,84; 53,84]	[43,24; 62,52]	[69,47; 86,58]		
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	266	259	235	223	213	204	191	182	166	156	140			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		96	73	82	79	81	85	93	85	91	91			
		Anteil in %		37,07	31,06	36,77	37,09	39,71	44,50	51,10	51,20	58,33	65,00			
		CI Anteil in %		[31,17; 42,96]	[25,13; 36,99]	[30,43; 43,11]	[30,59; 43,59]	[32,98; 46,44]	[37,44; 51,57]	[43,82; 58,38]	[43,58; 58,83]	[50,57; 66,09]	[57,07; 72,93]			
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	229	213	205	171	161	151	140	134	120	110				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		47	56	29	34	33	31	33	33	33				
		Anteil in %		22,07	27,32	16,96	21,12	21,85	22,14	24,63	27,50	30,91				
		CI Anteil in %		[16,48; 27,65]	[21,20; 33,43]	[11,32; 22,60]	[14,79; 27,44]	[15,24; 28,47]	[15,24; 29,05]	[17,30; 31,95]	[19,48; 35,52]	[22,23; 39,58]				
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	284	279	267	239	229	219	201	191	177					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		69	74	57	72	76	75	73	77					
		Anteil in %		24,73	27,72	23,85	31,44	34,70	37,31	38,22	43,50					
		CI Anteil in %		[19,66; 29,80]	[22,34; 33,09]	[18,44; 29,26]	[25,41; 37,47]	[28,38; 41,02]	[30,61; 44,02]	[31,31; 45,13]	[36,18; 50,83]					
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	227	222	215	205	185	176	168	159						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		66	54	76	62	68	64	63						
		Anteil in %		29,73	25,12	37,07	33,51	38,64	38,10	39,62						
		CI Anteil in %		[23,70; 35,76]	[19,31; 30,93]	[30,45; 43,70]	[26,69; 40,33]	[31,42; 45,85]	[30,73; 45,46]	[32,00; 47,25]						
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	249	242	233	228	220	208	200							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		53	64	59	61	69	77							
		Anteil in %		21,90	27,47	25,88	27,73	33,17	38,50							
		CI Anteil in %		[16,68; 27,12]	[21,72; 33,21]	[20,18; 31,57]	[21,80; 33,66]	[26,76; 39,59]	[31,74; 45,26]							
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	194	191	182	180	175	166								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		59	51	50	58	60								
		Anteil in %		30,89	28,02	27,78	33,14	36,14								
		CI Anteil in %		[24,32; 37,46]	[21,48; 34,56]	[21,22; 34,34]	[26,15; 40,14]	[28,81; 43,48]								
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	210	209	208	203	199									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		54	51	51	57									
		Anteil in %		25,84	24,52	25,12	28,64									
		CI Anteil in %		[19,89; 31,79]	[18,66; 30,38]	[19,14; 31,10]	[22,35; 34,94]									

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	228	223	213	202										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		52	47	53										
		Anteil in %			23,32	22,07	26,24									
		CI Anteil in %			[17,76; 28,88]	[16,48; 27,65]	[20,16; 32,32]									
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	222	216	212											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		42	51											
		Anteil in %			19,44	24,06										
		CI Anteil in %			[14,15; 24,73]	[18,29; 29,82]										
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	206	202												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		48												
		Anteil in %			23,76											
		CI Anteil in %			[17,88; 29,65]											
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	188													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														

Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer

In Tabelle 2.1. ist dargestellt, wie viele **Leistungserbringer**, d.h. Ärzte bzw. stationäre Einrichtungen sich jeweils zum Stichtag 30.6. und 31.12. eines Jahres an der Behandlung der DMP-Teilnehmerinnen in Brandenburg beteiligten und wie viele eingeschriebene Versicherte rechnerisch auf einen Leistungserbringer entfielen. Diese Angaben werden von den Krankenkassen gesondert zur Verfügung gestellt. Bei den Leistungserbringern ist eine Differenzierung nach Hausärzten, Gynäkologen, Onkologen und stationären Einrichtungen insgesamt vorgesehen. Die Angaben zu den onkologisch qualifizierten koordinierenden Ärzten konnten für die Mehrheit der Regionen erst ab dem ersten bzw. zweiten Halbjahr 2008 ermittelt werden. Daher enthalten die Halbjahr davor keine Angaben.

In der Region Brandenburg sind Hausärzte und onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte als Leistungserbringer vertraglich nicht vorgesehen. Vor dem Stichtag 31.12.2004 lagen keine Daten vor.

Tabelle 2.1 Leistungserbringer⁵

EZ		zum Stichtag 30.06.2004	zum Stichtag 31.12.2004	zum Stichtag 30.06.2005	zum Stichtag 31.12.2005	zum Stichtag 30.06.2006	zum Stichtag 31.12.2006	zum Stichtag 30.06.2007	zum Stichtag 31.12.2007	zum Stichtag 30.06.2008	zum Stichtag 31.12.2008	zum Stichtag 30.06.2009	zum Stichtag 31.12.2009	zum Stichtag 30.06.2010	zum Stichtag 31.12.2010	zum Stichtag 30.06.2011
Hausärzte	Anzahl Leistungserbringer	--														
	Veränderung*, absolut	--														
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--														
Gynäkologen	Anzahl Leistungserbringer	--	151	165	170	170	176	174	178	178	179	181	179	173	178	178
	Veränderung*, absolut	--		14	5	0	6	-2	4	0	1	2	-2	-6	5	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--	0,06	2,46	8,19	12,51	15,67	18,34	20,19	23,07	24,60	27,15	28,37	29,50	30,06	31,29
onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte**	Anzahl Leistungserbringer	--														
	Veränderung*, absolut	--														
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--														
Stationäre Einrichtungen insgesamt	Anzahl Leistungserbringer	--	13	15	15	13	13	13	13	15	15	13	13	13	13	13
	Veränderung*, absolut	--		2	0	-2	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--	0,69	27,07	92,87	163,54	212,15	245,54	276,46	273,73	293,53	378,08	390,69	392,54	411,54	428,46
zum Vergleich: eingeschriebene Versicherte lt. KM 6/2	Anzahl	--	9	406	1393	2126	2758	3192	3594	4106	4403	4915	5079	5103	5350	5570

* Veränderung gegenüber dem vorangegangenen Stichtag

** Als onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte werden teilnehmende Internisten mit Spezialisierung "internistische Onkologie und Hämatologie" oder Gynäkologen mit Spezialisierung "Gynäkologische Onkologie" aufgeführt.

⁵ Die Daten zu den Leistungserbringern werden von der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV), bzw. vom Vertragspartner geliefert. Sollten Leistungserbringerzahlen dieses Berichtes geringfügig von den Zahlen vorhergehender Berichte abweichen, so ist dies in unterschiedlichen Zugriffszeitpunkten auf die KV Daten begründet.

Auswertungskapitel 3: Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)

3.1 Patientinnenzahlen und –merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte. Die neue oder zeitnahe Diagnose bedeutet dabei, dass bei Einschreibung in das DMP das Datum der histologischen Nachweises eines Primärtumors nicht länger als 12 Wochen zurücklag. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein.

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 3.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2004-2 insgesamt 82 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 18 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 14 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 2 Patientin/Patientinnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1⁶

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	82	53	48	46	43	42	40	39	36	35	30	14	14	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	18	10	10	10	10	10	8	8	6	6	6	5	2	2
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	19	14	14	13	13	13	13	13	12	12	11	10	5	5
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	7	5	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	85	68	67	62	59	59	58	57	54	53	53	48	22	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	19	14	14	12	11	11	11	11	10	10	10	8	4	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	21	17	16	15	13	13	13	13	13	13	13	13	8	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	6	5	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	95	90	81	80	77	75	74	72	72	71	71	66		
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12		
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	21	21	18	17	16	16	16	16	16	16	16	15		
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	8		
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	11	8	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5		
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	6	6	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3		

⁶ Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass die Summe der Patientinnen aus den UICC-Kategorien in der Regel kleiner ausfällt als die Anzahl der Patientinnen insgesamt. Mögliche Abweichungen entstehen, weil die Patientinnen für die UICC-Stadien nicht auswertbar sind (keine Angaben bzw. die TNM-Kombination kann keinem UICC-Stadium zugeordnet werden) und weil Patientinnen mit der Angabe ‚keine OP‘ nicht für die Kategorien IIIC und IV berücksichtigt wurden.

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	105	101	91	89	88	84	82	81	80	79	78			
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0			
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	26	24	22	22	22	21	21	21	21	21	21			
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	24	22	19	19	19	19	19	19	18	17	16			
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	12	12	12	11	10	8	8	8	8	8	8			
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0			
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	96	91	88	67	64	61	59	58	58	57				
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	14	13	13	9	9	9	9	9	9	9				
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	28	26	26	19	18	17	16	16	16	16				
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10				
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	10	9	9	9	8	7	7	7	7	7				
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2			
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1				
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	129	126	121	101	100	98	96	96	93					
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	20	20	20	15	15	15	15	15	15					
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	29	29	28	26	25	25	24	24	24					
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	13	13	12	6	6	5	5	5	5					
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	6	5	5	3	3	3	3	3	3					
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	7	7	7	6	6	5	5	5	5					
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	5	4	4	3	3	3	3	3	3						
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	122	120	119	114	107	105	104	103						
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3	3						
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	20	20	20	20	19	18	18	18						
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	19	18	18	17	17	16	16	16						
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	14	14	14	12	9	9	9	9						
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4						
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	9	9	9	9	9	9	9	9						
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	8	8	8	8	7	7	7	7							
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	120	117	112	111	108	105	103							
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2							
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	21	21	21	21	21	21	21	21						
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	32	32	32	31	31	30	29							
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8							
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1							
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0							
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	6	5	5	5	5	5	5							
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	2	2	2	2	1	1								
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	126	123	115	113	112	109								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1	1	1								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	23	22	21	21	21	21								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	28	27	26	25	25	25								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	13	13	12	12	12	11								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	3	3	3	3	3	3								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4	4	3	3								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	9	9	8	8	8	8								
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1	0									

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	130	129	129	127	126									
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	5	5	5	5	5									
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	43	42	42	41	41									
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	26	26	26	26	26									
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	11	11	11	11	11									
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	3	3	3	3	3									
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	1	1									
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	5	5	5	4	4									
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1										
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	133	131	127	122										
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2	2	2										
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	31	31	29	29										
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	25	23	22	22										
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	17	17	17	15										
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	7	7	7										
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	1										
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4	4	4										
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	3											
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	119	115	115											
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	7	7	7											
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	31	31	31											
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	19	19	19											
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	7	7	7											
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	1	1	1											
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1											
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2											
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	5	4	4												
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	114	111												
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	6	6												
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	25	25												
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	28	27												
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	2	2												
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5	4												
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1												
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2												
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4													
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	102													
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1													
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	31													
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	16													
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	10													
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7													
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2													
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4													
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0														

Tabelle 3.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitritts-halbjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2004-2 mit 82 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. 68 von ihnen bzw. 82,93 Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	29	34	36	39	40	42	43	46	46	47	52	68	68	68	
		Anteil in %	35,37	41,46	43,90	47,56	48,78	51,22	52,44	56,10	56,10	57,32	63,41	82,93	82,93	82,93	
		CI Anteil in %	[24,95; 45,78]	[30,73; 52,19]	[33,09; 54,71]	[36,69; 58,44]	[37,89; 59,67]	[40,33; 62,11]	[41,56; 63,31]	[45,29; 66,91]	[45,29; 66,91]	[46,55; 68,09]	[52,92; 73,90]	[74,73; 91,12]	[74,73; 91,12]	[74,73; 91,12]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	2	3	4	5	6	8	8	8	9	9	9	9	
		Anteil in %	0,00	1,22	2,44	3,66	4,88	6,10	7,32	9,76	9,76	9,76	10,98	10,98	10,98	10,98	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	29	32	32	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
		Anteil in %	35,37	39,02	39,02	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	5	5	
		Anteil in %	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	2,44	2,44	3,66	3,66	4,88	6,10	6,10	6,10	6,10	
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	19	19	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	23,17	23,17	23,17	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Anteil %	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	82	53	48	46	43	42	40	39	36	36	35	30	14	14	
Anzahl		53	48	46	43	42	40	39	36	36	35	30	14	14	14		
2005-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	17	18	23	26	26	27	28	31	32	32	37	63	63		
		Anteil in %	20,00	21,18	27,06	30,59	30,59	31,76	32,94	36,47	37,65	37,65	43,53	74,12	74,12		
		CI Anteil in %	[11,45; 28,55]	[12,44; 29,91]	[17,56; 36,56]	[20,73; 40,44]	[20,73; 40,44]	[21,81; 41,72]	[22,89; 42,99]	[26,18; 46,76]	[27,29; 48,01]	[27,29; 48,01]	[32,93; 54,13]	[64,75; 83,48]	[64,75; 83,48]		
	davon wegen Tod	Anzahl	2	2	5	5	5	6	6	9	10	10	10	10	10		
		Anteil in %	2,35	2,35	5,88	5,88	5,88	7,06	7,06	10,59	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	14	14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		Anteil in %	16,47	16,47	18,82	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	1,18	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35		
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	31	31		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	36,47	36,47		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Anteil %	1,18	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35		
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	85	68	67	62	59	59	58	57	54	53	53	48	22		
Anzahl		68	67	62	59	59	58	57	54	53	53	48	22	22			

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2005-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	5	14	15	18	20	21	23	23	24	24	29	60			
		Anteil in %	5,26	14,74	15,79	18,95	21,05	22,11	24,21	24,21	25,26	25,26	30,53	63,16			
		CI Anteil in %	[0,75; 9,78]	[7,57; 21,90]	[8,42; 23,16]	[11,03; 26,87]	[12,81; 29,29]	[13,72; 30,49]	[15,55; 32,87]	[15,55; 32,87]	[16,48; 34,05]	[16,48; 34,05]	[21,22; 39,84]	[53,41; 72,91]			
	davon wegen Tod	Anzahl	2	3	4	6	8	9	11	11	12	12	13	15			
		Anteil in %	2,11	3,16	4,21	6,32	8,42	9,47	11,58	11,58	12,63	12,63	13,68	15,79			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		Anteil in %	2,11	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		Anteil in %	1,05	4,21	4,21	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26			
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	34,74			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Anteil %	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05			
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	95	90	81	80	77	75	74	72	72	71	71	66		
am Ende des Halbjahres		Anzahl	90	81	80	77	75	74	72	72	71	71	66	35			
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	4	14	16	17	21	23	24	25	26	27	31				
		Anteil in %	3,81	13,33	15,24	16,19	20,00	21,90	22,86	23,81	24,76	25,71	29,52				
		CI Anteil in %	[0,13; 7,49]	[6,80; 19,87]	[8,33; 22,15]	[9,11; 23,27]	[12,31; 27,69]	[13,96; 29,85]	[14,79; 30,93]	[15,62; 32,00]	[16,47; 33,06]	[17,31; 34,11]	[20,76; 38,29]				
	davon wegen Tod	Anzahl	1	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Anteil in %	0,95	3,81	5,71	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,48	11,43	12,38				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
		Anteil in %	0,95	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	4	4	5	8	9	9	9	9	9	9				
		Anteil in %	0,95	3,81	3,81	4,76	7,62	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		Anteil %	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95				
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	105	101	91	89	88	84	82	81	80	79	78			
am Ende des Halbjahres		Anzahl	101	91	89	88	84	82	81	80	79	78	74				
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	5	8	29	32	35	37	38	38	39	41					
		Anteil in %	5,21	8,33	30,21	33,33	36,46	38,54	39,58	39,58	40,63	42,71					
		CI Anteil in %	[0,74; 9,68]	[2,78; 13,89]	[20,97; 39,44]	[23,85; 42,81]	[26,78; 46,14]	[28,75; 48,33]	[29,75; 49,42]	[29,75; 49,42]	[30,75; 50,50]	[32,76; 52,66]					
	davon wegen Tod	Anzahl	2	5	8	8	11	13	14	14	14	16					
		Anteil in %	2,08	5,21	8,33	8,33	11,46	13,54	14,58	14,58	14,58	16,67					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
		Anteil in %	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	13	16	16	16	16	16	16	16					
		Anteil in %	0,00	0,00	13,54	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67					
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	5	5	5	5	5	5	6	6					
		Anteil %	0,00	0,00	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	6,25	6,25					
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	96	91	88	67	64	61	59	58	58	57				
am Ende des Halbjahres		Anzahl	91	88	67	64	61	59	58	58	57	55					

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	8	28	29	31	33	33	36	38						
		Anteil in %	2,33	6,20	21,71	22,48	24,03	25,58	25,58	27,91	29,46						
		CI Anteil in %	[0,00; 4,94]	[2,02; 10,38]	[14,56; 28,85]	[15,25; 29,71]	[16,63; 31,43]	[18,02; 33,14]	[18,02; 33,14]	[20,14; 35,68]	[21,56; 37,35]						
	davon wegen Tod	Anzahl	3	6	8	9	11	13	13	13	15						
		Anteil in %	2,33	4,65	6,20	6,98	8,53	10,08	10,08	11,63	13,18						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	20	20	20	20	20	21	21						
		Anteil in %	0,00	1,55	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	16,28	16,28						
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	129	126	121	101	100	98	96	96	93					
am Ende des Halbjahres		Anzahl	126	121	101	100	98	96	96	93	91						
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	3	8	15	17	18	19	20							
		Anteil in %	1,64	2,46	6,56	12,30	13,93	14,75	15,57	16,39							
		CI Anteil in %	[0,00; 3,90]	[0,00; 5,22]	[2,15; 10,97]	[6,44; 18,15]	[7,76; 20,10]	[8,43; 21,07]	[9,11; 22,03]	[9,80; 22,99]							
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1	5	11	13	14	15	15							
		Anteil in %	0,82	0,82	4,10	9,02	10,66	11,48	12,30	12,30							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	2	3	4	4	4	4	5							
		Anteil in %	0,82	1,64	2,46	3,28	3,28	3,28	3,28	4,10							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	122	120	119	114	107	105	104	103						
am Ende des Halbjahres		Anzahl	120	119	114	107	105	104	103	102							
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	8	9	12	15	17	19								
		Anteil in %	2,50	6,67	7,50	10,00	12,50	14,17	15,83								
		CI Anteil in %	[0,00; 5,31]	[2,18; 11,15]	[2,77; 12,23]	[4,61; 15,39]	[6,56; 18,44]	[7,90; 20,43]	[9,27; 22,39]								
	davon wegen Tod	Anzahl	3	8	9	12	15	17	17								
		Anteil in %	2,50	6,67	7,50	10,00	12,50	14,17	14,17								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	0	2								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67								
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0								
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	120	117	112	111	108	105	103	101						
am Ende des Halbjahres		Anzahl	117	112	111	108	105	103	101								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	11	13	14	17	18									
		Anteil in %	2,38	8,73	10,32	11,11	13,49	14,29									
		CI Anteil in %	[0,00; 5,05]	[3,78; 13,68]	[4,98; 15,65]	[5,60; 16,62]	[7,50; 19,48]	[8,15; 20,42]									
	davon wegen Tod	Anzahl	2	9	11	12	14	15									
		Anteil in %	1,59	7,14	8,73	9,52	11,11	11,90									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	2	2	2	3	3									
		Anteil in %	0,79	1,59	1,59	1,59	2,38	2,38									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	126	123	115	113	112	109								
am Ende des Halbjahres		Anzahl	123	115	113	112	109	108									
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	1	3	4	5										
		Anteil in %	0,77	0,77	2,31	3,08	3,85										
		CI Anteil in %	[0,00; 2,28]	[0,00; 2,28]	[0,00; 4,90]	[0,10; 6,06]	[0,53; 7,16]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1	2										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,77	0,77	1,54										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1	2	3	3										
		Anteil in %	0,77	0,77	1,54	2,31	2,31										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	130	129	129	127	126									
am Ende des Halbjahres		Anzahl	129	129	127	126	125										
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	6	11	14											
		Anteil in %	1,50	4,51	8,27	10,53											
		CI Anteil in %	[0,00; 3,58]	[0,97; 8,05]	[3,57; 12,97]	[5,29; 15,76]											
	davon wegen Tod	Anzahl	2	4	9	12											
		Anteil in %	1,50	3,01	6,77	9,02											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	2	2											
		Anteil in %	0,00	1,50	1,50	1,50											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	133	131	127	122										
am Ende des Halbjahres		Anzahl	131	127	122	119											

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	4	4	7												
		Anteil in %	3,36	3,36	5,88												
		CI Anteil in %	[0,11; 6,61]	[0,11; 6,61]	[1,64; 10,13]												
	davon wegen Tod	Anzahl	3	3	6												
		Anteil in %	2,52	2,52	5,04												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0												
Anteil in %		0,00	0,00	0,00													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	1													
	Anteil %	0,84	0,84	0,84													
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	119	115	115												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	115	115	112												
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	5													
		Anteil in %	2,63	4,39													
		CI Anteil in %	[0,00; 5,58]	[0,61; 8,16]													
	davon wegen Tod	Anzahl	2	3													
		Anteil in %	1,75	2,63													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0													
		Anteil in %	0,00	0,00													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1													
		Anteil in %	0,88	0,88													
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0													
Anteil in %		0,00	0,00														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1														
	Anteil %	0,00	0,88														
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	114	111													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	111	109													
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1														
		Anteil in %	0,98														
		CI Anteil in %	[0,00; 2,90]														
	davon wegen Tod	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0														
Anteil in %		0,00															
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1															
	Anteil %	0,98															
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	102														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	101														

In Tabelle 3.1.4 ist die **Altersverteilung nach Altersklassen** für alle Patientinnen, die im jeweiligen Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“), ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung war nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Auswertungs-

tungsjahres“ vorzunehmen. Unterschiedliche Altersverteilungen im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patientinnen die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

In der Kohorte 2004-2 entfielen im Beitrittsjahr 4 Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Tabelle 3.1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2004-1	0-14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15-34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35-39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	40-44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	45-49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	50-54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	55-59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	60-64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	65-69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70-74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75-79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	80-84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	85 und älter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Patientinnen zusammen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	40-44	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	45-49	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	50-54	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	55-59	3	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0
	60-64	10	7	6	4	4	4	4	4	4	2	2	0	0	1	1
	65-69	12	7	7	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	1	0
	70-74	18	13	11	11	11	7	7	6	5	7	7	5	1	1	1
	75-79	19	13	12	9	8	8	8	9	9	8	8	7	4	5	5
	80-84	7	7	7	12	10	12	11	10	9	8	8	8	4	3	4
	85 und älter	3	1	0	0	0	1	0	1	3	3	4	3	4	3	4
	Patientinnen zusammen	82	53	48	46	43	42	40	39	36	36	35	30	14	14	
2005-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44	6	5	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0
	45-49	6	5	7	6	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
	50-54	5	4	2	2	5	5	5	5	5	5	5	4	2	2	2
	55-59	7	6	5	4	2	2	3	3	3	3	4	4	1	1	1
	60-64	9	8	6	6	7	7	5	5	4	4	4	4	2	2	2
	65-69	13	12	11	10	6	6	8	7	7	7	6	6	4	2	2
	70-74	14	10	13	13	15	15	15	15	13	13	10	9	2	2	2
	75-79	14	10	9	8	6	6	6	6	7	6	9	8	4	4	4
	80-84	7	6	9	9	10	10	7	7	7	7	7	7	2	2	2
	85 und älter	3	2	2	1	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4
	Patientinnen zusammen	85	68	67	62	59	59	58	57	54	53	53	48	22	22	

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2007-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	2	1	1	1	1	1	1	1							
	35-39	3	3	3	3	3	3	2	2							
	40-44	11	8	7	3	3	3	4	4							
	45-49	8	10	10	14	13	12	12	12							
	50-54	4	3	3	3	3	4	4	4							
	55-59	5	6	6	5	5	4	4	4							
	60-64	14	12	12	9	8	4	4	4							
	65-69	20	18	18	19	17	18	17	16							
	70-74	15	16	16	17	15	15	15	14							
	75-79	14	15	15	14	14	12	12	12							
	80-84	22	21	21	16	15	17	17	14							
85 und älter	4	7	7	10	10	12	12	17								
	Patientinnen zusammen	122	120	119	114	107	105	104	103							
2008-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0							
	35-39	3	3	2	2	2	2	2	1							
	40-44	3	3	4	4	4	4	3	3							
	45-49	6	6	6	6	3	3	5	5							
	50-54	6	6	2	2	4	3	1	1							
	55-59	6	6	9	9	8	8	8	8							
	60-64	5	5	3	3	2	1	2	2							
	65-69	26	26	23	23	20	20	13	13							
	70-74	22	21	22	22	20	20	22	22							
	75-79	27	26	25	25	27	26	26	26							
	80-84	12	11	10	10	12	12	16	16							
85 und älter	4	4	6	5	6	6	6	6								
	Patientinnen zusammen	120	117	112	111	108	105	103								
2008-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	2	2	1	1	1	1	1	1							
	35-39	2	1	1	0	0	0	0	0							
	40-44	0	1	1	2	2	2	2	2							
	45-49	6	5	5	3	3	1	1	1							
	50-54	9	8	8	8	8	8	8	8							
	55-59	17	14	13	13	13	8	8	8							
	60-64	10	11	11	9	9	14	14	14							
	65-69	16	13	13	12	12	9	9	9							
	70-74	21	21	19	18	18	18	18	18							
	75-79	20	20	19	23	23	23	23	23							
	80-84	17	20	17	13	13	13	13	13							
85 und älter	6	7	7	11	10	12	12	12								
	Patientinnen zusammen	126	123	115	113	112	109									
2009-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0							
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0							
	35-39	2	2	2	2	1	1	1	1							
	40-44	2	2	2	2	2	2	2	2							
	45-49	6	6	5	5	5	5	5	5							
	50-54	13	12	10	10	9	9	9	9							
	55-59	22	22	20	20	20	20	20	20							
	60-64	10	10	15	15	14	14	14	14							
	65-69	28	28	23	23	21	21	21	21							
	70-74	14	14	15	14	14	14	14	14							
	75-79	19	19	19	18	20	20	20	20							
	80-84	11	11	14	14	14	14	14	14							
85 und älter	3	3	4	4	6	6	6	6								
	Patientinnen zusammen	130	129	129	127	126										

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2009-2	0-14	0	0	0	0											
	15-34	0	0	0	0											
	35-39	1	0	0	0											
	40-44	5	6	6	5											
	45-49	7	3	3	4											
	50-54	12	11	11	11											
	55-59	15	19	18	15											
	60-64	13	13	13	13											
	65-69	31	25	24	23											
	70-74	17	17	17	17											
	75-79	14	15	15	12											
	80-84	11	12	10	10											
	85 und älter	7	10	10	12											
	Patientinnen zusammen	133	131	127	122											
2010-1	0-14	0	0	0												
	15-34	1	1	1												
	35-39	1	1	0												
	40-44	7	7	7												
	45-49	9	9	6												
	50-54	10	9	12												
	55-59	14	14	12												
	60-64	11	11	11												
	65-69	13	12	12												
	70-74	20	20	18												
	75-79	18	17	17												
	80-84	10	9	12												
	85 und älter	5	5	7												
	Patientinnen zusammen	119	115	115												
2010-2	0-14	0	0													
	15-34	1	1													
	35-39	2	1													
	40-44	5	5													
	45-49	12	10													
	50-54	9	11													
	55-59	12	11													
	60-64	10	11													
	65-69	14	12													
	70-74	16	12													
	75-79	15	18													
	80-84	12	11													
	85 und älter	6	8													
	Patientinnen zusammen	114	111													
2011-1	0-14	0														
	15-34	1														
	35-39	1														
	40-44	4														
	45-49	8														
	50-54	11														
	55-59	4														
	60-64	8														
	65-69	19														
	70-74	13														
	75-79	17														
	80-84	7														
	85 und älter	9														
	Patientinnen zusammen	102														

In Tabelle 3.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 lagen im Beitrittsjahr für 82 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Das durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation betrug 69,28 Jahre, der Median lag bei 72,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 1

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	69,28
	Median	72,00
	Fallbasis	82
2005-1	Mean	65,88
	Median	69,00
	Fallbasis	85
2005-2	Mean	66,03
	Median	68,00
	Fallbasis	95
2006-1	Mean	68,49
	Median	71,00
	Fallbasis	105
2006-2	Mean	67,84
	Median	70,00
	Fallbasis	96
2007-1	Mean	68,68
	Median	70,00
	Fallbasis	129
2007-2	Mean	65,76
	Median	68,00
	Fallbasis	122
2008-1	Mean	68,58
	Median	71,00
	Fallbasis	120
2008-2	Mean	67,82
	Median	70,00
	Fallbasis	126
2009-1	Mean	65,18
	Median	66,50
	Fallbasis	130
2009-2	Mean	65,74
	Median	66,00
	Fallbasis	133
2010-1	Mean	65,21
	Median	68,00
	Fallbasis	119
2010-2	Mean	65,07
	Median	67,00
	Fallbasis	114
2011-1	Mean	66,57
	Median	69,00
	Fallbasis	102

In Tabelle 3.1.6 ist die **Altersverteilung bei Erstmanifestation** der Patientinnen nach Alterskategorien ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Die Altersverteilung bezieht sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zum Alter bei Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“).

In der Kohorte 2004-2 entfiel/entfielen im Beitrittsjahr 4 Patientin/Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2004-1	0-14	--
	15-34	--
	35-39	--
	40-44	--
	45-49	--
	50-54	--
	55-59	--
	60-64	--
	65-69	--
	70-74	--
	75-79	--
	80-84	--
	85 und älter	--
	zusammen	--
ohne benötigte Angaben	--	
2004-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	1
	45-49	4
	50-54	4
	55-59	3
	60-64	10
	65-69	12
	70-74	18
	75-79	19
	80-84	7
	85 und älter	3
	zusammen	82
ohne benötigte Angaben	0	
2005-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	6
	45-49	6
	50-54	5
	55-59	7
	60-64	9
	65-69	14
	70-74	13
	75-79	14
	80-84	7
	85 und älter	3
	zusammen	85
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2005-2	0-14	0
	15-34	1
	35-39	1
	40-44	6
	45-49	9
	50-54	5
	55-59	3
	60-64	13
	65-69	17
	70-74	16
	75-79	5
	80-84	14
	85 und älter	5
	zusammen	95
ohne benötigte Angaben	0	
2006-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	3
	40-44	7
	45-49	1
	50-54	4
	55-59	4
	60-64	12
	65-69	15
	70-74	14
	75-79	20
	80-84	21
	85 und älter	3
	zusammen	105
ohne benötigte Angaben	0	
2006-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	2
	45-49	7
	50-54	6
	55-59	1
	60-64	12
	65-69	14
	70-74	25
	75-79	15
	80-84	11
	85 und älter	2
	zusammen	96
ohne benötigte Angaben	0	
2007-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	6
	55-59	14
	60-64	9
	65-69	25
	70-74	29
	75-79	18
	80-84	14
	85 und älter	6
	zusammen	129
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2007-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	3
	40-44	11
	45-49	8
	50-54	4
	55-59	5
	60-64	14
	65-69	20
	70-74	15
	75-79	14
	80-84	22
	85 und älter	4
	zusammen	122
ohne benötigte Angaben	0	
2008-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	3
	40-44	3
	45-49	6
	50-54	7
	55-59	5
	60-64	5
	65-69	27
	70-74	21
	75-79	27
	80-84	12
	85 und älter	4
	zusammen	120
ohne benötigte Angaben	0	
2008-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	2
	40-44	0
	45-49	6
	50-54	9
	55-59	17
	60-64	10
	65-69	16
	70-74	21
	75-79	20
	80-84	17
	85 und älter	6
	zusammen	126
ohne benötigte Angaben	0	
2009-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	2
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	14
	55-59	22
	60-64	12
	65-69	25
	70-74	14
	75-79	20
	80-84	10
	85 und älter	3
	zusammen	130
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2009-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	5
	45-49	7
	50-54	12
	55-59	15
	60-64	13
	65-69	31
	70-74	17
	75-79	14
	80-84	11
	85 und älter	7
	zusammen	133
ohne benötigte Angaben	0	
2010-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	1
	40-44	8
	45-49	8
	50-54	10
	55-59	14
	60-64	12
	65-69	14
	70-74	18
	75-79	19
	80-84	9
	85 und älter	5
	zusammen	119
ohne benötigte Angaben	0	
2010-2	0-14	0
	15-34	1
	35-39	2
	40-44	5
	45-49	12
	50-54	9
	55-59	12
	60-64	10
	65-69	14
	70-74	16
	75-79	15
	80-84	12
	85 und älter	6
	zusammen	114
ohne benötigte Angaben	0	
2011-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	1
	40-44	5
	45-49	7
	50-54	11
	55-59	4
	60-64	8
	65-69	19
	70-74	13
	75-79	17
	80-84	8
	85 und älter	8
	zusammen	102
ohne benötigte Angaben	0	

In Tabelle 3.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,80 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 1

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 1		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,80
		Median	4,00
		Halbjahressumme	7484

In Tabelle 3.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2004-2 sind im Durchschnitt 5,80 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 5,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 1

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 1	Halbjahre
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,80
		Median 5,00
		Halbjahressumme 476
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 7,76
		Median 11,00
		Halbjahressumme 660
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 8,73
		Median 11,00
		Halbjahressumme 829
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 8,12
		Median 10,00
		Halbjahressumme 853
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 6,28
		Median 9,00
		Halbjahressumme 603
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 6,44
		Median 8,00
		Halbjahressumme 831
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 6,33
		Median 7,00
		Halbjahressumme 772
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,47
		Median 6,00
		Halbjahressumme 656
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 4,54
		Median 5,00
		Halbjahressumme 572
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 3,93
		Median 4,00
		Halbjahressumme 511
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 2,86
		Median 3,00
		Halbjahressumme 380
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 1,93
		Median 2,00
		Halbjahressumme 230
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 0,97
		Median 1,00
		Halbjahressumme 111

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 3.1.10 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

In der Kohorte 2004-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres 14 Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei 14 von Ihnen bzw. 100,00 Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	82	53	48	46	43	42	40	39	36	36	35	30	14	14
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		12	12	9	10	10	12	9	9	9	15	20	13	14
		Anteil in %		22,64	25,00	19,57	23,26	23,81	30,00	23,08	25,00	25,00	42,86	66,67	92,86	100,00
		CI Anteil in %		[11,27; 34,02]	[12,62; 37,38]	[7,97; 31,16]	[10,48; 36,03]	[10,77; 36,85]	[15,62; 44,38]	[9,68; 36,47]	[10,65; 39,35]	[10,65; 39,35]	[26,22; 59,49]	[49,51; 83,82]	[78,86; 100,00]	[100,00; 100,00]
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	85	68	67	62	59	59	58	57	54	53	53	48	22	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		29	24	19	20	22	19	17	18	13	18	28	20	
		Anteil in %		42,65	35,82	30,65	33,90	37,29	32,76	29,82	33,33	24,53	33,96	58,33	90,91	
		CI Anteil in %		[30,80; 54,49]	[24,25; 47,39]	[19,08; 42,21]	[21,72; 46,08]	[24,84; 49,73]	[20,57; 44,94]	[17,84; 41,81]	[20,64; 46,02]	[12,83; 36,22]	[21,09; 46,83]	[44,24; 72,43]	[78,61; 100,00]	
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	95	90	81	80	77	75	74	72	72	71	71	66		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		44	37	31	30	26	30	35	31	30	35	52		
		Anteil in %		48,89	45,68	38,75	38,96	34,67	40,54	48,61	43,06	42,25	49,30	78,79		
		CI Anteil in %		[38,50; 59,27]	[34,76; 56,59]	[28,01; 49,49]	[28,00; 49,92]	[23,82; 45,51]	[29,28; 51,80]	[36,99; 60,24]	[31,54; 54,57]	[30,68; 53,83]	[37,58; 61,01]	[68,85; 88,73]		
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	105	101	91	89	88	84	82	81	80	79	78			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		59	41	43	42	39	42	43	43	46	47			
		Anteil in %		58,42	45,05	48,31	47,73	46,43	51,22	53,09	53,75	58,23	60,26			
		CI Anteil in %		[48,76; 68,08]	[34,78; 55,33]	[37,87; 58,76]	[37,23; 58,22]	[35,70; 57,16]	[40,33; 62,11]	[42,15; 64,02]	[42,76; 64,74]	[47,28; 69,17]	[49,33; 71,19]			
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	96	91	88	67	64	61	59	58	58	57				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		30	35	8	9	9	8	6	8	9				
		Anteil in %		32,97	39,77	11,94	14,06	14,75	13,56	10,34	13,79	15,79				
		CI Anteil in %		[23,25; 42,68]	[29,49; 50,06]	[4,12; 19,76]	[5,48; 22,65]	[5,78; 23,73]	[4,75; 22,37]	[2,44; 18,25]	[4,84; 22,75]	[6,24; 25,34]				
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	129	126	121	101	100	98	96	96	93					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		44	41	25	34	32	31	33	36					
		Anteil in %		34,92	33,88	24,75	34,00	32,65	32,29	34,38	38,71					
		CI Anteil in %		[26,56; 43,28]	[25,42; 42,35]	[16,29; 33,21]	[24,67; 43,33]	[23,32; 41,99]	[22,89; 41,69]	[24,82; 43,93]	[28,76; 48,66]					
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	122	120	119	114	107	105	104	103						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		53	41	48	44	45	46	51						
		Anteil in %		44,17	34,45	42,11	41,12	42,86	44,23	49,51						
		CI Anteil in %		[35,24; 53,09]	[25,88; 43,03]	[33,00; 51,21]	[31,75; 50,49]	[33,35; 52,37]	[34,64; 53,82]	[39,81; 59,22]						
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	120	117	112	111	108	105	103							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		35	35	35	35	39	39							
		Anteil in %		29,91	31,25	31,53	32,41	37,14	37,86							
		CI Anteil in %		[21,58; 38,25]	[22,63; 39,87]	[22,85; 40,21]	[23,54; 41,28]	[27,86; 46,43]	[28,45; 47,28]							
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	126	123	115	113	112	109								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		43	38	35	39	46								
		Anteil in %		34,96	33,04	30,97	34,82	42,20								
		CI Anteil in %		[26,50; 43,42]	[24,41; 41,68]	[22,41; 39,54]	[25,96; 43,68]	[32,89; 51,52]								
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	130	129	129	127	126									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		38	32	34	36									
		Anteil in %		29,46	24,81	26,77	28,57									
		CI Anteil in %		[21,56; 37,35]	[17,32; 32,29]	[19,04; 34,50]	[20,65; 36,49]									

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	133	131	127	122										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		28	28	31										
		Anteil in %			21,37	22,05	25,41									
		CI Anteil in %			[14,33; 28,42]	[14,81; 29,29]	[17,65; 33,17]									
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	119	115	115											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		26	32											
		Anteil in %			22,61	27,83										
		CI Anteil in %			[14,93; 30,29]	[19,60; 36,05]										
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	114	111												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		34												
		Anteil in %			30,63											
		CI Anteil in %			[22,02; 39,24]											
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	102													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														

In den folgenden drei Tabellen sind die **TNM-Stadien** (Tumore, Nodes [Lymphknotenmetastasen], (Fern-)Metastasen) laut Erstdokumentation dargestellt.

In Tabelle 3.1.12 ist nach TNM-Klassifikationsschema (pTNM) die postoperativ (histopathologisch) bestimmte Tumorausdehnung **pTx** der Patientinnen ausgewiesen.⁷

Dazu wird unter „Auswertungsgruppe 1 insgesamt“ für jede Kohorte zunächst angegeben, wie viele Programmteilnehmerinnen der Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung zuzuordnen waren, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte. Für die „auswertbaren“ Patientinnen wird anschließend die postoperativ bestimmte Tumorausdehnung ausgewiesen bzw. wenn dies nicht möglich ist, die Angabe, ob keine Operation erfolgte oder keine Beurteilung möglich war.

Tabelle 3.1.12 TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	--
	auswertbar	Anzahl	--
	keine OP	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pTis	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pT0	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pT1	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pT2	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pT3	Anzahl	--
Anteil in %		--	
CI Anteil in %		--	
pT4	Anzahl	--	
	Anteil in %	--	
	CI Anteil in %	--	

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2004-2 82 Patientin/Patientinnen. Davon konnte/konnten 78 in die Auswertung einbezogen werden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

⁷ In Einzelfällen fließen die entsprechenden Werte aus der präoperativen Erstdokumentation ein, sofern keine postoperative Erstdokumentation im Auswertungszeitraum vorliegt (siehe auch: Rechenregeln für das DMP Brustkrebs V18 vom 19.09.2012).

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 82	
	auswertbar	Anzahl 78	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	5
		Anteil in %	6,41
		CI Anteil in %	[0,94; 11,88]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	34
		Anteil in %	43,59
		CI Anteil in %	[32,51; 54,67]
	pT2	Anzahl	35
Anteil in %		44,87	
CI Anteil in %		[33,76; 55,98]	
pT3	Anzahl	3	
	Anteil in %	3,85	
	CI Anteil in %	[0,00; 8,14]	
pT4	Anzahl	1	
	Anteil in %	1,28	
	CI Anteil in %	[0,00; 3,79]	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 85	
	auswertbar	Anzahl 73	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	5
		Anteil in %	6,85
		CI Anteil in %	[1,01; 12,68]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	31
		Anteil in %	42,47
		CI Anteil in %	[31,05; 53,88]
	pT2	Anzahl	31
Anteil in %		42,47	
CI Anteil in %		[31,05; 53,88]	
pT3	Anzahl	4	
	Anteil in %	5,48	
	CI Anteil in %	[0,22; 10,74]	
pT4	Anzahl	2	
	Anteil in %	2,74	
	CI Anteil in %	[0,00; 6,51]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 95	
	auswertbar	Anzahl 85	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	3
		Anteil in %	3,53
		CI Anteil in %	[0,00; 7,48]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	30
		Anteil in %	35,29
		CI Anteil in %	[25,07; 45,51]
	pT2	Anzahl	44
		Anteil in %	51,76
CI Anteil in %		[41,08; 62,45]	
pT3	Anzahl	3	
	Anteil in %	3,53	
	CI Anteil in %	[0,00; 7,48]	
pT4	Anzahl	5	
	Anteil in %	5,88	
	CI Anteil in %	[0,85; 10,91]	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 105	
	auswertbar	Anzahl 98	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	5
		Anteil in %	5,10
		CI Anteil in %	[0,72; 9,48]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	38
		Anteil in %	38,78
		CI Anteil in %	[29,08; 48,47]
	pT2	Anzahl	46
		Anteil in %	46,94
CI Anteil in %		[37,01; 56,87]	
pT3	Anzahl	6	
	Anteil in %	6,12	
	CI Anteil in %	[1,35; 10,89]	
pT4	Anzahl	3	
	Anteil in %	3,06	
	CI Anteil in %	[0,00; 6,49]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 96
	auswertbar	Anzahl 94
	keine OP	Anzahl 8
		Anteil in % 8,51
		CI Anteil in % [2,84; 14,18]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 1
		Anteil in % 1,06
		CI Anteil in % [0,00; 3,15]
	pTis	Anzahl 2
		Anteil in % 2,13
		CI Anteil in % [0,00; 5,06]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 20
		Anteil in % 21,28
		CI Anteil in % [12,96; 29,59]
pT2	Anzahl 52	
	Anteil in % 55,32	
	CI Anteil in % [45,21; 65,42]	
pT3	Anzahl 7	
	Anteil in % 7,45	
	CI Anteil in % [2,11; 12,78]	
pT4	Anzahl 4	
	Anteil in % 4,26	
	CI Anteil in % [0,15; 8,36]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 129
	auswertbar	Anzahl 127
	keine OP	Anzahl 12
		Anteil in % 9,45
		CI Anteil in % [4,34; 14,56]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 1
		Anteil in % 0,79
		CI Anteil in % [0,00; 2,33]
	pTis	Anzahl 6
		Anteil in % 4,72
		CI Anteil in % [1,02; 8,43]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 33
		Anteil in % 25,98
		CI Anteil in % [18,33; 33,64]
pT2	Anzahl 64	
	Anteil in % 50,39	
	CI Anteil in % [41,66; 59,12]	
pT3	Anzahl 6	
	Anteil in % 4,72	
	CI Anteil in % [1,02; 8,43]	
pT4	Anzahl 5	
	Anteil in % 3,94	
	CI Anteil in % [0,54; 7,33]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 122
	auswertbar	Anzahl 118
	keine OP	Anzahl 14
		Anteil in % 11,86
		CI Anteil in % [6,00; 17,72]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 1
		Anteil in % 0,85
		CI Anteil in % [0,00; 2,51]
	pTis	Anzahl 6
		Anteil in % 5,08
		CI Anteil in % [1,10; 9,07]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 34
		Anteil in % 28,81
		CI Anteil in % [20,61; 37,02]
	pT2	Anzahl 51
Anteil in % 43,22		
CI Anteil in % [34,24; 52,20]		
pT3	Anzahl 3	
	Anteil in % 2,54	
	CI Anteil in % [0,00; 5,39]	
pT4	Anzahl 9	
	Anteil in % 7,63	
	CI Anteil in % [2,82; 12,44]	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 120
	auswertbar	Anzahl 118
	keine OP	Anzahl 16
		Anteil in % 13,56
		CI Anteil in % [7,36; 19,76]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 2
		Anteil in % 1,69
		CI Anteil in % [0,00; 4,03]
	pTis	Anzahl 2
		Anteil in % 1,69
		CI Anteil in % [0,00; 4,03]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 39
		Anteil in % 33,05
		CI Anteil in % [24,53; 41,57]
	pT2	Anzahl 49
Anteil in % 41,53		
CI Anteil in % [32,60; 50,45]		
pT3	Anzahl 5	
	Anteil in % 4,24	
	CI Anteil in % [0,59; 7,89]	
pT4	Anzahl 5	
	Anteil in % 4,24	
	CI Anteil in % [0,59; 7,89]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 126
	auswertbar	Anzahl 120
	keine OP	Anzahl 15
		Anteil in % 12,50
		CI Anteil in % [6,56; 18,44]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 2
		Anteil in % 1,67
		CI Anteil in % [0,00; 3,97]
	pTis	Anzahl 2
		Anteil in % 1,67
		CI Anteil in % [0,00; 3,97]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 40
		Anteil in % 33,33
		CI Anteil in % [24,86; 41,80]
	pT2	Anzahl 50
Anteil in % 41,67		
CI Anteil in % [32,81; 50,52]		
pT3	Anzahl 5	
	Anteil in % 4,17	
	CI Anteil in % [0,58; 7,76]	
pT4	Anzahl 6	
	Anteil in % 5,00	
	CI Anteil in % [1,08; 8,92]	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 130
	auswertbar	Anzahl 114
	keine OP	Anzahl 8
		Anteil in % 7,02
		CI Anteil in % [2,31; 11,73]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 1
		Anteil in % 0,88
		CI Anteil in % [0,00; 2,60]
	pTis	Anzahl 8
		Anteil in % 7,02
		CI Anteil in % [2,31; 11,73]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 53
		Anteil in % 46,49
		CI Anteil in % [37,29; 55,69]
	pT2	Anzahl 40
Anteil in % 35,09		
CI Anteil in % [26,29; 43,89]		
pT3	Anzahl 1	
	Anteil in % 0,88	
	CI Anteil in % [0,00; 2,60]	
pT4	Anzahl 3	
	Anteil in % 2,63	
	CI Anteil in % [0,00; 5,58]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 133
	auswertbar	Anzahl 120
	keine OP	Anzahl 4
		Anteil in % 3,33
		CI Anteil in % [0,11; 6,56]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 2
		Anteil in % 1,67
		CI Anteil in % [0,00; 3,97]
	pTis	Anzahl 5
		Anteil in % 4,17
		CI Anteil in % [0,58; 7,76]
	pT0	Anzahl 2
		Anteil in % 1,67
		CI Anteil in % [0,00; 3,97]
	pT1	Anzahl 50
		Anteil in % 41,67
		CI Anteil in % [32,81; 50,52]
pT2	Anzahl 50	
	Anteil in % 41,67	
	CI Anteil in % [32,81; 50,52]	
pT3	Anzahl 4	
	Anteil in % 3,33	
	CI Anteil in % [0,11; 6,56]	
pT4	Anzahl 3	
	Anteil in % 2,50	
	CI Anteil in % [0,00; 5,31]	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 119
	auswertbar	Anzahl 106
	keine OP	Anzahl 8
		Anteil in % 7,55
		CI Anteil in % [2,49; 12,60]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 1
		Anteil in % 0,94
		CI Anteil in % [0,00; 2,79]
	pTis	Anzahl 9
		Anteil in % 8,49
		CI Anteil in % [3,16; 13,82]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 48
		Anteil in % 45,28
		CI Anteil in % [35,76; 54,80]
pT2	Anzahl 34	
	Anteil in % 32,08	
	CI Anteil in % [23,15; 41,00]	
pT3	Anzahl 3	
	Anteil in % 2,83	
	CI Anteil in % [0,00; 6,00]	
pT4	Anzahl 3	
	Anteil in % 2,83	
	CI Anteil in % [0,00; 6,00]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 114
	auswertbar	Anzahl 101
	keine OP	Anzahl 3
		Anteil in % 2,97
		CI Anteil in % [0,00; 6,30]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 1
		Anteil in % 0,99
		CI Anteil in % [0,00; 2,93]
	pTis	Anzahl 13
		Anteil in % 12,87
		CI Anteil in % [6,31; 19,43]
	pT0	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl 43
		Anteil in % 42,57
		CI Anteil in % [32,88; 52,27]
	pT2	Anzahl 34
		Anteil in % 33,66
		CI Anteil in % [24,40; 42,93]
pT3	Anzahl 4	
	Anteil in % 3,96	
	CI Anteil in % [0,14; 7,78]	
pT4	Anzahl 3	
	Anteil in % 2,97	
	CI Anteil in % [0,00; 6,30]	
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 102
	auswertbar	Anzahl 84
	keine OP	Anzahl 3
		Anteil in % 3,57
		CI Anteil in % [0,00; 7,56]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl 5
		Anteil in % 5,95
		CI Anteil in % [0,86; 11,04]
	pT0	Anzahl 2
		Anteil in % 2,38
		CI Anteil in % [0,00; 5,66]
	pT1	Anzahl 37
		Anteil in % 44,05
		CI Anteil in % [33,37; 54,73]
	pT2	Anzahl 30
		Anteil in % 35,71
		CI Anteil in % [25,41; 46,02]
pT3	Anzahl 4	
	Anteil in % 4,76	
	CI Anteil in % [0,18; 9,34]	
pT4	Anzahl 3	
	Anteil in % 3,57	
	CI Anteil in % [0,00; 7,56]	

In Tabelle 3.1.13 sind nach dem TNM-Klassifikationsschema (pTNM) die postoperativ (histopathologisch) bestimmten Lymphknotenmetastasen (Nodes) **pNx** der Patientinnen ausgewiesen.⁸ Dazu wird unter „Auswertungsgruppe 1 insgesamt“ für jede Kohorte zunächst angegeben, wie viele Programmteilnehmerinnen der Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung zuzuordnen waren, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte. Für die „auswertbaren“ Patientinnen wird anschließend das Vorhandensein von postoperativ bestimmten Lymphknotenmetastasen ausgewiesen bzw. wenn dies nicht möglich ist, die Angabe, ob keine Operation erfolgte oder keine Beurteilung möglich war.

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2004-2 82 Patientin/Patientinnen. Davon konnte/konnten 78 in die Auswertung einbezogen werden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.13 TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	--
	auswertbar	Anzahl	--
	keine OP	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pN0	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pN1	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pN2	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	pN3	Anzahl	--
Anteil in %		--	
CI Anteil in %		--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	82
	auswertbar	Anzahl	78
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	13
		Anteil in %	16,67
		CI Anteil in %	[8,34; 24,99]
	pN0	Anzahl	32
		Anteil in %	41,03
		CI Anteil in %	[30,04; 52,01]
	pN1	Anzahl	16
		Anteil in %	20,51
		CI Anteil in %	[11,49; 29,53]
	pN2	Anzahl	9
		Anteil in %	11,54
		CI Anteil in %	[4,40; 18,67]
	pN3	Anzahl	8
Anteil in %		10,26	
CI Anteil in %		[3,48; 17,03]	

⁸ In Einzelfällen fließen die entsprechenden Werte aus der präoperativen Erstdokumentation ein, sofern keine postoperative Erstdokumentation im Auswertungszeitraum vorliegt (siehe auch: Rechenregeln für das DMP Brustkrebs V18 vom 19.09.2012).

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2005-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 85
	auswertbar	Anzahl 73
	keine OP	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 5
		Anteil in % 6,85
		CI Anteil in % [1,01; 12,68]
	pN0	Anzahl 36
		Anteil in % 49,32
		CI Anteil in % [37,77; 60,86]
	pN1	Anzahl 17
		Anteil in % 23,29
		CI Anteil in % [13,52; 33,05]
pN2	Anzahl 6	
	Anteil in % 8,22	
	CI Anteil in % [1,87; 14,56]	
pN3	Anzahl 9	
	Anteil in % 12,33	
	CI Anteil in % [4,73; 19,92]	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 95
	auswertbar	Anzahl 85
	keine OP	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 6
		Anteil in % 7,06
		CI Anteil in % [1,58; 12,54]
	pN0	Anzahl 41
		Anteil in % 48,24
		CI Anteil in % [37,55; 58,92]
	pN1	Anzahl 16
		Anteil in % 18,82
		CI Anteil in % [10,46; 27,18]
pN2	Anzahl 15	
	Anteil in % 17,65	
	CI Anteil in % [9,49; 25,80]	
pN3	Anzahl 7	
	Anteil in % 8,24	
	CI Anteil in % [2,36; 14,11]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 105	
	auswertbar	Anzahl 98	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	9
		Anteil in %	9,18
		CI Anteil in %	[3,44; 14,93]
	pN0	Anzahl	58
		Anteil in %	59,18
		CI Anteil in %	[49,40; 68,96]
	pN1	Anzahl	14
		Anteil in %	14,29
		CI Anteil in %	[7,32; 21,25]
pN2	Anzahl	12	
	Anteil in %	12,24	
	CI Anteil in %	[5,72; 18,77]	
pN3	Anzahl	5	
	Anteil in %	5,10	
	CI Anteil in %	[0,72; 9,48]	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 96	
	auswertbar	Anzahl 94	
	keine OP	Anzahl	11
		Anteil in %	11,70
		CI Anteil in %	[5,17; 18,24]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	2
		Anteil in %	2,13
		CI Anteil in %	[0,00; 5,06]
	pN0	Anzahl	46
		Anteil in %	48,94
		CI Anteil in %	[38,78; 59,10]
	pN1	Anzahl	20
		Anteil in %	21,28
		CI Anteil in %	[12,96; 29,59]
pN2	Anzahl	11	
	Anteil in %	11,70	
	CI Anteil in %	[5,17; 18,24]	
pN3	Anzahl	4	
	Anteil in %	4,26	
	CI Anteil in %	[0,15; 8,36]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 129	
	auswertbar	Anzahl 127	
	keine OP	Anzahl	14
		Anteil in %	11,02
		CI Anteil in %	[5,56; 16,49]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	6
		Anteil in %	4,72
		CI Anteil in %	[1,02; 8,43]
	pN0	Anzahl	71
		Anteil in %	55,91
		CI Anteil in %	[47,24; 64,57]
	pN1	Anzahl	20
		Anteil in %	15,75
		CI Anteil in %	[9,39; 22,11]
pN2	Anzahl	7	
	Anteil in %	5,51	
	CI Anteil in %	[1,53; 9,50]	
pN3	Anzahl	9	
	Anteil in %	7,09	
	CI Anteil in %	[2,61; 11,57]	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 122	
	auswertbar	Anzahl 117	
	keine OP	Anzahl	17
		Anteil in %	14,53
		CI Anteil in %	[8,12; 20,94]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	3
		Anteil in %	2,56
		CI Anteil in %	[0,00; 5,44]
	pN0	Anzahl	55
		Anteil in %	47,01
		CI Anteil in %	[37,93; 56,09]
	pN1	Anzahl	21
		Anteil in %	17,95
		CI Anteil in %	[10,97; 24,93]
pN2	Anzahl	9	
	Anteil in %	7,69	
	CI Anteil in %	[2,84; 12,54]	
pN3	Anzahl	12	
	Anteil in %	10,26	
	CI Anteil in %	[4,74; 15,78]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 120
	auswertbar	Anzahl 116
	keine OP	Anzahl 16
		Anteil in % 13,79
		CI Anteil in % [7,49; 20,10]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 5
		Anteil in % 4,31
		CI Anteil in % [0,60; 8,02]
	pN0	Anzahl 63
		Anteil in % 54,31
		CI Anteil in % [45,21; 63,41]
	pN1	Anzahl 18
		Anteil in % 15,52
		CI Anteil in % [8,90; 22,13]
	pN2	Anzahl 4
		Anteil in % 3,45
CI Anteil in % [0,11; 6,78]		
pN3	Anzahl 10	
	Anteil in % 8,62	
	CI Anteil in % [3,49; 13,75]	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 126
	auswertbar	Anzahl 119
	keine OP	Anzahl 17
		Anteil in % 14,29
		CI Anteil in % [7,97; 20,60]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 6
		Anteil in % 5,04
		CI Anteil in % [1,09; 8,99]
	pN0	Anzahl 58
		Anteil in % 48,74
		CI Anteil in % [39,72; 57,76]
	pN1	Anzahl 24
		Anteil in % 20,17
		CI Anteil in % [12,93; 27,41]
	pN2	Anzahl 4
		Anteil in % 3,36
CI Anteil in % [0,11; 6,61]		
pN3	Anzahl 10	
	Anteil in % 8,40	
	CI Anteil in % [3,40; 13,41]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 130	
	auswertbar	Anzahl 114	
	keine OP	Anzahl	9
		Anteil in %	7,89
		CI Anteil in %	[2,92; 12,87]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	6
		Anteil in %	5,26
		CI Anteil in %	[1,15; 9,38]
	pN0	Anzahl	73
		Anteil in %	64,04
		CI Anteil in %	[55,19; 72,88]
	pN1	Anzahl	18
		Anteil in %	15,79
		CI Anteil in %	[9,07; 22,51]
pN2	Anzahl	3	
	Anteil in %	2,63	
	CI Anteil in %	[0,00; 5,58]	
pN3	Anzahl	5	
	Anteil in %	4,39	
	CI Anteil in %	[0,61; 8,16]	
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 133	
	auswertbar	Anzahl 120	
	keine OP	Anzahl	5
		Anteil in %	4,17
		CI Anteil in %	[0,58; 7,76]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	9
		Anteil in %	7,50
		CI Anteil in %	[2,77; 12,23]
	pN0	Anzahl	62
		Anteil in %	51,67
		CI Anteil in %	[42,69; 60,65]
	pN1	Anzahl	31
		Anteil in %	25,83
		CI Anteil in %	[17,97; 33,70]
pN2	Anzahl	6	
	Anteil in %	5,00	
	CI Anteil in %	[1,08; 8,92]	
pN3	Anzahl	7	
	Anteil in %	5,83	
	CI Anteil in %	[1,62; 10,04]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 119
	auswertbar	Anzahl 105
	keine OP	Anzahl 9
		Anteil in % 8,57
		CI Anteil in % [3,19; 13,95]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 4
		Anteil in % 3,81
		CI Anteil in % [0,13; 7,49]
	pN0	Anzahl 67
		Anteil in % 63,81
		CI Anteil in % [54,57; 73,05]
	pN1	Anzahl 16
		Anteil in % 15,24
		CI Anteil in % [8,33; 22,15]
pN2	Anzahl 4	
	Anteil in % 3,81	
	CI Anteil in % [0,13; 7,49]	
pN3	Anzahl 5	
	Anteil in % 4,76	
	CI Anteil in % [0,67; 8,85]	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 114
	auswertbar	Anzahl 101
	keine OP	Anzahl 5
		Anteil in % 4,95
		CI Anteil in % [0,70; 9,20]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 10
		Anteil in % 9,90
		CI Anteil in % [4,05; 15,76]
	pN0	Anzahl 64
		Anteil in % 63,37
		CI Anteil in % [53,92; 72,81]
	pN1	Anzahl 13
		Anteil in % 12,87
		CI Anteil in % [6,31; 19,43]
pN2	Anzahl 5	
	Anteil in % 4,95	
	CI Anteil in % [0,70; 9,20]	
pN3	Anzahl 4	
	Anteil in % 3,96	
	CI Anteil in % [0,14; 7,78]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 102
	auswertbar	Anzahl 83
	keine OP	Anzahl 4
		Anteil in % 4,82
		CI Anteil in % [0,18; 9,45]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 2
		Anteil in % 2,41
		CI Anteil in % [0,00; 5,73]
	pN0	Anzahl 51
		Anteil in % 61,45
		CI Anteil in % [50,91; 71,98]
	pN1	Anzahl 17
		Anteil in % 20,48
		CI Anteil in % [11,75; 29,22]
	pN2	Anzahl 5
Anteil in % 6,02		
CI Anteil in % [0,87; 11,17]		
pN3	Anzahl 4	
	Anteil in % 4,82	
	CI Anteil in % [0,18; 9,45]	

In Tabelle 3.1.14 sind nach dem TNM-Klassifikationsschema die postoperativen (Fern-)Metastasen **M** der Patientinnen ausgewiesen.⁹ Dazu wird unter „Auswertungsgruppe 1 insgesamt“ für jede Kohorte zunächst angegeben, wie viele Programmteilnehmerinnen der Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung zuzuordnen waren, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte. Für die „auswertbaren“ Patientinnen erfolgt anschließend die Angabe, ob Fernmetastasen vorlagen oder nicht bzw. ob diesbezüglich keine Beurteilung möglich war.

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2004-2 82 Patientin/Patientinnen. Davon konnte/konnten 82 in die Auswertung einbezogen werden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.14 TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium, Auswertungsgruppe 1

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitriths- halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl - -
	auswertbar	Anzahl - -
	keine Beurteilung möglich	Anzahl - -
		Anteil in % - -
		CI Anteil in % - -
	Fernmetastasen	Anzahl - -
		Anteil in % - -
		CI Anteil in % - -
	keine Fernmetastasen	Anzahl - -
		Anteil in % - -
		CI Anteil in % - -
	2004-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt
auswertbar		Anzahl 82
keine Beurteilung möglich		Anzahl 8
		Anteil in % 9,76
		CI Anteil in % [3,29; 16,22]
Fernmetastasen		Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
keine Fernmetastasen		Anzahl 74
		Anteil in % 90,24
		CI Anteil in % [83,78; 96,71]
2005-1		Auswertungsgruppe 1 insgesamt
	auswertbar	Anzahl 85
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 19
		Anteil in % 22,35
		CI Anteil in % [13,44; 31,26]
	Fernmetastasen	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 66
		Anteil in % 77,65
		CI Anteil in % [68,74; 86,56]

⁹ In Einzelfällen fließen die entsprechenden Werte aus der präoperativen Erstdokumentation ein, sofern keine postoperative Erstdokumentation im Auswertungszeitraum vorliegt (siehe auch: Rechenregeln für das DMP Brustkrebs V18 vom 19.09.2012).

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2005-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 95
	auswertbar	Anzahl 95
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 23
		Anteil in % 24,21
		CI Anteil in % [15,55; 32,87]
	Fernmetastasen	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 72
		Anteil in % 75,79
CI Anteil in % [67,13; 84,45]		
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 105
	auswertbar	Anzahl 105
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 17
		Anteil in % 16,19
		CI Anteil in % [9,11; 23,27]
	Fernmetastasen	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 88
		Anteil in % 83,81
CI Anteil in % [76,73; 90,89]		
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 96
	auswertbar	Anzahl 89
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 14
		Anteil in % 15,73
		CI Anteil in % [8,12; 23,34]
	Fernmetastasen	Anzahl 3
		Anteil in % 3,37
		CI Anteil in % [0,00; 7,14]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 72
		Anteil in % 80,90
CI Anteil in % [72,69; 89,11]		
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 129
	auswertbar	Anzahl 127
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 37
		Anteil in % 29,13
		CI Anteil in % [21,20; 37,07]
	Fernmetastasen	Anzahl 6
		Anteil in % 4,72
		CI Anteil in % [1,02; 8,43]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 84
		Anteil in % 66,14
CI Anteil in % [57,88; 74,40]		

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 122
	auswertbar	Anzahl 115
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 31
		Anteil in % 26,96
		CI Anteil in % [18,81; 35,10]
	Fernmetastasen	Anzahl 8
		Anteil in % 6,96
		CI Anteil in % [2,29; 11,63]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 76
		Anteil in % 66,09
CI Anteil in % [57,40; 74,78]		
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 120
	auswertbar	Anzahl 116
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 37
		Anteil in % 31,90
		CI Anteil in % [23,38; 40,42]
	Fernmetastasen	Anzahl 5
		Anteil in % 4,31
		CI Anteil in % [0,60; 8,02]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 74
		Anteil in % 63,79
CI Anteil in % [55,01; 72,58]		
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 126
	auswertbar	Anzahl 117
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 26
		Anteil in % 22,22
		CI Anteil in % [14,66; 29,79]
	Fernmetastasen	Anzahl 1
		Anteil in % 0,85
		CI Anteil in % [0,00; 2,53]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 90
		Anteil in % 76,92
CI Anteil in % [69,26; 84,59]		
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 130
	auswertbar	Anzahl 111
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 8
		Anteil in % 7,21
		CI Anteil in % [2,37; 12,04]
	Fernmetastasen	Anzahl 1
		Anteil in % 0,90
		CI Anteil in % [0,00; 2,67]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 102
		Anteil in % 91,89
CI Anteil in % [86,79; 96,99]		

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 133
	auswertbar	Anzahl 120
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 17
		Anteil in % 14,17
		CI Anteil in % [7,90; 20,43]
	Fernmetastasen	Anzahl 4
		Anteil in % 3,33
		CI Anteil in % [0,11; 6,56]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 99
		Anteil in % 82,50
CI Anteil in % [75,67; 89,33]		
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 119
	auswertbar	Anzahl 105
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 26
		Anteil in % 24,76
		CI Anteil in % [16,47; 33,06]
	Fernmetastasen	Anzahl 5
		Anteil in % 4,76
		CI Anteil in % [0,67; 8,85]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 74
		Anteil in % 70,48
CI Anteil in % [61,71; 79,24]		
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 114
	auswertbar	Anzahl 100
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 16
		Anteil in % 16,00
		CI Anteil in % [8,78; 23,22]
	Fernmetastasen	Anzahl 5
		Anteil in % 5,00
		CI Anteil in % [0,71; 9,29]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 79
		Anteil in % 79,00
CI Anteil in % [70,98; 87,02]		
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 102
	auswertbar	Anzahl 83
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 8
		Anteil in % 9,64
		CI Anteil in % [3,25; 16,03]
	Fernmetastasen	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 75
		Anteil in % 90,36
CI Anteil in % [83,97; 96,75]		

In Tabelle 3.1.15 ist der Rezeptorstatus der Patientinnen ausgewiesen. Es wird dargestellt wie viele Patientinnen eine positiven oder negativen Rezeptorstatus haben und bei wie vielen Patientinnen der Rezeptorstatus unbekannt ist.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2004-2 82 Frau/Frauen. Davon konnte/konnten 78 Patientin/Patientinnen in die Auswertung einbezogen werden.

Tabelle 3.1.15 Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	--
	auswertbar	Anzahl	--
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	positiv	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	negativ	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	2004-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl
auswertbar		Anzahl	78
unbekannter Rezeptorstatus		Anzahl	5
		Anteil in %	6,41
		CI Anteil in %	[0,94; 11,88]
positiv		Anzahl	60
		Anteil in %	76,92
		CI Anteil in %	[67,51; 86,33]
negativ		Anzahl	13
		Anteil in %	16,67
		CI Anteil in %	[8,34; 24,99]
2005-1		Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl
	auswertbar	Anzahl	73
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	3
		Anteil in %	4,11
		CI Anteil in %	[0,00; 8,69]
	positiv	Anzahl	58
		Anteil in %	79,45
		CI Anteil in %	[70,12; 88,79]
	negativ	Anzahl	12
		Anteil in %	16,44
		CI Anteil in %	[7,88; 25,00]
	2005-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl
auswertbar		Anzahl	85
unbekannter Rezeptorstatus		Anzahl	1
		Anteil in %	1,18
		CI Anteil in %	[0,00; 3,48]
positiv		Anzahl	70
		Anteil in %	82,35
		CI Anteil in %	[74,20; 90,51]
negativ		Anzahl	14
		Anteil in %	16,47
		CI Anteil in %	[8,54; 24,40]

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 105
	auswertbar	Anzahl 98
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl 2
		Anteil in % 2,04
		CI Anteil in % [0,00; 4,85]
	positiv	Anzahl 78
		Anteil in % 79,59
		CI Anteil in % [71,57; 87,61]
	negativ	Anzahl 18
		Anteil in % 18,37
CI Anteil in % [10,66; 26,07]		
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 96
	auswertbar	Anzahl 95
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl 6
		Anteil in % 6,32
		CI Anteil in % [1,40; 11,23]
	positiv	Anzahl 78
		Anteil in % 82,11
		CI Anteil in % [74,36; 89,85]
	negativ	Anzahl 11
		Anteil in % 11,58
CI Anteil in % [5,11; 18,05]		
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 129
	auswertbar	Anzahl 126
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl 5
		Anteil in % 3,97
		CI Anteil in % [0,55; 7,39]
	positiv	Anzahl 101
		Anteil in % 80,16
		CI Anteil in % [73,17; 87,15]
	negativ	Anzahl 20
		Anteil in % 15,87
CI Anteil in % [9,47; 22,28]		
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 122
	auswertbar	Anzahl 117
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl 11
		Anteil in % 9,40
		CI Anteil in % [4,09; 14,71]
	positiv	Anzahl 83
		Anteil in % 70,94
		CI Anteil in % [62,68; 79,20]
	negativ	Anzahl 23
		Anteil in % 19,66
CI Anteil in % [12,43; 26,89]		

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	Anzahl
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	120
	auswertbar	Anzahl	117
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	11
		Anteil in %	9,40
		CI Anteil in %	[4,09; 14,71]
	positiv	Anzahl	89
		Anteil in %	76,07
		CI Anteil in %	[68,30; 83,83]
	negativ	Anzahl	17
		Anteil in %	14,53
CI Anteil in %		[8,12; 20,94]	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	126
	auswertbar	Anzahl	119
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	9
		Anteil in %	7,56
		CI Anteil in %	[2,79; 12,33]
	positiv	Anzahl	89
		Anteil in %	74,79
		CI Anteil in %	[66,96; 82,62]
	negativ	Anzahl	21
		Anteil in %	17,65
CI Anteil in %		[10,77; 24,53]	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	130
	auswertbar	Anzahl	113
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	8
		Anteil in %	7,08
		CI Anteil in %	[2,33; 11,83]
	positiv	Anzahl	90
		Anteil in %	79,65
		CI Anteil in %	[72,19; 87,10]
	negativ	Anzahl	15
		Anteil in %	13,27
CI Anteil in %		[6,99; 19,56]	
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	133
	auswertbar	Anzahl	120
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	9
		Anteil in %	7,50
		CI Anteil in %	[2,77; 12,23]
	positiv	Anzahl	86
		Anteil in %	71,67
		CI Anteil in %	[63,57; 79,76]
	negativ	Anzahl	25
		Anteil in %	20,83
CI Anteil in %		[13,54; 28,13]	

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 119	
	auswertbar	Anzahl 105	
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	5
		Anteil in %	4,76
		CI Anteil in %	[0,67; 8,85]
	positiv	Anzahl	85
		Anteil in %	80,95
		CI Anteil in %	[73,41; 88,50]
	negativ	Anzahl	15
		Anteil in %	14,29
CI Anteil in %		[7,56; 21,01]	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 114	
	auswertbar	Anzahl 100	
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	4
		Anteil in %	4,00
		CI Anteil in %	[0,14; 7,86]
	positiv	Anzahl	82
		Anteil in %	82,00
		CI Anteil in %	[74,43; 89,57]
	negativ	Anzahl	14
		Anteil in %	14,00
CI Anteil in %		[7,16; 20,84]	
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 102	
	auswertbar	Anzahl 85	
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	3
		Anteil in %	3,53
		CI Anteil in %	[0,00; 7,48]
	positiv	Anzahl	63
		Anteil in %	74,12
		CI Anteil in %	[64,75; 83,48]
	negativ	Anzahl	19
		Anteil in %	22,35
CI Anteil in %		[13,44; 31,26]	

3.2 Medizinische Auswertungen

In Tabelle 3.2.1 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen mit einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie war. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil ein negativer Lymphknoten-Befund laut Erstdokumentation vorlag.

Die Auswertung zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie kann erst ab dem zweiten Halbjahr 2006 durchgeführt werden, da zu diesem Zeitpunkt neue DMP-Dokumentationsbögen eingeführt wurden. Auf diesen können die nötigen Angaben zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie dokumentiert werden, was auf den davor gültigen DMP-Dokumentationsbögen nicht möglich war.

In der Kohorte 2007-1 war/waren 44 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie zuzuordnen. Für 28 von Ihnen war der Status Sentinel-Lymphknoten- negativ in der Erstdokumentation dokumentiert.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.1 Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1		
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	21
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	9
		Anteil in %	42,86
		CI Anteil in %	[21,17; 64,55]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	44
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	28
		Anteil in %	63,64
		CI Anteil in %	[49,26; 78,01]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	21
		Anteil in %	40,38
		CI Anteil in %	[26,92; 53,85]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	45
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	23
		Anteil in %	51,11
		CI Anteil in %	[36,34; 65,88]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	51
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	24
		Anteil in %	47,06
		CI Anteil in %	[33,22; 60,89]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	66
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	35
		Anteil in %	53,03
		CI Anteil in %	[40,90; 65,16]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	67
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	34
		Anteil in %	50,75
		CI Anteil in %	[38,68; 62,81]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	63
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	42
		Anteil in %	66,67
		CI Anteil in %	[54,93; 78,40]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>	

EZ	Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1		
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	62
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	29
		Anteil in %	46,77
		CI Anteil in %	[34,25; 59,30]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	27
		Anteil in %	51,92
		CI Anteil in %	[38,21; 65,64]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

In Tabelle 3.2.2 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen mit Tumoren pTis und pT1 war. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil in der Erstdokumentation eine brusterhaltende Therapie dokumentiert war.

In der Kohorte 2004-2 war/waren 39 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit Tumoren pTis und pT1 zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.2 Patientinnen mit TumorgroÙe pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit TumorgroÙe pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	--
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>--</i>
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	39
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	24
		Anteil in %	61,54
		CI Anteil in %	[46,07; 77,01]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>82</i>
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	36
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	29
		Anteil in %	80,56
		CI Anteil in %	[67,44; 93,67]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>85</i>
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	33
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	29
		Anteil in %	87,88
		CI Anteil in %	[76,57; 99,19]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>95</i>
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	43
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	38
		Anteil in %	88,37
		CI Anteil in %	[78,68; 98,07]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>105</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	22
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	18
		Anteil in %	81,82
		CI Anteil in %	[65,32; 98,31]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>96</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	39
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	33
		Anteil in %	84,62
		CI Anteil in %	[73,14; 96,09]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	40
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	29
		Anteil in %	72,50
		CI Anteil in %	[58,49; 86,51]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>122</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	41
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	31
		Anteil in %	75,61
		CI Anteil in %	[62,30; 88,92]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>120</i>

EZ	Patientinnen mit TumorgroÙe pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	42
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	32
		Anteil in %	76,19
		CI Anteil in %	[63,15; 89,23]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	61
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	50
		Anteil in %	81,97
		CI Anteil in %	[72,24; 91,70]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	55
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	45
		Anteil in %	81,82
		CI Anteil in %	[71,53; 92,11]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	57
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	45
		Anteil in %	78,95
		CI Anteil in %	[68,27; 89,63]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	56
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	45
		Anteil in %	80,36
		CI Anteil in %	[69,86; 90,86]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	42
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	38
		Anteil in %	90,48
		CI Anteil in %	[81,49; 99,46]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

In Tabelle 3.2.3 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine axilläre Lymphonodektomie erfolgte. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil in der Erstdokumentation das Entfernen von mindestens 10 Lymphknoten dokumentiert war.

In der Kohorte 2004-2 war/waren 54 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit axillärer Lymphonodektomie zuzuordnen. Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.3 Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	--
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>--</i>
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	46
		Anteil in %	85,19
		CI Anteil in %	[75,62; 94,75]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>82</i>
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	60
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	53
		Anteil in %	88,33
		CI Anteil in %	[80,14; 96,52]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>85</i>
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	69
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	61
		Anteil in %	88,41
		CI Anteil in %	[80,80; 96,02]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>95</i>
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	78
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	64
		Anteil in %	82,05
		CI Anteil in %	[73,48; 90,62]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>105</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	65
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	58
		Anteil in %	90,63
		CI Anteil in %	[83,48; 97,77]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	69
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	58
		Anteil in %	84,06
		CI Anteil in %	[75,36; 92,76]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	53
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	51
		Anteil in %	96,23
		CI Anteil in %	[91,05; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	55
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	48
		Anteil in %	87,27
		CI Anteil in %	[78,38; 96,16]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>

EZ	Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	46
		Anteil in %	86,79
		CI Anteil in %	[77,68; 95,91]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	36
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	30
		Anteil in %	85,71
		CI Anteil in %	[74,12; 97,31]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	41
		Anteil in %	85,42
		CI Anteil in %	[75,33; 95,51]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	36
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	27
		Anteil in %	79,41
		CI Anteil in %	[66,02; 92,81]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	25
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	18
		Anteil in %	75,00
		CI Anteil in %	[57,68; 92,32]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	29
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	19
		Anteil in %	73,08
		CI Anteil in %	[56,65; 89,51]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

In Tabelle 3.2.4 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine brusterhaltende Therapie erfolgte. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie vorgenommen wurde. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aus-

sagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2004-2 war/waren 43 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.4 Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	--
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>--</i>
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	43
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	26
		Anteil in %	60,47
		CI Anteil in %	[45,68; 75,25]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>82</i>
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	26
		Anteil in %	54,17
		CI Anteil in %	[39,92; 68,41]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>85</i>
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	35
		Anteil in %	67,31
		CI Anteil in %	[54,43; 80,18]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>95</i>
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	67
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	44
		Anteil in %	65,67
		CI Anteil in %	[54,22; 77,13]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>105</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	34
		Anteil in %	65,38
		CI Anteil in %	[52,33; 78,44]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>96</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	74
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	54
		Anteil in %	72,97
		CI Anteil in %	[62,79; 83,16]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	67
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	43
		Anteil in %	64,18
		CI Anteil in %	[52,61; 75,75]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>122</i>

EZ	Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	62
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	45
		Anteil in %	72,58
		CI Anteil in %	[61,39; 83,78]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	69
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	45
		Anteil in %	65,22
		CI Anteil in %	[53,90; 76,54]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	80
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	57
		Anteil in %	71,25
		CI Anteil in %	[61,27; 81,23]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	89
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	66
		Anteil in %	74,16
		CI Anteil in %	[65,01; 83,30]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	66
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	48
		Anteil in %	72,73
		CI Anteil in %	[61,90; 83,55]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	62
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	37
		Anteil in %	59,68
		CI Anteil in %	[47,37; 71,99]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	63
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	5
		Anteil in %	7,94
		CI Anteil in %	[1,21; 14,67]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

In Tabelle 3.2.5 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen ein pT3/pT4-Tumor vorlag und eine Mastektomie erfolgte. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahres vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2004-2 war/waren 4 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit pT3/pT4-Tumor und erfolgter Mastektomie zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.5 Patientinnen mit Tumormgröße pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit Tumormgröße pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	--
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>--</i>
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>82</i>
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[6,17; 93,83]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>85</i>
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	57,14
		CI Anteil in %	[17,54; 96,74]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>95</i>
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	5
		Anteil in %	62,50
		CI Anteil in %	[26,64; 98,36]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>105</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	5
		Anteil in %	62,50
		CI Anteil in %	[26,64; 98,36]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>96</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	10
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	7
		Anteil in %	70,00
		CI Anteil in %	[40,06; 99,94]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	10
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	6
		Anteil in %	60,00
		CI Anteil in %	[27,99; 92,01]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>122</i>

EZ	Patientinnen mit Tumorstadium pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	28,57
		CI Anteil in %	[0,00; 64,72]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	12,50
		CI Anteil in %	[0,00; 37,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[0,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[6,17; 93,83]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	20,00
		CI Anteil in %	[0,00; 59,20]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	20,00
		CI Anteil in %	[0,00; 59,20]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

In Tabelle 3.2.6 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine R1/R2-Resektion nach Mastektomie dokumentiert wurde. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2004-2 war/waren 0 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.6 Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	--
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>--</i>
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>82</i>
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>85</i>
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>95</i>
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>105</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>96</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>122</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>120</i>

EZ	Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>130</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[0,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>133</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

In Tabelle 3.2.7 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine Mastektomie und die Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten aus der Axilla dokumentiert wurde. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2004-2 war/waren 9 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit Mastektomie und Resektion von mehr als 3 positiven Lymphknoten aus der Axilla zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.7 Patientinnen nach Mastektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach axillärer Lymphonodektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit axillärer Lymphonodektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	--
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>--</i>
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	22,22
		CI Anteil in %	[0,00; 51,03]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>82</i>
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	11
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	6
		Anteil in %	54,55
		CI Anteil in %	[23,68; 85,41]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>85</i>
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	10
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	40,00
		CI Anteil in %	[7,99; 72,01]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>95</i>
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	5
		Anteil in %	62,50
		CI Anteil in %	[26,64; 98,36]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>105</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	13
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	12
		Anteil in %	92,31
		CI Anteil in %	[77,23; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>96</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	6
		Anteil in %	66,67
		CI Anteil in %	[34,00; 99,33]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	11
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	36,36
		CI Anteil in %	[6,55; 66,18]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>122</i>

EZ	Patientinnen mit axillärer Lymphonodektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9
		Anzahl	4
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	44,44
		CI Anteil in %	[10,01; 78,88]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
		Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	16,67
		CI Anteil in %	[0,00; 49,33]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
		Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
		Anzahl	3
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[6,17; 93,83]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5
		Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	40,00
		CI Anteil in %	[0,00; 88,01]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
		Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	16,67
		CI Anteil in %	[0,00; 49,33]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
		Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

In Tabelle 3.2.8 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen ein niedriges Risiko vorlag. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. bei welchem Anteil innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Beitrittsjahres keine Chemotherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den vorliegenden Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine Chemotherapie dokumentiert ist. Ist dies nicht der Fall, gilt dies als „keine Chemotherapie“. Zur Gruppe der Patientinnen mit niedrigem Risiko wurden alle Frauen gezählt, für die alle der folgenden Merkmale gleichzeitig zutraten: Alter größer gleich 35 Jahre, Karzinom kleiner gleich 2 cm, hochdifferenziert (Grading G1), rezeptorpositiv (ER+ und/oder PR+) sowie nodal

negativ. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2004-2 war/waren 6 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit niedrigem Risiko zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.8 Patientinnen mit einem niedrigen Risiko¹⁰: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit einem niedrigen Risiko: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	--
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	--
		Anteil in %	--
		CI Anteil in %	--
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>--</i>
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	5
		Anteil in %	83,33
		CI Anteil in %	[50,67; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>82</i>
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>85</i>
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>95</i>
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	7
		Anteil in %	87,50
		CI Anteil in %	[63,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>105</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	75,00
		CI Anteil in %	[26,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>96</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	80,00
		CI Anteil in %	[40,80; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>122</i>

¹⁰ zur Gruppe mit niedrigem Risiko gehören alle Frauen, für die alle folgenden Merkmale gleichzeitig zutreffen: 35 Jahre oder älter sowie Tumor kleiner gleich 2cm, hochdifferenziert (Grading G1), rezeptorpositiv (ER+und oder PR+)sowie nodal negativ.

EZ	Patientinnen mit einem niedrigen Risiko: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	6
		Anteil in %	75,00
		CI Anteil in %	[42,92; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>120</i>
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	5
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	10
		Anteil in %	83,33
		CI Anteil in %	[61,31; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>130</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	8
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>133</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	10
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	10
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	6
		Anteil in %	75,00
		CI Anteil in %	[42,92; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

3.3 Überlebenszeiten

In den folgenden Tabellen sind **kumulierte „Überlebensraten“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Diese geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass Patientinnen bis zum jeweiligen Halbjahr überleben.

In Tabelle 3.3.1 ist für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 14 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 80,52 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1 Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	82	53	48	46	43	42	40	39	36	36	35	30	14	14
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0
		Anteil in %	0,00	1,89	2,08	2,17	2,33	2,38	2,50	5,13	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,11	96,07	93,98	91,80	89,61	87,37	82,89	82,89	82,89	80,52	80,52	80,52	80,52
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[94,45; 100,00]	[90,72; 100,00]	[87,37; 100,00]	[84,08; 99,52]	[80,96; 98,26]	[77,89; 96,85]	[72,05; 93,73]	[72,05; 93,73]	[69,04; 92,00]	[69,04; 92,00]	[69,04; 92,00]	[69,04; 92,00]	[69,04; 92,00]	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	85	68	67	62	59	59	58	57	54	53	53	48	22	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	0	3	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	
		Anteil in %	2,35	0,00	4,48	0,00	0,00	1,69	0,00	5,26	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,65	97,65	93,27	93,27	93,27	91,69	91,69	86,87	85,26	85,26	85,26	85,26	85,26	
CI Rate in %		[94,43; 100,00]	[94,43; 100,00]	[87,54; 99,00]	[87,54; 99,00]	[87,54; 99,00]	[85,27; 98,11]	[85,27; 98,11]	[78,79; 94,95]	[76,74; 93,78]	[76,74; 93,78]	[76,74; 93,78]	[76,74; 93,78]	[76,74; 93,78]		
2005-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	95	90	81	80	77	75	74	72	72	71	71	66		
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	1	1	2	2	1	2	0	1	0	1	2		
		Anteil in %	2,11	1,11	1,23	2,50	2,60	1,33	2,70	0,00	1,39	0,00	1,41	3,03		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,89	96,81	95,61	93,22	90,80	89,59	87,17	87,17	85,96	85,96	84,75	82,18		
CI Rate in %		[95,00; 100,00]	[93,25; 100,00]	[91,40; 99,82]	[87,97; 98,47]	[84,71; 96,89]	[83,13; 96,05]	[80,07; 94,27]	[80,07; 94,27]	[78,57; 93,35]	[78,57; 93,35]	[77,09; 92,41]	[73,97; 90,39]			
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	105	101	91	89	88	84	82	81	80	79	78			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	3	2	0	1	1	1	1	1	1	1			
		Anteil in %	0,95	2,97	2,20	0,00	1,14	1,19	1,22	1,23	1,25	1,27	1,28			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	99,05	96,11	93,99	93,99	92,93	91,82	90,70	89,58	88,46	87,34	86,22			
CI Rate in %		[97,19; 100,00]	[92,37; 99,85]	[89,32; 98,66]	[89,32; 98,66]	[87,87; 97,99]	[86,37; 97,27]	[84,90; 96,50]	[83,45; 95,71]	[82,02; 94,90]	[80,62; 94,06]	[79,24; 93,20]				
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	96	91	88	67	64	61	59	58	58	57				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	3	3	0	3	2	1	0	0	2				
		Anteil in %	2,08	3,30	3,41	0,00	4,69	3,28	1,69	0,00	0,00	3,51				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,92	94,69	91,46	91,46	87,17	84,32	82,89	82,89	82,89	79,98				
CI Rate in %		[95,06; 100,00]	[90,16; 99,22]	[85,80; 97,12]	[85,80; 97,12]	[79,99; 94,35]	[76,36; 92,28]	[74,58; 91,20]	[74,58; 91,20]	[74,58; 91,20]	[71,04; 88,92]					
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	129	126	121	101	100	98	96	96	93					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	3	3	2	1	2	2	0	2	2					
		Anteil in %	2,33	2,38	1,65	0,99	2,00	2,04	0,00	2,08	2,15					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,67	95,35	93,77	92,84	90,99	89,13	89,13	87,27	85,40					
CI Rate in %		[95,07; 100,00]	[91,72; 98,98]	[89,59; 97,95]	[88,32; 97,36]	[85,88; 96,10]	[83,52; 94,74]	[83,52; 94,74]	[81,21; 93,33]	[78,94; 91,86]						
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	122	120	119	114	107	105	104	103						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	4	6	2	1	1	0						
		Anteil in %	0,82	0,00	3,36	5,26	1,87	0,95	0,96	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	99,18	99,18	95,85	90,80	89,10	88,26	87,41	87,41						
CI Rate in %		[97,58; 100,00]	[97,58; 100,00]	[92,29; 99,41]	[85,62; 95,98]	[83,51; 94,69]	[82,48; 94,04]	[81,45; 93,37]	[81,45; 93,37]							

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	120	117	112	111	108	105	103								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	3	5	1	3	3	2	0								
		Anteil in %	2,50	4,27	0,89	2,70	2,78	1,90	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,50	93,33	92,50	90,00	87,50	85,83	85,83								
	CI Rate in %	[94,71; 100,00]	[88,87; 97,79]	[87,79; 97,21]	[84,63; 95,37]	[81,58; 93,42]	[79,59; 92,07]	[79,59; 92,07]									
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	126	123	115	113	112	109									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	7	2	1	2	1									
		Anteil in %	1,59	5,69	1,74	0,88	1,79	0,92									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,41	92,81	91,20	90,39	88,78	87,96									
	CI Rate in %	[96,23; 100,00]	[88,29; 97,33]	[86,23; 96,17]	[85,22; 95,56]	[83,24; 94,32]	[82,25; 93,67]	[82,25; 93,67]									
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	130	129	129	127	126										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	1										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,78	0,00	0,79										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	99,22	99,22	98,44										
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[97,71; 100,00]	[97,71; 100,00]	[96,29; 100,00]	[96,29; 100,00]	[96,29; 100,00]									
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	133	131	127	122											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	2	5	3											
		Anteil in %	1,50	1,53	3,94	2,46											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,50	96,99	93,17	90,88											
	CI Rate in %	[96,43; 100,00]	[94,09; 99,89]	[88,86; 97,48]	[85,96; 95,80]	[85,96; 95,80]	[85,96; 95,80]	[85,96; 95,80]									
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	119	115	115												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	3	0	3												
		Anteil in %	2,52	0,00	2,61												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,48	97,48	94,94												
	CI Rate in %	[94,66; 100,00]	[94,66; 100,00]	[90,99; 98,89]	[90,99; 98,89]	[90,99; 98,89]	[90,99; 98,89]	[90,99; 98,89]									
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	114	111													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	1													
		Anteil in %	1,75	0,90													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,25	97,36													
	CI Rate in %	[95,84; 100,00]	[94,41; 100,00]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	102														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00														
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]															

In Tabelle 3.3.1.1 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium 0** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium 0 zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.1 Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3	3							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]							

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	5	5	5	5	5										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--											
CI Rate in %		--	--	--	--												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	7	7	7												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00												
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	6	6													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0													
		Anteil in %	0,00	0,00													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00													
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--														
CI Rate in %		--															

In Tabelle 3.3.1.2 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium I** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile **fett** markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium I zuzuordnen. von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.2 Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	18	10	10	10	10	8	8	6	6	6	5			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[71,41; 100,00]	[71,41; 100,00]	[37,11; 97,89]	[37,11; 97,89]	[37,11; 97,89]	[37,11; 97,89]	[37,11; 97,89]			
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	19	14	14	12	11	11	11	10	10	10	8	4		
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[64,44; 100,00]	[64,44; 100,00]	[64,44; 100,00]	[64,44; 100,00]	[64,44; 100,00]		
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	26	24	22	22	22	21	21	21	21	21				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83			
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]			
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	13	13	9	9	9	9	9	9	9				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86			
CI Rate in %		[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]			
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	20	20	20	15	15	15	15	15	15					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	20	20	20	20	19	18	18	18						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	94,74	94,74	94,74	94,74						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[84,70; 100,00]	[84,70; 100,00]	[84,70; 100,00]	[84,70; 100,00]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	21	21	21	21	21	21	21							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	23	22	21	21	21	21								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45								
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[86,75; 100,00]	[86,75; 100,00]	[86,75; 100,00]	[86,75; 100,00]	[86,75; 100,00]	[86,75; 100,00]								
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	43	42	42	41	41									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]									
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	31	31	29	29										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	3,45										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	96,55										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[89,91; 100,00]											
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	31	31	31											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00											
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	25	25												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00												
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	31													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0													
		Anteil in %	0,00													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
CI Rate in %		[100,00; 100,00]														

In Tabelle 3.3.1.3 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIA** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 5 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIA zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 92,86 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.3 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	19	14	14	13	13	13	13	13	12	12	11	10	5	5	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	21	17	16	15	13	13	13	13	13	13	13	13	8		
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	[81,89; 100,00]	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	21	21	18	17	16	16	16	16	16	16	16	15			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Anteil in %	0,00	4,76	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,24	89,95	89,95	89,95	89,95	89,95	89,95	89,95	89,95	89,95	89,95	83,95		
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[86,13; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[76,70; 100,00]	[67,16; 100,00]		
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	24	22	19	19	19	19	19	19	18	17	16				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0			
		Anteil in %	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	5,56	5,88	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	90,79	85,75	80,70	80,70			
		CI Rate in %	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[78,54; 100,00]	[70,71; 100,00]	[63,61; 97,79]	[63,61; 97,79]			
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	28	26	26	19	18	17	16	16	16	16					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89				
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[83,86; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]				
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	29	29	28	26	25	25	24	24	24						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1	0	1	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	96,15	96,15	92,31	92,31	92,31	92,31	92,31					
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[88,76; 100,00]	[88,76; 100,00]	[82,07; 100,00]	[82,07; 100,00]	[82,07; 100,00]	[82,07; 100,00]	[82,07; 100,00]					

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	19	18	18	17	17	16	16								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	94,12	94,12	94,12	94,12							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[82,93; 100,00]	[82,93; 100,00]	[82,93; 100,00]	[82,93; 100,00]								
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	32	32	32	31	31	30	29								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	1	1	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	3,13	0,00	3,23	3,33	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	96,88	96,88	93,75	90,63	90,63								
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[90,85; 100,00]	[90,85; 100,00]	[85,36; 100,00]	[80,53; 100,00]	[80,53; 100,00]									
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	28	27	26	25	25	25									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	1	1	0	0	0									
		Anteil in %	3,57	3,70	3,85	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	96,43	92,86	89,29	89,29	89,29	89,29									
CI Rate in %		[89,56; 100,00]	[83,32; 100,00]	[77,83; 100,00]	[77,83; 100,00]	[77,83; 100,00]	[77,83; 100,00]										
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	26	26	26	26	26										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	25	23	22	22											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	1	0	1											
		Anteil in %	8,00	4,35	0,00	4,55											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	92,00	88,00	88,00	84,00											
CI Rate in %		[81,37; 100,00]	[75,26; 100,00]	[75,26; 100,00]	[69,63; 98,37]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	19	19	19												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00												
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	28	27													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0													
		Anteil in %	0,00	0,00													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00													
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	16														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00														
CI Rate in %		[100,00; 100,00]															

In Tabelle 3.3.1.4 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIB** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile **fett markiert** dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIB zuzuordnen. von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.4 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	5													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0													
		Anteil in %	0,00													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
CI Rate in %		[100,00; 100,00]														
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	8			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	83,33	83,33		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[62,24; 100,00]	[62,24; 100,00]			
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	81,82				
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[59,03; 100,00]					
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	13	13	12	6	6	5	5	5	5					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	1	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	7,69	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	92,31	92,31	92,31	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92					
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[46,86; 100,00]	[46,86; 100,00]	[46,86; 100,00]	[46,86; 100,00]	[46,86; 100,00]						

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	14	14	14	12	9	9	9	9							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	2	3	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	14,29	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	85,71	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[67,38; 100,00]	[39,19; 89,39]	[39,19; 89,39]	[39,19; 89,39]	[39,19; 89,39]	[39,19; 89,39]	[39,19; 89,39]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	13	13	12	12	12	11									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	1	0									
		Anteil in %	0,00	7,69	0,00	0,00	8,33	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	92,31	92,31	92,31	84,62	84,62									
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[65,01; 100,00]	[65,01; 100,00]										
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	11	11	11	11	11										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	17	17	17	15											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	2	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	11,76	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	88,24	88,24											
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[72,92; 100,00]	[72,92; 100,00]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	7	7	7												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00												
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--													
CI Rate in %		--	--														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	10														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00														
CI Rate in %		[100,00; 100,00]															

In Tabelle 3.3.1.5 wird die **kumulierte „Überlebensrate“** nach **Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIA** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile **fett** markiert dargestellt.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIA zuzuordnen. von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei **Prozent**.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

Tabelle 3.3.1.5 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
CI Rate in %		[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	11	8	6	6	6	6	6	6	5	5	5				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
		Anteil in %	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	75,76	75,76	75,76	75,76			
CI Rate in %		[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[45,18; 100,00]	[45,18; 100,00]	[45,18; 100,00]	[45,18; 100,00]	[45,18; 100,00]			
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	12	12	12	11	10	8	8	8	8	8					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67				
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]				
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	10	9	9	9	8	7	7	7	7	6					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50				
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]				
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	6	5	5	3	3	3	3	3	3						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33					
CI Rate in %		[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]					

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--								
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--							
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--								
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	7	7	7	7											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00											
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--												
CI Rate in %		--	--	--													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	5	4													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0													
		Anteil in %	20,00	0,00													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	80,00	80,00													
CI Rate in %		[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	7														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00														
CI Rate in %		[100,00; 100,00]															

In Tabelle 3.3.1.6 wird die **kumulierte „Überlebensrate“** nach Kaplan-Meier für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIB** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIB zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.6 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	3	3										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]										
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--										
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--										
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--											
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--													
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--										
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--											
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--														
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--										
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--											
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--															
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--															
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--										
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--											

In Tabelle 3.3.1.7 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIC** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIC zuzuordnen. von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei Prozent.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.7 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	7	5	4	4	3										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	1										
		Anteil in %	0,00	20,00	0,00	0,00	33,33										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	80,00	80,00	80,00	53,33										
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[4,67; 100,00]										
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	6	5	5	3	3	3									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]								
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	6	6	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]		
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	3	3	3												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00												
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	7	7	7	6	6	5	5	5	5						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33						
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]						

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	9	9	9	9	9	9	9								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	6	5	5	5	5	5	5								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33							
CI Rate in %		[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]							
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	9	9	8	8	8	8									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	0	1									
		Anteil in %	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	12,50									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	88,89	88,89	88,89	88,89	77,78									
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[68,36; 100,00]	[68,36; 100,00]	[68,36; 100,00]	[68,36; 100,00]	[50,62; 100,00]										
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	5	5	5	4	4										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	4	4	4	4											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00											
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--												
CI Rate in %		--	--	--													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--													
CI Rate in %		--	--														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	4														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00														
CI Rate in %		[100,00; 100,00]															

In Tabelle 3.3.1.8 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IV** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IV zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

Tabelle 3.3.1.8 Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	3	3	3											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00											
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	5	4	4	3	3	3	3	3	3					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
		Anteil in %	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	53,33				
CI Rate in %		[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[4,67; 100,00]				

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	8	8	8	8	7	7	7	7							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]	[64,58; 100,00]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	4														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2														
		Anteil in %	50,00														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	50,00														
CI Rate in %		[1,00; 99,00]															
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--							
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--							
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	4	4	4	3											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	25,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	75,00	75,00											
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	5	4	4												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	0	2												
		Anteil in %	20,00	0,00	50,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	80,00	80,00	40,00												
CI Rate in %		[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[-2,94; 82,94]													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	4	4													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0													
		Anteil in %	0,00	0,00													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00													
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--														
CI Rate in %		--															

In Tabelle 3.3.2 ist für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹¹

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 14 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. Bei von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 76,96 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2 Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	82	53	48	46	43	42	40	39	36	36	35	30	14	14
	auswertbar	Anzahl		42	36	37	34	33	29	31	27	27	21	10	1	0
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		42	33	34	32	30	26	26	23	23	19	10	1	
		Anteil in %		100,00	91,67	91,89	94,12	90,91	89,66	83,87	85,19	85,19	90,48	100,00	100,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	3	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		0,00	8,33	5,41	0,00	3,03	3,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	93,18	88,52	88,52	85,84	82,88	76,96	76,96	76,96	76,96	76,96	76,96	76,96
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[85,73; 100,00]	[79,05; 97,99]	[79,05; 97,99]	[75,30; 96,38]	[71,21; 94,55]	[63,55; 90,37]	[63,55; 90,37]	[63,55; 90,37]	[63,55; 90,37]	[63,55; 90,37]	[63,55; 90,37]	[63,55; 90,37]
2005-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	85	68	67	62	59	59	58	57	54	53	53	48	22	
	auswertbar	Anzahl		39	45	43	39	38	39	43	37	40	35	20	2	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		38	44	42	38	37	38	40	34	38	34	18	0	
		Anteil in %		97,44	97,78	97,67	97,44	97,37	97,44	93,02	91,89	95,00	97,14	90,00	0,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,18	98,18	98,18	98,18	98,18	95,79	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[94,65; 100,00]	[94,65; 100,00]	[94,65; 100,00]	[94,65; 100,00]	[94,65; 100,00]	[90,01; 100,00]	[85,96; 100,00]	[85,96; 100,00]	[85,96; 100,00]	[85,96; 100,00]	[85,96; 100,00]	[85,96; 100,00]	[85,96; 100,00]
2005-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	95	90	81	80	77	75	74	72	72	71	71	66		
	auswertbar	Anzahl		47	44	50	48	50	45	37	42	41	37	16		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		44	41	46	44	48	43	35	41	39	35	14		
		Anteil in %		93,62	93,18	92,00	91,67	96,00	95,56	94,59	97,62	95,12	94,59	87,50		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		
		Anteil in %		6,38	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,08	95,08	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	91,07	91,07	91,07		
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[89,65; 100,00]	[89,65; 100,00]	[86,93; 99,65]	[86,93; 99,65]	[86,93; 99,65]	[86,93; 99,65]	[86,93; 99,65]	[86,93; 99,65]	[83,52; 98,62]	[83,52; 98,62]	[83,52; 98,62]	[83,52; 98,62]	

¹¹ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	105	101	91	89	88	84	82	81	80	79	78			
	auswertbar	Anzahl		45	52	46	47	45	41	38	37	34	32			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		44	50	44	45	42	38	35	35	33	30			
		Anteil in %		97,78	96,15	95,65	95,74	93,33	92,68	92,11	94,59	97,06	93,75			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	1	0	1	0	1	0	0	1			
		Anteil in %		2,22	1,92	2,17	0,00	2,22	0,00	2,63	0,00	0,00	3,13			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,41	96,69	94,79	94,79	92,64	92,64	90,26	90,26	90,26	87,25			
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[95,32; 100,00]	[92,17; 100,00]	[89,03; 100,00]	[89,03; 100,00]	[85,63; 99,65]	[85,63; 99,65]	[82,03; 98,49]	[82,03; 98,49]	[82,03; 98,49]	[77,40; 97,10]				
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	96	91	88	67	64	61	59	58	58	57				
	auswertbar	Anzahl		63	56	59	58	52	52	52	50	50				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		60	54	55	53	48	49	50	46	46				
		Anteil in %		95,24	96,43	93,22	91,38	92,31	94,23	96,15	92,00	92,00				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		3	0	2	1	0	0	0	2	0				
		Anteil in %		4,76	0,00	3,39	1,72	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,77	95,77	92,69	91,06	91,06	91,06	91,06	87,56	87,56				
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[91,09; 100,00]	[91,09; 100,00]	[86,51; 98,87]	[84,21; 97,91]	[84,21; 97,91]	[84,21; 97,91]	[84,21; 97,91]	[79,44; 95,68]	[79,44; 95,68]					
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	129	126	121	101	100	98	96	96	93					
	auswertbar	Anzahl		85	81	76	68	68	65	64	59					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		84	79	73	64	65	61	58	54					
		Anteil in %		98,82	97,53	96,05	94,12	95,59	93,85	90,63	91,53					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	1	1	0	0	2	1					
		Anteil in %		1,18	1,23	1,32	1,47	0,00	0,00	3,13	1,69					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,92	97,77	96,54	95,23	95,23	95,23	92,30	90,62					
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[96,82; 100,00]	[94,72; 100,00]	[92,68; 100,00]	[90,65; 99,81]	[90,65; 99,81]	[90,65; 99,81]	[86,33; 98,27]	[83,91; 97,33]						
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	122	120	119	114	107	105	104	103						
	auswertbar	Anzahl		67	79	70	65	60	59	52						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		66	77	67	62	57	56	49						
		Anteil in %		98,51	97,47	95,71	95,38	95,00	94,92	94,23						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	2	2	1	0	1	0						
		Anteil in %		1,49	2,53	2,86	1,54	0,00	1,69	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,88	96,60	94,03	92,62	92,62	91,11	91,11						
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[96,69; 100,00]	[92,82; 100,00]	[88,94; 99,12]	[86,91; 98,33]	[86,91; 98,33]	[84,76; 97,46]	[84,76; 97,46]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	120	117	112	111	108	105	103							
	auswertbar	Anzahl		83	78	78	76	68	64							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		78	75	76	73	65	59							
		Anteil in %		93,98	96,15	97,44	96,05	95,59	92,19							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		5	0	0	1	0	3							
		Anteil in %		6,02	0,00	0,00	1,32	0,00	4,69							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	94,85	94,85	94,85	93,61	93,61	89,08							
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[90,45; 99,25]	[90,45; 99,25]	[90,45; 99,25]	[88,65; 98,57]	[88,65; 98,57]	[82,20; 95,96]								
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	126	123	115	113	112	109								
	auswertbar	Anzahl		86	79	78	75	64								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		84	76	73	69	59								
		Anteil in %		97,67	96,20	93,59	92,00	92,19								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2	1	2	2									
		Anteil in %		2,33	1,27	2,56	2,67	3,13								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,73	96,54	94,15	91,50	88,45								
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[94,62; 100,00]	[92,69; 100,00]	[89,17; 99,13]	[85,46; 97,54]	[81,28; 95,62]									

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	130	129	129	127	126										
	auswertbar	Anzahl		91	98	93	90										
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		90	97	90	89										
		Anteil in %		98,90	98,98	96,77	98,89										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	2	0										
		Anteil in %		1,10	0,00	2,15	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	99,06	99,06	97,10	97,10										
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[97,22; 100,00]	[97,22; 100,00]	[93,86; 100,00]	[93,86; 100,00]											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	133	131	127	122											
	auswertbar	Anzahl		104	102	94											
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		101	101	92											
		Anteil in %		97,12	99,02	97,87											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		3	1	1											
		Anteil in %		2,88	0,98	1,06											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,17	96,20	95,14											
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[94,01; 100,00]	[92,54; 99,86]	[90,98; 99,30]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	119	115	115												
	auswertbar	Anzahl		89	85												
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		86	80												
		Anteil in %		96,63	94,12												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		3	2												
		Anteil in %		3,37	2,35												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	96,77	94,38												
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[93,18; 100,00]	[89,59; 99,17]													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	114	111													
	auswertbar	Anzahl		78													
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		76													
		Anteil in %		97,44													
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2													
		Anteil in %		2,56													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,40													
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[93,85; 100,00]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	102														
	auswertbar	Anzahl															
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00														
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]															

In Tabelle 3.3.2.1 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium 0** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹²

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium 0 zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.1 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

¹² Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3	3						
	auswertbar	Anzahl		3	3	4	2	1	2	1						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	3	4	2	1	2	1						
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]						
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	5	5	5	5										
	auswertbar	Anzahl		4	4	3	4									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		4	4	3	4									
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0									
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--										
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--										
	CI Anteil in %	--	--	--	--											
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	7	7	7											
	auswertbar	Anzahl		4	4											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		4	4											
		Anteil in %		100,00	100,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0											
		Anteil in %		0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00											
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	6	6												
	auswertbar	Anzahl		5												
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		5												
		Anteil in %		100,00												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0												
		Anteil in %		0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00												
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--													
	auswertbar	Anzahl	--													
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--													
		Anteil in %	--													
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--													
		Anteil in %	--													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--													
	CI Anteil in %	--														

In Tabelle 3.3.2.2 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium I** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹³

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Bei von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.2 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	18	10	10	10	10	8	8	6	6	6	5			
	auswertbar	Anzahl		8	8	8	7	9	5	7	5	5	3	2		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		8	8	8	7	9	4	5	4	4	3	2		
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	71,43	80,00	80,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67		
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[53,51; 100,00]	[28,95; 100,00]	[28,95; 100,00]	[28,95; 100,00]	[28,95; 100,00]	[28,95; 100,00]			
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	19	14	14	12	11	11	11	10	10	10	8	4		
	auswertbar	Anzahl		8	8	7	7	6	7	7	7	7	3	0		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		8	8	7	7	6	7	7	7	7	3			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12			
	auswertbar	Anzahl		7	5	8	8	8	7	5	6	6	7	1		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		7	5	8	8	8	7	5	6	6	7	1		
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			

¹³ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfrequenz Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	26	24	22	22	21	21	21	21	21	21				
	auswertbar	Anzahl		11	14	12	13	12	11	11	10	9				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		11	14	12	13	12	11	11	10	9				
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	13	13	9	9	9	9	9	9					
	auswertbar	Anzahl		7	6	8	8	7	8	8	6	6				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		7	6	8	8	7	8	8	6	6				
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	20	20	20	15	15	15	15	15	15					
	auswertbar	Anzahl		10	12	13	10	10	10	10	9					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		10	12	13	10	10	10	10	9					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	20	20	20	20	19	18	18	18						
	auswertbar	Anzahl		15	17	15	15	13	11	12						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		15	17	15	15	13	11	12						
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]					
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	21	21	21	21	21	21	21							
	auswertbar	Anzahl		16	11	14	14	17	17							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		16	11	14	14	17	17							
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	23	22	21	21	21	21								
	auswertbar	Anzahl		16	15	15	14	12								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		16	15	15	14	12								
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0								
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]									

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	43	42	42	41	41									
	auswertbar	Anzahl		28	32	31	29									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		28	32	31	29									
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0									
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	31	31	29	29										
	auswertbar	Anzahl		23	21	22										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		23	21	22										
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0										
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	31	31	31											
	auswertbar	Anzahl		25	22											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		25	22											
		Anteil in %		100,00	100,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0											
		Anteil in %		0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00										
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	25	25												
	auswertbar	Anzahl		19												
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		19												
		Anteil in %		100,00												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0												
		Anteil in %		0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00												
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	31													
	auswertbar	Anzahl														
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
	CI Anteil in %															

In Tabelle 3.3.2.3 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIA** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁴

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 5 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIA zuzuordnen. Bei von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 77,92 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.3 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	19	14	14	13	13	13	13	13	12	12	11	10	5	5
	auswertbar	Anzahl		12	12	11	12	12	10	11	11	9	7	5	1	0
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		12	10	10	11	11	10	9	9	7	6	5	1	
		Anteil in %		100,00	83,33	90,91	91,67	91,67	100,00	81,82	81,82	77,78	85,71	100,00	100,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	85,71	85,71	85,71	85,71	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[67,38; 100,00]	[67,38; 100,00]	[67,38; 100,00]	[67,38; 100,00]	[55,79; 100,00]	[55,79; 100,00]	[55,79; 100,00]	[55,79; 100,00]	[55,79; 100,00]	[55,79; 100,00]	[55,79; 100,00]	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	21	17	16	15	13	13	13	13	13	13	13	8		
	auswertbar	Anzahl		8	8	8	5	6	6	8	5	8	7	4	1	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		7	7	7	4	5	6	7	4	7	6	3	0	
		Anteil in %		87,50	87,50	87,50	80,00	83,33	100,00	87,50	80,00	87,50	85,71	75,00	0,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	
		CI Anteil in %		[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	[73,92; 100,00]	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	21	21	18	17	16	16	16	16	16	16	15			
	auswertbar	Anzahl		12	11	11	10	11	11	12	11	12	9	3		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		11	10	10	9	10	10	11	10	11	8	2		
		Anteil in %		91,67	90,91	90,91	90,00	90,91	90,91	91,67	90,91	91,67	88,89	66,67		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %		8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	
		CI Anteil in %		[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	[79,37; 100,00]	

¹⁴ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	24	22	19	19	19	19	19	18	17	16					
	auswertbar	Anzahl		7	8	9	9	9	9	8	7	6					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		7	8	9	9	8	8	7	7	6					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	88,89	88,89	77,78	87,50	100,00	100,00				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	1	0	1	0	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[71,41; 100,00]	[71,41; 100,00]	[55,21; 100,00]	[55,21; 100,00]	[55,21; 100,00]	[55,21; 100,00]					
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	28	26	26	19	18	17	16	16	16						
	auswertbar	Anzahl		16	14	16	17	14	13	13	13	14					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		16	14	14	15	13	13	13	12	13					
		Anteil in %		100,00	100,00	87,50	88,24	92,86	100,00	100,00	92,31	92,86					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	2	0	0	0	0	1	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	82,96	82,96					
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[74,37; 100,00]	[65,37; 100,00]	[65,37; 100,00]						
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	29	29	28	26	25	25	24	24	24						
	auswertbar	Anzahl		17	20	19	15	17	16	16	14						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		17	20	18	14	16	15	15	13						
		Anteil in %		100,00	100,00	94,74	93,33	94,12	93,75	93,75	92,86						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	1	0	0	0	0	0						
		Anteil in %		0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	95,24	95,24	95,24	95,24	95,24	95,24						
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[86,13; 100,00]	[86,13; 100,00]	[86,13; 100,00]	[86,13; 100,00]	[86,13; 100,00]	[86,13; 100,00]							
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	19	18	18	17	17	16	16	16							
	auswertbar	Anzahl		9	10	8	10	8	11	11							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		9	10	8	10	8	11	11							
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	32	32	32	31	31	30	29								
	auswertbar	Anzahl		21	20	17	18	18	17								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		20	19	17	16	16	15								
		Anteil in %		95,24	95,00	100,00	88,89	88,89	88,24								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	0	1	0	1								
		Anteil in %		4,76	0,00	0,00	5,56	0,00	5,88								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,83	95,83	95,83	90,79	90,79	85,12								
	CI Anteil in %		[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[87,84; 100,00]	[78,54; 100,00]	[78,54; 100,00]	[69,38; 100,00]									
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	28	27	26	25	25	25									
	auswertbar	Anzahl		13	15	15	14	14									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		13	15	15	14	14									
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0									
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	26	26	26	26										
	auswertbar	Anzahl		18	21	17	20									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		18	21	17	20									
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0									
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	25	23	22	22										
	auswertbar	Anzahl		19	19	18										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		19	19	18										
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0										
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	19	19	19											
	auswertbar	Anzahl		15	14											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		15	14											
		Anteil in %		100,00	100,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0											
		Anteil in %		0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00										
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	28	27												
	auswertbar	Anzahl		19												
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		19												
		Anteil in %		100,00												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0												
		Anteil in %		0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00												
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	16													
	auswertbar	Anzahl														
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
	CI Anteil in %															

In Tabelle 3.3.2.4 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIB** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁵

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIB zuzuordnen. Bei von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.4 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3				
	auswertbar	Anzahl		3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	5														
	auswertbar	Anzahl															
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00														
	CI Anteil in %																
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	8				
	auswertbar	Anzahl		6	7	7	6	9	7	7	7	6	7	4			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		6	7	7	6	9	7	7	7	5	6	3			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	85,71	75,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,71	85,71	85,71			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]				

¹⁵ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfrieger Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8					
	auswertbar	Anzahl		3	4	4	4	4	3	4	4	4					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	4	3	3	3	2	3	3	3					
		Anteil in %		100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	66,67	75,00	75,00	75,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	1	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00					
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]					
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10					
	auswertbar	Anzahl		10	11	11	10	10	9	9	10	9					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		10	11	11	10	10	9	9	9	8					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	1	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00					
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[71,41; 100,00]	[71,41; 100,00]					
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	13	13	12	6	6	5	5	5	5						
	auswertbar	Anzahl		7	5	6	6	5	4	5	5						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		7	5	6	6	5	4	5	4						
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	1						
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00						
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]					
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	14	14	14	12	9	9	9	9							
	auswertbar	Anzahl		7	9	6	4	4	3	2							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		7	9	5	4	4	3	2							
		Anteil in %		100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	1	0	0	0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]						
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8								
	auswertbar	Anzahl		6	6	6	6	6	6								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		6	6	6	6	6	5								
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	1								
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33								
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[53,51; 100,00]								
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	13	13	12	12	12	11									
	auswertbar	Anzahl		9	8	8	9	6									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		9	7	6	6	6									
		Anteil in %		100,00	87,50	75,00	66,67	100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	1	1	1	0									
		Anteil in %		0,00	12,50	12,50	11,11	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	88,89	77,78	66,67	66,67									
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[68,36; 100,00]	[50,62; 100,00]	[35,87; 97,47]	[35,87; 97,47]									

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	11	11	11	11										
	auswertbar	Anzahl		6	7	7	6									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		6	7	7	6									
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0									
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	17	17	17	15										
	auswertbar	Anzahl		11	13	10										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		11	13	10										
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0										
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00										
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	7	7	7											
	auswertbar	Anzahl		5	6											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		5	6											
		Anteil in %		100,00	100,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0											
		Anteil in %		0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00											
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--												
	auswertbar	Anzahl	--	--												
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--												
		Anteil in %	--	--												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--												
		Anteil in %	--	--												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--												
	CI Anteil in %	--	--													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	10													
	auswertbar	Anzahl														
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
	CI Anteil in %															

In Tabelle 3.3.2.5 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIA** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁶

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIA zuzuordnen. Bei von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.5 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	auswertbar	Anzahl		3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	0		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3		
	auswertbar	Anzahl		1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	11	8	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5			
	auswertbar	Anzahl		3	1	3	2	2	2	2	3	2	2	1			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	1	3	2	2	2	2	3	2	2	1			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		

¹⁶ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	12	12	12	11	10	8	8	8	8	8				
	auswertbar	Anzahl		6	6	3	5	4	4	4	4	4	3			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		6	5	3	5	4	4	4	4	4	3			
		Anteil in %		100,00	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71			
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]			
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	10	9	9	9	8	7	7	7	7	6				
	auswertbar	Anzahl		7	8	7	5	5	6	6	6	5				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		7	8	7	5	5	6	6	6	5				
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	6	5	5	3	3	3	3	3	3					
	auswertbar	Anzahl		2	1	1	1	1	1	0	1					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		2	1	1	1	1	1		1					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0		0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4						
	auswertbar	Anzahl		1	1	2	2	2	2	1						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		1	1	2	2	2	2	1						
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]						
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--						
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--						
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--						
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3								
	auswertbar	Anzahl		2	2	2	2	2								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		2	2	2	2	2								
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0								
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3										
	auswertbar	Anzahl		3	3	3										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	3	3										
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0										
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	7	7	7	7										
	auswertbar	Anzahl		6	6	5										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		6	6	5										
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0										
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--											
	auswertbar	Anzahl	--	--	--											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--											
	CI Anteil in %	--	--	--												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	5	4												
	auswertbar	Anzahl		2												
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		2												
		Anteil in %		100,00												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0												
		Anteil in %		0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00												
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	7													
	auswertbar	Anzahl														
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
	CI Anteil in %															

In Tabelle 3.3.2.6 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIB** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁷

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIB zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.6 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

¹⁷ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfreye Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	3	3										
	auswertbar	Anzahl		2	2	2	1	0										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		2	2	2	1											
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0											
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
CI Anteil in %			[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--										
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--										
	CI Anteil in %	--	--	--	--											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--										
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--										
	CI Anteil in %	--	--	--	--											
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--										
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--										
	CI Anteil in %	--	--	--	--											
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--										
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--										
	CI Anteil in %	--	--	--	--											
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--										
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--										
	CI Anteil in %	--	--	--	--											

In Tabelle 3.3.2.7 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIC** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁸

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIC zuzuordnen. Bei von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.7 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	7	5	4	4	3									
	auswertbar	Anzahl		5	2	4	3									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		5	2	3	2									
		Anteil in %		100,00	100,00	75,00	66,67									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	1	0									
		Anteil in %		0,00	0,00	25,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]										
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	6	5	5	3	3	3	3							
	auswertbar	Anzahl		2	4	2	2	2	1							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		2	4	2	2	2	1							
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	6	6	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3		
	auswertbar	Anzahl		0	0	1	2	2	0	0	1	1	1	1		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl				1	2	2			1	1	1	1		
		Anteil in %				100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl				0	0	0			0	0	0	0		
		Anteil in %				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			

¹⁸ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
	auswertbar	Anzahl		0	0	0	1	1	1	0	1	1				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl					1	1	1		1	1				
		Anteil in %					100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl					0	0	0		0	0				
		Anteil in %					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	3	3	3											
	auswertbar	Anzahl		1	1											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	1											
		Anteil in %		100,00	100,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0											
		Anteil in %		0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00											
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]												
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	7	7	7	6	6	5	5	5	5					
	auswertbar	Anzahl		5	5	3	4	3	3	2	3					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		5	5	3	4	3	3	2	3					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]					
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	9	9	9	9	9	9	9							
	auswertbar	Anzahl		1	4	4	4	4	5	3						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	4	4	4	4	5	3						
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]						
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	6	5	5	5	5	5								
	auswertbar	Anzahl		1	2	3	3	2	2							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	2	3	3	2	2							
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	9	9	8	8	8	8								
	auswertbar	Anzahl		4	3	3	3	3								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		4	3	3	3	3								
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0								
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	5	5	5	4	4									
	auswertbar	Anzahl		1	2	1	2									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	2	1	2									
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0									
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	4	4	4	4										
	auswertbar	Anzahl		4	4	4										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		4	4	4										
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0										
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--											
	auswertbar	Anzahl	--	--	--											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--											
	CI Anteil in %	--	--	--												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--												
	auswertbar	Anzahl	--	--												
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--												
		Anteil in %	--	--												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--												
		Anteil in %	--	--												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--												
	CI Anteil in %	--	--													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	4													
	auswertbar	Anzahl														
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
	CI Anteil in %															

In Tabelle 3.3.2.8 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IV** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele

dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁹

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IV zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.8 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

¹⁹ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	3	3	3											
	auswertbar	Anzahl		1	1											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		0	0											
		Anteil in %		0,00	0,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0											
		Anteil in %		100,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	0,00	0,00											
	CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]												
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	5	4	4	3	3	3	3	3	3					
	auswertbar	Anzahl		3	2	2	2	1	2	2	2					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		2	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %		66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %		33,33	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CI Anteil in %		[13,33; 100,00]	[-53,34; 53,34]	[-53,34; 53,34]	[-53,34; 53,34]	[-53,34; 53,34]	[-53,34; 53,34]	[-53,34; 53,34]	[-53,34; 53,34]						
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	8	8	8	8	7	7	7	7						
	auswertbar	Anzahl		1	3	3	2	2	2	2						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		0	2	1	0	0	0	0						
		Anteil in %		0,00	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	1	0	0	0	0						
		Anteil in %		100,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	75,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00						
	CI Anteil in %		[32,56; 100,00]	[1,00; 99,00]	[-17,44; 67,44]	[-17,44; 67,44]	[-17,44; 67,44]	[-17,44; 67,44]	[-17,44; 67,44]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	4													
	auswertbar	Anzahl														
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
	CI Anteil in %															
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--						
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--							

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--										
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--										
		Anteil in %	--	--	--	--	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--										
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	4	4	4	3											
	auswertbar	Anzahl		2	3	1											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	3	1											
		Anteil in %		50,00	100,00	100,00											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	0											
		Anteil in %		50,00	0,00	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	66,67	66,67	66,67											
	CI Anteil in %		[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	5	4	4												
	auswertbar	Anzahl		4	4												
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	1												
		Anteil in %		25,00	25,00												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		3	0												
		Anteil in %		75,00	0,00												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	25,00	25,00												
	CI Anteil in %		[-17,44; 67,44]	[-17,44; 67,44]													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	4	4													
	auswertbar	Anzahl		2													
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		0													
		Anteil in %		0,00													
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2													
		Anteil in %		100,00													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	0,00													
	CI Anteil in %		[0,00; 0,00]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--														
	auswertbar	Anzahl	--														
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--														
	CI Anteil in %	--															

In Tabelle 3.3.3 sind die **Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert)** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1), dargestellt. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Für die Auswertung sind alle Inzidenzen ab dem 1. Folgehalbjahr zu zählen. Für alle Kohorten und Berichtshalbjahre wird zunächst die Zahl der im Programm verbliebenen Patientinnen ausgewiesen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen im Berichtshalbjahr von Rezidiven bzw. Metastasen betroffen waren. Darüber hinaus werden die entsprechenden kumulierten Anteilswerte dargestellt. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Summe der Patientinnen aus den beiden zuletzt ausgewiesenen Kategorien (mit Rezidiv/kontralateralem Tumor, mit Metastasen) in der Regel nicht der Anzahl der auswertbaren Patientinnen entspricht, da eine Doppelzuordnung von Patientinnen auf die beiden Kategorien möglich ist.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 82 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) zuzuordnen. Die kumulierte Anzahl für bis einschließlich dieses letzten Berichtshalbjahres neu aufgetretene lokoregionäre Rezidive oder kontralaterale Tumore lag bei 4. Der kumulierte Anteil bezogen auf die Patientinnen zum Beitritts halbjahr lag bei 4,88 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.3 Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Anteil in %		0,00	2,44	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 5,80]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]	[0,19; 9,57]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	2	3	4	5	7	9	9	9	9	9	9	9	9
		Anteil in %		0,00	2,44	3,66	4,88	6,10	8,54	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 5,80]	[0,00; 7,75]	[0,19; 9,57]	[0,89; 11,31]	[2,45; 14,62]	[4,17; 17,78]	[4,17; 17,78]	[4,17; 17,78]	[4,17; 17,78]	[4,17; 17,78]	[4,17; 17,78]	[4,17; 17,78]	[4,17; 17,78]	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	3	3	3	4	6	6	7	8	9	9	9	9
		Anteil in %		1,18	2,35	3,53	3,53	3,53	4,71	7,06	7,06	8,24	9,41	10,59	10,59	10,59	10,59
CI Anteil in %			[0,00; 3,48]	[0,00; 5,59]	[0,00; 7,48]	[0,00; 7,48]	[0,00; 7,48]	[0,18; 9,23]	[1,58; 12,54]	[1,58; 12,54]	[2,36; 14,11]	[3,17; 15,66]	[4,01; 17,17]	[4,01; 17,17]	[4,01; 17,17]	[4,01; 17,17]	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Anteil in %		0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]	[0,00; 3,12]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	3	4	5	5	5	5	5	6	8	8	8	8	8
		Anteil in %		3,16	3,16	4,21	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	6,32	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42
CI Anteil in %			[0,00; 6,69]	[0,00; 6,69]	[0,15; 8,27]	[0,75; 9,78]	[0,75; 9,78]	[0,75; 9,78]	[0,75; 9,78]	[0,75; 9,78]	[1,40; 11,23]	[2,81; 14,04]	[2,81; 14,04]	[2,81; 14,04]	[2,81; 14,04]	[2,81; 14,04]	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	2	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5
		Anteil in %		0,00	0,00	0,95	1,90	2,86	3,81	3,81	3,81	3,81	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,82]	[0,00; 4,53]	[0,00; 6,06]	[0,13; 7,49]	[0,13; 7,49]	[0,13; 7,49]	[0,13; 7,49]	[0,13; 7,49]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	2	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
		Anteil in %		0,95	1,90	1,90	1,90	2,86	3,81	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
CI Anteil in %			[0,00; 2,82]	[0,00; 4,53]	[0,00; 4,53]	[0,00; 4,53]	[0,00; 6,06]	[0,13; 7,49]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	[0,67; 8,85]	

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	96	96	96	96	96	96	96	96	96						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	5	7	9	11	11	11	11	13					
		Anteil in %			3,13	5,21	7,29	9,38	11,46	11,46	11,46	13,54					
CI Anteil in %				[0,00; 6,62]	[0,74; 9,68]	[2,06; 12,52]	[3,51; 15,24]	[5,05; 17,86]	[5,05; 17,86]	[5,05; 17,86]	[6,66; 20,42]						
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	129	129	129	129	129	129	129	129	129						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	3	3	3	3	3	3					
		Anteil in %			0,00	0,00	0,78	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33					
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,29]	[0,00; 4,94]	[0,00; 4,94]	[0,00; 4,94]	[0,00; 4,94]	[0,00; 4,94]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	3	3	4	4	6	9	11						
		Anteil in %			0,78	2,33	2,33	3,10	3,10	4,65	6,98	8,53					
CI Anteil in %				[0,00; 2,29]	[0,00; 4,94]	[0,00; 4,94]	[0,10; 6,10]	[0,10; 6,10]	[1,00; 8,30]	[2,56; 11,39]	[3,69; 13,37]						
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	122	122	122	122	122	122	122	122	122						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	2	3	4	4	4						
		Anteil in %			0,00	0,00	0,82	1,64	2,46	3,28	3,28						
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,43]	[0,00; 3,90]	[0,00; 5,22]	[0,11; 6,45]	[0,11; 6,45]						
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	3	4	7	8	8	8	8						
		Anteil in %			0,82	2,46	3,28	5,74	6,56	6,56	6,56						
CI Anteil in %				[0,00; 2,43]	[0,00; 5,22]	[0,11; 6,45]	[1,59; 9,88]	[2,15; 10,97]	[2,15; 10,97]	[2,15; 10,97]							
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	120	120	120	120	120	120	120	120	120						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	4	4	5	6	6	6	6						
		Anteil in %			2,50	3,33	3,33	4,17	5,00	5,00	5,00						
		CI Anteil in %			[0,00; 5,31]	[0,11; 6,56]	[0,11; 6,56]	[0,58; 7,76]	[1,08; 8,92]	[1,08; 8,92]	[1,08; 8,92]						
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	4	5	5	5	8	8							
		Anteil in %			2,50	3,33	4,17	4,17	4,17	6,67	6,67						
CI Anteil in %				[0,00; 5,31]	[0,11; 6,56]	[0,58; 7,76]	[0,58; 7,76]	[0,58; 7,76]	[2,18; 11,15]								
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	126	126	126	126	126	126	126	126	126						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	1	2	3	4	4	4	4						
		Anteil in %			0,79	0,79	1,59	2,38	3,17	3,17	3,17						
		CI Anteil in %			[0,00; 2,35]	[0,00; 2,35]	[0,00; 3,78]	[0,00; 5,05]	[0,10; 6,25]	[0,10; 6,25]							
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	3	5	6	8	8	8	8						
		Anteil in %			0,79	2,38	3,97	4,76	6,35	6,35	6,35						
CI Anteil in %				[0,00; 2,35]	[0,00; 5,05]	[0,55; 7,39]	[1,03; 8,50]	[2,07; 10,62]									
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	130	130	130	130	130	130	130	130	130						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	4	5	5	5	5	5						
		Anteil in %			0,77	1,54	3,08	3,85	3,85	3,85	3,85						
CI Anteil in %				[0,00; 2,28]	[0,00; 3,66]	[0,10; 6,06]	[0,53; 7,16]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	133	133	133	133	133	133	133	133	133						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	1	1	1	1	1						
		Anteil in %			0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75						
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,23]										
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	4	4	4	4	4	4	4						
		Anteil in %			2,26	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01						
CI Anteil in %				[0,00; 4,79]	[0,09; 5,92]	[0,09; 5,92]											

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	119	119	119												
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2												
		Anteil in %			0,84	1,68											
		CI Anteil in %			[0,00; 2,49]	[0,00; 4,00]											
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl			3	5											
		Anteil in %			2,52	4,20											
CI Anteil in %				[0,00; 5,35]	[0,58; 7,82]												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	114	114													
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0													
		Anteil in %			0,00												
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]												
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl			2												
		Anteil in %			1,75												
CI Anteil in %				[0,00; 4,18]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	102														
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
CI Anteil in %																	

Auswertungskapitel 4: Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)

4.1 Patientinnenzahlen und -merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmehintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 4.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programtteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2004-2 insgesamt 173 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 54 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 21 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 5 Patientin/Patientinnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2²⁰

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0											
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0	0											
davon UICC-Stadium IVC	Anzahl	0	0	0												
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	173	160	144	126	105	95	83	74	67	51	35	26	21	21
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	7	7	7	6	5	5	5	5	4	4	4	2	2	2
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	54	51	47	44	37	33	29	28	26	23	14	8	5	5
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	48	43	39	35	26	22	19	18	17	13	9	8	7	7
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	33	29	26	21	18	17	14	10	8	6	5	5	4	4
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	10	10	7	6	6	6	6	6	6	3	1	1	1	1
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	5	4	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
davon UICC-Stadium IVC	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	89	81	78	75	66	60	54	50	41	27	18	14	13	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	25	22	22	22	18	15	15	14	10	6	5	3	3	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	21	19	18	17	15	15	15	13	12	9	7	6	5	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	14	14	12	12	11	9	7	7	3	0	0	0	0	
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	1	1	1	
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
davon UICC-Stadium IVC	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	66	63	56	53	52	50	43	38	29	26	24	16		
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1		
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	16	15	12	12	12	12	12	7	5	4	4	4	3	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	14	13	13	13	13	13	13	12	11	9	7	6	1	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2		
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	3		
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
davon UICC-Stadium IVC	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

²⁰ Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass die Summe der Patientinnen aus den UICC-Kategorien in der Regel kleiner ausfällt als die Anzahl der Patientinnen insgesamt. Mögliche Abweichungen entstehen, weil die Patientinnen für die UICC-Stadien nicht auswertbar sind (keine Angaben bzw. die TNM-Kombination kann keinem UICC-Stadium zugeordnet werden) und weil Patientinnen mit der Angabe ‚keine OP‘ nicht für die Kategorien IIIC und IV berücksichtigt wurden.

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	133	130	119	111	104	102	93	87	73	65	51			
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	31	30	30	29	29	27	24	24	20	18	11			
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	29	29	26	23	21	21	21	19	16	13	12			
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	14	14	12	11	10	10	10	10	8	8	6			
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	11	11	10	10	10	10	8	8	7	5	4			
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0			
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	110	102	98	91	85	79	72	67	54	46				
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	28	27	26	25	23	21	19	17	14	10				
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	20	18	18	15	14	13	12	12	8	7				
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	11	10	10	10	9	9	8	7	4	3				
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	12	11	11	10	10	10	9	7	5	5				
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1				
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	7	6	5	5	5	5	4	4	3	3				
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	125	123	117	114	105	98	82	75	65					
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	2	2	2	1	1	1	1					
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	38	38	36	35	30	28	24	22	20					
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	36	36	34	33	32	31	28	24	20					
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	15	14	13	13	12	11	7	7	6					
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	6	6	6	6	6	4	3	2					
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4	4	3	3	2	2	2	2					
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3	3	3						
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	93	91	87	82	70	64	57	50						
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4	3	1	1	0	0						
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	20	20	19	19	16	14	10	9						
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	24	24	24	22	22	19	19	17						
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	15	14	14	13	9	8	8	8						
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	9	9	7	7	7	7	6	3						
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2						
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	3	3	2	2	1	1	1	1						
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	3	2	2	2	1	1	1	0							
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	106	106	104	100	95	88	82							
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	2	2	2							
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	27	27	27	27	26	25	24							
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	25	25	25	24	22	20	18							
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	7	7	6	6	6	5	4							
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	10	10	10	10	10	10	10							
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4	3	3	3	3							
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	9	9	9	9	8	7	6							
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1	0	0								
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	55	55	54	54	51	46								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2	2	2	2	2								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	24	24	23	23	23	20								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	16	16	16	16	14	13								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	4	4	4	4	4	4								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	2	2	2	2	2	1								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1	1	1								
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	3	3	3	3	2	2									

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
		Anzahl															
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	70	70	69	67	65										
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3										
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	17	17	17	16	16										
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	16	16	15	15	14										
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	9	9	9	9	9										
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	7	7	7	7										
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0										
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1	1										
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	3	3	3	3	3										
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	85	84	79	73											
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1											
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	21	21	21	20											
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	20	20	18	17											
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	4	4	4	3											
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	6	6	5	3											
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	2	2											
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	7	6	5	5											
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4											
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	91	90	87												
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2	2												
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	30	30	28												
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	25	24	23												
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	10	10	10												
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5	5	5												
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2												
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2												
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2	2	2												
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	79	78													
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2													
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	29	29													
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	13	13													
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	15	15													
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	2	2													
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	6	5													
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2													
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2	2													
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	71														
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2														
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	24														
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	15														
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	10														
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5														
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1														
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4														
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	3														

Tabelle 4.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2004-2 mit 173 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. 152 von ihnen bzw. 87,86 Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	13	29	47	68	78	90	99	106	122	138	147	152	152	152	
		Anteil in %	7,51	16,76	27,17	39,31	45,09	52,02	57,23	61,27	70,52	79,77	84,97	87,86	87,86	87,86	
		CI Anteil in %	[3,57; 11,45]	[11,18; 22,35]	[20,52; 33,82]	[32,01; 46,61]	[37,65; 52,52]	[44,56; 59,49]	[49,83; 64,62]	[53,99; 68,55]	[63,71; 77,33]	[73,77; 85,77]	[79,63; 90,31]	[82,98; 92,74]	[82,98; 92,74]	[82,98; 92,74]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	5	10	12	13	14	14	16	16	16	16	16	16	
		Anteil in %	0,00	1,16	2,89	5,78	6,94	7,51	8,09	8,09	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	12	19	24	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
		Anteil in %	6,94	10,98	13,87	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Anteil in %	0,00	0,58	1,16	1,73	1,73	2,31	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	7	15	22	30	40	47	54	68	84	93	98	98	98	
		Anteil in %	0,58	4,05	8,67	12,72	17,34	23,12	27,17	31,21	39,31	48,55	53,76	56,65	56,65	56,65	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	173	160	144	126	105	95	83	74	67	51	35	26	21	21
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	160	144	126	105	95	83	74	67	51	35	26	21	21	21
2005-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	8	11	14	23	29	35	39	48	62	71	75	76	76		
		Anteil in %	8,99	12,36	15,73	25,84	32,58	39,33	43,82	53,93	69,66	79,78	84,27	85,39	85,39		
		CI Anteil in %	[3,01; 14,96]	[5,48; 19,24]	[8,12; 23,34]	[16,70; 34,99]	[22,79; 42,38]	[29,12; 49,53]	[33,45; 54,19]	[43,52; 64,35]	[60,06; 79,27]	[71,38; 88,17]	[76,66; 91,88]	[78,01; 92,77]	[78,01; 92,77]		
	davon wegen Tod	Anzahl	2	2	3	3	5	8	8	8	10	10	10	10	10		
		Anteil in %	2,25	2,25	3,37	3,37	5,62	8,99	8,99	8,99	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	6	6	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		Anteil in %	6,74	6,74	7,87	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12		
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	3	4	10	14	17	21	30	42	51	55	56	56		
		Anteil in %	0,00	3,37	4,49	11,24	15,73	19,10	23,60	33,71	47,19	57,30	61,80	62,92	62,92		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	89	81	78	75	66	60	54	50	41	27	18	14	13	
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	81	78	75	66	60	54	50	41	27	18	14	13	13	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2005-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	10	13	14	16	23	28	37	40	42	50	51			
		Anteil in %	4,55	15,15	19,70	21,21	24,24	34,85	42,42	56,06	60,61	63,64	75,76	77,27			
		CI Anteil in %	[0,00; 9,61]	[6,43; 23,87]	[10,03; 29,37]	[11,27; 31,15]	[13,82; 34,66]	[23,26; 46,43]	[30,41; 54,44]	[43,99; 68,13]	[48,73; 72,48]	[51,94; 75,33]	[65,34; 86,18]	[67,08; 87,46]			
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	2	3	3	4	7	7	7	7	7	8	9		
		Anteil in %	0,00	3,03	3,03	4,55	4,55	6,06	10,61	10,61	10,61	10,61	12,12	13,64			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		Anteil in %	0,00	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2			
		Anteil in %	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03			
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	2	5	5	7	12	14	23	26	28	35	35			
		Anteil in %	1,52	3,03	7,58	7,58	10,61	18,18	21,21	34,85	39,39	42,42	53,03	53,03			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		Anteil in %	1,52	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03			
	Pat. insges.:	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	66	63	56	53	52	50	43	38	29	26	24	16		
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	63	56	53	52	50	43	38	29	26	24	16	15			
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	14	22	29	31	40	46	60	68	82	88				
		Anteil in %	2,26	10,53	16,54	21,80	23,31	30,08	34,59	45,11	51,13	61,65	66,17				
		CI Anteil in %	[0,00; 4,79]	[5,29; 15,76]	[10,20; 22,88]	[14,76; 28,85]	[16,10; 30,52]	[22,25; 37,90]	[26,47; 42,70]	[36,62; 53,60]	[42,60; 59,66]	[53,36; 69,95]	[58,09; 74,24]				
	davon wegen Tod	Anzahl	1	4	7	9	9	12	12	12	13	14	15				
		Anteil in %	0,75	3,01	5,26	6,77	6,77	9,02	9,02	9,02	9,77	10,53	11,28				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6				
		Anteil in %	1,50	3,76	3,76	3,76	3,76	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	5	9	13	15	20	26	40	47	60	65				
		Anteil in %	0,00	3,76	6,77	9,77	11,28	15,04	19,55	30,08	35,34	45,11	48,87				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pat. insges.:	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	133	130	119	111	104	102	93	87	73	65	51			
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	130	119	111	104	102	93	87	73	65	51	45				
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	8	12	19	25	31	38	43	56	64	73					
		Anteil in %	7,27	10,91	17,27	22,73	28,18	34,55	39,09	50,91	58,18	66,36					
		CI Anteil in %	[2,40; 12,15]	[5,06; 16,76]	[10,18; 24,37]	[14,86; 30,59]	[19,74; 36,63]	[25,62; 43,47]	[29,93; 48,25]	[41,52; 60,29]	[48,92; 67,44]	[57,49; 75,23]					
	davon wegen Tod	Anzahl	1	2	5	7	10	13	13	17	18	18					
		Anteil in %	0,91	1,82	4,55	6,36	9,09	11,82	11,82	15,45	16,36	16,36					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
		Anteil in %	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,91	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64					
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	4	7	8	11	15	20	29	36	45					
		Anteil in %	0,91	3,64	6,36	7,27	10,00	13,64	18,18	26,36	32,73	40,91					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Pat. insges.:	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	110	102	98	91	85	79	72	67	54	46				
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	102	98	91	85	79	72	67	54	46	37					

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	8	11	20	27	43	50	60	70						
		Anteil in %	1,60	6,40	8,80	16,00	21,60	34,40	40,00	48,00	56,00						
		CI Anteil in %	[0,00; 3,81]	[2,09; 10,71]	[3,81; 13,79]	[9,55; 22,45]	[14,36; 28,84]	[26,04; 42,76]	[31,38; 48,62]	[39,21; 56,79]	[47,26; 64,74]						
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1	2	6	9	13	14	16	16						
		Anteil in %	0,80	0,80	1,60	4,80	7,20	10,40	11,20	12,80	12,80						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	3	5	5	5	5	5	5	5						
		Anteil in %	0,80	2,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	4	4	9	13	25	31	39	49						
		Anteil in %	0,00	3,20	3,20	7,20	10,40	20,00	24,80	31,20	39,20						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	125	123	117	114	105	98	82	75	65						
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	123	117	114	105	98	82	75	65	55						
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	6	11	23	29	36	43	46							
		Anteil in %	2,15	6,45	11,83	24,73	31,18	38,71	46,24	49,46							
		CI Anteil in %	[0,00; 5,11]	[1,43; 11,47]	[5,23; 18,43]	[15,91; 33,55]	[21,72; 40,65]	[28,76; 48,66]	[36,05; 56,42]	[39,25; 59,68]							
	davon wegen Tod	Anzahl	1	3	7	11	11	12	15	16							
		Anteil in %	1,08	3,23	7,53	11,83	11,83	12,90	16,13	17,20							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	1	1	1							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	3	3	3	3	5	5							
		Anteil in %	0,00	2,15	3,23	3,23	3,23	3,23	5,38	5,38							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	1	1	9	15	20	22	24							
		Anteil in %	1,08	1,08	1,08	9,68	16,13	21,51	23,66	25,81							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	93	91	87	82	70	64	57	50							
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	91	87	82	70	64	57	50	47							
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	2	6	11	18	24	32								
		Anteil in %	0,00	1,89	5,66	10,38	16,98	22,64	30,19								
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 4,49]	[1,24; 10,08]	[4,54; 16,21]	[9,80; 24,16]	[14,64; 30,65]	[21,41; 38,97]								
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	2	2	3	3	4								
		Anteil in %	0,00	0,00	1,89	1,89	2,83	2,83	3,77								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	0	2								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89								
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	2	4	9	15	21	26								
		Anteil in %	0,00	1,89	3,77	8,49	14,15	19,81	24,53								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0								
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	106	106	104	100	95	88	82								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	106	104	100	95	88	82	74								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	1	1	4	9	11									
		Anteil in %	0,00	1,82	1,82	7,27	16,36	20,00									
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 5,38]	[0,00; 5,38]	[0,35; 14,20]	[6,50; 26,23]	[9,33; 30,67]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	2	3	3									
		Anteil in %	0,00	1,82	1,82	3,64	5,45	5,45									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	1	1									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	2	5	7									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	3,64	9,09	12,73									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>51</i>	<i>46</i>									
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>55</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>51</i>	<i>46</i>	<i>44</i>									
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	1	3	5	11										
		Anteil in %	0,00	1,43	4,29	7,14	15,71										
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 4,23]	[0,00; 9,06]	[1,07; 13,22]	[7,13; 24,30]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	1	4										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	1,43	5,71										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	2	3										
		Anteil in %	0,00	1,43	2,86	2,86	4,29										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	1	2	4										
		Anteil in %	0,00	0,00	1,43	2,86	5,71										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0										
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>69</i>	<i>67</i>	<i>65</i>										
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>70</i>	<i>69</i>	<i>67</i>	<i>65</i>	<i>59</i>										
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	6	12	16											
		Anteil in %	1,18	7,06	14,12	18,82											
		CI Anteil in %	[0,00; 3,48]	[1,58; 12,54]	[6,67; 21,56]	[10,46; 27,18]											
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1	3	4											
		Anteil in %	1,18	1,18	3,53	4,71											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	1	1											
		Anteil in %	0,00	0,00	1,18	1,18											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	5	8	11											
		Anteil in %	0,00	5,88	9,41	12,94											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0											
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,00												
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>85</i>	<i>84</i>	<i>79</i>	<i>73</i>											
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>84</i>	<i>79</i>	<i>73</i>	<i>69</i>											

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	4	7												
		Anteil in %	1,10	4,40	7,69												
		CI Anteil in %	[0,00; 3,25]	[0,16; 8,63]	[2,19; 13,20]												
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	2	3												
		Anteil in %	1,10	2,20	3,30												
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	1	3												
Anteil in %		0,00	1,10	3,30													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1													
	Anteil %	0,00	1,10	1,10													
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	91	90	87												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	90	87	84												
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	5													
		Anteil in %	1,27	6,33													
		CI Anteil in %	[0,00; 3,75]	[0,93; 11,73]													
	davon wegen Tod	Anzahl	0	3													
		Anteil in %	0,00	3,80													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0													
		Anteil in %	0,00	0,00													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1													
		Anteil in %	1,27	1,27													
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	1													
Anteil in %		0,00	1,27														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0														
	Anteil %	0,00	0,00														
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	79	78													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	78	74													
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1														
		Anteil in %	1,41														
		CI Anteil in %	[0,00; 4,17]														
	davon wegen Tod	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1														
Anteil in %		1,41															
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0															
	Anteil %	0,00															
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	71														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	70														

In Tabelle 4.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 startete/starteten 173 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliche Alter betrug im Beitrittsjahr 64,02 Jahre, der Median lag bei 66,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 2	Beitrittsjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	64,02
	Median	66,00
	Fallbasis	173
2005-1	Mean	66,53
	Median	68,00
	Fallbasis	89
2005-2	Mean	64,73
	Median	67,00
	Fallbasis	66
2006-1	Mean	66,57
	Median	68,00
	Fallbasis	133
2006-2	Mean	64,15
	Median	68,00
	Fallbasis	110
2007-1	Mean	66,13
	Median	68,00
	Fallbasis	125
2007-2	Mean	69,54
	Median	72,00
	Fallbasis	93
2008-1	Mean	66,20
	Median	70,00
	Fallbasis	106
2008-2	Mean	64,89
	Median	68,00
	Fallbasis	55
2009-1	Mean	64,97
	Median	66,00
	Fallbasis	70
2009-2	Mean	68,67
	Median	73,00
	Fallbasis	85
2010-1	Mean	65,81
	Median	69,00
	Fallbasis	91
2010-2	Mean	67,24
	Median	69,00
	Fallbasis	79
2011-1	Mean	65,20
	Median	66,00
	Fallbasis	71

In Tabelle 4.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 lagen im Beitrittsjahr für 173 Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation betrug 62,24 Jahre, der Median lag bei 64,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	62,24
	Median	64,00
	Fallbasis	173
2005-1	Mean	64,35
	Median	65,00
	Fallbasis	89
2005-2	Mean	63,08
	Median	65,00
	Fallbasis	66
2006-1	Mean	64,46
	Median	66,00
	Fallbasis	133
2006-2	Mean	62,78
	Median	66,50
	Fallbasis	110
2007-1	Mean	64,03
	Median	66,00
	Fallbasis	125
2007-2	Mean	68,08
	Median	71,00
	Fallbasis	93
2008-1	Mean	64,26
	Median	68,00
	Fallbasis	106
2008-2	Mean	63,89
	Median	67,00
	Fallbasis	55
2009-1	Mean	63,50
	Median	65,00
	Fallbasis	70
2009-2	Mean	67,51
	Median	70,00
	Fallbasis	85
2010-1	Mean	64,21
	Median	67,00
	Fallbasis	91
2010-2	Mean	66,43
	Median	69,00
	Fallbasis	79
2011-1	Mean	63,92
	Median	64,00
	Fallbasis	71

In Tabelle 4.1.6 ist die **Altersverteilung bei Erstmanifestation** der Patientinnen nach Alterskategorien ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Die Altersverteilung bezieht sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zum Alter bei Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“).

In der Kohorte 2004-2 entfiel/entfielen im Beitrittsjahr 13 Patientin/Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2004-1	0-14	--
	15-34	--
	35-39	--
	40-44	--
	45-49	--
	50-54	--
	55-59	--
	60-64	--
	65-69	--
	70-74	--
	75-79	--
	80-84	--
	85 und älter	--
	zusammen	--
ohne benötigte Angaben	--	
2004-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	7
	40-44	9
	45-49	12
	50-54	13
	55-59	14
	60-64	32
	65-69	31
	70-74	21
	75-79	28
	80-84	3
	85 und älter	1
	zusammen	173
ohne benötigte Angaben	0	
2005-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	3
	40-44	1
	45-49	6
	50-54	7
	55-59	8
	60-64	17
	65-69	20
	70-74	12
	75-79	7
	80-84	6
	85 und älter	2
	zusammen	89
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2005-2	0-14	0
	15-34	1
	35-39	2
	40-44	3
	45-49	7
	50-54	6
	55-59	3
	60-64	9
	65-69	10
	70-74	10
	75-79	11
	80-84	4
	85 und älter	0
	zusammen	66
ohne benötigte Angaben	0	
2006-1	0-14	0
	15-34	2
	35-39	4
	40-44	8
	45-49	7
	50-54	10
	55-59	8
	60-64	18
	65-69	22
	70-74	25
	75-79	16
	80-84	7
	85 und älter	6
	zusammen	133
ohne benötigte Angaben	0	
2006-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	6
	40-44	7
	45-49	6
	50-54	5
	55-59	6
	60-64	16
	65-69	25
	70-74	20
	75-79	14
	80-84	2
	85 und älter	1
	zusammen	110
ohne benötigte Angaben	0	
2007-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	10
	45-49	7
	50-54	12
	55-59	10
	60-64	14
	65-69	24
	70-74	25
	75-79	19
	80-84	3
	85 und älter	1
	zusammen	125
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2007-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	2
	40-44	2
	45-49	5
	50-54	1
	55-59	6
	60-64	9
	65-69	17
	70-74	22
	75-79	22
	80-84	6
	85 und älter	1
	zusammen	93
ohne benötigte Angaben	0	
2008-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	3
	40-44	4
	45-49	7
	50-54	8
	55-59	8
	60-64	9
	65-69	25
	70-74	30
	75-79	9
	80-84	2
	85 und älter	1
	zusammen	106
ohne benötigte Angaben	0	
2008-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	4
	45-49	6
	50-54	3
	55-59	4
	60-64	3
	65-69	18
	70-74	10
	75-79	6
	80-84	0
	85 und älter	1
	zusammen	55
ohne benötigte Angaben	0	
2009-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	0
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	6
	55-59	12
	60-64	7
	65-69	12
	70-74	11
	75-79	10
	80-84	2
	85 und älter	1
	zusammen	70
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2009-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	3
	40-44	5
	45-49	5
	50-54	3
	55-59	3
	60-64	4
	65-69	18
	70-74	13
	75-79	19
	80-84	8
	85 und älter	4
	zusammen	85
ohne benötigte Angaben	0	
2010-1	0-14	0
	15-34	2
	35-39	1
	40-44	2
	45-49	3
	50-54	11
	55-59	10
	60-64	7
	65-69	23
	70-74	16
	75-79	12
	80-84	3
	85 und älter	1
	zusammen	91
ohne benötigte Angaben	0	
2010-2	0-14	0
	15-34	1
	35-39	0
	40-44	3
	45-49	6
	50-54	6
	55-59	6
	60-64	9
	65-69	11
	70-74	9
	75-79	16
	80-84	11
	85 und älter	1
	zusammen	79
ohne benötigte Angaben	0	
2011-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	1
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	6
	55-59	10
	60-64	10
	65-69	7
	70-74	12
	75-79	8
	80-84	6
	85 und älter	2
	zusammen	71
ohne benötigte Angaben	0	

In Tabelle 4.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,86 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 5,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 2		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,86
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>6543</i>

In Tabelle 4.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 2 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2004-2 sind im Durchschnitt 5,83 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 5,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 2	Halbjahre
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean
		Median
		Halbjahressumme

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 4.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2004-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres 21 Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei 15 von Ihnen bzw. 71,43 Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	173	160	144	126	105	95	83	74	67	51	35	26	21	21
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		44	24	15	10	17	14	18	23	24	19	20	15	15
		Anteil in %		27,50	16,67	11,90	9,52	17,89	16,87	24,32	34,33	47,06	54,29	76,92	71,43	71,43
		CI Anteil in %		[20,56; 34,44]	[10,56; 22,78]	[6,23; 17,58]	[3,88; 15,17]	[10,15; 25,64]	[8,76; 24,97]	[14,48; 34,17]	[22,87; 45,78]	[33,22; 60,89]	[37,54; 71,03]	[60,41; 93,44]	[51,63; 91,23]	[51,63; 91,23]
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	89	81	78	75	66	60	54	50	41	27	18	14	13	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		22	12	13	11	14	11	17	18	14	11	11		
		Anteil in %		27,16	15,38	17,33	16,67	23,33	20,37	34,00	43,90	51,85	61,11	78,57	84,62	
		CI Anteil in %		[17,41; 36,91]	[7,33; 23,44]	[8,71; 25,96]	[7,61; 25,73]	[12,54; 34,13]	[9,53; 31,21]	[20,74; 47,26]	[28,52; 59,28]	[32,65; 71,06]	[37,94; 84,29]	[56,27; 100,00]	[64,20; 100,00]	
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	66	63	56	53	52	50	43	38	29	26	24	16		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		16	11	9	13	19	15	16	12	14	16	15		
		Anteil in %		25,40	19,64	16,98	25,00	38,00	34,88	42,11	41,38	53,85	66,67	93,75		
		CI Anteil in %		[14,56; 36,23]	[9,14; 30,14]	[6,78; 27,19]	[13,12; 36,88]	[24,41; 51,59]	[20,47; 49,30]	[26,20; 58,01]	[23,14; 59,62]	[34,30; 73,39]	[47,40; 85,93]	[81,50; 100,00]		
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	133	130	119	111	104	102	93	87	73	65	51			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		32	26	31	30	36	35	44	36	38	37			
		Anteil in %		24,62	21,85	27,93	28,85	35,29	37,63	50,57	49,32	58,46	72,55			
		CI Anteil in %		[17,18; 32,05]	[14,39; 29,30]	[19,54; 36,31]	[20,10; 37,60]	[25,97; 44,61]	[27,73; 47,53]	[40,01; 61,14]	[37,77; 60,86]	[46,39; 70,53]	[60,18; 84,92]			
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	110	102	98	91	85	79	72	67	54	46				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		8	12	16	19	18	18	22	19	20				
		Anteil in %		7,84	12,24	17,58	22,35	22,78	25,00	32,84	35,19	43,48				
		CI Anteil in %		[2,60; 13,09]	[5,72; 18,77]	[9,72; 25,45]	[13,44; 31,26]	[13,48; 32,09]	[14,93; 35,07]	[21,51; 44,17]	[22,33; 48,04]	[28,99; 57,96]				
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	125	123	117	114	105	98	82	75	65					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		16	25	28	29	35	31	31	31					
		Anteil in %		13,01	21,37	24,56	27,62	35,71	37,80	41,33	47,69					
		CI Anteil in %		[7,04; 18,98]	[13,91; 28,83]	[16,62; 32,50]	[19,03; 36,21]	[26,18; 45,25]	[27,24; 48,36]	[30,11; 52,55]	[35,46; 59,93]					
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	93	91	87	82	70	64	57	50						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		12	11	24	16	22	17	11						
		Anteil in %		13,19	12,64	29,27	22,86	34,38	29,82	22,00						
		CI Anteil in %		[6,20; 20,18]	[5,62; 19,67]	[19,36; 39,18]	[12,95; 32,77]	[22,65; 46,10]	[17,84; 41,81]	[10,40; 33,60]						
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	106	106	104	100	95	88	82							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		15	26	22	23	26	33							
		Anteil in %		14,15	25,00	22,00	24,21	29,55	40,24							
		CI Anteil in %		[7,48; 20,82]	[16,64; 33,36]	[13,84; 30,16]	[15,55; 32,87]	[19,96; 39,13]	[29,56; 50,92]							
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	55	55	54	54	51	46								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		14	11	13	17	13								
		Anteil in %		25,45	20,37	24,07	33,33	28,26								
		CI Anteil in %		[13,84; 37,07]	[9,53; 31,21]	[12,56; 35,58]	[20,27; 46,40]	[15,10; 41,42]								
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	70	70	69	67	65									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		15	17	14	18									
		Anteil in %		21,43	24,64	20,90	27,69									
		CI Anteil in %		[11,75; 31,11]	[14,40; 34,88]	[11,09; 30,70]	[16,73; 38,66]									

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	85	84	79	73											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		21	18	22											
		Anteil in %			25,00	22,78	30,14										
		CI Anteil in %			[15,68; 34,32]	[13,48; 32,09]	[19,54; 40,74]										
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	91	90	87												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		13	14												
		Anteil in %			14,44	16,09											
		CI Anteil in %			[7,14; 21,75]	[8,33; 23,86]											
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	79	78													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		10													
		Anteil in %			12,82												
		CI Anteil in %			[5,35; 20,29]												
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	71														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															

Auswertungskapitel 5: Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 3)

5.1 Patientinnenzahlen und -merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeginn und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 5.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2004-2 insgesamt 7 Teilnehmer/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 0 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 3

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	7	6	6	5	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	
2005-1	Patientinnen insgesamt	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1		
2005-2	Patientinnen insgesamt	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2			
2006-1	Patientinnen insgesamt	12	12	12	12	11	10	9	7	7	6	6				
2006-2	Patientinnen insgesamt	9	9	8	5	5	4	4	4	4	3					
2007-1	Patientinnen insgesamt	8	8	8	8	8	7	7	7	7						
2007-2	Patientinnen insgesamt	3	3	3	3	3	2	2	1							
2008-1	Patientinnen insgesamt	6	5	3	3	3	2	2								
2008-2	Patientinnen insgesamt	5	5	5	5	4	4									
2009-1	Patientinnen insgesamt	2	2	2	2	2										
2009-2	Patientinnen insgesamt	2	2	2	2											
2010-1	Patientinnen insgesamt	2	2	2												
2010-2	Patientinnen insgesamt	4	4													
2011-1	Patientinnen insgesamt	4														

Tabelle 5.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittshalbjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2004-2 mit -- Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. -- von ihnen bzw. -- Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2005-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anzahl <i>am Ende des Halbjahres</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	0	0	1	2										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	8,33	16,67										
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 24,67]	[0,00; 38,69]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	1	1										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	1										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	12	12	12	12	11										
		Anzahl <i>am Ende des Halbjahres</i>	12	12	12	11	10										
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anzahl <i>am Ende des Halbjahres</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anzahl <i>am Ende des Halbjahres</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
		CI Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil %	--	--	--	--											
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--	--											
		CI Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil %	--	--	--	--											
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--	--											
		CI Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil %	--	--	--	--											
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--	--											
		CI Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil %	--	--	--	--											
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											

In Tabelle 5.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 startete/starteten - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 3	Beitrittsjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-1	Mean	68,25
	Median	73,50
	Fallbasis	12
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2011-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

In Tabelle 5.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 lagen im Beitrittsjahr für - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliches Alter bei Erstmanifestation betrug - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-1	Mean	63,50
	Median	69,00
	Fallbasis	12
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2011-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

In Tabelle 5.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 5,07 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,50.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 3		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	5,07
		Median	4,50
		<i>Halbjahressumme</i>	375

In Tabelle 5.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 3 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2004-2 sind im Durchschnitt - - Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 3	Halbjahre
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 7,67
		Median 9,00
		Halbjahressumme 92
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 5.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

In der Kohorte 2004-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres - - Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei - - von Ihnen bzw. - - Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Definitionsgemäß liegt im Beitritts-halbjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitritts-halbjahr darzustellen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	12	12	12	12	11	10									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		0	0	1	3	4									
		Anteil in %		0,00	0,00	8,33	27,27	40,00									
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 24,67]	[0,00; 54,88]	[7,99; 72,01]									
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--												
		Anteil in %	--	--												
		CI Anteil in %	--	--												
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--													
		Anteil in %	--													
		CI Anteil in %	--													

Auswertungskapitel 6: Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 4)

6.1 Patientinnenzahlen und -merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeginn und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 6.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre noch Programmteilnehmerinnen waren.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2004-2 insgesamt - - Teilnehmer/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 4

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005-1	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005-2	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-1	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt	5	5	5	3	2	2	2	2	1	1					
2007-1	Patientinnen insgesamt	7	7	7	6	6	6	6	5	4						
2007-2	Patientinnen insgesamt	2	2	2	2	2	2	2	2							
2008-1	Patientinnen insgesamt	7	7	7	7	7	6	6								
2008-2	Patientinnen insgesamt	3	3	3	3	3	3									
2009-1	Patientinnen insgesamt	3	3	3	2	2										
2009-2	Patientinnen insgesamt	4	3	3	3											
2010-1	Patientinnen insgesamt	4	4	4												
2010-2	Patientinnen insgesamt	3	3													
2011-1	Patientinnen insgesamt	4														

Tabelle 6.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittshalbjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2004-2 mit - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. - - von ihnen bzw. - - Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2005-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2005-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen Tod		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen Ausschluss		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen regelhafter Beendigung		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pat. insges.:		zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2		ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen Tod		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen Ausschluss		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon wegen regelhafter Beendigung		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pat. insges.:		zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
		CI Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--	--											
	<i>Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--											
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--												
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
		CI Anteil in %	--	--	--												
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--												
		Anteil in %	--	--	--												
	<i>Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--												
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--												
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
		CI Anteil in %	--	--													
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--													
		Anteil in %	--	--													
	<i>Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--													
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--													
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
		CI Anteil in %	--														
	davon wegen Tod	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	<i>Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--														
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--														

In Tabelle 6.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 startete/starteten - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 4	Beitrittsjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2011-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

In Tabelle 6.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 lagen im Beitrittsjahr für - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliches Alter bei Erstmanifestation betrug - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2005-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2011-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

In Tabelle 6.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,02 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 4		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,02
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>169</i>

In Tabelle 6.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 4 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2004-2 sind im Durchschnitt - - Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 4	Halbjahre
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 6.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2004-2 war/waren zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres - - Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei - - von Ihnen bzw. - - Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--												
		Anteil in %	--	--												
		CI Anteil in %	--	--												
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--													
		Anteil in %	--													
		CI Anteil in %	--													

Auswertungskapitel 7: Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 5)

7.1 Patientinnenzahlen und -merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programm-eintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 7.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitritts-halbjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2004-2 insgesamt 16 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 5 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 5

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	16	14	13	12	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2005-1	Patientinnen insgesamt	18	15	12	10	9	8	7	6	6	6	6	6	6		
2005-2	Patientinnen insgesamt	14	12	9	9	9	9	8	8	8	7	7	7			
2006-1	Patientinnen insgesamt	16	16	13	11	10	8	7	7	6	6	5				
2006-2	Patientinnen insgesamt	9	6	6	5	5	5	3	3	3	3					
2007-1	Patientinnen insgesamt	15	15	14	10	10	10	10	8	8						
2007-2	Patientinnen insgesamt	7	6	4	4	3	3	3	3							
2008-1	Patientinnen insgesamt	10	7	7	7	7	7	7								
2008-2	Patientinnen insgesamt	5	5	5	5	5	4									
2009-1	Patientinnen insgesamt	5	5	5	5	4										
2009-2	Patientinnen insgesamt	4	3	2	2											
2010-1	Patientinnen insgesamt	6	5	4												
2010-2	Patientinnen insgesamt	6	6													
2011-1	Patientinnen insgesamt	7														

Tabelle 7.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitritts-halbjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2004-2 mit 16 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. von ihnen bzw. Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	3	4												
		Anteil in %	12,50	18,75	25,00												
		CI Anteil in %	[0,00; 29,24]	[0,00; 38,50]	[3,09; 46,91]												
	davon wegen Tod	Anzahl	2	3	4												
		Anteil in %	12,50	18,75	25,00												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0												
		Anteil %	0,00	0,00	0,00												
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	16	14	13												
Anzahl		14	13	12													
2005-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	6	8												
		Anteil in %	16,67	33,33	44,44												
		CI Anteil in %	[0,00; 34,38]	[10,92; 55,74]	[20,82; 68,07]												
	davon wegen Tod	Anzahl	2	4	6												
		Anteil in %	11,11	22,22	33,33												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1	1	1												
		Anteil in %	5,56	5,56	5,56												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0												
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1												
		Anteil %	0,00	5,56	5,56												
	Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	18	15	12												
Anzahl		15	12	10													

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2005-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2														
		Anteil in %	14,29														
		CI Anteil in %	[0,00; 33,31]														
	davon wegen Tod	Anzahl	1														
		Anteil in %	7,14														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1														
		Anteil in %	7,14														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0														
		Anteil in %	0,00														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0														
		Anteil %	0,00														
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	14														
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	12														
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	3	5	6											
		Anteil in %	0,00	18,75	31,25	37,50											
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 38,50]	[7,79; 54,71]	[13,00; 62,00]											
	davon wegen Tod	Anzahl	0	3	5	6											
		Anteil in %	0,00	18,75	31,25	37,50											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0											
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00											
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	16	16	13	11											
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	16	13	11	10											
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	1	5	5	5	5									
		Anteil in %	0,00	6,67	33,33	33,33	33,33	33,33									
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 19,73]	[8,64; 58,03]	[8,64; 58,03]	[8,64; 58,03]	[8,64; 58,03]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	5	5	5	5									
		Anteil in %	0,00	6,67	33,33	33,33	33,33	33,33									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>									
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>									
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	davon wegen Tod	Anzahl															
		Anteil in %															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl															
		Anteil in %															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl															
		Anteil in %															
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl															
		Anteil in %															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl															
		Anteil in %															
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>															
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>															
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--									
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--									
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--									
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--									
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--									
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--									
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--									
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--									
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--									
<i>Pat. insges.:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>									
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>									

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
		CI Anteil in %	--														
	davon wegen Tod	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--														
		Anteil in %	--														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--														
		Anteil %	--														
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--													
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--														

In Tabelle 7.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 startete/starteten 16 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr 64,19 Jahre, der Median lag bei 67,50 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 5	Beitrittsjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	64,19
	Median	67,50
	Fallbasis	16
2005-1	Mean	64,67
	Median	67,00
	Fallbasis	18
2005-2	Mean	71,93
	Median	72,00
	Fallbasis	14
2006-1	Mean	67,31
	Median	71,00
	Fallbasis	16
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	69,87
	Median	71,00
	Fallbasis	15
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	63,50
	Median	65,50
	Fallbasis	10
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2011-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

In Tabelle 7.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2004-2 lagen im Beitrittsjahr für 16 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliches Alter bei Erstmanifestation betrug 61,63 Jahre, der Median lag bei 63,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr
2004-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2004-2	Mean	61,63
	Median	63,00
	Fallbasis	16
2005-1	Mean	61,22
	Median	60,50
	Fallbasis	18
2005-2	Mean	68,62
	Median	68,00
	Fallbasis	13
2006-1	Mean	62,38
	Median	61,00
	Fallbasis	16
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	62,75
	Median	64,50
	Fallbasis	12
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	
	Median	
	Fallbasis	
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2011-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

In Tabelle 7.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,54 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 3,50.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung.

Tabelle 7.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 5		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,54
		Median	3,50
		<i>Halbjahressumme</i>	627

In Tabelle 7.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 5 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2004-2 sind im Durchschnitt 5,69 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 3,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung.

Tabelle 7.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 5	Halbjahre
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,69
		Median 3,00
		Halbjahressumme 91
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,39
		Median 3,50
		Halbjahressumme 97
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 6,64
		Median 9,50
		Halbjahressumme 93
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,56
		Median 4,50
		Halbjahressumme 89
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,67
		Median 8,00
		Halbjahressumme 85
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 4,20
		Median 6,00
		Halbjahressumme 42
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean --
		Median --
		Halbjahressumme --

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 7.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag. Diese Patientinnen wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2004-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei von Ihnen bzw. Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung.

Tabelle 7.1.11 Patientinnen ohne medizinischen Dokumentationsbogen im Halbjahr, Auswertungsgruppe 5

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	16	14	13	12										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		5	6	6										
		Anteil in %		35,71	46,15	50,00										
		CI Anteil in %		[9,67; 61,76]	[17,95; 74,36]	[20,45; 79,55]										
2005-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	18	15	12	10										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6	3	2										
		Anteil in %		40,00	25,00	20,00										
		CI Anteil in %		[14,34; 65,66]	[0,00; 50,59]	[0,00; 46,13]										
2005-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	14	12												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		5												
		Anteil in %		41,67												
		CI Anteil in %		[12,53; 70,80]												
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	16	16	13	11	10									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		5	6	7	4									
		Anteil in %		31,25	46,15	63,64	40,00									
		CI Anteil in %		[7,79; 54,71]	[17,95; 74,36]	[33,82; 93,45]	[7,99; 72,01]									
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	15	15	14	10	10	10	10							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		7	4	1	2	4	5							
		Anteil in %		46,67	28,57	10,00	20,00	40,00	50,00							
		CI Anteil in %		[20,53; 72,80]	[4,01; 53,13]	[0,00; 29,60]	[0,00; 46,13]	[7,99; 72,01]	[17,33; 82,67]							
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	10													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl														
		Anteil in %														
		CI Anteil in %														
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--											
		Anteil in %	--	--	--											
		CI Anteil in %	--	--	--											
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--												
		Anteil in %	--	--												
		CI Anteil in %	--	--												
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--													
		Anteil in %	--													
		CI Anteil in %	--													

Auswertungskapitel 8: Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 und 2

Im Kapitel 3.3 des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden tabellarische Auswertungen zu Überlebenszeiten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf eine Subkohorte von Patientinnen.

Im folgenden Kapitel 8 werden diese Auswertungen gemeinsam für die Subkohorte der **Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)** und die Subkohorte der **Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)** vorgenommen. Für die Gruppe dieser Patientinnen durften zudem in der Erstdokumentation keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen in den vorherigen Kapiteln und den Auswertungen im folgenden Kapitel 8 zu erleichtern, erfolgt die Nummerierung im Kapitel 8 analog zur Nummerierung in Kapitel 3.3.

8.3 Überlebenszeiten der Auswertungsgruppen 1 und 2

In Kapitel 8.3 sind **kumulierte „Überlebensraten“ nach Kaplan-Meier** für die Gesamtheit der Patientinnen aus den Auswertungsgruppen 1 und 2 ausgewiesen. Einbezogen sind also sowohl die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) als auch die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2). Diese kumulierten „Überlebensraten“ geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass Patientinnen bis zum jeweiligen Halbjahr überleben.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 und 2 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In Tabelle 8.3.1 ist die kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier ausgewiesen. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 35 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 und 2 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah bzw. nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 84,01 Prozent.

Tabelle 8.3.1 Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	255	213	192	172	148	137	123	113	103	87	70	56	35	35	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	3	4	6	3	2	2	2	2	0	1	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	1,41	2,08	3,49	2,03	1,46	1,63	1,77	1,94	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,59	96,54	93,17	91,28	89,95	88,49	86,92	85,23	85,23	84,01	84,01	84,01	84,01	84,01
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[97,01; 100,00]	[94,02; 99,06]	[89,57; 96,77]	[87,17; 95,39]	[85,50; 94,40]	[83,68; 93,30]	[81,73; 92,11]	[79,63; 90,83]	[79,63; 90,83]	[78,01; 90,01]	[78,01; 90,01]	[78,01; 90,01]	[78,01; 90,01]	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	174	149	145	137	125	119	112	107	95	80	71	62	35		
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	4	0	4	0	2	4	0	3	3	0	0	0	0		
		Anteil in %	2,30	0,00	2,76	0,00	1,60	3,36	0,00	2,80	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,70	97,70	95,01	95,01	93,49	90,34	90,34	87,81	85,04	85,04	85,04	85,04	85,04	85,04	
		CI Rate in %	[95,47; 99,93]	[95,47; 99,93]	[91,62; 98,40]	[91,62; 98,40]	[89,56; 97,42]	[85,48; 95,20]	[85,48; 95,20]	[82,31; 93,31]	[78,88; 91,20]	[78,88; 91,20]	[78,88; 91,20]	[78,88; 91,20]	[78,88; 91,20]		
2005-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	161	153	137	133	129	125	117	110	101	97	95	82			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	3	1	3	2	2	5	0	1	0	2	3			
		Anteil in %	1,24	1,96	0,73	2,26	1,55	1,60	4,27	0,00	0,99	0,00	2,11	3,66			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,76	96,82	96,11	93,95	92,49	91,01	87,12	87,12	86,26	86,26	84,44	81,35			
		CI Rate in %	[97,05; 100,00]	[94,08; 99,56]	[93,06; 99,16]	[90,11; 97,79]	[88,21; 96,77]	[86,33; 95,69]	[81,54; 92,70]	[81,54; 92,70]	[80,48; 92,04]	[80,48; 92,04]	[78,26; 90,62]	[74,48; 88,22]			
2006-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	238	231	210	200	192	186	175	168	153	144	129				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	6	5	2	1	4	1	1	2	2	2				
		Anteil in %	0,84	2,60	2,38	1,00	0,52	2,15	0,57	0,60	1,31	1,39	1,55				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	99,16	96,58	94,28	93,34	92,86	90,86	90,34	89,80	88,63	87,40	86,04				
		CI Rate in %	[98,00; 100,00]	[94,25; 98,91]	[91,26; 97,30]	[90,08; 96,60]	[89,48; 96,24]	[87,03; 94,69]	[86,40; 94,28]	[85,74; 93,86]	[84,31; 92,95]	[82,82; 91,98]	[81,16; 90,92]				
2006-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	206	193	186	158	149	140	131	125	112	103					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	3	4	6	2	6	5	1	4	1	2					
		Anteil in %	1,46	2,07	3,23	1,27	4,03	3,57	0,76	3,20	0,89	1,94					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,54	96,50	93,39	92,21	88,49	85,33	84,68	81,97	81,24	79,66					
		CI Rate in %	[96,90; 100,00]	[93,95; 99,05]	[89,91; 96,87]	[88,41; 96,01]	[83,83; 93,15]	[80,07; 90,59]	[79,31; 90,05]	[76,15; 87,79]	[75,30; 87,18]	[73,45; 85,87]					
2007-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	254	249	238	215	205	196	178	171	158						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	4	3	3	5	5	6	1	4	2						
		Anteil in %	1,57	1,20	1,26	2,33	2,44	3,06	0,56	2,34	1,27						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,43	97,24	96,01	93,78	91,49	88,69	88,19	86,13	85,04						
		CI Rate in %	[96,90; 99,96]	[95,22; 99,26]	[93,59; 98,43]	[90,72; 96,84]	[87,91; 95,07]	[84,58; 92,80]	[83,99; 92,39]	[81,56; 90,70]	[80,29; 89,79]						

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	215	211	206	196	177	169	161	153								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	2	8	10	2	2	4	1								
		Anteil in %	0,93	0,95	3,88	5,10	1,13	1,18	2,48	0,65								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	99,07	98,13	94,32	89,51	88,50	87,45	85,28	84,72								
		CI Rate in %	[97,79; 100,00]	[96,32; 99,94]	[91,20; 97,44]	[85,36; 93,66]	[84,17; 92,83]	[82,93; 91,97]	[80,40; 90,16]	[79,75; 89,69]								
2008-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	226	223	216	211	203	193	185									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	3	5	3	3	4	2	1									
		Anteil in %	1,33	2,24	1,39	1,42	1,97	1,04	0,54									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,67	96,46	95,12	93,77	91,92	90,97	90,48									
		CI Rate in %	[97,18; 100,00]	[94,05; 98,87]	[92,31; 97,93]	[90,61; 96,93]	[88,34; 95,50]	[87,19; 94,75]	[86,60; 94,36]									
2008-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	181	178	169	167	163	155										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	8	2	2	3	1										
		Anteil in %	1,10	4,49	1,18	1,20	1,84	0,65										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,90	94,45	93,33	92,21	90,52	89,93										
		CI Rate in %	[97,38; 100,00]	[91,11; 97,79]	[89,69; 96,97]	[88,29; 96,13]	[86,23; 94,81]	[85,52; 94,34]										
2009-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	200	199	198	194	191											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	1	4											
		Anteil in %	0,00	0,00	0,51	0,52	2,09											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	99,49	98,98	96,91											
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[98,50; 100,00]	[97,58; 100,00]	[94,48; 99,34]											
2009-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	218	215	206	195												
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	3	2	7	4												
		Anteil in %	1,38	0,93	3,40	2,05												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,62	97,71	94,39	92,45												
		CI Rate in %	[97,07; 100,00]	[95,72; 99,70]	[91,30; 97,48]	[88,89; 96,01]												
2010-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	210	205	202													
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	3	0	3													
		Anteil in %	1,43	0,00	1,49													
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,57	98,57	97,11													
		CI Rate in %	[96,97; 100,00]	[96,97; 100,00]	[94,83; 99,39]													
2010-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	193	189														
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	4														
		Anteil in %	1,04	2,12														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	98,96	96,87														
		CI Rate in %	[97,53; 100,00]	[94,40; 99,34]														
2011-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	173															
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0															
		Anteil in %	0,00															
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00															
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]															

In Tabelle 8.3.2 ist die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gesamtheit der Patientinnen aus den Auswertungsgruppen 1 und 2 ausgewiesen. Einbezogen sind also sowohl die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) als auch die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2). Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 und 2 ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im

jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppen 1 und 2 dies jeweils entspricht.²¹

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 35 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 und 2 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah bzw. nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. Bei 1 von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 83,38 Prozent.

Tabelle 8.3.2 Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr
2004-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	255	213	192	172	148	137	123	113	103	87	70	56	35	35
	auswertbar	Anzahl		160	158	152	130	112	98	87	72	54	37	16	7	6
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		157	151	145	125	105	90	78	62	44	29	10	2	1
		Anteil in %		98,13	95,57	95,39	96,15	93,75	91,84	89,66	86,11	81,48	78,38	62,50	28,57	16,67
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		3	4	4	0	3	3	2	1	1	0	0	0	0
		Anteil in %		1,88	2,53	2,63	0,00	2,68	3,06	2,30	1,39	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,48	96,26	93,76	93,76	91,31	88,63	86,47	85,19	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38
	CI Anteil in %		[96,78; 100,00]	[93,54; 98,98]	[90,17; 97,35]	[90,17; 97,35]	[86,87; 95,75]	[83,39; 93,87]	[80,56; 92,38]	[78,86; 91,52]	[76,26; 90,50]	[76,26; 90,50]	[76,26; 90,50]	[76,26; 90,50]	[76,26; 90,50]	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	174	149	145	137	125	119	112	107	95	80	71	62	35	
	auswertbar	Anzahl		98	111	105	95	86	82	76	61	53	42	23	4	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		94	107	99	88	81	79	70	56	49	39	19	0	
		Anteil in %		95,92	96,40	94,29	92,63	94,19	96,34	92,11	91,80	92,45	92,86	82,61	0,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		4	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		4,08	0,00	2,86	1,05	0,00	1,22	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	96,92	96,92	94,33	93,36	93,36	92,25	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	
	CI Anteil in %		[93,95; 99,89]	[93,95; 99,89]	[90,24; 98,42]	[88,90; 97,82]	[88,90; 97,82]	[87,34; 97,16]	[85,49; 96,41]	[85,49; 96,41]	[85,49; 96,41]	[85,49; 96,41]	[85,49; 96,41]	[85,49; 96,41]		
2005-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	161	153	137	133	129	125	117	110	101	97	95	82		
	auswertbar	Anzahl		96	89	95	87	82	74	59	59	53	46	18		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		90	80	84	76	74	66	55	55	48	42	15		
		Anteil in %		93,75	89,89	88,42	87,36	90,24	89,19	93,22	93,22	90,57	91,30	83,33		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		6	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0		
		Anteil in %		6,25	3,37	2,11	1,15	1,22	0,00	0,00	1,69	1,89	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	94,74	91,89	89,92	88,88	87,73	87,73	87,73	86,24	84,55	84,55	84,55		
	CI Anteil in %		[90,64; 98,84]	[86,81; 96,97]	[84,26; 95,58]	[82,93; 94,83]	[81,44; 94,02]	[81,44; 94,02]	[81,44; 94,02]	[79,42; 93,06]	[77,10; 92,00]	[77,10; 92,00]	[77,10; 92,00]			

²¹ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	238	231	210	200	192	186	175	168	153	144	129			
	auswertbar	Anzahl		146	147	127	121	113	99	81	75	62	47			
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		141	140	118	111	102	90	72	66	54	40			
		Anteil in %		96,58	95,24	92,91	91,74	90,27	90,91	88,89	88,00	87,10	85,11			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		5	2	3	2	1	1	2	1	0	1			
		Anteil in %		3,42	1,36	2,36	1,65	0,88	1,01	2,47	1,33	0,00	2,13			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,09	95,82	93,73	92,21	91,35	90,40	88,17	86,85	86,85	84,63			
		CI Anteil in %		[94,58; 99,60]	[92,79; 98,85]	[89,95; 97,51]	[87,95; 96,47]	[86,80; 95,90]	[85,53; 95,27]	[82,53; 93,81]	[80,73; 92,97]	[80,73; 92,97]	[77,27; 91,99]			
2006-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	206	193	186	158	149	140	131	125	112	103				
	auswertbar	Anzahl		157	145	136	127	115	106	101	85	76				
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		150	138	127	117	105	97	92	75	68				
		Anteil in %		95,54	95,17	93,38	92,13	91,30	91,51	91,09	88,24	89,47				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		7	2	3	3	1	2	1	2	0				
		Anteil in %		4,46	1,38	2,21	2,36	0,87	1,89	0,99	2,35	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,88	94,64	92,62	90,42	89,64	87,96	87,04	84,89	84,89				
		CI Anteil in %		[92,89; 98,87]	[91,23; 98,05]	[88,59; 96,65]	[85,78; 95,06]	[84,79; 94,49]	[82,68; 93,24]	[81,51; 92,57]	[78,75; 91,03]	[78,75; 91,03]				
2007-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	254	249	238	215	205	196	178	171	158					
	auswertbar	Anzahl		192	174	165	147	133	116	110	93					
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		190	167	155	137	123	107	100	85					
		Anteil in %		98,96	95,98	93,94	93,20	92,48	92,24	90,91	91,40					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2	5	4	1	2	0	2	1					
		Anteil in %		1,04	2,87	2,42	0,68	1,50	0,00	1,82	1,08					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	99,04	96,42	94,10	93,47	92,10	92,10	90,41	89,36					
		CI Anteil in %		[97,72; 100,00]	[93,81; 99,03]	[90,71; 97,49]	[89,88; 97,06]	[88,09; 96,11]	[88,09; 96,11]	[85,84; 94,98]	[84,40; 94,32]					
2007-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	215	211	206	196	177	169	161	153						
	auswertbar	Anzahl		146	157	131	119	103	102	92						
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		141	153	124	111	95	94	85						
		Anteil in %		96,58	97,45	94,66	93,28	92,23	92,16	92,39						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		5	2	5	1	0	1	0						
		Anteil in %		3,42	1,27	3,82	0,84	0,00	0,98	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,14	95,97	92,52	91,74	91,74	90,82	90,82						
		CI Anteil in %		[94,67; 99,61]	[93,05; 98,89]	[88,42; 96,62]	[87,41; 96,07]	[87,41; 96,07]	[86,16; 95,48]	[86,16; 95,48]						
2008-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	226	223	216	211	203	193	185							
	auswertbar	Anzahl		174	158	156	149	130	113							
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		167	153	151	141	122	104							
		Anteil in %		95,98	96,84	96,79	94,63	93,85	92,04							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		7	0	2	3	1	3							
		Anteil in %		4,02	0,00	1,28	2,01	0,77	2,65							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	96,43	96,43	95,25	93,35	92,62	90,03							
		CI Anteil in %		[93,83; 99,03]	[93,83; 99,03]	[92,21; 98,29]	[89,69; 97,01]	[88,72; 96,52]	[85,26; 94,80]							
2008-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	181	178	169	167	163	155								
	auswertbar	Anzahl		128	122	120	110	97								
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		124	117	113	103	91								
		Anteil in %		96,88	95,90	94,17	93,64	93,81								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		4	1	2	2	2								
		Anteil in %		3,13	0,82	1,67	1,82	2,06								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,04	96,27	94,69	92,92	90,90								
		CI Anteil in %		[94,18; 99,90]	[93,06; 99,48]	[90,86; 98,52]	[88,44; 97,40]	[85,72; 96,08]								

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	200	199	198	194	191									
	auswertbar	Anzahl		146	150	147	140									
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		144	146	140	135									
		Anteil in %		98,63	97,33	95,24	96,43									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2	2	3	0									
		Anteil in %		1,37	1,33	2,04	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,80	97,57	95,63	95,63									
	CI Anteil in %		[97,15; 100,00]	[95,21; 99,93]	[92,46; 98,80]	[92,46; 98,80]										
2009-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	218	215	206	195										
	auswertbar	Anzahl		167	163	146										
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		162	160	143										
		Anteil in %		97,01	98,16	97,95										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		5	1	1										
		Anteil in %		2,99	0,61	0,68										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,22	96,63	95,94										
	CI Anteil in %		[94,82; 99,62]	[93,98; 99,28]	[92,99; 98,89]											
2010-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	210	205	202											
	auswertbar	Anzahl		166	158											
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		161	152											
		Anteil in %		96,99	96,20											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		5	2											
		Anteil in %		3,01	1,27											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,14	95,87											
	CI Anteil in %		[94,67; 99,61]	[92,87; 98,87]												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	193	189												
	auswertbar	Anzahl		148												
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		145												
		Anteil in %		97,97												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		3												
		Anteil in %		2,03												
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,93												
	CI Anteil in %		[95,61; 100,00]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	173													
	auswertbar	Anzahl														
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl														
		Anteil in %														
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00													
	CI Anteil in %															

In Tabelle 8.3.3 sind die **Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert)** für die Gesamtheit der Patientinnen aus den Auswertungsgruppen 1 und 2 ausgewiesen. Einbezogen sind also sowohl die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) als auch die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2). Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Für die Auswertung sind alle Inzidenzen ab dem 1. Folgehalbjahr zu zählen. Für alle Kohorten und Berichtshalbjahre wird zunächst die Zahl der im Programm verbliebenen Patientinnen ausgewiesen. Anschließend wird dargestellt, wie viele der auswertbaren Patientinnen im Berichtshalbjahr von Rezidiven bzw. Metastasen betroffen waren. Darüber hinaus werden die entsprechenden Anteilswerte dargestellt. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Summe der Patientinnen aus den beiden zuletzt ausgewiesenen Kategorien (mit Rezidiv/kontralateralem Tumor, mit Metastasen) in der Regel

nicht der Anzahl der auswertbaren Patientinnen entspricht, da eine Doppelzuordnung von Patientinnen auf die beiden Kategorien möglich ist.

In der Kohorte 2004-2 war/waren im letzten Halbjahr 255 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 und 2 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah bzw. nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. Die kumulierte Anzahl für bis einschließlich dieses letzten Berichtshalbjahres neu aufgetretene lokoregionäre Rezidive oder kontralaterale Tumore lag bei 13. Der kumulierte Anteil bezogen auf die Patientinnen zum Beitritts halbjahr lag bei 5,10 Prozent.

Tabelle 8.3.3 Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
		Anteil in %		0,39	1,57	2,35	2,35	2,35	2,75	3,14	3,53	3,92	4,31	4,71	5,10	5,10	5,10
		CI Anteil in %		[0,00; 1,16]	[0,04; 3,10]	[0,49; 4,22]	[0,49; 4,22]	[0,49; 4,22]	[0,74; 4,75]	[0,99; 5,28]	[1,26; 5,80]	[1,53; 6,31]	[1,82; 6,81]	[2,10; 7,31]	[2,39; 7,80]	[2,39; 7,80]	[2,39; 7,80]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		2	7	10	11	14	19	23	23	23	23	23	23	23	23
		Anteil in %		0,78	2,75	3,92	4,31	5,49	7,45	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
CI Anteil in %			[0,00; 1,87]	[0,74; 4,75]	[1,53; 6,31]	[1,82; 6,81]	[2,69; 8,29]	[4,22; 10,68]	[5,50; 12,54]	[5,50; 12,54]	[5,50; 12,54]	[5,50; 12,54]	[5,50; 12,54]	[5,50; 12,54]	[5,50; 12,54]	[5,50; 12,54]	
2005-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Anteil in %		0,57	1,15	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
		CI Anteil in %		[0,00; 1,70]	[0,00; 2,74]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]	[0,00; 3,66]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	6	10	12	12	13	15	16	17	18	20	21	21	21
		Anteil in %		1,72	3,45	5,75	6,90	6,90	7,47	8,62	9,20	9,77	10,34	11,49	12,07	12,07	12,07
CI Anteil in %			[0,00; 3,66]	[0,73; 6,17]	[2,28; 9,22]	[3,12; 10,67]	[3,12; 10,67]	[3,55; 11,39]	[4,44; 12,80]	[4,89; 13,50]	[5,35; 14,19]	[5,81; 14,88]	[6,74; 16,25]	[7,21; 16,92]	[7,21; 16,92]	[7,21; 16,92]	
2005-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Anteil in %		0,62	1,24	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
		CI Anteil in %		[0,00; 1,84]	[0,00; 2,96]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]	[0,42; 5,79]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		5	7	10	13	14	15	16	17	19	21	21	21	21	21
		Anteil in %		3,11	4,35	6,21	8,07	8,70	9,32	9,94	10,56	11,80	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04
CI Anteil in %			[0,42; 5,79]	[1,19; 7,51]	[2,47; 9,95]	[3,85; 12,30]	[4,33; 13,06]	[4,81; 13,82]	[5,30; 14,57]	[5,80; 15,32]	[6,80; 16,80]	[7,83; 18,26]	[7,83; 18,26]	[7,83; 18,26]	[7,83; 18,26]		
2006-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	3	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7
		Anteil in %		0,00	0,00	0,42	1,26	1,68	2,52	2,52	2,52	2,52	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,24]	[0,00; 2,68]	[0,04; 3,32]	[0,53; 4,52]	[0,53; 4,52]	[0,53; 4,52]	[0,53; 4,52]	[0,53; 4,52]	[0,79; 5,09]	[0,79; 5,09]	[0,79; 5,09]	[0,79; 5,09]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		5	11	14	17	20	23	25	27	29	31	31	31	31	31
		Anteil in %		2,10	4,62	5,88	7,14	8,40	9,66	10,50	11,34	12,18	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
CI Anteil in %			[0,27; 3,93]	[1,95; 7,29]	[2,89; 8,88]	[3,86; 10,42]	[4,87; 11,94]	[5,90; 13,43]	[6,60; 14,41]	[7,31; 15,38]	[8,02; 16,35]	[8,74; 17,31]	[8,74; 17,31]	[8,74; 17,31]	[8,74; 17,31]	[8,74; 17,31]	

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	206	206	206	206	206	206	206	206	206						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		2	4	6	6	6	7	7	7	7					
		Anteil in %			0,97	1,94	2,91	2,91	2,91	3,40	3,40	3,40	3,40				
		CI Anteil in %			[0,00; 2,31]	[0,05; 3,83]	[0,61; 5,21]	[0,61; 5,21]	[0,61; 5,21]	[0,92; 5,88]	[0,92; 5,88]	[0,92; 5,88]	[0,92; 5,88]				
	mit Metastasierung bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		5	8	11	15	19	20	22	24	27					
		Anteil in %			2,43	3,88	5,34	7,28	9,22	9,71	10,68	11,65	13,11				
CI Anteil in %				[0,32; 4,53]	[1,24; 6,53]	[2,26; 8,42]	[3,72; 10,84]	[5,26; 13,18]	[5,66; 13,76]	[6,45; 14,91]	[7,26; 16,04]	[8,49; 17,73]					
2007-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	254	254	254	254	254	254	254	254	254						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		0	3	5	10	11	12	12	12	12					
		Anteil in %			0,00	1,18	1,97	3,94	4,33	4,72	4,72	4,72					
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 2,51]	[0,26; 3,68]	[1,54; 6,33]	[1,82; 6,84]	[2,11; 7,34]	[2,11; 7,34]	[2,11; 7,34]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		2	6	8	12	14	19	23	26	26					
		Anteil in %			0,79	2,36	3,15	4,72	5,51	7,48	9,06	10,24					
CI Anteil in %				[0,00; 1,88]	[0,49; 4,23]	[1,00; 5,30]	[2,11; 7,34]	[2,70; 8,32]	[4,24; 10,72]	[5,52; 12,59]	[6,50; 13,97]						
2007-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	215	215	215	215	215	215	215	215	215						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		2	3	5	6	7	8	8	8	8					
		Anteil in %			0,93	1,40	2,33	2,79	3,26	3,72	3,72	3,72					
		CI Anteil in %			[0,00; 2,22]	[0,00; 2,97]	[0,31; 4,34]	[0,58; 5,00]	[0,88; 5,63]	[1,18; 6,26]	[1,18; 6,26]	[1,18; 6,26]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		3	6	10	14	16	17	18	18	18					
		Anteil in %			1,40	2,79	4,65	6,51	7,44	7,91	8,37	8,37					
CI Anteil in %				[0,00; 2,97]	[0,58; 5,00]	[1,83; 7,47]	[3,21; 9,82]	[3,93; 10,96]	[4,29; 11,52]	[4,66; 12,08]	[4,66; 12,08]						
2008-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	226	226	226	226	226	226	226	226	226						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		4	5	6	9	12	12	12	12	12					
		Anteil in %			1,77	2,21	2,65	3,98	5,31	5,31	5,31	5,31					
		CI Anteil in %			[0,05; 3,49]	[0,29; 4,13]	[0,55; 4,76]	[1,43; 6,54]	[2,38; 8,24]	[2,38; 8,24]	[2,38; 8,24]	[2,38; 8,24]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		4	5	7	8	9	13	13	13	13					
		Anteil in %			1,77	2,21	3,10	3,54	3,98	5,75	5,75	5,75					
CI Anteil in %				[0,05; 3,49]	[0,29; 4,13]	[0,83; 5,36]	[1,13; 5,95]	[1,43; 6,54]	[2,71; 8,79]	[2,71; 8,79]	[2,71; 8,79]						
2008-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	181	181	181	181	181	181	181	181	181						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		2	3	5	6	7	7	7	7	7					
		Anteil in %			1,10	1,66	2,76	3,31	3,87	3,87	3,87	3,87					
		CI Anteil in %			[0,00; 2,63]	[0,00; 3,52]	[0,37; 5,16]	[0,70; 5,93]	[1,05; 6,68]	[1,05; 6,68]	[1,05; 6,68]	[1,05; 6,68]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		2	4	6	7	9	9	9	9	9					
		Anteil in %			1,10	2,21	3,31	3,87	4,97	4,97	4,97	4,97					
CI Anteil in %				[0,00; 2,63]	[0,06; 4,36]	[0,70; 5,93]	[1,05; 6,68]	[1,80; 8,15]	[1,80; 8,15]	[1,80; 8,15]	[1,80; 8,15]						
2009-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	200	200	200	200	200	200	200	200	200						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		0	0	1	1	1	1	1	1	1					
		Anteil in %			0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50					
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,48]	[0,00; 1,48]	[0,00; 1,48]	[0,00; 1,48]	[0,00; 1,48]	[0,00; 1,48]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		2	5	9	11	11	11	11	11	11					
		Anteil in %			1,00	2,50	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50					
CI Anteil in %				[0,00; 2,38]	[0,33; 4,67]	[1,62; 7,38]	[2,33; 8,67]	[2,33; 8,67]	[2,33; 8,67]	[2,33; 8,67]	[2,33; 8,67]						
2009-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	218	218	218	218	218	218	218	218	218						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		1	1	2	2	2	2	2	2	2					
		Anteil in %			0,46	0,46	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92					
		CI Anteil in %			[0,00; 1,36]	[0,00; 1,36]	[0,00; 2,19]	[0,00; 2,19]	[0,00; 2,19]	[0,00; 2,19]	[0,00; 2,19]	[0,00; 2,19]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halb-jahr	Anzahl		5	7	7	7	7	7	7	7	7					
		Anteil in %			2,29	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21					
CI Anteil in %				[0,30; 4,29]	[0,87; 5,56]	[0,87; 5,56]	[0,87; 5,56]	[0,87; 5,56]	[0,87; 5,56]	[0,87; 5,56]	[0,87; 5,56]						

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	210	210	210												
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	5												
		Anteil in %			1,43	2,38											
		CI Anteil in %			[0,00; 3,04]	[0,31; 4,45]											
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	5												
		Anteil in %			1,43	2,38											
CI Anteil in %				[0,00; 3,04]	[0,31; 4,45]												
2010-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	193	193													
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0													
		Anteil in %			0,00												
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]												
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3													
		Anteil in %			1,55												
CI Anteil in %				[0,00; 3,30]													
2011-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	173														
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
		CI Anteil in %															
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl															
		Anteil in %															
CI Anteil in %																	

Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte

Ein Grundziel der Evaluation ist laut Kriterien des BVA, die Überprüfung der Kosten der Versorgung der DMP-Patientinnen. Entsprechende Auswertungen werden in diesem zweiten Teil des Abschlussberichtes vorgenommen. Hierzu werden anhand von Zufallsstichproben die durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patientin der Auswertungsgruppe 1 berechnet.

In diese Betrachtung fließen alle Ausgaben für die betrachteten Leistungsbereiche ein, nicht nur die brustkrebspezifischen Ausgaben. Differenziert wird nach folgenden Bereichen:

- Ambulante ärztliche Behandlung
- Krankenhausbehandlung
- Arzneimittel
- Heilmittel
- Hilfsmittel
- Dialyse-Sachkosten
- Anschlussrehabilitation
- Häusliche Krankenpflege
- Krankengeld

Für die Zuordnung der Kosten zu einem Halbjahreszeitraum ist in der Regel der Beginn der Maßnahme ausschlaggebend, der die Kosten zuzuordnen sind. So sind die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt dem (Halb-)Jahr zuzuordnen, in dem der Krankenhausaufenthalt begann. Allerdings ist für die Zuordnung der Heilmittelkosten relevant, in welchem Monat sie abgerechnet wurden. Bei Neueinschreibungen gilt, dass die Kosten des vollständigen Quartals, in dem die Einschreibung erfolgte, berücksichtigt werden.

In den nachfolgenden standardisierten Tabellen wird die Entwicklung der durchschnittlichen Ausgaben zunächst getrennt nach Leistungsbereichen ausgewiesen, bevor die Gesamtbetrachtung erfolgt. Die Tabellen enthalten für alle Halbjahres-Kohorten die statistischen Kennwerte arithmetisches Mittel, Konfidenzintervall (95%) und Standardabweichung.

Das arithmetische Mittel wird berechnet, indem die gesamten Ausgaben eines Leistungsbereiches, die innerhalb eines Halbjahres für eine Kohorte angefallen sind, durch die Anzahl der teilnehmenden Patientinnen dieser Kohorte in diesem Halbjahr dividiert werden. Patientinnen, die im Berichtshalbjahr versterben, sind mit 0,5 zu gewichten. Patientinnen, die aus anderen Gründen ausscheiden, sind ebenfalls mit 0,5 zu gewichten, sofern ihr Ausscheiden im 1. Quartal des Halbjahres erfolgt.

Würden beispielsweise im Berichtshalbjahr von zehn Patientinnen zwei im zweiten Quartal versterben und eine aus sonstigen Gründen im zweiten Quartal ausscheiden, wären die beiden verstorbenen Patientinnen halb, die aus sonstigen Gründen ausgeschiedene Patientin sowie die im Programm verbliebenen Patientinnen voll zu gewichten. Die Bezugsgröße für die Mittelwertbildung beliefe sich rechnerisch auf neun Fälle.

Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden, sofern die Daten vorliegen, die Ausgaben der Patientinnen einer Kohorte über alle Berichtshalbjahre aufsummiert und durch die Summe der gewichteten Teilnahmejahre dividiert (jeweils ohne Beitrittsjahr).

Neben den durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patientin, deren Berechnung auf Zufallsstichproben basiert, werden weitere Kosten der Versorgung der DMP-Patientinnen dargestellt. Diese beinhalten die gesonderten Kosten der Krankenkassen für Verwaltung, Qualitätssicherung u.ä. im Rahmen der DMP. Die Verwaltungskosten und die Kosten der Qualitätssicherung werden durch die programmdurchführenden Krankenkassen kalkulatorisch ermittelt und basieren nicht auf Stichproben. Eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Patientinnen, die nicht während des gesamten Jahres eingeschrieben waren, gehen anteilig in die Berechnung ein. Die Durchschnittskosten ergeben sich folglich als der Quotient aus den Gesamtkosten für Verwaltung und Qualitätssicherung und den Versichertenjahren (= Gesamtzahl der eingeschriebenen Versicherten gewichtet mit dem Anteil ihres Teilnahmezeitraums im betrachteten Jahr).

Als **Verwaltungskosten** der Krankenkassen für die DMPs gelten

- Personal- und Sachkosten inklusive der Raumkosten, die mit der Durchführung der DMPs zusammenhängen und
- Kosten für die Datenverarbeitung und -erfassung sowie für die Evaluation, die in erster Linie an Dritte vergeben wird.

Als **Kosten der Qualitätssicherung** der Krankenkassen gelten

- Kosten der versichertenbezogenen Qualitätssicherung, die intern oder durch die Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen anfallen, z.B. durch Beratung der Versicherten, Reminder, Broschüren und
- Kosten der arztbezogenen Qualitätssicherung, die, je nach Datenflussmodell, direkt bei den Kassen anfallen können, bei der gemeinsamen Einrichtung oder bei Dritten (z.B. Erstellung von Feedbackberichten durch Datenstellen).

Die genaue Methode zur Ermittlung der Verwaltungskosten ist in diesem Abschlussbericht nicht darzustellen; die Kassen haben die jeweils von ihnen verwendete Methodik dem BVA jedoch auf Anfrage mitzuteilen.

Im Gegensatz zu den Auswertungen der Patientinnenmerkmale und der medizinischen Inhalte im ersten Teil, basiert die Evaluation der ökonomischen Inhalte nicht auf den Daten aller Teilnehmerinnen des evaluierten DMP. Vielmehr werden dazu aus allen Halbjahres-Kohorten **Stichproben** gezogen. Der Stichprobenumfang beträgt in der Regel zehn Prozent der Patientinnenanzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patientinnen. Bei Kohorten mit weniger als 100 Patientinnen werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patientinnen umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.

In den Berichten, die vor dem 30. September 2012 erstellt wurden, wurden alle Patientinnen für die Stichprobenziehung berücksichtigt. Diese Systematik wurde im Juni 2011 umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt werden nur noch Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 für die Stichprobenziehung berücksichtigt. Eine rückwirkende Änderung der Stichprobenziehung war nicht möglich. Daher wird im aktuellen Bericht die Auswertung für alle Kohorten bis 2010-2 auf Auswertungsgruppe 1 selektiert. Ab der Kohorte 2011-1 wurde die Stichprobenziehung angepasst: sie wird jetzt nur aus den Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 gezogen.

Aus diesem Grund sind die in den aktuellen Berichten ausgewiesenen Anzahlen an Stichprobenmitgliedern zumeist deutlich niedriger als in vorherigen Berichten. Auch die in früheren Berichten ausgewiesenen Leistungsausgaben sind dadurch nicht mehr mit den Ergebnissen in den aktuellen Berichten vergleichbar.

Zu beachten ist dabei, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis, die sich ggf. auch durch die endgültige Datenaufbereitung ergeben, können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patientinnen im Berichtsteil I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

Zu beachten sind bezüglich der Stichprobengröße auch Sondereffekte, die sich aus der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 ergeben. Für alle Kohorten vor der Fusion (bis einschließlich der Kohorte 2007-2) wurden die Stichproben für DMP-Teilnehmer von AOK und See-Krankenkasse gemeinsam gezogen, da auch die Versicherten der See-Krankenkasse an den DMPs der AOK teilnahmen. Nach der Fusion waren die Versicherten der See-Krankenkasse gemäß der Vorgaben des BVA mit ihrer gesamten Historie den Berichten der Knappschaft zuzuordnen. Diese nachträgliche Neuordnung der (ehemaligen) See-Versicherten führt sowohl in den Evaluationsberichten der AOK als auch in den Evaluationsberichten der Knappschaft dazu, dass in der Regel in den Kohorten bis einschließlich 2007-2 die Stichprobenfallzahlen nicht mehr der oben beschriebenen Stichprobenquote bzw. den oben definierten Ober- und Untergrenzen entsprechen.

Auswertungskapitel 9: Patientinnenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben

Tabelle 9.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patientinnen für die Ausgabenanalysen zur Verfügung standen. Dabei handelt es sich um Stichproben aus der Gesamtzahl der Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 je Kohorte. Ihre Anzahl wird jeweils in der ersten Zeile ausgewiesen. Im Laufe der weiteren Teilnehmelhalbjahre kann sich die Anzahl verringern, weil Patientinnen wegen Tod, Ausschluss oder eigener Beendigung aus dem Programm ausscheiden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbereichen ist jedoch nicht die Zahl der Patientinnen zu Beginn des Berichtshalbjahres relevant, sondern die Zahl der gewichteten Patientinnen (siehe einführende Anmerkungen zum Berichtsteil II), für die im Berichtshalbjahr die erforderlichen Angaben zu den Leistungsausgaben vorliegen. Zur Information wird diese Zahl in der zweiten Zeile ausgewiesen. Da die Daten zu den Leistungsausgaben erst ab dem Halbjahr 2004-1 vorliegen, können für davor liegende Halbjahre keine Auswertungen vorgenommen werden; die entsprechenden Tabellenzellen bleiben leer.

In der jeweils dritten Zeile wird ausgewiesen, wie viele Patientinnen im jeweiligen Berichtshalbjahr aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Die vierte Zeile weist den kumulierten Wert aus: Sie gibt an, wie viele Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres verstorben oder aus anderen Gründen aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Umfasst eine Kohorte in der Stichprobe weniger als 10 Patientinnen, werden keine Auswertungen vorgenommen. Stattdessen sind die Zahlenfelder der Auswertungstabellen in diesem Fall mit „-“ gefüllt.

In der Kohorte 2004-2 umfasst die Stichprobe im Beitrittsjahr 27 Patientinnen. Als Berechnungsbasis für die durchschnittlichen Leistungsausgaben dieser Kohorte und des jeweils letzten Berichtshalbjahres werden in den folgenden Tabellen die 0,0 auswertbaren und gewichteten Patientinnen herangezogen.

Tabelle 9.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2004-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		auswertbar und gewichtet	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4		
		auswertbar und gewichtet	26,5	15,5	11,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0		
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	11	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	0		
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	11	13	14	15	15	16	16	17	17	18	18	23	23	23		
2005-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12			
		auswertbar und gewichtet	44,0	30,5	28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0			
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	8	1	2	1	0	0	0	1	1	0	3	19	0			
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	8	9	11	12	12	12	12	13	14	14	17	36	36			
2005-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35				
		auswertbar und gewichtet	45,5	25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0				
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	1	3	0	2	1	0	0	0	1	0	3	15				
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1	4	4	6	7	7	7	7	8	8	11	26				
2006-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26					
		auswertbar und gewichtet	37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0					
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	2	4	1	1	1	1	0	0	0	1	1					
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	2	6	7	8	9	10	10	10	10	11	12					
2006-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	34	31	29	21	20	19	19	19	19	19						
		auswertbar und gewichtet	32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0						
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	3	2	8	1	1	0	0	0	0	0						
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	3	5	13	14	15	15	15	15	15	15						
2007-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	45	44	41	35	34	33	32	32	30							
		auswertbar und gewichtet	44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0							
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	1	3	6	1	1	1	0	2	2							
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1	4	10	11	12	13	13	15	17							
2007-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	56	56	56	54	51	51	51	50								
		auswertbar und gewichtet	56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0								
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	0	0	2	3	0	0	1	0								
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	0	2	5	5	5	6	6								
2008-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	44	43	40	40	40	38	37									
		auswertbar und gewichtet	43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0									
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	1	3	0	0	2	1	0									
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1	4	4	4	6	7	7									

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	
2008-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	71	68	66	64	64	63										
		auswertbar und gewichtet	65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5										
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	3	2	2	0	1	1										
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	3	5	7	7	8	9										
2009-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	61	60	60	60	59											
		auswertbar und gewichtet	61,0	46,0	44,0	44,0	38,5											
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	1	0	0	1	1											
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1	1	1	2	3											
2009-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	60	58	56	53												
		auswertbar und gewichtet	59,0	50,0	45,5	40,0												
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	2	2	3	2												
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	2	4	7	9												
2010-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	58	58	58													
		auswertbar und gewichtet	58,0	50,0	42,5													
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	0	0	3													
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	0	3													
2010-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	55	54														
		auswertbar und gewichtet	54,5	42,5														
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	1	1														
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1	2														
2011-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	96															
		auswertbar und gewichtet	93,0															
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	1															
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1															

Auswertungskapitel 10: Leistungsausgaben

Tabelle 10.1 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für die **ambulante ärztliche Behandlung**. Die Kosten der ambulanten ärztlichen Behandlung ergeben sich dabei aus dem Produkt, aus der Summe der erbrachten Punkte und einem durchschnittlichen Punktwert von 3,5 Eurocent sowie den in Euro abgerechneten Gebührenpositionen. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitritts-halb-jahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungs-jahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungs-jahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalb-jahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich

Tabelle 10.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	26,5	15,5	11,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0		
	Leistungsausgaben	Mean	1062,70	1252,75	1093,32	502,08	415,63	430,17	346,88	489,53	379,83	372,62	287,61	397,16	473,56			
		CI Mean	[832,61; 1292,80]	[831,29; 1674,21]	[515,16; 1671,48]	[345,56; 658,60]	[338,00; 493,26]	[332,81; 527,54]	[246,35; 447,41]	[317,71; 661,36]	[293,84; 465,83]	[284,36; 460,88]	[159,47; 415,75]	[295,50; 498,82]	[189,12; 758,01]			
	SD	1116,79	1106,94	1161,33	270,81	122,08	149,03	149,54	247,95	120,15	119,14	153,33	115,98	271,50				
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	44,0	30,5	28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0			
	Leistungsausgaben	Mean	1270,78	1027,19	1407,78	612,76	469,95	490,74	395,95	566,59	481,85	545,73	525,32	613,59	675,59	2045,40		
		CI Mean	[1126,00; 1415,56]	[827,01; 1227,37]	[975,78; 1839,78]	[351,63; 873,89]	[348,79; 591,12]	[339,62; 641,87]	[321,12; 470,78]	[430,37; 702,81]	[379,31; 584,40]	[408,80; 682,67]	[381,93; 668,71]	[475,19; 751,99]	[448,45; 902,72]	[0,00; 4536,18]		
	SD	1250,34	677,46	1217,25	704,99	324,18	400,64	198,38	361,13	269,33	352,80	365,78	345,93	470,72	1797,19			
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	45,5	25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0				
	Leistungsausgaben	Mean	1214,70	1267,75	1163,97	733,85	576,42	470,98	712,15	445,10	492,67	462,42	448,65	437,41	533,36			
		CI Mean	[1055,96; 1373,44]	[1011,51; 1524,00]	[778,20; 1549,73]	[389,14; 1078,56]	[421,10; 731,74]	[350,25; 591,71]	[309,64; 1114,67]	[350,87; 539,33]	[393,88; 591,46]	[311,67; 613,18]	[298,88; 598,42]	[324,34; 550,48]	[381,96; 684,76]			
	SD	1230,95	881,88	993,89	879,36	388,22	292,18	963,24	225,51	230,98	339,66	333,08	248,12	267,59				
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0					
	Leistungsausgaben	Mean	1145,14	1012,47	1109,72	461,08	383,33	451,11	509,22	431,93	452,89	749,95	427,70	481,12				
		CI Mean	[986,49; 1303,78]	[759,31; 1265,62]	[775,30; 1444,15]	[384,99; 537,17]	[331,90; 434,75]	[385,21; 517,02]	[383,89; 634,55]	[329,70; 534,16]	[344,37; 561,41]	[180,67; 1319,22]	[322,49; 532,90]	[383,69; 578,54]				
	SD	1078,38	785,64	878,35	184,15	117,34	144,63	259,74	208,63	221,47	1124,90	197,21	179,22					
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	34	31	29	21	20	19	19	19	19	19						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0						
	Leistungsausgaben	Mean	2027,52	1681,03	1391,26	548,90	518,30	449,24	729,63	1393,86	1368,70	1327,07	1432,90					
		CI Mean	[1359,31; 2695,72]	[1203,19; 2158,88]	[891,79; 1890,73]	[436,94; 660,87]	[439,03; 597,58]	[382,52; 515,95]	[183,81; 1275,44]	[0,00; 2988,81]	[0,00; 3012,00]	[0,00; 3036,36]	[0,00; 3118,08]					
	SD	4611,92	1389,87	1395,78	288,46	180,89	146,40	1181,48	3452,45	3557,11	3699,95	3545,00						

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	45	44	41	35	34	33	32	32	30							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0							
	Leistungsausgaben	Mean	1836,67	1499,27	1574,12	737,09	1048,04	860,18	1147,65	567,30	516,27	548,47						
		CI Mean	[1456,69; 2216,65]	[1093,44; 1905,11]	[1129,69; 2018,56]	[519,79; 954,38]	[0,00; 2097,11]	[281,14; 1439,23]	[452,92; 1842,38]	[416,85; 717,74]	[344,80; 687,74]	[377,92; 719,01]						
	SD	3037,59	1381,25	1469,52	678,92	2907,09	1604,61	1892,27	406,16	458,78	417,30							
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	56	56	56	54	51	51	51	50								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0								
	Leistungsausgaben	Mean	1934,67	1440,90	2014,99	581,20	504,33	562,39	507,82	757,65	1106,99							
		CI Mean	[1583,80; 2285,55]	[1140,31; 1741,48]	[1527,77; 2502,21]	[481,21; 681,18]	[424,80; 583,86]	[445,46; 679,32]	[394,34; 621,30]	[373,11; 1142,20]	[42,50; 2171,48]							
	SD	2744,28	1147,65	1860,22	318,58	234,86	326,77	311,79	1009,98	2488,83								
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	44	43	40	40	40	38	37									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0									
	Leistungsausgaben	Mean	1661,47	1685,72	1643,63	723,80	484,64	627,64	630,21	612,30								
		CI Mean	[1356,94; 1966,01]	[1297,47; 2073,97]	[1056,22; 2231,04]	[444,52; 1003,08]	[400,12; 569,17]	[448,25; 807,03]	[486,05; 774,37]	[441,80; 782,80]								
	SD	1956,12	1306,47	1721,65	767,33	224,08	466,69	348,88	398,63									
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	71	68	66	64	64	63										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5										
	Leistungsausgaben	Mean	1898,28	1611,61	2156,72	766,95	576,82	494,77	530,51									
		CI Mean	[1567,84; 2228,72]	[1329,00; 1894,22]	[1569,13; 2744,31]	[561,21; 972,70]	[495,67; 657,97]	[411,87; 577,67]	[452,65; 608,38]									
	SD	2483,51	1166,95	2098,53	704,18	274,63	275,73	240,02										
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	61	60	60	60	59											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	61,0	46,0	44,0	44,0	38,5											
	Leistungsausgaben	Mean	2044,37	1549,65	2008,01	902,72	567,30	500,71										
		CI Mean	[1652,77; 2435,96]	[1257,43; 1841,86]	[1474,83; 2541,20]	[533,30; 1272,14]	[441,52; 693,08]	[432,81; 568,61]										
	SD	2624,06	1164,43	1845,01	1250,23	425,68	214,95											
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	60	58	56	53												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	59,0	50,0	45,5	40,0												
	Leistungsausgaben	Mean	2638,00	2216,42	2264,94	1014,37	483,10											
		CI Mean	[1905,07; 3370,93]	[1627,13; 2805,70]	[1487,26; 3042,62]	[443,25; 1585,48]	[391,51; 574,68]											
	SD	4352,89	2309,39	2805,62	1965,50	295,52												
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	58	58	58													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	58,0	50,0	42,5													
	Leistungsausgaben	Mean	2925,79	2037,14	1820,07	1042,69												
		CI Mean	[2203,39; 3648,18]	[1596,82; 2477,45]	[1349,93; 2290,20]	[508,50; 1576,88]												
	SD	3544,80	1710,88	1696,11	1776,78													
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	55	54														
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	54,5	42,5														
	Leistungsausgaben	Mean	3490,66	1650,19	1745,33													
		CI Mean	[2264,76; 4716,55]	[1308,71; 1991,67]	[1132,38; 2358,28]													
	SD	4077,49	1286,20	2038,74														
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	96															
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	93,0															
	Leistungsausgaben	Mean	1904,42															
		CI Mean	[1637,58; 2171,27]															
	SD	1312,93																

Tabelle 10.2 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für die **Krankenhausbehandlung**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittshalbjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

Tabelle 10.2 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		26,5	15,5	11,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0	
	Leistungsausgaben	Mean	2410,89	6735,40	1896,71	2011,37	51,65	964,28	310,62	1426,67	1916,38	1001,04	26,77	470,19	2703,42			
		CI Mean	[1173,39; 3648,39]	[5556,12; 7914,68]	[343,30; 3450,12]	[0,00; 4682,96]	[0,00; 129,74]	[53,98; 1874,57]	[0,00; 803,63]	[0,00; 4118,19]	[0,00; 5633,94]	[0,00; 2169,76]	[0,00; 79,77]	[0,00; 1321,43]	[0,00; 8438,33]			
	SD	6006,41	3097,29	3120,30	4622,34	122,81	1393,31	733,34	3884,06	5194,36	1577,62	63,42	971,15	5474,00				
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,0	30,5	28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0		
	Leistungsausgaben	Mean	2008,25	5799,29	1855,80	1585,46	346,05	497,38	618,94	957,74	1707,63	1076,97	703,03	958,17	248,82	1889,59		
		CI Mean	[1300,00; 2716,50]	[4876,31; 6722,28]	[673,77; 3037,82]	[503,62; 2667,29]	[35,27; 656,82]	[149,42; 845,34]	[0,00; 1661,91]	[63,68; 1851,80]	[0,00; 4287,39]	[0,00; 2459,78]	[170,08; 1235,97]	[101,92; 1814,42]	[0,00; 529,94]	[0,00; 5593,17]		
	SD	6116,33	3123,67	3330,58	2920,68	831,48	922,47	2765,02	2370,24	6775,58	3562,68	1359,56	2140,18	582,61	2672,28			
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		45,5	25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0			
	Leistungsausgaben	Mean	2153,51	5668,89	1521,11	473,60	1449,62	514,68	1513,73	473,42	1385,82	790,63	1088,71	1737,89	888,15			
		CI Mean	[1459,86; 2847,17]	[4626,99; 6710,79]	[620,37; 2421,86]	[40,07; 907,13]	[19,23; 2880,01]	[41,09; 988,27]	[0,00; 3410,71]	[0,00; 1128,56]	[0,00; 2954,08]	[0,00; 1616,60]	[0,00; 2188,49]	[381,47; 3094,32]	[0,00; 2110,82]			
	SD	5378,91	3585,71	2320,68	1105,94	3575,22	1146,14	4539,62	1567,80	3666,66	1860,90	2445,82	2976,64	2160,93				
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0				
	Leistungsausgaben	Mean	2128,16	6375,54	1923,32	595,79	455,51	211,36	152,72	986,45	1191,36	1827,95	2307,69	1195,58				
		CI Mean	[1197,44; 3058,87]	[4990,02; 7761,07]	[0,00; 3924,20]	[19,17; 1172,41]	[0,00; 941,86]	[0,00; 497,06]	[0,00; 393,05]	[0,00; 2510,64]	[424,54; 1958,18]	[0,00; 4681,58]	[224,25; 4391,12]	[0,00; 2628,08]				
	SD	6326,45	4299,91	5255,18	1395,48	1109,71	626,97	498,06	3110,59	1564,94	5638,81	3905,62	2635,18					
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19	19					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0					
	Leistungsausgaben	Mean	2008,38	6662,11	1476,67	1070,19	359,27	1741,87	942,98	730,64	794,43	252,10	1400,20					
		CI Mean	[1298,83; 2717,92]	[4628,81; 8695,41]	[618,01; 2335,34]	[301,22; 1839,15]	[0,00; 940,05]	[0,00; 4081,40]	[46,15; 1839,82]	[162,38; 1298,90]	[48,40; 1540,47]	[0,00; 591,21]	[0,00; 2867,46]					
	SD	4897,20	5914,09	2399,54	1981,17	1325,18	5134,02	1941,30	1230,06	1614,87	734,03	3086,56						
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	2958,06	5571,96	1302,57	1691,83	578,97	1689,37	1918,92	1268,76	1993,61	1434,59						
		CI Mean	[2214,58; 3701,54]	[4782,19; 6361,73]	[637,85; 1967,28]	[772,27; 2611,40]	[98,29; 1059,65]	[336,61; 3042,12]	[163,37; 3674,47]	[264,57; 2272,95]	[868,08; 3119,15]	[558,31; 2310,86]						
	SD	5943,49	2687,97	2197,88	2873,04	1332,01	3748,64	4781,67	2711,06	3011,41	2144,11							

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		56	56	56	54	51	51	51	50						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0						
	Leistungsausgaben	Mean	3549,28	5847,99	1442,71	947,89	3151,14	1258,18	746,13	3547,06	1920,81						
		CI Mean	[2463,57; 4634,98]	[4745,72; 6950,26]	[754,54; 2130,89]	[42,97; 1852,80]	[804,07; 5498,21]	[89,44; 2426,92]	[196,39; 1295,87]	[1123,25; 5970,87]	[134,66; 3706,96]						
	SD	8491,63	4208,50	2627,47	2883,27	6930,94	3266,04	1510,42	6365,98	4176,12							
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		44	43	40	40	40	38	37							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	4894,19	5742,43	2180,76	636,63	1514,57	8013,47	1693,17	480,82							
		CI Mean	[712,91; 9075,46]	[4724,38; 6760,48]	[183,63; 4177,88]	[59,26; 1213,99]	[0,00; 3304,06]	[0,00; 20232,27]	[0,00; 3467,25]	[0,00; 983,06]							
	SD	26857,60	3425,75	5853,37	1586,32	4744,13	31787,70	4293,47	1174,26								
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		71	68	66	64	64	63								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5								
	Leistungsausgaben	Mean	3599,95	5943,14	2993,29	1175,35	857,24	1242,12	2754,08								
		CI Mean	[2126,68; 5073,22]	[5082,63; 6803,65]	[425,97; 5560,60]	[373,06; 1977,65]	[265,77; 1448,71]	[455,47; 2028,77]	[556,12; 4952,04]								
	SD	11072,76	3553,20	9168,99	2745,90	2001,73	2616,50	6775,02									
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		61	60	60	60	59									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		61,0	46,0	44,0	44,0	38,5									
	Leistungsausgaben	Mean	2370,14	4676,62	2057,79	1033,97	910,44	628,90									
		CI Mean	[1462,21; 3278,07]	[4138,93; 5214,30]	[828,90; 3286,68]	[60,73; 2007,22]	[333,13; 1487,75]	[137,16; 1120,64]									
	SD	6084,01	2142,59	4252,40	3293,76	1953,79	1556,71										
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		60	58	56	53										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		59,0	50,0	45,5	40,0										
	Leistungsausgaben	Mean	2460,79	6569,51	1464,17	1316,90	839,77										
		CI Mean	[1349,36; 3572,22]	[4297,69; 8841,34]	[390,21; 2538,14]	[489,20; 2144,60]	[0,00; 1780,48]										
	SD	6600,78	8903,17	3874,54	2848,53	3035,51											
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		58	58	58											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		58,0	50,0	42,5											
	Leistungsausgaben	Mean	2846,59	6126,78	1359,26	1498,63											
		CI Mean	[1473,83; 4219,34]	[4977,28; 7276,28]	[576,48; 2142,04]	[311,48; 2685,78]											
	SD	6736,08	4466,48	2824,02	3948,62												
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		55	54												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		54,5	42,5												
	Leistungsausgaben	Mean	4532,62	5704,50	2266,31												
		CI Mean	[2219,39; 6845,84]	[4627,77; 6781,23]	[1109,70; 3422,92]												
	SD	7694,07	4055,54	3847,04													
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		96													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		93,0													
	Leistungsausgaben	Mean		6476,20													
		CI Mean		[5505,49; 7446,91]													
	SD		4776,12														

Tabelle 10.3 gibt für alle Kohorten Auskunft über die Anzahl der **Patientinnen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt** im betrachteten Halbjahr und ihren Anteil an der Gesamtzahl der Patientinnen. Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2004-2 umfasst die Stichprobe im letzten Berichtshalbjahr 4 Patientinnen. Davon hatten 0 auswertbare Patientinnen bzw. Prozent mindestens einen Krankenhausaufenthalt.

Tabelle 10.3 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr
2004-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	27	9	5	2	5	4	2	2	3	1	2	1	0	0
		Anteil in %	100,00	56,25	35,71	15,38	41,67	33,33	18,18	18,18	30,00	10,00	22,22	11,11		
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[31,15; 81,36]	[9,66; 61,76]	[0,00; 35,79]	[12,53; 70,81]	[5,47; 61,19]	[0,00; 42,08]	[0,00; 42,08]	[0,06; 59,94]	[0,00; 29,60]	[0,00; 51,03]	[0,00; 32,89]		
2005-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12	
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	45	14	9	6	8	4	4	6	5	7	6	3	1	
		Anteil in %	93,75	35,00	23,08	16,22	22,22	11,11	11,11	16,67	14,29	20,59	17,65	9,68	8,33	
		CI Anteil in %	[86,83; 100,67]	[20,03; 49,97]	[9,68; 36,48]	[4,18; 28,26]	[8,45; 35,99]	[0,70; 21,52]	[0,70; 21,52]	[4,32; 29,02]	[2,53; 26,05]	[6,79; 34,39]	[4,64; 30,66]	[0,00; 20,26]	[0,00; 24,66]	
2005-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35		
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	44	11	6	7	6	6	4	6	6	5	7	6		
		Anteil in %	95,65	24,44	14,29	16,67	15,00	15,38	10,26	15,38	15,38	13,16	18,42	17,14		
		CI Anteil in %	[89,69; 101,61]	[11,74; 37,14]	[3,58; 25,00]	[5,26; 28,08]	[3,79; 26,21]	[3,91; 26,85]	[0,61; 19,91]	[3,91; 26,85]	[3,91; 26,85]	[2,27; 24,05]	[5,93; 30,91]	[4,47; 29,81]		
2006-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26			
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	35	8	5	4	3	3	3	8	3	5	5			
		Anteil in %	94,59	22,86	16,13	13,33	10,34	10,71	11,11	29,63	11,11	18,52	19,23			
		CI Anteil in %	[87,20; 101,98]	[8,74; 36,98]	[2,97; 29,29]	[0,96; 25,70]	[0,00; 21,62]	[0,00; 22,37]	[0,00; 23,19]	[12,08; 47,18]	[0,00; 23,19]	[3,59; 33,45]	[3,78; 34,68]			
2006-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	34	31	29	21	20	19	19	19	19	19				
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	30	11	10	3	7	5	6	7	2	4				
		Anteil in %	88,24	35,48	34,48	14,29	35,00	26,32	31,58	36,84	10,53	21,05				
		CI Anteil in %	[77,25; 99,23]	[18,36; 52,60]	[16,87; 52,09]	[0,00; 29,63]	[13,55; 56,45]	[5,98; 46,66]	[10,11; 53,05]	[14,56; 59,12]	[0,00; 24,71]	[2,22; 39,88]				
2007-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	45	44	41	35	34	33	32	32	30					
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	44	15	15	8	10	9	8	14	10					
		Anteil in %	97,78	34,09	36,59	22,86	29,41	27,27	25,00	43,75	33,33					
		CI Anteil in %	[93,43; 102,13]	[19,92; 48,26]	[21,66; 51,52]	[8,74; 36,98]	[13,86; 44,96]	[11,84; 42,70]	[9,76; 40,24]	[26,29; 61,21]	[16,17; 50,49]					
2007-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	56	56	56	54	51	51	51	50						
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	53	26	11	13	7	7	10	7						
		Anteil in %	94,64	46,43	19,64	24,07	13,73	13,73	19,61	14,00						
		CI Anteil in %	[88,69; 100,59]	[33,25; 59,61]	[9,14; 30,14]	[12,56; 35,58]	[4,19; 23,27]	[4,19; 23,27]	[8,60; 30,62]	[4,28; 23,72]						
2008-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	44	43	40	40	40	38	37							
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	40	12	8	9	9	5	5							
		Anteil in %	90,91	27,91	20,00	22,50	22,50	13,16	13,51							
		CI Anteil in %	[82,32; 99,50]	[14,34; 41,48]	[7,45; 32,55]	[9,39; 35,61]	[9,39; 35,61]	[2,27; 24,05]	[2,34; 24,68]							
2008-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	71	68	66	64	64	63								
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	63	23	11	12	12	15								
		Anteil in %	88,73	33,82	16,67	18,75	18,75	23,81								
		CI Anteil in %	[81,32; 96,14]	[22,49; 45,15]	[7,61; 25,73]	[9,11; 28,39]	[9,11; 28,39]	[13,21; 34,41]								
2009-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	61	60	60	60	59									
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	59	17	10	15	10									
		Anteil in %	96,72	28,33	16,67	25,00	16,95									
		CI Anteil in %	[92,21; 101,23]	[16,83; 39,83]	[7,16; 26,18]	[13,95; 36,05]	[7,29; 26,61]									

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	
2009-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	60	58	56	53											
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	55	11	15	11											
		Anteil in %	91,67	18,97	26,79	20,75											
		CI Anteil in %	[84,62; 98,72]	[8,79; 29,15]	[15,09; 38,49]	[9,73; 31,77]											
2010-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	58	58	58												
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	56	18	10												
		Anteil in %	96,55	31,03	17,24												
		CI Anteil in %	[91,81; 101,29]	[19,02; 43,04]	[7,43; 27,05]												
2010-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	55	54													
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	51	19													
		Anteil in %	92,73	35,19													
		CI Anteil in %	[85,80; 99,66]	[22,33; 48,05]													
2011-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	96														
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	90														
		Anteil in %	93,75														
		CI Anteil in %	[88,88; 98,62]														

Tabelle 10.4 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Arzneimittel**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Das 95-%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95-%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

Tabelle 10.4 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		26,5	15,5	11,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0	
	Leistungsausgaben	Mean	1765,70	852,90	1486,58	914,79	384,88	601,42	678,57	1061,47	857,30	808,80	820,68	588,01	989,15			
		CI Mean	[1169,15; 2362,26]	[429,09; 1276,70]	[0,00; 3040,74]	[111,05; 1718,53]	[228,69; 541,07]	[320,07; 882,78]	[296,78; 1060,36]	[470,42; 1652,51]	[423,77; 1290,83]	[581,70; 1035,90]	[336,19; 1305,16]	[177,62; 998,40]	[116,23; 1862,07]			
		SD	2895,46	1113,10	3121,80	1390,62	245,62	430,64	567,91	852,92	605,75	306,56	579,70	468,19	833,21			
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,0	30,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0			
	Leistungsausgaben	Mean	3255,16	1789,17	2118,61	1640,48	1978,11	1256,10	917,72	1357,35	1578,98	1676,23	1566,84	1331,18	2169,44	7254,87		
		CI Mean	[2579,08; 3931,25]	[948,02; 2630,33]	[1020,73; 3216,49]	[328,96; 2951,99]	[0,00; 4227,13]	[271,86; 2240,33]	[567,51; 1267,92]	[897,45; 1817,25]	[954,45; 2203,52]	[1099,85; 2252,61]	[913,77; 2219,92]	[732,87; 1929,49]	[103,07; 4235,80]	[7252,13; 7257,61]		
		SD	5838,55	2846,72	3093,49	3540,76	6017,31	2609,32	928,43	1219,24	1640,30	1484,98	1666,02	1495,47	4282,46	1,98		
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		45,5	25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0			
	Leistungsausgaben	Mean	3595,56	3187,80	4384,13	2379,89	2829,67	1723,66	1105,99	1121,14	1105,54	1100,08	856,93	887,72	910,94			
		CI Mean	[2592,73; 4598,39]	[2177,62; 4197,98]	[1978,11; 6790,15]	[44,12; 4715,65]	[208,82; 5450,51]	[280,98; 3166,33]	[579,53; 1632,46]	[714,55; 1527,72]	[653,12; 1557,96]	[552,20; 1647,96]	[454,91; 1258,94]	[441,50; 1333,94]	[274,55; 1547,32]			
		SD	7776,39	3476,54	6198,89	5958,58	6550,75	3491,42	1259,87	972,98	1057,78	1234,37	894,05	979,22	1124,75			
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0				
	Leistungsausgaben	Mean	2750,56	1442,67	2032,34	1719,70	1010,70	1129,28	1169,22	1292,25	1211,87	1329,30	1418,65	923,60				
		CI Mean	[2197,45; 3303,67]	[856,25; 2029,09]	[693,44; 3371,24]	[575,44; 2863,97]	[602,56; 1418,85]	[679,75; 1578,81]	[741,72; 1596,72]	[826,85; 1757,65]	[714,67; 1709,07]	[868,74; 1789,87]	[815,51; 2021,80]	[173,68; 1673,52]				
		SD	3759,71	1819,91	3516,53	2769,25	931,26	986,48	885,97	949,80	1014,70	910,08	1130,67	1379,53				
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19	19					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0					
	Leistungsausgaben	Mean	3744,58	4120,45	3270,89	2226,38	1051,02	1148,96	1193,62	1217,69	1131,00	2422,57	2240,34					
		CI Mean	[2497,27; 4991,89]	[1367,87; 6873,02]	[551,21; 5990,57]	[123,53; 4329,23]	[654,90; 1447,14]	[754,32; 1543,60]	[568,29; 1818,94]	[701,59; 1733,79]	[676,28; 1585,73]	[221,40; 4623,74]	[0,00; 4573,57]					
		SD	8608,81	8006,18	7600,15	5417,79	903,82	866,02	1353,58	1117,16	984,30	4764,69	4908,24					
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	5081,90	2729,18	4668,90	3241,06	2274,55	1425,29	1257,66	2224,81	2493,94	1317,50						
		CI Mean	[3704,19; 6459,60]	[1490,45; 3967,92]	[2279,04; 7058,76]	[1104,50; 5377,61]	[585,83; 3963,27]	[589,83; 2260,75]	[819,10; 1696,22]	[271,48; 4178,14]	[0,00; 5084,04]	[579,11; 2055,90]						
		SD	11013,49	4216,03	7902,06	6675,34	4679,64	2315,16	1194,52	5273,49	6929,90	1806,75						

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		56	56	56	54	51	51	51	50						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0						
	Leistungsausgaben	Mean	5615,71	5373,88	3191,31	2075,05	2522,81	2727,83	2683,47	3084,60	3537,83						
		CI Mean	[4130,52; 7100,90]	[3349,68; 7398,07]	[1849,86; 4532,76]	[462,43; 3687,66]	[761,76; 4283,85]	[397,78; 5057,87]	[496,01; 4870,94]	[396,23; 5772,97]	[504,90; 6570,75]						
	SD	11616,09	7728,42	5121,68	5138,14	5200,40	6511,32	6010,12	7060,83	7091,12							
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		44	43	40	40	40	38	37							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	5747,58	2817,17	5278,98	4118,82	2096,33	1502,12	1915,01	1099,99							
		CI Mean	[4047,52; 7447,64]	[1654,72; 3979,62]	[2751,50; 7806,47]	[1126,46; 7111,17]	[751,10; 3441,56]	[486,18; 2518,06]	[815,19; 3014,83]	[762,29; 1437,69]							
	SD	10919,98	3911,68	7407,79	8221,59	3566,34	2643,01	2661,68	789,56								
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		71	68	66	64	64	63								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5								
	Leistungsausgaben	Mean	6139,05	5315,26	4988,81	4023,42	2396,88	1717,22	1702,39								
		CI Mean	[4548,78; 7729,33]	[3401,77; 7228,76]	[2734,19; 7243,42]	[1893,57; 6153,27]	[1055,17; 3738,59]	[540,04; 2894,41]	[655,73; 2749,06]								
	SD	11952,18	7901,19	8052,20	7289,52	4540,77	3915,47	3226,24									
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		61	60	60	60	59									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		61,0	46,0	44,0	44,0	38,5									
	Leistungsausgaben	Mean	5835,13	4429,32	4516,78	2944,71	2350,70	1623,64									
		CI Mean	[4021,80; 7648,46]	[3037,65; 5820,99]	[2449,32; 6584,24]	[955,70; 4933,71]	[837,78; 3863,62]	[208,78; 3038,50]									
	SD	12151,10	5545,57	7154,18	6731,41	5120,19	4479,08										
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		60	58	56	53										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		59,0	50,0	45,5	40,0										
	Leistungsausgaben	Mean	7964,90	4448,83	5802,48	3474,15	2285,60										
		CI Mean	[5851,98; 10077,81]	[2452,42; 6445,24]	[3869,58; 7735,38]	[1783,57; 5164,72]	[628,77; 3942,42]										
	SD	12548,63	7823,84	6973,30	5818,13	5346,27											
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		58	58	58											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		58,0	50,0	42,5											
	Leistungsausgaben	Mean	9386,68	3071,10	5801,83	3389,23											
		CI Mean	[6075,79; 12697,57]	[1714,56; 4427,63]	[3285,53; 8318,13]	[1381,78; 5396,68]											
	SD	16246,50	5270,95	9078,03	6677,03												
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		55	54												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		54,5	42,5												
	Leistungsausgaben	Mean	6497,46	2409,38	3248,73												
		CI Mean	[2143,84; 10851,08]	[1319,43; 3499,33]	[1071,92; 5425,54]												
	SD	14480,69	4105,35	7240,34													
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		96													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		93,0													
	Leistungsausgaben	Mean		3743,81													
		CI Mean		[2624,07; 4863,54]													
	SD		5509,35														

Tabelle 10.5 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Heilmittel**. Zu den Heilmitteln gehören verschiedene Formen der Therapie wie z.B. physikalische Therapie, Ergotherapie, Logopädie. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitritts-halb-jahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungs-jahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungs-jahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich

Tabelle 10.5 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		26,5	15,5	11,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0
	Leistungsausgaben	Mean	153,82	49,40	74,00	48,03	65,04	59,75	33,61	121,36	95,13	84,68	83,56	133,50	118,75		
		CI Mean	[85,13; 222,52]	[9,26; 89,55]	[0,00; 178,18]	[0,00; 135,23]	[0,00; 150,50]	[0,00; 166,47]	[0,00; 99,73]	[0,00; 250,83]	[0,00; 223,28]	[0,00; 224,71]	[0,00; 199,04]	[0,00; 336,53]	[0,00; 370,65]		
	SD	333,42	105,45	209,27	150,88	134,40	163,35	98,36	186,83	179,06	189,02	138,17	231,63	240,44			
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,0	30,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0		
	Leistungsausgaben	Mean	201,82	103,65	99,69	110,48	76,05	89,21	110,63	99,78	120,43	77,03	97,49	111,75	140,64	0,00	
		CI Mean	[158,77; 244,86]	[49,81; 157,49]	[17,24; 182,14]	[34,58; 186,38]	[21,33; 130,78]	[33,25; 145,17]	[42,20; 179,06]	[38,27; 161,29]	[51,11; 189,75]	[15,64; 138,42]	[21,19; 173,79]	[31,70; 191,79]	[11,99; 269,29]	[0,00; 0,00]	
	SD	371,72	182,21	232,32	204,92	146,42	148,35	181,42	163,06	182,06	158,16	194,64	200,07	266,62	0,00		
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		45,5	25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0			
	Leistungsausgaben	Mean	184,74	105,29	50,90	138,98	92,12	97,60	123,18	129,06	76,43	89,32	64,28	73,32	57,04		
		CI Mean	[140,46; 229,02]	[70,82; 139,76]	[7,44; 94,37]	[63,45; 214,50]	[36,77; 147,48]	[35,67; 159,53]	[0,00; 247,63]	[6,63; 251,48]	[28,67; 124,19]	[50,34; 128,29]	[28,59; 99,96]	[28,51; 118,14]	[2,85; 111,22]		
	SD	343,36	118,63	111,99	192,67	138,36	149,88	297,81	292,97	111,67	87,81	79,36	98,34	95,77			
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	26				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0			
	Leistungsausgaben	Mean	115,07	37,67	30,84	55,68	46,80	71,61	101,62	84,12	101,29	14,47	32,04	45,32			
		CI Mean	[73,34; 156,81]	[19,70; 55,65]	[2,07; 59,62]	[22,15; 89,20]	[12,48; 81,11]	[0,00; 152,88]	[0,00; 207,94]	[0,00; 201,87]	[0,03; 202,56]	[0,00; 33,91]	[0,00; 76,80]	[0,00; 91,08]			
	SD	283,69	55,79	75,57	81,14	78,30	178,34	220,35	240,30	206,66	38,40	83,92	84,18				
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	17,0					
	Leistungsausgaben	Mean	379,15	101,45	137,86	195,06	182,80	167,40	178,81	160,09	175,44	274,29	272,61				
		CI Mean	[275,74; 482,56]	[32,72; 170,18]	[36,73; 238,98]	[78,55; 311,58]	[25,13; 340,48]	[9,09; 325,71]	[0,00; 364,54]	[0,00; 337,98]	[32,25; 318,63]	[67,97; 480,61]	[52,97; 492,25]				
	SD	713,72	199,90	282,59	300,20	359,77	347,40	402,05	385,06	309,96	446,60	462,04					
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0					
	Leistungsausgaben	Mean	184,19	46,12	85,04	123,37	127,75	70,35	49,46	80,66	109,79	81,75					
		CI Mean	[144,10; 224,28]	[23,39; 68,85]	[39,35; 130,73]	[53,69; 193,04]	[59,10; 196,40]	[33,22; 107,48]	[19,29; 79,63]	[25,97; 135,35]	[41,15; 178,44]	[22,05; 141,46]					
	SD	320,49	77,36	151,07	217,68	190,25	102,90	82,18	147,64	183,66	146,09						

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		56	56	56	54	51	51	51	50							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	253,15	72,39	71,96	117,67	113,19	137,49	156,89	163,30	206,30							
		CI Mean	[189,95; 316,35]	[43,41; 101,37]	[33,07; 110,85]	[38,73; 196,61]	[43,93; 182,45]	[48,24; 226,74]	[46,35; 267,43]	[39,99; 286,61]	[75,26; 337,34]							
	SD	494,28	110,64	148,50	251,51	204,53	249,41	303,72	323,87	306,37								
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		44	43	40	40	40	38	37								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0								
	Leistungsausgaben	Mean	215,59	87,09	74,33	97,77	88,62	135,47	106,95	165,54								
		CI Mean	[152,03; 279,15]	[44,38; 129,80]	[35,55; 113,11]	[26,34; 169,19]	[36,12; 141,12]	[25,57; 245,36]	[32,25; 181,65]	[41,48; 289,60]								
	SD	408,28	143,73	113,66	196,25	139,18	285,90	180,78	290,05									
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		71	68	66	64	64	63									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5									
	Leistungsausgaben	Mean	328,87	95,98	96,72	117,21	243,59	221,74	151,42									
		CI Mean	[227,14; 430,61]	[65,95; 126,01]	[18,37; 175,07]	[25,62; 208,81]	[94,84; 392,34]	[82,86; 360,63]	[57,60; 245,24]									
	SD	764,64	124,00	279,83	313,47	503,41	461,95	289,19										
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		61	60	60	60	59										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		61,0	46,0	44,0	44,0	38,5										
	Leistungsausgaben	Mean	283,95	75,02	114,55	151,88	134,05	172,47										
		CI Mean	[211,71; 356,19]	[53,93; 96,11]	[54,29; 174,81]	[80,36; 223,40]	[63,61; 204,50]	[82,32; 262,62]										
	SD	484,07	84,04	208,51	242,06	238,40	285,39											
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		60	58	56	53											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		59,0	50,0	45,5	40,0											
	Leistungsausgaben	Mean	247,56	35,07	90,55	147,53	138,31											
		CI Mean	[185,53; 309,59]	[15,97; 54,17]	[54,19; 126,91]	[83,35; 211,70]	[78,23; 198,40]											
	SD	368,38	74,85	131,18	220,87	193,88												
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		58	58	58												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		58,0	50,0	42,5												
	Leistungsausgaben	Mean	131,99	30,37	46,49	88,95												
		CI Mean	[69,52; 194,47]	[8,04; 52,70]	[16,97; 76,01]	[30,70; 147,19]												
	SD	306,55	86,76	106,51	193,74													
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		55	54													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		54,5	42,5													
	Leistungsausgaben	Mean	378,30	95,31	189,15													
		CI Mean	[99,13; 657,48]	[25,20; 165,42]	[49,56; 328,74]													
	SD	928,57	264,07	464,28														
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		96														
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		93,0														
	Leistungsausgaben	Mean		27,34														
		CI Mean		[7,13; 47,55]														
	SD		99,42															

Tabelle 10.6 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Hilfsmittel**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Leistungsausgaben stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der Hilfsmittel ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich

Tabelle 10.6 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl					9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0	
	Leistungsausgaben	Mean	33,98				15,36	29,92	0,00	26,12	28,24	30,41	5,45	0,00	0,00			
		CI Mean	[6,93; 61,02]				[0,00; 42,58]	[0,00; 88,55]	[0,00; 0,00]	[0,00; 77,32]	[0,00; 68,49]	[0,00; 90,02]	[0,00; 16,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	35	34	34	31	12			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl				28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0		
	Leistungsausgaben	Mean	131,60			110,39	66,65	41,44	83,82	52,00	107,92	29,88	38,02	68,24	56,05	0,00		
		CI Mean	[97,26; 165,94]			[32,60; 188,17]	[7,66; 125,64]	[10,23; 72,65]	[26,62; 141,03]	[19,22; 84,77]	[42,64; 173,21]	[5,19; 54,56]	[4,35; 71,68]	[0,00; 137,24]	[0,00; 120,57]	[0,00; 0,00]		
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	38	38	35				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl			25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0			
	Leistungsausgaben	Mean	136,75		50,50	51,29	50,77	57,26	50,44	52,15	78,11	156,45	62,30	106,40	51,50			
		CI Mean	[95,60; 177,90]		[7,42; 93,57]	[9,30; 93,27]	[5,87; 95,66]	[13,77; 100,75]	[16,97; 83,90]	[2,90; 101,39]	[26,88; 129,34]	[0,00; 321,55]	[0,00; 124,85]	[25,90; 186,90]	[0,00; 153,96]			
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0				
	Leistungsausgaben	Mean	184,37	147,49	84,88	81,71	83,77	67,97	79,56	97,13	111,15	130,83	150,02	54,54				
		CI Mean	[125,00; 243,74]	[32,08; 262,90]	[36,67; 133,09]	[17,42; 146,01]	[11,74; 155,81]	[16,94; 119,00]	[0,00; 164,90]	[0,00; 236,13]	[0,00; 265,87]	[0,00; 287,12]	[13,16; 286,88]	[13,06; 96,02]				
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19	19					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0					
	Leistungsausgaben	Mean	323,78	175,04	151,45	128,29	224,62	195,27	123,36	145,21	149,27	196,82	155,41					
		CI Mean	[208,67; 438,89]	[47,11; 302,97]	[39,00; 263,91]	[0,00; 263,92]	[0,00; 483,86]	[18,80; 371,74]	[0,00; 254,62]	[0,00; 308,40]	[0,54; 298,00]	[0,00; 457,20]	[0,00; 351,63]					
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	115,39	109,51	46,51	47,46	59,90	71,22	45,75	86,57	54,27	58,37						
		CI Mean	[87,26; 143,51]	[44,43; 174,59]	[18,00; 75,02]	[20,45; 74,47]	[4,35; 115,44]	[36,85; 105,60]	[20,16; 71,33]	[21,75; 151,38]	[11,87; 96,67]	[20,97; 95,77]						
		SD	224,83	221,51	94,27	84,40	153,92	95,26	69,69	174,99	113,45	91,51						

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		56	56	56	54	51	51	51	50							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	174,27	171,33	64,86	69,72	64,67	59,69	199,82	83,90	102,42							
		CI Mean	[103,01; 245,54]	[1,05; 341,60]	[31,81; 97,91]	[17,69; 121,76]	[17,70; 111,63]	[16,66; 102,72]	[0,00; 444,22]	[2,91; 164,88]	[8,15; 196,69]							
	SD	557,40	650,12	126,19	165,79	138,68	120,24	671,49	212,70	220,41								
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		44	43	40	40	40	38	37								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0								
	Leistungsausgaben	Mean	203,39	72,32	71,82	83,41	165,56	95,25	114,46	86,09								
		CI Mean	[149,05; 257,74]	[32,62; 112,02]	[27,45; 116,19]	[40,55; 126,27]	[61,57; 269,54]	[27,95; 162,55]	[51,38; 177,55]	[21,14; 151,04]								
	SD	349,09	133,60	130,05	117,76	275,68	175,08	152,66	151,85									
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		71	68	66	64	64	63									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5									
	Leistungsausgaben	Mean	277,80	121,69	138,02	105,19	141,87	130,15	188,26									
		CI Mean	[194,71; 360,90]	[70,24; 173,14]	[76,66; 199,37]	[26,01; 184,36]	[34,42; 249,32]	[35,56; 224,75]	[59,58; 316,95]									
	SD	624,53	212,46	219,13	270,98	363,65	314,64	396,66										
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		61	60	60	60	59										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		61,0	46,0	44,0	44,0	38,5										
	Leistungsausgaben	Mean	203,54	59,59	129,11	121,64	72,08	80,31										
		CI Mean	[105,69; 301,38]	[31,41; 87,78]	[0,00; 272,32]	[54,83; 188,46]	[0,00; 148,30]	[3,62; 156,99]										
	SD	655,64	112,30	495,55	226,12	257,94	242,76											
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		60	58	56	53											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		59,0	50,0	45,5	40,0											
	Leistungsausgaben	Mean	173,12	145,29	98,41	99,36	57,19											
		CI Mean	[114,24; 232,00]	[99,34; 191,24]	[41,29; 155,52]	[48,32; 150,39]	[18,39; 96,00]											
	SD	349,69	180,07	206,05	175,62	125,22												
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		58	58	58												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		58,0	50,0	42,5												
	Leistungsausgaben	Mean	193,77	145,51	97,59	96,05												
		CI Mean	[128,83; 258,71]	[107,87; 183,15]	[54,61; 140,57]	[46,13; 145,98]												
	SD	318,65	146,25	155,06	166,05													
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		55	54													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		54,5	42,5													
	Leistungsausgaben	Mean	272,13	126,08	136,06													
		CI Mean	[119,28; 424,97]	[81,42; 170,74]	[59,64; 212,49]													
	SD	508,38	168,21	254,19														
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		96														
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		93,0														
	Leistungsausgaben	Mean		111,60														
		CI Mean		[84,64; 138,56]														
	SD		132,64															

Tabelle 10.7 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Anschlussrehabilitation**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Das 95-%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95-%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

Tabelle 10.7 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		26,5	15,5	11,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0	
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
		SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,0	30,5	28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0		
	Leistungsausgaben	Mean	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CI Mean	[0,00; 40,29]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 226,41]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
		SD	230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		45,5	25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0			
	Leistungsausgaben	Mean	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CI Mean	[0,00; 57,87]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 303,78]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
		SD	297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0				
	Leistungsausgaben	Mean	44,71	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	153,08				
		CI Mean	[0,00; 106,49]	[0,00; 154,40]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 365,84]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 453,12]				
		SD	420,01	317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,38	0,00	0,00	0,00	551,94				
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19	19					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0					
	Leistungsausgaben	Mean	267,96	0,00	0,00	216,98	752,28	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00	117,06					
		CI Mean	[0,00; 615,33]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 643,12]	[0,00; 2226,74]	[0,00; 0,00]	[0,00; 320,66]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 346,49]					
		SD	2397,49	0,00	0,00	1097,90	3364,28	0,00	459,61	0,00	0,00	0,00	482,65					
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	78,37	0,00						
		CI Mean	[0,00; 85,49]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 237,59]	[0,00; 232,03]	[0,00; 0,00]						
		SD	396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,73	411,13	0,00						

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		56	56	56	54	51	51	51	50						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0						
	Leistungsausgaben	Mean	47,49	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00						
		CI Mean	[0,00; 116,12]	[0,00; 0,00]	[0,00; 191,90]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 217,86]	[0,00; 0,00]						
	SD	536,72	0,00	485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	378,94	0,00							
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		44	43	40	40	40	38	37							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	147,47	0,00	6,22	46,01	134,46	139,63	119,13	9,82							
		CI Mean	[1,61; 293,33]	[0,00; 0,00]	[0,00; 18,42]	[0,00; 136,18]	[0,00; 398,01]	[0,00; 413,53]	[0,00; 352,73]	[0,00; 29,06]							
	SD	936,89	0,00	35,75	247,75	698,69	712,54	565,36	44,99								
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		71	68	66	64	64	63								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5								
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
	SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		61	60	60	60	59									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		61,0	46,0	44,0	44,0	38,5									
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]								
	SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		60	58	56	53										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		59,0	50,0	45,5	40,0										
	Leistungsausgaben	Mean	28,86	0,00	0,00	0,00	48,88										
		CI Mean	[0,00; 85,42]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 144,70]										
	SD	335,93	0,00	0,00	0,00	309,21											
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		58	58	58											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		58,0	50,0	42,5											
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00											
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]											
	SD	0,00	0,00	0,00	0,00												
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		55	54												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		54,5	42,5												
	Leistungsausgaben	Mean	43,81	122,40	21,91												
		CI Mean	[0,00; 129,69]	[0,00; 362,34]	[0,00; 64,85]												
	SD	285,66	903,71	142,83													
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		96													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		93,0													
	Leistungsausgaben	Mean		0,00													
		CI Mean		[0,00; 0,00]													
	SD		0,00														

Tabelle 10.8 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für die häusliche Krankenpflege. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Auswertungen stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der Hilfsmittel ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich

Tabelle 10.8 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl					9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0	
	Leistungsausgaben	Mean	57,13				0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,12			
		CI Mean	[0,00; 152,62]				[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 101,60]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1358,17]			
		SD	388,23				0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,05			
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	35	34	34	31	12			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl				28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0		
	Leistungsausgaben	Mean	70,32			0,00	0,00	0,00	5,88	25,76	52,71	80,24	52,68	70,98	102,02	0,00		
		CI Mean	[15,30; 125,35]			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 16,55]	[0,00; 76,25]	[0,00; 142,48]	[0,00; 237,59]	[0,00; 155,94]	[0,00; 210,10]	[0,00; 284,93]	[0,00; 0,00]		
		SD	449,17			0,00	0,00	0,00	28,29	133,85	235,77	405,38	263,41	347,72	379,06	0,00		
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl			25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0			
	Leistungsausgaben	Mean	196,98		0,00	104,76	105,97	116,90	167,75	199,20	269,57	19,00	0,00	0,00	71,23			
		CI Mean	[83,46; 310,51]		[0,00; 0,00]	[0,00; 249,69]	[0,00; 253,85]	[0,00; 271,49]	[0,00; 356,73]	[0,00; 419,34]	[0,00; 722,83]	[0,00; 56,26]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 212,93]			
		SD	880,34		0,00	369,71	369,61	374,13	452,25	526,81	1059,75	83,95	0,00	0,00	250,44			
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0				
	Leistungsausgaben	Mean	554,09	0,00	191,32	238,22	219,72	283,03	324,40	381,08	374,70	358,34	263,34	210,75				
		CI Mean	[324,09; 784,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 458,43]	[0,00; 576,98]	[0,00; 540,65]	[0,00; 688,87]	[0,00; 782,65]	[0,00; 832,78]	[0,00; 791,16]	[9,89; 706,79]	[0,00; 593,19]	[0,00; 623,83]				
		SD	1563,41	0,00	701,54	819,83	732,28	890,59	949,71	921,85	849,91	688,54	618,34	759,88				
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19	19					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0					
	Leistungsausgaben	Mean	73,09	75,91	106,79	129,01	0,00	0,00	2,59	0,00	1,58	6,60	0,00					
		CI Mean	[19,17; 127,01]	[0,00; 164,18]	[0,00; 220,26]	[0,00; 262,42]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 7,67]	[0,00; 0,00]	[0,00; 4,66]	[0,00; 19,54]	[0,00; 0,00]					
		SD	372,15	256,76	317,09	343,71	0,00	0,00	10,99	0,00	6,68	28,00	0,00					
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	25,85	2,51	0,68	0,00	0,00	4,39	15,92	31,28	9,10	62,42						
		CI Mean	[1,32; 50,38]	[0,00; 6,68]	[0,00; 2,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 11,01]	[0,00; 47,12]	[0,00; 79,37]	[0,00; 26,94]	[0,00; 170,65]						
		SD	196,10	14,18	4,38	0,00	0,00	18,33	84,99	129,83	47,74	264,83						

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		56	56	56	54	51	51	51	50							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	183,39	99,33	144,60	159,23	96,85	23,31	19,57	13,85	112,52							
		CI Mean	[79,36; 287,42]	[0,00; 219,49]	[0,00; 295,47]	[0,00; 331,28]	[0,00; 236,11]	[0,00; 68,99]	[0,00; 56,60]	[0,00; 41,01]	[0,00; 243,99]							
	SD	813,66	458,75	576,01	548,20	411,26	127,66	101,76	71,33	307,38								
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		44	43	40	40	40	38	37								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0								
	Leistungsausgaben	Mean	372,52	138,95	170,43	117,16	132,36	147,84	294,14	307,85								
		CI Mean	[197,24; 547,80]	[8,72; 269,19]	[0,00; 363,42]	[0,00; 273,20]	[0,00; 285,41]	[0,00; 312,69]	[0,00; 612,82]	[0,00; 639,57]								
	SD	1125,87	438,25	565,64	428,71	405,75	428,85	771,23	775,59									
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		71	68	66	64	64	63									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5									
	Leistungsausgaben	Mean	335,82	185,17	178,67	159,30	128,01	166,49	213,84									
		CI Mean	[157,74; 513,91]	[0,00; 374,68]	[0,00; 380,83]	[0,00; 341,86]	[0,00; 303,90]	[0,00; 367,26]	[0,00; 461,27]									
	SD	1338,44	782,56	721,98	624,81	595,27	667,79	762,69										
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		61	60	60	60	59										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		61,0	46,0	44,0	44,0	38,5										
	Leistungsausgaben	Mean	126,71	18,41	42,76	77,75	68,01	66,19										
		CI Mean	[1,80; 251,62]	[0,00; 54,50]	[0,00; 126,56]	[0,00; 228,19]	[0,00; 201,29]	[0,00; 195,94]										
	SD	837,02	143,80	290,00	509,14	451,09	410,77											
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		60	58	56	53											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		59,0	50,0	45,5	40,0											
	Leistungsausgaben	Mean	101,29	39,67	62,81	39,74	47,84											
		CI Mean	[22,67; 179,91]	[0,00; 86,68]	[0,00; 145,25]	[0,00; 93,69]	[0,00; 107,59]											
	SD	466,94	184,22	297,41	185,66	192,79												
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		58	58	58												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		58,0	50,0	42,5												
	Leistungsausgaben	Mean	374,27	104,43	179,67	195,92												
		CI Mean	[114,93; 633,61]	[0,00; 227,18]	[2,40; 356,94]	[3,47; 388,37]												
	SD	1272,59	476,94	639,53	640,10													
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		55	54													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		54,5	42,5													
	Leistungsausgaben	Mean	210,64	162,16	105,32													
		CI Mean	[24,34; 396,94]	[14,58; 309,73]	[12,17; 198,47]													
	SD	619,67	555,85	309,83														
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		96														
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		93,0														
	Leistungsausgaben	Mean		52,57														
		CI Mean		[0,00; 106,28]														
	SD		264,31															

Tabelle 10.9 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben für **Krankengeld** (ohne Kinderkrankengeld) bei Patientinnen mit Krankengeldanspruch. Im Unterschied zu den mittleren Kosten in den anderen Leistungsbereichen und bei den Leistungsausgaben insgesamt werden also nicht alle teilnehmenden Patientinnen aus der Stichprobe berücksichtigt, sondern nur diejenigen Patientinnen mit dokumentiertem Krankengeldanspruch.

Der Krankengeldanspruch wurde dabei jeweils zum 1.1. eines Kalenderjahres erhoben, erstmalig im Jahr 2006. Fehlten die Angaben über den Krankengeldanspruch zum Jahresersten, wurden die Angaben vom Jahresersten des vorangegangenen Jahres übernommen. Die Auswertungen wurden unter der Annahme vorgenommen, dass ein zum 1.1. ermittelter Krankengeldanspruch im gesamten Vorjahr bestand. Bei Patientinnen, die zum 1.1. 2007 Anspruch auf Krankengeld hatten, wurde demnach ein Krankengeldanspruch für das Berichtshalbjahr 2006-1 angenommen. Bei Patientinnen, die zum 1.1.2006 Anspruch auf Krankengeld hatten, wurde – mangels Erhebung des Krankengeldanspruchs zum 1.1.2005 – angenommen, dass dieser Anspruch in den Berichtshalbjahren 2004-1 bis 2005-2 bestand usw.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren Patientinnen mit Krankengeldanspruch das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der 0 auswertbaren Patientinnen mit Krankengeldanspruch in der Stichprobe die durchschnittlichen Ausgaben für Krankengeld je Anspruchsberechtigtem Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich .

Tabelle 10.9 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)²²

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4	
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		3	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	
	Leistungsausgaben	Mean	3232,61	1870,47	5244,92	5550,30	518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CI Mean	[550,88; 5914,35]	[0,00; 4307,86]	[2933,52; 7556,31]	[3692,81; 7407,79]	[403,94; 633,92]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
	SD	5119,46	2153,92	1667,76	1340,25	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	36	35	34	34	31	12		
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1		
	Leistungsausgaben	Mean	2635,40	3646,81	4761,95	4410,20	917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1398,06	3829,98		
		CI Mean	[772,44; 4498,35]	[1091,80; 6201,81]	[15,81; 9508,09]	[0,00; 8834,19]	[0,00; 2110,70]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 4138,26]	[3829,98; 3829,98]		
	SD	5029,50	2607,15	4194,16	3909,47	1054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1977,16	0,00			
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35			
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		9	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5			
	Leistungsausgaben	Mean	1642,25	3570,91	4896,70	2004,77	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,19	238,04	673,00			
		CI Mean	[531,54; 2752,96]	[1476,88; 5664,93]	[1556,61; 8236,79]	[0,00; 4743,89]	[0,00; 1077,20]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1149,05]	[0,00; 704,60]	[0,00; 1992,09]			
	SD	4425,98	3205,14	4174,24	3423,19	891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,03	532,27	1504,88				
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26				
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
	Leistungsausgaben	Mean	0,00									0,00	0,00					
		CI Mean	[0,00; 0,00]									[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
	SD	0,00									0,00	0,00						

²² berechnet unter der Annahme eines Krankengeldanspruchs wie im Begleittext beschrieben.

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19	19					
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1					
	Leistungsausgaben	Mean	1248,87	2414,67	1820,70	1613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CI Mean	[0,00; 2894,53]	[0,00; 6706,94]	[0,00; 5389,27]	[0,00; 4776,51]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			
	SD	2784,72	3097,04	2574,86	2282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30						
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		6	6	5	5	5	5	4	4	3						
	Leistungsausgaben	Mean	3708,01	2453,05	7243,82	4226,51	240,52	0,00	191,97	0,00	0,00	613,42						
		CI Mean	[1351,48; 6064,54]	[1435,64; 3470,46]	[3244,73; 11242,92]	[462,75; 7990,26]	[0,00; 711,93]	[0,00; 0,00]	[0,00; 568,23]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1815,71]						
	SD	7313,37	1271,50	4997,83	4293,89	537,81	0,00	429,25	0,00	0,00	1062,47							
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		56	56	56	54	51	51	51	50							
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		7	7	6	7	6	5	5	4							
	Leistungsausgaben	Mean	3028,35	4593,58	5898,66	2791,55	179,75	60,57	160,87	0,00	25,25							
		CI Mean	[1529,95; 4526,75]	[1803,95; 7383,22]	[4793,63; 7003,69]	[1430,61; 4152,48]	[0,00; 439,57]	[0,00; 179,30]	[0,00; 391,64]	[0,00; 0,00]	[0,00; 74,75]							
	SD	4835,07	3765,65	1491,65	1700,82	350,72	148,37	263,28	0,00	50,51								
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		44	43	40	40	40	38	37								
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		3	3	2	2	0	0	0								
	Leistungsausgaben	Mean	6125,64	1692,82	3355,05	2851,08	2836,22											
		CI Mean	[1902,41; 10348,88]	[9,88; 3375,77]	[158,87; 6551,23]	[0,00; 8439,20]	[0,00; 8395,20]											
	SD	5700,84	1487,22	2824,46	4032,04	4011,01												
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		71	68	66	64	64	63									
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		9	5	5	5	5	4									
	Leistungsausgaben	Mean	2965,06	2357,30	3712,69	2408,82	994,63	0,00	0,00									
		CI Mean	[1542,96; 4387,16]	[955,58; 3759,02]	[2722,24; 4703,15]	[918,29; 3899,34]	[0,00; 2054,24]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]									
	SD	3554,50	2145,49	1129,97	1700,46	1208,85	0,00	0,00										
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		61	60	60	60	59										
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		9	8	6	6	4										
	Leistungsausgaben	Mean	3382,39	1782,32	3530,30	1903,23	154,48	0,00										
		CI Mean	[1160,43; 5604,34]	[517,37; 3047,27]	[1138,80; 5921,80]	[0,00; 4175,70]	[0,00; 457,25]	[0,00; 0,00]										
	SD	5553,74	1936,15	3451,11	2840,00	378,39	0,00											
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		60	58	56	53											
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		7	6	6	4											
	Leistungsausgaben	Mean	9091,60	3295,71	6787,26	3424,39	2865,71											
		CI Mean	[5263,81; 12919,38]	[980,59; 5610,83]	[4328,65; 9245,87]	[130,98; 6717,80]	[0,00; 6783,73]											
	SD	7811,80	3125,12	3072,62	4115,91	3997,98												
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		58	58	58												
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		11	9	12												
	Leistungsausgaben	Mean	10184,14	1164,19	6345,34	4152,12												
		CI Mean	[7155,49; 13212,79]	[399,37; 1929,00]	[3997,65; 8693,03]	[2262,63; 6041,61]												
	SD	7081,13	1294,18	3593,41	3339,48													

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		55														
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		5														
	Leistungsausgaben	Mean	10918,33	4484,28	5459,16													
		CI Mean	[0,00; 23559,16]	[2212,19; 6756,38]	[0,00; 11779,58]													
SD		14421,31	2592,12	7210,66														
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		96														
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		15														
	Leistungsausgaben	Mean		3092,35														
		CI Mean		[1860,19; 4324,52]														
SD			2434,78															

Tabelle 10.10 gibt Auskunft über die durchschnittlichen **Gesamtausgaben** je Patientin für alle bislang einzeln ausgewiesenen Leistungsbereiche, wobei Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006 berücksichtigt werden. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Das arithmetische Mittel der Gesamtausgaben in Tabelle 10.10 entspricht nicht der Summe der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbereichen, die in den vorangegangenen Tabellen ausgewiesen wurden. Das liegt daran, dass die Durchschnittsausgaben teils für unterschiedliche Personengruppen zu ermitteln waren. In der Regel wurden die Durchschnittsausgaben für alle auswertbaren und gewichteten Patientinnen der Stichprobe berechnet. Davon abweichend waren in Tabelle 10.9 die durchschnittlichen Krankengeldausgaben nicht für die gesamte Stichprobe zu ermitteln, sondern nur für die Patientinnen mit Krankengeldanspruch laut Stichtagsregelung wie im Begleittext beschrieben. Desweiteren fließen in Tabelle 10.10 auch die durchschnittlichen Dialyse-Sachkosten pro Auswertungshalbjahr ein, welche ansonsten nicht gesondert im Berichtsteil II dargestellt werden.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Diese Angaben beziehen sich – wie bei der Darstellung der einzelnen Leistungsbereiche – auf die Ausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr bzw. im Durchschnitt der Patientinnenjahre. Bei der Interpretation der Gesamtausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr ist zu beachten, dass die Ausgaben für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006-1 enthalten sind.

Zusätzlich wird in dieser Tabelle das arithmetische Mittel der kumulierten Leistungsausgaben im Zeitverlauf dargestellt. In diese Durchschnittsbildung wurden alle Patientinnen einbezogen, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Da im Berichtshalbjahr – nicht aber in den davor liegenden Halbjahren – die Gewichtungsregeln für verstorbene oder aus anderem Grund ausgeschiedene Kohortenmitglieder zu beachten sind, sind nicht einfach die Leistungsausgaben der Restkohorte bis zum aktuellen Berichtshalbjahr aufzusummieren und durch die Anzahl der Kohortenmitglieder zu teilen. Stattdessen sind Durchschnittswerte für alle betrachteten Halbjahre zu bilden und aufzusummieren. Umfasst beispielsweise eine Kohorte im Berichtshalbjahr 8.000 Patientinnen ungewichtet und 7.500 Patientinnen gewichtet und soll das kumulierte arithmetische Mittel für das dritte Halbjahr berechnet werden, ist folgendermaßen vorzugehen: Das arithmetische Mittel des ersten und zweiten Halbjahres wird jeweils gebildet, indem die jeweilige Summe der Leistungsausgaben der 8.000 Kohortenmitglieder durch ihre ungewichtete Anzahl dividiert wird. Das arithmetische Mittel des dritten Halbjahres – des Berichtshalbjahres – wird gebildet, indem die Summe der Leistungsausgaben der Kohortenmitglieder durch ihre gewichtete Anzahl geteilt wird, also durch 7.500. In der Tabelle wird dann als kumulierter Wert die Summe dieser drei Teilwerte ausgewiesen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die kumulierten Werte nur für diejenigen Kohorten aussagekräftig und vergleichbar sind, für die in allen betrachteten Halbjahren Ausgabenwerte vorlagen.

In der Kohorte 2004-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 0,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin Euro. Die bis einschließlich des letzten Berichtshalbjahres kumulierten Ausgaben lagen durchschnittlich bei Euro.

Tabelle 10.10 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	
2004-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leistungsausgaben kumuliert	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2004-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	16	14	13	12	12	11	11	10	10	9	9	4	4	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		26,5	15,5	11,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	5,5	5,0	3,5	0,0	0,0	
	Leistungsausgaben	Mean	5957,12	9144,88	5227,38	4441,54	1041,81	2085,53	1403,91	3125,15	3276,88	2297,55	1224,08	1588,87	4720,00			
		CI Mean	[4277,32; 7636,92]	[8005,09; 10284,68]	[2752,42; 7702,34]	[899,36; 7983,72]	[826,26; 1257,37]	[1253,08; 2917,99]	[875,11; 1932,72]	[0,00; 6523,11]	[0,00; 7447,86]	[1081,72; 3513,38]	[658,46; 1789,70]	[658,80; 2518,93]	[0,00; 11999,49]			
		SD	8153,17	2993,60	4971,40	6128,63	338,97	1274,17	786,59	4903,50	5827,90	1641,21	676,79	1061,07	6948,31			
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		9144,88	14531,78	19801,82	18899,97	21716,15	23120,06	25046,53	28323,41	26440,79	27779,53	28432,17	33152,17				
2005-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		48	40	39	37	36	36	36	35	34	34	31	12			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,0	30,5	28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	26,5	25,5	25,0	24,0	16,5	2,0		
	Leistungsausgaben	Mean	7266,07	9118,56	6120,35	4695,74	3090,37	2374,86	2132,93	3059,22	4049,53	3562,55	2983,38	3153,91	3562,02	13104,84		
		CI Mean	[6048,82; 8483,32]	[7759,99; 10477,13]	[3706,61; 8534,10]	[2295,46; 7096,02]	[754,09; 5426,64]	[1003,10; 3746,62]	[1063,17; 3202,69]	[1774,80; 4343,63]	[1127,14; 6971,92]	[1715,29; 5409,81]	[1806,35; 4160,41]	[1649,14; 4658,68]	[1251,66; 5872,39]	[8135,92; 18073,77]		
		SD	10512,04	4597,83	6801,19	6480,15	6250,78	3636,68	2836,05	3405,11	7675,48	4759,29	3002,63	3761,14	4788,14	3585,27		
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		9118,56	14021,07	18716,79	20302,95	22675,81	24808,74	27867,96	31917,49	34856,66	35660,72	39556,31	45279,84	108202,84			
2005-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	45	42	42	40	39	39	39	39	38	38	35			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		45,5	25,5	25,0	24,0	22,5	22,0	22,0	21,0	19,5	19,0	18,5	12,0			
	Leistungsausgaben	Mean	8003,01	11068,95	8505,12	4469,76	5216,17	2981,07	3775,87	2420,05	3408,14	2617,90	2623,03	3307,08	2792,62			
		CI Mean	[6573,41; 9432,60]	[9314,71; 12823,20]	[5027,05; 11983,19]	[2046,60; 6892,92]	[2275,09; 8157,26]	[1443,67; 4518,47]	[1413,60; 6138,15]	[1352,47; 3487,64]	[1410,70; 5405,58]	[1457,83; 3777,98]	[1206,70; 4039,35]	[1595,24; 5018,92]	[1121,41; 4463,84]			
		SD	11085,68	6037,27	8960,92	6181,53	7351,19	3720,67	5653,08	2554,80	4670,11	2613,65	3149,80	3756,59	2953,71			
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		11068,95	18716,35	22433,05	27649,22	29610,41	32661,02	35081,07	39672,66	40870,89	41510,53	44817,61	46539,49				
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		37	35	31	30	29	28	27	27	27	27	26				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		37,0	26,5	22,5	20,0	18,5	16,5	16,0	16,0	15,0	13,5	13,0				
	Leistungsausgaben	Mean	6922,09	9068,00	5372,42	3152,18	2199,82	2214,36	2336,74	3396,55	3443,26	4410,84	4599,43	3063,99				
		CI Mean	[5695,77; 8148,41]	[7527,82; 10608,19]	[2944,24; 7800,60]	[1846,29; 4458,07]	[1384,46; 3015,18]	[1415,88; 3012,85]	[1529,87; 3143,62]	[1102,84; 5690,26]	[1999,69; 4886,84]	[1263,33; 7558,35]	[1918,97; 7279,89]	[1181,86; 4946,11]				
		SD	8335,78	4779,89	6377,46	3160,39	1860,41	1752,25	1672,21	4681,04	2946,06	6219,51	5024,82	3462,29				
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		9068,00	13999,38	17691,66	19990,20	22682,45	25846,22	30072,72	33515,98	38567,43	44653,40	45724,63					
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	31	29	21	20	19	19	19	19	19					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		32,5	30,0	25,5	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0					
	Leistungsausgaben	Mean	9539,63	13128,29	6656,30	4641,38	3173,60	3702,74	3477,48	4364,70	4361,91	5259,46	6383,22					
		CI Mean	[7448,11; 11631,14]	[9749,35; 16507,23]	[3530,66; 9781,95]	[2123,38; 7159,39]	[1161,67; 5185,53]	[1149,06; 6256,42]	[1554,08; 5400,89]	[642,56; 8086,85]	[746,91; 7976,90]	[1123,70; 9395,21]	[2204,45; 10562,00]					
		SD	14435,45	9828,02	8734,63	6487,39	4590,62	5603,97	4163,42	8057,00	7825,06	8952,31	8790,57					
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		13128,29	19253,64	23267,84	28317,70	32770,96	36962,02	41326,73	45688,63	50948,09	58549,87						
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		45	44	41	35	34	33	32	32	30						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		44,5	42,0	37,5	29,5	29,5	28,5	28,0	27,5	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	11113,42	10289,31	8712,64	6615,66	4666,02	4362,46	4659,13	4339,64	5255,36	3695,51						
		CI Mean	[9098,75; 13128,09]	[8626,49; 11952,13]	[5380,77; 12044,51]	[4004,50; 9226,81]	[1748,54; 7583,49]	[2209,37; 6515,56]	[2364,18; 6954,08]	[1438,90; 7240,37]	[2074,04; 8436,68]	[2204,57; 5186,44]						
		SD	16105,51	5659,38	11016,83	8158,17	8084,68	5966,47	6250,87	7831,24	8511,73	3648,11						
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		10289,31	19169,81	25849,65	33088,63	37818,44	42972,47	45205,85	50461,21	54365,34							

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	56	56	56	54	51	51	51	50							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	56,0	56,0	39,0	33,5	30,0	29,0	26,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	12495,01	13593,31	7819,64	4513,40	6529,45	4780,99	4341,44	7890,61	7479,60						
		CI Mean	[10379,23; 14610,78]	[11347,27; 15839,35]	[5969,81; 9669,47]	[2579,10; 6447,70]	[3113,41; 9945,49]	[2108,19; 7453,80]	[1999,78; 6683,11]	[4142,36; 11638,86]	[2469,80; 12489,40]						
		SD	16548,07	8575,42	7062,68	6163,12	10087,63	7469,16	6433,81	9844,54	11713,16						
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		13593,31	21412,95	26457,28	32981,58	36181,74	40771,06	47977,13	57978,56							
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	44	43	40	40	40	38	37								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	43,5	33,0	29,0	27,0	26,0	22,5	21,0								
	Leistungsausgaben	Mean	13512,75	10660,43	9731,17	6020,21	4826,63	10661,43	4873,07	2762,41							
		CI Mean	[8943,33; 18082,17]	[8907,64; 12413,22]	[6328,67; 13133,67]	[2912,12; 9128,30]	[2299,03; 7354,23]	[0,00; 22965,91]	[2517,71; 7228,42]	[1807,78; 3717,04]							
		SD	29350,80	5898,19	9972,38	8539,58	6700,91	32010,61	5700,22	2231,97							
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		10660,43	20745,84	27634,98	31278,23	41939,66	47729,93	44496,45								
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	71	68	66	64	64	63									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	65,5	49,0	45,0	44,0	42,5	36,5									
	Leistungsausgaben	Mean	12907,72	13654,98	10931,06	6615,08	4457,43	3972,50	5540,50								
		CI Mean	[10593,85; 15221,58]	[11595,76; 15714,20]	[7485,50; 14376,63]	[4377,76; 8852,40]	[2966,17; 5948,70]	[2396,01; 5548,99]	[2630,08; 8450,93]								
		SD	17390,51	8502,89	12305,58	7657,35	5046,90	5243,60	8971,12								
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		13654,98	23374,97	30150,64	34474,50	38666,67	44866,70									
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	61	60	60	60	59										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	61,0	46,0	44,0	44,0	38,5										
	Leistungsausgaben	Mean	11567,84	11266,38	9682,37	5731,32	4133,62	3072,21									
		CI Mean	[9128,49; 14007,20]	[9779,90; 12752,87]	[6758,97; 12605,78]	[3345,89; 8116,74]	[2295,75; 5971,48]	[1233,45; 4910,98]									
		SD	16346,06	5923,38	10116,08	8073,02	6219,91	5821,03									
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		11266,38	21143,07	26412,76	30546,37	34724,41										
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	60	58	56	53											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	59,0	50,0	45,5	40,0											
	Leistungsausgaben	Mean	15056,82	14048,29	10873,44	6776,57	4202,34										
		CI Mean	[11974,81; 18138,83]	[10830,60; 17265,97]	[8092,68; 13654,19]	[4304,08; 9249,06]	[1933,21; 6471,47]										
		SD	18304,09	12609,96	10032,10	8509,11	7322,06										
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		14048,29	23938,68	30755,03	32297,90											
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	58	58	58												
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	58,0	50,0	42,5												
	Leistungsausgaben	Mean	18569,20	11773,12	10815,25	7483,83											
		CI Mean	[13990,04; 23148,35]	[10045,52; 13500,72]	[7461,14; 14169,36]	[4504,83; 10462,83]											
		SD	22469,85	6712,76	12100,57	9908,53											
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		11773,12	22530,72	30523,88												
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	55	54													
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	54,5	42,5													
	Leistungsausgaben	Mean	16710,12	10837,49	8355,06												
		CI Mean	[11309,17; 22111,07]	[9164,12; 12510,86]	[5654,59; 11055,54]												
		SD	17964,23	6302,80	8982,11												
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		10837,49	19230,45													
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	96														
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	93,0														
	Leistungsausgaben	Mean	12814,70														
		CI Mean	[11309,10; 14320,30]														
		SD	7407,90														
Leistungsausgaben kumuliert	Mean	12814,70															

Auswertungskapitel 11: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung

In den folgenden Tabelle 11.1 werden die Kosten für Qualitätssicherung und Verwaltung des DMP-Programms pro eingeschriebener Patientin und Kalenderjahr ausgewiesen; eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Zu beachten ist dabei, dass alle eingeschriebenen Patientinnen in die Berechnung eingehen; im Gegensatz zu den bisherigen Auswertungen im ökonomischen Berichtsteil wird also nicht auf eine Stichprobe zurückgegriffen. Da die Durchschnittskosten auch von der Anzahl der Programmteilnehmer abhängen, werden zur Information zudem die Versichertenjahre im Programm ausgewiesen.

Zu beachten ist zudem, dass am 01.01.2011 die AOK Brandenburg, AOK Berlin und AOK Mecklenburg-Vorpommern zur AOK Nordost fusionierten. Ab dem Jahr 2011 können die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung nicht mehr getrennt für die einzelnen Regionen erhoben werden. Die Angaben in den betreffenden drei Berichten sind daher ab diesem Zeitpunkt identisch.

Tabelle 11.1 Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmerin und Jahr und Versichertenjahre²³

EZ	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Verwaltungskosten in Euro	168,34	70,16	37,28	29,22	22,02	30,64	22,14	21,53
Qualitätssicherungskosten in Euro	- -	14,07	9,13	6,80	6,28	5,60	2,74	7,89
Gesamtkosten in Euro	168,34	84,23	46,41	36,02	28,30	36,24	24,88	29,42
zur Information: Versichertenjahre im Programm	21,0	396,0	638,3	967,2	1188,0	1166,0	106969,0	97477,0

²³ Die Kosten der Qualitätssicherung und Verwaltung ergeben sich aus den gemäß den Vorgaben des BVA gebuchten Aufwendungen und deren Verhältnis zu Versicherten in Jahren. Sollten in vorangegangenen Berichten Beträge enthalten sein, die vor Abschluss des Haushaltsjahres ermittelt wurden, oder Zahlen zu den Versichertenjahren verwendet worden seien, die vor Erstellung der amtlichen Statistiken ermittelt wurden, so können diese Zahlen u.U. von den Zahlen des aktuellen Berichtes abweichen, da sie im Nachhinein nochmals aktualisiert wurden. Zu beachten ist zudem, dass fusionsbedingt die Angaben von Versicherten der (ehemaligen) See-Krankenkasse ab 2008 nicht mehr in den AOK-, sondern in den Knappschaftsberichten berücksichtigt werden.

Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität

Ein Bestandteil der Evaluation ist die Analyse, wie sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patientinnen im Laufe der Teilnahme an Disease-Management-Programmen verändert. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen. Es handelt sich um ein standardisiertes Instrument, das von Patienten selbst ausgefüllt werden kann und auf seine metrischen Eigenschaften hin mit guten Ergebnissen geprüft wurde. Der SF-36 entstand im Rahmen der Medical Outcome Study (MOS) und ist die Kurzform einer 149 Items umfassenden Fragebatterie zur Funktionsfähigkeit und Lebensqualität. Der Fragebogen umfasst insgesamt 36 Items. Erfasst werden damit 8 Dimensionen der Gesundheit mit jeweils 2-10 Items sowie die Gesundheitsveränderungen in den vergangenen 12 Monaten mittels einer Frage. Die Skalen beinhalten folgende Dimensionen des Gesundheitszustandes:

- Körperliche Funktionsfähigkeit,
- Körperliche Rollenfunktion,
- Körperliche Schmerzen,
- Allgemeine Gesundheitswahrnehmung,
- Vitalität,
- Soziale Funktionsfähigkeit,
- Emotionale Rollenfunktion,
- Psychisches Wohlbefinden.

Die Bearbeitungszeit des SF-36 wird von den Entwicklern auf 8-15 Min. geschätzt. Der Fragebogen kann in zwei verschiedenen Versionen eingesetzt werden. Eine davon bezieht die Fragen rückblickend auf eine Woche, die andere im Rahmen der Evaluation der strukturierten Behandlungsprogramme eingesetzte Version hat ein Zeitfenster von 4 zurückliegenden Wochen (vgl. Bullinger/ Kirchberger 1998).²⁴

Die Veränderungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität werden mittels des SF 36 schriftlich erhoben. Der Versand der Fragebögen erfolgt durch die jeweils zuständige Krankenkasse. Dem Fragebogen ist ein standardisiertes Anschreiben, das zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und dem BVA abgestimmt wurde, beigelegt.

Analog zu den ökonomischen Auswertungen basieren auch die Auswertungen zum SF-36 nicht auf den Daten aller Patientinnen, sondern auf einer **Stichprobe**.

Entsprechend beträgt der Stichprobenumfang in der Regel zehn Prozent der Patientenzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patientinnen.²⁵ Bei Kohorten mit weniger als 100 Patientinnen werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patientinnen umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.²⁶

Ab Frühjahr 2012 (Kohorte 2011-1) werden für die ökonomischen Auswertungen dieselben Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 befragt, für welche auch die SF36-Lebensqualitätsbefragung durchgeführt wird. Davor wurde die SF36-Stichprobe unabhängig von der Stichprobe für die ökonomischen Auswertungen gezogen.

Zu beachten ist dabei, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis, die sich ggf. auch durch die endgültige Datenaufbereitung ergeben, können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patientinnen im Berichtsteil I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

²⁴ Bullinger M., Kirchberger I: SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand, Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie 1998.

²⁵ Zu den fusionsbedingten Besonderheiten siehe Einleitung zu Berichtsteil II „Evaluation der ökonomischen Inhalte“.

²⁶ Fusionsbedingt können die Stichproben in den AOK-Berichten kleiner und in den Knappschafts-Berichten größer ausfallen als gemäß obiger Beschreibung zu erwarten wäre. Sofern die Stichprobe Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse enthielt, mussten diese mit der evaluationsseitigen Umsetzung der Fusion von Knappschaft und ehemaliger See-Krankenkasse aus den Auswertungen der AOK-Berichte ausgeschlossen und in die Auswertungen der Knappschaftsberichte aufgenommen werden.

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wird ab der Eintrittskohorte 2006-2 erhoben. Für frühere Kohorten entfällt die Befragung zur Lebensqualität. Die Erstbefragung findet nach dem Beitrittsjahr statt; Wiederholungsbefragungen erfolgen in zweijährigen Abständen. Der vorliegende Bericht enthält somit Auswertungen zum SF-36 für die Erst-, Zweit- und Drittbefragung der Kohorten 2006-2 und 2007-1, für die Erst- und Zweitbefragungen der Kohorten 2007-2 bis 2009-1 sowie für die Erstbefragung der Kohorten 2009-2 bis 2011-1.

Um die gesundheitsbezogene Lebensqualität auszuwerten und darzustellen, werden die Items des Fragebogens nach einem standardisierten Algorithmus zu Skalenwerten verdichtet, die verschiedene Dimensionen des allgemeinen Gesundheitszustandes abbilden. Durch eine Transformation der Skalenrohre können alle Skalen Werte zwischen „0“ und „100“ annehmen. Der Wert „100“ stellt dabei den Bestwert dar, d.h. je höher der Wert auf einer Skala für eine Patientin ausfällt, desto besser ist ihr Gesundheitszustand in dieser Dimension. Neben den acht Subskalen des SF-36 können durch die Gewichtung von Items zwei übergeordnete Dimensionen, d.h. eine körperliche Summenskala und eine psychische Summenskala berechnet werden, in die jeweils mehrere Skalenwerte eingehen. Diese können ebenfalls Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) annehmen.


Die Ergebnisse zur Lebensqualität beinhalten eine differenzierte Darstellung der Zahl der versendeten Fragebögen und des Rücklaufes je Kohorte und Erhebungszeitpunkt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in den durch den SF-36 erfassten Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie des Items „Veränderung der Gesundheit“ je Kohorte im Zeitverlauf aufgezeigt.

Die Lebensqualität und ihre Veränderung im Zeitverlauf werden zudem anhand eines Indexwertes, dem SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) evaluiert. Der SF-6D ist ein krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität in Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand) bis 1 (bestmöglicher Gesundheitszustand). Der SF-6D kann aus Erhebungsdaten des SF-36 anhand von 11 dazu benötigten Items mit jeweils zwei bis sechs Antwortabstufungen extrahiert werden. Der SF-6D umfasst insgesamt sechs Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität: Körperliche Funktionsfähigkeit, Rollenfunktion, Soziale Funktionsfähigkeit, Schmerz, Psychisches Wohlbefinden, Vitalität. In der folgenden Übersicht findet sich eine Gegenüberstellung der Items, welche in die Sub- bzw. Summenskalen und den SF-6D-Gesamtindex eingehen. Dabei wird deutlich, dass nur eine geringe Anzahl von Items sowohl bei der Bildung der Summenskalen als auch bei der Bildung des SF-6D- Gesamtindex berücksichtigt werden. Daher gilt, dass der Indexwert des SF-6D-Gesamtindex (siehe Tab.8.12) nicht die Summe der Indexwerte der körperlichen Summenskala (siehe Tab. 8.10) und der Psychischen Summenskala (siehe Tab. 8.11) darstellt.²⁷

Der SF-6D wurde mit der Zielsetzung entwickelt, einen patientennahen Ergebnisindikator wie die gesundheitsbezogene Lebensqualität in gesundheitsökonomischen Studien zur Effizienz- und Effektivitätsbeurteilung z.B. den Kosten einer Behandlungsmaßnahme entgegen zu setzen. Dazu ist es notwendig, die Lebensqualität, die physische, psychische und soziale Aspekte von Gesundheit umfasst, zu einem einzigen Indexwert zu aggregieren.

²⁷ Bullinger M., Kirchberger I: SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand, Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie 1998; S. 60

Abb. III.1 Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex



Auswertungskapitel 12: Rücklaufstatistik

Tabelle 12.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patientinnen für die Auswertungen zur Lebensqualität zur Verfügung standen.

Zur Berechnung der Durchschnittswerte für die Indikatoren der Lebensqualität ist jedoch nicht die Zahl der Patientinnen zu Beginn des Berichtshalbjahres relevant, sondern die Zahl der Patientinnen, für die in der jeweiligen Befragung die erforderlichen Angaben vorliegen. Daher werden in den folgenden Tabellen differenziertere Angaben gemacht. In der ersten Zeile wird ausgewiesen, wie viele Patientinnen die Stichprobe für die Befragung insgesamt umfasste (Brutto-Stichprobe). Anschließend wird dargestellt, wie groß der Stichprobenumfang nach Bereinigung um „neutrale Ausfälle“ war, also um Patientinnen, welche an der Befragung nicht mehr teilnehmen konnten, weil sie nach der Stichprobenziehung aus dem Programm ausgeschieden, verstorben, unbekannt verzogen oder nicht mehr Mitglied der Krankenkasse waren, die das evaluierte DMP anbietet (Netto-

Stichprobe). Anschließend wird dargestellt, wie viele Patientinnen den Fragebogen insgesamt zurückgesendet haben,²⁸ wie viele Patientinnen den Fragebogen *vollständig* ausgefüllt haben und welchem Anteil an der Brutto- bzw. Netto-Stichprobe dies jeweils entspricht.

Da die Befragung zur Lebensqualität erst ab der Kohorte 2006-2 durchgeführt wird, können für vorherige Kohorten keine Auswertungen erfolgen. Da die Befragung alle zwei Jahre erfolgt, kann im vorliegenden Bericht zudem nur die Erstbefragung nach dem Beitrittsjahr ausgewiesen werden.

In der Kohorte 2007-1 umfasst die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. Nach Bereinigung um neutrale Ausfälle umfasste die Netto-Stichprobe 96 Patientinnen. 63 von ihnen schickten den Fragebogen zurück. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 65,63 Prozent der Netto-Stichprobe. Bei der ersten Wiederholungsbefragung der Patientinnen dieser Kohorte 2007-1 lag die Rücklaufquote bei 71,88 Prozent.

Tabelle 12.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	92	56	47
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	86	53	42
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	68	38	33
		Anteil an Brutto-SP in %	73,91	67,86	70,21
		Anteil an Netto-SP in %	79,07	71,70	78,57
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	63	34	29
		Anteil an Brutto-SP in %	68,48	60,71	61,70
Anteil an Netto-SP in %		73,26	64,15	69,05	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>	
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	68	51
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	96	64	48
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	63	46	36
		Anteil an Brutto-SP in %	63,00	67,65	70,59
		Anteil an Netto-SP in %	65,63	71,88	75,00
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	59	44	34
		Anteil an Brutto-SP in %	59,00	64,71	66,67
Anteil an Netto-SP in %		61,46	68,75	70,83	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	59	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	98	59	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	65	32	
		Anteil an Brutto-SP in %	65,00	54,24	
		Anteil an Netto-SP in %	66,33	54,24	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	59	30	
		Anteil an Brutto-SP in %	59,00	50,85	
Anteil an Netto-SP in %		60,20	50,85		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>		
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	63	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	91	63	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	75	38	
		Anteil an Brutto-SP in %	75,00	60,32	
		Anteil an Netto-SP in %	82,42	60,32	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	70	34	
		Anteil an Brutto-SP in %	70,00	53,97	
Anteil an Netto-SP in %		76,92	53,97		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>		

²⁸ Die an dieser Stelle ausgewiesene Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen kann - insbesondere in den von der Fusion betroffenen Halbjahren bis 2008-1 - von der entsprechenden Anzahl in den spezifischen Tabellen 13.1 bis 13.12 leicht abweichen. Auf die Anzahl der auswertbaren Fragebögen und damit auf die Auswertungsergebnisse zur Lebensqualität hat dies keinen Einfluss.

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	61
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	92	61
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	64	42
		Anteil an Brutto-SP in %	64,00	68,85
		Anteil an Netto-SP in %	69,57	68,85
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	53	38
		Anteil an Brutto-SP in %	53,00	62,30
Anteil an Netto-SP in %		57,61	62,30	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	74
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	99	72
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	66	52
		Anteil an Brutto-SP in %	66,00	70,27
		Anteil an Netto-SP in %	66,67	72,22
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	61	49
		Anteil an Brutto-SP in %	61,00	66,22
Anteil an Netto-SP in %		61,62	68,06	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	100	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	54	
		Anteil an Brutto-SP in %	54,00	
		Anteil an Netto-SP in %	54,00	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	48	
		Anteil an Brutto-SP in %	48,00	
Anteil an Netto-SP in %		48,00		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>		
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	100	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	62	
		Anteil an Brutto-SP in %	62,00	
		Anteil an Netto-SP in %	62,00	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	60	
		Anteil an Brutto-SP in %	60,00	
Anteil an Netto-SP in %		60,00		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>		
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	83	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	54	
		Anteil an Brutto-SP in %	54,00	
		Anteil an Netto-SP in %	65,06	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	46	
		Anteil an Brutto-SP in %	46,00	
Anteil an Netto-SP in %		55,42		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	100	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	92	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	63	
		Anteil an Brutto-SP in %	63,00	
		Anteil an Netto-SP in %	68,48	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	61	
		Anteil an Brutto-SP in %	61,00	
Anteil an Netto-SP in %		66,30		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>		

Auswertungskapitel 13: Auswertungen zur Lebensqualität

Tabelle 13.1 gibt Auskunft über den **Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr**. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen die vergleichende Frage zum Gesundheitszustand im vergangenen Jahr beantwortet haben. Anschließend wird für diese Personengruppe ausgewiesen, wie sich die Antworten auf einer Skala von 1 „viel besser“ bis 5 „viel schlechter“ verteilen.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 62 Patientinnen hatten die Frage zum Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr beantwortet. 3 von ihnen ging es zum Zeitpunkt der Befragung im Vergleich zum vergangenen Jahr viel besser, 9 Patientinnen ging es etwas besser.

Bei der ersten Wiederholungsbefragung der Kohorte 2007-1 sendeten 46 Patientinnen den Fragebogen zurück. Die Fragen zum Gesundheitszustand im Vergleich zum Vorjahr hatten 45 von ihnen beantwortet. Viel besser als im Vergleich zum Vorjahr ging es 1 Patientinnen, etwas besser ging es 9 Patientinnen.

Tabelle 13.1 Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangem Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	100,00	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	73,91	67,86	70,21
	(1) viel besser	Anzahl	3	0	1
	(2) etwas besser	Anzahl	16	5	5
	(3) etwa gleich	Anzahl	19	18	17
	(4) etwas schlechter	Anzahl	19	11	8
	(5) viel schlechter	Anzahl	11	4	2
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	62	45	34
		Anteil in %	98,41	97,83	94,44
		Anteil 2 in %	62,00	66,18	66,67
	(1) viel besser	Anzahl	3	1	2
	(2) etwas besser	Anzahl	9	9	3
	(3) etwa gleich	Anzahl	18	23	17
	(4) etwas schlechter	Anzahl	25	10	11
	(5) viel schlechter	Anzahl	7	2	1
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	63	32	
		Anteil in %	96,92	100,00	
		Anteil 2 in %	63,00	54,24	
	(1) viel besser	Anzahl	3	1	
	(2) etwas besser	Anzahl	10	4	
	(3) etwa gleich	Anzahl	9	12	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	29	10	
	(5) viel schlechter	Anzahl	12	5	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>		

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	74	38
		Anteil in %	98,67	100,00
		Anteil 2 in %	74,00	60,32
	(1) viel besser	Anzahl	4	0
	(2) etwas besser	Anzahl	7	4
	(3) etwa gleich	Anzahl	16	23
	(4) etwas schlechter	Anzahl	32	9
	(5) viel schlechter	Anzahl	15	2
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>	
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	61
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	59	42
		Anteil in %	92,19	100,00
		Anteil 2 in %	59,00	68,85
	(1) viel besser	Anzahl	5	1
	(2) etwas besser	Anzahl	8	5
	(3) etwa gleich	Anzahl	16	17
	(4) etwas schlechter	Anzahl	18	13
	(5) viel schlechter	Anzahl	12	6
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	74
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	63	52
		Anteil in %	95,45	100,00
		Anteil 2 in %	63,00	70,27
	(1) viel besser	Anzahl	3	3
	(2) etwas besser	Anzahl	2	11
	(3) etwa gleich	Anzahl	14	23
	(4) etwas schlechter	Anzahl	26	14
	(5) viel schlechter	Anzahl	18	1
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	52	
		Anteil in %	96,30	
		Anteil 2 in %	52,00	
	(1) viel besser	Anzahl	2	
	(2) etwas besser	Anzahl	9	
	(3) etwa gleich	Anzahl	9	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	21	
	(5) viel schlechter	Anzahl	11	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>		
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	61	
		Anteil in %	98,39	
		Anteil 2 in %	61,00	
	(1) viel besser	Anzahl	5	
	(2) etwas besser	Anzahl	13	
	(3) etwa gleich	Anzahl	18	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	16	
	(5) viel schlechter	Anzahl	9	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>		

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu verganginem Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
	(1) viel besser	Anzahl	4	
	(2) etwas besser	Anzahl	10	
	(3) etwa gleich	Anzahl	16	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	10	
	(5) viel schlechter	Anzahl	14	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	63	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	63,00	
	(1) viel besser	Anzahl	2	
	(2) etwas besser	Anzahl	8	
	(3) etwa gleich	Anzahl	19	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	22	
	(5) viel schlechter	Anzahl	12	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>		

Tabelle 13.2 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (besten Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 63 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Körperliche Funktionsfähigkeit" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 47,29.

46 Patientinnen sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 97,83 Prozent die Fragen zur körperlichen Funktionsfähigkeit beantwortet, so dass sie für die Skala auswertbar waren. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 50,56.

Tabelle 13.2 SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	67	37	33
		Anteil in %	98,53	97,37	100,00
		Anteil 2 in %*	72,83	66,07	70,21
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,05	42,14	39,07
		SD	26,00	24,28	27,77
		CI	[34,83; 47,28]	[34,32; 49,96]	[29,60; 48,55]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	94,44
		z-Wert	-1,90	-1,85	-1,99
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
	2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
für Skala auswertbar		Anzahl	63	45	36
		Anteil in %	100,00	97,83	100,00
		Anteil 2 in %*	63,00	66,18	70,59
transformierte Skalenwerte		Mean	47,29	50,56	55,45
		SD	27,94	29,37	29,24
		CI	[40,39; 54,19]	[41,97; 59,14]	[45,90; 65,00]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	95,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,63	-1,48	-1,27
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	100,00	100,00	
		Anteil 2 in %*	65,00	54,24	
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,99	42,86	
		SD	25,45	30,01	
		CI	[35,80; 48,18]	[32,47; 53,26]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	94,44	100,00	
		z-Wert	-1,86	-1,82	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	73	38
		Anteil in %	97,33	100,00
		Anteil 2 in %	73,00	60,32
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,98	41,21
		SD	27,66	27,73
		CI	[42,64; 55,33]	[32,40; 50,03]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	85,00
		z-Wert	-1,55	-1,89
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	61
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	41
		Anteil in %	98,44	97,62
		Anteil 2 in %	63,00	67,21
	transformierte Skalenwerte	Mean	40,52	33,82
		SD	28,73	25,58
		CI	[33,42; 47,61]	[25,99; 41,65]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,92	-2,21
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	74
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	52
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	66,00	70,27
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,88	52,49
		SD	26,38	29,43
		CI	[35,51; 48,24]	[44,49; 60,49]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	95,00	100,00
		z-Wert	-1,86	-1,40
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,08	
		SD	27,11	
		CI	[35,85; 50,31]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,81	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,22	
		SD	29,74	
		CI	[44,82; 59,63]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,41	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	53	
		Anteil in %	98,15	
		Anteil 2 in %	53,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,37	
		SD	31,01	
		CI	[40,03; 56,72]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,58	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	63,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,38	
		SD	30,60	
		CI	[35,83; 50,94]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	95,00	
		z-Wert	-1,80	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

Tabelle 13.3 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 62 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Körperliche Rollenfunktion" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 23,79.

46 Patientinnen sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,65 Prozent alle Fragen zur körperlichen Rollenfunktion beantwortet und konnten daher für die Skala ausgewertet werden. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 25,76.

Tabelle 13.3 SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr		
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33	
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21	
	für Skala auswertbar	Anzahl	67	36	31	
		Anteil in %	98,53	94,74	93,94	
		Anteil 2 in %*	72,83	64,29	65,96	
	transformierte Skalenwerte	Mean	19,78	32,64	21,77	
		SD	35,76	43,02	36,94	
		CI	[11,21; 28,34]	[18,59; 46,69]	[8,77; 34,78]	
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,82	-1,44	-1,76	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
	2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
		mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
Anteil in %			63,00	67,65	70,59	
für Skala auswertbar		Anzahl	62	44	36	
		Anteil in %	98,41	95,65	100,00	
		Anteil 2 in %*	62,00	64,71	70,59	
transformierte Skalenwerte		Mean	23,79	25,76	36,11	
		SD	36,34	38,41	44,10	
		CI	[14,75; 32,83]	[14,41; 37,11]	[21,71; 50,52]	
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,70	-1,64	-1,33	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
		mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
	Anteil in %		65,00	54,24		
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	31		
		Anteil in %	100,00	96,88		
		Anteil 2 in %*	65,00	52,54		
	transformierte Skalenwerte	Mean	18,46	20,16		
		SD	30,39	33,18		
		CI	[11,07; 25,85]	[8,48; 31,84]		
		Range: Min.	0,00	0,00		
		Range: Max.	100,00	100,00		
		z-Wert	-1,86	-1,81		
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	73	36
		Anteil in %	97,33	94,74
		Anteil 2 in %	73,00	57,14
	transformierte Skalenwerte	Mean	26,71	31,94
		SD	36,40	39,92
		CI	[18,36; 35,06]	[18,91; 44,98]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,61	-1,46
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	61
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
	für Skala auswertbar	Anzahl	59	39
		Anteil in %	92,19	92,86
		Anteil 2 in %	59,00	63,93
	transformierte Skalenwerte	Mean	21,19	17,31
		SD	33,09	32,01
		CI	[12,74; 29,63]	[7,26; 27,35]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,78	-1,89
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	74
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	50
		Anteil in %	100,00	96,15
		Anteil 2 in %	66,00	67,57
	transformierte Skalenwerte	Mean	23,48	39,50
		SD	35,05	46,86
		CI	[15,03; 31,94]	[26,51; 52,49]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,71	-1,23
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	53	
		Anteil in %	98,15	
		Anteil 2 in %	53,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	18,40	
		SD	30,68	
		CI	[10,14; 26,66]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,86	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	
		Anteil in %	98,39	
		Anteil 2 in %	61,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	27,87	
		SD	39,55	
		CI	[17,94; 37,80]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,58	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	50	
		Anteil in %	92,59	
		Anteil 2 in %	50,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	21,00	
		SD	34,39	
		CI	[11,47; 30,53]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,78	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	98,41	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	25,40	
		SD	37,19	
		CI	[16,15; 34,66]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,65	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

Tabelle 13.4 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zu **Körperlichen Schmerzen**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 63 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Körperliche Schmerzen" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 52,75.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 97,83 Prozent alle Fragen zum Thema „Körperliche Schmerzen“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 54,67.

Tabelle 13.4 SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	100,00	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	73,91	67,86	70,21
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,01	50,42	54,97
		SD	24,23	28,60	25,84
		CI	[39,26; 50,77]	[41,33; 59,51]	[46,15; 63,79]
		Range: Min.	0,00	12,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,29	-1,06	-0,87
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	45	36
		Anteil in %	100,00	97,83	100,00
		Anteil 2 in %*	63,00	66,18	70,59
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,75	54,67	53,61
		SD	28,72	30,38	29,48
		CI	[45,65; 59,84]	[45,79; 63,54]	[43,98; 63,24]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,97	-0,88	-0,93
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	100,00	100,00	
		Anteil 2 in %*	65,00	54,24	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,97	49,72	
		SD	25,40	28,47	
		CI	[44,79; 57,15]	[39,86; 59,58]	
		Range: Min.	10,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,04	-1,09	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	75	36
		Anteil in %	100,00	94,74
		Anteil 2 in %	75,00	57,14
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,96	52,75
		SD	28,47	27,47
		CI	[47,52; 60,40]	[43,78; 61,72]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,91	-0,97
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
für Skala auswertbar		Anzahl	64	42
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	64,00	68,85
transformierte Skalenwerte		Mean	49,97	44,31
		SD	28,67	27,59
		CI	[42,94; 56,99]	[35,97; 52,65]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,08	-1,32
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	52
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	66,00	70,27
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,03	56,94
		SD	27,08	30,34
		CI	[41,50; 54,56]	[48,70; 65,19]
		Range: Min.	12,00	10,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,17	-0,79
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
für Skala auswertbar		Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
transformierte Skalenwerte		Mean	50,80	
		SD	26,92	
		CI	[43,62; 57,98]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,05	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,23	
		SD	26,57	
		CI	[46,61; 59,84]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,95	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,94	
		SD	31,69	
		CI	[41,49; 58,40]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,08	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	63,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,70	
		SD	29,25	
		CI	[42,48; 56,92]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,09	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

Tabelle 13.5 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Allgemeinen Gesundheitswahrnehmung**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (besten Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 61 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Allgemeine Gesundheitswahrnehmung" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 49,62.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,65 Prozent alle Fragen zur allgemeinen Gesundheitswahrnehmung beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 47,85.

Tabelle 13.5 SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	37	32
		Anteil in %	97,06	97,37	96,97
		Anteil 2 in %*	71,74	66,07	68,09
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,16	41,86	43,88
		SD	17,88	18,42	15,97
		CI	[40,85; 49,48]	[35,93; 47,80]	[38,35; 49,42]
		Range: Min.	10,00	15,00	10,00
		Range: Max.	82,00	87,00	83,75
		z-Wert	-1,34	-1,50	-1,40
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	44	36
		Anteil in %	96,83	95,65	100,00
		Anteil 2 in %*	61,00	64,71	70,59
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,62	47,85	51,13
		SD	19,23	18,71	21,55
		CI	[44,80; 54,45]	[42,32; 53,38]	[44,09; 58,17]
		Range: Min.	5,00	15,00	15,00
		Range: Max.	92,00	92,00	97,00
		z-Wert	-1,12	-1,21	-1,05
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	31	
		Anteil in %	100,00	96,88	
		Anteil 2 in %*	65,00	52,54	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,18	45,80	
		SD	18,07	18,86	
		CI	[40,79; 49,58]	[39,16; 52,44]	
		Range: Min.	10,00	10,00	
		Range: Max.	92,00	92,00	
		z-Wert	-1,34	-1,31	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	75	37
		Anteil in %	100,00	97,37
		Anteil 2 in %	75,00	58,73
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,49	48,75
		SD	20,13	17,28
		CI	[40,93; 50,05]	[43,18; 54,32]
		Range: Min.	8,33	10,00
		Range: Max.	92,00	87,00
		z-Wert	-1,32	-1,16
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
für Skala auswertbar		Anzahl	63	40
		Anteil in %	98,44	95,24
		Anteil 2 in %	63,00	65,57
transformierte Skalenwerte		Mean	43,36	39,28
		SD	18,06	18,90
		CI	[38,90; 47,82]	[33,42; 45,14]
		Range: Min.	10,00	5,00
		Range: Max.	92,00	82,00
		z-Wert	-1,43	-1,63
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	52
		Anteil in %	98,48	100,00
		Anteil 2 in %	65,00	70,27
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,57	49,53
		SD	16,71	21,41
		CI	[39,50; 47,63]	[43,71; 55,35]
		Range: Min.	15,00	15,00
		Range: Max.	87,00	97,00
		z-Wert	-1,42	-1,12
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
für Skala auswertbar		Anzahl	52	
		Anteil in %	96,30	
		Anteil 2 in %	52,00	
transformierte Skalenwerte		Mean	42,94	
		SD	17,08	
		CI	[38,30; 47,58]	
		Range: Min.	8,33	
		Range: Max.	82,00	
		z-Wert	-1,45	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,47	
		SD	19,04	
		CI	[41,73; 51,21]	
		Range: Min.	15,00	
		Range: Max.	87,00	
		z-Wert	-1,28	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	51	
		Anteil in %	94,44	
		Anteil 2 in %	51,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,07	
		SD	22,58	
		CI	[40,87; 53,27]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	97,00	
		z-Wert	-1,25	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	98,41	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,77	
		SD	20,86	
		CI	[41,58; 51,96]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,26	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

Tabelle 13.6 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Vitalität**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 63 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Vitalität" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 43,78.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,65 Prozent alle Fragen zum Thema „Vitalität“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 46,86.

Tabelle 13.6 SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	68	37	33
		Anteil in %	100,00	97,37	100,00
		Anteil 2 in %*	73,91	66,07	70,21
	transformierte Skalenwerte	Mean	39,71	42,12	42,32
		SD	17,93	17,00	13,50
		CI	[35,44; 43,97]	[36,64; 47,59]	[37,72; 46,93]
		Range: Min.	0,00	15,00	15,00
		Range: Max.	80,00	93,33	70,00
		z-Wert	-1,02	-0,91	-0,90
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	44	36
		Anteil in %	100,00	95,65	100,00
		Anteil 2 in %*	63,00	64,71	70,59
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,78	46,86	46,99
		SD	20,95	19,86	20,12
		CI	[38,61; 48,96]	[40,99; 52,73]	[40,42; 53,56]
		Range: Min.	5,00	10,00	0,00
		Range: Max.	95,00	85,00	90,00
		z-Wert	-0,83	-0,68	-0,67
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	100,00	100,00	
		Anteil 2 in %*	65,00	54,24	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,23	37,19	
		SD	19,14	18,02	
		CI	[32,58; 41,88]	[30,94; 43,43]	
		Range: Min.	5,00	5,00	
		Range: Max.	100,00	70,00	
		z-Wert	-1,14	-1,14	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	74	37
		Anteil in %	98,67	97,37
		Anteil 2 in %	74,00	58,73
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,37	41,58
		SD	21,04	19,81
		CI	[36,58; 46,17]	[35,19; 47,96]
		Range: Min.	0,00	5,00
		Range: Max.	90,00	95,00
		z-Wert	-0,94	-0,93
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
für Skala auswertbar		Anzahl	63	41
		Anteil in %	98,44	97,62
		Anteil 2 in %	63,00	67,21
transformierte Skalenwerte		Mean	36,96	32,07
		SD	19,78	19,04
		CI	[32,07; 41,84]	[26,25; 37,90]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	65,00
		z-Wert	-1,15	-1,39
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	52
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	66,00	70,27
	transformierte Skalenwerte	Mean	40,76	46,44
		SD	20,93	21,22
		CI	[35,71; 45,81]	[40,67; 52,21]
		Range: Min.	0,00	5,00
		Range: Max.	95,00	90,00
		z-Wert	-0,97	-0,70
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
für Skala auswertbar		Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
transformierte Skalenwerte		Mean	40,31	
		SD	19,52	
		CI	[35,10; 45,51]	
		Range: Min.	5,00	
		Range: Max.	85,00	
		z-Wert	-0,99	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,23	
		SD	20,81	
		CI	[38,05; 48,40]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,85	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>	
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	52	
		Anteil in %	96,30	
		Anteil 2 in %	52,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	39,87	
		SD	18,65	
		CI	[34,80; 44,94]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	85,00	
		z-Wert	-1,02	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	63,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	39,58	
		SD	21,87	
		CI	[34,18; 44,98]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	90,00	
		z-Wert	-1,03	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

Tabelle 13.7 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Sozialen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 62 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Soziale Funktionsfähigkeit" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 65,52.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,65 Prozent alle Fragen zur sozialen Funktionsfähigkeit beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 67,90.

Tabelle 13.7 SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	68	37	33
		Anteil in %	100,00	97,37	100,00
		Anteil 2 in %*	73,91	66,07	70,21
	transformierte Skalenwerte	Mean	65,26	65,20	64,39
		SD	28,31	24,14	22,56
		CI	[58,53; 71,99]	[57,42; 72,98]	[56,70; 72,09]
		Range: Min.	0,00	12,50	25,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,82	-0,82	-0,86
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	44	36
		Anteil in %	98,41	95,65	100,00
		Anteil 2 in %*	62,00	64,71	70,59
	transformierte Skalenwerte	Mean	65,52	67,90	68,06
		SD	26,56	23,72	21,84
		CI	[58,91; 72,14]	[60,89; 74,91]	[60,92; 75,19]
		Range: Min.	12,50	0,00	25,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,81	-0,70	-0,69
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	100,00	100,00	
		Anteil 2 in %*	65,00	54,24	
	transformierte Skalenwerte	Mean	64,42	59,77	
		SD	28,32	29,74	
		CI	[57,54; 71,31]	[49,46; 70,07]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,86	-1,07	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	75	37
		Anteil in %	100,00	97,37
		Anteil 2 in %	75,00	58,73
	transformierte Skalenwerte	Mean	64,00	67,57
		SD	27,26	28,48
		CI	[57,83; 70,17]	[58,39; 76,75]
		Range: Min.	12,50	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,88	-0,72
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	61
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	41
		Anteil in %	98,44	97,62
		Anteil 2 in %	63,00	67,21
	transformierte Skalenwerte	Mean	55,95	53,05
		SD	28,65	30,08
		CI	[48,88; 63,03]	[43,84; 62,25]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,24	-1,37
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	74
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	52
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	66,00	70,27
	transformierte Skalenwerte	Mean	66,48	68,27
		SD	27,31	26,48
		CI	[59,89; 73,07]	[61,07; 75,47]
		Range: Min.	0,00	25,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,77	-0,69
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	65,97	
		SD	26,09	
		CI	[59,01; 72,93]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,79	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	65,32	
		SD	28,76	
		CI	[58,16; 72,48]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,82	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	59,72	
		SD	32,27	
		CI	[51,11; 68,33]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,07	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	63,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	65,28	
		SD	30,41	
		CI	[57,77; 72,79]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,82	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

Tabelle 13.8 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Emotionalen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 61 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Emotionale Rollenfunktion" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 43,17.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,65 Prozent alle Fragen zum Thema „Emotionale Rollenfunktion“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 58,33.

Tabelle 13.8 SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	64	34	31
		Anteil in %	94,12	89,47	93,94
		Anteil 2 in %*	69,57	60,71	65,96
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,98	44,12	45,16
		SD	44,49	44,74	46,78
		CI	[26,08; 47,88]	[29,08; 59,16]	[28,69; 61,63]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,34	-1,13	-1,09
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	44	36
		Anteil in %	96,83	95,65	100,00
		Anteil 2 in %*	61,00	64,71	70,59
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,17	58,33	53,70
		SD	46,49	44,97	48,65
		CI	[31,50; 54,83]	[45,05; 71,62]	[37,81; 69,60]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,15	-0,70	-0,84
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	30	
		Anteil in %	95,38	93,75	
		Anteil 2 in %*	62,00	50,85	
	transformierte Skalenwerte	Mean	39,78	42,22	
		SD	46,30	45,43	
		CI	[28,26; 51,31]	[25,97; 58,48]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,26	-1,18	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	72	37
		Anteil in %	96,00	97,37
		Anteil 2 in %	72,00	58,73
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,57	58,56
		SD	44,46	46,08
		CI	[26,30; 46,84]	[43,71; 73,41]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,35	-0,69
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	61
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
	für Skala auswertbar	Anzahl	60	39
		Anteil in %	93,75	92,86
		Anteil 2 in %	60,00	63,93
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,00	40,17
		SD	44,44	48,47
		CI	[23,76; 46,24]	[24,96; 55,38]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,40	-1,25
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	74
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	49
		Anteil in %	100,00	94,23
		Anteil 2 in %	66,00	66,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,45	49,66
		SD	46,28	46,71
		CI	[34,29; 56,62]	[36,58; 62,74]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,09	-0,96
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	52	
		Anteil in %	96,30	
		Anteil 2 in %	52,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,15	
		SD	47,21	
		CI	[33,32; 58,99]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,06	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	
		Anteil in %	98,39	
		Anteil 2 in %	61,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,72	
		SD	47,35	
		CI	[31,83; 55,60]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,14	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	47	
		Anteil in %	87,04	
		Anteil 2 in %	47,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,52	
		SD	46,49	
		CI	[34,23; 60,81]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,02	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	98,41	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,48	
		SD	45,92	
		CI	[24,05; 46,91]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,39	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>

Tabelle 13.9 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zum **psychischen Wohlbefinden**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 63 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Psychisches Wohlbefinden" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 61,52.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,65 Prozent alle Fragen zum psychischen Wohlbefinden beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 63,39.

Tabelle 13.9 SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	67	37	33
		Anteil in %	98,53	97,37	100,00
		Anteil 2 in %*	72,83	66,07	70,21
	transformierte Skalenwerte	Mean	55,80	57,95	58,67
		SD	19,81	18,37	18,72
		CI	[51,06; 60,54]	[52,03; 63,87]	[52,28; 65,05]
		Range: Min.	12,00	32,00	32,00
		Range: Max.	96,00	100,00	92,00
		z-Wert	-1,06	-0,94	-0,90
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	44	36
		Anteil in %	100,00	95,65	100,00
		Anteil 2 in %*	63,00	64,71	70,59
	transformierte Skalenwerte	Mean	61,52	63,39	59,78
		SD	20,44	19,69	19,48
		CI	[56,47; 66,57]	[57,57; 69,20]	[53,42; 66,14]
		Range: Min.	16,00	20,00	0,00
		Range: Max.	100,00	95,00	100,00
		z-Wert	-0,74	-0,64	-0,84
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	100,00	100,00	
		Anteil 2 in %*	65,00	54,24	
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,89	55,28	
		SD	21,48	21,81	
		CI	[51,67; 62,11]	[47,72; 62,84]	
		Range: Min.	8,00	4,00	
		Range: Max.	100,00	92,00	
		z-Wert	-1,00	-1,09	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	74	37
		Anteil in %	98,67	97,37
		Anteil 2 in %	74,00	58,73
	transformierte Skalenwerte	Mean	58,11	55,65
		SD	21,22	22,37
		CI	[53,27; 62,94]	[48,44; 62,86]
		Range: Min.	16,00	16,00
		Range: Max.	100,00	92,00
		z-Wert	-0,93	-1,07
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
für Skala auswertbar		Anzahl	63	41
		Anteil in %	98,44	97,62
		Anteil 2 in %	63,00	67,21
transformierte Skalenwerte		Mean	52,22	47,49
		SD	20,44	20,11
		CI	[47,17; 57,27]	[41,33; 53,64]
		Range: Min.	16,00	12,00
		Range: Max.	100,00	96,00
		z-Wert	-1,26	-1,52
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	52
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	66,00	70,27
	transformierte Skalenwerte	Mean	59,48	61,98
		SD	21,28	21,29
		CI	[54,35; 64,61]	[56,19; 67,77]
		Range: Min.	16,00	12,00
		Range: Max.	100,00	92,00
		z-Wert	-0,85	-0,71
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
für Skala auswertbar		Anzahl	54	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	54,00	
transformierte Skalenwerte		Mean	60,57	
		SD	19,73	
		CI	[55,31; 65,84]	
		Range: Min.	20,00	
		Range: Max.	96,00	
		z-Wert	-0,79	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>133</i>	

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	60,26	
		SD	21,15	
		CI	[54,99; 65,52]	
		Range: Min.	16,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,81	
		<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	52	
		Anteil in %	96,30	
		Anteil 2 in %	52,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	58,56	
		SD	21,95	
		CI	[52,59; 64,52]	
		Range: Min.	12,00	
		Range: Max.	92,00	
		z-Wert	-0,90	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	
		Anteil in %	98,41	
		Anteil 2 in %	62,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	57,76	
		SD	22,84	
		CI	[52,07; 63,44]	
		Range: Min.	12,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,95	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

Tabelle 13.10 gibt Auskunft über die **körperliche Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (besten Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 59 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der "Körperlichen Summenskala" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 34,95.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 36,36 Prozent alle nötigen Fragen, die „Körperliche Summenskala“ betreffend beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 35,01.

Tabelle 13.10 Körperliche Summenskala, Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	34	30
		Anteil in %	92,65	89,47	90,91
		Anteil 2 in %*	68,48	60,71	63,83
	transformierte Skalenwerte	Mean	33,10	34,03	32,48
		SD	9,10	9,67	10,14
		CI	[30,86; 35,35]	[30,78; 37,28]	[28,85; 36,11]
		Range: Min.	20,35	16,72	16,82
		Range: Max.	57,10	56,36	53,14
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
	2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
für Skala auswertbar		Anzahl	59	44	36
		Anteil in %	93,65	95,65	100,00
		Anteil 2 in %*	59,00	64,71	70,59
transformierte Skalenwerte		Mean	34,95	35,01	37,68
		SD	10,91	11,52	11,96
		CI	[32,16; 37,73]	[31,61; 38,41]	[33,77; 41,59]
		Range: Min.	11,21	7,10	12,28
		Range: Max.	57,71	57,70	58,30
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	30	
		Anteil in %	95,38	93,75	
		Anteil 2 in %*	62,00	50,85	
	transformierte Skalenwerte	Mean	33,22	33,34	
		SD	8,57	10,46	
		CI	[31,09; 35,35]	[29,59; 37,08]	
		Range: Min.	17,91	15,53	
		Range: Max.	51,11	55,60	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	70	34
		Anteil in %	93,33	89,47
		Anteil 2 in %*	70,00	53,97
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,38	34,40
		SD	10,08	10,71
		CI	[34,02; 38,75]	[30,80; 38,00]
		Range: Min.	14,44	15,49
		Range: Max.	59,22	56,37
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
für Skala auswertbar		Anzahl	58	38
		Anteil in %	90,63	90,48
		Anteil 2 in %*	58,00	62,30
transformierte Skalenwerte		Mean	33,93	31,30
		SD	9,32	9,42
		CI	[31,53; 36,33]	[28,30; 34,30]
		Range: Min.	14,79	12,52
		Range: Max.	59,86	59,57
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	49
		Anteil in %	98,48	94,23
		Anteil 2 in %*	65,00	66,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	32,70	37,71
		SD	10,05	12,00
		CI	[30,26; 35,14]	[34,35; 41,07]
		Range: Min.	15,50	20,76
		Range: Max.	57,51	58,22
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
für Skala auswertbar		Anzahl	50	
		Anteil in %	92,59	
		Anteil 2 in %*	50,00	
transformierte Skalenwerte		Mean	32,46	
		SD	9,58	
		CI	[29,81; 35,12]	
		Range: Min.	15,91	
		Range: Max.	54,00	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>		

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	
		Anteil in %	98,39	
		Anteil 2 in %*	61,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,87	
		SD	10,92	
		CI	[33,13; 38,61]	
		Range: Min.	16,09	
		Range: Max.	58,30	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>	
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
für Skala auswertbar		Anzahl	46	
		Anteil in %	85,19	
		Anteil 2 in %*	46,00	
transformierte Skalenwerte		Mean	34,53	
		SD	11,70	
		CI	[31,15; 37,91]	
		Range: Min.	17,22	
		Range: Max.	56,60	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>114</i>	
2011-1		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	
		Anteil in %	96,83	
		Anteil 2 in %*	61,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	34,71	
		SD	10,62	
		CI	[32,05; 37,38]	
		Range: Min.	16,34	
		Range: Max.	56,23	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>	

Tabelle 13.11 gibt Auskunft über die **psychische Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 59 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der "Psychischen Summenskala" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 44,02.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 36 Prozent alle notwendigen Fragen für die Auswertung der „Psychische Summenskala“ beantwortet. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 46,75.

Tabelle 13.11 Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	34	30
		Anteil in %	92,65	89,47	90,91
		Anteil 2 in %*	68,48	60,71	63,83
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,91	43,71	43,81
		SD	11,63	10,12	11,05
		CI	[40,04; 45,79]	[40,31; 47,11]	[39,86; 47,77]
		Range: Min.	23,10	27,47	29,61
		Range: Max.	69,62	68,11	67,24
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68	51
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
	für Skala auswertbar	Anzahl	59	44	36
		Anteil in %	93,65	95,65	100,00
		Anteil 2 in %*	59,00	64,71	70,59
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,02	46,75	44,49
		SD	11,42	11,45	11,81
		CI	[41,10; 46,93]	[43,37; 50,14]	[40,63; 48,35]
		Range: Min.	13,20	23,66	12,14
		Range: Max.	65,65	66,57	61,48
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32	
		Anteil in %	65,00	54,24	
	für Skala auswertbar	Anzahl	62	30	
		Anteil in %	95,38	93,75	
		Anteil 2 in %*	62,00	50,85	
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,17	41,80	
		SD	12,50	13,03	
		CI	[39,06; 45,28]	[37,13; 46,46]	
		Range: Min.	17,32	15,81	
		Range: Max.	65,64	62,29	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	70	34
		Anteil in %	93,33	89,47
		Anteil 2 in %*	70,00	53,97
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,40	45,16
		SD	10,88	11,82
		CI	[39,85; 44,95]	[41,19; 49,13]
		Range: Min.	22,94	22,14
		Range: Max.	65,52	61,14
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
für Skala auswertbar		Anzahl	58	38
		Anteil in %	90,63	90,48
		Anteil 2 in %*	58,00	62,30
transformierte Skalenwerte		Mean	39,40	38,90
		SD	11,51	11,43
		CI	[36,43; 42,36]	[35,27; 42,53]
		Range: Min.	22,09	18,87
		Range: Max.	64,28	64,17
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>
2009-1		Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	65	49
		Anteil in %	98,48	94,23
		Anteil 2 in %*	65,00	66,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,72	44,61
		SD	12,72	11,78
		CI	[41,63; 47,81]	[41,31; 47,90]
		Range: Min.	22,02	23,07
		Range: Max.	68,52	66,93
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
für Skala auswertbar		Anzahl	50	
		Anteil in %	92,59	
		Anteil 2 in %*	50,00	
transformierte Skalenwerte		Mean	44,78	
		SD	12,28	
		CI	[41,38; 48,19]	
		Range: Max.	69,34	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>		

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	
		Anteil in %	98,39	
		Anteil 2 in %*	61,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,28	
		SD	11,70	
		CI	[40,34; 46,21]	
		Range: Min.	21,62	
Range: Max.		66,88		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>		
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	46	
		Anteil in %	85,19	
		Anteil 2 in %*	46,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,06	
		SD	11,42	
		CI	[40,76; 47,36]	
		Range: Min.	19,76	
Range: Max.		67,99		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	
		Anteil in %	96,83	
		Anteil 2 in %*	61,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,33	
		SD	12,54	
		CI	[39,18; 45,47]	
		Range: Min.	21,23	
Range: Max.		69,18		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>		

Tabelle 13.12 gibt Auskunft über den **SF-6D-Gesamtindex**. Der SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) ist krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität im Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand bis „1“ (bestmöglicher Gesundheitszustand).

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung des SF-6D-Gesamtindex herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall

zwischen kleinstem und größtem berechneten Indexwert. Darüber hinaus wird ausgewiesen, wie groß im Durchschnitt die Differenz zwischen den SF-6D-Indexwerten der aktuellen Befragung und der ersten Befragung nach dem Beitrittsjahr ausfällt. Da bislang nur die Erstbefragung vorgenommen wurde, sind hierzu in diesem Bericht noch keine Angaben möglich.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 100 Patientinnen. 63 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 59 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung des "SF-6D-Gesamtindex" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Indexwert bei 0,62.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 46 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 93,48 Prozent alle nötigen Fragen zur Ermittlung des „SF-6D-Gesamtindex“ beantwortet und wurden so für die Auswertung des Index berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 0,62.

Tabelle 13.12 SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.0

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	92	56	47
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	68	38	33
		Anteil in %	73,91	67,86	70,21
	für Skala auswertbar	Anzahl	66	34	31
		Anteil in %	97,06	89,47	93,94
		Anteil 2 in %	71,74	60,71	65,96
	Indexwert	Mean	0,59	0,60	0,62
		SD	0,13	0,12	0,12
		CI	[0,56; 0,62]	[0,56; 0,64]	[0,58; 0,66]
		Range: Min.	0,30	0,39	0,41
		Range: Max.	0,85	0,89	0,89
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,02	0,00
		CI		[-0,05; 0,01]	[-0,05; 0,04]
		Fallbasis		33	28
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>96</i>	<i>64</i>	<i>58</i>
	2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	68
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	63	46	36
		Anteil in %	63,00	67,65	70,59
für Skala auswertbar		Anzahl	59	43	33
		Anteil in %	93,65	93,48	91,67
		Anteil 2 in %	59,00	63,24	64,71
Indexwert		Mean	0,62	0,62	0,64
		SD	0,13	0,12	0,14
		CI	[0,58; 0,65]	[0,59; 0,66]	[0,59; 0,69]
		Range: Min.	0,32	0,30	0,33
		Range: Max.	0,89	0,85	0,97
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,01	0,01
		CI		[-0,04; 0,02]	[-0,04; 0,06]
		Fallbasis		36	30
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>129</i>	<i>100</i>	<i>93</i>

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittshalb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	59
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	65	32
		Anteil in %	65,00	54,24
	für Skala auswertbar	Anzahl	63	31
		Anteil in %	96,92	96,88
		Anteil 2 in %	63,00	52,54
	Indexwert	Mean	0,60	0,59
		SD	0,12	0,12
		CI	[0,57; 0,63]	[0,55; 0,64]
		Range: Min.	0,32	0,36
		Range: Max.	0,85	0,89
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,04
		CI		[-0,09; 0,00]
		Fallbasis		26
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>122</i>	<i>107</i>	
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	63
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	75	38
		Anteil in %	75,00	60,32
	für Skala auswertbar	Anzahl	70	34
		Anteil in %	93,33	89,47
		Anteil 2 in %	70,00	53,97
	Indexwert	Mean	0,62	0,61
		SD	0,13	0,15
		CI	[0,59; 0,65]	[0,56; 0,66]
		Range: Min.	0,32	0,30
		Range: Max.	0,93	0,89
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,01
		CI		[-0,03; 0,04]
		Fallbasis		30
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>120</i>	<i>108</i>	
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	61
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	64	42
		Anteil in %	64,00	68,85
	für Skala auswertbar	Anzahl	57	38
		Anteil in %	89,06	90,48
		Anteil 2 in %	57,00	62,30
	Indexwert	Mean	0,57	0,56
		SD	0,14	0,13
		CI	[0,54; 0,61]	[0,51; 0,60]
		Range: Min.	0,32	0,32
		Range: Max.	0,96	0,89
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,00
		CI		[-0,04; 0,03]
		Fallbasis		28
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>126</i>	<i>112</i>	

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittshalb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	74
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	66	52
		Anteil in %	66,00	70,27
	für Skala auswertbar	Anzahl	64	49
		Anteil in %	96,97	94,23
		Anteil 2 in %	64,00	66,22
	Indexwert	Mean	0,61	0,65
		SD	0,12	0,14
		CI	[0,58; 0,64]	[0,61; 0,69]
		Range: Min.	0,30	0,32
		Range: Max.	0,97	0,96
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,01
		CI		[-0,02; 0,05]
		Fallbasis		40
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>130</i>	<i>126</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	49	
		Anteil in %	90,74	
		Anteil 2 in %	49,00	
	Indexwert	Mean	0,60	
		SD	0,12	
		CI	[0,57; 0,64]	
		Range: Min.	0,35	
		Range: Max.	0,93	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
		Fallbasis		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>133</i>		
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	62	
		Anteil in %	62,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	61	
		Anteil in %	98,39	
		Anteil 2 in %	61,00	
	Indexwert	Mean	0,63	
		SD	0,13	
		CI	[0,60; 0,67]	
		Range: Min.	0,37	
		Range: Max.	0,93	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
		Fallbasis		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>119</i>		

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittshalb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	54	
		Anteil in %	54,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	49	
		Anteil in %	90,74	
		Anteil 2 in %	49,00	
	Indexwert	Mean	0,60	
		SD	0,14	
		CI	[0,57; 0,64]	
		Range: Min.	0,32	
		Range: Max.	0,89	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
		Fallbasis		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>114</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	100	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	63	
		Anteil in %	63,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	59	
		Anteil in %	93,65	
		Anteil 2 in %	59,00	
	Indexwert	Mean	0,62	
		SD	0,15	
		CI	[0,58; 0,66]	
		Range: Min.	0,32	
		Range: Max.	0,97	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
		Fallbasis		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>102</i>		

Anhang A: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Evaluationsbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Brustkrebs herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um Datensätze, die jeweils für eine Patientin erhoben wurden:


- Patientinnenmerkmale
- Medizinische Daten
- Ökonomische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung A.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Brustkrebs von AOK, Seekrankenkasse und Knappschaft.

A.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung einer Patientin in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten. Für Patientinnen ab der Kohorte 2006-2 werden darüber hinaus Datensätze aus der Erhebung zur subjektiven Lebensqualität ausgewertet.

Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP Brustkrebs unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall - ab eDMP)



* Seit der Einführung von eDMP zum 01.07.2008 erhalten die Krankenkassen alle Datensätze, einschließlich der medizinischen Daten. Eine getrennte Übermittlung der Datensätze galt bis zum 30.06.2008.

Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) für Brustkrebs ab Juli 2009 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen medizinischen Behandlungsdaten sowie die personenbezogenen Merkmale enthält.²⁹ Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Brustkrebs finden die Satzartbeschreibungen SA200EA/FA, SA200EN/FN, SA200EB/FB sowie SA200ED/FD³⁰ Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA200ED/SA200FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2009-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 200EA/FA, SA200 EN//FN sowie SA200EB/FB übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2009-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA200ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jeder Patientin vorhandenen **Patientinnenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientinnenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patientin fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientinnenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 200 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass eine Patientin in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für sie eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt. Sobald dem Evaluator die Patientinnenmerkmale vorliegen, zieht er eine Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit der Programmteilnehmer für die **Evaluation** der ökonomischen Daten. Der Stichprobenumfang beträgt dabei jeweils 10 Prozent der Ist-Größe einer Kohorte, jedoch mindestens 100 und höchstens 500 Patientinnen. Falls an einem Programm zwischen 10 und 100 Patientinnen teilnahmen, wird eine Vollerhebung durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als 10 Teilnehmer umfasst, da in diesem Fall aus Gründen der Wahrung der Anonymität auf eine Auswertung verzichtet wird. Der Evaluator übermittelt der Krankenkasse eine Liste mit den Pseudonymen der Stichprobe. Die Kasse spielt diesen Pseudonymen die mit der medizinischen Behandlung verbundenen Leistungsausgaben zu und erstellt daraus einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 200 OD. Ferner liefert sie Angaben zu den Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. („**ökonomische Daten**“).

Der damit beschriebene Datenfluss ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Ab der Kohorte 2006-2 werden die Auswertungen darüber hinaus um die Ergebnisse einer schriftlichen **Befragung zur Veränderung der subjektiven Lebensqualität** bei Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 ergänzt. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen. Befragt wird die im vorigen Absatz bereits beschriebene Stichprobe von Patientinnen³¹. Die Kasse ermittelt dazu, für die vom Evaluator übermittelte Pseudonymliste, die zugehörigen Adressdaten und versendet an diese Patientinnen den Fragebogen. Die Patientinnen senden die ausgefüllten Fragebögen direkt an den Evaluator zurück, wo sie ausgewertet werden.

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmerinnen“ und „Patientinnen“ gesprochen und nicht von „Fällen“. Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientinnenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit die Versicherte

einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientinnenbezogenen Auswertung würde hingegen die Patientin weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Die Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschrieben werden mussten und sich in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientinnenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP eine Teilnehmerin der Kohorte 2004-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit Sicherheit geschlossen werden, dass sie sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat die betreffende Patientin „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patientinnen dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergeben sich zwei Besonderheiten. Erstens werden die Patientinnen verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen. Zweitens kann eine unveränderte Patientinnengruppe bei den berechneten Mittelwerten innerhalb eines Auswertungsjahres nicht „altern“, da sich die vollendeten Lebensjahre auf den Stichtag 1.1. des Auswertungsjahres beziehen. Unterschiedliche Mittelwerte im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patientinnen die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

²⁹ Bis zum 30.06.2009 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patientinnen bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

³⁰ Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „D“ werden diejenigen Dokumentation gekennzeichnet, die sich auf die Zeit nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen beziehen.

³¹ In den Berichten, die vor dem 30. September 2012 erstellt wurden, wurden alle Patientinnen für die Stichprobenziehung zu den ökonomischen Auswertungen berücksichtigt. Diese Systematik wurde im Juni 2011 umgestellt: ab der Kohorte 2011-1 wird die Stichprobe für die ökonomische Auswertungen nur noch aus den Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 gezogen.

A.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung kam es zu Abweichungen vom oben exemplarisch beschriebenen Datenfluss. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Rücklaufkontrolle (OD-Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.³² Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen ein Verstoß gegen die Auswertungsanforderungen laut Rechenregeln vorlag, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden „**Komplett-Dubletten**“ aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden „**Auswertungsdubletten**“ aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze, Ökonomische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung („**Matching**“) von Personenmerkmalen, medizinischen Daten und ökonomischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

³² Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientinnenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patientinnen ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei den ökonomischen Datensätzen war eine Überprüfung auf Verknüpfbarkeit entbehrlich. Da sie durch das Zuspielen der Leistungsausgaben zu denjenigen Pseudonymnummern generiert wurden, die in einer Stichprobe aus den PM-Datensätzen gezogen worden waren, war für die zugespielten Leistungsausgaben eine Verknüpfbarkeit mit den PM-Datensätzen in jedem Fall gegeben. Dennoch konnten auch hier drei Arten von Problemfällen auftreten:

- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen keine Leistungsausgaben zugespielt worden waren
- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen die Leistungsausgaben doppelt und mit teils unterschiedlichen Werten zugespielt worden waren
- In der Stichprobe nicht gezogene Pseudonymnummern, die dennoch um Leistungsausgaben ergänzt geliefert wurden

Im Rahmen einer **Rücklaufkontrolle** wurde daher ein Abgleich vorgenommen zwischen denjenigen Pseudonymnummern, die der Evaluator in der Stichprobe gezogen hatte, und denjenigen Pseudonymnummern, für welche die Krankenkasse die zugehörigen Leistungsausgaben zugespielt hatte. Damit wurden – differenziert nach Kassen, Eintrittskohorten und Antragsregion – die Problemfälle identifiziert. Da es sich bei der zweitgenannten Art von Problemfällen um nicht auswertungsrelevante Informationen handelt, wurden die entsprechenden Datensätze bei der Auswertung ignoriert. Analog wurde vorgegangen, wenn den Pseudonymnummern Leistungsausgaben für Halbjahre zugespielt wurden, in denen die entsprechenden Patientinnen nicht mehr Programmteilnehmerinnen waren.

Dass die Krankenkassen nicht allen gezogenen Pseudonymnummern die Leistungsausgaben für die erwarteten Berichtshalbjahre zuspielten, lag zum Teil daran, dass die entsprechenden Patientinnen rückwirkend aus dem Programm ausgeschlossen worden waren, diese Information zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung aber noch nicht vorlag. Lagen andere Gründe dafür vor, wurden die Daten ggf. von Kassen ergänzt und eine Neulieferung der überarbeiteten ökonomischen Datensätze an den Evaluator vorgenommen. Lagen in einer Datenlieferung für eine Pseudonymnummer zwei oder mehr ökonomische Datensätze mit unterschiedlichen Leistungsausgaben vor, floss der ökonomisch ungünstigste Wert in die Evaluation ein.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine **Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf** vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis waren die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (je nach Antragsregion bis zum Berichtshalbjahr 2011-1)
- Sie wurden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung, die sich auf bereits veröffentlichte Kohorten beziehen wurden ignoriert.

A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für eine DMP-Teilnehmerin für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kommt es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu (prozessbedingten) Abweichungen von diesem Schema. Wie in diesen Sonderfällen zu verfahren ist, wurde für die Evaluationsberichte zum Krankheitsbild Brustkrebs in den Berechnungsvorschriften des BVA erstmalig für die Berichte zum 1.7.2008 definiert und wird in den beiden folgenden Abschnitten beschrieben.

A.3.1 Präoperative und postoperative Dokumentationen

Anders als beispielsweise in den DMP zur Behandlung Diabetes mellitus Typ 2 und Typ 1 oder koronare Herzkrankheiten sind im DMP zur Behandlung von Brustkrebs zwei Arten von Erstdokumentationen zu unterscheiden: Die prä- und die postoperative Erstdokumentation (ED). In den aktuell gültigen Berechnungsvorschriften ist der Umgang mit diesen beiden Dokumentationsstypen wie folgt geregelt: Da sowohl die prä- als auch die postoperative ED auf demselben Dokumentationsbogen erfolgen und dieselbe Datenstruktur aufweisen, ist zunächst die eindeutige Zuordnung zu klären:

Als „präoperativ“ gelten alle ED wenn dies als aktueller Behandlungsstatus vermerkt ist (SA200EA/EN), bzw. wenn als Behandlungsstatus „OP geplant“ oder „OP nicht geplant“ angegeben ist (SA200EB).

Als „postoperativ“ gelten ED wenn dies als aktueller Behandlungsstatus vermerkt ist (SA200EA/EN), bzw. laut Behandlungsstatus Primärtumor/kontralateraler Tumor „postoperativ“ vermerkt ist (SA200EB).

Ebenfalls als „postoperativ“ gelten Dokumentationen, in denen weder „präoperativ“ noch „OP geplant“ oder „OP nicht geplant“ oder „postoperativ“ angegeben ist, aber Daten zur Art der erfolgten operativen (SA200EB) bzw. chirurgischen (SA200EA/EN) Therapie angegeben sind

Bei widersprüchlichen Angaben zum prä/postoperativen Status innerhalb eines Dokumentationsbogens gilt: „postoperativ“ sticht „präoperativ“: Wenn nach o.g. Kriterien eine ED sowohl als „präoperativ“ als auch als „postoperativ“ eingeordnet würde, wird sie als „postoperativ“ gewertet. Alle ED, die nach o.g. Kriterien weder als prä- noch als postoperativ zugeordnet werden können, gelten als nicht zuordenbar und werden in den Auswertungen ignoriert

A.3.2 Dokumentationen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für eine DMP-Teilnehmerin für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kommt es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu prozessbedingten Abweichungen von diesem Schema. In diesen Sonderfällen wird wie folgt verfahren:

- **Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**
Liegen für das Beitrittsjahr einer Patientin eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führt dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugerechnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle A.3.2.1
- **Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **Postoperative Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später³³**
Lag eine postoperative ED im Beitrittsjahr vor, eine zweite postoperative ED im 2. Halbjahr oder später, wurde diese behandelt wie eine Folgedokumentation. Lagen für dieses Halbjahr bereits eine oder mehrere „echte“ Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle A.3.2.1 Anwendung.
- **Zwei oder mehr Erstdokumentationen im Beitrittsjahr³⁴**
 - a) Bei Vorliegen von zwei oder mehr prä- bzw. zwei oder mehr postoperativen ED in einem Halbjahr gelten die Kriterien zum Umgang mit mehreren Dokumentationen in einem Halbjahr wie in Tabelle A.3.2.1 definiert. Die folgenden Regeln greifen nach einer solchen etwaigen Bereinigung.
 - b) Liegt im Auswertungszeitraum ausschließlich eine prä- oder ausschließlich eine postoperative ED vor, wird die vorliegende Dokumentation verwendet.
 - c) Liegt spätestens im ersten Folgehalbjahr eine postoperative ED vor, die einer präoperativen ED des Beitrittsjahres zuzuordnen ist, so werden die Daten aus präoperativer und postoperativer ED „fusioniert“. Hinsichtlich des Befundstatus (d.h. Angaben zu: pT, pN, M, Grading, Resektionsstatus, Rezeptoorstatus, Anzahl entfernter und Anzahl befallener Lymphknoten) gilt dabei, dass eine postoperative ED eine präoperative ED sticht, da davon auszugehen ist, dass die Angaben hierzu nach der OP valider sind als z.B. die Angaben, die lediglich über eine Biopsie gewonnen wurden. Bei allen übrigen Daten ist gemäß Tabelle A.3.2.1 zu verfahren, d.h. bspw. eine Strahlentherapie gilt als durchgeführt, wenn dies in einer der EDs angegeben ist, unabhängig davon ob dies in der präoperativen oder postoperativen ED der Fall ist.

³³ Für die letzte Kohorte ist der Einbezug von etwaigen postoperativen EDs definitionsgemäß nicht möglich (keine Angaben zum 1. Folgehalbjahr).

³⁴ Für die letzte Kohorte ist der Einbezug von etwaigen postoperativen EDs definitionsgemäß nicht möglich (keine Angaben zum 1. Folgehalbjahr).

Tabelle A.3.2.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr

Parameter	Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr
Lokalisation rechts,links beidseitig	als „beidseitig“ zu werten, wenn mindestens in einer Dokumentation „rechts“ UND in mindestens einer Dokumentation „links“ angekreuzt ODER in mindestens einer Dokumentation „beidseitig“ angekreuzt. Ansonsten gilt angekreuzte Seite, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert.
Brusterhaltende Therapi	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde und gleichzeitig keine Angaben zu einer Mastektomie in einer ED vorliegt. Sofern eine Angabe zur Mastektomie vorliegt, ist Mastektomie und nicht BET zu werten.
pT –Stadien	höchster dokumentierter Wert zu werten
pN –Stadien	höchster dokumentierter Wert zu werten
M –Stadien	höchster dokumentierter Wert zu werten
Grading	höchster dokumentierter Wert zu werten
Resektionsstatus	höchster dokumentierter Wert zu werten
Rezeptorstatus	als „positiv“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Axilläre Lymphonodektomie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Anzahl entfernter Lymphknoten	höchste dokumentierte Anzahl zu werten
Anzahl befallener Lymphknoten	höchste dokumentierte Anzahl zu werten
Strahlentherapie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde; („andauernd“, regulär abgeschlossen“, „vorzeitig beendet“ sind als „durchgeführt“ zu werten)
Bestrahlte Region: Mamma	als beidseitig zu werten, wenn mindestens in einer Dokumentation „rechts“ UND in mindestens einer Dokumentation „links“ angekreuzt“ ODER in mindestens einer Dokumentation „beidseitig“ angekreuzt. Ansonsten gilt angekreuzte Seite, wenn in mindestens einer Dokumentation in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Bestrahlter Region: Brustwand	als beidseitig zu werten, wenn mindestens in einer Dokumentation „rechts“ UND in mindestens einer Dokumentation „links“ angekreuzt“ ODER in mindestens einer Dokumentation „beidseitig“ angekreuzt. Ansonsten gilt angekreuzte Seite, wenn in mindestens einer Dokumentation in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Mastektomie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Chemotherapie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde („andauernd“, regulär abgeschlossen“, „vorzeitig beendet“ sind als durchgeführt zu werten)
Kriterien für niedriges Risiko (aus den medizinischen Daten; Alter wird aus PM-Daten zugespielt): - Karzinom kleiner gleich 2 cm - hochdifferenziert (Grading G1) - rezeptorpositiv (ER+ und/oder PR+) - nodalnegativ	Medizinische Kriterien für niedriges Risiko erfüllt, wenn gleichzeitiges Vorliegen in allen postoperativen Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr. (sofern ausschließlich präoperative Dokumentationen vorliegen: erfüllt, wenn gleichzeitiges Vorliegen in alle präoperativen Dokumentationen)
Datum der Histologie	Das am weitesten zurückliegende Datum zum Zeitpunkt der Subgruppenbildung wird ausgewertet
Datum des gesicherten Nachweises	Das am weitesten zurückliegende Datum zum Zeitpunkt der Subgruppenbildung wird ausgewertet
Lokalrezidiv/ Lokoregionäres Rezidiv	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Primärtumor	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Kontralateraler Brustkrebs	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Fernmetastasen	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Leber	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Lunge	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Knochen	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Andere	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Keine	gilt, wenn in mindestens einer Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert. Wird ignoriert, sofern in mindestens einer Dokumentation eine andere Lokalisation dokumentiert.

A.4 Erläuterung zu Klassifikationen bei Brustkrebs

Bösartige Neubildungen können von den verschiedensten Gewebearten ausgehen und sind zumeist durch ihr schnelles, ungehemmtes, infiltrierendes (in das umgebende Gewebe eindringendes) Wachstum sowie durch die Absiedlung von Tochtergeschwülsten (Metastasen) über die Lymphwege (Lymphknotenmetastasen) oder Blutgefäße (Organmetastasen) gekennzeichnet. Tumore, die von Haut- und Schleimhäuten – dazu gehören beispielsweise auch Drüsengänge – ausgehen, werden als Karzinome bezeichnet. Zur Entscheidung über die adäquate Behandlung sowie zur Beurteilung der Prognose bedarf es bei allen Krebserkrankungen einer differenzierten Einteilung der Tumoren. Beim Brustkrebs (Mammakarzinom) kommen hierfür in erster Linie zwei Einteilungen zum Einsatz. Zunächst das so genannte Staging, die Stadieneinteilung nach der TNM-Klassifikation. Das T steht dabei für den primären Tumor, dessen Ausdehnung in Stufen von 0 bis 4 eingeteilt wird. Das N steht für Noduli, (Lymph-)Knoten, bzw. deren lokalen metastatischen Befall mit Tumorzellen, der in drei Stufen eingeteilt wird. Das M steht für (Fern-)Metastasen, bzw. deren Vorhanden- (M1) oder Nichtvorhandensein (M0). Insgesamt ist somit eine Vielzahl von Kombinationen, z.B. T3N2M1, möglich, wobei das Vorhandensein von lokalen (Lymphknoten-)Metastasen oder gar Fern- oder Organmetastasen prognostisch weitaus ungünstiger ist, als deren Fehlen.

Das Staging entscheidet wesentlich über die Art der Therapie. In Frage kommt dabei die operative Entfernung der Tumorgebilde, der Brustdrüse oder gar der gesamten Brust (Ablatio) durch den Gynäkologen, eine strahlentherapeutische Behandlung oder eine Behandlung mit Zellgiften, eine Chemo- oder Zytostatikatherapie. Diese drei Therapiemodalitäten können auch in Kombination erfolgen, wobei die Reihenfolge dabei je nach individuellem Befund ganz unterschiedlich sein kann.

Zusätzlich zur allgemeinen, von der Gewebsart der Tumorzellen unabhängigen Einteilung nach dem TNM-Schema, erfolgt unter anderem beim Mammakarzinom eine zusätzliche Einteilung nach der Art des Tumorzellgewebes, das sog. Grading. Dabei wird in 4 Stufen nach dem Grad der Differenzierung unterschieden. Ein hohes Maß an Differenzierung, bzw. eine hohe Ähnlichkeit zum Ausgangsgewebe, weist dabei auf ein eher langsames Wachstum, oftmals aber auch auf ein schlechteres Ansprechen auf Zytostatika hin, während ein niedriges Maß an Differenzierung oftmals auf schnelles Wachstum und Metastasierung, aber auch auf gutes Ansprechen auf Zytostatika hinweist.

Neben dem Staging und Grading wird bei der feingeweblichen Untersuchung (Histologie) auch der Einbruch von Tumorzellen in Lymph- (L-Klassifikation) und Blutgefäße (V-Klassifikation) sowie der Schnittrand der operativ entfernten Tumormasse hinsichtlich dessen An- oder Abwesenheit von Tumorzellen (Entfernung im Gesunden als Ziel) (R-Klassifikation) in jeweils vier Abstufungen beurteilt.

Um noch differenzierter über Therapie und Prognose der Brustkrebserkrankung entscheiden zu können, werden die Tumorzellen mit laborchemischen oder immunhistochemischen Methoden hinsichtlich ihrer Eigenschaften (z.B. Oberflächenrezeptoren, Enzymaktivitäten) untersucht. So ist insbesondere die Expression von Hormon- (Östrogen-)rezeptoren auf den Tumorzellen ein wichtiger Indikator. In diesen Fällen kann der Einsatz von Östrogenrezeptorblockern das Tumorwachstum bremsen.

A.4.1 TNM-Klassifikation der Brust in Detail

(Der Zusatz "p" vor T bzw. N bedeutet postoperativ, ohne Zusatz: klinisch, d.h. Tastbefund. Die Zusätze hinter pN1b "i" bis "iv" sind die römischen Ziffern I bis IV)

A.4.1.1 pT - Primärtumor

- **Tx** - Primärtumor kann nicht beurteilt werden
- **T0** - Kein Anhalt für Primärtumor
- **pTis** - Carcinoma in situ: Intraduktales Karzinom oder lobuläres Carcinoma in situ oder M. Paget der Mamille ohne nachweisbaren Tumor
- **pT1** - Tumor bis 2 cm in größter Ausdehnung
- **pT1a** - Tumor bis 0,5 cm in größter Ausdehnung
- **pT1b** - Tumor 0,5 cm bis 1 cm in größter Ausdehnung
- **pT1c** - Tumor 1 cm bis 2 cm in größter Ausdehnung
- **pT2** - Tumor 2 cm bis 5 cm in größter Ausdehnung
- **pT3** - Tumor mehr als 5 cm in größter Ausdehnung
- **pT4** - Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung auf die Brustwand oder die Haut
- **pT4a** - Mit Ausdehnung auf die Brustwand
- **pT4b** - Mit Ödem (einschließlich Apfelsinenhaut), Ulzeration der Brusthaut oder Satellitenmetastasen der Haut der gleichen Brust
- **pT4c** - Kriterien 4a und 4b gemeinsam
- **pT4d** - Entzündliches (inflammatorisches) Mammakarzinom

Zusätze:

- **m** - multifokal/multizentrisch: mehrere Tumorherde in einer Brust.
- **r** - Rezidiv, Wiederaufflackern der Tumorerkrankung.
- **y** - während oder nach multimodaler (=Chemo- u/o Strahlentherapie) Vorbehandlung.

A.4.1.2 pN - Regionäre Lymphknoten

- **Nx** - Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden
- **pN0** - Keine regionären Lymphknoten befallen
- **pN1** - Metastasen in beweglichen ipsilateralen axillären Lymphknoten
- **pN1a** - Nur Mikrometastasen (keine größer als 0.2 cm)
- **pN1b** - Metastase(n) in Lymphknoten, zumindest eine größer als 0.2 cm
- **pN1bi** - Metastasen in 1 - 3 Lymphknoten, wenigstens eine größer als 0.2 cm, aber alle kleiner als 2 cm
- **pN1bii** - Metastasen in 4 oder mehr Lymphknoten, wenigstens eine größer als 0.2 cm, aber alle kleiner als 2 cm
- **pN1biii** - Ausdehnung der Metastasen über die Lymphknotenkapsel hinaus, alle kleiner als 2 cm in größter Ausdehnung
- **pN1biv** - Metastasen in Lymphknoten, 2 cm oder mehr in größter Ausdehnung
- **pN2** - Metastasen in ipsilateralen axillären Lymphknoten, untereinander verbacken oder in andere Strukturen fixiert
- **pN3** - Metastasen in ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna

Zusätze:

- **SN** - Sentinel Node (Wächterlymphknoten). Befund bezieht sich auf den/die entnommenen Wächterlymphknoten.
- **mi** - Mikrometastase, sehr kleine Metastase

Bei positiven axillären Lymphknoten sollte die Anzahl der befallenen Lymphknoten im Verhältnis zur Gesamtzahl der entfernten Lymphknoten angegeben werden. (x/y)

A.4.1.3 M - Fernmetastasen

- **Mx** - Das Vorliegen von Fernmetastasen kann nicht beurteilt werden
- **M0** - Keine Fernmetastasen
- **M1** - Fernmetastasen

A.4.1.4 Ergänzungen

Die Stadieneinteilung wird durch das histologische Grading ergänzt:

- **G1** - Gut differenziert
- **G2** - Mäßig differenziert
- **G3** - Schlecht differenziert
- **G4** - Undifferenziert (entdifferenziert)

Weitere Ergänzungen:

L - Lymphgefäßeinbruch

- **LX** - Lymphgefäßinvasion kann nicht beurteilt werden
- **L0** - kein Nachweis einer Lymphgefäßinvasion (also keine Tumorzellen in Lymphgefäßen nachgewiesen)
- **L1** - Lymphgefäßinvasion (also Tumorzellen in Lymphgefäßen nachgewiesen)

V - Blutgefäßeinbruch

- **V** - Blutgefäß-(Venen-)einbruch:
- **VX** - Blutgefäßinvasion kann nicht beurteilt werden
- **V0** - kein Nachweis von Blutgefäßinvasion (also keine Tumorzellen in Blutgefäßen nachgewiesen)
- **V1** - Blutgefäßinvasion (also Tumorzellen in Blutgefäßen nachgewiesen)

R - Resektionsrand (Absetzungsrand (Schnitttrand) bei der Operation)

- **RX** - Resektionsrand kann nicht beurteilt werden
- **R0** - Kein Residualtumor: Resektionsrand ist frei von Tumor (der Tumor wurde vollständig (mit einem Sicherheitssaum) im Gesunden entfernt)
- **R1** - Mikroskopischer Residualtumor: Tumor reicht bis an den Resektionsrand (der Tumor wurde wahrscheinlich nicht vollständig im Gesunden entfernt oder reicht gerade bis an den Rand (ohne Sicherheitssaum)).
- **R2** - Makroskopischer Residualtumor

Anhang B: Glossar

Adjuvante Therapie – Als adjuvante Therapie werden ergänzende oder unterstützende Therapiemaßnahmen bezeichnet. Speziell bei Krebserkrankungen handelt es sich um eine Therapie, die nach der operativen Entfernung der erkennbaren Tumorteile durchgeführt wird, um mögliche, jedoch noch nicht nachweisbare Absiedlungen des Tumors zu bekämpfen und auf diese Weise die Heilungschancen zu verbessern.

Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung) – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

Antiöstrogene – Substanzen, die durch Bindung an den Hormonrezeptor (Rezeptorblocker) die Wirkung der Östrogene (weibliches Sexualhormon) an den Erfolgsorganen kompetitiv hemmen oder modulieren.

Antragsregion – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

arithmetisches Mittel – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

Aromatasehemmer – Unterbinden durch Hemmung eines Enzyms (Aromatase) die Biosynthese von Östrogenen und wirken damit als Antiöstrogene. Sie werden als Zytostatika bei hormonpositiven Tumoren der Brustdrüse eingesetzt. Zusätzlich zur Chemotherapie erfolgt bei rezeptorpositiven Tumoren zumeist eine Antihormon-Behandlung mit selektiven Östrogenantagonisten wie Tamoxifen oder Aromatasehemmern.

auswertbare Patientinnen – Patientinnen, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmerinnen sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

Auswertungs(halb)jahr – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientinnenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmerinnen erfolgen.

Axilladissektion – Chirurgische Entfernung von Weichteilgewebe oder Lymphknoten aus der Achselhöhle.

axillär – Als Axilla (Achsel) wird die gesamte Schulter im engeren Sinne jedoch die Achselhöhle bezeichnet. In der Achselhöhle (axillär) finden sich neben den Gefäßbahnen (Nerven, Arterien, Venen) und Schweiß- und Talgdrüsen (Achselrdrüsen) lokale Organe der Immunabwehr Lymphbahnen und -knoten.

Axilläre Lymphonodektomie - Unter der axillären Lymphonodektomie (auch Axilladissektion) versteht man die Entfernung von Lymphknoten aus der Achselhöhle (Axilla). Sie wird als Alternative oder Ergänzung zur Entfernung des Wächterlymphknotens (Sentinel-Node-Biopsie) im Rahmen der chirurgischen Therapie des Mammakarzinoms durchgeführt. Das Ergebnis der feingeweblichen (histologischen) Untersuchung der entfernten Lymphknoten entscheidet je nach Befall bzw. Anzahl der Lymphknoten mit Tumorzellen über die weitere Therapie und Prognose.

Beitritts halbjahr – Kalenderhalbjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

CI (confidence interval) – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

DMP (Disease-Management-Programm[e]) – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

ED – siehe Erstdokumentation

Erstdokumentation – Mit der Einschreibung der Patientin in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

Erstmanifestation – Erstmaliges Erkennbarwerden einer Erkrankung.

EZ (Eintrittszeitpunkt) – In der Evaluation werden jeweils alle Patientinnen, deren Eintrittszeitpunkt in das Programm im selben Kalenderhalbjahr liegt, in eine Kohorte bzw. Halbjahreskohorte zusammengefasst.

FD – siehe Folgedokumentation

Fernmetastasen – Als Metastasen im engeren Sinne werden Absiedlungen eines Tumors in entferntem Gewebe bezeichnet. Fernmetastasen entstehen, wenn Tumorzellverbände mit dem Blut- oder Lymphstrom in entfernte Organe gelangen und dort weiterwachsen. Alternativ können Fernmetastasen auch durch Abtropfung oder Abklatschung von Tumorzellen in Körperhöhlen entstehen.

Folgedokumentation – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

GnRH-Analoga – Ein GnRH-Analagon (gonadotropine releasing hormone, ein Hormon in der Kette der Sexualhormonproduktion) ist ein Arzneistoff, der zur Unterdrückung der Hormonproduktion in den Eierstöcken führt. Sie werden bei prämenopausalen Frauen gegeben, die einen hormonrezeptorpositiven Brustkrebs haben.

Gx-gradig – Anhand der mikroskopischen Gewebsuntersuchung (Histologie) wird der Grad der Differenziertheit (grading) des Tumorgewebes bestimmt. Hierbei wird mit G1 gut, mit G2 mäßig, mit G3 schlecht und mit G4 nicht differenziertes Tumormaterial bezeichnet.

Häusliche Krankenpflege – In der Wohnung der Patientinnen erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungs pflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

Heilmittel – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen od. einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) u. Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

Hilfsmittel – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

Histologie - Die Histologie ist die Wissenschaft von den biologischen Geweben. Der Histologe/Pathologe untersucht Gewebeproben. Zu den Aufgaben der Histologie gehört u.a. die mikroskopische Diagnose und Klassifizierung von Tumoren.

invasiver Tumortyp – Im Gegensatz zum verdrängendem Wachstum wächst ein invasiver Tumor in die umliegenden Gewebe ein und zerstört es dabei.

ipsilateral – Auf der gleichen Seite liegend, z.B. beim Auftreten eines Tumorrezidivs. Im Gegensatz zu auf der entgegengesetzten Seite liegend (kontralateral).

Karzinom - Karzinome sind Krebserkrankungen, die vom Epithel (Haut, Schleimhäute, Drüsengewebe) ausgehen. Daraus ergibt sich eine weitere Differenzierung, je nach Art des entarteten Epithels (z.B. Lunge, Magen, Darm, Brust). Karzinome machen circa 80% aller bösartigen Tumore aus.

Kohorte bzw. Halbjahreskohorte – Gesamtheit der Teilnehmerinnen eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patientinnen, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

Kollektiv – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patientinnen einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Konfidenzintervall – siehe CI

Krankengeld – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstausfall ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

Lymphadenektomie – Chirurgische Entfernung von Lymphknoten.

Mamma – Die weibliche Brust mit der Brustdrüse. Sie besteht aus ca. 15 Einzeldrüsen, Bindegewebezügen u. einem individuell verschieden großen Anteil an Fettgewebe.

Mastektomie – Operative Entfernung der ganzen Brust (Brustamputation). Bei der subkutanen Mastektomie handelt es sich um die Entfernung nur des Brustdrüsengewebes unter Belassung der Brusthaut. Die Brust wird sofort wieder rekonstruiert, meist mit körperfremdem Gewebe. Bei der eingeschränkten, radikalen Mastektomie - auch erweiterte Mastektomie genannt - werden zusätzlich zum Brustdrüsengewebe und einem Teil der Brusthaut in der Regel auch ca. 10-15 Lymphknoten im Bereich der Achselhöhle entfernt. Bei der radikalen Mastektomie handelt es sich um eine Operationsmethode, die nur noch bei fortgeschrittenem Brustkrebs angewandt wird. Bei ihr werden zusätzlich der kleine und große Brustmuskel ganz oder teilweise entfernt.

Mean – siehe arithmetisches Mittel

Median – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

Medizinische Datensätze – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 200 EA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 200 EN sowie für die Folgedokumentationen die SA 200 FA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 200 FN.

Metastasen – Krankheitsherd, der durch die Verschleppung von Tumorzellen aus einem Primärtumor entsteht. Eine Metastasiering kann hämatogen, d.h. über den Blutweg, oder lymphogen, d.h. mit dem Lymphstrom erfolgen. Beim Brustkrebs sind die häufigsten Metastasenorte die Lymphknoten, die Haut, das Skelettsystem, , die Lunge, die Leber, und das zentrale Nervensystem. Es entstehen bösartige Tochtergeschwülste.

Neoadjuvante Therapie – Mit diesem Begriff wird eine Chemo-, Strahlen- oder Hormontherapie bezeichnet, die vor einer Operation durchgeführt wird, um die Tumormasse zu verringern und dadurch die Erfolgschancen für eine operative Tumorentfernung zu erhöhen.

Neoplasie – Es handelt sich um eine gewebliche Neubildung in Form eines Überschusswachstums von körpereigenem Gewebe. Neoplasien können jegliche Art von Gewebe betreffen, sie können benigne (gutartig) oder maligne (bösartig) sein. Je nach Ort (Lokalisation) des Tumors und der Funktion des durch ihn geschädigten Gewebes kann es zu einer Fehlfunktion von Organen mit Beeinträchtigung des Gesamtorganismus bis zum Tod kommen. Bösartige Neoplasien sind die Ursache der Krankheit Krebs.

nodalnegativ – Keine von Tumorzellen befallenen Lymphknoten (Noduli) vorhanden. Prognostisch günstig.

OD-Daten – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmerinnen verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientinnenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmerinnen vor. Diese Daten werden als Satzart 200 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patientin und Jahr vor.

Ovariektomie – Operative (chirurgische) Entfernung eines oder beider Eierstöcke (Ovarien). Wird besonders bei hormonempfindlichen Tumoren, im speziellen bei Brustkrebs, durchgeführt und wirkt sich auf den Verlauf günstig aus, sofern die Tumorzellen hormonempfindlich sind.

Ovarialfunktion – Funktionen der weiblichen Keimdrüsen (Eierstöcke, Ovarien). Es ist hierbei zu unterscheiden zwischen der generativen (Produktion von befruchtungsfähigen Eiern) und der vegetativen (Hormonbildung: Östrogene und Gestagene) Funktion.

PM-Daten – Patientinnenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientinnenmerkmale wie das Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

Primärtumor – Der zuerst (vor etwaigen Tochtergeschwülsten) entstandene Tumor.

postmenopausal - Lebensabschnitt der Frau, der sich den Wechseljahren (Klimakterium) anschließt und definitionsgemäß ein Jahr nach der letzten spontanen Regelblutung (Menopause) beginnt.

prämenopausal - Abschnitt der Wechseljahre der Frau (Klimakterium) vor der letzten spontanen Regelblutung / Menstruation (Menopause) mit unregelmäßigen Blutungen.

Programmteilnehmerinnen – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

pTx-Tumor – Einteilung der postoperativen (Rest-)Tumorgöße innerhalb des TNM (Tumor, Noduli [Lymphknotenmetastasen], Metastasen) Klassifikationsschemas. Dabei bedeutet pT1 Tumor bis 2 cm in größter Ausdehnung, pT2 Tumor bis 5 cm in größter Ausdehnung, pT3 Tumor mehr als 5 cm in größter Ausdehnung und pT4 Tumor jeder Größe mit Ausdehnung auf Brustwand oder Haut.

Resektion - Die Resektion ist die operative Entfernung kranker Gewebeteile eines Organs oder auch eines Tumors. Die Resektion wird unterschieden von der Exstirpation (Entfernung des ganzen Organs).

Restkohorte – Gesamtheit der Patientinnen einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmerinnen sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

Rezeptorpositiv – Vorhandensein von Andockstellen (Rezeptoren) für Hormone an Gewebszellen Die Bestimmung von Hormonrezeptoren bei Brustkrebs ist bedeutsam für die unterstützende (adjuvante) oder lindernde (palliative) Therapieentscheidung. Man unterscheidet Östrogen-(E) und Progesteronrezeptoren (Pr). Patientinnen vor Eintritt der Wechseljahre (prämenopausale) weisen zu etwa 50 bis 60 %, Patientinnen nach Eintritt der Wechseljahre (postmenopausale) zu 70 bis 80 % Östrogenrezeptoren auf. Diese so genannten rezeptorpositiven Fälle wurden bisher im Hinblick auf den Verlauf der Erkrankung (Prognose) günstiger eingeschätzt als die rezeptornegativen Tumoren.

Rezidiv – Bei einem Rezidiv handelt es sich um ein Wiederauftreten („Rückfall“) einer Krankheit, einer psychischen Störung oder deren Symptomen nach einer Behandlung, die zeitweilig erfolgreich war oder nach spontaner Rückbildung (Remission). Der Begriff Rezidiv spielt bei der Behandlung von Krebs eine wichtige Rolle. Ursache ist meist eine unvollständige Entfernung des Tumors, die nach einiger Zeit zu einem erneuten Auftreten der Krankheit führen kann. Wer in den fünf Jahren nach der Behandlung eines Tumors kein Rezidiv erfährt, gilt nach allgemeiner Norm als geheilt. Einige Tumoren können aber auch nach längerer Zeit ein Rezidiv verursachen.

Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV) – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidity) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

Rx-Resektion – Die R-Klassifikation beurteilt die Schnittränder des Tumors. Dabei bedeutet RX , dass der Resektionsrand nicht beurteilt werden kann; R0, dass kein Residualtumor vorhanden, bzw. der Resektionsrand frei von Tumor ist und somit der Tumor vollständig (mit einem Sicherheitssaum) im Gesunden entfernt wurde; R1, dass ein mikroskopischer Residualtumor vorhanden ist, bzw. der Tumor (ohne Sicherheitssaum) bis an den Resektionsrand reicht und damit wahrscheinlich nicht vollständig im Gesunden entfernt wurde und R2, dass ein makroskopischer Residualtumor sichtbar ist und der Tumor damit sicher nicht völlig entfernt werden konnte.

Tumor - Schwellung mit einer örtlichen umschriebenen Zunahme des Gewebavolumens. Als Ursache kann sowohl eine Entzündung mit Ödem, als auch eine gut- oder bösartige Neubildung in Frage kommen.