

Evaluation von strukturierten
Behandlungsprogrammen (DMP)

AOK Curaplan Brustkrebs der AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse

Berichtstyp: Evaluationsbericht

Auswertungshalbjahre: 2006-1 bis 2011-1

Abgabedatum: 30. September 2012

Evaluatoren:

infas

infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn

prognos

Prognos AG
Schwanenmarkt 21
40231 Düsseldorf

WIAD
Wissenschaftliches Institut der
Ärzte Deutschlands gem. e.V.

Wissenschaftliches Institut der Ärzte
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.
Uhierstr. 78
53175 Bonn

Zusammenfassung	7
0. Einleitung	11
Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation	12
0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten	16
Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard	17
0.2 Beispiel für eine tabellarische Darstellung	19
Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patientinnenzahlen und UICC-Stadien	19
0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Auswertungsgruppen und Kollektive	20
Tabelle 0.3.1 Abgrenzung der Auswertungsgruppen vor und nach der 13. RSA-ÄndV	21
Tabelle 0.3.2 Definition der UICC-Stadien	21
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	22
Auswertungskapitel 1: Patientinnenzahlen und -merkmale insgesamt	22
Tabelle 1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien	22
Tabelle 1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	26
Tabelle 1.3 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	32
Tabelle 1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	34
Tabelle 1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren	40
Tabelle 1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	42
Tabelle 1.7 Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren	48
Tabelle 1.8 Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien	50
Tabelle 1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	53
Tabelle 1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	54
Tabelle 1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation	56
Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer	58
Tabelle 2.1 Leistungserbringer	59
Auswertungskapitel 3: Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)	60
3.1 Patientinnenzahlen und –merkmale	60
Tabelle 3.1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1	60
Tabelle 3.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	64
Tabelle 3.1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	70
Tabelle 3.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 1	76

Tabelle 3.1.6	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	78
Tabelle 3.1.9	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 1	84
Tabelle 3.1.10	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 1	85
Tabelle 3.1.11	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1	87
Tabelle 3.1.12	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	90
Tabelle 3.1.13	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	101
Tabelle 3.1.14	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium, Auswertungsgruppe 1	112
Tabelle 3.1.15	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	117
3.2	Medizinische Auswertungen	122
Tabelle 3.2.1	Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1	122
Tabelle 3.2.2	Patientinnen mit Tumorgröße pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1	124
Tabelle 3.2.3	Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1	126
Tabelle 3.2.4	Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	128
Tabelle 3.2.5	Patientinnen mit Tumorgröße pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	131
Tabelle 3.2.6	Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	133
Tabelle 3.2.7	Patientinnen nach Mastektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach axillärer Lymphonodektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1	135
Tabelle 3.2.8	Patientinnen mit einem niedrigen Risiko: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1	137
3.3	Überlebenszeiten	140
Tabelle 3.3.1	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	140
Tabelle 3.3.1.1	Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	143
Tabelle 3.3.1.2	Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	146
Tabelle 3.3.1.3	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	149
Tabelle 3.3.1.4	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	152
Tabelle 3.3.1.5	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	155
Tabelle 3.3.1.6	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1	158
Tabelle 3.3.1.7	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	161
Tabelle 3.3.1.8	Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	164
Tabelle 3.3.2	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	167
Tabelle 3.3.2.1	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	171
Tabelle 3.3.2.2	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	175
Tabelle 3.3.2.3	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	179
Tabelle 3.3.2.4	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	183
Tabelle 3.3.2.5	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	187

Tabelle 3.3.2.6	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1	191
Tabelle 3.3.2.7	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	195
Tabelle 3.3.2.8	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1	199
Tabelle 3.3.3	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	203
Auswertungskapitel 4:	Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)	207
4.1	Patientinnenzahlen und -merkmale	207
Tabelle 4.1.1	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2	207
Tabelle 4.1.2	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	211
Tabelle 4.1.3	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 2	217
Tabelle 4.1.5	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 2	219
Tabelle 4.1.6	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	221
Tabelle 4.1.9	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 2	227
Tabelle 4.1.10	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 2	228
Tabelle 4.1.11	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2	230
Auswertungskapitel 5:	Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 3)	232
5.1	Patientinnenzahlen und -merkmale	232
Tabelle 5.1.1	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 3	232
Tabelle 5.1.2	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	234
Tabelle 5.1.3	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 3	240
Tabelle 5.1.5	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 3	242
Tabelle 5.1.9	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 3	244
Tabelle 5.1.10	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 3	245
Tabelle 5.1.11	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3	247
Auswertungskapitel 6:	Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 4)	249
6.1	Patientinnenzahlen und -merkmale	249
Tabelle 6.1.1	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 4	249
Tabelle 6.1.2	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	251
Tabelle 6.1.3	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 4	257
Tabelle 6.1.5	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 4	259
Tabelle 6.1.9	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 4	261
Tabelle 6.1.10	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 4	262
Tabelle 6.1.11	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4	264
Auswertungskapitel 7:	Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 5)	266
7.1	Patientinnenzahlen und -merkmale	266

Tabelle 7.1.1	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 5	266
Tabelle 7.1.2	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	268
Tabelle 7.1.3	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 5	274
Tabelle 7.1.5	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 5	276
Tabelle 7.1.9	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 5	278
Tabelle 7.1.10	Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 5	279
Tabelle 7.1.11	Patientinnen ohne medizinischen Dokumentationsbogen im Halbjahr, Auswertungsgruppe 5	281
Auswertungskapitel 8: Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 und 2		283
8.3	Überlebenszeiten der Auswertungsgruppen 1 und 2	284
Tabelle 8.3.1	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	284
Tabelle 8.3.2	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	287
Tabelle 8.3.3	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2	291
Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte		295
Auswertungskapitel 9: Patientinnenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben		297
Tabelle 9.1	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)	297
Auswertungskapitel 10: Leistungsausgaben		299
Tabelle 10.1	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	299
Tabelle 10.2	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	302
Tabelle 10.3	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	305
Tabelle 10.4	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	307
Tabelle 10.5	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	310
Tabelle 10.6	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	313
Tabelle 10.7	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	316
Tabelle 10.8	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	319
Tabelle 10.9	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	322
Tabelle 10.10	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	326
Auswertungskapitel 11: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung		329
Tabelle 11.1	Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmerin und Jahr und Versichertenjahre	329
Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität		330
Abb. III.1	Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex	333
Auswertungskapitel 12: Rücklaufstatistik		334

Tabelle 12.1	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)	334
Auswertungskapitel 13: Auswertungen zur Lebensqualität		338
Tabelle 13.1	Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	338
Tabelle 13.2	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	342
Tabelle 13.3	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	348
Tabelle 13.4	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	354
Tabelle 13.5	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	360
Tabelle 13.6	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	366
Tabelle 13.7	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	372
Tabelle 13.8	SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	378
Tabelle 13.9	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	384
Tabelle 13.10	Körperliche Summenskala, Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	390
Tabelle 13.11	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	394
Tabelle 13.12	SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	398
Anhang A: Methodik und Datengrundlage		404
A.1 Datengrundlage		404
Abb. A.1.1	Datenfluss im Rahmen des DMP Brustkrebs unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall - ab eDMP)	405
A.2 Qualitätssicherung		408
A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen		410
A.3.1	Präoperative und postoperative Dokumentationen	410
A.3.2	Dokumentationen.	411
Tabelle A.3.2.1	Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr.	412
A.4 Erläuterung zu Klassifikationen bei Brustkrebs.		413
A.4.1	TNM-Klassifikation der Brust in Detail	414
A.4.1.1	pT - Primärtumor	414
A.4.1.2	pN - Regionäre Lymphknoten	414
A.4.1.3	M - Fernmetastasen.	415
A.4.1.4	Ergänzungen	415
Anhang B: Glossar		416

Zusammenfassung

Auswertungsgruppen

Die Ergebnisdarstellung des Berichts unterscheidet zwischen fünf Patientinnengruppen mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf bzw. Prognose. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Auswertungsgruppe ‚Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs‘ erst seit dem zweiten Halbjahr 2006 ausgewiesen wird und alle Patientinnen vorher nur in vier Auswertungsgruppen eingeteilt wurden. Die Verteilung der Patientinnen in den BeitrittsHalbjahren ist wie folgt: In die Auswertungsgruppe 1 werden Patientinnen mit einer zum Zeitpunkt der Diagnosestellung des Primärtumors zeitnahen Einschreibung in das DMP eingeordnet. Der Auswertungsgruppe 2 werden Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte, zugeordnet. In der Auswertungsgruppe 3 finden sich Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung. Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs werden erst seit dem zweiten Halbjahr 2006 erfasst und der Auswertungsgruppe 4 zugeteilt. In die Auswertungsgruppe 5 werden Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung eingeordnet.

Ausgeschiedene Patientinnen*

Eine Patientin kann im Zeitverlauf aus dem Programm ausscheiden. Als Gründe für das Ausscheiden kommen das Versterben der Patientin, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung des Programms durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (Heilung bzw. Tumorfreiheit) in Betracht. Die meisten der ausgeschiedenen Patientinnen wurden aus dem Programm ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien sind durch das BVA festgelegt. Wird eine Patientin - bei kontinuierlicher Teilnahme am DMP - aus technischen Gründen aus dem DMP ausgeschrieben und im Anschluss wieder eingeschrieben, so wird dies als Ausscheiden und Teilnahme eines neuen Falls gewertet.

Sentinel-Lymphknoten-Biopsie*

Die Entfernung und Analyse des Sentinel-Lymphknotens (Wächterlymphknoten) während der Tumoroperation ist die schonendere Alternative zur sogenannten Axilladisektion, bei der alle Achsellymphknoten entfernt werden. Der Wächterlymphknoten

wird noch während der Operation auf Krebszellen untersucht. Ist er frei von Krebszellen, werden die anderen Lymphknoten in der Achsel belassen, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht befallen sind. Der Vorteil dieser Methode ist u.a., dass es nach der Operation seltener zu einem Lymphödem des betroffenen Armes kommt.

Brusterhaltende Therapie*

Sofern das Größenverhältnis von Brust und Tumor es zulässt und keine tumorbiologischen Faktoren dagegen sprechen, ist die brusterhaltende Therapie heute das operative Standardverfahren. Dies gilt auch für große Tumore. Entscheidend ist jedoch, dass der Tumor mit ausreichendem Sicherheitsabstand entfernt werden kann und im Anschluss eine Strahlentherapie durchgeführt wird.

Strahlentherapie*

Die Strahlentherapie ist neben Operation und medikamentöser Behandlung die am häufigsten angewandte Therapieform bei Brustkrebs. Die Bestrahlung schädigt das Erbgut der Zellen. Tumorzellen können im Gegensatz zu gesunden Zellen die entstandenen Schäden jedoch nicht reparieren und gehen zugrunde. Ziel der Strahlentherapie ist es, das Risiko für ein Rezidiv (Wiederauftreten) zu senken. Nach einer brusterhaltenden Operation gehört die Bestrahlung zur Standardtherapie. Nach einer kompletten Entfernung der Brust (Mastektomie) ist eine Bestrahlung u.a. angezeigt, wenn der Tumor sehr groß war (pT3 oder pT4-Tumoren) oder eine vollständige Entfernung nicht oder nur mit geringem Sicherheitsabstand möglich war (R1 / R2-Resektion).

Chemotherapie*

Nach einer Brustkrebs-Operation wird eine Chemotherapie eingesetzt, um evtl. noch im Körper vorhandene Tumorzellen zu zerstören. Bei Patientinnen mit einem niedrigen Rückfallrisiko kann ggf. jedoch auf eine Chemotherapie verzichtet werden. Zur Entscheidung über das Rückfallrisiko werden die Tumorgröße, der Lymphknotenbefall, das Grading (Entartungsgrad), der Rezeptorstatus, der Menopausestatus, andere Erkrankungen und das Alter der Patientin berücksichtigt.

Rezidiv- Metastasen- und Sterberaten*

Von wesentlicher prognostischer Bedeutung bei der Erkrankung Brustkrebs ist das Auftreten von Rezidiven des Tumors am Ort des Ersttumors oder in seiner unmittelbaren Nähe sowie das Auftreten eines kontralateralen Tumors in der zunächst nicht befallenen Brust (diese Gruppe wird in ihrem weiteren Verlauf in der Auswertungsgruppe 4 dargestellt). Weiterhin sind das Auftreten von Metastasen (diese Gruppe wird in ihrem weiteren Verlauf in der Auswertungsgruppe 5 dargestellt) und letztendlich auch das Versterben der Patientinnen wichtige Indikatoren des Behandlungserfolgs oder auch -misserfolgs.

* Sollten in der nachfolgenden tabellarischen Zusammenfassung einzelne Zellen nicht befüllt sein, liegt der Grund in zu geringen Patientinnenanzahlen, aufgrund derer die jeweilige Auswertung nicht durchgeführt werden konnte.

Tabellarische Zusammenfassung

Disease-Management-Programm AOK Curaplan Brustkrebs der AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse					
Variablen			Messzeitpunkt		Nummer/Link zur Tabelle im Bericht
Allgemeine Programm- und Patientendaten	Programmlaufzeit	Starthalbjahr		2006-1	
		Letztes Berichtshalbjahr		2011-1	
		Gesamtlaufzeit bis letztes Berichtshalbjahr (in Jahren)		5,5	
	Teilnehmerinnen insgesamt	Anzahl im letzten Berichtshalbjahr		1.204	1.1
		Insgesamt seit dem Start eingeschriebene Patientinnen		1.704	1.1
		Kumulierter Anteil der ausgeschiedenen Patientinnen (in %)	letztes Folgehalbjahr	33,3	1.2
		Mittleres Alter der Patientinnen bei Eintritt in das DMP (in Jahren)	alle Beitrittsjahre	65,9	1.3
		Mittleres Alter bei Erstmanifestation (in Jahren)	alle Beitrittsjahre	64,2	1.5
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 (in %)	alle Beitrittsjahre	26,6	3.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 2 (in %)	alle Beitrittsjahre	64,4	4.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 3 (in %)	alle Beitrittsjahre	2,5	5.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 4 (in %)	alle Beitrittsjahre	2,8	6.1.1
		Anteil Patientinnen in Auswertungsgruppe 5 (in %)	alle Beitrittsjahre	3,8	7.1.1

Disease-Management-Programm AOK Curaplan Brustkrebs der AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse					
Variablen			Messzeitpunkt		Nummer/Link zur Tabelle im Bericht
Medizinische Inhalte (Auswertungsgruppe 1)	Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	Anteil der Patientinnen mit einem negativen (unauffälligen) Lymphknotenbefund an allen Patientinnen mit Sentinel-Lymphknotenbiopsie laut Erstdokumentation (ab 2006-2) (in %)	alle Beitrittsjahre	37,7	3.2.1
	Brusterhaltende Therapie	Anteil der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie an den Patientinnen mit Tumorgröße pTis und pT1 laut Erstdokumentation (in %)	alle Beitrittsjahre	67,3	3.2.2
	Strahlentherapie	Anteil der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie, die innerhalb von 18 Monaten nach dem Beitrittsjahr eine Strahlentherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmehalbjahre	83,4	3.2.4
		Anteil der Patientinnen mit Tumorgröße pT3/pT4 nach Mastektomie, die innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmehalbjahre	56,0	3.2.5
		Anteil der Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie, die innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmehalbjahre	0,0	3.2.6
	Chemotherapie	Anteil der Patientinnen mit geringem Risiko, die innerhalb der ersten 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres keine Chemotherapie erhielten (in %)	die ersten vier Teilnahmehalbjahre	97,8	3.2.8
Rezidiv-, Metastase- und Sterberaten (Auswertungsgruppe 1)	Rezidiv / kontralateraler Tumor	Kumulierter Anteil der Patientinnen mit neu aufgetretenem lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor (in %)	letztes Folgehalbjahr	1,8	3.3.3
	Metastasierung	Kumulierter Anteil der Patientinnen mit neu aufgetretenen Metastasen (in %)	letztes Folgehalbjahr	6,8	3.3.3
	Verstorbene Patientinnen	Anteil der seit DMP-Beginn verstorbenen Patientinnen (in %)	letztes Folgehalbjahr	8,1	1.2

0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patientinnen wird über den gesamten Verlauf einer (chronischen) Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert, sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patientinnen sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen, sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patientinnen durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrunde liegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientinnenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Brustkrebs waren demnach sämtliche DMP zum 30.09.2009 zu evaluieren. Anschließend soll alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 30.09.2011, zum 30.09.2013, etc. erfolgen. Im September 2011 wurde durch das BVA beschlossen, die Erstellung der Evaluationsberichte für die Indikation Brustkrebs um ein Jahr auf den 30.09.2012 zu verschieben, so dass die vorliegenden Berichte die Aktualisierung der Evaluationsberichte aus September 2009 darstellen.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welche Inhalte der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Es ist zu beachten, dass sich entsprechend der Vorgaben des BVA die durchgeführten Auswertungen hinsichtlich Anzahl und Art zwischen den einzelnen Auswertungsgruppen bzw. zwischen den Auswertungsgruppen und der Gesamtheit der Patientinnen unterscheiden.

Quantitativ bedeutsam ist jedoch vor allem die Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008, die für die Programmteilnehmer zum 31.03.2008 relevant wurde. Vor der Fusion nahmen die Versicherten der Seekrankenkasse an den AOK-Programmen teil, seit der Fusion an den Knappschafts-Programmen. Gemäß der aktuell gültigen Evaluationskriterien des BVA gilt diesbezüglich: „Von Fusionen und Dienstleisterwechseln betroffene Patienten sind mit ihrer gesamten DMP-Historie in der Programmauswertung zu führen, der sie aufgrund ihrer aktuellen Programmteilnahme zuzuordnen sind.“

In allen Berichten der Indikation Brustkrebs, die ab dem 30.09.2009 einzureichen sind, werden daher – anders als in den vorigen Berichten – die Versicherten der ehemaligen See-Krankenkasse von Beginn an nicht mehr in den AOK-Berichten evaluiert, sondern in den Knappschaftsberichten – also auch für Halbjahre vor der Fusion. Folglich können fusionsbedingt in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 die Patientinnenzahlen in den AOK Berichten z.T. deutlich geringer ausfallen als in früheren Berichten, die Patientinnenzahlen in den Knappschaftsberichten dagegen z.T. deutlich höher. Somit können für diese Halbjahre auch die ausgewiesenen Evaluationsergebnisse von denen voriger Berichte abweichen.

Tabelle 0.1 Inhalte der Evaluation

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	
1. Patientinnenzahlen und –merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen und UICC-Stadien - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen gemäß für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren - Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
2. Leistungserbringer	<ul style="list-style-type: none"> - Ärzte - Gynäkologen - onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte - Stationäre Einrichtungen
3. Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)	<ul style="list-style-type: none"> Patientinnenzahlen und UICC-Stadien - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen gemäß für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren - Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
	<ul style="list-style-type: none"> - mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie - Brusterhaltende Therapie - Entfernte Lymphknoten - Strahlentherapie - unterbliebene Chemotherapie
	<ul style="list-style-type: none"> - (Tumorfremie) Überlebenszeit - Rezidiv- und Sterberaten
4. Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen und UICC-Stadien - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation

Auswertungskapitel	Inhalte
5. Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
6. Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation
7. Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 5)	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert) - Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen gemäß für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren - Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre - Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren - Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien - Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit - Patientinnen ohne medizinische Dokumentation

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte	
8. Patientinnenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Patientinnenzahlen - Ausscheiden aus dem Programm
9. Leistungsausgaben (Stichprobe)	Leistungsausgaben für die nachfolgenden Bereiche insgesamt (inklusive Dialyse-Sachkosten) und einzeln: <ul style="list-style-type: none"> - ambulante ärztliche Behandlung - Krankenhausbehandlung - Patientinnen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt - Arzneimittel - Heilmittel - Hilfsmittel - Anschlussrehabilitation - häusliche Krankenpflege - Krankengeld
10. Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung	Durchschnittliche Kosten pro Patientinnenjahr
Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität*	
11. Patientinnenzahlen der Stichprobe für den SF36	- Patientinnenzahlen und Rücklaufquote
12. Veränderung der subjektiven Lebensqualität (Stichprobe)*	Gesundheitszustand im Vergleich zum Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> - Körperliche Funktionsfähigkeit - Körperliche Rollenfunktion - Körperliche Schmerzen - Allgemeine Gesundheitswahrnehmung - Vitalität - Soziale Funktionsfähigkeit - Emotionale Rollenfunktion - Psychisches Wohlbefinden - Körperliche Summenskala - Psychische Summenskala - SF-6D-Gesamtindex
Anhang A: Methodik und Datengrundlage (einschl. Erläuterung zu Klassifikationen bei Brustkrebs)	
Anhang B: Glossar	

*Die Lebensqualitätsbefragung wird vom BVA erstmalig ab der 2. Halbjahreskohorte 2006 gefordert.

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den „Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme bei Brustkrebs“ am 05.10.2011 (Version 5.4) veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbeurteilung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Abschlussberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen.

Der vorliegende Bericht evaluiert das Disease-Management-Programm „AOK Curaplan Brustkrebs“ der AOK zur Behandlung von Brustkrebs in der Antragsregion Sachsen-Anhalt. Die Akkreditierung für das Programm wurde am 01.02.2006, also im Halbjahr 2006-1 erteilt. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmerinnen des Programms vom Zeitpunkt Ihres Beitritts bis einschließlich des Halbjahres 2011-1 beobachtet. Am AOK Curaplan Brustkrebs nehmen die Versicherten der AOK Sachsen-Anhalt und gegebenenfalls länderübergreifend betreute AOK-Versicherte anderer Regionen teil..

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.¹ Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs

der Knappschaft teil. Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Für den vorliegenden Bericht ist zudem die Fusion von AOK Sachsen-Anhalt und BKK Sachsen-Anhalt relevant, die bezüglich der DMPs zum 1.4.2009 umgesetzt wurde. Ab diesem Zeitpunkt nahmen die Versicherten der ehemaligen BKK Sachsen-Anhalt nicht mehr an den DMPs der BKK teil, sondern an den DMPs der AOK Sachsen-Anhalt. Die Patientenmerkmale und die dokumentierten medizinischen Parameter der ehemaligen BKK-Versicherten werden mit ihrem historischen Fallverlauf im vorliegenden Evaluationsbericht der AOK Sachsen-Anhalt berücksichtigt. Die stichprobenbasierten Auswertungen, d.h. zu den Leistungsausgaben und zum SF36, sind davon ausgenommen. Für Berichtsteil I gilt also, dass in den Halbjahren bis einschließlich 2009-1 auch Versicherte ausgewertet werden, die in diesen Halbjahren ursprünglich Teilnehmer der BKK-Programme waren.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

¹ Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patientinnen mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patientinnen und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patientinnen halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2003-1“, „Kohorte 2003-2“, „Kohorte 2004-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt der einzelnen Teilnehmerin in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1. verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2003-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc. Zu beachten ist dabei, dass sich die Spaltenüberschriften auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patientinnen beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche Kalenderhalbjahre.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

Eintrittszeitpunkt	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr
2003-1	Wert für 2003-1	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...
2003-2	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...	
2004-1	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...		
2004-2	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...			
2005-1	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...				
2005-2	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...					
2006-1	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...						
2006-2	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...							
2007-1	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...								
2007-2	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...									
2008-1	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...										
2008-2	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...											
2009-1	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...												
2009-2	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...													
2010-1	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...														
2010-2	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	...															
2011-1	Wert für 2011-1	...																
...	...																	

Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patientinnen zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte die Patientin zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2005 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2005-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2005 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2005-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patientinnen keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patientinnen bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientinnenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit die Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Dennoch wird im Folgenden in der Regel vereinfachend von „Patientinnen“, „Teilnehmerinnen“ oder „Versicherten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Darüber hinaus ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patientinnen aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinander folgenden Dokumentationen zu einem Abschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patientinnen, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind, als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patientinnen in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patientinnen.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patientinnen der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“.

Diejenigen Patientinnen, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare Patientinnen**“ bezeichnet.² Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patientinnen zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

² Die „nicht auswertbaren“ Patientinnen ergeben sich als Differenz zwischen den „Patientinnen insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patientinnen.

0.2 Beispiel für eine tabellarische Darstellung

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der **Patientinnenzahlen und UICC-Stadien** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, sind auch in den Auswertungskapiteln die Tabellen mit einem entsprechenden Erläuterungstext und Lesebeispiel versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

Die Lesebeispiele werden automatisch befüllt und beziehen sich unabhängig vom jeweils betrachteten Bericht immer auf dieselben Tabellenzellen. Da die Inhalte dieser Tabellenzellen zwischen den Evaluationsberichten abweichen, können hinsichtlich der Befüllung der Lesebeispiele zwei Besonderheiten auftreten.

1. Die Lesebeispiele enthalten -- anstatt Zahlen. Dies ist der Fall, wenn in der Kohorte überhaupt keine Patientinnen eingeschrieben sind. Dann enthalten die Lesebeispiele zwangsläufig keine Ergebnisse. Aus Datenschutzgründen werden die Lesebeispiele zu den Patientinnenmerkmalen - ausgenommen ist hier die Tabelle mit den Angaben zu den eingeschriebenen Patientinnen - ebenfalls mit -- gefüllt, wenn die Kohorten weniger als 10 Patientinnen enthalten.

2. Die Lesebeispiele sind leer, d.h. ohne Angaben. In diesen Fällen liegen für das betrachtete Halbjahr und den betrachteten Parameter keine Angaben mehr vor, weil zu diesem Zeitpunkt keine Teilnehmerin mehr in das Programm eingeschrieben ist. Daher können in diesen Fällen auch die Lesebeispiele keine Angaben enthalten.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patientinnen in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 die erste Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ Tabelle zu den **Patientinnenzahlen und UICC-Stadien** mit der zweiten Spalte. In der Beispieltabelle 0.2.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 308 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 73 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 100 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 24.

Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patientinnenzahlen und UICC-Stadien

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
Kohorte	Patientinnen insgesamt	Anzahl	308	292	273	245	214	194	171	153	124	100	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	10	10	10	8	7	6	4	4	3	2	
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	73	68	65	58	53	46	36	32	27	24	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	76	73	67	60	55	51	47	40	33	27	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	25	24	22	20	18	17	17	17	14	11	
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	11	10	9	8	7	6	4	2	1	1	
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	7	7	7	7	7	7	6	5	4	3	
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	8	7	6	5	5	5	5	5	4	2	
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	8	7	6	6	5	5	5	4	4	4		

0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Auswertungsgruppen und Kollektive

Bei der tabellarischen Darstellung wird nicht nur danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patientinnen dem DMP beigetreten sind, sondern – in den Tabellen zu Patientinnenmerkmalen und -zahlen – auch nach Altersgruppen. Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach

- Auswertungsgruppen und
- Kollektiven

Bei der Erkrankung Brustkrebs fällt sowohl die Art der bösartig veränderten Zellen, dem (möglichst frühzeitigen) Zeitpunkt der Entdeckung bzw. Diagnosestellung sowie dem Vorhandensein von Rezidiven bzw. Nah- und Fernmetastasen eine ganz erhebliche prognostische Bedeutung zu. Daher wird nachfolgend die Gesamtgruppe der Erkrankten gemäß der BVA-Kriterien in fünf **Auswertungsgruppen** unterteilt. Abgrenzungskriterien sind dabei das Datum der feingeweblichen Untersuchung (Histologie) und der Schweregrad der Erkrankung. Diese Einteilung wird anhand der Angaben in der Erstdokumentation vorgenommen und bleibt unabhängig vom weiteren Krankheitsverlauf über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. Im vorliegenden Bericht werden gemäß der Evaluationskriterien des BVA folgende fünf Auswertungsgruppen gebildet:

- **Auswertungsgruppe 1:** Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte
- **Auswertungsgruppe 2:** Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte
- **Auswertungsgruppe 3:** Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung
- **Auswertungsgruppe 4:** Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung
- **Auswertungsgruppe 5:** Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung

Zu beachten ist dabei, dass durch die mit der 13. RSA-ÄndV verbundenen Änderungen lediglich die Auswertungsgruppe 5 unverändert gebildet wird. Die Auswertungsgruppe 4 wird dagegen mit der Kohorte 2006-2 erstmalig gebildet. Sie setzt sich zusammen aus Patientinnen, die vor der 13. RSA-ÄndV den Auswertungsgruppen 1 bis 3 zugeordnet worden wären. Dies führt zu einem Bruch in der Zeitreihe: In den Kohorten bis 2006-1 wurden die Auswertungsgruppen 1 bis 3 systematisch anders abgegrenzt als in den Kohorten ab 2006-2 (siehe auch Tabelle 0.3).

Neben dieser Aufteilung nach Patientinnengruppen mit unterschiedlichen Prognosen zum Zeitpunkt der Einschreibung in das DMP werden in jeder Gruppe die neu aufgetretenen Anteile von Patientinnen ausgewiesen, bei denen Lokalrezidive oder Metastasierung festgestellt oder das Versterben dokumentiert wurde.

Zu beachten ist, dass für die Bildung der Auswertungsgruppen 1 und 2 Angaben zur Histologie erforderlich sind. Patientinnen ohne Metastasen und ohne Rezidive, bei denen die Angabe zur Histologie fehlt oder unplausibel ist, können daher keiner Auswertungsgruppe zugeordnet werden. Folglich kann die Summe der Patientinnen über die fünf Auswertungsgruppen geringer ausfallen als die Anzahl der Patientinnen insgesamt.

Innerhalb der Auswertungsgruppen wird für einige Auswertungen zusätzlich nach „**Kollektiven**“ unterschieden. Einem Kollektiv wird diejenige Teilgruppe der Patientinnen einer Auswertungsgruppe zugeordnet, bei der in der Erstdokumentation eine bestimmte Therapie, ein bestimmter Befund oder ein bestimmtes Risiko dokumentiert war. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Tabelle 0.3.1 Abgrenzung der Auswertungsgruppen vor und nach der 13. RSA-ÄndV

Nr.	Auswertungsgruppe	Definition vor 13. RSA-ÄndV	Definition nach 13. RSA-ÄndV
1	Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation bis zu 12 Wochen und gleichzeitig - kein lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation bis zu 12 Wochen und gleichzeitig - keine lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen - kein kontralateraler Brustkrebs (sonst Gruppe 4)
2	Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (fortgeschrittene Primärtherapie);	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation größer als 12 Wochen und gleichzeitig - kein lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen	Zeitraum zwischen Einschreibungsdatum und Erstmanifestation größer als 12 Wochen und gleichzeitig - kein lokoregionäres Rezidiv - keine Fernmetastasen - kein kontralateraler Brustkrebs (sonst Gruppe 4)
3	Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung;	gesicherter Nachweis eines lokoregionären Rezidivs liegt vor und gleichzeitig - kein gesicherter Nachweis zu Fernmetastasen liegt vor	gesicherter Nachweis eines lokoregionären Rezidivs liegt vor und gleichzeitig - kein gesicherter Nachweis zu Fernmetastasen liegt vor - kein kontralateraler Brustkrebs, wenn das Lokalrezidiv älter als 4,5 Jahre ist (sonst Gruppe 4)
4	Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (nur ab 13. RSA-ÄndV)	-----	Befund eines kontralateralen Brustkrebses liegt vor und gleichzeitig - kein Nachweis eines lokoregionären Rezidivs, (Ausnahme: Angabe in diesem Feld liegt länger als 4,5 Jahre zurück) - kein gesicherter Nachweis zu Fernmetastasen
5	Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung;	gesicherter Nachweis von Fernmetastasen liegt vor	

Tabelle 0.3.2 Definition der UICC-Stadien³

Stadium	Tumorgroße	Nodalstatus	Metastasierung
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
IIA	T0, T1	N1	M0
IIB	T2	N0	M0
IIB	T2	N1	M0
IIB	T3	N0	M0
IIIA	T0, T1, T2	N2	M0
IIIA	T3	N1, N2	M0
IIIB	T4	N0, N1, N2	M0
IIIC	Jedes T	N3	M0
IV	Jedes T	Jedes N	M1

³ Union internationale contre le cancer

Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte

Auswertungskapitel 1: Patientinnenzahlen und -merkmale insgesamt

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der **Patientinnenzahlen und UICC-Stadien** ab dem Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patientinnen eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen. Wenn eine Kohorte keine Patientinnen mit auswertbaren Angaben für den ersten

Berichtsteil umfasst, sind die entsprechenden Felder mit - - gefüllt. In allen anderen Fällen sind in der folgenden Tabelle die Patientinnenzahlen der Kohorten ausgewiesen. Diese Angabe erfolgt hier zur Information unabhängig davon, ob die Kohorte die Mindestgröße von 10 Patientinnen erreicht. Sofern eine Kohorte diese Mindestgröße nicht erreicht, sind in allen anderen Auswertungen die entsprechenden Felder mit „-“ gefüllt.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 308 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 73 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 100 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 24 Patientin/Patientinnen.

Tabelle 1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien⁴

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	49	49	47	44	40	39	38	35	26	22	18
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	10	10	10	8	7	7	7	7	5	5	5
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	3
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1	1

⁴ Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass die Summe der Patientinnen aus den UICC-Kategorien in der Regel kleiner ausfällt als die Anzahl der Patientinnen insgesamt. Mögliche Abweichungen entstehen, weil die Patientinnen für die UICC-Stadien nicht auswertbar sind (keine Angaben bzw. die TNM-Kombination kann keinem UICC-Stadium zugeordnet werden) und weil Patientinnen mit der Angabe ‚keine OP‘ nicht für die Kategorien IIIC und IV berücksichtigt wurden.

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	308	292	273	245	214	194	171	153	124	100	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	10	10	10	8	7	6	4	4	3	2	
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	73	68	65	58	53	46	36	32	27	24	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	76	73	67	60	55	51	47	40	33	27	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	25	24	22	20	18	17	17	17	14	11	
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	11	10	9	8	7	6	4	2	1	1	
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	7	7	7	7	7	7	6	5	4	3	
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	8	7	6	5	5	5	5	5	4	2	
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	8	7	6	6	5	5	5	5	4	4	4	
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	216	213	199	187	160	153	136	117	109		
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	3	3	3	2	2	2	1	1		
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	50	50	46	44	37	36	31	28	27		
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	42	42	39	37	31	31	28	25	23		
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	15	15	14	14	11	10	9	8	8		
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	6	6	6	6	6	5	5	4	4		
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	5	5	4	4	4	4	4	3	3		
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	14	13	10	8	7	7	7	7	7	7		
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	213	210	197	187	180	168	147	140			
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	8	8	7	7	7	7	7	7	7		
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	52	51	48	45	42	40	30	29	29		
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	46	45	43	40	38	36	31	31	31		
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	21	21	20	19	19	19	17	17	16		
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	15	15	14	14	14	14	14	14	12		
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	3	3	2	2	2	2	2		
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	6	5	5	5	5	5	5	5	5		
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	6	6	5	4	4	4	3	3	3			
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	117	117	114	112	102	94	92				
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	5	5	5	5	5	4	4				
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	26	26	24	24	22	20	20				
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	33	33	32	32	30	29	28				
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	10	10	10	10	10	8	8				
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	7	7	6	5	4	4				
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	3	3	2	2	2				
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3				
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1					

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	167	166	162	156	149	139					
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	9	9	9	9	9	9					
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	40	40	40	38	35	33					
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	34	33	31	30	29	27					
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	19	19	18	17	15	15					
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5	5	5	4	4	4					
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	5	5	5	5	5	5					
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4	4	4	4	4					
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4	4	4					
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	108	108	103	102	98						
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3						
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	26	26	25	25	25						
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	37	37	36	35	32						
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	3	3	3	3	3						
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	2	2	2	2	2						
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4	4						
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	187	186	183	176							
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	14	14	14	14							
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	59	59	59	56							
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	45	44	44	44							
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	14	14	14	14							
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	11	11	11	11							
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0							
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	1	1							
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4							
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	134	132	129								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	5	5	5								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	43	43	42								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	28	28	28								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	14	14	13								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	12	12	12								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	3	3	3								
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	3	3								

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	97	95								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	5	5								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	29	29								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	18	18								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	11	10								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5	5								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0								
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	3	3								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	108									
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4									
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	29									
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	22									
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	9									
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	3									
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	5									
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2									
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4									

Tabelle 1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen

der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2006-2 mit 308 Teilnehmerinnen. 225 von ihnen bzw. 73,05 Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Tabelle 1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	2	5	9	10	11	14	23	27	31	34
		Anteil in %	0,00	4,08	10,20	18,37	20,41	22,45	28,57	46,94	55,10	63,27	69,39
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 9,68]	[1,64; 18,77]	[7,41; 29,32]	[9,01; 31,81]	[10,65; 34,25]	[15,79; 41,35]	[32,82; 61,06]	[41,03; 69,17]	[49,63; 76,90]	[56,35; 82,43]
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1	1	1	2	3	4	4	4
		Anteil in %	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	4,08	6,12	8,16	8,16	8,16
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	2	3	3	3	4	5	5	5	5
		Anteil in %	0,00	0,00	4,08	6,12	6,12	6,12	8,16	10,20	10,20	10,20	10,20
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	3	4	5	6	13	16	20	23
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	6,12	8,16	10,20	12,24	26,53	32,65	40,82	46,94
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Anteil %	0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	49	49	47	44	40	39	38	35	26	22
am Ende des Halbjahres		Anzahl	49	47	44	40	39	38	35	26	22	18	15

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	16	35	63	94	114	137	155	184	208	225
		Anteil in %	5,19	11,36	20,45	30,52	37,01	44,48	50,32	59,74	67,53	73,05
		CI Anteil in %	[2,71; 7,68]	[7,81; 14,91]	[15,94; 24,97]	[25,37; 35,67]	[31,61; 42,41]	[38,92; 50,04]	[44,73; 55,92]	[54,25; 65,23]	[62,29; 72,77]	[68,09; 78,02]
	davon wegen Tod	Anzahl	3	15	19	28	29	32	34	38	40	40
		Anteil in %	0,97	4,87	6,17	9,09	9,42	10,39	11,04	12,34	12,99	12,99
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
		Anteil in %	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,60	2,60
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9
		Anteil in %	1,30	1,62	1,95	2,27	2,60	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	2	7	22	41	58	77	93	117	138	155
		Anteil in %	0,65	2,27	7,14	13,31	18,83	25,00	30,19	37,99	44,81	50,32
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	9	11	12	12	12	13	13	13
		Anteil %	0,00	0,32	2,92	3,57	3,90	3,90	3,90	4,22	4,22	4,22
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	308	292	273	245	214	194	171	153	124
am Ende des Halbjahres		Anzahl	292	273	245	214	194	171	153	124	100	83
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	17	29	56	63	80	99	107	116	
		Anteil in %	1,39	7,87	13,43	25,93	29,17	37,04	45,83	49,54	53,70	
		CI Anteil in %	[0,00; 2,95]	[4,27; 11,47]	[8,87; 17,98]	[20,07; 31,78]	[23,09; 35,24]	[30,58; 43,49]	[39,17; 52,49]	[42,85; 56,22]	[47,04; 60,37]	
	davon wegen Tod	Anzahl	1	7	11	15	16	18	21	21	22	
		Anteil in %	0,46	3,24	5,09	6,94	7,41	8,33	9,72	9,72	10,19	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	2	3	4	4	5	5	
		Anteil in %	0,00	0,46	0,93	0,93	1,39	1,85	1,85	2,31	2,31	
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	2	8	15	34	39	53	69	76	84	
		Anteil in %	0,93	3,70	6,94	15,74	18,06	24,54	31,94	35,19	38,89	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	5	5	5	5	5	5	
		Anteil %	0,00	0,46	0,46	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	216	213	199	187	160	153	136	117	109
am Ende des Halbjahres		Anzahl	213	199	187	160	153	136	117	109	100	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	3	16	26	33	45	66	73	89		
		Anteil in %	1,41	7,51	12,21	15,49	21,13	30,99	34,27	41,78		
		CI Anteil in %	[0,00; 2,99]	[3,96; 11,06]	[7,80; 16,61]	[10,62; 20,36]	[15,63; 26,62]	[24,76; 37,21]	[27,88; 40,66]	[35,14; 48,42]		
	davon wegen Tod	Anzahl	1	8	13	17	20	21	23	25		
		Anteil in %	0,47	3,76	6,10	7,98	9,39	9,86	10,80	11,74		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	2	2	2	2	2	3		
		Anteil in %	0,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	1,41		
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	2	6	11	14	22	42	46	59		
		Anteil in %	0,94	2,82	5,16	6,57	10,33	19,72	21,60	27,70		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	1	1	2	2		
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,94	0,94		
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	213	210	197	187	180	168	147	140		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	210	197	187	180	168	147	140	124		
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	3	5	15	23	25	31			
		Anteil in %	0,00	2,56	4,27	12,82	19,66	21,37	26,50			
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 5,44]	[0,59; 7,95]	[6,74; 18,90]	[12,43; 26,89]	[13,91; 28,83]	[18,46; 34,53]			
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	2	6	9	9	11			
		Anteil in %	0,00	0,00	1,71	5,13	7,69	7,69	9,40			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	2	2	3	3			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	2,56	2,56			
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	2	2	6	9	10	14			
		Anteil in %	0,00	1,71	1,71	5,13	7,69	8,55	11,97			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	1	3	3	3			
		Anteil %	0,00	0,85	0,85	0,85	2,56	2,56	2,56			
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	117	117	114	112	102	94	92			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	117	114	112	102	94	92	86			

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	5	11	18	28	31				
		Anteil in %	0,60	2,99	6,59	10,78	16,77	18,56				
		CI Anteil in %	[0,00; 1,77]	[0,40; 5,59]	[2,81; 10,36]	[6,06; 15,50]	[11,08; 22,45]	[12,65; 24,48]				
	davon wegen Tod	Anzahl	1	4	6	8	9	11				
		Anteil in %	0,60	2,40	3,59	4,79	5,39	6,59				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	1	1				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	2	2	2				
		Anteil in %	0,00	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	2	6	14	15				
		Anteil in %	0,00	0,00	1,20	3,59	8,38	8,98				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	2	2	2				
		Anteil %	0,00	0,00	0,60	1,20	1,20	1,20				
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	167	166	162	156	149	139			
am Ende des Halbjahres		Anzahl	166	162	156	149	139	136				
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	5	6	10	16					
		Anteil in %	0,00	4,63	5,56	9,26	14,81					
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,65; 8,61]	[1,22; 9,90]	[3,77; 14,75]	[8,08; 21,55]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	3	4	9					
		Anteil in %	0,00	1,85	2,78	3,70	8,33					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	1	1					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	1	2	2					
		Anteil in %	0,00	0,93	0,93	1,85	1,85					
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	1	2					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,93	1,85					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	2	2	2					
		Anteil %	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85					
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	108	108	103	102	98				
am Ende des Halbjahres		Anzahl	108	103	102	98	92					

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	4	11	14							
		Anteil in %	0,53	2,14	5,88	7,49							
		CI Anteil in %	[0,00; 1,58]	[0,06; 4,22]	[2,50; 9,26]	[3,70; 11,27]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	6	7							
		Anteil in %	0,00	1,07	3,21	3,74							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	1	1	1							
		Anteil in %	0,00	0,53	0,53	0,53							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	1	3	5							
		Anteil in %	0,53	0,53	1,60	2,67							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	1							
		Anteil %	0,00	0,00	0,53	0,53							
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	187	186	183	176						
am Ende des Halbjahres		Anzahl	186	183	176	173							
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	5	6								
		Anteil in %	1,49	3,73	4,48								
		CI Anteil in %	[0,00; 3,55]	[0,51; 6,95]	[0,96; 7,99]								
	davon wegen Tod	Anzahl	2	5	5								
		Anteil in %	1,49	3,73	3,73								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	1								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,75								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0								
		Anteil %	0,00	0,00	0,00								
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	134	132	129							
am Ende des Halbjahres		Anzahl	132	129	128								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	4									
		Anteil in %	2,06	4,12									
		CI Anteil in %	[0,00; 4,90]	[0,15; 8,10]									
	davon wegen Tod	Anzahl	1	3									
		Anteil in %	1,03	3,09									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1									
		Anteil in %	1,03	1,03									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0									
Anteil %		0,00	0,00										
<i>Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>97</i>	<i>95</i>										
	<i>Anzahl</i>	<i>95</i>	<i>93</i>										
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1										
		Anteil in %	0,93										
		CI Anteil in %	[0,00; 2,74]										
	davon wegen Tod	Anzahl	1										
		Anteil in %	0,93										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0										
Anteil %		0,00											
<i>Pat. insges.: zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>108</i>											
	<i>Anzahl</i>	<i>107</i>											

In Tabelle 1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts halbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 starteten 308 Teilnehmerinnen in das Programm. Das durchschnittliches Alter betrug im Beitritts halbjahr 65,24 Jahre, der Median lag bei 69,00 Jahren.

Tabelle 1.3 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres	Beitritts halbjahr
2006-1	Mean	64,80
	Median	64,00
	Fallbasis	49
2006-2	Mean	65,24
	Median	69,00
	Fallbasis	308
2007-1	Mean	67,31
	Median	70,00
	Fallbasis	216
2007-2	Mean	66,97
	Median	69,00
	Fallbasis	213
2008-1	Mean	66,05
	Median	68,00
	Fallbasis	117
2008-2	Mean	66,25
	Median	68,00
	Fallbasis	167
2009-1	Mean	66,42
	Median	67,00
	Fallbasis	108
2009-2	Mean	63,93
	Median	65,00
	Fallbasis	187
2010-1	Mean	65,15
	Median	65,50
	Fallbasis	134
2010-2	Mean	65,79
	Median	66,00
	Fallbasis	97

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2011-1	Mean	67,52
	Median	69,50
	<i>Fallbasis</i>	<i>108</i>

In Tabelle 1.4 ist die **Altersverteilung nach Altersklassen** für alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“), ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung war nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Auswertungsjahres“ vorzunehmen. Unterschiedliche Altersverteilungen

im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patientinnen die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

In der Kohorte 2006-2 entfielen im Beitrittsjahr 22 Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Tabelle 1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	45-49	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0
	50-54	6	6	1	1	2	2	2	2	1	1	1
	55-59	4	4	6	6	4	4	4	3	3	1	1
	60-64	13	13	11	10	4	4	2	2	2	2	1
	65-69	6	6	7	6	12	12	13	11	6	6	4
	70-74	10	10	12	11	8	8	6	6	5	5	3
	75-79	2	2	2	2	2	2	4	4	3	2	3
	80-84	4	4	4	4	5	4	3	3	2	1	2
	85 und älter	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3
	Patientinnen zusammen	49	49	47	44	40	39	38	35	26	22	18
2006-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	4	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0
	35-39	6	7	7	6	6	5	3	2	1	0	0
	40-44	18	12	12	12	11	10	10	7	4	4	4
	45-49	25	23	22	16	14	14	14	11	9	8	8
	50-54	22	25	24	25	21	21	17	18	14	8	8
	55-59	16	12	10	11	8	7	7	7	7	8	8
	60-64	24	18	18	17	14	11	10	10	9	6	6
	65-69	46	45	41	37	35	26	22	18	15	8	8
	70-74	61	50	45	29	24	26	21	19	16	16	16
	75-79	56	58	54	49	44	37	35	32	28	16	16
	80-84	24	34	32	34	29	29	24	18	11	17	17
	85 und älter	6	5	5	7	6	8	8	11	10	9	9
	Patientinnen zusammen	308	292	273	245	214	194	171	153	124	100	

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2007-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15-34	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	35-39	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
	40-44	6	6	6	6	5	4	1	1	2		
	45-49	11	10	7	7	3	3	4	4	4		
	50-54	14	14	15	15	14	14	10	10	5		
	55-59	12	12	12	9	11	11	9	8	9		
	60-64	24	24	17	16	12	11	10	7	9		
	65-69	34	34	32	32	24	24	20	18	15		
	70-74	42	42	39	38	32	31	26	20	17		
	75-79	51	50	49	45	33	31	25	19	20		
	80-84	13	12	13	11	17	16	22	22	24		
85 und älter	6	6	7	6	7	6	7	6	4			
	Patientinnen zusammen	216	213	199	187	160	153	136	117	109		
2007-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0			
	35-39	5	5	4	3	3	1	1	1			
	40-44	8	4	4	4	4	4	4	3			
	45-49	11	14	13	9	9	9	8	9			
	50-54	18	12	12	13	13	10	8	7			
	55-59	13	17	16	13	13	13	12	8			
	60-64	19	18	17	14	14	11	10	11			
	65-69	33	30	27	26	26	22	17	15			
	70-74	45	44	41	35	34	28	23	21			
	75-79	30	32	32	35	33	38	34	32			
	80-84	18	17	15	20	18	19	17	18			
85 und älter	13	17	16	15	13	13	13	15				
	Patientinnen zusammen	213	210	197	187	180	168	147	140			

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0			
	35-39	0	0	0	0	0	0	0	0			
	40-44	10	10	5	5	2	2	2				
	45-49	2	2	7	7	9	8	8				
	50-54	11	11	6	6	2	2	0				
	55-59	15	15	14	14	13	12	11				
	60-64	7	7	10	9	11	10	11				
	65-69	25	25	18	18	9	9	5				
	70-74	17	17	21	21	25	23	22				
	75-79	12	12	16	16	10	10	13				
	80-84	16	16	14	13	18	16	16				
	85 und älter	2	2	3	3	3	2	4				
	Patientinnen zusammen	117	117	114	112	102	94	92				
2008-2	0-14	0	0	0	0	0	0					
	15-34	1	1	1	1	1	1					
	35-39	3	3	3	3	3	2					
	40-44	4	2	2	2	2	3					
	45-49	10	8	8	5	5	4					
	50-54	16	18	18	17	16	13					
	55-59	16	14	14	12	12	11					
	60-64	15	14	14	12	11	10					
	65-69	25	24	24	22	21	21					
	70-74	27	27	26	24	23	19					
	75-79	27	30	30	31	29	25					
	80-84	15	16	13	16	16	18					
	85 und älter	8	9	9	11	10	12					
	Patientinnen zusammen	167	166	162	156	149	139					

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2009-1	0-14	0	0	0	0	0						
	15-34	1	1	1	1	1						
	35-39	0	0	0	0	0						
	40-44	2	2	1	1	1						
	45-49	6	6	4	4	3						
	50-54	4	4	7	6	4						
	55-59	13	13	12	12	11						
	60-64	15	15	8	8	8						
	65-69	29	29	26	26	23						
	70-74	14	14	19	19	20						
	75-79	11	11	10	10	9						
	80-84	10	10	11	11	13						
	85 und älter	3	3	4	4	5						
	Patientinnen zusammen	108	108	103	102	98						
2009-2	0-14	0	0	0	0							
	15-34	1	1	1	1							
	35-39	2	1	1	1							
	40-44	7	6	6	5							
	45-49	15	14	14	11							
	50-54	16	14	14	15							
	55-59	23	25	25	21							
	60-64	23	19	19	18							
	65-69	41	38	37	29							
	70-74	27	30	30	36							
	75-79	17	19	19	21							
	80-84	12	14	13	13							
	85 und älter	3	5	4	5							
	Patientinnen zusammen	187	186	183	176							

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-1	0-14	0	0	0								
	15-34	0	0	0								
	35-39	2	2	1								
	40-44	3	3	3								
	45-49	5	5	5								
	50-54	11	11	8								
	55-59	21	21	17								
	60-64	23	22	23								
	65-69	26	26	25								
	70-74	13	13	17								
	75-79	16	15	14								
	80-84	11	11	13								
	85 und älter	3	3	3								
	Patientinnen zusammen	134	132	129								
2010-2	0-14	0	0									
	15-34	0	0									
	35-39	0	0									
	40-44	3	1									
	45-49	5	7									
	50-54	10	10									
	55-59	14	11									
	60-64	10	10									
	65-69	14	14									
	70-74	16	17									
	75-79	13	12									
	80-84	7	6									
	85 und älter	5	7									
	Patientinnen zusammen	97	95									

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2011-1	0-14	0										
	15-34	1										
	35-39	1										
	40-44	4										
	45-49	4										
	50-54	7										
	55-59	10										
	60-64	13										
	65-69	14										
	70-74	23										
	75-79	10										
	80-84	13										
	85 und älter	8										
	Patientinnen zusammen	108										

In Tabelle 1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 lagen im Beitrittsjahr für 305 Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Das durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation betrug 62,74 Jahre, der Median lag bei 66,00 Jahren.

Tabelle 1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren	Beitritts-halb-jahr
2006-1	Mean	61,91
	Median	62,00
	Fallbasis	47
2006-2	Mean	62,74
	Median	66,00
	Fallbasis	305
2007-1	Mean	64,77
	Median	67,00
	Fallbasis	214
2007-2	Mean	64,94
	Median	67,00
	Fallbasis	210
2008-1	Mean	64,57
	Median	66,50
	Fallbasis	114
2008-2	Mean	65,17
	Median	68,00
	Fallbasis	166
2009-1	Mean	65,41
	Median	66,50
	Fallbasis	106
2009-2	Mean	63,05
	Median	65,00
	Fallbasis	184
2010-1	Mean	63,99
	Median	64,00
	Fallbasis	132
2010-2	Mean	64,44
	Median	64,00
	Fallbasis	95

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren	Beitritts- halbjahr
2011-1	Mean	65,61
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>107</i>

In Tabelle 1.6 ist die **Altersverteilung bei Erstmanifestation** der Patientinnen nach Alterskategorien ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Die Altersverteilung bezieht sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts- halbjahr noch Programmteilnehmerin-

nen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zum Alter bei Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“).

In der Kohorte 2006-2 entfielen im Beitritts- halbjahr 14 Patientinnen auf die Alters- klasse "50 - 54" Jahre.

Tabelle 1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2006-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	2
	45-49	4
	50-54	5
	55-59	3
	60-64	15
	65-69	9
	70-74	4
	75-79	3
	80-84	2
	85 und älter	0
	zusammen	47
ohne benötigte Angaben	2	
2006-2	0-14	0
	15-34	5
	35-39	11
	40-44	23
	45-49	31
	50-54	14
	55-59	20
	60-64	29
	65-69	61
	70-74	53
	75-79	43
	80-84	12
	85 und älter	3
	zusammen	305
ohne benötigte Angaben	3	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2007-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	6
	40-44	6
	45-49	14
	50-54	15
	55-59	19
	60-64	29
	65-69	41
	70-74	33
	75-79	40
	80-84	7
	85 und älter	3
	zusammen	214
	ohne benötigte Angaben	2
2007-2	0-14	0
	15-34	1
	35-39	5
	40-44	11
	45-49	13
	50-54	15
	55-59	17
	60-64	26
	65-69	37
	70-74	37
	75-79	24
	80-84	14
	85 und älter	10
	zusammen	210
	ohne benötigte Angaben	3

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2008-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	9
	45-49	3
	50-54	14
	55-59	13
	60-64	8
	65-69	22
	70-74	17
	75-79	16
	80-84	9
	85 und älter	2
	zusammen	114
	ohne benötigte Angaben	3
2008-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	2
	40-44	7
	45-49	12
	50-54	18
	55-59	12
	60-64	14
	65-69	27
	70-74	33
	75-79	18
	80-84	13
	85 und älter	8
	zusammen	166
	ohne benötigte Angaben	1

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2009-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	0
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	8
	55-59	10
	60-64	16
	65-69	28
	70-74	13
	75-79	11
	80-84	8
	85 und älter	3
	zusammen	106
	ohne benötigte Angaben	2
2009-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	1
	40-44	11
	45-49	13
	50-54	15
	55-59	25
	60-64	23
	65-69	40
	70-74	24
	75-79	19
	80-84	9
	85 und älter	2
	zusammen	184
	ohne benötigte Angaben	3

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2010-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	4
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	13
	55-59	22
	60-64	21
	65-69	24
	70-74	15
	75-79	14
	80-84	9
	85 und älter	2
	zusammen	132
	ohne benötigte Angaben	2
2010-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	9
	55-59	19
	60-64	11
	65-69	14
	70-74	15
	75-79	8
	80-84	5
	85 und älter	5
	zusammen	95
	ohne benötigte Angaben	2

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre	Beitritts- halbjahr
2011-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	3
	40-44	3
	45-49	5
	50-54	7
	55-59	13
	60-64	12
	65-69	21
	70-74	16
	75-79	10
	80-84	11
	85 und älter	5
	zusammen	107
	ohne benötigte Angaben	1

In Tabelle 1.7 ist die **mittlere Dauer der Erkrankung** vor der Einschreibung in Jahren ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zur Erkrankungsdauer vor Einschreibung vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 lagen im Beitrittsjahr für 305 Patientinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer vor Einschreibung betrug 2,42 Jahre, der Median lag bei 2,00 Jahren.

Tabelle 1.7 Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren

EZ	Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren	Beitritts-halbjahr
2006-1	Mean	2,40
	Median	2,00
	<i>Fallbasis</i>	47
2006-2	Mean	2,42
	Median	2,00
	<i>Fallbasis</i>	305
2007-1	Mean	2,57
	Median	2,00
	<i>Fallbasis</i>	214
2007-2	Mean	1,88
	Median	1,00
	<i>Fallbasis</i>	210
2008-1	Mean	1,33
	Median	1,00
	<i>Fallbasis</i>	114
2008-2	Mean	1,02
	Median	0,00
	<i>Fallbasis</i>	166
2009-1	Mean	0,99
	Median	1,00
	<i>Fallbasis</i>	106
2009-2	Mean	0,82
	Median	0,00
	<i>Fallbasis</i>	184
2010-1	Mean	1,17
	Median	1,00
	<i>Fallbasis</i>	132
2010-2	Mean	1,01
	Median	0,00
	<i>Fallbasis</i>	95

EZ	Mittlere Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren	Beitritts-halb-jahr
2011-1	Mean	1,79
	Median	1,00
	<i>Fallbasis</i>	107

Ergänzend zur mittleren Dauer der Erkrankung vor Einschreibung in Jahren erfolgt in Tabelle 1.8 der **Ausweis der Erkrankungsdauer in Kategorien**. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen pro Kategorie. Berücksichtigt werden alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die ein medizinischer Datensatz mit Angaben zur Erkrankungsdauer vor Einschreibung vorlag.

In der Kohorte 2006-2 betrug im Beitrittsjahr bei 18 Patientinnen die Erkrankungsdauer vor Einschreibung "5 bis 9" Jahre.

Tabelle 1.8 Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien

EZ	Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien	Beitritts- halbjahr
2006-1	bis unter 5	43
	5 bis 9	3
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	49
2006-2	bis unter 5	279
	5 bis 9	18
	10 bis 14	2
	15 bis 19	4
	20 bis 24	1
	25 und älter	1
	Patientinnen zusammen	308
2007-1	bis unter 5	185
	5 bis 9	22
	10 bis 14	4
	15 bis 19	1
	20 bis 24	2
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	216
2007-2	bis unter 5	195
	5 bis 9	10
	10 bis 14	2
	15 bis 19	2
	20 bis 24	1
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	213

EZ	Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien	Beitritts- halbjahr
2008-1	bis unter 5	110
	5 bis 9	2
	10 bis 14	1
	15 bis 19	1
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	117
2008-2	bis unter 5	160
	5 bis 9	1
	10 bis 14	4
	15 bis 19	1
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	167
2009-1	bis unter 5	102
	5 bis 9	3
	10 bis 14	1
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	108
2009-2	bis unter 5	178
	5 bis 9	3
	10 bis 14	3
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	187
2010-1	bis unter 5	131
	5 bis 9	1
	10 bis 14	0
	15 bis 19	0
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	134

EZ	Dauer der Erkrankung vor Einschreibung – Verteilung auf Kategorien	Beitritts- halbjahr
2010-2	bis unter 5	91
	5 bis 9	3
	10 bis 14	0
	15 bis 19	1
	20 bis 24	0
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	97
2011-1	bis unter 5	98
	5 bis 9	3
	10 bis 14	2
	15 bis 19	3
	20 bis 24	1
	25 und älter	0
	Patientinnen zusammen	108

In Tabelle 1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird

ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,31 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Tabelle 1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,31
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>7342</i>

In Tabelle 1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2006-2 sind im Durchschnitt 5,73 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 6,00.

Tabelle 1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Halbjahre
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,31
		Median	8,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>358</i>
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,73
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>1766</i>
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,90
		Median	8,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>1274</i>
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,77
		Median	7,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>1229</i>
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,39
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>631</i>
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,62
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>772</i>
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,81
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>411</i>
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,91
		Median	3,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>545</i>
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,95
		Median	2,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>261</i>

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Halbjahre
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	0,98
		Median	1,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>95</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2006-2 waren zu Beginn des letzten Halbjahres 100 Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei 40 von Ihnen bzw. 40,00 Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Tabelle 1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	49	49	47	44	40	39	38	35	26	22	18	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		15	11	9	9	5	8	13	10	12	10	
		Anteil in %			30,61	23,40	20,45	22,50	12,82	21,05	37,14	38,46	54,55	55,56
		CI Anteil in %			[17,57; 43,65]	[11,17; 35,64]	[8,40; 32,51]	[9,39; 35,61]	[2,19; 23,45]	[7,92; 34,19]	[20,90; 53,38]	[19,39; 57,53]	[33,25; 75,84]	[31,93; 79,18]
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	308	292	273	245	214	194	171	153	124	100		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		43	60	49	35	33	47	51	44	40		
		Anteil in %			14,73	21,98	20,00	16,36	17,01	27,49	33,33	35,48	40,00	
		CI Anteil in %			[10,65; 18,80]	[17,06; 26,90]	[14,98; 25,02]	[11,39; 21,32]	[11,71; 22,31]	[20,77; 34,20]	[25,84; 40,83]	[27,03; 43,94]	[30,35; 49,65]	
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	216	213	199	187	160	153	136	117	109			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		34	35	41	43	48	46	47	49			
		Anteil in %			15,96	17,59	21,93	26,88	31,37	33,82	40,17	44,95		
		CI Anteil in %			[11,03; 20,89]	[12,28; 22,89]	[15,98; 27,87]	[19,98; 33,77]	[24,00; 38,75]	[25,84; 41,80]	[31,25; 49,09]	[35,57; 54,34]		
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	213	210	197	187	180	168	147	140				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		39	32	45	40	39	34	50				
		Anteil in %			18,57	16,24	24,06	22,22	23,21	23,13	35,71			
		CI Anteil in %			[13,30; 23,84]	[11,08; 21,41]	[17,92; 30,21]	[16,13; 28,31]	[16,81; 29,62]	[16,29; 29,97]	[27,75; 43,68]			
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	117	117	114	112	102	94	92					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		18	19	21	21	21	27					
		Anteil in %			15,38	16,67	18,75	20,59	22,34	29,35				
		CI Anteil in %			[8,82; 21,95]	[9,80; 23,54]	[11,49; 26,01]	[12,70; 28,47]	[13,87; 30,81]	[19,99; 38,70]				
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	167	166	162	156	149	139						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		20	30	23	37	31						
		Anteil in %			12,05	18,52	14,74	24,83	22,30					
		CI Anteil in %			[7,08; 17,02]	[12,52; 24,52]	[9,16; 20,33]	[17,87; 31,79]	[15,36; 29,25]					

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	108	103	102	98						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		15	8	13	10					
		Anteil in %		13,89	7,77	12,75	10,20					
		CI Anteil in %		[7,34; 20,44]	[2,57; 12,96]	[6,24; 19,25]	[4,18; 16,23]					
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	187	186	183	176						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		24	28	28						
		Anteil in %		12,90	15,30	15,91						
		CI Anteil in %		[8,07; 17,73]	[10,07; 20,53]	[10,49; 21,33]						
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	134	132	129							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		12	20							
		Anteil in %		9,09	15,50							
		CI Anteil in %		[4,17; 14,01]	[9,23; 21,77]							
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	97	95								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		16								
		Anteil in %		16,84								
		CI Anteil in %		[9,28; 24,41]								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	108									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl										
		Anteil in %										
		CI Anteil in %										

Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer

In Tabelle 2.1. ist dargestellt, wie viele **Leistungserbringer**, d.h. Ärzte bzw. stationäre Einrichtungen sich jeweils zum Stichtag 30.6. und 31.12. eines Jahres an der Behandlung der DMP-Teilnehmerinnen in Sachsen-Anhalt beteiligten und wie viele eingeschriebene Versicherte rechnerisch auf einen Leistungserbringer entfielen. Diese Angaben werden von den Krankenkassen gesondert zur Verfügung gestellt. Bei den Leistungserbringern ist eine Differenzierung nach Hausärzten, Gynäkologen, Onkolo-

gen und stationären Einrichtungen insgesamt vorgesehen. Die Angaben zu den onkologisch qualifizierten koordinierenden Ärzten konnten für die Mehrheit der Regionen erst ab dem ersten bzw. zweiten Halbjahr 2008 ermittelt werden. Daher enthalten die Halbjahr davor keine Angaben.

Tabelle 2.1 Leistungserbringer⁵

EZ		zum Stichtag 30.06.2006	zum Stichtag 31.12.2006	zum Stichtag 30.06.2007	zum Stichtag 31.12.2007	zum Stichtag 30.06.2008	zum Stichtag 31.12.2008	zum Stichtag 30.06.2009	zum Stichtag 31.12.2009	zum Stichtag 30.06.2010	zum Stichtag 31.12.2010	zum Stichtag 30.06.2011
Hausärzte	Anzahl Leistungserbringer	0	0	0	2	2	2	4	3	4	3	0
	Veränderung*, absolut		0	0	2	0	0	2	-1	1	-1	-3
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	0,00	0,00	0,00	482,00	607,50	699,50	384,75	554,33	437,75	611,33	0,00
Gynäkologen	Anzahl Leistungserbringer	37	99	134	140	142	142	168	147	146	153	152
	Veränderung*, absolut		62	35	6	2	0	26	-21	-1	7	-1
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	0,70	2,39	4,43	6,89	8,56	9,85	9,16	11,31	11,99	11,99	12,16
onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte**	Anzahl Leistungserbringer					31	31	32	32	27	30	29
	Veränderung*, absolut					31	0	1	0	-5	3	-1
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer					39,19	45,13	48,09	51,97	64,85	61,13	63,72
Stationäre Einrichtungen insgesamt	Anzahl Leistungserbringer	3	3	3	3	16	16	18	3	3	17	17
	Veränderung*, absolut		0	0	0	13	0	2	-15	0	14	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	8,67	79,00	197,67	321,33	75,94	87,44	85,50	554,33	583,67	107,88	108,71
<i>zum Vergleich: eingeschriebene Versicherte lt. KM 6/2</i>	<i>Anzahl</i>	<i>26</i>	<i>237</i>	<i>593</i>	<i>964</i>	<i>1215</i>	<i>1399</i>	<i>1539</i>	<i>1663</i>	<i>1751</i>	<i>1834</i>	<i>1848</i>

* Veränderung gegenüber dem vorangegangenen Stichtag

** Als onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte werden teilnehmende Internisten mit Spezialisierung "internistische Onkologie und Hämatologie" oder Gynäkologen mit Spezialisierung "Gynäkologische Onkologie" aufgeführt.

⁵ Die Daten zu den Leistungserbringern werden von der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV), bzw. vom Vertragspartner geliefert. Sollten Leistungserbringerzahlen dieses Berichtes geringfügig von den Zahlen vorhergehender Berichte abweichen, so ist dies in unterschiedlichen Zugriffszeitpunkten auf die KV Daten begründet.

Auswertungskapitel 3: Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)

3.1 Patientinnenzahlen und –merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte. Die neue oder zeitnahe Diagnose bedeutet dabei, dass bei Einschreibung in das DMP das Datum der histologischen Nachweises eines Primärtumors nicht länger als 12 Wochen zurücklag. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein.

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 3.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitritts- halbjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 31 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 10 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 23 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/ bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 9 Patientin/Patientinnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1⁶

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

⁶ Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass die Summe der Patientinnen aus den UICC-Kategorien in der Regel kleiner ausfällt als die Anzahl der Patientinnen insgesamt. Mögliche Abweichungen entstehen, weil die Patientinnen für die UICC-Stadien nicht auswertbar sind (keine Angaben bzw. die TNM-Kombination kann keinem UICC-Stadium zugeordnet werden) und weil Patientinnen mit der Angabe ‚keine OP‘ nicht für die Kategorien IIIC und IV berücksichtigt wurden.

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	31	30	29	27	25	25	24	24	23	23
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	8	7	6	5	5	5	5	5	5	5
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	34	34	34	34	32	32	32	32	31	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	51	51	47	46	44	44	44	44		
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	2	2	2	2	2	2		
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7		
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	13	13	12	12	11	11	11	11		
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5		
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	4	4	3	3	3	3	3	3		
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0		
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2		
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	50	50	49	48	47	46	45			
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3			
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	14	14	13	13	13	13	13			
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	13	13	13	13	13	13	12			
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3			
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	3	3	3	3	3	2	2			
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	1	0	0	0			
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2			
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0				

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	65	65	63	62	61	61					
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4	4	4	4					
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	20	20	20	20	19	19					
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	13	13	12	12	12	12					
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	6	6	6	6	6	6					
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	1	1	1	1	1	1					
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2					
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1	1	1					
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0	0	0	0						
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	48	48	46	46	45						
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3						
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	13	13	13	13	13						
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	17	17	16	16	16						
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	2	2	2	2	2						
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0	0	0	0						
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0	0	0							
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	58	58	58	58							
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4	4							
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	12	12	12	12							
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	14	14	14	14							
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	7	7	7	7							
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	3	3	3	3							
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0							
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1							
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2	2	2	2								
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	40	39	38								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	14	14	14								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	8	8	8								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	2	2	2								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5	5	5								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0	0								
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2	1	1									

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	35	34								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	13	13								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	5	5								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	1	1								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	3	3								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0								
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	38									
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1									
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	8									
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	7									
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	3									
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	1									
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2									
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2									
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1									

Tabelle 3.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2006-2 mit 31 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. 8 von ihnen bzw. 25,81 Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	2	4	6	6	7	7	8	8	8
		Anteil in %	3,23	6,45	12,90	19,35	19,35	22,58	22,58	25,81	25,81	25,81
		CI Anteil in %	[0,00; 9,55]	[0,00; 15,24]	[0,91; 24,90]	[5,22; 33,49]	[5,22; 33,49]	[7,62; 37,54]	[7,62; 37,54]	[10,15; 41,46]	[10,15; 41,46]	[10,15; 41,46]
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	3	3	4	4	5	5	5
		Anteil in %	0,00	3,23	3,23	9,68	9,68	12,90	12,90	16,13	16,13	16,13
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Anteil in %	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
		Anteil %	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	31	30	29	27	25	25	24	24	23
am Ende des Halbjahres		Anzahl	30	29	27	25	25	24	24	23	23	23
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	0	0	2	2	2	2	3	4	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	8,82	11,76	
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 13,91]	[0,00; 13,91]	[0,00; 13,91]	[0,00; 13,91]	[0,00; 18,50]	[0,77; 22,76]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	1	1	1	1	1	2	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	5,88	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	34	34	34	34	32	32	32	31	
am Ende des Halbjahres		Anzahl	34	34	34	32	32	32	31	30		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	4	5	7	7	7	7	9			
		Anteil in %	0,00	7,84	9,80	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	17,65		
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,39; 15,30]	[1,56; 18,05]	[4,19; 23,26]	[4,19; 23,26]	[4,19; 23,26]	[4,19; 23,26]	[4,19; 23,26]	[7,08; 28,21]		
	davon wegen Tod	Anzahl	0	3	4	6	6	6	6	6	7		
		Anteil in %	0,00	5,88	7,84	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	13,73		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1	1	2		
		Anteil in %	0,00	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	3,92		
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	51	51	47	46	44	44	44	44		
am Ende des Halbjahres		Anzahl	51	47	46	44	44	44	44	44			
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	1	2	3	4	5	6				
		Anteil in %	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00				
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 5,92]	[0,00; 9,49]	[0,00; 12,65]	[0,40; 15,60]	[1,60; 18,40]	[2,90; 21,10]				
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	2	3	3	4				
		Anteil in %	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	6,00	8,00				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	1	1				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	1	1	1	1				
		Anteil in %	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	50	50	49	48	47	46	45			
am Ende des Halbjahres		Anzahl	50	49	48	47	46	45	44				

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	2	3	4	4	5				
		Anteil in %	0,00	3,08	4,62	6,15	6,15	7,69				
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 7,31]	[0,00; 9,76]	[0,27; 12,04]	[0,27; 12,04]	[1,16; 14,22]				
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	2	3	3	4				
		Anteil in %	0,00	3,08	3,08	4,62	4,62	6,15				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	1	1	1				
		Anteil %	0,00	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54				
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	65	65	63	62	61	61			
am Ende des Halbjahres		Anzahl	65	63	62	61	61	60				
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	2	2	3	4					
		Anteil in %	0,00	4,17	4,17	6,25	8,33					
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 9,88]	[0,00; 9,88]	[0,00; 13,17]	[0,43; 16,24]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1	1	2					
		Anteil in %	0,00	2,08	2,08	2,08	4,17					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	1	1					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08					
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	1	1					
		Anteil %	0,00	2,08	2,08	2,08	2,08					
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	48	48	46	46	45				
am Ende des Halbjahres		Anzahl	48	46	46	45	44					

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	58	58	58	58							
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	58	58	58	58							
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	2	2								
		Anteil in %	2,50	5,00	5,00								
		CI Anteil in %	[0,00; 7,40]	[0,00; 11,84]	[0,00; 11,84]								
	davon wegen Tod	Anzahl	1	2	2								
		Anteil in %	2,50	5,00	5,00								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0								
		Anteil %	0,00	0,00	0,00								
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	40	39	38								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	39	38	38								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	3									
		Anteil in %	2,86	8,57									
		CI Anteil in %	[0,00; 8,46]	[0,00; 17,98]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2									
		Anteil in %	0,00	5,71									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1									
		Anteil in %	2,86	2,86									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	35	34									
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	34	32									
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	38										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	38										

In Tabelle 3.1.4 ist die **Altersverteilung nach Altersklassen** für alle Patientinnen, die im jeweiligen Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“), ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung war nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Auswertungsjahres“ vorzunehmen. Unterschiedliche

Altersverteilungen im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patientinnen die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

In der Kohorte 2006-2 entfielen im Beitritts-halbjahr 4 Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Tabelle 3.1.4 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	0-14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15-34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35-39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	40-44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	45-49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	50-54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	55-59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	60-64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	65-69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70-74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75-79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	80-84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	85 und älter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Patientinnen zusammen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	40-44	4	3	3	2	2	2	2	2	0	0	1
	45-49	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
	50-54	4	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1
	55-59	2	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4
	60-64	4	3	3	4	2	2	2	1	1	1	1
	65-69	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	3
	70-74	3	2	1	0	0	1	1	2	2	2	4
	75-79	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	1
	80-84	1	2	2	4	4	4	3	2	1	3	3
	85 und älter	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	Patientinnen zusammen	31	30	29	27	25	25	24	24	23	23	23

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2007-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	45-49	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	50-54	4	4	3	3	2	2	2	2	2	0	0
	55-59	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4
	60-64	3	3	3	3	1	1	2	2	4	4	2
	65-69	6	6	5	5	6	6	4	4	4	4	2
	70-74	7	7	5	5	3	3	5	5	5	5	5
	75-79	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	80-84	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	4
	85 und älter	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3
	Patientinnen zusammen	34	34	34	34	32	32	32	32	31		
2007-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	45-49	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4
	50-54	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
	55-59	4	6	6	5	5	4	4	4	2	2	2
	60-64	3	3	3	2	2	2	2	2	4	4	4
	65-69	10	10	8	6	6	5	5	4	4	4	4
	70-74	9	7	6	9	8	8	8	8	7	7	7
	75-79	7	9	9	9	9	8	8	8	10	10	10
	80-84	2	1	0	1	1	4	4	4	4	4	4
	85 und älter	5	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4
	Patientinnen zusammen	51	51	47	46	44	44	44	44			

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-1	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40-44	5	5	1	1	1	1	1	1	1		
	45-49	1	1	5	5	5	5	5	5	5		
	50-54	5	5	2	2	1	1	1	0			
	55-59	7	7	8	8	6	6	6	6	6		
	60-64	3	3	3	3	6	6	6	6	6		
	65-69	7	7	7	7	3	3	3	3	3		
	70-74	10	10	7	7	9	9	8	8	8		
	75-79	6	6	9	9	7	7	7	7	7		
	80-84	5	5	6	5	8	7	6	6	6		
	85 und älter	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
	Patientinnen zusammen	50	50	49	48	47	46	45				
2008-2	0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40-44	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	45-49	5	4	4	3	3	3	3	3	3		
	50-54	9	9	9	8	8	6	6	6	6		
	55-59	7	7	7	7	7	9	9	9	9		
	60-64	9	6	6	5	5	4	4	4	4		
	65-69	7	12	12	9	9	9	9	9	9		
	70-74	11	8	7	10	9	7	7	7	7		
	75-79	10	12	12	12	12	12	12	12	12		
	80-84	4	5	4	6	6	8	8	8	8		
	85 und älter	2	2	2	2	2	3	3	3	3		
	Patientinnen zusammen	65	65	63	62	61	61					

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2009-1	0-14	0	0	0	0	0						
	15-34	1	1	1	1	1						
	35-39	0	0	0	0	0						
	40-44	1	1	1	1	1						
	45-49	1	1	1	1	1						
	50-54	1	1	1	1	1						
	55-59	4	4	4	4	4						
	60-64	8	8	4	4	5						
	65-69	12	12	11	11	9						
	70-74	8	8	9	9	8						
	75-79	5	5	5	5	7						
	80-84	5	5	7	7	8						
	85 und älter	2	2	2	2	2						
	Patientinnen zusammen	48	48	46	46	45						
2009-2	0-14	0	0	0	0	0						
	15-34	0	0	0	0	0						
	35-39	0	0	0	0	0						
	40-44	2	2	2	2	2						
	45-49	3	1	1	1	1						
	50-54	7	7	7	7	7						
	55-59	7	8	8	8	6						
	60-64	4	4	4	4	4						
	65-69	16	14	14	13	13						
	70-74	11	13	13	13	6						
	75-79	4	4	4	4	5						
	80-84	3	4	4	4	1						
	85 und älter	1	1	1	1	1						
	Patientinnen zusammen	58	58	58	58							

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-1	0-14	0	0	0								
	15-34	0	0	0								
	35-39	1	1	0								
	40-44	0	0	1								
	45-49	2	2	2								
	50-54	3	3	2								
	55-59	6	6	4								
	60-64	5	4	5								
	65-69	6	6	6								
	70-74	6	6	7								
	75-79	5	5	5								
	80-84	4	4	5								
	85 und älter	2	2	1								
	Patientinnen zusammen	40	39	38								
2010-2	0-14	0	0									
	15-34	0	0									
	35-39	0	0									
	40-44	1	0									
	45-49	2	3									
	50-54	3	3									
	55-59	9	7									
	60-64	4	4									
	65-69	4	5									
	70-74	3	4									
	75-79	6	6									
	80-84	2	1									
	85 und älter	1	1									
	Patientinnen zusammen	35	34									

EZ	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2011-1	0-14	0										
	15-34	1										
	35-39	1										
	40-44	3										
	45-49	1										
	50-54	5										
	55-59	3										
	60-64	6										
	65-69	4										
	70-74	6										
	75-79	0										
	80-84	7										
	85 und älter	1										
		Patientinnen zusammen	38									

In Tabelle 3.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 lagen im Beitrittsjahr für 31 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Das durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation betrug 62,45 Jahre, der Median lag bei 64,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 1

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 1	Beitrittsjahr
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	62,45
	Median	64,00
	Fallbasis	31
2007-1	Mean	66,00
	Median	68,00
	Fallbasis	34
2007-2	Mean	66,67
	Median	68,00
	Fallbasis	51
2008-1	Mean	65,18
	Median	68,00
	Fallbasis	50
2008-2	Mean	65,35
	Median	67,00
	Fallbasis	65
2009-1	Mean	67,44
	Median	68,50
	Fallbasis	48
2009-2	Mean	64,50
	Median	67,00
	Fallbasis	58
2010-1	Mean	66,78
	Median	66,50
	Fallbasis	40

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2010-2	Mean	64,31
	Median	64,00
	<i>Fallbasis</i>	35
2011-1	Mean	62,95
	Median	62,50
	<i>Fallbasis</i>	38

In Tabelle 3.1.6 ist die **Altersverteilung bei Erstmanifestation** der Patientinnen nach Alterskategorien ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Die Altersverteilung bezieht sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts halbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zum Alter bei Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“).

In der Kohorte 2006-2 entfiel/entfielen im Beitritts halbjahr 4 Patientin/Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts halbjahr
2006-1	0-14	--
	15-34	--
	35-39	--
	40-44	--
	45-49	--
	50-54	--
	55-59	--
	60-64	--
	65-69	--
	70-74	--
	75-79	--
	80-84	--
	85 und älter	--
	zusammen	--
ohne benötigte Angaben	--	
2006-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	4
	45-49	1
	50-54	4
	55-59	2
	60-64	4
	65-69	5
	70-74	3
	75-79	5
	80-84	1
	85 und älter	1
	zusammen	31
ohne benötigte Angaben	0	

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2007-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	0
	40-44	1
	45-49	0
	50-54	4
	55-59	3
	60-64	3
	65-69	6
	70-74	7
	75-79	6
	80-84	3
	85 und älter	0
	zusammen	34
	ohne benötigte Angaben	0
2007-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	2
	45-49	5
	50-54	4
	55-59	4
	60-64	3
	65-69	10
	70-74	9
	75-79	7
	80-84	2
	85 und älter	5
	zusammen	51
	ohne benötigte Angaben	0

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2008-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	5
	45-49	1
	50-54	5
	55-59	7
	60-64	3
	65-69	7
	70-74	10
	75-79	6
	80-84	5
	85 und älter	1
	zusammen	50
	ohne benötigte Angaben	0
2008-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	1
	45-49	5
	50-54	9
	55-59	7
	60-64	9
	65-69	7
	70-74	11
	75-79	10
	80-84	4
	85 und älter	2
	zusammen	65
	ohne benötigte Angaben	0

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2009-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	0
	40-44	1
	45-49	1
	50-54	1
	55-59	5
	60-64	7
	65-69	12
	70-74	8
	75-79	5
	80-84	5
	85 und älter	2
	zusammen	48
	ohne benötigte Angaben	0
2009-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	2
	45-49	3
	50-54	7
	55-59	7
	60-64	4
	65-69	16
	70-74	11
	75-79	4
	80-84	3
	85 und älter	1
	zusammen	58
	ohne benötigte Angaben	0

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2010-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	0
	45-49	2
	50-54	3
	55-59	6
	60-64	5
	65-69	6
	70-74	7
	75-79	4
	80-84	4
	85 und älter	2
	zusammen	40
	ohne benötigte Angaben	0
2010-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	1
	45-49	2
	50-54	3
	55-59	9
	60-64	4
	65-69	4
	70-74	3
	75-79	6
	80-84	2
	85 und älter	1
	zusammen	35
	ohne benötigte Angaben	0

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2011-1	0-14	0
	15-34	1
	35-39	1
	40-44	3
	45-49	1
	50-54	5
	55-59	3
	60-64	6
	65-69	5
	70-74	5
	75-79	1
	80-84	6
	85 und älter	1
	zusammen	38
	ohne benötigte Angaben	0

In Tabelle 3.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,21 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 1

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 1		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,21
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>1908</i>

In Tabelle 3.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2006-2 sind im Durchschnitt 7,42 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 9,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 1

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 1	Halbjahre	
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,42
		Median	9,00
		<i>Halbjahressumme</i>	230
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,68
		Median	8,00
		<i>Halbjahressumme</i>	261
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,27
		Median	7,00
		<i>Halbjahressumme</i>	320
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,70
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	285
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,80
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	312
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,85
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	185
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,00
		Median	3,00
		<i>Halbjahressumme</i>	174
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,93
		Median	2,00
		<i>Halbjahressumme</i>	77

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 1		Halbjahre
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	0,97
		Median	1,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>34</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 3.1.10 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen

In der Kohorte 2006-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres 23 Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei 6 von Ihnen bzw. 26,09 Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	31	30	29	27	25	25	24	24	23	23
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6	5	4	2	3	8	6	7	6
		Anteil in %		20,00	17,24	14,81	8,00	12,00	33,33	25,00	30,43	26,09
		CI Anteil in %		[5,44; 34,56]	[3,25; 31,23]	[1,16; 28,47]	[0,00; 18,85]	[0,00; 25,00]	[14,07; 52,60]	[7,30; 42,70]	[11,21; 49,66]	[7,74; 44,44]
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	34	34	34	34	32	32	32	32	31	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6	7	7	7	9	10	13	12	
		Anteil in %		17,65	20,59	20,59	21,88	28,13	31,25	40,63	38,71	
		CI Anteil in %		[4,64; 30,65]	[6,79; 34,38]	[6,79; 34,38]	[7,32; 36,43]	[12,30; 43,95]	[14,93; 47,57]	[23,34; 57,91]	[21,28; 56,14]	
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	51	51	47	46	44	44	44	44		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		9	6	9	9	9	9	14		
		Anteil in %		17,65	12,77	19,57	20,45	20,45	20,45	31,82		
		CI Anteil in %		[7,08; 28,21]	[3,12; 22,41]	[7,97; 31,16]	[8,40; 32,51]	[8,40; 32,51]	[8,40; 32,51]	[17,90; 45,74]		
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	50	50	49	48	47	46	45			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		9	4	6	6	12	12			
		Anteil in %		18,00	8,16	12,50	12,77	26,09	26,67			
		CI Anteil in %		[7,24; 28,76]	[0,42; 15,91]	[3,04; 21,96]	[3,12; 22,41]	[13,26; 38,92]	[13,60; 39,73]			
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	65	65	63	62	61	61				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		7	12	8	10	13				
		Anteil in %		10,77	19,05	12,90	16,39	21,31				
		CI Anteil in %		[3,17; 18,36]	[9,27; 28,82]	[4,49; 21,32]	[7,03; 25,76]	[10,95; 31,67]				

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	48	48	46	46	45					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		8	6	6	4					
		Anteil in %		16,67	13,04	13,04	8,89					
		CI Anteil in %		[6,01; 27,32]	[3,20; 22,88]	[3,20; 22,88]	[0,48; 17,30]					
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	58	58	58	58						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		10	13	9						
		Anteil in %		17,24	22,41	15,52						
		CI Anteil in %		[7,43; 27,05]	[11,59; 33,24]	[6,12; 24,92]						
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	40	39	38							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2	1							
		Anteil in %		5,13	2,63							
		CI Anteil in %		[0,00; 12,14]	[0,00; 7,79]							
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	35	34								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6								
		Anteil in %		17,65								
		CI Anteil in %		[4,64; 30,65]								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	38									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl										
		Anteil in %										
		CI Anteil in %										

In den folgenden drei Tabellen sind die **TNM-Stadien** (Tumore, Nodes [Lymphknoten-metastasen], (Fern-)Metastasen) laut Erstdokumentation dargestellt.

In Tabelle 3.1.12 ist nach TNM-Klassifikationsschema (pTNM) die postoperativ (histopathologisch) bestimmte Tumorausdehnung **pTx** der Patientinnen ausgewiesen.⁷

Dazu wird unter „Auswertungsgruppe 1 insgesamt“ für jede Kohorte zunächst angegeben, wie viele Programmteilnehmerinnen der Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung zuzuordnen waren, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose

erfolgte. Für die „auswertbaren“ Patientinnen wird anschließend die postoperativ bestimmte Tumorausdehnung ausgewiesen bzw. wenn dies nicht möglich ist, die Angabe, ob keine Operation erfolgte oder keine Beurteilung möglich war.

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2006-2 31 Patientin/Patientinnen. Davon konnte/konnten 30 in die Auswertung einbezogen werden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

⁷ In Einzelfällen fließen die entsprechenden Werte aus der präoperativen Erstdokumentation ein, sofern keine postoperative Erstdokumentation im Auswertungszeitraum vorliegt (siehe auch: Rechenregeln für das DMP Brustkrebs V18 vom 19.09.2012).

Tabelle 3.1.12 TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 3	
	auswertbar	Anzahl 1	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
	pT2	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT3	Anzahl	0
Anteil in %		0,00	
CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	
pT4	Anzahl	0	
	Anteil in %	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 31	
	auswertbar	Anzahl 30	
	keine OP	Anzahl	1
		Anteil in %	3,33
		CI Anteil in %	[0,00; 9,87]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	3
		Anteil in %	10,00
		CI Anteil in %	[0,00; 20,92]
	pTis	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	14
		Anteil in %	46,67
		CI Anteil in %	[28,51; 64,82]
	pT2	Anzahl	12
		Anteil in %	40,00
		CI Anteil in %	[22,17; 57,83]
pT3	Anzahl	0	
	Anteil in %	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	
pT4	Anzahl	0	
	Anteil in %	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 34	
	auswertbar	Anzahl 32	
	keine OP	Anzahl	1
		Anteil in %	3,13
		CI Anteil in %	[0,00; 9,25]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	17
		Anteil in %	53,13
		CI Anteil in %	[35,56; 70,69]
	pT2	Anzahl	10
		Anteil in %	31,25
		CI Anteil in %	[14,93; 47,57]
	pT3	Anzahl	1
Anteil in %		3,13	
CI Anteil in %		[0,00; 9,25]	
pT4	Anzahl	3	
	Anteil in %	9,38	
	CI Anteil in %	[0,00; 19,64]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Anzahl	Beitritts- halbjahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	51
	auswertbar	Anzahl	50
	keine OP	Anzahl	4
		Anteil in %	8,00
		CI Anteil in %	[0,40; 15,60]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	1
		Anteil in %	2,00
		CI Anteil in %	[0,00; 5,92]
	pTis	Anzahl	4
		Anteil in %	8,00
		CI Anteil in %	[0,40; 15,60]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	13
		Anteil in %	26,00
		CI Anteil in %	[13,72; 38,28]
	pT2	Anzahl	24
		Anteil in %	48,00
		CI Anteil in %	[34,01; 61,99]
	pT3	Anzahl	3
Anteil in %		6,00	
CI Anteil in %		[0,00; 12,65]	
pT4	Anzahl	1	
	Anteil in %	2,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 5,92]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 50	
	auswertbar	Anzahl 47	
	keine OP	Anzahl	1
		Anteil in %	2,13
		CI Anteil in %	[0,00; 6,30]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	1
		Anteil in %	2,13
		CI Anteil in %	[0,00; 6,30]
	pTis	Anzahl	4
		Anteil in %	8,51
		CI Anteil in %	[0,45; 16,57]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	24
		Anteil in %	51,06
		CI Anteil in %	[36,62; 65,51]
	pT2	Anzahl	16
		Anteil in %	34,04
		CI Anteil in %	[20,35; 47,74]
pT3	Anzahl	0	
	Anteil in %	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	
pT4	Anzahl	1	
	Anteil in %	2,13	
	CI Anteil in %	[0,00; 6,30]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 65	
	auswertbar	Anzahl 61	
	keine OP	Anzahl	2
		Anteil in %	3,28
		CI Anteil in %	[0,00; 7,78]
		Anzahl	1
	keine Beurteilung möglich	Anteil in %	1,64
		CI Anteil in %	[0,00; 4,85]
		Anzahl	6
	pTis	Anteil in %	9,84
		CI Anteil in %	[2,30; 17,37]
		Anzahl	0
	pT0	Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
		Anzahl	30
	pT1	Anteil in %	49,18
		CI Anteil in %	[36,53; 61,83]
		Anzahl	17
	pT2	Anteil in %	27,87
		CI Anteil in %	[16,52; 39,21]
		Anzahl	3
pT3	Anteil in %	4,92	
	CI Anteil in %	[0,00; 10,39]	
	Anzahl	2	
pT4	Anteil in %	3,28	
	CI Anteil in %	[0,00; 7,78]	
	Anzahl	2	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 48	
	auswertbar	Anzahl 47	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	1
		Anteil in %	2,13
		CI Anteil in %	[0,00; 6,30]
	pTis	Anzahl	4
		Anteil in %	8,51
		CI Anteil in %	[0,45; 16,57]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	20
		Anteil in %	42,55
		CI Anteil in %	[28,27; 56,84]
	pT2	Anzahl	18
		Anteil in %	38,30
		CI Anteil in %	[24,25; 52,35]
	pT3	Anzahl	2
		Anteil in %	4,26
		CI Anteil in %	[0,00; 10,09]
	pT4	Anzahl	2
Anteil in %		4,26	
CI Anteil in %		[0,00; 10,09]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 58	
	auswertbar	Anzahl 56	
	keine OP	Anzahl	1
		Anteil in %	1,79
		CI Anteil in %	[0,00; 5,29]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	5
		Anteil in %	8,93
		CI Anteil in %	[1,39; 16,46]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	23
		Anteil in %	41,07
		CI Anteil in %	[28,07; 54,07]
	pT2	Anzahl	22
		Anteil in %	39,29
		CI Anteil in %	[26,38; 52,19]
	pT3	Anzahl	4
Anteil in %		7,14	
CI Anteil in %		[0,34; 13,95]	
pT4	Anzahl	1	
	Anteil in %	1,79	
	CI Anteil in %	[0,00; 5,29]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Anzahl	Beitritts- halbjahr
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	40
	auswertbar	Anzahl	37
	keine OP	Anzahl	1
		Anteil in %	2,70
		CI Anteil in %	[0,00; 8,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	1
		Anteil in %	2,70
		CI Anteil in %	[0,00; 8,00]
	pTis	Anzahl	2
		Anteil in %	5,41
		CI Anteil in %	[0,00; 12,79]
	pT0	Anzahl	1
		Anteil in %	2,70
		CI Anteil in %	[0,00; 8,00]
	pT1	Anzahl	19
		Anteil in %	51,35
		CI Anteil in %	[35,02; 67,68]
	pT2	Anzahl	11
		Anteil in %	29,73
		CI Anteil in %	[14,80; 44,66]
pT3	Anzahl	1	
	Anteil in %	2,70	
	CI Anteil in %	[0,00; 8,00]	
pT4	Anzahl	1	
	Anteil in %	2,70	
	CI Anteil in %	[0,00; 8,00]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 35	
	auswertbar	Anzahl 33	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pTis	Anzahl	2
		Anteil in %	6,06
		CI Anteil in %	[0,00; 14,33]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	18
		Anteil in %	54,55
		CI Anteil in %	[37,29; 71,80]
	pT2	Anzahl	8
		Anteil in %	24,24
		CI Anteil in %	[9,39; 39,09]
	pT3	Anzahl	3
		Anteil in %	9,09
		CI Anteil in %	[0,00; 19,05]
	pT4	Anzahl	2
Anteil in %		6,06	
CI Anteil in %		[0,00; 14,33]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pTis, pT0, pT1, pT2, pT3 oder pT4-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Anzahl	Beitritts- halbjahr
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	38
	auswertbar	Anzahl	34
	keine OP	Anzahl	2
		Anteil in %	5,88
		CI Anteil in %	[0,00; 13,91]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	2
		Anteil in %	5,88
		CI Anteil in %	[0,00; 13,91]
	pTis	Anzahl	1
		Anteil in %	2,94
		CI Anteil in %	[0,00; 8,71]
	pT0	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pT1	Anzahl	10
		Anteil in %	29,41
		CI Anteil in %	[13,87; 44,96]
	pT2	Anzahl	15
		Anteil in %	44,12
		CI Anteil in %	[27,18; 61,06]
	pT3	Anzahl	2
		Anteil in %	5,88
		CI Anteil in %	[0,00; 13,91]
	pT4	Anzahl	2
Anteil in %		5,88	
CI Anteil in %		[0,00; 13,91]	

In Tabelle 3.1.13 sind nach dem TNM-Klassifikationsschema (pTNM) die postoperativ (histopathologisch) bestimmten Lymphknotenmetastasen (Nodes) **pNx** der Patientinnen ausgewiesen.⁸ Dazu wird unter „Auswertungsgruppe 1 insgesamt“ für jede Kohorte zunächst angegeben, wie viele Programmteilnehmerinnen der Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung zuzuordnen waren, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte. Für die „auswertbaren“ Patientinnen wird anschließend das Vorhandensein von postoperativ bestimmten Lymphknotenmetastasen ausgewiesen bzw. wenn dies nicht möglich ist, die Angabe, ob keine Operation erfolgte oder keine Beurteilung möglich war.

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2006-2 31 Patientin/Patientinnen. Davon konnte/konnten 30 in die Auswertung einbezogen werden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.13 TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 3	
	auswertbar	Anzahl 1	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pN0	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
	pN1	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pN2	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
pN3	Anzahl	0	
	Anteil in %	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	

⁸ In Einzelfällen fließen die entsprechenden Werte aus der präoperativen Erstdokumentation ein, sofern keine postoperative Erstdokumentation im Auswertungszeitraum vorliegt (siehe auch: Rechenregeln für das DMP Brustkrebs V18 vom 19.09.2012).

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 31	
	auswertbar	Anzahl 30	
	keine OP	Anzahl	1
		Anteil in %	3,33
		CI Anteil in %	[0,00; 9,87]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	3
		Anteil in %	10,00
		CI Anteil in %	[0,00; 20,92]
	pN0	Anzahl	17
		Anteil in %	56,67
		CI Anteil in %	[38,63; 74,70]
	pN1	Anzahl	9
		Anteil in %	30,00
		CI Anteil in %	[13,32; 46,68]
	pN2	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
pN3	Anzahl	0	
	Anteil in %	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 34	
	auswertbar	Anzahl 32	
	keine OP	Anzahl	2
		Anteil in %	6,25
		CI Anteil in %	[0,00; 14,77]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pN0	Anzahl	20
		Anteil in %	62,50
		CI Anteil in %	[45,46; 79,54]
	pN1	Anzahl	10
		Anteil in %	31,25
		CI Anteil in %	[14,93; 47,57]
	pN2	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pN3	Anzahl	0
Anteil in %		0,00	
CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 51	
	auswertbar	Anzahl 50	
	keine OP	Anzahl	5
		Anteil in %	10,00
		CI Anteil in %	[1,60; 18,40]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	5
		Anteil in %	10,00
		CI Anteil in %	[1,60; 18,40]
	pN0	Anzahl	22
		Anteil in %	44,00
		CI Anteil in %	[30,10; 57,90]
	pN1	Anzahl	12
		Anteil in %	24,00
		CI Anteil in %	[12,04; 35,96]
	pN2	Anzahl	3
		Anteil in %	6,00
		CI Anteil in %	[0,00; 12,65]
	pN3	Anzahl	3
		Anteil in %	6,00
		CI Anteil in %	[0,00; 12,65]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 50	
	auswertbar	Anzahl 47	
	keine OP	Anzahl	1
		Anteil in %	2,13
		CI Anteil in %	[0,00; 6,30]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	1
		Anteil in %	2,13
		CI Anteil in %	[0,00; 6,30]
	pN0	Anzahl	26
		Anteil in %	55,32
		CI Anteil in %	[40,95; 69,69]
	pN1	Anzahl	13
		Anteil in %	27,66
		CI Anteil in %	[14,73; 40,59]
	pN2	Anzahl	4
		Anteil in %	8,51
		CI Anteil in %	[0,45; 16,57]
	pN3	Anzahl	2
		Anteil in %	4,26
		CI Anteil in %	[0,00; 10,09]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 65	
	auswertbar	Anzahl 61	
	keine OP	Anzahl	2
		Anteil in %	3,28
		CI Anteil in %	[0,00; 7,78]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	3
		Anteil in %	4,92
		CI Anteil in %	[0,00; 10,39]
	pN0	Anzahl	44
		Anteil in %	72,13
		CI Anteil in %	[60,79; 83,48]
	pN1	Anzahl	8
		Anteil in %	13,11
		CI Anteil in %	[4,57; 21,66]
	pN2	Anzahl	3
		Anteil in %	4,92
		CI Anteil in %	[0,00; 10,39]
	pN3	Anzahl	1
		Anteil in %	1,64
		CI Anteil in %	[0,00; 4,85]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 48	
	auswertbar	Anzahl 47	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	3
		Anteil in %	6,38
		CI Anteil in %	[0,00; 13,45]
	pN0	Anzahl	34
		Anteil in %	72,34
		CI Anteil in %	[59,41; 85,27]
	pN1	Anzahl	8
		Anteil in %	17,02
		CI Anteil in %	[6,16; 27,88]
	pN2	Anzahl	2
		Anteil in %	4,26
		CI Anteil in %	[0,00; 10,09]
	pN3	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 58	
	auswertbar	Anzahl 56	
	keine OP	Anzahl	2
		Anteil in %	3,57
		CI Anteil in %	[0,00; 8,48]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	2
		Anteil in %	3,57
		CI Anteil in %	[0,00; 8,48]
	pN0	Anzahl	35
		Anteil in %	62,50
		CI Anteil in %	[49,71; 75,29]
	pN1	Anzahl	12
		Anteil in %	21,43
		CI Anteil in %	[10,58; 32,27]
	pN2	Anzahl	2
		Anteil in %	3,57
		CI Anteil in %	[0,00; 8,48]
	pN3	Anzahl	3
		Anteil in %	5,36
		CI Anteil in %	[0,00; 11,31]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 40	
	auswertbar	Anzahl 37	
	keine OP	Anzahl	3
		Anteil in %	8,11
		CI Anteil in %	[0,00; 17,02]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	1
		Anteil in %	2,70
		CI Anteil in %	[0,00; 8,00]
	pN0	Anzahl	23
		Anteil in %	62,16
		CI Anteil in %	[46,32; 78,00]
	pN1	Anzahl	6
		Anteil in %	16,22
		CI Anteil in %	[4,18; 28,26]
	pN2	Anzahl	4
		Anteil in %	10,81
		CI Anteil in %	[0,67; 20,95]
	pN3	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 35	
	auswertbar	Anzahl 33	
	keine OP	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	2
		Anteil in %	6,06
		CI Anteil in %	[0,00; 14,33]
	pN0	Anzahl	21
		Anteil in %	63,64
		CI Anteil in %	[46,97; 80,30]
	pN1	Anzahl	5
		Anteil in %	15,15
		CI Anteil in %	[2,73; 27,57]
	pN2	Anzahl	4
		Anteil in %	12,12
		CI Anteil in %	[0,81; 23,43]
	pN3	Anzahl	1
		Anteil in %	3,03
		CI Anteil in %	[0,00; 8,97]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit pN0, pN1, pN2, pN3-Stadium, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 38	
	auswertbar	Anzahl 34	
	keine OP	Anzahl	2
		Anteil in %	5,88
		CI Anteil in %	[0,00; 13,91]
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	2
		Anteil in %	5,88
		CI Anteil in %	[0,00; 13,91]
	pN0	Anzahl	23
		Anteil in %	67,65
		CI Anteil in %	[51,69; 83,61]
	pN1	Anzahl	4
		Anteil in %	11,76
		CI Anteil in %	[0,77; 22,76]
	pN2	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	pN3	Anzahl	3
		Anteil in %	8,82
		CI Anteil in %	[0,00; 18,50]

In Tabelle 3.1.14 sind nach dem TNM-Klassifikationsschema die postoperativen (Fern-)Metastasen **M** der Patientinnen ausgewiesen.⁹ Dazu wird unter „Auswertungsgruppe 1 insgesamt“ für jede Kohorte zunächst angegeben, wie viele Programmteilnehmerinnen der Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung zuzuordnen waren, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte. Für die „auswertbaren“ Patientinnen erfolgt anschließend die Angabe, ob Fernmetastasen vorliegen oder nicht bzw. ob diesbezüglich keine Beurteilung möglich war.

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2006-2 31 Patientin/Patientinnen. Davon konnte/konnten 29 in die Auswertung einbezogen werden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.1.14 TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium, Auswertungsgruppe 1

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 3	
	auswertbar	Anzahl 3	
	keine Beurteilung möglich	Anzahl	3
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
	Fernmetastasen	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	keine Fernmetastasen	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]

⁹ In Einzelfällen fließen die entsprechenden Werte aus der präoperativen Erstdokumentation ein, sofern keine postoperative Erstdokumentation im Auswertungszeitraum vorliegt (siehe auch: Rechenregeln für das DMP Brustkrebs V18 vom 19.09.2012).

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 31
	auswertbar	Anzahl 29
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 5
		Anteil in % 17,24
		CI Anteil in % [3,25; 31,23]
	Fernmetastasen	Anzahl 1
		Anteil in % 3,45
		CI Anteil in % [0,00; 10,21]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 23
		Anteil in % 79,31
CI Anteil in % [64,31; 94,31]		
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 34
	auswertbar	Anzahl 32
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 6
		Anteil in % 18,75
		CI Anteil in % [5,01; 32,49]
	Fernmetastasen	Anzahl 1
		Anteil in % 3,13
		CI Anteil in % [0,00; 9,25]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 25
		Anteil in % 78,13
CI Anteil in % [63,57; 92,68]		

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 51
	auswertbar	Anzahl 47
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 12
		Anteil in % 25,53
		CI Anteil in % [12,93; 38,13]
	Fernmetastasen	Anzahl 1
		Anteil in % 2,13
		CI Anteil in % [0,00; 6,30]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 34
		Anteil in % 72,34
		CI Anteil in % [59,41; 85,27]
	2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt
auswertbar		Anzahl 46
keine Beurteilung möglich		Anzahl 7
		Anteil in % 15,22
		CI Anteil in % [4,72; 25,71]
Fernmetastasen		Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
keine Fernmetastasen		Anzahl 39
		Anteil in % 84,78
		CI Anteil in % [74,29; 95,28]
2008-2		Auswertungsgruppe 1 insgesamt
	auswertbar	Anzahl 59
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 10
		Anteil in % 16,95
		CI Anteil in % [7,29; 26,60]
	Fernmetastasen	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 49
		Anteil in % 83,05
		CI Anteil in % [73,40; 92,71]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 48
	auswertbar	Anzahl 46
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 9
		Anteil in % 19,57
		CI Anteil in % [7,97; 31,16]
	Fernmetastasen	Anzahl 0
		Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 37
		Anteil in % 80,43
		CI Anteil in % [68,84; 92,03]
	2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt
auswertbar		Anzahl 56
keine Beurteilung möglich		Anzahl 9
		Anteil in % 16,07
		CI Anteil in % [6,37; 25,78]
Fernmetastasen		Anzahl 2
		Anteil in % 3,57
		CI Anteil in % [0,00; 8,48]
keine Fernmetastasen		Anzahl 45
		Anteil in % 80,36
		CI Anteil in % [69,86; 90,86]
2010-1		Auswertungsgruppe 1 insgesamt
	auswertbar	Anzahl 36
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 1
		Anteil in % 2,78
		CI Anteil in % [0,00; 8,22]
	Fernmetastasen	Anzahl 3
		Anteil in % 8,33
		CI Anteil in % [0,00; 17,49]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 32
		Anteil in % 88,89
		CI Anteil in % [78,48; 99,30]

EZ	TNM-Stadien: Patientinnen mit M0, M1-Stadium Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 35
	auswertbar	Anzahl 33
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 7
		Anteil in % 21,21
		CI Anteil in % [7,05; 35,38]
	Fernmetastasen	Anzahl 1
		Anteil in % 3,03
		CI Anteil in % [0,00; 8,97]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 25
		Anteil in % 75,76
CI Anteil in % [60,91; 90,61]		
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 38
	auswertbar	Anzahl 34
	keine Beurteilung möglich	Anzahl 5
		Anteil in % 14,71
		CI Anteil in % [2,62; 26,79]
	Fernmetastasen	Anzahl 2
		Anteil in % 5,88
		CI Anteil in % [0,00; 13,91]
	keine Fernmetastasen	Anzahl 27
		Anteil in % 79,41
CI Anteil in % [65,62; 93,21]		

In Tabelle 3.1.15 ist der Rezeptorstatus der Patientinnen ausgewiesen. Es wird dargestellt wie viele Patientinnen eine positiven oder negativen Rezeptorstatus haben und bei wie vielen Patientinnen der Rezeptorstatus unbekannt ist.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Die Auswertungsgruppe 1 umfasst in der Kohorte 2006-2 31 Frau/Frauen. Davon konnte/konnten 30 Patientin/Patientinnen in die Auswertung einbezogen werden.

Tabelle 3.1.15 Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	3
	auswertbar	Anzahl	1
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	positiv	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
	negativ	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
	2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl
auswertbar		Anzahl	30
unbekannter Rezeptorstatus		Anzahl	1
		Anteil in %	3,33
		CI Anteil in %	[0,00; 9,87]
positiv		Anzahl	27
		Anteil in %	90,00
		CI Anteil in %	[79,08; 100,00]
negativ		Anzahl	2
		Anteil in %	6,67
		CI Anteil in %	[0,00; 15,75]

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 34
	auswertbar	Anzahl 32
		Anzahl 0
	unbekannter Rezeptorstatus	Anteil in % 0,00
		CI Anteil in % [0,00; 0,00]
		Anzahl 28
	positiv	Anteil in % 87,50
		CI Anteil in % [75,86; 99,14]
		Anzahl 4
	negativ	Anteil in % 12,50
	CI Anteil in % [0,86; 24,14]	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 51
	auswertbar	Anzahl 50
		Anzahl 8
	unbekannter Rezeptorstatus	Anteil in % 16,00
		CI Anteil in % [5,74; 26,26]
		Anzahl 35
	positiv	Anteil in % 70,00
		CI Anteil in % [57,17; 82,83]
		Anzahl 7
	negativ	Anteil in % 14,00
	CI Anteil in % [4,28; 23,72]	

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 50
	auswertbar	Anzahl 47
		Anzahl 1
	unbekannter Rezeptorstatus	Anteil in % 2,13
		CI Anteil in % [0,00; 6,30]
		Anzahl 39
	positiv	Anteil in % 82,98
		CI Anteil in % [72,12; 93,84]
		Anzahl 7
	negativ	Anteil in % 14,89
	CI Anteil in % [4,60; 25,18]	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl 65
	auswertbar	Anzahl 61
		Anzahl 1
	unbekannter Rezeptorstatus	Anteil in % 1,64
		CI Anteil in % [0,00; 4,85]
		Anzahl 49
	positiv	Anteil in % 80,33
		CI Anteil in % [70,27; 90,39]
		Anzahl 11
	negativ	Anteil in % 18,03
	CI Anteil in % [8,30; 27,76]	

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	48
	auswertbar	Anzahl	47
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	2
		Anteil in %	4,26
		CI Anteil in %	[0,00; 10,09]
	positiv	Anzahl	38
		Anteil in %	80,85
		CI Anteil in %	[69,48; 92,22]
	negativ	Anzahl	7
		Anteil in %	14,89
CI Anteil in %		[4,60; 25,18]	
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	58
	auswertbar	Anzahl	56
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	2
		Anteil in %	3,57
		CI Anteil in %	[0,00; 8,48]
	positiv	Anzahl	45
		Anteil in %	80,36
		CI Anteil in %	[69,86; 90,86]
	negativ	Anzahl	9
		Anteil in %	16,07
CI Anteil in %		[6,37; 25,78]	

EZ	Rezeptorstatus, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	40
	auswertbar	Anzahl	36
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	1
		Anteil in %	2,78
		CI Anteil in %	[0,00; 8,22]
	positiv	Anzahl	30
		Anteil in %	83,33
		CI Anteil in %	[70,99; 95,68]
	negativ	Anzahl	5
		Anteil in %	13,89
CI Anteil in %		[2,43; 25,35]	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	35
	auswertbar	Anzahl	33
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	1
		Anteil in %	3,03
		CI Anteil in %	[0,00; 8,97]
	positiv	Anzahl	29
		Anteil in %	87,88
		CI Anteil in %	[76,57; 99,19]
	negativ	Anzahl	3
		Anteil in %	9,09
CI Anteil in %		[0,00; 19,05]	
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	38
	auswertbar	Anzahl	35
	unbekannter Rezeptorstatus	Anzahl	1
		Anteil in %	2,86
		CI Anteil in %	[0,00; 8,46]
	positiv	Anzahl	25
		Anteil in %	71,43
		CI Anteil in %	[56,24; 86,61]
	negativ	Anzahl	9
		Anteil in %	25,71
CI Anteil in %		[11,02; 40,41]	

3.2 Medizinische Auswertungen

In Tabelle 3.2.1 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen mit einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie war. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil ein negativer Lymphknoten-Befund laut Erstdokumentation vorlag.

Die Auswertung zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie kann erst ab dem zweiten Halbjahr 2006 durchgeführt werden, da zu diesem Zeitpunkt neue DMP-Dokumentationsbögen eingeführt wurden. Auf diesen können die nötigen Angaben zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie dokumentiert werden, was auf den davor gültigen DMP-Dokumentationsbögen nicht möglich war.

In der Kohorte 2007-1 war/waren 14 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie zuzuordnen. Für 5 von Ihnen war der Status Sentinel-Lymphknoten- negativ in der Erstdokumentation dokumentiert.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.1 Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1		
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	1
		Anteil in %	20,00
		CI Anteil in %	[0,00; 59,20]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	14
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	5
		Anteil in %	35,71
		CI Anteil in %	[9,67; 61,76]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	2
		Anteil in %	16,67
		CI Anteil in %	[0,00; 38,69]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	21
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	8
		Anteil in %	38,10
		CI Anteil in %	[16,81; 59,38]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>

EZ	Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Auswertungsgruppe 1		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	30
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	11
		Anteil in %	36,67
		CI Anteil in %	[19,13; 54,21]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	33
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	14
		Anteil in %	42,42
		CI Anteil in %	[25,30; 59,55]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	28
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	11
		Anteil in %	39,29
		CI Anteil in %	[20,86; 57,71]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	26
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	10
		Anteil in %	38,46
		CI Anteil in %	[19,39; 57,53]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	16
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	8
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[24,70; 75,30]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	22
	mit Sentinel-Lymphknoten negativ	Anzahl	8
		Anteil in %	36,36
		CI Anteil in %	[15,79; 56,94]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

In Tabelle 3.2.2 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen mit Tumoren pTis und pT1 war. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil in der Erstdokumentation eine brusterhaltende Therapie dokumentiert war.

In der Kohorte 2006-2 war/waren 14 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit Tumoren pTis und pT1 zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.2 Patientinnen mit Tumorgröße pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit Tumorgröße pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1		
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	14
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	7
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[22,82; 77,18]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	17
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	12
		Anteil in %	70,59
		CI Anteil in %	[48,26; 92,91]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	17
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	13
		Anteil in %	76,47
		CI Anteil in %	[55,69; 97,26]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	28
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	22
		Anteil in %	78,57
		CI Anteil in %	[63,09; 94,05]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>

EZ	Patientinnen mit Tumorgröße pTis und pT1: Brusterhaltende Therapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	36
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	29
		Anteil in %	80,56
		CI Anteil in %	[67,44; 93,67]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	24
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	17
		Anteil in %	70,83
		CI Anteil in %	[52,26; 89,41]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	28
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	20
		Anteil in %	71,43
		CI Anteil in %	[54,39; 88,47]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	21
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	17
		Anteil in %	80,95
		CI Anteil in %	[63,74; 98,16]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	20
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	16
		Anteil in %	80,00
		CI Anteil in %	[62,01; 97,99]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	11
	mit brusterhaltender Therapie	Anzahl	8
		Anteil in %	72,73
		CI Anteil in %	[45,12; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

In Tabelle 3.2.3 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine axilläre Lymphonodektomie erfolgte. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil in der Erstdokumentation das Entfernen von mindestens 10 Lymphknoten dokumentiert war.

In der Kohorte 2006-2 war/waren 21 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit axillärer Lymphonodektomie zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.3 Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1		
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	21
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	19
		Anteil in %	90,48
		CI Anteil in %	[77,61; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	17
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	16
		Anteil in %	94,12
		CI Anteil in %	[82,59; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	26
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	19
		Anteil in %	73,08
		CI Anteil in %	[55,69; 90,46]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	24
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	23
		Anteil in %	95,83
		CI Anteil in %	[87,67; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>

EZ	Patientinnen nach axillärer Lymphonodektomie: Patientinnen mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten, Auswertungsgruppe 1		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	21
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	16
		Anteil in %	76,19
		CI Anteil in %	[57,52; 94,86]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	10
		Anteil in %	66,67
		CI Anteil in %	[41,97; 91,36]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	20
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	18
		Anteil in %	90,00
		CI Anteil in %	[76,51; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	9
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	13
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	11
		Anteil in %	91,67
		CI Anteil in %	[76,03; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	11
	mit mindestens 10 entfernten Lymphknoten	Anzahl	7
		Anteil in %	63,64
		CI Anteil in %	[33,82; 93,45]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>

In Tabelle 3.2.4 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine brusterhaltende Therapie erfolgte. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie vorgenommen wurde. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbe-

dingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahres vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2006-2 war/waren 11 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.4 Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	11
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	11
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	17
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	15
		Anteil in %	88,24
		CI Anteil in %	[72,45; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	25
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	20
		Anteil in %	80,00
		CI Anteil in %	[64,00; 96,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>

EZ	Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	29
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	27
		Anteil in %	93,10
		CI Anteil in %	[83,72; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	40
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	38
		Anteil in %	95,00
		CI Anteil in %	[88,16; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	27
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	25
		Anteil in %	92,59
		CI Anteil in %	[82,53; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	31
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	26
		Anteil in %	83,87
		CI Anteil in %	[70,71; 97,03]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	22
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	20
		Anteil in %	90,91
		CI Anteil in %	[78,61; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	22
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	16
		Anteil in %	72,73
		CI Anteil in %	[53,68; 91,78]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>

EZ	Patientinnen nach brusterhaltender Therapie (BET): Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	16
		Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anteil in %	12,50
		CI Anteil in %	[0,00; 29,24]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>

In Tabelle 3.2.5 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen ein pT3/pT4-Tumor vorlag und eine Mastektomie erfolgte. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbe-

dingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2006-2 war/waren 0 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit pT3/pT4-Tumor und erfolgter Mastektomie zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.5 Patientinnen mit Tumormgröße pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit Tumormgröße pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[0,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	66,67
		CI Anteil in %	[1,33; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>

EZ	Patientinnen mit Tumgröße pT3/pT4 nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	75,00
		CI Anteil in %	[26,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	66,67
		CI Anteil in %	[1,33; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[0,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>38</i>

In Tabelle 3.2.6 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine R1/R2-Resektion nach Mastektomie dokumentiert wurde. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte

Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2006-2 war/waren 0 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.6 Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>

EZ	Patientinnen mit R1/R2-Resektion nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>38</i>

In Tabelle 3.2.7 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen eine Mastektomie und die Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten aus der Axilla dokumentiert wurde. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. welchem Anteil bis spätestens 18 Monate nach Ende des Beitrittsjahres eine Strahlentherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine entsprechende Strahlentherapie dokumentiert ist. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten, dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n)

Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2006-2 war/waren 0 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit Mastektomie und Resektion von mehr als 3 positiven Lymphknoten aus der Axilla zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.7 Patientinnen nach Mastektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach axillärer Lymphonodektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit axillärer Lymphonodektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	0
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	
		Anteil in %	
		CI Anteil in %	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	66,67
		CI Anteil in %	[1,33; 100,00]
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>

EZ	Patientinnen mit axillärer Lymphonodektomie und Resektion von mehr als 3 befallenen Lymphknoten nach Mastektomie: Strahlentherapie, Auswertungsgruppe 1		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	2
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	50,00
		CI Anteil in %	[0,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2
	mit Strahlentherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	0
		Anteil in %	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

In Tabelle 3.2.8 ist ausgewiesen, wie groß laut Erstdokumentation das Kollektiv der Patientinnen ist, bei denen ein niedriges Risiko vorlag. Zudem wird dargestellt, bei wie vielen von ihnen bzw. bei welchem Anteil innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Beitrittsjahres keine Chemotherapie erfolgte. Dazu wurden die Daten danach ausgewertet, ob in der Erstdokumentation oder in den vorliegenden Folgedokumentationen der ersten drei Halbjahre nach dem Beitrittsjahr mindestens einmal eine Chemotherapie dokumentiert ist. Ist dies nicht der Fall, gilt dies als „keine Chemotherapie“. Zur Gruppe der Patientinnen mit niedrigem Risiko wurden alle Frauen gezählt, für die alle der folgenden Merkmale gleichzeitig zutraten: Alter größer gleich 35 Jahre, Karzinom kleiner gleich 2 cm, hochdifferenziert (Grading G1), rezeptorpositiv (ER+ und/oder PR+) sowie nodal negativ. Bei der Interpretation der Werte ist zu beachten,

dass Aussagen über Therapien innerhalb von 18 Monaten datenbedingt nur für die erste(n) Kohorte(n) möglich sind. Für die vorletzte Kohorte lagen nur medizinische Daten für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten inklusive Beitrittsjahr vor, für die letzte Kohorte nur für den Zeitraum des Beitrittsjahres.

In der Kohorte 2006-2 war/waren 1 Frau/Frauen dem Kollektiv der Patientinnen mit niedrigem Risiko zuzuordnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.2.8 Patientinnen mit einem niedrigen Risiko¹⁰: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1

EZ	Patientinnen mit einem niedrigen Risiko: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1		
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>3</i>
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>31</i>
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>

¹⁰ zur Gruppe mit niedrigem Risiko gehören alle Frauen, für die alle folgenden Merkmale gleichzeitig zutreffen: 35 Jahre oder älter sowie Tumor kleiner gleich 2cm, hochdifferenziert (Grading G1), rezeptorpositiv (ER+und oder PR+)sowie nodal negativ.

EZ	Patientinnen mit einem niedrigen Risiko: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1		
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	1
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	4
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	8
		Anteil in %	88,89
		CI Anteil in %	[67,11; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	8
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	9
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>

EZ	Patientinnen mit einem niedrigen Risiko: Keine Chemotherapie, Auswertungsgruppe 1		
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3
	ohne Chemotherapie innerhalb von maximal 18 Monaten	Anzahl	3
		Anteil in %	100,00
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1 insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

3.3 Überlebenszeiten

In den folgenden Tabellen sind **kumulierte „Überlebensraten“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Diese geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass Patientinnen bis zum jeweiligen Halbjahr überleben.

In Tabelle 3.3.1 ist für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 23 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 82,35 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1 Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	31	30	29	27	25	25	24	24	23	23
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0
		Anteil in %	0,00	3,33	0,00	7,41	0,00	4,00	0,00	4,17	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	96,67	96,67	89,51	89,51	85,93	85,93	82,35	82,35	82,35
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[90,25; 100,00]	[90,25; 100,00]	[78,26; 100,00]	[78,26; 100,00]	[73,13; 98,73]	[73,13; 98,73]	[68,29; 96,41]	[68,29; 96,41]	[68,29; 96,41]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	34	34	34	34	32	32	32	32	31	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	97,06	97,06	97,06	97,06	97,06	93,93	
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[91,38; 100,00]	[91,38; 100,00]	[91,38; 100,00]	[91,38; 100,00]	[91,38; 100,00]	[85,77; 100,00]		

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	51	51	47	46	44	44	44			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	3	1	2	0	0	0	1		
		Anteil in %	0,00	5,88	2,13	4,35	0,00	0,00	0,00	2,27		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	94,12	92,12	88,11	88,11	88,11	88,11	86,11		
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[87,66; 100,00]	[84,70; 99,54]	[79,18; 97,04]	[79,18; 97,04]	[79,18; 97,04]	[79,18; 97,04]	[76,56; 95,66]			
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	50	50	49	48	47	46	45			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	1	1	0	1			
		Anteil in %	0,00	0,00	2,04	2,08	2,13	0,00	2,22			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	97,96	95,92	93,88	93,88	91,79			
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[94,00; 100,00]	[90,38; 100,00]	[87,17; 100,00]	[87,17; 100,00]	[84,08; 99,50]				
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	65	65	63	62	61	61				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	2	0	1	0	1				
		Anteil in %	0,00	3,08	0,00	1,61	0,00	1,64				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	96,92	96,92	95,36	95,36	93,80				
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[92,72; 100,00]	[92,72; 100,00]	[90,23; 100,00]	[90,23; 100,00]	[87,91; 99,69]					
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	48	48	46	46	45					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	1					
		Anteil in %	0,00	2,08	0,00	0,00	2,22					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,92	97,92	97,92	95,74					
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[93,88; 100,00]	[93,88; 100,00]	[93,88; 100,00]	[89,96; 100,00]						
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	58	58	58	58						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00						
	CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	40	39	38							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	1	0							
		Anteil in %	2,50	2,56	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	97,50	95,00	95,00							
	CI Rate in %	[92,66; 100,00]	[88,25; 100,00]	[88,25; 100,00]								

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	35	34									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	2									
		Anteil in %	0,00	5,88									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	94,12									
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[86,21; 100,00]										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	38										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]											

In Tabelle 3.3.1.1 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium 0** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium 0 zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.1 Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	3	3								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1								
		Anteil in %	0,00	33,33								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	66,67								
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[13,33; 100,00]									
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4	4				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	4	4	4	4						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--							
CI Rate in %		--	--	--								

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--									
CI Rate in %		--	--										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--									
CI Rate in %		--	--										

In Tabelle 3.3.1.2 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium I** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswer-

tungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 9 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium I zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 90,00 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.2 Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[71,41; 100,00]	[71,41; 100,00]	[71,41; 100,00]	[71,41; 100,00]	[71,41; 100,00]
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,86	92,86
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[79,37; 100,00]

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7		
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	14	13	13	13	13	13			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,31		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[77,82; 100,00]			
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	20	20	20	20	19	19				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00				
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[85,45; 100,00]	[85,45; 100,00]	[85,45; 100,00]					
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	13	13	13	13	13					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]						
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	12	12	12	12						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	14	14							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	13	13										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0										
		Anteil in %	0,00	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00										
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	8											
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0											
		Anteil in %	0,00											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00											
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]											

In Tabelle 3.3.1.3 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIA** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswer-

tungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 5 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIA zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 85,71 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.3 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	8	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	
		verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	[59,79; 100,00]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	13	13	12	12	11	11	11	11			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	1	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]	[76,03; 100,00]			
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13	12			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	13	13	12	12	12	12					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	0	1					
		Anteil in %	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	8,33					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	92,31	92,31	92,31	92,31	84,62					
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[65,01; 100,00]						
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	17	17	16	16	16						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	93,75						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[81,89; 100,00]							
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	14	14	14	14							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	8	8	8								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00								
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]									

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	5	5									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00									
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	7										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]											

In Tabelle 3.3.1.4 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIB** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswer-

tungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 4 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIB zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 100,00 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.4 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
		verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3	3	3			
		verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--			

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--									
		CI Rate in %	--	--									
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	3										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00										
		CI Rate in %	[100,00; 100,00]										

In Tabelle 3.3.1.5 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIA** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswer-

tungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIA zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.5 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl											
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	4	4	3	3	3	3	3	3			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]	[32,56; 100,00]			
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	1						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[13,33; 100,00]							
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--				
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--			
CI Rate in %		--	--	--	--	--	--	--	--				
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--	--						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--						
CI Rate in %		--	--	--	--	--							
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00							
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	5	5	5								
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00								
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]									

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	1									
		Anteil in %	0,00	33,33									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	66,67									
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[13,33; 100,00]										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--										
CI Rate in %		--											

In Tabelle 3.3.1.6 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIB** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswer-

tungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIB zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.6 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--										
		CI Rate in %	--										

In Tabelle 3.3.1.7 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIC** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIC zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.7 Überlebenszeit - UICC-Stadium IIC, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIC, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--										
		CI Rate in %	--										

In Tabelle 3.3.1.8 wird die **kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IV** zugeordnet werden. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IV zuzuordnen. - - von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.1.8 Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Rate in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--										
		CI Rate in %	--										

In Tabelle 3.3.2 ist für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientin-

nen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹¹

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 23 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. Bei 16 von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 92,11 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2 Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	auswertbar	Anzahl		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	

¹¹ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	31	30	29	27	25	25	24	24	23	23	
	auswertbar	Anzahl		25	24	24	23	22	16	18	16	17	
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		25	23	23	21	20	15	17	15	16	
		Anteil in %		100,00	95,83	95,83	91,30	90,91	93,75	94,44	93,75	94,12	
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,00	4,17	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	96,30	96,30	92,11	92,11	92,11	92,11	92,11	92,11	92,11
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[89,18; 100,00]	[89,18; 100,00]	[81,58; 100,00]	[81,58; 100,00]	[81,58; 100,00]	[81,58; 100,00]	[81,58; 100,00]	[81,58; 100,00]	[81,58; 100,00]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	34	34	34	34	32	32	32	32	31		
	auswertbar	Anzahl		28	27	27	25	23	22	19	20		
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		27	26	25	24	22	20	18	19		
		Anteil in %		96,43	96,30	92,59	96,00	95,65	90,91	94,74	95,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	0	0	0	1	0	0		
		Anteil in %		3,57	3,70	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	96,97	93,74	93,74	93,74	93,74	89,66	89,66	89,66	89,66	
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[91,12; 100,00]	[85,33; 100,00]	[85,33; 100,00]	[85,33; 100,00]	[85,33; 100,00]	[78,44; 100,00]	[78,44; 100,00]	[78,44; 100,00]	[78,44; 100,00]		
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	51	51	47	46	44	44	44	44			
	auswertbar	Anzahl		45	42	38	35	35	35	30			
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		43	40	36	32	30	30	26			
		Anteil in %		95,56	95,24	94,74	91,43	85,71	85,71	86,67			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2	0	1	0	2	1	1			
		Anteil in %		4,44	0,00	2,63	0,00	5,71	2,86	3,33			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	95,65	95,65	93,20	93,20	87,87	85,04	81,89			
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[89,76; 100,00]	[89,76; 100,00]	[85,75; 100,00]	[85,75; 100,00]	[77,84; 97,90]	[73,90; 96,18]	[69,57; 94,21]				
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	50	50	49	48	47	46	45				
	auswertbar	Anzahl		41	46	43	41	34	33				
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		40	44	39	38	32	31				
		Anteil in %		97,56	95,65	90,70	92,68	94,12	93,94				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	2	0	0	0				
		Anteil in %		2,44	2,17	4,65	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,96	95,83	91,27	91,27	91,27	91,27				
	CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[94,00; 100,00]	[90,17; 100,00]	[83,08; 99,46]	[83,08; 99,46]	[83,08; 99,46]	[83,08; 99,46]					

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	65	65	63	62	61	61					
	auswertbar	Anzahl		60	51	54	51	49					
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		60	50	52	49	46					
		Anteil in %		100,00	98,04	96,30	96,08	93,88					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	1	1	1	1					
		Anteil in %		0,00	1,96	1,85	1,96	2,04					
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00	98,25	96,43	94,57	92,56				
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[94,84; 100,00]	[91,56; 100,00]	[88,59; 100,00]	[85,53; 99,59]				
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	48	48	46	46	45						
	auswertbar	Anzahl		41	40	40	41						
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		40	40	39	39						
		Anteil in %		97,56	100,00	97,50	95,12						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	0	1						
		Anteil in %		2,44	0,00	0,00	2,44						
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	97,87	97,87	97,87	95,43					
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[93,74; 100,00]	[93,74; 100,00]	[93,74; 100,00]	[89,22; 100,00]					
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	58	58	58	58							
	auswertbar	Anzahl		48	45	49							
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		47	43	46							
		Anteil in %		97,92	95,56	93,88							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	1							
		Anteil in %		2,08	2,22	2,04							
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	98,18	96,26	94,21						
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[94,65; 100,00]	[91,17; 100,00]	[87,84; 100,00]						
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	40	39	38								
	auswertbar	Anzahl		37	37								
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		37	37								
		Anteil in %		100,00	100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0								
		Anteil in %		0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00	100,00							
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	35	34										
	auswertbar	Anzahl		30										
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		30										
		Anteil in %			100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0										
		Anteil in %			0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00									
CI Anteil in %			[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	38											
	auswertbar	Anzahl												
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl												
		Anteil in %												
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl												
		Anteil in %												
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00										
CI Anteil in %			[100,00; 100,00]											

In Tabelle 3.3.2.1 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium 0** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹²

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium 0 zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.1 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

¹² Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	3	3									
	auswertbar	Anzahl		3									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		3									
		Anteil in %		100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0									
		Anteil in %		0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00									
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]									
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3			
	auswertbar	Anzahl		3	3	3	3	3	3	3			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		3	3	2	2	2	2	2			
		Anteil in %		100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67			
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	1	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67			
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]			

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4	4				
	auswertbar	Anzahl		4	3	3	3	2				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		4	3	3	3	2				
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0				
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3					
	auswertbar	Anzahl		3	3	3	3					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		3	3	3	3					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]					
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	4	4	4	4						
	auswertbar	Anzahl		4	4	4						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		4	4	3						
		Anteil in %		100,00	100,00	75,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	1						
		Anteil in %		0,00	0,00	25,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	75,00						
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[32,56; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--	--							
	auswertbar	Anzahl	--	--	--							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--							
	CI Anteil in %	--	--	--								

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium 0, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--	--									
	auswertbar	Anzahl	--	--									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--									
CI Anteil in %		--	--										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium 0 insgesamt	Anzahl	--										
	auswertbar	Anzahl	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--										
CI Anteil in %		--											

In Tabelle 3.3.2.2 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium I** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹³

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 9 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Bei 6 von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 100,00 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.2 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹³ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
	auswertbar	Anzahl		9	8	8	10	8	6	6	6	6
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		9	8	8	10	8	6	6	6	6
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	auswertbar	Anzahl		12	12	11	11	9	10	8	10	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		12	12	11	11	9	10	8	10	
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	auswertbar	Anzahl		4	5	6	5	6	6	5		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		4	5	6	5	5	5	3		
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	83,33	60,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	1	0	1		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	20,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	83,33	62,50		
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[53,51; 100,00]	[53,51; 100,00]	[20,66; 100,00]			
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	14	13	13	13	13	13	13		
	auswertbar	Anzahl		12	13	13	12	11	11			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		12	13	13	12	11	11			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	20	20	20	20	19	19				
	auswertbar	Anzahl		17	18	17	15	16				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		17	18	17	15	16				
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0				
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	13	13	13	13	13					
	auswertbar	Anzahl		11	11	11	10					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		11	11	11	10					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]					
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	12	12	12	12						
	auswertbar	Anzahl		10	6	7						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		10	6	7						
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0						
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00						
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	14	14	14							
	auswertbar	Anzahl		14	14							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		14	14							
		Anteil in %		100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00							
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium I, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	13	13									
	auswertbar	Anzahl		11									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		11									
		Anteil in %		100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0									
		Anteil in %		0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00								
CI Anteil in %				[100,00; 100,00]									
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium I insgesamt	Anzahl	8										
	auswertbar	Anzahl											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00									
CI Anteil in %													

In Tabelle 3.3.2.3 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIA** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁴

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 5 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIA zuzuordnen. Bei 3 von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 80,00 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.3 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁴ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	8	7	6	5	5	5	5	5	5	5
	auswertbar	Anzahl		6	5	5	4	4	3	4	4	4
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		6	4	4	3	3	2	3	3	3
		Anteil in %		100,00	80,00	80,00	75,00	75,00	66,67	75,00	75,00	75,00
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	[44,94; 100,00]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	auswertbar	Anzahl		2	3	2	3	3	3	1	2	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		2	3	2	3	3	2	1	2	
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	1	0	0	
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]		
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	13	13	12	12	11	11	11	11		
	auswertbar	Anzahl		11	11	10	7	8	8	7		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		11	11	10	7	8	8	7		
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	13	13	13	13	13	13	12			
	auswertbar	Anzahl		12	12	10	11	8	7			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		11	11	9	10	7	6			
		Anteil in %		91,67	91,67	90,00	90,91	87,50	85,71			
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		1	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	92,31	92,31	92,31	92,31	92,31	92,31	92,31		
	CI Anteil in %		[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]	[77,82; 100,00]			

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	13	13	12	12	12	12				
	auswertbar	Anzahl		13	7	10	8	8				
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		13	7	9	7	6				
		Anteil in %		100,00	100,00	90,00	87,50	75,00				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	1	1	1				
		Anteil in %		0,00	0,00	10,00	12,50	12,50				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	90,00	80,00	68,57				
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[71,41; 100,00]	[55,21; 100,00]	[38,88; 98,26]					
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	17	17	16	16	16					
	auswertbar	Anzahl		15	15	14	15					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		15	15	14	14					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	93,33					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	1					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	6,67					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	93,33					
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[80,71; 100,00]						
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	14	14	14	14						
	auswertbar	Anzahl		11	10	13						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		11	10	13						
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0						
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00						
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	8	8	8							
	auswertbar	Anzahl		8	8							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		8	8							
		Anteil in %		100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00							
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	5	5									
	auswertbar	Anzahl		5									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		5									
		Anteil in %			100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0									
		Anteil in %			0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00								
CI Anteil in %				[100,00; 100,00]									
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIA insgesamt	Anzahl	7										
	auswertbar	Anzahl											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00									
CI Anteil in %													

In Tabelle 3.3.2.4 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIB** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁵

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 4 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIB zuzuordnen. Bei 3 von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 100,00 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.4 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁵ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
	auswertbar	Anzahl		3	4	4	4	4	3	3	3	3
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		3	4	4	4	4	3	3	3	3
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
	auswertbar	Anzahl		3	1	2	1	1	1	1	1	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		3	1	2	1	1	1	1	1	
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5		
	auswertbar	Anzahl		4	5	3	4	5	5	5		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		4	5	3	4	5	5	5		
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3				
	auswertbar	Anzahl		2	2	3	3	2	1			
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		2	2	3	3	2	1			
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]			

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	6	6	6	6	6	6					
	auswertbar	Anzahl		5	6	5	6	4					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		5	6	5	6	4					
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
CI Anteil in %				[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]					
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--					
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--						
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	7	7	7	7							
	auswertbar	Anzahl		5	6	6							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		5	6	6							
		Anteil in %		100,00	100,00	100,00							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0	0							
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00	100,00	100,00						
CI Anteil in %				[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--	--								
	auswertbar	Anzahl	--	--	--								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--								
		Anteil in %	--	--	--								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--								
		Anteil in %	--	--	--								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--								
CI Anteil in %		--	--	--									

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	--	--									
	auswertbar	Anzahl	--	--									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--									
		CI Anteil in %	--	--									
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIB insgesamt	Anzahl	3										
	auswertbar	Anzahl											
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00										
		CI Anteil in %											

In Tabelle 3.3.2.5 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIA** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁶

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIA zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.5 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁶ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	4	4	3	3	3	3	3	3		
	auswertbar	Anzahl		4	3	3	3	3	2	2		
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	2	2	2	2	2	2		
		Anteil in %		75,00	66,67	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67		
		CI Anteil in %		[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]		
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3					
	auswertbar	Anzahl		3	3	3	3					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		3	2	2	2					
		Anteil in %		100,00	66,67	66,67	66,67					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	1	0	0					
		Anteil in %		0,00	33,33	0,00	0,00					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67					
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]					

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3	3	3							
	auswertbar	Anzahl		3	3	3							
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		3	2	2							
		Anteil in %		100,00	66,67	66,67							
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	1	0							
		Anteil in %		0,00	33,33	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	66,67	66,67							
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[13,33; 100,00]	[13,33; 100,00]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	5	5	5								
	auswertbar	Anzahl		5	5								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl		5	5								
		Anteil in %		100,00	100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl		0	0								
		Anteil in %		0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00								
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]								

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIA, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	3	3									
	auswertbar	Anzahl		2									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		2									
		Anteil in %			100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0									
		Anteil in %			0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00								
CI Anteil in %				[100,00; 100,00]									
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIA insgesamt	Anzahl	--										
	auswertbar	Anzahl	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %		--									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %		--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate		--									
CI Anteil in %			--										

In Tabelle 3.3.2.6 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIB** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁷

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIB zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.6 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁷ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIB, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--	--									
	auswertbar	Anzahl	--	--									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--									
		CI Anteil in %	--	--									
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIB insgesamt	Anzahl	--										
	auswertbar	Anzahl	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--										
		CI Anteil in %	--										

In Tabelle 3.3.2.7 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IIIC** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁸

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IIIC zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.7 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁸ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--					
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--					
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--					
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--						
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--					
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--					

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IIIC, Auswertungsgruppe 1	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--	--								
	auswertbar	Anzahl	--	--								
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--								
		Anteil in %	--	--								
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--								
		Anteil in %	--	--								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--								
		CI Anteil in %	--	--								
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IIIC insgesamt	Anzahl	--									
	auswertbar	Anzahl	--									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--									
		Anteil in %	--									
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--									
		Anteil in %	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--									
		CI Anteil in %	--									

In Tabelle 3.3.2.8 wird die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung ausgewiesen, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) und die dem **UICC-Stadium IV** zugeordnet werden. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen

und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 dies jeweils entspricht.¹⁹

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr - - Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) und dem UICC-Stadium IV zuzuordnen. Bei - - von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei - - Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.2.8 Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁹ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--				
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--					
2009-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--				
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--					
2009-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--				
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--					
2010-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	mit neuen Met./ Rez. im Halb-jahr	Anzahl	--	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--	--	--	--	--	--				
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--					

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit - UICC-Stadium IV, Auswertungsgruppe 1		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--	--									
	auswertbar	Anzahl	--	--									
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--	--									
CI Anteil in %		--	--										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 u. UICC-Stadium IV insgesamt	Anzahl	--										
	auswertbar	Anzahl	--										
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	--										
CI Anteil in %		--											

In Tabelle 3.3.3 sind die **Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert)** für die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1), dargestellt. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Für die Auswertung sind alle Inzidenzen ab dem 1. Folgehalbjahr zu zählen. Für alle Kohorten und Berichtshalbjahre wird zunächst die Zahl der im Programm verbliebenen Patientinnen ausgewiesen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen im Berichtshalbjahr von Rezidiven bzw. Metastasen betroffen waren. Darüber hinaus werden die entsprechenden kumulierten Anteilswerte dargestellt. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Summe der Patientinnen aus den beiden zuletzt ausgewiesenen

Kategorien (mit Rezidiv/kontralateralem Tumor, mit Metastasen) in der Regel nicht der Anzahl der auswertbaren Patientinnen entspricht, da eine Doppelzuordnung von Patientinnen auf die beiden Kategorien möglich ist.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 31 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte) zuzuordnen. Die kumulierte Anzahl für bis einschließlich dieses letzten Berichtshalbjahres neu aufgetretene lokoregionäre Rezidive oder kontralaterale Tumore lag bei 0. Der kumulierte Anteil bezogen auf die Patientinnen zum Beitritts halbjahr lag bei 0,00 Prozent.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 3.3.3 Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	2006-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil in %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr		Anzahl	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3
		Anteil in %	0,00	3,23	3,23	6,45	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 9,55]	[0,00; 9,55]	[0,00; 15,24]	[0,00; 20,26]	[0,00; 20,26]	[0,00; 20,26]	[0,00; 20,26]	[0,00; 20,26]	[0,00; 20,26]	[0,00; 20,26]

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	34	34	34	34	34	34	34	34			
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	2	2	2	3	3	3		
		Anteil in %		2,94	5,88	5,88	5,88	5,88	8,82	8,82	8,82		
CI Anteil in %			[0,00; 8,71]	[0,00; 13,91]	[0,00; 13,91]	[0,00; 13,91]	[0,00; 13,91]	[0,00; 18,50]	[0,00; 18,50]	[0,00; 18,50]	[0,00; 18,50]		
2007-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	51	51	51	51	51	51	51	51			
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	2	2	3	4			
		Anteil in %		0,00	0,00	1,96	3,92	3,92	5,88	7,84			
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 5,80]	[0,00; 9,30]	[0,00; 9,30]	[0,00; 12,40]	[0,39; 15,30]			
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		2	3	3	3	5	8	10			
		Anteil in %		3,92	5,88	5,88	5,88	9,80	15,69	19,61			
CI Anteil in %			[0,00; 9,30]	[0,00; 12,40]	[0,00; 12,40]	[0,00; 12,40]	[1,56; 18,05]	[5,61; 25,77]	[8,60; 30,61]				
2008-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50				
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	1	1	1	1				
		Anteil in %		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 5,92]	[0,00; 5,92]	[0,00; 5,92]	[0,00; 5,92]				
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	3	5	6	6	6				
		Anteil in %		2,00	6,00	10,00	12,00	12,00	12,00				
CI Anteil in %			[0,00; 5,92]	[0,00; 12,65]	[1,60; 18,40]	[2,90; 21,10]	[2,90; 21,10]	[2,90; 21,10]					
2008-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	65	65	65	65	65	65					
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	1	2					
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	1,54	3,08					
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 4,55]	[0,00; 7,31]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	1	2	3	4					
		Anteil in %		0,00	1,54	3,08	4,62	6,15					
CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 4,55]	[0,00; 7,31]	[0,00; 9,76]	[0,27; 12,04]						

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2009-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	48	48	48	48	48						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0						
		Anteil in %			0,00	0,00	0,00	0,00					
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	1	2	3						
		Anteil in %			2,08	2,08	4,17	6,25					
		CI Anteil in %			[0,00; 6,17]	[0,00; 6,17]	[0,00; 9,88]	[0,00; 13,17]					
2009-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	58	58	58	58							
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	1	1							
		Anteil in %			1,72	1,72	1,72						
		CI Anteil in %			[0,00; 5,10]	[0,00; 5,10]	[0,00; 5,10]						
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	1	2							
		Anteil in %			0,00	1,72	3,45						
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 5,10]	[0,00; 8,19]						
2010-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	40	40	40								
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0								
		Anteil in %			0,00	0,00							
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0								
		Anteil in %			0,00	0,00							
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
2010-2	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	35	35									
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0									
		Anteil in %			0,00								
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]								
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0									
		Anteil in %			0,00								
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]								

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2011-1	Auswertungsgruppe 1 insgesamt	Anzahl	38										
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
		CI Anteil in %											
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
CI Anteil in %													

Auswertungskapitel 4: Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)**4.1 Patientinnenzahlen und -merkmale**

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte. Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 4.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitritts- halbjahr sowie zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren und wie sie sich auf die einzelnen UICC-Stadien verteilen.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 240 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet, davon waren 61 dem UICC-Stadium I zuzuordnen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 64 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/ bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres. Die Kategorie UICC-Stadium I umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 15 Patientin/Patientinnen.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.1 Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2²⁰

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	39	39	37	34	30	29	28	26	18	15	11
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	9	9	9	7	6	6	6	6	6	4	4
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	6	6	5	5	5	5	5	5	5	3	3
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	3	2	2	1	1	1	1	0	0
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

²⁰ Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass die Summe der Patientinnen aus den UICC-Kategorien in der Regel kleiner ausfällt als die Anzahl der Patientinnen insgesamt. Mögliche Abweichungen entstehen, weil die Patientinnen für die UICC-Stadien nicht auswertbar sind (keine Angaben bzw. die TNM-Kombination kann keinem UICC-Stadium zugeordnet werden) und weil Patientinnen mit der Angabe ‚keine OP‘ nicht für die Kategorien IIIC und IV berücksichtigt wurden.

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	240	228	214	191	163	146	125	110	86	64
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	10	10	10	8	7	6	4	4	3	2
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	61	56	53	46	41	34	26	22	17	15
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	58	57	54	48	43	39	35	29	25	19
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	14	13	13	12	10	9	9	9	7	5
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	9	9	8	8	7	6	4	2	1	1
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	6	6	6	6	6	6	5	4	3	2
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	8	7	6	5	5	5	5	5	4	2
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	159	157	146	138	118	111	94	79	72	
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	3	3	3	2	2	2	1	1	
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	34	34	30	29	23	22	17	14	13	
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	33	33	30	28	24	24	21	20	18	
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	10	10	9	9	8	7	6	5	5	
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	5	5	5	5	5	4	4	3	3	
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	2	2	2	2	2	1	1	
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	4	4	4	4	4	4	2	2	1	
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	139	137	131	123	118	106	89	82		
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4		
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	40	39	37	34	31	29	21	20		
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	30	29	28	25	24	22	19	19		
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	15	15	15	14	14	14	12	11		
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	10	10	10	10	10	10	10	8		
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	3	3	2	2	2	2		
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2		
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2	2	1	1	1	0	0	0			
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	60	60	58	57	49	43	42			
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2	2	2	2	2	1	1			
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	11	11	10	10	9	7	7			
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	20	20	19	19	17	16	16			
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	6	6	6	6	6	4	4			
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	4	4	4	3	2	2	2			
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2			
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2	2	1	1	1			
davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1				

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	91	90	89	84	78	69					
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	3	3	3	3	3	3					
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	20	20	20	18	16	14					
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	20	19	18	17	16	14					
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	11	11	11	10	8	8					
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	4	4	4	3	3	3					
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3	3	3	3	3	3					
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2	2	2	2					
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2	2	2	2	2	2					
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	52	52	49	48	46						
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	0	0	0	0	0						
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	12	12	11	11	11						
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	17	17	17	16	14						
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0	0						
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	1	1	1						
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1	1						
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	117	116	113	108							
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	9	9	9	9							
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	44	44	44	42							
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	30	29	29	29							
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	7	7	7	7							
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	7	7	7							
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	0	0	0	0							
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	1	1	0	0							
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	1	1	1	1							
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	86	86	85								
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4	4								
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	27	27	27								
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	19	19	19								
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	12	12	11								
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	7	7	7								
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	4	4	4								
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	2	2	2								
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	0	0	0								

EZ	Patientinnenzahlen und UICC-Stadien, Auswertungsgruppe 2		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	56	56									
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	4	4									
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	15	15									
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	12	12									
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	9	9									
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	2	2									
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	2	2									
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0	0									
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2	2									
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	58										
	davon UICC-Stadium 0	Anzahl	2										
	davon UICC-Stadium I	Anzahl	20										
	davon UICC-Stadium IIA	Anzahl	11										
	davon UICC-Stadium IIB	Anzahl	4										
	davon UICC-Stadium IIIA	Anzahl	2										
	davon UICC-Stadium IIIB	Anzahl	3										
	davon UICC-Stadium IIIC	Anzahl	0										
	davon UICC-Stadium IV	Anzahl	2										

Tabelle 4.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2006-2 mit 240 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. 192 von ihnen bzw. 80,00 Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	2	5	9	10	11	13	21	24	28
		Anteil in %	0,00	5,13	12,82	23,08	25,64	28,21	33,33	53,85	61,54	71,79
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 12,14]	[2,19; 23,45]	[9,68; 36,47]	[11,76; 39,52]	[13,90; 42,51]	[18,34; 48,32]	[38,00; 69,70]	[46,07; 77,01]	[57,49; 86,10]
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Anteil in %	0,00	0,00	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	2	3	3	3	4	5	5	5
		Anteil in %	0,00	0,00	5,13	7,69	7,69	7,69	10,26	12,82	12,82	12,82
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	3	4	5	6	13	16	20
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	7,69	10,26	12,82	15,38	33,33	41,03	51,28
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Anteil %	0,00	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	39	39	37	34	30	29	28	26	18
am Ende des Halbjahres		Anzahl	39	37	34	30	29	28	26	18	15	11

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	12	26	49	77	94	115	130	154	176	192
		Anteil in %	5,00	10,83	20,42	32,08	39,17	47,92	54,17	64,17	73,33	80,00
		CI Anteil in %	[2,24; 7,76]	[6,89; 14,77]	[15,31; 25,53]	[26,17; 38,00]	[32,98; 45,36]	[41,58; 54,25]	[47,85; 60,48]	[58,09; 70,25]	[67,73; 78,94]	[74,93; 85,07]
	davon wegen Tod	Anzahl	2	10	11	17	17	19	19	22	24	24
		Anteil in %	0,83	4,17	4,58	7,08	7,08	7,92	7,92	9,17	10,00	10,00
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
		Anteil in %	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,92	2,92
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		Anteil in %	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	2	6	21	40	55	73	88	109	128	144
		Anteil in %	0,83	2,50	8,75	16,67	22,92	30,42	36,67	45,42	53,33	60,00
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	7	9	10	10	10	10	10	10
		Anteil %	0,00	0,42	2,92	3,75	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	240	228	214	191	163	146	125	110	86
am Ende des Halbjahres		Anzahl	228	214	191	163	146	125	110	86	64	48
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	13	21	41	48	65	80	87	95	
		Anteil in %	1,26	8,18	13,21	25,79	30,19	40,88	50,31	54,72	59,75	
		CI Anteil in %	[0,00; 3,00]	[3,90; 12,45]	[7,93; 18,49]	[18,96; 32,61]	[23,03; 37,35]	[33,21; 48,55]	[42,52; 58,11]	[46,96; 62,48]	[52,10; 67,40]	
	davon wegen Tod	Anzahl	0	3	4	5	6	8	10	10	10	
		Anteil in %	0,00	1,89	2,52	3,14	3,77	5,03	6,29	6,29	6,29	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	2	3	4	4	4	4	
		Anteil in %	0,00	0,63	1,26	1,26	1,89	2,52	2,52	2,52	2,52	
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	2	8	14	31	36	50	63	70	78	
		Anteil in %	1,26	5,03	8,81	19,50	22,64	31,45	39,62	44,03	49,06	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	3	3	3	3	3	3	
		Anteil %	0,00	0,63	0,63	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	159	157	146	138	118	111	94	79	72
am Ende des Halbjahres		Anzahl	157	146	138	118	111	94	79	72	64	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	8	16	21	33	50	57	68		
		Anteil in %	1,44	5,76	11,51	15,11	23,74	35,97	41,01	48,92		
		CI Anteil in %	[0,00; 3,43]	[1,87; 9,64]	[6,19; 16,84]	[9,13; 21,08]	[16,64; 30,84]	[27,96; 43,98]	[32,80; 49,21]	[40,58; 57,26]		
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	5	7	10	10	12	13		
		Anteil in %	0,00	1,44	3,60	5,04	7,19	7,19	8,63	9,35		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	2	6	11	14	22	39	43	53		
		Anteil in %	1,44	4,32	7,91	10,07	15,83	28,06	30,94	38,13		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	1	1	2	2		
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	1,44	1,44		
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	139	137	131	123	118	106	89	82	
am Ende des Halbjahres		Anzahl	137	131	123	118	106	89	82	71		
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	2	3	11	17	18	22			
		Anteil in %	0,00	3,33	5,00	18,33	28,33	30,00	36,67			
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 7,91]	[0,00; 10,56]	[8,46; 28,21]	[16,83; 39,83]	[18,31; 41,69]	[24,37; 48,96]			
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0	1	4	5	5	5			
		Anteil in %	0,00	0,00	1,67	6,67	8,33	8,33	8,33			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	2	2	2	2			
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33			
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	2	2	5	8	9	13			
		Anteil in %	0,00	3,33	3,33	8,33	13,33	15,00	21,67			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	2	2	2			
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	3,33			
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	60	60	58	57	49	43	42		
am Ende des Halbjahres		Anzahl	60	58	57	49	43	42	38			

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	2	7	13	22	23				
		Anteil in %	1,10	2,20	7,69	14,29	24,18	25,27				
		CI Anteil in %	[0,00; 3,25]	[0,00; 5,23]	[2,19; 13,20]	[7,06; 21,52]	[15,33; 33,02]	[16,30; 34,25]				
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1	3	4	4	4				
		Anteil in %	1,10	1,10	3,30	4,40	4,40	4,40				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	1	1				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	2	2	2	2				
		Anteil in %	0,00	1,10	2,20	2,20	2,20	2,20				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	2	6	14	15				
		Anteil in %	0,00	0,00	2,20	6,59	15,38	16,48				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	1	1	1				
		Anteil %	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10				
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	91	90	89	84	78	69			
am Ende des Halbjahres		Anzahl	90	89	84	78	69	68				
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	3	4	6	10					
		Anteil in %	0,00	5,77	7,69	11,54	19,23					
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 12,17]	[0,38; 15,01]	[2,77; 20,31]	[8,41; 30,05]					
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	2	2	5					
		Anteil in %	0,00	1,92	3,85	3,85	9,62					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	1	1					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	1	1	1	1					
		Anteil in %	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92					
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	1	2					
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	1,92	3,85					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	1	1					
		Anteil %	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92					
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	52	52	49	48	46				
am Ende des Halbjahres		Anzahl	52	49	48	46	42					

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1	4	9	12							
		Anteil in %	0,85	3,42	7,69	10,26							
		CI Anteil in %	[0,00; 2,53]	[0,11; 6,73]	[2,84; 12,54]	[4,74; 15,78]							
	davon wegen Tod	Anzahl	0	2	4	5							
		Anteil in %	0,00	1,71	3,42	4,27							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	1	1	1							
		Anteil in %	0,00	0,85	0,85	0,85							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	0							
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	1	1	3	5							
		Anteil in %	0,85	0,85	2,56	4,27							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	1							
		Anteil %	0,00	0,00	0,85	0,85							
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	117	116	113	108						
am Ende des Halbjahres		Anzahl	116	113	108	105							
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	1	2								
		Anteil in %	0,00	1,16	2,33								
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 3,44]	[0,00; 5,53]								
	davon wegen Tod	Anzahl	0	1	1								
		Anteil in %	0,00	1,16	1,16								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0								
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00								
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	1								
		Anteil in %	0,00	0,00	1,16								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0								
		Anteil %	0,00	0,00	0,00								
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	86	86	85							
am Ende des Halbjahres		Anzahl	86	85	84								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2010-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]									
	davon wegen Tod	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0									
		Anteil in %	0,00	0,00									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0									
Anteil in %		0,00	0,00										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0										
	Anteil %	0,00	0,00										
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	56	56									
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	56	56									
2011-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1										
		Anteil in %	1,72										
		CI Anteil in %	[0,00; 5,10]										
	davon wegen Tod	Anzahl	1										
		Anteil in %	1,72										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0										
Anteil in %		0,00											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0											
	Anteil %	0,00											
Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	58										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	57										

In Tabelle 4.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts halbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 startete/starteten 240 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliche Alter betrug im Beitritts halbjahr 65,58 Jahre, der Median lag bei 69,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres, Auswertungsgruppe 2	Beitritts halbjahr
2006-1	Mean	64,64
	Median	64,00
	<i>Fallbasis</i>	39
2006-2	Mean	65,58
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	240
2007-1	Mean	67,30
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	159
2007-2	Mean	66,96
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	139
2008-1	Mean	65,92
	Median	67,50
	<i>Fallbasis</i>	60
2008-2	Mean	66,51
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	91
2009-1	Mean	65,38
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	52
2009-2	Mean	63,67
	Median	65,00
	<i>Fallbasis</i>	117
2010-1	Mean	63,86
	Median	64,00
	<i>Fallbasis</i>	86

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 2	Beitrittsjahr
2010-2	Mean	65,82
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	56
2011-1	Mean	70,09
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	58

In Tabelle 4.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts halbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 lagen im Beitritts halbjahr für 240 Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation betrug 63,53 Jahre, der Median lag bei 67,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 2	Beitritts halbjahr
2006-1	Mean	62,74
	Median	62,00
	Fallbasis	39
2006-2	Mean	63,53
	Median	67,00
	Fallbasis	240
2007-1	Mean	64,82
	Median	67,00
	Fallbasis	159
2007-2	Mean	65,12
	Median	67,00
	Fallbasis	139
2008-1	Mean	64,15
	Median	66,00
	Fallbasis	60
2008-2	Mean	65,45
	Median	69,00
	Fallbasis	91
2009-1	Mean	64,19
	Median	65,50
	Fallbasis	52
2009-2	Mean	62,83
	Median	64,00
	Fallbasis	117
2010-1	Mean	62,30
	Median	62,00
	Fallbasis	86

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2010-2	Mean	64,79
	Median	66,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>56</i>
2011-1	Mean	68,74
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>58</i>

In Tabelle 4.1.6 ist die **Altersverteilung bei Erstmanifestation** der Patientinnen nach Alterskategorien ausgewiesen. Dargestellt ist die absolute Anzahl. Die Altersverteilung bezieht sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit Angaben zum Alter bei Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“).

In der Kohorte 2006-2 entfiel/entfielen im Beitrittsjahr 9 Patientin/Patientinnen auf die Altersklasse "50 - 54" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.6 Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2006-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	2
	45-49	1
	50-54	5
	55-59	3
	60-64	13
	65-69	6
	70-74	4
	75-79	3
	80-84	2
	85 und älter	0
	zusammen	39
	ohne benötigte Angaben	0
2006-2	0-14	0
	15-34	4
	35-39	8
	40-44	11
	45-49	28
	50-54	9
	55-59	16
	60-64	20
	65-69	50
	70-74	46
	75-79	36
	80-84	10
	85 und älter	2
	zusammen	240
	ohne benötigte Angaben	0

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2007-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	5
	40-44	5
	45-49	13
	50-54	8
	55-59	12
	60-64	23
	65-69	32
	70-74	24
	75-79	30
	80-84	4
	85 und älter	3
	zusammen	159
		ohne benötigte Angaben
2007-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	4
	40-44	7
	45-49	7
	50-54	11
	55-59	10
	60-64	18
	65-69	26
	70-74	23
	75-79	17
	80-84	11
	85 und älter	5
	zusammen	139
		ohne benötigte Angaben

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2008-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	4
	45-49	2
	50-54	8
	55-59	5
	60-64	5
	65-69	15
	70-74	6
	75-79	9
	80-84	4
	85 und älter	1
	zusammen	60
		ohne benötigte Angaben
2008-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	2
	40-44	5
	45-49	6
	50-54	7
	55-59	5
	60-64	4
	65-69	18
	70-74	21
	75-79	7
	80-84	8
	85 und älter	6
	zusammen	91
		ohne benötigte Angaben

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2009-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	0
	40-44	1
	45-49	4
	50-54	5
	55-59	5
	60-64	9
	65-69	15
	70-74	3
	75-79	6
	80-84	3
	85 und älter	1
	zusammen	52
	ohne benötigte Angaben	0
2009-2	0-14	0
	15-34	2
	35-39	1
	40-44	7
	45-49	8
	50-54	8
	55-59	16
	60-64	18
	65-69	24
	70-74	13
	75-79	13
	80-84	6
	85 und älter	1
	zusammen	117
	ohne benötigte Angaben	0

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2010-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	3
	40-44	3
	45-49	3
	50-54	10
	55-59	15
	60-64	15
	65-69	17
	70-74	7
	75-79	9
	80-84	4
	85 und älter	0
	zusammen	86
		ohne benötigte Angaben
2010-2	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	2
	45-49	3
	50-54	6
	55-59	8
	60-64	6
	65-69	9
	70-74	12
	75-79	2
	80-84	3
	85 und älter	4
	zusammen	56
		ohne benötigte Angaben

EZ	Alter bei Erstmanifestation – Verteilung auf Alterskategorien für vollendete Lebensjahre, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr
2011-1	0-14	0
	15-34	0
	35-39	1
	40-44	0
	45-49	3
	50-54	1
	55-59	7
	60-64	3
	65-69	16
	70-74	11
	75-79	7
	80-84	5
	85 und älter	4
	zusammen	58
	ohne benötigte Angaben	0

In Tabelle 4.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,35 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 2		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,35
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	4773

In Tabelle 4.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 2 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2006-2 sind im Durchschnitt 5,53 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 6,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 2

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 2	Halbjahre	
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,85
		Median	7,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>267</i>
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,53
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>1327</i>
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,75
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>915</i>
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,65
		Median	7,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>786</i>
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,15
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>309</i>
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,51
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>410</i>
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,75
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>195</i>
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,88
		Median	3,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>337</i>
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,99
		Median	2,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>171</i>

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 2		Halbjahre
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,00
		Median	1,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>56</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 4.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2006-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres 64 Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei 26 von Ihnen bzw. 40,63 Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte.

Tabelle 4.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	39	39	37	34	30	29	28	26	18	15	11
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		12	8	6	6	2	4	9	7	8	6
		Anteil in %		30,77	21,62	17,65	20,00	6,90	14,29	34,62	38,89	53,33	54,55
		CI Anteil in %		[16,09; 45,44]	[8,17; 35,07]	[4,64; 30,65]	[5,44; 34,56]	[0,00; 16,28]	[1,09; 27,49]	[15,97; 53,26]	[15,71; 62,06]	[27,20; 79,47]	[23,68; 85,41]
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	240	228	214	191	163	146	125	110	86	64	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		30	50	40	27	27	31	36	29	26	
		Anteil in %		13,16	23,36	20,94	16,56	18,49	24,80	32,73	33,72	40,63	
		CI Anteil in %		[8,76; 17,56]	[17,68; 29,05]	[15,16; 26,73]	[10,84; 22,29]	[12,17; 24,81]	[17,20; 32,40]	[23,92; 41,54]	[23,67; 43,77]	[28,50; 52,75]	
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	159	157	146	138	118	111	94	79	72		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		25	22	28	34	37	31	31	33		
		Anteil in %		15,92	15,07	20,29	28,81	33,33	32,98	39,24	45,83		
		CI Anteil in %		[10,18; 21,67]	[9,25; 20,89]	[13,56; 27,02]	[20,61; 37,02]	[24,52; 42,14]	[23,42; 42,53]	[28,40; 50,08]	[34,24; 57,42]		
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	139	137	131	123	118	106	89	82			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		23	25	35	29	24	19	30			
		Anteil in %		16,79	19,08	28,46	24,58	22,64	21,35	36,59			
		CI Anteil in %		[10,51; 23,07]	[12,33; 25,84]	[20,45; 36,46]	[16,77; 32,38]	[14,64; 30,65]	[12,79; 29,91]	[26,10; 47,08]			
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	60	60	58	57	49	43	42				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		7	10	14	13	6	12				
		Anteil in %		11,67	17,24	24,56	26,53	13,95	28,57				
		CI Anteil in %		[3,48; 19,86]	[7,43; 27,05]	[13,29; 35,84]	[14,04; 39,02]	[3,47; 24,43]	[14,74; 42,40]				
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	91	90	89	84	78	69					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		13	17	15	25	15					
		Anteil in %		14,44	19,10	17,86	32,05	21,74					
		CI Anteil in %		[7,14; 21,75]	[10,89; 27,31]	[9,62; 26,10]	[21,63; 42,48]	[11,94; 31,54]					

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	52	52	49	48	46					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6	1	6	4					
		Anteil in %		11,54	2,04	12,50	8,70					
		CI Anteil in %		[2,77; 20,31]	[0,00; 6,04]	[3,04; 21,96]	[0,46; 16,93]					
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	117	116	113	108						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		13	12	18						
		Anteil in %		11,21	10,62	16,67						
		CI Anteil in %		[5,44; 16,97]	[4,91; 16,33]	[9,61; 23,73]						
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	86	86	85							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		9	19							
		Anteil in %		10,47	22,35							
		CI Anteil in %		[3,96; 16,97]	[13,44; 31,26]							
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	56	56								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		8								
		Anteil in %		14,29								
		CI Anteil in %		[5,04; 23,53]								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	58									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl										
		Anteil in %										
		CI Anteil in %										

Auswertungskapitel 5: Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 3)

5.1 Patientinnenzahlen und -merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 5.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitritts- und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 10 Teilnehmer/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 3 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 3

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2006-2	Patientinnen insgesamt	10	10	8	7	7	6	6	5	4	3	
2007-1	Patientinnen insgesamt	7	7	7	7	4	4	4	2	2		
2007-2	Patientinnen insgesamt	4	4	3	3	3	3	3	3			
2008-1	Patientinnen insgesamt	4	4	4	4	4	3	3				
2008-2	Patientinnen insgesamt	3	3	3	3	3	3					
2009-1	Patientinnen insgesamt	1	1	1	1	1						

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-2	Patientinnen insgesamt	5	5	5	4							
2010-1	Patientinnen insgesamt	3	3	2								
2010-2	Patientinnen insgesamt	1	1									
2011-1	Patientinnen insgesamt	1										

Tabelle 5.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen

der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2006-2 mit 10 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen, von ihnen bzw. Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2006-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]										
	davon wegen Tod	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0										
		Anteil %	0,00										
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	10										
Anzahl		10											
2007-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2007-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
		CI Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil %	--	--	--	--						
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--	--						
Anzahl		--	--	--	--							
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
		CI Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--							
		Anteil %	--	--	--							
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--							
Anzahl		--	--	--								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
		CI Anteil in %	--	--									
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--									
Anteil %		--	--										
Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--										
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--									
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
		CI Anteil in %	--										
	davon wegen Tod	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--										
Anteil %		--											
Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--											
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	Anzahl	--										

In Tabelle 5.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts halbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 startete/starteten 10 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitritts halbjahr 64,00 Jahre, der Median lag bei 66,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres, Auswertungsgruppe 3	Beitritts halbjahr
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	64,00
	Median	66,00
	Fallbasis	10
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 3	Beitrittsjahr
2011-1	Mean	- -
	Median	- -
	<i>Fallbasis</i>	- -

In Tabelle 5.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 lagen im Beitrittsjahr für 10 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliches Alter bei Erstmanifestation betrug 56,30 Jahre, der Median lag bei 52,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 3	Beitritts-halbjahr
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	56,30
	Median	52,00
	Fallbasis	10
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr
2011-1	Mean	- -
	Median	- -
	<i>Fallbasis</i>	- -

In Tabelle 5.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,90 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 5,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 3		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,90
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>206</i>

In Tabelle 5.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 3 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2006-2 sind im Durchschnitt 5,60 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 6,50.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 3

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 3	Halbjahre	
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,60
		Median	6,50
		<i>Halbjahressumme</i>	56
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 3		Halbjahre
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	- -
		Median	- -
		<i>Halbjahressumme</i>	- -

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 5.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2006-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei von Ihnen bzw. Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit lokoregionärem Rezidiv bei Einschreibung.

Tabelle 5.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	10	10								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		4								
		Anteil in %		40,00								
		CI Anteil in %		[7,99; 72,01]								
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 3	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
		CI Anteil in %	--	--	--	--						
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
		CI Anteil in %	--	--	--							
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--								
		Anteil in %	--	--								
		CI Anteil in %	--	--								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--									
		Anteil in %	--									
		CI Anteil in %	--									

Auswertungskapitel 6: Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 4)

6.1 Patientinnenzahlen und -merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 6.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitritts- und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre noch Programmteilnehmerinnen waren.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 9 Teilnehmer/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 1 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 4

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt	9	8	8	7	7	6	5	5	2	1	
2007-1	Patientinnen insgesamt	5	5	5	4	3	3	3	1	1		
2007-2	Patientinnen insgesamt	9	9	9	9	9	9	6	6			
2008-1	Patientinnen insgesamt	1	1	1	1	0	0	0				
2008-2	Patientinnen insgesamt	4	4	4	4	4	4					
2009-1	Patientinnen insgesamt	1	1	1	1	1						

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-2	Patientinnen insgesamt	5	5	5	4							
2010-1	Patientinnen insgesamt	2	2	2								
2010-2	Patientinnen insgesamt	2	2									
2011-1	Patientinnen insgesamt	9										

Tabelle 6.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2006-2 mit - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen. - - von ihnen bzw. - - Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2007-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2007-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2008-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2008-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
		CI Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil %	--	--	--	--						
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--	--						
Anzahl		--	--	--	--							
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
		CI Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--							
		Anteil %	--	--	--							
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--							
Anzahl		--	--	--								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2010-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
		CI Anteil in %	--	--									
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--									
Anteil %		--	--										
Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--										
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--									
2011-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
		CI Anteil in %	--										
	davon wegen Tod	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--										
Anteil %		--											
Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--											
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	Anzahl	--										

In Tabelle 6.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitritts halbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 startete/starteten - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitritts halbjahr - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres, Auswertungsgruppe 4	Beitritts halbjahr
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 4	Beitrittsjahr
2011-1	Mean	- -
	Median	- -
	<i>Fallbasis</i>	- -

In Tabelle 6.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 lagen im Beitrittsjahr für - - Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliches Alter bei Erstmanifestation betrug - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 4	Beitritts-halbjahr
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2007-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr
2011-1	Mean	- -
	Median	- -
	<i>Fallbasis</i>	- -

In Tabelle 6.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 3,79 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 4		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	3,79
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>178</i>

In Tabelle 6.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 4 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2006-2 sind im Durchschnitt - - Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 4

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 4	Halbjahre
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean - -
		Median - -
		<i>Halbjahressumme</i> - -

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 4		Halbjahre
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	- -
		Median	- -
		<i>Halbjahressumme</i>	- -

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 6.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2006-2 war/waren zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres - - Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei - - von Ihnen bzw. - - Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit kontralateralem Brustkrebs bei Einschreibung.

Tabelle 6.1.11 Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 4	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
		CI Anteil in %	--	--	--	--						
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
		CI Anteil in %	--	--	--							
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--								
		Anteil in %	--	--								
		CI Anteil in %	--	--								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--									
		Anteil in %	--									
		CI Anteil in %	--									

Auswertungskapitel 7: Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung (Auswertungsgruppe 5)

7.1 Patientinnenzahlen und -merkmale

Alle Tabellendarstellungen in diesem Auswertungskapitel beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung. In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Patientinnenzahlen zum Programmeintritt und in den darauf folgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Differenziert wird in den Tabellen nach den Kriterien:

- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Altersverteilung
- Dauer der Erkrankung

In Tabelle 7.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen im Programm differenziert nach Kohorten ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patientinnen jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmerinnen waren.

Beispielsweise ist/sind in der Kohorte 2006-2 insgesamt 18 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm gestartet. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres war/waren in dieser Kohorte noch 9 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen im Programm. Diese Teilnehmerin/Teilnehmerinnen bildet/bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.1 Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 5

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1	1
2006-2	Patientinnen insgesamt	18	16	14	13	12	11	11	9	9	9	
2007-1	Patientinnen insgesamt	11	10	7	4	3	3	3	3	3		
2007-2	Patientinnen insgesamt	10	9	7	6	6	6	5	5			
2008-1	Patientinnen insgesamt	2	2	2	2	2	2	2				
2008-2	Patientinnen insgesamt	4	4	3	3	3	2					
2009-1	Patientinnen insgesamt	6	6	6	6	5						

EZ	Patientinnenzahlen, Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-2	Patientinnen insgesamt	2	2	2	2							
2010-1	Patientinnen insgesamt	3	2	2								
2010-2	Patientinnen insgesamt	3	2									
2011-1	Patientinnen insgesamt	2										

Tabelle 7.1.2 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patientinnen aus dem Programm**. Dafür kommen Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse, Beendigung durch die Patientin oder regelhafte Programmbeendigung (tumorfrei) in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen

der ausgeschiedenen Patientinnen werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2006-2 mit 18 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen, von ihnen bzw. Prozent waren bis zum Ende des letzten Halbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.2 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--
am Ende des Halbjahres		Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	2	4	5	6	7	7				
		Anteil in %	11,11	22,22	27,78	33,33	38,89	38,89				
		CI Anteil in %	[0,00; 26,05]	[2,46; 41,99]	[6,49; 49,07]	[10,92; 55,74]	[15,71; 62,06]	[15,71; 62,06]				
	davon wegen Tod	Anzahl	1	3	4	5	6	6				
		Anteil in %	5,56	16,67	22,22	27,78	33,33	33,33				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1	1	1	1	1				
		Anteil in %	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56				
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	0				
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	18	16	14	13	12	11			
am Ende des Halbjahres		Anzahl	16	14	13	12	11	11				
2007-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	1									
		Anteil in %	9,09									
		CI Anteil in %	[0,00; 26,91]									
	davon wegen Tod	Anzahl	1									
		Anteil in %	9,09									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	0									
		Anteil in %	0,00									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0									
		Anteil in %	0,00									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	0									
		Anteil in %	0,00									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0									
		Anteil in %	0,00									
	Pat. insges.:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	11								
am Ende des Halbjahres		Anzahl	10									

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2007-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl											
		Anteil in %											
		CI Anteil in %											
	davon wegen Tod	Anzahl											
		Anteil in %											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl											
		Anteil in %											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl											
		Anteil in %											
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl											
		Anteil in %											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl											
		Anteil %											
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl											
Anzahl													
2008-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Anzahl</i>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2009-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Anzahl</i>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2009-2	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
		CI Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil %	--	--	--	--						
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--	--						
Anzahl		--	--	--	--							
2010-1	ausgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
		CI Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--							
		Anteil %	--	--	--							
	Pat. insges.: $\frac{\text{zu Beginn des Halbjahres}}{\text{am Ende des Halbjahres}}$	Anzahl	--	--	--							
Anzahl		--	--	--								

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patientinnen (Werte kumuliert), Auswertungsgruppe 5	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2010-2	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
		CI Anteil in %	--	--									
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--	--									
		Anteil in %	--	--									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--									
		Anteil %	--	--									
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--	--									
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--	--									
2011-1	aussgeschiedene Pat. insgesamt	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
		CI Anteil in %	--										
	davon wegen Tod	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon wegen regelhafter Beendigung	Anzahl	--										
		Anteil in %	--										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--										
		Anteil %	--										
	Pat. insges.: <i>zu Beginn des Halbjahres</i>	Anzahl	--										
<i>am Ende des Halbjahres</i>		Anzahl	--										

In Tabelle 7.1.3 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 startete/starteten 18 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr 64,61 Jahre, der Median lag bei 69,50 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.3 Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 5	Beitrittsjahr
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	64,61
	Median	69,50
	Fallbasis	18
2007-1	Mean	68,73
	Median	75,00
	Fallbasis	11
2007-2	Mean	63,10
	Median	67,50
	Fallbasis	10
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

EZ	Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Auswertungsgruppe 5	Beitrittsjahr
2011-1	Mean	- -
	Median	- -
	<i>Fallbasis</i>	- -

In Tabelle 7.1.5 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmerinnen bei Erstmanifestation** ausgewiesen. Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Patientinnen, die im Beitrittsjahr noch Programmteilnehmerinnen waren und für die mindestens ein medizinischer Datensatz mit den benötigten Angaben zu Erstmanifestation vorlag („auswertbare Patientinnen“). Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen.

In der Kohorte 2006-2 lagen im Beitrittsjahr für 18 Teilnehmerin/Teilnehmerinnen auswertbare medizinische Datensätze vor. Ihr durchschnittliches Alter bei Erstmanifestation betrug 56,56 Jahre, der Median lag bei 60,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung bei Einschreibung.

Tabelle 7.1.5 Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 5	Beitrittsjahr
2006-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2006-2	Mean	56,56
	Median	60,00
	Fallbasis	18
2007-1	Mean	63,64
	Median	68,00
	Fallbasis	11
2007-2	Mean	58,00
	Median	63,00
	Fallbasis	10
2008-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2008-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2009-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-1	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2010-2	Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--

EZ	Mittleres Alter bei Erstmanifestation in vollendeten Lebensjahren, Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr
2011-1	Mean	- -
	Median	- -
	<i>Fallbasis</i>	- -

In Tabelle 7.1.9 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen und **über alle Kohorten**. In diese Auswertung fließen alle Patientinnen unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patientinnen sind im Durchschnitt 4,26 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung.

Tabelle 7.1.9 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten, Auswertungsgruppe 5		Halbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	4,26
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>277</i>

In Tabelle 7.1.10 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patientinnen der Auswertungsgruppe 5 **pro Kohorte und über alle Halbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt sondern es wird ermittelt wie viele Halbjahre die Patientinnen durchschnittlich Teilnehmerinnen des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patientinnen der Kohorte 2006-2 sind im Durchschnitt 5,78 Halbjahre als Teilnehmerinnen in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 7,50.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung.

Tabelle 7.1.10 Patientinnen und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 5

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 5	Halbjahre	
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,78
		Median	7,50
		<i>Halbjahressumme</i>	104
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,27
		Median	2,00
		<i>Halbjahressumme</i>	36
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,40
		Median	6,00
		<i>Halbjahressumme</i>	44
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	--
		Median	--
		<i>Halbjahressumme</i>	--

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte, Auswertungsgruppe 5		Halbjahre
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	- -
		Median	- -
		<i>Halbjahressumme</i>	- -

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 7.1.11 noch diejenigen Patientinnen aufgeführt, für die im Auswertungshalbjahr kein medizinischer Dokumentationsbogen vorlag. Diese Patientinnen wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Definitionsgemäß liegt im Beitrittsjahr für alle evaluierten Patientinnen eine medizinische Erstdokumentation vor, so dass darauf verzichtet wird, diese Angaben für das Beitrittsjahr darzustellen.

In der Kohorte 2006-2 war/waren zu Beginn des letzten Halbjahres Patientin/Patientinnen in das Programm eingeschrieben. Bei von Ihnen bzw. Prozent lagen im letzten Halbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Gruppe der Patientinnen mit Fernmetastasierung.

Tabelle 7.1.11 Patientinnen ohne medizinischen Dokumentationsbogen im Halbjahr, Auswertungsgruppe 5

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	18	16	14	13	12	11	11			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2	2	5	6	3	6			
		Anteil in %		12,50	14,29	38,46	50,00	27,27	54,55			
		CI Anteil in %		[0,00; 29,24]	[0,00; 33,31]	[10,93; 65,99]	[20,45; 79,55]	[0,00; 54,88]	[23,68; 85,41]			
2007-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	11	10								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2								
		Anteil in %		20,00								
		CI Anteil in %		[0,00; 46,13]								
2007-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	10									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl										
		Anteil in %										
		CI Anteil in %										
2008-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2008-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EZ	Patientinnen ohne medizinische Dokumentation, Auswertungsgruppe 5	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--					
		Anteil in %	--	--	--	--	--					
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--					
2009-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--	--						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--						
		Anteil in %	--	--	--	--						
		CI Anteil in %	--	--	--	--						
2010-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--	--							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--							
		Anteil in %	--	--	--							
		CI Anteil in %	--	--	--							
2010-2	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--	--								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--								
		Anteil in %	--	--								
		CI Anteil in %	--	--								
2011-1	Patientinnen insgesamt	Anzahl	--									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--									
		Anteil in %	--									
		CI Anteil in %	--									

Auswertungskapitel 8: Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 und 2

Im Kapitel 3.3 des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden tabellarische Auswertungen zu Überlebenszeiten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf eine Subkohorte von Patientinnen.

Im folgenden Kapitel 8 werden diese Auswertungen gemeinsam für die Subkohorte der **Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1)** und die Subkohorte der **Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2)** vorgenommen. Für die Gruppe dieser Patientinnen durften zudem in der Erstdokumentation keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen in den vorherigen Kapiteln und den Auswertungen im folgenden Kapitel 8 zu erleichtern, erfolgt die Nummerierung im Kapitel 8 analog zur Nummerierung in Kapitel 3.3.

8.3 Überlebenszeiten der Auswertungsgruppen 1 und 2

In Kapitel 8.3 sind **kumulierte „Überlebensraten“ nach Kaplan-Meier** für die Gesamtheit der Patientinnen aus den Auswertungsgruppen 1 und 2 ausgewiesen. Einbezogen sind also sowohl die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) als auch die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2). Diese kumulierten „Überlebensraten“ geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass Patientinnen bis zum jeweiligen Halbjahr überleben.

In Tabelle 8.3.1 ist die kumulierte „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier ausgewiesen. Die Berechnung der Überlebenszeit basiert auf den Informationen aus dem PM-Datensatz über das etwaige Versterben von Patientinnen. Die kumulierte Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Zunächst werden in der ersten Zeile die Zahl der im Programm verbliebenen Mitglieder der Auswertungsgruppe 1 und 2 ausgewiesen. Anschließend wird ab dem zweiten Berichtshalbjahr dargestellt, wie viele Patientinnen im Halbjahr verstorben sind und welchem Anteil dies entspricht.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 87 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 und 2 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah bzw. nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. 0 von ihnen verstarb/verstarben in diesem Halbjahr. Die kumulierte Überlebensrate lag bei 85,99 Prozent.

Tabelle 8.3.1 Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	42	42	40	37	33	32	31	29	21	18	14
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	[92,66; 100,00]	
2006-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	271	258	243	218	188	171	149	134	109	87	
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	2	9	1	8	0	3	0	4	2	0	
		Anteil in %	0,74	3,49	0,41	3,67	0,00	1,75	0,00	2,99	1,83	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	99,26	95,80	95,41	91,90	91,90	90,29	90,29	87,60	85,99	85,99	
CI Rate in %		[98,24; 100,00]	[93,37; 98,23]	[92,87; 97,95]	[88,49; 95,31]	[88,49; 95,31]	[86,48; 94,10]	[86,48; 94,10]	[83,08; 92,12]	[81,03; 90,95]	[81,03; 90,95]		
2007-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	193	191	180	172	150	143	126	111	103		
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	3	1	2	1	2	2	0	1		
		Anteil in %	0,00	1,57	0,56	1,16	0,67	1,40	1,59	0,00	0,97		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,43	97,88	96,74	96,10	94,76	93,25	93,25	92,35		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[96,67; 100,00]	[95,83; 99,93]	[94,18; 99,30]	[93,26; 98,94]	[91,40; 98,12]	[89,35; 97,15]	[89,35; 97,15]	[88,10; 96,60]			

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2007-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	190	188	178	169	162	150	133	126		
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	5	4	4	3	0	2	2		
		Anteil in %	0,00	2,66	2,25	2,37	1,85	0,00	1,50	1,59		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,34	95,15	92,90	91,18	91,18	89,81	88,38		
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[95,04; 99,64]	[92,06; 98,24]	[89,18; 96,62]	[87,05; 95,31]	[87,05; 95,31]	[85,33; 94,29]	[83,55; 93,21]			
2008-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	110	110	107	105	96	89	87			
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	0	2	4	2	0	1			
		Anteil in %	0,00	0,00	1,87	3,81	2,08	0,00	1,15			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	98,13	94,39	92,43	92,43	91,36			
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[95,56; 100,00]	[90,03; 98,75]	[87,38; 97,48]	[87,38; 97,48]	[85,96; 96,76]				
2008-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	156	155	152	146	139	130				
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	2	2	2	0	1				
		Anteil in %	0,64	1,29	1,32	1,37	0,00	0,77				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	99,36	98,08	96,79	95,46	95,46	94,73				
CI Rate in %		[98,11; 100,00]	[95,92; 100,00]	[94,02; 99,56]	[92,17; 98,75]	[92,17; 98,75]	[91,17; 98,29]					
2009-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	100	100	95	94	91					
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	2	1	0	4					
		Anteil in %	0,00	2,00	1,05	0,00	4,40					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,00	96,97	96,97	92,71					
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[95,26; 100,00]	[93,59; 100,00]	[93,59; 100,00]	[87,50; 97,92]						
2009-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	175	174	171	166						
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	2	2	1						
		Anteil in %	0,00	1,15	1,17	0,60						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,85	97,69	97,11						
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[97,27; 100,00]	[95,46; 99,92]	[94,61; 99,61]							
2010-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	126	125	123							
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	1	2	0							
		Anteil in %	0,79	1,60	0,00							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	99,21	97,62	97,62							
CI Rate in %		[97,66; 100,00]	[94,96; 100,00]	[94,96; 100,00]								

EZ	Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	91	90									
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0	2									
		Anteil in %	0,00	2,22									
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,78									
CI Rate in %		[100,00; 100,00]	[94,73; 100,00]										
2011-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	96										
	verstorben im Halbjahr	Anzahl	0										
		Anteil in %	0,00										
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00										
CI Rate in %		[100,00; 100,00]											

In Tabelle 8.3.2 ist die **kumulierte tumorfreie „Überlebensrate“ nach Kaplan-Meier** für die Gesamtheit der Patientinnen aus den Auswertungsgruppen 1 und 2 ausgewiesen. Einbezogen sind also sowohl die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) als auch die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2). Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Als tumorfreie Überlebenszeit wird dabei die Zeit bis zur erstmaligen Diagnose von Metastasen und/oder Rezidiven laut Folgedokumentation definiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. In der ersten Zeile wird die Zahl der (im Programm verbliebenen) Mitglieder der Auswertungsgruppe

1 und 2 ausgewiesen. Unter „auswertbare Patientinnen“ werden dann diejenigen Patientinnen ausgewiesen, für die im jeweiligen Halbjahr die benötigten Angaben zu Metastasen und/oder Rezidiven vorlagen. Anschließend wird dargestellt, wie viele dieser Patientinnen bis einschließlich des Berichtshalbjahres nicht von neuen Metastasen und/oder Rezidiven betroffen waren, bei wie vielen Patientinnen dies der Fall war und welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern der Auswertungsgruppen 1 und 2 dies jeweils entspricht.²¹

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 87 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 und 2 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah bzw. nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. Bei 51 von ihnen waren bis zu diesem Halbjahr keine neuen Metastasen und/oder Rezidive dokumentiert. Die kumulierte tumorfreie Überlebensrate lag bei 89,96 Prozent.

Tabelle 8.3.2 Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	42	42	40	37	33	32	31	29	21	14	
	auswertbar	Anzahl		28	31	29	25	28	25	18	12	6	
	ohne neue Metastasen/Rezidive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		27	30	26	23	26	23	16	11	6	
		Anteil in %		96,43	96,77	89,66	92,00	92,86	92,00	88,89	91,67	75,00	66,67
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	0	2	0	0	0	0	0	0	
		Anteil in %		3,57	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,22	97,22	90,74	90,74	90,74	90,74	90,74	90,74	90,74	90,74
	CI Anteil in %		[91,85; 100,00]	[91,85; 100,00]	[80,72; 100,00]	[80,72; 100,00]	[80,72; 100,00]	[80,72; 100,00]	[80,72; 100,00]	[80,72; 100,00]	[80,72; 100,00]	[80,72; 100,00]	

²¹ Zu beachten ist dabei, dass sich – insbesondere in den späteren Halbjahren – der Anteil der auswertbaren Patientinnen ohne Metastasen/Rezidiven bis einschließlich des betrachteten Halbjahres und der Anteil der auswertbaren Patientinnen mit erstmaligen Metastasen/Rezidiven im Halbjahr nicht zu 100 Prozent aufsummieren müssen. Denn definitionsgemäß können nur diejenigen Patientinnen bis einschließlich des Halbjahres metastasen- bzw. rezidivfrei sein oder erstmalige Metastasen/Rezidive aufweisen, bei denen nicht in vorangegangenen Halbjahren bereits Metastasen/Rezidive aufgetreten sind.

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2006-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	271	258	243	218	188	171	149	134	109	87	
	auswertbar	Anzahl		228	189	180	159	143	110	93	75	55	
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		222	178	168	149	135	103	88	70	51	
		Anteil in %		97,37	94,18	93,33	93,71	94,41	93,64	94,62	93,33	92,73	
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		6	6	2	3	0	1	0	1	0	
		Anteil in %		2,63	3,17	1,11	1,89	0,00	0,91	0,00	1,33	0,00	
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,50	94,71	93,71	91,99	91,99	91,21	91,21	89,96	89,96	
	CI Anteil in %		[95,52; 99,48]	[91,79; 97,63]	[90,51; 96,91]	[88,30; 95,68]	[88,30; 95,68]	[87,25; 95,17]	[87,25; 95,17]	[85,36; 94,56]	[85,36; 94,56]		
2007-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	193	191	180	172	150	143	126	111	103		
	auswertbar	Anzahl		163	152	138	110	99	87	67	59		
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		161	149	133	103	92	81	64	56		
		Anteil in %		98,77	98,03	96,38	93,64	92,93	93,10	95,52	94,92		
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2	2	1	3	2	1	0	0		
		Anteil in %		1,23	1,32	0,72	2,73	2,02	1,15	0,00	0,00		
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,88	97,66	97,00	94,61	92,83	91,79	91,79	91,79		
	CI Anteil in %		[97,33; 100,00]	[95,39; 99,93]	[94,40; 99,60]	[90,93; 98,29]	[88,47; 97,19]	[87,02; 96,56]	[87,02; 96,56]	[87,02; 96,56]			
2007-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	190	188	178	169	162	150	133	126			
	auswertbar	Anzahl		161	150	128	125	117	107	83			
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		157	146	124	118	107	97	74			
		Anteil in %		97,52	97,33	96,88	94,40	91,45	90,65	89,16			
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		4	0	1	2	4	1	1			
		Anteil in %		2,48	0,00	0,78	1,60	3,42	0,93	1,20			
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	97,71	97,71	97,05	95,63	92,41	91,46	90,23			
	CI Anteil in %		[95,50; 99,92]	[95,50; 99,92]	[94,49; 99,61]	[92,44; 98,82]	[88,04; 96,78]	[86,76; 96,16]	[85,00; 95,46]				
2008-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	110	110	107	105	96	89	87				
	auswertbar	Anzahl		94	95	88	78	71	63				
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		92	92	81	72	65	57				
		Anteil in %		97,87	96,84	92,05	92,31	91,55	90,48				
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2	1	5	1	1	0				
		Anteil in %		2,13	1,05	5,68	1,28	1,41	0,00				
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,13	97,14	91,74	90,58	89,27	89,27				
	CI Anteil in %		[95,56; 100,00]	[93,95; 100,00]	[86,24; 97,24]	[84,70; 96,46]	[82,94; 95,60]	[82,94; 95,60]					

EZ	Tumorfremie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2008-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	156	155	152	146	139	130					
	auswertbar	Anzahl		137	125	124	104	103					
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		137	124	122	102	100					
		Anteil in %		100,00	99,20	98,39	98,08	97,09					
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	1	1	1	1					
		Anteil in %		0,00	0,80	0,81	0,96	0,97					
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	99,26	98,46	97,58	96,61					
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[97,82; 100,00]	[96,35; 100,00]	[94,86; 100,00]	[93,33; 99,89]						
2009-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	100	100	95	94	91						
	auswertbar	Anzahl		87	88	82	83						
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		86	87	81	80						
		Anteil in %		98,85	98,86	98,78	96,39						
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		1	1	0	2						
		Anteil in %		1,15	1,14	0,00	2,41						
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,97	97,89	97,89	95,51						
	CI Anteil in %		[96,96; 100,00]	[95,00; 100,00]	[95,00; 100,00]	[91,19; 99,83]							
2009-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	175	174	171	166							
	auswertbar	Anzahl		152	148	140							
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		150	145	137							
		Anteil in %		98,68	97,97	97,86							
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		2	1	1							
		Anteil in %		1,32	0,68	0,71							
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	98,80	98,16	97,44							
	CI Anteil in %		[97,15; 100,00]	[96,10; 100,00]	[94,96; 99,92]								
2010-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	126	125	123								
	auswertbar	Anzahl		114	103								
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		114	103								
		Anteil in %		100,00	100,00								
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0	0								
		Anteil in %		0,00	0,00								
	kumulierte Überlebensrate	Rate	100,00	100,00	100,00								
	CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]									

EZ	Tumorfreie Überlebenszeit, Auswertungsgruppe 1 und 2		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2010-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	91	90									
	auswertbar	Anzahl		78									
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl		78									
		Anteil in %		100,00									
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl		0									
		Anteil in %		0,00									
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00	100,00								
CI Anteil in %				[100,00; 100,00]									
2011-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	96										
	auswertbar	Anzahl											
	ohne neue Metastasen/Rezi- dive bis einschl. Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	mit neuen Met./ Rez. im Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
	kumulierte Überlebensrate	Rate		100,00									
CI Anteil in %													

In Tabelle 8.3.3 sind die **Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert)** für die Gesamtheit der Patientinnen aus den Auswertungsgruppen 1 und 2 ausgewiesen. Einbezogen sind also sowohl die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 1) als auch die Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte (Auswertungsgruppe 2). Für diese Patientinnen dürfen in der Erstdokumentation zudem keine lokoregionären Rezidive, keine Fernmetastasen und kein kontralateraler Brustkrebs dokumentiert sein. Für die Auswertung sind alle Inzidenzen ab dem 1. Folgehalbjahr zu zählen. Für alle Kohorten und Berichtshalbjahre wird zunächst die Zahl der im Programm verbliebenen Patientinnen ausgewiesen. Anschließend wird dargestellt, wie viele der auswertbaren Patientinnen im Berichtshalbjahr von Rezidiven bzw. Metastasen betroffen waren. Darüber hinaus werden die entsprechenden Anteils- werte dargestellt. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Summe der

Patientinnen aus den beiden zuletzt ausgewiesenen Kategorien (mit Rezidiv/kontralateralem Tumor, mit Metastasen) in der Regel nicht der Anzahl der auswertbaren Patientinnen entspricht, da eine Doppelzuordnung von Patientinnen auf die beiden Kategorien möglich ist.

In der Kohorte 2006-2 war/waren im letzten Halbjahr 271 Frau/Frauen der Auswertungsgruppe 1 und 2 (Patientinnen mit Primärtumor bei Einschreibung, deren Einschreibung zeitnah bzw. nicht zeitnah zur Diagnose erfolgte), zuzuordnen. Die kumulierte Anzahl für bis einschließlich dieses letzten Berichtshalbjahres neu aufgetretene lokoregionäre Rezidive oder kontralaterale Tumore lag bei 11. Der kumulierte Anteil bezogen auf die Patientinnen zum Beitritts halbjahr lag bei 4,06 Prozent.

Tabelle 8.3.3 Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2006-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	1	3	4	4	4	4	4	4	4
		Anteil in %		2,38	2,38	7,14	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
		CI Anteil in %		[0,00; 7,05]	[0,00; 7,05]	[0,00; 15,03]	[0,54; 18,51]	[0,54; 18,51]	[0,54; 18,51]	[0,54; 18,51]	[0,54; 18,51]	[0,54; 18,51]	[0,54; 18,51]
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
2006-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	5	7	9	9	9	9	10	11	
		Anteil in %		1,11	1,85	2,58	3,32	3,32	3,32	3,32	3,69	4,06	
		CI Anteil in %		[0,00; 2,36]	[0,24; 3,45]	[0,69; 4,48]	[1,18; 5,46]	[1,18; 5,46]	[1,18; 5,46]	[1,18; 5,46]	[1,44; 5,94]	[1,71; 6,41]	
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		3	9	13	15	17	18	18	18	18	
		Anteil in %		1,11	3,32	4,80	5,54	6,27	6,64	6,64	6,64	6,64	
		CI Anteil in %		[0,00; 2,36]	[1,18; 5,46]	[2,25; 7,35]	[2,81; 8,26]	[3,38; 9,17]	[3,67; 9,61]	[3,67; 9,61]	[3,67; 9,61]	[3,67; 9,61]	

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	
2007-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	193	193	193	193	193	193	193	193			
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	3	4	4	4	4	4		
		Anteil in %		0,52	1,04	1,55	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07		
		CI Anteil in %		[0,00; 1,53]	[0,00; 2,47]	[0,00; 3,30]	[0,06; 4,09]	[0,06; 4,09]	[0,06; 4,09]	[0,06; 4,09]	[0,06; 4,09]	[0,06; 4,09]	
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	3	5	9	12	13	13	13		
		Anteil in %		0,52	1,55	2,59	4,66	6,22	6,74	6,74	6,74		
CI Anteil in %			[0,00; 1,53]	[0,00; 3,30]	[0,34; 4,84]	[1,68; 7,65]	[2,80; 9,63]	[3,19; 10,28]	[3,19; 10,28]	[3,19; 10,28]	[3,19; 10,28]		
2007-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	190	190	190	190	190	190	190	190			
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	1	2	3	4	5	6	6		
		Anteil in %		0,53	0,53	1,05	1,58	2,11	2,63	3,16	3,16		
		CI Anteil in %		[0,00; 1,56]	[0,00; 1,56]	[0,00; 2,51]	[0,00; 3,36]	[0,06; 4,15]	[0,35; 4,91]	[0,66; 5,65]	[0,66; 5,65]	[0,66; 5,65]	
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		4	5	5	7	11	17	19	19		
		Anteil in %		2,11	2,63	2,63	3,68	5,79	8,95	10,00	10,00		
CI Anteil in %			[0,06; 4,15]	[0,35; 4,91]	[0,35; 4,91]	[1,00; 6,37]	[2,46; 9,12]	[4,88; 13,02]	[5,72; 14,28]	[5,72; 14,28]	[5,72; 14,28]		
2008-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	110	110	110	110	110	110	110	110			
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	2	3	4	4	4	4		
		Anteil in %		0,00	0,00	1,82	2,73	3,64	3,64	3,64	3,64		
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 4,33]	[0,00; 5,79]	[0,12; 7,15]	[0,12; 7,15]	[0,12; 7,15]	[0,12; 7,15]	[0,12; 7,15]	
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		2	4	8	10	12	13	13	13		
		Anteil in %		1,82	3,64	7,27	9,09	10,91	11,82	11,82	11,82		
CI Anteil in %			[0,00; 4,33]	[0,12; 7,15]	[2,40; 12,15]	[3,69; 14,49]	[5,06; 16,76]	[5,76; 17,88]	[5,76; 17,88]	[5,76; 17,88]	[5,76; 17,88]		
2008-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	156	156	156	156	156	156	156	156			
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	1	2	2	2	2		
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,64	1,28	1,28	1,28	1,28		
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,90]	[0,00; 3,05]	[0,00; 3,05]	[0,00; 3,05]	[0,00; 3,05]	[0,00; 3,05]	
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	1	2	3	4	4	4	4		
		Anteil in %		0,00	0,64	1,28	1,92	2,56	2,56	2,56	2,56		
CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 1,90]	[0,00; 3,05]	[0,00; 4,09]	[0,08; 5,05]	[0,08; 5,05]	[0,08; 5,05]	[0,08; 5,05]	[0,08; 5,05]		

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	100	100	100	100	100					
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0	0	0					
		Anteil in %			0,00	0,00	0,00	0,00				
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]				
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		1	2	3	5					
		Anteil in %			1,00	2,00	3,00	5,00				
CI Anteil in %				[0,00; 2,96]	[0,00; 4,76]	[0,00; 6,36]	[0,71; 9,29]					
2009-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	175	175	175	175						
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		2	2	2						
		Anteil in %			1,14	1,14	1,14					
		CI Anteil in %			[0,00; 2,72]	[0,00; 2,72]	[0,00; 2,72]					
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	1	2						
		Anteil in %			0,00	0,57	1,14					
CI Anteil in %				[0,00; 0,00]	[0,00; 1,69]	[0,00; 2,72]						
2010-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	126	126	126							
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0							
		Anteil in %			0,00	0,00						
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0	0							
		Anteil in %			0,00	0,00						
CI Anteil in %				[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
2010-2	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	91	91								
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0								
		Anteil in %			0,00							
		CI Anteil in %			[0,00; 0,00]							
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl		0								
		Anteil in %			0,00							
CI Anteil in %				[0,00; 0,00]								

EZ	Rezidiv- und Metastaseraten (kumuliert), Auswertungsgruppe 1 und 2		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2011-1	Auswertungsgruppe 1 und 2 insgesamt	Anzahl	96										
	mit lokoregionärem Rezidiv oder kontralateralem Tumor bis einschließlich Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
		CI Anteil in %											
	mit Metastasierung bis einschließlich Halbjahr	Anzahl											
		Anteil in %											
CI Anteil in %													

Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte

Ein Grundziel der Evaluation ist laut Kriterien des BVA, die Überprüfung der Kosten der Versorgung der DMP-Patientinnen. Entsprechende Auswertungen werden in diesem zweiten Teil des Abschlussberichtes vorgenommen. Hierzu werden anhand von Zufallsstichproben die durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patientin der Auswertungsgruppe 1 berechnet.

In diese Betrachtung fließen alle Ausgaben für die betrachteten Leistungsbereiche ein, nicht nur die brustkrebspezifischen Ausgaben. Differenziert wird nach folgenden Bereichen:

- Ambulante ärztliche Behandlung
- Krankenhausbehandlung
- Arzneimittel
- Heilmittel
- Hilfsmittel
- Dialyse-Sachkosten
- Anschlussrehabilitation
- Häusliche Krankenpflege
- Krankengeld

Für die Zuordnung der Kosten zu einem Halbjahreszeitraum ist in der Regel der Beginn der Maßnahme ausschlaggebend, der die Kosten zuzuordnen sind. So sind die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt dem (Halb-)Jahr zuzuordnen, in dem der Krankenhausaufenthalt begann. Allerdings ist für die Zuordnung der Heilmittelkosten relevant, in welchem Monat sie abgerechnet wurden. Bei Neueinschreibungen gilt, dass die Kosten des vollständigen Quartals, in dem die Einschreibung erfolgte, berücksichtigt werden.

In den nachfolgenden standardisierten Tabellen wird die Entwicklung der durchschnittlichen Ausgaben zunächst getrennt nach Leistungsbereichen ausgewiesen, bevor die Gesamtbetrachtung erfolgt. Die Tabellen enthalten für alle Halbjahres-Kohorten die statistischen Kennwerte arithmetisches Mittel, Konfidenzintervall (95%) und Standardabweichung.

Das arithmetische Mittel wird berechnet, indem die gesamten Ausgaben eines Leistungsbereiches, die innerhalb eines Halbjahres für eine Kohorte angefallen sind, durch die Anzahl der teilnehmenden Patientinnen dieser Kohorte in diesem Halbjahr dividiert werden. Patientinnen, die im Berichtshalbjahr versterben, sind mit 0,5 zu gewichten. Patientinnen, die aus anderen Gründen ausscheiden, sind ebenfalls mit 0,5 zu gewichten, sofern ihr Ausscheiden im 1. Quartal des Halbjahres erfolgt.

Würden beispielsweise im Berichtshalbjahr von zehn Patientinnen zwei im zweiten Quartal versterben und eine aus sonstigen Gründen im zweiten Quartal ausscheiden, wären die beiden verstorbenen Patientinnen halb, die aus sonstigen Gründen ausgeschiedene Patientin sowie die im Programm verbliebenen Patientinnen voll zu gewichten. Die Bezugsgröße für die Mittelwertbildung beliefe sich rechnerisch auf neun Fälle.

Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden, sofern die Daten vorliegen, die Ausgaben der Patientinnen einer Kohorte über alle Berichtshalbjahre aufsummiert und durch die Summe der gewichteten Teilnahmejahre dividiert (jeweils ohne Beitrittsjahr).

Neben den durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patientin, deren Berechnung auf Zufallsstichproben basiert, werden weitere Kosten der Versorgung der DMP-Patientinnen dargestellt. Diese beinhalten die gesonderten Kosten der Krankenkassen für Verwaltung, Qualitätssicherung u.ä. im Rahmen der DMP. Die Verwaltungskosten und die Kosten der Qualitätssicherung werden durch die programmdurchführenden Krankenkassen kalkulatorisch ermittelt und basieren nicht auf Stichproben. Eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Patientinnen, die nicht während des gesamten Jahres eingeschrieben waren, gehen anteilig in die Berechnung ein. Die Durchschnittskosten ergeben sich folglich als der Quotient aus den Gesamtkosten für Verwaltung und Qualitätssicherung und den Versichertenjahren (= Gesamtzahl der eingeschriebenen Versicherten gewichtet mit dem Anteil ihres Teilnahmezeitraums im betrachteten Jahr).

Als **Verwaltungskosten** der Krankenkassen für die DMPs gelten

- Personal- und Sachkosten inklusive der Raumkosten, die mit der Durchführung der DMPs zusammenhängen und
- Kosten für die Datenverarbeitung und -erfassung sowie für die Evaluation, die in erster Linie an Dritte vergeben wird.

Als **Kosten der Qualitätssicherung** der Krankenkassen gelten

- Kosten der versichertenbezogenen Qualitätssicherung, die intern oder durch die Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen anfallen, z.B. durch Beratung der Versicherten, Reminder, Broschüren und
- Kosten der arztbezogenen Qualitätssicherung, die, je nach Datenflussmodell, direkt bei den Kassen anfallen können, bei der gemeinsamen Einrichtung oder bei Dritten (z.B. Erstellung von Feedbackberichten durch Datenstellen).

Die genaue Methode zur Ermittlung der Verwaltungskosten ist in diesem Abschlussbericht nicht darzustellen; die Kassen haben die jeweils von ihnen verwendete Methodik dem BVA jedoch auf Anfrage mitzuteilen.

Im Gegensatz zu den Auswertungen der Patientinnenmerkmale und der medizinischen Inhalte im ersten Teil, basiert die Evaluation der ökonomischen Inhalte nicht auf den Daten aller Teilnehmerinnen des evaluierten DMP. Vielmehr werden dazu aus allen Halbjahres-Kohorten **Stichproben** gezogen. Der Stichprobenumfang beträgt in der Regel zehn Prozent der Patientinnenanzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patientinnen. Bei Kohorten mit weniger als 100 Patientinnen werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patientinnen umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.

In den Berichten, die vor dem 30. September 2012 erstellt wurden, wurden alle Patientinnen für die Stichprobenziehung berücksichtigt. Diese Systematik wurde im Juni 2011 umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt werden nur noch Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 für die Stichprobenziehung berücksichtigt. Eine rückwirkende Änderung der Stichprobenziehung war nicht möglich. Daher wird im aktuellen Bericht die Auswertung für alle Kohorten bis 2010-2 auf Auswertungsgruppe 1 selektiert. Ab der Kohorte 2011-1 wurde die Stichprobenziehung angepasst: sie wird jetzt nur aus den Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 gezogen.

Aus diesem Grund sind die in den aktuellen Berichten ausgewiesenen Anzahlen an Stichprobenmitgliedern zumeist deutlich niedriger als in vorherigen Berichten. Auch die in früheren Berichten ausgewiesenen Leistungsausgaben sind dadurch nicht mehr mit den Ergebnissen in den aktuellen Berichten vergleichbar.

Zu beachten ist dabei, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis, die sich ggf. auch durch die endgültige Datenaufbereitung ergeben, können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patientinnen im Berichtsteile I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

Zu beachten sind bezüglich der Stichprobengröße auch Sondereffekte, die sich aus der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 ergeben. Für alle Kohorten vor der Fusion (bis einschließlich der Kohorte 2007-2) wurden die Stichproben für DMP-Teilnehmer von AOK und See-Krankenkasse gemeinsam gezogen, da auch die Versicherten der See-Krankenkasse an den DMPs der AOK teilnahmen. Nach der Fusion waren die Versicherten der See-Krankenkasse gemäß der Vorgaben des BVA mit ihrer gesamten Historie den Berichten der Knappschaft zuzuordnen. Diese nachträgliche Neuordnung der (ehemaligen) See-Versicherten führt sowohl in den Evaluationsberichten der AOK als auch in den Evaluationsberichten der Knappschaft dazu, dass in der Regel in den Kohorten bis einschließlich 2007-2 die Stichprobenfallzahlen nicht mehr der oben beschriebenen Stichprobenquote bzw. den oben definierten Ober- und Untergrenzen entsprechen.

Im aktuellen Bericht können die Stichproben zur Kohorte 2009-1 zudem kleiner ausfallen als im Bericht aus September 2009. Die erstmalig von der AOK Sachsen-Anhalt gelieferten PM-Daten für die Kohorte 2009-1 enthielten Datensätze für ehemalige BKK-Versicherte mit dem künstlichen Eintrittsdatum 01.04.2009. Davon wurden einige Fälle in die OD-bzw. SF36-Stichproben gezogen. Diese PM-Lieferung wurde durch eine Korrekturlieferung ersetzt, in welcher alle ehemaligen BKK-Versicherte mit dem historisch korrekten Eintrittsdatum enthalten waren. Dieses wick größtenteils vom künstlichen Eintrittsdatum ab, so dass z.T. deutlich weniger Patienten der Kohorte 2009-1 zuzuordnen waren. Daher haben Fälle aus der PM-Erstlieferung, die in die Stichproben gezogen wurden, im aktuellen Bericht keinen passenden PM-Datensatz in Kohorte 2009-1. Die dadurch nötige Bereinigung der Stichprobe führt zur angesprochenen Verringerung der Anzahl der Stichprobenmitglieder.

Auswertungskapitel 9: Patientinnenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben

Tabelle 9.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patientinnen für die Ausgabenanalysen zur Verfügung standen. Dabei handelt es sich um Stichproben aus der Gesamtzahl der Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 je Kohorte. Ihre Anzahl wird jeweils in der ersten Zeile ausgewiesen. Im Laufe der weiteren Teilnahmehalbjahre kann sich die Anzahl verringern, weil Patientinnen wegen Tod, Ausschluss oder eigener Beendigung aus dem Programm ausscheiden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbereichen ist jedoch nicht die Zahl der Patientinnen zu Beginn des Berichtshalbjahres relevant, sondern die Zahl der gewichteten Patientinnen (siehe einführende Anmerkungen zum Berichtsteil II), für die im Berichtshalbjahr die erforderlichen Angaben zu den Leistungsausgaben vorliegen. Zur Information wird diese Zahl in der zweiten Zeile ausgewiesen. Da die Daten zu den

Leistungsausgaben erst ab dem Halbjahr 2004-1 vorliegen, können für davor liegende Halbjahre keine Auswertungen vorgenommen werden; die entsprechenden Tabellenzellen bleiben leer.

In der jeweils dritten Zeile wird ausgewiesen, wie viele Patientinnen im jeweiligen Berichtshalbjahr aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Die vierte Zeile weist den kumulierten Wert aus: Sie gibt an, wie viele Patientinnen bis zum Ende des Berichtshalbjahres verstorben oder aus anderen Gründen aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Umfasst eine Kohorte in der Stichprobe weniger als 10 Patientinnen, werden keine Auswertungen vorgenommen. Stattdessen sind die Zahlenfelder der Auswertungstabellen in diesem Fall mit „-“ gefüllt.

Tabelle 9.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		auswertbar und gewichtet	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	
		auswertbar und gewichtet	10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0	
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	
2007-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	12	12	12	12	11	11	11	11	10		
		auswertbar und gewichtet	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0		
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	0	0	1	1	1	1	2	2		
2007-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	18	18	15	15	14	14	14	14			
		auswertbar und gewichtet	18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0			
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	0	3	0	1	0	0	0	0			
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	3	3	4	4	4	4	4			

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2008-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	41	41	40	39	38	37	36				
		auswertbar und gewichtet	41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5				
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr aus- geschieden	0	1	1	1	1	1	1	1			
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	1	2	3	4	5	6				
2008-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	38	38	36	36	36	36	36				
		auswertbar und gewichtet	38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	32,5					
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr aus- geschieden	0	2	0	0	0	0	1				
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	2	2	2	2	2	3				
2009-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	46	46	44	44	43						
		auswertbar und gewichtet	46,0	43,0	41,0	40,0	38,5						
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr aus- geschieden	0	2	0	1	1						
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	2	2	3	4						
2009-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	27	27	27	27							
		auswertbar und gewichtet	27,0	25,0	24,0	23,0							
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr aus- geschieden	0	0	0	0							
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0	0	0	0							
2010-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	24	23	22								
		auswertbar und gewichtet	23,5	22,5	21,0								
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr aus- geschieden	1	1	0								
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1	2	2								
2010-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	34	33									
		auswertbar und gewichtet	34,0	31,0									
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr aus- geschieden	1	2									
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	1	3									
2011-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	38										
		auswertbar und gewichtet	38,0										
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr aus- geschieden	0										
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	0										

Auswertungskapitel 10: Leistungsausgaben

Tabelle 10.1 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für die **ambulante ärztliche Behandlung**. Die Kosten der ambulanten ärztlichen Behandlung ergeben sich dabei aus dem Produkt, aus der Summe der erbrachten Punkte und einem durchschnittlichen Punktwert von 3,5 Eurocent sowie den in Euro abgerechneten Gebührenpositionen. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Aus-

wertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin 449,88 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [276,80; 622,96].

Tabelle 10.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0	
	Leistungsausgaben	Mean	1281,94	619,42	1113,88	620,85	576,37	422,76	525,45	527,15	727,57	598,31	449,88	
		CI Mean	[1006,64; 1557,25]	[319,75; 919,08]	[488,74; 1739,03]	[206,05; 1035,64]	[403,77; 748,97]	[284,12; 561,41]	[193,86; 857,04]	[314,17; 740,14]	[319,55; 1135,59]	[171,43; 1025,20]	[276,80; 622,96]	
		SD	1132,45	483,49	1008,61	669,23	271,43	212,21	447,60	266,17	488,21	435,60	176,61	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0		
	Leistungsausgaben	Mean	1359,32	1208,08	1478,19	528,39	556,41	469,70	723,05	503,51	555,84	441,20		
		CI Mean	[1102,61; 1616,03]	[674,44; 1741,73]	[856,45; 2099,92]	[367,64; 689,13]	[392,24; 720,58]	[371,59; 567,81]	[380,99; 1065,11]	[420,13; 586,88]	[383,81; 727,88]	[338,74; 543,67]		
		SD	1178,78	943,16	1098,85	284,10	290,16	166,02	523,56	127,61	263,32	138,31		

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	18	18	15	15	14	14	14	14				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0				
	Leistungsausgaben	Mean	1326,47	1094,60	1254,91	490,89	551,28	619,38	512,13	543,02	464,33			
		CI Mean	[1073,18; 1579,76]	[639,66; 1549,54]	[667,38; 1842,44]	[397,46; 584,32]	[400,57; 701,98]	[430,72; 808,04]	[421,74; 602,51]	[350,38; 735,66]	[363,22; 565,45]			
	SD	1242,90	984,77	1235,95	184,62	292,78	333,43	159,75	325,97	171,10				
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	41	41	40	39	38	37	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5					
	Leistungsausgaben	Mean	1765,10	1494,52	1928,07	682,95	609,42	622,25	548,61	620,82				
		CI Mean	[1501,13; 2029,06]	[1165,45; 1823,58]	[1421,36; 2434,78]	[550,29; 815,61]	[492,62; 726,22]	[512,93; 731,57]	[442,86; 654,37]	[480,08; 761,55]				
	SD	1902,23	1075,02	1635,05	414,46	350,02	317,97	288,05	369,64					
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38	38	36	36	36	36	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	34,0	32,5					
	Leistungsausgaben	Mean	1799,08	1649,22	1980,88	632,19	599,57	608,59	566,36					
		CI Mean	[1509,84; 2088,32]	[1242,58; 2055,87]	[1457,93; 2503,84]	[528,34; 736,04]	[504,47; 694,67]	[512,90; 704,28]	[451,11; 681,60]					
	SD	1932,58	1278,94	1622,97	308,95	282,92	284,68	335,20						
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	46	44	44	43							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	46,0	43,0	41,0	40,0	38,5							
	Leistungsausgaben	Mean	1537,27	2039,43	1251,64	624,13	564,61	595,03						
		CI Mean	[1325,46; 1749,07]	[1662,63; 2416,23]	[910,62; 1592,65]	[539,03; 709,23]	[488,83; 640,39]	[496,23; 693,83]						
	SD	1377,56	1303,87	1140,92	278,00	244,53	312,77							
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	27	27	27								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	27,0	25,0	24,0	23,0								
	Leistungsausgaben	Mean	2263,65	1811,25	2238,80	603,62	479,76							
		CI Mean	[1581,96; 2945,33]	[1336,57; 2285,92]	[1426,82; 3050,77]	[448,58; 758,66]	[390,31; 569,20]							
	SD	2951,16	1258,42	2071,37	387,52	218,86								

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörigen Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		24	23	22									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		23,5	22,5	21,0									
	Leistungsausgaben	Mean	2179,40	1913,81	1377,34	781,51									
		CI Mean	[1429,71; 2929,09]	[1217,59; 2610,04]	[717,86; 2036,82]	[489,05; 1073,98]									
		SD	2522,72	1721,97	1596,02	683,79									
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0										
	Leistungsausgaben	Mean	2895,25	2542,88	1447,63										
		CI Mean	[1823,39; 3967,12]	[1412,65; 3673,12]	[911,69; 1983,56]										
		SD	3044,84	3362,42	1522,42										
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0											
	Leistungsausgaben	Mean		1751,19											
		CI Mean		[1275,02; 2227,35]											
		SD		1497,58											

Tabelle 10.2 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für die **Krankenhausbehandlung**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1),

jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin 76,77 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [0,00; 227,25].

Tabelle 10.2 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0		
	Leistungsausgaben	Mean	2953,64	5423,59	2057,66	141,87	1869,11	4179,27	1395,28	380,03	763,71	518,34	76,77		
		CI Mean	[1166,19; 4741,09]	[1850,16; 8997,01]	[0,00; 4479,69]	[0,00; 361,15]	[50,36; 3687,85]	[0,00; 9230,68]	[0,00; 3695,72]	[0,00; 851,50]	[0,00; 1698,21]	[0,00; 1534,27]	[0,00; 227,25]		
		SD	7352,50	5765,39	3907,72	353,78	2860,08	7731,75	3105,31	589,22	1118,16	1036,67	153,55		
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0			
	Leistungsausgaben	Mean	776,88	5140,12	869,46	220,32	101,21	13,39	906,08	801,74	183,80	0,00			
		CI Mean	[170,17; 1383,59]	[4371,43; 5908,81]	[0,00; 1955,71]	[0,00; 587,59]	[0,00; 299,57]	[0,00; 39,62]	[0,00; 2521,82]	[0,00; 2373,16]	[0,00; 544,03]	[0,00; 0,00]			
		SD	2785,93	1358,58	1919,84	649,11	350,59	44,40	2473,08	2405,23	551,39	0,00			

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	18	18	15	15	14	14	14	14				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0				
	Leistungsausgaben	Mean	2115,97	5602,50	2060,96	795,04	150,03	713,06	2183,75	872,37	397,12			
		CI Mean	[1210,57; 3021,36]	[3607,51; 7597,48]	[371,15; 3750,77]	[0,00; 1612,12]	[0,00; 444,45]	[139,14; 1286,97]	[413,77; 3953,73]	[0,00; 1943,83]	[0,00; 900,45]			
		SD	4442,77	4318,38	3554,74	1614,56	572,01	1014,33	3128,26	1813,08	851,71			
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	41	41	40	39	38	37	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5					
	Leistungsausgaben	Mean	2777,39	4345,50	1516,27	2906,60	1136,74	815,97	542,81	988,27				
		CI Mean	[1548,90; 4005,87]	[3561,51; 5129,49]	[562,84; 2469,70]	[37,51; 5775,69]	[350,40; 1923,08]	[216,00; 1415,94]	[79,88; 1005,75]	[102,44; 1874,11]				
		SD	8852,89	2561,23	3076,55	8964,04	2356,48	1745,09	1260,92	2326,58				
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38	38	36	36	36	36						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	32,5						
	Leistungsausgaben	Mean	2895,26	7392,99	1973,89	1385,50	1097,53	827,12	1928,92					
		CI Mean	[1764,02; 4026,50]	[5684,40; 9101,58]	[695,41; 3252,36]	[0,00; 2819,25]	[62,84; 2132,21]	[0,00; 1923,93]	[464,54; 3393,29]					
		SD	7558,43	5373,69	3967,69	4265,37	3078,16	3262,99	4259,30					
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	46	44	44	43							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	46,0	43,0	41,0	40,0	38,5							
	Leistungsausgaben	Mean	1685,19	5008,91	926,96	630,78	1169,98	633,81						
		CI Mean	[1020,82; 2349,56]	[3720,51; 6297,32]	[258,32; 1595,59]	[203,98; 1057,59]	[260,40; 2079,55]	[64,51; 1203,11]						
		SD	4320,95	4458,35	2237,00	1394,33	2935,04	1802,25						
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	27	27	27								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	27,0	25,0	24,0	23,0								
	Leistungsausgaben	Mean	1212,65	5475,14	1150,48	420,66	208,60							
		CI Mean	[524,17; 1901,14]	[4227,47; 6722,81]	[330,27; 1970,70]	[0,00; 885,46]	[0,00; 480,03]							
		SD	2980,60	3307,70	2092,39	1161,78	664,15							

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		24	23	22								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		23,5	22,5	21,0								
	Leistungsausgaben	Mean	5370,88	5984,57	3253,39	2076,92								
		CI Mean	[2024,46; 8717,29]	[4323,36; 7645,79]	[935,97; 5570,81]	[0,00; 4529,61]								
		SD	11260,78	4108,70	5608,40	5734,51								
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0									
	Leistungsausgaben	Mean	4341,79	5156,01	2170,90									
		CI Mean	[34,25; 8649,34]	[3978,33; 6333,70]	[17,12; 4324,67]									
		SD	12236,43	3503,59	6118,21									
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0										
	Leistungsausgaben	Mean		5546,99										
		CI Mean		[4195,55; 6898,42]										
		SD		4250,41										

Tabelle 10.3 gibt für alle Kohorten Auskunft über die Anzahl der **Patientinnen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt** im betrachteten Halbjahr und ihren Anteil an der Gesamtzahl der Patientinnen. Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2006-2 umfasst die Stichprobe im letzten Berichtshalbjahr 8 Patientinnen. Davon hatten 1 auswertbare Patientinnen bzw. 12,50 Prozent mindestens einen Krankenhausaufenthalt.

Tabelle 10.3 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	10	10	10	10	9	9	9	9	8	8
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	8	5	2	5	7	3	2	4	1	1
		Anteil in %	80,00	50,00	20,00	50,00	77,78	33,33	22,22	44,44	12,50	12,50
		CI Anteil in %	[53,87; 106,13]	[17,33; 82,67]	[0,00; 46,13]	[17,33; 82,67]	[48,97; 106,59]	[0,66; 66,00]	[0,00; 51,03]	[10,01; 78,87]	[0,00; 37,00]	[0,00; 37,00]
2007-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	12	12	12	12	11	11	11	11	10	
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	12	4	2	1	1	3	1	1	1	0
		Anteil in %	100,00	33,33	16,67	8,33	9,09	27,27	9,09	9,09		
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]	[5,47; 61,19]	[0,00; 38,70]	[0,00; 24,66]	[0,00; 26,91]	[0,00; 54,87]	[0,00; 26,91]	[0,00; 26,91]		
2007-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	18	18	15	15	14	14	14	14		
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	15	7	4	1	5	6	5	3		
		Anteil in %	83,33	38,89	26,67	6,67	35,71	42,86	35,71	21,43		
		CI Anteil in %	[65,61; 101,05]	[15,72; 62,06]	[3,50; 49,84]	[0,00; 19,74]	[9,66; 61,76]	[15,96; 69,76]	[9,66; 61,76]	[0,00; 43,74]		
2008-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	41	41	40	39	38	37	36			
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	34	16	11	11	8	5	7			
		Anteil in %	82,93	39,02	27,50	28,21	21,05	13,51	19,44			
		CI Anteil in %	[71,27; 94,59]	[23,90; 54,14]	[13,49; 41,51]	[13,90; 42,52]	[7,91; 34,19]	[2,34; 24,68]	[6,33; 32,55]			
2008-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38	38	36	36	36	36				
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	37	18	10	14	6	12				
		Anteil in %	97,37	47,37	27,78	38,89	16,67	33,33				
		CI Anteil in %	[92,21; 102,53]	[31,28; 63,46]	[12,94; 42,62]	[22,74; 55,04]	[4,32; 29,02]	[17,71; 48,95]				

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr
2009-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	46	44	44	43					
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	39	12	10	12	7					
		Anteil in %	84,78	26,09	22,73	27,27	16,28					
		CI Anteil in %	[74,28; 95,28]	[13,26; 38,92]	[10,20; 35,26]	[13,96; 40,58]	[5,11; 27,45]					
2009-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	27	27	27						
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	24	11	9	4						
		Anteil in %	88,89	40,74	33,33	14,81						
		CI Anteil in %	[76,81; 100,97]	[21,85; 59,63]	[15,21; 51,45]	[1,16; 28,46]						
2010-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	24	23	22							
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	22	9	7							
		Anteil in %	91,67	39,13	31,82							
		CI Anteil in %	[80,38; 102,96]	[18,74; 59,52]	[11,90; 51,74]							
2010-2	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	34	33								
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	30	12								
		Anteil in %	88,24	36,36								
		CI Anteil in %	[77,25; 99,23]	[19,69; 53,03]								
2011-1	Patienten insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38									
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	35									
		Anteil in %	92,11									
		CI Anteil in %	[83,42; 100,80]									

Tabelle 10.4 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Arzneimittel**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1),

jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin 549,92 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [1,78; 1098,07].

Tabelle 10.4 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0
	Leistungsausgaben	Mean	1792,92	2606,98	997,36	994,53	1051,56	611,53	1005,35	978,19	856,52	760,07	549,92
		CI Mean	[1448,47; 2137,38]	[0,00; 6091,92]	[441,31; 1553,41]	[501,82; 1487,24]	[481,43; 1621,69]	[387,41; 835,64]	[579,32; 1431,38]	[416,48; 1539,90]	[288,59; 1424,46]	[0,00; 1603,66]	[1,78; 1098,07]
	SD	1416,87	5622,63	897,13	794,94	896,56	343,04	575,09	701,99	679,55	860,80	559,33	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0	
	Leistungsausgaben	Mean	2583,47	1891,20	2499,00	1203,51	986,89	1090,41	1188,43	992,86	1074,62	1008,59	
		CI Mean	[1983,27; 3183,67]	[108,96; 3673,44]	[871,15; 4126,85]	[621,93; 1785,08]	[571,67; 1402,10]	[681,00; 1499,82]	[636,44; 1740,42]	[524,08; 1461,63]	[553,02; 1596,23]	[524,80; 1492,37]	
	SD	2756,03	3149,93	2877,06	1027,87	733,85	692,79	844,88	717,51	798,37	653,05		
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		18	18	15	15	14	14	14	14		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0		
	Leistungsausgaben	Mean	2904,52	2629,81	2418,00	1349,92	1036,49	947,73	1171,42	1511,49	1444,90		
		CI Mean	[2261,38; 3547,65]	[786,23; 4473,40]	[1204,46; 3631,54]	[586,31; 2113,53]	[627,28; 1445,71]	[537,47; 1357,99]	[817,12; 1525,71]	[534,47; 2488,52]	[485,19; 2404,60]		
	SD	3155,85	3990,65	2552,83	1508,90	795,02	725,09	626,18	1653,28	1623,98			

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	41	41	40	39	38	37	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5					
	Leistungsausgaben	Mean	3314,33	3780,17	2961,67	1053,36	1361,13	1313,47	1254,83	1782,15				
		CI Mean	[2678,77; 3949,88]	[2222,88; 5337,46]	[1743,85; 4179,49]	[795,44; 1311,28]	[935,98; 1786,28]	[902,24; 1724,71]	[826,54; 1683,12]	[763,91; 2800,38]				
	SD	4580,06	5087,52	3929,68	805,84	1274,08	1196,12	1166,56	2674,34					
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38	38	36	36	36	36	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	34,0	32,5					
	Leistungsausgaben	Mean	3914,57	2521,20	3276,60	2203,09	1626,31	1134,10	1405,60					
		CI Mean	[2824,20; 5004,95]	[1441,31; 3601,09]	[1617,07; 4936,13]	[558,63; 3847,55]	[765,07; 2487,54]	[793,25; 1474,94]	[606,97; 2204,23]					
	SD	7285,37	3396,37	5150,26	4892,23	2562,16	1014,00	2322,90						
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	46	44	44	43							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	46,0	43,0	41,0	40,0	38,5							
	Leistungsausgaben	Mean	3935,33	2563,53	2451,09	2313,17	1805,38	1228,40						
		CI Mean	[2691,03; 5179,63]	[1433,55; 3693,52]	[1390,02; 3512,16]	[491,54; 4134,79]	[587,50; 3023,25]	[828,94; 1627,87]						
	SD	8092,74	3910,18	3549,95	5951,07	3929,85	1264,59							
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	27	27	27								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	27,0	25,0	24,0	23,0								
	Leistungsausgaben	Mean	4066,25	5773,80	2490,98	2232,25	1327,67							
		CI Mean	[1968,46; 6164,04]	[3291,88; 8255,72]	[656,21; 4325,74]	[0,00; 4568,24]	[309,68; 2345,66]							
	SD	9081,80	6579,81	4680,52	5838,75	2490,87								
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	24	23	22									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	23,5	22,5	21,0									
	Leistungsausgaben	Mean	6011,96	1888,05	3620,96	2347,07								
		CI Mean	[2476,01; 9547,90]	[905,27; 2870,84]	[864,03; 6377,89]	[142,11; 4552,03]								
	SD	11898,54	2430,74	6672,07	5155,30									

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0										
	Leistungsausgaben	Mean	7718,94	2244,26	3859,47										
		CI Mean	[3012,97; 12424,90]	[1303,84; 3184,68]	[1506,49; 6212,45]										
		SD	13368,21	2797,73	6684,11										
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0											
	Leistungsausgaben	Mean		4956,93											
		CI Mean		[2109,71; 7804,15]											
		SD		8954,82											

Tabelle 10.5 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Heilmittel**. Zu den Heilmitteln gehören verschiedene Formen der Therapie wie z.B. physikalische Therapie, Ergotherapie, Logopädie. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Aus-

wertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin 843,10 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [169,48; 1516,72].

Tabelle 10.5 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0
	Leistungsausgaben	Mean	646,83	158,75	153,73	322,35	404,91	163,18	51,48	361,05	450,32	642,53	843,10
		CI Mean	[433,46; 860,20]	[0,00; 333,43]	[2,15; 305,32]	[8,38; 636,32]	[81,35; 728,48]	[0,00; 330,42]	[0,00; 117,26]	[0,00; 745,53]	[61,03; 839,61]	[222,38; 1062,68]	[169,48; 1516,72]
SD		877,68	281,84	244,57	506,57	508,83	255,97	88,80	480,51	465,80	428,73	687,37	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0	
	Leistungsausgaben	Mean	214,65	59,57	25,39	124,69	97,96	42,27	191,63	136,64	156,85	126,58	
		CI Mean	[113,07; 316,23]	[26,36; 92,79]	[6,70; 44,08]	[29,08; 220,30]	[0,00; 212,89]	[0,00; 117,61]	[0,00; 428,08]	[0,00; 367,16]	[0,00; 395,66]	[47,74; 205,42]	
SD		466,44	58,71	33,03	168,99	203,13	127,50	361,93	352,83	365,53	106,43		

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		18	18	15	15	14	14	14	14		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0		
	Leistungsausgaben	Mean	158,45	52,33	64,02	74,69	25,66	55,84	32,27	137,63	197,84		
		CI Mean	[87,76; 229,13]	[19,62; 85,04]	[17,20; 110,83]	[15,21; 134,17]	[0,00; 57,92]	[0,00; 121,57]	[0,00; 73,59]	[0,00; 274,92]	[0,35; 413,13]		
		SD	346,84	70,80	98,47	117,54	62,67	116,18	73,04	232,32	364,31		
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		41	41	40	39	38	37	36			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5			
	Leistungsausgaben	Mean	461,14	103,16	151,33	95,12	206,69	333,39	345,50	323,22			
		CI Mean	[303,84; 618,43]	[24,22; 182,09]	[69,59; 233,08]	[38,24; 152,00]	[86,42; 326,96]	[87,07; 579,71]	[10,60; 680,39]	[34,62; 611,82]			
		SD	1133,55	257,88	263,77	177,73	360,42	716,45	912,16	757,99			
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38	38	36	36	36	36				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	32,5				
	Leistungsausgaben	Mean	341,73	81,82	31,68	186,59	212,17	250,36	186,49				
		CI Mean	[241,88; 441,58]	[46,26; 117,38]	[11,63; 51,72]	[62,00; 311,18]	[91,36; 332,99]	[105,63; 395,09]	[82,37; 290,62]				
		SD	667,18	111,84	62,21	370,65	359,41	430,56	302,85				
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	46	44	44	43					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		46,0	43,0	41,0	40,0	38,5					
	Leistungsausgaben	Mean	137,11	38,75	66,35	67,38	75,64	64,91					
		CI Mean	[102,48; 171,74]	[20,35; 57,14]	[31,93; 100,78]	[41,76; 93,00]	[32,97; 118,30]	[29,61; 100,22]					
		SD	225,24	63,65	115,17	83,70	137,67	111,77					
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	27	27	27						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		27,0	25,0	24,0	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	380,27	48,20	125,58	200,28	249,72						
		CI Mean	[253,75; 506,79]	[14,54; 81,85]	[51,23; 199,93]	[86,68; 313,88]	[114,19; 385,24]						
		SD	547,72	89,22	189,67	283,93	331,60						

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		24	23	22							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		23,5	22,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	310,06	50,13	118,09	194,62							
		CI Mean	[137,21; 482,91]	[0,00; 124,16]	[22,61; 213,57]	[47,13; 342,10]							
		SD	581,65	183,09	231,07	344,82							
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0								
	Leistungsausgaben	Mean	262,78	89,15	131,39								
		CI Mean	[110,01; 415,54]	[16,28; 162,03]	[55,01; 207,77]								
		SD	433,95	216,81	216,98								
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0									
	Leistungsausgaben	Mean		50,74									
		CI Mean		[12,74; 88,74]									
		SD		119,52									

Tabelle 10.6 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Hilfsmittel**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Leistungsausgaben stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Aus-

wertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der Hilfsmittel ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin 133,83 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [0,00; 396,13].

Tabelle 10.6 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0
	Leistungsausgaben	Mean	395,32	177,80	253,78	276,38	246,41	247,52	25,11	269,96	87,59	41,30	133,83
		CI Mean	[245,34; 545,30]	[62,35; 293,24]	[30,19; 477,38]	[0,00; 562,48]	[79,53; 413,29]	[14,55; 480,49]	[0,00; 56,88]	[11,60; 528,33]	[0,00; 199,19]	[0,00; 88,07]	[0,00; 396,13]
	SD	616,93	186,26	360,75	461,59	262,43	356,59	42,89	322,89	133,54	47,73	267,66	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0	
	Leistungsausgaben	Mean	129,75	48,49	83,73	20,69	70,74	68,10	169,75	22,51	41,01	43,49	
		CI Mean	[66,87; 192,63]	[0,00; 106,91]	[7,03; 160,44]	[1,81; 39,56]	[9,59; 131,90]	[0,00; 151,26]	[0,00; 387,11]	[0,00; 66,62]	[0,00; 88,27]	[11,91; 75,08]	
	SD	288,74	103,26	135,57	33,36	108,09	140,73	332,70	67,52	72,34	42,64		
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		18	18	15	15	14	14	14	14		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0		
	Leistungsausgaben	Mean	105,60	148,26	107,13	51,59	25,12	34,52	43,86	46,30	43,16		
		CI Mean	[66,28; 144,92]	[59,30; 237,21]	[29,50; 184,75]	[8,61; 94,57]	[0,00; 50,41]	[0,00; 76,83]	[7,96; 79,76]	[0,00; 96,93]	[0,54; 85,77]		
	SD	192,94	192,56	163,29	84,93	49,14	74,78	63,45	85,67	72,11			

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	41	41	40	39	38	37	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5					
	Leistungsausgaben	Mean	266,90	173,32	157,22	68,77	139,14	242,83	81,85	103,05				
		CI Mean	[172,94; 360,86]	[93,06; 253,57]	[0,00; 320,54]	[22,20; 115,34]	[67,31; 210,96]	[82,56; 403,10]	[22,08; 141,62]	[15,17; 190,93]				
		SD	677,12	262,19	527,00	145,50	215,24	466,17	162,80	230,80				
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38	38	36	36	36	36	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	32,5						
	Leistungsausgaben	Mean	153,67	120,08	79,37	80,32	98,72	65,30	59,48					
		CI Mean	[100,23; 207,11]	[64,59; 175,57]	[14,09; 144,64]	[10,68; 149,97]	[44,32; 153,11]	[0,34; 130,27]	[20,15; 98,80]					
		SD	357,09	174,52	202,59	207,20	161,82	193,27	114,38					
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	46	44	44	43							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	46,0	43,0	41,0	40,0	38,5							
	Leistungsausgaben	Mean	256,25	153,11	145,68	132,23	93,91	139,70						
		CI Mean	[168,20; 344,30]	[57,17; 249,04]	[59,50; 231,85]	[34,62; 229,84]	[15,49; 172,32]	[48,49; 230,92]						
		SD	572,69	331,97	288,30	318,88	253,04	288,76						
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	27	27	27								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	27,0	25,0	24,0	23,0								
	Leistungsausgaben	Mean	172,00	212,62	147,71	66,52	39,25							
		CI Mean	[102,83; 241,17]	[117,11; 308,12]	[69,30; 226,12]	[18,44; 114,61]	[6,12; 72,38]							
		SD	299,44	253,20	200,03	120,18	81,06							
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	24	23	22									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	23,5	22,5	21,0									
	Leistungsausgaben	Mean	281,04	213,82	155,68	124,28								
		CI Mean	[110,06; 452,03]	[118,84; 308,80]	[49,72; 261,65]	[0,00; 262,70]								
		SD	575,38	234,91	256,45	323,65								

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0									
	Leistungsausgaben	Mean	367,24	201,55	183,62									
		CI Mean	[6,01; 728,47]	[137,47; 265,63]	[3,00; 364,24]									
		SD	1026,15	190,63	513,08									
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0										
	Leistungsausgaben	Mean		309,12										
		CI Mean		[85,31; 532,93]										
		SD		703,91										

Tabelle 10.7 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für **Anschlussrehabilitation**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1),

jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin 0,00 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [0,00; 0,00].

Tabelle 10.7 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0	
	Leistungsausgaben	Mean	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CI Mean	[0,00; 90,97]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 328,48]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
		SD	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0		
	Leistungsausgaben	Mean	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,78	233,33	0,00	0,00		
		CI Mean	[0,00; 243,60]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 674,22]	[0,00; 690,67]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
		SD	648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,33	700,00	0,00	0,00		
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		18	18	15	15	14	14	14	14			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0			
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			
		SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	41	41	40	39	38	37	36				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5			
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
		SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38	38	36	36	36	36	36				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	32,5				
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			
		SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	46	44	44	43						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		46,0	43,0	41,0	40,0	38,5					
	Leistungsausgaben	Mean	77,59	0,00	2,42	0,00	51,25	107,79					
		CI Mean	[0,00; 163,43]	[0,00; 0,00]	[0,00; 7,17]	[0,00; 0,00]	[0,00; 151,70]	[0,00; 255,24]					
		SD	558,27	0,00	15,90	0,00	324,13	466,79					
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	27	27	27							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		27,0	25,0	24,0	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00						
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 220,36]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
		SD	0,00	386,82	0,00	0,00	0,00						
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	24	23	22								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		23,5	22,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	92,41	0,00	89,33	0,00							
		CI Mean	[0,00; 273,57]	[0,00; 0,00]	[0,00; 264,52]	[0,00; 0,00]							
		SD	609,59	0,00	423,96	0,00							
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	34	33									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0								
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00								
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]								
		SD	0,00	0,00	0,00								

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)		Anzahl	38										
	auswertbar und gewichtet		Anzahl	38,0										
	Leistungsausgaben		Mean	0,00										
			CI Mean	[0,00; 0,00]										
			SD	0,00										

Tabelle 10.8 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin für die **häusliche Krankenpflege**. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Auswertungen stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Aus-

wertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der Hilfsmittel ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patientin 0,00 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [0,00; 0,00].

Tabelle 10.8 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0	
	Leistungsausgaben	Mean	2,77	14,72	0,00	5,05	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CI Mean	[0,00; 6,60]	[0,00; 43,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 14,95]	[0,00; 12,30]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
		SD	15,77	46,56	0,00	15,97	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0		
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
		SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	18	18	15	15	14	14	14	14				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0				
	Leistungsausgaben	Mean	188,88	33,18	36,96	24,81	40,90	94,63	126,19	167,54	240,86			
		CI Mean	[35,20; 342,56]	[0,00; 93,08]	[0,00; 86,13]	[0,00; 73,43]	[0,00; 121,17]	[0,00; 245,42]	[0,00; 344,72]	[0,00; 495,93]	[0,00; 712,93]			
		SD	754,10	129,65	103,43	96,08	155,94	266,51	386,24	555,68	798,83			
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	41	41	40	39	38	37	36					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5					
	Leistungsausgaben	Mean	132,49	128,96	111,52	6,14	93,97	50,80	57,06	75,70				
		CI Mean	[36,96; 228,02]	[0,00; 343,85]	[0,00; 297,30]	[0,00; 14,59]	[0,00; 200,09]	[0,00; 137,28]	[0,00; 152,22]	[0,00; 182,09]				
		SD	688,42	702,03	599,49	26,38	318,01	251,54	259,20	279,42				
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	38	38	36	36	36	36						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	32,5						
	Leistungsausgaben	Mean	134,81	32,50	30,00	62,06	75,40	90,96	82,58					
		CI Mean	[15,17; 254,45]	[0,00; 68,91]	[0,00; 66,77]	[0,00; 183,70]	[0,00; 223,18]	[0,00; 268,48]	[0,00; 242,11]					
		SD	799,39	114,51	114,10	361,87	439,64	528,12	464,02					
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	46	46	44	44	43							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	46,0	43,0	41,0	40,0	38,5							
	Leistungsausgaben	Mean	156,12	0,83	29,82	86,64	112,76	86,76						
		CI Mean	[31,55; 280,69]	[0,00; 2,45]	[0,00; 87,35]	[0,00; 221,80]	[0,00; 267,35]	[0,00; 225,96]						
		SD	810,18	5,62	192,49	441,57	498,85	440,69						
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	27	27	27	27								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	27,0	25,0	24,0	23,0								
	Leistungsausgaben	Mean	9,00	23,52	12,96	0,00	0,00							
		CI Mean	[0,00; 26,64]	[0,00; 69,62]	[0,00; 38,36]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
		SD	76,37	122,21	64,80	0,00	0,00							

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		24	23	22							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		23,5	22,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	363,33	175,34	211,97	149,19							
		CI Mean	[27,31; 699,35]	[0,00; 410,49]	[0,00; 461,60]	[0,00; 377,54]							
		SD	1130,73	581,59	604,14	533,88							
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33								
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0								
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	85,62	0,00								
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 227,26]	[0,00; 0,00]								
		SD	0,00	421,39	0,00								
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38									
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0									
	Leistungsausgaben	Mean		10,05									
		CI Mean		[0,00; 24,73]									
		SD		46,16									

Tabelle 10.9 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben für **Krankengeld** (ohne Kinderkrankengeld) bei Patientinnen mit Krankengeldanspruch. Im Unterschied zu den mittleren Kosten in den anderen Leistungsbereichen und bei den Leistungsausgaben insgesamt werden also nicht alle teilnehmenden Patientinnen aus der Stichprobe berücksichtigt, sondern nur diejenigen Patientinnen mit dokumentiertem Krankengeldanspruch.

Der Krankengeldanspruch wurde dabei jeweils zum 1.1. eines Kalenderjahres erhoben, erstmalig im Jahr 2006. Fehlten die Angaben über den Krankengeldanspruch zum Jahresersten, wurden die Angaben vom Jahresersten des vorangegangenen Jahres übernommen. Die Auswertungen wurden unter der Annahme vorgenommen, dass ein zum 1.1. ermittelter Krankengeldanspruch im gesamten Vorjahr bestand. Bei Patientinnen, die zum 1.1. 2007 Anspruch auf Krankengeld hatten, wurde demnach ein Krankengeldanspruch für das Berichtshalbjahr 2006-1 angenommen. Bei Patientin-

nen, die zum 1.1.2006 Anspruch auf Krankengeld hatten, wurde – mangels Erhebung des Krankengeldanspruchs zum 1.1.2005 – angenommen, dass dieser Anspruch in den Berichtshalbjahren 2004-1 bis 2005-2 bestand usw.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren Patientinnen mit Krankengeldanspruch das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patientinnen dividiert.

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der 0 auswertbaren Patientinnen mit Krankengeldanspruch in der Stichprobe die durchschnittlichen Ausgaben für Krankengeld je Anspruchsberechtigtem Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich .

Tabelle 10.9 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)²²

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
	Leistungsausgaben	Mean	1973,51	2072,92	2795,02	3125,50	0,00	0,00			0,00	0,00	
		CI Mean	[0,00; 4425,60]	[2072,92; 2072,92]	[2795,02; 2795,02]	[3125,50; 3125,50]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
SD		3064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

²² berechnet unter der Annahme eines Krankengeldanspruchs wie im Begleittext beschrieben.

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10		
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		0	0	1	1	1	1	0	0	0		
	Leistungsausgaben	Mean	2923,12			3662,48	2183,76	0,00	0,00					
		CI Mean	[0,00; 6436,20]			[3662,48; 3662,48]	[2183,76; 2183,76]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
SD		3584,77			0,00	0,00	0,00	0,00						
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		18	18	15	15	14	14	14	14			
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		2	2	2	2	2	2	2	2			
	Leistungsausgaben	Mean	1454,39	1124,50	3146,15	1944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CI Mean	[135,72; 2773,05]	[0,00; 2840,24]	[2926,99; 3365,30]	[855,20; 3033,21]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
SD		2517,35	1237,97	158,13	785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		41	41	40	39	38	37	36				
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		6	6	4	3	4	4	3				
	Leistungsausgaben	Mean	2722,92	1846,29	3680,64	2189,03	424,85	0,00	0,00	186,85				
		CI Mean	[954,28; 4491,55]	[334,41; 3358,16]	[1661,12; 5700,15]	[0,00; 4917,23]	[0,00; 960,82]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 553,09]			
SD		4420,66	1889,45	2523,87	2783,88	473,64	0,00	0,00	323,64					
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38	38	36	36	36	36					
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		4	2	2	2	2	2					
	Leistungsausgaben	Mean	538,15	4017,37	1345,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CI Mean	[0,00; 1258,57]	[2636,13; 5398,61]	[819,99; 1870,76]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
SD		1162,33	1409,43	379,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	46	44	44	43						
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		4	4	3	3	2						
	Leistungsausgaben	Mean	4989,47	1890,17	4941,43	3390,36	0,00	0,00						
		CI Mean	[1360,80; 8618,13]	[582,30; 3198,03]	[1459,71; 8423,14]	[17,14; 6763,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
SD		6413,29	1334,55	3552,77	2980,92	0,00	0,00							

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und ihre zugehörigen Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	27	27	27						
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		3	3	3	2						
	Leistungsausgaben	Mean	4324,96	4297,95	3472,27	2294,34	0,00						
		CI Mean	[733,15; 7916,76]	[2002,80; 6593,10]	[0,00; 6970,75]	[0,00; 5217,74]	[0,00; 0,00]						
	SD	5183,24	2028,22	3091,61	2583,41	0,00							
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		24	23	22							
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		7	7	6							
	Leistungsausgaben	Mean	9961,09	1415,06	6083,42	3693,86							
		CI Mean	[6003,83; 13918,34]	[398,04; 2432,08]	[3973,98; 8192,85]	[263,70; 7124,01]							
	SD	7279,64	1372,85	2847,47	4286,80								
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33								
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		7	8								
	Leistungsausgaben	Mean	10574,94	2415,22	5287,47								
		CI Mean	[5935,05; 15214,84]	[1356,44; 3474,00]	[2967,52; 7607,42]								
	SD	6695,72	1429,22	3347,86									
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38									
	auswertbar mit Krankengeldanspruch *	Anzahl		9									
	Leistungsausgaben	Mean		3681,13									
		CI Mean		[2189,09; 5173,17]									
	SD		2283,73										

Tabelle 10.10 gibt Auskunft über die durchschnittlichen **Gesamtausgaben** je Patientin für alle bislang einzeln ausgewiesenen Leistungsbereiche, wobei Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006 berücksichtigt werden. Patientinnen, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Das arithmetische Mittel der Gesamtausgaben in Tabelle 10.10 entspricht nicht der Summe der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbe- reichen, die in den vorangegangenen Tabellen ausgewiesen wurden. Das liegt daran, dass die Durchschnittsausgaben teils für unterschiedliche Personengruppen zu ermit- teln waren. In der Regel wurden die Durchschnittsausgaben für alle auswertbaren und gewichteten Patientinnen der Stichprobe berechnet. Davon abweichend waren in Tabelle 10.9 die durchschnittlichen Krankengeldausgaben nicht für die gesamte Stich- probe zu ermitteln, sondern nur für die Patientinnen mit Krankengeldanspruch laut Stichtagsregelung wie im Begleittext beschrieben. Desweiteren fließen in Tabelle 10.10 auch die durchschnittlichen Dialyse-Sachkosten pro Auswertungshalbjahr ein, welche ansonsten nicht gesondert im Berichtsteil II dargestellt werden.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patientinnen das arithme- tische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Diese Angaben beziehen sich – wie bei der Darstellung der einzelnen Leistungsbereiche – auf die Ausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr bzw. im Durchschnitt der Patientin-

nenjahre. Bei der Interpretation der Gesamtausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr ist zu beachten, dass die Ausgaben für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006-1 enthalten sind.

Zusätzlich wird in dieser Tabelle das arithmetische Mittel der kumulierten Leistungs- ausgaben im Zeitverlauf dargestellt. In diese Durchschnittsbildung wurden alle Patien- tinnen einbezogen, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmerinnen waren („Restkohorte“). Da im Berichtshalbjahr – nicht aber in den davor liegenden Halbjahren – die Gewichtungsregeln für verstorbene oder aus anderem Grund ausgeschiedene Kohortenmitglieder zu beachten sind, sind nicht einfach die Leistungsausgaben der Restkohorte bis zum aktuellen Berichtshalbjahr aufzusummieren und durch die Anzahl der Kohortenmitglieder zu teilen. Stattdessen sind Durchschnittswerte für alle betrach- teten Halbjahre zu bilden und aufzusummieren. Umfasst beispielsweise eine Kohorte im Berichtshalbjahr 8.000 Patientinnen ungewichtet und 7.500 Patientinnen gewichtet und soll das kumulierte arithmetische Mittel für das dritte Halbjahr berechnet werden, ist folgendermaßen vorzugehen: Das arithmetische Mittel des ersten und zweiten Halbjahres wird jeweils gebildet, indem die jeweilige Summe der Leistungsausgaben der 8.000 Kohortenmitglieder durch ihre ungewichtete Anzahl dividiert wird. Das arith- metische Mittel des dritten Halbjahres – des Berichtshalbjahres – wird gebildet, indem die Summe der Leistungsausgaben der Kohortenmitglieder durch ihre gewichtete Anzahl geteilt wird, also durch 7.500. In der Tabelle wird dann als kumulierter Wert die Summe dieser drei Teilwerte ausgewiesen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die

In der Kohorte 2006-2 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 4,0 Patientinnen (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je

Patientin 2053,50 Euro. Die bis einschließlich des letzten Berichtshalbjahres kumulierten Ausgaben lagen durchschnittlich bei 47582,21 Euro.

Tabelle 10.10 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2006-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar und gewichtet	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Leistungsausgaben	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2006-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		10	10	10	10	9	9	9	9	8	8
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	7,0	6,0	5,5	4,0	4,0
	Leistungsausgaben	Mean	7286,33	9208,54	4855,92	2673,58	4152,51	5735,24	3002,67	2516,39	2885,71	2560,54	2053,50
		CI Mean	[5256,20; 9316,46]	[3809,03; 14608,05]	[1861,31; 7850,54]	[1389,96; 3957,20]	[1838,46; 6466,55]	[238,51; 11231,97]	[735,93; 5269,41]	[1224,65; 3808,12]	[1437,60; 4333,82]	[1057,46; 4063,63]	[986,12; 3120,88]
		SD	8350,73	8711,61	4831,53	2071,00	3638,96	8413,36	3059,81	1614,33	1732,71	1533,76	1089,17
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>9208,54</i>	<i>14064,47</i>	<i>16738,04</i>	<i>20890,55</i>	<i>25499,83</i>	<i>30835,30</i>	<i>36756,61</i>	<i>39642,32</i>	<i>45528,71</i>	<i>47582,21</i>	
2007-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		12	12	12	12	11	11	11	11	10	
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	9,0	9,0	9,0	7,0	
	Leistungsausgaben	Mean	5461,31	8564,65	5463,42	2402,80	1995,19	1683,86	3406,71	2690,59	2012,12	1619,86	
		CI Mean	[4152,89; 6769,74]	[6067,74; 11061,57]	[2462,07; 8464,76]	[1379,51; 3426,08]	[1273,60; 2716,77]	[1164,55; 2203,18]	[1046,37; 5767,06]	[329,60; 5051,59]	[1188,74; 2835,49]	[1154,92; 2084,80]	
		SD	6008,07	4413,04	5304,57	1808,55	1275,33	878,77	3612,78	3613,77	1260,27	627,61	
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>8564,65</i>	<i>14028,07</i>	<i>16430,87</i>	<i>18426,05</i>	<i>19773,97</i>	<i>24428,69</i>	<i>27119,28</i>	<i>29131,40</i>	<i>29021,74</i>		
2007-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		18	18	15	15	14	14	14	14		
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		18,0	17,0	15,0	14,5	12,0	12,0	11,0	11,0		
	Leistungsausgaben	Mean	7020,00	9685,63	6312,10	3046,16	1829,48	2465,15	4069,61	3278,37	2788,20		
		CI Mean	[5522,73; 8517,27]	[6849,60; 12521,66]	[3347,37; 9276,84]	[1431,02; 4661,30]	[1190,74; 2468,21]	[1532,97; 3397,34]	[2278,93; 5860,29]	[1929,19; 4627,54]	[1126,28; 4450,13]		
		SD	7347,07	6138,91	6236,69	3191,54	1240,94	1647,54	3164,85	3227,56	2283,02	2812,24	
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>9685,63</i>	<i>15997,73</i>	<i>17962,67</i>	<i>19792,15</i>	<i>24289,45</i>	<i>28359,06</i>	<i>32279,56</i>	<i>35067,76</i>			

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr
2008-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		41	41	40	39	38	37	36			
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		41,0	40,0	37,5	34,5	32,5	28,5	26,5			
	Leistungsausgaben	Mean	9105,84	10302,61	7469,12	5111,50	3584,04	3378,71	2830,65	3914,36			
		CI Mean	[7470,92; 10740,76]	[8263,47; 12341,75]	[5351,73; 9586,52]	[2221,61; 8001,38]	[2480,20; 4687,88]	[2316,25; 4441,17]	[1909,77; 3751,54]	[1901,79; 5926,92]			
		SD	11781,78	6661,67	6832,45	9029,01	3307,95	3090,28	2508,27	5285,87			
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>10302,61</i>	<i>17769,81</i>	<i>22301,96</i>	<i>26136,58</i>	<i>27368,24</i>	<i>29196,27</i>	<i>33273,73</i>				
2008-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38	38	36	36	36	36				
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0	37,0	34,0	34,0	34,0	32,5				
	Leistungsausgaben	Mean	9390,76	12220,68	7689,21	4587,43	3709,69	2976,43	4229,42				
		CI Mean	[7585,43; 11196,08]	[10191,69; 14249,67]	[5294,97; 10083,46]	[2378,23; 6796,63]	[2330,27; 5089,11]	[1629,18; 4323,67]	[2050,30; 6408,53]				
		SD	12062,34	6381,40	7430,43	6572,31	4103,75	4008,02	6338,20				
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>12220,68</i>	<i>19909,89</i>	<i>23000,03</i>	<i>26709,72</i>	<i>29686,15</i>	<i>34298,86</i>					
2009-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		46	46	44	44	43					
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		46,0	43,0	41,0	40,0	38,5					
	Leistungsausgaben	Mean	8153,31	9968,93	5333,62	4102,40	3873,51	2856,41					
		CI Mean	[6508,68; 9797,93]	[8231,00; 11706,86]	[3633,92; 7033,33]	[2061,45; 6143,35]	[2209,93; 5537,09]	[2057,58; 3655,24]					
		SD	10696,40	6013,89	5686,59	6667,58	5368,06	2528,89					
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>9968,93</i>	<i>15324,89</i>	<i>19040,30</i>	<i>23098,26</i>	<i>26004,52</i>						
2009-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		27	27	27	27						
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		27,0	25,0	24,0	23,0						
	Leistungsausgaben	Mean	8585,43	13896,51	6583,18	3810,13	2306,66						
		CI Mean	[6057,96; 11112,91]	[11083,06; 16709,96]	[4175,61; 8990,75]	[1455,61; 6164,64]	[1087,40; 3525,91]						
		SD	10942,01	7458,72	6141,77	5885,05	2983,33						
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>13896,51</i>	<i>20714,09</i>	<i>24332,49</i>	<i>26760,06</i>							
2010-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		24	23	22							
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		23,5	22,5	21,0							
	Leistungsausgaben	Mean	17750,14	10647,24	10719,39	6899,01							
		CI Mean	[11685,52 ; 23814,75]	[8441,08; 12853,41]	[5852,07; 15586,70]	[3449,02; 10349,00]							
		SD	20407,58	5456,51	11779,44	8066,24							
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>10647,24</i>	<i>20820,30</i>	<i>28186,55</i>								

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche (inklusive Dialyse-Sachkosten) - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	
2010-2	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		34	33										
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		34,0	31,0										
	Leistungsausgaben	Mean	18647,99	11479,88	9324,00										
		CI Mean	[11341,51 ; 25954,48]	[8907,52; 14052,23]	[5670,75; 12977,24]										
		SD	20755,50	7652,70	10377,75										
	<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>11479,88</i>	<i>19992,15</i>										
2011-1	Patientinnen insgesamt (Stichprobe)	Anzahl		38											
	auswertbar und gewichtet	Anzahl		38,0											
	Leistungsausgaben	Mean		13581,98											
		CI Mean		[9788,27; 17375,68]											
		SD		11931,62											
	<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>13581,98</i>											

Auswertungskapitel 11: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung

In den folgenden Tabelle 11.1 werden die Kosten für Qualitätssicherung und Verwaltung des DMP-Programms pro eingeschriebener Patientin und Kalenderjahr ausgewiesen; eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Zu beachten ist dabei, dass alle eingeschriebenen Patientinnen in die Berechnung eingehen; im Gegensatz zu den bisherigen Auswertungen im ökonomischen Berichtsteil wird also nicht auf eine

Stichprobe zurückgegriffen. Da die Durchschnittskosten auch von der Anzahl der Programmteilnehmer abhängen, werden zur Information zudem die Versichertenjahre im Programm ausgewiesen.

Tabelle 11.1 Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmerin und Jahr und Versichertenjahre²³

EZ	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Verwaltungskosten in Euro	52,72	45,91	39,55	29,79	26,37	25,45
Qualitätssicherungskosten in Euro	31,87	29,87	25,95	26,24	24,58	23,72
Gesamtkosten in Euro	84,59	75,78	65,50	56,03	50,95	49,17
<i>zur Information: Versichertenjahre im Programm</i>	<i>83,0</i>	<i>547,2</i>	<i>759,0</i>	<i>890,0</i>	<i>979,0</i>	<i>979,0</i>

²³ Die Kosten der Qualitätssicherung und Verwaltung ergeben sich aus den gemäß den Vorgaben des BVA gebuchten Aufwendungen und deren Verhältnis zu Versicherten in Jahren. Sollten in vorangegangenen Berichten Beträge enthalten sein, die vor Abschluss des Haushaltsjahres ermittelt wurden, oder Zahlen zu den Versichertenjahren verwendet worden seien, die vor Erstellung der amtlichen Statistiken ermittelt wurden, so können diese Zahlen u.U. von den Zahlen des aktuellen Berichtes abweichen, da sie im Nachhinein nochmals aktualisiert wurden. Zu beachten ist zudem, dass fusionsbedingt die Angaben von Versicherten der (ehemaligen) See-Krankenkasse ab 2008 nicht mehr in den AOK-, sondern in den Knappschaftsberichten berücksichtigt werden.

Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität

Ein Bestandteil der Evaluation ist die Analyse, wie sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patientinnen im Laufe der Teilnahme an Disease-Management-Programmen verändert. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen. Es handelt sich um ein standardisiertes Instrument, das von Patienten selbst ausgefüllt werden kann und auf seine metrischen Eigenschaften hin mit guten Ergebnissen geprüft wurde. Der SF-36 entstand im Rahmen der Medical Outcome Study (MOS) und ist die Kurzform einer 149 Items umfassenden Fragebatterie zur Funktionsfähigkeit und Lebensqualität. Der Fragebogen umfasst insgesamt 36 Items. Erfasst werden damit 8 Dimensionen der Gesundheit mit jeweils 2-10 Items sowie die Gesundheitsveränderungen in den vergangenen 12 Monaten mittels einer Frage. Die Skalen beinhalten folgende Dimensionen des Gesundheitszustandes:

- Körperliche Funktionsfähigkeit,
- Körperliche Rollenfunktion,
- Körperliche Schmerzen,
- Allgemeine Gesundheitswahrnehmung,
- Vitalität,
- Soziale Funktionsfähigkeit,
- Emotionale Rollenfunktion,
- Psychisches Wohlbefinden.

Die Bearbeitungszeit des SF-36 wird von den Entwicklern auf 8-15 Min. geschätzt. Der Fragebogen kann in zwei verschiedenen Versionen eingesetzt werden. Eine davon bezieht die Fragen rückblickend auf eine Woche, die andere im Rahmen der Evaluation der strukturierten Behandlungsprogramme eingesetzte Version hat ein Zeitfenster von 4 zurückliegenden Wochen (vgl. Bullinger/ Kirchberger 1998).²⁴

Die Veränderungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität werden mittels des SF 36 schriftlich erhoben. Der Versand der Fragebögen erfolgt durch die jeweils zuständige Krankenkasse. Dem Fragebogen ist ein standardisiertes Anschreiben, das zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und dem BVA abgestimmt wurde, beigelegt.

Analog zu den ökonomischen Auswertungen basieren auch die Auswertungen zum SF-36 nicht auf den Daten aller Patientinnen, sondern auf einer **Stichprobe**.

Entsprechend beträgt der Stichprobenumfang in der Regel zehn Prozent der Patientenzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patientinnen.²⁵ Bei Kohorten mit weniger als 100 Patientinnen werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patientinnen umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.²⁶

Ab Frühjahr 2012 (Kohorte 2011-1) werden für die ökonomischen Auswertungen dieselben Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 befragt, für welche auch die SF36-Lebensqualitätsbefragung durchgeführt wird. Davor wurde die SF36-Stichprobe unabhängig von der Stichprobe für die ökonomischen Auswertungen gezogen.

Zu beachten ist dabei, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis, die sich ggf. auch durch die endgültige Datenaufbereitung ergeben, können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patientinnen im Berichtsteile I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

Im aktuellen Bericht können die Stichproben zur Kohorte 2009-1 zudem kleiner ausfallen als im Bericht aus September 2009. Die erstmalig von der AOK Sachsen-Anhalt gelieferten PM-Daten für die Kohorte 2009-1 enthielten Datensätze für ehemalige BKK-Versicherte mit dem künstlichen Eintrittsdatum 01.04.2009. Davon wurden einige Fälle in die OD-bzw. SF36-Stichproben gezogen. Diese PM-Lieferung wurde durch

²⁴ Bullinger M., Kirchberger I: SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand, Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie 1998.

²⁵ Zu den fusionsbedingten Besonderheiten siehe Einleitung zu Berichtsteil II „Evaluation der ökonomischen Inhalte“.

²⁶ Fusionsbedingt können die Stichproben in den AOK-Berichten kleiner und in den Knappschafts-Berichten größer ausfallen als gemäß obiger Beschreibung zu erwarten wäre. Sofern die Stichprobe Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse enthielt, mussten diese mit der evaluationsseitigen Umsetzung der Fusion von Knappschaft und ehemaliger See-Krankenkasse aus den Auswertungen der AOK-Berichte ausgeschlossen und in die Auswertungen der Knappschaftsberichte aufgenommen werden.

eine Korrekturlieferung ersetzt, in welcher alle ehemaligen BKK-Versicherte mit dem historisch korrekten Eintrittsdatum enthalten waren. Dieses wich größtenteils vom künstlichen Eintrittsdatum ab, so dass z.T. deutlich weniger Patienten der Kohorte 2009-1 zuzuordnen waren. Daher haben Fälle aus der PM-Erstlieferung, die in die

Stichproben gezogen wurden, im aktuellen Bericht keinen passenden PM-Datensatz in Kohorte 2009-1. Die dadurch nötige Bereinigung der Stichprobe führt zur angesprochenen Verringerung der Anzahl der Stichprobenmitglieder.

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wird ab der Eintrittskohorte 2006-2 erhoben. Für frühere Kohorten entfällt die Befragung zur Lebensqualität. Die Erstbefragung findet nach dem Beitrittsjahr statt; Wiederholungsbefragungen erfolgen in zweijährigen Abständen. Der vorliegende Bericht enthält somit Auswertungen zum SF-36 für die Erst-, Zweit- und Drittbefragung der Kohorten 2006-2 und 2007-1, für die Erst- und Zweitbefragungen der Kohorten 2007-2 bis 2009-1 sowie für die Erstbefragung der Kohorten 2009-2 bis 2011-1.

Um die gesundheitsbezogene Lebensqualität auszuwerten und darzustellen, werden die Items des Fragebogens nach einem standardisierten Algorithmus zu Skalenwerten verdichtet, die verschiedene Dimensionen des allgemeinen Gesundheitszustandes abbilden. Durch eine Transformation der Skalenrohwerte können alle Skalen Werte zwischen „0“ und „100“ annehmen. Der Wert „100“ stellt dabei den Bestwert dar, d.h. je höher der Wert auf einer Skala für eine Patientin ausfällt, desto besser ist ihr Gesundheitszustand in dieser Dimension. Neben den acht Subskalen des SF-36 können durch die Gewichtung von Items zwei übergeordnete Dimensionen, d.h. eine körperliche Summenskala und eine psychische Summenskala berechnet werden, in die jeweils mehrere Skalenwerte eingehen. Diese können ebenfalls Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) annehmen.


Die Ergebnisse zur Lebensqualität beinhalten eine differenzierte Darstellung der Zahl der versendeten Fragebögen und des Rücklaufes je Kohorte und Erhebungszeitpunkt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in den durch den SF-36 erfassten Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie des Items „Veränderung der Gesundheit“ je Kohorte im Zeitverlauf aufgezeigt.

Die Lebensqualität und ihre Veränderung im Zeitverlauf werden zudem anhand eines Indexwertes, dem SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) evaluiert. Der SF-6D ist ein krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität in Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand) bis 1 (bestmöglicher Gesundheitszustand). Der SF-6D kann aus Erhebungsdaten des SF-36 anhand von 11 dazu benötigten Items mit jeweils zwei bis sechs Antwortabstufungen extrahiert werden. Der SF-6D umfasst insgesamt sechs Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität: Körperliche Funktionsfähigkeit, Rollenfunktion, Soziale Funktionsfähigkeit, Schmerz, Psychisches Wohlbefinden, Vitalität. In der folgenden Übersicht findet sich eine Gegenüberstellung der Items, welche in die Sub- bzw. Summenskalen und den SF-6D-Gesamtindex eingehen. Dabei wird deutlich, dass nur eine geringe Anzahl von Items sowohl bei der Bildung der Summenskalen als auch bei der Bildung des SF-6D- Gesamtindex berücksichtigt werden. Daher gilt, dass der Indexwert des SF-6D-Gesamtindex (siehe Tab.8.12) nicht die Summe der Indexwerte der körperlichen Summenskala (siehe Tab. 8.10) und der Psychischen Summenskala (siehe Tab. 8.11) darstellt.²⁷

Der SF-6D wurde mit der Zielsetzung entwickelt, einen patientennahen Ergebnisindikator wie die gesundheitsbezogene Lebensqualität in gesundheitsökonomischen Studien zur Effizienz- und Effektivitätsbeurteilung z.B. den Kosten einer Behandlungsmaßnahme entgegen zu setzen. Dazu ist es notwendig, die Lebensqualität, die physische, psychische und soziale Aspekte von Gesundheit umfasst, zu einem einzigen Indexwert zu aggregieren.

²⁷ Bullinger M., Kirchberger I: SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand, Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie 1998; S. 60

Abb. III.1 Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex



Auswertungskapitel 12: Rücklaufstatistik

Tabelle 12.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patientinnen für die Auswertungen zur Lebensqualität zur Verfügung standen.

Zur Berechnung der Durchschnittswerte für die Indikatoren der Lebensqualität ist jedoch nicht die Zahl der Patientinnen zu Beginn des Berichtshalbjahres relevant, sondern die Zahl der Patientinnen, für die in der jeweiligen Befragung die erforderlichen Angaben vorliegen. Daher werden in den folgenden Tabellen differenziertere Angaben gemacht. In der ersten Zeile wird ausgewiesen, wie viele Patientinnen die Stichprobe für die Befragung insgesamt umfasste (Brutto-Stichprobe). Anschließend wird dargestellt, wie groß der Stichprobenumfang nach Bereinigung um „neutrale Ausfälle“ war, also um Patientinnen, welche an der Befragung nicht mehr teilnehmen konnten, weil sie nach der Stichprobenziehung aus dem Programm ausgeschieden, verstorben, unbekannt verzogen oder nicht mehr Mitglied der Krankenkasse waren, die das evaluierte DMP anbietet (Netto-Stichprobe). Anschließend wird dargestellt, wie viele Patientinnen

den Fragebogen insgesamt zurückgesendet haben,²⁸ wie viele Patientinnen den Fragebogen *vollständig* ausgefüllt haben und welchem Anteil an der Brutto- bzw. Netto-Stichprobe dies jeweils entspricht.

Da die Befragung zur Lebensqualität erst ab der Kohorte 2006-2 durchgeführt wird, können für vorherige Kohorten keine Auswertungen erfolgen. Da die Befragung alle zwei Jahre erfolgt, kann im vorliegenden Bericht zudem nur die Erstbefragung nach dem Beitrittsjahr ausgewiesen werden.

In der Kohorte 2007-1 umfasst die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 34 Patientinnen. Nach Bereinigung um neutrale Ausfälle umfasste die Netto-Stichprobe 34 Patientinnen. 26 von ihnen schickten den Fragebogen zurück. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 76,47 Prozent der Netto-Stichprobe. Bei der ersten Wiederholungsbefragung der Patientinnen dieser Kohorte 2007-1 lag die Rücklaufquote bei 70,37 Prozent.

Tabelle 12.1 Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe (Anzahl)

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe	Befragung nach Beitrittsjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	28	23	18
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	28	22	17
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	21	17	13
		Anteil an Brutto-SP in %	75,00	73,91	72,22
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anteil an Netto-SP in %	75,00	77,27	76,47
		Anzahl	16	17	13
		Anteil an Brutto-SP in %	57,14	73,91	72,22
	Patientinnen in Auswertungsgruppe 1	Anteil an Netto-SP in %	57,14	77,27	76,47
		Anzahl	31	25	23

²⁸ Die an dieser Stelle ausgewiesene Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen kann - insbesondere in den von der Fusion betroffenen Halbjahren bis 2008-1 - von der entsprechenden Anzahl in den spezifischen Tabellen 13.1 bis 13.12 leicht abweichen. Auf die Anzahl der auswertbaren Fragebögen und damit auf die Auswertungsergebnisse zur Lebensqualität hat dies keinen Einfluss.

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe		Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	34	30	22
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	34	27	18
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	26	19	14
		Anteil an Brutto-SP in %	76,47	63,33	63,64
		Anteil an Netto-SP in %	76,47	70,37	77,78
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	23	17	10
		Anteil an Brutto-SP in %	67,65	56,67	45,45
		Anteil an Netto-SP in %	67,65	62,96	55,56
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>	
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	53	44	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	50	44	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	35	29	
		Anteil an Brutto-SP in %	66,04	65,91	
		Anteil an Netto-SP in %	70,00	65,91	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	32	23	
		Anteil an Brutto-SP in %	60,38	52,27	
		Anteil an Netto-SP in %	64,00	52,27	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	48	44	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	48	44	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	35	32	
		Anteil an Brutto-SP in %	72,92	72,73	
		Anteil an Netto-SP in %	72,92	72,73	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	31	28	
		Anteil an Brutto-SP in %	64,58	63,64	
		Anteil an Netto-SP in %	64,58	63,64	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>		
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	64	58	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	63	52	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	49	37	
		Anteil an Brutto-SP in %	76,56	63,79	
		Anteil an Netto-SP in %	77,78	71,15	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	47	30	
		Anteil an Brutto-SP in %	73,44	51,72	
		Anteil an Netto-SP in %	74,60	57,69	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>		

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe		Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	48	42	
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	48	41	
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	35	30	
		Anteil an Brutto-SP in %	72,92	71,43	
		Anteil an Netto-SP in %	72,92	73,17	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	32	28	
		Anteil an Brutto-SP in %	66,67	66,67	
		Anteil an Netto-SP in %	66,67	68,29	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>		
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	59		
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	59		
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	45		
		Anteil an Brutto-SP in %	76,27		
		Anteil an Netto-SP in %	76,27		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	38		
		Anteil an Brutto-SP in %	64,41		
		Anteil an Netto-SP in %	64,41		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>			
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	39		
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	37		
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	26		
		Anteil an Brutto-SP in %	66,67		
		Anteil an Netto-SP in %	70,27		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	24		
		Anteil an Brutto-SP in %	61,54		
		Anteil an Netto-SP in %	64,86		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>			
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	34		
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	31		
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	24		
		Anteil an Brutto-SP in %	70,59		
		Anteil an Netto-SP in %	77,42		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	22		
		Anteil an Brutto-SP in %	64,71		
		Anteil an Netto-SP in %	70,97		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>			

EZ	Patientinnen aus Auswertungsgruppe 1 in der Stichprobe		Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	39		
	Stichprobenmitglieder (netto)	Anzahl	37		
	zurückgesandte Fragebögen	Anzahl	30		
		Anteil an Brutto-SP in %	76,92		
		Anteil an Netto-SP in %	81,08		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	25		
		Anteil an Brutto-SP in %	64,10		
		Anteil an Netto-SP in %	67,57		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>			

Auswertungskapitel 13: Auswertungen zur Lebensqualität

Tabelle 13.1 gibt Auskunft über den **Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr**. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen die vergleichende Frage zum Gesundheitszustand im vergangenen Jahr beantwortet haben. Anschließend wird für diese Personengruppe ausgewiesen, wie sich die Antworten auf einer Skala von 1 „viel besser“ bis 5 „viel schlechter“ verteilen.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halb-jahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 24 Patientinnen hatten die Frage zum Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr beantwortet. 1 von ihnen ging es zum Zeitpunkt der Befragung im Vergleich zum vergangenen Jahr viel besser, 4 Patientinnen ging es etwas besser.

Bei der ersten Wiederholungsbefragung der Kohorte 2007-1 sendeten 19 Patientinnen den Fragebogen zurück. Die Fragen zum Gesundheitszustand im Vergleich zum Vor-jahr hatten 18 von ihnen beantwortet. Viel besser als im Vergleich zum Vorjahr ging es 1 Patientinnen, etwas besser ging es 2 Patientinnen.

Tabelle 13.1 Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	19	17	13
		Anteil in %	90,48	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	67,86	73,91	72,22
	(1) viel besser	Anzahl	1	0	0
	(2) etwas besser	Anzahl	2	3	0
	(3) etwa gleich	Anzahl	5	9	8
	(4) etwas schlechter	Anzahl	9	4	3
	(5) viel schlechter	Anzahl	2	1	2
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>	

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	24	18	12
		Anteil in %	92,31	94,74	85,71
		Anteil 2 in %	70,59	60,00	54,55
	(1) viel besser	Anzahl	1	1	1
	(2) etwas besser	Anzahl	4	2	0
	(3) etwa gleich	Anzahl	7	10	3
	(4) etwas schlechter	Anzahl	7	4	6
	(5) viel schlechter	Anzahl	5	1	2
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>	
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	53	44	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	29	
		Anteil in %	66,04	65,91	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	35	28	
		Anteil in %	100,00	96,55	
		Anteil 2 in %	66,04	63,64	
	(1) viel besser	Anzahl	2	1	
	(2) etwas besser	Anzahl	5	4	
	(3) etwa gleich	Anzahl	9	15	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	13	8	
	(5) viel schlechter	Anzahl	6	0	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	44	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	32	
		Anteil in %	72,92	72,73	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	32	29	
		Anteil in %	91,43	90,63	
		Anteil 2 in %	66,67	65,91	
	(1) viel besser	Anzahl	1	0	
	(2) etwas besser	Anzahl	1	3	
	(3) etwa gleich	Anzahl	13	20	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	11	4	
	(5) viel schlechter	Anzahl	6	2	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>		

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	64	58	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	49	37	
		Anteil in %	76,56	63,79	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	48	36	
		Anteil in %	97,96	97,30	
		Anteil 2 in %	75,00	62,07	
	(1) viel besser	Anzahl	2	2	
	(2) etwas besser	Anzahl	9	3	
	(3) etwa gleich	Anzahl	12	17	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	16	11	
	(5) viel schlechter	Anzahl	9	3	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>		
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	42	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	30	
		Anteil in %	72,92	71,43	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	34	29	
		Anteil in %	97,14	96,67	
		Anteil 2 in %	70,83	69,05	
	(1) viel besser	Anzahl	1	1	
	(2) etwas besser	Anzahl	2	1	
	(3) etwa gleich	Anzahl	13	20	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	13	6	
	(5) viel schlechter	Anzahl	5	1	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>		
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	59		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	45		
		Anteil in %	76,27		
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	44		
		Anteil in %	97,78		
		Anteil 2 in %	74,58		
	(1) viel besser	Anzahl	2		
	(2) etwas besser	Anzahl	7		
	(3) etwa gleich	Anzahl	14		
	(4) etwas schlechter	Anzahl	16		
	(5) viel schlechter	Anzahl	5		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>			

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	
		Anteil in %	66,67	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	26	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	66,67	
	(1) viel besser	Anzahl	2	
	(2) etwas besser	Anzahl	3	
	(3) etwa gleich	Anzahl	7	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	13	
	(5) viel schlechter	Anzahl	1	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	24	
		Anteil in %	70,59	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	24	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	70,59	
	(1) viel besser	Anzahl	2	
	(2) etwas besser	Anzahl	4	
	(3) etwa gleich	Anzahl	4	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	11	
	(5) viel schlechter	Anzahl	3	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	30	
		Anteil in %	76,92	
	mit Angaben zum Gesundheits- zustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	28	
		Anteil in %	93,33	
		Anteil 2 in %	71,79	
	(1) viel besser	Anzahl	1	
	(2) etwas besser	Anzahl	4	
	(3) etwa gleich	Anzahl	11	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	9	
	(5) viel schlechter	Anzahl	3	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

Tabelle 13.2 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 26 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Körperliche Funktionsfähigkeit" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 50,58.

19 Patientinnen sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 100,00 Prozent die Fragen zur körperlichen Funktionsfähigkeit beantwortet, so dass sie für die Skala auswertbar waren. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 50,99.

Tabelle 13.2 SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	20	17	13
		Anteil in %	95,24	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	71,43	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,45	45,29	36,67
		SD	27,73	28,91	27,18
		CI	[30,30; 54,61]	[31,55; 59,04]	[21,89; 51,44]
		Range: Min.	0,00	0,00	5,00
		Range: Max.	100,00	95,00	95,00
		z-Wert	-1,84	-1,71	-2,09
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	100,00	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	76,47	63,33	63,64
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,58	50,99	29,13
		SD	29,77	31,91	25,26
		CI	[39,13; 62,02]	[36,64; 65,34]	[15,90; 42,36]
		Range: Min.	0,00	5,00	0,00
		Range: Max.	100,00	95,00	80,00
		z-Wert	-1,48	-1,46	-2,42
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	29	
		Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar		Anzahl	35	29	
		Anteil in %	100,00	100,00	
		Anteil 2 in %	66,04	65,91	
transformierte Skalenwerte		Mean	49,98	55,59	
		SD	28,00	27,79	
		CI	[40,70; 59,26]	[45,48; 65,71]	
		Range: Min.	0,00	15,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
	z-Wert	-1,51	-1,26		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	32
			Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	32
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	72,92	72,73
	transformierte Skalenwerte		Mean	54,43	48,53
			SD	27,08	29,27
			CI	[45,46; 63,40]	[38,38; 58,67]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-1,31	-1,57
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	49	37
			Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar			Anzahl	49	37
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	76,56	63,79
transformierte Skalenwerte			Mean	51,70	47,60
			SD	29,49	30,25
			CI	[43,44; 59,96]	[37,85; 57,35]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,43	-1,61	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	30
		Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar	Anzahl	35	30
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	72,92	71,43
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,65	55,65
		SD	31,97	31,67
		CI	[39,06; 60,24]	[44,32; 66,99]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,52	-1,26
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	59
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	45	
		Anteil in %	76,27	
für Skala auswertbar		Anzahl	44	
		Anteil in %	97,78	
		Anteil 2 in %	74,58	
transformierte Skalenwerte		Mean	46,87	
		SD	27,04	
		CI	[38,88; 54,86]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	95,00	
	z-Wert	-1,64		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	
		Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar	Anzahl	26	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	66,67	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,81	
		SD	29,42	
		CI	[39,50; 62,12]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,47	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	24	
		Anteil in %	70,59	
für Skala auswertbar		Anzahl	24	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	70,59	
transformierte Skalenwerte		Mean	48,91	
		SD	24,17	
		CI	[39,24; 58,58]	
		Range: Min.	10,00	
		Range: Max.	100,00	
	z-Wert	-1,56		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	30	
		Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar	Anzahl	29	
		Anteil in %	96,67	
		Anteil 2 in %	74,36	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,56	
		SD	27,91	
		CI	[38,41; 58,72]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,57	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

Tabelle 13.3 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 25 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Körperliche Rollenfunktion" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 35,00.

19 Patientinnen sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 94,74 Prozent alle Fragen zur körperlichen Rollenfunktion beantwortet und konnten daher für die Skala ausgewertet werden. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 33,33.

Tabelle 13.3 SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	19	17	13
		Anteil in %	90,48	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	67,86	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	15,79	11,76	13,46
		SD	27,90	23,58	26,25
		CI	[3,24; 28,34]	[0,56; 22,97]	[0,00; 27,73]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	75,00	75,00
		z-Wert	-1,94	-2,05	-2,00
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar		Anzahl	25	18	13
			Anteil in %	96,15	94,74	92,86
			Anteil 2 in %	73,53	60,00	59,09
	transformierte Skalenwerte		Mean	35,00	33,33	19,23
			SD	43,90	42,01	38,40
			CI	[17,79; 52,21]	[13,93; 52,74]	[0,00; 40,10]
			Range: Min.	0,00	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00	100,00
			z-Wert	-1,37	-1,42	-1,83
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	35	29	
			Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar			Anzahl	35	28	
			Anteil in %	100,00	96,55	
			Anteil 2 in %	66,04	63,64	
transformierte Skalenwerte			Mean	23,57	29,46	
			SD	37,35	36,68	
			CI	[11,20; 35,95]	[15,88; 43,05]	
			Range: Min.	0,00	0,00	
			Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,71	-1,53		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	32
			Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	31
			Anteil in %	100,00	96,88
			Anteil 2 in %	72,92	70,45
	transformierte Skalenwerte		Mean	27,86	33,87
			SD	39,65	43,08
			CI	[14,72; 40,99]	[18,70; 49,04]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-1,58	-1,40
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	49	37
			Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar			Anzahl	49	34
			Anteil in %	100,00	91,89
			Anteil 2 in %	76,56	58,62
transformierte Skalenwerte			Mean	31,12	30,88
			SD	40,99	40,39
			CI	[19,64; 42,60]	[17,31; 44,46]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,48	-1,49	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	30
			Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	29
			Anteil in %	100,00	96,67
			Anteil 2 in %	72,92	69,05
	transformierte Skalenwerte		Mean	39,29	46,55
			SD	42,57	43,67
			CI	[25,18; 53,39]	[30,66; 62,45]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-1,24	-1,03
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	59
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	45	
			Anteil in %	76,27	
für Skala auswertbar			Anzahl	44	
			Anteil in %	97,78	
			Anteil 2 in %	74,58	
transformierte Skalenwerte			Mean	31,06	
			SD	35,69	
			CI	[20,51; 41,61]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,48		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	
			Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar		Anzahl	25	
			Anteil in %	96,15	
			Anteil 2 in %	64,10	
	transformierte Skalenwerte		Mean	37,00	
			SD	44,56	
			CI	[19,53; 54,47]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
			z-Wert	-1,31	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	24	
			Anteil in %	70,59	
für Skala auswertbar			Anzahl	23	
			Anteil in %	95,83	
			Anteil 2 in %	67,65	
transformierte Skalenwerte			Mean	23,91	
			SD	37,29	
			CI	[8,67; 39,15]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,69		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	30	
			Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar		Anzahl	28	
			Anteil in %	93,33	
			Anteil 2 in %	71,79	
	transformierte Skalenwerte		Mean	28,57	
			SD	37,71	
			CI	[14,60; 42,54]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
			z-Wert	-1,56	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

Tabelle 13.4 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zu **Körperlichen Schmerzen**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 26 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Körperliche Schmerzen" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 53,58.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 100,00 Prozent alle Fragen zum Thema „Körperliche Schmerzen“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 60,05.

Tabelle 13.4 SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	100,00	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	75,00	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,38	45,76	43,62
		SD	26,44	27,28	23,78
		CI	[45,07; 67,69]	[32,80; 58,73]	[30,69; 56,54]
		Range: Min.	0,00	0,00	22,00
		Range: Max.	100,00	100,00	80,00
		z-Wert	-0,81	-1,26	-1,35
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	100,00	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	76,47	63,33	63,64
	transformierte Skalenwerte		Mean	53,58	60,05	41,21
			SD	34,21	30,56	34,17
			CI	[40,43; 66,73]	[46,31; 73,79]	[23,32; 59,11]
			Range: Min.	0,00	22,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00	100,00
			z-Wert	-0,93	-0,66	-1,45
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	35	29	
			Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar			Anzahl	35	27	
			Anteil in %	100,00	93,10	
			Anteil 2 in %	66,04	61,36	
transformierte Skalenwerte			Mean	54,83	53,26	
			SD	28,89	30,06	
			CI	[45,26; 64,40]	[41,92; 64,60]	
			Range: Min.	10,00	21,00	
			Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,88	-0,94		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	32
			Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	32
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	72,92	72,73
	transformierte Skalenwerte		Mean	61,09	52,44
			SD	29,67	28,86
			CI	[51,26; 70,91]	[42,44; 62,44]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-0,61	-0,98
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	49	37
			Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar			Anzahl	48	37
			Anteil in %	97,96	100,00
			Anteil 2 in %	75,00	63,79
transformierte Skalenwerte			Mean	52,94	53,41
			SD	29,98	30,86
			CI	[44,46; 61,42]	[43,46; 63,35]
			Range: Min.	0,00	12,00
			Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,96	-0,94	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	42	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	30		
		Anteil in %	72,92	71,43		
	für Skala auswertbar	Anzahl	34	30		
		Anteil in %	97,14	100,00		
		Anteil 2 in %	70,83	71,43		
	transformierte Skalenwerte	Mean	61,47	59,13		
		SD	26,43	30,95		
		CI	[52,59; 70,36]	[48,06; 70,21]		
		Range: Min.	21,00	0,00		
		Range: Max.	100,00	100,00		
		z-Wert	-0,60	-0,69		
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>	
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	59	
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	45			
		Anteil in %	76,27			
für Skala auswertbar		Anzahl	43			
		Anteil in %	95,56			
		Anteil 2 in %	72,88			
transformierte Skalenwerte		Mean	55,40			
		SD	29,15			
		CI	[46,68; 64,11]			
		Range: Min.	0,00			
		Range: Max.	100,00			
	z-Wert	-0,85				
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>			

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39		
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26		
			Anteil in %	66,67		
	für Skala auswertbar		Anzahl	26		
			Anteil in %	100,00		
			Anteil 2 in %	66,67		
	transformierte Skalenwerte		Mean	55,00		
			SD	26,35		
			CI	[44,87; 65,13]		
			Range: Min.	0,00		
			Range: Max.	100,00		
			z-Wert	-0,87		
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>		
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	24		
			Anteil in %	70,59		
für Skala auswertbar			Anzahl	24		
			Anteil in %	100,00		
			Anteil 2 in %	70,59		
transformierte Skalenwerte			Mean	53,25		
			SD	25,28		
			CI	[43,13; 63,37]		
			Range: Min.	22,00		
			Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,94			
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>			

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	30	
			Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar		Anzahl	29	
			Anteil in %	96,67	
			Anteil 2 in %	74,36	
	transformierte Skalenwerte		Mean	64,93	
			SD	30,63	
			CI	[53,78; 76,08]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
			z-Wert	-0,45	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

Tabelle 13.5 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Allgemeinen Gesundheitswahrnehmung**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 26 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Allgemeine Gesundheitswahrnehmung" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 43,49.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 100,00 Prozent alle Fragen zur allgemeinen Gesundheitswahrnehmung beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 45,59.

Tabelle 13.5 SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	20	17	13
		Anteil in %	95,24	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	71,43	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,48	41,72	42,75
		SD	13,35	15,35	15,42
		CI	[42,62; 54,33]	[34,43; 49,02]	[34,37; 51,13]
		Range: Min.	12,50	20,00	18,75
		Range: Max.	67,00	72,00	72,00
		z-Wert	-1,18	-1,51	-1,46
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	100,00	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	76,47	63,33	63,64
	transformierte Skalenwerte		Mean	43,49	45,59	38,07
			SD	18,26	17,48	17,14
			CI	[36,47; 50,51]	[37,73; 53,45]	[29,09; 47,05]
			Range: Min.	10,00	15,00	0,00
			Range: Max.	72,00	77,00	67,00
			z-Wert	-1,42	-1,32	-1,69
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	35	29	
			Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar			Anzahl	35	28	
			Anteil in %	100,00	96,55	
			Anteil 2 in %	66,04	63,64	
transformierte Skalenwerte			Mean	51,04	46,40	
			SD	19,32	18,06	
			CI	[44,63; 57,44]	[39,71; 53,09]	
			Range: Min.	20,00	10,00	
			Range: Max.	100,00	75,00	
		z-Wert	-1,05	-1,28		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	32
			Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	32
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	72,92	72,73
	transformierte Skalenwerte		Mean	49,36	48,13
			SD	18,96	18,16
			CI	[43,08; 55,65]	[41,84; 54,43]
			Range: Min.	5,00	20,00
			Range: Max.	87,00	87,00
			z-Wert	-1,13	-1,19
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	49	37
			Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar			Anzahl	49	37
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	76,56	63,79
transformierte Skalenwerte			Mean	52,20	49,99
			SD	20,93	23,26
			CI	[46,34; 58,06]	[42,49; 57,48]
			Range: Min.	10,00	0,00
			Range: Max.	92,00	97,00
	z-Wert	-0,99	-1,10		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	30
			Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar		Anzahl	34	30
			Anteil in %	97,14	100,00
			Anteil 2 in %	70,83	71,43
	transformierte Skalenwerte		Mean	48,13	48,52
			SD	18,71	21,06
			CI	[41,83; 54,42]	[40,98; 56,05]
			Range: Min.	20,00	15,00
			Range: Max.	92,00	97,00
			z-Wert	-1,19	-1,17
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	59
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	45	
			Anteil in %	76,27	
für Skala auswertbar			Anzahl	44	
			Anteil in %	97,78	
			Anteil 2 in %	74,58	
transformierte Skalenwerte			Mean	50,94	
			SD	17,70	
			CI	[45,71; 56,17]	
			Range: Min.	6,25	
			Range: Max.	97,00	
	z-Wert	-1,05			
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	
		Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar	Anzahl	26	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	66,67	
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,31	
		SD	19,28	
		CI	[43,90; 58,72]	
		Range: Min.	10,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,04	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	24	
		Anteil in %	70,59	
für Skala auswertbar		Anzahl	24	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	70,59	
transformierte Skalenwerte		Mean	42,30	
		SD	16,54	
		CI	[35,68; 48,91]	
		Range: Min.	8,33	
		Range: Max.	77,00	
	z-Wert	-1,48		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	30	
		Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar	Anzahl	29	
		Anteil in %	96,67	
		Anteil 2 in %	74,36	
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,81	
		SD	19,32	
		CI	[46,78; 60,84]	
		Range: Min.	15,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,91	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>		

Tabelle 13.6 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Vitalität**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halb-jahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 26 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Vitalität" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 45,32.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 100,00 Prozent alle Fragen zum Thema „Vitalität“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 46,84.

Tabelle 13.6 SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halb-jahr	Befragung nach 9. Halb-jahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	20	17	13
		Anteil in %	95,24	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	71,43	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,42	34,51	33,08
		SD	19,51	17,44	12,84
		CI	[32,87; 49,97]	[26,22; 42,80]	[26,10; 40,05]
		Range: Min.	15,00	5,00	10,00
		Range: Max.	80,00	60,00	50,00
		z-Wert	-0,94	-1,27	-1,34
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	100,00	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	76,47	63,33	63,64
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,32	46,84	36,07
		SD	21,74	22,86	19,33
		CI	[36,96; 53,68]	[36,56; 57,12]	[25,94; 46,20]
		Range: Min.	5,00	0,00	10,00
		Range: Max.	90,00	85,00	80,00
		z-Wert	-0,75	-0,68	-1,20
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	29	
		Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar		Anzahl	35	28	
		Anteil in %	100,00	96,55	
		Anteil 2 in %	66,04	63,64	
transformierte Skalenwerte		Mean	44,71	41,25	
		SD	21,00	21,59	
		CI	[37,76; 51,67]	[33,25; 49,25]	
		Range: Min.	10,00	0,00	
		Range: Max.	85,00	100,00	
	z-Wert	-0,78	-0,95		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	32
		Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	35	32
		Anteil in %	100,00	100,00
		Anteil 2 in %	72,92	72,73
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,48	44,06
		SD	24,08	20,30
		CI	[43,50; 59,45]	[37,03; 51,10]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	80,00
		z-Wert	-0,46	-0,81
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	49	37
		Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar		Anzahl	49	36
		Anteil in %	100,00	97,30
		Anteil 2 in %	76,56	62,07
transformierte Skalenwerte		Mean	45,10	44,91
		SD	23,99	20,46
		CI	[38,38; 51,82]	[38,22; 51,59]
		Range: Min.	5,00	0,00
		Range: Max.	100,00	85,00
	z-Wert	-0,76	-0,77	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	30
		Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar	Anzahl	34	30
		Anteil in %	97,14	100,00
		Anteil 2 in %	70,83	71,43
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,29	49,72
		SD	21,18	21,44
		CI	[38,18; 52,41]	[42,05; 57,40]
		Range: Min.	10,00	5,00
		Range: Max.	85,00	90,00
		z-Wert	-0,76	-0,54
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	59
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	45	
		Anteil in %	76,27	
für Skala auswertbar		Anzahl	44	
		Anteil in %	97,78	
		Anteil 2 in %	74,58	
transformierte Skalenwerte		Mean	44,13	
		SD	19,85	
		CI	[38,26; 49,99]	
		Range: Min.	6,67	
		Range: Max.	85,00	
z-Wert	-0,81			
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	
		Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar	Anzahl	25	
		Anteil in %	96,15	
		Anteil 2 in %	64,10	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,13	
		SD	22,42	
		CI	[41,35; 58,92]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,52	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	24	
		Anteil in %	70,59	
für Skala auswertbar		Anzahl	24	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	70,59	
transformierte Skalenwerte		Mean	36,25	
		SD	17,95	
		CI	[29,07; 43,43]	
		Range: Min.	5,00	
		Range: Max.	70,00	
	z-Wert	-1,19		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	30	
		Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar	Anzahl	29	
		Anteil in %	96,67	
		Anteil 2 in %	74,36	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,72	
		SD	22,81	
		CI	[38,42; 55,02]	
		Range: Min.	5,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,69	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

Tabelle 13.7 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Sozialen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 26 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Soziale Funktionsfähigkeit" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 67,31.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 100,00 Prozent alle Fragen zur sozialen Funktionsfähigkeit beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 69,08.

Tabelle 13.7 SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	100,00	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	75,00	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	76,19	64,71	60,58
		SD	23,02	21,76	26,93
		CI	[66,35; 86,03]	[54,36; 75,05]	[45,94; 75,22]
		Range: Min.	12,50	37,50	25,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,33	-0,84	-1,03
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	100,00	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	76,47	63,33	63,64
	transformierte Skalenwerte		Mean	67,31	69,08	69,64
			SD	26,48	26,47	26,73
			CI	[57,13; 77,48]	[57,18; 80,98]	[55,64; 83,64]
			Range: Min.	12,50	12,50	12,50
			Range: Max.	100,00	100,00	100,00
			z-Wert	-0,73	-0,65	-0,62
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	35	29	
			Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar			Anzahl	34	28	
			Anteil in %	97,14	96,55	
			Anteil 2 in %	64,15	63,64	
transformierte Skalenwerte			Mean	74,26	64,73	
			SD	24,41	25,24	
			CI	[66,06; 82,47]	[55,38; 74,08]	
			Range: Min.	12,50	12,50	
			Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,42	-0,84		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	32
			Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar		Anzahl	34	32
			Anteil in %	97,14	100,00
			Anteil 2 in %	70,83	72,73
	transformierte Skalenwerte		Mean	67,28	68,75
			SD	31,08	28,93
			CI	[56,83; 77,73]	[58,73; 78,77]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-0,73	-0,66
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	49	37
			Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar			Anzahl	49	37
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	76,56	63,79
transformierte Skalenwerte			Mean	72,96	66,55
			SD	25,56	27,65
			CI	[65,80; 80,12]	[57,65; 75,46]
			Range: Min.	0,00	12,50
			Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,48	-0,76	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	30
			Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	30
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	72,92	71,43
	transformierte Skalenwerte		Mean	67,86	72,92
			SD	30,51	29,01
			CI	[57,75; 77,97]	[62,54; 83,30]
			Range: Min.	12,50	12,50
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-0,70	-0,48
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	59
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	45	
			Anteil in %	76,27	
für Skala auswertbar			Anzahl	45	
			Anteil in %	100,00	
			Anteil 2 in %	76,27	
transformierte Skalenwerte			Mean	68,06	
			SD	21,58	
			CI	[61,75; 74,36]	
			Range: Min.	25,00	
			Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,69		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	
			Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar		Anzahl	26	
			Anteil in %	100,00	
			Anteil 2 in %	66,67	
	transformierte Skalenwerte		Mean	74,04	
			SD	21,77	
			CI	[65,67; 82,41]	
			Range: Min.	37,50	
			Range: Max.	100,00	
			z-Wert	-0,43	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	24	
			Anteil in %	70,59	
	für Skala auswertbar		Anzahl	24	
			Anteil in %	100,00	
			Anteil 2 in %	70,59	
	transformierte Skalenwerte		Mean	65,10	
			SD	28,07	
			CI	[53,87; 76,33]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,83		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39		
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	30		
			Anteil in %	76,92		
	für Skala auswertbar		Anzahl	29		
			Anteil in %	96,67		
			Anteil 2 in %	74,36		
	transformierte Skalenwerte		Mean	68,97		
			SD	28,86		
			CI	[58,46; 79,47]		
			Range: Min.	0,00		
			Range: Max.	100,00		
			z-Wert	-0,65		
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>38</i>		

Tabelle 13.8 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Emotionalen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halb-jahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 25 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Emotionale Rollenfunktion" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 42,67.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 94,74 Prozent alle Fragen zum Thema „Emotionale Rollenfunktion“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 55,56.

Tabelle 13.8 SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	18	17	13
		Anteil in %	85,71	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	64,29	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	27,78	25,49	35,90
		SD	40,02	43,35	44,02
		CI	[9,29; 46,26]	[4,88; 46,10]	[11,97; 59,82]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,62	-1,69	-1,37
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar		Anzahl	25	18	13
			Anteil in %	96,15	94,74	92,86
			Anteil 2 in %	73,53	60,00	59,09
	transformierte Skalenwerte		Mean	42,67	55,56	33,33
			SD	48,61	45,73	47,14
			CI	[23,61; 61,72]	[34,43; 76,68]	[7,71; 58,96]
			Range: Min.	0,00	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00	100,00
			z-Wert	-1,17	-0,78	-1,45
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	35	29	
			Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar			Anzahl	33	28	
			Anteil in %	94,29	96,55	
			Anteil 2 in %	62,26	63,64	
transformierte Skalenwerte			Mean	46,46	38,10	
			SD	47,10	46,00	
			CI	[30,40; 62,53]	[21,05; 55,14]	
			Range: Min.	0,00	0,00	
			Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,05	-1,31		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	32
			Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	31
			Anteil in %	100,00	96,88
			Anteil 2 in %	72,92	70,45
	transformierte Skalenwerte		Mean	50,48	59,14
			SD	46,70	43,64
			CI	[35,00; 65,95]	[43,78; 74,50]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-0,93	-0,67
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	49	37
			Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar			Anzahl	49	33
			Anteil in %	100,00	89,19
			Anteil 2 in %	76,56	56,90
transformierte Skalenwerte			Mean	45,58	44,44
			SD	46,49	47,63
			CI	[32,56; 58,60]	[28,19; 60,70]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,08	-1,12	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	30
			Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	29
			Anteil in %	100,00	96,67
			Anteil 2 in %	72,92	69,05
	transformierte Skalenwerte		Mean	44,76	57,47
			SD	45,69	45,34
			CI	[29,62; 59,90]	[40,97; 73,97]
			Range: Min.	0,00	0,00
			Range: Max.	100,00	100,00
			z-Wert	-1,11	-0,72
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	59
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	45	
			Anteil in %	76,27	
für Skala auswertbar			Anzahl	41	
			Anteil in %	91,11	
			Anteil 2 in %	69,49	
transformierte Skalenwerte			Mean	35,77	
			SD	43,07	
			CI	[22,59; 48,96]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
	z-Wert	-1,38			
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	
			Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar		Anzahl	26	
			Anteil in %	100,00	
			Anteil 2 in %	66,67	
	transformierte Skalenwerte		Mean	43,59	
			SD	47,86	
			CI	[25,19; 61,99]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
			z-Wert	-1,14	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	24	
			Anteil in %	70,59	
für Skala auswertbar			Anzahl	23	
			Anteil in %	95,83	
			Anteil 2 in %	67,65	
transformierte Skalenwerte			Mean	47,83	
			SD	51,08	
			CI	[26,95; 68,70]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,01		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	30	
			Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar		Anzahl	28	
			Anteil in %	93,33	
			Anteil 2 in %	71,79	
	transformierte Skalenwerte		Mean	51,19	
			SD	48,42	
			CI	[33,26; 69,12]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	100,00	
			z-Wert	-0,91	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>38</i>		

Tabelle 13.9 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zum **psychischen Wohlbefinden**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 26 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala "Psychisches Wohlbefinden" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 54,85.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 100,00 Prozent alle Fragen zum psychischen Wohlbefinden beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 62,32.

Tabelle 13.9 SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	20	17	13
		Anteil in %	95,24	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	71,43	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	59,55	53,24	56,62
		SD	18,92	19,62	15,82
		CI	[51,26; 67,84]	[43,91; 62,56]	[48,02; 65,21]
		Range: Min.	16,00	20,00	32,00
		Range: Max.	88,00	88,00	92,00
		z-Wert	-0,85	-1,20	-1,01
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar		Anzahl	26	19	14
			Anteil in %	100,00	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	76,47	63,33	63,64
	transformierte Skalenwerte		Mean	54,85	62,32	62,86
			SD	25,07	23,83	19,93
			CI	[45,21; 64,48]	[51,60; 73,03]	[52,42; 73,30]
			Range: Min.	8,00	8,00	16,00
			Range: Max.	100,00	96,00	92,00
			z-Wert	-1,11	-0,70	-0,67
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	35	29	
			Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar			Anzahl	35	28	
			Anteil in %	100,00	96,55	
			Anteil 2 in %	66,04	63,64	
transformierte Skalenwerte			Mean	61,71	61,14	
			SD	18,08	21,93	
			CI	[55,72; 67,70]	[53,02; 69,27]	
			Range: Min.	28,00	24,00	
			Range: Max.	96,00	100,00	
		z-Wert	-0,73	-0,76		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	32
			Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar		Anzahl	35	32
			Anteil in %	100,00	100,00
			Anteil 2 in %	72,92	72,73
	transformierte Skalenwerte		Mean	61,49	58,28
			SD	24,22	20,20
			CI	[53,46; 69,51]	[51,28; 65,28]
			Range: Min.	4,00	16,00
			Range: Max.	100,00	92,00
			z-Wert	-0,74	-0,92
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	64
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	49	37
			Anteil in %	76,56	63,79
für Skala auswertbar			Anzahl	49	36
			Anteil in %	100,00	97,30
			Anteil 2 in %	76,56	62,07
transformierte Skalenwerte			Mean	63,39	58,44
			SD	22,91	22,91
			CI	[56,97; 69,80]	[50,96; 65,93]
			Range: Min.	12,00	20,00
			Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,64	-0,91	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	30
			Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar		Anzahl	34	30
			Anteil in %	97,14	100,00
			Anteil 2 in %	70,83	71,43
	transformierte Skalenwerte		Mean	58,94	62,40
			SD	23,08	21,54
			CI	[51,18; 66,70]	[54,69; 70,11]
			Range: Min.	12,00	20,00
			Range: Max.	96,00	92,00
			z-Wert	-0,88	-0,69
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
	2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	59
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	45	
			Anteil in %	76,27	
für Skala auswertbar			Anzahl	44	
			Anteil in %	97,78	
			Anteil 2 in %	74,58	
transformierte Skalenwerte			Mean	61,68	
			SD	18,85	
			CI	[56,11; 67,25]	
			Range: Min.	32,00	
			Range: Max.	96,00	
	z-Wert	-0,73			
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	26	
			Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar		Anzahl	25	
			Anteil in %	96,15	
			Anteil 2 in %	64,10	
	transformierte Skalenwerte		Mean	61,44	
			SD	20,65	
			CI	[53,34; 69,54]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	88,00	
			z-Wert	-0,74	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
	2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	34
mit zurückgesendetem Fragebogen			Anzahl	24	
			Anteil in %	70,59	
für Skala auswertbar			Anzahl	24	
			Anteil in %	100,00	
			Anteil 2 in %	70,59	
transformierte Skalenwerte			Mean	54,08	
			SD	23,38	
			CI	[44,73; 63,44]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	88,00	
		z-Wert	-1,15		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse		Befragung nach Bei- trittshalb- jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt		Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	30	
			Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar		Anzahl	28	
			Anteil in %	93,33	
			Anteil 2 in %	71,79	
	transformierte Skalenwerte		Mean	64,29	
			SD	22,91	
			CI	[55,80; 72,77]	
			Range: Min.	12,00	
			Range: Max.	100,00	
			z-Wert	-0,59	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>		<i>Anzahl</i>	<i>38</i>		

Tabelle 13.10 gibt Auskunft über die **körperliche Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 24 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der "Körperlichen Summenskala" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 37,38.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 94,74 Prozent alle nötigen Fragen, die „Körperliche Summenskala“ betreffend beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 36,67.

Tabelle 13.10 Körperliche Summenskala, Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	17	17	13
		Anteil in %	80,95	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	60,71	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,12	33,33	30,72
		SD	10,21	8,60	9,92
		CI	[30,26; 39,97]	[29,24; 37,42]	[25,33; 36,12]
		Range: Min.	21,14	17,44	16,91
		Range: Max.	56,44	47,57	46,85
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar	Anzahl	24	18	12
		Anteil in %	92,31	94,74	85,71
		Anteil 2 in % [*]	70,59	60,00	54,55
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,38	36,67	28,06
		SD	11,48	10,70	10,57
		CI	[32,79; 41,97]	[31,72; 41,61]	[22,08; 34,04]
		Range: Min.	18,21	19,38	13,63
		Range: Max.	54,34	55,36	50,51
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
	2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	53	44
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	35	29	
		Anteil in %	66,04	65,91	
für Skala auswertbar		Anzahl	32	26	
		Anteil in %	91,43	89,66	
		Anteil 2 in % [*]	60,38	59,09	
transformierte Skalenwerte		Mean	36,27	37,41	
		SD	10,93	10,98	
		CI	[32,49; 40,06]	[33,19; 41,62]	
		Range: Min.	19,94	19,42	
		Range: Max.	55,93	55,21	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>		
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	44	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	32	
		Anteil in %	72,92	72,73	
	für Skala auswertbar	Anzahl	34	31	
		Anteil in %	97,14	96,88	
		Anteil 2 in % [*]	70,83	70,45	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,89	35,99	
		SD	9,88	10,77	
		CI	[34,57; 41,21]	[32,20; 39,78]	
		Range: Min.	20,26	20,57	
		Range: Max.	56,66	61,50	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>		

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	64	58
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	49	37
		Anteil in %	76,56	63,79
	für Skala auswertbar	Anzahl	48	31
		Anteil in %	97,96	83,78
		Anteil 2 in % [*]	75,00	53,45
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,59	36,75
		SD	11,33	11,46
		CI	[33,39; 39,80]	[32,71; 40,78]
		Range: Min.	17,89	18,44
		Range: Max.	57,13	57,52
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	30
		Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar	Anzahl	33	29
		Anteil in %	94,29	96,67
		Anteil 2 in % [*]	68,75	69,05
	transformierte Skalenwerte	Mean	38,52	38,71
		SD	10,53	12,68
		CI	[34,93; 42,12]	[34,10; 43,33]
		Range: Min.	24,08	19,29
		Range: Max.	57,22	57,35
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	45	
		Anteil in %	76,27	
	für Skala auswertbar	Anzahl	39	
		Anteil in %	86,67	
		Anteil 2 in % [*]	66,10	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,42	
		SD	9,36	
		CI	[34,48; 40,36]	
		Range: Min.	21,86	
		Range: Max.	54,63	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>	

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	
		Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar	Anzahl	24	
		Anteil in %	92,31	
		Anteil 2 in %	61,54	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,74	
		SD	10,69	
		CI	[33,46; 42,02]	
		Range: Min.	19,04	
		Range: Max.	59,83	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>	
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	24	
		Anteil in %	70,59	
	für Skala auswertbar	Anzahl	22	
		Anteil in %	91,67	
		Anteil 2 in %*	64,71	
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,42	
		SD	9,69	
		CI	[31,37; 39,46]	
		Range: Min.	18,61	
		Range: Max.	57,96	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	30	
		Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar	Anzahl	27	
		Anteil in %	90,00	
		Anteil 2 in %*	69,23	
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,84	
		SD	10,20	
		CI	[32,99; 40,69]	
		Range: Min.	21,21	
		Range: Max.	57,87	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>	

Tabelle 13.11 gibt Auskunft über die **psychische Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen.

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden.

Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts-halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 24 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der "Psychischen Summenskala" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Skalenwert bei 42,61.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 94,74 Prozent alle notwendigen Fragen für die Auswertung der „Psychische Summenskala“ beantwortet. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 44,94.

Tabelle 13.11 Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	17	17	13
		Anteil in %	80,95	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	60,71	73,91	72,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,47	39,51	42,02
		SD	12,03	10,06	10,25
		CI	[36,75; 48,19]	[34,73; 44,30]	[36,45; 47,59]
		Range: Min.	22,23	23,20	30,22
		Range: Max.	65,92	54,71	63,87
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>23</i>

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar	Anzahl	24	18	12
		Anteil in %	92,31	94,74	85,71
		Anteil 2 in % [*]	70,59	60,00	54,55
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,61	44,94	46,37
		SD	12,74	13,65	10,13
		CI	[37,51; 47,70]	[38,64; 51,25]	[40,64; 52,10]
		Range: Min.	15,68	16,84	29,76
		Range: Max.	62,24	63,85	62,64
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>31</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	53	44	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	29	
		Anteil in %	66,04	65,91	
	für Skala auswertbar	Anzahl	32	26	
		Anteil in %	91,43	89,66	
		Anteil 2 in % [*]	60,38	59,09	
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,25	41,29	
		SD	10,28	12,88	
		CI	[40,68; 47,81]	[36,34; 46,24]	
		Range: Min.	27,08	19,45	
		Range: Max.	59,54	64,78	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>51</i>	<i>44</i>	
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	44	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	32	
		Anteil in %	72,92	72,73	
	für Skala auswertbar	Anzahl	34	31	
		Anteil in %	97,14	96,88	
		Anteil 2 in % [*]	70,83	70,45	
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,90	45,82	
		SD	13,28	9,81	
		CI	[40,44; 49,37]	[42,37; 49,28]	
		Range: Min.	18,38	24,50	
		Range: Max.	63,98	59,79	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>	

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	64	58
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	49	37
		Anteil in %	76,56	63,79
	für Skala auswertbar	Anzahl	48	31
		Anteil in %	97,96	83,78
		Anteil 2 in % [*]	75,00	53,45
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,56	44,16
		SD	11,96	11,85
		CI	[42,18; 48,94]	[39,99; 48,33]
		Range: Min.	19,06	23,93
		Range: Max.	66,47	64,41
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	30
		Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar	Anzahl	33	29
		Anteil in %	94,29	96,67
		Anteil 2 in % [*]	68,75	69,05
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,92	45,73
		SD	11,80	11,88
		CI	[39,90; 47,95]	[41,40; 50,05]
		Range: Min.	22,55	22,99
		Range: Max.	64,40	63,40
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>48</i>	<i>45</i>
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	45	
		Anteil in %	76,27	
	für Skala auswertbar	Anzahl	39	
		Anteil in %	86,67	
		Anteil 2 in % [*]	66,10	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,62	
		SD	10,45	
		CI	[40,34; 46,90]	
		Range: Min.	25,09	
Range: Max.		62,11		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>58</i>		

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	
		Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar	Anzahl	24	
		Anteil in %	92,31	
		Anteil 2 in % [*]	61,54	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,18	
		SD	10,82	
		CI	[40,85; 49,51]	
		Range: Min.	22,36	
		Range: Max.	60,02	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>		
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	24	
		Anteil in %	70,59	
	für Skala auswertbar	Anzahl	22	
		Anteil in %	91,67	
		Anteil 2 in % [*]	64,71	
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,47	
		SD	13,37	
		CI	[36,88; 48,05]	
		Range: Min.	16,63	
		Range: Max.	61,72	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	30	
		Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar	Anzahl	27	
		Anteil in %	90,00	
		Anteil 2 in % [*]	69,23	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,28	
		SD	13,74	
		CI	[41,10; 51,46]	
		Range: Min.	19,34	
		Range: Max.	66,01	
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>38</i>		

Tabelle 13.12 gibt Auskunft über den **SF-6D-Gesamtindex**. Der SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) ist krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität in Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand bis „1“ (bestmöglicher Gesundheitszustand).

Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patientinnen Stichprobenmitglieder waren, wie viele von ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patientinnen alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung des SF-6D-Gesamtindex herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Indexwert. Darüber hinaus wird ausgewiesen, wie groß im Durchschnitt die Differenz zwischen den SF-6D-Indexwerten der aktuellen

Befragung und der ersten Befragung nach dem Beitritts halbjahr ausfällt. Da bislang nur die Erstbefragung vorgenommen wurde, sind hierzu in diesem Bericht noch keine Angaben möglich.

In der Kohorte 2007-1 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 34 Patientinnen. 26 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 26 Patientinnen hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung des "SF-6D-Gesamtindex" notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patientinnen lag der Indexwert bei 0,62.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 19 Patientinnen ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 94,74 Prozent alle nötigen Fragen zur Ermittlung des „SF-6D-Gesamtindex“ beantwortet und wurden so für die Auswertung des Index berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patientinnen lag bei 0,64.

Tabelle 13.12 SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patientinnen, an die ein Fragebogen verschickt wurde.0

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	28	23	18
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	21	17	13
		Anteil in %	75,00	73,91	72,22
	für Skala auswertbar	Anzahl	20	17	13
		Anteil in %	95,24	100,00	100,00
		Anteil 2 in %*	71,43	73,91	72,22
	Indexwert	Mean	0,62	0,59	0,61
		SD	0,10	0,11	0,10
		CI	[0,57; 0,66]	[0,54; 0,65]	[0,56; 0,67]
		Range: Min.	0,38	0,41	0,50
		Range: Max.	0,85	0,81	0,81
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,02	-0,02
		CI		[-0,07; 0,03]	[-0,06; 0,02]
		Fallbasis		14	12
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	31	25	23

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2007-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	30	22
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	19	14
		Anteil in %	76,47	63,33	63,64
	für Skala auswertbar	Anzahl	26	18	13
		Anteil in %	100,00	94,74	92,86
		Anteil 2 in %	76,47	60,00	59,09
	Indexwert	Mean	0,62	0,64	0,57
		SD	0,16	0,13	0,16
		CI	[0,56; 0,68]	[0,58; 0,70]	[0,49; 0,66]
		Range: Min.	0,35	0,45	0,35
		Range: Max.	0,89	0,89	0,89
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,06	-0,03
		CI		[0,02; 0,10]	[-0,07; 0,02]
	<i>Fallbasis</i>		17	13	
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	34	32	31
2007-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	53	44	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	29	
		Anteil in %	66,04	65,91	
	für Skala auswertbar	Anzahl	32	26	
		Anteil in %	91,43	89,66	
		Anteil 2 in %	60,38	59,09	
	Indexwert	Mean	0,63	0,63	
		SD	0,12	0,12	
		CI	[0,59; 0,67]	[0,59; 0,68]	
		Range: Min.	0,49	0,47	
		Range: Max.	0,96	1,00	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,01	
		CI		[-0,01; 0,04]	
	<i>Fallbasis</i>		22		
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	51	44	

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittshalb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	44
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	32
		Anteil in %	72,92	72,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	34	31
		Anteil in %	97,14	96,88
		Anteil 2 in %	70,83	70,45
	Indexwert	Mean	0,65	0,64
		SD	0,16	0,14
		CI	[0,60; 0,71]	[0,59; 0,69]
		Range: Min.	0,30	0,30
		Range: Max.	1,00	0,93
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,02
		CI		[-0,07; 0,02]
		Fallbasis		27
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>50</i>	<i>47</i>	
2008-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	64	58
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	49	37
		Anteil in %	76,56	63,79
	für Skala auswertbar	Anzahl	46	33
		Anteil in %	93,88	89,19
		Anteil 2 in %	71,88	56,90
	Indexwert	Mean	0,64	0,65
		SD	0,16	0,15
		CI	[0,59; 0,69]	[0,59; 0,70]
		Range: Min.	0,33	0,39
		Range: Max.	1,00	0,97
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,02
		CI		[-0,06; 0,02]
		Fallbasis		27
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	48	42
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	35	30
		Anteil in %	72,92	71,43
	für Skala auswertbar	Anzahl	33	28
		Anteil in %	94,29	93,33
		Anteil 2 in %	68,75	66,67
	Indexwert	Mean	0,66	0,65
		SD	0,13	0,16
		CI	[0,62; 0,71]	[0,59; 0,71]
		Range: Min.	0,39	0,33
		Range: Max.	0,93	0,96
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,00
		CI		[-0,04; 0,04]
		Fallbasis		26
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	48	45
2009-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	59	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	45	
		Anteil in %	76,27	
	für Skala auswertbar	Anzahl	41	
		Anteil in %	91,11	
		Anteil 2 in %	69,49	
	Indexwert	Mean	0,62	
		SD	0,12	
		CI	[0,59; 0,66]	
		Range: Min.	0,42	
		Range: Max.	0,89	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
		Fallbasis		
	<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	58	

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittshalb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	26	
		Anteil in %	66,67	
	für Skala auswertbar	Anzahl	24	
		Anteil in %	92,31	
		Anteil 2 in %	61,54	
	Indexwert	Mean	0,65	
		SD	0,15	
		CI	[0,59; 0,71]	
		Range: Min.	0,39	
		Range: Max.	0,96	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
	<i>Fallbasis</i>			
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>40</i>		
2010-2	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	34	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	24	
		Anteil in %	70,59	
	für Skala auswertbar	Anzahl	23	
		Anteil in %	95,83	
		Anteil 2 in %	67,65	
	Indexwert	Mean	0,61	
		SD	0,12	
		CI	[0,56; 0,66]	
		Range: Min.	0,41	
		Range: Max.	0,89	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
	<i>Fallbasis</i>			
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	<i>35</i>		

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder aus Auswertungsgruppe 1 und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitrittshalb-jahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2011-1	Stichprobenmitglieder insgesamt	Anzahl	39	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	30	
		Anteil in %	76,92	
	für Skala auswertbar	Anzahl	27	
		Anteil in %	90,00	
		Anteil 2 in %	69,23	
	Indexwert	Mean	0,65	
		SD	0,15	
		CI	[0,59; 0,71]	
		Range: Min.	0,37	
		Range: Max.	1,00	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		
		CI		
		Fallbasis		
<i>Patientinnen in Auswertungsgruppe 1</i>	<i>Anzahl</i>	38		

Anhang A: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Evaluationsbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Brustkrebs herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um Datensätze, die jeweils für eine Patientin erhoben wurden:


- Patientinnenmerkmale
- Medizinische Daten
- Ökonomische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung A.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Brustkrebs von AOK, Seekrankenkasse und Knappschaft.

A.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung einer Patientin in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten. Für Patientinnen ab der Kohorte 2006-2 werden darüber hinaus Datensätze aus der Erhebung zur subjektiven Lebensqualität ausgewertet.

Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP Brustkrebs unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall - ab eDMP)



Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) für Brustkrebs ab Juli 2009 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen medizinischen Behandlungsdaten sowie die personenbezogenen Merkmale enthält.²⁹ Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Brustkrebs finden die Satzartbeschreibungen SA200EA/FA, SA200EN/FN, SA200EB/FB sowie SA200ED/FD³⁰ Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA200ED/SA200FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2009-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 200EA/FA, SA200 EN/FN sowie SA200EB/FB übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2009-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA200ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jeder Patientin vorhandenen **Patientinnenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

²⁹ Bis zum 30.06.2009 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patientinnen bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

³⁰ Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „D“ werden diejenigen Dokumentation gekennzeichnet, die sich auf die Zeit nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen beziehen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientinnenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patientin fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientinnenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 200 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass eine Patientin in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für sie eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt. Sobald dem Evaluator die Patientinnenmerkmale vorliegen, zieht er eine Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit der Programmteilnehmer für die **Evaluation** der ökonomischen Daten. Der Stichprobenumfang beträgt dabei jeweils 10 Prozent der Ist-Größe einer Kohorte, jedoch mindestens 100 und höchstens 500 Patientinnen. Falls an einem Programm zwischen 10 und 100 Patientinnen teilnahmen, wird eine Vollerhebung durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als 10 Teilnehmer umfasst, da in diesem Fall aus Gründen der Wahrung der Anonymität auf eine Auswertung verzichtet wird. Der Evaluator übermittelt der Krankenkasse eine Liste mit den Pseudonymen der Stichprobe. Die Kasse spielt diesen Pseudonymen die mit der medizinischen Behandlung verbundenen Leistungsausgaben zu und erstellt daraus einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 200 OD. Ferner liefert sie Angaben zu den Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. („**ökonomische Daten**“).

Der damit beschriebene Datenfluss ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Ab der Kohorte 2006-2 werden die Auswertungen darüber hinaus um die Ergebnisse einer schriftlichen **Befragung zur Veränderung der subjektiven Lebensqualität** bei Patientinnen der Auswertungsgruppe 1 ergänzt. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen. Befragt wird die im vorigen Absatz bereits beschriebene Stichprobe von Patientinnen³¹. Die Kasse ermittelt dazu, für die vom Evaluator übermittelte Pseudonymliste, die zugehörigen Adressdaten und versendet an diese Patientinnen den Fragebogen. Die Patientinnen senden die ausgefüllten Fragebögen direkt an den Evaluator zurück, wo sie ausgewertet werden.

³¹ In den Berichten, die vor dem 30. September 2012 erstellt wurden, wurden alle Patientinnen für die Stichprobenziehung zu den ökonomischen Auswertungen berücksichtigt. Diese Systematik wurde im Juni 2011 umgestellt: ab der Kohorte 2011-1 wird die Stichprobe für die ökonomische Auswertungen nur noch aus den Mitgliedern der Auswertungsgruppe 1 gezogen.

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmerinnen“ und „Patientinnen“ gesprochen und nicht von „Fällen“. Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientinnenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit die Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientinnenbezogenen Auswertung würde hingegen die Patientin weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Die Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschlossen werden mussten und sich in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientinnenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP eine Teilnehmerin der Kohorte 2004-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit

Sicherheit geschlossen werden, dass sie sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat die betreffende Patientin „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patientinnen dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergeben sich zwei Besonderheiten. Erstens werden die Patientinnen verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen. Zweitens kann eine unveränderte Patientinnengruppe bei den berechneten Mittelwerten innerhalb eines Auswertungsjahres nicht „altern“, da sich die vollendeten Lebensjahre auf den Stichtag 1.1. des Auswertungsjahres beziehen. Unterschiedliche Mittelwerte im ersten und zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres sind daher darauf zurückzuführen, dass sich durch das Ausscheiden von Patientinnen die Zusammensetzung der Restkohorte ändern kann.

A.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung kam es zu Abweichungen vom oben exemplarisch beschriebenen Datenfluss. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Rücklaufkontrolle (OD-Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.³² Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

³² Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen ein Verstoß gegen die Auswertungsanforderungen laut Rechenregeln vorlag, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden „**Komplett-Dubletten**“ aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden „**Auswertungsdubletten**“ aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze, Ökonomische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung („**Matching**“) von Personenmerkmalen, medizinischen Daten und ökonomischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientinnenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patientinnen ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei den ökonomischen Datensätzen war eine Überprüfung auf Verknüpfbarkeit entbehrlich. Da sie durch das Zuspielden der Leistungsausgaben zu denjenigen Pseudonymnummern generiert wurden, die in einer Stichprobe aus den PM-Datensätzen gezogen worden waren, war für die zugespielten Leistungsausgaben eine Verknüpfbarkeit mit den PM-Datensätzen in jedem Fall gegeben. Dennoch konnten auch hier drei Arten von Problemfällen auftreten:

- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen keine Leistungsausgaben zugespielt worden waren
- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen die Leistungsausgaben doppelt und mit teils unterschiedlichen Werten zugespielt worden waren
- In der Stichprobe nicht gezogene Pseudonymnummern, die dennoch um Leistungsausgaben ergänzt geliefert wurden

Im Rahmen einer **Rücklaufkontrolle** wurde daher ein Abgleich vorgenommen zwischen denjenigen Pseudonymnummern, die der Evaluator in der Stichprobe gezogen hatte, und denjenigen Pseudonymnummern, für welche die Krankenkasse die zugehörigen Leistungsausgaben zugespielt hatte. Damit wurden – differenziert nach Kassen, Eintrittskohorten und Antragsregion – die Problemfälle identifiziert. Da es sich bei der zweitgenannten Art von Problemfällen um nicht auswertungsrelevante Informationen handelt, wurden die entsprechenden Datensätze bei der Auswertung ignoriert. Analog

wurde vorgegangen, wenn den Pseudonymnummern Leistungsausgaben für Halbjahre zugespielt wurden, in denen die entsprechenden Patientinnen nicht mehr Programmteilnehmerinnen waren.

Dass die Krankenkassen nicht allen gezogenen Pseudonymnummern die Leistungsausgaben für die erwarteten Berichtshalbjahre zuspielten, lag zum Teil daran, dass die entsprechenden Patientinnen rückwirkend aus dem Programm ausgeschrieben worden waren, diese Information zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung aber noch nicht vorlag. Lagen andere Gründe dafür vor, wurden die Daten ggf. von Kassen ergänzt und eine Neulieferung der überarbeiteten ökonomischen Datensätze an den Evaluator vorgenommen. Lagen in einer Datenlieferung für eine Pseudonymnummer zwei oder mehr ökonomische Datensätze mit unterschiedlichen Leistungsausgaben vor, floss der ökonomisch ungünstigste Wert in die Evaluation ein.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine **Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf** vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis waren die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (je nach Antragsregion bis zum Berichtshalbjahr 2011-1)
- Sie wurden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung, die sich auf bereits veröffentlichte Kohorten beziehen wurden ignoriert.

A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für eine DMP-Teilnehmerin für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kommt es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu (prozessbedingten) Abweichungen von diesem Schema. Wie in diesen Sonderfällen zu verfahren ist, wurde für die Evaluationsberichte zum Krankheitsbild Brustkrebs in den Berechnungsvorschriften des BVA erstmalig für die Berichte zum 1.7.2008 definiert und wird in den beiden folgenden Abschnitten beschrieben.

sie als „postoperativ“ gewertet. Alle ED, die nach o.g. Kriterien weder als prä- noch als postoperativ zugeordnet werden können, gelten als nicht zuordenbar und werden in den Auswertungen ignoriert

A.3.1 Präoperative und postoperative Dokumentationen

Anders als beispielsweise in den DMP zur Behandlung Diabetes mellitus Typ 2 und Typ 1 oder koronare Herzkrankheiten sind im DMP zur Behandlung von Brustkrebs zwei Arten von Erstdokumentationen zu unterscheiden: Die prä- und die postoperative Erstdokumentation (ED). In den aktuell gültigen Berechnungsvorschriften ist der Umgang mit diesen beiden Dokumentationstypen wie folgt geregelt: Da sowohl die prä- als auch die postoperative ED auf demselben Dokumentationsbogen erfolgen und dieselbe Datenstruktur aufweisen, ist zunächst die eindeutige Zuordnung zu klären:

Als „präoperativ“ gelten alle ED wenn dies als aktueller Behandlungsstatus vermerkt ist (SA200EA/EN), bzw. wenn als Behandlungsstatus „OP geplant“ oder „OP nicht geplant“ angegeben ist (SA200EB).

Als „postoperativ“ gelten ED wenn dies als aktueller Behandlungsstatus vermerkt ist (SA200EA/EN), bzw. laut Behandlungsstatus Primärtumor/kontralateraler Tumor „postoperativ“ vermerkt ist (SA200EB).

Ebenfalls als „postoperativ“ gelten Dokumentationen, in denen weder „präoperativ“ noch „OP geplant“ oder „OP nicht geplant“ oder „postoperativ“ angegeben ist, aber Daten zur Art der erfolgten operativen (SA200EB) bzw. chirurgischen (SA200EA/EN) Therapie angegeben sind

Bei widersprüchlichen Angaben zum prä/postoperativen Status innerhalb eines Dokumentationsbogens gilt: „postoperativ“ sticht „präoperativ“: Wenn nach o.g. Kriterien eine ED sowohl als „präoperativ“ als auch als „postoperativ“ eingeordnet würde, wird

A.3.2 Dokumentationen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für eine DMP-Teilnehmerin für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kommt es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu prozessbedingten Abweichungen von diesem Schema. In diesen Sonderfällen wird wie folgt verfahren:

- **Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**
Liegen für das Beitrittsjahr einer Patientin eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führte dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugeordnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle A.3.2.1
- **Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **Postoperative Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später³³**
Lag eine postoperative ED im Beitrittsjahr vor, eine zweite postoperative ED im 2. Halbjahr oder später, wurde diese behandelt wie eine Folgedokumentation. Lagen für dieses Halbjahr bereits eine oder mehrere „echte“ Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle A.3.2.1 Anwendung.
- **Zwei oder mehr Erstdokumentationen im Beitrittsjahr³⁴**
a) Bei Vorliegen von zwei oder mehr prä- bzw. zwei oder mehr postoperativen ED in einem Halbjahr gelten die Kriterien zum Umgang mit mehreren Dokumentationen in einem Halbjahr wie in Tabelle A.3.2.1 definiert. Die folgenden Regeln greifen nach einer solchen etwaigen Bereinigung.

b) Liegt im Auswertungszeitraum ausschließlich eine prä- oder ausschließlich eine postoperative ED vor, wird die vorliegende Dokumentation verwendet.

c) Liegt spätestens im ersten Folgehalbjahr eine postoperative ED vor, die einer präoperativen ED des Beitrittsjahres zuzuordnen ist, so werden die Daten aus präoperativer und postoperativer ED „fusioniert“. Hinsichtlich des Befundstatus (d.h. Angaben zu: pT, pN, M, Grading, Resektionsstatus, Rezeptorstatus, Anzahl entfernter und Anzahl befallener Lymphknoten) gilt dabei, dass eine postoperative ED eine präoperative ED sticht, da davon auszugehen ist, dass die Angaben hierzu nach der OP valider sind als z.B. die Angaben, die lediglich über eine Biopsie gewonnen wurden. Bei allen übrigen Daten ist gemäß Tabelle A.3.2.1 zu verfahren, d.h. bspw. eine Strahlentherapie gilt als durchgeführt, wenn dies in einer der EDs angegeben ist, unabhängig davon ob dies in der präoperativen oder postoperativen ED der Fall ist.

³³ Für die letzte Kohorte ist der Einbezug von etwaigen postoperativen EDs definitionsgemäß nicht möglich (keine Angaben zum 1. Folgehalbjahr).

³⁴ Für die letzte Kohorte ist der Einbezug von etwaigen postoperativen EDs definitionsgemäß nicht möglich (keine Angaben zum 1. Folgehalbjahr).

Tabelle A.3.2.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr

Parameter	Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr
Lokalisation rechts,links beidseitig	als „beidseitig“ zu werten, wenn mindestens in einer Dokumentation „rechts“ UND in mindestens einer Dokumentation „links“ angekreuzt ODER in mindestens einer Dokumentation „beidseitig“ angekreuzt. Ansonsten gilt angekreuzte Seite, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert.
Brusterhaltende Therapi	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde und gleichzeitig keine Angaben zu einer Mastektomie in einer ED vorliegt. Sofern eine Angabe zur Mastektomie vorliegt, ist Mastektomie und nicht BET zu werten.
pT –Stadien	höchster dokumentierter Wert zu werten
pN –Stadien	höchster dokumentierter Wert zu werten
M –Stadien	höchster dokumentierter Wert zu werten
Grading	höchster dokumentierter Wert zu werten
Resektionsstatus	höchster dokumentierter Wert zu werten
Rezeptorstatus	als „positiv“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Axilliäre Lymphonodektomie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Anzahl entfernter Lymphknoten	höchste dokumentierte Anzahl zu werten
Anzahl befallener Lymphknoten	höchste dokumentierte Anzahl zu werten
Strahlentherapie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde; („andauernd“, regulär abgeschlossen“, „vorzeitig beendet“ sind als „durchgeführt“ zu werten)
Bestrahlte Region: Mamma	als beidseitig zu werten, wenn mindestens in einer Dokumentation „rechts“ UND in mindestens einer Dokumentation „links“ angekreuzt“ ODER in mindestens einer Dokumentation „beidseitig“ angekreuzt. Ansonsten gilt angekreuzte Seite, wenn in mindestens einer Dokumentation in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Bestrahlter Region: Brustwand	als beidseitig zu werten, wenn mindestens in einer Dokumentation „rechts“ UND in mindestens einer Dokumentation „links“ angekreuzt“ ODER in mindestens einer Dokumentation „beidseitig“ angekreuzt. Ansonsten gilt angekreuzte Seite, wenn in mindestens einer Dokumentation in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Mastektomie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Chemotherapie	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde („andauernd“, regulär abgeschlossen“, „vorzeitig beendet“ sind als durchgeführt zu werten)
Kriterien für niedriges Risiko (aus den medizinischen Daten; Alter wird aus PM-Daten zugespielt): - Karzinom kleiner gleich 2 cm - hochdifferenziert (Grading G1) - rezeptorpositiv (ER+ und/oder PR+) - nodalnegativ	Medizinische Kriterien für niedriges Risiko erfüllt, wenn gleichzeitiges Vorliegen in allen postoperativen Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr. (sofern ausschließlich präoperative Dokumentationen vorliegen: erfüllt, wenn gleichzeitiges Vorliegen in alle präoperativen Dokumentationen)
Datum der Histologie	Das am weitesten zurückliegende Datum zum Zeitpunkt der Subgruppenbildung wird ausgewertet
Datum des gesicherten Nachweises	Das am weitesten zurückliegende Datum zum Zeitpunkt der Subgruppenbildung wird ausgewertet
Lokalrezidiv/ Lokoregionäres Rezidiv	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Primärtumor	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Kontralateraler Brustkrebs	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Fernmetastasen	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Leber	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Lunge	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Knochen	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Andere	gilt, wenn in mindestens einer der Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert
Lokalisation der Metastasen: Keine	gilt, wenn in mindestens einer Dokumentationen in einem Auswertungshalbjahr dokumentiert. Wird ignoriert, sofern in mindestens einer Dokumentation eine andere Lokalisation dokumentiert.

A.4 Erläuterung zu Klassifikationen bei Brustkrebs

Bösartige Neubildungen können von den verschiedensten Gewebearten ausgehen und sind zumeist durch ihr schnelles, ungehemmtes, infiltrierendes (in das umgebende Gewebe eindringendes) Wachstum sowie durch die Absiedlung von Tochtergeschwülsten (Metastasen) über die Lymphwege (Lymphknotenmetastasen) oder Blutgefäße (Organmetastasen) gekennzeichnet. Tumore, die von Haut- und Schleimhäuten – dazu gehören beispielsweise auch Drüsengänge – ausgehen, werden als Karzinome bezeichnet. Zur Entscheidung über die adäquate Behandlung sowie zur Beurteilung der Prognose bedarf es bei allen Krebserkrankungen einer differenzierten Einteilung der Tumoren. Beim Brustkrebs (Mammakarzinom) kommen hierfür in erster Linie zwei Einteilungen zum Einsatz. Zunächst das so genannte Staging, die Stadieneinteilung nach der TNM-Klassifikation. Das T steht dabei für den primären Tumor, dessen Ausdehnung in Stufen von 0 bis 4 eingeteilt wird. Das N steht für Noduli, (Lymph-)Knoten, bzw. deren lokalen metastatischen Befall mit Tumorzellen, der in drei Stufen eingeteilt wird. Das M steht für (Fern-)Metastasen, bzw. deren Vorhanden- (M1) oder Nichtvorhandensein (M0). Insgesamt ist somit eine Vielzahl von Kombinationen, z.B. T3N2M1, möglich, wobei das Vorhandensein von lokalen (Lymphknoten-)Metastasen oder gar Fern- oder Organmetastasen prognostisch weit aus ungünstiger ist, als deren Fehlen.

Das Staging entscheidet wesentlich über die Art der Therapie. In Frage kommt dabei die operative Entfernung der Tumorgewebes, der Brustdrüse oder gar der gesamten Brust (Ablatio) durch den Gynäkologen, eine strahlentherapeutische Behandlung oder eine Behandlung mit Zellgiften, eine Chemo- oder Zytostatikatherapie. Diese drei Therapiemodalitäten können auch in Kombination erfolgen, wobei die Reihenfolge dabei je nach individuellem Befund ganz unterschiedlich sein kann.

Zusätzlich zur allgemeinen, von der Gewebsart der Tumorzellen unabhängigen Einteilung nach dem TNM-Schema, erfolgt unter anderem beim Mammakarzinom eine zusätzliche Einteilung nach der Art des Tumorzellgewebes, das sog. Grading. Dabei wird in 4 Stufen nach dem Grad der Differenzierung unterschieden. Ein hohes Maß an Differenzierung, bzw. eine hohe Ähnlichkeit zum Ausgangsgewebe, weist dabei auf ein eher langsames Wachstum, oftmals aber auch auf ein schlechteres Ansprechen auf Zytostatika hin, während ein niedriges Maß an Differenzierung oftmals auf schnelles Wachstum und Metastasierung, aber auch auf gutes Ansprechen auf Zytostatika hinweist.

Neben dem Staging und Grading wird bei der feingeweblichen Untersuchung (Histologie) auch der Einbruch von Tumorzellen in Lymph- (L-Klassifikation) und Blutgefäße (V-Klassifikation) sowie der Schnitttrand der operativ entfernten Tumormasse hinsichtlich dessen An- oder Abwesenheit von Tumorzellen (Entfernung im Gesunden als Ziel) (R-Klassifikation) in jeweils vier Abstufungen beurteilt.

Um noch differenzierter über Therapie und Prognose der Brustkrebserkrankung entscheiden zu können, werden die Tumorzellen mit laborchemischen oder immunhistochemischen Methoden hinsichtlich ihrer Eigenschaften (z.B. Oberflächenrezeptoren, Enzymaktivitäten) untersucht. So ist insbesondere die Expression von Hormon- (Östrogen-)rezeptoren auf den Tumorzellen ein wichtiger Indikator. In diesen Fällen kann der Einsatz von Östrogenrezeptorenblockern das Tumorwachstum bremsen.

A.4.1 TNM-Klassifikation der Brust in Detail

(Der Zusatz "p" vor T bzw. N bedeutet postoperativ, ohne Zusatz: klinisch, d.h. Tastbefund. Die Zusätze hinter pN1b "i" bis "iv" sind die römischen Ziffern I bis IV)

A.4.1.1 pT - Primärtumor

- **Tx** - Primärtumor kann nicht beurteilt werden
- **T0** - Kein Anhalt für Primärtumor
- **pTis** - Carcinoma in situ: Intraduktales Karzinom oder lobuläres Carcinoma in situ oder M. Paget der Mamille ohne nachweisbaren Tumor
- **pT1** - Tumor bis 2 cm in größter Ausdehnung
- **pT1a** - Tumor bis 0,5 cm in größter Ausdehnung
- **pT1b** - Tumor 0,5 cm bis 1 cm in größter Ausdehnung
- **pT1c** - Tumor 1 cm bis 2 cm in größter Ausdehnung
- **pT2** - Tumor 2 cm bis 5 cm in größter Ausdehnung
- **pT3** - Tumor mehr als 5 cm in größter Ausdehnung
- **pT4** - Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung auf die Brustwand oder die Haut
- **pT4a** - Mit Ausdehnung auf die Brustwand
- **pT4b** - Mit Ödem (einschließlich Apfelsinenhaut), Ulzeration der Brusthaut oder Satellitenmetastasen der Haut der gleichen Brust
- **pT4c** - Kriterien 4a und 4b gemeinsam
- **pT4d** - Entzündliches (inflammatorisches) Mammakarzinom

Zusätze:

- **m** - multifokal/multizentrisch: mehrere Tumorherde in einer Brust.
- **r** - Rezidiv, Wiederaufflackern der Tumorerkrankung.
- **y** - während oder nach multimodaler (=Chemo- u/o Strahlentherapie) Vorbehandlung.

A.4.1.2 pN - Regionäre Lymphknoten

- **Nx** - Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden
- **pN0** - Keine regionären Lymphknoten befallen
- **pN1** - Metastasen in beweglichen ipsilateralen axillären Lymphknoten
- **pN1a** - Nur Mikrometastasen (keine größer als 0.2 cm)
- **pN1b** - Metastase(n) in Lymphknoten, zumindest eine größer als 0.2 cm
- **pN1bi** - Metastasen in 1 - 3 Lymphknoten, wenigstens eine größer als 0.2 cm, aber alle kleiner als 2 cm
- **pN1bii** - Metastasen in 4 oder mehr Lymphknoten, wenigstens eine größer als 0.2 cm, aber alle kleiner als 2 cm
- **pN1biii** - Ausdehnung der Metastasen über die Lymphknotenkapsel hinaus, alle kleiner als 2 cm in größter Ausdehnung
- **pN1biv** - Metastasen in Lymphknoten, 2 cm oder mehr in größter Ausdehnung
- **pN2** - Metastasen in ipsilateralen axillären Lymphknoten, untereinander verbacken oder in andere Strukturen fixiert
- **pN3** - Metastasen in ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna

Zusätze:

- **SN** - Sentinel Node (Wächterlymphknoten). Befund bezieht sich auf den/die entnommenen Wächterlymphknoten.
- **mi** - Mikrometastase, sehr kleine Metastase

Bei positiven axillären Lymphknoten sollte die Anzahl der befallenen Lymphknoten im Verhältnis zur Gesamtzahl der entfernten Lymphknoten angegeben werden. (x/y)

A.4.1.3 M - Fernmetastasen

- **Mx** - Das Vorliegen von Fernmetastasen kann nicht beurteilt werden
- **M0** - Keine Fernmetastasen
- **M1** - Fernmetastasen

A.4.1.4 Ergänzungen

Die Stadieneinteilung wird durch das histologische Grading ergänzt:

- **G1** - Gut differenziert
- **G2** - Mäßig differenziert
- **G3** - Schlecht differenziert
- **G4** - Undifferenziert (entdifferenziert)

Weitere Ergänzungen:

L - Lymphgefäßeinbruch

- **LX** - Lymphgefäßinvasion kann nicht beurteilt werden
- **L0** - kein Nachweis einer Lymphgefäßinvasion (also keine Tumorzellen in Lymphgefäßen nachgewiesen)
- **L1** - Lymphgefäßinvasion (also Tumorzellen in Lymphgefäßen nachgewiesen)

V - Blutgefäßeinbruch

- **V** - Blutgefäß-(Venen-)einbruch:
- **VX** - Blutgefäßinvasion kann nicht beurteilt werden
- **V0** - kein Nachweis von Blutgefäßinvasion (also keine Tumorzellen in Blutgefäßen nachgewiesen)
- **V1** - Blutgefäßinvasion (also Tumorzellen in Blutgefäßen nachgewiesen)

R - Resektionsrand (Absetzungsrand (Schnitttrand) bei der Operation)

- **RX** - Resektionsrand kann nicht beurteilt werden
- **R0** - Kein Residualtumor: Resektionsrand ist frei von Tumor (der Tumor wurde vollständig (mit einem Sicherheitssaum) im Gesunden entfernt)
- **R1** - Mikroskopischer Residualtumor: Tumor reicht bis an den Resektionsrand (der Tumor wurde wahrscheinlich nicht vollständig im Gesunden entfernt oder reicht gerade bis an den Rand (ohne Sicherheitssaum).
- **R2** - Makroskopischer Residualtumor

Anhang B: Glossar

Adjuvante Therapie – Als adjuvante Therapie werden ergänzende oder unterstützende Therapiemaßnahmen bezeichnet. Speziell bei Krebserkrankungen handelt es sich um eine Therapie, die nach der operativen Entfernung der erkennbaren Tumorteile durchgeführt wird, um mögliche, jedoch noch nicht nachweisbare Absiedlungen des Tumors zu bekämpfen und auf diese Weise die Heilungschancen zu verbessern.

Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung) – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

Antiöstrogene – Substanzen, die durch Bindung an den Hormonrezeptor (Rezeptorblocker) die Wirkung der Östrogene (weibliches Sexualhormon) an den Erfolgsorganen kompetitiv hemmen oder modulieren.

Antragsregion – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

arithmetisches Mittel – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

Aromatasehemmer – Unterbinden durch Hemmung eines Enzyms (Aromatase) die Biosynthese von Östrogenen und wirken damit als Antiöstrogene. Sie werden als Zytostatika bei hormonpositiven Tumoren der Brustdrüse eingesetzt. Zusätzlich zur Chemotherapie erfolgt bei rezeptorpositiven Tumoren zumeist eine Antihormonbehandlung mit selektiven Östrogenantagonisten wie Tamoxifen oder Aromatasehemmern.

auswertbare Patientinnen – Patientinnen, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmerinnen sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

Auswertungs(halb)jahr – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientinnenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmerinnen erfolgen.

Axilladissektion – Chirurgische Entfernung von Weichteilgewebe oder Lymphknoten aus der Achselhöhle.

axillär – Als Axilla (Achsel) wird die gesamte Schulter im engeren Sinne jedoch die Achselhöhle bezeichnet. In der Achselhöhle (axillär) finden sich neben den Gefäßbahnen (Nerven, Arterien, Venen) und Schweiß- und Talgdrüsen (Achseldrüsen) lokale Organe der Immunabwehr Lymphbahnen und -knoten.

Axilläre Lymphonodektomie - Unter der axillären Lymphonodektomie (auch Axilladissektion) versteht man die Entfernung von Lymphknoten aus der Achselhöhle (Axilla). Sie wird als Alternative oder Ergänzung zur Entfernung des Wächterlymphknotens (Sentinel-Node-Biopsie) im Rahmen der chirurgischen Therapie des Mammakarzinoms durchgeführt. Das Ergebnis der feingeweblichen (histologischen) Untersuchung der entfernten Lymphknoten entscheidet je nach Befall bzw. Anzahl der Lymphknoten mit Tumorzellen über die weitere Therapie und Prognose.

Beitrittsjahr – Kalenderjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

CI (confidence interval) – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

DMP (Disease-Management-Programm[e]) – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

ED – siehe Erstdokumentation

Erstdokumentation – Mit der Einschreibung der Patientin in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

Erstmanifestation – Erstmaliges Erkennbarwerden einer Erkrankung.

EZ (Eintrittszeitpunkt) – In der Evaluation werden jeweils alle Patientinnen, deren Eintrittszeitpunkt in das Programm im selben Kalenderhalbjahr liegt, in eine Kohorte bzw. Halbjahreskohorte zusammengefasst.

FD – siehe Folgedokumentation

Fernmetastasen – Als Metastasen im engeren Sinne werden Absiedlungen eines Tumors in entferntem Gewebe bezeichnet. Fernmetastasen entstehen, wenn Tumorzellverbände mit dem Blut- oder Lymphstrom in entfernte Organe gelangen und dort weiterwachsen. Alternativ können Fernmetastasen auch durch Abtropfung oder Abklatschung von Tumorzellen in Körperhöhlen entstehen.

Folgedokumentation – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

GnRH-Analoga – Ein GnRH-Analoga (gonadotropine releasing hormone, ein Hormon in der Kette der Sexualhormonproduktion) ist ein Arzneistoff, der zur Unterdrückung der Hormonproduktion in den Eierstöcken führt. Sie werden bei prämenopausalen Frauen gegeben, die einen hormonrezeptorpositiven Brustkrebs haben.

Gx-gradig – Anhand der mikroskopischen Gewebsuntersuchung (Histologie) wird der Grad der Differenziertheit (grading) des Tumorgewebes bestimmt. Hierbei wird mit G1 gut, mit G2 mäßig, mit G3 schlecht und mit G4 nicht differenziertes Tumormaterial bezeichnet.

Häusliche Krankenpflege – In der Wohnung der Patientinnen erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungspflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

Heilmittel – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen od. einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von

Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) u. Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

Hilfsmittel – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

Histologie - Die Histologie ist die Wissenschaft von den biologischen Geweben. Der Histologe/Pathologe untersucht Gewebeproben. Zu den Aufgaben der Histologie gehört u.a. die mikroskopische Diagnose und Klassifizierung von Tumoren.

invasiver Tumortyp – Im Gegensatz zum verdrängendem Wachstum wächst ein invasiver Tumor in die umliegenden Gewebe ein und zerstört es dabei.

ipsilateral – Auf der gleichen Seite liegend, z.B. beim Auftreten eines Tumorrezidivs. Im Gegensatz zu auf der entgegengesetzten Seite liegend (kontralateral).

Karzinom - Karzinome sind Krebserkrankungen, die vom Epithel (Haut, Schleimhäute, Drüsengewebe) ausgehen. Daraus ergibt sich eine weitere Differenzierung, je nach Art des entarteten Epithels (z.B. Lunge, Magen, Darm, Brust). Karzinome machen circa 80% aller bösartigen Tumore aus.

Kohorte bzw. Halbjahreskohorte – Gesamtheit der Teilnehmerinnen eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patientinnen, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

Kollektiv – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patientinnen einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Konfidenzintervall – siehe CI

Krankengeld – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit

ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstaufschlag ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

Lymphadenektomie – Chirurgische Entfernung von Lymphknoten.

Mamma – Die weibliche Brust mit der Brustdrüse. Sie besteht aus ca. 15 Einzeldrüsen, Bindegewebezügen u. einem individuell verschieden großen Anteil an Fettgewebe.

Mastektomie – Operative Entfernung der ganzen Brust (Brustamputation). Bei der subkutanen Mastektomie handelt es sich um die Entfernung nur des Brustdrüsengewebes unter Belassung der Brusthaut. Die Brust wird sofort wieder rekonstruiert, meist mit körperfremdem Gewebe. Bei der eingeschränkten, radikalen Mastektomie - auch erweiterte Mastektomie genannt - werden zusätzlich zum Brustdrüsengewebe und einem Teil der Brusthaut in der Regel auch ca. 10-15 Lymphknoten im Bereich der Achselhöhle entfernt. Bei der radikalen Mastektomie handelt es sich um eine Operationsmethode, die nur noch bei fortgeschrittenem Brustkrebs angewandt wird. Bei ihr werden zusätzlich der kleine und große Brustmuskel ganz oder teilweise entfernt.

Mean – siehe arithmetisches Mittel

Median – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

Medizinische Datensätze – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 200 EA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 200 EN sowie für die Folgedokumentationen die SA 200 FA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 200 FN.

Metastasen – Krankheitsherd, der durch die Verschleppung von Tumorzellen aus einem Primärtumor entsteht. Eine Metastasierung kann hämatogen, d.h. über den Blutweg, oder lymphogen, d.h. mit dem Lymphstrom erfolgen. Beim Brustkrebs sind die häufigsten Metastasenorte die Lymphknoten, die Haut, das Skelettsystem, die Lunge, die Leber, und das zentrale Nervensystem. Es entstehen bösartige Tochtergeschwülste.

Neoadjuvante Therapie – Mit diesem Begriff wird eine Chemo-, Strahlen- oder Hormontherapie bezeichnet, die vor einer Operation durchgeführt wird, um die Tumormasse zu verringern und dadurch die Erfolgchancen für eine operative Tumorentfernung zu erhöhen.

Neoplasie – Es handelt sich um eine gewebliche Neubildung in Form eines Überschusswachstums von körpereigenem Gewebe. Neoplasien können jegliche Art von Gewebe betreffen, sie können benigne (gutartig) oder maligne (bösartig) sein. Je nach Ort (Lokalisation) des Tumors und der Funktion des durch ihn geschädigten Gewebes kann es zu einer Fehlfunktion von Organen mit Beeinträchtigung des Gesamtorganismus bis zum Tod kommen. Bösartige Neoplasien sind die Ursache der Krankheit Krebs.

nodalnegativ – Keine von Tumorzellen befallenen Lymphknoten (Noduli) vorhanden. Prognostisch günstig.

OD-Daten – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmerinnen verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientinnenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmerinnen vor. Diese Daten werden als Satzart 200 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patientin und Jahr vor.

Ovariektomie – Operative (chirurgische) Entfernung eines oder beider Eierstöcke (Ovarien). Wird besonders bei hormonempfindlichen Tumoren, im speziellen bei Brustkrebs, durchgeführt und wirkt sich auf den Verlauf günstig aus, sofern die Tumorzellen hormonempfindlich sind.

Ovarialfunktion – Funktionen der weiblichen Keimdrüsen (Eierstöcke, Ovarien). Es ist hierbei zu unterscheiden zwischen der generativen (Produktion von befruchtungsfähigen Eiern) und der vegetativen (Hormonbildung: Östrogene und Gestagene) Funktion.

PM-Daten – Patientinnenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientinnenmerkmale wie das Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

Primärtumor – Der zuerst (vor etwaigen Tochtergeschwülsten) entstandene Tumor.

postmenopausal - Lebensabschnitt der Frau, der sich den Wechseljahren (Klimakterium) anschließt und definitionsgemäß ein Jahr nach der letzten spontanen Regelblutung (Menopause) beginnt.

prämenopausal - Abschnitt der Wechseljahre der Frau (Klimakterium) vor der letzten spontanen Regelblutung / Menstruation (Menopause) mit unregelmäßigen Blutungen.

Programmteilnehmerinnen – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

pTx-Tumor – Einteilung der postoperativen (Rest-)Tumorgröße innerhalb des TNM (Tumor, Noduli [Lymphknotenmetastasen], Metastasen) Klassifikationsschemas. Dabei bedeutet pT1 Tumor bis 2 cm in größter Ausdehnung, pT2 Tumor bis 5 cm in größter Ausdehnung, pT3 Tumor mehr als 5 cm in größter Ausdehnung und pT4 Tumor jeder Größe mit Ausdehnung auf Brustwand oder Haut.

Resektion - Die Resektion ist die operative Entfernung kranker Gewebeteile eines Organs oder auch eines Tumors. Die Resektion wird unterschieden von der Exstirpation (Entfernung des ganzen Organs).

Restkohorte – Gesamtheit der Patientinnen einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmerinnen sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

Rezeptorpositiv – Vorhandensein von Andockstellen (Rezeptoren) für Hormone an Gewebszellen. Die Bestimmung von Hormonrezeptoren bei Brustkrebs ist bedeutsam für die unterstützende (adjuvante) oder lindernde (palliative) Therapieentscheidung. Man unterscheidet Östrogen-(E) und Progesteronrezeptoren (Pr). Patientinnen vor Eintritt der Wechseljahre (prämenopausale) weisen zu etwa 50 bis 60 %, Patientinnen nach Eintritt der Wechseljahre (postmenopausale) zu 70 bis 80 % Östrogenrezeptoren auf. Diese so genannten rezeptorpositiven Fälle wurden bisher im Hinblick auf den Verlauf der Erkrankung (Prognose) günstiger eingeschätzt als die rezeptornegativen Tumoren.

Rezidiv – Bei einem Rezidiv handelt es sich um ein Wiederauftreten („Rückfall“) einer Krankheit, einer psychischen Störung oder deren Symptomen nach einer Behandlung, die zeitweilig erfolgreich war oder nach spontaner Rückbildung (Remission). Der Begriff Rezidiv spielt bei der Behandlung von Krebs eine wichtige Rolle. Ursache ist meist eine unvollständige Entfernung des Tumors, die nach einiger Zeit zu einem erneuten Auftreten der Krankheit führen kann. Wer in den fünf Jahren nach der Behandlung eines Tumors kein Rezidiv erfährt, gilt nach allgemeiner Norm als geheilt. Einige Tumoren können aber auch nach längerer Zeit ein Rezidiv verursachen.

Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV) – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen

Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidität) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

Rx-Resektion – Die R-Klassifikation beurteilt die Schnittränder des Tumors. Dabei bedeutet RX, dass der Resektionsrand nicht beurteilt werden kann; R0, dass kein Residualtumor vorhanden, bzw. der Resektionsrand frei von Tumor ist und somit der Tumor vollständig (mit einem Sicherheitssaum) im Gesunden entfernt wurde; R1, dass ein mikroskopischer Residualtumor vorhanden ist, bzw. der Tumor (ohne Sicherheitssaum) bis an den Resektionsrand reicht und damit wahrscheinlich nicht vollständig im Gesunden entfernt wurde und R2, dass ein makroskopischer Residualtumor sichtbar ist und der Tumor damit sicher nicht völlig entfernt werden konnte.

Tumor - Schwellung mit einer örtlichen umschriebenen Zunahme des Gewebevolumens. Als Ursache kann sowohl eine Entzündung mit Ödem, als auch eine gut- oder bösartige Neubildung in Frage kommen.