

# AOK Curaplan und "gut Dabei" der Knappschaft für Diabetes mellitus Typ 1 - bundesweite Gender-Auswertungen

**Berichtstyp:** bundesweiter Evaluationsbericht - Gender-Auswertungen

**Auswertungshalbjahre:** 2005-1 bis 2012-1

**Abgabedatum:** 30. September 2013

**Evaluatoren:**

**infas** infas Institut für angewandte  
Sozialwissenschaft GmbH  
Friedrich-Wilhelm-Str. 18  
53113 Bonn

**prognos**  
Prognos AG  
Schwanenmarkt 21  
40231 Düsseldorf

**WIAD** Wissenschaftliches Institut der Ärzte  
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.  
Uhierstr. 78  
53175 Bonn

|   |           |
|---|-----------|
| <b>0. Einleitung</b>  | <b>4</b>  |
| Tabelle 0.1    Inhalte der Evaluation   | 5         |
| <b>0.1. Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten</b>  | <b>7</b>  |
| Tabelle 0.1.1    Tabellenstandard   | 8         |
| Tabelle 0.1.2    Plausible Wertebereiche  | 10        |
| <b>0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung</b>   | <b>11</b> |
| Tabelle 0.2.1    Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration  | 11        |
| <b>0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Kollektive</b>   | <b>12</b> |
| <b>Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte</b>   | <b>13</b> |
| <b>Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale</b>  | <b>13</b> |
| Tabelle 1.1    Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung  | 13        |
| Tabelle 1.3    Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)   | 15        |
| Tabelle 1.4    Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres  | 23        |
| Tabelle 1.5    Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres                                  | 26        |
| Tabelle 1.6    Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten  | 31        |
| Tabelle 1.7    Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte   | 32        |
| Tabelle 1.8    Patienten ohne medizinische Dokumentation  | 34        |
| <b>Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung</b>   | <b>37</b> |
| 3.1 Risikofaktoren  | 38        |
| Tabelle 3.1.1a    Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index   | 40        |
| Tabelle 3.1.1b    Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index   | 55        |
| Tabelle 3.1.2    Raucher ≥ 12 Jahre in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation  | 78        |
| Tabelle 3.1.3    Raucherquote bei allen Patienten ≥ 12 Jahre  | 82        |
| Tabelle 3.1.4a    Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation   | 88        |
| Tabelle 3.1.4b    Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation  | 118       |
| Tabelle 3.1.5    Gut eingestellte Hypertoniker (Normotoniker) im Kollektiv der Hypertoniker laut Erstdokumentation (Anamnese)                                       | 163       |
| Tabelle 3.1.6    Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation                          | 167       |
| Tabelle 3.1.7    Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation                         | 171       |
| 3.2 Laborwerte  | 175       |
| Tabelle 3.2.1    Patienten und ihre HbA1c-Konzentration   | 176       |
| Tabelle 3.2.2    Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen  | 181       |
| Tabelle 3.2.3    Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte   | 196       |
| Tabelle 3.2.4    Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)   | 205       |
| Tabelle 3.2.5    Patienten und ihre jährliche Untersuchung auf pathologische Urinalbuminausscheidung  | 221       |
| 3.3 Medikation  | 224       |
| Tabelle 3.3.1    Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern  | 225       |
| 3.4 Prozessparameter  | 240       |
| Tabelle 3.4.1    Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen   | 241       |
| Tabelle 3.4.2    Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen   | 250       |
| 3.5 Augenärztliche Auswertungen   | 258       |
| Tabelle 3.5.1    Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung  | 259       |
| Tabelle 3.5.2    Erwachsene Patienten mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation  | 262       |
| 3.6 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten   | 266       |
| Tabelle 3.6.1    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation                            | 267       |
| Tabelle 3.6.2    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation | 272       |
| Tabelle 3.6.3    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht        |           |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  | auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation .....   | 279        |
| Tabelle 3.6.4  | Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation .....  | 294        |
| Tabelle 3.6.5  | Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation .....   | 300        |
| Tabelle 3.6.6  | Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation .....   | 306        |
| Tabelle 3.6.7  | Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut Erstdokumentation .....                            | 312        |
| Tabelle 3.6.8  | Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation .....  | 319        |
| Tabelle 3.6.9  | Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation ..... | 325        |
| Tabelle 3.6.10   | Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation .....                          | 330        |
| <b>Anhang A: Methodik und Datengrundlage .....</b>             |  | <b>334</b> |
| <b>A.1 Datengrundlage .....</b>                                |  | <b>334</b> |
| Abb. A.1.1   | Datenfluss im Rahmen des DMP DM1 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP .....   | 335        |
| <b>A.2 Qualitätssicherung .....</b>                            |  | <b>337</b> |
| <b>A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen .....</b> |  | <b>338</b> |
| Tabelle A.3.1  | Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr .....  | 339        |
| <b>Anhang B: Glossar .....</b>                                 |  | <b>340</b> |

## 0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patienten wird über den gesamten Verlauf einer chronischen Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patienten sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es, zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patienten durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrundeliegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 1 sind sämtliche DMP erstmalig zum 30.09.2009 zu evaluieren. Anschließend erfolgt alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 30.09.2011, zum 30.09.2013, etc.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welchen Inhalt der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Die in den Evaluationskriterien vorgesehenen alters- und geschlechtsspezifischen Zusatzauswertungen sind darin nicht enthalten. Sie werden in einem gesonderten Age- und Genderbericht ausgewiesen, für den bundesweite und kassenarten übergreifende (AOK, Knappschaft) Auswertungen vorgenommen werden.

**Tabelle 0.1     Inhalte der Evaluation**

| Auswertungskapitel  | Inhalte   |
|---|---|
| <b>Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte</b> |   |
| 1. Patientenzahlen und -merkmale                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung</li> <li>- Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)</li> <li>- Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres</li> <li>- Alter - Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres</li> <li>- Patienten und ihre mittlere Beobachtungszeit</li> <li>- Patienten ohne medizinische Dokumentation</li> </ul>  |
| 3. Krankheitsverlauf nach Einschreibung                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewichtsentwicklung (BMI)</li> <li>- Raucherstatus</li> <li>- Hypertonus</li> <li>- HbA1c-Werte</li> <li>- Serum-Kreatinin-Werte</li> <li>- Glomeruläre Filtrationsrate</li> <li>- Untersuchung auf pathologische Urin-Albumin-Ausscheidung</li> <li>- Medikation</li> <li>- Wahrnehmung von empfohlenen Schulungen</li> <li>- Augenärztliche Untersuchung</li> </ul> <p>Ereigniszeitanalysen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erblindung</li> <li>- Nephropathie</li> <li>- Fußstatus</li> <li>- Amputation</li> <li>- Herzinfarkt</li> <li>- Schlaganfall</li> <li>- Nierenersatztherapie</li> <li>- primäre und sekundäre Endpunkte</li> </ul> |
| <b>Anhang A: Methodik und Datengrundlage</b>                |   |
| <b>Anhang B: Glossar</b>                                    |   |

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den „Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme in der Version 5.4 am 04. Dezember 2012 veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbeobachtung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Abschlussberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen. Um eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf die Patientenpopulation herzustellen, erfolgt dazu eine risikoadjustierte Schätzung der interessierenden Parameter.

Der vorliegende Bericht enthält bundesweite, genderspezifische Auswertungen für die Summe aller DMPs der AOK und der Knappschaft zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1. Die Akkreditierung für das erste dieser Programme erfolgte im Halbjahr 2005-1. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmer des Programms vom Zeitpunkt Ihres Beitritts bis einschließlich des Halbjahres 2012-1 beobachtet. Betrachtet werden Versicherte der jeweiligen AOK sowie gegebenenfalls länderübergreifend betreute Versicherte anderer AOKen und die Versicherten der Knappschaft, zu denen nach der Fusion beider Kassen auch die ehemaligen Versicherten der See-Krankenkasse gehören.

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.<sup>1</sup> Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs der Knappschaft teil.<sup>2</sup> Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Für den vorliegenden Bericht ist zudem die Fusion von AOK Niedersachsen und IKK Niedersachsen relevant, die bezüglich der DMPs zum 1.4.2010 umgesetzt wurde sowie die Fusion von AOK Sachsen-Anhalt und BKK Sachsen-Anhalt, die bezüglich der DMPs zum 1.4.2010 umgesetzt wurde. Ab den jeweiligen Fusionszeitpunkten nahmen die Versicherten der ehemaligen IKK Niedersachsen bzw. der ehemaligen BKK Sachsen-Anhalt an den DMPs der AOK Niedersachsen bzw. der AOK Sachsen-Anhalt teil. Die Patientenmerkmale und die dokumentierten medizinischen Parameter der ehemaligen IKK- bzw. BKK-Versicherten wurden mit ihrem historischen Fallverlauf im vorliegenden bundesweiten Evaluationsbericht (Gender-Auswertungen) berücksichtigt. Daher können die Patientenzahlen höher ausfallen als die Patientenzahlen im bundesweiten Evaluationsbericht (Genderauswertungen) vom September 2009.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden DM1-Berichten Daten aus eDMP enthalten sind. Ab dem Halbjahr 2008-2 kann daher - je nach Auswertungsinhalt - die Vergleichbarkeit der Auswertungsinhalte eingeschränkt sein. Zum einen werden seit eDMP einige Parameter auf geänderte Art und Weise erfasst. Zum anderen besteht - je nach Praxissoftware - seit eDMP die Möglichkeit, auf ergänzende Patienteninformationen zuzugreifen, so dass ggf. ein bisher möglicherweise unterrepräsentierter Parameter korrigiert dargestellt wird.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

Zur Vereinfachung wird im folgenden von „Patienten“, „Teilnehmern“ und „Personen“ usw. gesprochen. Damit sind jedoch stets männliche und weibliche Personen gemeint.

<sup>1</sup> Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

<sup>2</sup> Eine Ausnahme bilden die DMPs zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 und 2 in der Antragsregion Mecklenburg-Vorpommern. In diesen beiden Fällen hatte die Knappschaft bis zum Fusionszeitpunkt keine eigenen Programme angeboten.

### 0.1. Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patienten in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patienten mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patienten und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patienten halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2005-1“, Kohorte „2005-2“, „Kohorte 2006-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt des einzelnen Teilnehmers in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1. verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2005-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc.. Zu beachten ist dabei, dass die Spaltenüberschriften sich auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patienten beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche **Kalenderhalbjahre**.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

| Eintrittszeitpunkt | Teilnehmer im Beitritts-halbjahr | Teilnehmer im 2. Halb-jahr | Teilnehmer im 3. Halb-jahr | Teilnehmer im 4. Halb-jahr | Teilnehmer im 5. Halb-jahr | Teilnehmer im 6. Halb-jahr | Teilnehmer im 7. Halb-jahr | Teilnehmer im 8. Halb-jahr | Teilnehmer im 9. Halb-jahr | Teilnehmer im 10. Halb-jahr | Teilnehmer im 11. Halb-jahr | Teilnehmer im 12. Halb-jahr | Teilnehmer im 13. Halb-jahr | Teilnehmer im 14. Halb-jahr | Teilnehmer im 15. Halb-jahr | Teilnehmer im 16. Halb-jahr |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2005-1             | Wert für 2005-1                  | Wert für 2005-2            | Wert für 2006-1            | Wert für 2006-2            | Wert für 2007-1            | Wert für 2007-2            | Wert für 2008-1            | Wert für 2008-2            | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2             | Wert für 2010-1             | Wert für 2010-2             | Wert für 2011-1             | Wert für 2011-2             | Wert für 2012-1             | ...                         |
| 2005-2             | Wert für 2005-2                  | Wert für 2006-1            | Wert für 2006-2            | Wert für 2007-1            | Wert für 2007-2            | Wert für 2008-1            | Wert für 2008-2            | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1             | Wert für 2010-2             | Wert für 2011-1             | Wert für 2011-2             | Wert für 2012-1             | ...                         |                             |
| 2006-1             | Wert für 2006-1                  | Wert für 2006-2            | Wert für 2007-1            | Wert für 2007-2            | Wert für 2008-1            | Wert für 2008-2            | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2             | Wert für 2011-1             | Wert für 2011-2             | Wert für 2012-1             | ...                         |                             |                             |
| 2006-2             | Wert für 2006-2                  | Wert für 2007-1            | Wert für 2007-2            | Wert für 2008-1            | Wert für 2008-2            | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1             | Wert für 2011-2             | Wert für 2012-1             | ...                         |                             |                             |                             |
| 2007-1             | Wert für 2007-1                  | Wert für 2007-2            | Wert für 2008-1            | Wert für 2008-2            | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2             | Wert für 2012-1             | ...                         |                             |                             |                             |                             |
| 2007-2             | Wert für 2007-2                  | Wert für 2008-1            | Wert für 2008-2            | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1             | ...                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2008-1             | Wert für 2008-1                  | Wert für 2008-2            | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1            | ...                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2008-2             | Wert für 2008-2                  | Wert für 2009-1            | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1            | ...                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2009-1             | Wert für 2009-1                  | Wert für 2009-2            | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1            | ...                        |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2009-2             | Wert für 2009-2                  | Wert für 2010-1            | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1            | ...                        |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2010-1             | Wert für 2010-1                  | Wert für 2010-2            | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1            | ...                        |                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2010-2             | Wert für 2010-2                  | Wert für 2011-1            | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1            | ...                        |                            |                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2011-1             | Wert für 2011-1                  | Wert für 2011-2            | Wert für 2012-1            | ...                        |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2011-2             | Wert für 2011-2                  | Wert für 2012-1            | ...                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2012-1             | Wert für 2012-1                  | ...                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| ...                | ...                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |



Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patienten zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte der Patient zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2005 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2005-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2005 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2005-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patienten keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patienten bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet.

Ab dem zweiten Halbjahr ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patienten aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen zu einem Ausschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patienten, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patienten in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patienten.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patienten der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“ (vgl. Tabelle 0.1.2.) oder Angaben, die nicht den Plausibilitätskriterien des BVA genügen.

Zu beachten ist weiterhin, dass im Sommer 2010 in Abstimmung mit dem BVA erstmals Regelungen getroffen wurden, die festlegen welcher Wert beim Vorliegen mehrerer Erstdokumentationen pro Halbjahr zu verwenden ist. Zudem wurden auf Basis aktualisierter BVA-Vorgaben seit Herbst 2013 – also erstmalig im vorliegenden Bericht – Anpassungen bei der Aufbereitung der Patientendaten vorgenommen (siehe Kapitel A.3 bzw. A.2).

**Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche**

| Parameter                            | definierter medizinischer Bereich* |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Größe (m)                            | ≥ 0,30 bis ≤ 2,50                  |
| Gewicht (kg)                         | ≥ 2 bis ≤ 300                      |
| RR systolisch (mmHg)                 | ≥ 30 bis ≤ 300                     |
| RR diastolisch (mmHg)                | ≥ 10 bis ≤ 200                     |
| HbA1c-Werte (%)                      | ≥ 2 bis ≤ 40                       |
| Serum-Kreatinin-Werte (μmol/l)       | ≥ 20 bis ≤ 998                     |
| Glomeruläre Filtrationsrate (ml/min) | ≥ 0,6 bis ≤ 950                    |

\*Basis: Expertenmeinungen nach Kenntnisstand Februar 2009. Wertebereiche sind vom BVA als Evaluationsgrundlage abgenommen und werden aufgrund der jeweils aktuellen Evaluationsergebnisse bei Bedarf angepasst.

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. nicht Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind. Diejenigen Patienten, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare**“ Patienten bezeichnet und in der Regel in den Tabellen gesondert ausgewiesen.<sup>3</sup> Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patienten zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

<sup>3</sup>Die „nicht auswertbaren“ Patienten ergeben sich als Differenz zwischen den „Patienten insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patienten.

**0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung**

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der Entwicklung der **HbA1c-Konzentration** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2.1). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, ist in diesem Bericht jede Tabelle mit einem entsprechenden Erläuterungstext versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patienten in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 eine Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ **Tabelle zur Entwicklung der HbA1c-Konzentration** mit der zweiten Spalte. Für jede Kohorte werden dort zunächst Angaben zu den Patienten gemacht. Zuerst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im

Berichtshalbjahr noch als Programmteilnehmer definiert werden. Die „auswertbaren“ Patienten, also diejenigen, für die im betrachteten Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorlagen, bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der mittleren patientenbezogenen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen (plausible) Werte aus beiden Halbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Das Konfidenzintervall wird ausgewiesen, indem die untere und obere Grenze durch ein Semikolon getrennt in eckigen Klammern dargestellt werden. Darüber hinaus werden Anzahl und Anteil der auswertbaren Patienten dargestellt, bei denen die Angaben zum oberen Normwert des Labors fehlten oder unplausibel waren.

**Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration**

| EZ      | Patienten und ihre HbA1c-Konzentration |                              | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr   | 4. Halbjahr   | 5. Halbjahr   | 6. Halbjahr   | 7. Halbjahr   | 8. Halbjahr   | 9. Halbjahr   | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |      |
|---------|--|------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Kohorte | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 342                    | 318            | 277           | 242           | 220           | 207           | 194           | 186           | 176           | 172               | 167               | 159               | 152               | 147               | 141               |      |
|         | auswertbar                             | Anzahl                       | 342                    | 310            | 266           | 238           | 218           | 207           | 194           | 184           | 174           | 168               | 161               | 155               | 148               | 144               | 138               |      |
|         | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,11                   | 7,69           | 7,87          | 7,69          | 7,89          | 7,82          | 7,84          | 7,85          | 7,83          | 7,78              | 7,85              | 7,75              | 7,77              | 7,74              | 7,76              |      |
|         |  | CI Mean                      | [7,91; 8,30]           | [7,53; 7,85]   | [7,68; 8,05]  | [7,52; 7,85]  | [7,69; 8,09]  | [7,63; 8,02]  | [7,64; 8,03]  | [7,64; 8,06]  | [7,62; 8,03]  | [7,59; 7,96]      | [7,65; 8,05]      | [7,59; 7,92]      | [7,60; 7,95]      | [7,57; 7,90]      | [7,58; 7,94]      |      |
|         |  | Median                       | 7,70                   | 7,50           | 7,60          | 7,60          | 7,60          | 7,60          | 7,60          | 7,60          | 7,60          | 7,60              | 7,60              | 7,70              | 7,60              | 7,70              | 7,60              | 7,60 |
|         |  | Fallbasis mittlere Differenz |                        | 310            | 266           | 238           | 218           | 207           | 194           | 184           | 174           | 168               | 161               | 155               | 148               | 144               | 138               |      |
|         |  | Mittlere Differenz zur ED    |                        | -0,33          | -0,14         | -0,18         | 0,03          | -0,05         | 0,00          | 0,05          | 0,01          | -0,01             | 0,02              | 0,00              | 0,03              | -0,01             | 0,02              |      |
|         |  | CI mittlere Differenz        |                        | [-0,48; -0,17] | [-0,32; 0,03] | [-0,37; 0,01] | [-0,17; 0,24] | [-0,27; 0,16] | [-0,21; 0,21] | [-0,19; 0,28] | [-0,22; 0,24] | [-0,24; 0,23]     | [-0,22; 0,26]     | [-0,21; 0,21]     | [-0,23; 0,29]     | [-0,28; 0,27]     | [-0,29; 0,32]     |      |
|         |  | Median mittlere Differenz    |                        | -0,10          | 0,00          | 0,00          | 0,20          | 0,00          | 0,10          | 0,10          | 0,10          | 0,30              | 0,30              | 0,20              | 0,30              | 0,25              | 0,20              |      |
|         | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 292                    | 281            | 246           | 214           | 195           | 183           | 174           | 167           | 167           | 160               | 151               | 145               | 141               | 139               | 136               | 129  |
|         | auswertbar                             | Anzahl                       | 292                    | 277            | 224           | 210           | 194           | 181           | 169           | 165           | 156           | 147               | 143               | 139               | 135               | 129               | 125               |      |
|         | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 7,87                   | 7,78           | 7,83          | 7,75          | 7,81          | 7,85          | 7,89          | 7,85          | 7,88          | 7,94              | 7,84              | 7,95              | 7,89              | 7,93              | 7,95              |      |
|         |  | CI Mean                      | [7,69; 8,04]           | [7,62; 7,93]   | [7,65; 8,01]  | [7,58; 7,92]  | [7,63; 8,00]  | [7,69; 8,02]  | [7,72; 8,06]  | [7,68; 8,02]  | [7,70; 8,06]  | [7,76; 8,13]      | [7,67; 8,02]      | [7,75; 8,14]      | [7,71; 8,07]      | [7,73; 8,12]      | [7,75; 8,14]      |      |
|         |  | Median                       | 7,70                   | 7,70           | 7,60          | 7,60          | 7,60          | 7,70          | 7,70          | 7,70          | 7,80          | 7,70              | 7,70              | 7,60              | 7,80              | 7,80              | 7,80              |      |
|         |  | Fallbasis mittlere Differenz |                        | 277            | 224           | 210           | 194           | 181           | 169           | 165           | 156           | 147               | 143               | 139               | 135               | 129               | 125               |      |
|         |  | Mittlere Differenz zur ED    |                        | -0,09          | 0,02          | 0,02          | 0,12          | 0,17          | 0,18          | 0,16          | 0,19          | 0,28              | 0,18              | 0,31              | 0,27              | 0,28              | 0,31              |      |
|         |  | CI mittlere Differenz        |                        | [-0,23; 0,04]  | [-0,14; 0,19] | [-0,17; 0,21] | [-0,06; 0,30] | [-0,02; 0,37] | [-0,01; 0,37] | [-0,03; 0,35] | [0,00; 0,39]  | [0,06; 0,49]      | [-0,03; 0,39]     | [0,09; 0,53]      | [0,03; 0,51]      | [0,04; 0,53]      | [0,07; 0,54]      |      |
|         |  | Median mittlere Differenz    |                        | 0,00           | 0,10          | 0,10          | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,30          | 0,20          | 0,30              | 0,30              | 0,40              | 0,30              | 0,40              | 0,40              |      |

### 0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Kollektive

Bei der tabellarischen Darstellung wird nicht nur danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patienten dem DMP beigetreten sind, sondern – in den Tabellen zu Patientenmerkmalen und -zahlen – auch nach Frauen und Männern sowie nach Altersgruppen. Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach Patientenkollektiven.

Für einen Teil der Tabellen wird demzufolge nach „**Kollektiven**“ unterschieden. Die sich hierdurch ergebenden Gruppierungen unterliegen entweder besonderen Risiken (z.B. Raucherstatus) oder weisen bestimmte Begleiterkrankungen auf, die spezifische Therapien erfordern (z.B. Hypertoniker). Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei der zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt wiederum unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. So wird beispielsweise ein Patient dem Kollektiv der Raucher zugeordnet, wenn in der Erstdokumentation der entsprechende Raucherstatus vermerkt ist. Der Patient bleibt dann – sofern er nicht aus dem DMP ausscheidet – über den gesamten Berichtszeitraum hinweg Mitglied des Raucherkollektivs, selbst wenn er noch innerhalb dieses Zeitraums mit dem Rauchen aufhört.

Wenn die Patientenzahl bzw. die Gruppe der auswertbaren Patienten oder ein Kollektiv in einer Kohorte im jeweiligen Berichtshalbjahr kleiner als 10 ist, wird aus Datenschutzgründen auf den Ausweis von Ergebnissen verzichtet. Die entsprechenden Tabellen bzw. Halbjahre sind dann leer bzw. ausgestrichelt.

## Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte

### Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden fünf Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

**Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung**

| EZ       | Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung |                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |       |
|----------|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 2005-1   | <b>Patienten insgesamt</b>                | Anzahl                     | 634                    | 599         | 523         | 456         | 415         | 390         | 368         | 353         | 336         | 323               | 312               | 300               | 291               | 283               | 270               |       |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 342                    | 318         | 277         | 242         | 220         | 207         | 194         | 186         | 176         | 172               | 167               | 159               | 152               | 147               | 141               | 141   |
|          |   | Anteil in %                | 53,94                  | 53,09       | 52,96       | 53,07       | 53,01       | 53,08       | 52,72       | 52,69       | 52,38       | 53,25             | 53,53             | 53,00             | 52,23             | 51,94             | 52,22             | 52,22 |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 292                    | 281         | 246         | 214         | 195         | 183         | 174         | 167         | 160         | 151               | 145               | 141               | 139               | 136               | 129               | 129   |
|          |   | Anteil in %                | 46,06                  | 46,91       | 47,04       | 46,93       | 46,99       | 46,92       | 47,28       | 47,31       | 47,62       | 46,75             | 46,47             | 47,00             | 47,77             | 48,06             | 47,78             | 47,78 |
|          | 2005-2                                    | <b>Patienten insgesamt</b> | Anzahl                 | 4059        | 3718        | 3296        | 3008        | 2824        | 2682        | 2548        | 2443        | 2335              | 2220              | 2121              | 2056              | 1973              | 1889              | 1889  |
| männlich |   | Anzahl                     | 2287                   | 2094        | 1857        | 1690        | 1582        | 1510        | 1432        | 1368        | 1309        | 1254              | 1185              | 1153              | 1103              | 1050              | 1050              | 1050  |
|          |   | Anteil in %                | 56,34                  | 56,32       | 56,34       | 56,18       | 56,02       | 56,30       | 56,20       | 56,00       | 56,06       | 56,49             | 55,87             | 56,08             | 55,90             | 55,58             | 55,58             | 55,58 |
| weiblich |   | Anzahl                     | 1772                   | 1624        | 1439        | 1318        | 1242        | 1172        | 1116        | 1075        | 1026        | 966               | 936               | 903               | 870               | 839               | 839               | 839   |
|          |   | Anteil in %                | 43,66                  | 43,68       | 43,66       | 43,82       | 43,98       | 43,70       | 43,80       | 44,00       | 43,94       | 43,51             | 44,13             | 43,92             | 44,10             | 44,42             | 44,42             | 44,42 |
| 2006-1   |   | <b>Patienten insgesamt</b> | Anzahl                 | 4004        | 3597        | 3136        | 2864        | 2642        | 2513        | 2386        | 2216        | 2082              | 1974              | 1883              | 1781              | 1679              | 1679              | 1679  |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 2245                   | 2019        | 1756        | 1611        | 1483        | 1408        | 1329        | 1225        | 1149        | 1090              | 1039              | 984               | 932               | 932               | 932               | 932   |
|          |   | Anteil in %                | 56,07                  | 56,13       | 55,99       | 56,25       | 56,13       | 56,03       | 55,70       | 55,28       | 55,19       | 55,22             | 55,18             | 55,25             | 55,51             | 55,51             | 55,51             | 55,51 |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 1759                   | 1578        | 1380        | 1253        | 1159        | 1105        | 1057        | 991         | 933         | 884               | 844               | 797               | 747               | 747               | 747               | 747   |
|          |   | Anteil in %                | 43,93                  | 43,87       | 44,01       | 43,75       | 43,87       | 43,97       | 44,30       | 44,72       | 44,81       | 44,78             | 44,82             | 44,75             | 44,49             | 44,49             | 44,49             | 44,49 |
|          | 2006-2                                    | <b>Patienten insgesamt</b> | Anzahl                 | 5400        | 4798        | 4268        | 3932        | 3691        | 3479        | 3229        | 3023        | 2868              | 2712              | 2581              | 2456              | 2456              | 2456              | 2456  |
| männlich |   | Anzahl                     | 3054                   | 2707        | 2393        | 2179        | 2052        | 1924        | 1796        | 1691        | 1605        | 1506              | 1434              | 1366              | 1366              | 1366              | 1366              | 1366  |
|          |   | Anteil in %                | 56,56                  | 56,42       | 56,07       | 55,42       | 55,59       | 55,30       | 55,62       | 55,94       | 55,96       | 55,53             | 55,56             | 55,62             | 55,62             | 55,62             | 55,62             | 55,62 |
| weiblich |   | Anzahl                     | 2346                   | 2091        | 1875        | 1753        | 1639        | 1555        | 1433        | 1332        | 1263        | 1206              | 1147              | 1090              | 1090              | 1090              | 1090              | 1090  |
|          |   | Anteil in %                | 43,44                  | 43,58       | 43,93       | 44,58       | 44,41       | 44,70       | 44,38       | 44,06       | 44,04       | 44,47             | 44,44             | 44,38             | 44,38             | 44,38             | 44,38             | 44,38 |
| 2007-1   |   | <b>Patienten insgesamt</b> | Anzahl                 | 11836       | 10790       | 9810        | 9193        | 8670        | 8174        | 7737        | 7364        | 7031              | 6740              | 6466              | 6466              | 6466              | 6466              | 6466  |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 6522                   | 5910        | 5338        | 4997        | 4736        | 4458        | 4205        | 4002        | 3822        | 3669              | 3522              | 3522              | 3522              | 3522              | 3522              | 3522  |
|          |   | Anteil in %                | 55,10                  | 54,77       | 54,41       | 54,36       | 54,63       | 54,54       | 54,35       | 54,35       | 54,35       | 54,36             | 54,44             | 54,47             | 54,47             | 54,47             | 54,47             | 54,47 |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 5314                   | 4880        | 4472        | 4196        | 3934        | 3716        | 3532        | 3362        | 3209        | 3071              | 2944              | 2944              | 2944              | 2944              | 2944              | 2944  |
|          |   | Anteil in %                | 44,90                  | 45,23       | 45,59       | 45,64       | 45,37       | 45,46       | 45,65       | 45,65       | 45,65       | 45,64             | 45,56             | 45,53             | 45,53             | 45,53             | 45,53             | 45,53 |
|          | 2007-2                                    | <b>Patienten insgesamt</b> | Anzahl                 | 7873        | 6983        | 6342        | 5772        | 5229        | 4846        | 4557        | 4309        | 4084              | 3897              | 3897              | 3897              | 3897              | 3897              | 3897  |
| männlich |   | Anzahl                     | 4414                   | 3892        | 3512        | 3195        | 2899        | 2676        | 2514        | 2368        | 2249        | 2141              | 2141              | 2141              | 2141              | 2141              | 2141              | 2141  |
|          |   | Anteil in %                | 56,07                  | 55,74       | 55,38       | 55,35       | 55,44       | 55,22       | 55,17       | 54,95       | 55,07       | 54,94             | 54,94             | 54,94             | 54,94             | 54,94             | 54,94             | 54,94 |
| weiblich |   | Anzahl                     | 3459                   | 3091        | 2830        | 2577        | 2330        | 2170        | 2043        | 1941        | 1835        | 1756              | 1756              | 1756              | 1756              | 1756              | 1756              | 1756  |
|          |   | Anteil in %                | 43,93                  | 44,26       | 44,62       | 44,65       | 44,56       | 44,78       | 44,83       | 45,05       | 44,93       | 45,06             | 45,06             | 45,06             | 45,06             | 45,06             | 45,06             | 45,06 |
| 2008-1   |   | <b>Patienten insgesamt</b> | Anzahl                 | 7378        | 6560        | 5886        | 5233        | 4773        | 4431        | 4108        | 3880        | 3696              | 3696              | 3696              | 3696              | 3696              | 3696              | 3696  |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 4190                   | 3689        | 3307        | 2914        | 2653        | 2459        | 2274        | 2144        | 2046        | 2046              | 2046              | 2046              | 2046              | 2046              | 2046              | 2046  |
|          |   | Anteil in %                | 56,79                  | 56,23       | 56,18       | 55,69       | 55,58       | 55,50       | 55,36       | 55,26       | 55,36       | 55,36             | 55,36             | 55,36             | 55,36             | 55,36             | 55,36             | 55,36 |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 3188                   | 2871        | 2579        | 2319        | 2120        | 1972        | 1834        | 1736        | 1650        | 1650              | 1650              | 1650              | 1650              | 1650              | 1650              | 1650  |
|          |   | Anteil in %                | 43,21                  | 43,77       | 43,82       | 44,31       | 44,42       | 44,50       | 44,64       | 44,74       | 44,74       | 44,64             | 44,64             | 44,64             | 44,64             | 44,64             | 44,64             | 44,64 |
|          | 2008-2                                    | <b>Patienten insgesamt</b> | Anzahl                 | 4992        | 4343        | 3768        | 3328        | 3028        | 2803        | 2629        | 2472        | 2472              | 2472              | 2472              | 2472              | 2472              | 2472              | 2472  |
| männlich |   | Anzahl                     | 2893                   | 2495        | 2153        | 1904        | 1738        | 1605        | 1505        | 1412        | 1412        | 1412              | 1412              | 1412              | 1412              | 1412              | 1412              | 1412  |
|          |   | Anteil in %                | 57,95                  | 57,45       | 57,14       | 57,21       | 57,40       | 57,26       | 57,25       | 57,12       | 57,12       | 57,12             | 57,12             | 57,12             | 57,12             | 57,12             | 57,12             | 57,12 |
| weiblich |   | Anzahl                     | 2099                   | 1848        | 1615        | 1424        | 1290        | 1198        | 1124        | 1060        | 1060        | 1060              | 1060              | 1060              | 1060              | 1060              | 1060              | 1060  |
|          |   | Anteil in %                | 42,05                  | 42,55       | 42,86       | 42,79       | 42,60       | 42,74       | 42,75       | 42,88       | 42,88       | 42,88             | 42,88             | 42,88             | 42,88             | 42,88             | 42,88             | 42,88 |

| EZ       | Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung |                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----------|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-1   | <b>Patienten insgesamt</b>                |                            | Anzahl                 | 5635        | 4855        | 4221        | 3772        | 3467        | 3190        | 2965        |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 3215                   | 2781        | 2408        | 2143        | 1971        | 1823        | 1697        |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 57,05                  | 57,28       | 57,05       | 56,81       | 56,85       | 57,15       | 57,23       |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 2420                   | 2074        | 1813        | 1629        | 1496        | 1367        | 1268        |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 42,95                  | 42,72       | 42,95       | 43,19       | 43,15       | 42,85       | 42,77       |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | 2009-2                                    | <b>Patienten insgesamt</b> |                        | Anzahl      | 4856        | 4142        | 3586        | 3188        | 2893        | 2697        |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männlich |   | Anzahl                     | 2729                   | 2303        | 1970        | 1730        | 1565        | 1452        |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 56,20                  | 55,60       | 54,94       | 54,27       | 54,10       | 53,84       |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| weiblich |   | Anzahl                     | 2127                   | 1839        | 1616        | 1458        | 1328        | 1245        |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 43,80                  | 44,40       | 45,06       | 45,73       | 45,90       | 46,16       |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-1   |   | <b>Patienten insgesamt</b> |                        | Anzahl      | 5199        | 4388        | 3797        | 3400        | 3112        |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 3025                   | 2538        | 2206        | 1972        | 1813        |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 58,18                  | 57,84       | 58,10       | 58,00       | 58,26       |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 2174                   | 1850        | 1591        | 1428        | 1299        |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 41,82                  | 42,16       | 41,90       | 42,00       | 41,74       |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | 2010-2                                    | <b>Patienten insgesamt</b> |                        | Anzahl      | 5398        | 4647        | 4016        | 3597        |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männlich |   | Anzahl                     | 3086                   | 2626        | 2248        | 2023        |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 57,17                  | 56,51       | 55,98       | 56,24       |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| weiblich |   | Anzahl                     | 2312                   | 2021        | 1768        | 1574        |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 42,83                  | 43,49       | 44,02       | 43,76       |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-1   |   | <b>Patienten insgesamt</b> |                        | Anzahl      | 5528        | 4757        | 4078        |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 3146                   | 2666        | 2269        |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 56,91                  | 56,04       | 55,64       |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 2382                   | 2091        | 1809        |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 43,09                  | 43,96       | 44,36       |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | 2011-2                                    | <b>Patienten insgesamt</b> |                        | Anzahl      | 5303        | 4565        |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männlich |   | Anzahl                     | 3031                   | 2602        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 57,16                  | 57,00       |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| weiblich |   | Anzahl                     | 2272                   | 1963        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 42,84                  | 43,00       |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2012-1   |   | <b>Patienten insgesamt</b> |                        | Anzahl      | 5917        |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | männlich                                  | Anzahl                     | 3423                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 57,85                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          | weiblich                                  | Anzahl                     | 2494                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|          |   | Anteil in %                | 42,15                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

Tabelle 1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Kranken-

kasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

**Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)**

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

| EZ  | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-<br>halbjahr                   | 2. Halbjahr  | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                |
|---|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2005-1                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                                   | 24           | 65             | 100            | 122            | 135            | 148            | 156            | 166            | 170               | 175               | 183               | 190               | 195               | 201               | 209            |
|   |  | Anteil in %                              | 7,02         | 19,01          | 29,24          | 35,67          | 39,47          | 43,27          | 45,61          | 48,54          | 49,71             | 51,17             | 53,51             | 55,56             | 57,02             | 58,77             | 61,11          |
|   |  | CI Anteil in %                           | [4,31; 9,73] | [14,84; 23,17] | [24,41; 34,07] | [30,59; 40,76] | [34,29; 44,66] | [38,02; 48,53] | [40,33; 50,90] | [43,23; 53,84] | [44,40; 55,01]    | [45,86; 56,48]    | [48,21; 58,80]    | [50,28; 60,83]    | [51,76; 62,27]    | [53,55; 64,00]    | [55,94; 66,29] |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                                   | 0            | 1              | 3              | 3              | 4              | 4              | 5              | 7              | 7                 | 7                 | 10                | 12                | 13                | 15                | 18             |
|   |  | Anteil in %                              | 0,00         | 0,29           | 0,88           | 0,88           | 1,17           | 1,17           | 1,46           | 2,05           | 2,05              | 2,05              | 2,92              | 3,51              | 3,80              | 4,39              | 5,26           |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                                   | 18           | 49             | 79             | 94             | 98             | 109            | 112            | 116            | 118               | 119               | 121               | 125               | 126               | 128               | 131            |
|   |  | Anteil in %                              | 5,26         | 14,33          | 23,10          | 27,49          | 28,65          | 31,87          | 32,75          | 33,92          | 34,50             | 34,80             | 35,38             | 36,55             | 36,84             | 37,43             | 38,30          |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                                   | 4            | 12             | 15             | 20             | 26             | 28             | 30             | 31             | 32                | 36                | 39                | 40                | 41                | 43                | 44             |
|   |  | Anteil in %                              | 1,17         | 3,51           | 4,39           | 5,85           | 7,60           | 8,19           | 8,77           | 9,06           | 9,36              | 10,53             | 11,40             | 11,70             | 11,99             | 12,57             | 12,87          |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                                   | 2            | 3              | 3              | 5              | 7              | 7              | 9              | 12             | 13                | 13                | 13                | 13                | 15                | 15                | 16             |
|   |  | Anteil in %                              | 0,58         | 0,88           | 0,88           | 1,46           | 2,05           | 2,05           | 2,63           | 3,51           | 3,80              | 3,80              | 3,80              | 3,80              | 4,39              | 4,39              | 4,68           |
|   | männl. Pat. <i>zu Beginn des Halbjahres</i>                                | Anzahl                                   | 342          | 318            | 277            | 242            | 220            | 207            | 194            | 186            | 176               | 172               | 167               | 159               | 152               | 147               | 141            |
|   |  | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i> | Anzahl       | 318            | 277            | 242            | 220            | 207            | 194            | 186            | 176               | 172               | 167               | 159               | 152               | 147               | 141            |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                                   | 11           | 46             | 78             | 97             | 109            | 118            | 125            | 132            | 141               | 147               | 151               | 153               | 156               | 163               | 167            |
|   |  | Anteil in %                              | 3,77         | 15,75          | 26,71          | 33,22          | 37,33          | 40,41          | 42,81          | 45,21          | 48,29             | 50,34             | 51,71             | 52,40             | 53,42             | 55,82             | 57,19          |
|   |  | CI Anteil in %                           | [1,58; 5,95] | [11,57; 19,94] | [21,63; 31,80] | [27,81; 38,63] | [31,77; 42,89] | [34,77; 46,05] | [37,12; 48,49] | [39,49; 50,92] | [42,55; 54,03]    | [44,60; 56,09]    | [45,97; 57,45]    | [46,66; 58,14]    | [47,69; 59,16]    | [50,12; 61,53]    | [51,51; 62,88] |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                                   | 0            | 2              | 4              | 6              | 7              | 9              | 9              | 10             | 10                | 11                | 11                | 11                | 12                | 12                | 12             |
|   |  | Anteil in %                              | 0,00         | 0,68           | 1,37           | 2,05           | 2,40           | 3,08           | 3,08           | 3,42           | 3,42              | 3,77              | 3,77              | 3,77              | 4,11              | 4,11              | 4,11           |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                                   | 10           | 37             | 62             | 75             | 80             | 85             | 88             | 93             | 98                | 100               | 104               | 106               | 108               | 109               | 110            |
|   |  | Anteil in %                              | 3,42         | 12,67          | 21,23          | 25,68          | 27,40          | 29,11          | 30,14          | 31,85          | 33,56             | 34,25             | 35,62             | 36,30             | 36,99             | 37,33             | 37,67          |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 0  | 5            | 10             | 13             | 19             | 21             | 24             | 24             | 28             | 31                | 31                | 31                | 31                | 35                | 38                |                |
|   | Anteil in %  | 0,00                                     | 1,71         | 3,42           | 4,45           | 6,51           | 7,19           | 8,22           | 8,22           | 9,59           | 10,62             | 10,62             | 10,62             | 10,62             | 11,99             | 13,01             |                |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 1  | 2            | 2              | 3              | 3              | 3              | 4              | 5              | 5              | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 | 7                 | 7                 |                |
|   | Anteil in %  | 0,34                                     | 0,68         | 0,68           | 1,03           | 1,03           | 1,03           | 1,37           | 1,71           | 1,71           | 1,71              | 1,71              | 1,71              | 1,71              | 2,40              | 2,40              |                |
| weibl. Pat. <i>zu Beginn des Halbjahres</i> | Anzahl   | 292                                      | 281          | 246            | 214            | 195            | 183            | 174            | 167            | 160            | 151               | 145               | 141               | 139               | 136               | 129               |                |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | Anzahl                                   | 281          | 246            | 214            | 195            | 183            | 174            | 167            | 160            | 151               | 145               | 139               | 136               | 129               | 125               |                |

| EZ  | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-halbjahr                       | 2. Halbjahr   | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |
|---|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-2                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                                   | 193           | 430            | 597            | 705            | 777            | 855            | 919            | 978            | 1033           | 1102           | 1134           | 1184           | 1237           | 1272           |
|   |  | Anteil in %                              | 8,44          | 18,80          | 26,10          | 30,83          | 33,97          | 37,39          | 40,18          | 42,76          | 45,17          | 48,19          | 49,58          | 51,77          | 54,09          | 55,62          |
|   |  | CI Anteil in %                           | [7,30; 9,58]  | [17,20; 20,40] | [24,30; 27,90] | [28,93; 32,72] | [32,03; 35,92] | [35,40; 39,37] | [38,17; 42,19] | [40,74; 44,79] | [43,13; 47,21] | [46,14; 50,23] | [47,53; 51,63] | [49,72; 53,82] | [52,05; 56,13] | [53,58; 57,66] |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                                   | 5             | 20             | 33             | 53             | 66             | 77             | 91             | 103            | 113            | 127            | 137            | 157            | 172            | 183            |
|   |  | Anteil in %                              | 0,22          | 0,87           | 1,44           | 2,32           | 2,89           | 3,37           | 3,98           | 4,50           | 4,94           | 5,55           | 5,99           | 6,86           | 7,52           | 8,00           |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                                   | 160           | 296            | 393            | 432            | 453            | 477            | 498            | 521            | 542            | 576            | 588            | 609            | 627            | 634            |
|   |  | Anteil in %                              | 7,00          | 12,94          | 17,18          | 18,89          | 19,81          | 20,86          | 21,78          | 22,78          | 23,70          | 25,19          | 25,71          | 26,63          | 27,42          | 27,72          |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                                   | 26            | 73             | 111            | 152            | 177            | 203            | 224            | 242            | 257            | 271            | 278            | 281            | 297            | 308            |
|   |  | Anteil in %                              | 1,14          | 3,19           | 4,85           | 6,65           | 7,74           | 8,88           | 9,79           | 10,58          | 11,24          | 11,85          | 12,16          | 12,29          | 12,99          | 13,47          |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                                   | 2             | 41             | 60             | 68             | 81             | 98             | 106            | 112            | 121            | 128            | 131            | 137            | 141            | 147            |
|   |  | Anteil in %                              | 0,09          | 1,79           | 2,62           | 2,97           | 3,54           | 4,29           | 4,63           | 4,90           | 5,29           | 5,60           | 5,73           | 5,99           | 6,17           | 6,43           |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>                            | <i>2287</i>   | <i>2094</i>    | <i>1857</i>    | <i>1690</i>    | <i>1582</i>    | <i>1510</i>    | <i>1432</i>    | <i>1368</i>    | <i>1309</i>    | <i>1254</i>    | <i>1185</i>    | <i>1153</i>    | <i>1103</i>    | <i>1050</i>    |
|   |  | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i> | <i>2094</i>   | <i>1857</i>    | <i>1690</i>    | <i>1582</i>    | <i>1510</i>    | <i>1432</i>    | <i>1368</i>    | <i>1309</i>    | <i>1254</i>    | <i>1185</i>    | <i>1153</i>    | <i>1103</i>    | <i>1050</i>    | <i>1015</i>    |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                                   | 148           | 333            | 454            | 530            | 600            | 656            | 697            | 746            | 806            | 836            | 869            | 902            | 933            | 973            |
|   |  | Anteil in %                              | 8,35          | 18,79          | 25,62          | 29,91          | 33,86          | 37,02          | 39,33          | 42,10          | 45,49          | 47,18          | 49,04          | 50,90          | 52,65          | 54,91          |
|   |  | CI Anteil in %                           | [7,06; 9,64]  | [16,97; 20,61] | [23,59; 27,65] | [27,78; 32,04] | [31,66; 36,06] | [34,77; 39,27] | [37,06; 41,61] | [39,80; 44,40] | [43,17; 47,80] | [44,85; 49,50] | [46,71; 51,37] | [48,57; 53,23] | [50,33; 54,98] | [52,59; 57,23] |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                                   | 3             | 10             | 18             | 33             | 42             | 52             | 62             | 70             | 79             | 82             | 86             | 91             | 97             | 109            |
|   |  | Anteil in %                              | 0,17          | 0,56           | 1,02           | 1,86           | 2,37           | 2,93           | 3,50           | 3,95           | 4,46           | 4,63           | 4,85           | 5,14           | 5,47           | 6,15           |
| davon wegen Ausschluss                      | Anzahl   | 119                                      | 226           | 299            | 330            | 356            | 377            | 393            | 410            | 429            | 440            | 455            | 468            | 478            | 486            |                |
|   | Anteil in %  | 6,72                                     | 12,75         | 16,87          | 18,62          | 20,09          | 21,28          | 22,18          | 23,14          | 24,21          | 24,83          | 25,68          | 26,41          | 26,98          | 27,43          |                |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 22                                       | 61            | 88             | 112            | 136            | 147            | 157            | 173            | 197            | 209            | 218            | 226            | 232            | 247            |                |
|   | Anteil in %  | 1,24                                     | 3,44          | 4,97           | 6,32           | 7,67           | 8,30           | 8,86           | 9,76           | 11,12          | 11,79          | 12,30          | 12,75          | 13,09          | 13,94          |                |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 4  | 36            | 49             | 55             | 66             | 80             | 85             | 93             | 101            | 105            | 110            | 117            | 126            | 131            |                |
|   | Anteil in %  | 0,23                                     | 2,03          | 2,77           | 3,10           | 3,72           | 4,51           | 4,80           | 5,25           | 5,70           | 5,93           | 6,21           | 6,60           | 7,11           | 7,39           |                |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1772</i>                              | <i>1624</i>   | <i>1439</i>    | <i>1318</i>    | <i>1242</i>    | <i>1172</i>    | <i>1116</i>    | <i>1075</i>    | <i>1026</i>    | <i>966</i>     | <i>936</i>     | <i>903</i>     | <i>870</i>     | <i>839</i>     |                |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>1624</i>                              | <i>1439</i>   | <i>1318</i>    | <i>1242</i>    | <i>1172</i>    | <i>1116</i>    | <i>1075</i>    | <i>1026</i>    | <i>966</i>     | <i>936</i>     | <i>903</i>     | <i>870</i>     | <i>839</i>     | <i>799</i>     |                |
| 2006-1                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                                   | 226           | 489            | 634            | 762            | 837            | 916            | 1020           | 1096           | 1155           | 1206           | 1261           | 1313           | 1351           |                |
|   |  | Anteil in %                              | 10,07         | 21,78          | 28,24          | 33,94          | 37,28          | 40,80          | 45,43          | 48,82          | 51,45          | 53,72          | 56,17          | 58,49          | 60,18          |                |
|   |  | CI Anteil in %                           | [8,82; 11,31] | [20,07; 23,49] | [26,38; 30,10] | [31,98; 35,90] | [35,28; 39,28] | [38,77; 42,84] | [43,37; 47,49] | [46,75; 50,89] | [49,38; 53,52] | [51,66; 55,78] | [54,12; 58,22] | [56,45; 60,52] | [58,15; 62,20] |                |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                                   | 5             | 18             | 27             | 38             | 45             | 54             | 62             | 75             | 84             | 93             | 102            | 109            | 121            |                |
|   |  | Anteil in %                              | 0,22          | 0,80           | 1,20           | 1,69           | 2,00           | 2,41           | 2,76           | 3,34           | 3,74           | 4,14           | 4,54           | 4,86           | 5,39           |                |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                                   | 181           | 347            | 427            | 481            | 511            | 554            | 598            | 635            | 671            | 700            | 734            | 763            | 776            |                |
|   |  | Anteil in %                              | 8,06          | 15,46          | 19,02          | 21,43          | 22,76          | 24,68          | 26,64          | 28,29          | 29,89          | 31,18          | 32,69          | 33,99          | 34,57          |                |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                                   | 31            | 97             | 144            | 196            | 221            | 244            | 292            | 315            | 325            | 334            | 343            | 358            | 368            |                |
|   |  | Anteil in %                              | 1,38          | 4,32           | 6,41           | 8,73           | 9,84           | 10,87          | 13,01          | 14,03          | 14,48          | 14,88          | 15,28          | 15,95          | 16,39          |                |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                                   | 9             | 27             | 36             | 47             | 60             | 64             | 68             | 71             | 75             | 79             | 82             | 83             | 86             |                |
|   |  | Anteil in %                              | 0,40          | 1,20           | 1,60           | 2,09           | 2,67           | 2,85           | 3,03           | 3,16           | 3,34           | 3,52           | 3,65           | 3,70           | 3,83           |                |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>                            | <i>2245</i>   | <i>2019</i>    | <i>1756</i>    | <i>1611</i>    | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>     |                |
|   |  | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i> | <i>2019</i>   | <i>1756</i>    | <i>1611</i>    | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>     | <i>894</i>     |                |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                                   | 181           | 379            | 506            | 600            | 654            | 702            | 768            | 826            | 875            | 915            | 962            | 1012           | 1033           |                |
|   |  | Anteil in %                              | 10,29         | 21,55          | 28,77          | 34,11          | 37,18          | 39,91          | 43,66          | 46,96          | 49,74          | 52,02          | 54,69          | 57,53          | 58,73          |                |
|   |  | CI Anteil in %                           | [8,87; 11,71] | [19,62; 23,47] | [26,65; 30,88] | [31,89; 36,33] | [34,92; 39,44] | [37,62; 42,20] | [41,34; 45,98] | [44,63; 49,29] | [47,41; 52,08] | [49,68; 54,35] | [52,36; 57,02] | [55,22; 59,84] | [56,43; 61,03] |                |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                                   | 2             | 7              | 14             | 24             | 29             | 36             | 42             | 46             | 54             | 61             | 66             | 77             | 81             |                |
|   |  | Anteil in %                              | 0,11          | 0,40           | 0,80           | 1,36           | 1,65           | 2,05           | 2,39           | 2,62           | 3,07           | 3,47           | 3,75           | 4,38           | 4,60           |                |
| davon wegen Ausschluss                      | Anzahl   | 136                                      | 255           | 311            | 357            | 375            | 397            | 427            | 453            | 476            | 497            | 526            | 550            | 560            |                |                |
|   | Anteil in %  | 7,73                                     | 14,50         | 17,68          | 20,30          | 21,32          | 22,57          | 24,28          | 25,75          | 27,06          | 28,25          | 29,90          | 31,27          | 31,84          |                |                |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 35                                       | 90            | 143            | 177            | 195            | 209            | 234            | 257            | 270            | 281            | 288            | 301            | 307            |                |                |
|   | Anteil in %  | 1,99                                     | 5,12          | 8,13           | 10,06          | 11,09          | 11,88          | 13,30          | 14,61          | 15,35          | 15,97          | 16,37          | 17,11          | 17,45          |                |                |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 8  | 27            | 38             | 42             | 55             | 60             | 65             | 70             | 75             | 76             | 82             | 84             | 85             |                |                |
|   | Anteil in %  | 0,45                                     | 1,53          | 2,16           | 2,39           | 3,13           | 3,41           | 3,70           | 3,98           | 4,26           | 4,32           | 4,66           | 4,78           | 4,83           |                |                |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1759</i>                              | <i>1578</i>   | <i>1380</i>    | <i>1253</i>    | <i>1159</i>    | <i>1105</i>    | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     |                |                |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>1578</i>                              | <i>1380</i>   | <i>1253</i>    | <i>1159</i>    | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     | <i>726</i>     |                |                |



| EZ  | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |      |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 2006-2  | ausgeschiedene männliche Patienten<br>insgesamt                            | Anzahl                   | 347               | 661               | 875               | 1002              | 1130              | 1258              | 1363              | 1449              | 1548              | 1620              | 1688              | 1739              |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 11,36             | 21,64             | 28,65             | 32,81             | 37,00             | 41,19             | 44,63             | 47,45             | 50,69             | 53,05             | 55,27             | 56,94             |                   |                   |      |
|   |  | CI Anteil in %           | [10,24;<br>12,49] | [20,18;<br>23,10] | [27,05;<br>30,25] | [31,14;<br>34,47] | [35,29;<br>38,71] | [39,45;<br>42,94] | [42,87;<br>46,39] | [45,67;<br>49,22] | [48,91;<br>52,46] | [51,27;<br>54,82] | [53,51;<br>57,04] | [55,19;<br>58,70] |                   |                   |      |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                   | 4                 | 17                | 31                | 42                | 59                | 74                | 90                | 102               | 115               | 125               | 128               | 135               |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 0,13              | 0,56              | 1,02              | 1,38              | 1,93              | 2,42              | 2,95              | 3,34              | 3,77              | 4,09              | 4,19              | 4,42              |                   |                   |      |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                   | 288               | 486               | 603               | 670               | 738               | 808               | 860               | 913               | 976               | 1023              | 1070              | 1097              |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 9,43              | 15,91             | 19,74             | 21,94             | 24,17             | 26,46             | 28,16             | 29,90             | 31,96             | 33,50             | 35,04             | 35,92             |                   |                   |      |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                   | 49                | 133               | 196               | 231               | 261               | 292               | 321               | 333               | 351               | 362               | 373               | 385               |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 1,60              | 4,35              | 6,42              | 7,56              | 8,55              | 9,56              | 10,51             | 10,90             | 11,49             | 11,85             | 12,21             | 12,61             |                   |                   |      |
|   | davon aus sonstigem oder<br>unbekanntem Grund                              | Anzahl                   | 6                 | 25                | 45                | 59                | 72                | 84                | 92                | 101               | 106               | 110               | 117               | 122               |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 0,20              | 0,82              | 1,47              | 1,93              | 2,36              | 2,75              | 3,01              | 3,31              | 3,47              | 3,60              | 3,83              | 3,99              |                   |                   |      |
|   | männl. Pat.<br>insgesamt:  | zu Beginn des Halbjahres | Anzahl            | 3054              | 2707              | 2393              | 2179              | 2052              | 1924              | 1796              | 1691              | 1605              | 1506              | 1434              | 1366              | 1366              | 1366 |
|   |  | am Ende des Halbjahres   | Anzahl            | 2707              | 2393              | 2179              | 2052              | 1924              | 1796              | 1691              | 1605              | 1506              | 1434              | 1366              | 1315              |                   |      |
|   | ausgeschiedene weibliche Patienten<br>insgesamt                            | Anzahl                   | 255               | 471               | 593               | 707               | 791               | 913               | 1014              | 1083              | 1140              | 1199              | 1256              | 1290              |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 10,87             | 20,08             | 25,28             | 30,14             | 33,72             | 38,92             | 43,22             | 46,16             | 48,59             | 51,11             | 53,54             | 54,99             |                   |                   |      |
|   |  | CI Anteil in %           | [9,61;<br>12,13]  | [18,46;<br>21,70] | [23,52;<br>27,04] | [28,28;<br>31,99] | [31,80;<br>35,63] | [36,94;<br>40,89] | [41,22;<br>45,23] | [44,15;<br>48,18] | [46,57;<br>50,62] | [49,09;<br>53,13] | [51,52;<br>55,56] | [52,97;<br>57,00] |                   |                   |      |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                   | 4                 | 11                | 14                | 22                | 29                | 38                | 45                | 50                | 58                | 64                | 71                | 77                |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 0,17              | 0,47              | 0,60              | 0,94              | 1,24              | 1,62              | 1,92              | 2,13              | 2,47              | 2,73              | 3,03              | 3,28              |                   |                   |      |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                   | 198               | 333               | 399               | 449               | 492               | 548               | 610               | 657               | 692               | 728               | 759               | 776               |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 8,44              | 14,19             | 17,01             | 19,14             | 20,97             | 23,36             | 26,00             | 28,01             | 29,50             | 31,03             | 32,35             | 33,08             |                   |                   |      |
| davon wegen Beendigung durch Pat.             | Anzahl   | 46                       | 107               | 144               | 181               | 206               | 252               | 279               | 290               | 300               | 313               | 325               | 331               |                   |                   |                   |      |
|   | Anteil in %  | 1,96                     | 4,56              | 6,14              | 7,72              | 8,78              | 10,74             | 11,89             | 12,36             | 12,79             | 13,34             | 13,85             | 14,11             |                   |                   |                   |      |
| davon aus sonstigem oder<br>unbekanntem Grund | Anzahl   | 7                        | 20                | 36                | 55                | 64                | 75                | 80                | 86                | 90                | 94                | 101               | 106               |                   |                   |                   |      |
|   | Anteil in %  | 0,30                     | 0,85              | 1,53              | 2,34              | 2,73              | 3,20              | 3,41              | 3,67              | 3,84              | 4,01              | 4,31              | 4,52              |                   |                   |                   |      |
| weibl. Pat.<br>insgesamt:                     | zu Beginn des Halbjahres   | Anzahl                   | 2346              | 2091              | 1875              | 1753              | 1639              | 1555              | 1433              | 1332              | 1263              | 1206              | 1147              | 1090              | 1090              | 1090              |      |
|   | am Ende des Halbjahres   | Anzahl                   | 2091              | 1875              | 1753              | 1639              | 1555              | 1433              | 1332              | 1263              | 1206              | 1147              | 1090              | 1056              |                   |                   |      |
| 2007-1  | ausgeschiedene männliche Patienten<br>insgesamt                            | Anzahl                   | 612               | 1184              | 1525              | 1786              | 2064              | 2317              | 2520              | 2700              | 2853              | 3000              | 3108              |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 9,38              | 18,15             | 23,38             | 27,38             | 31,65             | 35,53             | 38,64             | 41,40             | 43,74             | 46,00             | 47,65             |                   |                   |                   |      |
|   |  | CI Anteil in %           | [8,68;<br>10,09]  | [17,22;<br>19,09] | [22,36;<br>24,41] | [26,30;<br>28,47] | [30,52;<br>32,78] | [34,36;<br>36,69] | [37,46;<br>39,82] | [40,20;<br>42,59] | [42,54;<br>44,95] | [44,79;<br>47,21] | [46,44;<br>48,87] |                   |                   |                   |      |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                   | 8                 | 42                | 74                | 95                | 121               | 156               | 182               | 216               | 244               | 270               | 298               |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 0,12              | 0,64              | 1,13              | 1,46              | 1,86              | 2,39              | 2,79              | 3,31              | 3,74              | 4,14              | 4,57              |                   |                   |                   |      |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                   | 488               | 842               | 1044              | 1217              | 1397              | 1562              | 1684              | 1792              | 1875              | 1960              | 2010              |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 7,48              | 12,91             | 16,01             | 18,66             | 21,42             | 23,95             | 25,82             | 27,48             | 28,75             | 30,05             | 30,82             |                   |                   |                   |      |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                   | 90                | 225               | 297               | 346               | 404               | 437               | 480               | 508               | 532               | 552               | 571               |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 1,38              | 3,45              | 4,55              | 5,31              | 6,19              | 6,70              | 7,36              | 7,79              | 8,16              | 8,46              | 8,75              |                   |                   |                   |      |
|   | davon aus sonstigem oder<br>unbekanntem Grund                              | Anzahl                   | 26                | 75                | 110               | 128               | 142               | 162               | 174               | 184               | 202               | 218               | 229               |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 0,40              | 1,15              | 1,69              | 1,96              | 2,18              | 2,48              | 2,67              | 2,82              | 3,10              | 3,34              | 3,51              |                   |                   |                   |      |
|   | männl. Pat.<br>insgesamt:  | zu Beginn des Halbjahres | Anzahl            | 6522              | 5910              | 5338              | 4997              | 4736              | 4458              | 4205              | 4002              | 3822              | 3669              | 3522              | 3414              | 3414              | 3414 |
|   |  | am Ende des Halbjahres   | Anzahl            | 5910              | 5338              | 4997              | 4736              | 4458              | 4205              | 4002              | 3822              | 3669              | 3522              | 3414              | 3144              |                   |      |
|   | ausgeschiedene weibliche Patienten<br>insgesamt                            | Anzahl                   | 434               | 842               | 1118              | 1380              | 1598              | 1782              | 1952              | 2105              | 2243              | 2370              | 2454              |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 8,17              | 15,84             | 21,04             | 25,97             | 30,07             | 33,53             | 36,73             | 39,61             | 42,21             | 44,60             | 46,18             |                   |                   |                   |      |
|   |  | CI Anteil in %           | [7,43;<br>8,90]   | [14,86;<br>16,83] | [19,94;<br>22,13] | [24,79;<br>27,15] | [28,84;<br>31,30] | [32,26;<br>34,80] | [35,44;<br>38,03] | [38,30;<br>40,93] | [40,88;<br>43,54] | [43,26;<br>45,94] | [44,84;<br>47,52] |                   |                   |                   |      |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                   | 9                 | 21                | 37                | 64                | 86                | 105               | 123               | 142               | 163               | 183               | 194               |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 0,17              | 0,40              | 0,70              | 1,20              | 1,62              | 1,98              | 2,31              | 2,67              | 3,07              | 3,44              | 3,65              |                   |                   |                   |      |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                   | 369               | 654               | 812               | 958               | 1076              | 1188              | 1293              | 1396              | 1479              | 1552              | 1604              |                   |                   |                   |      |
|   |  | Anteil in %              | 6,94              | 12,31             | 15,28             | 18,03             | 20,25             | 22,36             | 24,33             | 26,27             | 27,83             | 29,21             | 30,18             |                   |                   |                   |      |
| davon wegen Beendigung durch Pat.             | Anzahl   | 44                       | 120               | 187               | 245               | 297               | 332               | 364               | 383               | 400               | 425               | 439               |                   |                   |                   |                   |      |
|   | Anteil in %  | 0,83                     | 2,26              | 3,52              | 4,61              | 5,59              | 6,25              | 6,85              | 7,21              | 7,53              | 8,00              | 8,26              |                   |                   |                   |                   |      |
| davon aus sonstigem oder<br>unbekanntem Grund | Anzahl   | 12                       | 47                | 82                | 113               | 139               | 157               | 172               | 184               | 201               | 210               | 217               |                   |                   |                   |                   |      |
|   | Anteil in %  | 0,23                     | 0,88              | 1,54              | 2,13              | 2,62              | 2,95              | 3,24              | 3,46              | 3,78              | 3,95              | 4,08              |                   |                   |                   |                   |      |
| weibl. Pat.<br>insgesamt:                     | zu Beginn des Halbjahres   | Anzahl                   | 5314              | 4880              | 4472              | 4196              | 3934              | 3716              | 3532              | 3362              | 3209              | 3071              | 2944              | 2944              | 2944              | 2944              |      |
|   | am Ende des Halbjahres   | Anzahl                   | 4880              | 4472              | 4196              | 3934              | 3716              | 3532              | 3362              | 3209              | 3071              | 2944              | 2860              |                   |                   |                   |      |

| EZ  | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-2                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                 | 522            | 902            | 1219           | 1515           | 1738           | 1900           | 2046           | 2165           | 2273              | 2359              |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 11,83          | 20,43          | 27,62          | 34,32          | 39,37          | 43,04          | 46,35          | 49,05          | 51,50             | 53,44             |                   |                   |                   |                   |
|   |  | CI Anteil in %         | [10,87; 12,78] | [19,25; 21,62] | [26,30; 28,94] | [32,92; 35,72] | [37,93; 40,82] | [41,58; 44,51] | [44,88; 47,82] | [47,57; 50,52] | [50,02; 52,97]    | [51,97; 54,92]    |                   |                   |                   |                   |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                 | 10             | 32             | 56             | 75             | 111            | 124            | 138            | 156            | 174               | 187               |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 0,23           | 0,72           | 1,27           | 1,70           | 2,51           | 2,81           | 3,13           | 3,53           | 3,94              | 4,24              |                   |                   |                   |                   |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                 | 435            | 692            | 907            | 1084           | 1211           | 1314           | 1412           | 1484           | 1543              | 1589              |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 9,86           | 15,68          | 20,55          | 24,56          | 27,44          | 29,77          | 31,99          | 33,62          | 34,96             | 36,00             |                   |                   |                   |                   |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                 | 65             | 140            | 194            | 271            | 324            | 364            | 391            | 409            | 432               | 453               |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 1,47           | 3,17           | 4,40           | 6,14           | 7,34           | 8,25           | 8,86           | 9,27           | 9,79              | 10,26             |                   |                   |                   |                   |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                 | 12             | 38             | 62             | 85             | 92             | 98             | 105            | 116            | 124               | 130               |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil %               | 0,27           | 0,86           | 1,40           | 1,93           | 2,08           | 2,22           | 2,38           | 2,63           | 2,81              | 2,95              |                   |                   |                   |                   |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>          | <i>4414</i>    | <i>3892</i>    | <i>3512</i>    | <i>3195</i>    | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>       | <i>2141</i>       |                   |                   |                   |                   |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>Anzahl</i>          | <i>3892</i>    | <i>3512</i>    | <i>3195</i>    | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>    | <i>2141</i>       | <i>2055</i>       |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                 | 368            | 629            | 882            | 1129           | 1289           | 1416           | 1518           | 1624           | 1703              | 1761              |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %                                 |  | 10,64                  | 18,18          | 25,50          | 32,64          | 37,27          | 40,94          | 43,89          | 46,95          | 49,23          | 50,91             |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in %                              |  | [9,61; 11,67]          | [16,90; 19,47] | [24,05; 26,95] | [31,08; 34,20] | [35,65; 38,88] | [39,30; 42,58] | [42,23; 45,54] | [45,29; 48,61] | [47,57; 50,90] | [49,24; 52,58]    |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon wegen Tod                             | Anzahl   | 5                      | 20             | 37             | 49             | 64             | 71             | 84             | 95             | 104            | 113               |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil in %  | 0,14                   | 0,58           | 1,07           | 1,42           | 1,85           | 2,05           | 2,43           | 2,75           | 3,01           | 3,27              |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon wegen Ausschluss                      | Anzahl   | 312                    | 469            | 624            | 777            | 874            | 962            | 1029           | 1099           | 1147           | 1176              |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil in %  | 9,02                   | 13,56          | 18,04          | 22,46          | 25,27          | 27,81          | 29,75          | 31,77          | 33,16          | 34,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 41                     | 102            | 163            | 216            | 250            | 270            | 284            | 297            | 313            | 324               |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil in %  | 1,19                   | 2,95           | 4,71           | 6,24           | 7,23           | 7,81           | 8,21           | 8,59           | 9,05           | 9,37              |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 10                     | 38             | 58             | 87             | 101            | 113            | 121            | 133            | 139            | 148               |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil %   | 0,29                   | 1,10           | 1,68           | 2,52           | 2,92           | 3,27           | 3,50           | 3,85           | 4,02           | 4,28              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3459</i>            | <i>3091</i>    | <i>2830</i>    | <i>2577</i>    | <i>2330</i>    | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>    | <i>Anzahl</i>  | <i>3091</i>            | <i>2830</i>    | <i>2577</i>    | <i>2330</i>    | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>    | <i>1698</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-1                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                 | 501            | 883            | 1276           | 1537           | 1731           | 1916           | 2046           | 2144           | 2227              |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 11,96          | 21,07          | 30,45          | 36,68          | 41,31          | 45,73          | 48,83          | 51,17          | 53,15             |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | CI Anteil in %         | [10,97; 12,94] | [19,84; 22,31] | [29,06; 31,85] | [35,22; 38,14] | [39,82; 42,80] | [44,22; 47,24] | [47,32; 50,34] | [49,66; 52,68] | [51,64; 54,66]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl                 | 11             | 33             | 56             | 77             | 93             | 106            | 123            | 130            | 145               |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 0,26           | 0,79           | 1,34           | 1,84           | 2,22           | 2,53           | 2,94           | 3,10           | 3,46              |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                 | 428            | 693            | 922            | 1094           | 1216           | 1340           | 1426           | 1495           | 1542              |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 10,21          | 16,54          | 22,00          | 26,11          | 29,02          | 31,98          | 34,03          | 35,68          | 36,80             |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                 | 40             | 111            | 225            | 276            | 322            | 352            | 369            | 387            | 402               |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 0,95           | 2,65           | 5,37           | 6,59           | 7,68           | 8,40           | 8,81           | 9,24           | 9,59              |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                 | 22             | 46             | 73             | 90             | 100            | 118            | 128            | 132            | 138               |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | Anteil %               | 0,53           | 1,10           | 1,74           | 2,15           | 2,39           | 2,82           | 3,05           | 3,15           | 3,29              |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>          | <i>4190</i>    | <i>3689</i>    | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>Anzahl</i>          | <i>3689</i>    | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>    | <i>1963</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                 | 317            | 609            | 869            | 1068           | 1216           | 1354           | 1452           | 1538           | 1612              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %                                 |  | 9,94                   | 19,10          | 27,26          | 33,50          | 38,14          | 42,47          | 45,55          | 48,24          | 50,56          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in %                              |  | [8,90; 10,98]          | [17,74; 20,47] | [25,71; 28,80] | [31,86; 35,14] | [36,46; 39,83] | [40,76; 44,19] | [43,82; 47,27] | [46,51; 49,98] | [48,83; 52,30] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon wegen Tod                             | Anzahl   | 10                     | 23             | 36             | 52             | 60             | 75             | 82             | 89             | 102            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil in %  | 0,31                   | 0,72           | 1,13           | 1,63           | 1,88           | 2,35           | 2,57           | 2,79           | 3,20           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon wegen Ausschluss                      | Anzahl   | 274                    | 477            | 625            | 754            | 857            | 950            | 1021           | 1071           | 1103           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil in %  | 8,59                   | 14,96          | 19,60          | 23,65          | 26,88          | 29,80          | 32,03          | 33,59          | 34,60          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 23                     | 79             | 157            | 199            | 225            | 247            | 258            | 278            | 298            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil in %  | 0,72                   | 2,48           | 4,92           | 6,24           | 7,06           | 7,75           | 8,09           | 8,72           | 9,35           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 10                     | 30             | 51             | 63             | 74             | 82             | 91             | 100            | 109            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil %   | 0,31                   | 0,94           | 1,60           | 1,98           | 2,32           | 2,57           | 2,85           | 3,14           | 3,42           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3188</i>            | <i>2871</i>    | <i>2579</i>    | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>    | <i>Anzahl</i>  | <i>2871</i>            | <i>2579</i>    | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    | <i>1576</i>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ  | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2008-2                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 398            | 740            | 989            | 1155           | 1288           | 1388           | 1481           | 1540           |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 13,76          | 25,58          | 34,19          | 39,92          | 44,52          | 47,98          | 51,19          | 53,23          |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [12,50; 15,01] | [23,99; 27,17] | [32,46; 35,91] | [38,14; 41,71] | [42,71; 46,33] | [46,16; 49,80] | [49,37; 53,01] | [51,41; 55,05] |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 6              | 25             | 39             | 55             | 68             | 78             | 88             | 96             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,21           | 0,86           | 1,35           | 1,90           | 2,35           | 2,70           | 3,04           | 3,32           |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 363            | 592            | 757            | 871            | 954            | 1018           | 1074           | 1107           |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 12,55          | 20,46          | 26,17          | 30,11          | 32,98          | 35,19          | 37,12          | 38,26          |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl             | 17             | 87             | 141            | 166            | 189            | 207            | 224            | 234            |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,59           | 3,01           | 4,87           | 5,74           | 6,53           | 7,16           | 7,74           | 8,09           |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl             | 12             | 36             | 52             | 63             | 77             | 85             | 95             | 103            |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil %           | 0,41           | 1,24           | 1,80           | 2,18           | 2,66           | 2,94           | 3,28           | 3,56           |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>    | <i>2495</i>    | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>Anzahl</i>      | <i>2495</i>    | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    | <i>1353</i>    |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 251            | 484            | 675            | 809            | 901            | 975            | 1039           | 1090           |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 11,96          | 23,06          | 32,16          | 38,54          | 42,93          | 46,45          | 49,50          | 51,93          |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [10,57; 13,35] | [21,26; 24,86] | [30,16; 34,16] | [36,46; 40,62] | [40,81; 45,04] | [44,32; 48,58] | [47,36; 51,64] | [49,79; 54,07] |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 2              | 11             | 23             | 26             | 31             | 40             | 42             | 49             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,10           | 0,52           | 1,10           | 1,24           | 1,48           | 1,91           | 2,00           | 2,33           |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 227            | 386            | 516            | 609            | 665            | 713            | 765            | 795            |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 10,81          | 18,39          | 24,58          | 29,01          | 31,68          | 33,97          | 36,45          | 37,88          |               |               |               |               |               |               |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 17                 | 64             | 103            | 130            | 147            | 160            | 165            | 173            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | Anteil in %  | 0,81               | 3,05           | 4,91           | 6,19           | 7,00           | 7,62           | 7,86           | 8,24           |                |               |               |               |               |               |               |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 5                  | 23             | 33             | 44             | 58             | 62             | 67             | 73             |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | Anteil %   | 0,24               | 1,10           | 1,57           | 2,10           | 2,76           | 2,95           | 3,19           | 3,48           |                |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2099</i>        | <i>1848</i>    | <i>1615</i>    | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>    | <i>Anzahl</i>  | <i>1848</i>        | <i>1615</i>    | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    | <i>1009</i>    |                |               |               |               |               |               |               |  |
| 2009-1                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 434            | 807            | 1072           | 1244           | 1392           | 1518           | 1598           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 13,50          | 25,10          | 33,34          | 38,69          | 43,30          | 47,22          | 49,70          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [12,32; 14,68] | [23,60; 26,60] | [31,71; 34,97] | [37,01; 40,38] | [41,58; 45,01] | [45,49; 48,94] | [47,98; 51,43] |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 7              | 24             | 49             | 68             | 87             | 106            | 115            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,22           | 0,75           | 1,52           | 2,12           | 2,71           | 3,30           | 3,58           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 399            | 664            | 836            | 953            | 1054           | 1130           | 1187           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 12,41          | 20,65          | 26,00          | 29,64          | 32,78          | 35,15          | 36,92          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl             | 21             | 89             | 140            | 165            | 182            | 209            | 220            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,65           | 2,77           | 4,35           | 5,13           | 5,66           | 6,50           | 6,84           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl             | 7              | 30             | 47             | 58             | 69             | 73             | 76             |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil %           | 0,22           | 0,93           | 1,46           | 1,80           | 2,15           | 2,27           | 2,36           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>      | <i>3215</i>    | <i>2781</i>    | <i>2408</i>    | <i>2143</i>    | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i>    |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>Anzahl</i>      | <i>2781</i>    | <i>2408</i>    | <i>2143</i>    | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i>    | <i>1617</i>    |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 346            | 607            | 791            | 924            | 1053           | 1152           | 1223           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 14,30          | 25,08          | 32,69          | 38,18          | 43,51          | 47,60          | 50,54          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [12,90; 15,69] | [23,36; 26,81] | [30,82; 34,56] | [36,25; 40,12] | [41,54; 45,49] | [45,61; 49,59] | [48,54; 52,53] |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 5              | 15             | 20             | 31             | 41             | 48             | 53             |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,21           | 0,62           | 0,83           | 1,28           | 1,69           | 1,98           | 2,19           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 305            | 491            | 622            | 706            | 792            | 846            | 890            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   |  | Anteil in %        | 12,60          | 20,29          | 25,70          | 29,17          | 32,73          | 34,96          | 36,78          |                |               |               |               |               |               |               |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 27                 | 75             | 107            | 132            | 153            | 180            | 192            |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | Anteil in %  | 1,12               | 3,10           | 4,42           | 5,45           | 6,32           | 7,44           | 7,93           |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 9                  | 26             | 42             | 55             | 67             | 78             | 88             |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
|   | Anteil %   | 0,37               | 1,07           | 1,74           | 2,27           | 2,77           | 3,22           | 3,64           |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2420</i>        | <i>2074</i>    | <i>1813</i>    | <i>1629</i>    | <i>1496</i>    | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>    | <i>Anzahl</i>  | <i>2074</i>        | <i>1813</i>    | <i>1629</i>    | <i>1496</i>    | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    | <i>1197</i>    |                |                |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ  | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halbjahr | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2009-2                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 426            | 759            | 999            | 1164           | 1277           | 1372           |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 15,61          | 27,81          | 36,61          | 42,65          | 46,79          | 50,27          |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [14,25; 16,97] | [26,13; 29,49] | [34,80; 38,41] | [40,80; 44,51] | [44,92; 48,67] | [48,40; 52,15] |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 5              | 28             | 46             | 59             | 69             | 83             |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,18           | 1,03           | 1,69           | 2,16           | 2,53           | 3,04           |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 387            | 635            | 792            | 910            | 980            | 1037           |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 14,18          | 23,27          | 29,02          | 33,35          | 35,91          | 38,00          |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl             | 25             | 71             | 116            | 138            | 162            | 177            |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,92           | 2,60           | 4,25           | 5,06           | 5,94           | 6,49           |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl             | 9              | 25             | 45             | 57             | 66             | 75             |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil %           | 0,33           | 0,92           | 1,65           | 2,09           | 2,42           | 2,75           |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>      | <i>2729</i>    | <i>2303</i>    | <i>1970</i>    | <i>1730</i>    | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>Anzahl</i>      | <i>2303</i>    | <i>1970</i>    | <i>1730</i>    | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    | <i>1357</i>    |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 288            | 511            | 669            | 799            | 882            | 960            |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 13,54          | 24,02          | 31,45          | 37,56          | 41,47          | 45,13          |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [12,09; 14,99] | [22,21; 25,84] | [29,48; 33,43] | [35,51; 39,62] | [39,37; 43,56] | [43,02; 47,25] |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 3              | 9              | 16             | 24             | 27             | 32             |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,14           | 0,42           | 0,75           | 1,13           | 1,27           | 1,50           |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 257            | 412            | 513            | 600            | 648            | 691            |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 12,08          | 19,37          | 24,12          | 28,21          | 30,47          | 32,49          |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 21                 | 68             | 101            | 129            | 151            | 167            |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | Anteil in %  | 0,99               | 3,20           | 4,75           | 6,06           | 7,10           | 7,85           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 7                  | 22             | 39             | 46             | 56             | 70             |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | Anteil %   | 0,33               | 1,03           | 1,83           | 2,16           | 2,63           | 3,29           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2127</i>        | <i>1839</i>    | <i>1616</i>    | <i>1458</i>    | <i>1328</i>    | <i>1245</i>    |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>    | <i>Anzahl</i>  | <i>1839</i>        | <i>1616</i>    | <i>1458</i>    | <i>1328</i>    | <i>1245</i>    | <i>1167</i>    |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| 2010-1                                      | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 487            | 819            | 1053           | 1212           | 1336           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 16,10          | 27,07          | 34,81          | 40,07          | 44,17          |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [14,79; 17,41] | [25,49; 28,66] | [33,11; 36,51] | [38,32; 41,81] | [42,40; 45,94] |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 2              | 17             | 33             | 43             | 55             |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,07           | 0,56           | 1,09           | 1,42           | 1,82           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 456            | 678            | 834            | 935            | 1015           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 15,07          | 22,41          | 27,57          | 30,91          | 33,55          |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl             | 20             | 87             | 135            | 169            | 190            |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,66           | 2,88           | 4,46           | 5,59           | 6,28           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl             | 9              | 37             | 51             | 65             | 76             |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil %           | 0,30           | 1,22           | 1,69           | 2,15           | 2,51           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | <i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>                                | <i>Anzahl</i>      | <i>3025</i>    | <i>2538</i>    | <i>2206</i>    | <i>1972</i>    | <i>1813</i>    |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>                                   | <i>Anzahl</i>      | <i>2538</i>    | <i>2206</i>    | <i>1972</i>    | <i>1813</i>    | <i>1689</i>    |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl             | 324            | 583            | 746            | 875            | 965            |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 14,90          | 26,82          | 34,31          | 40,25          | 44,39          |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | CI Anteil in %     | [13,41; 16,40] | [24,95; 28,68] | [32,32; 36,31] | [38,19; 42,31] | [42,30; 46,48] |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Tod  | Anzahl             | 5              | 13             | 27             | 31             | 35             |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 0,23           | 0,60           | 1,24           | 1,43           | 1,61           |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | davon wegen Ausschluss   | Anzahl             | 288            | 475            | 587            | 676            | 728            |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   |  | Anteil in %        | 13,25          | 21,85          | 27,00          | 31,09          | 33,49          |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.           | Anzahl   | 21                 | 67             | 91             | 115            | 137            |                |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | Anteil in %  | 0,97               | 3,08           | 4,19           | 5,29           | 6,30           |                |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund  | Anzahl   | 10                 | 28             | 41             | 53             | 65             |                |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
|   | Anteil %   | 0,46               | 1,29           | 1,89           | 2,44           | 2,99           |                |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2174</i>        | <i>1850</i>    | <i>1591</i>    | <i>1428</i>    | <i>1299</i>    |                |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>    | <i>Anzahl</i>  | <i>1850</i>        | <i>1591</i>    | <i>1428</i>    | <i>1299</i>    | <i>1209</i>    |                |                |             |             |              |              |              |              |              |              |  |

| EZ   | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-<br>halbjahr          | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2                                     | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 460            | 838            | 1063           | 1222           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 14,91          | 27,15          | 34,45          | 39,60          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [13,65; 16,16] | [25,59; 28,72] | [32,77; 36,12] | [37,87; 41,32] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Tod  | Anzahl                          | 8              | 22             | 36             | 50             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,26           | 0,71           | 1,17           | 1,62           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                          | 427            | 707            | 849            | 950            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 13,84          | 22,91          | 27,51          | 30,78          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                          | 17             | 77             | 131            | 166            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,55           | 2,50           | 4,24           | 5,38           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                          | 8              | 32             | 47             | 56             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil %                        | 0,26           | 1,04           | 1,52           | 1,81           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>männl. Pat.</i>   | <i>zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3086</i>    | <i>2626</i>    | <i>2248</i>    | <i>2023</i> |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>insgesamt:</i>  | <i>am Ende des Halbjahres</i>   | <i>Anzahl</i>  | <i>2626</i>    | <i>2248</i>    | <i>2023</i>    | <i>1864</i> |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 291            | 544            | 738            | 835            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 12,59          | 23,53          | 31,92          | 36,12          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [11,23; 13,94] | [21,80; 25,26] | [30,02; 33,82] | [34,16; 38,07] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | davon wegen Tod                 | Anzahl         | 2              | 13             | 20             | 27          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %                                |  |                                 | 0,09           | 0,56           | 0,87           | 1,17           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Ausschluss                     |  | Anzahl                          | 270            | 451            | 576            | 638            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 11,68          | 19,51          | 24,91          | 27,60          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.          |  | Anzahl                          | 13             | 59             | 107            | 127            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,56           | 2,55           | 4,63           | 5,49           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund |  | Anzahl                          | 6              | 21             | 35             | 43             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil %   | 0,26                            | 0,91           | 1,51           | 1,86           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibl. Pat.</i>                         | <i>zu Beginn des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>2312</i>    | <i>2021</i>    | <i>1768</i>    | <i>1574</i>    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>insgesamt:</i>                          | <i>am Ende des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>2021</i>    | <i>1768</i>    | <i>1574</i>    | <i>1477</i>    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-1                                     | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 480            | 877            | 1091           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 15,26          | 27,88          | 34,68          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [14,00; 16,51] | [26,31; 29,44] | [33,02; 36,34] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Tod  | Anzahl                          | 7              | 29             | 38             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,22           | 0,92           | 1,21           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                          | 430            | 687            | 825            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 13,67          | 21,84          | 26,22          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                          | 27             | 110            | 160            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,86           | 3,50           | 5,09           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                          | 16             | 51             | 68             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil %                        | 0,51           | 1,62           | 2,16           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>männl. Pat.</i>   | <i>zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3146</i>    | <i>2666</i>    | <i>2269</i>    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>insgesamt:</i>  | <i>am Ende des Halbjahres</i>   | <i>Anzahl</i>  | <i>2666</i>    | <i>2269</i>    | <i>2055</i>    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 291            | 573            | 741            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 12,22          | 24,06          | 31,11          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [10,90; 13,53] | [22,34; 25,77] | [29,25; 32,97] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | davon wegen Tod                 | Anzahl         | 4              | 17             | 25             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %                                |  |                                 | 0,17           | 0,71           | 1,05           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Ausschluss                     |  | Anzahl                          | 270            | 465            | 586            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 11,34          | 19,52          | 24,60          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.          |  | Anzahl                          | 9              | 63             | 93             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,38           | 2,64           | 3,90           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund |  | Anzahl                          | 8              | 28             | 37             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil %   | 0,34                            | 1,18           | 1,55           |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibl. Pat.</i>                         | <i>zu Beginn des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>2382</i>    | <i>2091</i>    | <i>1809</i>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>insgesamt:</i>                          | <i>am Ende des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>2091</i>    | <i>1809</i>    | <i>1641</i>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) | Beitritts-<br>halbjahr          | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-2                                     | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 429               | 756               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 14,15             | 24,94             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [12,91;<br>15,39] | [23,40;<br>26,48] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Tod  | Anzahl                          | 9                 | 26                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,30              | 0,86              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                          | 376               | 577               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 12,41             | 19,04             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                          | 30                | 101               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,99              | 3,33              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                          | 14                | 52                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil %                        | 0,46              | 1,72              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>männl. Pat.</i>   | <i>zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>     | <i>3031</i>       | <i>2602</i> |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>insgesamt:</i>  | <i>am Ende des Halbjahres</i>   | <i>Anzahl</i>     | <i>2602</i>       | <i>2275</i> |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 309               | 541               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 13,60             | 23,81             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [12,19;<br>15,01] | [22,06;<br>25,56] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Tod                            |  | Anzahl                          | 4                 | 11                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,18              | 0,48              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Ausschluss                     |  | Anzahl                          | 279               | 416               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 12,28             | 18,31             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.          |  | Anzahl                          | 14                | 81                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,62              | 3,57              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund |  | Anzahl                          | 12                | 33                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil %   | 0,53                            | 1,45              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibl. Pat.</i>                         | <i>zu Beginn des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>2272</i>       | <i>1963</i>       |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>insgesamt:</i>                          | <i>am Ende des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>1963</i>       | <i>1731</i>       |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2012-1                                     | <b>ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 407               |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 11,89             |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [10,81;<br>12,97] |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Tod  | Anzahl                          | 7                 |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,20              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Ausschluss   | Anzahl                          | 357               |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 10,43             |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon wegen Beendigung durch Pat.  | Anzahl                          | 31                |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,91              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund                                 | Anzahl                          | 12                |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil %                        | 0,35              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>männl. Pat.</i>   | <i>zu Beginn des Halbjahres</i> | <i>Anzahl</i>     | <i>3423</i>       |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>insgesamt:</i>  | <i>am Ende des Halbjahres</i>   | <i>Anzahl</i>     | <i>3016</i>       |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt</b>                        | Anzahl                          | 241               |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 9,66              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                  | [8,50;<br>10,82]  |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Tod                            |  | Anzahl                          | 5                 |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,20              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Ausschluss                     |  | Anzahl                          | 209               |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 8,38              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon wegen Beendigung durch Pat.          |  | Anzahl                          | 20                |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %                     | 0,80              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund |  | Anzahl                          | 7                 |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil %   | 0,28                            |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibl. Pat.</i>                         | <i>zu Beginn des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>2494</i>       |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>insgesamt:</i>                          | <i>am Ende des Halbjahres</i>  | <i>Anzahl</i>                   | <i>2253</i>       |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In Tabelle 1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebens-

jahren zum 1.1 des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Kindern, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **6 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „5“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 6 Jahre alt waren.

**Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres**

| EZ               | Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitrittsjahr    |                |
|------------------|--|------------------|----------------|
| 2005-1           | männliche Patienten  | Mean             | 42,41          |
|                  |  | CI Mean          | [40,69; 44,14] |
|                  |  | Median           | 42,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | 342            |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 45,41          |
|                  |  | CI Mean          | [43,44; 47,37] |
| Median           |  | 43,00            |                |
| <i>Fallbasis</i> |  | 292              |                |
| 2005-2           | männliche Patienten  | Mean             | 45,37          |
|                  |  | CI Mean          | [44,71; 46,02] |
|                  |  | Median           | 45,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | 2287           |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 46,20          |
|                  |  | CI Mean          | [45,34; 47,06] |
| Median           |  | 46,00            |                |
| <i>Fallbasis</i> |  | 1772             |                |
| 2006-1           | männliche Patienten  | Mean             | 42,92          |
|                  |  | CI Mean          | [42,28; 43,56] |
|                  |  | Median           | 43,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | 2245           |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 43,64          |
|                  |  | CI Mean          | [42,78; 44,50] |
| Median           |  | 43,00            |                |
| <i>Fallbasis</i> |  | 1759             |                |
| 2006-2           | männliche Patienten  | Mean             | 43,05          |
|                  |  | CI Mean          | [42,50; 43,60] |
|                  |  | Median           | 43,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | 3054           |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 42,86          |
|                  |  | CI Mean          | [42,14; 43,57] |
| Median           |  | 43,00            |                |
| <i>Fallbasis</i> |  | 2346             |                |
| 2007-1           | männliche Patienten  | Mean             | 43,53          |
|                  |  | CI Mean          | [43,13; 43,92] |
|                  |  | Median           | 44,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | 6522           |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 44,69          |
|                  |  | CI Mean          | [44,19; 45,19] |
| Median           |  | 45,00            |                |
| <i>Fallbasis</i> |  | 5314             |                |

| EZ     | Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitrittsjahr    |                |
|--------|--|------------------|----------------|
| 2007-2 | männliche Patienten  | Mean             | 39,98          |
|        |  | CI Mean          | [39,46; 40,49] |
|        |  | Median           | 41,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>4414</i>    |
|        | weibliche Patienten  | Mean             | 40,69          |
|        |  | CI Mean          | [40,03; 41,35] |
|        |  | Median           | 41,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3459</i>    |
| 2008-1 | männliche Patienten  | Mean             | 41,15          |
|        |  | CI Mean          | [40,65; 41,66] |
|        |  | Median           | 42,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>4190</i>    |
|        | weibliche Patienten  | Mean             | 41,56          |
|        |  | CI Mean          | [40,89; 42,22] |
|        |  | Median           | 42,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3188</i>    |
| 2008-2 | männliche Patienten  | Mean             | 40,27          |
|        |  | CI Mean          | [39,66; 40,88] |
|        |  | Median           | 41,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>2893</i>    |
|        | weibliche Patienten  | Mean             | 40,19          |
|        |  | CI Mean          | [39,39; 41,00] |
|        |  | Median           | 40,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>2099</i>    |
| 2009-1 | männliche Patienten  | Mean             | 40,08          |
|        |  | CI Mean          | [39,49; 40,67] |
|        |  | Median           | 41,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3215</i>    |
|        | weibliche Patienten  | Mean             | 39,24          |
|        |  | CI Mean          | [38,48; 40,00] |
|        |  | Median           | 39,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>2420</i>    |
| 2009-2 | männliche Patienten  | Mean             | 39,15          |
|        |  | CI Mean          | [38,53; 39,78] |
|        |  | Median           | 40,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>2729</i>    |
|        | weibliche Patienten  | Mean             | 38,61          |
|        |  | CI Mean          | [37,80; 39,43] |
|        |  | Median           | 38,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>2127</i>    |
| 2010-1 | männliche Patienten  | Mean             | 40,00          |
|        |  | CI Mean          | [39,41; 40,60] |
|        |  | Median           | 41,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3025</i>    |
|        | weibliche Patienten  | Mean             | 39,69          |
|        |  | CI Mean          | [38,90; 40,49] |
|        |  | Median           | 39,00          |
|        |  | <i>Fallbasis</i> | <i>2174</i>    |



| EZ               | Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitrittsjahr    |                |
|------------------|--|------------------|----------------|
| 2010-2           | männliche Patienten  | Mean             | 39,49          |
|                  |  | CI Mean          | [38,89; 40,09] |
|                  |  | Median           | 41,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3086</i>    |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 39,38          |
|                  |  | CI Mean          | [38,61; 40,15] |
|                  |  | Median           | 40,00          |
| <i>Fallbasis</i> |  | <i>2312</i>      |                |
| 2011-1           | männliche Patienten  | Mean             | 40,24          |
|                  |  | CI Mean          | [39,66; 40,83] |
|                  |  | Median           | 41,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3146</i>    |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 40,14          |
|                  |  | CI Mean          | [39,38; 40,91] |
|                  |  | Median           | 40,00          |
| <i>Fallbasis</i> |  | <i>2382</i>      |                |
| 2011-2           | männliche Patienten  | Mean             | 39,91          |
|                  |  | CI Mean          | [39,31; 40,51] |
|                  |  | Median           | 41,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3031</i>    |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 40,04          |
|                  |  | CI Mean          | [39,24; 40,84] |
|                  |  | Median           | 39,00          |
| <i>Fallbasis</i> |  | <i>2272</i>      |                |
| 2012-1           | männliche Patienten  | Mean             | 39,83          |
|                  |  | CI Mean          | [39,27; 40,39] |
|                  |  | Median           | 41,00          |
|                  |  | <i>Fallbasis</i> | <i>3423</i>    |
|                  | weibliche Patienten  | Mean             | 40,27          |
|                  |  | CI Mean          | [39,51; 41,02] |
|                  |  | Median           | 40,00          |
| <i>Fallbasis</i> |  | <i>2494</i>      |                |

In Tabelle 1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter

in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Kindern, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **6 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „5“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 6 Jahre alt waren.

**Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres**

| EZ                                  | Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitritts-<br>halbjahr |             |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 2005-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 2           |
|                                     |  | 6 bis 11               | 6           |
|                                     |  | 12 bis 17              | 15          |
|                                     |  | 18 bis 29              | 50          |
|                                     |  | 30 bis 44              | 116         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 138         |
|                                     |  | 70 und älter           | 15          |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>342</b>  |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 0           |
|                                     |  | 6 bis 11               | 2           |
|                                     |  | 12 bis 17              | 15          |
|                                     |  | 18 bis 29              | 36          |
|                                     |  | 30 bis 44              | 103         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 112         |
| 70 und älter                        |  | 24                     |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>292</b>             |             |
| 2005-2                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 5           |
|                                     |  | 6 bis 11               | 24          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 98          |
|                                     |  | 18 bis 29              | 231         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 761         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1003        |
|                                     |  | 70 und älter           | 165         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>2287</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 5           |
|                                     |  | 6 bis 11               | 32          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 85          |
|                                     |  | 18 bis 29              | 237         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 480         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 730         |
| 70 und älter                        |  | 203                    |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>1772</b>            |             |
| 2006-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 3           |
|                                     |  | 6 bis 11               | 30          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 111         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 300         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 751         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 944         |
|                                     |  | 70 und älter           | 106         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>2245</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 9           |
|                                     |  | 6 bis 11               | 36          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 116         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 278         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 494         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 671         |
| 70 und älter                        |  | 155                    |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>1759</b>            |             |

| EZ                                  | Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitritts-<br>halbjahr |      |
|-------------------------------------|--|------------------------|------|
| 2006-2                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 10   |
|                                     |  | 6 bis 11               | 41   |
|                                     |  | 12 bis 17              | 118  |
|                                     |  | 18 bis 29              | 439  |
|                                     |  | 30 bis 44              | 1048 |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1240 |
|                                     |  | 70 und älter           | 158  |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | Anzahl                 | 3054 |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 8    |
|                                     |  | 6 bis 11               | 42   |
|                                     |  | 12 bis 17              | 145  |
|                                     |  | 18 bis 29              | 404  |
|                                     |  | 30 bis 44              | 659  |
| 45 bis 69                           |  | 906                    |      |
| 70 und älter                        | 182  |                        |      |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | Anzahl   | 2346                   |      |
| 2007-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 29   |
|                                     |  | 6 bis 11               | 108  |
|                                     |  | 12 bis 17              | 295  |
|                                     |  | 18 bis 29              | 904  |
|                                     |  | 30 bis 44              | 2026 |
|                                     |  | 45 bis 69              | 2794 |
|                                     |  | 70 und älter           | 366  |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | Anzahl                 | 6522 |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 18   |
|                                     |  | 6 bis 11               | 110  |
|                                     |  | 12 bis 17              | 270  |
|                                     |  | 18 bis 29              | 882  |
|                                     |  | 30 bis 44              | 1351 |
| 45 bis 69                           |  | 2124                   |      |
| 70 und älter                        | 559  |                        |      |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | Anzahl   | 5314                   |      |
| 2007-2                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 47   |
|                                     |  | 6 bis 11               | 178  |
|                                     |  | 12 bis 17              | 357  |
|                                     |  | 18 bis 29              | 680  |
|                                     |  | 30 bis 44              | 1360 |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1577 |
|                                     |  | 70 und älter           | 214  |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | Anzahl                 | 4413 |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 59   |
|                                     |  | 6 bis 11               | 171  |
|                                     |  | 12 bis 17              | 285  |
|                                     |  | 18 bis 29              | 592  |
|                                     |  | 30 bis 44              | 875  |
| 45 bis 69                           |  | 1168                   |      |
| 70 und älter                        | 309  |                        |      |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | Anzahl   | 3459                   |      |

| EZ                                  | Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitritts-<br>halbjahr |             |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 2008-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 33          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 101         |
|                                     |  | 12 bis 17              | 255         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 695         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 1320        |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1554        |
|                                     |  | 70 und älter           | 232         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>4190</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 28          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 119         |
|                                     |  | 12 bis 17              | 236         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 589         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 802         |
| 45 bis 69                           |  | 1114                   |             |
| 70 und älter                        | 300  |                        |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>3188</b>            |             |
| 2008-2                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 30          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 90          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 189         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 487         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 923         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1040        |
|                                     |  | 70 und älter           | 133         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>2892</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 25          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 75          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 150         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 435         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 567         |
| 45 bis 69                           |  | 683                    |             |
| 70 und älter                        | 164  |                        |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2099</b>            |             |
| 2009-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 37          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 100         |
|                                     |  | 12 bis 17              | 199         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 585         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 979         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1156        |
|                                     |  | 70 und älter           | 159         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>3215</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 24          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 130         |
|                                     |  | 12 bis 17              | 174         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 526         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 646         |
| 45 bis 69                           |  | 740                    |             |
| 70 und älter                        | 180  |                        |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2420</b>            |             |

| EZ                                  | Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitritts-<br>halbjahr |             |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 2009-2                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 26          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 72          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 195         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 559         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 793         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 980         |
|                                     |  | 70 und älter           | 103         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>2728</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 21          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 106         |
|                                     |  | 12 bis 17              | 186         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 483         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 532         |
| 45 bis 69                           |  | 625                    |             |
| 70 und älter                        | 174  |                        |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2127</b>            |             |
| 2010-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 37          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 77          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 167         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 597         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 895         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1112        |
|                                     |  | 70 und älter           | 140         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>3025</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 26          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 81          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 152         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 508         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 538         |
| 45 bis 69                           |  | 692                    |             |
| 70 und älter                        | 177  |                        |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2174</b>            |             |
| 2010-2                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 41          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 87          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 213         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 613         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 846         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1151        |
|                                     |  | 70 und älter           | 135         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>3086</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 34          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 111         |
|                                     |  | 12 bis 17              | 155         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 509         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 578         |
| 45 bis 69                           |  | 752                    |             |
| 70 und älter                        | 173  |                        |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2312</b>            |             |

| EZ                                  | Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres | Beitritts-<br>halbjahr |             |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 2011-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 34          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 74          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 178         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 626         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 892         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1188        |
|                                     |  | 70 und älter           | 154         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>3146</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 25          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 105         |
|                                     |  | 12 bis 17              | 141         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 542         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 587         |
| 45 bis 69                           |  | 780                    |             |
| 70 und älter                        |  | 202                    |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2382</b>            |             |
| 2011-2                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 31          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 77          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 183         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 634         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 859         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1112        |
|                                     |  | 70 und älter           | 135         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>3031</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 34          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 66          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 147         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 570         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 529         |
| 45 bis 69                           |  | 715                    |             |
| 70 und älter                        |  | 211                    |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2272</b>            |             |
| 2012-1                              | männliche Patienten  | bis 5                  | 39          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 97          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 182         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 727         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 942         |
|                                     |  | 45 bis 69              | 1287        |
|                                     |  | 70 und älter           | 149         |
|                                     | <b>männliche Patienten zusammen</b>                                      | <b>Anzahl</b>          | <b>3423</b> |
|                                     | weibliche Patienten  | bis 5                  | 34          |
|                                     |  | 6 bis 11               | 71          |
|                                     |  | 12 bis 17              | 163         |
|                                     |  | 18 bis 29              | 619         |
|                                     |  | 30 bis 44              | 569         |
| 45 bis 69                           |  | 805                    |             |
| 70 und älter                        |  | 233                    |             |
| <b>weibliche Patienten zusammen</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>2494</b>            |             |

In Tabelle 1.6 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **über alle Kohorten und alle Folgehalbjahre**. In diese Auswertung fließen alle Patienten unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet

zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

**Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten**

| EZ      | Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten                                | Folgehalbjahre |               |
|---------|---|----------------|---------------|
| Kohorte | männliche Patienten insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten | Mean           | 4,35          |
|         |   | Median         | 3,00          |
|         | <i>Halbjahressumme</i>  |                | <i>207094</i> |
|         | weibliche Patienten insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten | Mean           | 4,53          |
|         |   | Median         | 3,00          |
|         | <i>Halbjahressumme</i>  |                | <i>165070</i> |

In Tabelle 1.7 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **pro Kohorte und über alle Folgehalbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

**Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte**

| EZ                     | Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte                   |        | Folgehalbjahre |
|------------------------|---|--------|----------------|
|                        |   |        |                |
| 2005-1                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 8,05           |
|                        |   | Median | 9,00           |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 2696           |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 8,41           |
|                        |   | Median | 10,00          |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 2397   |                |
| 2005-2                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 8,12           |
|                        |   | Median | 11,00          |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 18526          |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 8,19           |
|                        |   | Median | 11,00          |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 14505  |                |
| 2006-1                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 7,14           |
|                        |   | Median | 8,00           |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 16010          |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 7,24           |
|                        |   | Median | 9,00           |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 12728  |                |
| 2006-2                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 6,76           |
|                        |   | Median | 8,00           |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 20653          |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 6,98           |
|                        |   | Median | 9,00           |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 16384  |                |
| 2007-1                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 6,85           |
|                        |   | Median | 10,00          |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 44659          |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 7,02           |
|                        |   | Median | 10,00          |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 37316  |                |
| 2007-2                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 5,76           |
|                        |   | Median | 8,00           |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 25446          |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 5,95           |
|                        |   | Median | 9,00           |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 20573  |                |
| 2008-1                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 5,13           |
|                        |   | Median | 7,00           |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 21486          |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 5,36           |
|                        |   | Median | 8,00           |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 17081  |                |
| 2008-2                 | männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 4,43           |
|                        |   | Median | 6,00           |
|                        | <i>Halbjahressumme</i>  |        | 12812          |
|                        | weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean   | 4,55           |
|                        |   | Median | 7,00           |
| <i>Halbjahressumme</i> |   | 9559   |                |



| EZ     | Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte                        | Folgehalbjahre |              |
|--------|--|----------------|--------------|
| 2009-1 | männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit    | Mean           | 3,99         |
|        |  | Median         | 6,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>12823</i> |
|        | weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean           | 3,99         |
|        |  | Median         | 6,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>9647</i>  |
| 2009-2 | männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit    | Mean           | 3,31         |
|        |  | Median         | 5,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>9020</i>  |
|        | weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean           | 3,52         |
|        |  | Median         | 5,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>7486</i>  |
| 2010-1 | männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit    | Mean           | 2,82         |
|        |  | Median         | 4,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>8529</i>  |
|        | weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean           | 2,84         |
|        |  | Median         | 4,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>6168</i>  |
| 2010-2 | männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit    | Mean           | 2,23         |
|        |  | Median         | 3,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>6897</i>  |
|        | weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean           | 2,32         |
|        |  | Median         | 3,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>5363</i>  |
| 2011-1 | männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit    | Mean           | 1,57         |
|        |  | Median         | 2,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>4935</i>  |
|        | weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean           | 1,64         |
|        |  | Median         | 2,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>3900</i>  |
| 2011-2 | männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit    | Mean           | 0,86         |
|        |  | Median         | 1,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>2602</i>  |
|        | weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit | Mean           | 0,86         |
|        |  | Median         | 1,00         |
|        | <i>Halbjahressumme</i>   |                | <i>1963</i>  |

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im Berichts-  
 halbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen  
 nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen,  
 da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

**Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation**

| EZ             | Patienten ohne medizinische Dokumentation |                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr  | 3. Halbjahr   | 4. Halbjahr  | 5. Halbjahr  | 6. Halbjahr  | 7. Halbjahr  | 8. Halbjahr  | 9. Halbjahr  | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |              |
|----------------|---|----------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2005-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 342                    | 318          | 277           | 242          | 220          | 207          | 194          | 186          | 176          | 172               | 167               | 159               | 152               | 147               | 141               |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 8            | 11            | 4            | 2            | 0            | 0            | 2            | 2            | 4                 | 6                 | 4                 | 4                 | 3                 | 3                 |              |
|                |   | Anteil in %    |                        |              | 2,52          | 3,97         | 1,65         | 0,91         | 0,00         | 0,00         | 1,08         | 1,14              | 2,33              | 3,59              | 2,52              | 2,63              | 2,04              | 2,13         |
|                |   | CI Anteil in % |                        |              | [0,79; 4,24]  | [1,67; 6,27] | [0,04; 3,26] | [0,00; 2,17] | [0,00; 0,00] | [0,00; 0,00] | [0,00; 2,56] | [0,00; 2,71]      | [0,07; 4,58]      | [0,76; 6,42]      | [0,07; 4,96]      | [0,08; 5,18]      | [0,00; 4,33]      | [0,00; 4,52] |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 292                    | 281          | 246           | 214          | 195          | 183          | 174          | 167          | 160          | 151               | 145               | 141               | 139               | 136               | 129               |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 4            | 22            | 4            | 1            | 2            | 5            | 2            | 4            | 4                 | 2                 | 2                 | 3                 | 7                 | 4                 |              |
| Anteil in %    |   |                |                        | 1,42         | 8,94          | 1,87         | 0,51         | 1,09         | 2,87         | 1,20         | 2,50         | 2,65              | 1,38              | 1,42              | 2,16              | 5,15              | 3,10              |              |
| CI Anteil in % |   |                |                        | [0,04; 2,81] | [5,37; 12,52] | [0,05; 3,69] | [0,00; 1,52] | [0,00; 2,60] | [0,38; 5,36] | [0,00; 2,85] | [0,07; 4,93] | [0,08; 5,22]      | [0,00; 3,28]      | [0,00; 3,38]      | [0,00; 4,58]      | [1,42; 8,87]      | [0,10; 6,10]      |              |
| 2005-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 2287                   | 2094         | 1857          | 1690         | 1582         | 1510         | 1432         | 1368         | 1309         | 1254              | 1185              | 1153              | 1103              | 1050              |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 55           | 41            | 33           | 32           | 38           | 48           | 27           | 28           | 25                | 21                | 20                | 30                | 18                |                   |              |
|                |   | Anteil in %    |                        |              | 2,63          | 2,21         | 1,95         | 2,02         | 2,52         | 3,35         | 1,97         | 2,14              | 1,99              | 1,77              | 1,73              | 2,72              | 1,71              |              |
|                |   | CI Anteil in % |                        |              | [1,94; 3,31]  | [1,54; 2,88] | [1,29; 2,61] | [1,33; 2,72] | [1,73; 3,31] | [2,42; 4,28] | [1,24; 2,71] | [1,35; 2,92]      | [1,22; 2,77]      | [1,02; 2,52]      | [0,98; 2,49]      | [1,76; 3,68]      | [0,93; 2,50]      |              |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 1772                   | 1624         | 1439          | 1318         | 1242         | 1172         | 1116         | 1075         | 1026         | 966               | 936               | 903               | 870               | 839               |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 54           | 39            | 33           | 23           | 28           | 42           | 35           | 34           | 18                | 18                | 21                | 17                | 34                |                   |              |
| Anteil in %    |   |                |                        | 3,33         | 2,71          | 2,50         | 1,85         | 2,39         | 3,76         | 3,26         | 3,31         | 1,86              | 1,92              | 2,33              | 1,95              | 4,05              |                   |              |
| CI Anteil in % |   |                |                        | [2,45; 4,20] | [1,87; 3,55]  | [1,66; 3,35] | [1,10; 2,60] | [1,51; 3,26] | [2,65; 4,88] | [2,19; 4,32] | [2,22; 4,41] | [1,01; 2,72]      | [1,04; 2,80]      | [1,34; 3,31]      | [1,03; 2,87]      | [2,72; 5,39]      |                   |              |
| 2006-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 2245                   | 2019         | 1756          | 1611         | 1483         | 1408         | 1329         | 1225         | 1149         | 1090              | 1039              | 984               | 932               |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 54           | 38            | 54           | 42           | 63           | 49           | 30           | 18           | 13                | 20                | 16                | 25                |                   |                   |              |
|                |   | Anteil in %    |                        |              | 2,67          | 2,16         | 3,35         | 2,83         | 4,47         | 3,69         | 2,45         | 1,57              | 1,19              | 1,92              | 1,63              | 2,68              |                   |              |
|                |   | CI Anteil in % |                        |              | [1,97; 3,38]  | [1,48; 2,84] | [2,47; 4,23] | [1,99; 3,68] | [3,39; 5,55] | [2,67; 4,70] | [1,58; 3,31] | [0,85; 2,28]      | [0,55; 1,84]      | [1,09; 2,76]      | [0,84; 2,42]      | [1,64; 3,72]      |                   |              |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 1759                   | 1578         | 1380          | 1253         | 1159         | 1105         | 1057         | 991          | 933          | 884               | 844               | 797               | 747               |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 47           | 41            | 42           | 42           | 49           | 27           | 30           | 23           | 16                | 18                | 15                | 13                |                   |                   |              |
| Anteil in %    |   |                |                        | 2,98         | 2,97          | 3,35         | 3,62         | 4,43         | 2,55         | 3,03         | 2,47         | 1,81              | 2,13              | 1,88              | 1,74              |                   |                   |              |
| CI Anteil in % |   |                |                        | [2,14; 3,82] | [2,07; 3,87]  | [2,35; 4,35] | [2,55; 4,70] | [3,22; 5,65] | [1,60; 3,51] | [1,96; 4,09] | [1,47; 3,46] | [0,93; 2,69]      | [1,16; 3,11]      | [0,94; 2,83]      | [0,80; 2,68]      |                   |                   |              |
| 2006-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 3054                   | 2707         | 2393          | 2179         | 2052         | 1924         | 1796         | 1691         | 1605         | 1506              | 1434              | 1366              |                   |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 61           | 83            | 51           | 113          | 61           | 51           | 38           | 23           | 28                | 22                | 29                |                   |                   |                   |              |
|                |   | Anteil in %    |                        |              | 2,25          | 3,47         | 2,34         | 5,51         | 3,17         | 2,84         | 2,25         | 1,43              | 1,86              | 1,53              | 2,12              |                   |                   |              |
|                |   | CI Anteil in % |                        |              | [1,69; 2,81]  | [2,74; 4,20] | [1,71; 2,98] | [4,52; 6,49] | [2,39; 3,95] | [2,07; 3,61] | [1,54; 2,95] | [0,85; 2,01]      | [1,18; 2,54]      | [0,90; 2,17]      | [1,36; 2,89]      |                   |                   |              |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 2346                   | 2091         | 1875          | 1753         | 1639         | 1555         | 1433         | 1332         | 1263         | 1206              | 1147              | 1090              |                   |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 56           | 46            | 55           | 106          | 63           | 46           | 33           | 19           | 25                | 24                | 15                |                   |                   |                   |              |
| Anteil in %    |   |                |                        | 2,68         | 2,45          | 3,14         | 6,47         | 4,05         | 3,21         | 2,48         | 1,50         | 2,07              | 2,09              | 1,38              |                   |                   |                   |              |
| CI Anteil in % |   |                |                        | [1,99; 3,37] | [1,75; 3,15]  | [2,32; 3,95] | [5,28; 7,66] | [3,07; 5,03] | [2,30; 4,12] | [1,64; 3,31] | [0,83; 2,18] | [1,27; 2,88]      | [1,26; 2,92]      | [0,68; 2,07]      |                   |                   |                   |              |
| 2007-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 6522                   | 5910         | 5338          | 4997         | 4736         | 4458         | 4205         | 4002         | 3822         | 3669              | 3522              |                   |                   |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 152          | 119           | 200          | 143          | 83           | 82           | 70           | 54           | 64                | 76                |                   |                   |                   |                   |              |
|                |   | Anteil in %    |                        |              | 2,57          | 2,23         | 4,00         | 3,02         | 1,86         | 1,95         | 1,75         | 1,41              | 1,74              | 2,16              |                   |                   |                   |              |
|                |   | CI Anteil in % |                        |              | [2,17; 2,98]  | [1,83; 2,63] | [3,46; 4,55] | [2,53; 3,51] | [1,46; 2,26] | [1,53; 2,37] | [1,34; 2,16] | [1,04; 1,79]      | [1,32; 2,17]      | [1,68; 2,64]      |                   |                   |                   |              |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 5314                   | 4880         | 4472          | 4196         | 3934         | 3716         | 3532         | 3362         | 3209         | 3071              | 2944              |                   |                   |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 100          | 105           | 196          | 109          | 86           | 57           | 81           | 63           | 66                | 58                |                   |                   |                   |                   |              |
| Anteil in %    |   |                |                        | 2,05         | 2,35          | 4,67         | 2,77         | 2,31         | 1,61         | 2,41         | 1,96         | 2,15              | 1,97              |                   |                   |                   |                   |              |
| CI Anteil in % |   |                |                        | [1,65; 2,45] | [1,90; 2,79]  | [4,03; 5,31] | [2,26; 3,28] | [1,83; 2,80] | [1,20; 2,03] | [1,89; 2,93] | [1,48; 2,44] | [1,64; 2,66]      | [1,47; 2,47]      |                   |                   |                   |                   |              |
| 2007-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 4414                   | 3892         | 3512          | 3195         | 2899         | 2676         | 2514         | 2368         | 2249         | 2141              |                   |                   |                   |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 129          | 198           | 128          | 100          | 77           | 71           | 67           | 58           | 53                |                   |                   |                   |                   |                   |              |
|                |   | Anteil in %    |                        |              | 3,31          | 5,64         | 4,01         | 3,45         | 2,88         | 2,82         | 2,58         | 2,48              |                   |                   |                   |                   |                   |              |
|                |   | CI Anteil in % |                        |              | [2,75; 3,88]  | [4,87; 6,40] | [3,33; 4,69] | [2,79; 4,11] | [2,24; 3,51] | [2,18; 3,47] | [2,16; 3,50] | [1,92; 3,23]      | [1,82; 3,13]      |                   |                   |                   |                   |              |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl         | 3459                   | 3091         | 2830          | 2577         | 2330         | 2170         | 2043         | 1941         | 1835         | 1756              |                   |                   |                   |                   |                   |              |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl         |                        | 94           | 183           | 100          | 65           | 49           | 58           | 43           | 36           | 44                |                   |                   |                   |                   |                   |              |
| Anteil in %    |   |                |                        | 3,04         | 6,47          | 3,88         | 2,79         | 2,26         | 2,84         | 2,22         | 1,96         | 2,51              |                   |                   |                   |                   |                   |              |
| CI Anteil in % |   |                |                        | [2,44; 3,65] | [5,56; 7,37]  | [3,13; 4,63] | [2,12; 3,46] | [1,63; 2,88] | [2,12; 3,56] | [1,56; 2,87] | [1,33; 2,60] | [1,77; 3,24]      |                   |                   |                   |                   |                   |              |

| EZ             | Patienten ohne medizinische Dokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr  | 3. Halbjahr  | 4. Halbjahr  | 5. Halbjahr  | 6. Halbjahr  | 7. Halbjahr  | 8. Halbjahr  | 9. Halbjahr  | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 4190         | 3689         | 3307         | 2914         | 2653         | 2459         | 2274         | 2144         | 2046              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 214          | 187          | 126          | 85           | 82           | 68           | 55           | 64                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |              | 5,80         | 5,65         | 4,32         | 3,20         | 3,33         | 2,99         | 2,57         | 3,13              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |              | [5,05; 6,56] | [4,87; 6,44] | [3,59; 5,06] | [2,53; 3,87] | [2,62; 4,04] | [2,29; 3,69] | [1,90; 3,23] | [2,37; 3,88]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 3188         | 2871         | 2579         | 2319         | 2120         | 1972         | 1834         | 1736         | 1650              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 146          | 133          | 83           | 57           | 62           | 43           | 52           | 56                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        | 5,09         | 5,16         | 3,58         | 2,69         | 3,14         | 2,34         | 3,00         | 3,39         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        | [4,28; 5,89] | [4,30; 6,01] | [2,82; 4,34] | [2,00; 3,38] | [2,37; 3,91] | [1,65; 3,04] | [2,19; 3,80] | [2,52; 4,27] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2893         | 2495         | 2153         | 1904         | 1738         | 1605         | 1505         | 1412         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 114          | 94           | 71           | 55           | 62           | 61           | 50           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |              | 4,57         | 4,37         | 3,73         | 3,16         | 3,86         | 4,05         | 3,54         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |              | [3,75; 5,39] | [3,50; 5,23] | [2,88; 4,58] | [2,34; 3,99] | [2,92; 4,81] | [3,06; 5,05] | [2,58; 4,51] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2099         | 1848         | 1615         | 1424         | 1290         | 1198         | 1124         | 1060         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 75           | 60           | 59           | 53           | 49           | 30           | 45           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        | 4,06         | 3,72         | 4,14         | 4,11         | 4,09         | 2,67         | 4,25         |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        | [3,16; 4,96] | [2,79; 4,64] | [3,11; 5,18] | [3,02; 5,19] | [2,97; 5,21] | [1,73; 3,61] | [3,03; 5,46] |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 3215         | 2781         | 2408         | 2143         | 1971         | 1823         | 1697         |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 106          | 94           | 64           | 66           | 57           | 50           |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |              | 3,81         | 3,90         | 2,99         | 3,35         | 3,13         | 2,95         |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |              | [3,10; 4,52] | [3,13; 4,68] | [2,27; 3,71] | [2,55; 4,14] | [2,33; 3,93] | [2,14; 3,75] |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2420         | 2074         | 1813         | 1629         | 1496         | 1367         | 1268         |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 78           | 71           | 56           | 62           | 52           | 45           |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        | 3,76         | 3,92         | 3,44         | 4,14         | 3,80         | 3,55         |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        | [2,94; 4,58] | [3,02; 4,81] | [2,55; 4,32] | [3,13; 5,15] | [2,79; 4,82] | [2,53; 4,57] |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2729         | 2303         | 1970         | 1730         | 1565         | 1452         |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 83           | 84           | 64           | 68           | 56           |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |              | 3,60         | 4,26         | 3,70         | 4,35         | 3,86         |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |              | [2,84; 4,37] | [3,37; 5,16] | [2,81; 4,59] | [3,33; 5,36] | [2,87; 4,85] |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2127         | 1839         | 1616         | 1458         | 1328         | 1245         |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 71           | 72           | 49           | 47           | 48           |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        | 3,86         | 4,46         | 3,36         | 3,54         | 3,86         |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        | [2,98; 4,74] | [3,45; 5,46] | [2,44; 4,29] | [2,55; 4,53] | [2,79; 4,93] |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 3025         | 2538         | 2206         | 1972         | 1813         |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 97           | 82           | 60           | 57           |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |              | 3,82         | 3,72         | 3,04         | 3,14         |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |              | [3,08; 4,57] | [2,93; 4,51] | [2,28; 3,80] | [2,34; 3,95] |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2174         | 1850         | 1591         | 1428         | 1299         |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 66           | 56           | 50           | 48           |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        | 3,57         | 3,52         | 3,50         | 3,70         |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        | [2,72; 4,41] | [2,61; 4,43] | [2,55; 4,46] | [2,67; 4,72] |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 3086         | 2626         | 2248         | 2023         |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 83           | 81           | 76           |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |              | 3,16         | 3,60         | 3,76         |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |              | [2,49; 3,83] | [2,83; 4,37] | [2,93; 4,59] |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2312         | 2021         | 1768         | 1574         |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 58           | 60           | 47           |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        | 2,87         | 3,39         | 2,99         |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        | [2,14; 3,60] | [2,55; 4,24] | [2,14; 3,83] |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 3146         | 2666         | 2269         |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 91           | 94           |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |              | 3,41         | 4,14         |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |              | [2,72; 4,10] | [3,32; 4,96] |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2382         | 2091         | 1809         |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |              | 49           | 56           |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        | 2,34         | 3,10         |              |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        | [1,69; 2,99] | [2,30; 3,89] |              |              |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ             | Patienten ohne medizinische Dokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr  | 4. Halbjahr  | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2011-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 3031        | 2602         |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |             | 118          |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |             |              | 4,54         |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |             |              | [3,74; 5,33] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2272        | 1963         |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |             | 91           |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        |             | 4,64         |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        |             | [3,71; 5,57] |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2012-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 3423        |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |             |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            |             |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         |             |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>      | Anzahl                 | 2494        |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | ohne medizinische Dokumentation           | Anzahl                 |             |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   |                        |             |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   |                        |             |              |              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

### **Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung**

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Abschlussbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

#### **Risikofaktoren**

- Gewichtsentwicklung (BMI)
- Raucherstatus
- Hypertonus

#### **Laborwerte**

- HbA1c-Werte
- Serum-Kreatinin-Werte
- Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)
- Untersuchung auf pathologische Urinalbumin-Ausscheidung

#### **Medikation**

- Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern

#### **Prozessparameter**

- Diabetes-Schulungen
- Hypertonie-Schulung

#### **Augenärztliche Auswertungen**

- Ophthalmologische Netzhautuntersuchung
- Diabetische Retinopathie

#### **Ereigniszeitanalysen: Neu auftretende Begleit- und Folgeerkrankungen, Endpunktfreiheit**

- Erblindung
- Diabetische Nephropathie
- Erheblich auffälliger Fußstatus
- Amputation
- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Nierenersatztherapie
- Überlebensraten bei primären und sekundären Endpunkten

### 3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu drei Variablen dargestellt. Zunächst werden Angaben zur Gewichtsentwicklung anhand des Body-Mass-Index (BMI) dargestellt. Der BMI wird durch den Quotienten aus Körpergewicht in kg und Körpergröße in m im Quadrat errechnet ( $\text{kg}/\text{m}^2$ ). BMI-Werte unter  $25 \text{ kg}/\text{m}^2$  sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und  $30 \text{ kg}/\text{m}^2$  als leicht übergewichtig und BMI-Werte über  $30 \text{ kg}/\text{m}^2$  als übergewichtig (adipös) zu werten.

Anschließend werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortalität ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle 3.1.1a ist die Entwicklung des **Body-Mass-Index** für erwachsene Patienten ausgewiesen. Für jede Kohorte werden dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten  $\geq 18$  insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnung, Differenzbildung und Kategorienbildung. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen BMI im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei nicht um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen (plausible) Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Abschließend werden die Patientenzahlen in den BMI-Kategorien (normalgewichtig, leicht übergewichtig, übergewichtig) dargestellt.

Anschließend wird in Tabelle 3.1.1.b der **Body-Mass-Index bei Kindern** ausgewiesen. Für jede Kohorte werden dazu unter „Patienten  $< 18$  insgesamt“ und unter „männliche bzw. weibliche Patienten  $< 18$  insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben. Anschließend werden die Patientenzahlen differenziert nach der Geschlechterzugehörigkeit in den BMI-Kategorien (untergewichtig, normal, mäßig adipös, (stark) adipös) dargestellt. Dazu werden die alters- und geschlechtsspezifischen Kategoriengrenzen verwendet, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

**BMI: Alters- und geschlechtsspezifischen Kategoriengrenzen für Mädchen und Jungen<sup>4</sup>**

\* rechnerisches Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Auswertungsjahres kann bei 1-jährigen 0 Jahre betragen

**Mädchen**

| Alter    | untergewichtig | normal      | mäßig adipös | (stark) adipös |
|----------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 0 bis 1* | ≤ 14,8         | 14,9 - 18,2 | 18,3 - 19,2  | ≥ 19,3         |
| 2        | ≤ 14,3         | 14,4 - 17,9 | 18,0 - 19,0  | ≥ 19,1         |
| 3        | ≤ 13,9         | 14,0 - 17,6 | 17,7 - 18,8  | ≥ 18,9         |
| 4        | ≤ 13,6         | 13,7 - 17,5 | 17,6 - 18,8  | ≥ 18,9         |
| 5        | ≤ 13,5         | 13,6 - 17,6 | 17,7 - 19,0  | ≥ 19,1         |
| 6        | ≤ 13,5         | 13,6 - 17,9 | 18,0 - 19,6  | ≥ 19,7         |
| 7        | ≤ 13,6         | 13,7 - 18,4 | 18,5 - 20,3  | ≥ 20,4         |
| 8        | ≤ 13,8         | 13,9 - 19,2 | 19,3 - 21,4  | ≥ 21,5         |
| 9        | ≤ 14,1         | 14,2 - 19,9 | 20,0 - 22,4  | ≥ 22,5         |
| 10       | ≤ 14,4         | 14,5 - 20,7 | 20,8 - 23,4  | ≥ 23,5         |
| 11       | ≤ 14,8         | 14,9 - 21,5 | 21,6 - 24,4  | ≥ 24,5         |
| 12       | ≤ 15,3         | 15,4 - 22,4 | 22,5 - 25,4  | ≥ 25,5         |
| 13       | ≤ 16,0         | 16,1 - 23,2 | 23,3 - 26,2  | ≥ 26,3         |
| 14       | ≤ 16,6         | 16,7 - 24,0 | 24,1 - 26,9  | ≥ 27,0         |
| 15       | ≤ 17,2         | 17,3 - 24,5 | 24,6 - 27,4  | ≥ 27,5         |
| 16       | ≤ 17,6         | 17,7 - 24,8 | 24,9 - 27,6  | ≥ 27,7         |
| 17       | ≤ 17,9         | 18,0 - 25,0 | 25,1 - 27,6  | ≥ 27,7         |
| ≥ 18     | < 18,5         | 18,5 - 24,9 | 25,0 - 29,9  | ≥ 30,0         |

**Jungen**

| Alter    | untergewichtig | normal      | mäßig adipös | (stark) adipös |
|----------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 0 bis 1* | ≤ 15,1         | 15,2 - 18,7 | 18,8 - 19,8  | ≥ 19,9         |
| 2        | ≤ 14,5         | 14,6 - 17,9 | 18,0 - 19,1  | ≥ 19,2         |
| 3        | ≤ 14,0         | 14,1 - 17,6 | 17,7 - 18,8  | ≥ 18,9         |
| 4        | ≤ 13,9         | 14,0 - 17,5 | 17,6 - 18,8  | ≥ 18,9         |
| 5        | ≤ 13,7         | 13,8 - 17,5 | 17,6 - 18,9  | ≥ 19,0         |
| 6        | ≤ 13,7         | 13,8 - 17,8 | 17,9 - 19,3  | ≥ 19,4         |
| 7        | ≤ 13,8         | 13,9 - 18,2 | 18,3 - 20,1  | ≥ 20,2         |
| 8        | ≤ 14,0         | 14,1 - 18,9 | 19,0 - 21,0  | ≥ 21,1         |
| 9        | ≤ 14,2         | 14,3 - 19,7 | 19,8 - 22,1  | ≥ 22,2         |
| 10       | ≤ 14,5         | 14,6 - 20,5 | 20,6 - 23,3  | ≥ 23,4         |
| 11       | ≤ 14,9         | 15,0 - 21,3 | 21,4 - 24,4  | ≥ 24,5         |
| 12       | ≤ 15,3         | 15,4 - 22,2 | 22,3 - 25,3  | ≥ 25,4         |
| 13       | ≤ 15,8         | 15,9 - 22,9 | 23,0 - 26,2  | ≥ 26,3         |
| 14       | ≤ 16,4         | 16,5 - 23,6 | 23,7 - 26,9  | ≥ 27,0         |
| 15       | ≤ 16,9         | 17,0 - 24,3 | 24,4 - 27,4  | ≥ 27,5         |
| 16       | ≤ 17,5         | 17,6 - 24,8 | 24,9 - 27,9  | ≥ 28,0         |
| 17       | ≤ 18,0         | 18,1 - 25,3 | 25,4 - 28,3  | ≥ 28,4         |
| ≥ 18     | < 18,5         | 18,5 - 24,9 | 25,0 - 29,9  | ≥ 30,0         |

<sup>4</sup>Die Werte für den BMI richten sich nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA), die sich auf die Perzentilkurven von H. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al. beziehen, veröffentlicht in der Monatszeitschrift für Kinderheilkunde 149 (2001) 807-818. Die jeweils letzte Zeile (Alter ≥ 18) zeigt Werte gemäß Definition der WHO. Die Größe der Minderjährigen zur ED wird ab dem Zeitpunkt der ersten Doku NACH Erreichen des 18. Lebensjahres (vollständige Jahre) fixiert.

Tabelle 3.1.1a Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index

| EZ                                 | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index |   | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                   |                   |
|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2005-1                             | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     |   | Anzahl                       | 319               | 298               | 257               | 226               | 207               | 195               | 186               | 178               | 168               | 164               | 160               | 152               | 146               | 142               | 137               |                   |
|                                    | auswertbar                                    |   | Anzahl                       | 319               | 290               | 247               | 222               | 205               | 194               | 186               | 176               | 166               | 162               | 154               | 149               | 143               | 139               | 134               |                   |
|                                    | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI         | Mean                                      |                              | 26,62             | 26,70             | 26,95             | 26,87             | 26,98             | 26,98             | 26,78             | 26,82             | 26,81             | 26,88             | 26,98             | 26,87             | 27,16             | 27,36             | 27,45             |                   |
|                                    |   | CI Mean                                   |                              | [26,11;<br>27,14] | [26,17;<br>27,23] | [26,31;<br>27,59] | [26,25;<br>27,48] | [26,34;<br>27,63] | [26,28;<br>27,67] | [26,07;<br>27,49] | [26,10;<br>27,54] | [26,04;<br>27,57] | [26,10;<br>27,66] | [26,15;<br>27,81] | [26,03;<br>27,71] | [26,30;<br>28,02] | [26,42;<br>28,29] | [26,46;<br>28,44] |                   |
|                                    |   | Median                                    |                              | 25,76             | 25,90             | 25,95             | 26,05             | 26,20             | 26,02             | 25,73             | 26,12             | 26,11             | 26,18             | 26,05             | 25,66             | 26,12             | 26,29             | 26,12             |                   |
|                                    |   | Fallbasis mittlere Differenz              |                              |                   | 290               | 247               | 222               | 205               | 194               | 186               | 176               | 166               | 162               | 154               | 149               | 143               | 139               | 134               |                   |
|                                    |   | Mittlere Differenz zur ED                 |                              |                   | 0,15              | 0,24              | 0,00              | 0,22              | 0,33              | 0,37              | 0,38              | 0,48              | 0,55              | 0,61              | 0,62              | 0,89              | 1,02              | 1,15              |                   |
|                                    |   | CI mittlere Differenz                     |                              |                   | [0,03; 0,28]      | [-0,08;<br>0,56]  | [-0,23;<br>0,23]  | [-0,03;<br>0,46]  | [0,07; 0,60]      | [0,05; 0,69]      | [0,06; 0,69]      | [0,14; 0,81]      | [0,19; 0,91]      | [0,21; 1,01]      | [0,17; 1,07]      | [0,45; 1,34]      | [0,53; 1,51]      | [0,62; 1,67]      |                   |
|                                    |   | Median mittlere Differenz                 |                              |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,31              | 0,00              | 0,00              | 0,36              | 0,58              | 0,64              |                   |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>BMI < 25                 | Anzahl                                    |                              | 129               | 114               | 96                | 84                | 74                | 73                | 73                | 67                | 65                | 64                | 59                | 60                | 52                | 52                | 51                |                   |
|                                    |   | Anteil in %                               |                              | 40,44             | 39,31             | 38,87             | 37,84             | 36,10             | 37,63             | 39,25             | 38,07             | 39,16             | 39,51             | 38,31             | 40,27             | 36,36             | 37,41             | 38,06             |                   |
|                                    |   | CI Anteil in %                            |                              | [35,04;<br>45,83] | [33,68;<br>44,94] | [32,78;<br>44,96] | [31,44;<br>44,23] | [29,51;<br>42,69] | [30,79;<br>44,46] | [32,21;<br>46,28] | [30,87;<br>45,26] | [31,71;<br>46,60] | [31,95;<br>47,06] | [30,61;<br>46,01] | [32,37;<br>48,17] | [28,45;<br>44,28] | [29,34;<br>45,48] | [29,81;<br>46,31] |                   |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>25 ≤ BMI < 30            | Anzahl                                    |                              | 126               | 120               | 103               | 96                | 95                | 86                | 80                | 81                | 76                | 73                | 70                | 64                | 64                | 55                | 52                |                   |
|                                    |   | Anteil in %                               |                              | 39,50             | 41,38             | 41,70             | 43,24             | 46,34             | 44,33             | 43,01             | 46,02             | 45,78             | 45,06             | 45,45             | 42,95             | 44,76             | 39,57             | 38,81             |                   |
|                                    |   | CI Anteil in %                            |                              | [34,13;<br>44,87] | [35,70;<br>47,06] | [35,54;<br>47,86] | [36,71;<br>49,77] | [39,50;<br>53,18] | [37,32;<br>51,34] | [35,88;<br>50,15] | [38,64;<br>53,41] | [38,18;<br>53,39] | [37,38;<br>52,75] | [37,56;<br>53,34] | [34,98;<br>50,93] | [36,58;<br>52,93] | [31,41;<br>47,73] | [30,52;<br>47,09] |                   |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>BMI ≥ 30                 | Anzahl                                    |                              | 64                | 56                | 48                | 42                | 36                | 35                | 33                | 28                | 25                | 25                | 25                | 25                | 27                | 32                | 31                |                   |
|                                    |   | Anteil in %                               |                              | 20,06             | 19,31             | 19,43             | 18,92             | 17,56             | 18,04             | 17,74             | 15,91             | 15,06             | 15,43             | 16,23             | 16,78             | 18,88             | 23,02             | 23,13             |                   |
|                                    |   | CI Anteil in %                            |                              | [15,66;<br>24,46] | [14,76;<br>23,86] | [14,49;<br>24,38] | [13,76;<br>24,08] | [12,34;<br>22,78] | [12,62;<br>23,47] | [12,24;<br>23,25] | [10,49;<br>21,33] | [9,60;<br>20,52]  | [9,85;<br>21,01]  | [10,39;<br>22,08] | [10,76;<br>22,80] | [12,44;<br>25,32] | [16,00;<br>30,05] | [15,97;<br>30,30] |                   |
|                                    | 2005-1  | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b> |                              | Anzahl            | 275               | 265               | 231               | 202               | 184               | 172               | 164               | 158               | 151               | 144               | 138               | 134               | 132               | 129               | 122               |
|                                    |   | auswertbar                                |                              | Anzahl            | 275               | 261               | 211               | 199               | 183               | 170               | 159               | 157               | 148               | 141               | 137               | 133               | 130               | 122               | 119               |
|                                    |   | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI     | Mean                         |                   | 27,25             | 27,40             | 27,71             | 27,72             | 27,44             | 27,43             | 27,59             | 27,85             | 27,85             | 27,62             | 27,62             | 27,80             | 27,83             | 27,94             | 27,97             |
|                                    |   |   | CI Mean                      |                   | [26,56;<br>27,94] | [26,70;<br>28,10] | [26,89;<br>28,53] | [26,87;<br>28,56] | [26,66;<br>28,23] | [26,66;<br>28,19] | [26,75;<br>28,42] | [26,92;<br>28,77] | [26,97;<br>28,74] | [26,75;<br>28,49] | [26,72;<br>28,51] | [26,89;<br>28,71] | [26,88;<br>28,77] | [26,90;<br>28,97] | [26,91;<br>29,02] |
|                                    |   |   | Median                       |                   | 26,30             | 26,22             | 26,93             | 26,91             | 26,57             | 26,51             | 26,26             | 26,49             | 26,57             | 26,57             | 26,54             | 26,62             | 26,93             | 26,70             | 26,71             |
|                                    |   |   | Fallbasis mittlere Differenz |                   |                   | 261               | 211               | 199               | 183               | 170               | 159               | 157               | 148               | 141               | 137               | 133               | 130               | 122               | 119               |
| Mittlere Differenz zur ED          |   |   |                              | 0,24              | 0,35              | 0,38              | 0,44              | 0,36              | 0,49              | 0,70              | 0,67              | 0,68              | 0,65              | 0,84              | 0,83              | 0,92              | 0,98              |                   |                   |
| CI mittlere Differenz              |   |   |                              | [0,08; 0,41]      | [0,11; 0,59]      | [0,10; 0,66]      | [0,11; 0,78]      | [0,01; 0,71]      | [0,12; 0,87]      | [0,22; 1,19]      | [0,25; 1,09]      | [0,25; 1,12]      | [0,22; 1,08]      | [0,36; 1,32]      | [0,36; 1,31]      | [0,44; 1,39]      | [0,48; 1,48]      |                   |                   |
| Median mittlere Differenz          |   |   |                              | 0,00              | 0,29              | 0,32              | 0,34              | 0,34              | 0,35              | 0,40              | 0,45              | 0,38              | 0,44              | 0,75              | 0,70              | 0,73              | 1,01              |                   |                   |
| Pat. in Kategorie<br>BMI < 25      |   | Anzahl                                    |                              | 110               | 99                | 82                | 76                | 66                | 58                | 58                | 54                | 50                | 47                | 43                | 47                | 43                | 42                | 41                |                   |
|                                    |   | Anteil in %                               |                              | 40,00             | 37,93             | 38,86             | 38,19             | 36,07             | 34,12             | 36,48             | 34,39             | 33,78             | 33,33             | 31,39             | 35,34             | 33,08             | 34,43             | 34,45             |                   |
|                                    |   | CI Anteil in %                            |                              | [34,20;<br>45,80] | [32,03;<br>43,83] | [32,27;<br>45,46] | [31,42;<br>44,96] | [29,09;<br>43,04] | [26,97;<br>41,27] | [28,97;<br>43,98] | [26,94;<br>41,85] | [26,14;<br>41,43] | [25,52;<br>41,14] | [23,59;<br>39,19] | [27,18;<br>43,49] | [24,96;<br>41,20] | [25,96;<br>42,89] | [25,88;<br>43,03] |                   |
| Pat. in Kategorie<br>25 ≤ BMI < 30 |   | Anzahl                                    |                              | 94                | 96                | 72                | 66                | 67                | 65                | 58                | 57                | 55                | 52                | 56                | 48                | 47                | 43                | 41                |                   |
|                                    |   | Anteil in %                               |                              | 34,18             | 36,78             | 34,12             | 33,17             | 36,61             | 38,24             | 36,48             | 36,31             | 37,16             | 36,88             | 40,88             | 36,09             | 36,15             | 35,25             | 34,45             |                   |
|                                    |   | CI Anteil in %                            |                              | [28,57;<br>39,80] | [30,92;<br>42,64] | [27,71;<br>40,54] | [26,61;<br>39,72] | [29,61;<br>43,61] | [30,91;<br>45,56] | [28,97;<br>43,98] | [28,76;<br>43,85] | [29,35;<br>44,97] | [28,89;<br>44,87] | [32,61;<br>49,14] | [27,90;<br>44,28] | [27,86;<br>44,44] | [26,73;<br>43,76] | [25,88;<br>43,03] |                   |
| Pat. in Kategorie<br>BMI ≥ 30      |   | Anzahl                                    |                              | 71                | 66                | 57                | 57                | 50                | 47                | 43                | 46                | 43                | 42                | 38                | 38                | 40                | 37                | 37                |                   |
|                                    |   | Anteil in %                               |                              | 25,82             | 25,29             | 27,01             | 28,64             | 27,32             | 27,65             | 27,04             | 29,30             | 29,05             | 29,79             | 27,74             | 28,57             | 30,77             | 30,33             | 31,09             |                   |
|                                    |   | CI Anteil in %                            |                              | [20,64;<br>31,00] | [20,00;<br>30,57] | [21,01;<br>33,02] | [22,35;<br>34,94] | [20,85;<br>33,80] | [20,90;<br>34,39] | [20,12;<br>33,97] | [22,16;<br>36,44] | [21,71;<br>36,39] | [22,21;<br>37,36] | [20,21;<br>35,26] | [20,86;<br>36,28] | [22,80;<br>38,73] | [22,14;<br>38,52] | [22,74;<br>39,44] |                   |



| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-2                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2160           | 1982           | 1754           | 1603           | 1498           | 1430           | 1359           | 1307           | 1254           | 1202           | 1134           | 1103           | 1058           | 1010           |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2155           | 1926           | 1713           | 1568           | 1467           | 1389           | 1315           | 1281           | 1225           | 1176           | 1112           | 1082           | 1029           | 991            |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,88          | 27,40          | 27,36          | 27,54          | 27,63          | 27,83          | 27,90          | 27,95          | 27,98          | 28,10          | 28,10          | 28,14          | 28,15          | 28,33          |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,67; 27,08] | [27,12; 27,69] | [27,08; 27,63] | [27,25; 27,83] | [27,33; 27,93] | [27,51; 28,15] | [27,57; 28,22] | [27,62; 28,27] | [27,65; 28,31] | [27,75; 28,45] | [27,73; 28,46] | [27,77; 28,51] | [27,77; 28,52] | [27,93; 28,72] |
|                                 |   | Median                       | 26,47          | 26,79          | 26,83          | 26,93          | 27,12          | 27,24          | 27,17          | 27,28          | 27,28          | 27,35          | 27,45          | 27,43          | 27,46          | 27,54          |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1922           | 1710           | 1565           | 1464           | 1386           | 1313           | 1279           | 1223           | 1174           | 1110           | 1080           | 1027           | 989            |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,23           | 0,22           | 0,32           | 0,41           | 0,55           | 0,59           | 0,67           | 0,68           | 0,81           | 0,77           | 0,83           | 0,81           | 0,97           |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,16; 0,30]   | [0,13; 0,30]   | [0,22; 0,42]   | [0,33; 0,50]   | [0,45; 0,66]   | [0,47; 0,71]   | [0,56; 0,79]   | [0,57; 0,79]   | [0,67; 0,94]   | [0,64; 0,89]   | [0,68; 0,97]   | [0,67; 0,95]   | [0,81; 1,13]   |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,31           | 0,32           | 0,35           | 0,35           | 0,39           | 0,58           | 0,63           | 0,60           | 0,62           | 0,63           | 0,66           |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                       | 794            | 652            | 578            | 502            | 455            | 391            | 373            | 367            | 345            | 317            | 302            | 293            | 271            | 256            |
|                                 |   | Anteil in %                  | 36,84          | 33,85          | 33,74          | 32,02          | 31,02          | 28,15          | 28,37          | 28,65          | 28,16          | 26,96          | 27,16          | 27,08          | 26,34          | 25,83          |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [34,81; 38,88] | [31,74; 35,97] | [31,50; 35,98] | [29,71; 34,33] | [28,65; 33,38] | [25,78; 30,52] | [25,93; 30,80] | [26,17; 31,13] | [25,64; 30,68] | [24,42; 29,49] | [24,54; 29,77] | [24,43; 29,73] | [23,64; 29,03] | [23,11; 28,56] |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                       | 902            | 812            | 734            | 674            | 645            | 625            | 590            | 552            | 544            | 537            | 511            | 486            | 459            | 426            |
|                                 |   | Anteil in %                  | 41,86          | 42,16          | 42,85          | 42,98          | 43,97          | 45,00          | 44,87          | 43,09          | 44,41          | 45,66          | 45,95          | 44,92          | 44,61          | 42,99          |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [39,77; 43,94] | [39,95; 44,37] | [40,50; 45,19] | [40,53; 45,44] | [41,43; 46,51] | [42,38; 47,61] | [42,18; 47,56] | [40,38; 45,80] | [41,62; 47,19] | [42,82; 48,51] | [43,02; 48,88] | [41,95; 47,88] | [41,57; 47,65] | [39,90; 46,07] |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                       | 459            | 462            | 401            | 392            | 367            | 373            | 352            | 362            | 336            | 322            | 299            | 303            | 299            | 309            |
|                                 |   | Anteil in %                  | 21,30          | 23,99          | 23,41          | 25,00          | 25,02          | 26,85          | 26,77          | 28,26          | 27,43          | 27,38          | 26,89          | 28,00          | 29,06          | 31,18          |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [19,57; 23,03] | [22,08; 25,90] | [21,40; 25,42] | [22,86; 27,14] | [22,80; 27,23] | [24,52; 29,19] | [24,37; 29,16] | [25,79; 30,73] | [24,93; 29,93] | [24,83; 29,93] | [24,28; 29,50] | [25,33; 30,68] | [26,28; 31,83] | [28,30; 34,07] |
|                                 | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 1650           | 1517           | 1356           | 1248           | 1178           | 1120           | 1069           | 1031           | 986            | 932            | 906            | 877            | 845            | 815            |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 1646           | 1467           | 1319           | 1215           | 1152           | 1086           | 1026           | 997            | 953            | 914            | 886            | 854            | 826            | 780            |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 27,18          | 27,74          | 27,58          | 27,78          | 27,72          | 27,81          | 27,97          | 27,96          | 27,96          | 28,01          | 28,05          | 28,09          | 28,11          | 28,11          |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,85; 27,51] | [27,29; 28,20] | [27,13; 28,03] | [27,28; 28,28] | [27,28; 28,16] | [27,36; 28,26] | [27,48; 28,46] | [27,46; 28,46] | [27,53; 28,39] | [27,56; 28,45] | [27,60; 28,49] | [27,65; 28,54] | [27,65; 28,57] | [27,64; 28,58] |
|                                 |   | Median                       | 25,96          | 26,35          | 26,04          | 26,22          | 26,30          | 26,38          | 26,53          | 26,40          | 26,56          | 26,72          | 26,77          | 26,81          | 26,68          | 26,87          |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1464           | 1316           | 1212           | 1150           | 1084           | 1024           | 995            | 952            | 913            | 885            | 853            | 825            | 779            |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,26           | 0,23           | 0,28           | 0,35           | 0,44           | 0,48           | 0,52           | 0,64           | 0,68           | 0,71           | 0,76           | 0,86           | 0,83           |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,15; 0,37]   | [0,10; 0,36]   | [0,16; 0,39]   | [0,22; 0,48]   | [0,30; 0,57]   | [0,32; 0,63]   | [0,36; 0,68]   | [0,47; 0,81]   | [0,50; 0,85]   | [0,53; 0,89]   | [0,57; 0,95]   | [0,66; 1,06]   | [0,61; 1,04]   |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,34           | 0,34           | 0,38           | 0,37           | 0,39           | 0,43           | 0,68           | 0,46           | 0,68           | 0,71           | 0,74           |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      | Anzahl  | 693                          | 580            | 538            | 483            | 452            | 413            | 392            | 386            | 344            | 324            | 315            | 303            | 290            | 279            |                |
|                                 | Anteil in %                                   | 42,10                        | 39,54          | 40,79          | 39,75          | 39,24          | 38,03          | 38,21          | 38,72          | 36,10          | 35,45          | 35,55          | 35,48          | 35,11          | 35,77          |                |
|                                 | CI Anteil in %                                | [39,72; 44,49]               | [37,03; 42,04] | [38,14; 43,44] | [37,00; 42,51] | [36,42; 42,06] | [35,14; 40,92] | [35,23; 41,18] | [35,69; 41,74] | [33,05; 39,15] | [32,35; 38,55] | [32,40; 38,71] | [32,27; 38,69] | [31,85; 38,37] | [32,40; 39,14] |                |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 | Anzahl  | 521                          | 483            | 437            | 396            | 379            | 363            | 334            | 321            | 327            | 317            | 306            | 285            | 278            | 260            |                |
|                                 | Anteil in %                                   | 31,65                        | 32,92          | 33,13          | 32,59          | 32,90          | 33,43          | 32,55          | 32,20          | 34,31          | 34,68          | 34,54          | 33,37          | 33,66          | 33,33          |                |
|                                 | CI Anteil in %                                | [29,40; 33,90]               | [30,52; 35,33] | [30,59; 35,67] | [29,96; 35,23] | [30,18; 35,61] | [30,62; 36,23] | [29,68; 35,42] | [29,29; 35,10] | [31,30; 37,33] | [31,60; 37,77] | [31,40; 37,67] | [30,21; 36,54] | [30,43; 36,88] | [30,02; 36,64] |                |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      | Anzahl  | 432                          | 404            | 344            | 336            | 321            | 310            | 300            | 290            | 282            | 273            | 265            | 266            | 258            | 241            |                |
|                                 | Anteil in %                                   | 26,25                        | 27,54          | 26,08          | 27,65          | 27,86          | 28,55          | 29,24          | 29,09          | 29,59          | 29,87          | 29,91          | 31,15          | 31,23          | 30,90          |                |
|                                 | CI Anteil in %                                | [24,12; 28,37]               | [25,25; 29,83] | [23,71; 28,45] | [25,14; 30,17] | [25,27; 30,45] | [25,86; 31,23] | [26,46; 32,02] | [26,27; 31,91] | [26,69; 32,49] | [26,90; 32,84] | [26,89; 32,93] | [28,04; 34,26] | [28,07; 34,40] | [27,65; 34,14] |                |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2006-1                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2101           | 1884           | 1636           | 1499           | 1384           | 1313           | 1247           | 1155           | 1086           | 1032           | 988            | 935            | 886            |              |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2096           | 1832           | 1598           | 1448           | 1340           | 1254           | 1202           | 1129           | 1068           | 1020           | 969            | 919            | 862            |              |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,65          | 27,08          | 27,16          | 27,29          | 27,40          | 27,48          | 27,62          | 27,64          | 27,79          | 27,83          | 27,83          | 28,00          | 28,06          |              |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,42; 26,88] | [26,77; 27,39] | [26,83; 27,49] | [26,93; 27,65] | [27,02; 27,78] | [27,07; 27,88] | [27,20; 28,03] | [27,21; 28,08] | [27,34; 28,25] | [27,33; 28,32] | [27,34; 28,32] | [27,49; 28,50] | [27,54; 28,59] |              |
|                                 |   | Median                       | 25,93          | 26,12          | 26,36          | 26,54          | 26,62          | 26,58          | 26,64          | 26,85          | 26,87          | 26,83          | 26,84          | 27,04          | 26,99          |              |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1829           | 1595           | 1445           | 1337           | 1251           | 1199           | 1126           | 1065           | 1017           | 966            | 916            | 859            |              |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,17           | 0,21           | 0,29           | 0,36           | 0,40           | 0,49           | 0,50           | 0,60           | 0,63           | 0,60           | 0,73           | 0,75           |              |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,06; 0,28]   | [0,10; 0,33]   | [0,17; 0,41]   | [0,22; 0,49]   | [0,27; 0,53]   | [0,35; 0,64]   | [0,34; 0,65]   | [0,43; 0,78]   | [0,45; 0,81]   | [0,42; 0,79]   | [0,53; 0,92]   | [0,55; 0,96]   |              |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                       | 855            | 702            | 583            | 513            | 460            | 435            | 403            | 376            | 337            | 315            | 307            | 280            | 252            |              |
|                                 |   | Anteil in %                  | 40,79          | 38,32          | 36,48          | 35,43          | 34,33          | 34,69          | 33,53          | 33,30          | 31,55          | 30,88          | 31,68          | 30,47          | 29,23          |              |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [38,69; 42,90] | [36,09; 40,55] | [34,12; 38,84] | [32,96; 37,89] | [31,79; 36,87] | [32,05; 37,32] | [30,86; 36,20] | [30,55; 36,05] | [28,77; 34,34] | [28,05; 33,72] | [28,75; 34,61] | [27,49; 33,45] | [26,20; 32,27] |              |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                       | 828            | 744            | 663            | 603            | 571            | 529            | 506            | 466            | 451            | 443            | 409            | 391            | 386            |              |
|                                 |   | Anteil in %                  | 39,50          | 40,61          | 41,49          | 41,64          | 42,61          | 42,19          | 42,10          | 41,28          | 42,23          | 43,43          | 42,21          | 42,55          | 44,78          |              |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [37,41; 41,60] | [38,36; 42,86] | [39,07; 43,91] | [39,10; 44,18] | [39,96; 45,26] | [39,45; 44,92] | [39,30; 44,89] | [38,40; 44,15] | [39,26; 45,19] | [40,39; 46,47] | [39,10; 45,32] | [39,35; 45,74] | [41,46; 48,10] |              |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                       | 413            | 386            | 352            | 332            | 309            | 290            | 293            | 287            | 280            | 262            | 253            | 248            | 224            |              |
|                                 |   | Anteil in %                  | 19,70          | 21,07          | 22,03          | 22,93          | 23,06          | 23,13          | 24,38          | 25,42          | 26,22          | 25,69          | 26,11          | 26,99          | 25,99          |              |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [18,00; 21,41] | [19,20; 22,94] | [19,99; 24,06] | [20,76; 25,09] | [20,80; 25,32] | [20,79; 25,46] | [21,95; 26,80] | [22,88; 27,96] | [23,58; 28,86] | [23,00; 28,37] | [23,34; 28,88] | [24,11; 29,86] | [23,06; 28,92] |              |
|                                 | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 1598           | 1429           | 1256           | 1138           | 1052           | 1005           | 964            | 908            | 856            | 812            | 779            | 738            | 696            |              |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 1596           | 1383           | 1216           | 1097           | 1009           | 961            | 940            | 881            | 836            | 799            | 763            | 725            | 685            |              |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 27,28          | 27,34          | 27,37          | 27,39          | 27,67          | 27,66          | 27,70          | 27,92          | 28,02          | 27,93          | 27,96          | 28,07          | 28,10          |              |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,94; 27,62] | [27,02; 27,67] | [27,02; 27,71] | [27,04; 27,75] | [27,29; 28,06] | [27,26; 28,06] | [27,30; 28,10] | [27,50; 28,34] | [27,58; 28,46] | [27,49; 28,37] | [27,51; 28,41] | [27,60; 28,54] | [27,61; 28,59] |              |
|                                 |   | Median                       | 26,03          | 25,95          | 26,22          | 26,23          | 26,53          | 26,44          | 26,44          | 26,64          | 26,56          | 26,67          | 26,71          | 26,85          | 26,84          |              |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1382           | 1215           | 1096           | 1008           | 960            | 939            | 880            | 835            | 798            | 762            | 724            | 684            |              |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,17           | 0,22           | 0,23           | 0,41           | 0,43           | 0,44           | 0,54           | 0,67           | 0,67           | 0,72           | 0,80           | 0,84           |              |
| CI mittlere Differenz           |   |                              | [0,02; 0,33]   | [0,06; 0,39]   | [0,04; 0,41]   | [0,20; 0,61]   | [0,22; 0,65]   | [0,21; 0,67]   | [0,30; 0,79]   | [0,40; 0,94]   | [0,41; 0,93]   | [0,45; 0,99]   | [0,51; 1,09]   | [0,53; 1,14]   |                |              |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      | Anzahl  | 677                          | 577            | 501            | 445            | 391            | 381            | 362            | 325            | 307            | 287            | 270            | 255            | 249            |                |              |
|                                 | Anteil in %                                   | 42,42                        | 41,72          | 41,20          | 40,57          | 38,75          | 39,65          | 38,51          | 36,89          | 36,72          | 35,92          | 35,39          | 35,17          | 36,35          |                |              |
|                                 | CI Anteil in %                                | [39,99; 44,84]               | [39,12; 44,32] | [38,43; 43,97] | [37,66; 43,47] | [35,74; 41,76] | [36,55; 42,74] | [35,40; 41,62] | [33,70; 40,08] | [33,45; 39,99] | [32,59; 39,25] | [31,99; 38,78] | [31,69; 38,65] | [32,75; 39,96] |                |              |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 | Anzahl  | 491                          | 427            | 383            | 355            | 331            | 306            | 303            | 289            | 265            | 263            | 254            | 235            | 217            |                |              |
|                                 | Anteil in %                                   | 30,76                        | 30,87          | 31,50          | 32,36          | 32,80          | 31,84          | 32,23          | 32,80          | 31,70          | 32,92          | 33,29          | 32,41          | 31,68          |                |              |
|                                 | CI Anteil in %                                | [28,50; 33,03]               | [28,44; 33,31] | [28,88; 34,11] | [29,59; 35,13] | [29,91; 35,70] | [28,89; 34,79] | [29,24; 35,22] | [29,70; 35,91] | [28,54; 34,85] | [29,66; 36,18] | [29,94; 36,64] | [29,00; 35,82] | [28,19; 35,17] |                |              |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      | Anzahl  | 428                          | 379            | 332            | 297            | 287            | 274            | 275            | 267            | 264            | 249            | 239            | 235            | 219            |                |              |
|                                 | Anteil in %                                   | 26,82                        | 27,40          | 27,30          | 27,07          | 28,44          | 28,51          | 29,26          | 30,31          | 31,58          | 31,16          | 31,32          | 32,41          | 31,97          |                |              |
|                                 | CI Anteil in %                                | [24,64; 28,99]               | [25,05; 29,76] | [24,80; 29,81] | [24,44; 29,70] | [25,66; 31,23] | [25,66; 31,37] | [26,35; 32,17] | [27,27; 33,34] | [28,43; 34,73] | [27,95; 34,38] | [28,03; 34,62] | [29,00; 35,82] | [28,48; 35,47] |                |              |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2006-2                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2885           | 2561           | 2258           | 2061           | 1941           | 1826           | 1708           | 1608           | 1526           | 1433           | 1364           | 1300           |              |              |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2878           | 2502           | 2181           | 2010           | 1837           | 1767           | 1659           | 1570           | 1503           | 1405           | 1343           | 1271           |              |              |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,24          | 26,61          | 26,72          | 26,71          | 26,79          | 26,82          | 26,92          | 27,05          | 27,07          | 27,11          | 27,16          | 27,26          |              |              |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,08; 26,41] | [26,40; 26,82] | [26,51; 26,94] | [26,52; 26,90] | [26,59; 26,99] | [26,62; 27,02] | [26,71; 27,13] | [26,83; 27,26] | [26,85; 27,29] | [26,88; 27,34] | [26,92; 27,40] | [27,02; 27,51] |              |              |
|                                 |   | Median                       | 25,59          | 26,01          | 26,20          | 26,24          | 26,30          | 26,42          | 26,51          | 26,59          | 26,56          | 26,61          | 26,64          | 26,78          |              |              |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2496           | 2177           | 2007           | 1835           | 1765           | 1657           | 1568           | 1501           | 1403           | 1341           | 1269           |              |              |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,22           | 0,34           | 0,39           | 0,45           | 0,52           | 0,57           | 0,63           | 0,70           | 0,77           | 0,86           | 0,92           |              |              |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,13; 0,30]   | [0,25; 0,43]   | [0,29; 0,49]   | [0,34; 0,56]   | [0,41; 0,63]   | [0,45; 0,69]   | [0,51; 0,75]   | [0,58; 0,82]   | [0,65; 0,88]   | [0,73; 0,99]   | [0,79; 1,06]   |              |              |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,31           | 0,32           | 0,33           | 0,33           | 0,59           | 0,57           | 0,61           | 0,64           | 0,68           |              |              |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                       | 1255           | 1009           | 840            | 754            | 668            | 624            | 573            | 522            | 498            | 460            | 445            | 417            |              |              |
|                                 |   | Anteil in %                  | 43,61          | 40,33          | 38,51          | 37,51          | 36,36          | 35,31          | 34,54          | 33,25          | 33,13          | 32,74          | 33,13          | 32,81          |              |              |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [41,79; 45,42] | [38,41; 42,25] | [36,47; 40,56] | [35,40; 39,63] | [34,16; 38,56] | [33,08; 37,54] | [32,25; 36,83] | [30,92; 35,58] | [30,75; 35,51] | [30,29; 35,19] | [30,62; 35,65] | [30,23; 35,39] |              |              |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                       | 1130           | 1009           | 892            | 843            | 789            | 783            | 741            | 697            | 671            | 636            | 606            | 562            |              |              |
|                                 |   | Anteil in %                  | 39,26          | 40,33          | 40,90          | 41,94          | 42,95          | 44,31          | 44,67          | 44,39          | 44,64          | 45,27          | 45,12          | 44,22          |              |              |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [37,48; 41,05] | [38,41; 42,25] | [38,83; 42,96] | [39,78; 44,10] | [40,69; 45,21] | [42,00; 46,63] | [42,27; 47,06] | [41,94; 46,85] | [42,13; 47,16] | [42,66; 47,87] | [42,46; 47,79] | [41,49; 46,95] |              |              |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                       | 493            | 484            | 449            | 413            | 380            | 360            | 345            | 351            | 334            | 309            | 292            | 292            |              |              |
|                                 |   | Anteil in %                  | 17,13          | 19,34          | 20,59          | 20,55          | 20,69          | 20,37          | 20,80          | 22,36          | 22,22          | 21,99          | 21,74          | 22,97          |              |              |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [15,75; 18,51] | [17,80; 20,89] | [18,89; 22,28] | [18,78; 22,31] | [18,83; 22,54] | [18,49; 22,25] | [18,84; 22,75] | [20,30; 24,42] | [20,12; 24,32] | [19,83; 24,16] | [19,54; 23,95] | [20,66; 25,29] |              |              |
|                                 | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2151           | 1915           | 1729           | 1619           | 1514           | 1441           | 1333           | 1247           | 1194           | 1143           | 1091           | 1037           |              |              |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2149           | 1857           | 1682           | 1568           | 1417           | 1381           | 1299           | 1218           | 1174           | 1118           | 1066           | 1020           |              |              |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,53          | 26,72          | 26,85          | 26,93          | 26,93          | 27,09          | 27,14          | 27,17          | 27,20          | 27,28          | 27,33          | 27,43          |              |              |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,29; 26,76] | [26,47; 26,97] | [26,59; 27,12] | [26,66; 27,21] | [26,63; 27,23] | [26,79; 27,40] | [26,82; 27,46] | [26,84; 27,50] | [26,87; 27,53] | [26,94; 27,63] | [26,97; 27,68] | [27,07; 27,79] |              |              |
|                                 |   | Median                       | 25,48          | 25,59          | 25,80          | 25,96          | 26,03          | 26,04          | 26,04          | 26,16          | 26,22          | 26,35          | 26,46          | 26,45          |              |              |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1856           | 1681           | 1567           | 1416           | 1380           | 1298           | 1217           | 1173           | 1117           | 1065           | 1019           |              |              |
| Mittlere Differenz zur ED       |   |                              | 0,18           | 0,34           | 0,37           | 0,42           | 0,54           | 0,57           | 0,59           | 0,64           | 0,78           | 0,84           | 0,87           |                |              |              |
| CI mittlere Differenz           |   |                              | [0,11; 0,24]   | [0,25; 0,43]   | [0,28; 0,47]   | [0,28; 0,56]   | [0,41; 0,66]   | [0,43; 0,71]   | [0,45; 0,73]   | [0,50; 0,78]   | [0,62; 0,93]   | [0,68; 0,99]   | [0,71; 1,03]   |                |              |              |
| Median mittlere Differenz       |   |                              | 0,00           | 0,00           | 0,34           | 0,34           | 0,36           | 0,37           | 0,39           | 0,41           | 0,43           | 0,74           | 0,76           |                |              |              |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      | Anzahl  | 995                          | 846            | 735            | 678            | 605            | 580            | 547            | 506            | 486            | 460            | 446            | 413            |                |              |              |
|                                 | Anteil in %                                   | 46,30                        | 45,56          | 43,70          | 43,24          | 42,70          | 42,00          | 42,11          | 41,54          | 41,40          | 41,14          | 41,84          | 40,49          |                |              |              |
|                                 | CI Anteil in %                                | [44,19; 48,41]               | [43,29; 47,82] | [41,33; 46,07] | [40,79; 45,69] | [40,12; 45,27] | [39,39; 44,60] | [39,42; 44,80] | [38,77; 44,31] | [38,58; 44,22] | [38,26; 44,03] | [38,88; 44,80] | [37,48; 43,50] |                |              |              |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 | Anzahl  | 670                          | 567            | 533            | 497            | 460            | 436            | 409            | 392            | 377            | 358            | 315            | 306            |                |              |              |
|                                 | Anteil in %                                   | 31,18                        | 30,53          | 31,69          | 31,70          | 32,46          | 31,57          | 31,49          | 32,18          | 32,11          | 32,02          | 29,55          | 30,00          |                |              |              |
|                                 | CI Anteil in %                                | [29,22; 33,14]               | [28,44; 32,63] | [29,46; 33,91] | [29,39; 34,00] | [30,02; 34,90] | [29,12; 34,02] | [28,96; 34,01] | [29,56; 34,81] | [29,44; 34,78] | [29,29; 34,76] | [26,81; 32,29] | [27,19; 32,81] |                |              |              |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      | Anzahl  | 484                          | 444            | 414            | 393            | 352            | 365            | 343            | 320            | 311            | 300            | 305            | 301            |                |              |              |
|                                 | Anteil in %                                   | 22,52                        | 23,91          | 24,61          | 25,06          | 24,84          | 26,43          | 26,40          | 26,27          | 26,49          | 26,83          | 28,61          | 29,51          |                |              |              |
|                                 | CI Anteil in %                                | [20,76; 24,29]               | [21,97; 25,85] | [22,55; 26,67] | [22,92; 27,21] | [22,59; 27,09] | [24,10; 28,76] | [24,01; 28,80] | [23,80; 28,75] | [23,97; 29,02] | [24,24; 29,43] | [25,90; 31,33] | [26,71; 32,31] |                |              |              |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr                        | 2. Halbjahr                  | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |
|---------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 2007-1                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                                    | 6090                         | 5508           | 4973           | 4653           | 4423           | 4172           | 3943           | 3762           | 3595           | 3456           | 3318           |                |              |              |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                                    | 6076                         | 5357           | 4851           | 4465           | 4280           | 4088           | 3862           | 3691           | 3543           | 3392           | 3246           |                |              |              |  |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                                      | 26,47                        | 26,73          | 26,91          | 26,98          | 27,09          | 27,15          | 27,26          | 27,30          | 27,37          | 27,35          | 27,45          |                |              |              |  |
|                                 |   | CI Mean                                   | [26,34; 26,59]               | [26,57; 26,89] | [26,74; 27,08] | [26,80; 27,16] | [26,90; 27,28] | [26,95; 27,34] | [27,06; 27,46] | [27,10; 27,51] | [27,15; 27,58] | [27,14; 27,56] | [27,23; 27,68] |                |              |              |  |
|                                 |   | Median                                    | 25,82                        | 26,01          | 26,20          | 26,23          | 26,31          | 26,42          | 26,50          | 26,53          | 26,58          | 26,58          | 26,67          |                |              |              |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz              |                              | 5349           | 4841           | 4456           | 4272           | 4080           | 3855           | 3684           | 3536           | 3385           | 3240           |                |              |              |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED                 |                              | 0,09           | 0,20           | 0,27           | 0,33           | 0,38           | 0,45           | 0,45           | 0,48           | 0,50           | 0,54           |                |              |              |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz                     |                              | [0,05; 0,14]   | [0,15; 0,25]   | [0,21; 0,32]   | [0,27; 0,39]   | [0,31; 0,44]   | [0,38; 0,52]   | [0,38; 0,53]   | [0,40; 0,56]   | [0,42; 0,58]   | [0,46; 0,62]   |                |              |              |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz                 |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,27           | 0,29           | 0,31           | 0,32           | 0,32           | 0,33           |                |              |              |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                                    | 2510                         | 2106           | 1801           | 1655           | 1544           | 1442           | 1346           | 1257           | 1174           | 1124           | 1074           |                |              |              |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 41,31                        | 39,31          | 37,13          | 37,07          | 36,07          | 35,27          | 34,85          | 34,06          | 33,14          | 33,14          | 33,09          |                |              |              |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [40,07; 42,55]               | [38,00; 40,62] | [35,77; 38,49] | [35,65; 38,48] | [34,64; 37,51] | [33,81; 36,74] | [33,35; 36,36] | [32,53; 35,58] | [31,59; 34,69] | [31,55; 34,72] | [31,47; 34,71] |                |              |              |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                                    | 2510                         | 2257           | 2111           | 1932           | 1862           | 1826           | 1700           | 1646           | 1592           | 1511           | 1421           |                |              |              |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 41,31                        | 42,13          | 43,52          | 43,27          | 43,50          | 44,67          | 44,02          | 44,59          | 44,93          | 44,55          | 43,78          |                |              |              |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [40,07; 42,55]               | [40,81; 43,45] | [42,12; 44,91] | [41,82; 44,72] | [42,02; 44,99] | [43,14; 46,19] | [42,45; 45,58] | [42,99; 46,20] | [43,30; 46,57] | [42,87; 46,22] | [42,07; 45,48] |                |              |              |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                                    | 1056                         | 994            | 939            | 878            | 874            | 820            | 816            | 788            | 777            | 757            | 751            |                |              |              |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 17,38                        | 18,56          | 19,36          | 19,66          | 20,42          | 20,06          | 21,13          | 21,35          | 21,93          | 22,32          | 23,14          |                |              |              |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [16,43; 18,33]               | [17,51; 19,60] | [18,24; 20,47] | [18,50; 20,83] | [19,21; 21,63] | [18,83; 21,29] | [19,84; 22,42] | [20,03; 22,67] | [20,57; 23,29] | [20,92; 23,72] | [21,69; 24,59] |                |              |              |  |
|                                 | weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt            | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 4916           | 4513           | 4134           | 3883           | 3662           | 3461           | 3293           | 3142           | 3004           | 2874           | 2757           |              |              |  |
|                                 |   | auswertbar                                | Anzahl                       | 4906           | 4408           | 4026           | 3688           | 3553           | 3373           | 3238           | 3060           | 2936           | 2805           | 2696           |              |              |  |
|                                 |   | Auswertungsergebnisse zum BMI             | Mean                         | 26,85          | 27,06          | 27,14          | 27,11          | 27,20          | 27,32          | 27,39          | 27,37          | 27,34          | 27,40          | 27,49          |              |              |  |
|                                 |   |   | CI Mean                      | [26,68; 27,02] | [26,87; 27,25] | [26,93; 27,34] | [26,89; 27,33] | [26,98; 27,42] | [27,09; 27,55] | [27,15; 27,63] | [27,13; 27,60] | [27,09; 27,59] | [27,15; 27,65] | [27,23; 27,75] |              |              |  |
|                                 |   |   | Median                       | 25,69          | 25,81          | 25,95          | 25,89          | 26,08          | 26,22          | 26,35          | 26,35          | 26,35          | 26,37          | 26,41          |              |              |  |
|                                 |   |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 4405           | 4023           | 3685           | 3550           | 3370           | 3235           | 3057           | 2933           | 2802           | 2693           |              |              |  |
|                                 |   |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,16           | 0,23           | 0,22           | 0,28           | 0,37           | 0,47           | 0,47           | 0,49           | 0,52           | 0,58           |              |              |  |
|                                 |   |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,09; 0,22]   | [0,16; 0,31]   | [0,13; 0,31]   | [0,19; 0,37]   | [0,27; 0,46]   | [0,36; 0,57]   | [0,37; 0,58]   | [0,38; 0,60]   | [0,41; 0,63]   | [0,47; 0,70]   |              |              |  |
|                                 |   |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,35           | 0,35           | 0,35           | 0,37           | 0,38           |              |              |  |
|                                 |   | Pat. in Kategorie BMI < 25                | Anzahl                       | 2176           | 1871           | 1681           | 1568           | 1473           | 1391           | 1314           | 1224           | 1186           | 1127           | 1052           |              |              |  |
| Anteil in %                     |   |   | 44,35                        | 42,45          | 41,75          | 42,52          | 41,46          | 41,24          | 40,58          | 40,00          | 40,40          | 40,18          | 39,02          |                |              |              |  |
| CI Anteil in %                  |   |   | [42,96; 45,74]               | [40,99; 43,90] | [40,23; 43,28] | [40,92; 44,11] | [39,84; 43,08] | [39,58; 42,90] | [38,89; 42,27] | [38,26; 41,74] | [38,62; 42,17] | [38,36; 41,99] | [37,18; 40,86] |                |              |              |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 |   | Anzahl                                    | 1556                         | 1447           | 1334           | 1182           | 1171           | 1089           | 1067           | 1040           | 980            | 944            | 916            |                |              |              |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 31,72                        | 32,83          | 33,13          | 32,05          | 32,96          | 32,29          | 32,95          | 33,99          | 33,38          | 33,65          | 33,98          |                |              |              |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [30,41; 33,02]               | [31,44; 34,21] | [31,68; 34,59] | [30,54; 33,56] | [31,41; 34,50] | [30,71; 33,86] | [31,33; 34,57] | [32,31; 35,67] | [31,67; 35,08] | [31,91; 35,40] | [32,19; 35,76] |                |              |              |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      |   | Anzahl                                    | 1174                         | 1090           | 1011           | 938            | 909            | 893            | 857            | 796            | 770            | 734            | 728            |                |              |              |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 23,93                        | 24,73          | 25,11          | 25,43          | 25,58          | 26,47          | 26,47          | 26,01          | 26,23          | 26,17          | 27,00          |                |              |              |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [22,74; 25,12]               | [23,45; 26,00] | [23,77; 26,45] | [24,03; 26,84] | [24,15; 27,02] | [24,99; 27,96] | [24,95; 27,99] | [24,46; 27,57] | [24,63; 27,82] | [24,54; 27,79] | [25,33; 28,68] |                |              |              |  |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2007-2                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 3831           | 3352           | 3019           | 2744           | 2493           | 2304           | 2170           | 2045           | 1950           | 1862           |               |               |               |               |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 3818           | 3222           | 2836           | 2617           | 2401           | 2231           | 2106           | 1984           | 1901           | 1818           |               |               |               |               |  |
|                                 | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                | Mean                         | 25,95          | 26,43          | 26,47          | 26,68          | 26,78          | 26,90          | 26,88          | 27,01          | 27,08          | 27,20          |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Mean                      | [25,80; 26,09] | [26,21; 26,65] | [26,23; 26,71] | [26,42; 26,94] | [26,52; 27,04] | [26,63; 27,17] | [26,59; 27,16] | [26,71; 27,30] | [26,77; 27,39] | [26,89; 27,51] |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Median                       | 25,35          | 25,69          | 25,76          | 25,86          | 25,99          | 26,20          | 26,20          | 26,15          | 26,33          | 26,54          |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 3213           | 2827           | 2609           | 2394           | 2224           | 2099           | 1977           | 1894           | 1813           |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,25           | 0,28           | 0,37           | 0,44           | 0,56           | 0,56           | 0,63           | 0,68           | 0,78           |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,19; 0,32]   | [0,21; 0,35]   | [0,30; 0,44]   | [0,35; 0,52]   | [0,47; 0,65]   | [0,46; 0,65]   | [0,53; 0,72]   | [0,58; 0,79]   | [0,67; 0,90]   |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,29           | 0,32           | 0,34           | 0,36           | 0,60           |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                       | 1748           | 1363           | 1200           | 1084           | 948            | 868            | 818            | 748            | 711            | 653            |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 45,78          | 42,30          | 42,31          | 41,42          | 39,48          | 38,91          | 38,84          | 37,70          | 37,40          | 35,92          |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [44,20; 47,36] | [40,60; 44,01] | [40,49; 44,13] | [39,53; 43,31] | [37,53; 41,44] | [36,88; 40,93] | [36,76; 40,92] | [35,57; 39,83] | [35,23; 39,58] | [33,71; 38,12] |               |               |               |               |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                       | 1497           | 1317           | 1167           | 1064           | 1000           | 931            | 880            | 826            | 798            | 781            |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 39,21          | 40,88          | 41,15          | 40,66          | 41,65          | 41,73          | 41,79          | 41,63          | 41,98          | 42,96          |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [37,66; 40,76] | [39,18; 42,57] | [39,34; 42,96] | [38,77; 42,54] | [39,68; 43,62] | [39,68; 43,78] | [39,68; 43,89] | [39,46; 43,80] | [39,76; 44,20] | [40,68; 45,24] |               |               |               |               |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                       | 573            | 542            | 469            | 469            | 453            | 432            | 408            | 410            | 392            | 384            |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 15,01          | 16,82          | 16,54          | 17,92          | 18,87          | 19,36          | 19,37          | 20,67          | 20,62          | 21,12          |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [13,87; 16,14] | [15,53; 18,11] | [15,17; 17,90] | [16,45; 19,39] | [17,30; 20,43] | [17,72; 21,00] | [17,68; 21,06] | [18,88; 22,45] | [18,80; 22,44] | [19,25; 23,00] |               |               |               |               |  |
|                                 | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2944           | 2632           | 2409           | 2203           | 1998           | 1862           | 1758           | 1670           | 1581           | 1516           |               |               |               |               |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2932           | 2541           | 2239           | 2106           | 1932           | 1818           | 1697           | 1627           | 1542           | 1471           |               |               |               |               |  |
|                                 | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                | Mean                         | 26,49          | 26,94          | 27,13          | 27,10          | 27,13          | 27,24          | 27,21          | 27,31          | 27,43          | 27,44          |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,29; 26,69] | [26,63; 27,25] | [26,78; 27,48] | [26,76; 27,44] | [26,77; 27,49] | [26,87; 27,62] | [26,82; 27,60] | [26,91; 27,72] | [27,00; 27,86] | [26,99; 27,88] |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Median                       | 25,53          | 25,71          | 25,71          | 25,78          | 25,88          | 25,95          | 25,91          | 26,03          | 26,08          | 26,09          |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2535           | 2233           | 2101           | 1927           | 1813           | 1692           | 1622           | 1537           | 1466           |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,23           | 0,26           | 0,29           | 0,36           | 0,49           | 0,50           | 0,57           | 0,66           | 0,69           |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,15; 0,30]   | [0,17; 0,34]   | [0,20; 0,39]   | [0,26; 0,47]   | [0,37; 0,60]   | [0,38; 0,61]   | [0,44; 0,70]   | [0,52; 0,80]   | [0,55; 0,83]   |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,35           | 0,36           | 0,38           | 0,39           | 0,40           |               |               |               |               |  |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      | Anzahl  | 1325                         | 1140           | 997            | 934            | 831            | 761            | 722            | 687            | 629            | 600            |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 45,19                        | 44,86          | 44,53          | 44,35          | 43,01          | 41,86          | 42,55          | 42,22          | 40,79          | 40,79          |                |               |               |               |               |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [43,39; 46,99]               | [42,93; 46,80] | [42,47; 46,59] | [42,23; 46,47] | [40,80; 45,22] | [39,59; 44,13] | [40,19; 44,90] | [39,82; 44,63] | [38,34; 43,24] | [38,28; 43,30] |                |               |               |               |               |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 | Anzahl  | 982                          | 843            | 729            | 676            | 644            | 610            | 568            | 530            | 516            | 497            |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 33,49                        | 33,18          | 32,56          | 32,10          | 33,33          | 33,55          | 33,47          | 32,58          | 33,46          | 33,79          |                |               |               |               |               |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [31,78; 35,20]               | [31,34; 35,01] | [30,62; 34,50] | [30,10; 34,09] | [31,23; 35,44] | [31,38; 35,72] | [31,22; 35,72] | [30,30; 34,85] | [31,11; 35,82] | [31,37; 36,20] |                |               |               |               |               |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      | Anzahl  | 625                          | 558            | 513            | 496            | 457            | 447            | 407            | 410            | 397            | 374            |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 21,32                        | 21,96          | 22,91          | 23,55          | 23,65          | 24,59          | 23,98          | 25,20          | 25,75          | 25,42          |                |               |               |               |               |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [19,83; 22,80]               | [20,35; 23,57] | [21,17; 24,65] | [21,74; 25,36] | [21,76; 25,55] | [22,61; 26,57] | [21,95; 26,02] | [23,09; 27,31] | [23,56; 27,93] | [23,20; 27,65] |                |               |               |               |               |  |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr                        | 2. Halbjahr                  | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|---------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2008-1                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                                    | 3801                         | 3327           | 2978           | 2612           | 2374           | 2200           | 2035           | 1923           | 1841           |                |               |               |               |               |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                                    | 3784                         | 3127           | 2791           | 2486           | 2281           | 2112           | 1963           | 1865           | 1776           |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                | Mean                                      | 26,05                        | 26,63          | 26,84          | 26,98          | 27,05          | 27,06          | 27,03          | 27,13          | 27,28          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Mean                                   | [25,86; 26,23]               | [26,34; 26,92] | [26,52; 27,16] | [26,65; 27,31] | [26,71; 27,39] | [26,70; 27,42] | [26,67; 27,38] | [26,76; 27,51] | [26,90; 27,67] |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Median                                    | 25,31                        | 25,59          | 25,77          | 25,95          | 25,99          | 25,99          | 26,03          | 26,20          | 26,25          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz              |                              | 3116           | 2781           | 2477           | 2273           | 2104           | 1957           | 1859           | 1770           |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED                 |                              | 0,15           | 0,30           | 0,40           | 0,47           | 0,52           | 0,55           | 0,59           | 0,67           |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz                     |                              | [0,08; 0,22]   | [0,22; 0,37]   | [0,31; 0,49]   | [0,38; 0,57]   | [0,41; 0,63]   | [0,44; 0,67]   | [0,47; 0,72]   | [0,54; 0,80]   |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz                 |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,30           | 0,31           | 0,32           | 0,33           | 0,35           |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                                    | 1755                         | 1371           | 1177           | 1001           | 906            | 823            | 769            | 712            | 658            |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 46,38                        | 43,84          | 42,17          | 40,27          | 39,72          | 38,97          | 39,17          | 38,18          | 37,05          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [44,79; 47,97]               | [42,10; 45,58] | [40,34; 44,00] | [38,34; 42,19] | [37,71; 41,73] | [36,89; 41,05] | [37,01; 41,33] | [35,97; 40,38] | [34,80; 39,30] |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                                    | 1431                         | 1216           | 1106           | 1014           | 929            | 875            | 798            | 762            | 744            |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 37,82                        | 38,89          | 39,63          | 40,79          | 40,73          | 41,43          | 40,65          | 40,86          | 41,89          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [36,27; 39,36]               | [37,18; 40,60] | [37,81; 41,44] | [38,86; 42,72] | [38,71; 42,74] | [39,33; 43,53] | [38,48; 42,83] | [38,63; 43,09] | [39,60; 44,19] |                |               |               |               |               |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                                    | 598                          | 540            | 508            | 471            | 446            | 414            | 396            | 391            | 374            |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 15,80                        | 17,27          | 18,20          | 18,95          | 19,55          | 19,60          | 20,17          | 20,97          | 21,06          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [14,64; 16,97]               | [15,94; 18,59] | [16,77; 19,63] | [17,41; 20,49] | [17,92; 21,18] | [17,91; 21,30] | [18,40; 21,95] | [19,12; 22,81] | [19,16; 22,96] |                |               |               |               |               |  |
|                                 | 2008-1  | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 2805           | 2533           | 2275           | 2042           | 1868           | 1733           | 1616           | 1535           | 1460           |               |               |               |               |  |
|                                 |   | auswertbar                                | Anzahl                       | 2793           | 2395           | 2140           | 1953           | 1804           | 1670           | 1571           | 1486           | 1406           |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Auswertungs-ergebnisse zum BMI            | Mean                         | 26,35          | 26,67          | 26,83          | 26,86          | 27,01          | 27,02          | 27,24          | 27,31          | 27,35          |               |               |               |               |  |
|                                 |   |   | CI Mean                      | [26,14; 26,55] | [26,42; 26,93] | [26,53; 27,13] | [26,56; 27,17] | [26,69; 27,33] | [26,73; 27,31] | [26,93; 27,55] | [26,99; 27,64] | [27,01; 27,68] |               |               |               |               |  |
|                                 |   |   | Median                       | 25,24          | 25,46          | 25,46          | 25,47          | 25,70          | 25,76          | 25,85          | 25,96          | 25,91          |               |               |               |               |  |
|                                 |   |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2391           | 2134           | 1948           | 1799           | 1666           | 1567           | 1482           | 1403           |               |               |               |               |  |
| Mittlere Differenz zur ED       |   |   |                              | 0,17           | 0,27           | 0,37           | 0,45           | 0,55           | 0,72           | 0,79           | 0,84           |                |               |               |               |               |  |
| CI mittlere Differenz           |   |   |                              | [0,10; 0,23]   | [0,19; 0,35]   | [0,27; 0,46]   | [0,35; 0,55]   | [0,43; 0,67]   | [0,58; 0,87]   | [0,64; 0,94]   | [0,67; 1,00]   |                |               |               |               |               |  |
| Median mittlere Differenz       |   |   |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,33           | 0,37           | 0,39           | 0,42           | 0,41           |                |               |               |               |               |  |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      |   | Anzahl                                    | 1347                         | 1105           | 986            | 910            | 812            | 735            | 669            | 629            | 604            |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 48,23                        | 46,14          | 46,07          | 46,59          | 45,01          | 44,01          | 42,58          | 42,33          | 42,96          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [46,37; 50,08]               | [44,14; 48,13] | [43,96; 48,19] | [44,38; 48,81] | [42,71; 47,31] | [41,63; 46,39] | [40,14; 45,03] | [39,82; 44,84] | [40,37; 45,55] |                |               |               |               |               |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 |   | Anzahl                                    | 847                          | 741            | 646            | 572            | 543            | 508            | 486            | 462            | 421            |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 30,33                        | 30,94          | 30,19          | 29,29          | 30,10          | 30,42          | 30,94          | 31,09          | 29,94          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [28,62; 32,03]               | [29,09; 32,79] | [28,24; 32,13] | [27,27; 31,31] | [27,98; 32,22] | [28,21; 32,63] | [28,65; 33,22] | [28,74; 33,44] | [27,55; 32,34] |                |               |               |               |               |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      |   | Anzahl                                    | 599                          | 549            | 508            | 471            | 449            | 427            | 416            | 395            | 381            |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 21,45                        | 22,92          | 23,74          | 24,12          | 24,89          | 25,57          | 26,48          | 26,58          | 27,10          |                |               |               |               |               |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [19,92; 22,97]               | [21,24; 24,61] | [21,94; 25,54] | [22,22; 26,01] | [22,89; 26,88] | [23,48; 27,66] | [24,30; 28,66] | [24,33; 28,83] | [24,77; 29,42] |                |               |               |               |               |  |

| EZ                                 | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-<br>halbjahr                    | 2. Halbjahr                  | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2008-2                             | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                                    | 2583                         | 2211              | 1898              | 1677              | 1530              | 1414              | 1323              | 1240              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | auswertbar                                    | Anzahl                                    | 2572                         | 2094              | 1804              | 1606              | 1471              | 1347              | 1263              | 1190              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI         | Mean                                      | 26,01                        | 26,43             | 26,57             | 26,69             | 26,78             | 27,04             | 27,16             | 27,25             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Mean                                   | [25,82;<br>26,20]            | [26,21;<br>26,64] | [26,33;<br>26,81] | [26,43;<br>26,95] | [26,54;<br>27,02] | [26,76;<br>27,31] | [26,88;<br>27,45] | [26,96;<br>27,54] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Median                                    | 25,25                        | 25,71             | 25,80             | 25,95             | 26,20             | 26,32             | 26,47             | 26,54             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Fallbasis mittlere Differenz              |                              | 2092              | 1802              | 1605              | 1469              | 1345              | 1261              | 1188              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Mittlere Differenz zur ED                 |                              | 0,21              | 0,35              | 0,45              | 0,54              | 0,67              | 0,73              | 0,81              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI mittlere Differenz                     |                              | [0,15; 0,27]      | [0,27; 0,43]      | [0,36; 0,55]      | [0,44; 0,64]      | [0,55; 0,80]      | [0,60; 0,85]      | [0,67; 0,96]      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Median mittlere Differenz                 |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,32              | 0,34              | 0,54              | 0,60              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>BMI < 25                 | Anzahl                                    | 1221                         | 904               | 755               | 652               | 570               | 499               | 447               | 419               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 47,47                        | 43,17             | 41,85             | 40,60             | 38,75             | 37,05             | 35,39             | 35,21             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [45,54;<br>49,40]            | [41,05;<br>45,29] | [39,57;<br>44,13] | [38,20;<br>43,00] | [36,26;<br>41,24] | [34,47;<br>39,63] | [32,75;<br>38,03] | [32,50;<br>37,92] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>25 ≤ BMI < 30            | Anzahl                                    | 934                          | 795               | 690               | 621               | 590               | 553               | 540               | 501               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 36,31                        | 37,97             | 38,25             | 38,67             | 40,11             | 41,05             | 42,76             | 42,10             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [34,46;<br>38,17]            | [35,89;<br>40,04] | [36,01;<br>40,49] | [36,28;<br>41,05] | [37,60;<br>42,61] | [38,43;<br>43,68] | [40,03;<br>45,48] | [39,29;<br>44,91] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>BMI ≥ 30                 | Anzahl                                    | 417                          | 395               | 359               | 333               | 311               | 295               | 276               | 270               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 16,21                        | 18,86             | 19,90             | 20,73             | 21,14             | 21,90             | 21,85             | 22,69             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [14,79;<br>17,64]            | [17,19;<br>20,54] | [18,06;<br>21,74] | [18,75;<br>22,72] | [19,05;<br>23,23] | [19,69;<br>24,11] | [19,57;<br>24,13] | [20,31;<br>25,07] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | 2008-2  | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 1849              | 1617              | 1409              | 1246              | 1130              | 1052              | 987               | 938               |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | auswertbar                                | Anzahl                       | 1842              | 1545              | 1349              | 1193              | 1083              | 1006              | 957               | 897               |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI     | Mean                         | 26,46             | 26,97             | 26,92             | 27,09             | 27,32             | 27,38             | 27,59             | 27,61             |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | CI Mean                      | [26,17;<br>26,75] | [26,61;<br>27,33] | [26,60;<br>27,25] | [26,72;<br>27,46] | [26,94;<br>27,70] | [26,97;<br>27,79] | [27,16;<br>28,02] | [27,16;<br>28,06] |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | Median                       | 25,39             | 25,72             | 25,96             | 26,12             | 26,45             | 26,38             | 26,57             | 26,64             |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | Fallbasis mittlere Differenz |                   | 1543              | 1348              | 1192              | 1082              | 1005              | 956               | 896               |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | Mittlere Differenz zur ED    |                   | 0,26              | 0,38              | 0,55              | 0,66              | 0,69              | 0,84              | 0,86              |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | CI mittlere Differenz        |                   | [0,18; 0,35]      | [0,29; 0,48]      | [0,44; 0,67]      | [0,53; 0,80]      | [0,54; 0,84]      | [0,69; 0,99]      | [0,70; 1,02]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | Median mittlere Differenz    |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,36              | 0,37              | 0,63              | 0,66              |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Pat. in Kategorie<br>BMI < 25             | Anzahl                       | 860               | 676               | 569               | 488               | 408               | 381               | 352               | 322               |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Anteil in %                        |   |   | 46,69                        | 43,75             | 42,18             | 40,91             | 37,67             | 37,87             | 36,78             | 35,90             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CI Anteil in %                     |   |   | [44,41;<br>48,97]            | [41,28;<br>46,23] | [39,54;<br>44,82] | [38,11;<br>43,70] | [34,79;<br>40,56] | [34,87;<br>40,87] | [33,72;<br>39,84] | [32,76;<br>39,04] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie<br>25 ≤ BMI < 30 |   | Anzahl                                    | 579                          | 504               | 448               | 410               | 391               | 356               | 333               | 315               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 31,43                        | 32,62             | 33,21             | 34,37             | 36,10             | 35,39             | 34,80             | 35,12             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [29,31;<br>33,55]            | [30,28;<br>34,96] | [30,70;<br>35,72] | [31,67;<br>37,06] | [33,24;<br>38,97] | [32,43;<br>38,34] | [31,78;<br>37,82] | [31,99;<br>38,24] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie<br>BMI ≥ 30      |   | Anzahl                                    | 403                          | 365               | 332               | 295               | 284               | 269               | 272               | 260               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 21,88                        | 23,62             | 24,61             | 24,73             | 26,22             | 26,74             | 28,42             | 28,99             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [19,99;<br>23,77]            | [21,51;<br>25,74] | [22,31;<br>26,91] | [22,28;<br>27,18] | [23,60;<br>28,84] | [24,00;<br>29,48] | [25,56;<br>31,28] | [26,01;<br>31,96] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 2009-1                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2879           | 2469           | 2119           | 1871           | 1720           | 1590           | 1479           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2865           | 2361           | 2022           | 1811           | 1658           | 1537           | 1431           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                | Mean                         | 26,08          | 26,43          | 26,59          | 26,69          | 26,84          | 26,83          | 26,78          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | CI Mean                      | [25,87; 26,29] | [26,19; 26,67] | [26,33; 26,86] | [26,41; 26,98] | [26,53; 27,14] | [26,57; 27,10] | [26,53; 27,03] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Median                       | 25,45          | 25,74          | 25,87          | 25,98          | 26,17          | 26,23          | 26,23          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2357           | 2018           | 1807           | 1654           | 1534           | 1428           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,27           | 0,42           | 0,47           | 0,57           | 0,64           | 0,69           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,20; 0,33]   | [0,35; 0,49]   | [0,40; 0,55]   | [0,48; 0,67]   | [0,54; 0,75]   | [0,57; 0,81]   |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,29           | 0,32           | 0,33           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                       | 1295           | 1011           | 838            | 733            | 638            | 576            | 543            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 45,20          | 42,82          | 41,44          | 40,47          | 38,48          | 37,48          | 37,95          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [43,38; 47,02] | [40,82; 44,82] | [39,30; 43,59] | [38,21; 42,74] | [36,14; 40,82] | [35,05; 39,90] | [35,43; 40,46] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                       | 1111           | 914            | 796            | 726            | 694            | 655            | 604            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 38,78          | 38,71          | 39,37          | 40,09          | 41,86          | 42,62          | 42,21          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [36,99; 40,56] | [36,75; 40,68] | [37,24; 41,50] | [37,83; 42,35] | [39,48; 44,23] | [40,14; 45,09] | [39,65; 44,77] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                       | 459            | 436            | 388            | 352            | 326            | 306            | 284            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 16,02          | 18,47          | 19,19          | 19,44          | 19,66          | 19,91          | 19,85          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [14,68; 17,36] | [16,90; 20,03] | [17,47; 20,91] | [17,61; 21,26] | [17,75; 21,58] | [17,91; 21,91] | [17,78; 21,91] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2092           | 1773           | 1540           | 1383           | 1272           | 1168           | 1085           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2086           | 1697           | 1471           | 1326           | 1211           | 1119           | 1041           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                | Mean                         | 26,48          | 26,66          | 27,00          | 26,97          | 27,04          | 27,27          | 27,28          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,19; 26,76] | [26,33; 26,98] | [26,64; 27,36] | [26,64; 27,29] | [26,70; 27,38] | [26,86; 27,67] | [26,89; 27,67] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Median                       | 25,34          | 25,56          | 25,77          | 25,81          | 25,83          | 26,08          | 26,15          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1697           | 1471           | 1326           | 1211           | 1119           | 1041           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
| Mittlere Differenz zur ED       |   |                              | 0,15           | 0,40           | 0,48           | 0,64           | 0,88           | 0,86           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
| CI mittlere Differenz           |   |                              | [0,06; 0,23]   | [0,27; 0,53]   | [0,34; 0,62]   | [0,49; 0,79]   | [0,66; 1,11]   | [0,67; 1,06]   |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
| Median mittlere Differenz       |   |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,36           | 0,40           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      | Anzahl  | 989                          | 783            | 647            | 584            | 529            | 464            | 423            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 47,41                        | 46,14          | 43,98          | 44,04          | 43,68          | 41,47          | 40,63          |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [45,27; 49,55]               | [43,77; 48,51] | [41,45; 46,52] | [41,37; 46,72] | [40,89; 46,48] | [38,58; 44,35] | [37,65; 43,62] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 | Anzahl  | 635                          | 529            | 453            | 392            | 362            | 358            | 330            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 30,44                        | 31,17          | 30,80          | 29,56          | 29,89          | 31,99          | 31,70          |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [28,47; 32,42]               | [28,97; 33,38] | [28,44; 33,16] | [27,11; 32,02] | [27,31; 32,47] | [29,26; 34,73] | [28,87; 34,53] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      | Anzahl  | 462                          | 385            | 371            | 350            | 320            | 297            | 288            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 22,15                        | 22,69          | 25,22          | 26,40          | 26,42          | 26,54          | 27,67          |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [20,37; 23,93]               | [20,69; 24,68] | [23,00; 27,44] | [24,02; 28,77] | [23,94; 28,91] | [23,95; 29,13] | [24,95; 30,38] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |



| EZ                                 | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-<br>halbjahr                    | 2. Halbjahr                  | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2009-2                             | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                                    | 2435                         | 2039              | 1736              | 1519              | 1384              | 1290              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | auswertbar                                    | Anzahl                                    | 2432                         | 1958              | 1658              | 1458              | 1323              | 1241              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI         | Mean                                      | 25,94                        | 26,45             | 26,58             | 26,74             | 26,92             | 27,05             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Mean                                   | [25,75;<br>26,12]            | [26,20;<br>26,70] | [26,30;<br>26,86] | [26,43;<br>27,05] | [26,58;<br>27,25] | [26,70;<br>27,41] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Median                                    | 25,26                        | 25,76             | 25,86             | 25,94             | 26,03             | 26,13             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Fallbasis mittlere Differenz              |                              | 1957              | 1657              | 1457              | 1322              | 1240              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Mittlere Differenz zur ED                 |                              | 0,34              | 0,45              | 0,51              | 0,62              | 0,71              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI mittlere Differenz                     |                              | [0,28; 0,39]      | [0,37; 0,52]      | [0,42; 0,60]      | [0,52; 0,73]      | [0,60; 0,83]      |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Median mittlere Differenz                 |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,30              | 0,34              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>BMI < 25                 | Anzahl                                    | 1141                         | 841               | 690               | 593               | 531               | 481               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 46,92                        | 42,95             | 41,62             | 40,67             | 40,14             | 38,76             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [44,93;<br>48,90]            | [40,76;<br>45,15] | [39,24;<br>43,99] | [38,15;<br>43,19] | [37,49;<br>42,78] | [36,05;<br>41,47] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>25 ≤ BMI < 30            | Anzahl                                    | 913                          | 758               | 649               | 576               | 513               | 496               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 37,54                        | 38,71             | 39,14             | 39,51             | 38,78             | 39,97             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [35,62;<br>39,47]            | [36,55;<br>40,87] | [36,79;<br>41,49] | [37,00;<br>42,02] | [36,15;<br>41,40] | [37,24;<br>42,69] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | Pat. in Kategorie<br>BMI ≥ 30                 | Anzahl                                    | 378                          | 359               | 319               | 289               | 279               | 264               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 15,54                        | 18,34             | 19,24             | 19,82             | 21,09             | 21,27             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [14,10;<br>16,98]            | [16,62;<br>20,05] | [17,34;<br>21,14] | [17,77;<br>21,87] | [18,89;<br>23,29] | [19,00;<br>23,55] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    | 2009-2  | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 1814              | 1559              | 1373              | 1232              | 1122              | 1055              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | auswertbar                                | Anzahl                       | 1801              | 1488              | 1306              | 1182              | 1072              | 1009              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI     | Mean                         | 26,32             | 26,70             | 26,96             | 27,03             | 27,21             | 27,30             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | CI Mean                      | [26,03;<br>26,61] | [26,38;<br>27,03] | [26,60;<br>27,32] | [26,64;<br>27,41] | [26,79;<br>27,63] | [26,87;<br>27,74] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | Median                       | 25,15             | 25,64             | 25,91             | 25,81             | 25,97             | 26,18             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   |   | Fallbasis mittlere Differenz |                   | 1486              | 1304              | 1180              | 1070              | 1008              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Mittlere Differenz zur ED          |   |   |                              | 0,25              | 0,44              | 0,51              | 0,65              | 0,70              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CI mittlere Differenz              |   |   |                              | [0,15; 0,35]      | [0,30; 0,58]      | [0,36; 0,66]      | [0,48; 0,83]      | [0,53; 0,87]      |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Median mittlere Differenz          |   |   |                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,34              | 0,36              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie<br>BMI < 25      |   | Anzahl                                    | 883                          | 674               | 575               | 519               | 454               | 412               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 49,03                        | 45,30             | 44,03             | 43,91             | 42,35             | 40,83             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [46,72;<br>51,34]            | [42,77;<br>47,83] | [41,33;<br>46,72] | [41,08;<br>46,74] | [39,39;<br>45,31] | [37,80;<br>43,87] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie<br>25 ≤ BMI < 30 |   | Anzahl                                    | 528                          | 473               | 418               | 369               | 340               | 324               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 29,32                        | 31,79             | 32,01             | 31,22             | 31,72             | 32,11             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [27,21;<br>31,42]            | [29,42;<br>34,15] | [29,48;<br>34,54] | [28,58;<br>33,86] | [28,93;<br>34,50] | [29,23;<br>34,99] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie<br>BMI ≥ 30      |   | Anzahl                                    | 390                          | 341               | 313               | 294               | 278               | 273               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | Anteil in %                               | 21,65                        | 22,92             | 23,97             | 24,87             | 25,93             | 27,06             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                    |   | CI Anteil in %                            | [19,75;<br>23,56]            | [20,78;<br>25,05] | [21,65;<br>26,28] | [22,41;<br>27,34] | [23,31;<br>28,56] | [24,31;<br>29,80] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halbjahr                        | 2. Halbjahr                  | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2010-1                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                                    | 2744                         | 2296           | 1985           | 1768           | 1620           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                                    | 2727                         | 2191           | 1894           | 1699           | 1556           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                | Mean                                      | 26,16                        | 26,44          | 26,68          | 26,80          | 26,89          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI Mean                                   | [25,95; 26,38]               | [26,21; 26,67] | [26,42; 26,94] | [26,53; 27,08] | [26,60; 27,18] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Median                                    | 25,36                        | 25,68          | 25,88          | 26,06          | 26,06          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz              |                              | 2190           | 1892           | 1697           | 1554           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED                 |                              | 0,21           | 0,36           | 0,48           | 0,62           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz                     |                              | [0,14; 0,27]   | [0,28; 0,45]   | [0,38; 0,57]   | [0,51; 0,73]   |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz                 |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,29           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                                    | 1267                         | 944            | 794            | 682            | 610            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 46,46                        | 43,09          | 41,92          | 40,14          | 39,20          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [44,59; 48,33]               | [41,01; 45,16] | [39,70; 44,14] | [37,81; 42,47] | [36,78; 41,63] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                                    | 982                          | 835            | 727            | 671            | 623            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 36,01                        | 38,11          | 38,38          | 39,49          | 40,04          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [34,21; 37,81]               | [36,08; 40,14] | [36,19; 40,58] | [37,17; 41,82] | [37,60; 42,47] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                                    | 478                          | 412            | 373            | 346            | 323            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 17,53                        | 18,80          | 19,69          | 20,36          | 20,76          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [16,10; 18,96]               | [17,17; 20,44] | [17,90; 21,49] | [18,45; 22,28] | [18,74; 22,77] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 | weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt            | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 1915           | 1622           | 1389           | 1250           | 1143           |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | auswertbar                                | Anzahl                       | 1904           | 1559           | 1329           | 1197           | 1094           |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Auswertungs-ergebnisse zum BMI            | Mean                         | 26,49          | 26,73          | 26,84          | 27,07          | 27,06          |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   |   | CI Mean                      | [26,23; 26,75] | [26,42; 27,05] | [26,50; 27,18] | [26,70; 27,44] | [26,68; 27,44] |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   |   | Median                       | 25,32          | 25,36          | 25,51          | 25,71          | 25,78          |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1557           | 1327           | 1195           | 1092           |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| Mittlere Differenz zur ED       |   |   |                              | 0,27           | 0,36           | 0,45           | 0,58           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| CI mittlere Differenz           |   |   |                              | [0,16; 0,38]   | [0,25; 0,48]   | [0,33; 0,57]   | [0,45; 0,71]   |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| Median mittlere Differenz       |   |   |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      |   | Anzahl                                    | 902                          | 727            | 609            | 520            | 474            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 47,37                        | 46,63          | 45,82          | 43,44          | 43,33          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [45,13; 49,62]               | [44,16; 49,11] | [43,14; 48,50] | [40,63; 46,25] | [40,39; 46,26] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 |   | Anzahl                                    | 587                          | 486            | 413            | 383            | 358            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 30,83                        | 31,17          | 31,08          | 32,00          | 32,72          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [28,76; 32,90]               | [28,87; 33,47] | [28,59; 33,57] | [29,35; 34,64] | [29,94; 35,51] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      |   | Anzahl                                    | 415                          | 346            | 307            | 294            | 262            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 21,80                        | 22,19          | 23,10          | 24,56          | 23,95          |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [19,94; 23,65]               | [20,13; 24,26] | [20,83; 25,37] | [22,12; 27,00] | [21,42; 26,48] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |  |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-halb-jahr                       | 2. Halb-jahr                 | 3. Halb-jahr   | 4. Halb-jahr   | 5. Halb-jahr   | 6. Halb-jahr   | 7. Halb-jahr | 8. Halb-jahr | 9. Halb-jahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |  |
|---------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2010-2                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                                    | 2745                         | 2321           | 1986           | 1790           |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                                    | 2725                         | 2230           | 1902           | 1712           |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                | Mean                                      | 26,00                        | 26,49          | 26,70          | 26,96          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | CI Mean                                   | [25,82; 26,17]               | [26,26; 26,71] | [26,45; 26,95] | [26,70; 27,23] |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Median                                    | 25,50                        | 25,89          | 26,06          | 26,30          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz              |                              | 2224           | 1895           | 1705           |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED                 |                              | 0,26           | 0,34           | 0,53           |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz                     |                              | [0,20; 0,32]   | [0,26; 0,42]   | [0,44; 0,61]   |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz                 |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                                    | 1205                         | 899            | 730            | 622            |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 44,22                        | 40,31          | 38,38          | 36,33          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [42,36; 46,09]               | [38,28; 42,35] | [36,19; 40,57] | [34,05; 38,61] |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                                    | 1094                         | 919            | 796            | 732            |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 40,15                        | 41,21          | 41,85          | 42,76          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [38,31; 41,99]               | [39,17; 43,25] | [39,63; 44,07] | [40,41; 45,10] |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                                    | 426                          | 412            | 376            | 358            |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 15,63                        | 18,48          | 19,77          | 20,91          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [14,27; 17,00]               | [16,86; 20,09] | [17,98; 21,56] | [18,98; 22,84] |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 | 2010-2  | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 2012           | 1752           | 1532           | 1368           |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | auswertbar                                | Anzahl                       | 2003           | 1689           | 1475           | 1319           |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Auswertungs-ergebnisse zum BMI            | Mean                         | 26,71          | 27,07          | 27,24          | 27,38          |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   |   | CI Mean                      | [26,41; 27,01] | [26,74; 27,41] | [26,87; 27,60] | [26,93; 27,82] |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   |   | Median                       | 25,46          | 25,71          | 25,86          | 25,86          |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1689           | 1475           | 1318           |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,29           | 0,40           | 0,46           |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,22; 0,36]   | [0,30; 0,50]   | [0,36; 0,57]   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Pat. in Kategorie BMI < 25                | Anzahl                       | 934            | 745            | 637            | 563            |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Anteil in %                     |   |   | 46,63                        | 44,11          | 43,19          | 42,68          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
| CI Anteil in %                  |   |   | [44,44; 48,82]               | [41,74; 46,48] | [40,66; 45,72] | [40,01; 45,35] |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 |   | Anzahl                                    | 588                          | 503            | 440            | 401            |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 29,36                        | 29,78          | 29,83          | 30,40          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [27,36; 31,35]               | [27,60; 31,96] | [27,49; 32,17] | [27,92; 32,89] |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      |   | Anzahl                                    | 481                          | 441            | 398            | 355            |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                               | 24,01                        | 26,11          | 26,98          | 26,91          |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %                            | [22,14; 25,89]               | [24,01; 28,21] | [24,72; 29,25] | [24,52; 29,31] |                |              |              |              |               |               |               |               |               |               |  |  |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2011-1                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2860           | 2410           | 2033           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2852           | 2315           | 1937           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,09          | 26,39          | 26,49          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | CI Mean                      | [25,89; 26,30] | [26,17; 26,62] | [26,28; 26,69] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Median                       | 25,38          | 25,61          | 25,86          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2314           | 1936           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,18           | 0,29           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                | [0,13; 0,24]   | [0,22; 0,36]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                | 0,00           | 0,00           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                       | 1333           | 1027           | 824            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 46,74          | 44,36          | 42,54          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [44,91; 48,57] | [42,34; 46,39] | [40,34; 44,74] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                       | 1028           | 841            | 736            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 36,04          | 36,33          | 38,00          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [34,28; 37,81] | [34,37; 38,29] | [35,83; 40,16] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                       | 491            | 447            | 377            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 17,22          | 19,31          | 19,46          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [15,83; 18,60] | [17,70; 20,92] | [17,70; 21,23] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2111           | 1841           | 1586           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2100           | 1791           | 1530           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,60          | 26,99          | 26,84          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | CI Mean                      | [26,31; 26,89] | [26,62; 27,36] | [26,54; 27,15] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Median                       | 25,32          | 25,53          | 25,62          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1787           | 1528           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Mittlere Differenz zur ED       |   |                              | 0,21           | 0,31           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CI mittlere Differenz           |   |                              | [0,12; 0,29]   | [0,21; 0,41]   |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Median mittlere Differenz       |   |                              | 0,00           | 0,00           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      | Anzahl  | 1000                         | 818            | 689            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 47,62                        | 45,67          | 45,03          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [45,48; 49,76]               | [43,37; 47,98] | [42,54; 47,53] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 | Anzahl  | 633                          | 551            | 474            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 30,14                        | 30,76          | 30,98          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [28,18; 32,11]               | [28,63; 32,90] | [28,66; 33,30] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      | Anzahl  | 467                          | 422            | 367            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 22,24                        | 23,56          | 23,99          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [20,46; 24,02]               | [21,60; 25,53] | [21,85; 26,13] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ                              | Patienten ≥ 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index |                              | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |  |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 2011-2                          | <b>männliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2740                   | 2342           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2734                   | 2226           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,02                  | 26,36          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | CI Mean                      | [25,78; 26,26]         | [26,12; 26,59] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | Median                       | 25,31                  | 25,76          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | Fallbasis mittlere Differenz |                        | 2225           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | Mittlere Differenz zur ED    |                        | 0,23           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | CI mittlere Differenz        |                        | [0,18; 0,28]   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | Median mittlere Differenz    |                        | 0,00           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI < 25                    | Anzahl                       | 1289                   | 962            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 47,15                  | 43,22          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [45,28; 49,02]         | [41,16; 45,27] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30               | Anzahl                       | 1030                   | 874            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 37,67                  | 39,26          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [35,86; 39,49]         | [37,23; 41,29] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Pat. in Kategorie BMI ≥ 30                    | Anzahl                       | 415                    | 390            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | Anteil in %                  | 15,18                  | 17,52          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 |   | CI Anteil in %               | [13,83; 16,52]         | [15,94; 19,10] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | <b>weibliche Patienten ≥ 18 insgesamt</b>     | Anzahl                       | 2025                   | 1750           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | auswertbar                                    | Anzahl                       | 2018                   | 1657           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Auswertungsergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 26,41                  | 26,76          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| CI Mean                         |   | [26,14; 26,69]               | [26,44; 27,07]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| Median                          |   | 25,25                        | 25,61                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| Fallbasis mittlere Differenz    |   |                              | 1657                   |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| Mittlere Differenz zur ED       |   |                              | 0,28                   |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| CI mittlere Differenz           |   |                              | [0,21; 0,35]           |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| Median mittlere Differenz       |   |                              | 0,00                   |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI < 25      | Anzahl  | 964                          | 763                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 47,77                        | 46,05                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [45,59; 49,95]               | [43,65; 48,45]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30 | Anzahl  | 615                          | 521                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 30,48                        | 31,44                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [28,47; 32,48]               | [29,21; 33,68]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
| Pat. in Kategorie BMI ≥ 30      | Anzahl  | 439                          | 373                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | Anteil in %                                   | 21,75                        | 22,51                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|                                 | CI Anteil in %                                | [19,95; 23,55]               | [20,50; 24,52]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |

| EZ                                   | Patienten $\geq 18$ zur ED und ihr Body-Mass-Index        |                              | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1                               | <b>männliche Patienten <math>\geq 18</math> insgesamt</b> | Anzahl                       | 3105                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                       | 3086                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Auswertungsergebnisse zum BMI                             | Mean                         | 26,04                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Mean                      | [25,84; 26,24]         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Median                       | 25,31                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Fallbasis mittlere Differenz |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Mittlere Differenz zur ED    |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI mittlere Differenz        |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Median mittlere Differenz    |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Pat. in Kategorie BMI < 25                                | Anzahl                       | 1449                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %                  | 46,95                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %               | [45,19; 48,72]         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Pat. in Kategorie 25 $\leq$ BMI < 30                      | Anzahl                       | 1126                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %                  | 36,49                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %               | [34,79; 38,19]         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Pat. in Kategorie BMI $\geq 30$                           | Anzahl                       | 511                    |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %                  | 16,56                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %               | [15,25; 17,87]         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Patienten <math>\geq 18</math> insgesamt</b> | Anzahl                       | 2226                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                       | 2211                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Auswertungsergebnisse zum BMI                             | Mean                         | 26,48                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Mean                              |   | [26,22; 26,75]               |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median                               |   | 25,26                        |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Fallbasis mittlere Differenz         |   |                              |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Mittlere Differenz zur ED            |   |                              |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI mittlere Differenz                |   |                              |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median mittlere Differenz            |   |                              |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Pat. in Kategorie BMI < 25           | Anzahl  | 1054                         |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 47,67                        |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [45,59; 49,75]               |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Pat. in Kategorie 25 $\leq$ BMI < 30 | Anzahl  | 665                          |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 30,08                        |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [28,16; 31,99]               |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Pat. in Kategorie BMI $\geq 30$      | Anzahl  | 492                          |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 22,25                        |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [20,52; 23,99]               |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

**Tabelle 3.1.1b Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index**

\* BMI bei Kindern nur zur ED bis Kohorte 2008-1, komplett auch in den FD ab Kohorte 2008-2 (mit Einführung von eDMP)

| EZ                             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halb-jahr                          | 2. Halb-jahr    | 3. Halb-jahr | 4. Halb-jahr | 5. Halb-jahr | 6. Halb-jahr | 7. Halb-jahr | 8. Halb-jahr | 9. Halb-jahr | 10. Halb-jahr   | 11. Halb-jahr   | 12. Halb-jahr   | 13. Halb-jahr   | 14. Halb-jahr   | 15. Halb-jahr   |                 |                |
|--------------------------------|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2005-1                         | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                                       | 40              | 36           | 35           | 28           | 24           | 23           | 18           | 17           | 17              | 15              | 14              | 14              | 13              | 12              | 11              |                |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 40              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 16              | 15              | 12              | 13              | 12              | 11              | 11              | 10             |
|                                | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean   | 21,96           |              |              |              |              |              |              |              | 25,00           | 25,17           | 26,48           | 26,05           | 25,83           | 26,51           | 26,49           | 26,88          |
|                                |  | CI Mean                                      | [20,33; 23,60]  |              |              |              |              |              |              |              | [22,41; 27,60]  | [22,84; 27,50]  | [23,71; 29,26]  | [23,41; 28,70]  | [23,47; 28,20]  | [23,96; 29,06]  | [24,02; 28,96]  | [24,49; 29,26] |
|                                |  | Median                                       | 21,39           |              |              |              |              |              |              |              | 24,37           | 24,86           | 25,04           | 24,84           | 24,13           | 24,84           | 25,22           | 25,19          |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                 |              |              |              |              |              |              |              | 16              | 15              | 12              | 13              | 12              | 11              | 11              | 10             |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                 |              |              |              |              |              |              |              | 2,22            | 2,53            | 3,22            | 2,94            | 2,67            | 2,84            | 2,82            | 2,98           |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                 |              |              |              |              |              |              |              | [0,54; 3,91]    | [0,78; 4,28]    | [1,89; 4,56]    | [0,90; 4,97]    | [1,21; 4,14]    | [0,85; 4,84]    | [0,38; 5,26]    | [0,17; 5,79]   |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                 |              |              |              |              |              |              |              | 1,92            | 3,32            | 3,96            | 3,84            | 3,72            | 3,20            | 3,79            | 3,44           |
|                                | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                                       | 0               |              |              |              |              |              |              |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 0,00            |              |              |              |              |              |              |              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 0,00]    |              |              |              |              |              |              |              | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   |
|                                | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                                       | 27              |              |              |              |              |              |              |              | 9               | 8               | 6               | 7               | 7               | 6               | 4               | 3              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 67,50           |              |              |              |              |              |              |              | 56,25           | 53,33           | 50,00           | 53,85           | 58,33           | 54,55           | 36,36           | 30,00          |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [52,80; 82,20]  |              |              |              |              |              |              |              | [31,14; 81,36]  | [27,20; 79,47]  | [20,45; 79,55]  | [25,64; 82,05]  | [29,20; 87,47]  | [23,68; 85,41]  | [6,55; 66,18]   | [0,06; 59,94]  |
|                                | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                                       | 9               |              |              |              |              |              |              |              | 4               | 5               | 3               | 3               | 3               | 2               | 4               | 4              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 22,50           |              |              |              |              |              |              |              | 25,00           | 33,33           | 25,00           | 23,08           | 25,00           | 18,18           | 36,36           | 40,00          |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [9,39; 35,61]   |              |              |              |              |              |              |              | [3,09; 46,91]   | [8,64; 58,03]   | [0,00; 50,59]   | [0,00; 46,92]   | [0,00; 50,59]   | [0,00; 42,09]   | [6,55; 66,18]   | [7,99; 72,01]  |
|                                | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                                       | 4               |              |              |              |              |              |              |              | 3               | 2               | 3               | 3               | 2               | 3               | 3               | 3              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 10,00           |              |              |              |              |              |              |              | 18,75           | 13,33           | 25,00           | 23,08           | 16,67           | 27,27           | 27,27           | 30,00          |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,58; 19,42]   |              |              |              |              |              |              |              | [0,00; 38,50]   | [0,00; 31,14]   | [0,00; 50,59]   | [0,00; 46,92]   | [0,00; 38,69]   | [0,00; 54,88]   | [0,00; 54,88]   | [0,06; 59,94]  |
|                                | 2005-1   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl          | 23           | 20           | 20           | 16           | 13           | 12           | 8            | 8               | 8               | 8               | 7               | 7               | 6               | 5               | 4              |
|                                |  | auswertbar                                   | Anzahl          | 23           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 8               | 8               | 6               | 7               | 6               | 5               | 5              |
| Auswertungs-ergebnisse zum BMI |  | Mean   | 19,67           |              |              |              |              |              |              |              | 23,00           | 23,55           | 23,43           | 23,22           | 23,50           | 23,96           | 24,20           | 24,68          |
|                                |  | CI Mean                                      | [18,67; 20,67]  |              |              |              |              |              |              |              | [21,21; 24,79]  | [21,67; 25,44]  | [21,76; 25,09]  | [21,40; 25,04]  | [22,19; 24,82]  | [22,72; 25,21]  | [22,54; 25,85]  | [24,06; 25,30] |
|                                |  | Median                                       | 19,96           |              |              |              |              |              |              |              | 23,05           | 23,05           | 22,73           | 23,12           | 23,18           | 24,21           | 24,21           | 24,81          |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                 |              |              |              |              |              |              |              | 8               | 8               | 6               | 7               | 6               | 5               | 5               | 4              |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                 |              |              |              |              |              |              |              | 2,49            | 3,04            | 3,60            | 3,17            | 3,88            | 3,93            | 4,16            | 4,98           |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                 |              |              |              |              |              |              |              | [0,80; 4,17]    | [1,30; 4,79]    | [2,26; 4,93]    | [1,13; 5,21]    | [2,42; 5,35]    | [1,93; 5,92]    | [1,72; 6,61]    | [2,17; 7,79]   |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                 |              |              |              |              |              |              |              | 3,11            | 3,73            | 3,96            | 3,84            | 3,85            | 3,78            | 4,25            | 5,41           |
| Kategorie 1: untergewichtig    |  | Anzahl                                       | 0               |              |              |              |              |              |              |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 0,00            |              |              |              |              |              |              |              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 0,00]    |              |              |              |              |              |              |              | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   |
| Kategorie 2: normal            |  | Anzahl                                       | 21              |              |              |              |              |              |              |              | 6               | 6               | 5               | 5               | 5               | 4               | 3               | 2              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 91,30           |              |              |              |              |              |              |              | 75,00           | 75,00           | 83,33           | 71,43           | 83,33           | 80,00           | 60,00           | 50,00          |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [79,53; 100,00] |              |              |              |              |              |              |              | [42,92; 100,00] | [42,92; 100,00] | [50,67; 100,00] | [35,28; 100,00] | [50,67; 100,00] | [40,80; 100,00] | [11,99; 100,00] | [0,00; 100,00] |
| Kategorie 3: mäßig adipös      |  | Anzahl                                       | 2               |              |              |              |              |              |              |              | 2               | 2               | 1               | 2               | 1               | 1               | 2               | 2              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 8,70            |              |              |              |              |              |              |              | 25,00           | 25,00           | 16,67           | 28,57           | 16,67           | 20,00           | 40,00           | 50,00          |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 20,47]   |              |              |              |              |              |              |              | [0,00; 57,08]   | [0,00; 57,08]   | [0,00; 49,33]   | [0,00; 64,72]   | [0,00; 49,33]   | [0,00; 59,20]   | [0,00; 88,01]   | [0,00; 100,00] |
| Kategorie 4: (stark) adipös    |  | Anzahl                                       | 0               |              |              |              |              |              |              |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|                                |  | Anteil in %                                  | 0,00            |              |              |              |              |              |              |              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 0,00]    |              |              |              |              |              |              |              | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   |

| EZ                           | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |                |
|------------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-2                       | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 17             | 16          | 15          | 12          | 11          | 11             | 10             | 9              | 9              | 7              | 7              | 7              | 7              | 7              |                |
|                              | auswertbar                                     | Anzahl                       | 17             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              | 0              | 8              | 7              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |                |
|                              | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 25,06          |             |             |             |             |                |                | 27,01          | 27,01          | 29,54          | 29,36          | 28,16          | 28,64          | 28,40          | 28,34          |
|                              |  | CI Mean                      | [21,98; 28,14] |             |             |             |             |                |                | [22,41; 31,62] | [22,74; 31,29] | [25,44; 33,64] | [25,34; 33,37] | [24,35; 31,97] | [24,73; 32,54] | [24,61; 32,18] | [24,77; 31,91] |
|                              |  | Median                       | 25,71          |             |             |             |             |                |                | 27,63          | 29,38          | 30,48          | 29,93          | 27,76          | 28,49          | 28,49          | 28,05          |
|                              |  | Fallbasis mittlere Differenz |                |             |             |             |             |                |                | 8              | 7              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
|                              |  | Mittlere Differenz zur ED    |                |             |             |             |             |                |                | 1,96           | 1,95           | 2,84           | 2,66           | 1,47           | 1,94           | 1,70           | 1,65           |
|                              |  | CI mittlere Differenz        |                |             |             |             |             |                |                | [-0,31; 4,23]  | [-1,74; 5,63]  | [-1,54; 7,23]  | [-1,70; 7,02]  | [-3,30; 6,23]  | [-2,14; 6,02]  | [-1,99; 5,39]  | [-2,09; 5,38]  |
|                              |  | Median mittlere Differenz    |                |             |             |             |             |                |                | 0,83           | 1,88           | 2,74           | 2,66           | 0,48           | 1,21           | 1,21           | 1,35           |
|                              | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 0              |             |             |             |             |                |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                              |  | Anteil in %                  | 0,00           |             |             |             |             |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                              |  | CI Anteil in %               | [0,00; 0,00]   |             |             |             |             |                |                | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |
|                              | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 6              |             |             |             |             |                |                | 3              | 2              | 1              | 2              | 2              | 2              | 1              | 1              |
|                              |  | Anteil in %                  | 35,29          |             |             |             |             |                |                | 37,50          | 28,57          | 16,67          | 33,33          | 33,33          | 33,33          | 16,67          | 16,67          |
|                              |  | CI Anteil in %               | [11,88; 58,71] |             |             |             |             |                |                | [1,64; 73,36]  | [0,00; 64,72]  | [0,00; 49,33]  | [0,00; 74,65]  | [0,00; 74,65]  | [0,00; 74,65]  | [0,00; 49,33]  | [0,00; 49,33]  |
|                              | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 7              |             |             |             |             |                |                | 2              | 3              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 2              |
|                              |  | Anteil in %                  | 41,18          |             |             |             |             |                |                | 25,00          | 42,86          | 33,33          | 16,67          | 33,33          | 16,67          | 33,33          | 33,33          |
|                              |  | CI Anteil in %               | [17,06; 65,29] |             |             |             |             |                |                | [0,00; 57,08]  | [3,26; 82,46]  | [0,00; 74,65]  | [0,00; 49,33]  | [0,00; 74,65]  | [0,00; 49,33]  | [0,00; 74,65]  | [0,00; 74,65]  |
|                              | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 4              |             |             |             |             |                |                | 3              | 2              | 3              | 3              | 2              | 3              | 3              | 3              |
|                              |  | Anteil in %                  | 23,53          |             |             |             |             |                |                | 37,50          | 28,57          | 50,00          | 50,00          | 33,33          | 50,00          | 50,00          | 50,00          |
|                              |  | CI Anteil in %               | [2,74; 44,31]  |             |             |             |             |                |                | [1,64; 73,36]  | [0,00; 64,72]  | [6,17; 93,83]  | [6,17; 93,83]  | [0,00; 74,65]  | [6,17; 93,83]  | [6,17; 93,83]  | [6,17; 93,83]  |
|                              | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 249            | 219         | 186         | 157         | 148         | 132            | 120            | 105            | 95             | 86             | 81             | 76             | 70             | 64             |                |
|                              | auswertbar                                     | Anzahl                       | 248            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              | 111            | 98             | 91             | 83             | 80             | 75             | 67             | 62             |                |
|                              | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 22,00          |             |             |             |             |                | 23,49          | 23,88          | 23,93          | 24,58          | 24,59          | 24,54          | 24,65          | 24,60          |                |
| CI Mean                      |  | [21,43; 22,56]               |                |             |             |             |             | [22,71; 24,28] | [23,02; 24,75] | [22,99; 24,88] | [23,67; 25,49] | [23,65; 25,52] | [23,60; 25,49] | [23,64; 25,65] | [23,67; 25,53] |                |                |
| Median                       |  | 21,24                        |                |             |             |             |             | 23,42          | 23,51          | 23,15          | 24,01          | 23,83          | 23,94          | 24,38          | 24,56          |                |                |
| Fallbasis mittlere Differenz |  |                              |                |             |             |             |             | 110            | 98             | 91             | 83             | 80             | 75             | 67             | 62             |                |                |
| Mittlere Differenz zur ED    |  |                              |                |             |             |             |             | 1,80           | 1,92           | 2,39           | 2,82           | 2,96           | 2,91           | 3,23           | 3,50           |                |                |
| CI mittlere Differenz        |  |                              |                |             |             |             |             | [0,86; 2,73]   | [0,89; 2,95]   | [1,63; 3,15]   | [2,09; 3,55]   | [2,10; 3,81]   | [2,06; 3,77]   | [2,45; 4,00]   | [2,74; 4,26]   |                |                |
| Median mittlere Differenz    |  |                              |                |             |             |             |             | 2,05           | 1,99           | 2,11           | 2,30           | 2,79           | 2,77           | 3,33           | 3,41           |                |                |
| Kategorie 1: untergewichtig  | Anzahl   | 4                            |                |             |             |             |             | 2              | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 0              |                |                |
|                              | Anteil in %                                    | 1,61                         |                |             |             |             |             | 1,80           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1,25           | 1,33           | 1,49           | 0,00           |                |                |
|                              | CI Anteil in %                                 | [0,04; 3,18]                 |                |             |             |             |             | [0,00; 4,29]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 3,70]   | [0,00; 3,95]   | [0,00; 4,42]   | [0,00; 0,00]   |                |                |
| Kategorie 2: normal          | Anzahl   | 169                          |                |             |             |             |             | 66             | 60             | 55             | 45             | 42             | 44             | 36             | 35             |                |                |
|                              | Anteil in %                                    | 68,15                        |                |             |             |             |             | 59,46          | 61,22          | 60,44          | 54,22          | 52,50          | 58,67          | 53,73          | 56,45          |                |                |
|                              | CI Anteil in %                                 | [62,33; 73,96]               |                |             |             |             |             | [50,28; 68,63] | [51,53; 70,92] | [50,34; 70,54] | [43,43; 65,00] | [41,49; 63,51] | [47,45; 69,89] | [41,70; 65,76] | [44,01; 68,89] |                |                |
| Kategorie 3: mäßig adipös    | Anzahl   | 42                           |                |             |             |             |             | 30             | 29             | 25             | 32             | 31             | 24             | 24             | 22             |                |                |
|                              | Anteil in %                                    | 16,94                        |                |             |             |             |             | 27,03          | 29,59          | 27,47          | 38,55          | 38,75          | 32,00          | 35,82          | 35,48          |                |                |
|                              | CI Anteil in %                                 | [12,26; 21,61]               |                |             |             |             |             | [18,73; 35,33] | [20,51; 38,68] | [18,25; 36,69] | [28,02; 49,09] | [28,01; 49,49] | [21,37; 42,63] | [24,25; 47,39] | [23,48; 47,49] |                |                |
| Kategorie 4: (stark) adipös  | Anzahl   | 33                           |                |             |             |             |             | 13             | 9              | 11             | 6              | 6              | 6              | 6              | 5              |                |                |
|                              | Anteil in %                                    | 13,31                        |                |             |             |             |             | 11,71          | 9,18           | 12,09          | 7,23           | 7,50           | 8,00           | 8,96           | 8,06           |                |                |
|                              | CI Anteil in %                                 | [9,07; 17,54]                |                |             |             |             |             | [5,70; 17,72]  | [3,44; 14,93]  | [5,35; 18,82]  | [1,62; 12,83]  | [1,69; 13,31]  | [1,82; 14,18]  | [2,07; 15,84]  | [1,23; 14,90]  |                |                |



| EZ                            | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr                           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |    |
|-------------------------------|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                               | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                                       | 127            | 112         | 103         | 87          | 84          | 80          | 73             | 61             | 55             | 52             | 51             | 50             | 45             | 40             |    |
|                               | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 126            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 67             | 58             | 55             | 51             | 51             | 49             | 42             | 39             |    |
|                               | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean   | 21,96          |             |             |             |             |             | 23,17          | 23,44          | 23,69          | 24,29          | 24,15          | 24,21          | 24,10          | 24,34          |    |
|                               |  | CI Mean                                      | [21,17; 22,76] |             |             |             |             |             | [22,28; 24,06] | [22,45; 24,43] | [22,64; 24,73] | [23,30; 25,28] | [23,13; 25,16] | [23,12; 25,30] | [23,00; 25,19] | [23,30; 25,37] |    |
|                               |  | Median                                       | 20,99          |             |             |             |             |             | 23,33          | 23,22          | 23,19          | 23,94          | 23,74          | 23,46          | 23,70          | 24,16          |    |
|                               |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                |             |             |             |             |             | 66             | 58             | 55             | 51             | 51             | 49             | 42             | 39             |    |
|                               |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                |             |             |             |             |             | 1,54           | 1,50           | 2,23           | 2,51           | 2,48           | 2,53           | 2,78           | 3,13           |    |
|                               |  | CI mittlere Differenz                        |                |             |             |             |             |             | [0,60; 2,47]   | [0,46; 2,53]   | [1,46; 2,99]   | [1,78; 3,24]   | [1,63; 3,34]   | [1,67; 3,38]   | [2,01; 3,55]   | [2,37; 3,89]   |    |
|                               |  | Median mittlere Differenz                    |                |             |             |             |             |             | 1,88           | 1,74           | 2,11           | 2,11           | 2,20           | 1,93           | 2,46           | 3,06           |    |
|                               | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                                       | 2              |             |             |             |             |             | 1              | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 0              |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 1,59           |             |             |             |             |             | 1,49           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1,96           | 2,04           | 2,38           | 0,00           |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 3,78]   |             |             |             |             |             | [0,00; 4,42]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 5,80]   | [0,00; 6,04]   | [0,00; 7,05]   | [0,00; 0,00]   |    |
|                               | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                                       | 88             |             |             |             |             |             | 42             | 37             | 35             | 28             | 29             | 31             | 26             | 25             |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 69,84          |             |             |             |             |             | 62,69          | 63,79          | 63,64          | 54,90          | 56,86          | 63,27          | 61,90          | 64,10          |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [61,80; 77,89] |             |             |             |             |             | [51,02; 74,35] | [51,32; 76,27] | [50,81; 76,47] | [41,11; 68,69] | [43,13; 70,59] | [49,63; 76,90] | [47,04; 76,77] | [48,85; 79,35] |    |
|                               | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                                       | 20             |             |             |             |             |             | 16             | 16             | 14             | 20             | 19             | 13             | 13             | 12             |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 15,87          |             |             |             |             |             | 23,88          | 27,59          | 25,45          | 39,22          | 37,25          | 26,53          | 30,95          | 30,77          |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [9,47; 22,28]  |             |             |             |             |             | [13,59; 34,17] | [15,98; 39,19] | [13,84; 37,07] | [25,68; 52,75] | [23,85; 50,66] | [14,04; 39,02] | [16,80; 45,10] | [16,09; 45,44] |    |
|                               | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                                       | 16             |             |             |             |             |             | 8              | 5              | 6              | 3              | 2              | 4              | 2              | 2              |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 12,70          |             |             |             |             |             | 11,94          | 8,62           | 10,91          | 5,88           | 3,92           | 8,16           | 4,76           | 5,13           |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [6,86; 18,54]  |             |             |             |             |             | [4,12; 19,76]  | [1,33; 15,91]  | [2,59; 19,22]  | [0,00; 12,40]  | [0,00; 9,30]   | [0,42; 15,91]  | [0,00; 11,28]  | [0,00; 12,14]  |    |
|                               |  | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl         | 122         | 107         | 83          | 70          | 64          | 52             | 47             | 44             | 40             | 34             | 30             | 26             | 25             | 24 |
|                               |  | auswertbar                                   | Anzahl         | 122         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              | 44             | 40             | 36             | 32             | 29             | 26             | 25             | 23 |
| Auswertungsergebnisse zum BMI |  | Mean   | 22,03          |             |             |             |             |             | 23,98          | 24,53          | 24,31          | 25,05          | 25,36          | 25,18          | 25,57          | 25,04          |    |
|                               |  | CI Mean                                      | [21,22; 22,84] |             |             |             |             |             | [22,53; 25,42] | [22,98; 26,08] | [22,51; 26,12] | [23,28; 26,81] | [23,51; 27,21] | [23,39; 26,97] | [23,62; 27,52] | [23,25; 26,83] |    |
|                               |  | Median                                       | 21,56          |             |             |             |             |             | 23,53          | 24,01          | 23,04          | 24,11          | 25,00          | 24,70          | 25,39          | 25,39          |    |
|                               |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                |             |             |             |             |             | 44             | 40             | 36             | 32             | 29             | 26             | 25             | 23             |    |
|                               |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                |             |             |             |             |             | 2,19           | 2,54           | 2,64           | 3,31           | 3,79           | 3,64           | 3,98           | 4,13           |    |
|                               |  | CI mittlere Differenz                        |                |             |             |             |             |             | [1,46; 2,93]   | [1,72; 3,35]   | [1,73; 3,55]   | [2,44; 4,17]   | [2,77; 4,81]   | [2,62; 4,66]   | [2,75; 5,20]   | [3,06; 5,20]   |    |
|                               |  | Median mittlere Differenz                    |                |             |             |             |             |             | 2,06           | 2,40           | 2,26           | 3,15           | 3,67           | 3,64           | 4,73           | 3,73           |    |
| Kategorie 1: untergewichtig   |  | Anzahl                                       | 2              |             |             |             |             |             | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 1,64           |             |             |             |             |             | 2,27           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 3,90]   |             |             |             |             |             | [0,00; 6,73]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |    |
| Kategorie 2: normal           |  | Anzahl                                       | 81             |             |             |             |             |             | 24             | 23             | 20             | 17             | 13             | 13             | 10             | 10             |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 66,39          |             |             |             |             |             | 54,55          | 57,50          | 55,56          | 53,13          | 44,83          | 50,00          | 40,00          | 43,48          |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [57,98; 74,81] |             |             |             |             |             | [39,66; 69,43] | [41,98; 73,02] | [39,09; 72,02] | [35,56; 70,69] | [26,41; 63,25] | [30,40; 69,60] | [20,40; 59,60] | [22,76; 64,19] |    |
| Kategorie 3: mäßig adipös     |  | Anzahl                                       | 22             |             |             |             |             |             | 14             | 13             | 11             | 12             | 12             | 11             | 11             | 10             |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 18,03          |             |             |             |             |             | 31,82          | 32,50          | 30,56          | 37,50          | 41,38          | 42,31          | 44,00          | 43,48          |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [11,18; 24,88] |             |             |             |             |             | [17,90; 45,74] | [17,80; 47,20] | [15,29; 45,82] | [20,46; 54,54] | [23,14; 59,62] | [22,94; 61,67] | [24,14; 63,86] | [22,76; 64,19] |    |
| Kategorie 4: (stark) adipös   |  | Anzahl                                       | 17             |             |             |             |             |             | 5              | 4              | 5              | 3              | 4              | 2              | 4              | 3              |    |
|                               |  | Anteil in %                                  | 13,93          |             |             |             |             |             | 11,36          | 10,00          | 13,89          | 9,38           | 13,79          | 7,69           | 16,00          | 13,04          |    |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [7,76; 20,10]  |             |             |             |             |             | [1,88; 20,85]  | [0,58; 19,42]  | [2,43; 25,35]  | [0,00; 19,64]  | [1,02; 26,57]  | [0,00; 18,14]  | [1,33; 30,67]  | [0,00; 27,12]  |    |

| EZ                             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr                           | 2. Halbjahr                  | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halbjahr      | 11. Halbjahr      | 12. Halbjahr      | 13. Halbjahr      | 14. Halbjahr      | 15. Halbjahr      |  |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2006-1                         | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                                       | 305                          | 284               | 244         | 227         | 206         | 195               | 175               | 153               | 140               | 130               | 116               | 108               | 97                |                   |  |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 303                          | 0                 | 0           | 0           | 0           | 180               | 165               | 142               | 135               | 124               | 112               | 105               | 93                |                   |  |
|                                | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean   | 23,09                        |                   |             |             |             | 23,20             | 23,40             | 23,64             | 24,30             | 24,01             | 24,06             | 24,36             | 24,40             |                   |  |
|                                |  | CI Mean                                      | [21,65;<br>24,54]            |                   |             |             |             | [22,54;<br>23,85] | [22,71;<br>24,08] | [22,88;<br>24,39] | [23,25;<br>25,35] | [23,19;<br>24,90] | [23,21;<br>24,90] | [23,45;<br>25,26] | [23,42;<br>25,38] |                   |  |
|                                |  | Median                                       | 21,80                        |                   |             |             |             | 22,96             | 23,00             | 23,61             | 23,67             | 23,57             | 23,50             | 23,96             | 23,83             |                   |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                              |                   |             |             |             | 179               | 164               | 141               | 134               | 123               | 111               | 104               | 92                |                   |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                              |                   |             |             |             | 1,32              | 1,61              | 1,88              | 2,32              | 2,21              | 2,22              | 2,57              | 2,67              |                   |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                              |                   |             |             |             | [0,83; 1,82]      | [1,03; 2,19]      | [1,34; 2,43]      | [1,72; 2,92]      | [1,53; 2,88]      | [1,45; 2,99]      | [1,78; 3,35]      | [1,79; 3,54]      |                   |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                              |                   |             |             |             | 1,41              | 1,84              | 2,00              | 2,02              | 2,10              | 2,25              | 2,53              | 2,74              |                   |  |
|                                | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                                       | 6                            |                   |             |             |             | 1                 | 1                 | 2                 | 2                 | 2                 | 3                 | 2                 | 3                 |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 1,98                         |                   |             |             |             | 0,56              | 0,61              | 1,41              | 1,48              | 1,61              | 2,68              | 1,90              | 3,23              |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,41; 3,55]                 |                   |             |             |             | [0,00; 1,64]      | [0,00; 1,79]      | [0,00; 3,35]      | [0,00; 3,53]      | [0,00; 3,84]      | [0,00; 5,68]      | [0,00; 4,53]      | [0,00; 6,84]      |                   |  |
|                                | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                                       | 198                          |                   |             |             |             | 105               | 99                | 75                | 75                | 66                | 63                | 55                | 47                |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 65,35                        |                   |             |             |             | 58,33             | 60,00             | 52,82             | 55,56             | 53,23             | 56,25             | 52,38             | 50,54             |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [59,98;<br>70,71]            |                   |             |             |             | [51,11;<br>65,56] | [52,50;<br>67,50] | [44,58;<br>61,06] | [47,14;<br>63,97] | [44,41;<br>62,04] | [47,02;<br>65,48] | [42,78;<br>61,98] | [40,32;<br>60,75] |                   |  |
|                                | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                                       | 56                           |                   |             |             |             | 44                | 37                | 39                | 33                | 34                | 28                | 30                | 28                |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 18,48                        |                   |             |             |             | 24,44             | 22,42             | 27,46             | 24,44             | 27,42             | 25,00             | 28,57             | 30,11             |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [14,10;<br>22,86]            |                   |             |             |             | [18,15;<br>30,74] | [16,04;<br>28,81] | [20,10;<br>34,83] | [17,17;<br>31,72] | [19,54;<br>35,30] | [16,94;<br>33,06] | [19,89;<br>37,25] | [20,73;<br>39,48] |                   |  |
|                                | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                                       | 43                           |                   |             |             |             | 30                | 28                | 26                | 25                | 22                | 18                | 18                | 15                |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 14,19                        |                   |             |             |             | 16,67             | 16,97             | 18,31             | 18,52             | 17,74             | 16,07             | 17,14             | 16,13             |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [10,26;<br>18,13]            |                   |             |             |             | [11,21;<br>22,13] | [11,22;<br>22,71] | [11,93;<br>24,69] | [11,94;<br>25,10] | [10,99;<br>24,49] | [9,24;<br>22,90]  | [9,90;<br>24,39]  | [8,61;<br>23,64]  |                   |  |
|                                | 2006-1   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 144               | 135         | 120         | 112         | 99                | 95                | 82                | 70                | 63                | 58                | 51                | 49                | 46                |  |
|                                |  | auswertbar                                   | Anzahl                       | 143               | 0           | 0           | 0           | 0                 | 87                | 76                | 64                | 62                | 57                | 50                | 49                | 45                |  |
|                                |  | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI        | Mean                         | 21,36             |             |             |             |                   | 22,76             | 23,16             | 23,52             | 23,56             | 23,82             | 23,97             | 24,47             | 24,45             |  |
|                                |  |  | CI Mean                      | [20,69;<br>22,02] |             |             |             |                   | [21,79;<br>23,72] | [22,07;<br>24,24] | [22,34;<br>24,69] | [22,34;<br>24,78] | [22,54;<br>25,10] | [22,57;<br>25,38] | [23,01;<br>25,94] | [22,92;<br>25,98] |  |
|                                |  |  | Median                       | 21,24             |             |             |             |                   | 22,21             | 22,59             | 23,43             | 23,36             | 22,92             | 23,61             | 24,01             | 23,59             |  |
|                                |  |  | Fallbasis mittlere Differenz |                   |             |             |             |                   | 87                | 76                | 64                | 62                | 57                | 50                | 49                | 45                |  |
|                                |  |  | Mittlere Differenz zur ED    |                   |             |             |             |                   | 1,42              | 1,90              | 2,09              | 2,11              | 2,42              | 2,46              | 2,90              | 2,97              |  |
| CI mittlere Differenz          |  |  |                              |                   |             |             |             | [0,92; 1,92]      | [1,32; 2,48]      | [1,54; 2,63]      | [1,51; 2,71]      | [1,74; 3,09]      | [1,69; 3,23]      | [2,12; 3,68]      | [2,10; 3,85]      |                   |  |
| Median mittlere Differenz      |  |  |                              |                   |             |             |             | 1,41              | 2,05              | 2,40              | 1,92              | 2,32              | 2,18              | 2,43              | 2,94              |                   |  |
| Kategorie 1:<br>untergewichtig |  | Anzahl                                       | 3                            |                   |             |             |             | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 3                 | 2                 | 2                 |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 2,10                         |                   |             |             |             | 1,15              | 1,32              | 1,56              | 1,61              | 1,75              | 6,00              | 4,08              | 4,44              |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 4,46]                 |                   |             |             |             | [0,00; 3,40]      | [0,00; 3,89]      | [0,00; 4,63]      | [0,00; 4,77]      | [0,00; 5,19]      | [0,00;<br>12,65]  | [0,00; 9,68]      | [0,00;<br>10,53]  |                   |  |
| Kategorie 2:<br>normal         |  | Anzahl                                       | 104                          |                   |             |             |             | 56                | 46                | 35                | 34                | 32                | 27                | 25                | 23                |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 72,73                        |                   |             |             |             | 64,37             | 60,53             | 54,69             | 54,84             | 56,14             | 54,00             | 51,02             | 51,11             |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [65,40;<br>80,05]            |                   |             |             |             | [54,25;<br>74,49] | [49,46;<br>71,59] | [42,40;<br>66,98] | [42,35;<br>67,33] | [43,14;<br>69,14] | [40,04;<br>67,96] | [36,88;<br>65,16] | [36,34;<br>65,88] |                   |  |
| Kategorie 3:<br>mäßig adipös   |  | Anzahl                                       | 22                           |                   |             |             |             | 18                | 18                | 17                | 18                | 15                | 12                | 14                | 12                |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 15,38                        |                   |             |             |             | 20,69             | 23,68             | 26,56             | 29,03             | 26,32             | 24,00             | 28,57             | 26,67             |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [9,45;<br>21,32]             |                   |             |             |             | [12,13;<br>29,25] | [14,06;<br>33,31] | [15,66;<br>37,47] | [17,64;<br>40,42] | [14,78;<br>37,85] | [12,04;<br>35,96] | [15,79;<br>41,35] | [13,60;<br>39,73] |                   |  |
| Kategorie 4:<br>(stark) adipös |  | Anzahl                                       | 14                           |                   |             |             |             | 12                | 11                | 11                | 9                 | 9                 | 8                 | 8                 | 8                 |                   |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 9,79                         |                   |             |             |             | 13,79             | 14,47             | 17,19             | 14,52             | 15,79             | 16,00             | 16,33             | 17,78             |                   |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [4,90;<br>14,68]             |                   |             |             |             | [6,51;<br>21,08]  | [6,51;<br>22,44]  | [7,87;<br>26,50]  | [5,68;<br>23,36]  | [6,24;<br>25,34]  | [5,74;<br>26,26]  | [5,87;<br>26,78]  | [6,48;<br>29,07]  |                   |  |

| EZ                          | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2006-2                      | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 161            | 149         | 124         | 115            | 107            | 100            | 93             | 83             | 77             | 72             | 65             | 59             | 51             |              |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 160            | 0           | 0           | 0              | 0              | 93             | 89             | 78             | 73             | 67             | 62             | 56             | 48             |              |
|                             | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 24,64          |             |             |                |                | 23,60          | 23,60          | 23,74          | 24,92          | 24,17          | 24,12          | 24,26          | 24,35          |              |
|                             |  | CI Mean                      | [21,99; 27,30] |             |             |                |                | [22,71; 24,50] | [22,73; 24,48] | [22,74; 24,73] | [23,29; 26,56] | [23,10; 25,23] | [23,08; 25,16] | [23,13; 25,38] | [23,10; 25,60] |              |
|                             |  | Median                       | 22,88          |             |             |                |                | 23,46          | 23,80          | 23,67          | 24,09          | 24,09          | 23,14          | 23,81          | 24,26          |              |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                |             |             |                |                | 92             | 88             | 77             | 72             | 66             | 61             | 55             | 47             |              |
|                             |  | Mittlere Differenz zur ED    |                |             |             |                |                | 1,23           | 1,36           | 1,71           | 2,49           | 2,02           | 2,02           | 2,27           | 2,37           |              |
|                             |  | CI mittlere Differenz        |                |             |             |                |                | [0,45; 2,02]   | [0,54; 2,18]   | [0,79; 2,64]   | [0,96; 4,02]   | [0,97; 3,08]   | [0,94; 3,10]   | [1,04; 3,49]   | [0,99; 3,76]   |              |
|                             |  | Median mittlere Differenz    |                |             |             |                |                | 1,42           | 1,39           | 1,93           | 2,32           | 2,10           | 2,25           | 2,62           | 2,29           |              |
|                             | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 3              |             |             |                |                | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 0              | 0              | 1              |              |
|                             |  | Anteil in %                  | 1,88           |             |             |                |                | 0,00           | 0,00           | 1,28           | 1,37           | 1,49           | 0,00           | 0,00           | 2,08           |              |
|                             |  | CI Anteil in %               | [0,00; 3,98]   |             |             |                |                | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 3,79]   | [0,00; 4,05]   | [0,00; 4,42]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 6,17]   |              |
|                             | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 94             |             |             |                |                | 49             | 53             | 40             | 41             | 34             | 36             | 30             | 24             |              |
|                             |  | Anteil in %                  | 58,75          |             |             |                |                | 52,69          | 59,55          | 51,28          | 56,16          | 50,75          | 58,06          | 53,57          | 50,00          |              |
|                             |  | CI Anteil in %               | [51,10; 66,40] |             |             |                |                | [42,49; 62,89] | [49,30; 69,81] | [40,12; 62,45] | [44,70; 67,63] | [38,68; 62,81] | [45,68; 70,45] | [40,39; 66,75] | [35,71; 64,29] |              |
|                             | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 34             |             |             |                |                | 26             | 19             | 22             | 15             | 19             | 16             | 16             | 16             |              |
|                             |  | Anteil in %                  | 21,25          |             |             |                |                | 27,96          | 21,35          | 28,21          | 20,55          | 28,36          | 25,81          | 28,57          | 33,33          |              |
|                             |  | CI Anteil in %               | [14,89; 27,61] |             |             |                |                | [18,79; 37,13] | [12,79; 29,91] | [18,15; 38,26] | [11,21; 29,88] | [17,48; 39,23] | [14,83; 36,79] | [16,63; 40,51] | [19,86; 46,81] |              |
|                             | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 29             |             |             |                |                | 18             | 17             | 15             | 16             | 13             | 10             | 10             | 7              |              |
|                             |  | Anteil in %                  | 18,13          |             |             |                |                | 19,35          | 19,10          | 19,23          | 21,92          | 19,40          | 16,13          | 17,86          | 14,58          |              |
|                             |  | CI Anteil in %               | [12,14; 24,11] |             |             |                |                | [11,28; 27,43] | [10,89; 27,31] | [10,43; 28,03] | [12,36; 31,47] | [9,86; 28,94]  | [6,90; 25,36]  | [7,74; 27,98]  | [4,49; 24,67]  |              |
|                             | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 364            | 322         | 281         | 252            | 236            | 212            | 188            | 168            | 148            | 136            | 126            | 119            |                |              |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 364            | 0           | 0           | 0              | 216            | 201            | 170            | 158            | 145            | 132            | 121            | 114            |                |              |
|                             | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 21,94          |             |             |                | 23,71          | 23,72          | 24,03          | 23,39          | 23,58          | 23,85          | 23,95          | 24,03          |                |              |
|                             |  | CI Mean                      | [21,48; 22,39] |             |             |                | [22,35; 25,07] | [22,27; 25,71] | [22,36; 25,71] | [22,71; 24,07] | [22,86; 24,30] | [23,09; 24,62] | [23,14; 24,76] | [23,17; 24,89] |                |              |
|                             |  | Median                       | 21,60          |             |             |                | 22,67          | 22,77          | 22,84          | 23,07          | 23,32          | 23,27          | 23,60          | 23,56          |                |              |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                |             |             |                | 216            | 201            | 170            | 158            | 145            | 132            | 121            | 114            |                |              |
| Mittlere Differenz zur ED   |  |                              |                |             |             | 1,92           | 1,99           | 2,11           | 1,55           | 1,89           | 2,19           | 2,54           | 2,72           |                |                |              |
| CI mittlere Differenz       |  |                              |                |             |             | [-0,59; 4,43]  | [-0,74; 4,71]  | [-0,90; 5,12]  | [1,02; 2,08]   | [1,30; 2,48]   | [1,56; 2,83]   | [1,84; 3,25]   | [1,96; 3,49]   |                |                |              |
| Median mittlere Differenz   |  |                              |                |             |             | 1,12           | 1,38           | 1,38           | 1,51           | 1,89           | 2,35           | 2,86           | 2,76           |                |                |              |
| Kategorie 1: untergewichtig | Anzahl   | 8                            |                |             |             | 1              | 6              | 3              | 3              | 2              | 4              | 2              | 3              |                |                |              |
|                             | Anteil in %                                    | 2,20                         |                |             |             | 0,46           | 2,99           | 1,76           | 1,90           | 1,38           | 3,03           | 1,65           | 2,63           |                |                |              |
|                             | CI Anteil in %                                 | [0,69; 3,71]                 |                |             |             | [0,00; 1,37]   | [0,63; 5,34]   | [0,00; 3,75]   | [0,00; 4,03]   | [0,00; 3,28]   | [0,09; 5,97]   | [0,00; 3,93]   | [0,00; 5,58]   |                |                |              |
| Kategorie 2: normal         | Anzahl   | 245                          |                |             |             | 137            | 126            | 105            | 97             | 86             | 78             | 70             | 66             |                |                |              |
|                             | Anteil in %                                    | 67,31                        |                |             |             | 63,43          | 62,69          | 61,76          | 61,39          | 59,31          | 59,09          | 57,85          | 57,89          |                |                |              |
|                             | CI Anteil in %                                 | [62,48; 72,13]               |                |             |             | [56,99; 69,86] | [55,98; 69,39] | [54,44; 69,09] | [53,78; 69,01] | [51,29; 67,33] | [50,67; 67,51] | [49,02; 66,69] | [48,79; 67,00] |                |                |              |
| Kategorie 3: mäßig adipös   | Anzahl   | 64                           |                |             |             | 49             | 42             | 35             | 39             | 39             | 34             | 33             | 33             |                |                |              |
|                             | Anteil in %                                    | 17,58                        |                |             |             | 22,69          | 20,90          | 20,59          | 24,68          | 26,90          | 25,76          | 27,27          | 28,95          |                |                |              |
|                             | CI Anteil in %                                 | [13,67; 21,50]               |                |             |             | [17,09; 28,28] | [15,26; 26,53] | [14,49; 26,68] | [17,94; 31,43] | [19,65; 34,14] | [18,27; 33,25] | [19,30; 35,24] | [20,59; 37,31] |                |                |              |
| Kategorie 4: (stark) adipös | Anzahl   | 47                           |                |             |             | 29             | 27             | 27             | 19             | 18             | 16             | 16             | 12             |                |                |              |
|                             | Anteil in %                                    | 12,91                        |                |             |             | 13,43          | 13,43          | 15,88          | 12,03          | 12,41          | 12,12          | 13,22          | 10,53          |                |                |              |
|                             | CI Anteil in %                                 | [9,46; 16,36]                |                |             |             | [8,87; 17,98]  | [8,71; 18,16]  | [10,37; 21,39] | [6,94; 17,11]  | [7,03; 17,80]  | [6,53; 17,71]  | [7,16; 19,28]  | [4,87; 16,18]  |                |                |              |

| EZ                             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halb-jahr                          | 2. Halb-jahr   | 3. Halb-jahr | 4. Halb-jahr | 5. Halb-jahr | 6. Halb-jahr   | 7. Halb-jahr   | 8. Halb-jahr   | 9. Halb-jahr   | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr  | 13. Halb-jahr  | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
|                                | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                                       | 169            | 146          | 135          | 118          | 111            | 98             | 88             | 83             | 79             | 73             | 70             | 66             |               |               |  |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 169            | 0            | 0            | 0            | 101            | 93             | 84             | 79             | 77             | 71             | 67             | 62             |               |               |  |
|                                | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean   | 21,28          |              |              |              | 23,76          | 24,02          | 24,35          | 22,86          | 22,84          | 23,16          | 23,29          | 23,40          |               |               |  |
|                                |  | CI Mean                                      | [20,65; 21,91] |              |              |              | [21,02; 26,51] | [21,06; 26,99] | [21,08; 27,61] | [21,87; 23,84] | [21,88; 23,80] | [22,13; 24,19] | [22,22; 24,36] | [22,22; 24,58] |               |               |  |
|                                |  | Median                                       | 21,16          |              |              |              | 22,10          | 22,84          | 22,71          | 22,99          | 22,78          | 23,14          | 22,91          | 22,85          |               |               |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                |              |              |              | 101            | 93             | 84             | 79             | 77             | 71             | 67             | 62             |               |               |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                |              |              |              | 2,31           | 2,44           | 2,77           | 1,43           | 1,55           | 1,87           | 2,32           | 2,57           |               |               |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                |              |              |              | [-0,20; 4,82]  | [-0,29; 5,16]  | [-0,24; 5,78]  | [0,90; 1,97]   | [0,96; 2,14]   | [1,24; 2,51]   | [1,62; 3,03]   | [1,81; 3,33]   |               |               |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                |              |              |              | 1,00           | 1,14           | 1,10           | 1,37           | 1,83           | 2,13           | 2,39           | 2,52           |               |               |  |
|                                | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                                       | 5              |              |              |              | 0              | 4              | 2              | 3              | 2              | 3              | 2              | 3              |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 2,96           |              |              |              | 0,00           | 4,30           | 2,38           | 3,80           | 2,60           | 4,23           | 2,99           | 4,84           |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,40; 5,52]   |              |              |              | [0,00; 0,00]   | [0,16; 8,45]   | [0,00; 5,66]   | [0,00; 8,04]   | [0,00; 6,17]   | [0,00; 8,94]   | [0,00; 7,09]   | [0,00; 10,22]  |               |               |  |
|                                | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                                       | 122            |              |              |              | 65             | 56             | 53             | 48             | 48             | 43             | 39             | 34             |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 72,19          |              |              |              | 64,36          | 60,22          | 63,10          | 60,76          | 62,34          | 60,56          | 58,21          | 54,84          |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [65,41; 78,96] |              |              |              | [54,97; 73,74] | [50,21; 70,22] | [52,71; 73,48] | [49,92; 71,60] | [51,44; 73,23] | [49,11; 72,01] | [46,31; 70,11] | [42,35; 67,33] |               |               |  |
|                                | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                                       | 28             |              |              |              | 25             | 23             | 16             | 21             | 20             | 18             | 20             | 20             |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 16,57          |              |              |              | 24,75          | 24,73          | 19,05          | 26,58          | 25,97          | 25,35          | 29,85          | 32,26          |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [10,95; 22,19] |              |              |              | [16,29; 33,21] | [15,91; 33,55] | [10,60; 27,50] | [16,78; 36,39] | [16,12; 35,83] | [15,16; 35,54] | [18,81; 40,89] | [20,53; 43,99] |               |               |  |
|                                | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                                       | 14             |              |              |              | 11             | 10             | 13             | 7              | 7              | 7              | 6              | 5              |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 8,28           |              |              |              | 10,89          | 10,75          | 15,48          | 8,86           | 9,09           | 9,86           | 8,96           | 8,06           |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [4,12; 12,45]  |              |              |              | [4,79; 17,00]  | [4,42; 17,08]  | [7,70; 23,26]  | [2,55; 15,17]  | [2,63; 15,55]  | [2,88; 16,84]  | [2,07; 15,84]  | [1,23; 14,90]  |               |               |  |
|                                |  | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl         | 195          | 176          | 146          | 134            | 125            | 114            | 100            | 85             | 69             | 63             | 56             | 53            |               |  |
|                                |  | auswertbar                                   | Anzahl         | 195          | 0            | 0            | 0              | 115            | 108            | 86             | 79             | 68             | 61             | 54             | 52            |               |  |
| Auswertungs-ergebnisse zum BMI |  | Mean   | 22,50          |              |              |              | 23,67          | 23,45          | 23,73          | 23,92          | 24,42          | 24,66          | 24,77          | 24,79          |               |               |  |
|                                |  | CI Mean                                      | [21,87; 23,14] |              |              |              | [22,81; 24,53] | [22,59; 24,32] | [22,81; 24,65] | [23,00; 24,84] | [23,36; 25,48] | [23,55; 25,77] | [23,56; 25,98] | [23,55; 26,02] |               |               |  |
|                                |  | Median                                       | 22,03          |              |              |              | 23,07          | 22,71          | 22,90          | 23,31          | 23,63          | 23,62          | 23,80          | 24,13          |               |               |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                |              |              |              | 115            | 108            | 86             | 79             | 68             | 61             | 54             | 52             |               |               |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                |              |              |              | 1,57           | 1,60           | 1,47           | 1,67           | 2,28           | 2,57           | 2,81           | 2,91           |               |               |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                |              |              |              | [0,72; 2,42]   | [0,74; 2,46]   | [0,49; 2,44]   | [0,59; 2,75]   | [0,99; 3,56]   | [1,16; 3,97]   | [1,20; 4,43]   | [1,24; 4,58]   |               |               |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                |              |              |              | 1,31           | 1,68           | 1,42           | 1,88           | 2,44           | 2,98           | 3,58           | 3,27           |               |               |  |
| Kategorie 1: untergewichtig    |  | Anzahl                                       | 3              |              |              |              | 1              | 2              | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 1,54           |              |              |              | 0,87           | 1,85           | 1,16           | 0,00           | 0,00           | 1,64           | 0,00           | 0,00           |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [0,00; 3,27]   |              |              |              | [0,00; 2,57]   | [0,00; 4,41]   | [0,00; 3,44]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 4,85]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |               |               |  |
| Kategorie 2: normal            |  | Anzahl                                       | 123            |              |              |              | 72             | 70             | 52             | 49             | 38             | 35             | 31             | 32             |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 63,08          |              |              |              | 62,61          | 64,81          | 60,47          | 62,03          | 55,88          | 57,38          | 57,41          | 61,54          |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [56,29; 69,87] |              |              |              | [53,73; 71,49] | [55,77; 73,86] | [50,07; 70,86] | [51,25; 72,80] | [43,99; 67,77] | [44,86; 69,89] | [44,09; 70,72] | [48,19; 74,89] |               |               |  |
| Kategorie 3: mäßig adipös      |  | Anzahl                                       | 36             |              |              |              | 24             | 19             | 19             | 18             | 19             | 16             | 13             | 13             |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 18,46          |              |              |              | 20,87          | 17,59          | 22,09          | 22,78          | 27,94          | 26,23          | 24,07          | 25,00          |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [13,00; 23,92] |              |              |              | [13,41; 28,33] | [10,38; 24,81] | [13,27; 30,91] | [13,48; 32,09] | [17,20; 38,69] | [15,10; 37,36] | [12,56; 35,58] | [13,12; 36,88] |               |               |  |
| Kategorie 4: (stark) adipös    |  | Anzahl                                       | 33             |              |              |              | 18             | 17             | 14             | 12             | 11             | 9              | 10             | 7              |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 16,92          |              |              |              | 15,65          | 15,74          | 16,28          | 15,19          | 16,18          | 14,75          | 18,52          | 13,46          |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [11,65; 22,20] |              |              |              | [8,98; 22,32]  | [8,84; 22,64]  | [8,43; 24,13]  | [7,22; 23,16]  | [7,36; 24,99]  | [5,78; 23,73]  | [8,06; 28,98]  | [4,09; 22,83]  |               |               |  |

| EZ                             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr                           | 2. Halbjahr                  | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halbjahr      | 11. Halbjahr      | 12. Halbjahr      | 13. Halbjahr      | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |  |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|--|
| 2007-1                         | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                                       | 830                          | 769               | 703         | 657               | 585               | 541               | 501               | 460               | 432               | 410               | 391               |                   |              |              |  |  |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 827                          | 0                 | 0           | 629               | 571               | 526               | 486               | 452               | 426               | 402               | 382               |                   |              |              |  |  |
|                                | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean   | 21,35                        |                   |             | 21,92             | 22,45             | 22,41             | 22,53             | 22,92             | 23,09             | 23,29             | 23,49             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Mean                                      | [21,05;<br>21,64]            |                   |             | [21,60;<br>22,25] | [21,87;<br>23,03] | [22,07;<br>22,75] | [22,17;<br>22,89] | [22,53;<br>23,31] | [22,68;<br>23,49] | [22,87;<br>23,71] | [23,05;<br>23,92] |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Median                                       | 20,99                        |                   |             | 21,76             | 22,09             | 22,27             | 22,26             | 22,65             | 22,66             | 22,81             | 22,93             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                              |                   |             | 627               | 569               | 523               | 483               | 449               | 423               | 399               | 379               |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                              |                   |             | 0,88              | 1,50              | 1,54              | 1,81              | 2,26              | 2,47              | 2,76              | 3,04              |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                              |                   |             | [0,67; 1,09]      | [0,54; 2,47]      | [1,28; 1,81]      | [1,51; 2,11]      | [1,92; 2,60]      | [2,10; 2,83]      | [2,35; 3,16]      | [2,63; 3,46]      |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                              |                   |             | 0,83              | 1,28              | 1,57              | 1,84              | 2,34              | 2,48              | 2,71              | 2,94              |                   |              |              |  |  |
|                                | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                                       | 23                           |                   |             | 6                 | 12                | 5                 | 4                 | 6                 | 4                 | 6                 | 7                 |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 2,78                         |                   |             | 0,95              | 2,10              | 0,95              | 0,82              | 1,33              | 0,94              | 1,49              | 1,83              |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [1,66; 3,90]                 |                   |             | [0,19; 1,71]      | [0,92; 3,28]      | [0,12; 1,78]      | [0,02; 1,63]      | [0,27; 2,38]      | [0,02; 1,86]      | [0,31; 2,68]      | [0,49; 3,18]      |                   |              |              |  |  |
|                                | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                                       | 570                          |                   |             | 424               | 391               | 342               | 329               | 286               | 275               | 247               | 248               |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 68,92                        |                   |             | 67,41             | 68,48             | 65,02             | 67,70             | 63,27             | 64,55             | 61,44             | 64,92             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [65,77;<br>72,08]            |                   |             | [63,74;<br>71,07] | [64,66;<br>72,29] | [60,94;<br>69,10] | [63,53;<br>71,86] | [58,83;<br>67,72] | [60,01;<br>69,10] | [56,68;<br>66,21] | [60,13;<br>69,71] |                   |              |              |  |  |
|                                | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                                       | 137                          |                   |             | 123               | 105               | 114               | 107               | 109               | 98                | 96                | 78                |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 16,57                        |                   |             | 19,55             | 18,39             | 21,67             | 22,02             | 24,12             | 23,00             | 23,88             | 20,42             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [14,03;<br>19,10]            |                   |             | [16,45;<br>22,66] | [15,21;<br>21,57] | [18,15;<br>25,20] | [18,33;<br>25,70] | [20,17;<br>28,06] | [19,00;<br>27,01] | [19,71;<br>28,05] | [16,37;<br>24,47] |                   |              |              |  |  |
|                                | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                                       | 97                           |                   |             | 76                | 63                | 65                | 46                | 51                | 49                | 53                | 49                |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 11,73                        |                   |             | 12,08             | 11,03             | 12,36             | 9,47              | 11,28             | 11,50             | 13,18             | 12,83             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [9,53;<br>13,92]             |                   |             | [9,53;<br>14,63]  | [8,46;<br>13,61]  | [9,54;<br>15,17]  | [6,86;<br>12,07]  | [8,36;<br>14,20]  | [8,47;<br>14,54]  | [9,87;<br>16,50]  | [9,47;<br>16,18]  |                   |              |              |  |  |
|                                | 2007-1   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 432               | 402         | 365               | 344               | 313               | 286               | 262               | 240               | 227               | 213               | 204               |              |              |  |  |
|                                |  | auswertbar                                   | Anzahl                       | 431               | 0           | 0                 | 326               | 305               | 276               | 255               | 237               | 223               | 210               | 198               |              |              |  |  |
|                                |  | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI        | Mean                         | 21,05             |             |                   | 21,53             | 22,48             | 22,20             | 22,34             | 22,81             | 22,93             | 23,02             | 23,10             |              |              |  |  |
|                                |  |  | CI Mean                      | [20,67;<br>21,43] |             |                   | [21,08;<br>21,97] | [21,47;<br>23,49] | [21,72;<br>22,68] | [21,83;<br>22,84] | [22,27;<br>23,35] | [22,35;<br>23,50] | [22,43;<br>23,62] | [22,50;<br>23,70] |              |              |  |  |
|                                |  |  | Median                       | 20,66             |             |                   | 21,51             | 21,87             | 21,90             | 22,06             | 22,64             | 22,40             | 22,59             | 22,72             |              |              |  |  |
|                                |  |  | Fallbasis mittlere Differenz |                   |             |                   | 326               | 305               | 275               | 254               | 236               | 222               | 209               | 197               |              |              |  |  |
| Mittlere Differenz zur ED      |  |  |                              |                   |             | 0,67              | 1,61              | 1,41              | 1,70              | 2,28              | 2,41              | 2,60              | 2,78              |                   |              |              |  |  |
| CI mittlere Differenz          |  |  |                              |                   |             | [0,46; 0,88]      | [0,65; 2,58]      | [1,15; 1,68]      | [1,40; 2,00]      | [1,94; 2,62]      | [2,05; 2,77]      | [2,20; 3,01]      | [2,36; 3,19]      |                   |              |              |  |  |
| Median mittlere Differenz      |  |  |                              |                   |             | 0,65              | 1,15              | 1,43              | 1,72              | 2,32              | 2,20              | 2,47              | 2,59              |                   |              |              |  |  |
| Kategorie 1:<br>untergewichtig |  | Anzahl                                       | 14                           |                   |             | 6                 | 10                | 4                 | 4                 | 5                 | 2                 | 4                 | 5                 |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 3,25                         |                   |             | 1,84              | 3,28              | 1,45              | 1,57              | 2,11              | 0,90              | 1,90              | 2,53              |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [1,57; 4,92]                 |                   |             | [0,38; 3,30]      | [1,28; 5,28]      | [0,04; 2,86]      | [0,04; 3,10]      | [0,28; 3,94]      | [0,00; 2,14]      | [0,05; 3,76]      | [0,33; 4,72]      |                   |              |              |  |  |
| Kategorie 2:<br>normal         |  | Anzahl                                       | 308                          |                   |             | 234               | 216               | 192               | 180               | 152               | 146               | 136               | 131               |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 71,46                        |                   |             | 71,78             | 70,82             | 69,57             | 70,59             | 64,14             | 65,47             | 64,76             | 66,16             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [67,19;<br>75,73]            |                   |             | [66,89;<br>76,67] | [65,71;<br>75,93] | [64,13;<br>75,00] | [64,98;<br>76,19] | [58,02;<br>70,25] | [59,22;<br>71,73] | [58,29;<br>71,24] | [59,55;<br>72,77] |                   |              |              |  |  |
| Kategorie 3:<br>mäßig adipös   |  | Anzahl                                       | 62                           |                   |             | 53                | 47                | 48                | 49                | 55                | 50                | 42                | 39                |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 14,39                        |                   |             | 16,26             | 15,41             | 17,39             | 19,22             | 23,21             | 22,42             | 20,00             | 19,70             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [11,07;<br>17,70]            |                   |             | [12,25;<br>20,27] | [11,35;<br>19,47] | [12,91;<br>21,87] | [14,37;<br>24,06] | [17,82;<br>28,59] | [16,94;<br>27,91] | [14,58;<br>25,42] | [14,14;<br>25,25] |                   |              |              |  |  |
| Kategorie 4:<br>(stark) adipös |  | Anzahl                                       | 47                           |                   |             | 33                | 32                | 32                | 22                | 25                | 25                | 28                | 23                |                   |              |              |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 10,90                        |                   |             | 10,12             | 10,49             | 11,59             | 8,63              | 10,55             | 11,21             | 13,33             | 11,62             |                   |              |              |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [7,96;<br>13,85]             |                   |             | [6,84;<br>13,40]  | [7,05;<br>13,94]  | [7,81;<br>15,38]  | [5,17;<br>12,08]  | [6,63;<br>14,47]  | [7,06;<br>15,36]  | [8,72;<br>17,94]  | [7,14;<br>16,09]  |                   |              |              |  |  |

| EZ                          | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halb-jahr          | 2. Halb-jahr   | 3. Halb-jahr   | 4. Halb-jahr   | 5. Halb-jahr   | 6. Halb-jahr   | 7. Halb-jahr   | 8. Halb-jahr   | 9. Halb-jahr   | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr  | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2007-2                      | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 398            |                | 338            | 313            | 272            | 255            | 239            | 220            | 205            | 197            | 187            |               |               |               |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 396            | 0              | 0              | 303            | 266            | 250            | 231            | 215            | 203            | 192            | 184            |               |               |               |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 21,67          |                |                | 22,35          | 22,41          | 22,65          | 22,74          | 23,04          | 23,26          | 23,58          | 23,90          |               |               |               |
|                             |  | CI Mean                      | [21,21; 22,12] |                |                | [21,89; 22,82] | [21,95; 22,87] | [22,17; 23,13] | [22,22; 23,25] | [22,47; 23,61] | [22,69; 23,83] | [22,99; 24,18] | [23,27; 24,53] |               |               |               |
|                             |  | Median                       | 21,32          |                |                | 21,97          | 22,39          | 22,69          | 22,43          | 22,67          | 22,77          | 23,21          | 23,03          |               |               |               |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                |                |                | 301            | 264            | 248            | 229            | 213            | 201            | 190            | 182            |               |               |               |
|                             |  | Mittlere Differenz zur ED    |                |                |                | 1,10           | 1,38           | 1,68           | 1,94           | 2,24           | 2,53           | 2,93           | 3,33           |               |               |               |
|                             |  | CI mittlere Differenz        |                |                |                | [0,89; 1,32]   | [1,11; 1,64]   | [1,38; 1,99]   | [1,59; 2,30]   | [1,82; 2,65]   | [2,13; 2,93]   | [2,48; 3,38]   | [2,83; 3,83]   |               |               |               |
|                             |  | Median mittlere Differenz    |                |                |                | 1,00           | 1,39           | 1,77           | 2,09           | 2,44           | 2,78           | 2,86           | 3,26           |               |               |               |
|                             | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 9              |                |                | 0              | 2              | 1              | 0              | 1              | 2              | 2              | 2              |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 2,27           |                |                | 0,00           | 0,75           | 0,40           | 0,00           | 0,47           | 0,99           | 1,04           | 1,09           |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [0,80; 3,74]   |                |                | [0,00; 0,00]   | [0,00; 1,79]   | [0,00; 1,18]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 1,38]   | [0,00; 2,35]   | [0,00; 2,48]   | [0,00; 2,59]   |               |               |               |
|                             | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 262            |                |                | 190            | 175            | 150            | 149            | 134            | 129            | 111            | 117            |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 66,16          |                |                | 62,71          | 65,79          | 60,00          | 64,50          | 62,33          | 63,55          | 57,81          | 63,59          |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [61,50; 70,83] |                |                | [57,25; 68,16] | [60,08; 71,50] | [53,91; 66,09] | [58,32; 70,69] | [55,83; 68,82] | [56,91; 70,18] | [50,81; 64,82] | [56,62; 70,56] |               |               |               |
|                             | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 75             |                |                | 70             | 58             | 66             | 58             | 54             | 48             | 54             | 39             |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 18,94          |                |                | 23,10          | 21,80          | 26,40          | 25,11          | 25,12          | 23,65          | 28,13          | 21,20          |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [15,08; 22,80] |                |                | [18,35; 27,86] | [16,83; 26,78] | [20,92; 31,88] | [19,50; 30,71] | [19,31; 30,93] | [17,79; 29,50] | [21,75; 34,50] | [15,27; 27,12] |               |               |               |
|                             | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 50             |                |                | 43             | 31             | 33             | 24             | 26             | 24             | 25             | 26             |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 12,63          |                |                | 14,19          | 11,65          | 13,20          | 10,39          | 12,09          | 11,82          | 13,02          | 14,13          |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [9,35; 15,90]  |                |                | [10,26; 18,13] | [7,79; 15,52]  | [9,00; 17,40]  | [6,45; 14,33]  | [7,72; 16,46]  | [7,37; 16,28]  | [8,25; 17,79]  | [9,08; 19,18]  |               |               |               |
|                             | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 1097           | 998            | 913            | 824            | 737            | 679            | 628            | 593            | 552            | 518            |                |               |               |               |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 1093           | 0              | 871            | 797            | 699            | 649            | 607            | 565            | 528            | 493            |                |               |               |               |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 21,02          |                | 22,02          | 21,79          | 22,01          | 22,13          | 22,58          | 22,47          | 22,70          | 22,80          |                |               |               |               |
|                             |  | CI Mean                      | [20,74; 21,30] |                | [21,47; 22,58] | [21,48; 22,10] | [21,64; 22,39] | [21,77; 22,49] | [22,00; 23,17] | [22,09; 22,86] | [22,31; 23,09] | [22,40; 23,19] |                |               |               |               |
|                             |  | Median                       | 20,55          |                | 21,26          | 21,63          | 21,61          | 21,77          | 21,91          | 22,03          | 22,17          | 22,31          |                |               |               |               |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                |                | 868            | 795            | 697            | 647            | 605            | 563            | 526            | 491            |                |               |               |               |
| Mittlere Differenz zur ED   |  |                              |                | 1,12           | 0,98           | 1,37           | 1,60           | 2,08           | 2,03           | 2,36           | 2,66           |                |                |               |               |               |
| CI mittlere Differenz       |  |                              |                | [0,22; 2,02]   | [0,79; 1,18]   | [1,09; 1,64]   | [1,34; 1,85]   | [1,80; 2,35]   | [1,73; 2,33]   | [2,04; 2,69]   | [2,31; 3,00]   |                |                |               |               |               |
| Median mittlere Differenz   |  |                              |                | 0,63           | 0,88           | 1,13           | 1,49           | 1,80           | 1,95           | 2,29           | 2,42           |                |                |               |               |               |
| Kategorie 1: untergewichtig | Anzahl   | 29                           |                | 8              | 10             | 7              | 9              | 11             | 9              | 4              | 4              |                |                |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 2,65                         |                | 0,92           | 1,25           | 1,00           | 1,39           | 1,81           | 1,59           | 0,76           | 0,81           |                |                |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [1,70; 3,61]                 |                | [0,28; 1,55]   | [0,48; 2,03]   | [0,26; 1,74]   | [0,49; 2,29]   | [0,75; 2,87]   | [0,56; 2,63]   | [0,02; 1,50]   | [0,02; 1,60]   |                |                |               |               |               |
| Kategorie 2: normal         | Anzahl   | 754                          |                | 564            | 532            | 442            | 425            | 379            | 366            | 337            | 321            |                |                |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 68,98                        |                | 64,75          | 66,75          | 63,23          | 65,49          | 62,44          | 64,78          | 63,83          | 65,11          |                |                |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [66,24; 71,73]               |                | [61,58; 67,93] | [63,48; 70,02] | [59,66; 66,81] | [61,82; 69,15] | [58,58; 66,29] | [60,84; 68,72] | [59,72; 67,93] | [60,90; 69,32] |                |                |               |               |               |
| Kategorie 3: mäßig adipös   | Anzahl   | 184                          |                | 198            | 179            | 173            | 146            | 144            | 129            | 120            | 114            |                |                |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 16,83                        |                | 22,73          | 22,46          | 24,75          | 22,50          | 23,72          | 22,83          | 22,73          | 23,12          |                |                |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [14,62; 19,05]               |                | [19,95; 25,52] | [19,56; 25,36] | [21,55; 27,95] | [19,28; 25,71] | [20,34; 27,11] | [19,37; 26,30] | [19,15; 26,31] | [19,40; 26,85] |                |                |               |               |               |
| Kategorie 4: (stark) adipös | Anzahl   | 126                          |                | 101            | 76             | 77             | 69             | 73             | 61             | 67             | 54             |                |                |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 11,53                        |                | 11,60          | 9,54           | 11,02          | 10,63          | 12,03          | 10,80          | 12,69          | 10,95          |                |                |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [9,63; 13,42]                |                | [9,47; 13,72]  | [7,50; 11,58]  | [8,69; 13,34]  | [8,26; 13,01]  | [9,44; 14,62]  | [8,24; 13,36]  | [9,85; 15,53]  | [8,19; 13,71]  |                |                |               |               |               |

| EZ                            | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr                           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |
|-------------------------------|--|--|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                               | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                                       | 582            | 539         | 492            | 450            | 405            | 371            | 343            | 322            | 298            | 278            |              |              |              |              |  |
|                               | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 582            | 0           | 469            | 435            | 378            | 353            | 327            | 303            | 278            | 259            |              |              |              |              |  |
|                               | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean   | 20,75          |             | 22,24          | 21,51          | 21,64          | 21,88          | 22,11          | 22,18          | 22,36          | 22,54          |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Mean                                      | [20,41; 21,10] |             | [21,28; 23,19] | [21,13; 21,90] | [21,18; 22,10] | [21,44; 22,33] | [21,66; 22,56] | [21,70; 22,65] | [21,87; 22,84] | [22,03; 23,05] |              |              |              |              |  |
|                               |  | Median                                       | 20,39          |             | 21,31          | 21,56          | 21,40          | 21,53          | 21,77          | 21,89          | 22,05          | 22,31          |              |              |              |              |  |
|                               |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                |             | 469            | 435            | 378            | 353            | 327            | 303            | 278            | 259            |              |              |              |              |  |
|                               |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                |             | 1,55           | 1,01           | 1,30           | 1,62           | 1,73           | 1,81           | 2,27           | 2,56           |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI mittlere Differenz                        |                |             | [0,65; 2,45]   | [0,81; 1,20]   | [1,02; 1,58]   | [1,36; 1,88]   | [1,46; 2,01]   | [1,51; 2,11]   | [1,95; 2,60]   | [2,21; 2,90]   |              |              |              |              |  |
|                               |  | Median mittlere Differenz                    |                |             | 0,60           | 0,78           | 1,01           | 1,42           | 1,66           | 1,75           | 2,09           | 2,26           |              |              |              |              |  |
|                               | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                                       | 19             |             | 4              | 6              | 3              | 3              | 5              | 4              | 2              | 2              |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 3,26           |             | 0,85           | 1,38           | 0,79           | 0,85           | 1,53           | 1,32           | 0,72           | 0,77           |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [1,82; 4,71]   |             | [0,02; 1,69]   | [0,28; 2,48]   | [0,00; 1,69]   | [0,00; 1,81]   | [0,20; 2,86]   | [0,03; 2,61]   | [0,00; 1,71]   | [0,00; 1,84]   |              |              |              |              |  |
|                               | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                                       | 414            |             | 313            | 303            | 255            | 239            | 214            | 207            | 185            | 169            |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 71,13          |             | 66,74          | 69,66          | 67,46          | 67,71          | 65,44          | 68,32          | 66,55          | 65,25          |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [67,45; 74,82] |             | [62,47; 71,01] | [65,33; 73,98] | [62,73; 72,19] | [62,82; 72,59] | [60,28; 70,61] | [63,07; 73,56] | [60,99; 72,10] | [59,44; 71,06] |              |              |              |              |  |
|                               | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                                       | 92             |             | 105            | 94             | 88             | 87             | 81             | 71             | 68             | 67             |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 15,81          |             | 22,39          | 21,61          | 23,28          | 24,65          | 24,77          | 23,43          | 24,46          | 25,87          |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [12,84; 18,77] |             | [18,61; 26,16] | [17,74; 25,48] | [19,01; 27,55] | [20,14; 29,15] | [20,08; 29,46] | [18,66; 28,21] | [19,40; 29,52] | [20,53; 31,21] |              |              |              |              |  |
|                               | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                                       | 57             |             | 47             | 32             | 32             | 24             | 27             | 21             | 23             | 21             |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 9,79           |             | 10,02          | 7,36           | 8,47           | 6,80           | 8,26           | 6,93           | 8,27           | 8,11           |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [7,38; 12,21]  |             | [7,30; 12,74]  | [4,90; 9,81]   | [5,66; 11,28]  | [4,17; 9,43]   | [5,27; 11,24]  | [4,07; 9,80]   | [5,03; 11,52]  | [4,78; 11,44]  |              |              |              |              |  |
|                               |  | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl         | 515         | 459            | 421            | 374            | 332            | 308            | 285            | 271            | 254            | 240          |              |              |              |  |
|                               |  | auswertbar                                   | Anzahl         | 511         | 0              | 402            | 362            | 321            | 296            | 280            | 262            | 250            | 234          |              |              |              |  |
| Auswertungsergebnisse zum BMI |  | Mean   | 21,33          |             | 21,78          | 22,12          | 22,45          | 22,42          | 23,13          | 22,82          | 23,09          | 23,08          |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Mean                                      | [20,87; 21,78] |             | [21,30; 22,25] | [21,62; 22,61] | [21,84; 23,06] | [21,85; 23,00] | [21,98; 24,29] | [22,20; 23,44] | [22,47; 23,70] | [22,47; 23,69] |              |              |              |              |  |
|                               |  | Median                                       | 20,94          |             | 21,24          | 21,97          | 21,91          | 22,07          | 22,01          | 22,18          | 22,55          | 22,41          |              |              |              |              |  |
|                               |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                |             | 399            | 360            | 319            | 294            | 278            | 260            | 248            | 232            |              |              |              |              |  |
|                               |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                |             | 0,61           | 0,95           | 1,45           | 1,57           | 2,48           | 2,28           | 2,46           | 2,77           |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI mittlere Differenz                        |                |             | [0,30; 0,93]   | [0,59; 1,32]   | [0,95; 1,94]   | [1,11; 2,03]   | [1,38; 3,58]   | [1,87; 2,70]   | [2,04; 2,89]   | [2,34; 3,20]   |              |              |              |              |  |
|                               |  | Median mittlere Differenz                    |                |             | 0,69           | 0,97           | 1,35           | 1,58           | 1,94           | 2,32           | 2,68           | 2,87           |              |              |              |              |  |
| Kategorie 1: untergewichtig   |  | Anzahl                                       | 10             |             | 4              | 4              | 4              | 6              | 6              | 5              | 2              | 2              |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 1,96           |             | 1,00           | 1,10           | 1,25           | 2,03           | 2,14           | 1,91           | 0,80           | 0,85           |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [0,75; 3,16]   |             | [0,02; 1,97]   | [0,03; 2,18]   | [0,03; 2,46]   | [0,42; 3,64]   | [0,44; 3,84]   | [0,25; 3,57]   | [0,00; 1,91]   | [0,00; 2,04]   |              |              |              |              |  |
| Kategorie 2: normal           |  | Anzahl                                       | 340            |             | 251            | 229            | 187            | 186            | 165            | 159            | 152            | 152            |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 66,54          |             | 62,44          | 63,26          | 58,26          | 62,84          | 58,93          | 60,69          | 60,80          | 64,96          |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [62,44; 70,63] |             | [57,70; 67,18] | [58,29; 68,23] | [52,85; 63,66] | [57,32; 68,35] | [53,16; 64,70] | [54,76; 66,61] | [54,74; 66,86] | [58,83; 71,08] |              |              |              |              |  |
| Kategorie 3: mäßig adipös     |  | Anzahl                                       | 92             |             | 93             | 85             | 85             | 59             | 63             | 58             | 52             | 47             |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 18,00          |             | 23,13          | 23,48          | 26,48          | 19,93          | 22,50          | 22,14          | 20,80          | 20,09          |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [14,67; 21,34] |             | [19,01; 27,26] | [19,11; 27,85] | [21,65; 31,31] | [15,37; 24,49] | [17,60; 27,40] | [17,10; 27,17] | [15,76; 25,84] | [14,94; 25,23] |              |              |              |              |  |
| Kategorie 4: (stark) adipös   |  | Anzahl                                       | 69             |             | 54             | 44             | 45             | 45             | 46             | 40             | 44             | 33             |              |              |              |              |  |
|                               |  | Anteil in %                                  | 13,50          |             | 13,43          | 12,15          | 14,02          | 15,20          | 16,43          | 15,27          | 17,60          | 14,10          |              |              |              |              |  |
|                               |  | CI Anteil in %                               | [10,54; 16,47] |             | [10,10; 16,77] | [8,78; 15,53]  | [10,21; 17,82] | [11,11; 19,30] | [12,08; 20,78] | [10,90; 19,63] | [12,87; 22,33] | [9,63; 18,57]  |              |              |              |              |  |

| EZ                             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halb-jahr                          | 2. Halb-jahr                 | 3. Halb-jahr      | 4. Halb-jahr      | 5. Halb-jahr      | 6. Halb-jahr      | 7. Halb-jahr      | 8. Halb-jahr      | 9. Halb-jahr      | 10. Halb-jahr     | 11. Halb-jahr     | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |  |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2008-1                         | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                                       | 772                          | 700               | 633               | 579               | 531               | 498               | 457               | 422               | 395               |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 766                          | 655               | 606               | 559               | 516               | 483               | 445               | 406               | 379               |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean   | 21,26                        | 21,61             | 22,02             | 21,93             | 22,21             | 22,42             | 22,98             | 22,82             | 22,97             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Mean                                      | [20,94;<br>21,59]            | [21,28;<br>21,95] | [21,47;<br>22,58] | [21,58;<br>22,28] | [21,83;<br>22,58] | [22,03;<br>22,81] | [22,26;<br>23,71] | [22,40;<br>23,23] | [22,53;<br>23,42] |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Median                                       | 20,83                        | 21,45             | 21,52             | 21,67             | 21,85             | 22,04             | 22,26             | 22,44             | 22,72             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                              | 649               | 602               | 555               | 512               | 479               | 441               | 403               | 376               |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                              | 0,41              | 0,96              | 0,97              | 1,39              | 1,70              | 2,36              | 2,35              | 2,62              |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                              | [0,23; 0,59]      | [0,05; 1,87]      | [0,75; 1,19]      | [1,15; 1,63]      | [1,44; 1,95]      | [1,16; 3,56]      | [2,02; 2,68]      | [2,21; 3,02]      |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                              | 0,36              | 0,75              | 1,00              | 1,36              | 1,55              | 1,92              | 2,07              | 2,42              |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                                       | 19                           | 12                | 12                | 9                 | 9                 | 6                 | 7                 | 3                 | 7                 |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 2,48                         | 1,83              | 1,98              | 1,61              | 1,74              | 1,24              | 1,57              | 0,74              | 1,85              |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [1,38; 3,58]                 | [0,80; 2,86]      | [0,87; 3,09]      | [0,57; 2,65]      | [0,61; 2,87]      | [0,25; 2,23]      | [0,42; 2,73]      | [0,00; 1,57]      | [0,49; 3,20]      |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                                       | 547                          | 436               | 412               | 368               | 344               | 307               | 294               | 251               | 232               |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 71,41                        | 66,56             | 67,99             | 65,83             | 66,67             | 63,56             | 66,07             | 61,82             | 61,21             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [68,21;<br>74,61]            | [62,95;<br>70,18] | [64,27;<br>71,70] | [61,90;<br>69,77] | [62,60;<br>70,74] | [59,26;<br>67,86] | [61,66;<br>70,47] | [57,09;<br>66,55] | [56,30;<br>66,13] |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                                       | 110                          | 120               | 120               | 116               | 107               | 106               | 89                | 96                | 89                |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 14,36                        | 18,32             | 19,80             | 20,75             | 20,74             | 21,95             | 20,00             | 23,65             | 23,48             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [11,88;<br>16,85]            | [15,36;<br>21,29] | [16,63;<br>22,98] | [17,39;<br>24,12] | [17,23;<br>24,24] | [18,25;<br>25,64] | [16,28;<br>23,72] | [19,51;<br>27,78] | [19,21;<br>27,76] |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                                       | 90                           | 87                | 62                | 66                | 56                | 64                | 55                | 56                | 51                |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 11,75                        | 13,28             | 10,23             | 11,81             | 10,85             | 13,25             | 12,36             | 13,79             | 13,46             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [9,47;<br>14,03]             | [10,68;<br>15,88] | [7,82;<br>12,65]  | [9,13;<br>14,48]  | [8,17;<br>13,54]  | [10,22;<br>16,28] | [9,30;<br>15,42]  | [10,43;<br>17,15] | [10,02;<br>16,90] |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                | 2008-1   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl                       | 389               | 362               | 329               | 302               | 279               | 259               | 239               | 221               | 205               |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | auswertbar                                   | Anzahl                       | 386               | 334               | 315               | 291               | 272               | 255               | 236               | 218               | 201               |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI        | Mean                         | 21,04             | 21,36             | 21,98             | 21,72             | 22,09             | 22,26             | 23,08             | 22,58             | 22,83             |               |               |               |               |  |  |
|                                |  |  | CI Mean                      | [20,62;<br>21,46] | [20,92;<br>21,80] | [21,03;<br>22,94] | [21,25;<br>22,19] | [21,59;<br>22,60] | [21,74;<br>22,78] | [21,83;<br>24,33] | [22,03;<br>23,12] | [22,21;<br>23,45] |               |               |               |               |  |  |
|                                |  |  | Median                       | 20,78             | 21,42             | 21,50             | 21,62             | 21,93             | 22,04             | 22,27             | 22,47             | 22,72             |               |               |               |               |  |  |
|                                |  |  | Fallbasis mittlere Differenz |                   | 331               | 312               | 288               | 269               | 252               | 233               | 215               | 198               |               |               |               |               |  |  |
|                                |  |  | Mittlere Differenz zur ED    |                   | 0,33              | 1,00              | 0,77              | 1,17              | 1,44              | 2,40              | 1,93              | 2,15              |               |               |               |               |  |  |
| CI mittlere Differenz          |  |  |                              | [0,15; 0,51]      | [0,09; 1,91]      | [0,55; 1,00]      | [0,94; 1,41]      | [1,19; 1,70]      | [1,20; 3,59]      | [1,60; 2,26]      | [1,75; 2,56]      |                   |               |               |               |               |  |  |
| Median mittlere Differenz      |  |  |                              | 0,29              | 0,52              | 0,69              | 0,93              | 1,26              | 1,59              | 1,65              | 1,80              |                   |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 1:<br>untergewichtig |  | Anzahl                                       | 13                           | 7                 | 8                 | 5                 | 4                 | 2                 | 4                 | 1                 | 4                 |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 3,37                         | 2,10              | 2,54              | 1,72              | 1,47              | 0,78              | 1,69              | 0,46              | 1,99              |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [1,57; 5,17]                 | [0,56; 3,63]      | [0,80; 4,28]      | [0,22; 3,21]      | [0,04; 2,90]      | [0,00; 1,87]      | [0,04; 3,35]      | [0,00; 1,36]      | [0,05; 3,93]      |                   |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 2:<br>normal         |  | Anzahl                                       | 273                          | 230               | 222               | 201               | 183               | 166               | 161               | 137               | 125               |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 70,73                        | 68,86             | 70,48             | 69,07             | 67,28             | 65,10             | 68,22             | 62,84             | 62,19             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [66,18;<br>75,27]            | [63,89;<br>73,84] | [65,43;<br>75,52] | [63,75;<br>74,39] | [61,69;<br>72,87] | [59,24;<br>70,96] | [62,27;<br>74,17] | [56,41;<br>69,27] | [55,47;<br>68,91] |                   |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 3:<br>mäßig adipös   |  | Anzahl                                       | 64                           | 59                | 62                | 56                | 59                | 55                | 44                | 54                | 45                |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 16,58                        | 17,66             | 19,68             | 19,24             | 21,69             | 21,57             | 18,64             | 24,77             | 22,39             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [12,87;<br>20,30]            | [13,57;<br>21,76] | [15,28;<br>24,08] | [14,71;<br>23,78] | [16,78;<br>26,60] | [16,51;<br>26,63] | [13,66;<br>23,62] | [19,03;<br>30,51] | [16,61;<br>28,17] |                   |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 4:<br>(stark) adipös |  | Anzahl                                       | 36                           | 38                | 23                | 29                | 26                | 32                | 27                | 26                | 27                |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 9,33                         | 11,38             | 7,30              | 9,97              | 9,56              | 12,55             | 11,44             | 11,93             | 13,43             |                   |               |               |               |               |  |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [6,42;<br>12,23]             | [7,97;<br>14,79]  | [4,42;<br>10,18]  | [6,52;<br>13,41]  | [6,06;<br>13,06]  | [8,47;<br>16,62]  | [7,37;<br>15,51]  | [7,61;<br>16,24]  | [8,71;<br>18,16]  |                   |               |               |               |               |  |  |



| EZ                          | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2008-2                      | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 383            | 338            | 304            | 277            | 252            | 239            | 218            | 201            | 190            |               |               |               |               |               |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 380            | 321            | 291            | 268            | 244            | 228            | 209            | 188            | 178            |               |               |               |               |               |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 21,49          | 21,88          | 22,07          | 22,16          | 22,33          | 22,60          | 22,88          | 23,10          | 23,14          |               |               |               |               |               |
|                             |  | CI Mean                      | [21,00; 21,98] | [21,36; 22,39] | [21,54; 22,60] | [21,63; 22,68] | [21,77; 22,89] | [22,02; 23,18] | [22,27; 23,49] | [22,46; 23,73] | [22,51; 23,77] |               |               |               |               |               |
|                             |  | Median                       | 20,92          | 21,48          | 21,74          | 21,95          | 21,72          | 22,01          | 22,23          | 22,42          | 22,77          |               |               |               |               |               |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 318            | 290            | 267            | 243            | 227            | 208            | 188            | 178            |               |               |               |               |               |
|                             |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,49           | 0,92           | 1,19           | 1,63           | 1,98           | 2,31           | 2,83           | 3,13           |               |               |               |               |               |
|                             |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,22; 0,77]   | [0,62; 1,22]   | [0,93; 1,44]   | [1,30; 1,96]   | [1,62; 2,34]   | [1,91; 2,71]   | [2,38; 3,28]   | [2,66; 3,60]   |               |               |               |               |               |
|                             |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,42           | 0,96           | 1,17           | 1,84           | 2,05           | 2,51           | 2,88           | 3,14           |               |               |               |               |               |
|                             | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 6              | 5              | 4              | 4              | 5              | 4              | 3              | 2              | 3              |               |               |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 1,58           | 1,56           | 1,37           | 1,49           | 2,05           | 1,75           | 1,44           | 1,06           | 1,69           |               |               |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [0,32; 2,83]   | [0,20; 2,91]   | [0,03; 2,71]   | [0,04; 2,95]   | [0,27; 3,83]   | [0,05; 3,46]   | [0,00; 3,05]   | [0,00; 2,53]   | [0,00; 3,58]   |               |               |               |               |               |
|                             | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 274            | 206            | 190            | 167            | 161            | 141            | 133            | 114            | 107            |               |               |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 72,11          | 64,17          | 65,29          | 62,31          | 65,98          | 61,84          | 63,64          | 60,64          | 60,11          |               |               |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [67,59; 76,62] | [58,92; 69,43] | [59,81; 70,77] | [56,50; 68,13] | [60,03; 71,94] | [55,52; 68,16] | [57,10; 70,17] | [53,64; 67,64] | [52,90; 67,33] |               |               |               |               |               |
|                             | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 46             | 61             | 58             | 60             | 48             | 51             | 45             | 42             | 44             |               |               |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 12,11          | 19,00          | 19,93          | 22,39          | 19,67          | 22,37          | 21,53          | 22,34          | 24,72          |               |               |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [8,82; 15,39]  | [14,70; 23,30] | [15,33; 24,53] | [17,39; 27,39] | [14,67; 24,67] | [16,95; 27,79] | [15,95; 27,12] | [16,37; 28,31] | [18,36; 31,07] |               |               |               |               |               |
|                             | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 54             | 49             | 39             | 37             | 30             | 32             | 28             | 30             | 24             |               |               |               |               |               |
|                             |  | Anteil in %                  | 14,21          | 15,26          | 13,40          | 13,81          | 12,30          | 14,04          | 13,40          | 15,96          | 13,48          |               |               |               |               |               |
|                             |  | CI Anteil in %               | [10,70; 17,73] | [11,32; 19,21] | [9,48; 17,32]  | [9,67; 17,94]  | [8,17; 16,42]  | [9,52; 18,55]  | [8,77; 18,03]  | [10,71; 21,21] | [8,45; 18,51]  |               |               |               |               |               |
|                             | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 559            | 514            | 460            | 404            | 367            | 337            | 319            | 294            |                |               |               |               |               |               |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 557            | 500            | 444            | 385            | 353            | 329            | 308            | 284            |                |               |               |               |               |               |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 21,36          | 21,54          | 22,10          | 22,02          | 22,28          | 22,36          | 22,46          | 22,54          |                |               |               |               |               |               |
|                             |  | CI Mean                      | [20,90; 21,82] | [21,16; 21,93] | [21,33; 22,88] | [21,56; 22,49] | [21,80; 22,76] | [21,86; 22,86] | [21,94; 22,98] | [21,99; 23,08] |                |               |               |               |               |               |
|                             |  | Median                       | 20,70          | 21,06          | 21,48          | 21,67          | 21,91          | 21,88          | 21,87          | 21,98          |                |               |               |               |               |               |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 499            | 443            | 384            | 352            | 328            | 307            | 283            |                |               |               |               |               |               |
| Mittlere Differenz zur ED   |  |                              | 0,16           | 0,74           | 0,73           | 1,28           | 1,48           | 1,78           | 1,92           |                |                |               |               |               |               |               |
| CI mittlere Differenz       |  |                              | [-0,27; 0,60]  | [-0,54; 2,02]  | [0,15; 1,30]   | [0,65; 1,90]   | [0,81; 2,16]   | [1,05; 2,51]   | [1,15; 2,69]   |                |                |               |               |               |               |               |
| Median mittlere Differenz   |  |                              | 0,15           | 0,53           | 0,97           | 1,34           | 1,66           | 1,76           | 2,16           |                |                |               |               |               |               |               |
| Kategorie 1: untergewichtig | Anzahl   | 22                           | 15             | 9              | 7              | 5              | 4              | 4              | 3              |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 3,95                         | 3,00           | 2,03           | 1,82           | 1,42           | 1,22           | 1,30           | 1,06           |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [2,33; 5,57]                 | [1,50; 4,50]   | [0,71; 3,34]   | [0,48; 3,15]   | [0,18; 2,65]   | [0,03; 2,40]   | [0,03; 2,57]   | [0,00; 2,25]   |                |                |               |               |               |               |               |
| Kategorie 2: normal         | Anzahl   | 367                          | 338            | 289            | 262            | 229            | 221            | 194            | 191            |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 65,89                        | 67,60          | 65,09          | 68,05          | 64,87          | 67,17          | 62,99          | 67,25          |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [61,95; 69,83]               | [63,49; 71,71] | [60,65; 69,53] | [63,39; 72,72] | [59,89; 69,86] | [62,09; 72,26] | [57,59; 68,39] | [61,79; 72,72] |                |                |               |               |               |               |               |
| Kategorie 3: mäßig adipös   | Anzahl   | 103                          | 89             | 101            | 72             | 74             | 65             | 75             | 60             |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 18,49                        | 17,80          | 22,75          | 18,70          | 20,96          | 19,76          | 24,35          | 21,13          |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [15,26; 21,72]               | [14,44; 21,16] | [18,84; 26,65] | [14,80; 22,60] | [16,71; 25,22] | [15,45; 24,07] | [19,55; 29,15] | [16,37; 25,88] |                |                |               |               |               |               |               |
| Kategorie 4: (stark) adipös | Anzahl   | 65                           | 58             | 45             | 44             | 45             | 39             | 35             | 30             |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | Anteil in %                                    | 11,67                        | 11,60          | 10,14          | 11,43          | 12,75          | 11,85          | 11,36          | 10,56          |                |                |               |               |               |               |               |
|                             | CI Anteil in %                                 | [9,00; 14,34]                | [8,79; 14,41]  | [7,32; 12,95]  | [8,25; 14,61]  | [9,26; 16,23]  | [8,36; 15,35]  | [7,81; 14,91]  | [6,98; 14,14]  |                |                |               |               |               |               |               |

| EZ                             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr                           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                                       | 309            | 283            | 254            | 226            | 207            | 191            | 182            | 172            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 308            | 275            | 244            | 216            | 203            | 189            | 176            | 167            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean   | 21,14          | 21,27          | 22,19          | 21,91          | 22,15          | 22,22          | 22,21          | 22,33          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Mean                                      | [20,54; 21,73] | [20,76; 21,77] | [20,87; 23,51] | [21,29; 22,53] | [21,56; 22,75] | [21,57; 22,88] | [21,53; 22,89] | [21,64; 23,02] |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Median                                       | 20,38          | 20,81          | 21,30          | 21,44          | 21,85          | 21,67          | 21,56          | 21,85          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                | 275            | 244            | 216            | 203            | 189            | 176            | 167            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                | 0,17           | 1,02           | 0,73           | 1,19           | 1,33           | 1,55           | 1,72           |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                | [-0,26; 0,61]  | [-0,26; 2,30]  | [0,15; 1,30]   | [0,56; 1,81]   | [0,65; 2,01]   | [0,82; 2,27]   | [0,95; 2,49]   |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                | 0,17           | 0,53           | 1,00           | 1,35           | 1,69           | 1,82           | 2,23           |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                                       | 10             | 7              | 5              | 4              | 2              | 2              | 2              | 1              |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 3,25           | 2,55           | 2,05           | 1,85           | 0,99           | 1,06           | 1,14           | 0,60           |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [1,26; 5,23]   | [0,68; 4,41]   | [0,27; 3,83]   | [0,05; 3,65]   | [0,00; 2,35]   | [0,00; 2,52]   | [0,00; 2,71]   | [0,00; 1,77]   |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                                       | 213            | 199            | 160            | 149            | 138            | 136            | 120            | 121            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 69,16          | 72,36          | 65,57          | 68,98          | 67,98          | 71,96          | 68,18          | 72,46          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [63,99; 74,32] | [67,07; 77,66] | [59,60; 71,55] | [62,80; 75,16] | [61,55; 74,41] | [65,54; 78,38] | [61,28; 75,08] | [65,66; 79,25] |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                                       | 55             | 42             | 57             | 41             | 40             | 30             | 37             | 28             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 17,86          | 15,27          | 23,36          | 18,98          | 19,70          | 15,87          | 21,02          | 16,77          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [13,57; 22,14] | [11,01; 19,53] | [18,04; 28,68] | [13,74; 24,22] | [14,22; 25,19] | [10,65; 21,10] | [14,99; 27,06] | [11,08; 22,45] |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                                       | 30             | 27             | 22             | 22             | 23             | 21             | 17             | 17             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 9,74           | 9,82           | 9,02           | 10,19          | 11,33          | 11,11          | 9,66           | 10,18          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [6,42; 13,06]  | [6,29; 13,34]  | [5,42; 12,62]  | [6,14; 14,23]  | [6,96; 15,70]  | [6,62; 15,60]  | [5,28; 14,04]  | [5,58; 14,78]  |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl         | 250            | 231            | 206            | 178            | 160            | 146            | 137            | 122           |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | auswertbar                                   | Anzahl         | 249            | 225            | 200            | 169            | 150            | 140            | 132            | 117           |               |               |               |               |               |  |
| Auswertungs-ergebnisse zum BMI |  | Mean   | 21,64          | 21,87          | 22,00          | 22,17          | 22,44          | 22,55          | 22,79          | 22,83          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Mean                                      | [20,93; 22,35] | [21,29; 22,46] | [21,38; 22,62] | [21,47; 22,88] | [21,65; 23,24] | [21,77; 23,33] | [21,98; 23,60] | [21,95; 23,71] |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Median                                       | 21,37          | 21,41          | 21,98          | 22,03          | 22,04          | 22,37          | 22,65          | 22,77          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                | 224            | 199            | 168            | 149            | 139            | 131            | 116            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                | 0,15           | 0,39           | 0,72           | 1,41           | 1,69           | 2,09           | 2,19           |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz                        |                | [-0,33; 0,63]  | [-0,18; 0,95]  | [0,04; 1,41]   | [0,93; 1,88]   | [1,24; 2,15]   | [1,55; 2,64]   | [1,63; 2,76]   |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz                    |                | 0,12           | 0,55           | 0,89           | 1,32           | 1,65           | 1,58           | 2,03           |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 1: untergewichtig    |  | Anzahl                                       | 12             | 8              | 4              | 3              | 3              | 2              | 2              | 2              |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 4,82           | 3,56           | 2,00           | 1,78           | 2,00           | 1,43           | 1,52           | 1,71           |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [2,15; 7,48]   | [1,13; 5,98]   | [0,05; 3,95]   | [0,00; 3,77]   | [0,00; 4,25]   | [0,00; 3,40]   | [0,00; 3,61]   | [0,00; 4,07]   |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 2: normal            |  | Anzahl                                       | 154            | 139            | 129            | 113            | 91             | 85             | 74             | 70             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 61,85          | 61,78          | 64,50          | 66,86          | 60,67          | 60,71          | 56,06          | 59,83          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [55,80; 67,89] | [55,41; 68,14] | [57,85; 71,15] | [59,75; 73,98] | [52,82; 68,51] | [52,60; 68,83] | [47,56; 64,56] | [50,91; 68,75] |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 3: mäßig adipös      |  | Anzahl                                       | 48             | 47             | 44             | 31             | 34             | 35             | 38             | 32             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 19,28          | 20,89          | 22,00          | 18,34          | 22,67          | 25,00          | 28,79          | 27,35          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [14,37; 24,19] | [15,57; 26,21] | [16,24; 27,76] | [12,49; 24,20] | [15,94; 29,39] | [17,80; 32,20] | [21,03; 36,54] | [19,24; 35,46] |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 4: (stark) adipös    |  | Anzahl                                       | 35             | 31             | 23             | 22             | 22             | 18             | 18             | 13             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                                  | 14,06          | 13,78          | 11,50          | 13,02          | 14,67          | 12,86          | 13,64          | 11,11          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %                               | [9,73; 18,38]  | [9,26; 18,29]  | [7,07; 15,93]  | [7,93; 18,11]  | [8,99; 20,35]  | [7,29; 18,42]  | [7,76; 19,51]  | [5,39; 16,83]  |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|----------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2009-1         | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 664            | 613            | 562            | 518            | 475            | 432            | 401            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 653            | 597            | 550            | 505            | 460            | 416            | 387            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 20,71          | 21,29          | 21,41          | 21,53          | 22,14          | 22,00          | 22,07          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Mean                      | [20,37; 21,05] | [20,85; 21,74] | [21,03; 21,79] | [21,14; 21,91] | [21,40; 22,89] | [21,57; 22,43] | [21,63; 22,51] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Median                       | 20,07          | 20,32          | 20,66          | 20,82          | 21,37          | 21,67          | 21,94          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 587            | 540            | 495            | 451            | 408            | 378            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,63           | 0,90           | 1,09           | 1,86           | 1,75           | 2,00           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,43; 0,82]   | [0,68; 1,12]   | [0,83; 1,35]   | [1,57; 2,14]   | [1,44; 2,06]   | [1,67; 2,33]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,28           | 0,71           | 0,91           | 1,36           | 1,67           | 1,92           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 20             | 10             | 8              | 6              | 6              | 5              | 5              |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 3,06           | 1,68           | 1,45           | 1,19           | 1,30           | 1,20           | 1,29           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [1,74; 4,39]   | [0,64; 2,71]   | [0,45; 2,46]   | [0,24; 2,13]   | [0,27; 2,34]   | [0,15; 2,25]   | [0,17; 2,42]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 460            | 409            | 377            | 338            | 304            | 266            | 260            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 70,44          | 68,51          | 68,55          | 66,93          | 66,09          | 63,94          | 67,18          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [66,94; 73,95] | [64,78; 72,24] | [64,66; 72,43] | [62,82; 71,04] | [61,76; 70,42] | [59,32; 68,56] | [62,50; 71,87] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 101            | 93             | 96             | 94             | 97             | 89             | 78             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 15,47          | 15,58          | 17,45          | 18,61          | 21,09          | 21,39          | 20,16          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [12,69; 18,24] | [12,67; 18,49] | [14,28; 20,63] | [15,22; 22,01] | [17,36; 24,82] | [17,45; 25,34] | [16,15; 24,16] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 72             | 85             | 69             | 67             | 53             | 56             | 44             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 11,03          | 14,24          | 12,55          | 13,27          | 11,52          | 13,46          | 11,37          |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI Anteil in % |  | [8,62; 13,43]                | [11,43; 17,04] | [9,77; 15,32]  | [10,31; 16,23] | [8,60; 14,44]  | [10,18; 16,75] | [8,20; 14,54]  |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2009-1         | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 336            | 312            | 289            | 272            | 251            | 233            | 218            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 328            | 306            | 284            | 264            | 243            | 225            | 212            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 20,56          | 21,00          | 21,27          | 21,42          | 21,64          | 22,04          | 22,11          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Mean                      | [20,10; 21,01] | [20,50; 21,49] | [20,75; 21,79] | [20,90; 21,94] | [21,09; 22,18] | [21,45; 22,63] | [21,51; 22,71] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Median                       | 19,88          | 20,31          | 20,65          | 20,71          | 21,18          | 21,63          | 21,64          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 299            | 277            | 256            | 237            | 220            | 206            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,44           | 0,89           | 1,16           | 1,52           | 1,92           | 2,04           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,24; 0,64]   | [0,66; 1,11]   | [0,90; 1,43]   | [1,24; 1,81]   | [1,61; 2,23]   | [1,71; 2,37]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,26           | 0,58           | 0,95           | 1,39           | 1,78           | 1,90           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 10             | 8              | 5              | 1              | 2              | 2              | 2              |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 3,05           | 2,61           | 1,76           | 0,38           | 0,82           | 0,89           | 0,94           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [1,19; 4,91]   | [0,82; 4,41]   | [0,23; 3,29]   | [0,00; 1,12]   | [0,00; 1,96]   | [0,00; 2,12]   | [0,00; 2,25]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 234            | 206            | 200            | 179            | 160            | 142            | 144            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 71,34          | 67,32          | 70,42          | 67,80          | 65,84          | 63,11          | 67,92          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [66,44; 76,24] | [62,06; 72,58] | [65,11; 75,74] | [62,16; 73,45] | [59,87; 71,82] | [56,79; 69,43] | [61,63; 74,22] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 54             | 55             | 47             | 52             | 53             | 48             | 42             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 16,46          | 17,97          | 16,55          | 19,70          | 21,81          | 21,33          | 19,81          |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [12,44; 20,48] | [13,66; 22,28] | [12,22; 20,88] | [14,89; 24,50] | [16,61; 27,01] | [15,97; 26,70] | [14,43; 25,19] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 30             | 37             | 32             | 32             | 28             | 33             | 24             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                |  | Anteil in %                  | 9,15           | 12,09          | 11,27          | 12,12          | 11,52          | 14,67          | 11,32          |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI Anteil in % |  | [6,02; 12,27]                | [8,43; 15,75]  | [7,58; 14,95]  | [8,18; 16,07]  | [7,50; 15,55]  | [10,03; 19,30] | [7,05; 15,60]  |                |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ                          | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |  |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2009-2                      | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 328            | 301            | 273            | 246            | 224            | 199            | 183            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 325            | 291            | 266            | 241            | 217            | 191            | 175            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 20,86          | 21,61          | 21,56          | 21,64          | 22,70          | 21,95          | 22,01          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | CI Mean                      | [20,36; 21,36] | [20,85; 22,37] | [21,00; 22,12] | [21,07; 22,21] | [21,25; 24,16] | [21,34; 22,57] | [21,36; 22,65] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Median                       | 20,13          | 20,32          | 20,69          | 20,96          | 21,67          | 21,72          | 21,97          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 288            | 263            | 239            | 214            | 188            | 172            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,82           | 0,91           | 1,01           | 2,23           | 1,55           | 1,95           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,28; 1,36]   | [0,71; 1,12]   | [0,73; 1,29]   | [0,79; 3,67]   | [1,19; 1,91]   | [1,57; 2,33]   |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,31           | 0,84           | 0,89           | 1,31           | 1,59           | 1,97           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 10             | 2              | 3              | 5              | 4              | 3              | 3              |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 3,08           | 0,69           | 1,13           | 2,07           | 1,84           | 1,57           | 1,71           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [1,20; 4,96]   | [0,00; 1,64]   | [0,00; 2,40]   | [0,27; 3,88]   | [0,05; 3,64]   | [0,00; 3,34]   | [0,00; 3,64]   |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 226            | 203            | 177            | 159            | 144            | 124            | 116            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 69,54          | 69,76          | 66,54          | 65,98          | 66,36          | 64,92          | 66,29          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [64,53; 74,55] | [64,47; 75,05] | [60,86; 72,22] | [59,98; 71,97] | [60,06; 72,66] | [58,14; 71,71] | [59,26; 73,31] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 47             | 38             | 49             | 42             | 44             | 41             | 36             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 14,46          | 13,06          | 18,42          | 17,43          | 20,28          | 21,47          | 20,57          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [10,63; 18,29] | [9,18; 16,94]  | [13,75; 23,09] | [12,63; 22,23] | [14,91; 25,64] | [15,63; 27,30] | [14,57; 26,58] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 42             | 48             | 37             | 35             | 25             | 23             | 20             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 12,92          | 16,49          | 13,91          | 14,52          | 11,52          | 12,04          | 11,43          |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [9,27; 16,58]  | [12,22; 20,77] | [9,74; 18,08]  | [10,07; 18,98] | [7,26; 15,78]  | [7,41; 16,67]  | [6,70; 16,16]  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 606            | 544            | 477            | 437            | 387            | 352            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 598            | 527            | 456            | 423            | 374            | 335            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 21,22          | 22,32          | 21,82          | 22,12          | 22,23          | 22,85          |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | CI Mean                      | [20,88; 21,55] | [21,44; 23,21] | [21,42; 22,22] | [21,69; 22,54] | [21,78; 22,69] | [21,88; 23,82] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Median                       | 20,98          | 21,22          | 21,21          | 21,47          | 21,51          | 22,01          |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 523            | 451            | 418            | 370            | 332            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Mittlere Differenz zur ED   |  |                              | 1,19           | 0,93           | 1,36           | 1,65           | 2,32           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| CI mittlere Differenz       |  |                              | [-0,08; 2,45]  | [0,71; 1,15]   | [1,10; 1,61]   | [1,34; 1,96]   | [1,94; 2,69]   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Median mittlere Differenz   |  |                              | 0,39           | 0,77           | 1,20           | 1,44           | 1,63           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 1: untergewichtig | Anzahl   | 11                           | 11             | 6              | 8              | 4              | 10             |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Anteil in %                                    | 1,84                         | 2,09           | 1,32           | 1,89           | 1,07           | 2,99           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [0,76; 2,92]                 | [0,87; 3,31]   | [0,27; 2,36]   | [0,59; 3,19]   | [0,03; 2,11]   | [1,16; 4,81]   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 2: normal         | Anzahl   | 409                          | 357            | 295            | 267            | 235            | 215            |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Anteil in %                                    | 68,39                        | 67,74          | 64,69          | 63,12          | 62,83          | 64,18          |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [64,67; 72,12]               | [63,75; 71,74] | [60,30; 69,08] | [58,52; 67,72] | [57,93; 67,74] | [59,04; 69,32] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 3: mäßig adipös   | Anzahl   | 108                          | 102            | 99             | 101            | 87             | 71             |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Anteil in %                                    | 18,06                        | 19,35          | 21,71          | 23,88          | 23,26          | 21,19          |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [14,97; 21,15]               | [15,98; 22,73] | [17,92; 25,50] | [19,81; 27,94] | [18,97; 27,55] | [16,81; 25,58] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Kategorie 4: (stark) adipös | Anzahl   | 70                           | 57             | 56             | 47             | 48             | 39             |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | Anteil in %                                    | 11,71                        | 10,82          | 12,28          | 11,11          | 12,83          | 11,64          |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [9,13; 14,28]                | [8,16; 13,47]  | [9,26; 15,30]  | [8,11; 14,11]  | [9,44; 16,23]  | [8,20; 15,08]  |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |  |

| EZ                                    | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-<br>halbjahr                       | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                       | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                                       | 293               | 264               | 234               | 211               | 181               | 162               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       | auswertbar                                     | Anzahl                                       | 288               | 258               | 225               | 205               | 172               | 153               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean   | 21,28             | 22,53             | 21,96             | 22,36             | 22,69             | 22,40             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Mean                                      | [20,82;<br>21,74] | [21,24;<br>23,83] | [21,39;<br>22,53] | [21,75;<br>22,97] | [21,99;<br>23,38] | [21,69;<br>23,11] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Median                                       | 21,10             | 21,91             | 21,82             | 22,27             | 22,33             | 22,38             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                   | 255               | 221               | 201               | 169               | 150               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                   | 1,24              | 0,90              | 1,37              | 1,72              | 1,72              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI mittlere Differenz                        |                   | [-0,02;<br>2,51]  | [0,68; 1,12]      | [1,11; 1,62]      | [1,41; 2,04]      | [1,34; 2,10]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Median mittlere Differenz                    |                   | 0,37              | 0,65              | 1,04              | 1,50              | 1,56              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                                       | 6                 | 6                 | 3                 | 4                 | 1                 | 6                 |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 2,08              | 2,33              | 1,33              | 1,95              | 0,58              | 3,92              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [0,43; 3,74]      | [0,48; 4,17]      | [0,00; 2,84]      | [0,05; 3,85]      | [0,00; 1,72]      | [0,84; 7,01]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                                       | 197               | 166               | 144               | 123               | 97                | 96                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 68,40             | 64,34             | 64,00             | 60,00             | 56,40             | 62,75             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [63,02;<br>73,78] | [58,48;<br>70,20] | [57,71;<br>70,29] | [53,28;<br>66,72] | [48,96;<br>63,83] | [55,06;<br>70,43] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                                       | 55                | 59                | 52                | 53                | 48                | 31                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 19,10             | 22,87             | 23,11             | 25,85             | 27,91             | 20,26             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [14,55;<br>23,64] | [17,73;<br>28,00] | [17,59;<br>28,63] | [19,85;<br>31,86] | [21,18;<br>34,63] | [13,87;<br>26,65] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                                       | 30                | 27                | 26                | 25                | 26                | 20                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 10,42             | 10,47             | 11,56             | 12,20             | 15,12             | 13,07             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [6,88;<br>13,95]  | [6,72;<br>14,21]  | [7,37;<br>15,74]  | [7,70;<br>16,69]  | [9,75;<br>20,49]  | [7,71;<br>18,43]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b> | Anzahl            | 313               | 280               | 243               | 226               | 206               | 190         |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | auswertbar                                   | Anzahl            | 310               | 269               | 231               | 218               | 202               | 182         |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI |  | Mean   | 21,16             | 22,13             | 21,68             | 21,89             | 21,85             | 23,22             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Mean                                      | [20,66;<br>21,65] | [20,91;<br>23,34] | [21,11;<br>22,25] | [21,30;<br>22,48] | [21,26;<br>22,44] | [21,54;<br>24,90] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Median                                       | 20,61             | 20,66             | 20,66             | 20,88             | 20,91             | 21,72             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Fallbasis mittlere Differenz                 |                   | 268               | 230               | 217               | 201               | 182               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Mittlere Differenz zur ED                    |                   | 1,13              | 0,97              | 1,34              | 1,59              | 2,81              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI mittlere Differenz                        |                   | [0,00; 2,27]      | [0,74; 1,19]      | [1,08; 1,61]      | [1,28; 1,89]      | [1,16; 4,46]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Median mittlere Differenz                    |                   | 0,40              | 0,85              | 1,33              | 1,38              | 1,73              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 1:<br>untergewichtig        |  | Anzahl                                       | 5                 | 5                 | 3                 | 4                 | 3                 | 4                 |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 1,61              | 1,86              | 1,30              | 1,83              | 1,49              | 2,20              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [0,21; 3,02]      | [0,24; 3,48]      | [0,00; 2,76]      | [0,05; 3,62]      | [0,00; 3,16]      | [0,06; 4,33]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 2:<br>normal                |  | Anzahl                                       | 212               | 191               | 151               | 144               | 138               | 119               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 68,39             | 71,00             | 65,37             | 66,06             | 68,32             | 65,38             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [63,20;<br>73,57] | [65,57;<br>76,44] | [59,22;<br>71,52] | [59,75;<br>72,36] | [61,88;<br>74,75] | [58,45;<br>72,32] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 3:<br>mäßig adipös          |  | Anzahl                                       | 53                | 43                | 47                | 48                | 39                | 40                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 17,10             | 15,99             | 20,35             | 22,02             | 19,31             | 21,98             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [12,90;<br>21,29] | [11,60;<br>20,37] | [15,14;<br>25,55] | [16,51;<br>27,53] | [13,85;<br>24,76] | [15,95;<br>28,01] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 4:<br>(stark) adipös        |  | Anzahl                                       | 40                | 30                | 30                | 22                | 22                | 19                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | Anteil in %                                  | 12,90             | 11,15             | 12,99             | 10,09             | 10,89             | 10,44             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |  | CI Anteil in %                               | [9,17;<br>16,64]  | [7,38;<br>14,92]  | [8,64;<br>17,33]  | [6,08;<br>14,10]  | [6,58;<br>15,20]  | [5,98;<br>14,89]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2010-1                         | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 540            | 470            | 423            | 382            | 349            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 538            | 450            | 414            | 371            | 339            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean                         | 20,74          | 21,00          | 21,31          | 21,50          | 21,84          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Mean                      | [20,36; 21,11] | [20,58; 21,41] | [20,87; 21,76] | [20,98; 22,02] | [21,26; 22,42] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Median                       | 20,09          | 20,56          | 20,57          | 20,96          | 21,14          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 449            | 412            | 370            | 337            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,51           | 0,90           | 1,28           | 1,70           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,32; 0,71]   | [0,68; 1,11]   | [0,79; 1,77]   | [1,17; 2,23]   |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,40           | 0,74           | 0,98           | 1,28           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                       | 16             | 10             | 7              | 7              | 6              |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                  | 2,97           | 2,22           | 1,69           | 1,89           | 1,77           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %               | [1,54; 4,41]   | [0,86; 3,59]   | [0,45; 2,93]   | [0,50; 3,27]   | [0,36; 3,18]   |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                       | 390            | 304            | 284            | 245            | 227            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                  | 72,49          | 67,56          | 68,60          | 66,04          | 66,96          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %               | [68,71; 76,27] | [63,23; 71,89] | [64,12; 73,08] | [61,21; 70,86] | [61,95; 71,98] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                       | 66             | 73             | 68             | 75             | 66             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                  | 12,27          | 16,22          | 16,43          | 20,22          | 19,47          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %               | [9,49; 15,04]  | [12,81; 19,63] | [12,85; 20,00] | [16,12; 24,31] | [15,25; 23,69] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                       | 66             | 63             | 55             | 44             | 40             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Anteil in %                  | 12,27          | 14,00          | 13,29          | 11,86          | 11,80          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Anteil in %               | [9,49; 15,04]  | [10,79; 17,21] | [10,01; 16,56] | [8,57; 15,15]  | [8,36; 15,24]  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 281            | 242            | 221            | 204            | 193            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 280            | 234            | 215            | 197            | 187            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean                         | 20,35          | 20,69          | 20,94          | 21,29          | 21,67          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | CI Mean                      | [19,87; 20,83] | [20,16; 21,21] | [20,37; 21,52] | [20,56; 22,02] | [20,91; 22,43] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Median                       | 19,83          | 20,31          | 20,28          | 20,57          | 20,96          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 233            | 214            | 196            | 186            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Mittlere Differenz zur ED      |  |                              | 0,47           | 0,77           | 1,34           | 1,70           |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI mittlere Differenz          |  |                              | [0,28; 0,66]   | [0,55; 0,98]   | [0,85; 1,83]   | [1,17; 2,23]   |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Median mittlere Differenz      |  |                              | 0,32           | 0,53           | 0,84           | 1,22           |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 1:<br>untergewichtig | Anzahl   | 10                           | 4              | 5              | 3              | 3              |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Anteil in %                                    | 3,57                         | 1,71           | 2,33           | 1,52           | 1,60           |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | CI Anteil in %                                 | [1,39; 5,75]                 | [0,05; 3,37]   | [0,31; 4,34]   | [0,00; 3,24]   | [0,00; 3,41]   |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 2:<br>normal         | Anzahl   | 213                          | 173            | 158            | 137            | 130            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Anteil in %                                    | 76,07                        | 73,93          | 73,49          | 69,54          | 69,52          |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | CI Anteil in %                                 | [71,07; 81,08]               | [68,29; 79,57] | [67,57; 79,40] | [63,10; 75,99] | [62,90; 76,13] |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 3:<br>mäßig adipös   | Anzahl   | 30                           | 29             | 28             | 35             | 29             |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Anteil in %                                    | 10,71                        | 12,39          | 13,02          | 17,77          | 15,51          |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | CI Anteil in %                                 | [7,08; 14,34]                | [8,16; 16,62]  | [8,51; 17,53]  | [12,42; 23,12] | [10,31; 20,71] |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 4:<br>(stark) adipös | Anzahl   | 27                           | 28             | 24             | 22             | 25             |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | Anteil in %                                    | 9,64                         | 11,97          | 11,16          | 11,17          | 13,37          |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                | CI Anteil in %                                 | [6,18; 13,11]                | [7,80; 16,13]  | [6,94; 15,38]  | [6,76; 15,58]  | [8,48; 18,26]  |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ                          | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-halbjahr           | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2010-2                      | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 259            | 228            | 202            | 178            | 156            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 258            | 216            | 199            | 174            | 152            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 21,15          | 21,33          | 21,72          | 21,73          | 22,05          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | CI Mean                      | [20,57; 21,73] | [20,68; 21,97] | [21,02; 22,41] | [20,99; 22,47] | [21,16; 22,94] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Median                       | 20,43          | 20,91          | 21,08          | 21,35          | 21,42          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 216            | 198            | 174            | 151            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,56           | 1,04           | 1,21           | 1,70           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,35; 0,77]   | [0,79; 1,28]   | [0,89; 1,53]   | [1,19; 2,20]   |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,46           | 0,90           | 1,09           | 1,42           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 6              | 6              | 2              | 4              | 3              |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 2,33           | 2,78           | 1,01           | 2,30           | 1,97           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [0,48; 4,17]   | [0,58; 4,97]   | [0,00; 2,39]   | [0,07; 4,53]   | [0,00; 4,19]   |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 177            | 131            | 126            | 108            | 97             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 68,60          | 60,65          | 63,32          | 62,07          | 63,82          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [62,93; 74,28] | [54,12; 67,18] | [56,60; 70,03] | [54,84; 69,30] | [56,15; 71,48] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 36             | 44             | 40             | 40             | 37             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 13,95          | 20,37          | 20,10          | 22,99          | 24,34          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [9,72; 18,19]  | [14,99; 25,75] | [14,52; 25,68] | [16,72; 29,26] | [17,50; 31,19] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 39             | 35             | 31             | 22             | 15             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 15,12          | 16,20          | 15,58          | 12,64          | 9,87           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [10,74; 19,50] | [11,28; 21,13] | [10,53; 20,63] | [7,69; 17,60]  | [5,11; 14,63]  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 641            | 574            | 498            | 439            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 637            | 560            | 476            | 425            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Auswertungs-ergebnisse zum BMI                 | Mean                         | 21,05          | 21,23          | 21,78          | 21,44          |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | CI Mean                      | [20,70; 21,39] | [20,85; 21,61] | [21,05; 22,52] | [21,00; 21,88] |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Median                       | 20,58          | 20,70          | 20,76          | 20,80          |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 558            | 475            | 424            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Mittlere Differenz zur ED   |  |                              | 0,33           | 1,13           | 0,99           |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI mittlere Differenz       |  |                              | [0,15; 0,51]   | [0,90; 1,36]   | [0,74; 1,24]   |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Median mittlere Differenz   |  |                              | 0,25           | 0,71           | 0,79           |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 1: untergewichtig | Anzahl   | 24                           | 17             | 11             | 9              |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Anteil in %                                    | 3,77                         | 3,04           | 2,31           | 2,12           |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [2,29; 5,25]                 | [1,61; 4,46]   | [0,96; 3,66]   | [0,75; 3,49]   |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 2: normal         | Anzahl   | 427                          | 384            | 316            | 296            |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Anteil in %                                    | 67,03                        | 68,57          | 66,39          | 69,65          |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [63,38; 70,69]               | [64,72; 72,42] | [62,14; 70,63] | [65,27; 74,02] |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 3: mäßig adipös   | Anzahl   | 114                          | 101            | 88             | 74             |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Anteil in %                                    | 17,90                        | 18,04          | 18,49          | 17,41          |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [14,92; 20,88]               | [14,85; 21,22] | [15,00; 21,98] | [13,80; 21,02] |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Kategorie 4: (stark) adipös | Anzahl   | 72                           | 58             | 61             | 46             |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | Anteil in %                                    | 11,30                        | 10,36          | 12,82          | 10,82          |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [8,84; 13,76]                | [7,83; 12,88]  | [9,81; 15,82]  | [7,87; 13,78]  |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|    | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 341            | 305            | 262            | 233            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | auswertbar                                     | Anzahl                       | 339            | 296            | 251            | 224            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 20,98          | 21,16          | 21,32          | 21,27          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Mean                      | [20,54; 21,42] | [20,66; 21,67] | [20,73; 21,90] | [20,65; 21,89] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Median                       | 20,60          | 20,67          | 20,57          | 20,52          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 295            | 251            | 224            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,39           | 0,78           | 0,95           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,21; 0,57]   | [0,55; 1,01]   | [0,69; 1,20]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,30           | 0,65           | 0,77           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 14             | 7              | 8              | 6              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 4,13           | 2,36           | 3,19           | 2,68           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [2,01; 6,25]   | [0,63; 4,10]   | [1,01; 5,36]   | [0,56; 4,80]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 235            | 211            | 174            | 167            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 69,32          | 71,28          | 69,32          | 74,55          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [64,41; 74,24] | [66,12; 76,45] | [63,61; 75,04] | [68,84; 80,27] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 58             | 51             | 44             | 34             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 17,11          | 17,23          | 17,53          | 15,18          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [13,09; 21,12] | [12,92; 21,54] | [12,82; 22,24] | [10,47; 19,89] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 32             | 27             | 25             | 17             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 9,44           | 9,12           | 9,96           | 7,59           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [6,32; 12,56]  | [5,84; 12,41]  | [6,25; 13,67]  | [4,11; 11,07]  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 300            | 269            | 236            | 206            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | auswertbar                                     | Anzahl                       | 298            | 264            | 225            | 201            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 21,12          | 21,31          | 22,30          | 21,63          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Mean                      | [20,58; 21,67] | [20,74; 21,89] | [20,90; 23,71] | [21,00; 22,26] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Median                       | 20,55          | 20,75          | 21,36          | 21,08          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 263            | 224            | 200            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,27           | 1,53           | 1,04           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,07; 0,47]   | [0,21; 2,84]   | [0,73; 1,35]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,18           | 0,79           | 0,87           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 10             | 10             | 3              | 3              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 3,36           | 3,79           | 1,33           | 1,49           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [1,31; 5,40]   | [1,48; 6,10]   | [0,00; 2,84]   | [0,00; 3,17]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 192            | 173            | 142            | 129            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 64,43          | 65,53          | 63,11          | 64,18          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [58,98; 69,87] | [59,79; 71,27] | [56,79; 69,43] | [57,53; 70,82] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 56             | 50             | 44             | 40             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 18,79          | 18,94          | 19,56          | 19,90          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [14,35; 23,23] | [14,20; 23,67] | [14,36; 24,75] | [14,37; 25,43] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 40             | 31             | 36             | 29             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 13,42          | 11,74          | 16,00          | 14,43          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [9,55; 17,30]  | [7,85; 15,63]  | [11,20; 20,80] | [9,56; 19,30]  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



| EZ     | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2011-1 | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 557               | 506               | 459               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | auswertbar                                     | Anzahl                       | 554               | 491               | 448               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean                         | 20,68             | 21,31             | 21,44             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Mean                      | [20,29;<br>21,06] | [20,87;<br>21,74] | [21,01;<br>21,87] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median                       | 19,96             | 20,55             | 20,86             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |                   | 489               | 445               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |                   | 0,62              | 0,84              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |                   | [0,25; 0,99]      | [0,56; 1,11]      |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |                   | 0,33              | 0,73              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                       | 19                | 9                 | 9                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 3,43              | 1,83              | 2,01              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [1,91; 4,95]      | [0,65; 3,02]      | [0,71; 3,31]      |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                       | 399               | 331               | 322               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 72,02             | 67,41             | 71,88             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [68,28;<br>75,76] | [63,26;<br>71,56] | [67,71;<br>76,04] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                       | 74                | 79                | 60                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 13,36             | 16,09             | 13,39             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [10,52;<br>16,19] | [12,84;<br>19,34] | [10,24;<br>16,55] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                       | 62                | 72                | 57                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 11,19             | 14,66             | 12,72             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [8,56;<br>13,82]  | [11,53;<br>17,80] | [9,63;<br>15,81]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 2011-1 | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 286               | 256               | 236               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | auswertbar                                     | Anzahl                       | 284               | 248               | 229               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean                         | 20,53             | 21,21             | 21,36             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Mean                      | [20,01;<br>21,06] | [20,57;<br>21,84] | [20,79;<br>21,93] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median                       | 19,77             | 20,53             | 20,93             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |                   | 246               | 227               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |                   | 0,70              | 0,90              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |                   | [0,33; 1,08]      | [0,62; 1,18]      |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |                   | 0,33              | 0,84              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                       | 10                | 4                 | 5                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 3,52              | 1,61              | 2,18              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [1,37; 5,67]      | [0,04; 3,18]      | [0,29; 4,08]      |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                       | 214               | 176               | 168               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 75,35             | 70,97             | 73,36             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [70,33;<br>80,37] | [65,31;<br>76,63] | [67,62;<br>79,10] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                       | 30                | 35                | 28                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 10,56             | 14,11             | 12,23             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [6,98;<br>14,14]  | [9,77;<br>18,45]  | [7,97;<br>16,48]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                       | 30                | 33                | 28                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %                  | 10,56             | 13,31             | 12,23             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %               | [6,98;<br>14,14]  | [9,07;<br>17,54]  | [7,97;<br>16,48]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ                          | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-2                      | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 271            | 250            | 223            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 270            | 243            | 219            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 20,83          | 21,41          | 21,51          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | CI Mean                      | [20,26; 21,40] | [20,80; 22,01] | [20,87; 22,16] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Median                       | 20,18          | 20,61          | 20,78          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 243            | 218            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,54           | 0,77           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,27; 0,80]   | [0,44; 1,10]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,35           | 0,61           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 9              | 5              | 4              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 3,33           | 2,06           | 1,83           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [1,19; 5,48]   | [0,27; 3,85]   | [0,05; 3,60]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 185            | 155            | 154            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 68,52          | 63,79          | 70,32          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [62,97; 74,07] | [57,73; 69,84] | [64,26; 76,38] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 44             | 44             | 32             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 16,30          | 18,11          | 14,61          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [11,88; 20,71] | [13,26; 22,96] | [9,92; 19,30]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 32             | 39             | 29             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Anteil in %                  | 11,85          | 16,05          | 13,24          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | CI Anteil in %               | [7,99; 15,71]  | [11,42; 20,67] | [8,74; 17,74]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 538            | 473            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | auswertbar                                     | Anzahl                       | 537            | 458            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 21,62          | 21,65          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | CI Mean                      | [21,09; 22,14] | [21,21; 22,10] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Median                       | 20,92          | 20,96          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 457            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Mittlere Differenz zur ED   |  |                              | 0,23           |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI mittlere Differenz       |  |                              | [-0,04; 0,50]  |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median mittlere Differenz   |  |                              | 0,10           |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 1: untergewichtig | Anzahl   | 14                           | 16             |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Anteil in %                                    | 2,61                         | 3,49           |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [1,26; 3,96]                 | [1,81; 5,18]   |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 2: normal         | Anzahl   | 358                          | 291            |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Anteil in %                                    | 66,67                        | 63,54          |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [62,68; 70,66]               | [59,12; 67,95] |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 3: mäßig adipös   | Anzahl   | 88                           | 94             |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Anteil in %                                    | 16,39                        | 20,52          |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [13,25; 19,52]               | [16,82; 24,23] |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 4: (stark) adipös | Anzahl   | 77                           | 57             |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | Anteil in %                                    | 14,34                        | 12,45          |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                             | CI Anteil in %                                 | [11,37; 17,31]               | [9,42; 15,47]  |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 291            | 260            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 290            | 252            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 21,36          | 21,85          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Mean                      | [20,86; 21,87] | [21,26; 22,44] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Median                       | 20,88          | 21,06          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 251            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | 0,54           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI mittlere Differenz        |                | [0,28; 0,81]   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,13           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 8              | 9              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 2,76           | 3,57           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [0,87; 4,65]   | [1,28; 5,87]   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 206            | 164            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 71,03          | 65,08          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [65,80; 76,26] | [59,18; 70,98] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 44             | 44             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 15,17          | 17,46          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [11,04; 19,31] | [12,76; 22,16] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 32             | 35             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 11,03          | 13,89          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in % |  | [7,42; 14,65]                | [9,61; 18,17]  |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 247            | 213            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 247            | 206            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 21,91          | 21,42          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Mean                      | [20,94; 22,89] | [20,75; 22,08] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Median                       | 20,94          | 20,74          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 206            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,16          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI mittlere Differenz        |                | [-1,19; 0,88]  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Median mittlere Differenz    |                | 0,04           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 6              | 7              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 2,43           | 3,40           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [0,51; 4,35]   | [0,92; 5,88]   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 152            | 127            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 61,54          | 61,65          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [55,46; 67,62] | [54,99; 68,31] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 44             | 50             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 17,81          | 24,27          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | CI Anteil in %               | [13,03; 22,60] | [18,40; 30,14] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 45             | 22             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |  | Anteil in %                  | 18,22          | 10,68          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in % |  | [13,39; 23,04]               | [6,45; 14,91]  |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ             | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|--|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2012-1         | <b>Patienten &lt; 18 insgesamt</b>             | Anzahl                       | 586               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 583               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean                         | 21,18             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Mean                      | [20,59;<br>21,77] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Median                       | 20,24             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Mittlere Differenz zur ED    |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI mittlere Differenz        |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Median mittlere Differenz    |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                       | 27                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 4,63              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Anteil in %               | [2,92; 6,34]      |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                       | 387               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 66,38             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Anteil in %               | [62,54;<br>70,22] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                       | 83                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 14,24             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Anteil in %               | [11,40;<br>17,08] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                       | 86                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 14,75             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |  | [11,87;<br>17,63]            |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 318               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar                                     | Anzahl                       | 316               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Auswertungs-<br>ergebnisse zum<br>BMI          | Mean                         | 20,66             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Mean                      | [20,13;<br>21,19] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Median                       | 20,01             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Fallbasis mittlere Differenz |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Mittlere Differenz zur ED    |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI mittlere Differenz        |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Median mittlere Differenz    |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 1:<br>untergewichtig                 | Anzahl                       | 18                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 5,70              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Anteil in %               | [3,14; 8,26]      |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 2:<br>normal                         | Anzahl                       | 212               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 67,09             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Anteil in %               | [61,90;<br>72,28] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 3:<br>mäßig adipös                   | Anzahl                       | 44                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 13,92             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | CI Anteil in %               | [10,10;<br>17,75] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Kategorie 4:<br>(stark) adipös                 | Anzahl                       | 42                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |  | Anteil in %                  | 13,29             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |  | [9,54;<br>17,04]             |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ | Patienten < 18 zur ED und ihr Body-Mass-Index* | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----|--|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|    | <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | Anzahl                       | 268            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | auswertbar                                     | Anzahl                       | 267            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Auswertungsergebnisse zum BMI                  | Mean                         | 21,79          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Mean                      | [20,67; 22,92] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Median                       | 20,37          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Fallbasis mittlere Differenz |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Mittlere Differenz zur ED    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI mittlere Differenz        |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 1: untergewichtig                    | Anzahl                       | 9              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 3,37           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [1,20; 5,54]   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 2: normal                            | Anzahl                       | 175            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 65,54          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [59,83; 71,25] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 3: mäßig adipös                      | Anzahl                       | 39             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 14,61          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [10,36; 18,85] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 4: (stark) adipös                    | Anzahl                       | 44             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %                  | 16,48          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %               | [12,02; 20,94] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In Tabelle 3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder ≥12 Jahre insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jewei-

ligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitritts- und im Berichtshalbjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

**Tabelle 3.1.2 Raucher ≥ 12 Jahre in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation**

| EZ   | Raucher ≥ 12 Jahre in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr  | 13. Halb-jahr  | 14. Halb-jahr  | 15. Halb-jahr  |                |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-1                                     | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 97             | 83             | 67             | 58             | 53             | 50             | 48             | 44             | 42             | 42             | 41             | 38             | 35             | 32             | 29             |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 80             | 66             | 56             | 53             | 50             | 48             | 44             | 42             | 41             | 40             | 37             | 33             | 30             | 29             |
|  | Raucher   | Anzahl             |                | 67             | 50             | 40             | 36             | 35             | 31             | 27             | 25             | 25             | 24             | 23             | 20             | 19             | 18             |
|  |   | Anteil in %        |                | 83,75          | 75,76          | 71,43          | 67,92          | 70,00          | 64,58          | 61,36          | 59,52          | 60,98          | 60,00          | 62,16          | 60,61          | 63,33          | 62,07          |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [75,61; 91,89] | [65,34; 86,18] | [59,49; 83,37] | [55,24; 80,61] | [57,17; 82,83] | [50,91; 78,26] | [46,81; 75,92] | [44,50; 74,55] | [45,86; 76,09] | [44,62; 75,38] | [46,32; 78,00] | [43,68; 77,54] | [45,79; 80,87] | [44,10; 80,04] |
|  | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>334</i>     | <i>312</i>     | <i>271</i>     | <i>239</i>     | <i>217</i>     | <i>205</i>     | <i>193</i>     | <i>185</i>     | <i>175</i>     | <i>171</i>     | <i>166</i>     | <i>158</i>     | <i>151</i>     | <i>146</i>     | <i>140</i>     |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 59             | 55             | 50             | 42             | 38             | 35             | 31             | 30             | 27             | 27             | 27             | 27             | 26             | 26             | 24             |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 55             | 45             | 41             | 37             | 34             | 31             | 30             | 27             | 27             | 26             | 27             | 26             | 24             | 24             |
|  | Raucher   | Anzahl             |                | 47             | 37             | 27             | 23             | 22             | 22             | 14             | 12             | 11             | 10             | 10             | 10             | 9              | 9              |
|  |   | Anteil in %        |                | 85,45          | 82,22          | 65,85          | 62,16          | 64,71          | 70,97          | 46,67          | 44,44          | 40,74          | 38,46          | 37,04          | 38,46          | 37,50          | 37,50          |
| CI Anteil in %                             |   |                    | [76,05; 94,86] | [70,93; 93,52] | [51,16; 80,55] | [46,32; 78,00] | [48,40; 81,01] | [54,72; 87,21] | [28,51; 64,82] | [25,34; 63,54] | [21,85; 59,63] | [19,39; 57,53] | [18,47; 55,60] | [19,39; 57,53] | [17,71; 57,29] | [17,71; 57,29] |                |
| <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>290</i>         | <i>279</i>     | <i>244</i>     | <i>213</i>     | <i>194</i>     | <i>182</i>     | <i>173</i>     | <i>166</i>     | <i>159</i>     | <i>151</i>     | <i>145</i>     | <i>141</i>     | <i>139</i>     | <i>136</i>     | <i>129</i>     |                |
| 2005-2                                     | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 709            | 621            | 531            | 481            | 445            | 419            | 389            | 375            | 355            | 343            | 321            | 311            | 297            | 282            |                |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 606            | 525            | 473            | 436            | 403            | 374            | 362            | 348            | 334            | 316            | 302            | 290            | 275            |                |
|  | Raucher   | Anzahl             |                | 548            | 433            | 368            | 329            | 288            | 243            | 230            | 218            | 214            | 205            | 196            | 186            | 174            |                |
|  |   | Anteil in %        |                | 90,43          | 82,48          | 77,80          | 75,46          | 71,46          | 64,97          | 63,54          | 62,64          | 64,07          | 64,87          | 64,90          | 64,14          | 63,27          |                |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [88,08; 92,77] | [79,22; 85,73] | [74,05; 81,55] | [71,41; 79,50] | [67,05; 75,88] | [60,13; 69,81] | [58,57; 68,50] | [57,55; 67,73] | [58,92; 69,23] | [59,60; 70,15] | [59,51; 70,29] | [58,61; 69,67] | [57,56; 68,98] |                |
|  | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2258</i>    | <i>2066</i>    | <i>1829</i>    | <i>1665</i>    | <i>1557</i>    | <i>1485</i>    | <i>1408</i>    | <i>1347</i>    | <i>1290</i>    | <i>1237</i>    | <i>1168</i>    | <i>1136</i>    | <i>1086</i>    | <i>1034</i>    |                |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 353            | 324            | 283            | 256            | 237            | 222            | 210            | 205            | 193            | 182            | 175            | 171            | 166            | 156            |                |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 310            | 274            | 245            | 231            | 214            | 201            | 191            | 185            | 179            | 175            | 166            | 161            | 144            |                |
|  | Raucher   | Anzahl             |                | 264            | 218            | 179            | 164            | 151            | 121            | 117            | 114            | 110            | 107            | 101            | 97             | 88             |                |
|  |   | Anteil in %        |                | 85,16          | 79,56          | 73,06          | 71,00          | 70,56          | 60,20          | 61,26          | 61,62          | 61,45          | 61,14          | 60,84          | 60,25          | 61,11          |                |
| CI Anteil in %                             |   |                    | [81,20; 89,12] | [74,78; 84,35] | [67,49; 78,63] | [65,13; 76,86] | [64,44; 76,68] | [53,42; 66,98] | [54,33; 68,18] | [54,59; 68,65] | [54,30; 68,60] | [53,90; 68,39] | [53,40; 68,29] | [52,67; 67,83] | [53,12; 69,10] |                |                |
| <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1735</i>        | <i>1589</i>    | <i>1408</i>    | <i>1291</i>    | <i>1218</i>    | <i>1153</i>    | <i>1100</i>    | <i>1060</i>    | <i>1012</i>    | <i>953</i>     | <i>923</i>     | <i>891</i>     | <i>859</i>     | <i>828</i>     |                |                |
| 2006-1                                     | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 717            | 627            | 520            | 472            | 431            | 399            | 375            | 349            | 322            | 305            | 285            | 266            | 251            |                |                |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 609            | 507            | 455            | 420            | 381            | 361            | 342            | 315            | 299            | 279            | 262            | 244            |                |                |
|  | Raucher   | Anzahl             |                | 549            | 433            | 381            | 333            | 259            | 236            | 228            | 209            | 193            | 172            | 159            | 144            |                |                |
|  |   | Anteil in %        |                | 90,15          | 85,40          | 83,74          | 79,29          | 67,98          | 65,37          | 66,67          | 66,35          | 64,55          | 61,65          | 60,69          | 59,02          |                |                |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [87,78; 92,52] | [82,33; 88,48] | [80,34; 87,13] | [75,41; 83,17] | [63,29; 72,67] | [60,46; 70,29] | [61,66; 71,67] | [61,12; 71,58] | [59,12; 69,98] | [55,93; 67,36] | [54,76; 66,61] | [52,83; 65,20] |                |                |
|  | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2212</i>    | <i>1987</i>    | <i>1726</i>    | <i>1582</i>    | <i>1456</i>    | <i>1381</i>    | <i>1306</i>    | <i>1202</i>    | <i>1128</i>    | <i>1070</i>    | <i>1020</i>    | <i>966</i>     | <i>914</i>     |                |                |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 342            | 300            | 258            | 224            | 204            | 200            | 188            | 172            | 160            | 153            | 142            | 135            | 125            |                |                |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 291            | 249            | 218            | 198            | 191            | 182            | 164            | 155            | 148            | 140            | 134            | 123            |                |                |
|  | Raucher   | Anzahl             |                | 261            | 213            | 171            | 145            | 135            | 123            | 107            | 102            | 95             | 87             | 86             | 76             |                |                |
|  |   | Anteil in %        |                | 89,69          | 85,54          | 78,44          | 73,23          | 70,68          | 67,58          | 65,24          | 65,81          | 64,19          | 62,14          | 64,18          | 61,79          |                |                |
| CI Anteil in %                             |   |                    | [86,19; 93,19] | [81,17; 89,92] | [72,97; 83,91] | [67,05; 79,42] | [64,21; 77,15] | [60,76; 74,40] | [57,93; 72,55] | [58,31; 73,30] | [56,44; 71,94] | [54,08; 70,21] | [56,03; 72,33] | [53,17; 70,41] |                |                |                |
| <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1714</i>        | <i>1534</i>    | <i>1339</i>    | <i>1214</i>    | <i>1122</i>    | <i>1069</i>    | <i>1023</i>    | <i>960</i>     | <i>902</i>     | <i>854</i>     | <i>815</i>     | <i>771</i>     | <i>723</i>     |                |                |                |

| EZ     | Raucher ≥ 12 Jahre in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--------|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2006-2 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 957         | 813            | 702            | 639            | 595            | 554            | 514            | 479            | 459            | 427            | 401            | 384            |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 793            | 668            | 619            | 559            | 533            | 497            | 470            | 451            | 418            | 398            | 373            |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 714            | 538            | 472            | 393            | 367            | 343            | 322            | 310            | 282            | 273            | 251            |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 90,04          | 80,54          | 76,25          | 70,30          | 68,86          | 69,01          | 68,51          | 68,74          | 67,46          | 68,59          | 67,29          |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [87,95; 92,12] | [77,53; 83,54] | [72,90; 79,61] | [66,51; 74,10] | [64,92; 72,79] | [64,94; 73,08] | [64,31; 72,71] | [64,45; 73,02] | [62,97; 71,96] | [64,03; 73,16] | [62,52; 72,06] |              |              |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>3003</i> | <i>2660</i>    | <i>2349</i>    | <i>2139</i>    | <i>2015</i>    | <i>1890</i>    | <i>1764</i>    | <i>1661</i>    | <i>1577</i>    | <i>1480</i>    | <i>1409</i>    | <i>1341</i>    |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 481         | 409            | 352            | 326            | 302            | 285            | 261            | 240            | 225            | 216            | 208            | 199            |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 398            | 344            | 316            | 280            | 273            | 251            | 235            | 221            | 212            | 205            | 196            |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 336            | 269            | 234            | 183            | 181            | 168            | 151            | 144            | 135            | 127            | 121            |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 84,42          | 78,20          | 74,05          | 65,36          | 66,30          | 66,93          | 64,26          | 65,16          | 63,68          | 61,95          | 61,73          |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [80,85; 87,99] | [73,83; 82,57] | [69,21; 78,89] | [59,77; 70,94] | [60,68; 71,92] | [61,10; 72,76] | [58,11; 70,40] | [58,86; 71,45] | [57,19; 70,17] | [55,29; 68,61] | [54,91; 68,56] |              |              |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2296</i> | <i>2045</i>    | <i>1836</i>    | <i>1715</i>    | <i>1603</i>    | <i>1520</i>    | <i>1400</i>    | <i>1305</i>    | <i>1240</i>    | <i>1184</i>    | <i>1127</i>    | <i>1070</i>    |              |              |
| 2007-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 1728        | 1497           | 1312           | 1194           | 1117           | 1033           | 960            | 899            | 852            | 803            | 763            |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1460           | 1275           | 1127           | 1081           | 1004           | 931            | 875            | 833            | 785            | 746            |                |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 1271           | 1006           | 807            | 771            | 708            | 655            | 619            | 578            | 541            | 500            |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 87,05          | 78,90          | 71,61          | 71,32          | 70,52          | 70,35          | 70,74          | 69,39          | 68,92          | 67,02          |                |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [85,33; 88,78] | [76,66; 81,14] | [68,97; 74,24] | [68,63; 74,02] | [67,70; 73,34] | [67,42; 73,29] | [67,73; 73,76] | [66,26; 72,52] | [65,68; 72,16] | [63,65; 70,40] |                |              |              |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>6385</i> | <i>5779</i>    | <i>5218</i>    | <i>4880</i>    | <i>4629</i>    | <i>4359</i>    | <i>4112</i>    | <i>3911</i>    | <i>3734</i>    | <i>3582</i>    | <i>3436</i>    |                |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 871         | 765            | 672            | 613            | 562            | 516            | 486            | 467            | 440            | 412            | 389            |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 739            | 649            | 580            | 545            | 500            | 477            | 456            | 429            | 403            | 385            |                |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 636            | 507            | 400            | 358            | 323            | 316            | 303            | 282            | 257            | 246            |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 86,06          | 78,12          | 68,97          | 65,69          | 64,60          | 66,25          | 66,45          | 65,73          | 63,77          | 63,90          |                |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [83,56; 88,56] | [74,94; 81,30] | [65,20; 72,73] | [61,70; 69,68] | [60,40; 68,80] | [62,00; 70,50] | [62,11; 70,79] | [61,24; 70,23] | [59,07; 68,47] | [59,09; 68,70] |                |              |              |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>5186</i> | <i>4758</i>    | <i>4356</i>    | <i>4084</i>    | <i>3833</i>    | <i>3618</i>    | <i>3437</i>    | <i>3273</i>    | <i>3124</i>    | <i>2986</i>    | <i>2863</i>    |                |              |              |
| 2007-2 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 1227        | 1024           | 890            | 787            | 692            | 624            | 588            | 549            | 516            | 486            |                |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 978            | 834            | 747            | 669            | 602            | 573            | 531            | 506            | 475            |                |                |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 859            | 627            | 560            | 504            | 456            | 428            | 384            | 365            | 338            |                |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 87,83          | 75,18          | 74,97          | 75,34          | 75,75          | 74,69          | 72,32          | 72,13          | 71,16          |                |                |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [85,78; 89,88] | [72,25; 78,11] | [71,86; 78,08] | [72,07; 78,61] | [72,32; 79,17] | [71,13; 78,26] | [68,51; 76,13] | [68,22; 76,04] | [67,08; 75,24] |                |                |              |              |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>4188</i> | <i>3679</i>    | <i>3311</i>    | <i>3004</i>    | <i>2720</i>    | <i>2504</i>    | <i>2357</i>    | <i>2215</i>    | <i>2104</i>    | <i>2002</i>    |                |                |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 617         | 544            | 476            | 426            | 365            | 338            | 310            | 294            | 273            | 256            |                |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 523            | 427            | 404            | 352            | 327            | 299            | 285            | 264            | 249            |                |                |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 456            | 307            | 282            | 247            | 221            | 206            | 198            | 186            | 172            |                |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 87,19          | 71,90          | 69,80          | 70,17          | 67,58          | 68,90          | 69,47          | 70,45          | 69,08          |                |                |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [84,32; 90,06] | [67,63; 76,17] | [65,32; 74,28] | [65,38; 74,96] | [62,50; 72,67] | [63,64; 74,15] | [64,12; 74,83] | [64,94; 75,97] | [63,32; 74,83] |                |                |              |              |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>3229</i> | <i>2883</i>    | <i>2635</i>    | <i>2394</i>    | <i>2158</i>    | <i>2001</i>    | <i>1880</i>    | <i>1782</i>    | <i>1684</i>    | <i>1610</i>    |                |                |              |              |
| 2008-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 1232        | 1058           | 907            | 757            | 666            | 604            | 559            | 511            | 483            |                |                |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 993            | 840            | 718            | 638            | 586            | 534            | 496            | 467            |                |                |                |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 869            | 683            | 593            | 500            | 457            | 409            | 380            | 349            |                |                |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 87,51          | 81,31          | 82,59          | 78,37          | 77,99          | 76,59          | 76,61          | 74,73          |                |                |                |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [85,46; 89,57] | [78,67; 83,95] | [79,81; 85,37] | [75,17; 81,57] | [74,63; 81,34] | [73,00; 80,19] | [72,88; 80,34] | [70,79; 78,68] |                |                |                |              |              |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>4056</i> | <i>3565</i>    | <i>3195</i>    | <i>2808</i>    | <i>2553</i>    | <i>2362</i>    | <i>2182</i>    | <i>2055</i>    | <i>1958</i>    |                |                |                |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 627         | 539            | 464            | 395            | 356            | 323            | 296            | 277            | 257            |                |                |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 507            | 434            | 381            | 344            | 310            | 284            | 268            | 246            |                |                |                |              |              |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 431            | 339            | 292            | 267            | 240            | 218            | 198            | 181            |                |                |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 85,01          | 78,11          | 76,64          | 77,62          | 77,42          | 76,76          | 73,88          | 73,58          |                |                |                |              |              |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [81,90; 88,12] | [74,22; 82,01] | [72,39; 80,89] | [73,21; 82,03] | [72,76; 82,08] | [71,84; 81,68] | [68,61; 79,15] | [68,06; 79,10] |                |                |                |              |              |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>3041</i> | <i>2734</i>    | <i>2449</i>    | <i>2197</i>    | <i>2005</i>    | <i>1859</i>    | <i>1725</i>    | <i>1632</i>    | <i>1549</i>    |                |                |                |              |              |

| EZ     | Raucher ≥ 12 Jahre in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|--------|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2008-2 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 863         | 719            | 579            | 502            | 440            | 401            | 369            | 346            |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 682            | 548            | 471            | 420            | 379            | 351            | 328            |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 643            | 506            | 420            | 370            | 328            | 303            | 277            |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 94,28          | 92,34          | 89,17          | 88,10          | 86,54          | 86,32          | 84,45          |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [92,54; 96,03] | [90,11; 94,57] | [86,36; 91,98] | [84,99; 91,20] | [83,10; 89,98] | [82,73; 89,92] | [80,52; 88,38] |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2772</i> | <i>2385</i>    | <i>2049</i>    | <i>1806</i>    | <i>1647</i>    | <i>1517</i>    | <i>1418</i>    | <i>1327</i>    |               |               |               |               |               |               |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 418         | 346            | 288            | 240            | 206            | 184            | 164            | 154            |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 327            | 271            | 222            | 197            | 174            | 160            | 145            |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 314            | 249            | 201            | 174            | 152            | 142            | 128            |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 96,02          | 91,88          | 90,54          | 88,32          | 87,36          | 88,75          | 88,28          |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [93,90; 98,15] | [88,62; 95,14] | [86,68; 94,40] | [83,83; 92,82] | [82,40; 92,31] | [83,84; 93,66] | [83,02; 93,53] |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>1999</i> | <i>1754</i>    | <i>1528</i>    | <i>1342</i>    | <i>1211</i>    | <i>1120</i>    | <i>1049</i>    | <i>991</i>     |               |               |               |               |               |               |
| 2009-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 863         | 717            | 594            | 507            | 452            | 409            | 372            |                |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 684            | 559            | 481            | 432            | 393            | 354            |                |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 661            | 516            | 432            | 382            | 345            | 310            |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 96,64          | 92,31          | 89,81          | 88,43          | 87,79          | 87,57          |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [95,29; 97,99] | [90,10; 94,52] | [87,11; 92,52] | [85,41; 91,45] | [84,54; 91,03] | [84,13; 91,01] |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>3078</i> | <i>2649</i>    | <i>2283</i>    | <i>2023</i>    | <i>1853</i>    | <i>1711</i>    | <i>1590</i>    |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 443         | 346            | 281            | 244            | 219            | 195            | 179            |                |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 333            | 270            | 236            | 208            | 187            | 176            |                |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 321            | 250            | 211            | 183            | 160            | 149            |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 96,40          | 92,59          | 89,41          | 87,98          | 85,56          | 84,66          |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [94,39; 98,40] | [89,46; 95,72] | [85,47; 93,34] | [83,55; 92,41] | [80,51; 90,61] | [79,32; 90,00] |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2266</i> | <i>1931</i>    | <i>1678</i>    | <i>1504</i>    | <i>1379</i>    | <i>1258</i>    | <i>1163</i>    |                |               |               |               |               |               |               |
| 2009-2 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 788         | 625            | 512            | 433            | 385            | 358            |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 591            | 481            | 409            | 359            | 336            |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 569            | 441            | 366            | 317            | 292            |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 96,28          | 91,68          | 89,49          | 88,30          | 86,90          |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [94,75; 97,81] | [89,21; 94,15] | [86,51; 92,46] | [84,97; 91,63] | [83,29; 90,52] |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2630</i> | <i>2209</i>    | <i>1883</i>    | <i>1649</i>    | <i>1493</i>    | <i>1383</i>    |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 403         | 332            | 272            | 232            | 209            | 196            |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 309            | 257            | 223            | 199            | 186            |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 295            | 235            | 201            | 177            | 164            |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 95,47          | 91,44          | 90,13          | 88,94          | 88,17          |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [93,15; 97,79] | [88,01; 94,87] | [86,21; 94,06] | [84,58; 93,31] | [83,52; 92,83] |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2000</i> | <i>1720</i>    | <i>1504</i>    | <i>1351</i>    | <i>1226</i>    | <i>1149</i>    |                |                |               |               |               |               |               |               |
| 2010-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 853         | 673            | 559            | 495            | 451            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 643            | 542            | 475            | 439            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 633            | 514            | 441            | 397            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 98,44          | 94,83          | 92,84          | 90,43          |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [97,49; 99,40] | [92,97; 96,70] | [90,52; 95,16] | [87,68; 93,19] |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2911</i> | <i>2437</i>    | <i>2109</i>    | <i>1877</i>    | <i>1719</i>    |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 416         | 332            | 257            | 226            | 197            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 313            | 250            | 218            | 189            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | Raucher   | Anzahl             |             | 299            | 235            | 200            | 172            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 95,53          | 94,00          | 91,74          | 91,01          |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [93,23; 97,82] | [91,05; 96,95] | [88,08; 95,41] | [86,92; 95,10] |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|        | <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2067</i> | <i>1752</i>    | <i>1498</i>    | <i>1348</i>    | <i>1229</i>    |                |                |                |               |               |               |               |               |               |



| EZ   | Raucher ≥ 12 Jahre in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|--|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2010-2                                     | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 849         | 678            | 541            | 466            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             | 654            | 515            | 439            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             | 638            | 487            | 408            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                | 97,55          | 94,56          | 92,94          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | CI Anteil in %     |             |                | [96,37; 98,74] | [92,60; 96,52] | [90,54; 95,34] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2958</i> | <i>2501</i>    | <i>2129</i>    | <i>1911</i>    |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 443         | 370            | 310            | 271            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             | 361            | 299            | 258            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             | 342            | 272            | 229            |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                | 94,74          | 90,97          | 88,76          |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %  |                    |             | [92,43; 97,04] | [87,72; 94,22] | [84,90; 92,62] |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
| <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2167</i>        | <i>1888</i> | <i>1647</i>    | <i>1463</i>    |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
| 2011-1                                     | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 918         | 751            | 603            |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             | 711            | 566            |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             | 684            | 524            |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                | 96,20          | 92,58          |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | CI Anteil in %     |             |                | [94,80; 97,61] | [90,42; 94,74] |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>3038</i> | <i>2568</i>    | <i>2178</i>    |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 460         | 385            | 323            |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             | 377            | 313            |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             | 363            | 292            |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                | 96,29          | 93,29          |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %  |                    |             | [94,38; 98,20] | [90,51; 96,07] |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
| <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2252</i>        | <i>1971</i> | <i>1701</i>    |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
| 2011-2                                     | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 926         | 759            |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             | 716            |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             | 693            |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                | 96,79          |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | CI Anteil in %     |             |                | [95,50; 98,08] |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>2923</i> | <i>2503</i>    |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 446         | 381            |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             | 354            |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             | 342            |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                | 96,61          |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %  |                    |             | [94,72; 98,50] |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
| <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2172</i>        | <i>1875</i> |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
| 2012-1                                     | <b>männliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 1027        |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | CI Anteil in %     |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <i>männliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i>                          | <i>Anzahl</i>      | <i>3287</i> |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder ≥ 12 Jahre insgesamt</b>           | Anzahl             | 462         |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar  | Anzahl             |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | Raucher   | Anzahl             |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |   | Anteil in %        |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %  |                    |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |
| <i>weibliche Pat. ≥ 12 Jahre insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2389</i>        |             |                |                |                |                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |

In Tabelle 3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten ≥12 Jahre insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte werden dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten ≥12 Jahre insgesamt“ angegeben, wie viele Pati-

enten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

**Tabelle 3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten ≥ 12 Jahre**

| EZ     | Raucherquote bei allen Patienten ≥ 12 Jahre     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                  |
|--------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2005-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 334         | 312               | 271               | 239               | 217               | 205               | 193               | 185               | 175               | 171               | 166               | 158               | 151               | 146               | 140              |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 304               | 260               | 235               | 215               | 205               | 193               | 183               | 173               | 167               | 160               | 154               | 147               | 143               | 137              |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 75                | 60                | 47                | 41                | 40                | 35                | 30                | 28                | 26                | 26                | 25                | 22                | 21                | 19               |
|        |   | Anteil in %            |             | 24,67             | 23,08             | 20,00             | 19,07             | 19,51             | 18,13             | 16,39             | 16,18             | 15,57             | 16,25             | 16,23             | 14,97             | 14,69             | 13,87            |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [19,82;<br>29,53] | [17,95;<br>28,21] | [14,87;<br>25,13] | [13,81;<br>24,33] | [14,07;<br>24,95] | [12,68;<br>23,58] | [11,01;<br>21,77] | [10,68;<br>21,69] | [10,05;<br>21,08] | [10,52;<br>21,98] | [10,39;<br>22,08] | [9,18;<br>20,75]  | [8,86;<br>20,51]  | [8,06;<br>19,68] |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 290         | 279               | 244               | 213               | 194               | 182               | 173               | 166               | 159               | 151               | 145               | 141               | 139               | 136               | 129              |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 275               | 222               | 209               | 193               | 180               | 168               | 164               | 155               | 147               | 143               | 139               | 136               | 129               | 125              |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 50                | 42                | 32                | 25                | 24                | 23                | 16                | 14                | 13                | 12                | 12                | 12                | 11                | 11               |
|        |   | Anteil in %            |             | 18,18             | 18,92             | 15,31             | 12,95             | 13,33             | 13,69             | 9,76              | 9,03              | 8,84              | 8,39              | 8,63              | 8,82              | 8,53              | 8,80             |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [13,61;<br>22,75] | [13,76;<br>24,08] | [10,42;<br>20,20] | [8,20;<br>17,70]  | [8,35;<br>18,31]  | [8,48;<br>18,90]  | [5,20;<br>14,31]  | [4,50;<br>13,56]  | [4,24;<br>13,45]  | [3,83;<br>12,95]  | [3,95;<br>13,32]  | [4,04;<br>13,61]  | [3,69;<br>13,37]  | [3,81;<br>13,79] |
| 2005-2 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2258        | 2066              | 1829              | 1665              | 1557              | 1485              | 1408              | 1347              | 1290              | 1237              | 1168              | 1136              | 1086              | 1034              |                  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2011              | 1788              | 1632              | 1525              | 1447              | 1361              | 1321              | 1262              | 1212              | 1147              | 1116              | 1057              | 1016              |                  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 597               | 478               | 405               | 369               | 329               | 299               | 280               | 269               | 265               | 256               | 249               | 240               | 226               |                  |
|        |   | Anteil in %            |             | 29,69             | 26,73             | 24,82             | 24,20             | 22,74             | 21,97             | 21,20             | 21,32             | 21,86             | 22,32             | 22,31             | 22,71             | 22,24             |                  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [27,69;<br>31,68] | [24,68;<br>28,79] | [22,72;<br>26,91] | [22,05;<br>26,35] | [20,58;<br>24,90] | [19,77;<br>24,17] | [18,99;<br>23,40] | [19,05;<br>23,58] | [19,54;<br>24,19] | [19,91;<br>24,73] | [19,87;<br>24,76] | [20,18;<br>25,23] | [19,69;<br>24,80] |                  |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 1735        | 1589              | 1408              | 1291              | 1218              | 1153              | 1100              | 1060              | 1012              | 953               | 923               | 891               | 859               | 828               |                  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1536              | 1370              | 1258              | 1196              | 1125              | 1058              | 1025              | 978               | 936               | 905               | 870               | 842               | 794               |                  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 298               | 251               | 207               | 190               | 168               | 139               | 134               | 133               | 128               | 125               | 120               | 117               | 108               |                  |
|        |   | Anteil in %            |             | 19,40             | 18,32             | 16,45             | 15,89             | 14,93             | 13,14             | 13,07             | 13,60             | 13,68             | 13,81             | 13,79             | 13,90             | 13,60             |                  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [17,42;<br>21,38] | [16,27;<br>20,37] | [14,40;<br>18,50] | [13,81;<br>17,96] | [12,85;<br>17,02] | [11,10;<br>15,17] | [11,01;<br>15,14] | [11,45;<br>15,75] | [11,47;<br>15,88] | [11,56;<br>16,06] | [11,50;<br>16,09] | [11,56;<br>16,23] | [11,22;<br>15,99] |                  |
| 2006-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2212        | 1987              | 1726              | 1582              | 1456              | 1381              | 1306              | 1202              | 1128              | 1070              | 1020              | 966               | 914               |                   |                  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1934              | 1688              | 1529              | 1414              | 1321              | 1258              | 1175              | 1110              | 1058              | 1001              | 950               | 889               |                   |                  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 605               | 479               | 423               | 379               | 323               | 298               | 290               | 272               | 251               | 229               | 213               | 190               |                   |                  |
|        |   | Anteil in %            |             | 31,28             | 28,38             | 27,67             | 26,80             | 24,45             | 23,69             | 24,68             | 24,50             | 23,72             | 22,88             | 22,42             | 21,37             |                   |                  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [29,22;<br>33,35] | [26,23;<br>30,53] | [25,42;<br>29,91] | [24,49;<br>29,11] | [22,13;<br>26,77] | [21,34;<br>26,04] | [22,21;<br>27,15] | [21,97;<br>27,04] | [21,16;<br>26,29] | [20,27;<br>25,48] | [19,77;<br>25,07] | [18,68;<br>24,07] |                   |                  |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 1714        | 1534              | 1339              | 1214              | 1122              | 1069              | 1023              | 960               | 902               | 854               | 815               | 771               | 723               |                   |                  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1488              | 1298              | 1172              | 1080              | 1023              | 997               | 930               | 881               | 839               | 799               | 758               | 712               |                   |                  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 285               | 231               | 193               | 172               | 166               | 153               | 142               | 140               | 129               | 121               | 123               | 113               |                   |                  |
|        |   | Anteil in %            |             | 19,15             | 17,80             | 16,47             | 15,93             | 16,23             | 15,35             | 15,27             | 15,89             | 15,38             | 15,14             | 16,23             | 15,87             |                   |                  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [17,15;<br>21,15] | [15,71;<br>19,88] | [14,34;<br>18,59] | [13,74;<br>18,11] | [13,97;<br>18,49] | [13,11;<br>17,58] | [12,96;<br>17,58] | [13,48;<br>18,31] | [12,93;<br>17,82] | [12,66;<br>17,63] | [13,60;<br>18,85] | [13,18;<br>18,56] |                   |                  |
| 2006-2 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 3003        | 2660              | 2349              | 2139              | 2015              | 1890              | 1764              | 1661              | 1577              | 1480              | 1409              | 1341              |                   |                   |                  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2600              | 2267              | 2089              | 1904              | 1832              | 1716              | 1624              | 1554              | 1453              | 1387              | 1313              |                   |                   |                  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 796               | 618               | 550               | 500               | 462               | 436               | 412               | 398               | 359               | 350               | 326               |                   |                   |                  |
|        |   | Anteil in %            |             | 30,62             | 27,26             | 26,33             | 26,26             | 25,22             | 25,41             | 25,37             | 25,61             | 24,71             | 25,23             | 24,83             |                   |                   |                  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [28,84;<br>32,39] | [25,43;<br>29,09] | [24,44;<br>28,22] | [24,28;<br>28,24] | [23,23;<br>27,21] | [23,35;<br>27,47] | [23,25;<br>27,49] | [23,44;<br>27,78] | [22,49;<br>26,93] | [22,95;<br>27,52] | [22,49;<br>27,17] |                   |                   |                  |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2296        | 2045              | 1836              | 1715              | 1603              | 1520              | 1400              | 1305              | 1240              | 1184              | 1127              | 1070              |                   |                   |                  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1989              | 1790              | 1661              | 1499              | 1458              | 1360              | 1273              | 1221              | 1159              | 1103              | 1055              |                   |                   |                  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 395               | 316               | 284               | 256               | 252               | 227               | 208               | 198               | 185               | 174               | 172               |                   |                   |                  |
|        |   | Anteil in %            |             | 19,86             | 17,65             | 17,10             | 17,08             | 17,28             | 16,69             | 16,34             | 16,22             | 15,96             | 15,78             | 16,30             |                   |                   |                  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [18,11;<br>21,61] | [15,89;<br>19,42] | [15,29;<br>18,91] | [15,17;<br>18,98] | [15,34;<br>19,23] | [14,71;<br>18,67] | [14,31;<br>18,37] | [14,15;<br>18,28] | [13,85;<br>18,07] | [13,62;<br>17,93] | [14,07;<br>18,53] |                   |                   |                  |

| EZ     | Raucherquote bei allen Patienten ≥ 12 Jahre     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2007-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 6385        | 5779              | 5218              | 4880              | 4629              | 4359              | 4112              | 3911              | 3734              | 3582              | 3436              |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 5630              | 5100              | 4682              | 4488              | 4277              | 4030              | 3841              | 3680              | 3518              | 3361              |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 1428              | 1158              | 1016              | 976               | 908               | 850               | 808               | 763               | 727               | 687               |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 25,36             | 22,71             | 21,70             | 21,75             | 21,23             | 21,09             | 21,04             | 20,73             | 20,67             | 20,44             |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [24,23;<br>26,50] | [21,56;<br>23,86] | [20,52;<br>22,88] | [20,54;<br>22,95] | [20,00;<br>22,46] | [19,83;<br>22,35] | [19,75;<br>22,33] | [19,42;<br>22,04] | [19,33;<br>22,00] | [19,08;<br>21,80] |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 5186        | 4758              | 4356              | 4084              | 3833              | 3618              | 3437              | 3273              | 3124              | 2986              | 2863              |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 4658              | 4253              | 3891              | 3726              | 3533              | 3382              | 3192              | 3061              | 2921              | 2806              |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 728               | 588               | 504               | 477               | 432               | 423               | 401               | 379               | 349               | 332               |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 15,63             | 13,83             | 12,95             | 12,80             | 12,23             | 12,51             | 12,56             | 12,38             | 11,95             | 11,83             |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [14,59;<br>16,67] | [12,79;<br>14,86] | [11,90;<br>14,01] | [11,73;<br>13,87] | [11,15;<br>13,31] | [11,39;<br>13,62] | [11,41;<br>13,71] | [11,21;<br>13,55] | [10,77;<br>13,12] | [10,64;<br>13,03] |                   |                   |                   |  |
| 2007-2 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 4188        | 3679              | 3311              | 3004              | 2720              | 2504              | 2357              | 2215              | 2104              | 2002              |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 3550              | 3118              | 2879              | 2624              | 2432              | 2288              | 2154              | 2050              | 1953              |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 968               | 798               | 725               | 648               | 607               | 564               | 507               | 482               | 448               |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 27,27             | 25,59             | 25,18             | 24,70             | 24,96             | 24,65             | 23,54             | 23,51             | 22,94             |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [25,80;<br>28,73] | [24,06;<br>27,13] | [23,60;<br>26,77] | [23,04;<br>26,35] | [23,24;<br>26,68] | [22,88;<br>26,42] | [21,75;<br>25,33] | [21,68;<br>25,35] | [21,07;<br>24,80] |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 3229        | 2883              | 2635              | 2394              | 2158              | 2001              | 1880              | 1782              | 1684              | 1610              |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2792              | 2459              | 2298              | 2096              | 1957              | 1826              | 1743              | 1651              | 1569              |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 513               | 383               | 361               | 320               | 293               | 275               | 266               | 250               | 234               |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 18,37             | 15,58             | 15,71             | 15,27             | 14,97             | 15,06             | 15,26             | 15,14             | 14,91             |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [16,94;<br>19,81] | [14,14;<br>17,01] | [14,22;<br>17,20] | [13,73;<br>16,81] | [13,39;<br>16,55] | [13,42;<br>16,70] | [13,57;<br>16,95] | [13,41;<br>16,87] | [13,15;<br>16,68] |                   |                   |                   |                   |  |
| 2008-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 4056        | 3565              | 3195              | 2808              | 2553              | 2362              | 2182              | 2055              | 1958              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 3356              | 3010              | 2686              | 2470              | 2282              | 2115              | 2000              | 1894              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 1021              | 818               | 728               | 640               | 589               | 546               | 518               | 482               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 30,42             | 27,18             | 27,10             | 25,91             | 25,81             | 25,82             | 25,90             | 25,45             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [28,87;<br>31,98] | [25,59;<br>28,77] | [25,42;<br>28,78] | [24,18;<br>27,64] | [24,01;<br>27,61] | [23,95;<br>27,68] | [23,98;<br>27,82] | [23,49;<br>27,41] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 3041        | 2734              | 2449              | 2197              | 2005              | 1859              | 1725              | 1632              | 1549              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2593              | 2319              | 2119              | 1951              | 1801              | 1685              | 1584              | 1496              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 522               | 415               | 361               | 325               | 300               | 274               | 251               | 234               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 20,13             | 17,90             | 17,04             | 16,66             | 16,66             | 16,26             | 15,85             | 15,64             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [18,59;<br>21,67] | [16,34;<br>19,46] | [15,44;<br>18,64] | [15,00;<br>18,31] | [14,94;<br>18,38] | [14,50;<br>18,02] | [14,05;<br>17,64] | [13,80;<br>17,48] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2008-2 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2772        | 2385              | 2049              | 1806              | 1647              | 1517              | 1418              | 1327              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2271              | 1956              | 1737              | 1593              | 1456              | 1359              | 1279              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 721               | 568               | 481               | 432               | 391               | 366               | 336               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 31,75             | 29,04             | 27,69             | 27,12             | 26,85             | 26,93             | 26,27             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [29,83;<br>33,66] | [27,03;<br>31,05] | [25,59;<br>29,80] | [24,93;<br>29,30] | [24,58;<br>29,13] | [24,57;<br>29,29] | [23,86;<br>28,68] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 1999        | 1754              | 1528              | 1342              | 1211              | 1120              | 1049              | 991               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1682              | 1470              | 1287              | 1164              | 1074              | 1021              | 950               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 350               | 287               | 248               | 213               | 185               | 176               | 163               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             | 20,81             | 19,52             | 19,27             | 18,30             | 17,23             | 17,24             | 17,16             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [18,87;<br>22,75] | [17,50;<br>21,55] | [17,11;<br>21,43] | [16,08;<br>20,52] | [14,97;<br>19,48] | [14,92;<br>19,56] | [14,76;<br>19,56] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ     | Raucherquote bei allen Patienten ≥ 12 Jahre     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 3078        | 2649              | 2283              | 2023              | 1853              | 1711              | 1590              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2545              | 2189              | 1962              | 1790              | 1658              | 1541              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 731               | 578               | 491               | 441               | 406               | 373               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 28,72             | 26,40             | 25,03             | 24,64             | 24,49             | 24,21             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [26,96;<br>30,48] | [24,56;<br>28,25] | [23,11;<br>26,94] | [22,64;<br>26,63] | [22,42;<br>26,56] | [22,07;<br>26,34] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2266        | 1931              | 1678              | 1504              | 1379              | 1258              | 1163              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1854              | 1608              | 1449              | 1318              | 1210              | 1121              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 365               | 299               | 257               | 233               | 215               | 205               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 19,69             | 18,59             | 17,74             | 17,68             | 17,77             | 18,29             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [17,88;<br>21,50] | [16,69;<br>20,50] | [15,77;<br>19,70] | [15,62;<br>19,74] | [15,61;<br>19,92] | [16,02;<br>20,55] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-2 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2630        | 2209              | 1883              | 1649              | 1493              | 1383              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2129              | 1801              | 1587              | 1427              | 1330              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 624               | 483               | 410               | 369               | 340               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 29,31             | 26,82             | 25,83             | 25,86             | 25,56             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [27,38;<br>31,24] | [24,77;<br>28,87] | [23,68;<br>27,99] | [23,59;<br>28,13] | [23,22;<br>27,91] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2000        | 1720              | 1504              | 1351              | 1226              | 1149              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1650              | 1435              | 1304              | 1179              | 1103              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 323               | 268               | 231               | 205               | 196               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 19,58             | 18,68             | 17,71             | 17,39             | 17,77             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [17,66;<br>21,49] | [16,66;<br>20,69] | [15,64;<br>19,79] | [15,22;<br>19,55] | [15,51;<br>20,03] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2911        | 2437              | 2109              | 1877              | 1719              |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2343              | 2030              | 1820              | 1665              |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 708               | 589               | 510               | 464               |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 30,22             | 29,01             | 28,02             | 27,87             |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [28,36;<br>32,08] | [27,04;<br>30,99] | [25,96;<br>30,09] | [25,71;<br>30,02] |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2067        | 1752              | 1498              | 1348              | 1229              |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1686              | 1443              | 1300              | 1182              |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 335               | 270               | 237               | 210               |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 19,87             | 18,71             | 18,23             | 17,77             |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [17,96;<br>21,77] | [16,70;<br>20,72] | [16,13;<br>20,33] | [15,59;<br>19,95] |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-2 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2958        | 2501              | 2129              | 1911              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2418              | 2048              | 1836              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 702               | 560               | 495               |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 29,03             | 27,34             | 26,96             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [27,22;<br>30,84] | [25,41;<br>29,27] | [24,93;<br>28,99] |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2167        | 1888              | 1647              | 1463              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1832              | 1592              | 1418              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 368               | 297               | 260               |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 20,09             | 18,66             | 18,34             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [18,25;<br>21,92] | [16,74;<br>20,57] | [16,32;<br>20,35] |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ     | Raucherquote bei allen Patienten ≥ 12 Jahre     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2011-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 3038        | 2568              | 2178              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2479              | 2086              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 736               | 577               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 29,69             | 27,66             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [27,89;<br>31,49] | [25,74;<br>29,58] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2252        | 1971              | 1701              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1924              | 1645              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 402               | 333               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 20,89             | 20,24             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [19,08;<br>22,71] | [18,30;<br>22,19] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-2 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2923        | 2503              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 2386              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 749               |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 31,39             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [29,53;<br>33,25] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2172        | 1875              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             | 1784              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             | 376               |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 21,08             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [19,18;<br>22,97] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2012-1 | <b>männliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 3287        |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten ≥ 12 Jahre insgesamt</b> | Anzahl                 | 2389        |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar                                      | Anzahl                 |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Raucher   | Anzahl                 |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

In Tabelle 3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Es gelten die nachfolgend aufgeführten alters- und geschlechtsspezifischen Grenzwerte für einen nicht ausreichend behandelten Hypertonus. Jeder Patient ist in den jeweiligen Folgehalbjahren anhand dieser Grenzwerte als „Hypertoniker“ (ja/nein) zu klassifizieren, sofern beide RR-Werte vorliegen.

**Alters- und geschlechtsspezifische Schwellenwerte zur Definition der Hypertoniker über die Blutdruckwerte**

| Lebensalter in vollendeten Lebensjahren zur ED oder FDx (Klassifikation gemäß Eva-Kriterien) | Relevantes Alter | Geschlecht     | Nicht ausreichend behandelte Hypertonie zur FDx, wenn RRsys (in mmHG)... | Nicht ausreichend behandelte Hypertonie zur FDx, wenn RRdias (in mmHG)... |
|--|------------------|----------------|--|---|
| < 2 Jahre  | < 2              | Beide          | ≥ 107  | ≥ 60  |
| ≥ 2 und < 3 Jahre  | 2                | Beide          | ≥ 110  | ≥ 65  |
| ≥ 3 und < 4 Jahre  | 3                | Beide          | ≥ 113  | ≥ 69  |
| ≥ 4 und < 5 Jahre  | 4                | Beide          | ≥ 115  | ≥ 72  |
| ≥ 5 und < 6 Jahre  | 5                | Beide          | ≥ 116  | ≥ 74  |
| ≥ 6 und < 7 Jahre  | 6                | Beide          | ≥ 117  | ≥ 76  |
| ≥ 7 und < 8 Jahre  | 7                | Beide          | ≥ 119  | ≥ 78  |
| ≥ 8 und < 9 Jahre  | 8                | Beide          | ≥ 120  | ≥ 80  |
| ≥ 9 und < 10 Jahre   | 9                | Beide          | ≥ 121  | ≥ 81  |
| ≥ 10 und < 11 Jahre  | 10               | Beide          | ≥ 123  | ≥ 82  |
| ≥ 11 und < 12 Jahre  | 11               | Beide          | ≥ 125  | ≥ 82  |
| ≥ 12 und < 13 Jahre  | 12               | Beide          | ≥ 127  | ≥ 83  |
| ≥ 13 und < 14 Jahre  | 13               | Beide          | ≥ 130  | ≥ 83  |
| ≥ 14 und < 15 Jahre  | 14               | Beide          | ≥ 132  | ≥ 84  |
| ≥ 15 und < 16 Jahre  | 15               | Jungen         | ≥ 135  | ≥ 85  |
| ≥ 15 und < 16 Jahre  | 15               | Mädchen        | ≥ 131  | ≥ 85  |
| ≥ 16 und < 17 Jahre  | 16               | Jungen         | ≥ 137  | ≥ 87  |
| ≥ 16 und < 17 Jahre  | 16               | Mädchen        | ≥ 132  | ≥ 86  |
| ≥ 17 und < 18 Jahre  | 17               | Jungen         | ≥ 140  | ≥ 89  |
| ≥ 17 und < 18 Jahre  | 17               | Mädchen        | ≥ 132  | ≥ 86  |
| ≥ 18 Jahre   | 18               | Beide          | ≥ 140  | ≥ 90  |
| Alle ≥ 18 Jahre  | ab 18            | Beide          | ≥ 140  | ≥ 90  |
| Alle < 18 Jahre  | 0 bis 17         | Jungen/Mädchen | abhängig von age und gender  | abhängig von age und gender   |
| Alle < 12 Jahre  | 0 bis 11         | Beide          | abhängig von age   | abhängig von age  |
| Alle < 6 Jahre   | 0 bis 5          | Beide          | abhängig von age   | abhängig von age  |

In Tabelle 3.1.4a wird die Entwicklung des Blutdrucks geschlechterspezifisch für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Für jede Kohorte werden unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahlen derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren.

Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) ausgewiesen, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

Analog werden diese Auswertungen in Tabelle 3.1.4.b geschlechterspezifisch für die **Patienten < 18, < 12 und < 6 Jahren** vorgenommen.

**Tabelle 3.1.4a Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation**

\* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestuft Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc..

| EZ     | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)               | Beitritts-<br>halbjahr               | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                |
|--------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2005-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                  | Anzahl                               | 128            | 122            | 109            | 98             | 93             | 87             | 84             | 81             | 76                | 75                | 72                | 67                | 65                | 64                | 63             |
|        | auswertbar  | Anzahl                               | 128            | 120            | 104            | 96             | 92             | 87             | 84             | 79             | 74                | 73                | 68                | 67                | 64                | 63                | 60             |
|        | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                               | 56             | 58             | 57             | 55             | 58             | 60             | 60             | 47             | 49                | 44                | 41                | 34                | 43                | 42                | 46             |
|        |   | Anteil in %                          | 43,75          | 48,33          | 54,81          | 57,29          | 63,04          | 68,97          | 71,43          | 59,49          | 66,22             | 60,27             | 60,29             | 50,75             | 67,19             | 66,67             | 76,67          |
|        |   | CI Anteil in %                       | [35,12; 52,38] | [39,35; 57,31] | [45,20; 64,42] | [47,34; 67,24] | [53,13; 72,96] | [59,19; 78,74] | [61,71; 81,15] | [48,60; 70,39] | [55,37; 77,07]    | [48,97; 71,58]    | [48,58; 72,01]    | [38,68; 62,81]    | [55,59; 78,78]    | [54,93; 78,40]    | [65,87; 87,46] |
|        | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                               | 15             | 23             | 14             | 14             | 10             | 16             | 9              | 6              | 6                 | 4                 | 6                 | 4                 | 4                 | 5                 | 5              |
|        |   | Anteil in %                          | 11,72          | 19,17          | 13,46          | 14,58          | 10,87          | 18,39          | 10,71          | 7,59           | 8,11              | 5,48              | 8,82              | 5,97              | 6,25              | 7,94              | 8,33           |
|        |   | CI Anteil in %                       | [6,12; 17,31]  | [12,09; 26,24] | [6,87; 20,05]  | [7,49; 21,68]  | [4,47; 17,26]  | [10,20; 26,58] | [4,06; 17,37]  | [1,72; 13,47]  | [1,85; 14,37]     | [0,22; 10,74]     | [2,03; 15,62]     | [0,25; 11,69]     | [0,27; 12,23]     | [1,21; 14,67]     | [1,28; 15,39]  |
|        | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                               | 41             | 35             | 43             | 41             | 48             | 44             | 51             | 41             | 43                | 40                | 35                | 30                | 39                | 37                | 41             |
|        |   | Anteil in %                          | 32,03          | 29,17          | 41,35          | 42,71          | 52,17          | 50,57          | 60,71          | 51,90          | 58,11             | 54,79             | 51,47             | 44,78             | 60,94             | 58,73             | 68,33          |
|        |   | CI Anteil in %                       | [23,92; 40,15] | [21,00; 37,33] | [31,84; 50,86] | [32,76; 52,66] | [41,91; 62,44] | [40,01; 61,14] | [50,21; 71,22] | [40,81; 62,99] | [46,79; 69,43]    | [43,30; 66,29]    | [39,50; 63,44]    | [32,78; 56,77]    | [48,89; 72,99]    | [46,48; 70,98]    | [56,46; 80,20] |
|        | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                               | 72             | 62             | 47             | 41             | 34             | 27             | 24             | 32             | 25                | 29                | 27                | 33                | 21                | 21                | 14             |
|        |   | Anteil in %                          | 56,25          | 51,67          | 45,19          | 42,71          | 36,96          | 31,03          | 28,57          | 40,51          | 33,78             | 39,73             | 39,71             | 49,25             | 32,81             | 33,33             | 23,33          |
|        |   | CI Anteil in %                       | [47,62; 64,88] | [42,69; 60,65] | [35,58; 54,80] | [32,76; 52,66] | [27,04; 46,87] | [21,26; 40,81] | [18,85; 38,29] | [29,61; 51,40] | [22,93; 44,63]    | [28,42; 51,03]    | [27,99; 51,42]    | [37,19; 61,32]    | [21,22; 44,41]    | [21,60; 45,07]    | [12,54; 34,13] |
|        | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                               | 9              | 11             | 7              | 7              | 8              | 2              | 2              | 1              | 0                 | 2                 | 2                 | 1                 | 2                 | 0                 | 1              |
|        |   | Anteil in %                          | 7,03           | 9,17           | 6,73           | 7,29           | 8,70           | 2,30           | 2,38           | 1,27           | 0,00              | 2,74              | 2,94              | 1,49              | 3,13              | 0,00              | 1,67           |
|        |   | CI Anteil in %                       | [2,58; 11,48]  | [3,98; 14,35]  | [1,89; 11,57]  | [2,06; 12,52]  | [2,91; 14,49]  | [0,00; 5,47]   | [0,00; 5,66]   | [0,00; 3,75]   | [0,00; 0,00]      | [0,00; 6,51]      | [0,00; 6,99]      | [0,00; 4,42]      | [0,00; 7,42]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 4,93]   |
|        | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                               | 48             | 36             | 32             | 28             | 24             | 20             | 19             | 26             | 19                | 21                | 21                | 28                | 18                | 19                | 12             |
|        |   | Anteil in %                          | 37,50          | 30,00          | 30,77          | 29,17          | 26,09          | 22,99          | 22,62          | 32,91          | 25,68             | 28,77             | 30,88             | 41,79             | 28,13             | 30,16             | 20,00          |
|        |   | CI Anteil in %                       | [29,08; 45,92] | [21,77; 38,23] | [21,86; 39,68] | [20,03; 38,31] | [17,06; 35,11] | [14,10; 31,88] | [13,62; 31,62] | [22,48; 43,34] | [15,65; 35,70]    | [18,31; 39,22]    | [19,82; 41,95]    | [29,89; 53,69]    | [17,02; 39,23]    | [18,73; 41,58]    | [9,79; 30,21]  |
|        | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                               | 6              | 5              | 2              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              | 1                 | 1                 | 0                 | 1                 | 0                 | 1                 | 0              |
|        |   | Anteil in %                          | 4,69           | 4,17           | 1,92           | 0,00           | 1,09           | 1,15           | 0,00           | 0,00           | 1,35              | 1,37              | 0,00              | 1,49              | 0,00              | 1,59              | 0,00           |
|        |   | CI Anteil in %                       | [1,01; 8,36]   | [0,58; 7,76]   | [0,00; 4,58]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 3,22]   | [0,00; 3,40]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 4,00]      | [0,00; 4,05]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 4,42]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 4,70]      | [0,00; 0,00]   |
|        | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | Anzahl                               | 9              | 10             | 6              | 6              | 1              | 4              | 3              | 5              | 5                 | 5                 | 4                 | 3                 | 1                 | 1                 | 1              |
|        |   | Anteil in %                          | 7,03           | 8,33           | 5,77           | 6,25           | 1,09           | 4,60           | 3,57           | 6,33           | 6,76              | 6,85              | 5,88              | 4,48              | 1,56              | 1,59              | 1,67           |
|        |   | CI Anteil in %                       | [2,58; 11,48]  | [3,37; 13,30]  | [1,27; 10,27]  | [1,38; 11,12]  | [0,00; 3,22]   | [0,17; 9,02]   | [0,00; 7,56]   | [0,93; 11,73]  | [1,00; 12,51]     | [1,01; 12,68]     | [0,25; 11,52]     | [0,00; 9,47]      | [0,00; 4,63]      | [0,00; 4,70]      | [0,00; 4,93]   |
|        |   | <b>männliche Patienten insgesamt</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>342</b>     | <b>318</b>     | <b>277</b>     | <b>242</b>     | <b>220</b>     | <b>207</b>     | <b>194</b>     | <b>186</b>        | <b>172</b>        | <b>167</b>        | <b>159</b>        | <b>152</b>        | <b>147</b>        | <b>141</b>     |



| EZ                                   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                   |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 100               | 98                | 89                | 79                | 71                | 61                | 59                | 55                | 50                | 48                | 44                | 44                | 43                | 40                | 38                |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 | 100               | 97                | 82                | 78                | 70                | 61                | 57                | 55                | 50                | 46                | 44                | 44                | 43                | 37                | 35                |
|                                      | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 50                | 36                | 44                | 39                | 36                | 27                | 34                | 27                | 26                | 20                | 23                | 27                | 26                | 19                | 20                |
|                                      |   | Anteil in %            | 50,00             | 37,11             | 53,66             | 50,00             | 51,43             | 44,26             | 59,65             | 49,09             | 52,00             | 43,48             | 52,27             | 61,36             | 60,47             | 51,35             | 57,14             |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [40,15;<br>59,85] | [27,45;<br>46,78] | [42,80;<br>64,52] | [38,83;<br>61,17] | [39,64;<br>63,22] | [31,69;<br>56,83] | [46,80;<br>72,50] | [35,76;<br>62,42] | [38,01;<br>65,99] | [28,99;<br>57,96] | [37,34;<br>67,20] | [46,81;<br>75,92] | [45,68;<br>75,25] | [35,02;<br>67,68] | [40,51;<br>73,78] |
|                                      | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | 10                | 16                | 12                | 12                | 14                | 7                 | 6                 | 3                 | 3                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 10,00             | 16,49             | 14,63             | 15,38             | 20,00             | 11,48             | 10,53             | 5,45              | 6,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [4,09;<br>15,91]  | [9,07;<br>23,92]  | [6,94;<br>22,33]  | [7,33;<br>23,44]  | [10,56;<br>29,44] | [3,41;<br>19,54]  | [2,49;<br>18,56]  | [0,00;<br>11,51]  | [0,00;<br>12,65]  | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      |
|                                      | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | 40                | 20                | 32                | 27                | 22                | 20                | 28                | 24                | 23                | 20                | 23                | 27                | 26                | 19                | 20                |
|                                      |   | Anteil in %            | 40,00             | 20,62             | 39,02             | 34,62             | 31,43             | 32,79             | 49,12             | 43,64             | 46,00             | 43,48             | 52,27             | 61,36             | 60,47             | 51,35             | 57,14             |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [30,35;<br>49,65] | [12,53;<br>28,71] | [28,40;<br>49,65] | [23,99;<br>45,24] | [20,47;<br>42,38] | [20,91;<br>44,67] | [36,03;<br>62,22] | [30,41;<br>56,86] | [32,04;<br>59,96] | [28,99;<br>57,96] | [37,34;<br>67,20] | [46,81;<br>75,92] | [45,68;<br>75,25] | [35,02;<br>67,68] | [40,51;<br>73,78] |
|                                      | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 50                | 61                | 38                | 39                | 34                | 34                | 23                | 28                | 24                | 26                | 21                | 17                | 17                | 18                | 15                |
|                                      |   | Anteil in %            | 50,00             | 62,89             | 46,34             | 50,00             | 48,57             | 55,74             | 40,35             | 50,91             | 48,00             | 56,52             | 47,73             | 38,64             | 39,53             | 48,65             | 42,86             |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [40,15;<br>59,85] | [53,22;<br>72,55] | [35,48;<br>57,20] | [38,83;<br>61,17] | [36,78;<br>60,36] | [43,17;<br>68,31] | [27,50;<br>53,20] | [37,58;<br>64,24] | [34,01;<br>61,99] | [42,04;<br>71,01] | [32,80;<br>62,66] | [24,08;<br>53,19] | [24,75;<br>54,32] | [32,32;<br>64,98] | [26,22;<br>59,49] |
|                                      | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 5                 | 15                | 8                 | 7                 | 5                 | 5                 | 5                 | 1                 | 1                 | 2                 | 0                 | 1                 | 0                 | 1                 | 0                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 5,00              | 15,46             | 9,76              | 8,97              | 7,14              | 8,20              | 8,77              | 1,82              | 2,00              | 4,35              | 0,00              | 2,27              | 0,00              | 2,70              | 0,00              |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [0,71; 9,29]      | [8,23;<br>22,70]  | [3,29;<br>16,22]  | [2,59;<br>15,36]  | [1,07;<br>13,22]  | [1,26;<br>15,14]  | [1,36;<br>16,18]  | [0,00; 5,38]      | [0,00; 5,92]      | [0,00;<br>10,31]  | [0,00; 0,00]      | [0,00; 6,73]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 8,00]      | [0,00; 0,00]      |
|                                      | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 36                | 31                | 23                | 24                | 24                | 24                | 13                | 23                | 20                | 20                | 17                | 14                | 13                | 16                | 12                |
|                                      |   | Anteil in %            | 36,00             | 31,96             | 28,05             | 30,77             | 34,29             | 39,34             | 22,81             | 41,82             | 40,00             | 43,48             | 38,64             | 31,82             | 30,23             | 43,24             | 34,29             |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [26,54;<br>45,46] | [22,63;<br>41,29] | [18,27;<br>37,83] | [20,46;<br>41,08] | [23,09;<br>45,49] | [26,98;<br>51,71] | [11,82;<br>33,80] | [28,66;<br>54,97] | [26,28;<br>53,72] | [28,99;<br>57,96] | [24,08;<br>53,19] | [17,90;<br>45,74] | [16,34;<br>44,12] | [27,06;<br>59,43] | [18,33;<br>50,24] |
|                                      | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 2                 | 5                 | 3                 | 2                 | 0                 | 2                 | 0                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 0                 | 1                 | 0                 | 1                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 2,00              | 5,15              | 3,66              | 2,56              | 0,00              | 3,28              | 0,00              | 1,82              | 2,00              | 2,17              | 2,27              | 0,00              | 2,33              | 0,00              | 2,86              |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [0,00; 4,76]      | [0,73; 9,58]      | [0,00; 7,75]      | [0,00; 6,09]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 7,78]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 5,38]      | [0,00; 5,92]      | [0,00; 6,43]      | [0,00; 6,73]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 6,88]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 8,46]      |
|                                      | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | 7                 | 10                | 4                 | 6                 | 5                 | 3                 | 5                 | 3                 | 2                 | 3                 | 3                 | 2                 | 3                 | 1                 | 2                 |
| Anteil in %                          |   | 7,00                   | 10,31             | 4,88              | 7,69              | 7,14              | 4,92              | 8,77              | 5,45              | 4,00              | 6,52              | 6,82              | 4,55              | 6,98              | 2,70              | 5,71              |                   |
| CI Anteil in %                       |   | [1,97;<br>12,03]       | [4,23;<br>16,39]  | [0,19; 9,57]      | [1,74;<br>13,64]  | [1,07;<br>13,22]  | [0,00;<br>10,39]  | [1,36;<br>16,18]  | [0,00;<br>11,51]  | [0,00; 9,49]      | [0,00;<br>13,74]  | [0,00;<br>14,35]  | [0,00;<br>10,77]  | [0,00;<br>14,68]  | [0,00; 8,00]      | [0,00;<br>13,52]  |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b> | <b>Anzahl</b>   | <b>292</b>             | <b>281</b>        | <b>246</b>        | <b>214</b>        | <b>195</b>        | <b>183</b>        | <b>174</b>        | <b>167</b>        | <b>160</b>        | <b>151</b>        | <b>145</b>        | <b>141</b>        | <b>139</b>        | <b>136</b>        | <b>129</b>        |                   |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)               | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2005-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                  | Anzahl                 | 991            | 935            | 853            | 793            | 747            | 709            | 678            | 651            | 626               | 602               | 569               | 554               | 526               | 499               |
|  | auswertbar  | Anzahl                 | 991            | 914            | 837            | 780            | 726            | 689            | 659            | 640            | 613               | 589               | 558               | 544               | 511               | 491               |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 501            | 490            | 444            | 443            | 416            | 413            | 382            | 359            | 359               | 331               | 318               | 332               | 292               | 282               |
|  |   | Anteil in %            | 50,55          | 53,61          | 53,05          | 56,79          | 57,30          | 59,94          | 57,97          | 56,09          | 58,56             | 56,20             | 56,99             | 61,03             | 57,14             | 57,43             |
|  |   | CI Anteil in %         | [47,44; 53,67] | [50,38; 56,85] | [49,66; 56,43] | [53,32; 60,27] | [53,70; 60,90] | [56,28; 63,60] | [54,19; 61,74] | [52,25; 59,94] | [54,66; 62,47]    | [52,19; 60,21]    | [52,88; 61,10]    | [56,93; 65,13]    | [52,85; 61,44]    | [53,06; 61,81]    |
|  | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 72             | 98             | 91             | 75             | 71             | 63             | 36             | 30             | 36                | 30                | 27                | 24                | 23                | 26                |
|  |   | Anteil in %            | 7,27           | 10,72          | 10,87          | 9,62           | 9,78           | 9,14           | 5,46           | 4,69           | 5,87              | 5,09              | 4,84              | 4,41              | 4,50              | 5,30              |
|  |   | CI Anteil in %         | [5,65; 8,88]   | [8,72; 12,73]  | [8,76; 12,98]  | [7,55; 11,69]  | [7,62; 11,94]  | [6,99; 11,30]  | [3,73; 7,20]   | [3,05; 6,33]   | [4,01; 7,74]      | [3,32; 6,87]      | [3,06; 6,62]      | [2,68; 6,14]      | [2,70; 6,30]      | [3,31; 7,28]      |
|  | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 429            | 392            | 353            | 368            | 345            | 350            | 346            | 329            | 323               | 301               | 291               | 308               | 269               | 256               |
|  |   | Anteil in %            | 43,29          | 42,89          | 42,17          | 47,18          | 47,52          | 50,80          | 52,50          | 51,41          | 52,69             | 51,10             | 52,15             | 56,62             | 52,64             | 52,14             |
|  |   | CI Anteil in %         | [40,20; 46,38] | [39,68; 46,10] | [38,83; 45,52] | [43,67; 50,69] | [43,89; 51,16] | [47,06; 54,53] | [48,69; 56,32] | [47,53; 55,28] | [48,74; 56,65]    | [47,06; 55,14]    | [48,00; 56,30]    | [52,45; 60,79]    | [48,31; 56,98]    | [47,72; 56,56]    |
|  | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 490            | 424            | 393            | 337            | 310            | 276            | 277            | 281            | 254               | 258               | 240               | 212               | 219               | 209               |
|  |   | Anteil in %            | 49,45          | 46,39          | 46,95          | 43,21          | 42,70          | 40,06          | 42,03          | 43,91          | 41,44             | 43,80             | 43,01             | 38,97             | 42,86             | 42,57             |
|  |   | CI Anteil in %         | [46,33; 52,56] | [43,15; 49,62] | [43,57; 50,34] | [39,73; 46,68] | [39,10; 46,30] | [36,40; 43,72] | [38,26; 45,81] | [40,06; 47,75] | [37,53; 45,34]    | [39,79; 47,81]    | [38,90; 47,12]    | [34,87; 43,07]    | [38,56; 47,15]    | [38,19; 46,94]    |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 68             | 77             | 64             | 46             | 52             | 38             | 19             | 21             | 11                | 17                | 11                | 15                | 14                | 14                |
|  |   | Anteil in %            | 6,86           | 8,42           | 7,65           | 5,90           | 7,16           | 5,52           | 2,88           | 3,28           | 1,79              | 2,89              | 1,97              | 2,76              | 2,74              | 2,85              |
|  |   | CI Anteil in %         | [5,29; 8,44]   | [6,62; 10,23]  | [5,84; 9,45]   | [4,24; 7,55]   | [5,29; 9,04]   | [3,81; 7,22]   | [1,60; 4,16]   | [1,90; 4,66]   | [0,74; 2,85]      | [1,53; 4,24]      | [0,82; 3,13]      | [1,38; 4,13]      | [1,32; 4,16]      | [1,38; 4,32]      |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 343            | 273            | 256            | 242            | 206            | 193            | 215            | 223            | 197               | 192               | 188               | 166               | 167               | 161               |
|  |   | Anteil in %            | 34,61          | 29,87          | 30,59          | 31,03          | 28,37          | 28,01          | 32,63          | 34,84          | 32,14             | 32,60             | 33,69             | 30,51             | 32,68             | 32,79             |
|  |   | CI Anteil in %         | [31,65; 37,57] | [26,90; 32,84] | [27,46; 33,71] | [27,78; 34,27] | [25,09; 31,66] | [24,66; 31,37] | [29,04; 36,21] | [31,15; 38,54] | [28,44; 35,84]    | [28,81; 36,39]    | [29,77; 37,62]    | [26,64; 34,39]    | [28,61; 36,75]    | [28,63; 36,95]    |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 17             | 12             | 12             | 9              | 5              | 8              | 2              | 1              | 1                 | 4                 | 2                 | 1                 | 5                 | 0                 |
|  |   | Anteil in %            | 1,72           | 1,31           | 1,43           | 1,15           | 0,69           | 1,16           | 0,30           | 0,16           | 0,16              | 0,68              | 0,36              | 0,18              | 0,98              | 0,00              |
|  |   | CI Anteil in %         | [0,91; 2,52]   | [0,57; 2,05]   | [0,63; 2,24]   | [0,40; 1,90]   | [0,09; 1,29]   | [0,36; 1,96]   | [0,00; 0,72]   | [0,00; 0,46]   | [0,00; 0,48]      | [0,02; 1,34]      | [0,00; 0,85]      | [0,00; 0,54]      | [0,12; 1,83]      | [0,00; 0,00]      |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anzahl  | 62                     | 62             | 61             | 40             | 47             | 37             | 41             | 36             | 45             | 45                | 39                | 30                | 33                | 34                |                   |
|  | Anteil in %   | 6,26                   | 6,78           | 7,29           | 5,13           | 6,47           | 5,37           | 6,22           | 5,63           | 7,34           | 7,64              | 6,99              | 5,51              | 6,46              | 6,92              |                   |
|  | CI Anteil in %  | [4,75; 7,76]           | [5,15; 8,41]   | [5,53; 9,05]   | [3,58; 6,68]   | [4,68; 8,26]   | [3,69; 7,05]   | [4,38; 8,07]   | [3,84; 7,41]   | [5,27; 9,41]   | [5,49; 9,79]      | [4,87; 9,11]      | [3,59; 7,43]      | [4,32; 8,59]      | [4,68; 9,17]      |                   |
|  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2287           | 2094           | 1857           | 1690           | 1582           | 1510           | 1432           | 1368           | 1309              | 1254              | 1185              | 1153              | 1103              | 1050              |

| EZ                            | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                  | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                     | Anzahl                 | 753               | 698               | 636               | 593               | 565               | 536               | 517               | 494               | 476               | 455               | 447               | 433               | 416               | 407               |
|                               | auswertbar   | Anzahl                 | 753               | 680               | 615               | 581               | 556               | 521               | 501               | 482               | 462               | 445               | 436               | 422               | 409               | 387               |
|                               | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 388               | 372               | 345               | 329               | 312               | 300               | 300               | 271               | 255               | 256               | 247               | 257               | 220               | 212               |
|                               |  | Anteil in %            | 51,53             | 54,71             | 56,10             | 56,63             | 56,12             | 57,58             | 59,88             | 56,22             | 55,19             | 57,53             | 56,65             | 60,90             | 53,79             | 54,78             |
|                               | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | CI Anteil in %         | [47,96;<br>55,10] | [50,96;<br>58,45] | [52,17;<br>60,02] | [52,59;<br>60,66] | [51,99;<br>60,24] | [53,33;<br>61,83] | [55,58;<br>64,18] | [51,79;<br>60,66] | [50,66;<br>59,73] | [52,93;<br>62,13] | [51,99;<br>61,31] | [56,24;<br>65,56] | [48,95;<br>58,63] | [49,82;<br>59,75] |
|                               |  | Anzahl                 | 55                | 91                | 90                | 66                | 67                | 47                | 35                | 30                | 28                | 23                | 18                | 17                | 14                | 20                |
|                               | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anteil in %            | 7,30              | 13,38             | 14,63             | 11,36             | 12,05             | 9,02              | 6,99              | 6,22              | 6,06              | 5,17              | 4,13              | 4,03              | 3,42              | 5,17              |
|                               |  | CI Anteil in %         | [5,44; 9,16]      | [10,82;<br>15,94] | [11,84;<br>17,43] | [8,78;<br>13,94]  | [9,34;<br>14,76]  | [6,56;<br>11,48]  | [4,75; 9,22]      | [4,06; 8,38]      | [3,88; 8,24]      | [3,11; 7,23]      | [2,26; 6,00]      | [2,15; 5,91]      | [1,66; 5,19]      | [2,96; 7,38]      |
|                               | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 333               | 281               | 255               | 263               | 245               | 253               | 265               | 241               | 227               | 233               | 229               | 240               | 206               | 192               |
|                               |  | Anteil in %            | 44,22             | 41,32             | 41,46             | 45,27             | 44,06             | 48,56             | 52,89             | 50,00             | 49,13             | 52,36             | 52,52             | 56,87             | 50,37             | 49,61             |
|                               | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [40,67;<br>47,77] | [37,62;<br>45,03] | [37,57;<br>45,36] | [41,22;<br>49,32] | [39,93;<br>48,20] | [44,26;<br>52,86] | [48,52;<br>57,27] | [45,53;<br>54,47] | [44,57;<br>53,70] | [47,71;<br>57,01] | [47,83;<br>57,22] | [52,14;<br>61,60] | [45,52;<br>55,22] | [44,62;<br>54,60] |
|                               |  | Anzahl                 | 365               | 308               | 270               | 252               | 244               | 221               | 201               | 211               | 207               | 189               | 189               | 165               | 189               | 175               |
|                               | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 48,47             | 45,29             | 43,90             | 43,37             | 43,88             | 42,42             | 40,12             | 43,78             | 44,81             | 42,47             | 43,35             | 39,10             | 46,21             | 45,22             |
|                               |  | CI Anteil in %         | [44,90;<br>52,04] | [41,55;<br>49,04] | [39,98;<br>47,83] | [39,34;<br>47,41] | [39,76;<br>48,01] | [38,17;<br>46,67] | [35,82;<br>44,42] | [39,34;<br>48,21] | [40,27;<br>49,34] | [37,87;<br>47,07] | [38,69;<br>48,01] | [34,44;<br>43,76] | [41,37;<br>51,05] | [40,25;<br>50,18] |
|                               | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 44                | 55                | 39                | 41                | 31                | 32                | 17                | 14                | 19                | 9                 | 14                | 13                | 14                | 9                 |
|                               |  | Anteil in %            | 5,84              | 8,09              | 6,34              | 7,06              | 5,58              | 6,14              | 3,39              | 2,90              | 4,11              | 2,02              | 3,21              | 3,08              | 3,42              | 2,33              |
|                               | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | CI Anteil in %         | [4,17; 7,52]      | [6,04;<br>10,14]  | [4,41; 8,27]      | [4,97; 9,14]      | [3,67; 7,48]      | [4,08; 8,21]      | [1,81; 4,98]      | [1,40; 4,41]      | [2,30; 5,93]      | [0,71; 3,33]      | [1,55; 4,87]      | [1,43; 4,73]      | [1,66; 5,19]      | [0,82; 3,83]      |
|                               |  | Anzahl                 | 257               | 200               | 191               | 173               | 175               | 159               | 157               | 162               | 160               | 154               | 149               | 130               | 150               | 132               |
|                               | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | Anteil in %            | 34,13             | 29,41             | 31,06             | 29,78             | 31,47             | 30,52             | 31,34             | 33,61             | 34,63             | 34,61             | 34,17             | 30,81             | 36,67             | 34,11             |
|                               |  | CI Anteil in %         | [30,74;<br>37,52] | [25,98;<br>32,84] | [27,40;<br>34,72] | [26,05;<br>33,50] | [27,61;<br>35,34] | [26,56;<br>34,48] | [27,27;<br>35,40] | [29,39;<br>37,83] | [30,29;<br>38,98] | [30,18;<br>39,03] | [29,72;<br>38,63] | [26,40;<br>35,22] | [32,00;<br>41,35] | [29,38;<br>38,84] |
|                               | weibliche Patienten insgesamt  | Anzahl                 | 17                | 7                 | 7                 | 4                 | 6                 | 7                 | 2                 | 3                 | 1                 | 2                 | 1                 | 2                 | 3                 | 1                 |
|                               |  | Anteil in %            | 2,26              | 1,03              | 1,14              | 0,69              | 1,08              | 1,34              | 0,40              | 0,62              | 0,22              | 0,45              | 0,23              | 0,47              | 0,73              | 0,26              |
|                               | weibliche Patienten insgesamt  | CI Anteil in %         | [1,20; 3,32]      | [0,27; 1,79]      | [0,30; 1,98]      | [0,02; 1,36]      | [0,22; 1,94]      | [0,35; 2,33]      | [0,00; 0,95]      | [0,00; 1,33]      | [0,00; 0,64]      | [0,00; 1,07]      | [0,00; 0,68]      | [0,00; 1,13]      | [0,00; 1,56]      | [0,00; 0,76]      |
| Anzahl                        |  | 47                     | 46                | 33                | 34                | 32                | 23                | 25                | 32                | 27                | 24                | 25                | 20                | 22                | 33                |                   |
| weibliche Patienten insgesamt | Anteil in %  | 6,24                   | 6,76              | 5,37              | 5,85              | 5,76              | 4,41              | 4,99              | 6,64              | 5,84              | 5,39              | 5,73              | 4,74              | 5,38              | 8,53              |                   |
|                               | CI Anteil in %   | [4,51; 7,97]           | [4,88; 8,65]      | [3,58; 7,15]      | [3,94; 7,76]      | [3,82; 7,69]      | [2,65; 6,18]      | [3,08; 6,90]      | [4,41; 8,86]      | [3,70; 7,99]      | [3,29; 7,49]      | [3,55; 7,92]      | [2,71; 6,77]      | [3,19; 7,57]      | [5,74;<br>11,31]  |                   |
| weibliche Patienten insgesamt | Anzahl   | 1772                   | 1624              | 1439              | 1318              | 1242              | 1172              | 1116              | 1075              | 1026              | 966               | 936               | 903               | 870               | 839               |                   |

| EZ                                   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                         | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 727            | 657            | 588            | 541            | 509            | 479            | 460            | 425            | 400               | 378               | 363               | 340               | 325               |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 | 727            | 646            | 577            | 519            | 494            | 469            | 445            | 411            | 395               | 373               | 353               | 333               | 314               |                   |
|                                      | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 369            | 347            | 330            | 308            | 287            | 278            | 281            | 238            | 245               | 230               | 225               | 204               | 186               |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 50,76          | 53,72          | 57,19          | 59,34          | 58,10          | 59,28          | 63,15          | 57,91          | 62,03             | 61,66             | 63,74             | 61,26             | 59,24             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [47,12; 54,39] | [49,87; 57,56] | [53,15; 61,23] | [55,11; 63,57] | [53,74; 62,45] | [54,82; 63,73] | [58,66; 67,63] | [53,13; 62,69] | [57,23; 66,82]    | [56,72; 66,60]    | [58,72; 68,76]    | [56,02; 66,50]    | [53,79; 64,68]    |                   |
|                                      | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 69             | 107            | 96             | 87             | 72             | 55             | 46             | 44             | 41                | 36                | 30                | 30                | 20                |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 9,49           | 16,56          | 16,64          | 16,76          | 14,57          | 11,73          | 10,34          | 10,71          | 10,38             | 9,65              | 8,50              | 9,01              | 6,37              |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [7,36; 11,62]  | [13,69; 19,43] | [13,60; 19,68] | [13,55; 19,98] | [11,46; 17,69] | [8,81; 14,64]  | [7,51; 13,17]  | [7,71; 13,70]  | [7,37; 13,39]     | [6,65; 12,65]     | [5,59; 11,41]     | [5,93; 12,09]     | [3,66; 9,07]      |                   |
|                                      | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 300            | 240            | 234            | 221            | 215            | 223            | 235            | 194            | 204               | 194               | 195               | 174               | 166               |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 41,27          | 37,15          | 40,55          | 42,58          | 43,52          | 47,55          | 52,81          | 47,20          | 51,65             | 52,01             | 55,24             | 52,25             | 52,87             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [37,68; 44,85] | [33,42; 40,88] | [36,54; 44,56] | [38,32; 46,84] | [39,15; 47,90] | [43,02; 52,07] | [48,17; 57,45] | [42,37; 52,03] | [46,71; 56,58]    | [46,93; 57,09]    | [50,05; 60,44]    | [46,88; 57,63]    | [47,34; 58,40]    |                   |
|                                      | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 358            | 299            | 247            | 211            | 207            | 191            | 164            | 173            | 150               | 143               | 128               | 129               | 128               |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 49,24          | 46,28          | 42,81          | 40,66          | 41,90          | 40,72          | 36,85          | 42,09          | 37,97             | 38,34             | 36,26             | 38,74             | 40,76             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [45,61; 52,88] | [42,44; 50,13] | [38,77; 46,85] | [36,43; 44,89] | [37,55; 46,26] | [36,27; 45,18] | [32,37; 41,34] | [37,31; 46,87] | [33,18; 42,77]    | [33,40; 43,28]    | [31,24; 41,28]    | [33,50; 43,98]    | [35,32; 46,21]    |                   |
|                                      | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 61             | 68             | 47             | 30             | 28             | 18             | 25             | 15             | 16                | 14                | 15                | 12                | 15                |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 8,39           | 10,53          | 8,15           | 5,78           | 5,67           | 3,84           | 5,62           | 3,65           | 4,05              | 3,75              | 4,25              | 3,60              | 4,78              |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [6,37; 10,41]  | [8,16; 12,89]  | [5,91; 10,38]  | [3,77; 7,79]   | [3,63; 7,71]   | [2,10; 5,58]   | [3,48; 7,76]   | [1,83; 5,46]   | [2,10; 6,00]      | [1,82; 5,68]      | [2,14; 6,36]      | [1,60; 5,61]      | [2,41; 7,14]      |                   |
|                                      | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 224            | 186            | 155            | 142            | 138            | 143            | 112            | 134            | 112               | 102               | 91                | 100               | 88                |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 30,81          | 28,79          | 26,86          | 27,36          | 27,94          | 30,49          | 25,17          | 32,60          | 28,35             | 27,35             | 25,78             | 30,03             | 28,03             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [27,45; 34,17] | [25,30; 32,29] | [23,24; 30,48] | [23,52; 31,20] | [23,97; 31,90] | [26,32; 34,66] | [21,13; 29,21] | [28,07; 37,14] | [23,90; 32,80]    | [22,82; 31,88]    | [21,21; 30,35]    | [25,10; 34,96]    | [23,05; 33,00]    |                   |
|                                      | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 14             | 12             | 12             | 8              | 6              | 0              | 2              | 3              | 1                 | 0                 | 1                 | 2                 | 2                 |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 1,93           | 1,86           | 2,08           | 1,54           | 1,21           | 0,00           | 0,45           | 0,73           | 0,25              | 0,00              | 0,28              | 0,60              | 0,64              |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [0,93; 2,93]   | [0,82; 2,90]   | [0,91; 3,25]   | [0,48; 2,60]   | [0,25; 2,18]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 1,07]   | [0,00; 1,55]   | [0,00; 0,75]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,84]      | [0,00; 1,43]      | [0,00; 1,52]      |                   |
|                                      | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | 59             | 33             | 33             | 31             | 35             | 30             | 25             | 21             | 21                | 27                | 21                | 15                | 23                |                   |
| Anteil in %                          |   | 8,12                   | 5,11           | 5,72           | 5,97           | 7,09           | 6,40           | 5,62           | 5,11           | 5,32           | 7,24              | 5,95              | 4,50              | 7,32              |                   |                   |
| CI Anteil in %                       |   | [6,13; 10,10]          | [3,41; 6,81]   | [3,82; 7,62]   | [3,93; 8,01]   | [4,82; 9,35]   | [4,18; 8,61]   | [3,48; 7,76]   | [2,98; 7,24]   | [3,10; 7,53]   | [4,61; 9,87]      | [3,48; 8,42]      | [2,27; 6,74]      | [4,44; 10,21]     |                   |                   |
| <b>männliche Patienten insgesamt</b> | Anzahl  | 2245                   | 2019           | 1756           | 1611           | 1483           | 1408           | 1329           | 1225           | 1149           | 1090              | 1039              | 984               | 932               |                   |                   |

| EZ                                   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)               | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                  | Anzahl                 | 568            | 518            | 461            | 424            | 396            | 380            | 365            | 350            | 322               | 307               | 292               | 282               | 263               |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 | 568            | 506            | 452            | 411            | 380            | 365            | 359            | 340            | 317               | 303               | 287               | 273               | 262               |                   |
|                                      | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 288            | 271            | 268            | 237            | 243            | 211            | 238            | 209            | 194               | 185               | 187               | 165               | 174               |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 50,70          | 53,56          | 59,29          | 57,66          | 63,95          | 57,81          | 66,30          | 61,47          | 61,20             | 61,06             | 65,16             | 60,44             | 66,41             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [46,59; 54,82] | [49,21; 57,91] | [54,76; 63,83] | [52,88; 62,45] | [59,11; 68,78] | [52,73; 62,88] | [61,40; 71,19] | [56,29; 66,65] | [55,83; 66,57]    | [55,56; 66,56]    | [59,63; 70,68]    | [54,63; 66,25]    | [60,68; 72,14]    |                   |
|                                      | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 44             | 71             | 78             | 66             | 62             | 37             | 36             | 31             | 26                | 21                | 24                | 20                | 21                |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 7,75           | 14,03          | 17,26          | 16,06          | 16,32          | 10,14          | 10,03          | 9,12           | 8,20              | 6,93              | 8,36              | 7,33              | 8,02              |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [5,55; 9,95]   | [11,00; 17,06] | [13,77; 20,74] | [12,50; 19,61] | [12,60; 20,04] | [7,04; 13,24]  | [6,92; 13,14]  | [6,05; 12,18]  | [5,18; 11,23]     | [4,07; 9,80]      | [5,15; 11,57]     | [4,23; 10,42]     | [4,72; 11,31]     |                   |
|                                      | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 244            | 200            | 190            | 171            | 181            | 174            | 202            | 178            | 168               | 164               | 163               | 145               | 153               |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 42,96          | 39,53          | 42,04          | 41,61          | 47,63          | 47,67          | 56,27          | 52,35          | 53,00             | 54,13             | 56,79             | 53,11             | 58,40             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [38,88; 47,03] | [35,26; 43,79] | [37,48; 46,59] | [36,83; 46,38] | [42,60; 52,66] | [42,54; 52,80] | [51,13; 61,41] | [47,04; 57,67] | [47,49; 58,50]    | [48,51; 59,75]    | [51,05; 62,54]    | [47,18; 59,04]    | [52,42; 64,38]    |                   |
|                                      | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 280            | 235            | 184            | 174            | 137            | 154            | 121            | 131            | 123               | 118               | 100               | 108               | 88                |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 49,30          | 46,44          | 40,71          | 42,34          | 36,05          | 42,19          | 33,70          | 38,53          | 38,80             | 38,94             | 34,84             | 39,56             | 33,59             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [45,18; 53,41] | [42,09; 50,79] | [36,17; 45,24] | [37,55; 47,12] | [31,22; 40,89] | [37,12; 47,27] | [28,81; 38,60] | [33,35; 43,71] | [33,43; 44,17]    | [33,44; 44,44]    | [29,32; 40,37]    | [33,75; 45,37]    | [27,86; 39,32]    |                   |
|                                      | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 36             | 54             | 36             | 30             | 29             | 19             | 14             | 16             | 13                | 13                | 9                 | 12                | 9                 |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 6,34           | 10,67          | 7,96           | 7,30           | 7,63           | 5,21           | 3,90           | 4,71           | 4,10              | 4,29              | 3,14              | 4,40              | 3,44              |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [4,33; 8,34]   | [7,98; 13,36]  | [5,47; 10,46]  | [4,78; 9,82]   | [4,96; 10,30]  | [2,92; 7,49]   | [1,89; 5,91]   | [2,45; 6,96]   | [1,91; 6,29]      | [2,00; 6,58]      | [1,12; 5,16]      | [1,96; 6,83]      | [1,23; 5,64]      |                   |
|                                      | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 173            | 132            | 114            | 117            | 90             | 113            | 91             | 98             | 96                | 88                | 74                | 81                | 63                |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 30,46          | 26,09          | 25,22          | 28,47          | 23,68          | 30,96          | 25,35          | 28,82          | 30,28             | 29,04             | 25,78             | 29,67             | 24,05             |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [26,67; 34,25] | [22,26; 29,92] | [21,21; 29,23] | [24,10; 32,84] | [19,40; 27,96] | [26,21; 35,71] | [20,84; 29,85] | [24,00; 33,65] | [25,22; 35,35]    | [23,92; 34,16]    | [20,71; 30,85]    | [24,24; 35,10]    | [18,86; 29,23]    |                   |
|                                      | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 13             | 15             | 10             | 6              | 7              | 4              | 1              | 2              | 0                 | 2                 | 0                 | 1                 | 3                 |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 2,29           | 2,96           | 2,21           | 1,46           | 1,84           | 1,10           | 0,28           | 0,59           | 0,00              | 0,66              | 0,00              | 0,37              | 1,15              |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [1,06; 3,52]   | [1,49; 4,44]   | [0,85; 3,57]   | [0,30; 2,62]   | [0,49; 3,20]   | [0,03; 2,17]   | [0,00; 0,82]   | [0,00; 1,40]   | [0,00; 0,00]      | [0,00; 1,57]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 1,08]      | [0,00; 2,44]      |                   |
|                                      | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | 58             | 34             | 24             | 21             | 11             | 18             | 15             | 15             | 14                | 15                | 17                | 14                | 13                |                   |
| Anteil in %                          |   | 10,21                  | 6,72           | 5,31           | 5,11           | 2,89           | 4,93           | 4,18           | 4,41           | 4,42           | 4,95              | 5,92              | 5,13              | 4,96              |                   |                   |
| CI Anteil in %                       |   | [7,72; 12,70]          | [4,54; 8,90]   | [3,24; 7,38]   | [2,98; 7,24]   | [1,21; 4,58]   | [2,71; 7,16]   | [2,11; 6,25]   | [2,23; 6,60]   | [2,15; 6,68]   | [2,50; 7,40]      | [3,19; 8,66]      | [2,51; 7,75]      | [2,33; 7,60]      |                   |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b> | <b>Anzahl</b>   | <b>1759</b>            | <b>1578</b>    | <b>1380</b>    | <b>1253</b>    | <b>1159</b>    | <b>1105</b>    | <b>1057</b>    | <b>991</b>     | <b>933</b>     | <b>884</b>        | <b>844</b>        | <b>797</b>        | <b>747</b>        |                   |                   |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                  | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                     | Anzahl                 | 1037              | 955               | 871               | 806               | 765               | 720               | 672               | 639               | 609               | 571               | 543               | 519               |                   |                   |
|   | auswertbar   | Anzahl                 | 1037              | 937               | 852               | 786               | 732               | 694               | 656               | 625               | 598               | 562               | 533               | 507               |                   |                   |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 518               | 540               | 452               | 453               | 420               | 429               | 369               | 372               | 355               | 330               | 297               | 294               |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 49,95             | 57,63             | 53,05             | 57,63             | 57,38             | 61,82             | 56,25             | 59,52             | 59,36             | 58,72             | 55,72             | 57,99             |                   |                   |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | CI Anteil in %         | [46,91;<br>53,00] | [54,47;<br>60,80] | [49,70;<br>56,40] | [54,18;<br>61,09] | [53,79;<br>60,96] | [58,20;<br>65,43] | [52,45;<br>60,05] | [55,67;<br>63,37] | [55,42;<br>63,30] | [54,64;<br>62,79] | [51,50;<br>59,94] | [53,69;<br>62,29] |                   |                   |
|   |  | Anzahl                 | 111               | 119               | 112               | 86                | 46                | 51                | 45                | 38                | 32                | 33                | 32                | 30                |                   |                   |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anteil in %            | 10,70             | 12,70             | 13,15             | 10,94             | 6,28              | 7,35              | 6,86              | 6,08              | 5,35              | 5,87              | 6,00              | 5,92              |                   |                   |
|   |  | CI Anteil in %         | [8,82;<br>12,59]  | [10,57;<br>14,83] | [10,88;<br>15,42] | [8,76;<br>13,13]  | [4,52; 8,04]      | [5,41; 9,29]      | [4,92; 8,80]      | [4,21; 7,95]      | [3,55; 7,16]      | [3,93; 7,82]      | [3,99; 8,02]      | [3,86; 7,97]      |                   |                   |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 407               | 421               | 340               | 367               | 374               | 378               | 324               | 334               | 323               | 297               | 265               | 264               |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 39,25             | 44,93             | 39,91             | 46,69             | 51,09             | 54,47             | 49,39             | 53,44             | 54,01             | 52,85             | 49,72             | 52,07             |                   |                   |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | CI Anteil in %         | [36,27;<br>42,22] | [41,74;<br>48,12] | [36,62;<br>43,20] | [43,20;<br>50,18] | [47,47;<br>54,72] | [50,76;<br>58,17] | [45,56;<br>53,22] | [49,53;<br>57,35] | [50,02;<br>58,01] | [48,72;<br>56,98] | [45,47;<br>53,97] | [47,72;<br>56,42] |                   |                   |
|   |  | Anzahl                 | 519               | 397               | 400               | 333               | 312               | 265               | 287               | 253               | 243               | 232               | 236               | 213               |                   |                   |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anteil in %            | 50,05             | 42,37             | 46,95             | 42,37             | 42,62             | 38,18             | 43,75             | 40,48             | 40,64             | 41,28             | 44,28             | 42,01             |                   |                   |
|   |  | CI Anteil in %         | [47,00;<br>53,09] | [39,20;<br>45,53] | [43,60;<br>50,30] | [38,91;<br>45,82] | [39,04;<br>46,21] | [34,57;<br>41,80] | [39,95;<br>47,55] | [36,63;<br>44,33] | [36,70;<br>44,58] | [37,21;<br>45,36] | [40,06;<br>48,50] | [37,71;<br>46,31] |                   |                   |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 96                | 86                | 81                | 54                | 38                | 23                | 29                | 26                | 24                | 18                | 17                | 13                |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 9,26              | 9,18              | 9,51              | 6,87              | 5,19              | 3,31              | 4,42              | 4,16              | 4,01              | 3,20              | 3,19              | 2,56              |                   |                   |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | CI Anteil in %         | [7,49;<br>11,02]  | [7,33;<br>11,03]  | [7,54;<br>11,48]  | [5,10; 8,64]      | [3,58; 6,80]      | [1,98; 4,65]      | [2,85; 5,99]      | [2,59; 5,73]      | [2,44; 5,59]      | [1,75; 4,66]      | [1,70; 4,68]      | [1,19; 3,94]      |                   |                   |
|   |  | Anzahl                 | 320               | 249               | 242               | 227               | 227               | 200               | 211               | 203               | 183               | 181               | 183               | 164               |                   |                   |
|   | Kategorie 7 "mäßig erhöht mit Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 30,86             | 26,57             | 28,40             | 28,88             | 31,01             | 28,82             | 32,16             | 32,48             | 30,60             | 32,21             | 34,33             | 32,35             |                   |                   |
|   |  | CI Anteil in %         | [28,05;<br>33,67] | [23,74;<br>29,40] | [25,37;<br>31,43] | [25,71;<br>32,05] | [27,66;<br>34,36] | [25,45;<br>32,19] | [28,59;<br>35,74] | [28,81;<br>36,15] | [26,91;<br>34,30] | [28,34;<br>36,07] | [30,30;<br>38,37] | [28,27;<br>36,42] |                   |                   |
|   | Kategorie 8 "mäßig erhöht ohne Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 12                | 12                | 13                | 16                | 5                 | 1                 | 3                 | 1                 | 2                 | 2                 | 4                 | 2                 |                   |                   |
|   |  | Anteil in %            | 1,16              | 1,28              | 1,53              | 2,04              | 0,68              | 0,14              | 0,46              | 0,16              | 0,33              | 0,36              | 0,75              | 0,39              |                   |                   |
|   | Kategorie 9 "deutlich erhöht mit Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | CI Anteil in %         | [0,51; 1,81]      | [0,56; 2,00]      | [0,70; 2,35]      | [1,05; 3,02]      | [0,09; 1,28]      | [0,00; 0,43]      | [0,00; 0,97]      | [0,00; 0,47]      | [0,00; 0,80]      | [0,00; 0,85]      | [0,02; 1,48]      | [0,00; 0,94]      |                   |                   |
| Anzahl  |  | 91                     | 50                | 64                | 36                | 42                | 41                | 44                | 23                | 34                | 31                | 32                | 34                |                   |                   |                   |
| Kategorie 10 "deutlich erhöht ohne Therapie":<br>sys>160 oder dia>100 | Anteil in %  | 8,78                   | 5,34              | 7,51              | 4,58              | 5,74              | 5,91              | 6,71              | 3,68              | 5,69              | 5,52              | 6,00              | 6,71              |                   |                   |                   |
|   | CI Anteil in %   | [7,05;<br>10,50]       | [3,90; 6,78]      | [5,74; 9,28]      | [3,12; 6,04]      | [4,05; 7,42]      | [4,15; 7,66]      | [4,79; 8,62]      | [2,20; 5,16]      | [3,83; 7,54]      | [3,63; 7,41]      | [3,99; 8,02]      | [4,53; 8,89]      |                   |                   |                   |
| <b>männliche Patienten insgesamt</b>                                  | Anzahl   | 3054                   | 2707              | 2393              | 2179              | 2052              | 1924              | 1796              | 1691              | 1605              | 1506              | 1434              | 1366              |                   |                   |                   |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)               | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                  | Anzahl                 | 804            | 737            | 674            | 636            | 597            | 575            | 541            | 507            | 488               | 468               | 448               | 430               |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 | 804            | 719            | 660            | 615            | 563            | 559            | 527            | 500            | 479               | 459               | 439               | 425               |                   |                   |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 427            | 426            | 377            | 352            | 348            | 345            | 292            | 292            | 284               | 283               | 263               | 266               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 53,11          | 59,25          | 57,12          | 57,24          | 61,81          | 61,72          | 55,41          | 58,40          | 59,29             | 61,66             | 59,91             | 62,59             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [49,66; 56,56] | [55,65; 62,84] | [53,34; 60,90] | [53,32; 61,15] | [57,79; 65,83] | [57,68; 65,75] | [51,16; 59,66] | [54,08; 62,72] | [54,89; 63,69]    | [57,20; 66,11]    | [55,32; 64,50]    | [57,98; 67,19]    |                   |                   |
|  | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 77             | 109            | 89             | 78             | 55             | 47             | 41             | 40             | 37                | 37                | 37                | 35                |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 9,58           | 15,16          | 13,48          | 12,68          | 9,77           | 8,41           | 7,78           | 8,00           | 7,72              | 8,06              | 8,43              | 8,24              |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [7,54; 11,61]  | [12,54; 17,78] | [10,88; 16,09] | [10,05; 15,32] | [7,31; 12,22]  | [6,11; 10,71]  | [5,49; 10,07]  | [5,62; 10,38]  | [5,33; 10,12]     | [5,57; 10,55]     | [5,83; 11,03]     | [5,62; 10,85]     |                   |                   |
|  | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 350            | 317            | 288            | 274            | 293            | 298            | 251            | 252            | 247               | 246               | 226               | 231               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 43,53          | 44,09          | 43,64          | 44,55          | 52,04          | 53,31          | 47,63          | 50,40          | 51,57             | 53,59             | 51,48             | 54,35             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [40,10; 46,96] | [40,46; 47,72] | [39,85; 47,42] | [40,62; 48,48] | [47,91; 56,17] | [49,17; 57,45] | [43,36; 51,90] | [46,01; 54,79] | [47,09; 56,05]    | [49,03; 58,16]    | [46,80; 56,16]    | [49,61; 59,09]    |                   |                   |
|  | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 377            | 293            | 283            | 263            | 215            | 214            | 235            | 208            | 195               | 176               | 176               | 159               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 46,89          | 40,75          | 42,88          | 42,76          | 38,19          | 38,28          | 44,59          | 41,60          | 40,71             | 38,34             | 40,09             | 37,41             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [43,44; 50,34] | [37,16; 44,35] | [39,10; 46,66] | [38,85; 46,68] | [34,17; 42,21] | [34,25; 42,32] | [40,34; 48,84] | [37,28; 45,92] | [36,31; 45,11]    | [33,89; 42,80]    | [35,50; 44,68]    | [32,81; 42,02]    |                   |                   |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 64             | 64             | 50             | 39             | 25             | 23             | 23             | 22             | 16                | 13                | 11                | 14                |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 7,96           | 8,90           | 7,58           | 6,34           | 4,44           | 4,11           | 4,36           | 4,40           | 3,34              | 2,83              | 2,51              | 3,29              |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [6,09; 9,83]   | [6,82; 10,98]  | [5,56; 9,60]   | [4,41; 8,27]   | [2,74; 6,14]   | [2,47; 5,76]   | [2,62; 6,11]   | [2,60; 6,20]   | [1,73; 4,95]      | [1,31; 4,35]      | [1,04; 3,97]      | [1,60; 4,99]      |                   |                   |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 238            | 182            | 181            | 174            | 150            | 152            | 172            | 148            | 149               | 134               | 143               | 112               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 29,60          | 25,31          | 27,42          | 28,29          | 26,64          | 27,19          | 32,64          | 29,60          | 31,11             | 29,19             | 32,57             | 26,35             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [26,44; 32,76] | [22,13; 28,49] | [24,02; 30,83] | [24,73; 31,86] | [22,99; 30,30] | [23,50; 30,88] | [28,63; 36,64] | [25,59; 33,61] | [26,96; 35,26]    | [25,03; 33,36]    | [28,19; 36,96]    | [22,16; 30,55]    |                   |                   |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 24             | 12             | 9              | 8              | 1              | 2              | 5              | 4              | 3                 | 4                 | 0                 | 1                 |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 2,99           | 1,67           | 1,36           | 1,30           | 0,18           | 0,36           | 0,95           | 0,80           | 0,63              | 0,87              | 0,00              | 0,24              |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [1,81; 4,16]   | [0,73; 2,61]   | [0,48; 2,25]   | [0,40; 2,20]   | [0,00; 0,53]   | [0,00; 0,85]   | [0,12; 1,78]   | [0,02; 1,58]   | [0,00; 1,33]      | [0,02; 1,72]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,70]      |                   |                   |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anzahl  | 51                     | 35             | 43             | 42             | 39             | 37             | 35             | 34             | 27             | 25                | 22                | 32                |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %   | 6,34                   | 4,87           | 6,52           | 6,83           | 6,93           | 6,62           | 6,64           | 6,80           | 5,64           | 5,45              | 5,01              | 7,53              |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %  | [4,66; 8,03]           | [3,29; 6,44]   | [4,63; 8,40]   | [4,83; 8,82]   | [4,83; 9,03]   | [4,56; 8,68]   | [4,51; 8,77]   | [4,59; 9,01]   | [3,57; 7,70]   | [3,37; 7,53]      | [2,97; 7,05]      | [5,02; 10,04]     |                   |                   |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                             | <b>Anzahl</b>   | <b>2346</b>            | <b>2091</b>    | <b>1875</b>    | <b>1753</b>    | <b>1639</b>    | <b>1555</b>    | <b>1433</b>    | <b>1332</b>    | <b>1263</b>    | <b>1206</b>       | <b>1147</b>       | <b>1090</b>       |                   |                   |                   |

| EZ             | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)               | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2007-1         | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                  | Anzahl                 | 2385           | 2221           | 2026           | 1909           | 1843           | 1762           | 1670           | 1604           | 1536              | 1479              | 1417              |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar  | Anzahl                 | 2385           | 2173           | 1978           | 1850           | 1796           | 1740           | 1640           | 1575           | 1514              | 1453              | 1388              |                   |                   |                   |  |
|                | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 1176           | 1141           | 1078           | 1037           | 1036           | 976            | 942            | 890            | 932               | 845               | 822               |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 49,31          | 52,51          | 54,50          | 56,05          | 57,68          | 56,09          | 57,44          | 56,51          | 61,56             | 58,16             | 59,22             |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [47,30; 51,32] | [50,41; 54,61] | [52,30; 56,69] | [53,79; 58,32] | [55,40; 59,97] | [53,76; 58,42] | [55,05; 59,83] | [54,06; 58,96] | [59,11; 64,01]    | [55,62; 60,69]    | [56,64; 61,81]    |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 226            | 280            | 253            | 153            | 133            | 122            | 118            | 108            | 115               | 95                | 96                |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 9,48           | 12,89          | 12,79          | 8,27           | 7,41           | 7,01           | 7,20           | 6,86           | 7,60              | 6,54              | 6,92              |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [8,30; 10,65]  | [11,48; 14,29] | [11,32; 14,26] | [7,01; 9,53]   | [6,19; 8,62]   | [5,81; 8,21]   | [5,94; 8,45]   | [5,61; 8,11]   | [6,26; 8,93]      | [5,27; 7,81]      | [5,58; 8,25]      |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 950            | 861            | 825            | 884            | 903            | 854            | 824            | 782            | 817               | 750               | 726               |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 39,83          | 39,62          | 41,71          | 47,78          | 50,28          | 49,08          | 50,24          | 49,65          | 53,96             | 51,62             | 52,31             |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [37,87; 41,80] | [37,57; 41,68] | [39,54; 43,88] | [45,51; 50,06] | [47,97; 52,59] | [46,73; 51,43] | [47,82; 52,66] | [47,18; 52,12] | [51,45; 56,47]    | [49,05; 54,19]    | [49,68; 54,93]    |                   |                   |                   |  |
|                | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 1209           | 1032           | 900            | 813            | 760            | 764            | 698            | 685            | 582               | 608               | 566               |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 50,69          | 47,49          | 45,50          | 43,95          | 42,32          | 43,91          | 42,56          | 43,49          | 38,44             | 41,84             | 40,78             |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [48,68; 52,70] | [45,39; 49,59] | [43,31; 47,70] | [41,68; 46,21] | [40,03; 44,60] | [41,58; 46,24] | [40,17; 44,95] | [41,04; 45,94] | [35,99; 40,89]    | [39,31; 44,38]    | [38,19; 43,36]    |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 204            | 228            | 174            | 97             | 85             | 77             | 53             | 59             | 42                | 61                | 47                |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 8,55           | 10,49          | 8,80           | 5,24           | 4,73           | 4,43           | 3,23           | 3,75           | 2,77              | 4,20              | 3,39              |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [7,43; 9,68]   | [9,20; 11,78]  | [7,55; 10,05]  | [4,23; 6,26]   | [3,75; 5,72]   | [3,46; 5,39]   | [2,38; 4,09]   | [2,81; 4,68]   | [1,95; 3,60]      | [3,17; 5,23]      | [2,43; 4,34]      |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 760            | 642            | 585            | 593            | 554            | 559            | 531            | 508            | 454               | 456               | 425               |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 31,87          | 29,54          | 29,58          | 32,05          | 30,85          | 32,13          | 32,38          | 32,25          | 29,99             | 31,38             | 30,62             |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [30,00; 33,74] | [27,63; 31,46] | [27,56; 31,59] | [29,93; 34,18] | [28,71; 32,98] | [29,93; 34,32] | [30,11; 34,64] | [29,94; 34,56] | [27,68; 32,30]    | [29,00; 33,77]    | [28,19; 33,05]    |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 61             | 38             | 27             | 12             | 15             | 11             | 14             | 7              | 8                 | 11                | 11                |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 2,56           | 1,75           | 1,37           | 0,65           | 0,84           | 0,63           | 0,85           | 0,44           | 0,53              | 0,76              | 0,79              |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [1,92; 3,19]   | [1,20; 2,30]   | [0,85; 1,88]   | [0,28; 1,01]   | [0,41; 1,26]   | [0,26; 1,00]   | [0,41; 1,30]   | [0,12; 0,77]   | [0,16; 0,89]      | [0,31; 1,20]      | [0,33; 1,26]      |                   |                   |                   |  |
|                | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | 184            | 124            | 114            | 111            | 106            | 117            | 100            | 111            | 78                | 80                | 83                |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %    |   | 7,71                   | 5,71           | 5,76           | 6,00           | 5,90           | 6,72           | 6,10           | 7,05           | 5,15           | 5,51              | 5,98              |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in % |   | [6,64; 8,79]           | [4,73; 6,68]   | [4,74; 6,79]   | [4,92; 7,08]   | [4,81; 6,99]   | [5,55; 7,90]   | [4,94; 7,26]   | [5,78; 8,31]   | [4,04; 6,27]   | [4,33; 6,68]      | [4,73; 7,23]      |                   |                   |                   |                   |  |
|                | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>          | <b>6522</b>    | <b>5910</b>    | <b>5338</b>    | <b>4997</b>    | <b>4736</b>    | <b>4458</b>    | <b>4205</b>    | <b>4002</b>    | <b>3822</b>       | <b>3669</b>       | <b>3522</b>       |                   |                   |                   |  |



| EZ                                   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)               | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                  | Anzahl                 | 1841           | 1713           | 1601           | 1505           | 1425           | 1353           | 1294           | 1235           | 1182              | 1125              | 1086              |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 | 1841           | 1688           | 1571           | 1442           | 1389           | 1334           | 1275           | 1202           | 1154              | 1108              | 1068              |                   |                   |                   |
|                                      | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 967            | 940            | 912            | 823            | 835            | 786            | 766            | 701            | 726               | 647               | 621               |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 52,53          | 55,69          | 58,05          | 57,07          | 60,12          | 58,92          | 60,08          | 58,32          | 62,91             | 58,39             | 58,15             |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [50,24; 54,81] | [53,32; 58,06] | [55,61; 60,49] | [54,52; 59,63] | [57,54; 62,69] | [56,28; 61,56] | [57,39; 62,77] | [55,53; 61,11] | [60,12; 65,70]    | [55,49; 61,30]    | [55,19; 61,11]    |                   |                   |                   |
|                                      | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 210            | 248            | 220            | 132            | 140            | 139            | 123            | 121            | 114               | 86                | 82                |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 11,41          | 14,69          | 14,00          | 9,15           | 10,08          | 10,42          | 9,65           | 10,07          | 9,88              | 7,76              | 7,68              |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [9,95; 12,86]  | [13,00; 16,38] | [12,29; 15,72] | [7,66; 10,64]  | [8,50; 11,66]  | [8,78; 12,06]  | [8,03; 11,27]  | [8,36; 11,77]  | [8,16; 11,60]     | [6,19; 9,34]      | [6,08; 9,28]      |                   |                   |                   |
|                                      | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 757            | 692            | 692            | 691            | 695            | 647            | 643            | 580            | 612               | 561               | 539               |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 41,12          | 41,00          | 44,05          | 47,92          | 50,04          | 48,50          | 50,43          | 48,25          | 53,03             | 50,63             | 50,47             |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [38,87; 43,37] | [38,65; 43,34] | [41,59; 46,50] | [45,34; 50,50] | [47,41; 52,67] | [45,82; 51,18] | [47,69; 53,18] | [45,43; 51,08] | [50,15; 55,91]    | [47,69; 53,58]    | [47,47; 53,47]    |                   |                   |                   |
|                                      | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 874            | 748            | 659            | 619            | 554            | 548            | 509            | 501            | 428               | 461               | 447               |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 47,47          | 44,31          | 41,95          | 42,93          | 39,88          | 41,08          | 39,92          | 41,68          | 37,09             | 41,61             | 41,85             |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [45,19; 49,76] | [41,94; 46,68] | [39,51; 44,39] | [40,37; 45,48] | [37,31; 42,46] | [38,44; 43,72] | [37,23; 42,61] | [38,89; 44,47] | [34,30; 39,88]    | [38,70; 44,51]    | [38,89; 44,81]    |                   |                   |                   |
|                                      | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 157            | 163            | 135            | 87             | 74             | 66             | 68             | 57             | 48                | 53                | 53                |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 8,53           | 9,66           | 8,59           | 6,03           | 5,33           | 4,95           | 5,33           | 4,74           | 4,16              | 4,78              | 4,96              |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [7,25; 9,80]   | [8,25; 11,07]  | [7,21; 9,98]   | [4,80; 7,26]   | [4,15; 6,51]   | [3,78; 6,11]   | [4,10; 6,57]   | [3,54; 5,94]   | [3,01; 5,31]      | [3,53; 6,04]      | [3,66; 6,27]      |                   |                   |                   |
|                                      | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 569            | 464            | 430            | 450            | 393            | 402            | 377            | 376            | 318               | 331               | 327               |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 30,91          | 27,49          | 27,37          | 31,21          | 28,29          | 30,13          | 29,57          | 31,28          | 27,56             | 29,87             | 30,62             |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [28,80; 33,02] | [25,36; 29,62] | [25,17; 29,58] | [28,81; 33,60] | [25,92; 30,66] | [27,67; 32,60] | [27,06; 32,07] | [28,66; 33,90] | [24,98; 30,14]    | [27,18; 32,57]    | [27,85; 33,38]    |                   |                   |                   |
|                                      | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 25             | 34             | 18             | 13             | 9              | 10             | 5              | 9              | 7                 | 10                | 10                |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            | 1,36           | 2,01           | 1,15           | 0,90           | 0,65           | 0,75           | 0,39           | 0,75           | 0,61              | 0,90              | 0,94              |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [0,83; 1,89]   | [1,34; 2,68]   | [0,62; 1,67]   | [0,41; 1,39]   | [0,23; 1,07]   | [0,29; 1,21]   | [0,05; 0,74]   | [0,26; 1,24]   | [0,16; 1,05]      | [0,35; 1,46]      | [0,36; 1,51]      |                   |                   |                   |
|                                      | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | 123            | 87             | 76             | 69             | 78             | 70             | 59             | 59             | 55                | 67                | 57                |                   |                   |                   |
| Anteil in %                          |   | 6,68                   | 5,15           | 4,84           | 4,79           | 5,62           | 5,25           | 4,63           | 4,91           | 4,77           | 6,05              | 5,34              |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in %                       |   | [5,54; 7,82]           | [4,10; 6,21]   | [3,78; 5,90]   | [3,68; 5,89]   | [4,40; 6,83]   | [4,05; 6,44]   | [3,47; 5,78]   | [3,69; 6,13]   | [3,54; 6,00]   | [4,64; 7,45]      | [3,99; 6,69]      |                   |                   |                   |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b> | Anzahl  | 5314                   | 4880           | 4472           | 4196           | 3934           | 3716           | 3532           | 3362           | 3209           | 3071              | 2944              |                   |                   |                   |                   |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 1315              | 1197              | 1103              | 1015              | 922               | 859               | 820               | 775               | 736               | 703               |                   |                   |                   |                   |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | 1315              | 1169              | 1045              | 973               | 899               | 846               | 802               | 756               | 718               | 693               |                   |                   |                   |                   |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 691               | 653               | 572               | 565               | 528               | 476               | 450               | 470               | 419               | 405               |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            | 52,55             | 55,86             | 54,74             | 58,07             | 58,73             | 56,26             | 56,11             | 62,17             | 58,36             | 58,44             |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | [49,85;<br>55,25] | [53,01;<br>58,71] | [51,72;<br>57,76] | [54,97;<br>61,17] | [55,51;<br>61,95] | [52,92;<br>59,61] | [52,67;<br>59,55] | [58,71;<br>65,63] | [54,75;<br>61,96] | [54,77;<br>62,11] |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anzahl                 | 155               | 180               | 109               | 105               | 94                | 77                | 72                | 73                | 62                | 55                |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | 11,79             | 15,40             | 10,43             | 10,79             | 10,46             | 9,10              | 8,98              | 9,66              | 8,64              | 7,94              |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         | [10,04;<br>13,53] | [13,33;<br>17,47] | [8,58;<br>12,28]  | [8,84;<br>12,74]  | [8,45;<br>12,46]  | [7,16;<br>11,04]  | [7,00;<br>10,96]  | [7,55;<br>11,76]  | [6,58;<br>10,69]  | [5,92;<br>9,95]   |                   |                   |                   |                   |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 536               | 473               | 463               | 460               | 434               | 399               | 378               | 397               | 357               | 350               |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            | 40,76             | 40,46             | 44,31             | 47,28             | 48,28             | 47,16             | 47,13             | 52,51             | 49,72             | 50,51             |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [38,10;<br>43,42] | [37,65;<br>43,28] | [41,29;<br>47,32] | [44,14;<br>50,42] | [45,01;<br>51,54] | [43,80;<br>50,53] | [43,68;<br>50,59] | [48,95;<br>56,08] | [46,06;<br>53,38] | [46,78;<br>54,23] |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anzahl                 | 624               | 516               | 473               | 408               | 371               | 370               | 352               | 286               | 299               | 288               |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 47,45             | 44,14             | 45,26             | 41,93             | 41,27             | 43,74             | 43,89             | 37,83             | 41,64             | 41,56             |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         | [44,75;<br>50,15] | [41,29;<br>46,99] | [42,24;<br>48,28] | [38,83;<br>45,03] | [38,05;<br>44,49] | [40,39;<br>47,08] | [40,45;<br>47,33] | [34,37;<br>41,29] | [38,04;<br>45,25] | [37,89;<br>45,23] |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 128               | 113               | 65                | 40                | 31                | 38                | 37                | 30                | 31                | 20                |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            | 9,73              | 9,67              | 6,22              | 4,11              | 3,45              | 4,49              | 4,61              | 3,97              | 4,32              | 2,89              |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | [8,13;<br>11,34]  | [7,97;<br>11,36]  | [4,76;<br>7,69]   | [2,86;<br>5,36]   | [2,25;<br>4,64]   | [3,10;<br>5,89]   | [3,16;<br>6,07]   | [2,58;<br>5,36]   | [2,83;<br>5,81]   | [1,64;<br>4,13]   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anzahl                 | 373               | 307               | 334               | 314               | 276               | 269               | 254               | 214               | 228               | 207               |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anteil in %            | 28,37             | 26,26             | 31,96             | 32,27             | 30,70             | 31,80             | 31,67             | 28,31             | 31,75             | 29,87             |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         | [25,93;<br>30,80] | [23,74;<br>28,79] | [29,13;<br>34,79] | [29,33;<br>35,21] | [27,68;<br>33,72] | [28,66;<br>34,94] | [28,45;<br>34,89] | [28,45;<br>31,52] | [25,09;<br>35,16] | [28,35;<br>33,28] |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 35                | 28                | 9                 | 9                 | 12                | 5                 | 7                 | 4                 | 4                 | 5                 |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            | 2,66              | 2,40              | 0,86              | 0,92              | 1,33              | 0,59              | 0,87              | 0,53              | 0,56              | 0,72              |                   |                   |                   |                   |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | CI Anteil in %         | [1,79;<br>3,53]   | [1,52;<br>3,27]   | [0,30;<br>1,42]   | [0,32;<br>1,53]   | [0,58;<br>2,09]   | [0,07;<br>1,11]   | [0,23;<br>1,52]   | [0,01;<br>1,05]   | [0,01;<br>1,10]   | [0,09;<br>1,35]   |                   |                   |                   |                   |
| Anzahl  |   | 88                     | 68                | 65                | 45                | 52                | 58                | 54                | 38                | 36                | 56                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anteil in %   | 6,69                   | 5,82              | 6,22              | 4,62              | 5,78              | 6,86              | 6,73              | 5,03              | 5,01              | 8,08              |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | CI Anteil in %  | [5,34;<br>8,04]        | [4,47;<br>7,16]   | [4,76;<br>7,69]   | [3,30;<br>5,95]   | [4,26;<br>7,31]   | [5,15;<br>8,56]   | [5,00;<br>8,47]   | [3,47;<br>6,58]   | [3,42;<br>6,61]   | [6,05;<br>10,11]  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>männliche Patienten insgesamt</b>                                | Anzahl  | 4414                   | 3892              | 3512              | 3195              | 2899              | 2676              | 2514              | 2368              | 2249              | 2141              |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 974               | 884               | 825               | 759               | 699               | 645               | 614               | 584               | 557               | 533               |                   |                   |                   |                   |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | 974               | 856               | 786               | 735               | 678               | 629               | 598               | 571               | 551               | 521               |                   |                   |                   |                   |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 488               | 481               | 452               | 416               | 406               | 387               | 372               | 357               | 339               | 303               |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 50,10             | 56,19             | 57,51             | 56,60             | 59,88             | 61,53             | 62,21             | 62,52             | 61,52             | 58,16             |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [46,96;<br>53,24] | [52,87;<br>59,52] | [54,05;<br>60,96] | [53,01;<br>60,18] | [56,19;<br>63,57] | [57,72;<br>65,33] | [58,32;<br>66,10] | [58,55;<br>66,50] | [57,46;<br>65,59] | [53,92;<br>62,40] |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | 105               | 152               | 93                | 81                | 80                | 69                | 68                | 65                | 56                | 60                |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 10,78             | 17,76             | 11,83             | 11,02             | 11,80             | 10,97             | 11,37             | 11,38             | 10,16             | 11,52             |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [8,83;<br>12,73]  | [15,20;<br>20,32] | [9,57;<br>14,09]  | [8,75;<br>13,29]  | [9,37;<br>14,23]  | [8,53;<br>13,41]  | [8,82;<br>13,92]  | [8,78;<br>13,99]  | [7,64;<br>12,69]  | [8,77;<br>14,26]  |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | 383               | 329               | 359               | 335               | 326               | 318               | 304               | 292               | 283               | 243               |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 39,32             | 38,43             | 45,67             | 45,58             | 48,08             | 50,56             | 50,84             | 51,14             | 51,36             | 46,64             |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [36,25;<br>42,39] | [35,17;<br>41,70] | [42,19;<br>49,16] | [41,98;<br>49,18] | [44,32;<br>51,85] | [46,65;<br>54,47] | [46,83;<br>54,85] | [47,03;<br>55,24] | [47,18;<br>55,54] | [42,35;<br>50,93] |                   |                   |                   |                   |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 486               | 375               | 334               | 319               | 272               | 242               | 226               | 214               | 212               | 218               |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 49,90             | 43,81             | 42,49             | 43,40             | 40,12             | 38,47             | 37,79             | 37,48             | 38,48             | 41,84             |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [46,76;<br>53,04] | [40,48;<br>47,13] | [39,04;<br>45,95] | [39,82;<br>46,99] | [36,43;<br>43,81] | [34,67;<br>42,28] | [33,90;<br>41,68] | [33,50;<br>41,45] | [34,41;<br>42,54] | [37,60;<br>46,08] |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 91                | 78                | 39                | 47                | 43                | 38                | 23                | 20                | 25                | 21                |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 9,34              | 9,11              | 4,96              | 6,39              | 6,34              | 6,04              | 3,85              | 3,50              | 4,54              | 4,03              |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [7,51;<br>11,17]  | [7,18;<br>11,04]  | [3,44; 6,48]      | [4,62; 8,16]      | [4,51; 8,18]      | [4,18; 7,90]      | [2,30; 5,39]      | [1,99; 5,01]      | [2,80; 6,28]      | [2,34; 5,72]      |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 294               | 235               | 224               | 212               | 185               | 166               | 163               | 157               | 143               | 164               |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 30,18             | 27,45             | 28,50             | 28,84             | 27,29             | 26,39             | 27,26             | 27,50             | 25,95             | 31,48             |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [27,30;<br>33,07] | [24,46;<br>30,44] | [25,34;<br>31,66] | [25,57;<br>32,12] | [23,93;<br>30,64] | [22,94;<br>29,84] | [23,69;<br>30,83] | [23,83;<br>31,16] | [22,29;<br>29,62] | [27,49;<br>35,47] |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 28                | 14                | 11                | 6                 | 4                 | 2                 | 4                 | 3                 | 8                 | 5                 |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 2,87              | 1,64              | 1,40              | 0,82              | 0,59              | 0,32              | 0,67              | 0,53              | 1,45              | 0,96              |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [1,82; 3,92]      | [0,79; 2,49]      | [0,58; 2,22]      | [0,17; 1,47]      | [0,01; 1,17]      | [0,00; 0,76]      | [0,02; 1,32]      | [0,00; 1,12]      | [0,45; 2,45]      | [0,12; 1,80]      |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | 73                | 48                | 60                | 54                | 40                | 36                | 36                | 34                | 36                | 28                |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 7,49              | 5,61              | 7,63              | 7,35              | 5,90              | 5,72              | 6,02              | 5,95              | 6,53              | 5,37              |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [5,84; 9,15]      | [4,07; 7,15]      | [5,78; 9,49]      | [5,46; 9,23]      | [4,12; 7,67]      | [3,91; 7,54]      | [4,11; 7,93]      | [4,01; 7,90]      | [4,47; 8,60]      | [3,44; 7,31]      |                   |                   |                   |                   |
|    | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                 | 3459              | 3091              | 2830              | 2577              | 2330              | 2170              | 2043              | 1941              | 1835              | 1756              |                   |                   |                   |                   |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2008-1  | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 1213              | 1079              | 991               | 879               | 815               | 752               | 691               | 655               | 631               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | 1213              | 1016              | 944               | 845               | 788               | 725               | 668               | 643               | 610               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 576               | 521               | 545               | 468               | 432               | 415               | 400               | 366               | 356               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 47,49             | 51,28             | 57,73             | 55,38             | 54,82             | 57,24             | 59,88             | 56,92             | 58,36             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [44,67;<br>50,30] | [48,20;<br>54,35] | [54,58;<br>60,89] | [52,03;<br>58,74] | [51,35;<br>58,30] | [53,64;<br>60,85] | [56,16;<br>63,60] | [53,09;<br>60,75] | [54,45;<br>62,28] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | 121               | 92                | 91                | 68                | 73                | 57                | 51                | 50                | 41                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 9,98              | 9,06              | 9,64              | 8,05              | 9,26              | 7,86              | 7,63              | 7,78              | 6,72              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [8,29;<br>11,66]  | [7,29;<br>10,82]  | [7,76;<br>11,52]  | [6,21; 9,88]      | [7,24;<br>11,29]  | [5,90; 9,82]      | [5,62; 9,65]      | [5,70; 9,85]      | [4,73; 8,71]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | 455               | 429               | 454               | 400               | 359               | 358               | 349               | 316               | 315               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 37,51             | 42,22             | 48,09             | 47,34             | 45,56             | 49,38             | 52,25             | 49,14             | 51,64             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [34,78;<br>40,24] | [39,19;<br>45,26] | [44,90;<br>51,28] | [43,97;<br>50,71] | [42,08;<br>49,04] | [45,74;<br>53,02] | [48,45;<br>56,04] | [45,28;<br>53,01] | [47,67;<br>55,61] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 637               | 495               | 399               | 377               | 356               | 310               | 268               | 277               | 254               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 52,51             | 48,72             | 42,27             | 44,62             | 45,18             | 42,76             | 40,12             | 43,08             | 41,64             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [49,70;<br>55,33] | [45,65;<br>51,80] | [39,11;<br>45,42] | [41,26;<br>47,97] | [41,70;<br>48,65] | [39,15;<br>46,36] | [36,40;<br>43,84] | [39,25;<br>46,91] | [37,72;<br>45,55] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 119               | 65                | 49                | 39                | 38                | 33                | 31                | 25                | 22                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 9,81              | 6,40              | 5,19              | 4,62              | 4,82              | 4,55              | 4,64              | 3,89              | 3,61              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [8,14;<br>11,49]  | [4,89; 7,90]      | [3,77; 6,61]      | [3,20; 6,03]      | [3,33; 6,32]      | [3,03; 6,07]      | [3,04; 6,24]      | [2,39; 5,38]      | [2,13; 5,09]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 372               | 341               | 278               | 258               | 261               | 239               | 198               | 210               | 178               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 30,67             | 33,56             | 29,45             | 30,53             | 33,12             | 32,97             | 29,64             | 32,66             | 29,18             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [28,07;<br>33,26] | [30,66;<br>36,47] | [26,54;<br>32,36] | [27,43;<br>33,64] | [29,83;<br>36,41] | [29,54;<br>36,39] | [26,17;<br>33,11] | [29,03;<br>36,29] | [25,57;<br>32,79] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 40                | 11                | 10                | 15                | 10                | 10                | 6                 | 6                 | 8                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 3,30              | 1,08              | 1,06              | 1,78              | 1,27              | 1,38              | 0,90              | 0,93              | 1,31              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [2,29; 4,30]      | [0,45; 1,72]      | [0,41; 1,71]      | [0,88; 2,67]      | [0,49; 2,05]      | [0,53; 2,23]      | [0,18; 1,61]      | [0,19; 1,68]      | [0,41; 2,22]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anzahl  | 106                    | 78                | 62                | 65                | 47                | 28                | 33                | 36                | 46                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Anteil in %   | 8,74                   | 7,68              | 6,57              | 7,69              | 5,96              | 3,86              | 4,94              | 5,60              | 7,54              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI Anteil in %  | [7,15;<br>10,33]       | [6,04; 9,32]      | [4,99; 8,15]      | [5,89; 9,49]      | [4,31; 7,62]      | [2,46; 5,27]      | [3,30; 6,58]      | [3,82; 7,38]      | [5,44; 9,64]      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>männliche Patienten insgesamt</b>                                | Anzahl  | 4190                   | 3689              | 3307              | 2914              | 2653              | 2459              | 2274              | 2144              | 2046              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)               | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                  | Anzahl                 | 917            | 851            | 776            | 695            | 637            | 601            | 555            | 522            | 497               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar  | Anzahl                 | 917            | 798            | 730            | 661            | 621            | 585            | 544            | 504            | 485               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 483            | 464            | 419            | 389            | 359            | 352            | 337            | 290            | 286               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 52,67          | 58,15          | 57,40          | 58,85          | 57,81          | 60,17          | 61,95          | 57,54          | 58,97             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [49,44; 55,91] | [54,72; 61,57] | [53,81; 60,99] | [55,10; 62,60] | [53,92; 61,70] | [56,20; 64,14] | [57,86; 66,03] | [53,22; 61,86] | [54,59; 63,35]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 94             | 78             | 73             | 57             | 59             | 49             | 48             | 35             | 35                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,25          | 9,77           | 10,00          | 8,62           | 9,50           | 8,38           | 8,82           | 6,94           | 7,22              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [8,29; 12,22]  | [7,71; 11,84]  | [7,82; 12,18]  | [6,48; 10,76]  | [7,19; 11,81]  | [6,13; 10,62]  | [6,44; 11,21]  | [4,72; 9,17]   | [4,91; 9,52]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 389            | 386            | 346            | 332            | 300            | 303            | 289            | 255            | 251               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 42,42          | 48,37          | 47,40          | 50,23          | 48,31          | 51,79          | 53,13          | 50,60          | 51,75             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [39,22; 45,62] | [44,90; 51,84] | [43,77; 51,02] | [46,41; 54,04] | [44,38; 52,24] | [47,74; 55,85] | [48,93; 57,32] | [46,23; 54,96] | [47,30; 56,20]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 434            | 334            | 311            | 272            | 262            | 233            | 207            | 214            | 199               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 47,33          | 41,85          | 42,60          | 41,15          | 42,19          | 39,83          | 38,05          | 42,46          | 41,03             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [44,09; 50,56] | [38,43; 45,28] | [39,01; 46,19] | [37,40; 44,90] | [38,30; 46,08] | [35,86; 43,80] | [33,97; 42,14] | [38,14; 46,78] | [36,65; 45,41]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 85             | 43             | 38             | 29             | 25             | 23             | 18             | 21             | 16                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 9,27           | 5,39           | 5,21           | 4,39           | 4,03           | 3,93           | 3,31           | 4,17           | 3,30              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [7,39; 11,15]  | [3,82; 6,96]   | [3,59; 6,82]   | [2,82; 5,95]   | [2,48; 5,57]   | [2,36; 5,51]   | [1,80; 4,81]   | [2,42; 5,91]   | [1,71; 4,89]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 263            | 233            | 220            | 180            | 195            | 163            | 161            | 153            | 146               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 28,68          | 29,20          | 30,14          | 27,23          | 31,40          | 27,86          | 29,60          | 30,36          | 30,10             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [25,75; 31,61] | [26,04; 32,35] | [26,81; 33,47] | [23,84; 30,63] | [27,75; 35,05] | [24,23; 31,50] | [25,76; 33,44] | [26,34; 34,38] | [26,02; 34,19]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 22             | 8              | 1              | 3              | 2              | 4              | 1              | 2              | 2                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 2,40           | 1,00           | 0,14           | 0,45           | 0,32           | 0,68           | 0,18           | 0,40           | 0,41              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [1,41; 3,39]   | [0,31; 1,69]   | [0,00; 0,41]   | [0,00; 0,97]   | [0,00; 0,77]   | [0,02; 1,35]   | [0,00; 0,54]   | [0,00; 0,95]   | [0,00; 0,98]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anzahl  | 64                     | 50             | 52             | 60             | 40             | 43             | 27             | 38             | 35             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %   | 6,98                   | 6,27           | 7,12           | 9,08           | 6,44           | 7,35           | 4,96           | 7,54           | 7,22           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %  | [5,33; 8,63]           | [4,58; 7,95]   | [5,26; 8,99]   | [6,89; 11,27]  | [4,51; 8,37]   | [5,23; 9,47]   | [3,14; 6,79]   | [5,23; 9,85]   | [4,91; 9,52]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                             | Anzahl  | 3188                   | 2871           | 2579           | 2319           | 2120           | 1972           | 1834           | 1736           | 1650           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ          | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                  | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2008-2      | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                     | Anzahl                 | 865            | 780            | 683            | 601            | 559            | 529            | 511            | 481            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | auswertbar   | Anzahl                 | 865            | 745            | 654            | 578            | 541            | 513            | 494            | 464            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 428            | 399            | 357            | 333            | 303            | 304            | 290            | 268            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | Anteil in %            | 49,48          | 53,56          | 54,59          | 57,61          | 56,01          | 59,26          | 58,70          | 57,76          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | CI Anteil in %         | [46,15; 52,81] | [49,97; 57,14] | [50,77; 58,41] | [53,58; 61,64] | [51,82; 60,19] | [55,00; 63,52] | [54,36; 63,05] | [53,26; 62,26] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 71             | 63             | 48             | 45             | 49             | 36             | 38             | 36             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | Anteil in %            | 8,21           | 8,46           | 7,34           | 7,79           | 9,06           | 7,02           | 7,69           | 7,76           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | CI Anteil in %         | [6,38; 10,04]  | [6,46; 10,46]  | [5,34; 9,34]   | [5,60; 9,97]   | [6,64; 11,48]  | [4,80; 9,23]   | [5,34; 10,04]  | [5,32; 10,20]  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 357            | 336            | 309            | 288            | 254            | 268            | 252            | 232            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | Anteil in %            | 41,27          | 45,10          | 47,25          | 49,83          | 46,95          | 52,24          | 51,01          | 50,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | CI Anteil in %         | [37,99; 44,55] | [41,53; 48,68] | [43,42; 51,08] | [45,75; 53,91] | [42,74; 51,16] | [47,92; 56,57] | [46,60; 55,42] | [45,45; 54,55] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 437            | 346            | 297            | 245            | 238            | 209            | 204            | 196            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | Anteil in %            | 50,52          | 46,44          | 45,41          | 42,39          | 43,99          | 40,74          | 41,30          | 42,24          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | CI Anteil in %         | [47,19; 53,85] | [42,86; 50,03] | [41,59; 49,23] | [38,36; 46,42] | [39,81; 48,18] | [36,48; 45,00] | [36,95; 45,64] | [37,74; 46,74] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 56             | 35             | 33             | 26             | 21             | 25             | 22             | 20             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | Anteil in %            | 6,47           | 4,70           | 5,05           | 4,50           | 3,88           | 4,87           | 4,45           | 4,31           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | CI Anteil in %         | [4,83; 8,11]   | [3,18; 6,22]   | [3,37; 6,72]   | [2,81; 6,19]   | [2,25; 5,51]   | [3,01; 6,74]   | [2,63; 6,27]   | [2,46; 6,16]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 289            | 243            | 193            | 182            | 185            | 152            | 144            | 141            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | Anteil in %            | 33,41          | 32,62          | 29,51          | 31,49          | 34,20          | 29,63          | 29,15          | 30,39          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | CI Anteil in %         | [30,27; 36,56] | [29,25; 35,99] | [26,01; 33,01] | [27,70; 35,28] | [30,19; 38,20] | [25,67; 33,58] | [25,14; 33,16] | [26,20; 34,58] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 20             | 10             | 4              | 1              | 1              | 3              | 4              | 2              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | Anteil in %            | 2,31           | 1,34           | 0,61           | 0,17           | 0,18           | 0,58           | 0,81           | 0,43           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             |  | CI Anteil in %         | [1,31; 3,31]   | [0,52; 2,17]   | [0,01; 1,21]   | [0,00; 0,51]   | [0,00; 0,55]   | [0,00; 1,25]   | [0,02; 1,60]   | [0,00; 1,03]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | 72             | 58             | 67             | 36             | 31             | 29             | 34             | 33             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in % |  | 8,32                   | 7,79           | 10,24          | 6,23           | 5,73           | 5,65           | 6,88           | 7,11           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | CI Anteil in %   | [6,48; 10,17]          | [5,86; 9,71]   | [7,92; 12,57]  | [4,26; 8,20]   | [3,77; 7,69]   | [3,65; 7,65]   | [4,65; 9,12]   | [4,77; 9,45]   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|             | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | <b>2893</b>    | <b>2495</b>    | <b>2153</b>    | <b>1904</b>    | <b>1738</b>    | <b>1605</b>    | <b>1505</b>    | <b>1412</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                  | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>                                     | Anzahl                 | 584               | 529               | 478               | 432               | 401               | 376               | 355               | 340               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar   | Anzahl                 | 584               | 511               | 459               | 413               | 388               | 364               | 347               | 328               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 291               | 294               | 257               | 220               | 222               | 200               | 194               | 194               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 49,83             | 57,53             | 55,99             | 53,27             | 57,22             | 54,95             | 55,91             | 59,15             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [45,77;<br>53,89] | [53,24;<br>61,82] | [51,45;<br>60,54] | [48,45;<br>58,09] | [52,29;<br>62,15] | [49,83;<br>60,06] | [50,68;<br>61,14] | [53,82;<br>64,47] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 35                | 49                | 37                | 30                | 29                | 28                | 28                | 20                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 6,00              | 9,59              | 8,06              | 7,26              | 7,47              | 7,69              | 8,07              | 6,10              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [4,07; 7,93]      | [7,03;<br>12,14]  | [5,57;<br>10,55]  | [4,76; 9,77]      | [4,85;<br>10,09]  | [4,95;<br>10,43]  | [5,20;<br>10,94]  | [3,50; 8,69]      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 256               | 245               | 220               | 190               | 193               | 172               | 166               | 174               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 43,91             | 47,95             | 47,93             | 46,00             | 49,74             | 47,25             | 47,84             | 53,05             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [39,88;<br>47,94] | [43,61;<br>52,28] | [43,35;<br>52,51] | [41,19;<br>50,82] | [44,76;<br>54,72] | [42,12;<br>52,39] | [42,58;<br>53,10] | [47,64;<br>58,46] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 292               | 217               | 202               | 193               | 166               | 164               | 153               | 134               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 50,00             | 42,47             | 44,01             | 46,73             | 42,78             | 45,05             | 44,09             | 40,85             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [45,94;<br>54,06] | [38,18;<br>46,76] | [39,46;<br>48,55] | [41,91;<br>51,55] | [37,85;<br>47,71] | [39,94;<br>50,17] | [38,86;<br>49,32] | [35,53;<br>46,18] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 42                | 29                | 25                | 26                | 19                | 15                | 12                | 16                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 7,20              | 5,68              | 5,45              | 6,30              | 4,90              | 4,12              | 3,46              | 4,88              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [5,10; 9,30]      | [3,67; 7,68]      | [3,37; 7,53]      | [3,95; 8,64]      | [2,75; 7,05]      | [2,08; 6,17]      | [1,53; 5,38]      | [2,54; 7,21]      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 189               | 148               | 141               | 134               | 124               | 125               | 115               | 95                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 32,42             | 28,96             | 30,72             | 32,45             | 31,96             | 34,34             | 33,14             | 28,96             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [28,62;<br>36,22] | [25,03;<br>32,90] | [26,49;<br>34,94] | [27,92;<br>36,97] | [27,31;<br>36,60] | [29,46;<br>39,23] | [28,18;<br>38,10] | [24,05;<br>33,88] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 8                 | 5                 | 6                 | 5                 | 3                 | 1                 | 3                 | 2                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 1,37              | 0,98              | 1,31              | 1,21              | 0,77              | 0,27              | 0,86              | 0,61              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [0,43; 2,32]      | [0,12; 1,83]      | [0,27; 2,35]      | [0,15; 2,27]      | [0,00; 1,65]      | [0,00; 0,81]      | [0,00; 1,84]      | [0,00; 1,45]      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie":<br>sys>160 oder dia>100 | Anzahl   | 53                     | 35                | 30                | 28                | 20                | 23                | 23                | 21                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Anteil in %  | 9,09                   | 6,85              | 6,54              | 6,78              | 5,15              | 6,32              | 6,63              | 6,40              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI Anteil in %   | [6,76;<br>11,43]       | [4,66; 9,04]      | [4,27; 8,80]      | [4,35; 9,21]      | [2,95; 7,36]      | [3,82; 8,82]      | [4,01; 9,25]      | [3,75; 9,06]      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                                | <b>Anzahl</b>  | <b>2099</b>            | <b>1848</b>       | <b>1615</b>       | <b>1424</b>       | <b>1290</b>       | <b>1198</b>       | <b>1124</b>       | <b>1060</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                            | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-1                        | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 920               | 807               | 719               | 635               | 581               | 539               | 502               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | auswertbar   | Anzahl                 | 920               | 783               | 694               | 616               | 568               | 521               | 488               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 444               | 418               | 387               | 329               | 320               | 284               | 264               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anteil in %            | 48,26             | 53,38             | 55,76             | 53,41             | 56,34             | 54,51             | 54,10             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | [45,03;<br>51,49] | [49,89;<br>56,88] | [52,07;<br>59,46] | [49,47;<br>57,35] | [52,26;<br>60,42] | [50,23;<br>58,79] | [49,67;<br>58,52] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anzahl                 | 71                | 65                | 71                | 51                | 38                | 47                | 38                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | 7,72              | 8,30              | 10,23             | 8,28              | 6,69              | 9,02              | 7,79              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | CI Anteil in %         | [5,99; 9,44]      | [6,37;<br>10,24]  | [7,97;<br>12,49]  | [6,10;<br>10,46]  | [4,63; 8,75]      | [6,56;<br>11,48]  | [5,41;<br>10,17]  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 373               | 353               | 316               | 278               | 282               | 237               | 226               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anteil in %            | 40,54             | 45,08             | 45,53             | 45,13             | 49,65             | 45,49             | 46,31             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [37,37;<br>43,72] | [41,60;<br>48,57] | [41,83;<br>49,24] | [41,20;<br>49,06] | [45,53;<br>53,76] | [41,21;<br>49,77] | [41,88;<br>50,74] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anzahl                 | 476               | 365               | 307               | 287               | 248               | 237               | 224               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 51,74             | 46,62             | 44,24             | 46,59             | 43,66             | 45,49             | 45,90             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | CI Anteil in %         | [48,51;<br>54,97] | [43,12;<br>50,11] | [40,54;<br>47,93] | [42,65;<br>50,53] | [39,58;<br>47,74] | [41,21;<br>49,77] | [41,48;<br>50,33] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 60                | 49                | 29                | 26                | 24                | 13                | 17                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anteil in %            | 6,52              | 6,26              | 4,18              | 4,22              | 4,23              | 2,50              | 3,48              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | [4,93; 8,12]      | [4,56; 7,96]      | [2,69; 5,67]      | [2,63; 5,81]      | [2,57; 5,88]      | [1,15; 3,84]      | [1,86; 5,11]      |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anzahl                 | 331               | 248               | 233               | 215               | 190               | 184               | 172               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | männliche Patienten insgesamt  | Anteil in %            | 35,98             | 31,67             | 33,57             | 34,90             | 33,45             | 35,32             | 35,25             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | CI Anteil in %         | [32,88;<br>39,08] | [28,41;<br>34,93] | [30,06;<br>37,09] | [31,14;<br>38,67] | [29,57;<br>37,33] | [31,21;<br>39,42] | [31,00;<br>39,49] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | männliche Patienten insgesamt  | Anzahl                 | 16                | 8                 | 7                 | 6                 | 3                 | 4                 | 5                 |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anteil in %            | 1,74              | 1,02              | 1,01              | 0,97              | 0,53              | 0,77              | 1,02              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | männliche Patienten insgesamt  | CI Anteil in %         | [0,89; 2,58]      | [0,32; 1,73]      | [0,26; 1,75]      | [0,20; 1,75]      | [0,00; 1,12]      | [0,02; 1,52]      | [0,13; 1,92]      |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anzahl                        |  | 69                     | 60                | 38                | 40                | 31                | 36                | 30                |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | Anteil in %  | 7,50                   | 7,66              | 5,48              | 6,49              | 5,46              | 6,91              | 6,15              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | CI Anteil in %   | [5,80; 9,20]           | [5,80; 9,53]      | [3,78; 7,17]      | [4,55; 8,44]      | [3,59; 7,33]      | [4,73; 9,09]      | [4,01; 8,28]      |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | Anzahl   | 3215                   | 2781              | 2408              | 2143              | 1971              | 1823              | 1697              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                         | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 646            | 581            | 524            | 475            | 438            | 401            | 369            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar  | Anzahl                 | 646            | 562            | 507            | 458            | 418            | 385            | 356            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 337            | 301            | 263            | 255            | 233            | 223            | 204            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 52,17          | 53,56          | 51,87          | 55,68          | 55,74          | 57,92          | 57,30          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [48,31; 56,02] | [49,43; 57,69] | [47,52; 56,23] | [51,12; 60,23] | [50,97; 60,51] | [52,98; 62,86] | [52,16; 62,45] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 42             | 39             | 33             | 32             | 30             | 22             | 19             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 6,50           | 6,94           | 6,51           | 6,99           | 7,18           | 5,71           | 5,34           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [4,60; 8,40]   | [4,84; 9,04]   | [4,36; 8,66]   | [4,65; 9,32]   | [4,70; 9,65]   | [3,39; 8,04]   | [3,00; 7,68]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 295            | 262            | 230            | 223            | 203            | 201            | 185            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 45,67          | 46,62          | 45,36          | 48,69          | 48,56          | 52,21          | 51,97          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [41,82; 49,51] | [42,49; 50,75] | [41,03; 49,70] | [44,11; 53,27] | [43,77; 53,36] | [47,21; 57,20] | [46,77; 57,16] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 309            | 261            | 244            | 203            | 185            | 162            | 152            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 47,83          | 46,44          | 48,13          | 44,32          | 44,26          | 42,08          | 42,70          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [43,98; 51,69] | [42,31; 50,57] | [43,77; 52,48] | [39,77; 48,88] | [39,49; 49,03] | [37,14; 47,02] | [37,55; 47,84] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 37             | 28             | 22             | 19             | 15             | 12             | 12             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 5,73           | 4,98           | 4,34           | 4,15           | 3,59           | 3,12           | 3,37           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [3,93; 7,52]   | [3,18; 6,78]   | [2,56; 6,11]   | [2,32; 5,98]   | [1,80; 5,37]   | [1,38; 4,85]   | [1,49; 5,25]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 213            | 181            | 183            | 151            | 143            | 129            | 113            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 32,97          | 32,21          | 36,09          | 32,97          | 34,21          | 33,51          | 31,74          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [29,34; 36,60] | [28,34; 36,07] | [31,91; 40,28] | [28,66; 37,28] | [29,66; 38,76] | [28,79; 38,23] | [26,90; 36,58] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 7              | 7              | 5              | 2              | 1              | 2              | 6              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 1,08           | 1,25           | 0,99           | 0,44           | 0,24           | 0,52           | 1,69           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [0,28; 1,88]   | [0,33; 2,16]   | [0,13; 1,85]   | [0,00; 1,04]   | [0,00; 0,71]   | [0,00; 1,24]   | [0,35; 3,02]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100 | Anzahl  | 52                     | 45             | 34             | 31             | 26             | 19             | 21             |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %   | 8,05                   | 8,01           | 6,71           | 6,77           | 6,22           | 4,94           | 5,90           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %  | [5,95; 10,15]          | [5,76; 10,25]  | [4,53; 8,89]   | [4,47; 9,07]   | [3,90; 8,54]   | [2,77; 7,10]   | [3,45; 8,35]   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2420           | 2074           | 1813           | 1629           | 1496           | 1367           | 1268           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 752               | 658               | 592               | 518               | 474               | 442               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | 752               | 641               | 565               | 493               | 457               | 429               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 387               | 341               | 323               | 272               | 262               | 244               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 51,46             | 53,20             | 57,17             | 55,17             | 57,33             | 56,88             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [47,89;<br>55,04] | [49,33;<br>57,06] | [53,08;<br>61,25] | [50,78;<br>59,57] | [52,79;<br>61,87] | [52,18;<br>61,57] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | 57                | 48                | 49                | 38                | 31                | 30                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 7,59              | 7,49              | 8,67              | 7,71              | 6,78              | 6,99              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [5,69; 9,49]      | [5,45; 9,53]      | [6,35;<br>11,00]  | [5,35;<br>10,06]  | [4,48; 9,09]      | [4,58; 9,41]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | 330               | 293               | 274               | 234               | 231               | 214               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 43,94             | 45,71             | 48,50             | 47,46             | 50,55             | 49,88             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [40,39;<br>47,49] | [41,85;<br>49,57] | [44,37;<br>52,62] | [43,05;<br>51,88] | [45,96;<br>55,14] | [45,15;<br>54,62] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 364               | 300               | 242               | 221               | 195               | 185               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 48,40             | 46,80             | 42,83             | 44,83             | 42,67             | 43,12             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [44,83;<br>51,98] | [42,94;<br>50,67] | [38,75;<br>46,92] | [40,43;<br>49,22] | [38,13;<br>47,21] | [38,43;<br>47,82] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 45                | 32                | 28                | 20                | 24                | 21                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 5,99              | 4,99              | 4,96              | 4,06              | 5,25              | 4,90              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [4,29; 7,69]      | [3,30; 6,68]      | [3,16; 6,75]      | [2,31; 5,80]      | [3,20; 7,30]      | [2,85; 6,94]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 236               | 213               | 172               | 159               | 136               | 131               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 31,42             | 33,23             | 30,44             | 32,25             | 29,76             | 30,54             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [28,10;<br>34,75] | [29,58;<br>36,88] | [26,64;<br>34,24] | [28,12;<br>36,38] | [25,56;<br>33,96] | [26,17;<br>34,90] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 14                | 4                 | 2                 | 4                 | 3                 | 3                 |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 1,86              | 0,62              | 0,35              | 0,81              | 0,66              | 0,70              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,90; 2,83]      | [0,01; 1,23]      | [0,00; 0,84]      | [0,02; 1,60]      | [0,00; 1,40]      | [0,00; 1,49]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anzahl   | 69                     | 51                | 40                | 38                | 32                | 30                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 9,19                   | 7,96              | 7,08              | 7,71              | 7,00              | 6,99              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [7,12;<br>11,26]       | [5,86;<br>10,05]  | [4,96; 9,20]      | [5,35;<br>10,06]  | [4,66; 9,34]      | [4,58; 9,41]      |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                 | 2729              | 2303              | 1970              | 1730              | 1565              | 1452              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                         | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 570               | 506               | 455               | 420               | 390               | 368               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar  | Anzahl                 | 570               | 490               | 439               | 409               | 379               | 355               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 312               | 285               | 252               | 240               | 216               | 220               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 54,74             | 58,16             | 57,40             | 58,68             | 56,99             | 61,97             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [50,65;<br>58,83] | [53,79;<br>62,54] | [52,77;<br>62,03] | [53,90;<br>63,46] | [52,00;<br>61,98] | [56,91;<br>67,03] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 53                | 45                | 40                | 33                | 31                | 33                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 9,30              | 9,18              | 9,11              | 8,07              | 8,18              | 9,30              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [6,91;<br>11,68]  | [6,62;<br>11,74]  | [6,42;<br>11,81]  | [5,43;<br>10,71]  | [5,42;<br>10,94]  | [6,27;<br>12,32]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 259               | 240               | 212               | 207               | 185               | 187               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 45,44             | 48,98             | 48,29             | 50,61             | 48,81             | 52,68             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [41,35;<br>49,53] | [44,55;<br>53,41] | [43,61;<br>52,97] | [45,76;<br>55,46] | [43,77;<br>53,85] | [47,47;<br>57,88] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 258               | 205               | 187               | 169               | 163               | 135               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 45,26             | 41,84             | 42,60             | 41,32             | 43,01             | 38,03             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [41,17;<br>49,35] | [37,46;<br>46,21] | [37,97;<br>47,23] | [36,54;<br>46,10] | [38,02;<br>48,00] | [32,97;<br>43,09] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 28                | 27                | 24                | 15                | 21                | 17                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 4,91              | 5,51              | 5,47              | 3,67              | 5,54              | 4,79              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [3,14; 6,69]      | [3,49; 7,53]      | [3,34; 7,60]      | [1,84; 5,49]      | [3,23; 7,85]      | [2,56; 7,01]      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 176               | 145               | 119               | 125               | 110               | 97                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 30,88             | 29,59             | 27,11             | 30,56             | 29,02             | 27,32             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [27,08;<br>34,67] | [25,55;<br>33,64] | [22,94;<br>31,27] | [26,09;<br>35,03] | [24,45;<br>33,60] | [22,68;<br>31,97] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 8                 | 5                 | 2                 | 5                 | 3                 | 3                 |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %  |   | 1,40                   | 1,02              | 0,46              | 1,22              | 0,79              | 0,85              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %   |   | [0,44; 2,37]           | [0,13; 1,91]      | [0,00; 1,09]      | [0,16; 2,29]      | [0,00; 1,68]      | [0,00; 1,80]      |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100 | Anzahl  | 46                     | 28                | 42                | 24                | 29                | 18                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %   | 8,07                   | 5,71              | 9,57              | 5,87              | 7,65              | 5,07              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %  | [5,83;<br>10,31]       | [3,66; 7,77]      | [6,81;<br>12,32]  | [3,59; 8,15]      | [4,97;<br>10,33]  | [2,78; 7,36]      |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                                       | <b>Anzahl</b>   | <b>2127</b>            | <b>1839</b>       | <b>1616</b>       | <b>1458</b>       | <b>1328</b>       | <b>1245</b>       |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                            | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                     | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-1                        | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 871               | 757               | 669               | 615               | 568               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | auswertbar  | Anzahl                 | 871               | 729               | 642               | 597               | 552               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 454               | 426               | 377               | 351               | 310               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | Anteil in %            | 52,12             | 58,44             | 58,72             | 58,79             | 56,16             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | [48,80;<br>55,44] | [54,86;<br>62,02] | [54,91;<br>62,53] | [54,84;<br>62,75] | [52,02;<br>60,30] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | Anzahl                 | 67                | 64                | 51                | 54                | 41                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | 7,69              | 8,78              | 7,94              | 9,05              | 7,43              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | CI Anteil in %         | [5,92; 9,46]      | [6,72;<br>10,83]  | [5,85;<br>10,04]  | [6,74;<br>11,35]  | [5,24; 9,62]      |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 387               | 362               | 326               | 297               | 269               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | Anteil in %            | 44,43             | 49,66             | 50,78             | 49,75             | 48,73             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [41,13;<br>47,73] | [46,03;<br>53,29] | [46,91;<br>54,65] | [45,73;<br>53,76] | [44,56;<br>52,91] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | Anzahl                 | 417               | 303               | 265               | 246               | 242               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 47,88             | 41,56             | 41,28             | 41,21             | 43,84             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | CI Anteil in %         | [44,56;<br>51,20] | [37,98;<br>45,14] | [37,47;<br>45,09] | [37,25;<br>45,16] | [39,70;<br>47,98] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 63                | 34                | 37                | 25                | 26                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | Anteil in %            | 7,23              | 4,66              | 5,76              | 4,19              | 4,71              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | [5,51; 8,95]      | [3,13; 6,20]      | [3,96; 7,57]      | [2,58; 5,80]      | [2,94; 6,48]      |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | Anzahl                 | 266               | 216               | 182               | 176               | 170               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | männliche Patienten insgesamt   | Anteil in %            | 30,54             | 29,63             | 28,35             | 29,48             | 30,80             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |   | CI Anteil in %         | [27,48;<br>33,60] | [26,31;<br>32,95] | [24,86;<br>31,84] | [25,82;<br>33,14] | [26,94;<br>34,65] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | männliche Patienten insgesamt   | Anzahl                 | 16                | 10                | 7                 | 2                 | 6                 |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %                   |   | 1,84                   | 1,37              | 1,09              | 0,34              | 1,09              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | CI Anteil in %  | [0,94; 2,73]           | [0,53; 2,22]      | [0,29; 1,89]      | [0,00; 0,80]      | [0,22; 1,95]      |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Anzahl  | 72                     | 43                | 39                | 43                | 40                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | Anteil in %   | 8,27                   | 5,90              | 6,07              | 7,20              | 7,25              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | CI Anteil in %  | [6,44;<br>10,10]       | [4,19; 7,61]      | [4,23; 7,92]      | [5,13; 9,28]      | [5,08; 9,41]      |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | Anzahl  | 3025                   | 2538              | 2206              | 1972              | 1813              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 564               | 485               | 424               | 385               | 358               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | 564               | 470               | 407               | 373               | 342               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 298               | 254               | 241               | 201               | 209               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 52,84             | 54,04             | 59,21             | 53,89             | 61,11             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [48,71;<br>56,96] | [49,53;<br>58,55] | [54,43;<br>63,99] | [48,82;<br>58,95] | [55,94;<br>66,29] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | 39                | 36                | 38                | 29                | 27                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 6,93              | 7,66              | 9,34              | 7,77              | 7,89              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [4,83; 9,03]      | [5,25;<br>10,07]  | [6,51;<br>12,17]  | [5,05;<br>10,50]  | [5,03;<br>10,76]  |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | 259               | 218               | 203               | 172               | 182               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 46,00             | 46,38             | 49,88             | 46,11             | 53,22             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [41,88;<br>50,12] | [41,87;<br>50,90] | [45,01;<br>54,74] | [41,05;<br>51,18] | [47,92;<br>58,51] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 265               | 216               | 166               | 172               | 133               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 46,99             | 45,96             | 40,79             | 46,11             | 38,89             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [42,86;<br>51,11] | [41,45;<br>50,47] | [36,01;<br>45,57] | [41,05;<br>51,18] | [33,71;<br>44,06] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 37                | 31                | 14                | 15                | 11                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 6,57              | 6,60              | 3,44              | 4,02              | 3,22              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [4,52; 8,62]      | [4,35; 8,84]      | [1,67; 5,21]      | [2,02; 6,02]      | [1,34; 5,09]      |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 175               | 154               | 122               | 139               | 107               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 31,08             | 32,77             | 29,98             | 37,27             | 31,29             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [27,26;<br>34,91] | [28,52;<br>37,01] | [25,52;<br>34,43] | [32,35;<br>42,18] | [26,37;<br>36,21] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 7                 | 6                 | 4                 | 1                 | 1                 |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 1,24              | 1,28              | 0,98              | 0,27              | 0,29              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,33; 2,16]      | [0,26; 2,29]      | [0,02; 1,94]      | [0,00; 0,79]      | [0,00; 0,87]      |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anzahl   | 46                     | 25                | 26                | 17                | 14                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 8,17                   | 5,32              | 6,39              | 4,56              | 4,09              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [5,91;<br>10,44]       | [3,29; 7,35]      | [4,01; 8,77]      | [2,44; 6,68]      | [1,99; 6,20]      |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | <b>2174</b>       | <b>1850</b>       | <b>1591</b>       | <b>1428</b>       | <b>1299</b>       |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                            | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2                        | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 884               | 767               | 672               | 614               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | auswertbar   | Anzahl                 | 884               | 748               | 653               | 597               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 462               | 439               | 390               | 337               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anteil in %            | 52,26             | 58,69             | 59,72             | 56,45             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | [48,97;<br>55,56] | [55,16;<br>62,22] | [55,96;<br>63,49] | [52,47;<br>60,43] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anzahl                 | 78                | 68                | 61                | 61                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | 8,82              | 9,09              | 9,34              | 10,22             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | CI Anteil in %         | [6,95;<br>10,69]  | [7,03;<br>11,15]  | [7,11;<br>11,58]  | [7,79;<br>12,65]  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 384               | 371               | 329               | 276               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anteil in %            | 43,44             | 49,60             | 50,38             | 46,23             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [40,17;<br>46,71] | [46,01;<br>53,18] | [46,54;<br>54,22] | [42,23;<br>50,23] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anzahl                 | 422               | 309               | 263               | 260               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 47,74             | 41,31             | 40,28             | 43,55             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | CI Anteil in %         | [44,44;<br>51,03] | [37,78;<br>44,84] | [36,51;<br>44,04] | [39,57;<br>47,53] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 59                | 47                | 36                | 33                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anteil in %            | 6,67              | 6,28              | 5,51              | 5,53              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | [5,03; 8,32]      | [4,54; 8,02]      | [3,76; 7,26]      | [3,69; 7,36]      |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | Anzahl                 | 280               | 205               | 179               | 183               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | männliche Patienten insgesamt  | Anteil in %            | 31,67             | 27,41             | 27,41             | 30,65             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               |  | CI Anteil in %         | [28,61;<br>34,74] | [24,21;<br>30,61] | [23,99;<br>30,84] | [26,95;<br>34,35] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | Anzahl   | 11                     | 8                 | 10                | 9                 |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Anteil in %  | 1,24                   | 1,07              | 1,53              | 1,51              |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | CI Anteil in %   | [0,51; 1,98]           | [0,33; 1,81]      | [0,59; 2,47]      | [0,53; 2,49]      |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | Anzahl   | 72                     | 49                | 38                | 35                |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt | Anteil in %  | 8,14                   | 6,55              | 5,82              | 5,86              |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                               | CI Anteil in %   | [6,34; 9,95]           | [4,78; 8,33]      | [4,02; 7,62]      | [3,98; 7,75]      |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt |  | Anzahl                 | 3086              | 2626              | 2248              | 2023              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                         | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 655            | 578            | 516            | 478            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar  | Anzahl                 | 655            | 562            | 500            | 462            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 368            | 318            | 298            | 285            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 56,18          | 56,58          | 59,60          | 61,69          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [52,38; 59,99] | [52,48; 60,69] | [55,29; 63,91] | [57,25; 66,13] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | 48             | 40             | 40             | 42             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 7,33           | 7,12           | 8,00           | 9,09           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [5,33; 9,33]   | [4,99; 9,25]   | [5,62; 10,38]  | [6,47; 11,72]  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | 320            | 278            | 258            | 243            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 48,85          | 49,47          | 51,60          | 52,60          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [45,02; 52,69] | [45,33; 53,60] | [47,22; 55,98] | [48,04; 57,16] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 287            | 244            | 202            | 177            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 43,82          | 43,42          | 40,40          | 38,31          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [40,01; 47,62] | [39,31; 47,52] | [36,09; 44,71] | [33,87; 42,75] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 29             | 24             | 20             | 13             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 4,43           | 4,27           | 4,00           | 2,81           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [2,85; 6,00]   | [2,60; 5,94]   | [2,28; 5,72]   | [1,30; 4,32]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 205            | 185            | 140            | 124            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 31,30          | 32,92          | 28,00          | 26,84          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [27,74; 34,85] | [29,03; 36,81] | [24,06; 31,94] | [22,79; 30,88] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 8              | 5              | 4              | 6              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %  |   | 1,22                   | 0,89           | 0,80           | 1,30           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %   |   | [0,38; 2,06]           | [0,11; 1,67]   | [0,02; 1,58]   | [0,27; 2,33]   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100 | Anzahl  | 45                     | 30             | 38             | 34             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %   | 6,87                   | 5,34           | 7,60           | 7,36           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %  | [4,93; 8,81]           | [3,48; 7,20]   | [5,27; 9,93]   | [4,98; 9,74]   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                                       | <b>Anzahl</b>   | <b>2312</b>            | <b>2021</b>    | <b>1768</b>    | <b>1574</b>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 940               | 818               | 710               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 | 940               | 799               | 683               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 480               | 415               | 365               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            | 51,06             | 51,94             | 53,44             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | [47,87;<br>54,26] | [48,47;<br>55,41] | [49,70;<br>57,18] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anzahl                 | 80                | 72                | 62                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | 8,51              | 9,01              | 9,08              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         | [6,73;<br>10,30]  | [7,02;<br>11,00]  | [6,92;<br>11,23]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 400               | 343               | 303               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            | 42,55             | 42,93             | 44,36             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [39,39;<br>45,72] | [39,49;<br>46,36] | [40,63;<br>48,09] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anzahl                 | 460               | 384               | 318               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 48,94             | 48,06             | 46,56             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         | [45,74;<br>52,13] | [44,59;<br>51,53] | [42,82;<br>50,30] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 65                | 48                | 33                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            | 6,91              | 6,01              | 4,83              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | [5,29; 8,54]      | [4,36; 7,66]      | [3,22; 6,44]      |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anzahl                 | 295               | 269               | 238               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | männliche Patienten insgesamt  | Anteil in %            | 31,38             | 33,67             | 34,85             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         | [28,41;<br>34,35] | [30,39;<br>36,95] | [31,27;<br>38,42] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt        | Anzahl   | 20                     | 11                | 6                 |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %  | 2,13                   | 1,38              | 0,88              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt        | CI Anteil in %   | [1,20; 3,05]           | [0,57; 2,19]      | [0,18; 1,58]      |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anzahl   | 80                     | 56                | 41                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| männliche Patienten insgesamt        | Anteil in %  | 8,51                   | 7,01              | 6,00              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %   | [6,73;<br>10,30]       | [5,24; 8,78]      | [4,22; 7,79]      |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>männliche Patienten insgesamt</b> |  | <b>Anzahl</b>          | <b>3146</b>       | <b>2666</b>       | <b>2269</b>       |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 633               | 580               | 510               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar   | Anzahl                 | 633               | 561               | 494               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 352               | 326               | 311               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 55,61             | 58,11             | 62,96             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [51,73;<br>59,48] | [54,02;<br>62,20] | [58,69;<br>67,22] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | 41                | 45                | 40                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 6,48              | 8,02              | 8,10              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [4,56; 8,40]      | [5,77;<br>10,27]  | [5,69;<br>10,51]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | 311               | 281               | 271               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 49,13             | 50,09             | 54,86             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [45,23;<br>53,03] | [45,95;<br>54,23] | [50,47;<br>59,25] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 281               | 235               | 183               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 44,39             | 41,89             | 37,04             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [40,52;<br>48,27] | [37,80;<br>45,98] | [32,78;<br>41,31] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 47                | 31                | 24                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 7,42              | 5,53              | 4,86              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [5,38; 9,47]      | [3,63; 7,42]      | [2,96; 6,76]      |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 175               | 163               | 130               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | Anteil in %            | 27,65             | 29,06             | 26,32             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |  | CI Anteil in %         | [24,16;<br>31,13] | [25,29;<br>32,82] | [22,43;<br>30,20] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100 | Anzahl   | 7                      | 5                 | 2                 |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Anteil in %  | 1,11                   | 0,89              | 0,40              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI Anteil in %   | [0,29; 1,92]           | [0,11; 1,67]      | [0,00; 0,97]      |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100  | Anzahl   | 52                     | 36                | 27                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Anteil in %  | 8,21                   | 6,42              | 5,47              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI Anteil in %   | [6,07;<br>10,36]       | [4,39; 8,45]      | [3,46; 7,47]      |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | <b>2382</b>       | <b>2091</b>       | <b>1809</b>       |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                         | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 852               | 763               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | 852               | 730               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 418               | 407               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 49,06             | 55,75             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | CI Anteil in %         | [45,70;<br>52,42] | [52,15;<br>59,36] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anzahl                 | 55                | 62                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anteil in %            | 6,46              | 8,49              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [4,80; 8,11]      | [6,47;<br>10,52]  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 363               | 345               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 42,61             | 47,26             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | CI Anteil in %         | [39,28;<br>45,93] | [43,64;<br>50,88] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anzahl                 | 434               | 323               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anteil in %            | 50,94             | 44,25             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [47,58;<br>54,30] | [40,64;<br>47,85] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 70                | 39                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            | 8,22              | 5,34              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | CI Anteil in %         | [6,37;<br>10,06]  | [3,71; 6,97]      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anzahl                 | 283               | 227               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anteil in %            | 33,22             | 31,10             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         | [30,05;<br>36,38] | [27,74;<br>34,46] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl  | 14                     | 5                 |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Anteil in %   | 1,64                   | 0,68              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | [0,79; 2,50]           | [0,09; 1,28]      |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | Anzahl  | 67                     | 52                |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | 7,86                   | 7,12              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI Anteil in %  | [6,06; 9,67]           | [5,26; 8,99]      |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | <i>Anzahl</i>   | 3031                   | 2602              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                            | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 614               | 547               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | 614               | 523               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 330               | 298               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | 53,75             | 56,98             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | [49,80;<br>57,69] | [52,73;<br>61,23] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | 47                | 44                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | 7,65              | 8,41              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | [5,55; 9,76]      | [6,03;<br>10,79]  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 283               | 254               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | 46,09             | 48,57             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [42,15;<br>50,04] | [44,28;<br>52,85] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | 284               | 225               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 46,25             | 43,02             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | [42,31;<br>50,20] | [38,77;<br>47,27] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 24                | 24                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | 3,91              | 4,59              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | [2,37; 5,44]      | [2,79; 6,38]      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | 187               | 154               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | weibliche Patienten insgesamt  | Anteil in %            | 30,46             | 29,45             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | [26,81;<br>34,10] | [25,54;<br>33,36] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | 11                     | 6                 |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | 1,79                   | 1,15              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | [0,74; 2,84]           | [0,23; 2,06]      |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | 62                     | 41                |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | 10,10                  | 7,84              |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | [7,71;<br>12,48]       | [5,53;<br>10,15]  |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | <b>2272</b>       | <b>1963</b>       |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                           | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl                 | 971               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar  | Anzahl                 | 971               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | 444               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 45,73             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 " <i>normal ohne Therapie</i> ":<br>sys<140 und dia<90                          | CI Anteil in %         | [42,59;<br>48,86] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anzahl                 | 78                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 " <i>normal mit Therapie</i> ":<br>sys<140 und dia<90                           | Anteil in %            | 8,05              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [6,34; 9,76]      |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | 366               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 37,77             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | [34,72;<br>40,83] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anzahl                 | 525               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | 54,07             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [50,93;<br>57,20] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | 78                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 8,05              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | [6,34; 9,76]      |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anzahl                 | 332               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anteil in %            | 34,26             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [31,27;<br>37,25] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl  | 23                     |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %   | 2,37                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100                 | CI Anteil in %  | [1,41; 3,33]           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anzahl  | 92                     |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100                  | Anteil in %   | 9,49                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %  | [7,65;<br>11,34]       |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3423              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl                 | 676               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | 676               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | 359               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 53,11             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [49,34;<br>56,87] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 1 " <i>normal ohne Therapie</i> ":<br>sys<140 und dia<90                       | Anzahl                 | 60                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 8,88              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [6,73;<br>11,02]  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 2 " <i>normal mit Therapie</i> ":<br>sys<140 und dia<90                        | Anzahl                 | 299               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 44,23             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [40,48;<br>47,98] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | 317               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 46,89             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [43,13;<br>50,66] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | 30                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 4,44              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [2,88; 5,99]      |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | 211               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 31,21             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [27,72;<br>34,71] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | 11                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 1,63              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [0,67; 2,58]      |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | 65                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | Anteil in %            | 9,62              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |  | CI Anteil in %         | [7,39;<br>11,84]  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | <b>2494</b>       |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Tabelle 3.1.4b Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation**

\* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestufteten Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc..

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                    | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 2005-1  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                      | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                      | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| auswertbar  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                          | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                           | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100               | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie":<br>sys>160 oder dia>100                | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 12 insgesamt  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>      | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 12 insgesamt  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | männliche Patienten < 6 insgesamt  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>              | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %   |  |  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 6 insgesamt  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |



| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| 2005-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 18 insgesamt  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>      | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr   | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|----|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                     | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>  |                        | <b>Anzahl</b> | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anzahl                 | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                      | Anteil in %            | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>  |                        | <b>Anzahl</b> | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 6 insgesamt   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>       | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 6 insgesamt   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)          | Beitritts-<br>halbjahr                                 | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| 2006-1  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                            | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 18 insgesamt  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                     | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt  |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)          | Beitritts-<br>halbjahr                                 | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                            | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 12 insgesamt  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                     | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 12 insgesamt  |   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 6 insgesamt   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>       | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 6 insgesamt   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 2006-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| auswertbar  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|----|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |



| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <i>männliche Patienten &lt; 6 insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <i>weibliche Patienten &lt; 6 insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| 2007-1  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 18 insgesamt  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>      | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  | männliche Patienten < 12 insgesamt   | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|  |  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %   |  |  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 12 insgesamt   |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>männliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)          | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 2007-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                            | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>                                    | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                            | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| auswertbar  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90                          | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90                           | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100 | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100               | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100                | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>                                    | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | weibliche Kollektivmitglieder < 12 insges.  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| Anteil in %   |   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| weibliche Patienten < 12 insgesamt  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | <b>männliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>       | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   |   | <b>Anzahl</b>   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| 2008-1  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>  |   | <b>Anzahl</b>  | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>      | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)                     | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| Anteil in %   |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>  |   | <b>Anzahl</b>   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |



| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>männliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|    | <b>weibliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 2008-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | weibliche Kollektivmitglieder < 18 insges.  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| Anteil in %   |   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt  |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | weibliche Kollektivmitglieder < 12 insges.  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | auswertbar  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   |   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| Anteil in %   |   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|   | CI Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| weibliche Patienten < 12 insgesamt  | Anzahl  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | weibliche Kollektivmitglieder < 6 insges.  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| Anteil in %  |  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| weibliche Patienten < 6 insgesamt  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |



| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>                                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>  |   | <b>Anzahl</b>  | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>      | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>  |   | <b>Anzahl</b>   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 6 insgesamt   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>       | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 6 insgesamt   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |



| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| 2009-2  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>                                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | männliche Patienten < 18 insgesamt  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>      | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| CI Anteil in %  |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| Anteil in %                                  |  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| CI Anteil in %                               |  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b> |  | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |
| Anteil in %                                  |  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| CI Anteil in %                               |  | --                     | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b> |  | <b>Anzahl</b>          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |

| EZ  | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                | Beitritts-<br>halbjahr                                    | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |    |    |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>                                   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | auswertbar  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |
|   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   | <b>männliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   |   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>       | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | auswertbar  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                        | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   |   | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
|   |   | Kategorie 1 "normal ohne Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- | -- |
| Anzahl  |   |   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 2 "normal mit Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht mit<br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht mit<br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |   | CI Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
|   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | -- |    |
| <b>weibliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>   |   | Anzahl  | --             | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |    |    |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2010-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Anteil in %  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Anteil in %  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   |  | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   |  | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <i>männliche Patienten &lt; 6 insgesamt</i>                      | <i>Anzahl</i>  | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>              | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <i>weibliche Patienten &lt; 6 insgesamt</i>                      | <i>Anzahl</i>  | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>männliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | <i>Anzahl</i>          | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten &lt; 18 insgesamt</b>   | <i>Anzahl</i>  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   |  | Anzahl   | --             | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |



| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | CI Anteil in %   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anzahl   | --                     | --          | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Anteil in %  | --                     | --          | --          | --</        |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2011-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | männliche Patienten < 18 insgesamt   | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CI Anteil in %   |  |  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt   |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   |  | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | <b>männliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>  | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>              | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          | --          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | Anteil in %  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| <b>weibliche Patienten &lt; 6 insgesamt</b>  |  | <b>Anzahl</b>  | --             | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2011-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | männliche Patienten < 18 insgesamt   | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CI Anteil in %   |  |  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt   |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | männliche Patienten < 12 insgesamt   | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>             | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          | --          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CI Anteil in %   |  |  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| weibliche Patienten < 12 insgesamt   |  | Anteil in %  | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | weibliche Kollektivmitglieder < 6 insges.  | Anteil in %            | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | CI Anteil in %         | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl                 | --          | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | Anteil in %  | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anzahl   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | CI Anteil in %   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anzahl   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | Anteil in %  | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anzahl   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | CI Anteil in %   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anzahl   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %  | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| weibliche Patienten < 6 insgesamt  | Anzahl   | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | --                     | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2012-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>   | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | männliche Patienten < 18 insgesamt   | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 18 insges.</b>             | Anzahl         | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl         | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)                               | Anzahl         | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anteil in %    | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90 | CI Anteil in % | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | Anzahl         | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90  | Anteil in %    | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CI Anteil in %   |  |  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | Anzahl   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| weibliche Patienten < 18 insgesamt   |  | Anteil in %  | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  |  | CI Anteil in %   | --             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |



| EZ   | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr                               | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b>   | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>männliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>  | <b>--</b>   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 12 insges.</b> | Anzahl      | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | auswertbar   | Anzahl      | --          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anzahl   | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   |  | Anteil in %  | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %                                       | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten &lt; 12 insgesamt</b>   |  | <b>Anzahl</b>  | <b>--</b>   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ | Hypertonieverlauf bei Patienten < 18 mit Hypertonie laut Anamnese (ED)                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|    | <b>männliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | männliche Patienten < 6 insgesamt  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | <b>weibliche Kollektivmitglieder &lt; 6 insges.</b>  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | auswertbar   | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)   | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 1 "normal <i>ohne</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                             | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 2 "normal <i>mit</i> Therapie":<br>sys<140 und dia<90                              | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Hypertoniker*<br>(Kategorien 3 bis 6)  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 3 "mäßig erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100 | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 4 "mäßig erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys≥140 und ≤160 oder<br>dia≥90 und ≤100  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 5 "deutlich erhöht <i>ohne</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | Kategorie 6 "deutlich erhöht <i>mit</i><br>Therapie": sys>160 oder dia>100                   | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    | weibliche Patienten < 6 insgesamt  | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|    |  | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In Tabelle 3.1.5 werden **gut eingestellte Hypertoniker (Normotoniker) im Kollektiv der Hypertoniker** im Verlauf ihre DMP-Teilnahme abgebildet. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte werden unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahlen derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist.

**Tabelle 3.1.5 Gut eingestellte Hypertoniker (Normotoniker) im Kollektiv der Hypertoniker laut Erstdokumentation (Anamnese)**

| EZ     | Gut eingestellte Hypertoniker im Kollektiv der Hypertoniker laut ED (Anamnese) | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                   |
|--------|--|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2005-1 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 128         | 122               | 109               | 98                | 93                | 87                | 84                | 81                | 76                | 75                | 72                | 67                | 65                | 64                | 63                |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 120               | 104               | 96                | 92                | 87                | 84                | 79                | 74                | 73                | 68                | 67                | 64                | 63                | 60                |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 58                | 57                | 55                | 58                | 60                | 60                | 47                | 49                | 44                | 41                | 34                | 43                | 42                | 46                |
|        |  | Anteil in %            |             | 48,33             | 54,81             | 57,29             | 63,04             | 68,97             | 71,43             | 59,49             | 66,22             | 60,27             | 60,29             | 50,75             | 67,19             | 66,67             | 76,67             |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [39,35;<br>57,31] | [45,20;<br>64,42] | [47,34;<br>67,24] | [53,13;<br>72,96] | [59,19;<br>78,74] | [61,71;<br>81,15] | [48,60;<br>70,39] | [55,37;<br>77,07] | [48,97;<br>71,58] | [48,58;<br>72,01] | [38,68;<br>62,81] | [55,59;<br>78,78] | [54,93;<br>78,40] | [65,87;<br>87,46] |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 100         | 98                | 89                | 79                | 71                | 61                | 59                | 55                | 50                | 48                | 44                | 44                | 43                | 40                | 38                |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 97                | 82                | 78                | 70                | 61                | 57                | 55                | 50                | 46                | 44                | 44                | 43                | 37                | 35                |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 36                | 44                | 39                | 36                | 27                | 34                | 27                | 26                | 20                | 23                | 27                | 26                | 19                | 20                |
|        |  | Anteil in %            |             | 37,11             | 53,66             | 50,00             | 51,43             | 44,26             | 59,65             | 49,09             | 52,00             | 43,48             | 52,27             | 61,36             | 60,47             | 51,35             | 57,14             |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [27,45;<br>46,78] | [42,80;<br>64,52] | [38,83;<br>61,17] | [39,64;<br>63,22] | [31,69;<br>56,83] | [46,80;<br>72,50] | [35,76;<br>62,42] | [38,01;<br>65,99] | [28,99;<br>57,96] | [37,34;<br>67,20] | [46,81;<br>75,92] | [45,68;<br>75,25] | [35,02;<br>67,68] | [40,51;<br>73,78] |
| 2005-2 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 991         | 935               | 853               | 793               | 747               | 709               | 678               | 651               | 626               | 602               | 569               | 554               | 526               | 499               |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 914               | 837               | 780               | 726               | 689               | 659               | 640               | 613               | 589               | 558               | 544               | 511               | 491               |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 490               | 444               | 443               | 416               | 413               | 382               | 359               | 359               | 331               | 318               | 332               | 292               | 282               |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 53,61             | 53,05             | 56,79             | 57,30             | 59,94             | 57,97             | 56,09             | 58,56             | 56,20             | 56,99             | 61,03             | 57,14             | 57,43             |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [50,38;<br>56,85] | [49,66;<br>56,43] | [53,32;<br>60,27] | [53,70;<br>60,90] | [56,28;<br>63,60] | [54,19;<br>61,74] | [52,25;<br>59,94] | [54,66;<br>62,47] | [52,19;<br>60,21] | [52,88;<br>61,10] | [56,93;<br>65,13] | [52,85;<br>61,44] | [53,06;<br>61,81] |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 753         | 698               | 636               | 593               | 565               | 536               | 517               | 494               | 476               | 455               | 447               | 433               | 416               | 407               |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 680               | 615               | 581               | 556               | 521               | 501               | 482               | 462               | 445               | 436               | 422               | 409               | 387               |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 372               | 345               | 329               | 312               | 300               | 300               | 271               | 255               | 256               | 247               | 257               | 220               | 212               |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 54,71             | 56,10             | 56,63             | 56,12             | 57,58             | 59,88             | 56,22             | 55,19             | 57,53             | 56,65             | 60,90             | 53,79             | 54,78             |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [50,96;<br>58,45] | [52,17;<br>60,02] | [52,59;<br>60,66] | [51,99;<br>60,24] | [53,33;<br>61,83] | [55,58;<br>64,18] | [51,79;<br>60,66] | [50,66;<br>59,73] | [52,93;<br>62,13] | [51,99;<br>61,31] | [56,24;<br>65,56] | [48,95;<br>58,63] | [49,82;<br>59,75] |                   |
| 2006-1 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 727         | 657               | 588               | 541               | 509               | 479               | 460               | 425               | 400               | 378               | 363               | 340               | 325               |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 646               | 577               | 519               | 494               | 469               | 445               | 411               | 395               | 373               | 353               | 333               | 314               |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 347               | 330               | 308               | 287               | 278               | 281               | 238               | 245               | 230               | 225               | 204               | 186               |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 53,72             | 57,19             | 59,34             | 58,10             | 59,28             | 63,15             | 57,91             | 62,03             | 61,66             | 63,74             | 61,26             | 59,24             |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [49,87;<br>57,56] | [53,15;<br>61,23] | [55,11;<br>63,57] | [53,74;<br>62,45] | [54,82;<br>63,73] | [58,66;<br>67,63] | [53,13;<br>62,69] | [57,23;<br>66,82] | [56,72;<br>66,60] | [58,72;<br>68,76] | [56,02;<br>66,50] | [53,79;<br>64,68] |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 568         | 518               | 461               | 424               | 396               | 380               | 365               | 350               | 322               | 307               | 292               | 282               | 263               |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 506               | 452               | 411               | 380               | 365               | 359               | 340               | 317               | 303               | 287               | 273               | 262               |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 271               | 268               | 237               | 243               | 211               | 238               | 209               | 194               | 185               | 187               | 165               | 174               |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 53,56             | 59,29             | 57,66             | 63,95             | 57,81             | 66,30             | 61,47             | 61,20             | 61,06             | 65,16             | 60,44             | 66,41             |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [49,21;<br>57,91] | [54,76;<br>63,83] | [52,88;<br>62,45] | [59,11;<br>68,78] | [52,73;<br>62,88] | [61,40;<br>71,19] | [56,29;<br>66,65] | [55,83;<br>66,57] | [55,56;<br>66,56] | [59,63;<br>70,68] | [54,63;<br>66,25] | [60,68;<br>72,14] |                   |                   |
| 2006-2 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 1037        | 955               | 871               | 806               | 765               | 720               | 672               | 639               | 609               | 571               | 543               | 519               |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 937               | 852               | 786               | 732               | 694               | 656               | 625               | 598               | 562               | 533               | 507               |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 540               | 452               | 453               | 420               | 429               | 369               | 372               | 355               | 330               | 297               | 294               |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 57,63             | 53,05             | 57,63             | 57,38             | 61,82             | 56,25             | 59,52             | 59,36             | 58,72             | 55,72             | 57,99             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [54,47;<br>60,80] | [49,70;<br>56,40] | [54,18;<br>61,09] | [53,79;<br>60,96] | [58,20;<br>65,43] | [52,45;<br>60,05] | [55,67;<br>63,37] | [55,42;<br>63,30] | [54,64;<br>62,79] | [51,50;<br>59,94] | [53,69;<br>62,29] |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 804         | 737               | 674               | 636               | 597               | 575               | 541               | 507               | 488               | 468               | 448               | 430               |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 719               | 660               | 615               | 563               | 559               | 527               | 500               | 479               | 459               | 439               | 425               |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 426               | 377               | 352               | 348               | 345               | 292               | 292               | 284               | 283               | 263               | 266               |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 59,25             | 57,12             | 57,24             | 61,81             | 61,72             | 55,41             | 58,40             | 59,29             | 61,66             | 59,91             | 62,59             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [55,65;<br>62,84] | [53,34;<br>60,90] | [53,32;<br>61,15] | [57,79;<br>65,83] | [57,68;<br>65,75] | [51,16;<br>59,66] | [54,08;<br>62,72] | [54,89;<br>63,69] | [57,20;<br>66,11] | [55,32;<br>64,50] | [57,98;<br>67,19] |                   |                   |                   |

| EZ     | Gut eingestellte Hypertoniker im Kollektiv der Hypertoniker laut ED (Anamnese) | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------|--|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-1 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 2385        | 2221              | 2026              | 1909              | 1843              | 1762              | 1670              | 1604              | 1536              | 1479              | 1417              |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 2173              | 1978              | 1851              | 1797              | 1741              | 1641              | 1576              | 1515              | 1455              | 1390              |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 1141              | 1078              | 1038              | 1037              | 977               | 943               | 891               | 933               | 847               | 824               |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 52,51             | 54,50             | 56,08             | 57,71             | 56,12             | 57,46             | 56,54             | 61,58             | 58,21             | 59,28             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [50,41;<br>54,61] | [52,30;<br>56,69] | [53,82;<br>58,34] | [55,42;<br>59,99] | [53,79;<br>58,45] | [55,07;<br>59,86] | [54,09;<br>58,98] | [59,13;<br>64,03] | [55,68;<br>60,75] | [56,70;<br>61,86] |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 1841        | 1713              | 1601              | 1505              | 1425              | 1353              | 1294              | 1235              | 1182              | 1125              | 1086              |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 1688              | 1571              | 1442              | 1389              | 1334              | 1275              | 1202              | 1154              | 1108              | 1068              |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 940               | 912               | 823               | 835               | 786               | 766               | 701               | 726               | 647               | 621               |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 55,69             | 58,05             | 57,07             | 60,12             | 58,92             | 60,08             | 58,32             | 62,91             | 58,39             | 58,15             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [53,32;<br>58,06] | [55,61;<br>60,49] | [54,52;<br>59,63] | [57,54;<br>62,69] | [56,28;<br>61,56] | [57,39;<br>62,77] | [55,53;<br>61,11] | [60,12;<br>65,70] | [55,49;<br>61,30] | [55,19;<br>61,11] |                   |                   |                   |
| 2007-2 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 1315        | 1197              | 1103              | 1015              | 922               | 859               | 820               | 775               | 736               | 703               |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 1169              | 1045              | 973               | 899               | 846               | 802               | 756               | 718               | 693               |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 653               | 572               | 565               | 528               | 476               | 450               | 470               | 419               | 405               |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 55,86             | 54,74             | 58,07             | 58,73             | 56,26             | 56,11             | 62,17             | 58,36             | 58,44             |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [53,01;<br>58,71] | [51,72;<br>57,76] | [54,97;<br>61,17] | [55,51;<br>61,95] | [52,92;<br>59,61] | [52,67;<br>59,55] | [58,71;<br>65,63] | [54,75;<br>61,96] | [54,77;<br>62,11] |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 974         | 884               | 825               | 759               | 699               | 645               | 614               | 584               | 557               | 533               |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 856               | 787               | 736               | 679               | 630               | 599               | 572               | 552               | 522               |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 481               | 453               | 417               | 407               | 388               | 373               | 358               | 340               | 304               |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 56,19             | 57,56             | 56,66             | 59,94             | 61,59             | 62,27             | 62,59             | 61,59             | 58,24             |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [52,87;<br>59,52] | [54,11;<br>61,02] | [53,08;<br>60,24] | [56,25;<br>63,63] | [57,79;<br>65,39] | [58,39;<br>66,16] | [58,62;<br>66,56] | [57,53;<br>65,66] | [54,00;<br>62,47] |                   |                   |                   |                   |
| 2008-1 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 1213        | 1079              | 991               | 879               | 815               | 752               | 691               | 655               | 631               |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 1021              | 944               | 845               | 788               | 725               | 668               | 643               | 610               |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 524               | 545               | 468               | 432               | 415               | 400               | 366               | 356               |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 51,32             | 57,73             | 55,38             | 54,82             | 57,24             | 59,88             | 56,92             | 58,36             |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [48,25;<br>54,39] | [54,58;<br>60,89] | [52,03;<br>58,74] | [51,35;<br>58,30] | [53,64;<br>60,85] | [56,16;<br>63,60] | [53,09;<br>60,75] | [54,45;<br>62,28] |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 917         | 851               | 776               | 695               | 637               | 601               | 555               | 522               | 497               |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 806               | 730               | 661               | 621               | 585               | 544               | 504               | 485               |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 469               | 419               | 389               | 359               | 352               | 337               | 290               | 286               |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 58,19             | 57,40             | 58,85             | 57,81             | 60,17             | 61,95             | 57,54             | 58,97             |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [54,78;<br>61,60] | [53,81;<br>60,99] | [55,10;<br>62,60] | [53,92;<br>61,70] | [56,20;<br>64,14] | [57,86;<br>66,03] | [53,22;<br>61,86] | [54,59;<br>63,35] |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-2 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 865         | 780               | 683               | 601               | 559               | 529               | 511               | 481               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 745               | 654               | 578               | 541               | 513               | 494               | 464               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 399               | 357               | 333               | 303               | 304               | 290               | 268               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 53,56             | 54,59             | 57,61             | 56,01             | 59,26             | 58,70             | 57,76             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [49,97;<br>57,14] | [50,77;<br>58,41] | [53,58;<br>61,64] | [51,82;<br>60,19] | [55,00;<br>63,52] | [54,36;<br>63,05] | [53,26;<br>62,26] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 584         | 529               | 478               | 432               | 401               | 376               | 355               | 340               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 511               | 459               | 413               | 388               | 364               | 347               | 328               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 294               | 257               | 220               | 222               | 200               | 194               | 194               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 57,53             | 55,99             | 53,27             | 57,22             | 54,95             | 55,91             | 59,15             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [53,24;<br>61,82] | [51,45;<br>60,54] | [48,45;<br>58,09] | [52,29;<br>62,15] | [49,83;<br>60,06] | [50,68;<br>61,14] | [53,82;<br>64,47] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-1 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 920         | 807               | 719               | 635               | 581               | 539               | 502               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 783               | 694               | 616               | 568               | 521               | 488               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 418               | 387               | 329               | 320               | 284               | 264               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 53,38             | 55,76             | 53,41             | 56,34             | 54,51             | 54,10             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [49,89;<br>56,88] | [52,07;<br>59,46] | [49,47;<br>57,35] | [52,26;<br>60,42] | [50,23;<br>58,79] | [49,67;<br>58,52] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 646         | 581               | 524               | 475               | 438               | 401               | 369               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 562               | 507               | 458               | 418               | 385               | 356               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 301               | 263               | 255               | 233               | 223               | 204               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 53,56             | 51,87             | 55,68             | 55,74             | 57,92             | 57,30             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [49,43;<br>57,69] | [47,52;<br>56,23] | [51,12;<br>60,23] | [50,97;<br>60,51] | [52,98;<br>62,86] | [52,16;<br>62,45] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ     | Gut eingestellte Hypertoniker im Kollektiv der Hypertoniker laut ED (Anamnese) | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------|--|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009-2 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 752         | 658               | 592               | 518               | 474               | 442               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 641               | 566               | 493               | 457               | 429               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 341               | 323               | 272               | 262               | 244               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 53,20             | 57,07             | 55,17             | 57,33             | 56,88             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [49,33;<br>57,06] | [52,99;<br>61,15] | [50,78;<br>59,57] | [52,79;<br>61,87] | [52,18;<br>61,57] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 570         | 506               | 455               | 420               | 390               | 368               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 490               | 439               | 409               | 379               | 355               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 285               | 252               | 240               | 216               | 220               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 58,16             | 57,40             | 58,68             | 56,99             | 61,97             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [53,79;<br>62,54] | [52,77;<br>62,03] | [53,90;<br>63,46] | [52,00;<br>61,98] | [56,91;<br>67,03] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-1 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 871         | 757               | 669               | 615               | 568               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 729               | 642               | 597               | 552               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 426               | 377               | 351               | 310               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 58,44             | 58,72             | 58,79             | 56,16             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [54,86;<br>62,02] | [54,91;<br>62,53] | [54,84;<br>62,75] | [52,02;<br>60,30] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 564         | 485               | 424               | 385               | 358               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 471               | 408               | 374               | 343               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 255               | 241               | 202               | 210               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 54,14             | 59,07             | 54,01             | 61,22             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [49,64;<br>58,65] | [54,29;<br>63,85] | [48,95;<br>59,07] | [56,06;<br>66,39] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-2 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 884         | 767               | 672               | 614               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 748               | 653               | 597               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 439               | 390               | 337               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 58,69             | 59,72             | 56,45             |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [55,16;<br>62,22] | [55,96;<br>63,49] | [52,47;<br>60,43] |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 655         | 578               | 516               | 478               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 562               | 500               | 462               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 318               | 298               | 285               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 56,58             | 59,60             | 61,69             |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [52,48;<br>60,69] | [55,29;<br>63,91] | [57,25;<br>66,13] |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-1 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 940         | 818               | 710               |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 799               | 683               |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 415               | 365               |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 51,94             | 53,44             |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [48,47;<br>55,41] | [49,70;<br>57,18] |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 633         | 580               | 510               |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 561               | 494               |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 326               | 311               |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 58,11             | 62,96             |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [54,02;<br>62,20] | [58,69;<br>67,22] |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-2 | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 852         | 763               |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 730               |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 407               |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 55,75             |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [52,15;<br>59,36] |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 614         | 547               |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 |             | 523               |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        | Normotoniker   | Anzahl                 |             | 298               |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            |             | 56,98             |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         |             | [52,73;<br>61,23] |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ          | Gut eingestellte Hypertoniker im Kollektiv der Hypertoniker laut ED (Anamnese) | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|-------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2012-1      | <b>männl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 971         |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | auswertbar   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Normotoniker   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |  | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |  | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | <b>weibl. Kollektivmitglieder insges.</b>                                      | Anzahl                 | 676         |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | auswertbar   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Normotoniker   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in % |  |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | CI Anteil in %   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

In Tabelle 3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

**Tabelle 3.1.6 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation**

| EZ  | Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halbjahr     | 11. Halbjahr     | 12. Halbjahr     | 13. Halbjahr     | 14. Halbjahr     | 15. Halbjahr     |                  |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2005-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 128              | 122              | 109              | 98               | 93               | 87               | 84               | 81               | 76               | 75               | 72               | 67               | 65               | 64               | 63               |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 128              | 120              | 104              | 96               | 92               | 87               | 84               | 79               | 74               | 73               | 68               | 67               | 64               | 63               | 60               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 140,55           | 139,15           | 137,13           | 133,61           | 132,79           | 131,64           | 131,29           | 135,13           | 132,09           | 136,53           | 134,69           | 136,96           | 130,45           | 130,98           | 129,62           |
|   |   | CI Mean            | [137,29; 143,82] | [135,77; 142,53] | [133,89; 140,36] | [129,96; 137,27] | [130,08; 135,51] | [127,97; 135,32] | [128,26; 134,31] | [131,01; 139,25] | [128,36; 135,82] | [132,51; 140,56] | [131,01; 138,37] | [133,06; 140,85] | [126,72; 134,19] | [127,23; 134,74] | [126,51; 132,72] |
|   |   | Median             | 140,00           | 139,00           | 135,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 133,00           | 130,50           | 136,00           | 130,00           | 130,00           |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>342</i>       | <i>318</i>       | <i>277</i>       | <i>242</i>       | <i>220</i>       | <i>207</i>       | <i>194</i>       | <i>186</i>       | <i>176</i>       | <i>172</i>       | <i>167</i>       | <i>159</i>       | <i>152</i>       | <i>147</i>       | <i>141</i>       |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 100              | 98               | 89               | 79               | 71               | 61               | 59               | 55               | 50               | 48               | 44               | 44               | 43               | 40               | 38               |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 100              | 97               | 82               | 78               | 70               | 61               | 57               | 55               | 50               | 46               | 44               | 44               | 43               | 37               | 35               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,16           | 141,97           | 137,44           | 137,79           | 136,60           | 137,15           | 136,61           | 139,11           | 134,96           | 139,15           | 134,68           | 134,55           | 134,84           | 135,81           | 134,83           |
|   |   | CI Mean            | [133,32; 141,00] | [137,99; 145,95] | [133,14; 141,74] | [133,51; 142,08] | [132,50; 140,70] | [132,55; 141,75] | [131,84; 141,39] | [134,62; 143,60] | [130,53; 139,39] | [133,97; 144,33] | [128,74; 140,62] | [129,57; 139,52] | [129,91; 139,77] | [131,10; 140,52] | [128,20; 141,45] |
| Median  |   | 136,00             | 140,00           | 135,00           | 134,50           | 135,00           | 140,00           | 135,00           | 139,00           | 132,00           | 140,00           | 135,00           | 130,00           | 130,00           | 138,00           | 130,00           |                  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>292</i>         | <i>281</i>       | <i>246</i>       | <i>214</i>       | <i>195</i>       | <i>183</i>       | <i>174</i>       | <i>167</i>       | <i>160</i>       | <i>151</i>       | <i>145</i>       | <i>141</i>       | <i>139</i>       | <i>136</i>       | <i>129</i>       |                  |
| 2005-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 990              | 934              | 852              | 792              | 746              | 708              | 677              | 650              | 625              | 601              | 568              | 553              | 525              | 498              |                  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 990              | 913              | 836              | 779              | 725              | 688              | 658              | 639              | 612              | 588              | 557              | 543              | 510              | 490              |                  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,25           | 136,27           | 136,94           | 134,96           | 135,14           | 134,61           | 134,95           | 134,60           | 134,80           | 135,08           | 135,27           | 133,27           | 135,85           | 135,35           |                  |
|   |   | CI Mean            | [135,16; 137,34] | [135,17; 137,36] | [135,66; 138,21] | [133,79; 136,14] | [133,87; 136,41] | [133,36; 135,87] | [133,64; 136,25] | [133,26; 135,93] | [133,40; 136,19] | [133,69; 136,47] | [133,78; 136,76] | [131,84; 134,71] | [134,37; 137,32] | [133,85; 136,85] |                  |
|   |   | Median             | 135,00           | 135,00           | 135,00           | 132,00           | 132,00           | 133,50           | 133,00           | 134,00           | 130,00           | 130,00           | 132,00           | 130,00           | 135,00           | 134,00           |                  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2287</i>      | <i>2094</i>      | <i>1857</i>      | <i>1690</i>      | <i>1582</i>      | <i>1510</i>      | <i>1432</i>      | <i>1368</i>      | <i>1309</i>      | <i>1254</i>      | <i>1185</i>      | <i>1153</i>      | <i>1103</i>      | <i>1050</i>      |                  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 750              | 697              | 635              | 592              | 564              | 535              | 516              | 493              | 475              | 454              | 446              | 432              | 415              | 406              |                  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 750              | 679              | 614              | 580              | 555              | 520              | 500              | 481              | 461              | 444              | 435              | 421              | 408              | 386              |                  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,82           | 136,62           | 135,17           | 134,81           | 135,86           | 134,49           | 134,73           | 135,06           | 135,12           | 134,24           | 134,54           | 133,93           | 135,41           | 135,26           |                  |
|   |   | CI Mean            | [135,53; 138,11] | [135,32; 137,91] | [133,76; 136,58] | [133,39; 136,24] | [134,38; 137,34] | [133,03; 135,96] | [133,35; 136,10] | [133,55; 136,57] | [133,62; 136,62] | [132,69; 135,78] | [132,99; 136,10] | [132,37; 135,49] | [133,75; 137,06] | [133,52; 137,00] |                  |
| Median  |   | 135,00             | 135,00           | 134,50           | 134,00           | 135,00           | 130,00           | 130,00           | 134,00           | 134,00           | 132,00           | 134,00           | 132,00           | 135,00           | 135,00           |                  |                  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1772</i>        | <i>1624</i>      | <i>1439</i>      | <i>1318</i>      | <i>1242</i>      | <i>1172</i>      | <i>1116</i>      | <i>1075</i>      | <i>1026</i>      | <i>966</i>       | <i>936</i>       | <i>903</i>       | <i>870</i>       | <i>839</i>       |                  |                  |
| 2006-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 725              | 655              | 587              | 540              | 508              | 478              | 459              | 425              | 400              | 378              | 363              | 340              | 325              |                  |                  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 725              | 644              | 576              | 518              | 493              | 469              | 445              | 411              | 395              | 373              | 353              | 333              | 314              |                  |                  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,10           | 135,36           | 135,42           | 134,77           | 134,61           | 134,04           | 134,13           | 134,31           | 133,56           | 134,14           | 132,84           | 133,43           | 134,49           |                  |                  |
|   |   | CI Mean            | [135,74; 138,47] | [134,01; 136,71] | [133,98; 136,86] | [133,33; 136,20] | [133,05; 136,17] | [132,54; 135,55] | [132,60; 135,66] | [132,68; 135,94] | [132,01; 135,11] | [132,18; 136,10] | [131,20; 134,48] | [131,73; 135,14] | [132,56; 136,43] |                  |                  |
|   |   | Median             | 135,00           | 134,00           | 132,00           | 132,00           | 131,00           | 130,00           | 130,00           | 132,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           |                  |                  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2245</i>      | <i>2019</i>      | <i>1756</i>      | <i>1611</i>      | <i>1483</i>      | <i>1408</i>      | <i>1329</i>      | <i>1225</i>      | <i>1149</i>      | <i>1090</i>      | <i>1039</i>      | <i>984</i>       | <i>932</i>       |                  |                  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 567              | 517              | 460              | 423              | 396              | 380              | 365              | 350              | 322              | 307              | 292              | 282              | 263              |                  |                  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 567              | 505              | 451              | 410              | 380              | 365              | 359              | 340              | 317              | 303              | 287              | 273              | 262              |                  |                  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 138,27           | 136,10           | 133,85           | 135,95           | 133,27           | 134,68           | 132,13           | 133,96           | 134,86           | 133,73           | 133,26           | 133,79           | 132,72           |                  |                  |
|   |   | CI Mean            | [136,60; 139,93] | [134,38; 137,81] | [132,15; 135,56] | [134,23; 137,67] | [131,65; 134,89] | [132,90; 136,47] | [130,46; 133,80] | [132,27; 135,65] | [133,16; 136,56] | [131,87; 135,59] | [131,28; 135,24] | [131,70; 135,88] | [130,65; 134,79] |                  |                  |
| Median  |   | 136,00             | 135,00           | 130,00           | 134,00           | 130,00           | 132,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           |                  |                  |                  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1759</i>        | <i>1578</i>      | <i>1380</i>      | <i>1253</i>      | <i>1159</i>      | <i>1105</i>      | <i>1057</i>      | <i>991</i>       | <i>933</i>       | <i>884</i>       | <i>844</i>       | <i>797</i>       | <i>747</i>       |                  |                  |                  |

| EZ  | Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halbjahr     | 11. Halbjahr     | 12. Halbjahr     | 13. Halbjahr     | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2006-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 1035             | 954              | 870              | 805              | 764              | 719              | 671              | 638              | 608              | 570              | 542              | 518              |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 1035             | 936              | 851              | 785              | 731              | 693              | 655              | 624              | 597              | 561              | 532              | 506              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,37           | 134,72           | 136,24           | 134,48           | 134,09           | 133,88           | 135,26           | 133,53           | 134,55           | 134,46           | 135,38           | 135,17           |              |              |
|   |   | CI Mean            | [136,30; 138,44] | [133,65; 135,80] | [135,10; 137,37] | [133,34; 135,61] | [132,87; 135,31] | [132,70; 135,06] | [133,99; 136,52] | [132,34; 134,71] | [133,23; 135,87] | [133,13; 135,79] | [133,93; 136,82] | [133,74; 136,61] |              |              |
|   |   | Median             | 137,00           | 131,00           | 134,00           | 131,00           | 132,00           | 130,00           | 134,00           | 130,00           | 132,00           | 134,00           | 135,00           | 132,00           |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>3054</i>      | <i>2707</i>      | <i>2393</i>      | <i>2179</i>      | <i>2052</i>      | <i>1924</i>      | <i>1796</i>      | <i>1691</i>      | <i>1605</i>      | <i>1506</i>      | <i>1434</i>      | <i>1366</i>      |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 804              | 737              | 674              | 636              | 597              | 575              | 541              | 507              | 488              | 468              | 448              | 430              |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 804              | 719              | 660              | 615              | 563              | 559              | 527              | 500              | 479              | 459              | 439              | 425              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,56           | 134,43           | 135,17           | 134,93           | 133,28           | 133,30           | 135,15           | 134,92           | 134,69           | 134,05           | 134,18           | 133,92           |              |              |
|   |   | CI Mean            | [135,23; 137,90] | [133,09; 135,77] | [133,77; 136,56] | [133,45; 136,40] | [131,74; 134,81] | [131,78; 134,83] | [133,61; 136,68] | [133,31; 136,53] | [133,16; 136,22] | [132,44; 135,67] | [132,61; 135,76] | [132,14; 135,69] |              |              |
| Median  |   | 135,00             | 130,00           | 132,00           | 132,00           | 130,00           | 130,00           | 133,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 132,00           | 130,00           |                  |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2346</i>        | <i>2091</i>      | <i>1875</i>      | <i>1753</i>      | <i>1639</i>      | <i>1555</i>      | <i>1433</i>      | <i>1332</i>      | <i>1263</i>      | <i>1206</i>      | <i>1147</i>      | <i>1090</i>      |                  |              |              |
| 2007-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 2380             | 2216             | 2021             | 1904             | 1838             | 1757             | 1665             | 1600             | 1532             | 1475             | 1413             |                  |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 2380             | 2168             | 1973             | 1846             | 1792             | 1736             | 1636             | 1572             | 1511             | 1451             | 1386             |                  |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 138,64           | 136,32           | 135,52           | 135,75           | 135,31           | 136,21           | 135,49           | 135,85           | 133,89           | 135,14           | 135,29           |                  |              |              |
|   |   | CI Mean            | [137,93; 139,35] | [135,63; 137,00] | [134,81; 136,24] | [134,99; 136,51] | [134,55; 136,07] | [135,43; 137,00] | [134,70; 136,28] | [135,02; 136,69] | [133,10; 134,68] | [134,32; 135,97] | [134,45; 136,13] |                  |              |              |
|   |   | Median             | 138,00           | 135,00           | 135,00           | 135,00           | 134,00           | 135,00           | 134,00           | 134,00           | 130,00           | 133,00           | 133,00           |                  |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>6522</i>      | <i>5910</i>      | <i>5338</i>      | <i>4997</i>      | <i>4736</i>      | <i>4458</i>      | <i>4205</i>      | <i>4002</i>      | <i>3822</i>      | <i>3669</i>      | <i>3522</i>      |                  |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 1835             | 1708             | 1599             | 1503             | 1423             | 1351             | 1292             | 1233             | 1181             | 1124             | 1085             |                  |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 1835             | 1684             | 1569             | 1440             | 1387             | 1332             | 1273             | 1200             | 1153             | 1107             | 1067             |                  |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,68           | 135,75           | 134,81           | 134,89           | 134,51           | 134,60           | 134,10           | 134,61           | 133,38           | 135,48           | 134,95           |                  |              |              |
|   |   | CI Mean            | [135,88; 137,47] | [134,95; 136,56] | [134,00; 135,63] | [134,06; 135,72] | [133,64; 135,38] | [133,74; 135,46] | [133,24; 134,97] | [133,70; 135,52] | [132,45; 134,30] | [134,50; 136,46] | [133,95; 135,95] |                  |              |              |
| Median  |   | 135,00             | 134,00           | 132,00           | 133,00           | 132,00           | 132,00           | 132,00           | 132,00           | 130,00           | 134,00           | 132,00           |                  |                  |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>5314</i>        | <i>4880</i>      | <i>4472</i>      | <i>4196</i>      | <i>3934</i>      | <i>3716</i>      | <i>3532</i>      | <i>3362</i>      | <i>3209</i>      | <i>3071</i>      | <i>2944</i>      |                  |                  |              |              |
| 2007-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 1307             | 1189             | 1096             | 1009             | 917              | 854              | 816              | 771              | 732              | 699              |                  |                  |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 1307             | 1162             | 1039             | 968              | 894              | 841              | 798              | 753              | 714              | 689              |                  |                  |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,23           | 135,53           | 134,98           | 134,20           | 134,86           | 135,35           | 135,70           | 133,08           | 134,75           | 134,81           |                  |                  |              |              |
|   |   | CI Mean            | [136,24; 138,22] | [134,52; 136,54] | [133,99; 135,98] | [133,16; 135,24] | [133,79; 135,93] | [134,22; 136,49] | [134,52; 136,89] | [134,52; 134,24] | [131,92; 135,93] | [133,58; 136,08] | [133,54; 136,08] |                  |              |              |
|   |   | Median             | 135,00           | 134,50           | 134,00           | 130,00           | 130,00           | 132,00           | 134,00           | 130,00           | 133,50           | 132,00           |                  |                  |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>4414</i>      | <i>3892</i>      | <i>3512</i>      | <i>3195</i>      | <i>2899</i>      | <i>2676</i>      | <i>2514</i>      | <i>2368</i>      | <i>2249</i>      | <i>2141</i>      |                  |                  |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 970              | 880              | 821              | 756              | 696              | 642              | 611              | 582              | 555              | 531              |                  |                  |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 970              | 852              | 783              | 733              | 677              | 628              | 596              | 570              | 550              | 520              |                  |                  |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,50           | 134,68           | 135,62           | 135,16           | 134,04           | 133,69           | 134,27           | 133,12           | 134,41           | 134,38           |                  |                  |              |              |
|   |   | CI Mean            | [136,31; 138,69] | [133,51; 135,84] | [134,28; 136,95] | [133,90; 136,43] | [132,73; 135,35] | [132,44; 134,95] | [132,92; 135,63] | [131,73; 134,51] | [132,99; 135,82] | [132,90; 135,85] |                  |                  |              |              |
| Median  |   | 135,00             | 132,50           | 132,00           | 134,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           |                  |                  |                  |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3459</i>        | <i>3091</i>      | <i>2830</i>      | <i>2577</i>      | <i>2330</i>      | <i>2170</i>      | <i>2043</i>      | <i>1941</i>      | <i>1835</i>      | <i>1756</i>      |                  |                  |                  |              |              |
| 2008-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 1204             | 1072             | 985              | 873              | 810              | 748              | 688              | 652              | 628              |                  |                  |                  |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 1204             | 1014             | 938              | 839              | 783              | 721              | 665              | 640              | 607              |                  |                  |                  |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 138,74           | 137,06           | 135,42           | 135,94           | 135,88           | 134,94           | 134,24           | 135,58           | 135,44           |                  |                  |                  |              |              |
|   |   | CI Mean            | [137,66; 139,83] | [136,01; 138,11] | [134,35; 136,48] | [134,73; 137,15] | [134,65; 137,11] | [133,75; 136,13] | [132,98; 135,51] | [134,30; 136,85] | [134,10; 136,78] |                  |                  |                  |              |              |
|   |   | Median             | 138,00           | 135,00           | 132,00           | 135,00           | 134,00           | 132,00           | 130,00           | 134,00           | 133,00           |                  |                  |                  |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>4190</i>      | <i>3689</i>      | <i>3307</i>      | <i>2914</i>      | <i>2653</i>      | <i>2459</i>      | <i>2274</i>      | <i>2144</i>      | <i>2046</i>      |                  |                  |                  |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 911              | 846              | 772              | 692              | 636              | 600              | 554              | 521              | 496              |                  |                  |                  |              |              |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 911              | 802              | 726              | 658              | 620              | 584              | 543              | 503              | 484              |                  |                  |                  |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,54           | 134,37           | 134,93           | 135,43           | 134,55           | 133,99           | 132,89           | 134,47           | 134,60           |                  |                  |                  |              |              |
|   |   | CI Mean            | [136,26; 138,81] | [133,18; 135,56] | [133,68; 136,19] | [134,00; 136,85] | [133,16; 135,93] | [132,51; 135,48] | [131,44; 134,34] | [132,88; 136,06] | [132,96; 136,24] |                  |                  |                  |              |              |
| Median  |   | 135,00             | 130,00           | 130,50           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 132,00           | 131,50           |                  |                  |                  |                  |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3188</i>        | <i>2871</i>      | <i>2579</i>      | <i>2319</i>      | <i>2120</i>      | <i>1972</i>      | <i>1834</i>      | <i>1736</i>      | <i>1650</i>      |                  |                  |                  |                  |              |              |



| EZ  | Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halbjahr | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |  |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 2008-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 858              | 773              | 677              | 596              | 555              | 525              | 507              | 477              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 858              | 738              | 648              | 574              | 537              | 509              | 490              | 460              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,69           | 136,12           | 136,28           | 135,30           | 135,36           | 134,72           | 135,36           | 134,11           |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [136,46; 138,93] | [134,80; 137,44] | [134,87; 137,69] | [133,93; 136,66] | [133,97; 136,76] | [133,27; 136,16] | [133,78; 136,94] | [132,63; 135,59] |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | Median             | 137,00           | 135,00           | 134,00           | 134,00           | 132,00           | 132,00           | 132,00           | 132,00           |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>      | <i>2495</i>      | <i>2153</i>      | <i>1904</i>      | <i>1738</i>      | <i>1605</i>      | <i>1505</i>      | <i>1412</i>      |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 577              | 524              | 474              | 428              | 397              | 374              | 353              | 338              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 577              | 506              | 455              | 409              | 384              | 362              | 345              | 326              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,87           | 135,86           | 135,21           | 136,48           | 134,98           | 135,40           | 135,38           | 134,48           |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [135,33; 138,41] | [134,25; 137,46] | [133,52; 136,90] | [134,80; 138,15] | [133,23; 136,73] | [133,66; 137,15] | [133,61; 137,15] | [132,65; 136,31] |              |              |              |              |              |              |  |  |
| Median  |   | 135,00             | 132,00           | 130,00           | 134,00           | 130,00           | 133,50           | 134,00           | 131,00           |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2099</i>        | <i>1848</i>      | <i>1615</i>      | <i>1424</i>      | <i>1290</i>      | <i>1198</i>      | <i>1124</i>      | <i>1060</i>      |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| 2009-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 912              | 801              | 713              | 629              | 577              | 535              | 498              |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 912              | 777              | 688              | 611              | 564              | 517              | 484              |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,42           | 135,83           | 134,93           | 136,01           | 134,69           | 136,33           | 134,98           |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [136,27; 138,58] | [134,60; 137,06] | [133,61; 136,25] | [134,63; 137,38] | [133,32; 136,05] | [134,71; 137,95] | [133,45; 136,50] |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | Median             | 138,00           | 134,00           | 132,00           | 134,00           | 132,00           | 135,00           | 131,50           |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>3215</i>      | <i>2781</i>      | <i>2408</i>      | <i>2143</i>      | <i>1971</i>      | <i>1823</i>      | <i>1697</i>      |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 640              | 576              | 520              | 472              | 436              | 399              | 367              |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 640              | 558              | 504              | 456              | 417              | 384              | 355              |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,79           | 136,15           | 136,15           | 135,64           | 135,65           | 134,35           | 134,43           |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [135,42; 138,16] | [134,68; 137,63] | [134,59; 137,71] | [134,03; 137,26] | [133,88; 137,41] | [132,66; 136,03] | [132,53; 136,34] |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| Median  |   | 135,00             | 135,00           | 134,00           | 131,00           | 133,00           | 132,00           | 131,00           |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2420</i>        | <i>2074</i>      | <i>1813</i>      | <i>1629</i>      | <i>1496</i>      | <i>1367</i>      | <i>1268</i>      |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| 2009-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 746              | 653              | 587              | 514              | 471              | 440              |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 746              | 636              | 561              | 489              | 454              | 427              |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 137,31           | 136,69           | 136,07           | 136,08           | 134,77           | 135,25           |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [135,98; 138,65] | [135,34; 138,04] | [134,63; 137,51] | [134,50; 137,65] | [133,18; 136,36] | [133,67; 136,83] |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | Median             | 135,00           | 135,00           | 132,00           | 134,00           | 132,00           | 133,00           |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2729</i>      | <i>2303</i>      | <i>1970</i>      | <i>1730</i>      | <i>1565</i>      | <i>1452</i>      |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 562              | 500              | 452              | 417              | 387              | 365              |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 562              | 486              | 436              | 406              | 376              | 352              |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 135,63           | 134,33           | 135,00           | 133,80           | 134,44           | 133,09           |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [134,06; 137,20] | [132,78; 135,87] | [133,26; 136,74] | [132,14; 135,45] | [132,70; 136,18] | [131,36; 134,82] |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| Median  |   | 131,50             | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2127</i>        | <i>1839</i>      | <i>1616</i>      | <i>1458</i>      | <i>1328</i>      | <i>1245</i>      |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| 2010-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 866              | 752              | 664              | 611              | 565              |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 866              | 724              | 637              | 593              | 549              |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,65           | 134,72           | 134,63           | 134,88           | 135,61           |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [135,42; 137,88] | [133,42; 136,02] | [133,32; 135,94] | [133,51; 136,25] | [134,19; 137,02] |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | Median             | 135,00           | 132,00           | 130,00           | 132,00           | 132,00           |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>3025</i>      | <i>2538</i>      | <i>2206</i>      | <i>1972</i>      | <i>1813</i>      |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl             | 561              | 482              | 421              | 382              | 355              |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             | 561              | 468              | 405              | 371              | 340              |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean               | 136,18           | 134,10           | 134,43           | 134,34           | 133,80           |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|   |   | CI Mean            | [134,66; 137,70] | [132,57; 135,63] | [132,73; 136,14] | [132,71; 135,97] | [132,16; 135,45] |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| Median  |   | 132,00             | 131,00           | 130,00           | 132,00           | 130,00           |                  |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2174</i>        | <i>1850</i>      | <i>1591</i>      | <i>1428</i>      | <i>1299</i>      |                  |                  |                  |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |

| EZ  | Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halb-jahr | 2. Halb-jahr     | 3. Halb-jahr     | 4. Halb-jahr     | 5. Halb-jahr     | 6. Halb-jahr | 7. Halb-jahr | 8. Halb-jahr | 9. Halb-jahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2010-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 877              | 761              | 667              | 609              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 877              | 742              | 648              | 592              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 136,27           | 134,72           | 135,28           | 135,51           |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [135,10; 137,43] | [133,50; 135,95] | [133,99; 136,58] | [134,19; 136,83] |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | Median              | 135,00           | 131,50           | 132,00           | 134,00           |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>       | <i>3086</i>      | <i>2626</i>      | <i>2248</i>      | <i>2023</i>      |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 651              | 575              | 514              | 476              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 651              | 559              | 498              | 460              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 135,43           | 134,68           | 134,86           | 134,82           |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [134,07; 136,79] | [133,24; 136,12] | [133,27; 136,46] | [133,24; 136,41] |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| Median  |   | 132,00              | 132,00           | 130,00           | 130,00           |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2312</i>         | <i>2021</i>      | <i>1768</i>      | <i>1574</i>      |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 2011-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 937              | 815              | 707              |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 937              | 796              | 680              |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 137,79           | 137,12           | 136,14           |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [136,61; 138,98] | [135,88; 138,37] | [134,87; 137,40] |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | Median              | 136,00           | 135,00           | 135,00           |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>       | <i>3146</i>      | <i>2666</i>      | <i>2269</i>      |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 629              | 576              | 508              |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 629              | 557              | 492              |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 135,93           | 134,00           | 133,17           |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [134,45; 137,40] | [132,57; 135,44] | [131,71; 134,64] |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| Median  |   | 132,00              | 130,00           | 130,00           |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2382</i>         | <i>2091</i>      | <i>1809</i>      |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 2011-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 843              | 755              |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 843              | 722              |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 137,70           | 136,14           |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [136,47; 138,94] | [134,92; 137,36] |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | Median              | 137,00           | 135,00           |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>       | <i>3031</i>      | <i>2602</i>      |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 610              | 543              |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 610              | 519              |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 136,64           | 134,82           |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [135,08; 138,21] | [133,26; 136,37] |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| Median  |   | 132,50              | 130,00           |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2272</i>         | <i>1963</i>      |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 2012-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 963              |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 963              |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 138,83           |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [137,70; 139,96] |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | Median              | 140,00           |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>       | <i>3423</i>      |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>   | Anzahl              | 671              |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | auswertbar  | Anzahl              | 671              |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   | Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck  | Mean                | 136,72           |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|   |   | CI Mean             | [135,23; 138,21] |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| Median  |   | 133,00              |                  |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2494</i>         |                  |                  |                  |                  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |

In Tabelle 3.1.7 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

**Tabelle 3.1.7 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation**

| EZ  | Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |                |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 128            | 122            | 109            | 98             | 93             | 87             | 84             | 81             | 76             | 75             | 72             | 67             | 65             | 64             | 63             |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 128            | 120            | 104            | 96             | 92             | 87             | 84             | 79             | 74             | 73             | 68             | 67             | 64             | 63             | 60             |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 79,32          | 78,01          | 78,22          | 76,70          | 76,12          | 75,23          | 74,75          | 76,56          | 74,16          | 77,75          | 74,82          | 76,37          | 72,91          | 74,33          | 74,12          |
|   |  | CI Mean            | [77,55; 81,09] | [75,98; 80,03] | [76,51; 79,93] | [74,43; 78,97] | [74,09; 78,15] | [72,46; 78,00] | [72,88; 76,62] | [74,26; 78,85] | [72,13; 76,20] | [75,31; 80,20] | [72,37; 77,28] | [74,00; 78,75] | [70,53; 75,28] | [71,64; 77,03] | [71,68; 76,55] |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 78,00          | 75,00          | 75,50          | 76,00          | 76,50          | 80,00          | 76,00          | 78,00          | 73,00          | 78,00          | 76,50          |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>342</i>     | <i>318</i>     | <i>277</i>     | <i>242</i>     | <i>220</i>     | <i>207</i>     | <i>194</i>     | <i>186</i>     | <i>176</i>     | <i>172</i>     | <i>167</i>     | <i>159</i>     | <i>152</i>     | <i>147</i>     | <i>141</i>     |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 100            | 98             | 89             | 79             | 71             | 61             | 59             | 55             | 50             | 48             | 44             | 44             | 43             | 40             | 38             |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 100            | 97             | 82             | 78             | 70             | 61             | 57             | 55             | 50             | 46             | 44             | 44             | 43             | 37             | 35             |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,23          | 79,31          | 75,96          | 78,86          | 77,03          | 74,64          | 75,40          | 75,58          | 76,18          | 76,43          | 75,59          | 73,00          | 75,19          | 75,54          | 76,94          |
|   |  | CI Mean            | [76,03; 80,44] | [77,25; 81,37] | [73,80; 78,12] | [76,33; 81,39] | [74,76; 79,30] | [71,96; 77,31] | [72,73; 78,08] | [72,77; 78,39] | [74,07; 78,29] | [73,26; 79,61] | [72,11; 79,08] | [69,83; 76,17] | [72,20; 78,18] | [72,65; 78,43] | [74,11; 79,77] |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 76,00          | 75,00          | 77,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 70,00          | 77,00          | 80,00          | 80,00          |                |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>292</i>         | <i>281</i>     | <i>246</i>     | <i>214</i>     | <i>195</i>     | <i>183</i>     | <i>174</i>     | <i>167</i>     | <i>160</i>     | <i>151</i>     | <i>145</i>     | <i>141</i>     | <i>139</i>     | <i>136</i>     | <i>129</i>     |                |
| 2005-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 990            | 934            | 852            | 792            | 746            | 708            | 677            | 650            | 625            | 601            | 568            | 553            | 525            | 498            |                |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 990            | 913            | 836            | 779            | 725            | 688            | 658            | 639            | 612            | 588            | 557            | 543            | 510            | 490            |                |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,36          | 77,93          | 78,08          | 77,78          | 76,86          | 77,11          | 76,70          | 77,05          | 76,76          | 77,09          | 76,53          | 76,08          | 76,46          | 76,22          |                |
|   |  | CI Mean            | [77,72; 78,99] | [77,27; 78,58] | [77,37; 78,79] | [77,13; 78,44] | [76,16; 77,57] | [76,35; 77,86] | [75,99; 77,40] | [76,29; 77,81] | [75,97; 77,55] | [76,25; 77,94] | [75,63; 77,43] | [75,24; 76,93] | [75,61; 77,31] | [75,37; 77,08] |                |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 79,00          | 80,00          | 80,00          |                |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2287</i>    | <i>2094</i>    | <i>1857</i>    | <i>1690</i>    | <i>1582</i>    | <i>1510</i>    | <i>1432</i>    | <i>1368</i>    | <i>1309</i>    | <i>1254</i>    | <i>1185</i>    | <i>1153</i>    | <i>1103</i>    | <i>1050</i>    |                |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 750            | 697            | 635            | 592            | 564            | 535            | 516            | 493            | 475            | 454            | 446            | 432            | 415            | 406            |                |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 750            | 679            | 614            | 580            | 555            | 520            | 500            | 481            | 461            | 444            | 435            | 421            | 408            | 386            |                |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 76,52          | 76,49          | 75,53          | 75,51          | 75,64          | 75,30          | 75,74          | 75,99          | 75,97          | 74,77          | 75,37          | 74,57          | 75,59          | 75,05          |                |
|   |  | CI Mean            | [75,79; 77,25] | [75,77; 77,21] | [74,79; 76,27] | [74,75; 76,27] | [74,82; 76,46] | [74,45; 76,15] | [74,88; 76,59] | [75,09; 76,89] | [75,07; 76,87] | [73,85; 75,69] | [74,46; 76,28] | [73,66; 75,49] | [74,63; 76,55] | [74,03; 76,06] |                |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 78,00          | 78,00          | 76,00          | 76,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 76,00          | 78,00          | 75,00          | 76,50          | 75,00          |                |                |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1772</i>        | <i>1624</i>    | <i>1439</i>    | <i>1318</i>    | <i>1242</i>    | <i>1172</i>    | <i>1116</i>    | <i>1075</i>    | <i>1026</i>    | <i>966</i>     | <i>936</i>     | <i>903</i>     | <i>870</i>     | <i>839</i>     |                |                |
| 2006-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 725            | 655            | 587            | 540            | 508            | 478            | 459            | 425            | 400            | 378            | 363            | 340            | 325            |                |                |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 725            | 644            | 576            | 518            | 493            | 469            | 445            | 411            | 395            | 373            | 353            | 333            | 314            |                |                |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 79,53          | 78,75          | 78,89          | 78,10          | 77,61          | 78,09          | 77,44          | 77,26          | 77,50          | 77,62          | 76,50          | 76,99          | 76,39          |                |                |
|   |  | CI Mean            | [78,77; 80,29] | [78,00; 79,49] | [78,06; 79,71] | [77,19; 79,01] | [76,71; 78,51] | [77,21; 78,97] | [76,56; 78,33] | [76,24; 78,28] | [76,58; 78,42] | [76,57; 78,68] | [75,44; 77,56] | [75,92; 78,05] | [75,32; 77,45] |                |                |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2245</i>    | <i>2019</i>    | <i>1756</i>    | <i>1611</i>    | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>     |                |                |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 567            | 517            | 460            | 423            | 396            | 380            | 365            | 350            | 322            | 307            | 292            | 282            | 263            |                |                |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 567            | 505            | 451            | 410            | 380            | 365            | 359            | 340            | 317            | 303            | 287            | 273            | 262            |                |                |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,43          | 78,40          | 76,17          | 76,57          | 75,62          | 76,28          | 75,37          | 75,89          | 75,90          | 74,83          | 74,80          | 75,82          | 74,35          |                |                |
|   |  | CI Mean            | [77,62; 79,23] | [77,44; 79,35] | [75,30; 77,03] | [75,66; 77,47] | [74,69; 76,55] | [75,27; 77,28] | [74,34; 76,39] | [74,88; 76,89] | [74,86; 76,93] | [73,71; 75,94] | [73,74; 75,87] | [74,63; 77,01] | [73,14; 75,57] |                |                |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 78,00          | 78,00          | 78,00          | 77,00          | 80,00          | 76,00          | 76,00          | 80,00          | 75,00          |                |                |                |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1759</i>        | <i>1578</i>    | <i>1380</i>    | <i>1253</i>    | <i>1159</i>    | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     |                |                |                |

| EZ  | Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2006-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 1035           | 954            | 870            | 805            | 764            | 719            | 671            | 638            | 608            | 570            | 542            | 518            |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 1035           | 936            | 851            | 785            | 731            | 693            | 655            | 624            | 597            | 561            | 532            | 506            |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 79,61          | 77,89          | 78,87          | 77,82          | 77,42          | 77,44          | 77,89          | 76,95          | 77,20          | 76,31          | 76,47          | 77,02          |              |              |
|   |  | CI Mean            | [78,98; 80,25] | [77,22; 78,56] | [78,18; 79,56] | [77,12; 78,53] | [76,70; 78,14] | [76,74; 78,15] | [77,13; 78,66] | [76,16; 77,73] | [76,40; 78,00] | [75,47; 77,15] | [75,59; 77,34] | [76,15; 77,89] |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 79,00          | 79,00          | 80,00          |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3054</i>    | <i>2707</i>    | <i>2393</i>    | <i>2179</i>    | <i>2052</i>    | <i>1924</i>    | <i>1796</i>    | <i>1691</i>    | <i>1605</i>    | <i>1506</i>    | <i>1434</i>    | <i>1366</i>    |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 804            | 737            | 674            | 636            | 597            | 575            | 541            | 507            | 488            | 468            | 448            | 430            |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 804            | 719            | 660            | 615            | 563            | 559            | 527            | 500            | 479            | 459            | 439            | 425            |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 77,58          | 76,52          | 76,30          | 76,22          | 75,84          | 75,36          | 76,50          | 75,66          | 75,57          | 74,99          | 75,45          | 75,71          |              |              |
|   |  | CI Mean            | [76,87; 78,29] | [75,80; 77,24] | [75,52; 77,08] | [75,40; 77,04] | [75,01; 76,67] | [74,56; 76,16] | [75,62; 77,39] | [74,79; 76,53] | [74,72; 76,41] | [74,13; 75,86] | [74,55; 76,34] | [74,79; 76,64] |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 78,00          | 78,50          | 80,00          | 79,00          | 76,00          | 78,00          | 76,50          | 78,00          | 76,00          | 77,00          | 77,00          |                |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2346</i>        | <i>2091</i>    | <i>1875</i>    | <i>1753</i>    | <i>1639</i>    | <i>1555</i>    | <i>1433</i>    | <i>1332</i>    | <i>1263</i>    | <i>1206</i>    | <i>1147</i>    | <i>1090</i>    |                |              |              |
| 2007-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 2380           | 2216           | 2021           | 1904           | 1838           | 1757           | 1665           | 1600           | 1532           | 1475           | 1413           |                |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 2380           | 2168           | 1973           | 1846           | 1792           | 1736           | 1636           | 1572           | 1511           | 1451           | 1386           |                |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 79,80          | 78,93          | 78,32          | 78,04          | 77,86          | 78,21          | 77,48          | 77,45          | 76,78          | 76,96          | 76,83          |                |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,38; 80,21] | [78,52; 79,35] | [77,87; 78,76] | [77,59; 78,48] | [77,39; 78,33] | [77,73; 78,68] | [77,00; 77,95] | [76,96; 77,94] | [76,28; 77,29] | [76,47; 77,45] | [76,32; 77,34] |                |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 78,00          | 80,00          | 79,00          |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>6522</i>    | <i>5910</i>    | <i>5338</i>    | <i>4997</i>    | <i>4736</i>    | <i>4458</i>    | <i>4205</i>    | <i>4002</i>    | <i>3822</i>    | <i>3669</i>    | <i>3522</i>    |                |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 1835           | 1708           | 1599           | 1503           | 1423           | 1351           | 1292           | 1233           | 1181           | 1124           | 1085           |                |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 1835           | 1684           | 1569           | 1440           | 1387           | 1332           | 1273           | 1200           | 1153           | 1107           | 1067           |                |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,24          | 77,77          | 76,78          | 76,61          | 76,41          | 76,06          | 75,80          | 76,05          | 75,47          | 76,26          | 75,65          |                |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,78; 78,69] | [77,32; 78,22] | [76,31; 77,25] | [76,12; 77,11] | [75,90; 76,92] | [75,54; 76,58] | [75,26; 76,34] | [75,47; 76,63] | [74,89; 76,06] | [75,70; 76,81] | [75,07; 76,23] |                |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 78,00          | 78,00          | 78,00          | 76,00          | 78,00          | 77,00          |                |                |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>5314</i>        | <i>4880</i>    | <i>4472</i>    | <i>4196</i>    | <i>3934</i>    | <i>3716</i>    | <i>3532</i>    | <i>3362</i>    | <i>3209</i>    | <i>3071</i>    | <i>2944</i>    |                |                |              |              |
| 2007-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 1307           | 1189           | 1096           | 1009           | 917            | 854            | 816            | 771            | 732            | 699            |                |                |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 1307           | 1162           | 1039           | 968            | 894            | 841            | 798            | 753            | 714            | 689            |                |                |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 79,66          | 78,73          | 78,36          | 78,01          | 78,16          | 77,80          | 77,67          | 76,82          | 77,16          | 77,37          |                |                |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,08; 80,24] | [78,16; 79,30] | [77,77; 78,95] | [77,38; 78,64] | [77,50; 78,81] | [77,12; 78,49] | [76,97; 78,38] | [76,15; 77,50] | [76,48; 77,85] | [76,67; 78,08] |                |                |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4414</i>    | <i>3892</i>    | <i>3512</i>    | <i>3195</i>    | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>    | <i>2141</i>    |                |                |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 970            | 880            | 821            | 756            | 696            | 642            | 611            | 582            | 555            | 531            |                |                |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 970            | 852            | 783            | 733            | 677            | 628            | 596            | 570            | 550            | 520            |                |                |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,38          | 77,37          | 76,94          | 76,97          | 77,19          | 76,55          | 77,10          | 75,69          | 76,09          | 76,11          |                |                |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,74; 79,03] | [76,71; 78,03] | [76,23; 77,66] | [76,25; 77,69] | [76,48; 77,91] | [75,78; 77,32] | [76,31; 77,88] | [74,88; 76,51] | [75,31; 76,87] | [75,30; 76,92] |                |                |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 78,00          | 78,00          | 79,50          |                |                |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3459</i>        | <i>3091</i>    | <i>2830</i>    | <i>2577</i>    | <i>2330</i>    | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>    |                |                |                |              |              |
| 2008-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 1204           | 1072           | 985            | 873            | 810            | 748            | 688            | 652            | 628            |                |                |                |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 1204           | 1014           | 938            | 839            | 783            | 721            | 665            | 640            | 607            |                |                |                |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 80,24          | 79,19          | 78,41          | 78,05          | 78,22          | 77,59          | 77,02          | 77,37          | 77,02          |                |                |                |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,63; 80,85] | [78,57; 79,82] | [77,78; 79,04] | [77,33; 78,78] | [77,53; 78,92] | [76,85; 78,32] | [76,27; 77,76] | [76,57; 78,16] | [76,24; 77,80] |                |                |                |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |                |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4190</i>    | <i>3689</i>    | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>    |                |                |                |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 911            | 846            | 772            | 692            | 636            | 600            | 554            | 521            | 496            |                |                |                |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 911            | 802            | 726            | 658            | 620            | 584            | 543            | 503            | 484            |                |                |                |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,48          | 77,05          | 76,96          | 76,65          | 76,48          | 76,47          | 75,19          | 75,60          | 75,40          |                |                |                |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,80; 79,16] | [76,35; 77,76] | [76,22; 77,71] | [75,85; 77,46] | [75,72; 77,24] | [75,67; 77,27] | [74,34; 76,04] | [74,70; 76,51] | [74,52; 76,29] |                |                |                |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 76,00          | 78,00          | 76,00          |                |                |                |                |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3188</i>        | <i>2871</i>    | <i>2579</i>    | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                |                |                |                |              |              |

| EZ  | Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2008-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 858            | 773            | 677            | 596            | 555            | 525            | 507            | 477            |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 858            | 738            | 648            | 574            | 537            | 509            | 490            | 460            |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 80,00          | 79,02          | 78,87          | 78,36          | 78,47          | 77,95          | 77,81          | 77,50          |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,28; 80,72] | [78,22; 79,82] | [78,04; 79,70] | [77,57; 79,15] | [77,61; 79,33] | [77,14; 78,76] | [76,91; 78,70] | [76,57; 78,43] |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>    | <i>2495</i>    | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 577            | 524            | 474            | 428            | 397            | 374            | 353            | 338            |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 577            | 506            | 455            | 409            | 384            | 362            | 345            | 326            |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,89          | 77,02          | 77,59          | 77,27          | 77,30          | 76,89          | 77,50          | 76,48          |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [78,03; 79,76] | [76,11; 77,92] | [76,63; 78,54] | [76,32; 78,22] | [76,31; 78,29] | [75,85; 77,93] | [76,42; 78,59] | [75,45; 77,51] |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2099</i>        | <i>1848</i>    | <i>1615</i>    | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |              |              |              |              |              |              |
| 2009-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 912            | 801            | 713            | 629            | 577            | 535            | 498            |                |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 912            | 777            | 688            | 611            | 564            | 517            | 484            |                |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 80,10          | 78,89          | 78,98          | 78,42          | 78,23          | 78,74          | 78,20          |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,41; 80,78] | [78,15; 79,63] | [78,25; 79,71] | [77,60; 79,23] | [77,40; 79,06] | [77,92; 79,57] | [77,27; 79,12] |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3215</i>    | <i>2781</i>    | <i>2408</i>    | <i>2143</i>    | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i>    |                |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 640            | 576            | 520            | 472            | 436            | 399            | 367            |                |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 640            | 558            | 504            | 456            | 417            | 384            | 355            |                |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,56          | 78,18          | 78,50          | 77,21          | 77,68          | 77,33          | 76,86          |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,76; 79,35] | [77,35; 79,00] | [77,62; 79,38] | [76,34; 78,08] | [76,80; 78,56] | [76,35; 78,31] | [75,84; 77,88] |                |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2420</i>        | <i>2074</i>    | <i>1813</i>    | <i>1629</i>    | <i>1496</i>    | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    |                |                |              |              |              |              |              |              |
| 2009-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 746            | 653            | 587            | 514            | 471            | 440            |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 746            | 636            | 561            | 489            | 454            | 427            |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 80,15          | 79,45          | 79,24          | 78,11          | 77,76          | 77,74          |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,40; 80,90] | [78,66; 80,24] | [78,40; 80,08] | [77,18; 79,03] | [76,79; 78,74] | [76,73; 78,74] |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2729</i>    | <i>2303</i>    | <i>1970</i>    | <i>1730</i>    | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 562            | 500            | 452            | 417            | 387            | 365            |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 562            | 486            | 436            | 406            | 376            | 352            |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,99          | 78,30          | 78,16          | 76,76          | 77,58          | 76,62          |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [78,11; 79,87] | [77,45; 79,16] | [77,15; 79,17] | [75,73; 77,80] | [76,51; 78,65] | [75,48; 77,75] |                |                |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2127</i>        | <i>1839</i>    | <i>1616</i>    | <i>1458</i>    | <i>1328</i>    | <i>1245</i>    |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
| 2010-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 866            | 752            | 664            | 611            | 565            |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 866            | 724            | 637            | 593            | 549            |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 79,73          | 78,40          | 78,32          | 78,35          | 77,97          |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,05; 80,42] | [77,65; 79,15] | [77,55; 79,09] | [77,54; 79,16] | [77,17; 78,77] |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3025</i>    | <i>2538</i>    | <i>2206</i>    | <i>1972</i>    | <i>1813</i>    |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 561            | 482            | 421            | 382            | 355            |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 561            | 468            | 405            | 371            | 340            |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,46          | 78,37          | 77,36          | 77,59          | 77,16          |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,57; 79,35] | [77,46; 79,29] | [76,44; 78,28] | [76,59; 78,59] | [76,10; 78,22] |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |                |                |                |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2174</i>        | <i>1850</i>    | <i>1591</i>    | <i>1428</i>    | <i>1299</i>    |                |                |                |                |              |              |              |              |              |              |

| EZ  | Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED) | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halbjahr | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2010-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 877            | 761            | 667            | 609            |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 877            | 742            | 648            | 592            |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 79,98          | 78,18          | 78,50          | 78,54          |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,27; 80,68] | [77,44; 78,91] | [77,73; 79,26] | [77,75; 79,34] |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3086</i>    | <i>2626</i>    | <i>2248</i>    | <i>2023</i>    |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 651            | 575            | 514            | 476            |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 651            | 559            | 498            | 460            |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,10          | 77,81          | 77,81          | 76,75          |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,28; 78,92] | [76,95; 78,66] | [76,96; 78,65] | [75,85; 77,66] |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2312</i>        | <i>2021</i>    | <i>1768</i>    | <i>1574</i>    |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| 2011-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 937            | 815            | 707            |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 937            | 796            | 680            |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 80,48          | 79,67          | 79,02          |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,81; 81,14] | [78,97; 80,37] | [78,23; 79,81] |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          | 80,00          |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3146</i>    | <i>2666</i>    | <i>2269</i>    |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 629            | 576            | 508            |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 629            | 557            | 492            |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,86          | 77,87          | 77,24          |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [78,03; 79,69] | [77,07; 78,68] | [76,36; 78,13] |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          | 80,00          |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2382</i>        | <i>2091</i>    | <i>1809</i>    |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| 2011-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 843            | 755            |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 843            | 722            |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 80,26          | 78,73          |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [79,55; 80,97] | [78,04; 79,41] |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          | 80,00          |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3031</i>    | <i>2602</i>    |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 610            | 543            |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 610            | 519            |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,44          | 77,75          |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,53; 79,35] | [76,81; 78,68] |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              | 80,00          |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2272</i>        | <i>1963</i>    |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| 2012-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 963            |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 963            |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 80,69          |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [80,00; 81,38] |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | Median             | 80,00          |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3423</i>    |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder insgesamt</b>  | Anzahl             | 671            |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | auswertbar   | Anzahl             | 671            |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   | Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck  | Mean               | 78,67          |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
|   |  | CI Mean            | [77,83; 79,52] |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| Median  |  | 80,00              |                |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2494</i>        |                |                |                |                |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |

### 3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensiviertere Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

Eine etwaige Beeinträchtigung der Filter- bzw. Klärfunktion der Nieren kann durch die so genannte Kreatinin-Clearance beurteilt werden. Für deren Berechnung wird der Kreatininwert im Blut (Serum) des Patienten ermittelt. Ein erhöhter Kreatininwert kann eine Funktionsverschlechterung der Nieren anzeigen.

In Tabelle 3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte werden dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

Tabelle 3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration

| EZ                           | Patienten und ihre HbA1c-Konzentration | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr   | 9. Halbjahr   | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |               |      |
|------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|
| 2005-1                       | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 342            | 318            | 277            | 242            | 220            | 207            | 194           | 186           | 176               | 172               | 167               | 159               | 152               | 147               | 141           |      |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 342            | 310            | 266            | 238            | 218            | 207            | 194           | 184           | 174               | 168               | 161               | 155               | 148               | 144               | 138           |      |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,11           | 7,69           | 7,87           | 7,69           | 7,89           | 7,82           | 7,84          | 7,85          | 7,83              | 7,78              | 7,85              | 7,75              | 7,77              | 7,74              | 7,76          |      |
|                              |  | CI Mean                      | [7,91; 8,30]   | [7,53; 7,85]   | [7,68; 8,05]   | [7,52; 7,85]   | [7,69; 8,09]   | [7,63; 8,02]   | [7,64; 8,03]  | [7,64; 8,06]  | [7,62; 8,03]      | [7,59; 7,96]      | [7,65; 8,05]      | [7,59; 7,92]      | [7,60; 7,95]      | [7,57; 7,90]      | [7,58; 7,94]  |      |
|                              |  | Median                       | 7,70           | 7,50           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60          | 7,60          | 7,60              | 7,60              | 7,60              | 7,70              | 7,60              | 7,70              | 7,60          | 7,60 |
|                              |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 310            | 266            | 238            | 218            | 207            | 194           | 184           | 174               | 168               | 161               | 155               | 148               | 144               | 138           |      |
|                              |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,33          | -0,14          | -0,18          | 0,03           | -0,05          | 0,00          | 0,05          | 0,01              | -0,01             | 0,02              | 0,00              | 0,03              | -0,01             | 0,02          |      |
|                              |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,48; -0,17] | [-0,32; 0,03]  | [-0,37; 0,01]  | [-0,17; 0,24]  | [-0,27; 0,16]  | [-0,21; 0,21] | [-0,19; 0,28] | [-0,22; 0,24]     | [-0,24; 0,23]     | [-0,22; 0,26]     | [-0,21; 0,21]     | [-0,23; 0,29]     | [-0,28; 0,27]     | [-0,29; 0,32] |      |
|                              | Median mittlere Differenz              |                              | -0,10          | 0,00           | 0,00           | 0,20           | 0,00           | 0,10           | 0,10          | 0,10          | 0,30              | 0,30              | 0,20              | 0,30              | 0,25              | 0,20              |               |      |
|                              | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 292            | 281            | 246            | 214            | 195            | 183            | 174           | 167           | 160               | 151               | 145               | 141               | 139               | 136               | 129           |      |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 292            | 277            | 224            | 210            | 194            | 181            | 169           | 165           | 156               | 147               | 143               | 139               | 135               | 129               | 125           |      |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 7,87           | 7,78           | 7,83           | 7,75           | 7,81           | 7,85           | 7,89          | 7,85          | 7,88              | 7,94              | 7,84              | 7,95              | 7,89              | 7,93              | 7,95          |      |
|                              |  | CI Mean                      | [7,69; 8,04]   | [7,62; 7,93]   | [7,65; 8,01]   | [7,58; 7,92]   | [7,63; 8,00]   | [7,69; 8,02]   | [7,72; 8,06]  | [7,68; 8,02]  | [7,70; 8,06]      | [7,76; 8,13]      | [7,67; 8,02]      | [7,75; 8,14]      | [7,71; 8,07]      | [7,73; 8,12]      | [7,75; 8,14]  |      |
|                              |  | Median                       | 7,70           | 7,70           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,70           | 7,70          | 7,70          | 7,70              | 7,80              | 7,70              | 7,60              | 7,80              | 7,80              | 7,80          |      |
| Fallbasis mittlere Differenz |  |                              | 277            | 224            | 210            | 194            | 181            | 169            | 165           | 156           | 147               | 143               | 139               | 135               | 129               | 125               |               |      |
| Mittlere Differenz zur ED    |  |                              | -0,09          | 0,02           | 0,02           | 0,12           | 0,17           | 0,18           | 0,16          | 0,19          | 0,28              | 0,18              | 0,31              | 0,27              | 0,28              | 0,31              |               |      |
| CI mittlere Differenz        |  |                              | [-0,23; 0,04]  | [-0,14; 0,19]  | [-0,17; 0,21]  | [-0,06; 0,30]  | [-0,02; 0,37]  | [-0,01; 0,37]  | [-0,03; 0,35] | [0,00; 0,39]  | [0,06; 0,49]      | [-0,03; 0,39]     | [0,09; 0,53]      | [0,03; 0,51]      | [0,04; 0,53]      | [0,07; 0,54]      |               |      |
| Median mittlere Differenz    |  | 0,00                         | 0,10           | 0,10           | 0,20           | 0,20           | 0,20           | 0,30           | 0,20          | 0,30          | 0,30              | 0,40              | 0,30              | 0,40              | 0,40              |                   |               |      |
| 2005-2                       | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2287           | 2094           | 1857           | 1690           | 1582           | 1510           | 1432          | 1368          | 1309              | 1254              | 1185              | 1153              | 1103              | 1050              |               |      |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 2285           | 2038           | 1816           | 1655           | 1550           | 1468           | 1384          | 1341          | 1281              | 1229              | 1164              | 1133              | 1072              | 1032              |               |      |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 7,82           | 7,73           | 7,71           | 7,73           | 7,72           | 7,71           | 7,73          | 7,78          | 7,82              | 7,82              | 7,79              | 7,82              | 7,78              | 7,81              |               |      |
|                              |  | CI Mean                      | [7,75; 7,88]   | [7,67; 7,79]   | [7,65; 7,78]   | [7,67; 7,80]   | [7,65; 7,78]   | [7,64; 7,78]   | [7,66; 7,80]  | [7,71; 7,85]  | [7,75; 7,89]      | [7,75; 7,89]      | [7,72; 7,86]      | [7,75; 7,89]      | [7,70; 7,85]      | [7,74; 7,88]      |               |      |
|                              |  | Median                       | 7,50           | 7,50           | 7,50           | 7,50           | 7,50           | 7,50           | 7,50          | 7,60          | 7,60              | 7,70              | 7,70              | 7,60              | 7,60              | 7,70              |               |      |
|                              |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2037           | 1816           | 1655           | 1550           | 1468           | 1384          | 1341          | 1281              | 1229              | 1164              | 1133              | 1072              | 1032              |               |      |
|                              |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,01          | 0,02           | 0,07           | 0,08           | 0,08           | 0,12          | 0,17          | 0,22              | 0,22              | 0,18              | 0,22              | 0,19              | 0,25              |               |      |
|                              |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,06; 0,04]  | [-0,04; 0,07]  | [0,01; 0,12]   | [0,02; 0,14]   | [0,02; 0,15]   | [0,05; 0,18]  | [0,10; 0,24]  | [0,15; 0,29]      | [0,15; 0,29]      | [0,11; 0,26]      | [0,15; 0,30]      | [0,11; 0,27]      | [0,17; 0,33]      |               |      |
|                              | Median mittlere Differenz              |                              | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,20          | 0,20          | 0,20              | 0,20              | 0,30              | 0,20              | 0,30              |                   |               |      |
|                              | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 1772           | 1624           | 1439           | 1318           | 1242           | 1172           | 1116          | 1075          | 1026              | 966               | 936               | 903               | 870               | 839               |               |      |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 1771           | 1569           | 1400           | 1285           | 1219           | 1142           | 1074          | 1039          | 992               | 948               | 917               | 882               | 853               | 805               |               |      |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 7,85           | 7,79           | 7,76           | 7,81           | 7,79           | 7,83           | 7,78          | 7,87          | 7,88              | 7,92              | 7,92              | 7,95              | 7,85              | 7,92              |               |      |
|                              |  | CI Mean                      | [7,78; 7,92]   | [7,72; 7,85]   | [7,69; 7,82]   | [7,74; 7,88]   | [7,71; 7,86]   | [7,76; 7,91]   | [7,70; 7,85]  | [7,79; 7,95]  | [7,81; 7,96]      | [7,84; 8,00]      | [7,83; 8,00]      | [7,86; 8,03]      | [7,77; 7,94]      | [7,84; 8,01]      |               |      |
|                              |  | Median                       | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,70          | 7,70          | 7,70              | 7,75              | 7,80              | 7,80              | 7,70              | 7,70              |               |      |
| Fallbasis mittlere Differenz |  |                              | 1569           | 1400           | 1285           | 1219           | 1142           | 1074           | 1039          | 992           | 948               | 917               | 882               | 853               | 805               |                   |               |      |
| Mittlere Differenz zur ED    |  |                              | 0,01           | 0,02           | 0,09           | 0,09           | 0,15           | 0,13           | 0,23          | 0,25          | 0,30              | 0,30              | 0,35              | 0,27              | 0,31              |                   |               |      |
| CI mittlere Differenz        |  |                              | [-0,04; 0,07]  | [-0,04; 0,07]  | [0,02; 0,15]   | [0,02; 0,15]   | [0,09; 0,22]   | [0,06; 0,20]   | [0,16; 0,31]  | [0,18; 0,33]  | [0,22; 0,38]      | [0,22; 0,38]      | [0,27; 0,43]      | [0,18; 0,35]      | [0,23; 0,39]      |                   |               |      |
| Median mittlere Differenz    |  | 0,10                         | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,20           | 0,30          | 0,30          | 0,30              | 0,40              | 0,30              | 0,30              |                   |                   |               |      |
| 2006-1                       | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2245           | 2019           | 1756           | 1611           | 1483           | 1408           | 1329          | 1225          | 1149              | 1090              | 1039              | 984               | 932               |                   |               |      |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 2245           | 1965           | 1718           | 1557           | 1440           | 1345           | 1280          | 1195          | 1131              | 1077              | 1019              | 968               | 907               |                   |               |      |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,12           | 7,82           | 7,84           | 7,84           | 7,82           | 7,81           | 7,87          | 7,86          | 7,88              | 7,83              | 7,87              | 7,82              | 7,86              |                   |               |      |
|                              |  | CI Mean                      | [8,05; 8,19]   | [7,76; 7,88]   | [7,78; 7,91]   | [7,77; 7,91]   | [7,75; 7,89]   | [7,74; 7,89]   | [7,80; 7,95]  | [7,79; 7,94]  | [7,81; 7,96]      | [7,75; 7,90]      | [7,79; 7,95]      | [7,74; 7,90]      | [7,78; 7,94]      |                   |               |      |
|                              |  | Median                       | 7,80           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,65           | 7,60           | 7,70          | 7,70          | 7,70              | 7,70              | 7,70              | 7,70              | 7,70              |                   |               |      |
|                              |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1965           | 1718           | 1557           | 1440           | 1345           | 1280          | 1195          | 1131              | 1077              | 1019              | 968               | 907               |                   |               |      |
|                              |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,24          | -0,15          | -0,15          | -0,15          | -0,11          | -0,06         | -0,04         | -0,01             | -0,04             | 0,01              | -0,05             | 0,02              |                   |               |      |
|                              |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,30; -0,18] | [-0,21; -0,09] | [-0,22; -0,08] | [-0,22; -0,08] | [-0,19; -0,04] | [-0,13; 0,02] | [-0,12; 0,04] | [-0,10; 0,07]     | [-0,13; 0,04]     | [-0,08; 0,10]     | [-0,14; 0,04]     | [-0,07; 0,11]     |                   |               |      |
|                              | Median mittlere Differenz              |                              | -0,10          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10          | 0,10          | 0,10              | 0,10              | 0,10              | 0,10              |                   |                   |               |      |
|                              | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 1759           | 1578           | 1380           | 1253           | 1159           | 1105           | 1057          | 991           | 933               | 884               | 844               | 797               | 747               |                   |               |      |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 1759           | 1531           | 1339           | 1211           | 1114           | 1056           | 1030          | 961           | 910               | 868               | 826               | 782               | 734               |                   |               |      |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,19           | 7,92           | 7,92           | 7,91           | 7,85           | 7,92           | 7,95          | 7,95          | 7,99              | 7,95              | 8,06              | 7,99              | 8,02              |                   |               |      |
|                              |  | CI Mean                      | [8,12; 8,27]   | [7,84; 7,99]   | [7,85; 8,00]   | [7,83; 7,99]   | [7,77; 7,93]   | [7,84; 8,00]   | [7,87; 8,03]  | [7,87; 8,03]  | [7,91; 8,07]      | [7,87; 8,03]      | [7,97; 8,14]      | [7,91; 8,08]      | [7,93; 8,11]      |                   |               |      |
|                              |  | Median                       | 7,90           | 7,60           | 7,70           | 7,70           | 7,60           | 7,80           | 7,80          | 7,70          | 7,90              | 7,80              | 7,90              | 7,80              | 7,90              |                   |               |      |
| Fallbasis mittlere Differenz |  |                              | 1531           | 1339           | 1211           | 1114           | 1056           | 1030           | 961           | 910           | 868               | 826               | 782               | 734               |                   |                   |               |      |
| Mittlere Differenz zur ED    |  |                              | -0,25          | -0,17          | -0,17          | -0,20          | -0,12          | -0,07          | -0,07         | -0,04         | -0,05             | 0,05              | 0,00              | 0,04              |                   |                   |               |      |
| CI mittlere Differenz        |  |                              | [-0,31; -0,18] | [-0,25; -0,10] | [-0,25; -0,10] | [-0,28; -0,12] | [-0,20; -0,03] | [-0,16; 0,01]  | [-0,16; 0,03] | [-0,13; 0,06] | [-0,14; 0,05]     | [-0,05; 0,15]     | [-0,10; 0,10]     | [-0,06; 0,15]     |                   |                   |               |      |
| Median mittlere Differenz    |  | -0,10                        | -0,10          | -0,10          | -0,10          | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10          | 0,00          | 0,10              | 0,10              | 0,10              |                   |                   |                   |               |      |



| EZ                        | Patienten und ihre HbA1c-Konzentration | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-2                    | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3054           | 2707           | 2393           | 2179           | 2052           | 1924           | 1796           | 1691           | 1605              | 1506              | 1434              | 1366              |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 3050           | 2646           | 2310           | 2128           | 1937           | 1863           | 1745           | 1652           | 1580              | 1477              | 1412              | 1337              |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,05           | 7,71           | 7,64           | 7,63           | 7,64           | 7,67           | 7,67           | 7,72           | 7,67              | 7,69              | 7,67              | 7,71              |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [7,98; 8,11]   | [7,65; 7,76]   | [7,59; 7,70]   | [7,57; 7,68]   | [7,59; 7,70]   | [7,61; 7,73]   | [7,61; 7,72]   | [7,66; 7,78]   | [7,61; 7,73]      | [7,62; 7,75]      | [7,60; 7,73]      | [7,65; 7,78]      |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 7,60           | 7,50           | 7,50           | 7,40           | 7,40           | 7,50           | 7,50           | 7,60           | 7,50              | 7,50              | 7,50              | 7,50              |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2643           | 2307           | 2125           | 1934           | 1861           | 1743           | 1650           | 1578              | 1475              | 1410              | 1335              |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,23          | -0,20          | -0,19          | -0,15          | -0,10          | -0,09          | -0,04          | -0,08             | -0,05             | -0,06             | 0,00              |                   |                   |
|                           |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,28; -0,17] | [-0,26; -0,14] | [-0,25; -0,13] | [-0,22; -0,08] | [-0,17; -0,03] | [-0,16; -0,02] | [-0,11; -0,03] | [-0,15; -0,00]    | [-0,13; -0,03]    | [-0,14; -0,01]    | [-0,08; -0,08]    |                   |                   |
|                           | Median mittlere Differenz              |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,20           | 0,10           | 0,20              | 0,10              | 0,20              |                   |                   |                   |
|                           | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2346           | 2091           | 1875           | 1753           | 1639           | 1555           | 1433           | 1332           | 1263              | 1206              | 1147              | 1090              |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 2344           | 2035           | 1829           | 1695           | 1531           | 1490           | 1386           | 1297           | 1243              | 1180              | 1122              | 1074              |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,02           | 7,84           | 7,81           | 7,79           | 7,82           | 7,84           | 7,85           | 7,91           | 7,83              | 7,83              | 7,81              | 7,86              |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [7,96; 8,09]   | [7,77; 7,90]   | [7,74; 7,87]   | [7,72; 7,85]   | [7,75; 7,88]   | [7,77; 7,91]   | [7,78; 7,92]   | [7,84; 7,98]   | [7,77; 7,90]      | [7,76; 7,89]      | [7,73; 7,88]      | [7,79; 7,94]      |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 7,70           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,70           | 7,70           | 7,70           | 7,70              | 7,70              | 7,70              | 7,70              |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2034           | 1829           | 1695           | 1531           | 1490           | 1386           | 1297           | 1243              | 1180              | 1122              | 1074              |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,12          | -0,11          | -0,09          | -0,01          | 0,00           | 0,04           | 0,13           | 0,08              | 0,10              | 0,07              | 0,14              |                   |                   |
| CI mittlere Differenz     |  |                              | [-0,17; -0,07] | [-0,16; -0,05] | [-0,15; -0,03] | [-0,07; -0,06] | [-0,06; -0,07] | [-0,03; -0,11] | [0,06; 0,20]   | [0,01; 0,16]   | [0,03; 0,18]      | [-0,01; -0,15]    | [0,07; 0,22]      |                   |                   |                   |
| Median mittlere Differenz |  | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,20           | 0,20           | 0,10           | 0,10              | 0,20              |                   |                   |                   |                   |
| 2007-1                    | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 6522           | 5910           | 5338           | 4997           | 4736           | 4458           | 4205           | 4002           | 3822              | 3669              | 3522              |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 6517           | 5757           | 5218           | 4795           | 4591           | 4375           | 4121           | 3932           | 3768              | 3605              | 3446              |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 7,93           | 7,63           | 7,63           | 7,62           | 7,68           | 7,65           | 7,74           | 7,67           | 7,69              | 7,64              | 7,70              |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [7,89; 7,98]   | [7,59; 7,67]   | [7,59; 7,66]   | [7,58; 7,65]   | [7,64; 7,72]   | [7,61; 7,69]   | [7,70; 7,78]   | [7,63; 7,71]   | [7,65; 7,73]      | [7,60; 7,68]      | [7,65; 7,74]      |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 7,50           | 7,40           | 7,40           | 7,40           | 7,50           | 7,40           | 7,50           | 7,50           | 7,50              | 7,50              | 7,50              |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 5753           | 5214           | 4793           | 4588           | 4372           | 4119           | 3930           | 3767              | 3605              | 3446              |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,22          | -0,17          | -0,13          | -0,05          | -0,05          | 0,06           | 0,00           | 0,04              | 0,01              | 0,07              |                   |                   |                   |
|                           |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,26; -0,18] | [-0,21; -0,14] | [-0,17; -0,09] | [-0,09; -0,01] | [-0,09; -0,01] | [0,01; 0,10]   | [-0,04; -0,05] | [-0,01; -0,09]    | [-0,04; -0,05]    | [0,03; 0,12]      |                   |                   |                   |
|                           | Median mittlere Differenz              |                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,20           | 0,10           | 0,10              | 0,10              | 0,20              |                   |                   |                   |
|                           | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 5314           | 4880           | 4472           | 4196           | 3934           | 3716           | 3532           | 3362           | 3209              | 3071              | 2944              |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 5311           | 4780           | 4367           | 4000           | 3825           | 3630           | 3475           | 3281           | 3146              | 3005              | 2886              |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 7,92           | 7,72           | 7,70           | 7,71           | 7,79           | 7,76           | 7,85           | 7,78           | 7,82              | 7,75              | 7,78              |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [7,88; 7,97]   | [7,68; 7,76]   | [7,66; 7,74]   | [7,67; 7,75]   | [7,75; 7,83]   | [7,72; 7,80]   | [7,81; 7,89]   | [7,74; 7,82]   | [7,78; 7,86]      | [7,71; 7,79]      | [7,74; 7,83]      |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 7,60           | 7,50           | 7,50           | 7,50           | 7,60           | 7,60           | 7,70           | 7,60           | 7,70              | 7,60              | 7,60              |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 4777           | 4364           | 3998           | 3824           | 3630           | 3475           | 3281           | 3146              | 3005              | 2886              |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,15          | -0,13          | -0,08          | 0,02           | 0,02           | 0,13           | 0,09           | 0,14              | 0,08              | 0,13              |                   |                   |                   |
| CI mittlere Differenz     |  |                              | [-0,19; -0,12] | [-0,17; -0,09] | [-0,12; -0,04] | [-0,02; -0,06] | [-0,02; -0,06] | [0,08; 0,17]   | [0,05; 0,13]   | [0,09; 0,18]   | [0,03; 0,12]      | [0,08; 0,18]      |                   |                   |                   |                   |
| Median mittlere Differenz |  | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,20           | 0,20           | 0,20           | 0,20           | 0,20              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2007-2                    | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 4414           | 3892           | 3512           | 3195           | 2899           | 2676           | 2514           | 2368           | 2249              | 2141              |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 4414           | 3759           | 3314           | 3065           | 2799           | 2597           | 2442           | 2300           | 2191              | 2088              |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,22           | 7,80           | 7,76           | 7,82           | 7,81           | 7,89           | 7,85           | 7,86           | 7,82              | 7,83              |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,16; 8,28]   | [7,75; 7,85]   | [7,71; 7,80]   | [7,77; 7,86]   | [7,76; 7,86]   | [7,83; 7,94]   | [7,79; 7,90]   | [7,81; 7,92]   | [7,77; 7,88]      | [7,78; 7,89]      |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 7,80           | 7,50           | 7,50           | 7,60           | 7,60           | 7,70           | 7,60           | 7,65           | 7,60              | 7,60              |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 3759           | 3314           | 3065           | 2799           | 2597           | 2442           | 2300           | 2191              | 2088              |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,33          | -0,33          | -0,23          | -0,21          | -0,10          | -0,13          | -0,09          | -0,12             | -0,08             |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,38; -0,28] | [-0,38; -0,27] | [-0,29; -0,17] | [-0,27; -0,15] | [-0,16; -0,03] | [-0,20; -0,06] | [-0,16; -0,02] | [-0,19; -0,05]    | [-0,16; -0,01]    |                   |                   |                   |                   |
|                           | Median mittlere Differenz              |                              | -0,10          | -0,10          | 0,00           | 0,00           | 0,20           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,10              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3459           | 3091           | 2830           | 2577           | 2330           | 2170           | 2043           | 1941           | 1835              | 1756              |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 3457           | 2996           | 2645           | 2476           | 2264           | 2121           | 1985           | 1897           | 1799              | 1712              |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,17           | 7,86           | 7,84           | 7,92           | 7,87           | 7,94           | 7,87           | 7,92           | 7,85              | 7,92              |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,11; 8,23]   | [7,80; 7,91]   | [7,79; 7,90]   | [7,86; 7,97]   | [7,82; 7,93]   | [7,88; 8,00]   | [7,81; 7,93]   | [7,86; 7,98]   | [7,80; 7,91]      | [7,86; 7,98]      |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 7,80           | 7,60           | 7,60           | 7,70           | 7,70           | 7,70           | 7,70           | 7,80           | 7,70              | 7,80              |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2994           | 2643           | 2474           | 2263           | 2120           | 1984           | 1896           | 1798              | 1711              |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,24          | -0,21          | -0,12          | -0,11          | -0,01          | -0,04          | 0,02           | -0,05             | 0,04              |                   |                   |                   |                   |
| CI mittlere Differenz     |  |                              | [-0,29; -0,19] | [-0,27; -0,16] | [-0,17; -0,06] | [-0,17; -0,04] | [-0,07; -0,06] | [-0,11; -0,02] | [-0,05; -0,09] | [-0,12; -0,02] | [-0,03; -0,11]    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Median mittlere Differenz |  | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,20           | 0,10           | 0,20           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                        | Patienten und ihre HbA1c-Konzentration | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008-1                    | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 4190           | 3689           | 3307           | 2914           | 2653           | 2459           | 2274           | 2144           | 2046              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 4185           | 3473           | 3120           | 2788           | 2568           | 2376           | 2206           | 2088           | 1982              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,42           | 7,81           | 7,86           | 7,85           | 7,88           | 7,83           | 7,87           | 7,82           | 7,85              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,36; 8,48]   | [7,76; 7,86]   | [7,81; 7,91]   | [7,80; 7,90]   | [7,82; 7,93]   | [7,78; 7,89]   | [7,81; 7,92]   | [7,76; 7,87]   | [7,79; 7,91]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 8,00           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,70           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 3471           | 3118           | 2786           | 2567           | 2375           | 2205           | 2087           | 1981              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,52          | -0,42          | -0,40          | -0,33          | -0,35          | -0,29          | -0,34          | -0,25             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,58; -0,46] | [-0,48; -0,35] | [-0,47; -0,33] | [-0,40; -0,26] | [-0,42; -0,28] | [-0,37; -0,22] | [-0,42; -0,26] | [-0,33; -0,17]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Median mittlere Differenz              |                              | -0,10          | -0,10          | -0,10          | 0,00           | -0,10          | 0,00           | -0,10          | 0,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3188           | 2871           | 2579           | 2319           | 2120           | 1972           | 1834           | 1736           | 1650              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 3177           | 2724           | 2446           | 2234           | 2063           | 1909           | 1791           | 1684           | 1594              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,29           | 7,85           | 7,90           | 7,88           | 7,93           | 7,86           | 7,94           | 7,83           | 7,89              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,22; 8,36]   | [7,79; 7,91]   | [7,84; 7,95]   | [7,82; 7,94]   | [7,87; 7,99]   | [7,80; 7,92]   | [7,87; 8,00]   | [7,77; 7,89]   | [7,83; 7,96]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 7,90           | 7,60           | 7,70           | 7,70           | 7,70           | 7,70           | 7,80           | 7,70           | 7,70              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2714           | 2436           | 2225           | 2055           | 1902           | 1784           | 1677           | 1588              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,38          | -0,26          | -0,25          | -0,16          | -0,20          | -0,11          | -0,21          | -0,15             |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI mittlere Differenz     |  |                              | [-0,44; -0,32] | [-0,33; -0,20] | [-0,32; -0,18] | [-0,23; -0,08] | [-0,28; -0,12] | [-0,19; -0,03] | [-0,30; -0,13] | [-0,24; -0,06] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Median mittlere Differenz |  | -0,10                        | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,00           | 0,10           | 0,00           | 0,10           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-2                    | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2893           | 2495           | 2153           | 1904           | 1738           | 1605           | 1505           | 1412           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 2887           | 2378           | 2057           | 1832           | 1683           | 1542           | 1443           | 1361           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,43           | 7,91           | 7,81           | 7,88           | 7,86           | 7,90           | 7,85           | 7,85           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,35; 8,50]   | [7,84; 7,97]   | [7,75; 7,88]   | [7,82; 7,95]   | [7,79; 7,93]   | [7,82; 7,98]   | [7,78; 7,93]   | [7,77; 7,92]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 8,00           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           | 7,60           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2373           | 2053           | 1828           | 1680           | 1539           | 1440           | 1358           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,41          | -0,44          | -0,33          | -0,32          | -0,26          | -0,26          | -0,24          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,49; -0,34] | [-0,52; -0,36] | [-0,42; -0,25] | [-0,40; -0,23] | [-0,35; -0,17] | [-0,36; -0,17] | [-0,34; -0,15] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Median mittlere Differenz              |                              | 0,00           | -0,10          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2099           | 1848           | 1615           | 1424           | 1290           | 1198           | 1124           | 1060           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 2093           | 1772           | 1555           | 1365           | 1237           | 1149           | 1093           | 1014           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,36           | 7,96           | 7,90           | 7,96           | 7,90           | 7,92           | 7,93           | 7,94           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,28; 8,45]   | [7,89; 8,04]   | [7,83; 7,97]   | [7,89; 8,04]   | [7,83; 7,98]   | [7,85; 8,00]   | [7,85; 8,00]   | [7,86; 8,02]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 8,00           | 7,80           | 7,70           | 7,70           | 7,70           | 7,80           | 7,80           | 7,80           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1766           | 1550           | 1360           | 1233           | 1145           | 1089           | 1010           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,30          | -0,29          | -0,19          | -0,21          | -0,16          | -0,12          | -0,08          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI mittlere Differenz     |  |                              | [-0,37; -0,22] | [-0,37; -0,21] | [-0,28; -0,10] | [-0,30; -0,11] | [-0,26; -0,06] | [-0,22; -0,02] | [-0,19; -0,02] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Median mittlere Differenz |  | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,10           | 0,10           | 0,10           |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-1                    | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3215           | 2781           | 2408           | 2143           | 1971           | 1823           | 1697           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 3205           | 2674           | 2311           | 2079           | 1904           | 1766           | 1646           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,59           | 7,87           | 7,88           | 7,86           | 7,89           | 7,85           | 7,91           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,52; 8,67]   | [7,81; 7,93]   | [7,82; 7,94]   | [7,80; 7,92]   | [7,83; 7,96]   | [7,79; 7,91]   | [7,84; 7,97]   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 8,10           | 7,60           | 7,70           | 7,60           | 7,60           | 7,70           | 7,70           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 2665           | 2303           | 2071           | 1900           | 1763           | 1642           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,66          | -0,52          | -0,52          | -0,46          | -0,48          | -0,39          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI mittlere Differenz        |                | [-0,74; -0,59] | [-0,60; -0,44] | [-0,60; -0,43] | [-0,55; -0,37] | [-0,57; -0,39] | [-0,49; -0,30] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Median mittlere Differenz              |                              | -0,20          | -0,10          | -0,10          | -0,10          | -0,10          | 0,00           |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2420           | 2074           | 1813           | 1629           | 1496           | 1367           | 1268           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | auswertbar                             | Anzahl                       | 2413           | 1995           | 1740           | 1572           | 1434           | 1315           | 1223           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,55           | 7,98           | 8,01           | 7,97           | 8,02           | 7,94           | 7,99           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | CI Mean                      | [8,47; 8,63]   | [7,91; 8,05]   | [7,94; 8,08]   | [7,90; 8,04]   | [7,95; 8,10]   | [7,87; 8,02]   | [7,91; 8,06]   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Median                       | 8,10           | 7,70           | 7,80           | 7,80           | 7,80           | 7,70           | 7,80           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Fallbasis mittlere Differenz |                | 1989           | 1733           | 1566           | 1428           | 1309           | 1217           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |  | Mittlere Differenz zur ED    |                | -0,48          | -0,40          | -0,41          | -0,33          | -0,37          | -0,32          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI mittlere Differenz     |  |                              | [-0,56; -0,40] | [-0,48; -0,32] | [-0,50; -0,32] | [-0,42; -0,23] | [-0,48; -0,27] | [-0,43; -0,22] |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Median mittlere Differenz |  | -0,10                        | -0,10          | -0,10          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ     | Patienten und ihre HbA1c-Konzentration | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr  | 3. Halbjahr        | 4. Halbjahr        | 5. Halbjahr        | 6. Halbjahr        | 7. Halbjahr        | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-2 | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2729         | 2303               | 1970               | 1730               | 1565               | 1452               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                             | Anzahl                       | 2723         | 2219               | 1885               | 1666               | 1497               | 1396               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,67         | 7,99               | 7,93               | 7,94               | 7,88               | 7,95               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                      | [8,59; 8,74] | [7,93; 8,05]       | [7,86; 8,00]       | [7,87; 8,01]       | [7,81; 7,95]       | [7,87; 8,03]       |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median                       | 8,20         | 7,70               | 7,70               | 7,70               | 7,60               | 7,70               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 2214               | 1880               | 1661               | 1493               | 1393               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |              | -0,59              | -0,62              | -0,56              | -0,60              | -0,50              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |              | [-0,67; -<br>0,51] | [-0,71; -<br>0,53] | [-0,65; -<br>0,46] | [-0,70; -<br>0,50] | [-0,61; -<br>0,39] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |              | -0,10              | -0,20              | -0,20              | -0,20              | -0,10              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2127         | 1839               | 1616               | 1458               | 1328               | 1245               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                             | Anzahl                       | 2122         | 1768               | 1542               | 1408               | 1280               | 1197               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,54         | 8,01               | 7,94               | 8,00               | 7,92               | 7,96               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                      | [8,45; 8,62] | [7,93; 8,08]       | [7,87; 8,02]       | [7,92; 8,08]       | [7,83; 8,00]       | [7,88; 8,04]       |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median                       | 8,10         | 7,80               | 7,70               | 7,70               | 7,70               | 7,70               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 1764               | 1539               | 1405               | 1277               | 1194               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |              | -0,47              | -0,48              | -0,40              | -0,47              | -0,40              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |              | [-0,55; -<br>0,38] | [-0,57; -<br>0,38] | [-0,50; -<br>0,30] | [-0,57; -<br>0,36] | [-0,51; -<br>0,29] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |              | 0,00               | -0,10              | 0,00               | -0,10              | -0,10              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-1 | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3025         | 2538               | 2206               | 1972               | 1813               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                             | Anzahl                       | 3020         | 2441               | 2124               | 1912               | 1754               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,78         | 7,90               | 7,94               | 7,88               | 7,90               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                      | [8,71; 8,86] | [7,83; 7,96]       | [7,87; 8,00]       | [7,81; 7,95]       | [7,83; 7,96]       |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median                       | 8,30         | 7,60               | 7,70               | 7,60               | 7,70               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 2437               | 2120               | 1909               | 1751               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |              | -0,83              | -0,72              | -0,74              | -0,70              |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |              | [-0,91; -<br>0,75] | [-0,81; -<br>0,63] | [-0,84; -<br>0,65] | [-0,80; -<br>0,60] |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |              | -0,20              | -0,20              | -0,30              | -0,20              |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2174         | 1850               | 1591               | 1428               | 1299               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                             | Anzahl                       | 2172         | 1784               | 1534               | 1378               | 1251               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,65         | 8,05               | 8,07               | 8,01               | 8,00               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                      | [8,57; 8,74] | [7,98; 8,12]       | [8,00; 8,15]       | [7,94; 8,09]       | [7,93; 8,08]       |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median                       | 8,30         | 7,80               | 7,90               | 7,80               | 7,80               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 1782               | 1532               | 1376               | 1249               |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |              | -0,52              | -0,42              | -0,45              | -0,40              |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |              | [-0,60; -<br>0,45] | [-0,51; -<br>0,34] | [-0,54; -<br>0,36] | [-0,49; -<br>0,30] |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |              | -0,20              | -0,10              | -0,20              | -0,10              |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-2 | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3086         | 2626               | 2248               | 2023               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                             | Anzahl                       | 3082         | 2540               | 2166               | 1947               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,69         | 8,06               | 7,94               | 7,94               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                      | [8,61; 8,76] | [8,00; 8,12]       | [7,88; 8,00]       | [7,87; 8,00]       |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median                       | 8,20         | 7,80               | 7,70               | 7,70               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 2539               | 2165               | 1946               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |              | -0,55              | -0,57              | -0,56              |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |              | [-0,63; -<br>0,47] | [-0,66; -<br>0,49] | [-0,64; -<br>0,47] |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |              | -0,10              | -0,10              | -0,10              |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2312         | 2021               | 1768               | 1574               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar                             | Anzahl                       | 2307         | 1963               | 1708               | 1527               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,55         | 8,08               | 7,98               | 7,99               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                      | [8,48; 8,63] | [8,02; 8,15]       | [7,91; 8,05]       | [7,92; 8,06]       |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median                       | 8,20         | 7,80               | 7,80               | 7,80               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 1959               | 1704               | 1524               |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Mittlere Differenz zur ED    |              | -0,44              | -0,47              | -0,40              |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI mittlere Differenz        |              | [-0,51; -<br>0,36] | [-0,56; -<br>0,39] | [-0,49; -<br>0,31] |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median mittlere Differenz    |              | -0,10              | -0,10              | -0,10              |                    |                    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                           | Patienten und ihre HbA1c-Konzentration | Beitritts-<br>halbjahr       | 2. Halbjahr  | 3. Halbjahr        | 4. Halbjahr        | 5. Halbjahr        | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1                       | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3146         | 2666               | 2269               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 3143         | 2575               | 2173               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,88         | 7,93               | 7,95               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI Mean                      | [8,80; 8,95] | [7,87; 7,99]       | [7,89; 8,02]       |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Median                       | 8,40         | 7,60               | 7,70               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 2572               | 2170               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Mittlere Differenz zur ED    |              |                    | -0,86              | -0,77              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI mittlere Differenz        |              |                    | [-0,94; -<br>0,77] | [-0,86; -<br>0,68] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Median mittlere Differenz              |                              |              | -0,30              | -0,30              |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2382         | 2091               | 1809               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 2379         | 2042               | 1753               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,75         | 8,10               | 8,08               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI Mean                      | [8,66; 8,83] | [8,03; 8,18]       | [8,01; 8,16]       |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Median                       | 8,30         | 7,80               | 7,90               |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Fallbasis mittlere Differenz |  |                              | 2040         | 1752               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Mittlere Differenz zur ED    |  |                              |              | -0,57              | -0,53              |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI mittlere Differenz        |  |                              |              | [-0,65; -<br>0,49] | [-0,61; -<br>0,45] |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median mittlere Differenz    |  |                              | -0,20        | -0,20              |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-2                       | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3031         | 2602               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 3025         | 2483               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,74         | 8,05               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI Mean                      | [8,67; 8,82] | [7,99; 8,12]       |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Median                       | 8,30         | 7,80               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Fallbasis mittlere Differenz |              | 2478               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Mittlere Differenz zur ED    |              |                    | -0,61              |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI mittlere Differenz        |              |                    | [-0,69; -<br>0,54] |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Median mittlere Differenz              |                              |              | -0,10              |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2272         | 1963               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 2269         | 1872               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,71         | 8,13               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI Mean                      | [8,63; 8,80] | [8,05; 8,20]       |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Median                       | 8,30         | 7,80               |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Fallbasis mittlere Differenz |  |                              | 1870         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Mittlere Differenz zur ED    |  |                              |              | -0,50              |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI mittlere Differenz        |  |                              |              | [-0,58; -<br>0,41] |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median mittlere Differenz    |  |                              | -0,10        |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2012-1                       | <b>männliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 3423         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 3418         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,92         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI Mean                      | [8,85; 8,99] |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Median                       | 8,40         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Fallbasis mittlere Differenz |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Mittlere Differenz zur ED    |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI mittlere Differenz        |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Median mittlere Differenz              |                              |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | <b>weibliche Pat. insgesamt</b>        | Anzahl                       | 2494         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | auswertbar                             | Anzahl                       | 2488         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              | Auswertungsergebnisse<br>zum HbA1c     | Mean                         | 8,81         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | CI Mean                      | [8,73; 8,89] |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                              |  | Median                       | 8,40         |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Fallbasis mittlere Differenz |  |                              |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Mittlere Differenz zur ED    |  |                              |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI mittlere Differenz        |  |                              |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median mittlere Differenz    |  |                              |              |                    |                    |                    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In Tabelle 3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte werden dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten

ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalbjahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

**Tabelle 3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen**

| EZ                                       | 2005-1                                 | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr                   | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |       |     |
|--|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|
|  |  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                                   | 342            | 318            | 277            | 242            | 220            | 207            | 194            | 186            | 176            | 172            | 167            | 159            | 152            | 147            | 141   |     |
|  |  | auswertbar                                    | Anzahl                                   | 342            | 310            | 266            | 238            | 218            | 207            | 194            | 184            | 174            | 168            | 161            | 155            | 148            | 144            | 144   | 138 |
|  |  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                                   | 22             | 26             | 22             | 17             | 9              | 12             | 11             | 11             | 10             | 5              | 4              | 5              | 5              | 4              | 4     | 6   |
|  |  |   | Anteil in %                              | 6,43           | 8,39           | 8,27           | 7,14           | 4,13           | 5,80           | 5,67           | 5,98           | 5,75           | 2,98           | 2,48           | 3,23           | 3,38           | 2,78           | 4,35  |     |
|  |  | CI Anteil in %                                | [3,83; 9,04]                             | [5,30; 11,48]  | [4,95; 11,59]  | [3,86; 10,42]  | [1,48; 6,78]   | [2,61; 8,99]   | [2,41; 8,93]   | [2,54; 9,41]   | [2,28; 9,22]   | [0,40; 5,55]   | [0,07; 4,90]   | [0,44; 6,02]   | [0,46; 6,30]   | [0,08; 5,47]   | [0,93; 7,76]   |       |     |
|  |  |   | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl         | 99             | 105            | 75             | 75             | 68             | 69             | 62             | 58             | 48             | 56             | 53             | 49             | 43             | 39    | 36  |
|  |  | Anteil in %                                   |  | 28,95          | 33,87          | 28,20          | 31,51          | 31,19          | 33,33          | 31,96          | 31,52          | 27,59          | 33,33          | 32,92          | 31,61          | 29,05          | 27,08          | 26,09 |     |
|  |  | CI Anteil in %                                | [24,13; 33,76]                           | [28,59; 39,15] | [22,78; 33,61] | [25,60; 37,43] | [25,03; 37,36] | [26,90; 39,77] | [25,38; 38,54] | [24,79; 38,25] | [20,93; 34,25] | [26,18; 40,48] | [25,64; 40,20] | [24,27; 38,96] | [21,71; 36,39] | [19,80; 34,37] | [18,73; 33,44] |       |     |
|  |  |   | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl         | 83             | 83             | 77             | 62             | 69             | 51             | 47             | 50             | 56             | 51             | 45             | 41             | 50             | 55    | 48  |
|  |  | Anteil in %                                   |  | 24,27          | 26,77          | 28,95          | 26,05          | 31,65          | 24,64          | 24,23          | 27,17          | 32,18          | 30,36          | 27,95          | 26,45          | 33,78          | 38,19          | 34,78 |     |
|  |  | CI Anteil in %                                | [19,72; 28,82]                           | [21,84; 31,71] | [23,49; 34,41] | [20,46; 31,64] | [25,46; 37,84] | [18,75; 30,52] | [18,18; 30,27] | [20,73; 33,62] | [25,22; 39,15] | [23,38; 37,33] | [21,00; 34,90] | [19,49; 33,42] | [26,14; 41,43] | [30,23; 46,16] | [26,81; 42,76] |       |     |
|  |  |   | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl         | 38             | 36             | 33             | 39             | 16             | 22             | 26             | 22             | 20             | 20             | 22             | 27             | 21             | 18    | 15  |
|  |  | Anteil in %                                   |  | 11,11          | 11,61          | 12,41          | 16,39          | 7,34           | 10,63          | 13,40          | 11,96          | 11,49          | 11,90          | 13,66          | 17,42          | 14,19          | 12,50          | 10,87 |     |
|  |  | CI Anteil in %                                | [7,78; 14,45]                            | [8,04; 15,19]  | [8,44; 16,38]  | [11,67; 21,10] | [3,87; 10,81]  | [6,42; 14,84]  | [8,60; 18,21]  | [7,26; 16,66]  | [6,74; 16,25]  | [6,99; 16,82]  | [8,34; 18,99]  | [11,43; 23,41] | [8,55; 19,83]  | [7,08; 17,92]  | [5,66; 16,08]  |       |     |
|  |  |   | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl         | 59             | 38             | 33             | 34             | 39             | 36             | 33             | 31             | 30             | 29             | 26             | 30             | 23             | 26    | 31  |
|  |  | Anteil in %                                   |  | 17,25          | 12,26          | 12,41          | 14,29          | 17,89          | 17,39          | 17,01          | 16,85          | 17,24          | 17,26          | 16,15          | 19,35          | 15,54          | 18,06          | 22,46 |     |
|  |  | CI Anteil in %                                | [13,24; 21,26]                           | [8,60; 15,91]  | [8,44; 16,38]  | [9,83; 18,74]  | [12,79; 22,99] | [12,22; 22,57] | [11,71; 22,31] | [11,42; 22,27] | [11,61; 22,87] | [11,53; 22,99] | [10,45; 21,85] | [13,11; 25,59] | [9,68; 21,40]  | [11,75; 24,36] | [15,48; 29,45] |       |     |
|  |  |   | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl         | 41             | 22             | 26             | 11             | 17             | 17             | 15             | 12             | 10             | 7              | 11             | 3              | 6              | 2     | 2   |
|  |  | Anteil in %                                   |  | 11,99          | 7,10           | 9,77           | 4,62           | 7,80           | 8,21           | 7,73           | 6,52           | 5,75           | 4,17           | 6,83           | 1,94           | 4,05           | 1,39           | 1,45  |     |
|  |  | CI Anteil in %                                | [8,54; 15,44]                            | [4,23; 9,96]   | [6,20; 13,35]  | [1,95; 7,29]   | [4,23; 11,37]  | [4,46; 11,96]  | [3,96; 11,50]  | [2,94; 10,10]  | [2,28; 9,22]   | [1,14; 7,20]   | [2,92; 10,74]  | [0,00; 4,11]   | [0,87; 7,24]   | [0,00; 3,31]   | [0,00; 3,45]   |       |     |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl                                 |   | 292                                      | 281            | 246            | 214            | 195            | 183            | 174            | 167            | 160            | 151            | 145            | 141            | 139            | 136            | 129            |       |     |
|  |  | auswertbar                                    | Anzahl                                   | 292            | 277            | 224            | 210            | 194            | 181            | 169            | 165            | 156            | 147            | 143            | 139            | 135            | 129            | 125   |     |
|  |  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                                   | 19             | 16             | 9              | 8              | 6              | 3              | 4              | 4              | 4              | 6              | 3              | 5              | 3              | 5              | 3     | 2   |
| Anteil in %                              | 6,51                                   |   | 5,78                                     | 4,02           | 3,81           | 3,09           | 1,66           | 2,37           | 2,42           | 3,85           | 2,04           | 3,50           | 2,16           | 3,70           | 2,33           | 1,60           |                |       |     |
|  | CI Anteil in %                         | [3,67; 9,34]                                  | [3,02; 8,53]                             | [1,44; 6,60]   | [1,21; 6,40]   | [0,65; 5,54]   | [0,00; 3,52]   | [0,07; 4,67]   | [0,07; 4,78]   | [0,82; 6,87]   | [0,00; 4,33]   | [0,48; 6,52]   | [0,00; 4,58]   | [0,51; 6,90]   | [0,00; 4,94]   | [0,00; 3,81]   |                |       |     |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 |  | Anzahl  | 85                                       | 82             | 70             | 68             | 63             | 58             | 52             | 49             | 43             | 33             | 42             | 30             | 33             | 29             | 32             |       |     |
|  | Anteil in %                            | 29,11   | 29,60                                    | 31,25          | 32,38          | 32,47          | 32,04          | 30,77          | 29,70          | 27,56          | 22,45          | 29,37          | 21,58          | 24,44          | 22,48          | 25,60          |                |       |     |
| CI Anteil in %                           | [23,89; 34,33]                         | [24,22; 34,99]                                | [25,17; 37,33]                           | [26,04; 38,72] | [25,87; 39,08] | [25,23; 38,86] | [23,79; 37,75] | [22,70; 36,69] | [20,53; 34,60] | [15,68; 29,22] | [21,88; 36,86] | [14,72; 28,45] | [17,17; 31,72] | [15,25; 29,71] | [17,92; 33,28] |                |                |       |     |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0 | Anzahl  | 78                                       | 85             | 59             | 69             | 59             | 57             | 47             | 48             | 45             | 56             | 39             | 53             | 50             | 51             | 37             |       |     |
| Anteil in %                              |  | 26,71   | 30,69                                    | 26,34          | 32,86          | 30,41          | 31,49          | 27,81          | 29,09          | 28,85          | 38,10          | 27,27          | 38,13          | 37,04          | 39,53          | 29,60          |                |       |     |
| CI Anteil in %                           | [21,63; 31,80]                         | [25,24; 36,13]                                | [20,56; 32,12]                           | [26,49; 39,23] | [23,92; 36,90] | [24,71; 38,28] | [21,04; 34,59] | [22,14; 36,04] | [21,71; 35,98] | [30,22; 45,97] | [19,95; 34,60] | [30,03; 46,23] | [28,86; 45,21] | [31,06; 48,01] | [21,57; 37,63] |                |                |       |     |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5 | Anzahl  | 44                                       | 38             | 39             | 24             | 26             | 25             | 23             | 26             | 19             | 17             | 19             | 13             | 18             | 16             | 19             |       |     |
| Anteil in %                              |  | 15,07   | 13,72                                    | 17,41          | 11,43          | 13,40          | 13,81          | 13,61          | 15,76          | 12,18          | 11,56          | 13,29          | 9,35           | 13,33          | 12,40          | 15,20          |                |       |     |
| CI Anteil in %                           | [10,96; 19,18]                         | [9,66; 17,78]                                 | [12,43; 22,39]                           | [7,12; 15,74]  | [8,60; 18,21]  | [8,77; 18,85]  | [8,42; 18,79]  | [10,18; 21,33] | [7,03; 17,33]  | [6,38; 16,75]  | [7,70; 18,87]  | [4,49; 14,21]  | [7,58; 19,09]  | [6,69; 18,11]  | [8,88; 21,52]  |                |                |       |     |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0    | Anzahl  | 46                                       | 38             | 34             | 31             | 28             | 28             | 36             | 34             | 36             | 28             | 32             | 31             | 23             | 21             | 30             |       |     |
| Anteil in %                              |  | 15,75   | 13,72                                    | 15,18          | 14,76          | 14,43          | 15,47          | 21,30          | 20,61          | 23,08          | 19,05          | 22,38          | 22,30          | 17,04          | 16,28          | 24,00          |                |       |     |
| CI Anteil in %                           | [11,57; 19,94]                         | [9,66; 17,78]                                 | [10,47; 19,89]                           | [9,95; 19,57]  | [9,47; 19,39]  | [10,19; 20,75] | [15,11; 27,49] | [14,42; 26,80] | [16,44; 29,71] | [12,68; 25,42] | [15,52; 29,23] | [15,36; 29,25] | [10,67; 23,40] | [9,88; 22,67]  | [16,48; 31,52] |                |                |       |     |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0          | Anzahl  | 20                                       | 18             | 13             | 10             | 12             | 10             | 7              | 4              | 7              | 10             | 6              | 9              | 6              | 9              | 5              |       |     |
| Anteil in %                              |  | 6,85  | 6,50                                     | 5,80           | 4,76           | 6,19           | 5,52           | 4,14           | 2,42           | 4,49           | 6,80           | 4,20           | 6,47           | 4,44           | 6,98           | 4,00           |                |       |     |
| CI Anteil in %                           | [3,95; 9,75]                           | [3,59; 9,41]                                  | [2,73; 8,87]                             | [1,87; 7,65]   | [2,79; 9,58]   | [2,19; 8,86]   | [1,13; 7,16]   | [0,07; 4,78]   | [1,23; 7,75]   | [2,72; 10,89]  | [0,90; 7,49]   | [2,37; 10,58]  | [0,96; 7,93]   | [2,56; 11,39]  | [0,55; 7,45]   |                |                |       |     |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2005-2                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 2287           | 2094           | 1857           | 1690           | 1582           | 1510           | 1432           | 1368           | 1309              | 1254              | 1185              | 1153              | 1103              | 1050              |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 2285           | 2038           | 1816           | 1655           | 1550           | 1468           | 1384           | 1341           | 1281              | 1229              | 1164              | 1133              | 1072              | 1032              |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 170            | 134            | 135            | 109            | 108            | 91             | 87             | 77             | 55                | 56                | 56                | 49                | 47                | 35                |
|  |   | Anteil in %            | 7,44           | 6,58           | 7,43           | 6,59           | 6,97           | 6,20           | 6,29           | 5,74           | 4,29              | 4,56              | 4,81              | 4,32              | 4,38              | 3,39              |
|  |   | CI Anteil in %         | [6,36; 8,52]   | [5,50; 7,65]   | [6,23; 8,64]   | [5,39; 7,78]   | [5,70; 8,24]   | [4,96; 7,43]   | [5,01; 7,57]   | [4,50; 6,99]   | [3,18; 5,40]      | [3,39; 5,72]      | [3,58; 6,04]      | [3,14; 5,51]      | [3,16; 5,61]      | [2,29; 4,50]      |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 768            | 699            | 602            | 559            | 544            | 527            | 473            | 421            | 400               | 371               | 349               | 340               | 330               | 305               |
|  |   | Anteil in %            | 33,61          | 34,30          | 33,15          | 33,78          | 35,10          | 35,90          | 34,18          | 31,39          | 31,23             | 30,19             | 29,98             | 30,01             | 30,78             | 29,55             |
|  |   | CI Anteil in %         | [31,67; 35,55] | [32,24; 36,36] | [30,98; 35,32] | [31,50; 36,06] | [32,72; 37,47] | [33,44; 38,35] | [31,68; 36,68] | [28,91; 33,88] | [28,69; 33,76]    | [27,62; 32,75]    | [27,35; 32,62]    | [27,34; 32,68]    | [28,02; 33,55]    | [26,77; 32,34]    |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 569            | 516            | 489            | 430            | 393            | 361            | 372            | 368            | 355               | 347               | 339               | 330               | 329               | 323               |
|  |   | Anteil in %            | 24,90          | 25,32          | 26,93          | 25,98          | 25,35          | 24,59          | 26,88          | 27,44          | 27,71             | 28,23             | 29,12             | 29,13             | 30,69             | 31,30             |
|  |   | CI Anteil in %         | [23,13; 26,68] | [23,43; 27,21] | [24,89; 28,97] | [23,87; 28,10] | [23,19; 27,52] | [22,39; 26,79] | [24,54; 29,22] | [25,05; 29,83] | [25,26; 30,16]    | [25,72; 30,75]    | [26,51; 31,73]    | [26,48; 31,77]    | [27,93; 33,45]    | [28,47; 34,13]    |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 242            | 256            | 201            | 197            | 149            | 177            | 159            | 175            | 176               | 177               | 173               | 157               | 124               | 135               |
|  |   | Anteil in %            | 10,59          | 12,56          | 11,07          | 11,90          | 9,61           | 12,06          | 11,49          | 13,05          | 13,74             | 14,40             | 14,86             | 13,86             | 11,57             | 13,08             |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,33; 11,85]  | [11,12; 14,00] | [9,62; 12,51]  | [10,34; 13,46] | [8,14; 11,08]  | [10,39; 13,72] | [9,81; 13,17]  | [11,25; 14,85] | [11,85; 15,63]    | [12,44; 16,37]    | [12,82; 16,91]    | [11,84; 15,87]    | [9,65; 13,48]     | [11,02; 15,14]    |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 346            | 300            | 290            | 253            | 263            | 227            | 217            | 221            | 240               | 215               | 194               | 201               | 199               | 195               |
|  |   | Anteil in %            | 15,14          | 14,72          | 15,97          | 15,29          | 16,97          | 15,46          | 15,68          | 16,48          | 18,74             | 17,49             | 16,67             | 17,74             | 18,56             | 18,90             |
|  |   | CI Anteil in %         | [13,67; 16,61] | [13,18; 16,26] | [14,28; 17,65] | [13,55; 17,02] | [15,10; 18,84] | [13,61; 17,31] | [13,76; 17,60] | [14,49; 18,47] | [16,60; 20,87]    | [15,37; 19,62]    | [14,52; 18,81]    | [15,52; 19,97]    | [16,23; 20,89]    | [16,51; 21,28]    |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 190            | 133            | 99             | 107            | 93             | 85             | 76             | 79             | 55                | 63                | 53                | 56                | 43                | 39                |
|  |   | Anteil in %            | 8,32           | 6,53           | 5,45           | 6,47           | 6,00           | 5,79           | 5,49           | 5,89           | 4,29              | 5,13              | 4,55              | 4,94              | 4,01              | 3,78              |
|  |   | CI Anteil in %         | [7,18; 9,45]   | [5,45; 7,60]   | [4,41; 6,50]   | [5,28; 7,65]   | [4,82; 7,18]   | [4,60; 6,99]   | [4,29; 6,69]   | [4,63; 7,15]   | [3,18; 5,40]      | [3,89; 6,36]      | [3,36; 5,75]      | [3,68; 6,21]      | [2,84; 5,19]      | [2,62; 4,94]      |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 1772                   | 1624           | 1439           | 1318           | 1242           | 1172           | 1116           | 1075           | 1026           | 966               | 936               | 903               | 870               | 839               |                   |
| auswertbar                               | Anzahl  | 1771                   | 1569           | 1400           | 1285           | 1219           | 1142           | 1074           | 1039           | 992            | 948               | 917               | 882               | 853               | 805               |                   |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 114                    | 86             | 68             | 47             | 57             | 42             | 43             | 31             | 32             | 30                | 29                | 27                | 33                | 22                |                   |
|  | Anteil in %                                   | 6,44                   | 5,48           | 4,86           | 3,66           | 4,68           | 3,68           | 4,00           | 2,98           | 3,23           | 3,16              | 3,16              | 3,06              | 3,87              | 2,73              |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [5,29; 7,58]           | [4,35; 6,61]   | [3,73; 5,98]   | [2,63; 4,68]   | [3,49; 5,86]   | [2,59; 4,77]   | [2,83; 5,18]   | [1,95; 4,02]   | [2,13; 4,33]   | [2,05; 4,28]      | [2,03; 4,30]      | [1,92; 4,20]      | [2,57; 5,16]      | [1,61; 3,86]      |                   |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 542                    | 483            | 462            | 430            | 414            | 383            | 368            | 328            | 288            | 268               | 248               | 233               | 256               | 221               |                   |
|  | Anteil in %                                   | 30,60                  | 30,78          | 33,00          | 33,46          | 33,96          | 33,54          | 34,26          | 31,57          | 29,03          | 28,27             | 27,04             | 26,42             | 30,01             | 27,45             |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [28,46; 32,75]         | [28,50; 33,07] | [30,54; 35,46] | [30,88; 36,04] | [31,30; 36,62] | [30,80; 36,28] | [31,42; 37,10] | [28,74; 34,40] | [26,21; 31,86] | [25,40; 31,14]    | [24,17; 29,92]    | [23,51; 29,33]    | [26,93; 33,09]    | [24,37; 30,54]    |                   |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 497                    | 448            | 393            | 364            | 307            | 308            | 287            | 312            | 300            | 286               | 288               | 271               | 252               | 247               |                   |
|  | Anteil in %                                   | 28,06                  | 28,55          | 28,07          | 28,33          | 25,18          | 26,97          | 26,72          | 30,03          | 30,24          | 30,17             | 31,41             | 30,73             | 29,54             | 30,68             |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [25,97; 30,16]         | [26,32; 30,79] | [25,72; 30,43] | [25,86; 30,79] | [22,75; 27,62] | [24,40; 29,55] | [24,07; 29,37] | [27,24; 32,82] | [27,38; 33,10] | [27,25; 33,09]    | [28,40; 34,41]    | [27,68; 33,77]    | [26,48; 32,61]    | [27,50; 33,87]    |                   |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 212                    | 196            | 192            | 161            | 165            | 133            | 134            | 114            | 124            | 123               | 134               | 126               | 122               | 120               |                   |
|  | Anteil in %                                   | 11,97                  | 12,49          | 13,71          | 12,53          | 13,54          | 11,65          | 12,48          | 10,97          | 12,50          | 12,97             | 14,61             | 14,29             | 14,30             | 14,91             |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [10,46; 13,48]         | [10,86; 14,13] | [11,91; 15,52] | [10,72; 14,34] | [11,61; 15,46] | [9,78; 13,51]  | [10,50; 14,45] | [9,07; 12,87]  | [10,44; 14,56] | [10,83; 15,11]    | [12,33; 16,90]    | [11,98; 16,60]    | [11,95; 16,65]    | [12,44; 17,37]    |                   |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 277                    | 275            | 210            | 221            | 205            | 210            | 190            | 191            | 194            | 188               | 170               | 179               | 143               | 150               |                   |
|  | Anteil in %                                   | 15,64                  | 17,53          | 15,00          | 17,20          | 16,82          | 18,39          | 17,69          | 18,38          | 19,56          | 19,83             | 18,54             | 20,29             | 16,76             | 18,63             |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [13,95; 17,33]         | [15,65; 19,41] | [13,13; 16,87] | [15,13; 19,26] | [14,72; 18,92] | [16,14; 20,64] | [15,41; 19,97] | [16,03; 20,74] | [17,09; 22,03] | [17,29; 22,37]    | [16,02; 21,06]    | [17,64; 22,95]    | [14,26; 19,27]    | [15,94; 21,33]    |                   |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 129                    | 81             | 75             | 62             | 71             | 66             | 52             | 63             | 54             | 53                | 48                | 46                | 47                | 45                |                   |
|  | Anteil in %                                   | 7,28                   | 5,16           | 5,36           | 4,82           | 5,82           | 5,78           | 4,84           | 6,06           | 5,44           | 5,59              | 5,23              | 5,22              | 5,51              | 5,59              |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [6,07; 8,49]           | [4,07; 6,26]   | [4,18; 6,54]   | [3,65; 6,00]   | [4,51; 7,14]   | [4,43; 7,13]   | [3,56; 6,13]   | [4,61; 7,52]   | [4,03; 6,86]   | [4,13; 7,05]      | [3,79; 6,68]      | [3,75; 6,68]      | [3,98; 7,04]      | [4,00; 7,18]      |                   |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-1                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 2245           | 2019           | 1756           | 1611           | 1483           | 1408           | 1329           | 1225           | 1149              | 1090              | 1039              | 984               | 932               |                   |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 2245           | 1965           | 1718           | 1557           | 1440           | 1345           | 1280           | 1195           | 1131              | 1077              | 1019              | 968               | 907               |                   |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 122            | 130            | 96             | 87             | 71             | 67             | 58             | 52             | 45                | 54                | 47                | 42                | 37                |                   |
|  |   | Anteil in %            | 5,43           | 6,62           | 5,59           | 5,59           | 4,93           | 4,98           | 4,53           | 4,35           | 3,98              | 5,01              | 4,61              | 4,34              | 4,08              |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [4,50; 6,37]   | [5,52; 7,72]   | [4,50; 6,67]   | [4,45; 6,73]   | [3,81; 6,05]   | [3,82; 6,14]   | [3,39; 5,67]   | [3,19; 5,51]   | [2,84; 5,12]      | [3,71; 6,32]      | [3,32; 5,90]      | [3,05; 5,62]      | [2,79; 5,37]      |                   |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 604            | 614            | 538            | 499            | 464            | 421            | 381            | 370            | 327               | 324               | 297               | 303               | 263               |                   |
|  |   | Anteil in %            | 26,90          | 31,25          | 31,32          | 32,05          | 32,22          | 31,30          | 29,77          | 30,96          | 28,91             | 30,08             | 29,15             | 31,30             | 29,00             |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [25,07; 28,74] | [29,20; 33,30] | [29,12; 33,51] | [29,73; 34,37] | [29,81; 34,64] | [28,82; 33,78] | [27,26; 32,27] | [28,34; 33,58] | [26,27; 31,56]    | [27,34; 32,82]    | [26,35; 31,94]    | [28,38; 34,22]    | [26,04; 31,95]    |                   |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 563            | 489            | 448            | 394            | 389            | 379            | 355            | 327            | 319               | 300               | 293               | 258               | 274               |                   |
|  |   | Anteil in %            | 25,08          | 24,89          | 26,08          | 25,31          | 27,01          | 28,18          | 27,73          | 27,36          | 28,21             | 27,86             | 28,75             | 26,65             | 30,21             |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [23,28; 26,87] | [22,97; 26,80] | [24,00; 28,15] | [23,14; 27,47] | [24,72; 29,31] | [25,77; 30,58] | [25,28; 30,19] | [24,84; 29,89] | [25,58; 30,83]    | [25,18; 30,53]    | [25,97; 31,53]    | [23,87; 29,44]    | [27,22; 33,20]    |                   |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 267            | 246            | 202            | 184            | 185            | 167            | 173            | 156            | 155               | 139               | 132               | 143               | 112               |                   |
|  |   | Anteil in %            | 11,89          | 12,52          | 11,76          | 11,82          | 12,85          | 12,42          | 13,52          | 13,05          | 13,70             | 12,91             | 12,95             | 14,77             | 12,35             |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [10,55; 13,23] | [11,06; 13,98] | [10,23; 13,28] | [10,21; 13,42] | [11,12; 14,58] | [10,65; 14,18] | [11,64; 15,39] | [11,14; 14,97] | [11,70; 15,71]    | [10,90; 14,91]    | [10,89; 15,02]    | [12,54; 17,01]    | [10,21; 14,49]    |                   |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 434            | 352            | 312            | 275            | 233            | 223            | 236            | 215            | 214               | 193               | 183               | 167               | 164               |                   |
|  |   | Anteil in %            | 19,33          | 17,91          | 18,16          | 17,66          | 16,18          | 16,58          | 18,44          | 17,99          | 18,92             | 17,92             | 17,96             | 17,25             | 18,08             |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [17,70; 20,97] | [16,22; 19,61] | [16,34; 19,98] | [15,77; 19,56] | [14,28; 18,08] | [14,59; 18,57] | [16,31; 20,56] | [15,81; 20,17] | [16,64; 21,21]    | [15,63; 20,21]    | [15,60; 20,32]    | [14,87; 19,63]    | [15,58; 20,59]    |                   |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 255            | 134            | 122            | 118            | 98             | 88             | 77             | 75             | 71                | 67                | 67                | 55                | 57                |                   |
|  |   | Anteil in %            | 11,36          | 6,82           | 7,10           | 7,58           | 6,81           | 6,54           | 6,02           | 6,28           | 6,28              | 6,22              | 6,58              | 5,68              | 6,28              |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [10,05; 12,67] | [5,70; 7,93]   | [5,89; 8,32]   | [6,26; 8,89]   | [5,50; 8,11]   | [5,22; 7,86]   | [4,71; 7,32]   | [4,90; 7,65]   | [4,86; 7,69]      | [4,78; 7,66]      | [5,05; 8,10]      | [4,22; 7,14]      | [4,70; 7,86]      |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 1759                   | 1578           | 1380           | 1253           | 1159           | 1105           | 1057           | 991            | 933            | 884               | 844               | 797               | 747               |                   |                   |
| auswertbar                               | Anzahl  | 1759                   | 1531           | 1339           | 1211           | 1114           | 1056           | 1030           | 961            | 910            | 868               | 826               | 782               | 734               |                   |                   |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 82                     | 69             | 60             | 52             | 59             | 33             | 32             | 35             | 31             | 25                | 21                | 21                | 17                |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 4,66                   | 4,51           | 4,48           | 4,29           | 5,30           | 3,13           | 3,11           | 3,64           | 3,41           | 2,88              | 2,54              | 2,69              | 2,32              |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [3,68; 5,65]           | [3,47; 5,55]   | [3,37; 5,59]   | [3,15; 5,44]   | [3,98; 6,61]   | [2,08; 4,17]   | [2,05; 4,17]   | [2,46; 4,83]   | [2,23; 4,59]   | [1,77; 3,99]      | [1,47; 3,62]      | [1,55; 3,82]      | [1,23; 3,40]      |                   |                   |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 454                    | 475            | 405            | 364            | 326            | 311            | 286            | 246            | 237            | 235               | 201               | 209               | 195               |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 25,81                  | 31,03          | 30,25          | 30,06          | 29,26          | 29,45          | 27,77          | 25,60          | 26,04          | 27,07             | 24,33             | 26,73             | 26,57             |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [23,76; 27,86]         | [28,71; 33,34] | [27,79; 32,71] | [27,47; 32,64] | [26,59; 31,94] | [26,70; 32,20] | [25,03; 30,50] | [22,84; 28,36] | [23,19; 28,90] | [24,12; 30,03]    | [21,41; 27,26]    | [23,62; 29,83]    | [23,37; 29,76]    |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 426                    | 396            | 368            | 324            | 320            | 309            | 313            | 302            | 247            | 245               | 238               | 228               | 201               |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 24,22                  | 25,87          | 27,48          | 26,75          | 28,73          | 29,26          | 30,39          | 31,43          | 27,14          | 28,23             | 28,81             | 29,16             | 27,38             |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [22,22; 26,22]         | [23,67; 28,06] | [25,09; 29,88] | [24,26; 29,25] | [26,07; 31,38] | [26,52; 32,01] | [27,58; 33,20] | [28,49; 34,36] | [24,25; 30,03] | [25,23; 31,22]    | [25,72; 31,90]    | [25,97; 32,34]    | [24,16; 30,61]    |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 209                    | 190            | 151            | 151            | 136            | 143            | 121            | 132            | 142            | 134               | 128               | 114               | 112               |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 11,88                  | 12,41          | 11,28          | 12,47          | 12,21          | 13,54          | 11,75          | 13,74          | 15,60          | 15,44             | 15,50             | 14,58             | 15,26             |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [10,37; 13,39]         | [10,76; 14,06] | [9,58; 12,97]  | [10,61; 14,33] | [10,28; 14,13] | [11,48; 15,61] | [9,78; 13,71]  | [11,56; 15,91] | [13,25; 17,96] | [13,03; 17,84]    | [13,03; 17,97]    | [12,10; 17,05]    | [12,66; 17,86]    |                   |                   |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 374                    | 280            | 258            | 234            | 206            | 199            | 205            | 182            | 196            | 178               | 185               | 160               | 160               |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 21,26                  | 18,29          | 19,27          | 19,32          | 18,49          | 18,84          | 19,90          | 18,94          | 21,54          | 20,51             | 22,40             | 20,46             | 21,80             |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [19,35; 23,17]         | [16,35; 20,23] | [17,15; 21,38] | [17,10; 21,55] | [16,21; 20,77] | [16,48; 21,20] | [17,46; 22,34] | [16,46; 21,42] | [18,87; 24,21] | [17,82; 23,19]    | [19,55; 25,24]    | [17,63; 23,29]    | [18,81; 24,79]    |                   |                   |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 214                    | 121            | 97             | 86             | 67             | 61             | 73             | 64             | 57             | 51                | 53                | 50                | 49                |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 12,17                  | 7,90           | 7,24           | 7,10           | 6,01           | 5,78           | 7,09           | 6,66           | 6,26           | 5,88              | 6,42              | 6,39              | 6,68              |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [10,64; 13,69]         | [6,55; 9,26]   | [5,86; 8,63]   | [5,65; 8,55]   | [4,62; 7,41]   | [4,37; 7,18]   | [5,52; 8,66]   | [5,08; 8,24]   | [4,69; 7,84]   | [4,31; 7,44]      | [4,74; 8,09]      | [4,68; 8,11]      | [4,87; 8,48]      |                   |                   |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-2                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 3054           | 2707           | 2393           | 2179           | 2052           | 1924           | 1796           | 1691           | 1605              | 1506              | 1434              | 1366              |                   |                   |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 3050           | 2646           | 2310           | 2128           | 1937           | 1863           | 1745           | 1652           | 1580              | 1477              | 1412              | 1337              |                   |                   |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 237            | 221            | 176            | 165            | 133            | 117            | 98             | 83             | 89                | 72                | 68                | 58                |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 7,77           | 8,35           | 7,62           | 7,75           | 6,87           | 6,28           | 5,62           | 5,02           | 5,63              | 4,87              | 4,82              | 4,34              |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [6,82; 8,72]   | [7,30; 9,41]   | [6,54; 8,70]   | [6,62; 8,89]   | [5,74; 7,99]   | [5,18; 7,38]   | [4,54; 6,70]   | [3,97; 6,08]   | [4,50; 6,77]      | [3,78; 5,97]      | [3,70; 5,93]      | [3,25; 5,43]      |                   |                   |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 926            | 903            | 822            | 761            | 713            | 648            | 621            | 534            | 544               | 523               | 491               | 450               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 30,36          | 34,13          | 35,58          | 35,76          | 36,81          | 34,78          | 35,59          | 32,32          | 34,43             | 35,41             | 34,77             | 33,66             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [28,73; 31,99] | [32,32; 35,93] | [33,63; 37,54] | [33,72; 37,80] | [34,66; 38,96] | [32,62; 36,95] | [33,34; 37,83] | [30,07; 34,58] | [32,09; 36,77]    | [32,97; 37,85]    | [32,29; 37,26]    | [31,12; 36,19]    |                   |                   |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 680            | 645            | 616            | 559            | 502            | 516            | 476            | 479            | 464               | 436               | 423               | 404               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 22,30          | 24,38          | 26,67          | 26,27          | 25,92          | 27,70          | 27,28          | 29,00          | 29,37             | 29,52             | 29,96             | 30,22             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [20,82; 23,77] | [22,74; 26,01] | [24,86; 28,47] | [24,40; 28,14] | [23,96; 27,87] | [25,66; 29,73] | [25,19; 29,37] | [26,81; 31,18] | [27,12; 31,61]    | [27,19; 31,85]    | [27,57; 32,35]    | [27,75; 32,68]    |                   |                   |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 323            | 292            | 242            | 212            | 212            | 213            | 213            | 205            | 161               | 151               | 160               | 160               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 10,59          | 11,04          | 10,48          | 9,96           | 10,94          | 11,43          | 12,21          | 12,41          | 10,19             | 10,22             | 11,33             | 11,97             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,50; 11,68]  | [9,84; 12,23]  | [9,23; 11,73]  | [8,69; 11,24]  | [9,55; 12,34]  | [9,99; 12,88]  | [10,67; 13,74] | [10,82; 14,00] | [8,70; 11,68]     | [8,68; 11,77]     | [9,68; 12,99]     | [10,23; 13,71]    |                   |                   |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 507            | 401            | 325            | 316            | 273            | 277            | 254            | 272            | 252               | 224               | 216               | 209               |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 16,62          | 15,15          | 14,07          | 14,85          | 14,09          | 14,87          | 14,56          | 16,46          | 15,95             | 15,17             | 15,30             | 15,63             |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [15,30; 17,94] | [13,79; 16,52] | [12,65; 15,49] | [13,34; 16,36] | [12,54; 15,64] | [13,25; 16,48] | [12,90; 16,21] | [14,68; 18,25] | [14,14; 17,76]    | [13,34; 17,00]    | [13,42; 17,18]    | [13,68; 17,58]    |                   |                   |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 377            | 184            | 129            | 115            | 104            | 92             | 83             | 79             | 70                | 71                | 54                | 56                |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 12,36          | 6,95           | 5,58           | 5,40           | 5,37           | 4,94           | 4,76           | 4,78           | 4,43              | 4,81              | 3,82              | 4,19              |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [11,19; 13,53] | [5,98; 7,92]   | [4,65; 6,52]   | [4,44; 6,37]   | [4,37; 6,37]   | [3,95; 5,92]   | [3,76; 5,76]   | [3,75; 5,81]   | [3,42; 5,45]      | [3,72; 5,90]      | [2,82; 4,83]      | [3,11; 5,26]      |                   |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2346                   | 2091           | 1875           | 1753           | 1639           | 1555           | 1433           | 1332           | 1263           | 1206              | 1147              | 1090              |                   |                   |                   |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2344                   | 2035           | 1829           | 1695           | 1531           | 1490           | 1386           | 1297           | 1243           | 1180              | 1122              | 1074              |                   |                   |                   |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 128                    | 122            | 104            | 89             | 83             | 70             | 53             | 34             | 44             | 38                | 44                | 29                |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 5,46                   | 6,00           | 5,69           | 5,25           | 5,42           | 4,70           | 3,82           | 2,62           | 3,54           | 3,22              | 3,92              | 2,70              |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [4,54; 6,38]           | [4,96; 7,03]   | [4,62; 6,75]   | [4,19; 6,31]   | [4,29; 6,56]   | [3,62; 5,77]   | [2,81; 4,83]   | [1,75; 3,49]   | [2,51; 4,57]   | [2,21; 4,23]      | [2,79; 5,06]      | [1,73; 3,67]      |                   |                   |                   |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 711                    | 648            | 612            | 574            | 479            | 478            | 442            | 387            | 358            | 375               | 335               | 320               |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 30,33                  | 31,84          | 33,46          | 33,86          | 31,29          | 32,08          | 31,89          | 29,84          | 28,80          | 31,78             | 29,86             | 29,80             |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [28,47; 32,19]         | [29,82; 33,87] | [31,30; 35,62] | [31,61; 36,12] | [28,96; 33,61] | [29,71; 34,45] | [29,44; 34,34] | [27,35; 32,33] | [26,28; 31,32] | [29,12; 34,44]    | [27,18; 32,54]    | [27,06; 32,53]    |                   |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 568                    | 539            | 460            | 441            | 417            | 396            | 387            | 375            | 388            | 316               | 330               | 312               |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 24,23                  | 26,49          | 25,15          | 26,02          | 27,24          | 26,58          | 27,92          | 28,91          | 31,21          | 26,78             | 29,41             | 29,05             |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [22,50; 25,97]         | [24,57; 28,40] | [23,16; 27,14] | [23,93; 28,11] | [25,01; 29,47] | [24,33; 28,82] | [25,56; 30,28] | [26,44; 31,38] | [28,64; 33,79] | [24,25; 29,31]    | [26,74; 32,08]    | [26,33; 31,77]    |                   |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 266                    | 243            | 219            | 193            | 181            | 182            | 171            | 173            | 160            | 175               | 164               | 161               |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 11,35                  | 11,94          | 11,97          | 11,39          | 11,82          | 12,21          | 12,34          | 13,34          | 12,87          | 14,83             | 14,62             | 14,99             |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [10,06; 12,63]         | [10,53; 13,35] | [10,49; 13,46] | [9,87; 12,90]  | [10,20; 13,44] | [10,55; 13,88] | [10,61; 14,07] | [11,49; 15,19] | [11,01; 14,73] | [12,80; 16,86]    | [12,55; 16,68]    | [12,85; 17,13]    |                   |                   |                   |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 432                    | 338            | 313            | 300            | 298            | 283            | 264            | 265            | 236            | 226               | 204               | 200               |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 18,43                  | 16,61          | 17,11          | 17,70          | 19,46          | 18,99          | 19,05          | 20,43          | 18,99          | 19,15             | 18,18             | 18,62             |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [16,86; 20,00]         | [14,99; 18,23] | [15,39; 18,84] | [15,88; 19,52] | [17,48; 21,45] | [17,00; 20,99] | [16,98; 21,12] | [18,24; 22,63] | [16,81; 21,17] | [16,91; 21,40]    | [15,92; 20,44]    | [16,29; 20,95]    |                   |                   |                   |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 239                    | 145            | 121            | 98             | 73             | 81             | 69             | 63             | 57             | 50                | 45                | 52                |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 10,20                  | 7,13           | 6,62           | 5,78           | 4,77           | 5,44           | 4,98           | 4,86           | 4,59           | 4,24              | 4,01              | 4,84              |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [8,97; 11,42]          | [6,01; 8,24]   | [5,48; 7,76]   | [4,67; 6,89]   | [3,70; 5,84]   | [4,28; 6,59]   | [3,83; 6,12]   | [3,69; 6,03]   | [3,42; 5,75]   | [3,09; 5,39]      | [2,86; 5,16]      | [3,56; 6,13]      |                   |                   |                   |



| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-1                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 6522           | 5910           | 5338           | 4997           | 4736           | 4458           | 4205           | 4002           | 3822              | 3669              | 3522              |                   |                   |                   |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 6517           | 5757           | 5218           | 4795           | 4591           | 4375           | 4121           | 3932           | 3768              | 3605              | 3446              |                   |                   |                   |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 519            | 511            | 402            | 350            | 303            | 285            | 206            | 211            | 192               | 196               | 164               |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 7,96           | 8,88           | 7,70           | 7,30           | 6,60           | 6,51           | 5,00           | 5,37           | 5,10              | 5,44              | 4,76              |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [7,31; 8,62]   | [8,14; 9,61]   | [6,98; 8,43]   | [6,56; 8,04]   | [5,88; 7,32]   | [5,78; 7,25]   | [4,33; 5,66]   | [4,66; 6,07]   | [4,39; 5,80]      | [4,70; 6,18]      | [4,05; 5,47]      |                   |                   |                   |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 2178           | 2136           | 1959           | 1839           | 1652           | 1576           | 1393           | 1423           | 1303              | 1308              | 1206              |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 33,42          | 37,10          | 37,54          | 38,35          | 35,98          | 36,02          | 33,80          | 36,19          | 34,58             | 36,28             | 35,00             |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [32,27; 34,57] | [35,85; 38,35] | [36,23; 38,86] | [36,98; 39,73] | [34,59; 37,37] | [34,60; 37,45] | [32,36; 35,25] | [34,69; 37,69] | [33,06; 36,10]    | [34,71; 37,85]    | [33,40; 36,59]    |                   |                   |                   |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 1456           | 1380           | 1329           | 1182           | 1178           | 1163           | 1136           | 1075           | 1088              | 1021              | 995               |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 22,34          | 23,97          | 25,47          | 24,65          | 25,66          | 26,58          | 27,57          | 27,34          | 28,87             | 28,32             | 28,87             |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [21,33; 23,35] | [22,87; 25,07] | [24,29; 26,65] | [23,43; 25,87] | [24,40; 26,92] | [25,27; 27,89] | [26,20; 28,93] | [25,95; 28,73] | [27,43; 30,32]    | [26,85; 29,79]    | [27,36; 30,39]    |                   |                   |                   |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 647            | 570            | 494            | 506            | 518            | 501            | 514            | 440            | 452               | 431               | 416               |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 9,93           | 9,90           | 9,47           | 10,55          | 11,28          | 11,45          | 12,47          | 11,19          | 12,00             | 11,96             | 12,07             |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,20; 10,65]  | [9,13; 10,67]  | [8,67; 10,26]  | [9,68; 11,42]  | [10,37; 12,20] | [10,51; 12,40] | [11,46; 13,48] | [10,20; 12,18] | [10,96; 13,03]    | [10,90; 13,01]    | [10,98; 13,16]    |                   |                   |                   |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 1002           | 786            | 709            | 658            | 681            | 630            | 640            | 591            | 561               | 492               | 501               |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 15,38          | 13,65          | 13,59          | 13,72          | 14,83          | 14,40          | 15,53          | 15,03          | 14,89             | 13,65             | 14,54             |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [14,50; 16,25] | [12,77; 14,54] | [12,66; 14,52] | [12,75; 14,70] | [13,81; 15,86] | [13,36; 15,44] | [14,42; 16,64] | [13,91; 16,15] | [13,75; 16,03]    | [12,53; 14,77]    | [13,36; 15,72]    |                   |                   |                   |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 715            | 374            | 325            | 260            | 259            | 220            | 232            | 192            | 172               | 157               | 164               |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 10,97          | 6,50           | 6,23           | 5,42           | 5,64           | 5,03           | 5,63           | 4,88           | 4,56              | 4,36              | 4,76              |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [10,21; 11,73] | [5,86; 7,13]   | [5,57; 6,88]   | [4,78; 6,06]   | [4,97; 6,31]   | [4,38; 5,68]   | [4,93; 6,33]   | [4,21; 5,56]   | [3,90; 5,23]      | [3,69; 5,02]      | [4,05; 5,47]      |                   |                   |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 5314                   | 4880           | 4472           | 4196           | 3934           | 3716           | 3532           | 3362           | 3209           | 3071              | 2944              |                   |                   |                   |                   |
| auswertbar                               | Anzahl  | 5311                   | 4780           | 4367           | 4000           | 3825           | 3630           | 3475           | 3281           | 3146           | 3005              | 2886              |                   |                   |                   |                   |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 306                    | 328            | 259            | 219            | 174            | 178            | 141            | 136            | 115            | 112               | 109               |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 5,76                   | 6,86           | 5,93           | 5,48           | 4,55           | 4,90           | 4,06           | 4,15           | 3,66           | 3,73              | 3,78              |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [5,13; 6,39]           | [6,15; 7,58]   | [5,23; 6,63]   | [4,77; 6,18]   | [3,89; 5,21]   | [4,20; 5,61]   | [3,40; 4,71]   | [3,46; 4,83]   | [3,00; 4,31]   | [3,05; 4,40]      | [3,08; 4,47]      |                   |                   |                   |                   |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 1687                   | 1617           | 1510           | 1359           | 1232           | 1159           | 1042           | 1030           | 929            | 947               | 882               |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 31,76                  | 33,83          | 34,58          | 33,98          | 32,21          | 31,93          | 29,99          | 31,39          | 29,53          | 31,51             | 30,56             |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [30,51; 33,02]         | [32,49; 35,17] | [33,17; 35,99] | [32,51; 35,44] | [30,73; 33,69] | [30,41; 33,45] | [28,46; 31,51] | [29,80; 32,98] | [27,94; 31,12] | [29,85; 33,18]    | [28,88; 32,24]    |                   |                   |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 1359                   | 1285           | 1206           | 1142           | 1077           | 1054           | 1008           | 972            | 965            | 911               | 887               |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 25,59                  | 26,88          | 27,62          | 28,55          | 28,16          | 29,04          | 29,01          | 29,63          | 30,67          | 30,32             | 30,73             |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [24,41; 26,76]         | [25,63; 28,14] | [26,29; 28,94] | [27,15; 29,95] | [26,73; 29,58] | [27,56; 30,51] | [27,50; 30,52] | [28,06; 31,19] | [29,06; 32,29] | [28,67; 31,96]    | [29,05; 32,42]    |                   |                   |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 574                    | 522            | 512            | 482            | 490            | 446            | 440            | 403            | 439            | 431               | 387               |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 10,81                  | 10,92          | 11,72          | 12,05          | 12,81          | 12,29          | 12,66          | 12,28          | 13,95          | 14,34             | 13,41             |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [9,97; 11,64]          | [10,04; 11,80] | [10,77; 12,68] | [11,04; 13,06] | [11,75; 13,87] | [11,22; 13,35] | [11,56; 13,77] | [11,16; 13,41] | [12,74; 15,17] | [13,09; 15,60]    | [12,17; 14,65]    |                   |                   |                   |                   |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 930                    | 755            | 669            | 595            | 648            | 616            | 655            | 586            | 550            | 479               | 498               |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 17,51                  | 15,79          | 15,32          | 14,88          | 16,94          | 16,97          | 18,85          | 17,86          | 17,48          | 15,94             | 17,26             |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [16,49; 18,53]         | [14,76; 16,83] | [14,25; 16,39] | [13,77; 15,98] | [15,75; 18,13] | [15,75; 18,19] | [17,55; 20,15] | [16,55; 19,17] | [16,16; 18,81] | [14,63; 17,25]    | [15,88; 18,63]    |                   |                   |                   |                   |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 455                    | 273            | 211            | 203            | 204            | 177            | 189            | 154            | 148            | 125               | 123               |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 8,57                   | 5,71           | 4,83           | 5,08           | 5,33           | 4,88           | 5,44           | 4,69           | 4,70           | 4,16              | 4,26              |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [7,81; 9,32]           | [5,05; 6,37]   | [4,20; 5,47]   | [4,39; 5,76]   | [4,62; 6,05]   | [4,18; 5,58]   | [4,68; 6,19]   | [3,97; 5,42]   | [3,96; 5,44]   | [3,45; 4,87]      | [3,52; 5,00]      |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2007-2                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 4414           | 3892           | 3512           | 3195           | 2899           | 2676           | 2514           | 2368           | 2249              | 2141              |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 4414           | 3759           | 3314           | 3065           | 2799           | 2597           | 2442           | 2300           | 2191              | 2088              |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 267            | 276            | 222            | 172            | 175            | 124            | 122            | 112            | 108               | 93                |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 6,05           | 7,34           | 6,70           | 5,61           | 6,25           | 4,77           | 5,00           | 4,87           | 4,93              | 4,45              |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [5,35; 6,75]   | [6,51; 8,18]   | [5,85; 7,55]   | [4,80; 6,43]   | [5,36; 7,15]   | [3,95; 5,60]   | [4,13; 5,86]   | [3,99; 5,75]   | [4,02; 5,84]      | [3,57; 5,34]      |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 1299           | 1273           | 1114           | 984            | 897            | 773            | 763            | 717            | 680               | 640               |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 29,43          | 33,87          | 33,61          | 32,10          | 32,05          | 29,77          | 31,24          | 31,17          | 31,04             | 30,65             |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [28,08; 30,77] | [32,35; 35,38] | [32,01; 35,22] | [30,45; 33,76] | [30,32; 33,78] | [28,01; 31,52] | [29,41; 33,08] | [29,28; 33,07] | [29,10; 32,97]    | [28,67; 32,63]    |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 938            | 891            | 823            | 801            | 718            | 709            | 656            | 621            | 626               | 589               |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 21,25          | 23,70          | 24,83          | 26,13          | 25,65          | 27,30          | 26,86          | 27,00          | 28,57             | 28,21             |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [20,04; 22,46] | [22,34; 25,06] | [23,36; 26,31] | [24,58; 27,69] | [24,03; 27,27] | [25,59; 29,01] | [25,10; 28,62] | [25,19; 28,81] | [26,68; 30,46]    | [26,28; 30,14]    |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 466            | 399            | 374            | 352            | 347            | 346            | 296            | 298            | 256               | 268               |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,56          | 10,61          | 11,29          | 11,48          | 12,40          | 13,32          | 12,12          | 12,96          | 11,68             | 12,84             |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,65; 11,46]  | [9,63; 11,60]  | [10,21; 12,36] | [10,36; 12,61] | [11,18; 13,62] | [12,02; 14,63] | [10,83; 13,42] | [11,58; 14,33] | [10,34; 13,03]    | [11,40; 14,27]    |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 783            | 625            | 565            | 550            | 490            | 467            | 445            | 389            | 385               | 380               |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 17,74          | 16,63          | 17,05          | 17,94          | 17,51          | 17,98          | 18,22          | 16,91          | 17,57             | 18,20             |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [16,61; 18,87] | [15,44; 17,82] | [15,77; 18,33] | [16,59; 19,30] | [16,10; 18,91] | [16,50; 19,46] | [16,69; 19,75] | [15,38; 18,45] | [15,98; 19,17]    | [16,54; 19,85]    |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 661            | 295            | 216            | 206            | 172            | 178            | 160            | 163            | 136               | 118               |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 14,98          | 7,85           | 6,52           | 6,72           | 6,15           | 6,85           | 6,55           | 7,09           | 6,21              | 5,65              |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [13,92; 16,03] | [6,99; 8,71]   | [5,68; 7,36]   | [5,83; 7,61]   | [5,26; 7,03]   | [5,88; 7,83]   | [5,57; 7,53]   | [6,04; 8,14]   | [5,20; 7,22]      | [4,66; 6,64]      |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 3459                   | 3091           | 2830           | 2577           | 2330           | 2170           | 2043           | 1941           | 1835           | 1756              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 3457                   | 2996           | 2645           | 2476           | 2264           | 2121           | 1985           | 1897           | 1799           | 1712              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 180                    | 170            | 130            | 96             | 97             | 70             | 81             | 64             | 53             | 53                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 5,21                   | 5,67           | 4,91           | 3,88           | 4,28           | 3,30           | 4,08           | 3,37           | 2,95           | 3,10              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [4,47; 5,95]           | [4,85; 6,50]   | [4,09; 5,74]   | [3,12; 4,64]   | [3,45; 5,12]   | [2,54; 4,06]   | [3,21; 4,95]   | [2,56; 4,19]   | [2,16; 3,73]   | [2,28; 3,92]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 977                    | 957            | 855            | 774            | 687            | 589            | 581            | 521            | 550            | 475               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 28,26                  | 31,94          | 32,33          | 31,26          | 30,34          | 27,77          | 29,27          | 27,46          | 30,57          | 27,75             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [26,76; 29,76]         | [30,27; 33,61] | [30,54; 34,11] | [29,43; 33,09] | [28,45; 32,24] | [25,86; 29,68] | [27,27; 31,27] | [25,46; 29,47] | [28,44; 32,70] | [25,62; 29,87]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 845                    | 792            | 714            | 659            | 635            | 636            | 580            | 566            | 524            | 497               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 24,44                  | 26,44          | 26,99          | 26,62          | 28,05          | 29,99          | 29,22          | 29,84          | 29,13          | 29,03             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [23,01; 25,88]         | [24,86; 28,01] | [25,30; 28,69] | [24,87; 28,36] | [26,20; 29,90] | [28,04; 31,94] | [27,22; 31,22] | [27,78; 31,90] | [27,03; 31,23] | [26,88; 31,18]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 392                    | 347            | 307            | 336            | 287            | 306            | 275            | 272            | 257            | 268               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 11,34                  | 11,58          | 11,61          | 13,57          | 12,68          | 14,43          | 13,85          | 14,34          | 14,29          | 15,65             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [10,28; 12,40]         | [10,44; 12,73] | [10,39; 12,83] | [12,22; 14,92] | [11,31; 14,05] | [12,93; 15,92] | [12,33; 15,37] | [12,76; 15,92] | [12,67; 15,90] | [13,93; 17,38]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 611                    | 507            | 459            | 424            | 417            | 391            | 352            | 376            | 336            | 331               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 17,67                  | 16,92          | 17,35          | 17,12          | 18,42          | 18,43          | 17,73          | 19,82          | 18,68          | 19,33             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [16,40; 18,95]         | [15,58; 18,27] | [15,91; 18,80] | [15,64; 18,61] | [16,82; 20,02] | [16,78; 20,09] | [16,05; 19,41] | [18,03; 21,62] | [16,88; 20,48] | [17,46; 21,21]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 452                    | 223            | 180            | 187            | 141            | 129            | 116            | 98             | 79             | 88                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 13,07                  | 7,44           | 6,81           | 7,55           | 6,23           | 6,08           | 5,84           | 5,17           | 4,39           | 5,14              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [11,95; 14,20]         | [6,50; 8,38]   | [5,85; 7,77]   | [6,51; 8,59]   | [5,23; 7,22]   | [5,06; 7,10]   | [4,81; 6,88]   | [4,17; 6,16]   | [3,44; 5,34]   | [4,09; 6,19]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008-1                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 4190           | 3689           | 3307           | 2914           | 2653           | 2459           | 2274           | 2144           | 2046              |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 4185           | 3473           | 3120           | 2788           | 2568           | 2376           | 2206           | 2088           | 1982              |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 230            | 280            | 203            | 166            | 146            | 120            | 97             | 88             | 72                |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 5,50           | 8,06           | 6,51           | 5,95           | 5,69           | 5,05           | 4,40           | 4,21           | 3,63              |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [4,81; 6,19]   | [7,16; 8,97]   | [5,64; 7,37]   | [5,08; 6,83]   | [4,79; 6,58]   | [4,17; 5,93]   | [3,54; 5,25]   | [3,35; 5,08]   | [2,81; 4,46]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 1068           | 1096           | 985            | 886            | 773            | 787            | 695            | 700            | 621               |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 25,52          | 31,56          | 31,57          | 31,78          | 30,10          | 33,12          | 31,50          | 33,52          | 31,33             |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [24,20; 26,84] | [30,01; 33,10] | [29,94; 33,20] | [30,05; 33,51] | [28,33; 31,88] | [31,23; 35,02] | [29,57; 33,44] | [31,50; 35,55] | [29,29; 33,37]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 840            | 868            | 755            | 738            | 683            | 591            | 589            | 539            | 582               |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 20,07          | 24,99          | 24,20          | 26,47          | 26,60          | 24,87          | 26,70          | 25,81          | 29,36             |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,86; 21,29] | [23,55; 26,43] | [22,70; 25,70] | [24,83; 28,11] | [24,89; 28,31] | [23,14; 26,61] | [24,85; 28,55] | [23,94; 27,69] | [27,36; 31,37]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 453            | 373            | 356            | 294            | 313            | 290            | 300            | 264            | 242               |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 10,82          | 10,74          | 11,41          | 10,55          | 12,19          | 12,21          | 13,60          | 12,64          | 12,21             |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,88; 11,77]  | [9,71; 11,77]  | [10,29; 12,53] | [9,40; 11,69]  | [10,92; 13,45] | [10,89; 13,52] | [12,17; 15,03] | [11,22; 14,07] | [10,77; 13,65]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 872            | 579            | 586            | 489            | 462            | 421            | 377            | 372            | 338               |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 20,84          | 16,67          | 18,78          | 17,54          | 17,99          | 17,72          | 17,09          | 17,82          | 17,05             |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [19,61; 22,07] | [15,43; 17,91] | [17,41; 20,15] | [16,13; 18,95] | [16,50; 19,48] | [16,18; 19,25] | [15,52; 18,66] | [16,17; 19,46] | [15,40; 18,71]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 722            | 277            | 235            | 215            | 191            | 167            | 148            | 125            | 127               |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            | 17,25          | 7,98           | 7,53           | 7,71           | 7,44           | 7,03           | 6,71           | 5,99           | 6,41              |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         | [16,11; 18,40] | [7,07; 8,88]   | [6,61; 8,46]   | [6,72; 8,70]   | [6,42; 8,45]   | [6,00; 8,06]   | [5,66; 7,75]   | [4,97; 7,00]   | [5,33; 7,49]      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 3188                   | 2871           | 2579           | 2319           | 2120           | 1972           | 1834           | 1736           | 1650           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| auswertbar                               | Anzahl  | 3177                   | 2724           | 2446           | 2234           | 2063           | 1909           | 1791           | 1684           | 1594           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 184                    | 197            | 145            | 109            | 98             | 86             | 74             | 75             | 66             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 5,79                   | 7,23           | 5,93           | 4,88           | 4,75           | 4,50           | 4,13           | 4,45           | 4,14           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [4,98; 6,60]           | [6,26; 8,20]   | [4,99; 6,86]   | [3,99; 5,77]   | [3,83; 5,67]   | [3,57; 5,44]   | [3,21; 5,05]   | [3,47; 5,44]   | [3,16; 5,12]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 820                    | 861            | 724            | 668            | 600            | 584            | 527            | 493            | 455            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 25,81                  | 31,61          | 29,60          | 29,90          | 29,08          | 30,59          | 29,42          | 29,28          | 28,54          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [24,29; 27,33]         | [29,86; 33,35] | [27,79; 31,41] | [28,00; 31,80] | [27,12; 31,04] | [28,52; 32,66] | [27,31; 31,54] | [27,10; 31,45] | [26,33; 30,76] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 720                    | 661            | 636            | 605            | 533            | 520            | 477            | 482            | 448            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 22,66                  | 24,27          | 26,00          | 27,08          | 25,84          | 27,24          | 26,63          | 28,62          | 28,11          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [21,21; 24,12]         | [22,66; 25,88] | [24,26; 27,74] | [25,24; 28,92] | [23,95; 27,73] | [25,24; 29,24] | [24,59; 28,68] | [26,46; 30,78] | [25,90; 30,31] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 351                    | 322            | 303            | 314            | 286            | 253            | 236            | 243            | 233            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 11,05                  | 11,82          | 12,39          | 14,06          | 13,86          | 13,25          | 13,18          | 14,43          | 14,62          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [9,96; 12,14]          | [10,61; 13,03] | [11,08; 13,69] | [12,61; 15,50] | [12,37; 15,35] | [11,73; 14,77] | [11,61; 14,74] | [12,75; 16,11] | [12,88; 16,35] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 639                    | 462            | 452            | 373            | 396            | 348            | 353            | 293            | 299            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 20,11                  | 16,96          | 18,48          | 16,70          | 19,20          | 18,23          | 19,71          | 17,40          | 18,76          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [18,72; 21,51]         | [15,55; 18,37] | [16,94; 20,02] | [15,15; 18,24] | [17,50; 20,90] | [16,50; 19,96] | [17,87; 21,55] | [15,59; 19,21] | [16,84; 20,67] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 463                    | 221            | 186            | 165            | 150            | 118            | 124            | 98             | 93             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Anteil in %                                   | 14,57                  | 8,11           | 7,60           | 7,39           | 7,27           | 6,18           | 6,92           | 5,82           | 5,83           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI Anteil in %                                | [13,35; 15,80]         | [7,09; 9,14]   | [6,55; 8,65]   | [6,30; 8,47]   | [6,15; 8,39]   | [5,10; 7,26]   | [5,75; 8,10]   | [4,70; 6,94]   | [4,68; 6,99]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2008-2                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 2893           | 2495           | 2153           | 1904           | 1738           | 1605           | 1505           | 1412           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 2887           | 2378           | 2057           | 1832           | 1683           | 1542           | 1443           | 1361           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 167            | 173            | 147            | 115            | 88             | 81             | 73             | 71             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 5,78           | 7,28           | 7,15           | 6,28           | 5,23           | 5,25           | 5,06           | 5,22           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [4,93; 6,64]   | [6,23; 8,32]   | [6,03; 8,26]   | [5,17; 7,39]   | [4,16; 6,29]   | [4,14; 6,37]   | [3,93; 6,19]   | [4,03; 6,40]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 738            | 737            | 664            | 566            | 565            | 518            | 485            | 442            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 25,56          | 30,99          | 32,28          | 30,90          | 33,57          | 33,59          | 33,61          | 32,48          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [23,97; 27,15] | [29,13; 32,85] | [30,26; 34,30] | [28,78; 33,01] | [31,31; 35,83] | [31,23; 35,95] | [31,17; 36,05] | [29,99; 34,96] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 579            | 570            | 492            | 442            | 407            | 371            | 365            | 344            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 20,06          | 23,97          | 23,92          | 24,13          | 24,18          | 24,06          | 25,29          | 25,28          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,59; 21,52] | [22,25; 25,69] | [22,07; 25,76] | [22,17; 26,09] | [22,14; 26,23] | [21,93; 26,19] | [23,05; 27,54] | [22,97; 27,59] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 318            | 248            | 251            | 224            | 187            | 186            | 169            | 168            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 11,01          | 10,43          | 12,20          | 12,23          | 11,11          | 12,06          | 11,71          | 12,34          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,87; 12,16]  | [9,20; 11,66]  | [10,79; 13,62] | [10,73; 13,73] | [9,61; 12,61]  | [10,44; 13,69] | [10,05; 13,37] | [10,60; 14,09] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 559            | 421            | 352            | 343            | 306            | 246            | 239            | 233            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,36          | 17,70          | 17,11          | 18,72          | 18,18          | 15,95          | 16,56          | 17,12          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [17,92; 20,80] | [16,17; 19,24] | [15,48; 18,74] | [16,94; 20,51] | [16,34; 20,03] | [14,13; 17,78] | [14,64; 18,48] | [15,12; 19,12] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 526            | 229            | 151            | 142            | 130            | 140            | 112            | 103            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 18,22          | 9,63           | 7,34           | 7,75           | 7,72           | 9,08           | 7,76           | 7,57           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [16,81; 19,63] | [8,44; 10,82]  | [6,21; 8,47]   | [6,53; 8,98]   | [6,45; 9,00]   | [7,64; 10,51]  | [6,38; 9,14]   | [6,16; 8,97]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2099                   | 1848           | 1615           | 1424           | 1290           | 1198           | 1124           | 1060           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2093                   | 1772           | 1555           | 1365           | 1237           | 1149           | 1093           | 1014           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 103                    | 124            | 82             | 66             | 54             | 51             | 45             | 35             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 4,92                   | 7,00           | 5,27           | 4,84           | 4,37           | 4,44           | 4,12           | 3,45           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [3,99; 5,85]           | [5,81; 8,19]   | [4,16; 6,38]   | [3,70; 5,97]   | [3,23; 5,50]   | [3,25; 5,63]   | [2,94; 5,30]   | [2,33; 4,58]   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 564                    | 502            | 476            | 400            | 369            | 314            | 317            | 278            |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 26,95                  | 28,33          | 30,61          | 29,30          | 29,83          | 27,33          | 29,00          | 27,42          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [25,05; 28,85]         | [26,23; 30,43] | [28,32; 32,90] | [26,89; 31,72] | [27,28; 32,38] | [24,75; 29,91] | [26,31; 31,69] | [24,67; 30,16] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 435                    | 422            | 384            | 348            | 328            | 291            | 287            | 281            |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 20,78                  | 23,81          | 24,69          | 25,49          | 26,52          | 25,33          | 26,26          | 27,71          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [19,04; 22,52]         | [21,83; 25,80] | [22,55; 26,84] | [23,18; 27,81] | [24,05; 28,98] | [22,81; 27,84] | [23,65; 28,87] | [24,96; 30,47] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 236                    | 232            | 192            | 161            | 164            | 164            | 150            | 153            |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 11,28                  | 13,09          | 12,35          | 11,79          | 13,26          | 14,27          | 13,72          | 15,09          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [9,92; 12,63]          | [11,52; 14,66] | [10,71; 13,98] | [10,08; 13,51] | [11,37; 15,15] | [12,25; 16,30] | [11,68; 15,76] | [12,88; 17,29] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 409                    | 335            | 311            | 281            | 245            | 267            | 230            | 210            |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 19,54                  | 18,91          | 20,00          | 20,59          | 19,81          | 23,24          | 21,04          | 20,71          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [17,84; 21,24]         | [17,08; 20,73] | [18,01; 21,99] | [18,44; 22,73] | [17,58; 22,03] | [20,79; 25,68] | [18,63; 23,46] | [18,21; 23,21] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 346                    | 157            | 110            | 109            | 77             | 62             | 64             | 57             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 16,53                  | 8,86           | 7,07           | 7,99           | 6,22           | 5,40           | 5,86           | 5,62           |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [14,94; 18,12]         | [7,54; 10,18]  | [5,80; 8,35]   | [6,55; 9,42]   | [4,88; 7,57]   | [4,09; 6,70]   | [4,46; 7,25]   | [4,20; 7,04]   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-1                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 3215           | 2781           | 2408           | 2143           | 1971           | 1823           | 1697           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 3205           | 2674           | 2311           | 2079           | 1904           | 1766           | 1646           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 175            | 188            | 151            | 113            | 92             | 91             | 71             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 5,46           | 7,03           | 6,53           | 5,44           | 4,83           | 5,15           | 4,31           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [4,67; 6,25]   | [6,06; 8,00]   | [5,53; 7,54]   | [4,46; 6,41]   | [3,87; 5,80]   | [4,12; 6,18]   | [3,33; 5,30]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 738            | 870            | 703            | 687            | 598            | 550            | 526            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 23,03          | 32,54          | 30,42          | 33,04          | 31,41          | 31,14          | 31,96          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [21,57; 24,48] | [30,76; 34,31] | [28,54; 32,30] | [31,02; 35,07] | [29,32; 33,49] | [28,98; 33,30] | [29,70; 34,21] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 639            | 599            | 580            | 496            | 503            | 456            | 426            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,94          | 22,40          | 25,10          | 23,86          | 26,42          | 25,82          | 25,88          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,55; 21,32] | [20,82; 23,98] | [23,33; 26,87] | [22,03; 25,69] | [24,44; 28,40] | [23,78; 27,86] | [23,76; 28,00] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 349            | 291            | 269            | 248            | 224            | 223            | 178            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,89          | 10,88          | 11,64          | 11,93          | 11,76          | 12,63          | 10,81          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,81; 11,97]  | [9,70; 12,06]  | [10,33; 12,95] | [10,54; 13,32] | [10,32; 13,21] | [11,08; 14,18] | [9,31; 12,31]  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 651            | 506            | 419            | 380            | 336            | 322            | 320            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 20,31          | 18,92          | 18,13          | 18,28          | 17,65          | 18,23          | 19,44          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,92; 21,71] | [17,44; 20,41] | [16,56; 19,70] | [16,62; 19,94] | [15,93; 19,36] | [16,43; 20,03] | [17,53; 21,35] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 653            | 220            | 189            | 155            | 151            | 124            | 125            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 20,37          | 8,23           | 8,18           | 7,46           | 7,93           | 7,02           | 7,59           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,98; 21,77] | [7,19; 9,27]   | [7,06; 9,30]   | [6,33; 8,58]   | [6,72; 9,14]   | [5,83; 8,21]   | [6,31; 8,87]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2420                   | 2074           | 1813           | 1629           | 1496           | 1367           | 1268           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2413                   | 1995           | 1740           | 1572           | 1434           | 1315           | 1223           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 110                    | 120            | 84             | 61             | 51             | 52             | 48             |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 4,56                   | 6,02           | 4,83           | 3,88           | 3,56           | 3,95           | 3,92           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [3,73; 5,39]           | [4,97; 7,06]   | [3,82; 5,84]   | [2,93; 4,84]   | [2,60; 4,52]   | [2,90; 5,01]   | [2,84; 5,01]   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 547                    | 566            | 495            | 447            | 382            | 382            | 327            |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 22,67                  | 28,37          | 28,45          | 28,44          | 26,64          | 29,05          | 26,74          |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [21,00; 24,34]         | [26,39; 30,35] | [26,33; 30,57] | [26,20; 30,67] | [24,35; 28,93] | [26,59; 31,50] | [24,26; 29,22] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 489                    | 500            | 435            | 411            | 405            | 370            | 324            |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 20,27                  | 25,06          | 25,00          | 26,15          | 28,24          | 28,14          | 26,49          |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [18,66; 21,87]         | [23,16; 26,96] | [22,96; 27,04] | [23,97; 28,32] | [25,91; 30,57] | [25,71; 30,57] | [24,02; 28,97] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 266                    | 246            | 214            | 218            | 196            | 165            | 197            |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 11,02                  | 12,33          | 12,30          | 13,87          | 13,67          | 12,55          | 16,11          |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [9,77; 12,27]          | [10,89; 13,77] | [10,76; 13,84] | [12,16; 15,58] | [11,89; 15,45] | [10,76; 14,34] | [14,05; 18,17] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 567                    | 386            | 362            | 320            | 282            | 256            | 244            |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 23,50                  | 19,35          | 20,80          | 20,36          | 19,67          | 19,47          | 19,95          |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [21,81; 25,19]         | [17,61; 21,08] | [18,90; 22,71] | [18,37; 22,35] | [17,61; 21,72] | [17,33; 21,61] | [17,71; 22,19] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 434                    | 177            | 150            | 115            | 118            | 90             | 83             |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 17,99                  | 8,87           | 8,62           | 7,32           | 8,23           | 6,84           | 6,79           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [16,45; 19,52]         | [7,62; 10,12]  | [7,30; 9,94]   | [6,03; 8,60]   | [6,81; 9,65]   | [5,48; 8,21]   | [5,38; 8,20]   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-2                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 2729           | 2303           | 1970           | 1730           | 1565           | 1452           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 2723           | 2219           | 1885           | 1666           | 1497           | 1396           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 98             | 130            | 113            | 68             | 66             | 74             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 3,60           | 5,86           | 5,99           | 4,08           | 4,41           | 5,30           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [2,90; 4,30]   | [4,88; 6,84]   | [4,92; 7,07]   | [3,13; 5,03]   | [3,37; 5,45]   | [4,13; 6,48]   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 629            | 590            | 590            | 522            | 504            | 416            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 23,10          | 29,43          | 31,30          | 31,33          | 33,67          | 29,80          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [21,52; 24,68] | [27,53; 31,32] | [29,21; 33,39] | [29,10; 33,56] | [31,27; 36,06] | [27,40; 32,20] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 539            | 503            | 425            | 429            | 374            | 366            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,79          | 22,67          | 22,55          | 25,75          | 24,98          | 26,22          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,30; 21,29] | [20,93; 24,41] | [20,66; 24,43] | [23,65; 27,85] | [22,79; 27,18] | [23,91; 28,53] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 297            | 263            | 222            | 210            | 176            | 157            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,91          | 11,85          | 11,78          | 12,61          | 11,76          | 11,25          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,74; 12,08]  | [10,51; 13,20] | [10,32; 13,23] | [11,01; 14,20] | [10,12; 13,39] | [9,59; 12,90]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 590            | 455            | 361            | 293            | 262            | 261            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 21,67          | 20,50          | 19,15          | 17,59          | 17,50          | 18,70          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [20,12; 23,21] | [18,82; 22,18] | [17,37; 20,93] | [15,76; 19,42] | [15,58; 19,43] | [16,65; 20,74] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 570            | 215            | 174            | 144            | 115            | 122            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 20,93          | 9,69           | 9,23           | 8,64           | 7,68           | 8,74           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [19,40; 22,46] | [8,46; 10,92]  | [7,92; 10,54]  | [7,29; 9,99]   | [6,33; 9,03]   | [7,26; 10,22]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2127                   | 1839           | 1616           | 1458           | 1328           | 1245           |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2122                   | 1768           | 1542           | 1408           | 1280           | 1197           |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 90                     | 95             | 82             | 58             | 64             | 66             |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 4,24                   | 5,37           | 5,32           | 4,12           | 5,00           | 5,51           |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [3,38; 5,10]           | [4,32; 6,42]   | [4,20; 6,44]   | [3,08; 5,16]   | [3,81; 6,19]   | [4,22; 6,81]   |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 513                    | 473            | 442            | 385            | 399            | 342            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 24,18                  | 26,75          | 28,66          | 27,34          | 31,17          | 28,57          |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [22,35; 26,00]         | [24,69; 28,82] | [26,41; 30,92] | [25,01; 29,67] | [28,63; 33,71] | [26,01; 31,13] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 445                    | 467            | 403            | 408            | 323            | 307            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 20,97                  | 26,41          | 26,13          | 28,98          | 25,23          | 25,65          |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [19,24; 22,70]         | [24,36; 28,47] | [23,94; 28,33] | [26,61; 31,35] | [22,85; 27,61] | [23,17; 28,12] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 215                    | 226            | 209            | 167            | 161            | 147            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 10,13                  | 12,78          | 13,55          | 11,86          | 12,58          | 12,28          |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [8,85; 11,42]          | [11,23; 14,34] | [11,84; 15,26] | [10,17; 13,55] | [10,76; 14,40] | [10,42; 14,14] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 457                    | 341            | 287            | 259            | 236            | 240            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 21,54                  | 19,29          | 18,61          | 18,39          | 18,44          | 20,05          |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [19,79; 23,29]         | [17,45; 21,13] | [16,67; 20,56] | [16,37; 20,42] | [16,31; 20,56] | [17,78; 22,32] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 402                    | 166            | 119            | 131            | 97             | 95             |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 18,94                  | 9,39           | 7,72           | 9,30           | 7,58           | 7,94           |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [17,28; 20,61]         | [8,03; 10,75]  | [6,38; 9,05]   | [7,79; 10,82]  | [6,13; 9,03]   | [6,40; 9,47]   |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-1                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 3025           | 2538           | 2206           | 1972           | 1813           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 3020           | 2441           | 2124           | 1912           | 1754           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 124            | 173            | 125            | 110            | 84             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 4,11           | 7,09           | 5,89           | 5,75           | 4,79           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [3,40; 4,81]   | [6,07; 8,11]   | [4,88; 6,89]   | [4,71; 6,80]   | [3,79; 5,79]   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 616            | 774            | 663            | 599            | 552            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 20,40          | 31,71          | 31,21          | 31,33          | 31,47          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,96; 21,83] | [29,86; 33,55] | [29,24; 33,19] | [29,25; 33,41] | [29,30; 33,64] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 596            | 563            | 529            | 479            | 441            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,74          | 23,06          | 24,91          | 25,05          | 25,14          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,32; 21,15] | [21,39; 24,74] | [23,07; 26,75] | [23,11; 27,00] | [23,11; 27,17] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 327            | 276            | 239            | 221            | 224            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,83          | 11,31          | 11,25          | 11,56          | 12,77          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,72; 11,94]  | [10,05; 12,56] | [9,91; 12,60]  | [10,13; 12,99] | [11,21; 14,33] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 653            | 439            | 369            | 351            | 316            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 21,62          | 17,98          | 17,37          | 18,36          | 18,02          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [20,15; 23,09] | [16,46; 19,51] | [15,76; 18,98] | [16,62; 20,09] | [16,22; 19,82] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 704            | 216            | 199            | 152            | 137            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 23,31          | 8,85           | 9,37           | 7,95           | 7,81           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [21,80; 24,82] | [7,72; 9,98]   | [8,13; 10,61]  | [6,74; 9,16]   | [6,55; 9,07]   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 2174           | 1850           | 1591           | 1428           | 1299           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 2172           | 1784           | 1534           | 1378           | 1251           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 79                     | 94             | 54             | 53             | 44             |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 3,64                   | 5,27           | 3,52           | 3,85           | 3,52           |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [2,85; 4,42]           | [4,23; 6,31]   | [2,60; 4,44]   | [2,83; 4,86]   | [2,50; 4,54]   |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 431                    | 460            | 419            | 376            | 342            |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 19,84                  | 25,78          | 27,31          | 27,29          | 27,34          |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [18,17; 21,52]         | [23,75; 27,82] | [25,08; 29,54] | [24,93; 29,64] | [24,87; 29,81] |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 452                    | 478            | 402            | 385            | 327            |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 20,81                  | 26,79          | 26,21          | 27,94          | 26,14          |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [19,10; 22,52]         | [24,74; 28,85] | [24,00; 28,41] | [25,57; 30,31] | [23,70; 28,57] |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 274                    | 243            | 216            | 182            | 180            |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 12,62                  | 13,62          | 14,08          | 13,21          | 14,39          |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [11,22; 14,01]         | [12,03; 15,21] | [12,34; 15,82] | [11,42; 15,00] | [12,44; 16,33] |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 521                    | 331            | 301            | 265            | 265            |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 23,99                  | 18,55          | 19,62          | 19,23          | 21,18          |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [22,19; 25,78]         | [16,75; 20,36] | [17,63; 21,61] | [17,15; 21,31] | [18,92; 23,45] |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 415                    | 178            | 142            | 117            | 93             |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 19,11                  | 9,98           | 9,26           | 8,49           | 7,43           |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [17,45; 20,76]         | [8,59; 11,37]  | [7,81; 10,71]  | [7,02; 9,96]   | [5,98; 8,89]   |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 3086           | 2626           | 2248           | 2023           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 3082           | 2540           | 2166           | 1947           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 115            | 137            | 119            | 98             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 3,73           | 5,39           | 5,49           | 5,03           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [3,06; 4,40]   | [4,52; 6,27]   | [4,53; 6,45]   | [4,06; 6,00]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 683            | 702            | 639            | 593            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 22,16          | 27,64          | 29,50          | 30,46          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [20,69; 23,63] | [25,90; 29,38] | [27,58; 31,42] | [28,41; 32,50] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 630            | 633            | 576            | 472            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 20,44          | 24,92          | 26,59          | 24,24          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [19,02; 21,87] | [23,24; 26,60] | [24,73; 28,45] | [22,34; 26,15] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 337            | 288            | 211            | 257            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,93          | 11,34          | 9,74           | 13,20          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,83; 12,04]  | [10,11; 12,57] | [8,49; 10,99]  | [11,70; 14,70] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 675            | 520            | 430            | 358            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 21,90          | 20,47          | 19,85          | 18,39          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [20,44; 23,36] | [18,90; 22,04] | [18,17; 21,53] | [16,67; 20,11] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 642            | 260            | 191            | 169            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 20,83          | 10,24          | 8,82           | 8,68           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [19,40; 22,26] | [9,06; 11,42]  | [7,62; 10,01]  | [7,43; 9,93]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2312                   | 2021           | 1768           | 1574           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2307                   | 1963           | 1708           | 1527           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 87                     | 113            | 95             | 70             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 3,77                   | 5,76           | 5,56           | 4,58           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [2,99; 4,55]           | [4,73; 6,79]   | [4,47; 6,65]   | [3,53; 5,63]   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 505                    | 514            | 478            | 427            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 21,89                  | 26,18          | 27,99          | 27,96          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [20,20; 23,58]         | [24,24; 28,13] | [25,86; 30,12] | [25,71; 30,22] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 498                    | 466            | 438            | 403            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 21,59                  | 23,74          | 25,64          | 26,39          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [19,91; 23,27]         | [21,86; 25,62] | [23,57; 27,72] | [24,18; 28,60] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 283                    | 261            | 213            | 200            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 12,27                  | 13,30          | 12,47          | 13,10          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [10,93; 13,61]         | [11,79; 14,80] | [10,90; 14,04] | [11,40; 14,79] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 518                    | 416            | 339            | 306            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 22,45                  | 21,19          | 19,85          | 20,04          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [20,75; 24,16]         | [19,38; 23,00] | [17,96; 21,74] | [18,03; 22,05] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 416                    | 193            | 145            | 121            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 18,03                  | 9,83           | 8,49           | 7,92           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [16,46; 19,60]         | [8,51; 11,15]  | [7,17; 9,81]   | [6,57; 9,28]   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 3146           | 2666           | 2269           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 3143           | 2575           | 2173           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 107            | 195            | 128            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 3,40           | 7,57           | 5,89           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [2,77; 4,04]   | [6,55; 8,59]   | [4,90; 6,88]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 626            | 774            | 649            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,92          | 30,06          | 29,87          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,52; 21,31] | [28,29; 31,83] | [27,94; 31,79] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 618            | 595            | 531            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,66          | 23,11          | 24,44          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,27; 21,05] | [21,48; 24,74] | [22,63; 26,24] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 327            | 299            | 262            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,40          | 11,61          | 12,06          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,34; 11,47]  | [10,37; 12,85] | [10,69; 13,43] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 723            | 464            | 409            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 23,00          | 18,02          | 18,82          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [21,53; 24,48] | [16,53; 19,50] | [17,18; 20,47] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 742            | 248            | 194            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 23,61          | 9,63           | 8,93           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [22,12; 25,09] | [8,49; 10,77]  | [7,73; 10,13]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2382                   | 2091           | 1809           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2379                   | 2042           | 1753           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 83                     | 123            | 76             |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 3,49                   | 6,02           | 4,34           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [2,75; 4,23]           | [4,99; 7,06]   | [3,38; 5,29]   |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 462                    | 541            | 452            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 19,42                  | 26,49          | 25,78          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [17,83; 21,01]         | [24,58; 28,41] | [23,74; 27,83] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 480                    | 494            | 471            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 20,18                  | 24,19          | 26,87          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [18,56; 21,79]         | [22,33; 26,05] | [24,79; 28,94] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 294                    | 231            | 225            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 12,36                  | 11,31          | 12,84          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [11,04; 13,68]         | [9,94; 12,69]  | [11,27; 14,40] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 557                    | 442            | 360            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 23,41                  | 21,65          | 20,54          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [21,71; 25,12]         | [19,86; 23,43] | [18,64; 22,43] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 503                    | 211            | 169            |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 21,14                  | 10,33          | 9,64           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [19,50; 22,78]         | [9,01; 11,65]  | [8,26; 11,02]  |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-2                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 3031           | 2602           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 3025           | 2483           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 120            | 174            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 3,97           | 7,01           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [3,27; 4,66]   | [6,00; 8,01]   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 642            | 688            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 21,22          | 27,71          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [19,77; 22,68] | [25,95; 29,47] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 599            | 533            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,80          | 21,47          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,38; 21,22] | [19,85; 23,08] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 309            | 290            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,21          | 11,68          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,14; 11,29]  | [10,42; 12,94] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 689            | 540            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 22,78          | 21,75          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [21,28; 24,27] | [20,12; 23,37] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 666            | 258            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 22,02          | 10,39          |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [20,54; 23,49] | [9,19; 11,59]  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2272                   | 1963           |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2269                   | 1872           |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 99                     | 94             |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 4,36                   | 5,02           |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [3,52; 5,20]           | [4,03; 6,01]   |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 447                    | 513            |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 19,70                  | 27,40          |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [18,06; 21,34]         | [25,38; 29,42] |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 462                    | 452            |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 20,36                  | 24,15          |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [18,70; 22,02]         | [22,21; 26,08] |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 251                    | 224            |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 11,06                  | 11,97          |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [9,77; 12,35]          | [10,50; 13,44] |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 539                    | 360            |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 23,75                  | 19,23          |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [22,00; 25,51]         | [17,44; 21,02] |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 471                    | 229            |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 20,76                  | 12,23          |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [19,09; 22,43]         | [10,75; 13,72] |                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                       | Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1                                   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>          | Anzahl                 | 3423           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar                                    | Anzahl                 | 3418           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                        | Anzahl                 | 117            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 3,42           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [2,81; 4,03]   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2      | Anzahl                 | 677            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 19,81          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [18,47; 21,14] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0        | Anzahl                 | 627            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 18,34          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [17,05; 19,64] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5        | Anzahl                 | 362            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 10,59          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [9,56; 11,62]  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0           | Anzahl                 | 771            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 22,56          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [21,16; 23,96] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0                 | Anzahl                 | 864            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 25,28          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [23,82; 26,74] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>weibliche Patienten insgesamt</b>     | Anzahl  | 2494                   |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar                               | Anzahl  | 2488                   |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| normal:<br>HbA1c ≤ 6,0                   | Anzahl  | 78                     |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 3,14                   |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [2,45; 3,82]           |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| oberer Zielbereich:<br>6,0 < HbA1c ≤ 7,2 | Anzahl  | 484                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 19,45                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [17,90; 21,01]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 1<br>7,2 < HbA1c ≤ 8,0   | Anzahl  | 476                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 19,13                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [17,59; 20,68]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| erhöhtes Risiko 2<br>8,0 < HbA1c ≤ 8,5   | Anzahl  | 298                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 11,98                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [10,70; 13,25]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 1:<br>8,5 < HbA1c ≤ 10,0      | Anzahl  | 603                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 24,24                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [22,55; 25,92]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Hochrisiko 2:<br>HbA1c > 10,0            | Anzahl  | 549                    |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %                                   | 22,07                  |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %                                | [20,44; 23,70]         |                |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In der folgenden Tabelle 3.2.3 ist die Entwicklung der **Serum-Kreatinin-Werte** ausgewiesen. Die ersten Zeilen beziehen sich auf die Unterteilung der Patienten in zwei spezifische Untergruppen. Zunächst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zur Serum-Kreatinin-Untersuchung vorliegen (erhobener und plausibler Wert gemäß Tabelle 0.1.2 bzw. die Angabe, dass keine Untersuchung erfolgte).

Diese „auswertbaren“ Patienten werden wiederum in zwei Gruppen unterteilt: Zunächst wird ausgewiesen, wie viele Patienten nicht auf Serum-Kreatinin untersucht wurden und welchen Anteil an den „auswertbaren“ Patienten diese Personengruppe ausmacht. Anschließend wird ausgewiesen, bei wie vielen Patienten die Serum-Kreatinin-Werte erhoben wurden und plausible Ergebnisse dokumentiert sind („untersuchte Patienten“). Diese Anzahl entspricht der Fallbasis für Berechnung von arithmetischem Mittel und Median.

**Tabelle 3.2.3 Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte**

| EZ   | 2005-1                        | 2005-2                        | Beitritts-<br>halbjahr                                   | 2. Halbjahr                 | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr     | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                 |                 |                 |                |      |  |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|--|
| 2005-1   | männliche Patienten insgesamt | weibliche Patienten insgesamt | Anzahl   | 342                         | 292             | 2287            | 2094            | 1857            | 1690            | 1582            | 1510            | 1432              | 1368              | 1309              | 1254              | 1185              | 1153              | 1103            | 1050            |                 |                |      |  |
|  |                               |                               | auswertbar   | Anzahl                      | 342             | 289             | 2281            | 277             | 224             | 2034            | 1808            | 1652              | 1543              | 1462              | 1382              | 1339              | 1280              | 1228            | 1163            | 1131            | 1073           | 1032 |  |
|  |                               |                               | nicht untersuchte Patienten                              | Anzahl                      | 86              | 73              | 511             | 638             | 661             | 591             | 575             | 556               | 475               | 480               | 435               | 422               | 406               | 366             | 337             | 340             |                |      |  |
|  |                               |                               |  | Anteil in %                 | 25,15           | 25,26           | 22,40           | 31,37           | 36,56           | 35,77           | 37,27           | 38,03             | 34,37             | 35,85             | 33,98             | 34,36             | 34,91             | 32,36           | 31,41           | 32,95           |                |      |  |
|  |                               |                               |  | CI Anteil in %              | [20,54; 29,75]  | [27,97; 38,48]  | [20,69; 24,11]  | [29,35; 33,38]  | [34,34; 38,78]  | [33,46; 38,09]  | [34,85; 39,68]  | [35,54; 40,52]    | [31,87; 36,88]    | [33,28; 38,42]    | [31,39; 36,58]    | [31,71; 37,02]    | [32,17; 37,65]    | [29,63; 35,09]  | [28,63; 34,19]  | [30,08; 35,81]  |                |      |  |
|  |                               |                               | untersuchte Patienten                                    | Anzahl                      | 256             | 216             | 1770            | 1396            | 1147            | 1061            | 968             | 906               | 907               | 859               | 845               | 806               | 757               | 765             | 736             | 692             |                |      |  |
|  |                               |                               |  | Mean                        | 96,32           | 80,88           | 96,70           | 100,43          | 101,13          | 98,77           | 97,09           | 98,55             | 97,09             | 96,79             | 95,17             | 94,21             | 97,33             | 97,41           | 96,51           | 98,22           |                |      |  |
|  |                               |                               |  | CI Mean                     | [87,39; 105,25] | [74,69; 87,06]  | [93,63; 99,76]  | [96,09; 104,77] | [96,20; 106,06] | [94,33; 103,20] | [92,41; 101,77] | [93,36; 103,75]   | [92,46; 101,72]   | [92,32; 101,25]   | [91,11; 99,23]    | [90,18; 98,24]    | [92,08; 102,58]   | [91,89; 102,92] | [91,35; 101,66] | [91,85; 104,58] |                |      |  |
|  |                               |                               | Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l | Median                      | 80,00           | 71,00           | 88,00           | 80,00           | 80,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 80,00          |      |  |
|  | CI Mean                       | [87,39; 105,25]               |  | [74,69; 87,06]              | [93,63; 99,76]  | [96,09; 104,77] | [96,20; 106,06] | [94,33; 103,20] | [92,41; 101,77] | [93,36; 103,75] | [92,46; 101,72] | [92,32; 101,25]   | [91,11; 99,23]    | [90,18; 98,24]    | [92,08; 102,58]   | [91,89; 102,92]   | [91,35; 101,66]   | [91,85; 104,58] |                 |                 |                |      |  |
|  | Median                        | 80,00                         |  | 71,00                       | 88,00           | 80,00           | 80,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00             | 88,00           | 80,00           |                 |                |      |  |
|  | 2005-2                        | männliche Patienten insgesamt | weibliche Patienten insgesamt                            | Anzahl                      | 2287            | 1772            | 2287            | 2094            | 1857            | 1690            | 1582            | 1510              | 1432              | 1368              | 1309              | 1254              | 1185              | 1153            | 1103            | 1050            |                |      |  |
|  |                               |                               |  | auswertbar                  | Anzahl          | 2281            | 1769            | 2281            | 2034            | 1808            | 1652            | 1543              | 1462              | 1382              | 1339              | 1280              | 1228              | 1163            | 1131            | 1073            | 1032           |      |  |
|  |                               |                               |  | nicht untersuchte Patienten | Anzahl          | 511             | 425             | 511             | 638             | 661             | 591             | 575               | 556               | 475               | 480               | 435               | 422               | 406             | 366             | 337             | 340            |      |  |
|  |                               |                               |  |                             | Anteil in %     | 22,40           | 24,02           | 22,40           | 31,37           | 36,56           | 35,77           | 37,27             | 38,03             | 34,37             | 35,85             | 33,98             | 34,36             | 34,91           | 32,36           | 31,41           | 32,95          |      |  |
|  |                               |                               |  |                             | CI Anteil in %  | [20,69; 24,11]  | [22,03; 26,02]  | [20,69; 24,11]  | [29,35; 33,38]  | [34,34; 38,78]  | [33,46; 38,09]  | [34,85; 39,68]    | [35,54; 40,52]    | [31,87; 36,88]    | [33,28; 38,42]    | [31,39; 36,58]    | [31,71; 37,02]    | [32,17; 37,65]  | [29,63; 35,09]  | [28,63; 34,19]  | [30,08; 35,81] |      |  |
|  |                               |                               |  | untersuchte Patienten       | Anzahl          | 1770            | 1344            | 1770            | 1396            | 1147            | 1061            | 968               | 906               | 907               | 859               | 845               | 806               | 757             | 765             | 736             | 692            |      |  |
|  |                               |                               |  |                             | Mean            | 96,70           | 87,54           | 96,70           | 100,43          | 101,13          | 98,77           | 97,09             | 98,55             | 97,09             | 96,79             | 95,17             | 94,21             | 97,33           | 97,41           | 96,51           | 98,22          |      |  |
| CI Mean  |                               |                               |  |                             | [93,63; 99,76]  | [83,96; 91,13]  | [93,63; 99,76]  | [96,09; 104,77] | [96,20; 106,06] | [94,33; 103,20] | [92,41; 101,77] | [93,36; 103,75]   | [92,46; 101,72]   | [92,32; 101,25]   | [91,11; 99,23]    | [90,18; 98,24]    | [92,08; 102,58]   | [91,89; 102,92] | [91,35; 101,66] | [91,85; 104,58] |                |      |  |
| Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l |                               |                               |  | Median                      | 88,00           | 76,00           | 88,00           | 88,00           | 86,00           | 86,00           | 83,00           | 81,00             | 83,00             | 84,00             | 83,00             | 83,00             | 83,00             | 83,00           | 84,00           | 82,00           |                |      |  |
|  | CI Mean                       | [93,63; 99,76]                | [83,96; 91,13]   | [93,63; 99,76]              | [96,09; 104,77] | [96,20; 106,06] | [94,33; 103,20] | [92,41; 101,77] | [93,36; 103,75] | [92,46; 101,72] | [92,32; 101,25] | [91,11; 99,23]    | [90,18; 98,24]    | [92,08; 102,58]   | [91,89; 102,92]   | [91,35; 101,66]   | [91,85; 104,58]   |                 |                 |                 |                |      |  |
|  | Median                        | 88,00                         | 76,00  | 88,00                       | 88,00           | 86,00           | 86,00           | 83,00           | 81,00           | 83,00           | 84,00           | 83,00             | 83,00             | 83,00             | 83,00             | 84,00             | 82,00             |                 |                 |                 |                |      |  |

| EZ     | Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr        | 4. Halbjahr        | 5. Halbjahr        | 6. Halbjahr        | 7. Halbjahr        | 8. Halbjahr        | 9. Halbjahr        | 10. Halb-<br>jahr  | 11. Halb-<br>jahr  | 12. Halb-<br>jahr  | 13. Halb-<br>jahr  | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2006-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2245              | 2019               | 1756               | 1611               | 1483               | 1408               | 1329               | 1225               | 1149               | 1090               | 1039               | 984                | 932               |                   |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 2224              | 1958               | 1710               | 1550               | 1433               | 1344               | 1280               | 1194               | 1129               | 1076               | 1018               | 968                | 907               |                   |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 585               | 561                | 468                | 457                | 365                | 331                | 280                | 314                | 246                | 281                | 236                | 251                | 197               |                   |  |
|        |  | Anteil in %            | 26,30             | 28,65              | 27,37              | 29,48              | 25,47              | 24,63              | 21,88              | 26,30              | 21,79              | 26,12              | 23,18              | 25,93              | 21,72             |                   |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [24,47;<br>28,13] | [26,65;<br>30,65]  | [25,25;<br>29,48]  | [27,21;<br>31,75]  | [23,21;<br>27,73]  | [22,32;<br>26,93]  | [19,61;<br>24,14]  | [23,80;<br>28,80]  | [19,38;<br>24,20]  | [23,49;<br>28,74]  | [20,59;<br>25,78]  | [23,17;<br>28,69]  | [19,03;<br>24,40] |                   |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1639              | 1397               | 1242               | 1093               | 1068               | 1013               | 1000               | 880                | 883                | 795                | 782                | 717                | 710               |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 91,91             | 92,64              | 94,37              | 93,86              | 92,71              | 92,60              | 92,39              | 91,11              | 92,48              | 95,95              | 92,67              | 92,02              | 94,03             |                   |  |
|        |  | CI Mean                | [89,39;<br>94,42] | [89,55;<br>95,72]  | [90,61;<br>98,12]  | [90,26;<br>97,46]  | [88,95;<br>96,46]  | [88,49;<br>96,72]  | [88,29;<br>96,48]  | [87,73;<br>94,49]  | [89,08;<br>95,88]  | [91,55;<br>100,36] | [89,81;<br>95,54]  | [88,62;<br>95,42]  | [89,69;<br>98,37] |                   |  |
|        |  | Median                 | 81,00             | 80,00              | 80,00              | 83,00              | 80,00              | 83,00              | 81,00              | 82,00              | 84,00              | 85,00              | 86,00              | 84,00              | 83,50             |                   |  |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 1759              | 1578               | 1380               | 1253               | 1159               | 1105               | 1057               | 991                | 933                | 884                | 844                | 797                | 747               |                   |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 1744              | 1529               | 1338               | 1209               | 1111               | 1054               | 1027               | 960                | 909                | 867                | 825                | 781                | 733               |                   |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 511               | 496                | 406                | 391                | 301                | 294                | 279                | 279                | 233                | 222                | 207                | 200                | 170               |                   |  |
|        |  | Anteil in %            | 29,30             | 32,44              | 30,34              | 32,34              | 27,09              | 27,89              | 27,17              | 29,06              | 25,63              | 25,61              | 25,09              | 25,61              | 23,19             |                   |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [27,16;<br>31,44] | [30,09;<br>34,79]  | [27,88;<br>32,81]  | [29,70;<br>34,98]  | [24,48;<br>29,71]  | [25,18;<br>30,60]  | [24,44;<br>29,89]  | [26,19;<br>31,94]  | [22,79;<br>28,47]  | [22,70;<br>28,51]  | [22,13;<br>28,05]  | [22,55;<br>28,67]  | [20,13;<br>26,25] |                   |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1233              | 1033               | 932                | 818                | 810                | 760                | 748                | 681                | 676                | 645                | 618                | 581                | 563               |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 85,33             | 79,56              | 88,74              | 84,21              | 80,28              | 78,85              | 81,21              | 80,78              | 84,57              | 82,40              | 79,31              | 80,44              | 79,87             |                   |  |
|        |  | CI Mean                | [81,10;<br>89,57] | [76,90;<br>82,21]  | [83,17;<br>94,31]  | [79,49;<br>88,93]  | [76,39;<br>84,16]  | [75,44;<br>82,26]  | [77,18;<br>85,24]  | [75,92;<br>85,65]  | [78,78;<br>90,35]  | [77,07;<br>87,72]  | [75,21;<br>83,42]  | [75,96;<br>84,91]  | [75,78;<br>83,96] |                   |  |
|        |  | Median                 | 71,00             | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00             |                   |  |
| 2006-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3054              | 2707               | 2393               | 2179               | 2052               | 1924               | 1796               | 1691               | 1605               | 1506               | 1434               | 1366               |                   |                   |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 3041              | 2633               | 2300               | 2120               | 1936               | 1859               | 1743               | 1649               | 1579               | 1476               | 1410               | 1335               |                   |                   |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 872               | 743                | 736                | 616                | 604                | 490                | 539                | 437                | 448                | 354                | 422                | 338                |                   |                   |  |
|        |  | Anteil in %            | 28,67             | 28,22              | 32,00              | 29,06              | 31,20              | 26,36              | 30,92              | 26,50              | 28,37              | 23,98              | 29,93              | 25,32              |                   |                   |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [27,07;<br>30,28] | [26,50;<br>29,94]  | [30,09;<br>33,91]  | [27,12;<br>30,99]  | [29,13;<br>33,26]  | [24,35;<br>28,36]  | [28,75;<br>33,09]  | [24,37;<br>28,63]  | [26,15;<br>30,60]  | [21,80;<br>26,16]  | [27,54;<br>32,32]  | [22,98;<br>27,65]  |                   |                   |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2169              | 1890               | 1564               | 1504               | 1332               | 1369               | 1204               | 1212               | 1131               | 1122               | 988                | 997                |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 96,11             | 98,18              | 97,44              | 99,45              | 101,33             | 100,17             | 102,17             | 101,11             | 102,32             | 100,86             | 97,81              | 97,24              |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                | [92,62;<br>99,60] | [94,36;<br>102,00] | [93,65;<br>101,23] | [95,01;<br>103,90] | [96,58;<br>106,08] | [95,51;<br>104,82] | [96,85;<br>107,49] | [95,94;<br>106,28] | [96,77;<br>107,88] | [95,95;<br>105,76] | [93,05;<br>102,57] | [92,39;<br>102,08] |                   |                   |  |
|        |  | Median                 | 80,00             | 82,50              | 86,00              | 87,00              | 84,00              | 83,00              | 82,00              | 81,00              | 84,00              | 84,00              | 83,00              | 82,00              |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2346              | 2091               | 1875               | 1753               | 1639               | 1555               | 1433               | 1332               | 1263               | 1206               | 1147               | 1090               |                   |                   |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 2337              | 2025               | 1822               | 1693               | 1527               | 1491               | 1383               | 1296               | 1243               | 1181               | 1123               | 1075               |                   |                   |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 691               | 587                | 639                | 494                | 466                | 420                | 426                | 346                | 361                | 292                | 326                | 268                |                   |                   |  |
|        |  | Anteil in %            | 29,57             | 28,99              | 35,07              | 29,18              | 30,52              | 28,17              | 30,80              | 26,70              | 29,04              | 24,72              | 29,03              | 24,93              |                   |                   |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [27,72;<br>31,42] | [27,01;<br>30,96]  | [32,88;<br>37,26]  | [27,01;<br>31,35]  | [28,21;<br>32,83]  | [25,88;<br>30,45]  | [28,37;<br>33,24]  | [24,29;<br>29,11]  | [26,52;<br>31,57]  | [22,26;<br>27,19]  | [26,37;<br>31,69]  | [22,34;<br>27,52]  |                   |                   |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1646              | 1438               | 1183               | 1199               | 1061               | 1071               | 957                | 950                | 882                | 889                | 797                | 807                |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 80,57             | 84,95              | 80,41              | 82,47              | 80,50              | 80,99              | 79,05              | 81,68              | 79,27              | 80,42              | 79,50              | 82,20              |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                | [77,82;<br>83,32] | [81,04;<br>88,87]  | [77,46;<br>83,36]  | [78,81;<br>86,12]  | [76,91;<br>84,08]  | [77,15;<br>84,83]  | [75,42;<br>82,68]  | [77,46;<br>85,91]  | [75,55;<br>82,99]  | [76,79;<br>84,05]  | [76,13;<br>82,87]  | [77,57;<br>86,82]  |                   |                   |  |
|        |  | Median                 | 71,00             | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 71,00              |                   |                   |  |

| EZ     | Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr        | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 6522              | 5910               | 5338              | 4997              | 4736              | 4458              | 4205              | 4002              | 3822              | 3669              | 3522              |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 6446              | 5724               | 5178              | 4787              | 4581              | 4363              | 4112              | 3924              | 3760              | 3598              | 3438              |                   |                   |                   |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1766              | 1743               | 1617              | 1481              | 1432              | 1366              | 1201              | 1199              | 1032              | 1044              | 951               |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            | 27,40             | 30,45              | 31,23             | 30,94             | 31,26             | 31,31             | 29,21             | 30,56             | 27,45             | 29,02             | 27,66             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         | [26,31;<br>28,49] | [29,26;<br>31,64]  | [29,97;<br>32,49] | [29,63;<br>32,25] | [29,92;<br>32,60] | [29,93;<br>32,68] | [27,82;<br>30,60] | [29,11;<br>32,00] | [26,02;<br>28,87] | [27,53;<br>30,50] | [26,17;<br>29,16] |                   |                   |                   |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 4680              | 3981               | 3561              | 3306              | 3149              | 2997              | 2911              | 2725              | 2728              | 2554              | 2487              |                   |                   |                   |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 94,64             | 95,87              | 95,03             | 96,28             | 93,26             | 94,83             | 95,73             | 96,04             | 95,30             | 96,28             | 94,45             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Mean                | [92,76;<br>96,51] | [93,69;<br>98,05]  | [92,82;<br>97,24] | [93,91;<br>98,65] | [91,23;<br>95,28] | [92,51;<br>97,15] | [93,25;<br>98,21] | [93,47;<br>98,60] | [92,82;<br>97,79] | [93,54;<br>99,01] | [91,98;<br>96,93] |                   |                   |                   |
|        |  | Median                 | 85,00             | 83,00              | 82,00             | 84,00             | 83,00             | 83,00             | 83,00             | 84,00             | 83,00             | 83,00             | 82,00             |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 5314              | 4880               | 4472              | 4196              | 3934              | 3716              | 3532              | 3362              | 3209              | 3071              | 2944              |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 5272              | 4753               | 4349              | 3990              | 3818              | 3623              | 3470              | 3276              | 3142              | 3001              | 2881              |                   |                   |                   |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1492              | 1408               | 1308              | 1243              | 1110              | 1128              | 971               | 989               | 830               | 844               | 733               |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            | 28,30             | 29,62              | 30,08             | 31,15             | 29,07             | 31,13             | 27,98             | 30,19             | 26,42             | 28,12             | 25,44             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         | [27,08;<br>29,52] | [28,33;<br>30,92]  | [28,71;<br>31,44] | [29,72;<br>32,59] | [27,63;<br>30,51] | [29,63;<br>32,64] | [26,49;<br>29,48] | [28,62;<br>31,76] | [24,87;<br>27,96] | [26,52;<br>29,73] | [23,85;<br>27,03] |                   |                   |                   |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 3780              | 3345               | 3041              | 2747              | 2708              | 2495              | 2499              | 2287              | 2312              | 2157              | 2148              |                   |                   |                   |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 79,67             | 78,91              | 78,90             | 79,11             | 78,79             | 78,29             | 77,99             | 79,72             | 78,35             | 78,71             | 77,84             |                   |                   |                   |
|        |  | CI Mean                | [77,97;<br>81,37] | [77,24;<br>80,57]  | [77,05;<br>80,74] | [77,34;<br>80,88] | [76,97;<br>80,62] | [76,55;<br>80,03] | [76,21;<br>79,77] | [77,64;<br>81,80] | [76,36;<br>80,34] | [76,58;<br>80,83] | [75,78;<br>79,91] |                   |                   |                   |
|        |  | Median                 | 71,00             | 71,00              | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             |                   |                   |                   |
| 2007-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 4414              | 3892               | 3512              | 3195              | 2899              | 2676              | 2514              | 2368              | 2249              | 2141              |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 4379              | 3748               | 3307              | 3059              | 2791              | 2595              | 2439              | 2300              | 2190              | 2087              |                   |                   |                   |                   |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1341              | 1105               | 1057              | 928               | 883               | 780               | 782               | 634               | 646               | 587               |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            | 30,62             | 29,48              | 31,96             | 30,34             | 31,64             | 30,06             | 32,06             | 27,57             | 29,50             | 28,13             |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         | [29,26;<br>31,99] | [28,02;<br>30,94]  | [30,37;<br>33,55] | [28,71;<br>31,97] | [29,91;<br>33,36] | [28,29;<br>31,82] | [30,21;<br>33,91] | [25,74;<br>29,39] | [27,59;<br>31,41] | [26,20;<br>30,06] |                   |                   |                   |                   |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 3038              | 2643               | 2250              | 2131              | 1908              | 1815              | 1657              | 1666              | 1544              | 1500              |                   |                   |                   |                   |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 95,67             | 98,24              | 95,83             | 94,82             | 92,94             | 93,45             | 92,16             | 93,07             | 92,60             | 94,13             |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Mean                | [92,79;<br>98,55] | [94,73;<br>101,74] | [92,60;<br>99,05] | [91,76;<br>97,88] | [90,21;<br>95,67] | [90,37;<br>96,52] | [89,29;<br>95,03] | [90,14;<br>96,00] | [89,49;<br>95,72] | [90,83;<br>97,44] |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Median                 | 80,00             | 80,00              | 82,00             | 82,00             | 81,00             | 82,00             | 82,00             | 82,00             | 81,00             | 82,00             |                   |                   |                   |                   |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3459              | 3091               | 2830              | 2577              | 2330              | 2170              | 2043              | 1941              | 1835              | 1756              |                   |                   |                   |                   |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 3428              | 2984               | 2641              | 2475              | 2264              | 2120              | 1980              | 1896              | 1799              | 1711              |                   |                   |                   |                   |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1092              | 896                | 824               | 802               | 721               | 618               | 598               | 530               | 523               | 453               |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Anteil in %            | 31,86             | 30,03              | 31,20             | 32,40             | 31,85             | 29,15             | 30,20             | 27,95             | 29,07             | 26,48             |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Anteil in %         | [30,30;<br>33,42] | [28,38;<br>31,67]  | [29,43;<br>32,97] | [30,56;<br>34,25] | [29,93;<br>33,77] | [27,22;<br>31,09] | [28,18;<br>32,22] | [25,93;<br>29,97] | [26,97;<br>31,17] | [24,38;<br>28,57] |                   |                   |                   |                   |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2336              | 2088               | 1817              | 1673              | 1543              | 1502              | 1382              | 1366              | 1276              | 1258              |                   |                   |                   |                   |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 79,76             | 80,47              | 77,93             | 79,70             | 78,93             | 76,77             | 77,89             | 75,63             | 76,53             | 76,59             |                   |                   |                   |                   |
|        |  | CI Mean                | [77,22;<br>82,29] | [77,60;<br>83,34]  | [75,53;<br>80,34] | [76,85;<br>82,55] | [76,10;<br>81,76] | [74,17;<br>79,38] | [75,34;<br>80,44] | [73,40;<br>77,86] | [74,26;<br>78,79] | [74,26;<br>78,92] |                   |                   |                   |                   |
|        |  | Median                 | 71,00             | 71,00              | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             |                   |                   |                   |                   |

| EZ      | Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008-1  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 4190              | 3689              | 3307              | 2914              | 2653              | 2459              | 2274              | 2144              | 2046              |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 4154              | 3468              | 3108              | 2782              | 2565              | 2374              | 2204              | 2085              | 1980              |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1248              | 1024              | 973               | 958               | 796               | 777               | 649               | 652               | 539               |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | Anteil in %            | 30,04             | 29,53             | 31,31             | 34,44             | 31,03             | 32,73             | 29,45             | 31,27             | 27,22             |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | CI Anteil in %         | [28,65;<br>31,44] | [28,01;<br>31,05] | [29,68;<br>32,94] | [32,67;<br>36,20] | [29,24;<br>32,82] | [30,84;<br>34,62] | [27,54;<br>31,35] | [29,28;<br>33,26] | [25,26;<br>29,18] |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2906              | 2444              | 2135              | 1824              | 1769              | 1597              | 1555              | 1433              | 1441              |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 91,62             | 91,36             | 91,64             | 93,20             | 93,49             | 94,19             | 94,97             | 94,76             | 95,18             |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | CI Mean                | [89,24;<br>94,00] | [89,03;<br>93,70] | [88,88;<br>94,41] | [90,27;<br>96,13] | [90,20;<br>96,78] | [90,77;<br>97,60] | [91,34;<br>98,60] | [91,01;<br>98,52] | [91,32;<br>99,03] |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | Median                 | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 81,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 81,00             | 80,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3188              | 2871              | 2579              | 2319              | 2120              | 1972              | 1834              | 1736              | 1650              |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 3159              | 2718              | 2442              | 2231              | 2060              | 1907              | 1788              | 1683              | 1592              |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1012              | 817               | 807               | 770               | 659               | 603               | 535               | 540               | 461               |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | Anteil in %            | 32,04             | 30,06             | 33,05             | 34,51             | 31,99             | 31,62             | 29,92             | 32,09             | 28,96             |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | CI Anteil in %         | [30,41;<br>33,66] | [28,33;<br>31,78] | [31,18;<br>34,91] | [32,54;<br>36,49] | [29,98;<br>34,01] | [29,53;<br>33,71] | [27,80;<br>32,04] | [29,85;<br>34,32] | [26,73;<br>31,19] |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2147              | 1901              | 1635              | 1461              | 1401              | 1304              | 1253              | 1143              | 1131              |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 77,14             | 78,31             | 77,92             | 77,85             | 79,84             | 78,79             | 78,96             | 78,12             | 78,80             |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Mean |  | [74,84;<br>79,43]      | [75,69;<br>80,93] | [75,24;<br>80,59] | [74,91;<br>80,80] | [76,44;<br>83,25] | [75,62;<br>81,96] | [75,57;<br>82,34] | [74,64;<br>81,59] | [75,33;<br>82,26] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Median  |  | 71,00                  | 71,00             | 71,00             | 70,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             | 71,00             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-2  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2893              | 2495              | 2153              | 1904              | 1738              | 1605              | 1505              | 1412              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 2882              | 2377              | 2056              | 1831              | 1681              | 1542              | 1441              | 1360              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 915               | 701               | 707               | 592               | 560               | 489               | 474               | 380               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | Anteil in %            | 31,75             | 29,49             | 34,39             | 32,33             | 33,31             | 31,71             | 32,89             | 27,94             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | CI Anteil in %         | [30,05;<br>33,45] | [27,66;<br>31,32] | [32,33;<br>36,44] | [30,19;<br>34,48] | [31,06;<br>35,57] | [29,39;<br>34,04] | [30,47;<br>35,32] | [25,56;<br>30,33] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1967              | 1676              | 1349              | 1239              | 1121              | 1053              | 967               | 980               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 89,19             | 90,70             | 91,43             | 90,90             | 91,55             | 93,21             | 94,65             | 92,92             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | CI Mean                | [86,85;<br>91,54] | [88,02;<br>93,38] | [88,14;<br>94,72] | [88,18;<br>93,62] | [88,28;<br>94,83] | [89,31;<br>97,11] | [90,42;<br>98,88] | [89,09;<br>96,75] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | Median                 | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 81,00             | 81,00             | 81,00             | 82,00             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2099              | 1848              | 1615              | 1424              | 1290              | 1198              | 1124              | 1060              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 2092              | 1771              | 1554              | 1365              | 1236              | 1149              | 1092              | 1015              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 741               | 548               | 528               | 440               | 417               | 343               | 352               | 269               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | Anteil in %            | 35,42             | 30,94             | 33,98             | 32,23             | 33,74             | 29,85             | 32,23             | 26,50             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         |  | CI Anteil in %         | [33,37;<br>37,47] | [28,79;<br>33,10] | [31,62;<br>36,33] | [29,75;<br>34,71] | [31,10;<br>36,37] | [27,20;<br>32,50] | [29,46;<br>35,01] | [23,79;<br>29,22] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1351              | 1223              | 1026              | 925               | 819               | 806               | 740               | 746               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 76,25             | 79,62             | 78,59             | 75,85             | 77,07             | 75,33             | 77,31             | 77,23             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Mean |  | [73,21;<br>79,30]      | [75,65;<br>83,59] | [74,59;<br>82,59] | [72,93;<br>78,76] | [73,65;<br>80,50] | [72,53;<br>78,12] | [73,89;<br>80,73] | [72,88;<br>81,58] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Median  |  | 70,00                  | 71,00             | 69,00             | 69,00             | 69,00             | 70,00             | 70,50             | 69,00             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ     | Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2009-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3215              | 2781              | 2408              | 2143              | 1971              | 1823              | 1697              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 3202              | 2673              | 2311              | 2074              | 1902              | 1762              | 1645              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1098              | 870               | 712               | 700               | 558               | 558               | 464               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %            | 34,29             | 32,55             | 30,81             | 33,75             | 29,34             | 31,67             | 28,21             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [32,65;<br>35,94] | [30,77;<br>34,32] | [28,93;<br>32,69] | [31,72;<br>35,79] | [27,29;<br>31,38] | [29,50;<br>33,84] | [26,03;<br>30,38] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2104              | 1803              | 1599              | 1374              | 1344              | 1204              | 1181              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 91,65             | 92,53             | 92,80             | 93,22             | 92,46             | 94,55             | 92,22             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Mean                | [88,74;<br>94,56] | [89,13;<br>95,93] | [89,09;<br>96,51] | [89,40;<br>97,03] | [88,94;<br>95,99] | [90,24;<br>98,85] | [88,45;<br>95,99] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median                 | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 81,00             | 80,00             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2420              | 2074              | 1813              | 1629              | 1496              | 1367              | 1268              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 2409              | 1992              | 1740              | 1570              | 1431              | 1312              | 1221              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 851               | 600               | 574               | 551               | 434               | 404               | 362               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %            | 35,33             | 30,12             | 32,99             | 35,10             | 30,33             | 30,79             | 29,65             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [33,42;<br>37,24] | [28,11;<br>32,14] | [30,78;<br>35,20] | [32,73;<br>37,46] | [27,95;<br>32,71] | [28,29;<br>33,29] | [27,09;<br>32,21] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1558              | 1392              | 1166              | 1019              | 997               | 908               | 859               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 76,63             | 75,35             | 76,78             | 76,47             | 74,11             | 78,63             | 79,14             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Mean                | [73,91;<br>79,36] | [72,59;<br>78,11] | [73,29;<br>80,28] | [73,11;<br>79,83] | [71,74;<br>76,47] | [74,48;<br>82,79] | [74,52;<br>83,75] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median                 | 70,00             | 70,00             | 69,00             | 71,00             | 71,00             | 70,00             | 69,00             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 2009-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2729              | 2303              | 1970              | 1730              | 1565              | 1452              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 2718              | 2217              | 1879              | 1664              | 1495              | 1392              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 969               | 659               | 646               | 486               | 471               | 395               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %            | 35,65             | 29,72             | 34,38             | 29,21             | 31,51             | 28,38             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [33,85;<br>37,45] | [27,82;<br>31,63] | [32,23;<br>36,53] | [27,02;<br>31,39] | [29,15;<br>33,86] | [26,01;<br>30,75] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1749              | 1558              | 1233              | 1178              | 1024              | 997               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 88,43             | 91,67             | 90,97             | 90,80             | 92,57             | 91,58             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Mean                | [85,99;<br>90,88] | [88,24;<br>95,11] | [87,61;<br>94,33] | [87,45;<br>94,16] | [88,32;<br>96,82] | [87,71;<br>95,45] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median                 | 80,00             | 80,00             | 82,00             | 82,00             | 82,00             | 81,00             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2127              | 1839              | 1616              | 1458              | 1328              | 1245              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 2120              | 1768              | 1541              | 1409              | 1279              | 1196              |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 750               | 520               | 504               | 402               | 403               | 327               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Anteil in %            | 35,38             | 29,41             | 32,71             | 28,53             | 31,51             | 27,34             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [33,34;<br>37,41] | [27,29;<br>31,54] | [30,36;<br>35,05] | [26,17;<br>30,89] | [28,96;<br>34,06] | [24,81;<br>29,87] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1370              | 1248              | 1037              | 1007              | 876               | 869               |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 75,60             | 75,74             | 74,81             | 76,17             | 76,28             | 72,95             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | CI Mean                | [72,41;<br>78,79] | [72,24;<br>79,23] | [71,75;<br>77,88] | [72,74;<br>79,61] | [72,24;<br>80,32] | [70,58;<br>75,31] |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|        |  | Median                 | 68,00             | 67,00             | 67,00             | 68,00             | 68,00             | 67,00             |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |



| EZ      | Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-1  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3025              | 2538              | 2206              | 1972              | 1813              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 3012              | 2440              | 2123              | 1908              | 1755              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 989               | 662               | 585               | 567               | 439               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | Anteil in %            | 32,84             | 27,13             | 27,56             | 29,72             | 25,01             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | CI Anteil in %         | [31,16;<br>34,51] | [25,37;<br>28,90] | [25,65;<br>29,46] | [27,67;<br>31,77] | [22,99;<br>27,04] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2023              | 1778              | 1538              | 1341              | 1316              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 89,32             | 91,10             | 88,93             | 89,08             | 88,75             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | CI Mean                | [86,55;<br>92,09] | [88,10;<br>94,10] | [86,28;<br>91,57] | [86,36;<br>91,81] | [85,80;<br>91,71] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | Median                 | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2174              | 1850              | 1591              | 1428              | 1299              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 2166              | 1783              | 1534              | 1376              | 1251              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 765               | 542               | 473               | 423               | 363               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | Anteil in %            | 35,32             | 30,40             | 30,83             | 30,74             | 29,02             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | CI Anteil in %         | [33,31;<br>37,33] | [28,26;<br>32,53] | [28,52;<br>33,15] | [28,30;<br>33,18] | [26,50;<br>31,53] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1401              | 1241              | 1061              | 953               | 888               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 74,77             | 76,02             | 75,03             | 77,42             | 75,03             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Mean |  | [72,17;<br>77,36]      | [72,91;<br>79,12] | [71,99;<br>78,07] | [73,73;<br>81,12] | [71,86;<br>78,21] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median  |  | 66,00                  | 67,00             | 67,00             | 68,00             | 67,00             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-2  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3086              | 2626              | 2248              | 2023              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 3076              | 2538              | 2165              | 1942              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1059              | 720               | 691               | 557               |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | Anteil in %            | 34,43             | 28,37             | 31,92             | 28,68             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | CI Anteil in %         | [32,75;<br>36,11] | [26,61;<br>30,12] | [29,95;<br>33,88] | [26,67;<br>30,69] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2017              | 1818              | 1474              | 1385              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 89,01             | 90,34             | 90,73             | 92,45             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | CI Mean                | [86,32;<br>91,71] | [87,49;<br>93,20] | [87,25;<br>94,21] | [88,50;<br>96,40] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | Median                 | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2312              | 2021              | 1768              | 1574              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | auswertbar   | Anzahl                 | 2305              | 1961              | 1707              | 1524              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 832               | 542               | 537               | 414               |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | Anteil in %            | 36,10             | 27,64             | 31,46             | 27,17             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         |  | CI Anteil in %         | [34,13;<br>38,06] | [25,66;<br>29,62] | [29,26;<br>33,66] | [24,93;<br>29,40] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1473              | 1419              | 1170              | 1110              |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|         | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 78,16             | 75,85             | 76,56             | 76,72             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Mean |  | [75,08;<br>81,24]      | [73,25;<br>78,45] | [73,77;<br>79,36] | [73,36;<br>80,08] |                   |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median  |  | 69,00                  | 69,00             | 69,00             | 68,00             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3146              | 2666              | 2269              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | 3140              | 2573              | 2172              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1072              | 748               | 628               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 34,14             | 29,07             | 28,91             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [32,48;<br>35,80] | [27,32;<br>30,83] | [27,01;<br>30,82] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2068              | 1825              | 1544              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 88,52             | 86,26             | 86,74             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Mean                | [85,89;<br>91,15] | [84,24;<br>88,28] | [84,35;<br>89,13] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Median                 | 80,00             | 80,00             | 80,00             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2382              | 2091              | 1809              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | 2374              | 2039              | 1750              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 827               | 587               | 519               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 34,84             | 28,79             | 29,66             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [32,92;<br>36,75] | [26,82;<br>30,75] | [27,52;<br>31,80] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| untersuchte Patienten  | Anzahl   | 1547                   | 1452              | 1231              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean   | 73,97                  | 74,64             | 75,50             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Mean  | [71,15;<br>76,79]      | [71,81;<br>77,47] | [72,16;<br>78,84] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Median   | 66,00                  | 66,00             | 67,00             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-2   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3031              | 2602              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | 3020              | 2481              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1031              | 717               |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 34,14             | 28,90             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [32,45;<br>35,83] | [27,12;<br>30,68] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1989              | 1764              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 89,03             | 88,35             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Mean                | [86,23;<br>91,83] | [85,49;<br>91,21] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Median                 | 80,00             | 80,00             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2272              | 1963              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 | 2267              | 1871              |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 742               | 475               |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 32,73             | 25,39             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [30,80;<br>34,66] | [23,41;<br>27,36] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| untersuchte Patienten  | Anzahl   | 1525                   | 1396              |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean   | 76,14                  | 74,97             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Mean  | [73,18;<br>79,10]      | [72,48;<br>77,46] |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Median   | 67,00                  | 66,50             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ     | Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte                       | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 3423              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 3414              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 1164              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Anteil in %            | 34,09             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [32,50;<br>35,69] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 2250              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 87,56             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                | [84,97;<br>90,16] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Median                 | 80,00             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>                           | Anzahl                 | 2494              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar   | Anzahl                 | 2490              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | nicht untersuchte Patienten                                    | Anzahl                 | 916               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | Anteil in %            | 36,79             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Anteil in %         | [34,89;<br>38,68] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | untersuchte Patienten  | Anzahl                 | 1574              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | Auswertungsergebnisse zum<br>Serum-Kreatinin-Wert<br>in µmol/l | Mean                   | 73,83             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |  | CI Mean                | [70,90;<br>76,76] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Median |  | 65,00                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In der folgenden Tabelle 3.2.4 werden basierend auf den Serum-Kreatinin-Werten – mittels der Cockcroft-Gault-Formel – Angaben zur **glomerulären Filtrationsrate (GFR)** bei Erwachsenen gemacht. Die Fallbasis für diese Auswertungen kann geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren und untersuchten Patienten für die Serum-Kreatinin-Werte. Denn zur näherungsweisen Ermittlung der GFR mittels Cockcroft-Gault-Formel sind zusätzlich die Angaben zu Alter und Gewicht erforderlich.

Die Ausscheidungsfunktion der Niere bzw. deren Funktionseinheiten, den mehr als eine Million Glomeruli, erfolgt über Filtration, Sekretion und Resorption. In den kelchartigen Glomeruli befindet sich ein Knäuel von Gefäßen, deren Wände für Wasser, Salze und kleinmolekulare Substanzen (z.B. Zucker) durchlässig sind, wodurch diese als Primärharn in die kugelförmigen Kelche und aus diesen abzweigenden Sammelröhrchen abgeleitet werden. Blutkörperchen und großmolekulare Substanzen wie Eiweiße (z.B. Albumin) verbleiben bei Nierengesunden fast vollständig in den Gefäßen, in die im weiteren Verlauf der Ausscheidungsvorgänge auch über 99% des Primärharns rückresorbiert werden.

Frei in den Primärharn filtriert und weder rückresorbiert noch verstoffwechselt wird u.a. Kreatinin, ein Abbauprodukt aus der Muskulatur. Ein Anstieg der Kreatininkonzentration im Blutplasma kann ein Indikator für eine eingeschränkte Nierenfunktion sein. Wesentlich aussagekräftiger ist jedoch die glomeruläre Filtrationsrate, die Gesamtmenge an Primärharn, die von allen Glomeruli beider Nieren – beim Nierengesunden etwa 0,12 Liter pro Minute bzw. ca.170 Liter pro Tag - produziert wird. Die GFR kann unter Berücksichtigung der genannten Faktoren mittels der erwähnten Formel näherungsweise berechnet werden.

Zunächst werden unter „erwachsene männliche bzw. erwachsene weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar und untersucht“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zur GFR vorliegen (erhobener und plausibler Wert gemäß Tabelle 0.1.2 sowie jeweils eine plausible Angabe zum Lebensalter und zum Gewicht). Diese Anzahl entspricht der Fallbasis für Berechnung von arithmetischem Mittel und Median.

Nach einer Darstellung der Mittelwerte wird ausgewiesen, wie sich die Patienten auf die GFR-Kategorien "normal" (GFR mindestens 90), "leicht pathologisch" (GFR von 60 bis unter 90), "mäßig pathologisch" (GFR von 30 bis unter 60), "hoch pathologisch" (GFR von 15 bis unter 30) und "terminal insuffizient" (GFR unter 15) verteilen.

**Tabelle 3.2.4 Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)**

| EZ                        | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr     | 10. Halbjahr    | 11. Halbjahr    | 12. Halbjahr    | 13. Halbjahr    | 14. Halbjahr    | 15. Halbjahr    |                  |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2005-1                    | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 319              | 298              | 257              | 226              | 207             | 195             | 186             | 178             | 168             | 164             | 160             | 152             | 146             | 142             | 137              |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 246              | 199              | 180              | 148              | 150             | 124             | 140             | 135             | 120             | 113             | 138             | 133             | 131             | 120             | 122              |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 114,90           | 114,03           | 112,30           | 109,39           | 105,60          | 104,44          | 104,93          | 102,24          | 100,10          | 101,53          | 104,06          | 103,47          | 104,31          | 105,77          | 108,65           |
|                           |  | CI Mean            | [110,15; 119,65] | [107,99; 120,08] | [105,75; 118,85] | [102,93; 115,86] | [99,06; 112,14] | [96,87; 112,00] | [98,08; 111,78] | [95,70; 108,79] | [93,20; 107,00] | [94,12; 108,95] | [97,11; 111,00] | [97,02; 109,92] | [97,54; 111,08] | [98,81; 112,72] | [100,97; 116,32] |
|                           |  | Median             | 113,99           | 112,24           | 112,28           | 105,17           | 104,78          | 105,63          | 105,00          | 102,44          | 99,31           | 98,32           | 98,04           | 102,12          | 101,55          | 101,83          | 106,49           |
|                           | GFR normal   | Anzahl             | 187              | 143              | 125              | 105              | 96              | 77              | 80              | 81              | 74              | 71              | 86              | 81              | 83              | 79              | 78               |
|                           |  | Anteil in %        | 76,02            | 71,86            | 69,44            | 70,95            | 64,00           | 62,10           | 57,14           | 60,00           | 61,67           | 62,83           | 62,32           | 60,90           | 63,36           | 65,83           | 63,93            |
|                           |  | CI Anteil in %     | [70,67; 81,36]   | [65,60; 78,12]   | [62,70; 76,19]   | [63,61; 78,29]   | [56,29; 71,71]  | [53,52; 70,67]  | [48,92; 65,37]  | [51,71; 68,29]  | [52,93; 70,40]  | [53,88; 71,78]  | [54,20; 70,43]  | [52,58; 69,23]  | [55,08; 71,64]  | [57,31; 74,35]  | [55,38; 72,49]   |
|                           | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 43               | 43               | 37               | 32               | 41              | 32              | 45              | 39              | 33              | 27              | 37              | 40              | 32              | 28              | 30               |
|                           |  | Anteil in %        | 17,48            | 21,61            | 20,56            | 21,62            | 27,33           | 25,81           | 32,14           | 28,89           | 27,50           | 23,89           | 26,81           | 30,08           | 24,43           | 23,33           | 24,59            |
|                           |  | CI Anteil in %     | [12,72; 22,24]   | [15,88; 27,34]   | [14,64; 26,48]   | [14,97; 28,28]   | [20,18; 34,49]  | [18,07; 33,54]  | [24,38; 39,91]  | [21,21; 36,56]  | [19,48; 35,52]  | [16,00; 31,79]  | [19,39; 34,23]  | [22,25; 37,90]  | [17,04; 31,81]  | [15,73; 30,93]  | [16,92; 32,26]   |
|                           | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 11               | 6                | 14               | 9                | 12              | 12              | 12              | 12              | 10              | 14              | 14              | 11              | 14              | 12              | 11               |
|                           |  | Anteil in %        | 4,47             | 3,02             | 7,78             | 6,08             | 8,00            | 9,68            | 8,57            | 8,89            | 8,33            | 12,39           | 10,14           | 8,27            | 10,69           | 10,00           | 9,02             |
|                           |  | CI Anteil in %     | [1,88; 7,06]     | [0,63; 5,40]     | [3,85; 11,70]    | [2,22; 9,94]     | [3,64; 12,36]   | [4,45; 14,90]   | [3,92; 13,23]   | [4,07; 13,71]   | [3,37; 13,30]   | [6,29; 18,49]   | [5,09; 15,20]   | [3,57; 12,97]   | [5,38; 16,00]   | [4,61; 15,39]   | [3,91; 14,12]    |
|                           | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 3                | 3                | 2                | 0                | 0               | 1               | 1               | 1               | 2               | 0               | 1               | 1               | 1               | 1               | 2                |
|                           |  | Anteil in %        | 1,22             | 1,51             | 1,11             | 0,00             | 0,00            | 0,81            | 0,71            | 0,74            | 1,67            | 0,00            | 0,72            | 0,75            | 0,76            | 0,83            | 1,64             |
|                           |  | CI Anteil in %     | [0,00; 2,59]     | [0,00; 3,20]     | [0,00; 2,65]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,39]    | [0,00; 2,11]    | [0,00; 2,19]    | [0,00; 3,97]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,14]    | [0,00; 2,23]    | [0,00; 2,26]    | [0,00; 2,47]    | [0,00; 3,90]     |
|                           | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 2                | 4                | 2                | 2                | 1               | 2               | 2               | 2               | 1               | 1               | 0               | 0               | 1               | 0               | 1                |
|                           |  | Anteil in %        | 0,81             | 2,01             | 1,11             | 1,35             | 0,67            | 1,61            | 1,43            | 1,48            | 0,83            | 0,88            | 0,00            | 0,00            | 0,76            | 0,00            | 0,82             |
|                           |  | CI Anteil in %     | [0,00; 1,94]     | [0,06; 3,96]     | [0,00; 2,65]     | [0,00; 3,22]     | [0,00; 1,97]    | [0,00; 3,84]    | [0,00; 3,40]    | [0,00; 3,53]    | [0,00; 2,47]    | [0,00; 2,62]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,26]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,43]     |
|                           | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 275              | 265              | 231              | 202              | 184             | 172             | 164             | 158             | 151             | 144             | 138             | 134             | 129             | 129             | 122              |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 204              | 169              | 130              | 133              | 132             | 118             | 112             | 113             | 105             | 105             | 112             | 115             | 117             | 105             | 111              |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 99,25            | 99,17            | 99,17            | 98,83            | 89,99           | 97,34           | 89,42           | 97,24           | 93,44           | 91,13           | 91,39           | 94,10           | 93,68           | 96,28           | 92,87            |
|                           |  | CI Mean            | [93,48; 105,02]  | [92,62; 105,73]  | [91,42; 106,91]  | [90,64; 107,02]  | [83,26; 96,72]  | [89,16; 105,52] | [82,36; 96,48]  | [89,04; 105,45] | [85,64; 101,23] | [84,13; 98,13]  | [84,49; 98,29]  | [86,98; 101,22] | [86,26; 101,10] | [88,56; 103,99] | [86,32; 99,41]   |
|                           |  | Median             | 92,57            | 94,26            | 95,27            | 95,78            | 87,69           | 94,55           | 84,89           | 92,36           | 87,83           | 87,36           | 90,01           | 89,52           | 92,56           | 91,74           | 89,07            |
|                           | GFR normal   | Anzahl             | 108              | 92               | 72               | 76               | 65              | 64              | 52              | 57              | 52              | 47              | 56              | 57              | 62              | 55              | 55               |
|                           |  | Anteil in %        | 52,94            | 54,44            | 55,38            | 57,14            | 49,24           | 54,24           | 46,43           | 50,44           | 49,52           | 44,76           | 50,00           | 49,57           | 52,99           | 52,38           | 49,55            |
|                           |  | CI Anteil in %     | [46,07; 59,81]   | [46,91; 61,97]   | [46,81; 63,96]   | [48,70; 65,59]   | [40,68; 57,80]  | [45,21; 63,26]  | [37,15; 55,71]  | [41,18; 59,70]  | [39,91; 59,13]  | [35,21; 54,32]  | [40,70; 59,30]  | [40,39; 58,74]  | [43,91; 62,07]  | [42,78; 61,98]  | [40,21; 58,89]   |
| GFR leicht pathologisch   | Anzahl   | 66                 | 46               | 39               | 32               | 35               | 28              | 35              | 37              | 33              | 41              | 32              | 41              | 34              | 36              | 38              |                  |
|                           | Anteil in %  | 32,35              | 27,22            | 30,00            | 24,06            | 26,52            | 23,73           | 31,25           | 32,74           | 31,43           | 39,05           | 28,57           | 35,65           | 29,06           | 34,29           | 34,23           |                  |
|                           | CI Anteil in %   | [25,92; 38,79]     | [20,49; 33,95]   | [22,09; 37,91]   | [16,77; 31,35]   | [18,96; 34,07]   | [16,02; 31,44]  | [22,63; 39,87]  | [24,05; 41,43]  | [22,51; 40,35]  | [29,67; 48,42]  | [20,17; 36,98]  | [26,86; 44,44]  | [20,80; 37,32]  | [25,16; 43,41]  | [25,37; 43,10]  |                  |
| GFR mäßig pathologisch    | Anzahl   | 25                 | 23               | 15               | 18               | 25               | 23              | 21              | 13              | 14              | 14              | 20              | 14              | 18              | 13              | 17              |                  |
|                           | Anteil in %  | 12,25              | 13,61            | 11,54            | 13,53            | 18,94            | 19,49           | 18,75           | 11,50           | 13,33           | 13,33           | 17,86           | 12,17           | 15,38           | 12,38           | 15,32           |                  |
|                           | CI Anteil in %   | [7,74; 16,77]      | [8,42; 18,79]    | [6,03; 17,05]    | [7,70; 19,37]    | [12,23; 25,65]   | [12,31; 26,67]  | [11,49; 26,01]  | [5,60; 17,41]   | [6,80; 19,87]   | [6,80; 19,87]   | [10,73; 24,98]  | [6,17; 18,18]   | [8,82; 21,95]   | [6,05; 18,71]   | [8,59; 22,05]   |                  |
| GFR hoch pathologisch     | Anzahl   | 5                  | 7                | 3                | 5                | 5                | 2               | 3               | 4               | 4               | 1               | 2               | 1               | 1               | 0               | 1               |                  |
|                           | Anteil in %  | 2,45               | 4,14             | 2,31             | 3,76             | 3,79             | 1,69            | 2,68            | 3,54            | 3,81            | 0,95            | 1,79            | 0,87            | 0,85            | 0,00            | 0,90            |                  |
|                           | CI Anteil in %   | [0,32; 4,58]       | [1,13; 7,16]     | [0,00; 4,90]     | [0,51; 7,00]     | [0,52; 7,06]     | [0,00; 4,03]    | [0,00; 5,68]    | [0,12; 6,96]    | [0,13; 7,49]    | [0,00; 2,82]    | [0,00; 4,25]    | [0,00; 2,57]    | [0,00; 2,53]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,67]    |                  |
| GFR terminal insuffizient | Anzahl   | 0                  | 1                | 1                | 2                | 2                | 1               | 1               | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               | 1               | 0               |                  |
|                           | Anteil in %  | 0,00               | 0,59             | 0,77             | 1,50             | 1,52             | 0,85            | 0,89            | 1,77            | 1,90            | 1,90            | 1,79            | 1,74            | 1,71            | 0,95            | 0,00            |                  |
|                           | CI Anteil in %   | [0,00; 0,00]       | [0,00; 1,75]     | [0,00; 2,28]     | [0,00; 3,58]     | [0,00; 3,61]     | [0,00; 2,51]    | [0,00; 2,64]    | [0,00; 4,21]    | [0,00; 4,53]    | [0,00; 4,53]    | [0,00; 4,25]    | [0,00; 4,14]    | [0,00; 4,07]    | [0,00; 2,82]    | [0,00; 0,00]    |                  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halbjahr     | 11. Halbjahr     | 12. Halbjahr     | 13. Halbjahr     | 14. Halbjahr     | 15. Halbjahr     |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2005-2   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 2160             | 1982             | 1754             | 1603             | 1498             | 1430             | 1359             | 1307             | 1254             | 1202             | 1134             | 1103             | 1058             | 1010             |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 1702             | 1327             | 1101             | 1010             | 931              | 867              | 876              | 830              | 818              | 780              | 729              | 739              | 710              | 669              |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 109,36           | 108,86           | 108,68           | 107,10           | 108,95           | 109,16           | 109,09           | 108,76           | 109,49           | 108,62           | 108,52           | 108,38           | 109,04           | 110,55           |
|  |  | CI Mean            | [107,48; 111,23] | [106,69; 111,04] | [106,23; 111,14] | [104,61; 109,59] | [106,39; 111,50] | [106,40; 111,92] | [106,36; 111,81] | [105,95; 111,56] | [106,70; 112,29] | [105,79; 111,44] | [105,58; 111,46] | [105,33; 111,42] | [105,95; 112,13] | [107,13; 113,98] |
|  |  | Median             | 106,54           | 107,34           | 107,21           | 106,96           | 107,89           | 108,18           | 108,36           | 107,10           | 106,50           | 106,78           | 106,33           | 104,43           | 106,02           | 108,02           |
|  | GFR normal   | Anzahl             | 1186             | 914              | 738              | 660              | 622              | 575              | 588              | 549              | 556              | 514              | 488              | 479              | 481              | 449              |
|  |  | Anteil in %        | 69,68            | 68,88            | 67,03            | 65,35            | 66,81            | 66,32            | 67,12            | 66,14            | 67,97            | 65,90            | 66,94            | 64,82            | 67,75            | 67,12            |
|  |  | CI Anteil in %     | [67,50; 71,87]   | [66,39; 71,37]   | [64,25; 69,81]   | [62,41; 68,28]   | [63,78; 69,84]   | [63,17; 69,47]   | [64,01; 70,24]   | [62,92; 69,37]   | [64,77; 71,17]   | [62,57; 69,23]   | [63,52; 70,36]   | [61,37; 68,26]   | [64,31; 71,19]   | [63,55; 70,68]   |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 371              | 289              | 252              | 244              | 227              | 210              | 209              | 196              | 189              | 190              | 166              | 189              | 153              | 141              |
|  |  | Anteil in %        | 21,80            | 21,78            | 22,89            | 24,16            | 24,38            | 24,22            | 23,86            | 23,61            | 23,11            | 24,36            | 22,77            | 25,58            | 21,55            | 21,08            |
|  |  | CI Anteil in %     | [19,84; 23,76]   | [19,56; 24,00]   | [20,41; 25,37]   | [21,52; 26,80]   | [21,62; 27,14]   | [21,37; 27,07]   | [21,03; 26,68]   | [20,72; 26,51]   | [20,21; 26,00]   | [21,34; 27,37]   | [19,72; 25,82]   | [22,43; 28,72]   | [18,52; 24,58]   | [17,98; 24,17]   |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 117              | 97               | 85               | 82               | 65               | 63               | 63               | 69               | 63               | 65               | 63               | 58               | 59               | 66               |
|  |  | Anteil in %        | 6,87             | 7,31             | 7,72             | 8,12             | 6,98             | 7,27             | 7,19             | 8,31             | 7,70             | 8,33             | 8,64             | 7,85             | 8,31             | 9,87             |
|  |  | CI Anteil in %     | [5,67; 8,08]     | [5,91; 8,71]     | [6,14; 9,30]     | [6,43; 9,80]     | [5,34; 8,62]     | [5,54; 9,00]     | [5,48; 8,90]     | [6,43; 10,19]    | [5,87; 9,53]     | [6,39; 10,27]    | [6,60; 10,68]    | [5,91; 9,79]     | [6,28; 10,34]    | [7,60; 12,13]    |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 16               | 12               | 14               | 16               | 11               | 11               | 9                | 11               | 6                | 8                | 7                | 7                | 13               | 6                |
|  |  | Anteil in %        | 0,94             | 0,90             | 1,27             | 1,58             | 1,18             | 1,27             | 1,03             | 1,33             | 0,73             | 1,03             | 0,96             | 0,95             | 1,83             | 0,90             |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,48; 1,40]     | [0,39; 1,41]     | [0,61; 1,93]     | [0,81; 2,35]     | [0,49; 1,88]     | [0,52; 2,01]     | [0,36; 1,70]     | [0,55; 2,10]     | [0,15; 1,32]     | [0,32; 1,73]     | [0,25; 1,67]     | [0,25; 1,65]     | [0,84; 2,82]     | [0,18; 1,61]     |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 12               | 15               | 12               | 8                | 6                | 8                | 7                | 5                | 4                | 3                | 5                | 6                | 4                | 7                |
|  |  | Anteil in %        | 0,71             | 1,13             | 1,09             | 0,79             | 0,64             | 0,92             | 0,80             | 0,60             | 0,49             | 0,38             | 0,69             | 0,81             | 0,56             | 1,05             |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,31; 1,10]     | [0,56; 1,70]     | [0,48; 1,70]     | [0,25; 1,34]     | [0,13; 1,16]     | [0,29; 1,56]     | [0,21; 1,39]     | [0,08; 1,13]     | [0,01; 0,97]     | [0,00; 0,82]     | [0,09; 1,29]     | [0,16; 1,46]     | [0,01; 1,11]     | [0,27; 1,82]     |
| <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                   | Anzahl   | 1650               | 1517             | 1356             | 1248             | 1178             | 1120             | 1069             | 1031             | 986              | 932              | 906              | 877              | 845              | 815              |                  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1277               | 1019             | 876              | 789              | 764              | 698              | 685              | 672              | 630              | 619              | 594              | 611              | 578              | 576              |                  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 91,05              | 91,42            | 90,35            | 91,25            | 91,49            | 90,50            | 91,25            | 89,45            | 90,84            | 91,83            | 92,43            | 91,72            | 92,45            | 90,42            |                  |
|  | CI Mean  | [88,94; 93,16]     | [89,00; 93,84]   | [87,90; 92,80]   | [88,63; 93,86]   | [88,89; 94,09]   | [87,78; 93,21]   | [88,38; 94,12]   | [86,79; 92,11]   | [88,05; 93,62]   | [88,90; 94,76]   | [89,24; 95,62]   | [88,62; 94,82]   | [89,18; 95,73]   | [87,41; 93,43]   |                  |
|  | Median   | 86,75              | 88,11            | 86,86            | 87,25            | 86,44            | 87,22            | 88,08            | 86,87            | 87,08            | 89,64            | 87,24            | 87,00            | 87,65            | 86,34            |                  |
| GFR normal   | Anzahl   | 588                | 481              | 400              | 369              | 358              | 321              | 325              | 313              | 292              | 308              | 277              | 288              | 277              | 265              |                  |
|  | Anteil in %  | 46,05              | 47,20            | 45,66            | 46,77            | 46,86            | 45,99            | 47,45            | 46,58            | 46,35            | 49,76            | 46,63            | 47,14            | 47,92            | 46,01            |                  |
|  | CI Anteil in %   | [43,31; 48,78]     | [44,14; 50,27]   | [42,36; 48,96]   | [43,28; 50,25]   | [43,32; 50,40]   | [42,29; 49,69]   | [43,70; 51,19]   | [42,80; 50,35]   | [42,45; 50,25]   | [45,82; 53,70]   | [42,62; 50,65]   | [43,17; 51,10]   | [43,85; 52,00]   | [41,93; 50,08]   |                  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 435                | 328              | 304              | 264              | 259              | 239              | 224              | 227              | 219              | 194              | 201              | 203              | 180              | 201              |                  |
|  | Anteil in %  | 34,06              | 32,19            | 34,70            | 33,46            | 33,90            | 34,24            | 32,70            | 33,78            | 34,76            | 31,34            | 33,84            | 33,22            | 31,14            | 34,90            |                  |
|  | CI Anteil in %   | [31,46; 36,66]     | [29,32; 35,06]   | [31,55; 37,86]   | [30,17; 36,75]   | [30,54; 37,26]   | [30,72; 37,76]   | [29,19; 36,22]   | [30,20; 37,36]   | [31,04; 38,48]   | [27,68; 35,00]   | [30,03; 37,65]   | [29,49; 36,96]   | [27,36; 34,92]   | [31,00; 38,79]   |                  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 217                | 176              | 145              | 132              | 128              | 122              | 114              | 112              | 103              | 95               | 103              | 100              | 102              | 89               |                  |
|  | Anteil in %  | 16,99              | 17,27            | 16,55            | 16,73            | 16,75            | 17,48            | 16,64            | 16,67            | 16,35            | 15,35            | 17,34            | 16,37            | 17,65            | 15,45            |                  |
|  | CI Anteil in %   | [14,93; 19,05]     | [14,95; 19,59]   | [14,09; 19,02]   | [14,12; 19,34]   | [14,10; 19,40]   | [14,66; 20,30]   | [13,85; 19,43]   | [13,85; 19,49]   | [13,46; 19,24]   | [12,51; 18,19]   | [14,29; 20,39]   | [13,43; 19,30]   | [14,54; 20,76]   | [12,50; 18,41]   |                  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 25                 | 21               | 18               | 19               | 13               | 10               | 17               | 17               | 13               | 18               | 10               | 15               | 13               | 17               |                  |
|  | Anteil in %  | 1,96               | 2,06             | 2,05             | 2,41             | 1,70             | 1,43             | 2,48             | 2,53             | 2,06             | 2,91             | 1,68             | 2,45             | 2,25             | 2,95             |                  |
|  | CI Anteil in %   | [1,20; 2,72]       | [1,19; 2,93]     | [1,11; 2,99]     | [1,34; 3,48]     | [0,78; 2,62]     | [0,55; 2,31]     | [1,32; 3,65]     | [1,34; 3,72]     | [0,95; 3,17]     | [1,58; 4,23]     | [0,65; 2,72]     | [1,23; 3,68]     | [1,04; 3,46]     | [1,57; 4,33]     |                  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 12                 | 13               | 9                | 5                | 6                | 6                | 5                | 3                | 3                | 4                | 3                | 5                | 6                | 4                |                  |
|  | Anteil in %  | 0,94               | 1,28             | 1,03             | 0,63             | 0,79             | 0,86             | 0,73             | 0,45             | 0,48             | 0,65             | 0,51             | 0,82             | 1,04             | 0,69             |                  |
|  | CI Anteil in %   | [0,41; 1,47]       | [0,59; 1,97]     | [0,36; 1,70]     | [0,08; 1,19]     | [0,16; 1,41]     | [0,17; 1,54]     | [0,09; 1,37]     | [0,00; 0,95]     | [0,00; 1,01]     | [0,01; 1,28]     | [0,00; 1,08]     | [0,10; 1,53]     | [0,21; 1,87]     | [0,02; 1,37]     |                  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halb-jahr | 2. Halb-jahr     | 3. Halb-jahr     | 4. Halb-jahr     | 5. Halb-jahr     | 6. Halb-jahr     | 7. Halb-jahr     | 8. Halb-jahr     | 9. Halb-jahr     | 10. Halb-jahr    | 11. Halb-jahr    | 12. Halb-jahr    | 13. Halb-jahr    | 14. Halb-jahr    | 15. Halb-jahr |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2006-1   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl              | 2101             | 1884             | 1636             | 1499             | 1384             | 1313             | 1247             | 1155             | 1086             | 1032             | 988              | 935              | 886              |               |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl              | 1560             | 1326             | 1175             | 1029             | 1010             | 953              | 946              | 829              | 839              | 759              | 745              | 686              | 676              |               |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                | 115,41           | 116,02           | 113,85           | 113,71           | 114,10           | 115,45           | 114,34           | 114,04           | 111,70           | 110,54           | 109,75           | 110,76           | 110,80           |               |
|  |  | CI Mean             | [113,39; 117,44] | [113,83; 118,21] | [111,61; 116,08] | [111,27; 116,16] | [111,63; 116,57] | [112,92; 117,97] | [111,70; 116,97] | [111,34; 116,74] | [108,98; 114,41] | [107,71; 113,37] | [106,95; 112,56] | [107,85; 113,67] | [107,79; 113,80] |               |
|  |  | Median              | 112,98           | 114,39           | 110,98           | 113,08           | 112,78           | 112,74           | 112,01           | 111,86           | 108,14           | 109,31           | 107,50           | 108,35           | 109,76           |               |
|  | GFR normal   | Anzahl              | 1171             | 1013             | 876              | 753              | 737              | 718              | 696              | 613              | 607              | 536              | 520              | 486              | 469              |               |
|  |  | Anteil in %         | 75,06            | 76,40            | 74,55            | 73,18            | 72,97            | 75,34            | 73,57            | 73,94            | 72,35            | 70,62            | 69,80            | 70,85            | 69,38            |               |
|  |  | CI Anteil in %      | [72,92; 77,21]   | [74,11; 78,68]   | [72,06; 77,04]   | [70,47; 75,89]   | [70,23; 75,71]   | [72,60; 78,08]   | [70,76; 76,38]   | [70,95; 76,93]   | [69,32; 75,38]   | [67,38; 73,86]   | [66,50; 73,10]   | [67,44; 74,25]   | [65,90; 72,86]   |               |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl              | 288              | 217              | 223              | 202              | 202              | 176              | 182              | 157              | 165              | 151              | 160              | 144              | 146              |               |
|  |  | Anteil in %         | 18,46            | 16,37            | 18,98            | 19,63            | 20,00            | 18,47            | 19,24            | 18,94            | 19,67            | 19,89            | 21,48            | 20,99            | 21,60            |               |
|  |  | CI Anteil in %      | [16,54; 20,39]   | [14,37; 18,36]   | [16,74; 21,22]   | [17,20; 22,06]   | [17,53; 22,47]   | [16,00; 20,93]   | [16,73; 21,75]   | [16,27; 21,61]   | [16,98; 22,36]   | [17,05; 22,74]   | [18,53; 24,43]   | [17,94; 24,04]   | [18,49; 24,70]   |               |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl              | 80               | 78               | 56               | 61               | 54               | 45               | 54               | 46               | 56               | 60               | 57               | 49               | 48               |               |
|  |  | Anteil in %         | 5,13             | 5,88             | 4,77             | 5,93             | 5,35             | 4,72             | 5,71             | 5,55             | 6,67             | 7,91             | 7,65             | 7,14             | 7,10             |               |
|  |  | CI Anteil in %      | [4,03; 6,22]     | [4,62; 7,15]     | [3,55; 5,98]     | [4,48; 7,37]     | [3,96; 6,73]     | [3,37; 6,07]     | [4,23; 7,19]     | [3,99; 7,11]     | [4,98; 8,36]     | [5,98; 9,83]     | [5,74; 9,56]     | [5,21; 9,07]     | [5,16; 9,04]     |               |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl              | 14               | 11               | 10               | 7                | 11               | 6                | 6                | 8                | 7                | 7                | 7                | 5                | 10               |               |
|  |  | Anteil in %         | 0,90             | 0,83             | 0,85             | 0,68             | 1,09             | 0,63             | 0,63             | 0,97             | 0,83             | 0,92             | 0,94             | 0,73             | 1,48             |               |
|  |  | CI Anteil in %      | [0,43; 1,37]     | [0,34; 1,32]     | [0,33; 1,38]     | [0,18; 1,18]     | [0,45; 1,73]     | [0,13; 1,13]     | [0,13; 1,14]     | [0,30; 1,63]     | [0,22; 1,45]     | [0,24; 1,60]     | [0,25; 1,63]     | [0,09; 1,37]     | [0,57; 2,39]     |               |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl              | 7                | 7                | 10               | 6                | 6                | 8                | 8                | 5                | 4                | 5                | 1                | 2                | 3                |               |
|  |  | Anteil in %         | 0,45             | 0,53             | 0,85             | 0,58             | 0,59             | 0,84             | 0,85             | 0,60             | 0,48             | 0,66             | 0,13             | 0,29             | 0,44             |               |
|  |  | CI Anteil in %      | [0,12; 0,78]     | [0,14; 0,92]     | [0,33; 1,38]     | [0,12; 1,05]     | [0,12; 1,07]     | [0,26; 1,42]     | [0,26; 1,43]     | [0,08; 1,13]     | [0,01; 0,94]     | [0,08; 1,23]     | [0,00; 0,40]     | [0,00; 0,70]     | [0,00; 0,95]     |               |
|  | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl              | 1598             | 1429             | 1256             | 1138             | 1052             | 1005             | 964              | 908              | 856              | 812              | 779              | 738              | 696              |               |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1151                | 963              | 869              | 762              | 751              | 700              | 699              | 638              | 635              | 605              | 581              | 545              | 534              |                  |               |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 97,56               | 97,95            | 95,68            | 94,98            | 96,95            | 97,53            | 96,66            | 98,54            | 96,31            | 95,83            | 95,29            | 95,33            | 94,96            |                  |               |
|  | CI Mean  | [95,15; 99,97]      | [95,34; 100,57]  | [92,99; 98,37]   | [92,13; 97,83]   | [94,06; 99,84]   | [94,49; 100,58]  | [93,53; 99,78]   | [95,14; 101,94]  | [92,98; 99,64]   | [92,47; 99,19]   | [91,95; 98,63]   | [91,62; 99,04]   | [91,43; 98,49]   |                  |               |
|  | Median   | 92,71               | 92,18            | 91,66            | 89,96            | 92,19            | 91,51            | 90,96            | 92,27            | 91,26            | 90,18            | 90,01            | 88,98            | 90,74            |                  |               |
| GFR normal   | Anzahl   | 602                 | 499              | 454              | 379              | 390              | 362              | 356              | 335              | 329              | 305              | 291              | 268              | 270              |                  |               |
|  | Anteil in %  | 52,30               | 51,82            | 52,24            | 49,74            | 51,93            | 51,71            | 50,93            | 52,51            | 51,81            | 50,41            | 50,09            | 49,17            | 50,56            |                  |               |
|  | CI Anteil in %   | [49,42; 55,19]      | [48,66; 54,97]   | [48,92; 55,57]   | [46,19; 53,29]   | [48,35; 55,51]   | [48,01; 55,42]   | [47,22; 54,64]   | [48,63; 56,39]   | [47,92; 55,70]   | [46,43; 54,40]   | [46,02; 54,16]   | [44,97; 53,38]   | [46,32; 54,81]   |                  |               |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 377                 | 340              | 277              | 266              | 237              | 233              | 226              | 192              | 185              | 193              | 189              | 168              | 166              |                  |               |
|  | Anteil in %  | 32,75               | 35,31            | 31,88            | 34,91            | 31,56            | 33,29            | 32,33            | 30,09            | 29,13            | 31,90            | 32,53            | 30,83            | 31,09            |                  |               |
|  | CI Anteil in %   | [30,04; 35,47]      | [32,29; 38,33]   | [28,78; 34,98]   | [31,52; 38,29]   | [28,23; 34,88]   | [29,79; 36,78]   | [28,86; 35,80]   | [26,53; 33,66]   | [25,60; 32,67]   | [28,18; 35,62]   | [28,72; 36,34]   | [26,95; 34,71]   | [27,16; 35,02]   |                  |               |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 136                 | 109              | 107              | 94               | 111              | 92               | 102              | 98               | 106              | 94               | 88               | 99               | 85               |                  |               |
|  | Anteil in %  | 11,82               | 11,32            | 12,31            | 12,34            | 14,78            | 13,14            | 14,59            | 15,36            | 16,69            | 15,54            | 15,15            | 18,17            | 15,92            |                  |               |
|  | CI Anteil in %   | [9,95; 13,68]       | [9,32; 13,32]    | [10,13; 14,50]   | [10,00; 14,67]   | [12,24; 17,32]   | [10,64; 15,65]   | [11,97; 17,21]   | [12,56; 18,16]   | [13,79; 19,60]   | [12,65; 18,43]   | [12,23; 18,06]   | [14,93; 21,41]   | [12,81; 19,02]   |                  |               |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 23                  | 11               | 15               | 15               | 8                | 9                | 8                | 8                | 8                | 8                | 12               | 7                | 9                |                  |               |
|  | Anteil in %  | 2,00                | 1,14             | 1,73             | 1,97             | 1,07             | 1,29             | 1,14             | 1,25             | 1,26             | 1,32             | 2,07             | 1,28             | 1,69             |                  |               |
|  | CI Anteil in %   | [1,19; 2,81]        | [0,47; 1,81]     | [0,86; 2,59]     | [0,98; 2,96]     | [0,33; 1,80]     | [0,45; 2,12]     | [0,36; 1,93]     | [0,39; 2,12]     | [0,39; 2,13]     | [0,41; 2,23]     | [0,91; 3,22]     | [0,34; 2,23]     | [0,59; 2,78]     |                  |               |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 13                  | 4                | 16               | 8                | 5                | 4                | 7                | 5                | 7                | 5                | 1                | 3                | 4                |                  |               |
|  | Anteil in %  | 1,13                | 0,42             | 1,84             | 1,05             | 0,67             | 0,57             | 1,00             | 0,78             | 1,10             | 0,83             | 0,17             | 0,55             | 0,75             |                  |               |
|  | CI Anteil in %   | [0,52; 1,74]        | [0,01; 0,82]     | [0,95; 2,74]     | [0,33; 1,77]     | [0,08; 1,25]     | [0,01; 1,13]     | [0,26; 1,74]     | [0,10; 1,47]     | [0,29; 1,92]     | [0,10; 1,55]     | [0,00; 0,51]     | [0,00; 1,17]     | [0,02; 1,48]     |                  |               |

| EZ                        | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halbjahr     | 11. Halbjahr     | 12. Halbjahr     | 13. Halbjahr     | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2006-2                    | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 2885             | 2561             | 2258             | 2061             | 1941             | 1826             | 1708             | 1608             | 1526             | 1433             | 1364             | 1300             |              |              |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 2073             | 1802             | 1502             | 1441             | 1285             | 1314             | 1153             | 1167             | 1090             | 1079             | 960              | 960              |              |              |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 113,55           | 111,87           | 111,96           | 110,34           | 110,53           | 110,24           | 109,97           | 110,48           | 109,70           | 107,22           | 108,90           | 108,57           |              |              |
|                           |  | CI Mean            | [111,86; 115,24] | [110,03; 113,72] | [109,96; 113,96] | [108,32; 112,37] | [108,32; 112,74] | [108,12; 112,36] | [107,64; 112,31] | [108,17; 112,79] | [107,35; 112,05] | [104,90; 109,53] | [106,49; 111,31] | [106,11; 111,04] |              |              |
|                           |  | Median             | 112,62           | 111,30           | 111,40           | 110,06           | 109,99           | 109,52           | 110,95           | 110,22           | 110,72           | 107,35           | 109,05           | 108,87           |              |              |
|                           | GFR normal   | Anzahl             | 1529             | 1307             | 1076             | 1030             | 920              | 940              | 804              | 834              | 780              | 742              | 669              | 658              |              |              |
|                           |  | Anteil in %        | 73,76            | 72,53            | 71,64            | 71,48            | 71,60            | 71,54            | 69,73            | 71,47            | 71,56            | 68,77            | 69,69            | 68,54            |              |              |
|                           |  | CI Anteil in %     | [71,86; 75,65]   | [70,47; 74,59]   | [69,36; 73,92]   | [69,15; 73,81]   | [69,13; 74,06]   | [69,10; 73,98]   | [67,08; 72,38]   | [68,87; 74,06]   | [68,88; 74,24]   | [66,00; 71,53]   | [66,78; 72,60]   | [65,60; 71,48]   |              |              |
|                           | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 392              | 336              | 305              | 291              | 250              | 254              | 233              | 228              | 198              | 230              | 204              | 207              |              |              |
|                           |  | Anteil in %        | 18,91            | 18,65            | 20,31            | 20,19            | 19,46            | 19,33            | 20,21            | 19,54            | 18,17            | 21,32            | 21,25            | 21,56            |              |              |
|                           |  | CI Anteil in %     | [17,22; 20,60]   | [16,85; 20,44]   | [18,27; 22,34]   | [18,12; 22,27]   | [17,29; 21,62]   | [17,19; 21,47]   | [17,89; 22,53]   | [17,26; 21,81]   | [15,88; 20,46]   | [18,87; 23,76]   | [18,66; 23,84]   | [18,96; 24,17]   |              |              |
|                           | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 109              | 116              | 88               | 84               | 78               | 85               | 81               | 73               | 84               | 73               | 67               | 77               |              |              |
|                           |  | Anteil in %        | 5,26             | 6,44             | 5,86             | 5,83             | 6,07             | 6,47             | 7,03             | 6,26             | 7,71             | 6,77             | 6,98             | 8,02             |              |              |
|                           |  | CI Anteil in %     | [4,30; 6,22]     | [5,30; 7,57]     | [4,67; 7,05]     | [4,62; 7,04]     | [4,76; 7,38]     | [5,14; 7,80]     | [5,55; 8,50]     | [4,87; 7,65]     | [6,12; 9,29]     | [5,27; 8,26]     | [5,37; 8,59]     | [6,30; 9,74]     |              |              |
|                           | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 18               | 24               | 18               | 10               | 18               | 15               | 16               | 8                | 8                | 15               | 11               | 8                |              |              |
|                           |  | Anteil in %        | 0,87             | 1,33             | 1,20             | 0,69             | 1,40             | 1,14             | 1,39             | 0,69             | 0,73             | 1,39             | 1,15             | 0,83             |              |              |
|                           |  | CI Anteil in %     | [0,47; 1,27]     | [0,80; 1,86]     | [0,65; 1,75]     | [0,27; 1,12]     | [0,76; 2,04]     | [0,57; 1,72]     | [0,71; 2,06]     | [0,21; 1,16]     | [0,23; 1,24]     | [0,69; 2,09]     | [0,47; 1,82]     | [0,26; 1,41]     |              |              |
|                           | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 25               | 19               | 15               | 26               | 19               | 20               | 19               | 24               | 20               | 9                | 10               |                  |              |              |
|                           |  | Anteil in %        | 1,21             | 1,05             | 1,00             | 1,80             | 1,48             | 1,52             | 1,65             | 2,06             | 1,83             | 1,76             | 0,94             | 1,04             |              |              |
|                           |  | CI Anteil in %     | [0,74; 1,68]     | [0,58; 1,53]     | [0,50; 1,50]     | [1,12; 2,49]     | [0,82; 2,14]     | [0,86; 2,18]     | [0,91; 2,38]     | [1,24; 2,87]     | [1,04; 2,63]     | [0,98; 2,55]     | [0,33; 1,55]     | [0,40; 1,68]     |              |              |
|                           | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 2151             | 1915             | 1729             | 1619             | 1514             | 1441             | 1333             | 1247             | 1194             | 1143             | 1091             | 1037             |              |              |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 1545             | 1337             | 1111             | 1125             | 997              | 1014             | 904              | 903              | 842              | 855              | 763              | 770              |              |              |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 97,41            | 94,38            | 95,24            | 95,17            | 96,11            | 96,05            | 96,56            | 94,57            | 96,89            | 94,74            | 93,30            | 94,16            |              |              |
|                           |  | CI Mean            | [95,42; 99,41]   | [92,36; 96,40]   | [92,97; 97,51]   | [92,75; 97,58]   | [93,53; 98,68]   | [93,47; 98,64]   | [93,81; 99,30]   | [91,95; 97,20]   | [94,06; 99,71]   | [92,04; 97,44]   | [90,64; 95,96]   | [91,36; 96,96]   |              |              |
| Median                    |  | 92,97              | 90,77            | 90,16            | 89,35            | 91,22            | 90,87            | 91,63            | 89,66            | 91,71            | 89,68            | 89,09            | 90,06            |                  |              |              |
| GFR normal                | Anzahl   | 829                | 677              | 556              | 551              | 510              | 519              | 473              | 448              | 441              | 421              | 375              | 385              |                  |              |              |
|                           | Anteil in %  | 53,66              | 50,64            | 50,05            | 48,98            | 51,15            | 51,18            | 52,32            | 49,61            | 52,38            | 49,24            | 49,15            | 50,00            |                  |              |              |
|                           | CI Anteil in %   | [51,17; 56,14]     | [47,95; 53,32]   | [47,10; 52,99]   | [46,06; 51,90]   | [48,05; 54,26]   | [48,11; 54,26]   | [49,07; 55,58]   | [46,35; 52,88]   | [49,00; 55,75]   | [45,89; 52,59]   | [45,60; 52,70]   | [46,47; 53,53]   |                  |              |              |
| GFR leicht pathologisch   | Anzahl   | 493                | 468              | 389              | 386              | 335              | 329              | 289              | 309              | 270              | 290              | 258              | 255              |                  |              |              |
|                           | Anteil in %  | 31,91              | 35,00            | 35,01            | 34,31            | 33,60            | 32,45            | 31,97            | 34,22            | 32,07            | 33,92            | 33,81            | 33,12            |                  |              |              |
|                           | CI Anteil in %   | [29,58; 34,23]     | [32,45; 37,56]   | [32,21; 37,82]   | [31,54; 37,09]   | [30,67; 36,53]   | [29,56; 35,33]   | [28,93; 35,01]   | [31,12; 37,32]   | [28,91; 35,22]   | [30,74; 37,09]   | [30,45; 37,17]   | [29,79; 36,44]   |                  |              |              |
| GFR mäßig pathologisch    | Anzahl   | 189                | 153              | 141              | 160              | 133              | 141              | 123              | 120              | 107              | 123              | 111              | 103              |                  |              |              |
|                           | Anteil in %  | 12,23              | 11,44            | 12,69            | 14,22            | 13,34            | 13,91            | 13,61            | 13,29            | 12,71            | 14,39            | 14,55            | 13,38            |                  |              |              |
|                           | CI Anteil in %   | [10,60; 13,87]     | [9,74; 13,15]    | [10,73; 14,65]   | [12,18; 16,26]   | [11,23; 15,45]   | [11,77; 16,04]   | [11,37; 15,84]   | [11,07; 15,50]   | [10,46; 14,96]   | [12,03; 16,74]   | [12,04; 17,05]   | [10,97; 15,78]   |                  |              |              |
| GFR hoch pathologisch     | Anzahl   | 20                 | 18               | 16               | 14               | 9                | 16               | 14               | 18               | 18               | 12               | 16               |                  |                  |              |              |
|                           | Anteil in %  | 1,29               | 1,35             | 1,44             | 1,24             | 0,90             | 1,58             | 1,55             | 1,99             | 2,14             | 1,75             | 1,57             | 2,08             |                  |              |              |
|                           | CI Anteil in %   | [0,73; 1,86]       | [0,73; 1,96]     | [0,74; 2,14]     | [0,60; 1,89]     | [0,32; 1,49]     | [0,81; 2,35]     | [0,74; 2,35]     | [1,08; 2,91]     | [1,16; 3,12]     | [0,87; 2,63]     | [0,69; 2,46]     | [1,07; 3,09]     |                  |              |              |
| GFR terminal insuffizient | Anzahl   | 14                 | 21               | 9                | 14               | 10               | 9                | 5                | 8                | 6                | 6                | 7                | 11               |                  |              |              |
|                           | Anteil in %  | 0,91               | 1,57             | 0,81             | 1,24             | 1,00             | 0,89             | 0,55             | 0,89             | 0,71             | 0,70             | 0,92             | 1,43             |                  |              |              |
|                           | CI Anteil in %   | [0,43; 1,38]       | [0,90; 2,24]     | [0,28; 1,34]     | [0,60; 1,89]     | [0,38; 1,62]     | [0,31; 1,47]     | [0,07; 1,04]     | [0,27; 1,50]     | [0,14; 1,28]     | [0,14; 1,26]     | [0,24; 1,59]     | [0,59; 2,27]     |                  |              |              |



| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halbjahr     | 11. Halbjahr     | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2007-1   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 6090             | 5508             | 4973             | 4653             | 4423             | 4172             | 3943             | 3762             | 3595             | 3456             | 3318           |              |              |              |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 4483             | 3772             | 3354             | 3134             | 2999             | 2836             | 2772             | 2594             | 2599             | 2443             | 2377           |              |              |              |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 111,60           | 111,01           | 110,60           | 110,47           | 110,57           | 110,14           | 109,00           | 108,70           | 108,71           | 108,07           | 108,22         |              |              |              |
|  |  | CI Mean            | [110,45; 112,74] | [109,76; 112,26] | [109,28; 111,92] | [109,07; 111,87] | [109,19; 111,95] | [108,72; 111,55] | [107,59; 110,41] | [107,22; 110,18] | [107,24; 109,58] | [106,57; 109,77] |                |              |              |              |
|  |  | Median             | 109,96           | 110,14           | 109,47           | 109,41           | 108,80           | 108,84           | 108,14           | 107,59           | 108,54           | 108,28           | 107,21         |              |              |              |
|  | GFR normal   | Anzahl             | 3244             | 2742             | 2412             | 2240             | 2159             | 2034             | 1943             | 1796             | 1789             | 1687             | 1652           |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        | 72,36            | 72,69            | 71,91            | 71,47            | 71,99            | 71,72            | 70,09            | 69,24            | 68,83            | 69,05            | 69,50          |              |              |              |
|  |  | CI Anteil in %     | [71,05; 73,67]   | [71,27; 74,12]   | [70,39; 73,44]   | [69,89; 73,06]   | [70,38; 73,60]   | [70,06; 73,38]   | [68,39; 71,80]   | [67,46; 71,01]   | [67,05; 70,62]   | [67,22; 70,89]   | [67,65; 71,35] |              |              |              |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 921              | 724              | 675              | 627              | 604              | 559              | 602              | 572              | 582              | 526              | 506            |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        | 20,54            | 19,19            | 20,13            | 20,01            | 20,14            | 19,71            | 21,72            | 22,05            | 22,39            | 21,53            | 21,29          |              |              |              |
|  |  | CI Anteil in %     | [19,36; 21,73]   | [17,94; 20,45]   | [18,77; 21,48]   | [18,61; 21,41]   | [18,70; 21,58]   | [18,25; 21,18]   | [20,18; 23,25]   | [20,46; 23,65]   | [20,79; 24,00]   | [19,90; 23,16]   | [19,64; 22,93] |              |              |              |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 242              | 232              | 199              | 197              | 183              | 189              | 169              | 175              | 174              | 176              | 174            |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        | 5,40             | 6,15             | 5,93             | 6,29             | 6,10             | 6,66             | 6,10             | 6,75             | 6,69             | 7,20             | 7,32           |              |              |              |
|  |  | CI Anteil in %     | [4,74; 6,06]     | [5,38; 6,92]     | [5,13; 6,73]     | [5,44; 7,14]     | [5,25; 6,96]     | [5,75; 7,58]     | [5,21; 6,99]     | [5,78; 7,71]     | [5,73; 7,66]     | [6,18; 8,23]     | [6,27; 8,37]   |              |              |              |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 43               | 43               | 44               | 51               | 34               | 38               | 41               | 30               | 37               | 31               | 28             |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        | 0,96             | 1,14             | 1,31             | 1,63             | 1,13             | 1,34             | 1,48             | 1,16             | 1,42             | 1,27             | 1,18           |              |              |              |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,67; 1,24]     | [0,80; 1,48]     | [0,93; 1,70]     | [1,18; 2,07]     | [0,75; 1,51]     | [0,92; 1,76]     | [1,03; 1,93]     | [0,74; 1,57]     | [0,97; 1,88]     | [0,82; 1,71]     | [0,74; 1,61]   |              |              |              |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 33               | 31               | 24               | 19               | 19               | 16               | 17               | 21               | 17               | 23               | 17             |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        | 0,74             | 0,82             | 0,72             | 0,61             | 0,63             | 0,56             | 0,61             | 0,81             | 0,65             | 0,94             | 0,72           |              |              |              |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,49; 0,99]     | [0,53; 1,11]     | [0,43; 1,00]     | [0,33; 0,88]     | [0,35; 0,92]     | [0,29; 0,84]     | [0,32; 0,90]     | [0,46; 1,15]     | [0,34; 0,96]     | [0,56; 1,32]     | [0,38; 1,05]   |              |              |              |
|  | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 4916             | 4513             | 4134             | 3883             | 3662             | 3461             | 3293             | 3142             | 3004             | 2874             | 2757           |              |              |              |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 3601               | 3155             | 2862             | 2604             | 2571             | 2362             | 2366             | 2172             | 2197             | 2043             | 2049             |                |              |              |              |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 96,38              | 97,41            | 95,83            | 94,47            | 94,57            | 94,75            | 94,49            | 92,94            | 93,16            | 93,18            | 93,40            |                |              |              |              |
|  | CI Mean  | [95,07; 97,69]     | [95,99; 98,82]   | [94,36; 97,29]   | [92,96; 95,98]   | [93,11; 96,03]   | [93,21; 96,30]   | [92,97; 96,01]   | [91,36; 94,51]   | [91,56; 94,76]   | [91,53; 94,83]   | [91,76; 95,03]   |                |              |              |              |
|  | Median   | 90,66              | 91,98            | 91,08            | 88,87            | 89,75            | 90,40            | 89,73            | 88,75            | 87,88            | 88,57            | 88,77            |                |              |              |              |
| GFR normal   | Anzahl   | 1828               | 1652             | 1459             | 1260             | 1277             | 1199             | 1177             | 1047             | 1041             | 978              | 994              |                |              |              |              |
|  | Anteil in %  | 50,76              | 52,36            | 50,98            | 48,39            | 49,67            | 50,76            | 49,75            | 48,20            | 47,38            | 47,87            | 48,51            |                |              |              |              |
|  | CI Anteil in %   | [49,13; 52,40]     | [50,62; 54,10]   | [49,15; 52,81]   | [46,47; 50,31]   | [47,74; 51,60]   | [48,75; 52,78]   | [47,73; 51,76]   | [46,10; 50,31]   | [45,29; 49,47]   | [45,70; 50,04]   | [46,35; 50,68]   |                |              |              |              |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 1241               | 1026             | 965              | 910              | 896              | 782              | 800              | 748              | 767              | 712              | 707              |                |              |              |              |
|  | Anteil in %  | 34,46              | 32,52            | 33,72            | 34,95            | 34,85            | 33,11            | 33,81            | 34,44            | 34,91            | 34,85            | 34,50            |                |              |              |              |
|  | CI Anteil in %   | [32,91; 36,02]     | [30,88; 34,15]   | [31,99; 35,45]   | [33,11; 36,78]   | [33,01; 36,69]   | [31,21; 35,01]   | [31,91; 35,72]   | [32,44; 36,44]   | [32,92; 36,91]   | [32,78; 36,92]   | [32,45; 36,56]   |                |              |              |              |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 463                | 411              | 384              | 390              | 350              | 333              | 341              | 334              | 343              | 319              | 308              |                |              |              |              |
|  | Anteil in %  | 12,86              | 13,03            | 13,42            | 14,98            | 13,61            | 14,10            | 14,41            | 15,38            | 15,61            | 15,61            | 15,03            |                |              |              |              |
|  | CI Anteil in %   | [11,76; 13,95]     | [11,85; 14,20]   | [12,17; 14,67]   | [13,61; 16,35]   | [12,29; 14,94]   | [12,69; 15,50]   | [13,00; 15,83]   | [13,86; 16,89]   | [14,09; 17,13]   | [14,04; 17,19]   | [13,48; 16,58]   |                |              |              |              |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 41                 | 47               | 35               | 31               | 34               | 36               | 40               | 28               | 32               | 20               | 28               |                |              |              |              |
|  | Anteil in %  | 1,14               | 1,49             | 1,22             | 1,19             | 1,32             | 1,52             | 1,69             | 1,29             | 1,46             | 0,98             | 1,37             |                |              |              |              |
|  | CI Anteil in %   | [0,79; 1,49]       | [1,07; 1,91]     | [0,82; 1,63]     | [0,77; 1,61]     | [0,88; 1,76]     | [1,03; 2,02]     | [1,17; 2,21]     | [0,81; 1,76]     | [0,96; 1,96]     | [0,55; 1,41]     | [0,86; 1,87]     |                |              |              |              |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 28                 | 19               | 19               | 13               | 14               | 12               | 8                | 15               | 14               | 14               | 12               |                |              |              |              |
|  | Anteil in %  | 0,78               | 0,60             | 0,66             | 0,50             | 0,54             | 0,51             | 0,34             | 0,69             | 0,64             | 0,69             | 0,59             |                |              |              |              |
|  | CI Anteil in %   | [0,49; 1,06]       | [0,33; 0,87]     | [0,37; 0,96]     | [0,23; 0,77]     | [0,26; 0,83]     | [0,22; 0,79]     | [0,10; 0,57]     | [0,34; 1,04]     | [0,30; 0,97]     | [0,33; 1,04]     | [0,26; 0,92]     |                |              |              |              |

| EZ                        | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halb-jahr | 2. Halb-jahr     | 3. Halb-jahr     | 4. Halb-jahr     | 5. Halb-jahr     | 6. Halb-jahr     | 7. Halb-jahr     | 8. Halb-jahr     | 9. Halb-jahr     | 10. Halb-jahr    | 11. Halb-jahr    | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|---------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2007-2                    | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl              | 3831             | 3352             | 3019             | 2744             | 2493             | 2304             | 2170             | 2045             | 1950             | 1862             |               |               |               |               |  |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl              | 2770             | 2369             | 2006             | 1915             | 1690             | 1632             | 1479             | 1497             | 1392             | 1363             |               |               |               |               |  |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                | 112,70           | 111,14           | 111,02           | 110,49           | 110,44           | 110,08           | 109,72           | 109,07           | 109,50           | 109,25           |               |               |               |               |  |
|                           |  | CI Mean             | [111,24; 114,15] | [109,53; 112,76] | [109,26; 112,78] | [108,71; 112,26] | [108,50; 112,37] | [108,18; 111,98] | [107,68; 111,75] | [107,05; 111,08] | [107,42; 111,59] | [107,11; 111,40] |               |               |               |               |  |
|                           |  | Median              | 111,47           | 110,90           | 110,20           | 109,39           | 109,22           | 109,65           | 107,40           | 107,79           | 107,05           | 108,44           |               |               |               |               |  |
|                           | GFR normal   | Anzahl              | 2040             | 1708             | 1436             | 1366             | 1187             | 1148             | 1025             | 1044             | 971              | 938              |               |               |               |               |  |
|                           |  | Anteil in %         | 73,65            | 72,10            | 71,59            | 71,33            | 70,24            | 70,34            | 69,30            | 69,74            | 69,76            | 68,82            |               |               |               |               |  |
|                           |  | CI Anteil in %      | [72,01; 75,29]   | [70,29; 73,90]   | [69,61; 73,56]   | [69,31; 73,36]   | [68,06; 72,42]   | [68,13; 72,56]   | [66,95; 71,66]   | [67,41; 72,07]   | [67,34; 72,17]   | [66,36; 71,28]   |               |               |               |               |  |
|                           | GFR leicht pathologisch  | Anzahl              | 524              | 467              | 390              | 382              | 337              | 331              | 320              | 314              | 301              | 293              |               |               |               |               |  |
|                           |  | Anteil in %         | 18,92            | 19,71            | 19,44            | 19,95            | 19,94            | 20,28            | 21,64            | 20,98            | 21,62            | 21,50            |               |               |               |               |  |
|                           |  | CI Anteil in %      | [17,46; 20,38]   | [18,11; 21,32]   | [17,71; 21,17]   | [18,16; 21,74]   | [18,04; 21,85]   | [18,33; 22,23]   | [19,54; 23,74]   | [18,91; 23,04]   | [19,46; 23,79]   | [19,31; 23,68]   |               |               |               |               |  |
|                           | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl              | 143              | 128              | 130              | 124              | 131              | 125              | 108              | 109              | 90               | 106              |               |               |               |               |  |
|                           |  | Anteil in %         | 5,16             | 5,40             | 6,48             | 6,48             | 7,75             | 7,66             | 7,30             | 7,28             | 6,47             | 7,78             |               |               |               |               |  |
|                           |  | CI Anteil in %      | [4,34; 5,99]     | [4,49; 6,31]     | [5,40; 7,56]     | [5,37; 7,58]     | [6,48; 9,03]     | [6,37; 8,95]     | [5,98; 8,63]     | [5,96; 8,60]     | [5,17; 7,76]     | [6,35; 9,20]     |               |               |               |               |  |
|                           | GFR hoch pathologisch  | Anzahl              | 26               | 26               | 28               | 25               | 23               | 17               | 17               | 18               | 20               | 15               |               |               |               |               |  |
|                           |  | Anteil in %         | 0,94             | 1,10             | 1,40             | 1,31             | 1,36             | 1,04             | 1,15             | 1,20             | 1,44             | 1,10             |               |               |               |               |  |
|                           |  | CI Anteil in %      | [0,58; 1,30]     | [0,68; 1,52]     | [0,88; 1,91]     | [0,80; 1,81]     | [0,81; 1,91]     | [0,55; 1,53]     | [0,61; 1,69]     | [0,65; 1,75]     | [0,81; 2,06]     | [0,55; 1,65]     |               |               |               |               |  |
|                           | GFR terminal insuffizient  | Anzahl              | 37               | 40               | 22               | 18               | 12               | 11               | 9                | 12               | 10               | 11               |               |               |               |               |  |
|                           |  | Anteil in %         | 1,34             | 1,69             | 1,10             | 0,94             | 0,71             | 0,67             | 0,61             | 0,80             | 0,72             | 0,81             |               |               |               |               |  |
|                           |  | CI Anteil in %      | [0,91; 1,76]     | [1,17; 2,21]     | [0,64; 1,55]     | [0,51; 1,37]     | [0,31; 1,11]     | [0,28; 1,07]     | [0,21; 1,01]     | [0,35; 1,25]     | [0,27; 1,16]     | [0,33; 1,28]     |               |               |               |               |  |
|                           | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl              | 2944             | 2632             | 2409             | 2203             | 1998             | 1862             | 1758             | 1670             | 1581             | 1516             |               |               |               |               |  |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl              | 2116             | 1846             | 1611             | 1505             | 1372             | 1340             | 1230             | 1226             | 1140             | 1132             |               |               |               |               |  |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                | 99,18            | 98,04            | 97,39            | 96,42            | 95,42            | 95,95            | 94,49            | 95,31            | 94,67            | 93,85            |               |               |               |               |  |
|                           |  | CI Mean             | [97,41; 100,94]  | [96,17; 99,92]   | [95,48; 99,31]   | [94,33; 98,51]   | [93,34; 97,50]   | [93,89; 98,01]   | [92,31; 96,67]   | [93,17; 97,46]   | [92,44; 96,91]   | [91,66; 96,04]   |               |               |               |               |  |
| Median                    |  | 93,93               | 92,90            | 93,44            | 92,29            | 90,72            | 92,70            | 89,16            | 91,62            | 90,83            | 89,60            |                  |               |               |               |               |  |
| GFR normal                | Anzahl   | 1153                | 986              | 877              | 777              | 696              | 713              | 609              | 638              | 579              | 561              |                  |               |               |               |               |  |
|                           | Anteil in %  | 54,49               | 53,41            | 54,44            | 51,63            | 50,73            | 53,21            | 49,51            | 52,04            | 50,79            | 49,56            |                  |               |               |               |               |  |
|                           | CI Anteil in %   | [52,37; 56,61]      | [51,14; 55,69]   | [52,01; 56,87]   | [49,10; 54,15]   | [48,08; 53,38]   | [50,54; 55,88]   | [46,72; 52,31]   | [49,24; 54,84]   | [47,89; 53,69]   | [46,64; 52,47]   |                  |               |               |               |               |  |
| GFR leicht pathologisch   | Anzahl   | 653                 | 582              | 473              | 483              | 440              | 413              | 416              | 380              | 361              | 366              |                  |               |               |               |               |  |
|                           | Anteil in %  | 30,86               | 31,53            | 29,36            | 32,09            | 32,07            | 30,82            | 33,82            | 31,00            | 31,67            | 32,33            |                  |               |               |               |               |  |
|                           | CI Anteil in %   | [28,89; 32,83]      | [29,41; 33,65]   | [27,14; 31,59]   | [29,73; 34,45]   | [29,60; 34,54]   | [28,35; 33,29]   | [31,18; 36,47]   | [28,41; 33,58]   | [28,97; 34,37]   | [29,61; 35,06]   |                  |               |               |               |               |  |
| GFR mäßig pathologisch    | Anzahl   | 263                 | 230              | 228              | 212              | 208              | 192              | 180              | 187              | 183              | 189              |                  |               |               |               |               |  |
|                           | Anteil in %  | 12,43               | 12,46            | 14,15            | 14,09            | 15,16            | 14,33            | 14,63            | 15,25            | 16,05            | 16,70            |                  |               |               |               |               |  |
|                           | CI Anteil in %   | [11,02; 13,84]      | [10,95; 13,97]   | [12,45; 15,86]   | [12,33; 15,84]   | [13,26; 17,06]   | [12,45; 16,21]   | [12,66; 16,61]   | [13,24; 17,27]   | [13,92; 18,18]   | [14,52; 18,87]   |                  |               |               |               |               |  |
| GFR hoch pathologisch     | Anzahl   | 30                  | 27               | 21               | 16               | 17               | 13               | 17               | 17               | 13               | 12               |                  |               |               |               |               |  |
|                           | Anteil in %  | 1,42                | 1,46             | 1,30             | 1,06             | 1,24             | 0,97             | 1,38             | 1,39             | 1,14             | 1,06             |                  |               |               |               |               |  |
|                           | CI Anteil in %   | [0,91; 1,92]        | [0,91; 2,01]     | [0,75; 1,86]     | [0,54; 1,58]     | [0,65; 1,82]     | [0,45; 1,50]     | [0,73; 2,03]     | [0,73; 2,04]     | [0,52; 1,76]     | [0,46; 1,66]     |                  |               |               |               |               |  |
| GFR terminal insuffizient | Anzahl   | 17                  | 21               | 12               | 17               | 11               | 9                | 8                | 4                | 4                | 4                |                  |               |               |               |               |  |
|                           | Anteil in %  | 0,80                | 1,14             | 0,74             | 1,13             | 0,80             | 0,67             | 0,65             | 0,33             | 0,35             | 0,35             |                  |               |               |               |               |  |
|                           | CI Anteil in %   | [0,42; 1,18]        | [0,65; 1,62]     | [0,32; 1,16]     | [0,60; 1,66]     | [0,33; 1,27]     | [0,23; 1,11]     | [0,20; 1,10]     | [0,01; 0,65]     | [0,01; 0,69]     | [0,01; 0,70]     |                  |               |               |               |               |  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halb-jahr    | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2008-1   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 3801             | 3327             | 2978             | 2612             | 2374             | 2200             | 2035             | 1923             | 1841             |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 2731             | 2279             | 1969             | 1686             | 1630             | 1473             | 1431             | 1317             | 1335             |               |               |               |               |               |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 116,62           | 115,68           | 115,62           | 114,98           | 114,07           | 113,39           | 111,29           | 112,35           | 111,75           |               |               |               |               |               |
|  |  | CI Mean            | [115,03; 118,21] | [114,02; 117,34] | [113,83; 117,42] | [112,98; 116,98] | [112,12; 116,03] | [111,31; 115,48] | [109,26; 113,32] | [110,18; 114,53] | [109,60; 113,91] |               |               |               |               |               |
|  |  | Median             | 114,32           | 113,74           | 113,41           | 113,83           | 112,67           | 111,84           | 109,76           | 110,98           | 112,40           |               |               |               |               |               |
|  | GFR normal   | Anzahl             | 2062             | 1736             | 1488             | 1243             | 1178             | 1065             | 1029             | 944              | 960              |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        | 75,50            | 76,17            | 75,57            | 73,72            | 72,27            | 72,30            | 71,91            | 71,68            | 71,91            |               |               |               |               |               |
|  |  | CI Anteil in %     | [73,89; 77,12]   | [74,42; 77,92]   | [73,67; 77,47]   | [71,62; 75,83]   | [70,10; 74,44]   | [70,02; 74,59]   | [69,58; 74,24]   | [69,24; 74,11]   | [69,50; 74,32]   |               |               |               |               |               |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 476              | 378              | 335              | 304              | 319              | 283              | 284              | 255              | 247              |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        | 17,43            | 16,59            | 17,01            | 18,03            | 19,57            | 19,21            | 19,85            | 19,36            | 18,50            |               |               |               |               |               |
|  |  | CI Anteil in %     | [16,01; 18,85]   | [15,06; 18,11]   | [15,35; 18,67]   | [16,20; 19,87]   | [17,64; 21,50]   | [17,20; 21,23]   | [17,78; 21,91]   | [17,23; 21,50]   | [16,42; 20,59]   |               |               |               |               |               |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 151              | 130              | 114              | 104              | 102              | 90               | 86               | 91               | 96               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        | 5,53             | 5,70             | 5,79             | 6,17             | 6,26             | 6,11             | 6,01             | 6,91             | 7,19             |               |               |               |               |               |
|  |  | CI Anteil in %     | [4,67; 6,39]     | [4,75; 6,66]     | [4,76; 6,82]     | [5,02; 7,32]     | [5,08; 7,43]     | [4,89; 7,33]     | [4,78; 7,24]     | [5,54; 8,28]     | [5,80; 8,58]     |               |               |               |               |               |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 24               | 23               | 17               | 26               | 14               | 21               | 21               | 18               | 18               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        | 0,88             | 1,01             | 0,86             | 1,54             | 0,86             | 1,43             | 1,47             | 1,37             | 1,35             |               |               |               |               |               |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,53; 1,23]     | [0,60; 1,42]     | [0,45; 1,27]     | [0,95; 2,13]     | [0,41; 1,31]     | [0,82; 2,03]     | [0,84; 2,09]     | [0,74; 1,99]     | [0,73; 1,97]     |               |               |               |               |               |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 18               | 12               | 15               | 9                | 17               | 14               | 11               | 9                | 14               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        | 0,66             | 0,53             | 0,76             | 0,53             | 1,04             | 0,95             | 0,77             | 0,68             | 1,05             |               |               |               |               |               |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,36; 0,96]     | [0,23; 0,82]     | [0,38; 1,15]     | [0,19; 0,88]     | [0,55; 1,54]     | [0,45; 1,45]     | [0,32; 1,22]     | [0,24; 1,13]     | [0,50; 1,60]     |               |               |               |               |               |
|  | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 2805             | 2533             | 2275             | 2042             | 1868             | 1733             | 1616             | 1535             | 1460             |               |               |               |               |               |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1974               | 1730             | 1496             | 1341             | 1282             | 1178             | 1144             | 1038             | 1041             |                  |               |               |               |               |               |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 100,58             | 100,10           | 98,04            | 98,74            | 97,03            | 96,16            | 95,87            | 96,80            | 95,37            |                  |               |               |               |               |               |
|  | CI Mean  | [98,73; 102,43]    | [98,10; 102,09]  | [95,98; 100,09]  | [96,58; 100,89]  | [94,80; 99,27]   | [93,89; 98,42]   | [93,56; 98,18]   | [94,34; 99,25]   | [92,95; 97,79]   |                  |               |               |               |               |               |
|  | Median   | 96,34              | 95,30            | 92,89            | 94,63            | 92,49            | 91,49            | 91,25            | 93,29            | 91,61            |                  |               |               |               |               |               |
| GFR normal   | Anzahl   | 1109               | 967              | 801              | 738              | 683              | 611              | 582              | 550              | 536              |                  |               |               |               |               |               |
|  | Anteil in %  | 56,18              | 55,90            | 53,54            | 55,03            | 53,28            | 51,87            | 50,87            | 52,99            | 51,49            |                  |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %   | [53,99; 58,37]     | [53,56; 58,24]   | [51,01; 56,07]   | [52,37; 57,70]   | [50,54; 56,01]   | [49,01; 54,72]   | [47,98; 53,77]   | [49,95; 56,02]   | [48,45; 54,53]   |                  |               |               |               |               |               |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 580                | 520              | 470              | 407              | 407              | 386              | 379              | 320              | 322              |                  |               |               |               |               |               |
|  | Anteil in %  | 29,38              | 30,06            | 31,42            | 30,35            | 31,75            | 32,77            | 33,13            | 30,83            | 30,93            |                  |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %   | [27,37; 31,39]     | [27,90; 32,22]   | [29,06; 33,77]   | [27,89; 32,81]   | [29,20; 34,30]   | [30,09; 35,45]   | [30,40; 35,86]   | [28,02; 33,64]   | [28,12; 33,74]   |                  |               |               |               |               |               |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 248                | 200              | 189              | 165              | 157              | 153              | 156              | 146              | 155              |                  |               |               |               |               |               |
|  | Anteil in %  | 12,56              | 11,56            | 12,63            | 12,30            | 12,25            | 12,99            | 13,64            | 14,07            | 14,89            |                  |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %   | [11,10; 14,03]     | [10,05; 13,07]   | [10,95; 14,32]   | [10,55; 14,06]   | [10,45; 14,04]   | [11,07; 14,91]   | [11,65; 15,63]   | [11,95; 16,18]   | [12,73; 17,05]   |                  |               |               |               |               |               |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 21                 | 27               | 24               | 20               | 18               | 15               | 16               | 13               | 20               |                  |               |               |               |               |               |
|  | Anteil in %  | 1,06               | 1,56             | 1,60             | 1,49             | 1,40             | 1,27             | 1,40             | 1,25             | 1,92             |                  |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %   | [0,61; 1,52]       | [0,98; 2,14]     | [0,97; 2,24]     | [0,84; 2,14]     | [0,76; 2,05]     | [0,63; 1,91]     | [0,72; 2,08]     | [0,58; 1,93]     | [1,09; 2,76]     |                  |               |               |               |               |               |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 16                 | 16               | 12               | 11               | 17               | 13               | 11               | 9                | 8                |                  |               |               |               |               |               |
|  | Anteil in %  | 0,81               | 0,92             | 0,80             | 0,82             | 1,33             | 1,10             | 0,96             | 0,87             | 0,77             |                  |               |               |               |               |               |
|  | CI Anteil in %   | [0,41; 1,21]       | [0,47; 1,38]     | [0,35; 1,25]     | [0,34; 1,30]     | [0,70; 1,95]     | [0,51; 1,70]     | [0,40; 1,53]     | [0,30; 1,43]     | [0,24; 1,30]     |                  |               |               |               |               |               |

| EZ                        | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halbjahr | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |  |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 2008-2                    | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 2583             | 2211             | 1898             | 1677             | 1530             | 1414             | 1323             | 1240             |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 1812             | 1537             | 1237             | 1137             | 1022             | 954              | 892              | 894              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 117,05           | 116,07           | 114,50           | 114,57           | 113,70           | 112,71           | 112,75           | 112,48           |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | CI Mean            | [115,25; 118,86] | [114,06; 118,08] | [112,35; 116,65] | [112,24; 116,89] | [111,39; 116,01] | [110,12; 115,30] | [110,10; 115,40] | [109,76; 115,19] |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | Median             | 115,04           | 114,94           | 113,70           | 113,77           | 112,17           | 109,50           | 111,54           | 110,16           |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | GFR normal   | Anzahl             | 1418             | 1180             | 921              | 848              | 770              | 697              | 655              | 645              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | Anteil in %        | 78,26            | 76,77            | 74,45            | 74,58            | 75,34            | 73,06            | 73,43            | 72,15            |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | CI Anteil in %     | [76,36; 80,16]   | [74,66; 78,88]   | [72,02; 76,89]   | [72,05; 77,11]   | [72,70; 77,99]   | [70,24; 75,88]   | [70,53; 76,33]   | [69,21; 75,09]   |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 275              | 240              | 230              | 187              | 173              | 183              | 161              | 173              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | Anteil in %        | 15,18            | 15,61            | 18,59            | 16,45            | 16,93            | 19,18            | 18,05            | 19,35            |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | CI Anteil in %     | [13,52; 16,83]   | [13,80; 17,43]   | [16,42; 20,76]   | [14,29; 18,60]   | [14,63; 19,23]   | [16,68; 21,68]   | [15,52; 20,57]   | [16,76; 21,94]   |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 89               | 85               | 62               | 84               | 61               | 57               | 58               | 59               |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | Anteil in %        | 4,91             | 5,53             | 5,01             | 7,39             | 5,97             | 5,97             | 6,50             | 6,60             |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | CI Anteil in %     | [3,92; 5,91]     | [4,39; 6,67]     | [3,80; 6,23]     | [5,87; 8,91]     | [4,52; 7,42]     | [4,47; 7,48]     | [4,88; 8,12]     | [4,97; 8,23]     |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 22               | 26               | 16               | 13               | 12               | 11               | 11               | 13               |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | Anteil in %        | 1,21             | 1,69             | 1,29             | 1,14             | 1,17             | 1,15             | 1,23             | 1,45             |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | CI Anteil in %     | [0,71; 1,72]     | [1,05; 2,34]     | [0,66; 1,92]     | [0,53; 1,76]     | [0,51; 1,83]     | [0,48; 1,83]     | [0,51; 1,96]     | [0,67; 2,24]     |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 8                | 6                | 8                | 5                | 6                | 6                | 7                | 4                |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | Anteil in %        | 0,44             | 0,39             | 0,65             | 0,44             | 0,59             | 0,63             | 0,78             | 0,45             |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | CI Anteil in %     | [0,14; 0,75]     | [0,08; 0,70]     | [0,20; 1,09]     | [0,05; 0,82]     | [0,12; 1,06]     | [0,13; 1,13]     | [0,21; 1,36]     | [0,01; 0,89]     |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 1849             | 1617             | 1409             | 1246             | 1130             | 1052             | 987              | 938              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 1241             | 1109             | 925              | 836              | 754              | 735              | 681              | 689              |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 104,51           | 102,05           | 102,70           | 101,20           | 100,66           | 100,57           | 100,15           | 101,02           |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           |  | CI Mean            | [102,06; 106,95] | [99,52; 104,58]  | [99,94; 105,46]  | [98,35; 104,06]  | [97,79; 103,53]  | [97,58; 103,56]  | [96,99; 103,30]  | [97,80; 104,24]  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| Median                    |  | 98,82              | 96,69            | 96,01            | 94,50            | 95,74            | 95,16            | 94,63            | 95,23            |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| GFR normal                | Anzahl   | 745                | 642              | 538              | 468              | 426              | 405              | 369              | 389              |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | Anteil in %  | 60,03              | 57,89            | 58,16            | 55,98            | 56,50            | 55,10            | 54,19            | 56,46            |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | CI Anteil in %   | [57,31; 62,76]     | [54,98; 60,80]   | [54,98; 61,34]   | [52,61; 59,35]   | [52,96; 60,04]   | [51,50; 58,70]   | [50,44; 57,93]   | [52,75; 60,16]   |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| GFR leicht pathologisch   | Anzahl   | 341                | 319              | 268              | 253              | 224              | 228              | 209              | 195              |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | Anteil in %  | 27,48              | 28,76            | 28,97            | 30,26            | 29,71            | 31,02            | 30,69            | 28,30            |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | CI Anteil in %   | [24,99; 29,96]     | [26,10; 31,43]   | [26,05; 31,90]   | [27,15; 33,38]   | [26,44; 32,97]   | [27,67; 34,37]   | [27,22; 34,16]   | [24,94; 31,67]   |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| GFR mäßig pathologisch    | Anzahl   | 138                | 121              | 97               | 100              | 85               | 84               | 89               | 89               |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | Anteil in %  | 11,12              | 10,91            | 10,49            | 11,96            | 11,27            | 11,43            | 13,07            | 12,92            |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | CI Anteil in %   | [9,37; 12,87]      | [9,07; 12,75]    | [8,51; 12,46]    | [9,76; 14,16]    | [9,01; 13,53]    | [9,13; 13,73]    | [10,54; 15,60]   | [10,41; 15,42]   |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| GFR hoch pathologisch     | Anzahl   | 9                  | 18               | 13               | 9                | 13               | 14               | 9                | 11               |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | Anteil in %  | 0,73               | 1,62             | 1,41             | 1,08             | 1,72             | 1,90             | 1,32             | 1,60             |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | CI Anteil in %   | [0,25; 1,20]       | [0,88; 2,37]     | [0,65; 2,16]     | [0,38; 1,78]     | [0,79; 2,65]     | [0,92; 2,89]     | [0,46; 2,18]     | [0,66; 2,53]     |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
| GFR terminal insuffizient | Anzahl   | 8                  | 9                | 9                | 6                | 6                | 4                | 5                | 5                |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | Anteil in %  | 0,64               | 0,81             | 0,97             | 0,72             | 0,80             | 0,54             | 0,73             | 0,73             |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |
|                           | CI Anteil in %   | [0,20; 1,09]       | [0,28; 1,34]     | [0,34; 1,61]     | [0,15; 1,29]     | [0,16; 1,43]     | [0,01; 1,08]     | [0,09; 1,38]     | [0,09; 1,36]     |                  |              |              |              |              |              |              |  |  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |  |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2009-1   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 2879             | 2469             | 2119             | 1871             | 1720             | 1590             | 1479             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 1935             | 1652             | 1429             | 1254             | 1206             | 1091             | 1063             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 116,33           | 116,75           | 116,60           | 115,85           | 114,13           | 114,87           | 114,27           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | CI Mean            | [114,51; 118,15] | [114,77; 118,72] | [114,43; 118,76] | [113,57; 118,13] | [111,87; 116,40] | [112,45; 117,30] | [111,76; 116,77] |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | Median             | 115,91           | 116,54           | 115,21           | 115,55           | 112,27           | 114,13           | 111,11           |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | GFR normal   | Anzahl             | 1475             | 1241             | 1090             | 943              | 902              | 812              | 794              |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | Anteil in %        | 76,23            | 75,12            | 76,28            | 75,20            | 74,79            | 74,43            | 74,69            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [74,33; 78,12]   | [73,04; 77,21]   | [74,07; 78,48]   | [72,81; 77,59]   | [72,34; 77,24]   | [71,84; 77,02]   | [72,08; 77,31]   |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 318              | 290              | 234              | 217              | 212              | 193              | 193              |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | Anteil in %        | 16,43            | 17,55            | 16,38            | 17,30            | 17,58            | 17,69            | 18,16            |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [14,78; 18,09]   | [15,72; 19,39]   | [14,46; 18,29]   | [15,21; 19,40]   | [15,43; 19,73]   | [15,42; 19,96]   | [15,84; 20,47]   |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 99               | 88               | 72               | 67               | 67               | 57               | 52               |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | Anteil in %        | 5,12             | 5,33             | 5,04             | 5,34             | 5,56             | 5,22             | 4,89             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [4,13; 6,10]     | [4,24; 6,41]     | [3,90; 6,17]     | [4,10; 6,59]     | [4,26; 6,85]     | [3,90; 6,55]     | [3,59; 6,19]     |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 25               | 18               | 18               | 13               | 13               | 14               | 14               |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | Anteil in %        | 1,29             | 1,09             | 1,26             | 1,04             | 1,08             | 1,28             | 1,32             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,79; 1,80]     | [0,59; 1,59]     | [0,68; 1,84]     | [0,48; 1,60]     | [0,49; 1,66]     | [0,62; 1,95]     | [0,63; 2,00]     |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 18               | 15               | 15               | 14               | 12               | 15               | 10               |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | Anteil in %        | 0,93             | 0,91             | 1,05             | 1,12             | 1,00             | 1,37             | 0,94             |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,50; 1,36]     | [0,45; 1,37]     | [0,52; 1,58]     | [0,53; 1,70]     | [0,43; 1,56]     | [0,68; 2,07]     | [0,36; 1,52]     |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                   | Anzahl   | 2092               | 1773             | 1540             | 1383             | 1272             | 1168             | 1085             |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1410               | 1245             | 1053             | 910              | 898              | 807              | 767              |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 104,87             | 103,83           | 103,16           | 100,71           | 102,24           | 100,35           | 99,73            |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | CI Mean  | [102,57; 107,17]   | [101,38; 106,28] | [100,56; 105,76] | [98,06; 103,36]  | [99,55; 104,93]  | [97,47; 103,22]  | [96,84; 102,63]  |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | Median   | 99,62              | 98,46            | 98,63            | 97,27            | 98,71            | 95,91            | 97,32            |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| GFR normal   | Anzahl   | 869                | 729              | 641              | 518              | 528              | 459              | 433              |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | Anteil in %  | 61,63              | 58,55            | 60,87            | 56,92            | 58,80            | 56,88            | 56,45            |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | CI Anteil in %   | [59,09; 64,17]     | [55,82; 61,29]   | [57,92; 63,82]   | [53,70; 60,14]   | [55,58; 62,02]   | [53,46; 60,30]   | [52,94; 59,96]   |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 359                | 344              | 266              | 251              | 246              | 230              | 213              |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | Anteil in %  | 25,46              | 27,63            | 25,26            | 27,58            | 27,39            | 28,50            | 27,77            |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | CI Anteil in %   | [23,19; 27,74]     | [25,15; 30,12]   | [22,64; 27,89]   | [24,68; 30,49]   | [24,48; 30,31]   | [25,38; 31,62]   | [24,60; 30,94]   |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 149                | 154              | 127              | 125              | 110              | 98               | 104              |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | Anteil in %  | 10,57              | 12,37            | 12,06            | 13,74            | 12,25            | 12,14            | 13,56            |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | CI Anteil in %   | [8,96; 12,17]      | [10,54; 14,20]   | [10,09; 14,03]   | [11,50; 15,97]   | [10,10; 14,40]   | [9,89; 14,40]    | [11,13; 15,98]   |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 22                 | 10               | 11               | 11               | 11               | 13               | 9                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | Anteil in %  | 1,56               | 0,80             | 1,04             | 1,21             | 1,22             | 1,61             | 1,17             |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,91; 2,21]       | [0,31; 1,30]     | [0,43; 1,66]     | [0,50; 1,92]     | [0,51; 1,94]     | [0,74; 2,48]     | [0,41; 1,94]     |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 11                 | 8                | 8                | 5                | 3                | 7                | 8                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | Anteil in %  | 0,78               | 0,64             | 0,76             | 0,55             | 0,33             | 0,87             | 1,04             |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,32; 1,24]       | [0,20; 1,09]     | [0,24; 1,28]     | [0,07; 1,03]     | [0,00; 0,71]     | [0,23; 1,51]     | [0,32; 1,76]     |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-2   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl                 | 2435             | 2039             | 1736             | 1519             | 1384             | 1290             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl                 | 1623             | 1430             | 1137             | 1074             | 941              | 914              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                   | 119,19           | 117,02           | 115,49           | 114,68           | 114,26           | 114,74           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Mean                | [117,15; 121,22] | [114,93; 119,11] | [113,24; 117,74] | [112,25; 117,11] | [111,70; 116,81] | [112,07; 117,41] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Median                 | 116,90           | 115,33           | 113,54           | 111,96           | 111,75           | 111,68           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR normal   | Anzahl                 | 1267             | 1094             | 862              | 805              | 689              | 678              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 78,07            | 76,50            | 75,81            | 74,95            | 73,22            | 74,18            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [76,05; 80,08]   | [74,31; 78,70]   | [73,32; 78,30]   | [72,36; 77,55]   | [70,39; 76,05]   | [71,34; 77,02]   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl                 | 255              | 243              | 205              | 200              | 185              | 170              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 15,71            | 16,99            | 18,03            | 18,62            | 19,66            | 18,60            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [13,94; 17,48]   | [15,05; 18,94]   | [15,79; 20,27]   | [16,29; 20,95]   | [17,12; 22,20]   | [16,08; 21,12]   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl                 | 86               | 68               | 50               | 54               | 55               | 54               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 5,30             | 4,76             | 4,40             | 5,03             | 5,84             | 5,91             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [4,21; 6,39]     | [3,65; 5,86]     | [3,21; 5,59]     | [3,72; 6,34]     | [4,35; 7,34]     | [4,38; 7,44]     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl                 | 7                | 10               | 11               | 6                | 4                | 5                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,43             | 0,70             | 0,97             | 0,56             | 0,43             | 0,55             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,11; 0,75]     | [0,27; 1,13]     | [0,40; 1,54]     | [0,11; 1,00]     | [0,01; 0,84]     | [0,07; 1,03]     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl                 | 8                | 15               | 9                | 8                | 7                |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,49             | 1,05             | 0,79             | 0,84             | 0,85             | 0,77             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,15; 0,83]     | [0,52; 1,58]     | [0,28; 1,31]     | [0,29; 1,38]     | [0,26; 1,44]     | [0,20; 1,33]     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl                 | 1814             | 1559             | 1373             | 1232             | 1122             | 1055             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1228                   | 1108             | 928              | 892              | 781              | 774              |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 105,73                 | 105,61           | 104,31           | 103,18           | 103,80           | 104,26           |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Mean  | [103,29; 108,16]       | [103,07; 108,15] | [101,56; 107,07] | [100,36; 106,01] | [100,77; 106,83] | [101,19; 107,32] |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Median   | 99,91                  | 99,19            | 99,93            | 99,00            | 97,83            | 98,45            |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR normal   | Anzahl   | 752                    | 672              | 549              | 512              | 461              | 456              |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 61,24                  | 60,65            | 59,16            | 57,40            | 59,03            | 58,91            |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [58,51; 63,96]         | [57,77; 63,53]   | [56,00; 62,32]   | [54,15; 60,65]   | [55,58; 62,48]   | [55,45; 62,38]   |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 339                    | 309              | 265              | 273              | 223              | 222              |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 27,61                  | 27,89            | 28,56            | 30,61            | 28,55            | 28,68            |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [25,10; 30,11]         | [25,25; 30,53]   | [25,65; 31,46]   | [27,58; 33,63]   | [25,38; 31,72]   | [25,49; 31,87]   |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 114                    | 108              | 98               | 87               | 84               | 82               |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 9,28                   | 9,75             | 10,56            | 9,75             | 10,76            | 10,59            |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [7,66; 10,91]          | [8,00; 11,49]    | [8,58; 12,54]    | [7,81; 11,70]    | [8,58; 12,93]    | [8,42; 12,76]    |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 14                     | 10               | 10               | 15               | 8                | 12               |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 1,14                   | 0,90             | 1,08             | 1,68             | 1,02             | 1,55             |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,55; 1,73]           | [0,35; 1,46]     | [0,41; 1,74]     | [0,84; 2,53]     | [0,32; 1,73]     | [0,68; 2,42]     |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 9                      | 9                | 6                | 5                | 5                | 2                |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 0,73                   | 0,81             | 0,65             | 0,56             | 0,64             | 0,26             |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,26; 1,21]           | [0,28; 1,34]     | [0,13; 1,16]     | [0,07; 1,05]     | [0,08; 1,20]     | [0,00; 0,62]     |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2010-1   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl             | 2744             | 2296             | 1985             | 1768             | 1620             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl             | 1903             | 1673             | 1430             | 1250             | 1216             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean               | 120,54           | 118,58           | 118,06           | 117,46           | 117,46           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI Mean            | [118,62; 122,46] | [116,67; 120,50] | [115,98; 120,15] | [115,32; 119,61] | [115,23; 119,68] |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Median             | 118,29           | 117,54           | 117,27           | 116,82           | 116,37           |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | GFR normal   | Anzahl             | 1498             | 1324             | 1109             | 970              | 931              |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        | 78,72            | 79,14            | 77,55            | 77,60            | 76,56            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [76,88; 80,56]   | [77,19; 81,09]   | [75,39; 79,72]   | [75,29; 79,91]   | [74,18; 78,94]   |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl             | 297              | 243              | 232              | 202              | 202              |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        | 15,61            | 14,52            | 16,22            | 16,16            | 16,61            |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [13,98; 17,24]   | [12,84; 16,21]   | [14,31; 18,14]   | [14,12; 18,20]   | [14,52; 18,70]   |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl             | 80               | 82               | 70               | 62               | 64               |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        | 4,20             | 4,90             | 4,90             | 4,96             | 5,26             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [3,30; 5,11]     | [3,87; 5,94]     | [3,78; 6,01]     | [3,76; 6,16]     | [4,01; 6,52]     |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl             | 16               | 11               | 15               | 11               | 13               |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        | 0,84             | 0,66             | 1,05             | 0,88             | 1,07             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,43; 1,25]     | [0,27; 1,04]     | [0,52; 1,58]     | [0,36; 1,40]     | [0,49; 1,65]     |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl             | 12               | 13               | 4                | 5                | 6                |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        | 0,63             | 0,78             | 0,28             | 0,40             | 0,49             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI Anteil in %     | [0,27; 0,99]     | [0,36; 1,20]     | [0,01; 0,55]     | [0,05; 0,75]     | [0,10; 0,89]     |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                   | Anzahl   | 1915               | 1622             | 1389             | 1250             | 1143             |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1284               | 1138             | 956              | 870              | 817              |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 106,05             | 106,12           | 104,00           | 103,06           | 102,97           |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI Mean  | [103,69; 108,42]   | [103,69; 108,55] | [101,29; 106,70] | [100,28; 105,85] | [100,16; 105,78] |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Median   | 101,09             | 100,90           | 98,14            | 98,57            | 98,39            |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| GFR normal   | Anzahl   | 806                | 712              | 561              | 504              | 484              |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Anteil in %  | 62,77              | 62,57            | 58,68            | 57,93            | 59,24            |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI Anteil in %   | [60,13; 65,42]     | [59,75; 65,38]   | [55,56; 61,81]   | [54,65; 61,21]   | [55,87; 62,61]   |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 325                | 299              | 283              | 256              | 236              |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Anteil in %  | 25,31              | 26,27            | 29,60            | 29,43            | 28,89            |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI Anteil in %   | [22,93; 27,69]     | [23,72; 28,83]   | [26,71; 32,50]   | [26,40; 32,46]   | [25,78; 32,00]   |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 125                | 104              | 95               | 89               | 81               |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Anteil in %  | 9,74               | 9,14             | 9,94             | 10,23            | 9,91             |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI Anteil in %   | [8,11; 11,36]      | [7,46; 10,81]    | [8,04; 11,83]    | [8,22; 12,24]    | [7,86; 11,96]    |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 19                 | 13               | 11               | 12               | 10               |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Anteil in %  | 1,48               | 1,14             | 1,15             | 1,38             | 1,22             |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,82; 2,14]       | [0,52; 1,76]     | [0,47; 1,83]     | [0,60; 2,15]     | [0,47; 1,98]     |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 9                  | 10               | 6                | 9                | 6                |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Anteil in %  | 0,70               | 0,88             | 0,63             | 1,03             | 0,73             |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,24; 1,16]       | [0,34; 1,42]     | [0,13; 1,13]     | [0,36; 1,71]     | [0,15; 1,32]     |                  |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl                 | 2745             | 2321             | 1986             | 1790             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl                 | 1867             | 1674             | 1345             | 1272             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                   | 119,34           | 117,38           | 118,00           | 116,72           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Mean                | [117,45; 121,23] | [115,45; 119,31] | [115,72; 120,29] | [114,46; 118,98] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Median                 | 116,62           | 115,01           | 115,00           | 113,96           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR normal   | Anzahl                 | 1463             | 1286             | 1036             | 960              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 78,36            | 76,82            | 77,03            | 75,47            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [76,49; 80,23]   | [74,80; 78,84]   | [74,78; 79,28]   | [73,11; 77,84]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl                 | 299              | 279              | 223              | 230              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 16,01            | 16,67            | 16,58            | 18,08            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [14,35; 17,68]   | [14,88; 18,45]   | [14,59; 18,57]   | [15,97; 20,20]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl                 | 81               | 88               | 63               | 58               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 4,34             | 5,26             | 4,68             | 4,56             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [3,41; 5,26]     | [4,19; 6,33]     | [3,55; 5,81]     | [3,41; 5,71]     |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl                 | 11               | 12               | 11               | 12               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,59             | 0,72             | 0,82             | 0,94             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,24; 0,94]     | [0,31; 1,12]     | [0,34; 1,30]     | [0,41; 1,47]     |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl                 | 13               | 9                | 12               | 12               |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,70             | 0,54             | 0,89             | 0,94             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,32; 1,07]     | [0,19; 0,89]     | [0,39; 1,39]     | [0,41; 1,47]     |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                   | Anzahl   | 2012                   | 1752             | 1532             | 1368             |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1347                   | 1270             | 1048             | 992              |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 105,46                 | 105,13           | 103,15           | 102,15           |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Mean  | [103,06; 107,86]       | [102,76; 107,49] | [100,67; 105,62] | [99,57; 104,73]  |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Median   | 99,74                  | 100,04           | 99,31            | 97,83            |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR normal   | Anzahl   | 807                    | 766              | 635              | 573              |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 59,91                  | 60,31            | 60,59            | 57,76            |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [57,29; 62,53]         | [57,62; 63,01]   | [57,63; 63,55]   | [54,69; 60,84]   |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 378                    | 356              | 288              | 290              |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 28,06                  | 28,03            | 27,48            | 29,23            |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [25,66; 30,46]         | [25,56; 30,50]   | [24,78; 30,19]   | [26,40; 32,07]   |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 132                    | 123              | 104              | 101              |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 9,80                   | 9,69             | 9,92             | 10,18            |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [8,21; 11,39]          | [8,06; 11,31]    | [8,11; 11,73]    | [8,30; 12,06]    |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 21                     | 17               | 15               | 20               |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 1,56                   | 1,34             | 1,43             | 2,02             |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,90; 2,22]           | [0,71; 1,97]     | [0,71; 2,15]     | [1,14; 2,89]     |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 9                      | 8                | 6                | 8                |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 0,67                   | 0,63             | 0,57             | 0,81             |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,23; 1,10]           | [0,19; 1,07]     | [0,12; 1,03]     | [0,25; 1,36]     |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl                 | 2860             | 2410             | 2033             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl                 | 1946             | 1708             | 1434             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                   | 119,96           | 120,25           | 119,17           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Mean                | [118,10; 121,82] | [118,34; 122,16] | [117,06; 121,27] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Median                 | 117,27           | 118,77           | 116,92           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR normal   | Anzahl                 | 1522             | 1348             | 1116             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 78,21            | 78,92            | 77,82            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [76,38; 80,05]   | [76,99; 80,86]   | [75,67; 79,98]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl                 | 316              | 269              | 235              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 16,24            | 15,75            | 16,39            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [14,60; 17,88]   | [14,02; 17,48]   | [14,47; 18,30]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl                 | 81               | 74               | 68               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 4,16             | 4,33             | 4,74             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [3,27; 5,05]     | [3,37; 5,30]     | [3,64; 5,84]     |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl                 | 14               | 11               | 10               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,72             | 0,64             | 0,70             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,34; 1,10]     | [0,26; 1,02]     | [0,27; 1,13]     |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl                 | 13               | 6                | 5                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,67             | 0,35             | 0,35             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,31; 1,03]     | [0,07; 0,63]     | [0,04; 0,65]     |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl                 | 2111             | 1841             | 1586             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1421                   | 1337             | 1121             |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 108,68                 | 107,12           | 106,00           |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Mean  | [106,23; 111,14]       | [104,63; 109,60] | [103,29; 108,71] |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Median   | 102,67                 | 101,61           | 101,09           |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR normal   | Anzahl   | 911                    | 836              | 679              |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 64,11                  | 62,53            | 60,57            |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [61,61; 66,60]         | [59,93; 65,12]   | [57,71; 63,43]   |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 354                    | 344              | 297              |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 24,91                  | 25,73            | 26,49            |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [22,66; 27,16]         | [23,39; 28,07]   | [23,91; 29,08]   |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 132                    | 137              | 123              |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 9,29                   | 10,25            | 10,97            |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [7,78; 10,80]          | [8,62; 11,87]    | [9,14; 12,80]    |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 14                     | 9                | 13               |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 0,99                   | 0,67             | 1,16             |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,47; 1,50]           | [0,23; 1,11]     | [0,53; 1,79]     |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 10                     | 11               | 9                |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 0,70                   | 0,82             | 0,80             |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,27; 1,14]           | [0,34; 1,31]     | [0,28; 1,33]     |                  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-2   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl                 | 2740             | 2342             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl                 | 1852             | 1628             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                   | 120,64           | 119,90           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Mean                | [118,71; 122,56] | [117,93; 121,88] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Median                 | 119,17           | 119,12           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR normal   | Anzahl                 | 1450             | 1269             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 78,29            | 77,95            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [76,42; 80,17]   | [75,93; 79,96]   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl                 | 290              | 265              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 15,66            | 16,28            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [14,00; 17,31]   | [14,48; 18,07]   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl                 | 78               | 66               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 4,21             | 4,05             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [3,30; 5,13]     | [3,10; 5,01]     |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl                 | 22               | 15               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 1,19             | 0,92             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,69; 1,68]     | [0,46; 1,39]     |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl                 | 12               | 13               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,65             | 0,80             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,28; 1,01]     | [0,37; 1,23]     |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                   | Anzahl   | 2025                   | 1750             |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1410                   | 1292             |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 106,63                 | 105,97           |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Mean  | [104,29; 108,97]       | [103,55; 108,39] |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Median   | 102,73                 | 101,30           |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR normal   | Anzahl   | 887                    | 813              |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 62,91                  | 62,93            |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [60,39; 65,43]         | [60,29; 65,56]   |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 342                    | 320              |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 24,26                  | 24,77            |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [22,02; 26,49]         | [22,41; 27,12]   |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 148                    | 127              |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 10,50                  | 9,83             |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [8,90; 12,10]          | [8,21; 11,45]    |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 22                     | 23               |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 1,56                   | 1,78             |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,91; 2,21]           | [1,06; 2,50]     |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 11                     | 9                |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 0,78                   | 0,70             |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,32; 1,24]           | [0,24; 1,15]     |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Erwachsene Patienten zur ED und ihre Glomeruläre Filtrationsrate | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1   | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>                       | Anzahl                 | 3105             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar und untersucht  | Anzahl                 | 2094             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR)     | Mean                   | 122,16           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Mean                | [120,32; 124,01] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Median                 | 119,90           |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR normal   | Anzahl                 | 1667             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 79,61            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [77,88; 81,33]   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR leicht pathologisch  | Anzahl                 | 303              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 14,47            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [12,96; 15,98]   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR mäßig pathologisch   | Anzahl                 | 96               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 4,58             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [3,69; 5,48]     |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR hoch pathologisch  | Anzahl                 | 17               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            | 0,81             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         | [0,43; 1,20]     |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | GFR terminal insuffizient  | Anzahl                 | 11               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %  |  | 0,53                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %   |  | [0,22; 0,84]           |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>                   | Anzahl   | 2226                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar und untersucht                                    | Anzahl   | 1469                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Auswertungsergebnisse zur Glomerulären Filtrationsrate (GFR) | Mean   | 108,63                 |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Mean  | [106,36; 110,91]       |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Median   | 104,36                 |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR normal   | Anzahl   | 954                    |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 64,94                  |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [62,50; 67,38]         |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR leicht pathologisch                                      | Anzahl   | 342                    |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 23,28                  |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [21,12; 25,44]         |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR mäßig pathologisch                                       | Anzahl   | 144                    |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 9,80                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [8,28; 11,32]          |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR hoch pathologisch  | Anzahl   | 15                     |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 1,02                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,51; 1,54]           |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| GFR terminal insuffizient                                    | Anzahl   | 14                     |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %  | 0,95                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %   | [0,46; 1,45]           |                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In Tabelle 3.2.5 wird untersucht, bei wie vielen Patienten bzw. welchem Anteil eine **jährliche Untersuchung auf pathologische Urinalbumin-Ausscheidung** erfolgte. Die Auswertungen erfolgen also nicht im üblichen Halbjahresbezug. Da die Angaben aus der Erstdokumentation sich über einen unbekanntem Zeitraum erstrecken, können die Angaben des Beitrittsjahres nicht für die jährliche Betrachtungsweise verwendet werden. Der Jahresbezug wird folgendermaßen definiert: Eine jährliche Untersuchung gilt als gegeben, wenn eine Untersuchung im zweiten und/oder dritten Halbjahr dokumentiert ist bzw. im vierten und/oder fünften Halbjahr, etc. Betrachtet werden dabei alle Versicherten, die jeweils in beiden Halbjahren Programmteilnehmer waren.

Bei Nierengesunden werden nur geringe Mengen von Albumin, dem häufigsten Eiweiß (Protein) im Blutplasma, mit einer Reihe von Funktionen als Trägersubstanz sowie zur Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks in den Primärharn filtriert. Dieser geringe Anteil wird anschließend fast vollständig rückresorbiert (Ausscheidung < 30mg/Tag). Bei gestörter Filterfunktion erscheinen größere Mengen von Albumin im Primärharn, die die Resorptionskapazität der Nieren übersteigen und somit im Urin ausgeschieden werden. Eine Mikroalbuminurie, ein Indikator für einen Anstieg der GFR bzw. einer beginnenden Nierenschädigung liegt bei Werten von > 30 bis zu 300mg/Tag, eine Makroalbumin- bzw. Proteinurie ein Indikator für eine manifeste Nierenschädigung bei Werten von > 300mg/Tag Albumin im Urin vor.

In der folgenden Tabelle werden in den ersten Zeilen Angaben zu den Patienten gemacht. Zunächst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr bzw. im Untersuchungsjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Untersuchungsjahr Angaben zur Untersuchung auf pathologische Urin-Albumin-Ausscheidung vorliegen. Anschließend wird ausgewiesen, bei wie vielen der „auswertbaren“ Patienten bzw. welchem Anteil eine Untersuchung erfolgte.

Tabelle 3.2.5 Patienten und ihre jährliche Untersuchung auf pathologische Urinalbuminausscheidung

| EZ     | Patienten und ihre jährliche Untersuchung auf pathologische Urinalbuminausscheidung        | Teilnehmer im Beitritts-halbjahr | Im 1. Untersuchungs-jahr | Im 2. Untersuchungs-jahr | Im 3. Untersuchungs-jahr | Im 4. Untersuchungs-jahr | Im 5. Untersuchungs-jahr | Im 6. Untersuchungs-jahr | Im 7. Untersuchungs-jahr |                |
|--------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 2005-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 342                      | 277                      | 220                      | 194                      | 176                      | 167                      | 152                      | 141            |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 277                      | 220                      | 194                      | 176                      | 167                      | 151                      | 141            |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 217                      | 167                      | 159                      | 134                      | 124                      | 122                      | 118            |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 78,34                    | 75,91                    | 81,96                    | 76,14                    | 74,25                    | 80,79                    | 83,69          |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [73,48; 83,20]           | [70,25; 81,57]           | [76,53; 87,38]           | [69,82; 82,45]           | [67,60; 80,90]           | [74,49; 87,10]           | [77,57; 89,81] |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 292                      | 246                      | 195                      | 174                      | 160                      | 145                      | 139                      | 129            |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 246                      | 195                      | 174                      | 159                      | 144                      | 138                      | 127            |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 203                      | 151                      | 149                      | 132                      | 117                      | 123                      | 111            |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 82,52                    | 77,44                    | 85,63                    | 83,02                    | 81,25                    | 89,13                    | 87,40          |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [77,76; 87,28]           | [71,55; 83,32]           | [80,41; 90,86]           | [77,16; 88,87]           | [74,85; 87,65]           | [83,92; 94,34]           | [81,61; 93,20] |
| 2005-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2287                     | 1857                     | 1582                     | 1432                     | 1309                     | 1185                     | 1103                     |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1855                     | 1577                     | 1428                     | 1308                     | 1182                     | 1101                     |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1472                     | 1175                     | 1117                     | 954                      | 871                      | 836                      |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 79,35                    | 74,51                    | 78,22                    | 72,94                    | 73,69                    | 75,93                    |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [77,51; 81,20]           | [72,36; 76,66]           | [76,08; 80,36]           | [70,53; 75,34]           | [71,18; 76,20]           | [73,40; 78,46]           |                |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 1772                     | 1439                     | 1242                     | 1116                     | 1026                     | 936                      | 870                      |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1433                     | 1241                     | 1111                     | 1020                     | 932                      | 868                      |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1145                     | 936                      | 872                      | 782                      | 705                      | 653                      |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 79,90                    | 75,42                    | 78,49                    | 76,67                    | 75,64                    | 75,23                    |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [77,83; 81,98]           | [73,03; 77,82]           | [76,07; 80,91]           | [74,07; 79,26]           | [72,89; 78,40]           | [72,36; 78,10]           |                |
| 2006-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2245                     | 1756                     | 1483                     | 1329                     | 1149                     | 1039                     | 932                      |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1751                     | 1474                     | 1316                     | 1147                     | 1038                     | 931                      |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1441                     | 1154                     | 1070                     | 945                      | 864                      | 771                      |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 82,30                    | 78,29                    | 81,31                    | 82,39                    | 83,24                    | 82,81                    |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [80,51; 84,08]           | [76,18; 80,40]           | [79,20; 83,41]           | [80,18; 84,59]           | [80,96; 85,51]           | [80,39; 85,24]           |                |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 1759                     | 1380                     | 1159                     | 1057                     | 933                      | 844                      | 747                      |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1375                     | 1148                     | 1046                     | 928                      | 840                      | 743                      |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1133                     | 897                      | 844                      | 769                      | 699                      | 614                      |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 82,40                    | 78,14                    | 80,69                    | 82,87                    | 83,21                    | 82,64                    |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [80,39; 84,41]           | [75,74; 80,53]           | [78,29; 83,08]           | [80,44; 85,29]           | [80,69; 85,74]           | [79,91; 85,36]           |                |
| 2006-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3054                     | 2393                     | 2052                     | 1796                     | 1605                     | 1434                     |                          |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 2385                     | 2049                     | 1791                     | 1602                     | 1430                     |                          |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1911                     | 1639                     | 1387                     | 1246                     | 1103                     |                          |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 80,13                    | 79,99                    | 77,44                    | 77,78                    | 77,13                    |                          |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [78,52; 81,73]           | [78,26; 81,72]           | [75,51; 79,38]           | [75,74; 79,81]           | [74,96; 79,31]           |                          |                |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2346                     | 1875                     | 1639                     | 1433                     | 1263                     | 1147                     |                          |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1871                     | 1628                     | 1422                     | 1260                     | 1146                     |                          |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1489                     | 1319                     | 1147                     | 1010                     | 906                      |                          |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 79,58                    | 81,02                    | 80,66                    | 80,16                    | 79,06                    |                          |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [77,76; 81,41]           | [79,11; 82,93]           | [78,61; 82,71]           | [77,96; 82,36]           | [76,70; 81,41]           |                          |                |
| 2007-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 6522                     | 5338                     | 4736                     | 4205                     | 3822                     | 3522                     |                          |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 5315                     | 4701                     | 4191                     | 3808                     | 3506                     |                          |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 4089                     | 3564                     | 3187                     | 2886                     | 2722                     |                          |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 76,93                    | 75,81                    | 76,04                    | 75,79                    | 77,64                    |                          |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [75,80; 78,07]           | [74,59; 77,04]           | [74,75; 77,34]           | [74,43; 77,15]           | [76,26; 79,02]           |                          |                |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 5314                     | 4472                     | 3934                     | 3532                     | 3209                     | 2944                     |                          |                |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 4458                     | 3905                     | 3520                     | 3190                     | 2922                     |                          |                |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 3464                     | 3074                     | 2708                     | 2467                     | 2341                     |                          |                |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 77,70                    | 78,72                    | 76,93                    | 77,34                    | 80,12                    |                          |                |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [76,48; 78,93]           | [77,44; 80,00]           | [75,54; 78,32]           | [75,88; 78,79]           | [78,67; 81,56]           |                          |                |

| EZ     | Patienten und ihre jährliche Untersuchung auf pathologische Urinalbuminausscheidung        | Teilnehmer im Beitritts-halbjahr | Im 1. Untersu-chungs-jahr | Im 2. Untersu-chungs-jahr | Im 3. Untersu-chungs-jahr | Im 4. Untersu-chungs-jahr | Im 5. Untersu-chungs-jahr | Im 6. Untersu-chungs-jahr | Im 7. Untersu-chungs-jahr |
|--------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2007-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 4414                      | 3512                      | 2899                      | 2514                      | 2249                      |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 3491                      | 2876                      | 2501                      | 2231                      |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 2714                      | 2157                      | 1868                      | 1700                      |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 77,74                     | 75,00                     | 74,69                     | 76,20                     |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [76,36; 79,12]            | [73,42; 76,58]            | [72,99; 76,39]            | [74,43; 77,97]            |                           |                           |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3459                      | 2830                      | 2330                      | 2043                      | 1835                      |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2814                      | 2322                      | 2035                      | 1823                      |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 2214                      | 1747                      | 1537                      | 1396                      |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 78,68                     | 75,24                     | 75,53                     | 76,58                     |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [77,16; 80,19]            | [73,48; 76,99]            | [73,66; 77,40]            | [74,63; 78,52]            |                           |                           |
| 2008-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 4190                      | 3307                      | 2653                      | 2274                      | 2046                      |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 3250                      | 2633                      | 2252                      | 2025                      |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 2481                      | 1916                      | 1681                      | 1583                      |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 76,34                     | 72,77                     | 74,64                     | 78,17                     |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [74,88; 77,80]            | [71,07; 74,47]            | [72,85; 76,44]            | [76,37; 79,97]            |                           |                           |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3188                      | 2579                      | 2120                      | 1834                      | 1650                      |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2544                      | 2107                      | 1818                      | 1629                      |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1960                      | 1596                      | 1386                      | 1256                      |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 77,04                     | 75,75                     | 76,24                     | 77,10                     |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [75,41; 78,68]            | [73,92; 77,58]            | [74,28; 78,19]            | [75,06; 79,14]            |                           |                           |
| 2008-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2893                      | 2153                      | 1738                      | 1505                      |                           |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2125                      | 1719                      | 1478                      |                           |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1551                      | 1238                      | 1102                      |                           |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 72,99                     | 72,02                     | 74,56                     |                           |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [71,10; 74,88]            | [69,90; 74,14]            | [72,34; 76,78]            |                           |                           |                           |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2099                      | 1615                      | 1290                      | 1124                      |                           |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1604                      | 1274                      | 1111                      |                           |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1179                      | 906                       | 814                       |                           |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 73,50                     | 71,11                     | 73,27                     |                           |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [71,34; 75,66]            | [68,62; 73,60]            | [70,66; 75,87]            |                           |                           |                           |
| 2009-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3215                      | 2408                      | 1971                      | 1697                      |                           |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2388                      | 1950                      | 1677                      |                           |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1755                      | 1435                      | 1273                      |                           |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 73,49                     | 73,59                     | 75,91                     |                           |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [71,72; 75,26]            | [71,63; 75,55]            | [73,86; 77,96]            |                           |                           |                           |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2420                      | 1813                      | 1496                      | 1268                      |                           |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1801                      | 1478                      | 1248                      |                           |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1337                      | 1084                      | 939                       |                           |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 74,24                     | 73,34                     | 75,24                     |                           |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [72,22; 76,26]            | [71,09; 75,60]            | [72,84; 77,64]            |                           |                           |                           |
| 2009-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2729                      | 1970                      | 1565                      |                           |                           |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1953                      | 1537                      |                           |                           |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1488                      | 1133                      |                           |                           |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 76,19                     | 73,72                     |                           |                           |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [74,30; 78,08]            | [71,51; 75,92]            |                           |                           |                           |                           |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2127                      | 1616                      | 1328                      |                           |                           |                           |                           |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1595                      | 1307                      |                           |                           |                           |                           |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1194                      | 964                       |                           |                           |                           |                           |
|        |  | Anteil in %                      |                           | 74,86                     | 73,76                     |                           |                           |                           |                           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                           | [72,73; 76,99]            | [71,37; 76,14]            |                           |                           |                           |                           |

| EZ   | Patienten und ihre jährliche Untersuchung auf pathologische Urinalbuminausscheidung        | Teilnehmer im Beitritts-halbjahr | Im 1. Untersu-chungs-jahr | Im 2. Untersu-chungs-jahr | Im 3. Untersu-chungs-jahr | Im 4. Untersu-chungs-jahr | Im 5. Untersu-chungs-jahr | Im 6. Untersu-chungs-jahr | Im 7. Untersu-chungs-jahr |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2010-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3025                      | 2206                      | 1813                      |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2195                      | 1800                      |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1679                      | 1385                      |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 76,49                     | 76,94                     |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [74,72; 78,27]            | [75,00; 78,89]            |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2174                      | 1591                      | 1299                      |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1577                      | 1282                      |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1196                      | 974                       |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 75,84                     | 75,98                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [73,73; 77,95]            | [73,64; 78,31]            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2010-2   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3086                      | 2248                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2237                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1685                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 75,32                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [73,54; 77,11]            |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2312                      | 1768                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1761                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1314                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 74,62                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [72,58; 76,65]            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2011-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3146                      | 2269                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2256                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1686                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 74,73                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [72,94; 76,53]            |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2382                      | 1809                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1802                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1375                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 76,30                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [74,34; 78,27]            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2011-2   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3031                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2272                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2012-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3423                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2494                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |

### 3.3 Medikation

Die medikamentöse Therapie bei Typ-I-Diabetikern besteht hauptsächlich in der Zuführung von kurz-, mittel- oder langfristig wirkenden Insulinen. Die benötigte Insulinmenge ist individuell von der Menge der durch mit der Nahrung zugeführten Kohlenhydrate sowie der körperlichen Aktivität der Erkrankten abhängig. Insulin ist ein Proteohormon, das im Magen-Darm-Trakt verdaut werden würde und daher mehrfach täglich nach Messung des Blutzuckerspiegels mittels Injektionen ins Unterhautfettgewebe per Spritzen, spezieller Injektoren oder programmierbarer Insulinpumpen - zumeist von den Erkrankten selbst - appliziert wird.

An dieser Stelle wird jedoch nicht auf die Insulintherapie der Erkrankten eingegangen, sondern die Anteile der Patienten, die aufgrund von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bereits eingetretene Folgeerkrankungen (Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall) spezifischer Arzneimitteltherapien bedürfen. Im Speziellen werden die Anteile der Typ-I-Diabetiker, die mit Statinen zur Senkung der Blutfett- bzw. Cholesterinkonzentration sowie Thrombozyten-Aggregationshemmer zur Senkung der Blutgerinnungsneigung behandelt werden, ausgewiesen.

In der Tabelle 3.3.1 ist die Entwicklung der **Medikation der Patienten mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern** ausgewiesen. Für jede Kohorte werden dazu zunächst unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren.

Anschließend wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten eine potenzielle Indikation für eine Statin-Therapie vorlag und welchem Anteil an den „auswertbaren“ Patienten dies entspricht. Anschließend wird ausgewiesen bei wie vielen dieser Patienten bzw. welchem Anteil eine Statin-Therapie erfolgte. Als potenziell indiziert gilt eine Statin-Therapie, wenn laut Anamnese-Daten Schlaganfall, Hypertonus, pAVK, Fettstoffwechselstörung, KHK, Herzinfarkt oder Nephropathie vermerkt sind – entweder in der Erstdokumentation und/oder in den Folgedokumentationen bis einschließlich des Berichtshalbjahres. Es handelt sich hierbei also nicht um die übliche Kollektivbetrachtung, bei der ausschließlich die Angaben in der Erstdokumentation über die Kollektivzugehörigkeit entscheiden. Vielmehr ist das solchermaßen gebildete Kollektiv im Zeitverlauf variabel: Es kommen neue Patienten hinzu, bei denen die relevanten Indikationen erst im Zeitverlauf auftreten.

Vergleichbare Informationen erfolgen bezüglich einer Behandlung mit ThrombozytenAggregationshemmern. Hier gilt eine entsprechende Therapie als potenziell indiziert, wenn laut Anamnese-Daten Schlaganfall, pAVK, KHK oder Herzinfarkt vermerkt sind.



**Tabelle 3.3.1 Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern**

\* Als potenzielle Indikation für eine Statin-Therapie gelten Schlaganfall, Hypertonus, pAVK, Fettstoffwechselstörung, KHK, Herzinfarkt oder Nephropathie laut Anamnesedaten der Erstdokumentation und/oder der Folgedokumentationen bis einschließlich des Berichtshalbjahres.

\*\* Als potenzielle Indikation für eine Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern gelten Schlaganfall, pAVK, KHK oder Herzinfarkt laut Anamnesedaten der Erstdokumentation und/oder der Folgedokumentationen bis einschließlich des Berichtshalbjahres.

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2005-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 342            | 318            | 277            | 242            | 220            | 207            | 194            | 186            | 176               | 172               | 167               | 159               | 152               | 147               | 141            |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 342            | 310            | 266            | 238            | 218            | 207            | 194            | 184            | 174               | 168               | 161               | 155               | 147               | 143               | 137            |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 153            | 146            | 128            | 123            | 119            | 117            | 111            | 124            | 116               | 115               | 112               | 109               | 104               | 102               | 100            |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 47             | 49             | 39             | 31             | 37             | 31             | 31             | 37             | 36                | 38                | 34                | 34                | 31                | 30                | 27             |
|                |   | Anteil in %            | 30,72          | 33,56          | 30,47          | 25,20          | 31,09          | 26,50          | 27,93          | 29,84          | 31,03             | 33,04             | 30,36             | 31,19             | 29,81             | 29,41             | 27,00          |
|                |   | CI Anteil in %         | [23,38; 38,05] | [25,88; 41,25] | [22,46; 38,47] | [17,50; 32,91] | [22,74; 39,44] | [18,46; 34,53] | [19,54; 36,31] | [21,75; 37,92] | [22,58; 39,49]    | [24,41; 41,68]    | [21,80; 38,91]    | [22,46; 39,93]    | [20,97; 38,64]    | [20,53; 38,30]    | [18,25; 35,75] |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 342            | 310            | 266            | 238            | 218            | 207            | 194            | 184            | 174               | 168               | 161               | 155               | 147               | 143               | 137            |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 54             | 54             | 49             | 46             | 46             | 44             | 43             | 50             | 47                | 45                | 43                | 42                | 38                | 38                | 38             |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 31             | 28             | 27             | 27             | 27             | 26             | 24             | 32             | 29                | 27                | 26                | 26                | 24                | 23                | 23             |
|                |   | Anteil in %            | 57,41          | 51,85          | 55,10          | 58,70          | 58,70          | 59,09          | 55,81          | 64,00          | 61,70             | 60,00             | 60,47             | 61,90             | 63,16             | 60,53             | 60,53          |
|                |   | CI Anteil in %         | [44,09; 70,72] | [38,40; 65,30] | [41,03; 69,17] | [44,31; 73,08] | [44,31; 73,08] | [44,40; 73,79] | [40,79; 70,83] | [50,56; 77,44] | [47,65; 75,75]    | [45,52; 74,48]    | [45,68; 75,25]    | [47,04; 76,77]    | [47,61; 78,70]    | [44,78; 76,28]    | [44,78; 76,28] |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 292            | 281            | 246            | 214            | 195            | 183            | 174            | 167            | 160               | 151               | 145               | 141               | 139               | 136               | 129            |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 292            | 277            | 224            | 210            | 194            | 181            | 169            | 165            | 156               | 147               | 143               | 139               | 136               | 129               | 125            |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 123            | 124            | 104            | 103            | 98             | 87             | 81             | 95             | 94                | 89                | 85                | 84                | 82                | 75                | 73             |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 45             | 46             | 42             | 35             | 38             | 34             | 31             | 41             | 38                | 36                | 34                | 34                | 34                | 32                | 31             |
|                |   | Anteil in %            | 36,59          | 37,10          | 40,38          | 33,98          | 38,78          | 39,08          | 38,27          | 43,16          | 40,43             | 40,45             | 40,00             | 40,48             | 41,46             | 42,67             | 42,47          |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 81,59]  | [0,00; 83,10]  | [0,00; 82,38]  | [0,00; 68,98]  | [0,78; 76,78]  | [5,08; 73,08]  | [7,27; 69,27]  | [2,16; 84,16]  | [2,43; 78,43]     | [4,45; 76,45]     | [6,00; 74,00]     | [6,48; 74,48]     | [7,46; 75,46]     | [10,67; 74,67]    | [11,47; 73,47] |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 292            | 277            | 224            | 210            | 194            | 181            | 169            | 164            | 155               | 146               | 142               | 138               | 135               | 128               | 124            |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 31             | 32             | 28             | 25             | 27             | 25             | 27             | 28             | 25                | 24                | 24                | 22                | 22                | 19                | 18             |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 22             | 21             | 20             | 18             | 15             | 15             | 17             | 21             | 19                | 18                | 18                | 16                | 16                | 14                | 13             |
| Anteil in %    |   | 70,97                  | 65,63          | 71,43          | 72,00          | 55,56          | 60,00          | 62,96          | 75,00          | 76,00          | 75,00             | 75,00             | 72,73             | 72,73             | 73,68             | 72,22             |                |
| CI Anteil in % |   | [54,72; 87,21]         | [48,91; 82,34] | [54,39; 88,47] | [54,04; 89,96] | [36,46; 74,66] | [40,40; 79,60] | [44,40; 81,53] | [58,67; 91,33] | [58,91; 93,09] | [57,30; 92,70]    | [57,30; 92,70]    | [53,68; 91,78]    | [53,68; 91,78]    | [53,34; 94,03]    | [50,93; 93,51]    |                |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2005-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2287           | 2094           | 1857           | 1690           | 1582           | 1510           | 1432           | 1368           | 1309              | 1254              | 1185              | 1153              | 1103              | 1050              |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2287           | 2039           | 1816           | 1657           | 1550           | 1472           | 1384           | 1340           | 1279              | 1229              | 1164              | 1133              | 1073              | 1032              |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1242           | 1172           | 1091           | 1020           | 967            | 928            | 1001           | 990            | 964               | 935               | 895               | 878               | 836               | 811               |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 441            | 391            | 372            | 359            | 335            | 325            | 371            | 389            | 387               | 371               | 364               | 363               | 346               | 340               |
|                |   | Anteil in %            | 35,51          | 33,36          | 34,10          | 35,20          | 34,64          | 35,02          | 37,06          | 39,29          | 40,15             | 39,68             | 40,67             | 41,34             | 41,39             | 41,92             |
|                |   | CI Anteil in %         | [32,84; 38,17] | [30,66; 36,06] | [31,28; 36,91] | [32,26; 38,13] | [31,64; 37,64] | [31,95; 38,09] | [34,07; 40,06] | [36,25; 42,34] | [37,05; 43,24]    | [36,54; 42,82]    | [37,45; 43,89]    | [38,08; 44,60]    | [38,05; 44,73]    | [38,53; 45,32]    |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2287           | 2039           | 1816           | 1657           | 1550           | 1472           | 1381           | 1339           | 1278              | 1227              | 1162              | 1131              | 1071              | 1030              |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 386            | 380            | 362            | 342            | 319            | 307            | 350            | 357            | 341               | 327               | 319               | 314               | 292               | 286               |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 243            | 224            | 220            | 213            | 199            | 185            | 226            | 236            | 228               | 221               | 225               | 222               | 209               | 205               |
|                |   | Anteil in %            | 62,95          | 58,95          | 60,77          | 62,28          | 62,38          | 60,26          | 64,57          | 66,11          | 66,86             | 67,58             | 70,53             | 70,70             | 71,58             | 71,68             |
|                |   | CI Anteil in %         | [58,13; 67,78] | [53,99; 63,90] | [55,74; 65,81] | [57,14; 67,43] | [57,06; 67,71] | [54,78; 65,74] | [59,55; 69,59] | [61,19; 71,02] | [61,86; 71,87]    | [62,50; 72,67]    | [65,52; 75,54]    | [65,66; 75,74]    | [66,39; 76,76]    | [66,45; 76,91]    |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 1772           | 1624           | 1439           | 1318           | 1242           | 1172           | 1116           | 1075           | 1026              | 966               | 936               | 903               | 870               | 839               |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 1772           | 1570           | 1400           | 1285           | 1219           | 1144           | 1074           | 1039           | 992               | 948               | 918               | 881               | 853               | 805               |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 899            | 831            | 772            | 726            | 707            | 669            | 734            | 733            | 716               | 696               | 688               | 665               | 650               | 618               |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 288            | 252            | 237            | 238            | 233            | 235            | 260            | 250            | 249               | 253               | 264               | 257               | 260               | 242               |
|                |   | Anteil in %            | 32,04          | 30,32          | 30,70          | 32,78          | 32,96          | 35,13          | 35,42          | 34,11          | 34,78             | 36,35             | 38,37             | 38,65             | 40,00             | 39,16             |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 1772           | 1570           | 1400           | 1285           | 1219           | 1144           | 1073           | 1039           | 992               | 948               | 918               | 882               | 853               | 805               |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 273            | 264            | 245            | 228            | 229            | 219            | 233            | 229            | 212               | 212               | 211               | 203               | 197               | 188               |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 166            | 158            | 143            | 139            | 135            | 140            | 152            | 150            | 141               | 140               | 140               | 130               | 128               | 126               |
| Anteil in %    |   | 60,81                  | 59,85          | 58,37          | 60,96          | 58,95          | 63,93          | 65,24          | 65,50          | 66,51          | 66,04             | 66,35             | 64,04             | 64,97             | 67,02             |                   |
| CI Anteil in % |   | [55,00; 66,61]         | [53,92; 65,77] | [52,18; 64,55] | [54,62; 67,31] | [52,57; 65,34] | [57,55; 70,30] | [59,11; 71,36] | [59,33; 71,67] | [60,14; 72,88] | [59,65; 72,43]    | [59,96; 72,74]    | [57,42; 70,66]    | [58,30; 71,65]    | [60,28; 73,76]    |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2245           | 2019           | 1756           | 1611           | 1483           | 1408           | 1329           | 1225           | 1149              | 1090              | 1039              | 984               | 932               |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2245           | 1965           | 1718           | 1557           | 1441           | 1344           | 1279           | 1194           | 1130              | 1075              | 1017              | 966               | 905               |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 970            | 896            | 807            | 746            | 724            | 813            | 801            | 764            | 738               | 714               | 690               | 663               | 628               |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 269            | 257            | 252            | 234            | 235            | 272            | 275            | 272            | 266               | 261               | 244               | 234               | 228               |                   |
|                |   | Anteil in %            | 27,73          | 28,68          | 31,23          | 31,37          | 32,46          | 33,46          | 34,33          | 35,60          | 36,04             | 36,55             | 35,36             | 35,29             | 36,31             |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [24,91; 30,55] | [25,72; 31,65] | [28,03; 34,43] | [28,04; 34,70] | [29,05; 35,87] | [30,21; 36,70] | [31,04; 37,62] | [32,20; 39,00] | [32,58; 39,51]    | [33,02; 40,09]    | [31,79; 38,93]    | [31,65; 38,93]    | [32,54; 40,07]    |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2245           | 1965           | 1718           | 1557           | 1441           | 1345           | 1279           | 1194           | 1130              | 1076              | 1018              | 967               | 906               |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 267            | 247            | 233            | 216            | 208            | 246            | 252            | 242            | 238               | 231               | 223               | 215               | 208               |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 138            | 131            | 121            | 120            | 123            | 167            | 168            | 163            | 155               | 152               | 148               | 141               | 134               |                   |
|                |   | Anteil in %            | 51,69          | 53,04          | 51,93          | 55,56          | 59,13          | 67,89          | 66,67          | 67,36          | 65,13             | 65,80             | 66,37             | 65,58             | 64,42             |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [45,68; 57,69] | [46,80; 59,27] | [45,50; 58,36] | [48,91; 62,20] | [52,44; 65,83] | [62,04; 73,73] | [60,83; 72,50] | [61,44; 73,28] | [59,06; 71,19]    | [59,67; 71,93]    | [60,15; 72,58]    | [59,22; 71,95]    | [57,90; 70,95]    |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 1759           | 1578           | 1380           | 1253           | 1159           | 1105           | 1057           | 991            | 933               | 884               | 844               | 797               | 747               |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 1759           | 1531           | 1339           | 1211           | 1117           | 1055           | 1030           | 961            | 910               | 868               | 826               | 782               | 734               |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 747            | 689            | 628            | 578            | 541            | 621            | 628            | 597            | 578               | 563               | 544               | 525               | 511               |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 199            | 162            | 163            | 150            | 142            | 181            | 186            | 180            | 177               | 170               | 177               | 169               | 162               |                   |
|                |   | Anteil in %            | 26,64          | 23,51          | 25,96          | 25,95          | 26,25          | 29,15          | 29,62          | 30,15          | 30,62             | 30,20             | 32,54             | 32,19             | 31,70             |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 1759           | 1531           | 1339           | 1211           | 1117           | 1055           | 1030           | 961            | 910               | 868               | 826               | 782               | 734               |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 178            | 162            | 145            | 133            | 128            | 157            | 159            | 151            | 149               | 142               | 138               | 135               | 138               |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 109            | 92             | 85             | 72             | 69             | 99             | 100            | 91             | 92                | 88                | 91                | 88                | 91                |                   |
| Anteil in %    |   | 61,24                  | 56,79          | 58,62          | 54,14          | 53,91          | 63,06          | 62,89          | 60,26          | 61,74          | 61,97             | 65,94             | 65,19             | 65,94             |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [54,06; 68,41]         | [49,14; 64,44] | [50,58; 66,67] | [45,63; 62,64] | [45,24; 62,58] | [55,48; 70,63] | [55,36; 70,43] | [52,43; 68,10] | [53,91; 69,58] | [53,96; 69,98]    | [58,01; 73,88]    | [57,12; 73,25]    | [58,01; 73,88]    |                   |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3054           | 2707           | 2393           | 2179           | 2052           | 1924           | 1796           | 1691           | 1605              | 1506              | 1434              | 1366              |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3054           | 2646           | 2310           | 2128           | 1937           | 1862           | 1744           | 1652           | 1581              | 1477              | 1410              | 1335              |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1357           | 1242           | 1141           | 1080           | 1214           | 1211           | 1167           | 1123           | 1088              | 1039              | 1003              | 972               |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 389            | 366            | 360            | 353            | 411            | 412            | 399            | 376            | 376               | 361               | 351               | 337               |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 28,67          | 29,47          | 31,55          | 32,69          | 33,86          | 34,02          | 34,19          | 33,48          | 34,56             | 34,74             | 35,00             | 34,67             |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [26,26; 31,07] | [26,93; 32,01] | [28,85; 34,25] | [29,89; 35,48] | [31,19; 36,52] | [31,35; 36,69] | [31,47; 36,91] | [30,72; 36,24] | [31,73; 37,39]    | [31,85; 37,64]    | [32,04; 37,95]    | [31,68; 37,66]    |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3054           | 2646           | 2310           | 2128           | 1938           | 1863           | 1744           | 1651           | 1582              | 1477              | 1408              | 1333              |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 344            | 315            | 296            | 270            | 325            | 334            | 334            | 321            | 322               | 305               | 299               | 288               |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 188            | 173            | 162            | 163            | 213            | 206            | 202            | 198            | 200               | 194               | 185               | 179               |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 54,65          | 54,92          | 54,73          | 60,37          | 65,54          | 61,68          | 60,48          | 61,68          | 62,11             | 63,61             | 61,87             | 62,15             |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [49,38; 59,92] | [49,42; 60,42] | [49,05; 60,41] | [54,53; 66,22] | [60,36; 70,71] | [56,45; 66,90] | [55,23; 65,73] | [56,36; 67,01] | [56,80; 67,42]    | [58,20; 69,02]    | [56,36; 67,39]    | [56,54; 67,76]    |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2346           | 2091           | 1875           | 1753           | 1639           | 1555           | 1433           | 1332           | 1263              | 1206              | 1147              | 1090              |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2346           | 2035           | 1829           | 1698           | 1533           | 1492           | 1386           | 1298           | 1244              | 1181              | 1123              | 1075              |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1010           | 921            | 854            | 811            | 879            | 906            | 877            | 835            | 819               | 798               | 771               | 751               |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 248            | 230            | 234            | 233            | 295            | 316            | 300            | 285            | 280               | 255               | 245               | 245               |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 24,55          | 24,97          | 27,40          | 28,73          | 33,56          | 34,88          | 34,21          | 34,13          | 34,19             | 31,95             | 31,78             | 32,62             |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2346           | 2035           | 1829           | 1698           | 1533           | 1492           | 1387           | 1299           | 1244              | 1181              | 1120              | 1072              |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 221            | 209            | 200            | 189            | 221            | 236            | 230            | 224            | 217               | 209               | 200               | 193               |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 120            | 106            | 109            | 108            | 148            | 158            | 153            | 154            | 145               | 141               | 133               | 128               |                   |                   |
| Anteil in %    |   | 54,30                  | 50,72          | 54,50          | 57,14          | 66,97          | 66,95          | 66,52          | 68,75          | 66,82          | 67,46             | 66,50             | 66,32             |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [47,72; 60,88]         | [43,92; 57,51] | [47,58; 61,42] | [50,07; 64,22] | [60,75; 73,18] | [60,93; 72,96] | [60,41; 72,63] | [62,67; 74,83] | [60,54; 73,10] | [61,10; 73,83]    | [59,94; 73,06]    | [59,64; 73,01]    |                   |                   |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2007-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl             | 6522           | 5910           | 5338           | 4997           | 4736           | 4458           | 4205           | 4002           | 3822           | 3669           | 3522           |              |              |              |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl             | 6522           | 5758           | 5219           | 4795           | 4591           | 4375           | 4121           | 3929           | 3765           | 3601           | 3441           |              |              |              |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl             | 3091           | 2894           | 2709           | 2944           | 3000           | 2937           | 2819           | 2739           | 2661           | 2586           | 2494           |              |              |              |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl             | 933            | 848            | 809            | 948            | 977            | 972            | 968            | 950            | 926            | 906            | 885            |              |              |              |
|                |   | Anteil in %        | 30,18          | 29,30          | 29,86          | 32,20          | 32,57          | 33,09          | 34,34          | 34,68          | 34,80          | 35,03          | 35,49          |              |              |              |
|                |   | CI Anteil in %     | [28,57; 31,80] | [27,64; 30,96] | [28,14; 31,59] | [30,51; 33,89] | [30,89; 34,24] | [31,39; 34,80] | [32,59; 36,09] | [32,90; 36,47] | [32,99; 36,61] | [33,20; 36,87] | [33,61; 37,36] |              |              |              |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl             | 6522           | 5758           | 5219           | 4795           | 4590           | 4372           | 4120           | 3928           | 3764           | 3600           | 3441           |              |              |              |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl             | 782            | 754            | 693            | 801            | 818            | 823            | 784            | 782            | 770            | 756            | 737            |              |              |              |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl             | 453            | 405            | 395            | 483            | 480            | 490            | 468            | 466            | 466            | 463            | 454            |              |              |              |
|                |   | Anteil in %        | 57,93          | 53,71          | 57,00          | 60,30          | 58,68          | 59,54          | 59,69          | 59,59          | 60,52          | 61,24          | 61,60          |              |              |              |
|                |   | CI Anteil in %     | [54,47; 61,39] | [50,15; 57,27] | [53,31; 60,69] | [56,91; 63,69] | [55,30; 62,06] | [56,18; 62,89] | [56,26; 63,13] | [56,15; 63,03] | [57,06; 63,97] | [57,77; 64,72] | [58,09; 65,11] |              |              |              |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl             | 5314           | 4880           | 4472           | 4196           | 3934           | 3716           | 3532           | 3362           | 3209           | 3071           | 2944           |              |              |              |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl             | 5314           | 4780           | 4367           | 3995           | 3818           | 3625           | 3472           | 3277           | 3142           | 3001           | 2880           |              |              |              |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl             | 2358           | 2226           | 2119           | 2294           | 2302           | 2255           | 2206           | 2126           | 2075           | 2017           | 1972           |              |              |              |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl             | 703            | 652            | 625            | 743            | 751            | 746            | 745            | 713            | 701            | 680            | 659            |              |              |              |
|                |   | Anteil in %        | 29,81          | 29,29          | 29,50          | 32,39          | 32,62          | 33,08          | 33,77          | 33,54          | 33,78          | 33,71          | 33,42          |              |              |              |
|                |   | CI Anteil in %     | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] |              |              |              |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl             | 5314           | 4780           | 4367           | 3998           | 3823           | 3628           | 3473           | 3280           | 3144           | 3004           | 2883           |              |              |              |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl             | 516            | 509            | 488            | 571            | 587            | 586            | 583            | 564            | 550            | 539            | 522            |              |              |              |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl             | 272            | 252            | 247            | 331            | 330            | 326            | 312            | 299            | 297            | 296            | 286            |              |              |              |
| Anteil in %    |   | 52,71              | 49,51          | 50,61          | 57,97          | 56,22          | 55,63          | 53,52          | 53,01          | 54,00          | 54,92          | 54,79          |                |              |              |              |
| CI Anteil in % |   | [48,40; 57,03]     | [45,16; 53,86] | [46,17; 55,06] | [53,92; 62,02] | [52,20; 60,23] | [51,61; 59,66] | [49,46; 57,57] | [48,89; 57,14] | [49,83; 58,17] | [50,71; 59,12] | [50,52; 59,06] |                |              |              |              |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 4414           | 3892           | 3512           | 3195           | 2899           | 2676           | 2514           | 2368           | 2249              | 2141              |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 4414           | 3763           | 3314           | 3067           | 2798           | 2598           | 2442           | 2300           | 2190              | 2088              |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1699           | 1555           | 1688           | 1648           | 1571           | 1519           | 1455           | 1398           | 1352              | 1314              |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 491            | 434            | 529            | 524            | 531            | 515            | 487            | 473            | 445               | 450               |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 28,90          | 27,91          | 31,34          | 31,80          | 33,80          | 33,90          | 33,47          | 33,83          | 32,91             | 34,25             |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [26,74; 31,06] | [25,68; 30,14] | [29,13; 33,55] | [29,55; 34,05] | [31,46; 36,14] | [31,52; 36,29] | [31,05; 35,90] | [31,35; 36,32] | [30,41; 35,42]    | [31,68; 36,81]    |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 4414           | 3763           | 3310           | 3063           | 2795           | 2594           | 2438           | 2296           | 2187              | 2085              |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 414            | 389            | 436            | 443            | 421            | 397            | 387            | 370            | 355               | 351               |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 238            | 214            | 271            | 273            | 270            | 258            | 244            | 238            | 229               | 224               |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 57,49          | 55,01          | 62,16          | 61,63          | 64,13          | 64,99          | 63,05          | 64,32          | 64,51             | 63,82             |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [52,72; 62,26] | [50,06; 59,96] | [57,60; 66,71] | [57,09; 66,16] | [59,55; 68,72] | [60,29; 69,69] | [58,23; 67,86] | [59,44; 69,21] | [59,52; 69,49]    | [58,78; 68,85]    |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3459           | 3091           | 2830           | 2577           | 2330           | 2170           | 2043           | 1941           | 1835              | 1756              |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3459           | 2997           | 2646           | 2475           | 2263           | 2119           | 1983           | 1896           | 1797              | 1711              |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1264           | 1165           | 1259           | 1251           | 1188           | 1127           | 1100           | 1077           | 1050              | 1018              |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 381            | 343            | 410            | 415            | 410            | 388            | 379            | 364            | 351               | 343               |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 30,14          | 29,44          | 32,57          | 33,17          | 34,51          | 34,43          | 34,45          | 33,80          | 33,43             | 33,69             |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3459           | 2997           | 2645           | 2475           | 2263           | 2119           | 1983           | 1896           | 1797              | 1710              |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 269            | 255            | 292            | 284            | 275            | 272            | 259            | 253            | 257               | 255               |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 133            | 130            | 164            | 158            | 152            | 149            | 148            | 151            | 152               | 144               |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   | 49,44                  | 50,98          | 56,16          | 55,63          | 55,27          | 54,78          | 57,14          | 59,68          | 59,14          | 56,47             |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [43,46; 55,43]         | [44,83; 57,13] | [50,46; 61,87] | [49,85; 61,42] | [49,39; 61,16] | [48,85; 60,71] | [51,10; 63,18] | [53,63; 65,74] | [53,12; 65,17] | [50,37; 62,57]    |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 4190           | 3689           | 3307           | 2914           | 2653           | 2459           | 2274           | 2144           | 2046              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 4190           | 3475           | 3117           | 2786           | 2565           | 2375           | 2204           | 2088           | 1981              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1618           | 1689           | 1620           | 1510           | 1434           | 1363           | 1298           | 1275           | 1236              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 479            | 552            | 550            | 515            | 481            | 467            | 452            | 459            | 444               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 29,60          | 32,68          | 33,95          | 34,11          | 33,54          | 34,26          | 34,82          | 36,00          | 35,92             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [27,38; 31,83] | [30,44; 34,92] | [31,64; 36,26] | [31,71; 36,50] | [31,10; 35,99] | [31,74; 36,78] | [32,23; 37,42] | [33,36; 38,64] | [33,25; 38,60]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 4190           | 3475           | 3119           | 2787           | 2567           | 2376           | 2205           | 2087           | 1980              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 419            | 444            | 425            | 399            | 376            | 351            | 335            | 328            | 323               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 238            | 264            | 265            | 250            | 232            | 220            | 217            | 213            | 209               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 56,80          | 59,46          | 62,35          | 62,66          | 61,70          | 62,68          | 64,78          | 64,94          | 64,71             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [52,05; 61,55] | [54,89; 64,03] | [57,74; 66,96] | [57,90; 67,41] | [56,78; 66,62] | [57,61; 67,75] | [59,65; 69,90] | [59,77; 70,11] | [59,49; 69,93]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3188           | 2871           | 2579           | 2319           | 2120           | 1972           | 1834           | 1736           | 1650              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3188           | 2725           | 2446           | 2236           | 2063           | 1910           | 1791           | 1684           | 1594              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1172           | 1252           | 1223           | 1164           | 1117           | 1072           | 1033           | 983            | 962               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 332            | 383            | 380            | 364            | 360            | 347            | 331            | 331            | 323               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 28,33          | 30,59          | 31,07          | 31,27          | 32,23          | 32,37          | 32,04          | 33,67          | 33,58             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3188           | 2725           | 2446           | 2236           | 2063           | 1910           | 1791           | 1684           | 1594              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 261            | 290            | 270            | 257            | 259            | 255            | 243            | 236            | 235               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 137            | 165            | 163            | 154            | 160            | 154            | 144            | 148            | 142               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   | 52,49                  | 56,90          | 60,37          | 59,92          | 61,78          | 60,39          | 59,26          | 62,71          | 60,43          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [46,42; 58,56]         | [51,19; 62,61] | [54,53; 66,22] | [53,92; 65,93] | [55,85; 67,71] | [54,38; 66,41] | [53,07; 65,45] | [56,53; 68,89] | [54,16; 66,69] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2893           | 2495           | 2153           | 1904           | 1738           | 1605           | 1505           | 1412           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2891           | 2380           | 2058           | 1833           | 1683           | 1543           | 1444           | 1362           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1143           | 1121           | 1035           | 960            | 922            | 885            | 861            | 834            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 360            | 383            | 355            | 328            | 328            | 325            | 319            | 315            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 31,50          | 34,17          | 34,30          | 34,17          | 35,57          | 36,72          | 37,05          | 37,77          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [28,80; 34,19] | [31,39; 36,94] | [31,41; 37,19] | [31,16; 37,17] | [32,48; 38,67] | [33,55; 39,90] | [33,82; 40,28] | [34,48; 41,06] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2891           | 2380           | 2058           | 1832           | 1682           | 1542           | 1443           | 1361           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 251            | 262            | 238            | 229            | 221            | 217            | 212            | 212            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 163            | 172            | 156            | 147            | 148            | 147            | 148            | 142            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 64,94          | 65,65          | 65,55          | 64,19          | 66,97          | 67,74          | 69,81          | 66,98          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [59,03; 70,86] | [59,89; 71,41] | [59,50; 71,60] | [57,97; 70,42] | [60,75; 73,18] | [61,51; 73,98] | [63,62; 76,01] | [60,64; 73,33] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2099           | 1848           | 1615           | 1424           | 1290           | 1198           | 1124           | 1060           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2093           | 1770           | 1553           | 1363           | 1235           | 1147           | 1092           | 1013           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 781            | 769            | 730            | 687            | 659            | 625            | 608            | 586            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 253            | 252            | 244            | 236            | 228            | 223            | 218            | 218            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 32,39          | 32,77          | 33,42          | 34,35          | 34,60          | 35,68          | 35,86          | 37,20          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2095           | 1771           | 1554           | 1364           | 1236           | 1148           | 1092           | 1012           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 152            | 150            | 145            | 139            | 134            | 132            | 125            | 128            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 101            | 98             | 97             | 88             | 89             | 87             | 84             | 85             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   | 66,45                  | 65,33          | 66,90          | 63,31          | 66,42          | 65,91          | 67,20          | 66,41          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [58,92; 73,98]         | [57,69; 72,97] | [59,21; 74,58] | [55,27; 71,35] | [58,39; 74,44] | [57,79; 74,03] | [58,94; 75,46] | [58,19; 74,62] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3215           | 2781           | 2408           | 2143           | 1971           | 1823           | 1697           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3214           | 2675           | 2314           | 2079           | 1905           | 1766           | 1647           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1205           | 1176           | 1089           | 1004           | 961            | 912            | 865            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 375            | 354            | 332            | 310            | 307            | 297            | 283            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 31,12          | 30,10          | 30,49          | 30,88          | 31,95          | 32,57          | 32,72          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [28,51; 33,74] | [27,48; 32,72] | [27,75; 33,22] | [28,02; 33,74] | [29,00; 34,90] | [29,52; 35,61] | [29,59; 35,85] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3211           | 2671           | 2310           | 2075           | 1902           | 1763           | 1643           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 276            | 287            | 265            | 254            | 253            | 239            | 233            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 187            | 185            | 167            | 154            | 159            | 154            | 145            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 67,75          | 64,46          | 63,02          | 60,63          | 62,85          | 64,44          | 62,23          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [62,23; 73,28] | [58,91; 70,01] | [57,20; 68,84] | [54,61; 66,65] | [56,88; 68,81] | [58,35; 70,52] | [55,99; 68,47] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2420           | 2074           | 1813           | 1629           | 1496           | 1367           | 1268           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2419           | 1995           | 1741           | 1572           | 1433           | 1314           | 1222           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 855            | 820            | 781            | 733            | 691            | 651            | 618            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 275            | 259            | 239            | 236            | 222            | 216            | 207            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 32,16          | 31,59          | 30,60          | 32,20          | 32,13          | 33,18          | 33,50          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2415           | 1993           | 1739           | 1570           | 1431           | 1312           | 1219           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 168            | 163            | 161            | 150            | 140            | 138            | 139            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 103            | 90             | 94             | 83             | 77             | 81             | 86             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   | 61,31                  | 55,21          | 58,39          | 55,33          | 55,00          | 58,70          | 61,87          |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [53,92; 68,70]         | [47,56; 62,87] | [50,75; 66,02] | [47,35; 63,32] | [46,73; 63,27] | [50,45; 66,94] | [53,77; 69,97] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2729           | 2303           | 1970           | 1730           | 1565           | 1452           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2726           | 2218           | 1884           | 1664           | 1496           | 1394           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1022           | 984            | 899            | 834            | 795            | 759            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 307            | 282            | 255            | 239            | 240            | 231            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 30,04          | 28,66          | 28,36          | 28,66          | 30,19          | 30,43          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [27,23; 32,85] | [25,83; 31,49] | [25,42; 31,31] | [25,59; 31,73] | [27,00; 33,38] | [27,16; 33,71] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2729           | 2218           | 1885           | 1665           | 1497           | 1395           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 244            | 238            | 217            | 213            | 214            | 215            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 153            | 152            | 138            | 134            | 135            | 124            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 62,70          | 63,87          | 63,59          | 62,91          | 63,08          | 57,67          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [56,62; 68,79] | [57,75; 69,98] | [57,18; 70,01] | [56,41; 69,41] | [56,60; 69,56] | [51,05; 64,29] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2127           | 1839           | 1616           | 1458           | 1328           | 1245           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2125           | 1766           | 1542           | 1407           | 1280           | 1197           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 764            | 717            | 678            | 649            | 612            | 593            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 228            | 207            | 201            | 197            | 195            | 191            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 29,84          | 28,87          | 29,65          | 30,35          | 31,86          | 32,21          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2122           | 1765           | 1540           | 1405           | 1277           | 1194           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 139            | 142            | 139            | 139            | 130            | 125            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 85             | 84             | 87             | 88             | 83             | 81             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   | 61,15                  | 59,15          | 62,59          | 63,31          | 63,85          | 64,80          |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [53,02; 69,28]         | [51,04; 67,27] | [54,52; 70,66] | [55,27; 71,35] | [55,56; 72,14] | [56,39; 73,21] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2010-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3025           | 2538           | 2206           | 1972           | 1813           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3024           | 2441           | 2123           | 1912           | 1756           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1167           | 1063           | 979            | 939            | 902            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 364            | 344            | 322            | 315            | 300            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 31,19          | 32,36          | 32,89          | 33,55          | 33,26          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [28,53; 33,85] | [29,55; 35,18] | [29,95; 35,84] | [30,52; 36,57] | [30,18; 36,34] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3022           | 2440           | 2123           | 1910           | 1754           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 261            | 248            | 232            | 219            | 211            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 157            | 148            | 136            | 128            | 128            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 60,15          | 59,68          | 58,62          | 58,45          | 60,66          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [54,20; 66,10] | [53,56; 65,80] | [52,27; 64,97] | [51,91; 64,99] | [54,06; 67,27] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2174           | 1850           | 1591           | 1428           | 1299           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2172           | 1783           | 1534           | 1376           | 1249           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 745            | 694            | 633            | 611            | 596            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 220            | 185            | 167            | 165            | 152            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | Anteil in %            | 29,53          | 26,66          | 26,38          | 27,00          | 25,50          |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2172           | 1784           | 1535           | 1378           | 1251           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 133            | 131            | 121            | 122            | 122            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 76             | 67             | 68             | 70             | 72             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %    |   | 57,14                  | 51,15          | 56,20          | 57,38          | 59,02          |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in % |   | [48,70; 65,59]         | [42,55; 59,74] | [47,32; 65,08] | [48,57; 66,19] | [50,25; 67,78] |                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3086           | 2626           | 2248           | 2023           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3086           | 2543           | 2167           | 1947           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1198           | 1115           | 1026           | 975            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 365            | 349            | 325            | 319            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 30,47          | 31,30          | 31,68          | 32,72          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [27,86; 33,07] | [28,58; 34,02] | [28,83; 34,52] | [29,77; 35,66] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3086           | 2543           | 2167           | 1947           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 269            | 254            | 243            | 230            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 175            | 156            | 144            | 132            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 65,06          | 61,42          | 59,26          | 57,39          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [59,35; 70,76] | [55,42; 67,42] | [53,07; 65,45] | [50,99; 63,80] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2312           | 2021           | 1768           | 1574           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2311           | 1962           | 1707           | 1526           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 856            | 809            | 763            | 723            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 270            | 251            | 245            | 241            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 31,54          | 31,03          | 32,11          | 33,33          |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2311           | 1962           | 1707           | 1526           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 150            | 147            | 138            | 134            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 89             | 87             | 81             | 77             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %    |   | 59,33                  | 59,18          | 58,70          | 57,46          |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in % |   | [51,45; 67,22]         | [51,21; 67,16] | [50,45; 66,94] | [49,06; 65,87] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ             | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1         | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3146           | 2666           | 2269           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3142           | 2572           | 2173           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1248           | 1157           | 1020           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 393            | 351            | 333            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 31,49          | 30,34          | 32,65          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [28,91; 34,07] | [27,69; 32,99] | [29,77; 35,53] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3142           | 2572           | 2173           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 265            | 235            | 221            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 162            | 143            | 134            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 61,13          | 60,85          | 60,63          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [55,25; 67,01] | [54,60; 67,10] | [54,18; 67,09] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2382           | 2091           | 1809           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2381           | 2041           | 1753           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 854            | 821            | 756            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 259            | 257            | 236            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | Anteil in %            | 30,33          | 31,30          | 31,22          |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                |   | CI Anteil in %         | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2379           | 2039           | 1751           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 156            | 162            | 153            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 95             | 99             | 96             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %    |   | 60,90                  | 61,11          | 62,75          |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in % |   | [53,22; 68,58]         | [53,58; 68,64] | [55,06; 70,43] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-2   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3031              | 2602              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3030              | 2482              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1163              | 1107              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 341               | 327               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 29,32             | 29,54             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [26,70;<br>31,94] | [26,85;<br>32,23] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3030              | 2483              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 271               | 265               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 182               | 180               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 67,16             | 67,92             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [61,56;<br>72,76] | [62,29;<br>73,56] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2272              | 1963              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2268              | 1870              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 791               | 756               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 222               | 216               |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 28,07             | 28,57             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [0,00;<br>100,00] | [0,00;<br>100,00] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 2267              | 1868              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern | Anzahl  | 145                    | 138               |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                            | Anzahl  | 98                     | 94                |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %   | 67,59                  | 68,12             |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %  | [59,94;<br>75,23]      | [60,31;<br>75,92] |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Patienten und ihre Medikation mit Statinen und Thrombozyten-Aggregationshemmern | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3423              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 3422              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 1281              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 394               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 30,76             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [28,23;<br>33,29] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)                  | Anzahl                 | 3419              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern      | Anzahl                 | 265               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                                 | Anzahl                 | 188               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 70,94             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [65,47;<br>76,42] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2494              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar (für Statin-Therapie)  | Anzahl                 | 2493              |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | potenzielle Indikation* für Statin-Therapie                                     | Anzahl                 | 871               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Behandlung mit Statinen   | Anzahl                 | 285               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | Anteil in %            | 32,72             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |   | CI Anteil in %         | [0,00;<br>100,00] |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| auswertbar (für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern)             | Anzahl  | 2493                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| potenzielle Indikation** für Therapie mit Thrombozyten-Aggregationshemmern | Anzahl  | 167                    |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Behandlung mit Thrombozyten-Aggregationshemmern                            | Anzahl  | 104                    |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | Anteil in %   | 62,28                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI Anteil in %  | [54,90;<br>69,65]      |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

### 3.4 Prozessparameter

Zur Erhöhung der Lebensqualität der Patienten sowie zur Erhaltung ihrer Autonomie ist eine Schulung über die Ursachen, Auswirkungen und Therapiemodalitäten eines Diabetes mellitus empfehlenswert. Zum einen, weil hierdurch oftmals bei den Diabetikern dauerhafte Verhaltens- und Verhältnisänderungen in den Bereichen Ernährung und Bewegung eingeleitet werden können, die positive Effekte auf den Krankheitsverlauf ausüben. Zum anderen aber auch, weil vor allem bei der Insulintherapie eine kontinuierliche Kontrolle der verzehrten Lebensmittel (Broteinheiten) sowie der zu injizierenden Insulinmenge durch wiederholte Blutzuckerselbstmessungen erfolgen muss. Hierzu ist ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit der Betroffenen erforderlich, welches u.a. in den Schulungen intensiv erlernt wird.

Gefürchtete Langzeitkomplikationen des Diabetes bestehen in der Schädigung von kleinen Gefäßen (sog. Mikroangiopathien). Betroffen sind grundsätzlich alle Gefäße, besonders gravierend sind jedoch Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retina) des Auges mit der Gefahr der Erblindung, der Nieren mit der Gefahr des Nierenversagens sowie des Herzens mit der Gefahr des Herzinfarktes.

In der Tabelle 3.4.1 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlenen Diabetes-Schulung** teilgenommen haben, aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten* - also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zunächst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar)“ die auswertbaren Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Diabetesschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Diabetesschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.



**Tabelle 3.4.1 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen**

\* Auswertbar sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-halb-jahr | 2. Halb-jahr   | 3. Halb-jahr   | 4. Halb-jahr   | 5. Halb-jahr   | 6. Halb-jahr   | 7. Halb-jahr    | 8. Halb-jahr    | 9. Halb-jahr    | 10. Halb-jahr   | 11. Halb-jahr   | 12. Halb-jahr   | 13. Halb-jahr    | 14. Halb-jahr    | 15. Halb-jahr    |                 |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              |                | 81             | 56             | 45             | 34             | 33              | 27              | 19              | 20              | 13              | 37              | 142              | 139              | 136              | 129             |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              |                | 42             | 23             | 22             | 22             | 19              | 22              | 16              | 17              | 11              | 36              | 142              | 139              | 136              | 128             |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 51,85          | 41,07          | 48,89          | 64,71          | 57,58           | 81,48           | 84,21           | 85,00           | 84,62           | 97,30           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 99,22           |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [40,90; 62,80] | [28,07; 54,07] | [34,12; 63,66] | [48,40; 81,01] | [40,45; 74,70]  | [66,55; 96,41]  | [67,36; 100,00] | [68,94; 100,00] | [64,20; 100,00] | [92,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [97,71; 100,00] |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              |                | 6              | 7              | 7              | 5              | 6               | 0               | 0               | 0               | 0               | 1               | 0                | 0                | 0                | 0               |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 7,41           | 12,50          | 15,56          | 14,71          | 18,18           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,70            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [1,67; 13,15]  | [3,76; 21,24]  | [4,85; 26,26]  | [2,62; 26,79]  | [4,82; 31,55]   | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 8,00]    | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl              |                | 33             | 26             | 16             | 7              | 8               | 5               | 3               | 3               | 2               | 0               | 0                | 0                | 0                | 1               |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 40,74          | 46,43          | 35,56          | 20,59          | 24,24           | 18,52           | 15,79           | 15,00           | 15,38           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,78            |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [29,97; 51,51] | [33,25; 59,61] | [21,41; 49,70] | [6,79; 34,38]  | [9,39; 39,09]   | [3,59; 33,45]   | [0,00; 32,64]   | [0,00; 31,06]   | [0,00; 35,80]   | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 2,29]    |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>       | <i>342</i>     | <i>318</i>     | <i>277</i>     | <i>242</i>     | <i>220</i>     | <i>207</i>      | <i>194</i>      | <i>186</i>      | <i>176</i>      | <i>172</i>      | <i>167</i>      | <i>159</i>       | <i>152</i>       | <i>147</i>       | <i>141</i>      |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              |                | 68             | 39             | 32             | 22             | 14              | 12              | 17              | 15              | 13              | 50              | 126              | 124              | 113              | 113             |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              |                | 21             | 16             | 15             | 17             | 11              | 11              | 16              | 14              | 9               | 47              | 126              | 124              | 113              | 112             |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 30,88          | 41,03          | 46,88          | 77,27          | 78,57           | 91,67           | 94,12           | 93,33           | 69,23           | 94,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 99,12           |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [19,82; 41,95] | [25,39; 56,67] | [29,31; 64,44] | [59,35; 95,20] | [56,27; 100,00] | [75,33; 100,00] | [82,59; 100,00] | [80,27; 100,00] | [43,12; 95,34]  | [87,35; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [97,38; 100,00] |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              |                | 9              | 3              | 2              | 0              | 0               | 0               | 0               | 1               | 0               | 2               | 0                | 0                | 0                | 1               |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 13,24          | 7,69           | 6,25           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6,67            | 0,00            | 4,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,88            |
| CI Anteil in %                       |   |                     | [5,12; 21,35]  | [0,00; 16,16]  | [0,00; 14,77]  | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 19,73]   | [0,00; 0,00]    | [0,00; 9,49]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 2,62]     |                 |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  |                     | 38             | 20             | 15             | 5              | 3              | 1               | 1               | 0               | 4               | 1               | 0               | 0                | 0                | 0                |                 |
|                                      | Anteil in %   |                     | 55,88          | 51,28          | 46,88          | 22,73          | 21,43          | 8,33            | 5,88            | 0,00            | 30,77           | 2,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                 |
|                                      | CI Anteil in %  |                     | [43,99; 67,77] | [35,39; 67,17] | [29,31; 64,44] | [4,80; 40,65]  | [0,00; 43,73]  | [0,00; 24,67]   | [0,00; 17,41]   | [0,00; 0,00]    | [4,66; 56,88]   | [0,00; 5,92]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     |                 |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>292</i>          | <i>281</i>     | <i>246</i>     | <i>214</i>     | <i>195</i>     | <i>183</i>     | <i>174</i>      | <i>167</i>      | <i>160</i>      | <i>151</i>      | <i>145</i>      | <i>141</i>      | <i>139</i>       | <i>136</i>       | <i>129</i>       |                 |
| 2005-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              |                | 476            | 319            | 227            | 232            | 215             | 221             | 202             | 169             | 190             | 181             | 190              | 171              | 159              |                 |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              |                | 301            | 210            | 153            | 155            | 161             | 117             | 127             | 114             | 124             | 137             | 153              | 147              | 142              |                 |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 63,24          | 65,83          | 67,40          | 66,81          | 74,88           | 52,94           | 62,87           | 67,46           | 65,26           | 75,69           | 80,53            | 85,96            | 89,31            |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [58,90; 67,57] | [60,62; 71,04] | [61,29; 73,51] | [60,74; 72,88] | [69,07; 80,69]  | [46,35; 59,54]  | [56,19; 69,55]  | [60,37; 74,54]  | [58,47; 72,05]  | [69,42; 81,96]  | [74,88; 86,17]   | [80,74; 91,19]   | [84,49; 94,13]   |                 |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              |                | 124            | 74             | 60             | 60             | 45              | 60              | 45              | 38              | 51              | 39              | 31               | 22               | 14               |                 |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 26,05          | 23,20          | 26,43          | 25,86          | 20,93           | 27,15           | 22,28           | 22,49           | 26,84           | 21,55           | 16,32            | 12,87            | 8,81             |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [22,10; 30,00] | [18,56; 27,84] | [20,68; 32,18] | [20,22; 31,51] | [15,48; 26,38]  | [21,27; 33,03]  | [16,52; 28,03]  | [16,17; 28,80]  | [20,52; 33,16]  | [15,54; 27,55]  | [11,05; 21,58]   | [7,83; 17,90]    | [4,39; 13,22]    |                 |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl              |                | 51             | 35             | 14             | 17             | 9               | 44              | 30              | 17              | 15              | 5               | 6                | 2                | 3                |                 |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 10,71          | 10,97          | 6,17           | 7,33           | 4,19            | 19,91           | 14,85           | 10,06           | 7,89            | 2,76            | 3,16             | 1,17             | 1,89             |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [7,93; 13,50]  | [7,54; 14,41]  | [3,03; 9,30]   | [3,97; 10,69]  | [1,50; 6,87]    | [14,63; 25,19]  | [9,94; 19,77]   | [5,51; 14,61]   | [4,05; 11,74]   | [0,37; 5,16]    | [0,66; 5,65]     | [0,00; 2,79]     | [0,00; 4,01]     |                 |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>       | <i>2287</i>    | <i>2094</i>    | <i>1857</i>    | <i>1690</i>    | <i>1582</i>    | <i>1510</i>     | <i>1432</i>     | <i>1368</i>     | <i>1309</i>     | <i>1254</i>     | <i>1185</i>     | <i>1153</i>      | <i>1103</i>      | <i>1050</i>      |                 |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              |                | 335            | 220            | 186            | 179            | 152             | 180             | 163             | 140             | 128             | 158             | 148              | 146              | 141              |                 |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              |                | 207            | 139            | 128            | 124            | 112             | 112             | 110             | 102             | 91              | 133             | 127              | 127              | 114              |                 |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 61,79          | 63,18          | 68,82          | 69,27          | 73,68           | 62,22           | 67,48           | 72,86           | 71,09           | 84,18           | 85,81            | 86,99            | 80,85            |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                | [56,58; 67,00] | [56,79; 69,57] | [62,14; 75,49] | [62,50; 76,05] | [66,66; 80,71]  | [55,12; 69,32]  | [60,27; 74,70]  | [65,46; 80,25]  | [63,21; 78,98]  | [78,47; 89,89]  | [80,17; 91,45]   | [81,51; 92,46]   | [74,33; 87,37]   |                 |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              |                | 84             | 52             | 43             | 42             | 32              | 29              | 23              | 24              | 24              | 16              | 20               | 11               | 20               |                 |
|                                      |   | Anteil in %         |                | 25,07          | 23,64          | 23,12          | 23,46          | 21,05           | 16,11           | 14,11           | 17,14           | 18,75           | 10,13           | 13,51            | 7,53             | 14,18            |                 |
| CI Anteil in %                       |   |                     | [20,43; 29,72] | [18,01; 29,26] | [17,04; 29,19] | [17,24; 29,69] | [14,55; 27,56] | [10,73; 21,50]  | [8,75; 19,47]   | [10,88; 23,41]  | [11,96; 25,54]  | [5,41; 14,85]   | [7,99; 19,04]   | [3,24; 11,83]    | [8,41; 19,96]    |                  |                 |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  |                     | 44             | 29             | 15             | 13             | 8              | 39              | 30              | 14              | 13              | 9               | 1               | 8                | 7                |                  |                 |
|                                      | Anteil in %   |                     | 13,13          | 13,18          | 8,06           | 7,26           | 5,26           | 21,67           | 18,40           | 10,00           | 10,16           | 5,70            | 0,68            | 5,48             | 4,96             |                  |                 |
|                                      | CI Anteil in %  |                     | [9,51; 16,76]  | [8,70; 17,66]  | [4,14; 11,08]  | [3,45; 11,08]  | [1,70; 8,82]   | [15,63; 27,70]  | [12,44; 24,37]  | [5,01; 14,99]   | [4,90; 15,41]   | [2,07; 9,32]    | [0,00; 2,00]    | [1,78; 9,18]     | [1,37; 8,56]     |                  |                 |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1772</i>         | <i>1624</i>    | <i>1439</i>    | <i>1318</i>    | <i>1242</i>    | <i>1172</i>    | <i>1116</i>     | <i>1075</i>     | <i>1026</i>     | <i>966</i>      | <i>936</i>      | <i>903</i>      | <i>870</i>       | <i>839</i>       |                  |                 |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-halb-jahr | 2. Halb-jahr   | 3. Halb-jahr   | 4. Halb-jahr   | 5. Halb-jahr   | 6. Halb-jahr   | 7. Halb-jahr   | 8. Halb-jahr   | 9. Halb-jahr   | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr  | 13. Halb-jahr  | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 2006-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              | 555            | 299            | 234            | 215            | 265            | 200            | 183            | 187            | 190            | 183            | 180            | 163            |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              | 398            | 239            | 194            | 176            | 156            | 134            | 136            | 145            | 157            | 157            | 142            | 140            |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 71,71          | 79,93          | 82,91          | 81,86          | 58,87          | 67,00          | 74,32          | 77,54          | 82,63          | 85,79          | 78,89          | 85,89          |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [67,96; 75,46] | [75,39; 84,48] | [78,07; 87,74] | [76,70; 87,02] | [52,93; 64,80] | [60,47; 73,53] | [67,97; 80,66] | [71,54; 83,54] | [77,23; 88,03] | [80,72; 90,86] | [72,91; 84,87] | [80,53; 91,25] |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              | 106            | 39             | 21             | 17             | 21             | 22             | 20             | 16             | 13             | 12             | 18             | 11             |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 19,10          | 13,04          | 8,97           | 7,91           | 7,92           | 11,00          | 10,93          | 8,56           | 6,84           | 6,56           | 10,00          | 6,75           |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [15,83; 22,37] | [9,22; 16,87]  | [5,30; 12,64]  | [4,29; 11,52]  | [4,67; 11,18]  | [6,65; 15,35]  | [6,40; 15,46]  | [4,54; 12,58]  | [3,24; 10,44]  | [2,96; 10,15]  | [5,61; 14,39]  | [2,89; 10,61]  |               |               |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl              | 51             | 21             | 19             | 22             | 88             | 44             | 27             | 26             | 20             | 14             | 20             | 12             |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 9,19           | 7,02           | 8,12           | 10,23          | 33,21          | 22,00          | 14,75          | 13,90          | 10,53          | 7,65           | 11,11          | 7,36           |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [6,78; 11,59]  | [4,12; 9,92]   | [4,61; 11,63]  | [6,17; 14,29]  | [27,53; 38,89] | [16,24; 27,76] | [9,60; 19,91]  | [8,93; 18,88]  | [6,15; 14,90]  | [3,79; 11,51]  | [6,51; 15,72]  | [3,34; 11,38]  |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>       | <i>2245</i>    | <i>2019</i>    | <i>1756</i>    | <i>1611</i>    | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>    |               |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              | 432            | 238            | 192            | 154            | 207            | 142            | 115            | 131            | 137            | 127            | 130            | 105            |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              | 323            | 187            | 159            | 135            | 124            | 88             | 82             | 94             | 104            | 96             | 89             | 83             |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 74,77          | 78,57          | 82,81          | 87,66          | 59,90          | 61,97          | 71,30          | 71,76          | 75,91          | 75,59          | 68,46          | 79,05          |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [70,67; 78,87] | [73,35; 83,80] | [77,46; 88,16] | [82,45; 92,87] | [53,21; 66,60] | [53,96; 69,98] | [63,00; 79,61] | [64,02; 79,49] | [68,73; 83,10] | [68,09; 83,09] | [60,44; 76,48] | [71,23; 86,87] |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              | 75             | 35             | 22             | 11             | 25             | 19             | 12             | 18             | 12             | 12             | 19             | 11             |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 17,36          | 14,71          | 11,46          | 7,14           | 12,08          | 13,38          | 10,43          | 13,74          | 8,76           | 9,45           | 14,62          | 10,48          |               |               |  |
| CI Anteil in %                       |   | [13,79; 20,94]      | [10,20; 19,21] | [6,94; 15,98]  | [3,06; 11,22]  | [7,63; 16,53]  | [7,76; 19,00]  | [4,82; 16,05]  | [7,82; 19,66]  | [4,01; 13,51]  | [4,34; 14,56]  | [8,52; 20,71]  | [4,59; 16,36]  |                |               |               |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 34                  | 16             | 11             | 8              | 58             | 35             | 21             | 19             | 21             | 19             | 22             | 11             |                |               |               |  |
|                                      | Anteil in %   | 7,87                | 6,72           | 5,73           | 5,19           | 28,02          | 24,65          | 18,26          | 14,50          | 15,33          | 14,96          | 16,92          | 10,48          |                |               |               |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [5,33; 10,41]       | [3,53; 9,91]   | [2,43; 9,03]   | [1,68; 8,71]   | [21,89; 34,15] | [17,53; 31,76] | [11,17; 25,35] | [8,45; 20,56]  | [9,27; 21,38]  | [8,73; 21,19]  | [10,45; 23,39] | [4,59; 16,36]  |                |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1759</i>         | <i>1578</i>    | <i>1380</i>    | <i>1253</i>    | <i>1159</i>    | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     |               |               |  |
| 2006-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              | 771            | 401            | 324            | 359            | 288            | 238            | 240            | 254            | 231            | 218            | 206            |                |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              | 534            | 265            | 218            | 214            | 184            | 171            | 174            | 194            | 184            | 175            | 157            |                |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 69,26          | 66,08          | 67,28          | 59,61          | 63,89          | 71,85          | 72,50          | 76,38          | 79,65          | 80,28          | 76,21          |                |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [66,00; 72,52] | [61,45; 70,72] | [62,17; 72,40] | [54,53; 64,69] | [58,33; 69,45] | [66,12; 77,57] | [66,84; 78,16] | [71,14; 81,61] | [74,45; 84,86] | [74,98; 85,57] | [70,39; 82,04] |                |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              | 154            | 78             | 60             | 72             | 63             | 42             | 42             | 39             | 32             | 32             | 36             |                |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 19,97          | 19,45          | 18,52          | 20,06          | 21,88          | 17,65          | 17,50          | 15,35          | 13,85          | 14,68          | 17,48          |                |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [17,15; 22,80] | [15,57; 23,33] | [14,28; 22,75] | [15,91; 24,20] | [17,09; 26,66] | [12,79; 22,50] | [12,68; 22,32] | [10,91; 19,80] | [9,39; 18,32]  | [9,97; 19,39]  | [12,28; 22,67] |                |               |               |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl              | 83             | 58             | 46             | 73             | 41             | 25             | 24             | 21             | 15             | 11             | 13             |                |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 10,77          | 14,46          | 14,20          | 20,33          | 14,24          | 10,50          | 10,00          | 8,27           | 6,49           | 5,05           | 6,31           |                |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [8,58; 12,95]  | [11,02; 17,91] | [10,39; 18,00] | [16,16; 24,50] | [10,19; 18,28] | [6,60; 14,41]  | [6,20; 13,80]  | [4,87; 11,66]  | [3,31; 9,68]   | [2,13; 7,96]   | [2,98; 9,64]   |                |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>       | <i>3054</i>    | <i>2707</i>    | <i>2393</i>    | <i>2179</i>    | <i>2052</i>    | <i>1924</i>    | <i>1796</i>    | <i>1691</i>    | <i>1605</i>    | <i>1506</i>    | <i>1434</i>    | <i>1366</i>    |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl              | 567            | 334            | 272            | 297            | 258            | 201            | 195            | 211            | 183            | 179            | 181            |                |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl              | 402            | 229            | 205            | 188            | 163            | 140            | 144            | 167            | 142            | 141            | 144            |                |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 70,90          | 68,56          | 75,37          | 63,30          | 63,18          | 69,65          | 73,85          | 79,15          | 77,60          | 78,77          | 79,56          |                |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %      | [67,16; 74,64] | [63,58; 73,55] | [70,24; 80,50] | [57,81; 68,79] | [57,28; 69,08] | [63,28; 76,02] | [67,66; 80,03] | [73,65; 84,64] | [71,54; 83,65] | [72,76; 84,78] | [73,67; 85,45] |                |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl              | 113            | 51             | 38             | 53             | 57             | 31             | 39             | 28             | 27             | 26             | 28             |                |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %         | 19,93          | 15,27          | 13,97          | 17,85          | 22,09          | 15,42          | 20,00          | 13,27          | 14,75          | 14,53          | 15,47          |                |               |               |  |
| CI Anteil in %                       |   | [16,64; 23,22]      | [11,41; 19,13] | [9,84; 18,10]  | [13,48; 22,21] | [17,02; 27,17] | [10,42; 20,43] | [14,37; 25,63] | [8,68; 17,86]  | [9,60; 19,91]  | [9,35; 19,70]  | [10,19; 20,75] |                |                |               |               |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 52                  | 54             | 29             | 56             | 38             | 30             | 12             | 16             | 14             | 12             | 9              |                |                |               |               |  |
|                                      | Anteil in %   | 9,17                | 16,17          | 10,66          | 18,86          | 14,73          | 14,93          | 6,15           | 7,58           | 7,65           | 6,70           | 4,97           |                |                |               |               |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [6,79; 11,55]       | [12,21; 20,12] | [6,99; 14,34]  | [14,40; 23,31] | [10,40; 19,06] | [9,99; 19,86]  | [2,77; 9,54]   | [4,00; 11,16]  | [3,79; 11,51]  | [3,03; 10,38]  | [1,80; 8,15]   |                |                |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2346</i>         | <i>2091</i>    | <i>1875</i>    | <i>1753</i>    | <i>1639</i>    | <i>1555</i>    | <i>1433</i>    | <i>1332</i>    | <i>1263</i>    | <i>1206</i>    | <i>1147</i>    | <i>1090</i>    |                |               |               |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2007-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 1645           | 936            | 980            | 809            | 669            | 683            | 664            | 668            | 622            | 520            |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 1161           | 654            | 655            | 547            | 440            | 449            | 463            | 417            | 385            | 363            |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 70,58          | 69,87          | 66,84          | 67,61          | 65,77          | 65,74          | 69,73          | 62,43          | 61,90          | 69,81          |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [68,37; 72,78] | [66,93; 72,81] | [63,89; 69,79] | [64,39; 70,84] | [62,17; 69,37] | [62,18; 69,30] | [66,23; 73,23] | [58,75; 66,10] | [58,08; 65,86] | [65,86; 73,76] |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 274            | 158            | 154            | 137            | 112            | 93             | 88             | 87             | 75             | 76             |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 16,66          | 16,88          | 15,71          | 16,93          | 16,74          | 13,62          | 13,25          | 13,02          | 12,06          | 14,62          |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [14,86; 18,46] | [14,48; 19,28] | [13,43; 17,99] | [14,35; 19,52] | [13,91; 19,57] | [11,04; 16,19] | [10,67; 15,83] | [10,47; 15,58] | [9,50; 14,62]  | [11,58; 17,65] |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl             | 210            | 124            | 171            | 125            | 117            | 113            | 141            | 113            | 164            | 162            | 81           |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 12,77          | 13,25          | 17,45          | 15,45          | 17,49          | 20,64          | 17,02          | 24,55          | 26,05          | 15,58          |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [11,15; 14,38] | [11,07; 15,42] | [15,07; 19,83] | [12,96; 17,94] | [14,61; 20,37] | [17,61; 23,68] | [14,16; 19,88] | [21,28; 27,82] | [22,59; 29,50] | [12,46; 18,70] |              |              |              |              |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>      | <i>6522</i>    | <i>5910</i>    | <i>5338</i>    | <i>4997</i>    | <i>4736</i>    | <i>4458</i>    | <i>4205</i>    | <i>4002</i>    | <i>3822</i>    | <i>3669</i>    | <i>3522</i>  |              |              |              |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 1328           | 800            | 905            | 698            | 585            | 569            | 559            | 525            | 530            | 448            |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 943            | 588            | 611            | 478            | 412            | 391            | 397            | 350            | 352            | 333            |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 71,01          | 73,50          | 67,51          | 68,48          | 70,43          | 68,72          | 71,02          | 66,67          | 66,42          | 74,33          |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [68,57; 73,45] | [70,44; 76,56] | [64,46; 70,57] | [65,03; 71,93] | [66,73; 74,13] | [64,90; 72,53] | [67,26; 74,78] | [62,63; 70,70] | [62,39; 70,44] | [70,28; 78,38] |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 213            | 114            | 143            | 112            | 67             | 69             | 59             | 49             | 59             | 49             |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 16,04          | 14,25          | 15,80          | 16,05          | 11,45          | 12,13          | 10,55          | 9,33           | 11,13          | 10,94          |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [14,06; 18,01] | [11,83; 16,67] | [13,42; 18,18] | [13,32; 18,77] | [8,87; 14,04]  | [9,44; 14,81]  | [8,01; 13,10]  | [6,84; 11,82]  | [8,45; 13,81]  | [8,04; 13,83]  |              |              |              |              |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 172                | 98             | 151            | 108            | 106            | 109            | 103            | 126            | 119            | 66             |                |              |              |              |              |  |
|                                      | Anteil in %   | 12,95              | 12,25          | 16,69          | 15,47          | 18,12          | 19,16          | 18,43          | 24,00          | 22,45          | 14,73          |                |              |              |              |              |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [11,15; 14,76]     | [9,98; 14,52]  | [14,25; 19,12] | [12,79; 18,16] | [15,00; 21,24] | [15,92; 22,39] | [15,21; 21,64] | [20,34; 27,66] | [18,90; 26,01] | [11,45; 18,02] |                |              |              |              |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>5314</i>        | <i>4880</i>    | <i>4472</i>    | <i>4196</i>    | <i>3934</i>    | <i>3716</i>    | <i>3532</i>    | <i>3362</i>    | <i>3209</i>    | <i>3071</i>    | <i>2944</i>    |              |              |              |              |  |
| 2007-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 1139           | 716            | 561            | 477            | 396            | 386            | 362            | 353            | 304            |                |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 809            | 416            | 343            | 284            | 247            | 245            | 231            | 236            | 204            |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 71,03          | 58,10          | 61,14          | 59,54          | 62,37          | 63,47          | 63,81          | 66,86          | 67,11          |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [68,39; 73,66] | [54,48; 61,72] | [57,10; 65,18] | [55,13; 63,95] | [57,60; 67,15] | [58,66; 68,28] | [58,85; 68,77] | [61,94; 71,77] | [61,82; 72,40] |                |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 182            | 118            | 93             | 91             | 67             | 61             | 67             | 61             | 56             |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 15,98          | 16,48          | 16,58          | 19,08          | 16,92          | 15,80          | 18,51          | 17,28          | 18,42          |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [13,85; 18,11] | [13,76; 19,20] | [13,50; 19,66] | [15,55; 22,61] | [13,22; 20,62] | [12,16; 19,45] | [14,50; 22,51] | [13,33; 21,23] | [14,06; 22,79] |                |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl             | 148            | 182            | 125            | 102            | 82             | 80             | 64             | 56             | 44             |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 12,99          | 25,42          | 22,28          | 21,38          | 20,71          | 20,73          | 17,68          | 15,86          | 14,47          |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [11,04; 14,95] | [22,23; 28,61] | [18,83; 25,73] | [17,70; 25,07] | [16,71; 24,70] | [16,68; 24,77] | [13,74; 21,61] | [12,05; 19,68] | [10,51; 18,44] |                |              |              |              |              |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>      | <i>4414</i>    | <i>3892</i>    | <i>3512</i>    | <i>3195</i>    | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>    | <i>2141</i>    |              |              |              |              |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 837            | 522            | 420            | 356            | 299            | 327            | 290            | 277            | 243            |                |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 590            | 333            | 272            | 243            | 205            | 221            | 209            | 199            | 179            |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 70,49          | 63,79          | 64,76          | 68,26          | 68,56          | 67,58          | 72,07          | 71,84          | 73,66          |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [67,40; 73,58] | [59,67; 67,92] | [60,19; 69,34] | [63,42; 73,10] | [63,29; 73,83] | [62,50; 72,67] | [66,90; 77,24] | [66,53; 77,15] | [68,11; 79,21] |                |              |              |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 134            | 77             | 68             | 50             | 33             | 50             | 37             | 41             | 40             |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 16,01          | 14,75          | 16,19          | 14,04          | 11,04          | 15,29          | 12,76          | 14,80          | 16,46          |                |              |              |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [13,52; 18,50] | [11,71; 17,80] | [12,66; 19,72] | [10,43; 17,66] | [7,48; 14,59]  | [11,38; 19,20] | [8,91; 16,61]  | [10,61; 18,99] | [11,79; 21,13] |                |              |              |              |              |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 113                | 112            | 80             | 63             | 61             | 56             | 44             | 37             | 24             |                |                |              |              |              |              |  |
|                                      | Anteil in %   | 13,50              | 21,46          | 19,05          | 17,70          | 20,40          | 17,13          | 15,17          | 13,36          | 9,88           |                |                |              |              |              |              |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [11,18; 15,82]     | [17,93; 24,98] | [15,29; 22,81] | [13,73; 21,67] | [15,83; 24,98] | [13,04; 21,21] | [11,04; 19,31] | [9,34; 17,37]  | [6,12; 13,64]  |                |                |              |              |              |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3459</i>        | <i>3091</i>    | <i>2830</i>    | <i>2577</i>    | <i>2330</i>    | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>    |                |              |              |              |              |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2008-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 1131           | 565            | 407            | 385            | 387            | 380            | 313            | 311            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 766            | 362            | 256            | 261            | 257            | 229            | 206            | 217            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 67,73          | 64,07          | 62,90          | 67,79          | 66,41          | 60,26          | 65,81          | 69,77          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [65,00; 70,45] | [60,11; 68,03] | [58,20; 67,60] | [63,12; 72,47] | [61,70; 71,12] | [55,34; 65,19] | [60,55; 71,08] | [64,66; 74,89] |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 201            | 112            | 92             | 83             | 75             | 86             | 54             | 64             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 17,77          | 19,82          | 22,60          | 21,56          | 19,38          | 22,63          | 17,25          | 20,58          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [15,54; 20,00] | [16,53; 23,11] | [18,54; 26,67] | [17,45; 25,67] | [15,44; 23,32] | [18,42; 26,84] | [13,06; 21,44] | [16,08; 25,08] |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl             | 164            | 91             | 59             | 41             | 55             | 65             | 53             | 30             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 14,50          | 16,11          | 14,50          | 10,65          | 14,21          | 17,11          | 16,93          | 9,65           |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [12,45; 16,55] | [13,07; 19,14] | [11,07; 17,92] | [7,56; 13,73]  | [10,73; 17,70] | [13,31; 20,90] | [12,77; 21,09] | [6,36; 12,93]  |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>      | <i>4190</i>    | <i>3689</i>    | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>   |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 901            | 517            | 408            | 338            | 338            | 327            | 319            | 272            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 649            | 369            | 288            | 246            | 243            | 237            | 223            | 201            |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 72,03          | 71,37          | 70,59          | 72,78          | 71,89          | 72,48          | 69,91          | 73,90          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [69,10; 74,96] | [67,47; 75,27] | [66,16; 75,01] | [68,03; 77,53] | [67,09; 76,69] | [67,63; 77,33] | [64,86; 74,95] | [68,67; 79,13] |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 148            | 80             | 65             | 61             | 55             | 51             | 63             | 52             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 16,43          | 15,47          | 15,93          | 18,05          | 16,27          | 15,60          | 19,75          | 19,12          |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [14,01; 18,85] | [12,35; 18,59] | [12,38; 19,49] | [13,94; 22,15] | [12,33; 20,21] | [11,66; 19,53] | [15,37; 24,12] | [14,44; 23,80] |               |               |               |               |               |               |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 104                | 68             | 55             | 31             | 40             | 39             | 33             | 19             |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Anteil in %   | 11,54              | 13,15          | 13,48          | 9,17           | 11,83          | 11,93          | 10,34          | 6,99           |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [9,46; 13,63]      | [10,24; 16,07] | [10,16; 16,80] | [6,09; 12,25]  | [8,39; 15,28]  | [8,41; 15,44]  | [7,00; 13,69]  | [3,95; 10,02]  |                |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3188</i>        | <i>2871</i>    | <i>2579</i>    | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |               |               |               |               |               |               |  |
| 2008-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 778            | 397            | 292            | 262            | 234            | 221            | 208            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 528            | 257            | 175            | 176            | 164            | 155            | 148            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 67,87          | 64,74          | 59,93          | 67,18          | 70,09          | 70,14          | 71,15          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [64,58; 71,15] | [60,03; 69,44] | [54,30; 65,56] | [61,48; 72,87] | [64,21; 75,96] | [64,09; 76,18] | [64,98; 77,33] |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 153            | 77             | 66             | 45             | 34             | 35             | 37             |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 19,67          | 19,40          | 22,60          | 17,18          | 14,53          | 15,84          | 17,79          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [16,87; 22,46] | [15,50; 23,29] | [17,80; 27,41] | [12,60; 21,75] | [10,00; 19,05] | [11,01; 20,66] | [12,58; 23,00] |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl             | 97             | 63             | 51             | 41             | 36             | 31             | 23             |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 12,47          | 15,87          | 17,47          | 15,65          | 15,38          | 14,03          | 11,06          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [10,14; 14,79] | [12,27; 19,47] | [13,10; 21,83] | [11,24; 20,06] | [10,75; 20,02] | [9,44; 18,62]  | [6,79; 15,33]  |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>    | <i>2495</i>    | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             | 543            | 324            | 245            | 226            | 196            | 194            | 179            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             | 379            | 225            | 168            | 155            | 149            | 148            | 131            |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 69,80          | 69,44          | 68,57          | 68,58          | 76,02          | 76,29          | 73,18          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [65,93; 73,66] | [64,42; 74,47] | [62,75; 74,40] | [62,52; 74,65] | [70,03; 82,01] | [70,29; 82,29] | [66,68; 79,69] |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             | 84             | 50             | 40             | 41             | 25             | 26             | 23             |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        | 15,47          | 15,43          | 16,33          | 18,14          | 12,76          | 13,40          | 12,85          |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     | [12,43; 18,51] | [11,49; 19,37] | [11,69; 20,96] | [13,11; 23,18] | [8,07; 17,44]  | [8,60; 18,21]  | [7,93; 17,77]  |                |               |               |               |               |               |               |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 80                 | 49             | 37             | 30             | 22             | 20             | 25             |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Anteil in %   | 14,73              | 15,12          | 15,10          | 13,27          | 11,22          | 10,31          | 13,97          |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [11,75; 17,72]     | [11,22; 19,03] | [10,61; 19,59] | [8,84; 17,71]  | [6,79; 15,66]  | [6,02; 14,60]  | [8,87; 19,06]  |                |                |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2099</i>        | <i>1848</i>    | <i>1615</i>    | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 812               | 422               | 342               | 313               | 299               | 243               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 551               | 259               | 218               | 218               | 195               | 165               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 67,86             | 61,37             | 63,74             | 69,65             | 65,22             | 67,90             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [64,64;<br>71,07] | [56,72;<br>66,03] | [58,64;<br>68,85] | [64,55;<br>74,75] | [59,81;<br>70,63] | [62,02;<br>73,78] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 152               | 98                | 74                | 55                | 56                | 47                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 18,72             | 23,22             | 21,64             | 17,57             | 18,73             | 19,34             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [16,03;<br>21,40] | [19,19;<br>27,26] | [17,27;<br>26,01] | [13,35;<br>21,79] | [14,30;<br>23,16] | [14,37;<br>24,32] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 109               | 65                | 50                | 40                | 48                | 31                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 13,42             | 15,40             | 14,62             | 12,78             | 16,05             | 12,76             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [11,08;<br>15,77] | [11,95;<br>18,85] | [10,87;<br>18,37] | [9,07;<br>16,48]  | [11,89;<br>20,22] | [8,55;<br>16,96]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>          | <i>3215</i>       | <i>2781</i>       | <i>2408</i>       | <i>2143</i>       | <i>1971</i>       | <i>1823</i>       | <i>1697</i> |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 613               | 341               | 292               | 256               | 251               | 224               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 442               | 229               | 222               | 193               | 179               | 156               |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 72,10             | 67,16             | 76,03             | 75,39             | 71,31             | 69,64             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [68,55;<br>75,66] | [62,16;<br>72,15] | [71,12;<br>80,93] | [70,10;<br>80,68] | [65,71;<br>76,92] | [63,61;<br>75,68] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 119               | 67                | 40                | 39                | 47                | 46                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 19,41             | 19,65             | 13,70             | 15,23             | 18,73             | 20,54             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   | [16,28;<br>22,55]      | [15,42;<br>23,87] | [9,75;<br>17,65]  | [10,82;<br>19,65] | [13,89;<br>23,56] | [15,23;<br>25,84] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 52                     | 45                | 30                | 24                | 25                | 22                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 8,48                   | 13,20             | 10,27             | 9,38              | 9,96              | 9,82              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [6,28;<br>10,69]       | [9,60;<br>16,79]  | [6,79;<br>13,76]  | [5,80;<br>12,95]  | [6,25;<br>13,67]  | [5,92;<br>13,73]  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2420</i>            | <i>2074</i>       | <i>1813</i>       | <i>1629</i>       | <i>1496</i>       | <i>1367</i>       | <i>1268</i>       |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2009-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 705               | 379               | 303               | 263               | 219               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 517               | 274               | 229               | 205               | 168               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 73,33             | 72,30             | 75,58             | 77,95             | 76,71             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [70,07;<br>76,60] | [67,78;<br>76,81] | [70,73;<br>80,42] | [72,93;<br>82,97] | [71,10;<br>82,32] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 102               | 46                | 34                | 32                | 32                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 14,47             | 12,14             | 11,22             | 12,17             | 14,61             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [11,87;<br>17,07] | [8,85;<br>15,43]  | [7,66;<br>14,78]  | [8,21;<br>16,13]  | [9,92;<br>19,30]  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 86                | 59                | 40                | 26                | 19                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 12,20             | 15,57             | 13,20             | 9,89              | 8,68              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [9,78;<br>14,62]  | [11,91;<br>19,22] | [9,38;<br>17,02]  | [6,27;<br>13,50]  | [4,94;<br>12,41]  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>          | <i>2729</i>       | <i>2303</i>       | <i>1970</i>       | <i>1730</i>       | <i>1565</i>       | <i>1452</i>       |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 580               | 343               | 275               | 245               | 218               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 423               | 251               | 207               | 176               | 169               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 72,93             | 73,18             | 75,27             | 71,84             | 77,52             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [69,31;<br>76,55] | [68,48;<br>77,87] | [70,16;<br>80,38] | [66,19;<br>77,48] | [71,97;<br>83,08] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 93                | 42                | 33                | 43                | 31                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 16,03             | 12,24             | 12,00             | 17,55             | 14,22             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   | [13,05;<br>19,02]      | [8,77;<br>15,72]  | [8,15;<br>15,85]  | [12,78;<br>22,32] | [9,57;<br>18,87]  |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 64                     | 50                | 35                | 26                | 18                |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 11,03                  | 14,58             | 12,73             | 10,61             | 8,26              |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [8,48;<br>13,59]       | [10,84;<br>18,32] | [8,78;<br>16,67]  | [6,75;<br>14,48]  | [4,59;<br>11,92]  |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2127</i>            | <i>1839</i>       | <i>1616</i>       | <i>1458</i>       | <i>1328</i>       | <i>1245</i>       |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 |             | 837               | 437               | 349               | 315               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 |             | 641               | 329               | 262               | 251               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 76,58             | 75,29             | 75,07             | 79,68             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [73,71;<br>79,45] | [71,24;<br>79,33] | [70,53;<br>79,62] | [75,23;<br>84,13] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 |             | 114               | 60                | 49                | 41                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 13,62             | 13,73             | 14,04             | 13,02             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [11,29;<br>15,95] | [10,50;<br>16,96] | [10,39;<br>17,69] | [9,29;<br>16,74]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 |             | 82                | 48                | 38                | 23                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 9,80              | 10,98             | 10,89             | 7,30              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [7,78;<br>11,81]  | [8,05;<br>13,92]  | [7,62;<br>14,16]  | [4,42;<br>10,18]  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>          | <i>3025</i> | <i>2538</i>       | <i>2206</i>       | <i>1972</i>       | <i>1813</i>       |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 |             | 589               | 336               | 284               | 239               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 |             | 430               | 233               | 201               | 171               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 73,01             | 69,35             | 70,77             | 71,55             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [69,42;<br>76,59] | [64,41;<br>74,28] | [65,48;<br>76,07] | [65,82;<br>77,28] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 |             | 86                | 54                | 53                | 45                |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 14,60             | 16,07             | 18,66             | 18,83             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   |                        |             | [11,75;<br>17,46] | [12,14;<br>20,00] | [14,12;<br>23,20] | [13,86;<br>23,80] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  |                        | 73          | 49                | 30                | 23                |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   |                        |             | 12,39             | 14,58             | 10,56             | 9,62              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  |                        |             | [9,73;<br>15,06]  | [10,80;<br>18,36] | [6,98;<br>14,14]  | [5,88;<br>13,37]  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2174</i>            | <i>1850</i> | <i>1591</i>       | <i>1428</i>       | <i>1299</i>       |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 |             | 852               | 482               | 357               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 |             | 641               | 335               | 262               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 75,23             | 69,50             | 73,39             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [72,33;<br>78,13] | [65,39;<br>73,62] | [68,80;<br>77,98] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 |             | 122               | 83                | 61                |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 14,32             | 17,22             | 17,09             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [11,97;<br>16,67] | [13,85;<br>20,59] | [13,18;<br>21,00] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 |             | 89                | 64                | 34                |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 10,45             | 13,28             | 9,52              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [8,39;<br>12,50]  | [10,25;<br>16,31] | [6,47;<br>12,57]  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>          | <i>3086</i> | <i>2626</i>       | <i>2248</i>       | <i>2023</i>       |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 |             | 628               | 387               | 298               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 |             | 488               | 299               | 232               |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 77,71             | 77,26             | 77,85             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |                   | [74,45;<br>80,96] | [73,08;<br>81,44] | [73,13;<br>82,57] |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 |             | 90                | 53                | 42                |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |                   | 14,33             | 13,70             | 14,09             |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   |                        |             | [11,59;<br>17,07] | [10,27;<br>17,12] | [10,14;<br>18,05] |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  |                        | 50          | 35                | 24                |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   |                        |             | 7,96              | 9,04              | 8,05              |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  |                        |             | [5,84;<br>10,08]  | [6,18;<br>11,91]  | [4,96;<br>11,15]  |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2312</i>            | <i>2021</i> | <i>1768</i>       | <i>1574</i>       |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2011-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             |             | 850            | 440            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             |             | 664            | 328            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 78,12          | 74,55          |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [75,34; 80,90] | [70,47; 78,62] |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             |             | 106            | 73             |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 12,47          | 16,59          |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [10,25; 14,69] | [13,11; 20,07] |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl             |             | 80             | 39             |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 9,41           | 8,86           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [7,45; 11,38]  | [6,20; 11,52]  |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>      | <i>3146</i> | <i>2666</i>    | <i>2269</i>    |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             |             | 682            | 384            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             |             | 555            | 307            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 81,38          | 79,95          |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [78,45; 84,30] | [75,94; 83,96] |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             |             | 75             | 49             |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 11,00          | 12,76          |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI Anteil in %                       |   |                    |             | [8,65; 13,35]  | [9,42; 16,10]  |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  |                    | 52          | 28             |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Anteil in %   |                    |             | 7,62           | 7,29           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | CI Anteil in %  |                    |             | [5,63; 9,62]   | [4,69; 9,90]   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2382</i>        | <i>2091</i> | <i>1809</i>    |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2011-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             |             | 805            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             |             | 593            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 73,66          |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [70,62; 76,71] |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             |             | 155            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 19,25          |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [16,53; 21,98] |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl             |             | 57             |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 7,08           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [5,31; 8,85]   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>      | <i>3031</i> | <i>2602</i>    |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl             |             | 621            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl             |             | 477            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 76,81          |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |             |                | [73,49; 80,13] |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl             |             | 91             |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |             |                | 14,65          |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI Anteil in %                       |   |                    |             | [11,87; 17,44] |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  |                    | 53          |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | Anteil in %   |                    |             | 8,53           |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | CI Anteil in %  |                    |             | [6,34; 10,73]  |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2272</i>        | <i>1963</i> |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                  | <i>Anzahl</i>          | <i>3423</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2494</i>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



In der Tabelle 3.4.2 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlenen Hypertonie-Schulung** teilgenommen haben (oder aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten) oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten* - also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zunächst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar)“ die auswertbaren Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Hypertonieschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Hypertonieschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

**Tabelle 3.4.2 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen**

\* Auswertbar sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                 |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 68             | 44             | 32              | 23              | 16              | 14             | --             | --             | --                | --                | 12                | 11                | 10                | 14                |                 |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 8              | 4              | 4               | 2               | 2               | 2              | 3              | --             | --                | --                | --                | 8                 | 7                 | 7                 | 7               |
|                                      |   | Anteil in %            | 11,76          | 9,09           | 12,50           | 8,70            | 12,50           | 21,43          | --             | --             | --                | --                | --                | 66,67             | 63,64             | 70,00             | 50,00           |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [4,05; 19,48]  | [0,50; 17,68]  | [0,86; 24,14]   | [0,00; 20,47]   | [0,00; 29,24]   | [0,00; 43,73]  | --             | --             | --                | --                | --                | [38,81; 94,52]    | [33,82; 93,45]    | [40,06; 99,94]    | [22,82; 77,18]  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 6              | 6              | 3               | 2               | 2               | 3              | --             | --             | --                | --                | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 3               |
|                                      |   | Anteil in %            | 8,82           | 13,64          | 9,38            | 8,70            | 12,50           | 21,43          | --             | --             | --                | --                | --                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21,43           |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [2,03; 15,62]  | [3,38; 23,89]  | [0,00; 19,64]   | [0,00; 20,47]   | [0,00; 29,24]   | [0,00; 43,73]  | --             | --             | --                | --                | --                | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 43,73]   |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 54             | 34             | 25              | 19              | 12              | 8              | --             | --             | --                | --                | --                | 4                 | 4                 | 3                 | 4               |
|                                      |   | Anteil in %            | 79,41          | 77,27          | 78,13           | 82,61           | 75,00           | 57,14          | --             | --             | --                | --                | --                | 33,33             | 36,36             | 30,00             | 28,57           |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [69,73; 89,09] | [64,75; 89,80] | [63,57; 92,68]  | [66,77; 98,45]  | [53,09; 96,91]  | [30,24; 84,04] | --             | --             | --                | --                | --                | [5,48; 61,19]     | [6,55; 66,18]     | [0,06; 59,94]     | [4,01; 53,13]   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>342</i>     | <i>318</i>     | <i>277</i>      | <i>242</i>      | <i>220</i>      | <i>207</i>     | <i>194</i>     | <i>--</i>      | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>159</i>        | <i>152</i>        | <i>147</i>        | <i>141</i>      |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 54             | 28             | 24              | 12              | 7               | 6              | 6              | --             | --                | --                | --                | 4                 | 7                 | 5                 | 4               |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 5              | 4              | 2               | 2               | 1               | 1              | 1              | --             | --                | --                | --                | 3                 | 4                 | 4                 | 3               |
|                                      |   | Anteil in %            | 9,26           | 14,29          | 8,33            | 16,67           | 14,29           | 16,67          | --             | --             | --                | --                | --                | 75,00             | 57,14             | 80,00             | 75,00           |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [1,46; 17,06]  | [1,09; 27,49]  | [0,00; 19,63]   | [0,00; 38,69]   | [0,00; 42,29]   | [0,00; 49,33]  | --             | --             | --                | --                | --                | [26,00; 100,00]   | [17,54; 96,74]    | [40,80; 100,00]   | [26,00; 100,00] |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 3              | 2              | 3               | 0               | 0               | 1              | --             | --             | --                | --                | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
|                                      |   | Anteil in %            | 5,56           | 7,14           | 12,50           | 0,00            | 0,00            | 16,67          | --             | --             | --                | --                | --                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [0,00; 11,72]  | [0,00; 16,86]  | [0,00; 26,02]   | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 49,33]  | --             | --             | --                | --                | --                | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]    |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 46             | 22             | 19              | 10              | 6               | 4              | 4              | --             | --                | --                | --                | 1                 | 3                 | 1                 | 1               |
|                                      |   | Anteil in %            | 85,19          | 78,57          | 79,17           | 83,33           | 85,71           | 66,67          | --             | --             | --                | --                | --                | 25,00             | 42,86             | 20,00             | 25,00           |
| CI Anteil in %                       |   | [75,62; 94,75]         | [63,09; 94,05] | [62,57; 95,76] | [61,31; 100,00] | [57,71; 100,00] | [25,35; 100,00] | --             | --             | --             | --                | --                | [0,00; 74,00]     | [3,26; 82,46]     | [0,00; 59,20]     | [0,00; 74,00]     |                 |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>292</i>             | <i>281</i>     | <i>246</i>     | <i>214</i>      | <i>195</i>      | <i>183</i>      | <i>174</i>     | <i>--</i>      | <i>--</i>      | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>141</i>        | <i>139</i>        | <i>136</i>        | <i>129</i>        |                 |
| 2005-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 258            | 168            | 98              | 105             | 95              | 131            | 106            | 88             | 83                | 59                | 55                | 57                | 62                |                   |                 |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 91             | 64             | 47              | 45              | 51              | 38             | 35             | 35             | 35                | 39                | 34                | 35                | 33                | 42                |                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 35,27          | 38,10          | 47,96           | 42,86           | 53,68           | 29,01          | 33,02          | 39,77          | 46,99             | 57,63             | 63,64             | 57,89             | 67,74             |                   |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [29,43; 41,11] | [30,73; 45,46] | [38,02; 57,90]  | [33,35; 52,37]  | [43,60; 63,76]  | [21,21; 36,81] | [24,02; 42,01] | [29,49; 50,06] | [36,19; 57,79]    | [44,91; 70,34]    | [50,81; 76,47]    | [44,96; 70,83]    | [56,01; 79,47]    |                   |                 |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 54             | 37             | 31              | 24              | 20              | 40             | 34             | 31             | 24                | 24                | 16                | 22                | 17                |                   |                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 20,93          | 22,02          | 31,63           | 22,86           | 21,05           | 30,53          | 32,08          | 35,23          | 28,92             | 37,29             | 29,09             | 38,60             | 27,42             |                   |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [15,96; 25,90] | [15,74; 28,31] | [22,38; 40,89]  | [14,79; 30,93]  | [12,81; 29,29]  | [22,62; 38,45] | [23,15; 41,00] | [25,19; 45,26] | [19,10; 38,73]    | [24,84; 49,73]    | [16,98; 41,20]    | [25,85; 51,35]    | [16,22; 38,61]    |                   |                 |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 113            | 67             | 20              | 36              | 24              | 53             | 37             | 22             | 20                | 3                 | 4                 | 2                 | 3                 |                   |                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 43,80          | 39,88          | 20,41           | 34,29           | 25,26           | 40,46          | 34,91          | 25,00          | 24,10             | 5,08              | 7,27              | 3,51              | 4,84              |                   |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [37,73; 49,86] | [32,45; 47,31] | [12,39; 28,43]  | [25,16; 43,41]  | [16,48; 34,05]  | [32,02; 48,90] | [25,79; 44,02] | [15,90; 34,10] | [14,84; 33,35]    | [0,00; 10,74]     | [0,35; 14,20]     | [0,00; 8,33]      | [0,00; 10,22]     |                   |                 |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>2287</i>    | <i>2094</i>    | <i>1857</i>     | <i>1690</i>     | <i>1582</i>     | <i>1510</i>    | <i>1432</i>    | <i>1368</i>    | <i>1309</i>       | <i>1254</i>       | <i>1185</i>       | <i>1153</i>       | <i>1103</i>       | <i>1050</i>       |                 |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 166            | 105            | 81              | 83              | 65              | 106            | 88             | 58             | 50                | 45                | 30                | 50                | 47                |                   |                 |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 55             | 38             | 39              | 41              | 33              | 24             | 29             | 19             | 24                | 26                | 20                | 30                | 25                |                   |                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 33,13          | 36,19          | 48,15           | 49,40           | 50,77           | 22,64          | 32,95          | 32,76          | 48,00             | 57,78             | 66,67             | 60,00             | 53,19             |                   |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [25,95; 40,31] | [26,95; 45,43] | [37,20; 59,10]  | [38,58; 60,22]  | [38,52; 63,02]  | [14,64; 30,65] | [23,08; 42,83] | [20,57; 44,94] | [34,01; 61,99]    | [43,18; 72,37]    | [49,51; 83,82]    | [46,28; 73,72]    | [38,77; 67,61]    |                   |                 |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 40             | 22             | 14              | 9               | 12              | 28             | 23             | 19             | 13                | 16                | 10                | 17                | 16                |                   |                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 24,10          | 20,95          | 17,28           | 10,84           | 18,46           | 26,42          | 26,14          | 32,76          | 26,00             | 35,56             | 33,33             | 34,00             | 34,04             |                   |                 |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [17,57; 30,62] | [13,13; 28,77] | [9,00; 25,57]   | [4,11; 17,57]   | [8,96; 27,97]   | [17,98; 34,85] | [16,90; 35,37] | [20,57; 44,94] | [13,72; 38,28]    | [21,41; 49,70]    | [16,18; 50,49]    | [20,74; 47,26]    | [20,35; 47,74]    |                   |                 |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 71             | 45             | 28              | 33              | 20              | 54             | 36             | 20             | 13                | 3                 | 0                 | 3                 | 6                 |                   |                 |
|                                      |   | Anteil in %            | 42,77          | 42,86          | 34,57           | 39,76           | 30,77           | 50,94          | 40,91          | 34,48          | 26,00             | 6,67              | 0,00              | 6,00              | 12,77             |                   |                 |
| CI Anteil in %                       |   | [35,22; 50,32]         | [33,35; 52,37] | [24,15; 44,99] | [29,17; 50,35]  | [19,46; 42,08]  | [41,38; 60,51]  | [30,58; 51,24] | [22,14; 46,82] | [13,72; 38,28] | [0,00; 14,04]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 12,65]     | [3,12; 22,41]     |                   |                   |                 |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1772</i>            | <i>1624</i>    | <i>1439</i>    | <i>1318</i>     | <i>1242</i>     | <i>1172</i>     | <i>1116</i>    | <i>1075</i>    | <i>1026</i>    | <i>966</i>        | <i>936</i>        | <i>903</i>        | <i>870</i>        | <i>839</i>        |                   |                 |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 2006-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 209            | 131            | 89             | 74             | 208            | 133            | 125            | 118            | 107            | 95             | 89             | 75             |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 54             | 38             | 29             | 22             | 21             | 15             | 20             | 23             | 27             | 28             | 25             | 29             |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 25,84          | 29,01          | 32,58          | 29,73          | 10,10          | 11,28          | 16,00          | 19,49          | 25,23          | 29,47          | 28,09          | 38,67          |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [19,89; 31,79] | [21,21; 36,81] | [22,79; 42,38] | [19,24; 40,21] | [5,99; 14,20]  | [5,88; 16,67]  | [9,55; 22,45]  | [12,31; 26,67] | [16,96; 33,50] | [20,26; 38,69] | [18,70; 37,48] | [27,57; 49,76] |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 41             | 32             | 14             | 14             | 17             | 13             | 16             | 9              | 7              | 11             | 12             | 6              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 19,62          | 24,43          | 15,73          | 18,92          | 8,17           | 9,77           | 12,80          | 7,63           | 6,54           | 11,58          | 13,48          | 8,00           |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [14,22; 25,01] | [17,04; 31,81] | [8,12; 23,34]  | [9,93; 27,90]  | [4,44; 11,91]  | [4,71; 14,84]  | [6,92; 18,68]  | [2,82; 12,44]  | [1,83; 11,25]  | [5,11; 18,05]  | [6,35; 20,62]  | [1,82; 14,18]  |              |              |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 114            | 61             | 46             | 38             | 170            | 105            | 89             | 86             | 73             | 56             | 52             | 40             |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 54,55          | 46,56          | 51,69          | 51,35          | 81,73          | 78,95          | 71,20          | 72,88          | 68,22          | 58,95          | 58,43          | 53,33          |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [47,78; 61,31] | [37,99; 55,14] | [41,24; 62,13] | [39,89; 62,82] | [76,47; 86,99] | [71,99; 85,90] | [63,23; 79,17] | [64,83; 80,94] | [59,36; 77,09] | [49,00; 68,89] | [48,13; 68,72] | [41,97; 64,70] |              |              |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>2245</i>    | <i>2019</i>    | <i>1756</i>    | <i>1611</i>    | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>   |              |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 181            | 87             | 65             | 46             | 161            | 100            | 82             | 87             | 82             | 63             | 73             | 58             |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 45             | 26             | 20             | 17             | 22             | 11             | 9              | 17             | 20             | 15             | 16             | 18             |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 24,86          | 29,89          | 30,77          | 36,96          | 13,66          | 11,00          | 10,98          | 19,54          | 24,39          | 23,81          | 21,92          | 31,03          |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [18,55; 31,18] | [20,21; 39,56] | [19,46; 42,08] | [22,85; 51,06] | [8,34; 18,99]  | [4,84; 17,16]  | [4,17; 17,78]  | [11,16; 27,92] | [15,04; 33,74] | [13,21; 34,41] | [12,36; 31,47] | [19,02; 43,04] |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 47             | 17             | 10             | 7              | 14             | 12             | 10             | 14             | 8              | 8              | 10             | 9              |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 25,97          | 19,54          | 15,38          | 15,22          | 8,70           | 12,00          | 12,20          | 16,09          | 9,76           | 12,70          | 13,70          | 15,52          |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [19,56; 32,37] | [11,16; 27,92] | [6,54; 24,22]  | [4,72; 25,71]  | [4,33; 13,06]  | [5,60; 18,40]  | [5,07; 19,32]  | [8,33; 23,86]  | [3,29; 16,22]  | [4,41; 20,99]  | [5,76; 21,64]  | [6,12; 24,92]  |              |              |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 89                     | 44             | 35             | 22             | 125            | 77             | 63             | 56             | 54             | 40             | 47             | 31             |                |              |              |  |
|                                      | Anteil in %   | 49,17                  | 50,57          | 53,85          | 47,83          | 77,64          | 77,00          | 76,83          | 64,37          | 65,85          | 63,49          | 64,38          | 53,45          |                |              |              |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [41,87; 56,47]         | [40,01; 61,14] | [41,63; 66,06] | [33,23; 62,42] | [71,18; 84,10] | [68,71; 85,29] | [67,64; 86,02] | [54,25; 74,49] | [55,53; 76,18] | [51,51; 75,48] | [53,32; 75,44] | [40,50; 66,40] |                |              |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1759</i>            | <i>1578</i>    | <i>1380</i>    | <i>1253</i>    | <i>1159</i>    | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     |              |              |  |
| 2006-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 308            | 167            | 116            | 233            | 151            | 115            | 100            | 92             | 85             | 83             | 75             |                |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 72             | 34             | 19             | 55             | 44             | 40             | 47             | 41             | 42             | 41             | 40             |                |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 23,38          | 20,36          | 16,38          | 23,61          | 29,14          | 34,78          | 47,00          | 44,57          | 49,41          | 49,40          | 53,33          |                |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [18,64; 28,11] | [14,23; 26,48] | [9,62; 23,14]  | [18,14; 29,07] | [21,87; 36,41] | [26,04; 43,53] | [37,17; 56,83] | [34,35; 54,78] | [38,72; 60,10] | [38,58; 60,22] | [41,97; 64,70] |                |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 61             | 34             | 24             | 31             | 25             | 19             | 12             | 9              | 11             | 11             | 6              |                |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 19,81          | 20,36          | 20,69          | 13,30          | 16,56          | 16,52          | 12,00          | 9,78           | 12,94          | 13,25          | 8,00           |                |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [15,35; 24,26] | [14,23; 26,48] | [13,29; 28,09] | [8,93; 17,68]  | [10,61; 22,50] | [9,70; 23,34]  | [5,60; 18,40]  | [3,68; 15,89]  | [5,76; 20,12]  | [5,91; 20,59]  | [1,82; 14,18]  |                |              |              |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 175            | 99             | 73             | 147            | 82             | 56             | 41             | 42             | 32             | 31             | 29             |                |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 56,82          | 59,28          | 62,93          | 63,09          | 54,30          | 48,70          | 41,00          | 45,65          | 37,65          | 37,35          | 38,67          |                |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [51,28; 62,36] | [51,81; 66,76] | [54,10; 71,76] | [56,88; 69,30] | [46,33; 62,28] | [39,52; 57,87] | [31,31; 50,69] | [35,42; 55,89] | [27,29; 48,01] | [26,88; 47,82] | [27,57; 49,76] |                |              |              |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>3054</i>    | <i>2707</i>    | <i>2393</i>    | <i>2179</i>    | <i>2052</i>    | <i>1924</i>    | <i>1796</i>    | <i>1691</i>    | <i>1605</i>    | <i>1506</i>    | <i>1434</i>    | <i>1366</i>    |              |              |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 238            | 154            | 95             | 176            | 118            | 100            | 82             | 76             | 64             | 66             | 67             |                |              |              |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 55             | 28             | 19             | 41             | 35             | 34             | 32             | 38             | 37             | 37             | 37             |                |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 23,11          | 18,18          | 20,00          | 23,30          | 29,66          | 34,00          | 39,02          | 50,00          | 57,81          | 56,06          | 55,22          |                |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [17,74; 28,48] | [12,07; 24,29] | [11,91; 28,09] | [17,03; 29,56] | [21,38; 37,94] | [24,67; 43,33] | [28,40; 49,65] | [38,68; 61,32] | [45,62; 70,01] | [43,99; 68,13] | [43,23; 67,22] |                |              |              |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 62             | 39             | 17             | 28             | 25             | 18             | 19             | 8              | 4              | 8              | 7              |                |              |              |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 26,05          | 25,32          | 17,89          | 15,91          | 21,19          | 18,00          | 23,17          | 10,53          | 6,25           | 12,12          | 10,45          |                |              |              |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [20,46; 31,64] | [18,43; 32,22] | [10,15; 25,64] | [10,49; 21,33] | [13,78; 28,59] | [10,43; 25,57] | [13,98; 32,36] | [3,58; 17,47]  | [0,27; 12,23]  | [4,19; 20,06]  | [3,07; 17,83]  |                |              |              |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 121                    | 87             | 59             | 107            | 58             | 48             | 31             | 30             | 23             | 21             | 23             |                |                |              |              |  |
|                                      | Anteil in %   | 50,84                  | 56,49          | 62,11          | 60,80          | 49,15          | 48,00          | 37,80          | 39,47          | 35,94          | 31,82          | 34,33          |                |                |              |              |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [44,48; 57,21]         | [48,64; 64,35] | [52,30; 71,91] | [53,56; 68,03] | [40,09; 58,21] | [38,16; 57,84] | [27,24; 48,36] | [28,41; 50,54] | [24,09; 47,79] | [20,49; 43,14] | [22,87; 45,78] |                |                |              |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2346</i>            | <i>2091</i>    | <i>1875</i>    | <i>1753</i>    | <i>1639</i>    | <i>1555</i>    | <i>1433</i>    | <i>1332</i>    | <i>1263</i>    | <i>1206</i>    | <i>1147</i>    | <i>1090</i>    |                |              |              |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2007-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 787               | 414               | 626               | 460               | 372               | 368               | 326               | 367               | 353               | 262               |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 213               | 127               | 179               | 147               | 153               | 154               | 138               | 134               | 122               | 116               |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 27,06             | 30,68             | 28,59             | 31,96             | 41,13             | 41,85             | 42,33             | 36,51             | 34,56             | 44,27             |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [23,96;<br>30,17] | [26,23;<br>35,12] | [25,05;<br>32,14] | [27,69;<br>36,22] | [36,12;<br>46,14] | [36,80;<br>46,89] | [36,96;<br>47,70] | [31,58;<br>41,44] | [29,59;<br>39,53] | [38,25;<br>50,30] |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 151               | 76                | 78                | 63                | 64                | 61                | 52                | 54                | 59                | 64                |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 19,19             | 18,36             | 12,46             | 13,70             | 17,20             | 16,58             | 15,95             | 14,71             | 16,71             | 24,43             |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [16,43;<br>21,94] | [14,62;<br>22,09] | [9,87;<br>15,05]  | [10,55;<br>16,84] | [13,36;<br>21,04] | [12,77;<br>20,38] | [11,97;<br>19,93] | [11,08;<br>18,34] | [12,82;<br>20,61] | [19,21;<br>29,64] |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 423               | 211               | 369               | 250               | 155               | 136               | 179               | 172               | 82                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 53,75             | 50,97             | 58,95             | 54,35             | 41,67             | 41,58             | 41,72             | 48,77             | 48,73             | 31,30             |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [50,26;<br>57,23] | [46,14;<br>55,79] | [55,09;<br>62,80] | [49,79;<br>58,90] | [36,65;<br>46,68] | [36,53;<br>46,62] | [36,36;<br>47,08] | [43,65;<br>53,89] | [43,50;<br>53,95] | [25,67;<br>36,92] |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>6522</i>       | <i>5910</i>       | <i>5338</i>       | <i>4997</i>       | <i>4736</i>       | <i>4458</i>       | <i>4205</i>       | <i>4002</i>       | <i>3822</i>       | <i>3669</i>       | <i>3522</i>       |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 661               | 304               | 545               | 374               | 309               | 320               | 286               | 281               | 284               | 230               |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 157               | 81                | 177               | 134               | 127               | 119               | 117               | 102               | 105               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 23,75             | 26,64             | 32,48             | 35,83             | 41,10             | 39,69             | 41,61             | 41,64             | 35,92             | 45,65             |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [20,51;<br>27,00] | [21,67;<br>31,62] | [28,54;<br>36,41] | [30,96;<br>40,70] | [35,61;<br>46,60] | [34,32;<br>45,06] | [35,89;<br>47,33] | [35,86;<br>47,41] | [30,33;<br>41,51] | [39,20;<br>52,10] |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 148               | 74                | 79                | 55                | 44                | 48                | 38                | 24                | 42                | 38                |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 22,39             | 24,34             | 14,50             | 14,71             | 14,24             | 15,00             | 13,29             | 8,54              | 14,79             | 16,52             |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [19,21;<br>25,57] | [19,51;<br>29,17] | [11,54;<br>17,45] | [11,11;<br>18,30] | [10,34;<br>18,14] | [11,08;<br>18,92] | [9,35;<br>17,23]  | [5,27;<br>11,81]  | [10,65;<br>18,92] | [11,71;<br>21,33] |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 356                    | 149               | 289               | 185               | 138               | 145               | 129               | 140               | 140               | 87                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 53,86                  | 49,01             | 53,03             | 49,47             | 44,66             | 45,31             | 45,10             | 49,82             | 49,30             | 37,83             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [50,05;<br>57,66]      | [43,38;<br>54,64] | [48,83;<br>57,22] | [44,39;<br>54,54] | [39,11;<br>50,21] | [39,85;<br>50,78] | [39,33;<br>50,88] | [43,97;<br>55,68] | [43,47;<br>55,12] | [31,54;<br>44,11] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>5314</i>            | <i>4880</i>       | <i>4472</i>       | <i>4196</i>       | <i>3934</i>       | <i>3716</i>       | <i>3532</i>       | <i>3362</i>       | <i>3209</i>       | <i>3071</i>       | <i>2944</i>       |                   |                   |                   |                   |  |
| 2007-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 509               | 448               | 310               | 266               | 214               | 186               | 170               | 147               | 136               |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 98                | 72                | 55                | 50                | 47                | 34                | 34                | 42                | 37                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 19,25             | 16,07             | 17,74             | 18,80             | 21,96             | 18,28             | 20,00             | 28,57             | 27,21             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [15,82;<br>22,68] | [12,67;<br>19,48] | [13,48;<br>22,00] | [14,09;<br>23,50] | [16,40;<br>27,52] | [12,71;<br>23,85] | [13,97;<br>26,03] | [21,24;<br>35,90] | [19,70;<br>34,71] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 103               | 84                | 69                | 68                | 61                | 54                | 51                | 43                | 49                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 20,24             | 18,75             | 22,26             | 25,56             | 28,50             | 29,03             | 30,00             | 29,25             | 36,03             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [16,74;<br>23,73] | [15,13;<br>22,37] | [17,62;<br>26,90] | [20,31;<br>30,82] | [22,44;<br>34,57] | [22,49;<br>35,57] | [23,09;<br>36,91] | [21,87;<br>36,63] | [27,93;<br>44,13] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 308               | 292               | 186               | 148               | 106               | 98                | 85                | 62                | 50                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 60,51             | 65,18             | 60,00             | 55,64             | 49,53             | 52,69             | 50,00             | 42,18             | 36,76             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [56,26;<br>64,76] | [60,76;<br>69,60] | [54,54;<br>65,46] | [49,66;<br>61,62] | [42,82;<br>56,25] | [45,49;<br>59,88] | [42,46;<br>57,54] | [34,17;<br>50,19] | [28,63;<br>44,90] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>4414</i>       | <i>3892</i>       | <i>3512</i>       | <i>3195</i>       | <i>2899</i>       | <i>2676</i>       | <i>2514</i>       | <i>2368</i>       | <i>2249</i>       | <i>2141</i>       |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 360               | 287               | 196               | 164               | 147               | 135               | 118               | 112               | 92                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 68                | 49                | 36                | 31                | 26                | 27                | 32                | 35                | 29                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 18,89             | 17,07             | 18,37             | 18,90             | 17,69             | 20,00             | 27,12             | 31,25             | 31,52             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [14,84;<br>22,94] | [12,71;<br>21,43] | [12,93;<br>23,80] | [12,89;<br>24,91] | [11,50;<br>23,88] | [13,23;<br>26,77] | [19,06;<br>35,17] | [22,63;<br>39,87] | [21,98;<br>41,07] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 60                | 60                | 50                | 42                | 40                | 38                | 30                | 30                | 28                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 16,67             | 20,91             | 25,51             | 25,61             | 27,21             | 28,15             | 25,42             | 26,79             | 30,43             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [12,81;<br>20,52] | [16,19;<br>25,62] | [19,39;<br>31,63] | [18,91;<br>32,31] | [19,99;<br>34,43] | [20,53;<br>35,76] | [17,53;<br>33,31] | [18,55;<br>35,02] | [20,98;<br>39,89] |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 232                    | 178               | 110               | 91                | 81                | 70                | 56                | 47                | 35                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 64,44                  | 62,02             | 56,12             | 55,49             | 55,10             | 51,85             | 47,46             | 41,96             | 38,04             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [59,49;<br>69,40]      | [56,40;<br>67,65] | [49,16;<br>63,09] | [47,86;<br>63,12] | [47,03;<br>63,17] | [43,39;<br>60,31] | [38,41;<br>56,51] | [32,78;<br>51,15] | [28,07;<br>48,02] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3459</i>            | <i>3091</i>       | <i>2830</i>       | <i>2577</i>       | <i>2330</i>       | <i>2170</i>       | <i>2043</i>       | <i>1941</i>       | <i>1835</i>       | <i>1756</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2008-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 546            | 269            | 193            | 166            | 165            | 171            | 154            | 127            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 98             | 52             | 46             | 38             | 46             | 39             | 50             | 50             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 17,95          | 19,33          | 23,83          | 22,89          | 27,88          | 22,81          | 32,47          | 39,37          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [14,73; 21,17] | [14,60; 24,06] | [17,81; 29,86] | [16,48; 29,30] | [21,02; 34,74] | [16,50; 29,11] | [25,05; 39,89] | [30,84; 47,90] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 115            | 76             | 66             | 55             | 44             | 57             | 38             | 41             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 21,06          | 28,25          | 34,20          | 33,13          | 26,67          | 33,33          | 24,68          | 32,28          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [17,64; 24,49] | [22,86; 33,64] | [27,49; 40,91] | [25,95; 40,31] | [19,90; 33,43] | [26,25; 40,42] | [17,84; 31,51] | [24,12; 40,45] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 333            | 141            | 81             | 73             | 75             | 75             | 66             | 36             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 60,99          | 52,42          | 41,97          | 43,98          | 45,45          | 43,86          | 42,86          | 28,35          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [56,89; 65,08] | [46,44; 58,40] | [34,99; 48,95] | [36,40; 51,55] | [37,83; 53,08] | [36,40; 51,32] | [35,02; 50,70] | [20,48; 36,22] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>4190</i>    | <i>3689</i>    | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 417            | 230            | 191            | 156            | 154            | 139            | 135            | 114            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 99             | 61             | 53             | 48             | 55             | 44             | 42             | 40             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 23,74          | 26,52          | 27,75          | 30,77          | 35,71          | 31,65          | 31,11          | 35,09          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [19,65; 27,83] | [20,80; 32,24] | [21,38; 34,12] | [23,50; 38,04] | [28,12; 43,31] | [23,89; 39,42] | [23,27; 38,95] | [26,29; 43,89] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 82             | 52             | 52             | 47             | 38             | 42             | 41             | 40             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 19,66          | 22,61          | 27,23          | 30,13          | 24,68          | 30,22          | 30,37          | 35,09          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [15,84; 23,48] | [17,19; 28,03] | [20,90; 33,55] | [22,91; 37,35] | [17,84; 31,51] | [22,55; 37,88] | [22,58; 38,16] | [26,29; 43,89] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 236                    | 117            | 86             | 61             | 61             | 53             | 52             | 34             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 56,59                  | 50,87          | 45,03          | 39,10          | 39,61          | 38,13          | 38,52          | 29,82          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [51,83; 61,36]         | [44,39; 57,34] | [37,95; 52,10] | [31,42; 46,78] | [31,86; 47,36] | [30,03; 46,23] | [30,28; 46,76] | [21,39; 38,26] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3188</i>            | <i>2871</i>    | <i>2579</i>    | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2008-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 329            | 170            | 149            | 113            | 100            | 107            | 92             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 87             | 45             | 40             | 38             | 32             | 41             | 38             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 26,44          | 26,47          | 26,85          | 33,63          | 32,00          | 38,32          | 41,30          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [21,67; 31,22] | [19,82; 33,12] | [19,71; 33,99] | [24,88; 42,38] | [22,81; 41,19] | [29,06; 47,57] | [31,19; 51,42] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 68             | 38             | 40             | 21             | 24             | 26             | 19             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 20,67          | 22,35          | 26,85          | 18,58          | 24,00          | 24,30          | 20,65          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [16,29; 25,05] | [16,07; 28,63] | [19,71; 33,99] | [11,38; 25,79] | [15,59; 32,41] | [16,13; 32,46] | [12,33; 28,97] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 174            | 87             | 69             | 54             | 44             | 40             | 35             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 52,89          | 51,18          | 46,31          | 47,79          | 44,00          | 37,38          | 38,04          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [47,49; 58,29] | [43,64; 58,71] | [38,28; 54,34] | [38,54; 57,04] | [34,22; 53,78] | [28,17; 46,59] | [28,07; 48,02] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>2893</i>    | <i>2495</i>    | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 235            | 158            | 117            | 94             | 84             | 86             | 92             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 56             | 48             | 39             | 37             | 37             | 42             | 38             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 23,83          | 30,38          | 33,33          | 39,36          | 44,05          | 48,84          | 41,30          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [18,37; 29,29] | [23,19; 37,57] | [24,75; 41,91] | [29,43; 49,29] | [33,37; 54,73] | [38,21; 59,46] | [31,19; 51,42] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 47             | 31             | 21             | 17             | 14             | 12             | 13             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 20,00          | 19,62          | 17,95          | 18,09          | 16,67          | 13,95          | 14,13          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [14,87; 25,13] | [13,41; 25,83] | [10,97; 24,93] | [10,26; 25,91] | [8,65; 24,68]  | [6,59; 21,32]  | [6,97; 21,29]  |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 132                    | 79             | 57             | 40             | 33             | 32             | 41             |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 56,17                  | 50,00          | 48,72          | 42,55          | 39,29          | 37,21          | 44,57          |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [49,81; 62,53]         | [42,18; 57,82] | [39,62; 57,81] | [32,50; 52,60] | [28,78; 49,79] | [26,93; 47,49] | [34,35; 54,78] |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2099</i>            | <i>1848</i>    | <i>1615</i>    | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 286            | 186            | 142            | 125            | 121            | 90             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 71             | 48             | 35             | 39             | 25             | 27             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 24,83          | 25,81          | 24,65          | 31,20          | 20,66          | 30,00          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [19,81; 29,84] | [19,50; 32,11] | [17,53; 31,76] | [23,05; 39,35] | [13,42; 27,91] | [20,48; 39,52] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 71             | 52             | 43             | 34             | 34             | 28             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 24,83          | 27,96          | 30,28          | 27,20          | 28,10          | 31,11          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [19,81; 29,84] | [21,49; 34,42] | [22,70; 37,87] | [19,37; 35,03] | [20,06; 36,14] | [21,49; 40,73] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | 144            | 86             | 64             | 52             | 62             | 35             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 50,35          | 46,24          | 45,07          | 41,60          | 51,24          | 38,89          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [44,54; 56,15] | [39,05; 53,42] | [36,86; 53,28] | [32,92; 50,28] | [42,30; 60,18] | [28,76; 49,02] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>3215</i>    | <i>2781</i>    | <i>2408</i>    | <i>2143</i>    | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i> |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | 197            | 130            | 109            | 93             | 99             | 92             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | 52             | 34             | 34             | 28             | 31             | 33             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 26,40          | 26,15          | 31,19          | 30,11          | 31,31          | 35,87          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [20,23; 32,57] | [18,57; 33,74] | [22,46; 39,93] | [20,73; 39,48] | [22,13; 40,50] | [26,02; 45,72] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | 54             | 31             | 25             | 22             | 26             | 26             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | 27,41          | 23,85          | 22,94          | 23,66          | 26,26          | 28,26          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | [21,17; 33,66] | [16,49; 31,20] | [15,01; 30,86] | [14,97; 32,34] | [17,55; 34,98] | [19,01; 37,51] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | 91                     | 65             | 50             | 43             | 42             | 33             |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | 46,19                  | 50,00          | 45,87          | 46,24          | 42,42          | 35,87          |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | [39,21; 53,17]         | [41,37; 58,63] | [36,47; 55,27] | [36,05; 56,42] | [32,64; 52,21] | [26,02; 45,72] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2420</i>            | <i>2074</i>    | <i>1813</i>    | <i>1629</i>    | <i>1496</i>    | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2009-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --             | 227            | 151            | 120            | 102            | 73             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --             | 70             | 47             | 44             | 47             | 34             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --             | 30,84          | 31,13          | 36,67          | 46,08          | 46,58          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --             | [24,82; 36,86] | [23,72; 38,54] | [28,01; 45,33] | [36,36; 55,80] | [35,05; 58,10] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --             | 49             | 24             | 21             | 19             | 15             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --             | 21,59          | 15,89          | 17,50          | 18,63          | 20,55          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --             | [16,22; 26,95] | [10,04; 21,75] | [10,67; 24,33] | [11,03; 26,22] | [11,21; 29,88] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | --             | 108            | 80             | 55             | 36             | 24             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --             | 47,58          | 52,98          | 45,83          | 35,29          | 32,88          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --             | [41,07; 54,09] | [44,99; 60,97] | [36,88; 54,79] | [25,97; 44,61] | [22,03; 43,73] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | <i>--</i>      | <i>2303</i>    | <i>1970</i>    | <i>1730</i>    | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --             | 191            | 137            | 106            | 86             | 80             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --             | 50             | 37             | 34             | 23             | 24             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --             | 26,18          | 27,01          | 32,08          | 26,74          | 30,00          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --             | [19,93; 32,43] | [19,55; 34,47] | [23,15; 41,00] | [17,33; 36,15] | [19,89; 40,11] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --             | 34             | 23             | 18             | 27             | 20             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --             | 17,80          | 16,79          | 16,98          | 31,40          | 25,00          |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --             | [12,36; 23,24] | [10,51; 23,07] | [9,80; 24,16]  | [21,53; 41,26] | [15,45; 34,55] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | --                     | 107            | 77             | 54             | 36             | 36             |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | --                     | 56,02          | 56,20          | 50,94          | 41,86          | 45,00          |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | --                     | [48,96; 63,08] | [47,87; 64,54] | [41,38; 60,51] | [31,37; 52,35] | [34,03; 55,97] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>--</i>              | <i>1839</i>    | <i>1616</i>    | <i>1458</i>    | <i>1328</i>    | <i>1245</i>    |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 273               | 155               | 146               | 116               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 95                | 62                | 61                | 57                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 34,80             | 40,00             | 41,78             | 49,14             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [29,14;<br>40,46] | [32,26;<br>47,74] | [33,75;<br>49,81] | [40,00;<br>58,28] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 57                | 26                | 29                | 27                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 20,88             | 16,77             | 19,86             | 23,28             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [16,05;<br>25,71] | [10,87;<br>22,68] | [13,37;<br>26,36] | [15,55;<br>31,00] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 121               | 67                | 56                | 32                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 44,32             | 43,23             | 38,36             | 27,59             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [38,42;<br>50,23] | [35,40;<br>51,05] | [30,44;<br>46,27] | [19,42;<br>35,76] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | --                | <i>2538</i>       | <i>2206</i>       | <i>1972</i>       | <i>1813</i>       |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 195               | 133               | 103               | 76                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 53                | 40                | 34                | 27                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 27,18             | 30,08             | 33,01             | 35,53             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [20,92;<br>33,44] | [22,25;<br>37,90] | [23,88;<br>42,14] | [24,69;<br>46,36] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 37                | 21                | 23                | 16                |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 18,97             | 15,79             | 22,33             | 21,05             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   | --                     | [13,46;<br>24,49] | [9,57;<br>22,01]  | [14,25;<br>30,41] | [11,83;<br>30,28] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | --                     | 105               | 72                | 46                | 33                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | --                     | 53,85             | 54,14             | 44,66             | 43,42             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | --                     | [46,83;<br>60,86] | [45,63;<br>62,64] | [35,01;<br>54,31] | [32,20;<br>54,64] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | --                     | <i>1850</i>       | <i>1591</i>       | <i>1428</i>       | <i>1299</i>       |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 246               | 173               | 140               |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 86                | 50                | 47                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 34,96             | 28,90             | 33,57             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [28,99;<br>40,93] | [22,13;<br>35,68] | [25,72;<br>41,42] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 52                | 51                | 48                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 21,14             | 29,48             | 34,29             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [16,03;<br>26,25] | [22,67;<br>36,29] | [26,39;<br>42,18] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 108               | 72                | 45                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 43,90             | 41,62             | 32,14             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [37,69;<br>50,12] | [34,25;<br>48,99] | [24,38;<br>39,91] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | --                | <i>2626</i>       | <i>2248</i>       | <i>2023</i>       |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 198               | 125               | 104               |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 70                | 51                | 51                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 35,35             | 40,80             | 49,04             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [28,68;<br>42,03] | [32,15;<br>49,45] | [39,38;<br>58,69] |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 49                | 25                | 25                |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 24,75             | 20,00             | 24,04             |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   | --                     | [18,72;<br>30,77] | [12,96;<br>27,04] | [15,79;<br>32,29] |                   |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | --                     | 79                | 49                | 28                |                   |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | --                     | 39,90             | 39,20             | 26,92             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | --                     | [33,06;<br>46,74] | [30,61;<br>47,79] | [18,36;<br>35,49] |                   |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | --                     | <i>2021</i>       | <i>1768</i>       | <i>1574</i>       |                   |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr       | 3. Halbjahr       | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 254               | 166               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 81                | 65                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 31,89             | 39,16             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [26,15;<br>37,63] | [31,71;<br>46,60] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 72                | 44                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 28,35             | 26,51             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [22,79;<br>33,90] | [19,77;<br>33,24] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 101               | 57                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 39,76             | 34,34             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [33,73;<br>45,79] | [27,09;<br>41,58] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | --                | <i>2666</i>       | <i>2269</i>       |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 188               | 118               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 70                | 50                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 37,23             | 42,37             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [30,31;<br>44,16] | [33,42;<br>51,33] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 36                | 29                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 19,15             | 24,58             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   | --                     | [13,51;<br>24,79] | [16,77;<br>32,38] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | --                     | 82                | 39                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | --                     | 43,62             | 33,05             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | --                     | [36,51;<br>50,72] | [24,53;<br>41,57] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | --                     | <i>2091</i>       | <i>1809</i>       |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-2                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 249               |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 90                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 36,14             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [30,17;<br>42,12] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 73                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 29,32             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [23,65;<br>34,98] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 86                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 34,54             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [28,62;<br>40,46] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | --                | <i>2602</i>       |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --                | 177               |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --                | 57                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 32,20             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --                | [25,30;<br>39,11] |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --                | 44                |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --                | 24,86             |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   | --                     | [18,47;<br>31,24] |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | --                     | 76                |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | --                     | 42,94             |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | --                     | [35,62;<br>50,25] |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | --                     | <i>1963</i>       |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



| EZ                                   | Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen        | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1                               | <b>männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung nicht wahrgenommen   | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>                                    | <i>Anzahl</i>          | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b> | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung wahrgenommen   | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Schulung aktuell nicht möglich  | Anzahl                 | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            | --          |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                       |   | --                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Schulung nicht wahrgenommen          | Anzahl  | --                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | Anteil in %   | --                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI Anteil in %  | --                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | --                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

### 3.5 Augenärztliche Auswertungen

Folgeerkrankungen an den Augen sind typische Schäden, die sich mit zunehmender Erkrankungsdauer ausbilden können. Das frühzeitige Erkennen und eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist ein wichtiges Ziel. Zunächst werden die DMP-Teilnehmer hinsichtlich der Durchführung einer jährlichen ophthalmologischen Netzhautuntersuchung ausgewertet.

Die diabetische Retinopathie ist eine durch Diabetes mellitus hervorgerufene Erkrankung der Netzhaut des Auges. Die Schädigungen kleiner Blutgefäße (Mikroangiopathie) bzw. Blutungen der Netzhautgefäße verursachen eine Minderung der Sehschärfe sowie Einschränkung des Gesichtsfelds und können zur Erblindung führen. Eine frühzeitige Erkennung der Veränderungen an den Netzhautgefäßen gefolgt von einer Lasertherapie der Netzhaut kann einen positiven Einfluss auf die Progredienz dieser Folgeerkrankung haben.

In Tabelle 3.5.1 wird untersucht, bei wie vielen Patienten bzw. welchem Anteil eine **jährliche augenärztliche Untersuchung** erfolgte. Die Auswertungen erfolgen also nicht im üblichen Halbjahresbezug. Da die Angaben aus der Erstdokumentation sich über einen unbekanntem Zeitraum erstrecken, können die Angaben des Beitrittsjahres nicht für die jährliche Betrachtungsweise verwendet werden. Der Jahresbezug wird folgendermaßen definiert: Eine jährliche Untersuchung gilt als gegeben, wenn eine Untersuchung im zweiten und/oder dritten Halbjahr dokumentiert ist bzw. im vierten und/oder fünften Halbjahr, etc. Betrachtet werden dabei alle Versicherten, die jeweils in beiden Halbjahren Programmteilnehmer waren.

In der folgenden Tabelle werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Beitrittsjahr bzw. im Untersuchungsjahr (noch) Programmteilnehmer waren. Da eine **jährliche** Auswertung vorgenommen werden soll, wird ausgewiesen, wie viele Patienten in der zweiten Hälfte des untersuchten Jahreszeitraumes (zweites/drittes Halbjahr, viertes/fünftes Halbjahr, etc.) noch Programmteilnehmer waren. Patienten, die lediglich in der ersten Jahreshälfte im Programm waren, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird dargestellt, für wie viele der „auswertbaren“ Patienten bzw. welchen Anteil im interessierenden Jahreszeitraum (= aktuelles Halbjahrespaar) eine augenärztliche Untersuchung erfolgte.

Tabelle 3.5.1 Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung

| EZ     | Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung                        | Teilnehmer im Beitritts-halbjahr | Im 1. Untersuchungs-jahr | Im 2. Untersuchungs-jahr | Im 3. Untersuchungs-jahr | Im 4. Untersuchungs-jahr | Im 5. Untersuchungs-jahr | Im 6. Untersuchungs-jahr | Im 7. Untersuchungs-jahr |                 |
|--------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 2005-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 342                      | 277                      | 220                      | 194                      | 176                      | 167                      | 152                      | 141             |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 277                      | 220                      | 194                      | 176                      | 167                      | 151                      | 141             |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 195                      | 187                      | 169                      | 154                      | 154                      | 148                      | 135             |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 70,40                    | 85,00                    | 87,11                    | 87,50                    | 92,22                    | 98,01                    | 95,74           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [65,01; 75,78]           | [80,27; 89,73]           | [82,39; 91,84]           | [82,60; 92,40]           | [88,14; 96,29]           | [95,78; 100,00]          | [92,40; 99,09]  |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 292                      | 246                      | 195                      | 174                      | 160                      | 145                      | 139                      | 129             |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 246                      | 195                      | 174                      | 159                      | 144                      | 138                      | 127             |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 187                      | 169                      | 157                      | 147                      | 133                      | 136                      | 124             |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 76,02                    | 86,67                    | 90,23                    | 92,45                    | 92,36                    | 98,55                    | 97,64           |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [70,67; 81,36]           | [81,88; 91,45]           | [85,81; 94,65]           | [88,33; 96,57]           | [88,01; 96,71]           | [96,55; 100,00]          | [94,99; 100,00] |
| 2005-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2287                     | 1857                     | 1582                     | 1432                     | 1309                     | 1185                     | 1103                     |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1855                     | 1579                     | 1428                     | 1308                     | 1182                     | 1101                     |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1515                     | 1233                     | 1110                     | 997                      | 942                      | 872                      |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 81,67                    | 78,09                    | 77,73                    | 76,22                    | 79,70                    | 79,20                    |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [79,91; 83,43]           | [76,05; 80,13]           | [75,57; 79,89]           | [73,92; 78,53]           | [77,40; 81,99]           | [76,80; 81,60]           |                 |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 1772                     | 1439                     | 1242                     | 1116                     | 1026                     | 936                      | 870                      |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1433                     | 1241                     | 1111                     | 1020                     | 932                      | 868                      |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1206                     | 1013                     | 914                      | 841                      | 750                      | 693                      |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 84,16                    | 81,63                    | 82,27                    | 82,45                    | 80,47                    | 79,84                    |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [82,27; 86,05]           | [79,47; 83,78]           | [80,02; 84,52]           | [80,12; 84,79]           | [77,93; 83,02]           | [77,17; 82,51]           |                 |
| 2006-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2245                     | 1756                     | 1483                     | 1329                     | 1149                     | 1039                     | 932                      |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1752                     | 1474                     | 1316                     | 1147                     | 1038                     | 931                      |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1367                     | 1185                     | 1076                     | 909                      | 835                      | 709                      |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 78,03                    | 80,39                    | 81,76                    | 79,25                    | 80,44                    | 76,15                    |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [76,09; 79,96]           | [78,37; 82,42]           | [79,68; 83,85]           | [76,90; 81,60]           | [78,03; 82,86]           | [73,42; 78,89]           |                 |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 1759                     | 1380                     | 1159                     | 1057                     | 933                      | 844                      | 747                      |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1375                     | 1149                     | 1046                     | 928                      | 840                      | 743                      |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1079                     | 938                      | 870                      | 770                      | 688                      | 595                      |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 78,47                    | 81,64                    | 83,17                    | 82,97                    | 81,90                    | 80,08                    |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [76,30; 80,65]           | [79,40; 83,88]           | [80,91; 85,44]           | [80,55; 85,39]           | [79,30; 84,51]           | [77,21; 82,95]           |                 |
| 2006-2 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3054                     | 2393                     | 2052                     | 1796                     | 1605                     | 1434                     |                          |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 2385                     | 2049                     | 1791                     | 1602                     | 1430                     |                          |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1903                     | 1672                     | 1433                     | 1274                     | 1157                     |                          |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 79,79                    | 81,60                    | 80,01                    | 79,53                    | 80,91                    |                          |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [78,18; 81,40]           | [79,92; 83,28]           | [78,16; 81,86]           | [77,55; 81,50]           | [78,87; 82,95]           |                          |                 |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2346                     | 1875                     | 1639                     | 1433                     | 1263                     | 1147                     |                          |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 1872                     | 1628                     | 1422                     | 1260                     | 1146                     |                          |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 1523                     | 1338                     | 1172                     | 1035                     | 931                      |                          |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 81,36                    | 82,19                    | 82,42                    | 82,14                    | 81,24                    |                          |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [79,59; 83,12]           | [80,33; 84,05]           | [80,44; 84,40]           | [80,03; 84,26]           | [78,98; 83,50]           |                          |                 |
| 2007-1 | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 6522                     | 5338                     | 4736                     | 4205                     | 3822                     | 3522                     |                          |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 5320                     | 4701                     | 4191                     | 3808                     | 3506                     |                          |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 3935                     | 3470                     | 3088                     | 2946                     | 2782                     |                          |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 73,97                    | 73,81                    | 73,68                    | 77,36                    | 79,35                    |                          |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [72,79; 75,15]           | [72,56; 75,07]           | [72,35; 75,02]           | [76,03; 78,69]           | [78,01; 80,69]           |                          |                 |
|        | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 5314                     | 4472                     | 3934                     | 3532                     | 3209                     | 2944                     |                          |                 |
|        | auswertbar   | Anzahl                           |                          | 4459                     | 3905                     | 3520                     | 3190                     | 2922                     |                          |                 |
|        | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                          | 3376                     | 3067                     | 2712                     | 2533                     | 2400                     |                          |                 |
|        |  | Anteil in %                      |                          | 75,71                    | 78,54                    | 77,05                    | 79,40                    | 82,14                    |                          |                 |
|        |  | CI Anteil in %                   |                          | [74,45; 76,97]           | [77,25; 79,83]           | [75,66; 78,43]           | [78,00; 80,81]           | [80,75; 83,52]           |                          |                 |

| EZ   | Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung                        | Teilnehmer im Beitritts-halbjahr | Im 1. Untersu-chungs-jahr | Im 2. Untersu-chungs-jahr | Im 3. Untersu-chungs-jahr | Im 4. Untersu-chungs-jahr | Im 5. Untersu-chungs-jahr | Im 6. Untersu-chungs-jahr | Im 7. Untersu-chungs-jahr |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2007-2   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 4414                      | 3512                      | 2899                      | 2514                      | 2249                      |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 3491                      | 2876                      | 2501                      | 2231                      |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 2541                      | 2064                      | 1810                      | 1644                      |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 72,79                     | 71,77                     | 72,37                     | 73,69                     |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [71,31; 74,26]            | [70,12; 73,41]            | [70,62; 74,12]            | [71,86; 75,52]            |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3459                      | 2830                      | 2330                      | 2043                      | 1835                      |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2814                      | 2322                      | 2035                      | 1823                      |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 2138                      | 1730                      | 1530                      | 1398                      |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 75,98                     | 74,50                     | 75,18                     | 76,69                     |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [74,40; 77,56]            | [72,73; 76,28]            | [73,31; 77,06]            | [74,75; 78,63]            |                           |                           |                           |
| 2008-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 4190                      | 3307                      | 2653                      | 2274                      | 2046                      |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 3250                      | 2633                      | 2252                      | 2025                      |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 2394                      | 1891                      | 1645                      | 1543                      |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 73,66                     | 71,82                     | 73,05                     | 76,20                     |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [72,15; 75,18]            | [70,10; 73,54]            | [71,21; 74,88]            | [74,34; 78,05]            |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3188                      | 2579                      | 2120                      | 1834                      | 1650                      |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2544                      | 2107                      | 1818                      | 1629                      |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1993                      | 1618                      | 1404                      | 1286                      |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 78,34                     | 76,79                     | 77,23                     | 78,94                     |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [76,74; 79,94]            | [74,99; 78,59]            | [75,30; 79,16]            | [76,96; 80,92]            |                           |                           |                           |
| 2008-2   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2893                      | 2153                      | 1738                      | 1505                      |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2125                      | 1719                      | 1478                      |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1536                      | 1202                      | 1094                      |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 72,28                     | 69,92                     | 74,02                     |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [70,38; 74,19]            | [67,76; 72,09]            | [71,78; 76,26]            |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2099                      | 1615                      | 1290                      | 1124                      |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1604                      | 1274                      | 1111                      |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1175                      | 924                       | 850                       |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 73,25                     | 72,53                     | 76,51                     |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [71,09; 75,42]            | [70,08; 74,98]            | [74,01; 79,00]            |                           |                           |                           |                           |
| 2009-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3215                      | 2408                      | 1971                      | 1697                      |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2388                      | 1950                      | 1677                      |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1713                      | 1385                      | 1247                      |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 71,73                     | 71,03                     | 74,36                     |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [69,93; 73,54]            | [69,01; 73,04]            | [72,27; 76,45]            |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2420                      | 1813                      | 1496                      | 1268                      |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1801                      | 1478                      | 1248                      |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1327                      | 1074                      | 949                       |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 73,68                     | 72,67                     | 76,04                     |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [71,65; 75,72]            | [70,39; 74,94]            | [73,67; 78,41]            |                           |                           |                           |                           |
| 2009-2   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2729                      | 1970                      | 1565                      |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1953                      | 1537                      |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1423                      | 1103                      |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 72,86                     | 71,76                     |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [70,89; 74,83]            | [69,51; 74,01]            |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2127                      | 1616                      | 1328                      |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1595                      | 1307                      |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1208                      | 966                       |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 75,74                     | 73,91                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [73,63; 77,84]            | [71,53; 76,29]            |                           |                           |                           |                           |                           |

| EZ   | Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung                        | Teilnehmer im Beitritts-halbjahr | Im 1. Untersu-chungs-jahr | Im 2. Untersu-chungs-jahr | Im 3. Untersu-chungs-jahr | Im 4. Untersu-chungs-jahr | Im 5. Untersu-chungs-jahr | Im 6. Untersu-chungs-jahr | Im 7. Untersu-chungs-jahr |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2010-1   | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3025                      | 2206                      | 1813                      |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2195                      | 1800                      |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1570                      | 1266                      |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 71,53                     | 70,33                     |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [69,64; 73,41]            | [68,22; 72,44]            |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2174                      | 1591                      | 1299                      |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1577                      | 1282                      |                           |                           |                           |                           |
| 2010-2   | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1128                      | 967                       |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 71,53                     | 75,43                     |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [69,30; 73,76]            | [73,07; 77,79]            |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3086                      | 2248                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2237                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1580                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 70,63                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [68,74; 72,52]            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2011-1   | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2312                      | 1768                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1761                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1311                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 74,45                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [72,41; 76,48]            |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3146                      | 2269                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 2256                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  | 1596                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  | 70,74                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  | [68,87; 72,62]            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2011-2   | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2382                      | 1809                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           | 1802                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           | 1330                      |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           | 73,81                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           | [71,78; 75,84]            |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3031                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2012-1   | <b>weibliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 2272                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | Anteil in %                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  |  | CI Anteil in %                   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | <b>männliche Patienten insgesamt</b>   | Anzahl                           | 3423                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | auswertbar   | Anzahl                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr) | Anzahl   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | Anteil in %  |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|  | CI Anteil in %   |                                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |

In Tabelle 3.5.2 wird dokumentiert, wie viele männliche und weibliche Erwachsene laut Erstdokumentation von einer **diabetischer Retinopathie** betroffen, aber nicht erblindet waren.

**Tabelle 3.5.2 Erwachsene Patienten mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation**

| EZ                                   | Erwachsene Patienten mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr        |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 2005-1                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 319                    |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 52                     |
|                                      |   | Anteil in % 16,30             |
|                                      |   | CI Anteil in % [12,24; 20,36] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i> 342             |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 275                    |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 57                     |
| Anteil in % 20,73                    |   |                               |
| CI Anteil in % [15,93; 25,53]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i> 292   |                               |
| 2005-2                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2160                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 525                    |
|                                      |   | Anteil in % 24,31             |
|                                      |   | CI Anteil in % [22,50; 26,11] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i> 2287            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 1650                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 394                    |
| Anteil in % 23,88                    |   |                               |
| CI Anteil in % [21,82; 25,94]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i> 1772  |                               |
| 2006-1                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2101                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 333                    |
|                                      |   | Anteil in % 15,85             |
|                                      |   | CI Anteil in % [14,29; 17,41] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i> 2245            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 1598                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 248                    |
| Anteil in % 15,52                    |   |                               |
| CI Anteil in % [13,74; 17,30]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i> 1759  |                               |
| 2006-2                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2885                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 393                    |
|                                      |   | Anteil in % 13,62             |
|                                      |   | CI Anteil in % [12,37; 14,87] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i> 3054            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2151                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 306                    |
| Anteil in % 14,23                    |   |                               |
| CI Anteil in % [12,75; 15,70]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i> 2346  |                               |

| EZ                                   | Erwachsene Patienten mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr        |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 2007-1                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 6090                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 884                    |
|                                      |   | Anteil in % 14,52             |
|                                      |   | CI Anteil in % [13,63; 15,40] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 6522</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 4916                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 737                    |
| Anteil in % 14,99                    |   |                               |
| CI Anteil in % [13,99; 15,99]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 5314</i>  |                               |
| 2007-2                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 3831                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 513                    |
|                                      |   | Anteil in % 13,39             |
|                                      |   | CI Anteil in % [12,31; 14,47] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 4414</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2944                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 389                    |
| Anteil in % 13,21                    |   |                               |
| CI Anteil in % [11,99; 14,44]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 3459</i>  |                               |
| 2008-1                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 3801                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 442                    |
|                                      |   | Anteil in % 11,63             |
|                                      |   | CI Anteil in % [10,61; 12,65] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 4190</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2805                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 380                    |
| Anteil in % 13,55                    |   |                               |
| CI Anteil in % [12,28; 14,81]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 3188</i>  |                               |
| 2008-2                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2583                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 341                    |
|                                      |   | Anteil in % 13,20             |
|                                      |   | CI Anteil in % [11,90; 14,51] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 2893</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 1849                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 245                    |
| Anteil in % 13,25                    |   |                               |
| CI Anteil in % [11,70; 14,80]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 2099</i>  |                               |
| 2009-1                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2879                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 349                    |
|                                      |   | Anteil in % 12,12             |
|                                      |   | CI Anteil in % [10,93; 13,31] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 3215</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2092                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 251                    |
| Anteil in % 12,00                    |   |                               |
| CI Anteil in % [10,61; 13,39]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 2420</i>  |                               |

| EZ                                   | Erwachsene Patienten mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr        |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 2009-2                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2435                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 289                    |
|                                      |   | Anteil in % 11,87             |
|                                      |   | CI Anteil in % [10,58; 13,15] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 2729</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 1814                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 196                    |
| Anteil in % 10,80                    |   |                               |
| CI Anteil in % [9,38; 12,23]         |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 2127</i>  |                               |
| 2010-1                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2744                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 313                    |
|                                      |   | Anteil in % 11,41             |
|                                      |   | CI Anteil in % [10,22; 12,60] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 3025</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 1915                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 220                    |
| Anteil in % 11,49                    |   |                               |
| CI Anteil in % [10,06; 12,92]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 2174</i>  |                               |
| 2010-2                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2745                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 302                    |
|                                      |   | Anteil in % 11,00             |
|                                      |   | CI Anteil in % [9,83; 12,17]  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 3086</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2012                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 264                    |
| Anteil in % 13,12                    |   |                               |
| CI Anteil in % [11,65; 14,60]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 2312</i>  |                               |
| 2011-1                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2860                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 301                    |
|                                      |   | Anteil in % 10,52             |
|                                      |   | CI Anteil in % [9,40; 11,65]  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 3146</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2111                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 254                    |
| Anteil in % 12,03                    |   |                               |
| CI Anteil in % [10,64; 13,42]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 2382</i>  |                               |
| 2011-2                               | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2740                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 314                    |
|                                      |   | Anteil in % 11,46             |
|                                      |   | CI Anteil in % [10,27; 12,65] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl 3031</i>            |
|                                      | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl 2025                   |
|                                      | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl 252                    |
| Anteil in % 12,44                    |   |                               |
| CI Anteil in % [11,01; 13,88]        |   |                               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl 2272</i>  |                               |



| EZ     | Erwachsene Patienten mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr |                  |
|--------|---|------------------------|------------------|
| 2012-1 | <b>erwachsene männliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl                 | 3105             |
|        | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl                 | 317              |
|        |   | Anteil in %            | 10,21            |
|        |   | CI Anteil in %         | [9,14;<br>11,27] |
|        | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3423</i>      |
|        | <b>erwachsene weibliche Pat. insgesamt</b>  | Anzahl                 | 2226             |
|        | mit diabetischer Retinopathie und ohne Erblindung laut Erstdokumentation                      | Anzahl                 | 251              |
|        |   | Anteil in %            | 11,28            |
|        |   | CI Anteil in %         | [9,96;<br>12,59] |
|        | <i>weibliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>2494</i>      |

### 3.6 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten

Die durch langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachten Begleit- oder Folgeerkrankungen des Diabetes sind durch Makro- und Mikroangiopathie sowie Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven, bedingt und können zu schweren Organschädigungen bzw. Organversagen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Therapie kann die Progredienz deutlich verlangsamen. Eine gefürchtete Folge des Diabetes mellitus besteht in der Schädigung der Nieren durch Veränderung der Nierengefäße in Form der diabetischen Nephropathie, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Eine weitere Schädigung besteht in Form des diabetischen Fußes, bei dessen fortgeschrittenen Stadien Amputationen von Zehen, des Vorfußes oder gar des Unterschenkels notwendig werden können. Ein weiteres von Gefäßveränderungen betroffenes Organ ist das Herz, bei dem es in ausgeprägten Stadien zu so genannten (durch die gleichzeitige Schädigung der Nerven) „stummen Infarkten“, bei denen die Patienten keine oder kaum Schmerzen verspüren, kommen kann. Durch ausgeprägte Schädigung der Gefäße des Zentralnervensystems können weiterhin Schlaganfälle verursacht werden. In den folgenden Tabellen wird das neue Auftreten von Endpunkten dokumentiert; d.h. es werden erstmalig auftretende Endpunkte ausgewiesen. Folgeerkrankungen an den Augen und Nieren sind typische Schäden, die sich mit zunehmender Erkrankungsdauer ausbilden können. Das frühzeitige Erkennen und eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist ein wichtiges Ziel.

Die folgenden Tabellen beinhalten **Ereigniszeitanalysen** zum Erstauftreten der eben beschriebenen Ereignisse sowie die Angaben zur kumulierten „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit in Prozent wieder, mit der für Patienten des Basiskollektivs ohne Ereignis zur ED im jeweiligen Halbjahr (noch) keines der im Einzelnen betrachteten Ereignisse eingetreten ist. Bezugsgröße im Halbjahr ist das Restkollektiv und entspricht dem Basiskollektiv, reduziert um ausgeschriebene Patienten sowie Patienten, bei denen im Verlauf bereits ein Ereignis eingetreten ist. Pro Halbjahr fließen also die verbleibenden Patienten unter Risiko in die Auswertung ein.

Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit wird in jeder der folgenden Tabellen in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

In Tabelle 3.6.1 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren vom **Erstaufreten einer Erblindungen** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Erblindung vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Erblindung dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr

die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene Erblindung dokumentiert ist.

Tabelle 3.6.1 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation

| EZ                                   | Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                 |              |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 340              | 316              | 275              | 240              | 217              | 205              | 192              | 184              | 174               | 171               | 166               | 157               | 150               | 145               | 139             |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 308              | 264              | 236              | 215              | 205              | 192              | 182              | 172               | 167               | 160               | 153               | 146               | 142               | 136             |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0               | 0            |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,42             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,63              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 1,25]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 1,85]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00] |
|                                      | kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit  | Rate                   |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,58</b>     | <b>99,58</b>     | <b>99,58</b>     | <b>99,58</b>     | <b>99,58</b>     | <b>99,58</b>      | <b>99,58</b>      | <b>98,97</b>      | <b>98,97</b>      | <b>98,97</b>      | <b>98,97</b>      | <b>98,97</b>    |              |
|                                      |  | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [98,76; 100,00]  | [98,76; 100,00]  | [98,76; 100,00]  | [98,76; 100,00]  | [98,76; 100,00]  | [98,76; 100,00]   | [98,76; 100,00]   | [97,52; 100,00]   | [97,52; 100,00]   | [97,52; 100,00]   | [97,52; 100,00]   | [97,52; 100,00] |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>342</i>       | <i>318</i>       | <i>277</i>       | <i>242</i>       | <i>220</i>       | <i>207</i>       | <i>194</i>       | <i>186</i>       | <i>176</i>        | <i>172</i>        | <i>167</i>        | <i>159</i>        | <i>152</i>        | <i>147</i>        | <i>141</i>      |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 288              | 277              | 242              | 210              | 191              | 180              | 171              | 164              | 159               | 150               | 144               | 140               | 138               | 135               | 128             |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 273              | 221              | 206              | 190              | 178              | 166              | 162              | 155               | 146               | 142               | 138               | 135               | 128               | 124             |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |              |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |              |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]    |              |
|                                      | kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit  | Rate                   |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>   |              |
| CI                                   |  |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  |                 |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>292</i>             | <i>281</i>       | <i>246</i>       | <i>214</i>       | <i>195</i>       | <i>183</i>       | <i>174</i>       | <i>167</i>       | <i>160</i>       | <i>151</i>        | <i>145</i>        | <i>141</i>        | <i>139</i>        | <i>136</i>        | <i>129</i>        |                 |              |
| 2005-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2277             | 2085             | 1848             | 1681             | 1575             | 1503             | 1425             | 1360             | 1301              | 1247              | 1180              | 1148              | 1099              | 1046              |                 |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2030             | 1807             | 1648             | 1543             | 1465             | 1377             | 1333             | 1275              | 1222              | 1159              | 1128              | 1069              | 1029              |                 |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 1                | 0                | 2                | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |                 |              |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,05             | 0,00             | 0,12             | 0,00             | 0,00             | 0,07             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,10              |                 |              |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,15]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,29]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,21]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,29]      |                 |              |
|                                      | kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit  | Rate                   |                  | <b>99,95</b>     | <b>99,95</b>     | <b>99,83</b>     | <b>99,83</b>     | <b>99,83</b>     | <b>99,76</b>     | <b>99,76</b>     | <b>99,76</b>      | <b>99,76</b>      | <b>99,76</b>      | <b>99,76</b>      | <b>99,76</b>      | <b>99,66</b>      |                 |              |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,85; 100,00]  | [99,85; 100,00]  | [99,64; 100,00]  | [99,64; 100,00]  | [99,64; 100,00]  | [99,52; 100,00]  | [99,52; 100,00]  | [99,52; 100,00]   | [99,52; 100,00]   | [99,52; 100,00]   | [99,52; 100,00]   | [99,52; 100,00]   | [99,36; 99,96]    |                 |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2287</i>      | <i>2094</i>      | <i>1857</i>      | <i>1690</i>      | <i>1582</i>      | <i>1510</i>      | <i>1432</i>      | <i>1368</i>      | <i>1309</i>       | <i>1254</i>       | <i>1185</i>       | <i>1153</i>       | <i>1103</i>       | <i>1050</i>       |                 |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1755             | 1608             | 1423             | 1302             | 1226             | 1156             | 1102             | 1061             | 1012              | 953               | 923               | 890               | 858               | 827               |                 |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1554             | 1384             | 1269             | 1203             | 1128             | 1062             | 1028             | 979               | 935               | 905               | 871               | 841               | 793               |                 |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                | 2                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 | 0                 |                 |              |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,06             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,19             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,12              | 0,00              |                 |              |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,19]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,45]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,35]      | [0,00; 0,00]      |                 |              |
|                                      | kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit  | Rate                   |                  | <b>99,94</b>     | <b>99,94</b>     | <b>99,94</b>     | <b>99,94</b>     | <b>99,94</b>     | <b>99,75</b>     | <b>99,75</b>     | <b>99,75</b>      | <b>99,75</b>      | <b>99,75</b>      | <b>99,75</b>      | <b>99,63</b>      | <b>99,63</b>      |                 |              |
| CI                                   |  |                        | [99,82; 100,00]  | [99,82; 100,00]  | [99,82; 100,00]  | [99,82; 100,00]  | [99,82; 100,00]  | [99,46; 100,00]  | [99,46; 100,00]  | [99,46; 100,00]  | [99,46; 100,00]   | [99,46; 100,00]   | [99,46; 100,00]   | [99,26; 100,00]   | [99,26; 100,00]   |                   |                 |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1772</i>            | <i>1624</i>      | <i>1439</i>      | <i>1318</i>      | <i>1242</i>      | <i>1172</i>      | <i>1116</i>      | <i>1075</i>      | <i>1026</i>      | <i>966</i>        | <i>936</i>        | <i>903</i>        | <i>870</i>        | <i>839</i>        |                   |                 |              |
| 2006-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2234             | 2008             | 1747             | 1602             | 1474             | 1398             | 1319             | 1217             | 1141              | 1084              | 1033              | 978               | 927               |                   |                 |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1955             | 1709             | 1548             | 1433             | 1335             | 1270             | 1187             | 1123              | 1071              | 1013              | 962               | 903               |                   |                 |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 0                | 1                | 1                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                 |              |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,07             | 0,07             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                 |              |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,21]     | [0,00; 0,22]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      |                   |                 |              |
|                                      | kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit  | Rate                   |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,93</b>     | <b>99,86</b>     | <b>99,86</b>     | <b>99,86</b>     | <b>99,86</b>      | <b>99,86</b>      | <b>99,86</b>      | <b>99,86</b>      | <b>99,86</b>      |                   |                 |              |
|                                      |  | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,79; 100,00]  | [99,66; 100,00]  | [99,66; 100,00]  | [99,66; 100,00]  | [99,66; 100,00]   | [99,66; 100,00]   | [99,66; 100,00]   | [99,66; 100,00]   | [99,66; 100,00]   |                   |                 |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2245</i>      | <i>2019</i>      | <i>1756</i>      | <i>1611</i>      | <i>1483</i>      | <i>1408</i>      | <i>1329</i>      | <i>1225</i>      | <i>1149</i>       | <i>1090</i>       | <i>1039</i>       | <i>984</i>        | <i>932</i>        |                   |                 |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1747             | 1568             | 1370             | 1244             | 1151             | 1096             | 1048             | 983              | 925               | 876               | 836               | 789               | 739               |                   |                 |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1521             | 1329             | 1202             | 1109             | 1047             | 1021             | 953              | 902               | 860               | 818               | 775               | 726               |                   |                 |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 1                | 1                | 1                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 | 1                 |                   |                 |              |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,08             | 0,09             | 0,10             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,13              | 0,14              |                   |                 |              |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,25]     | [0,00; 0,27]     | [0,00; 0,28]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,38]      | [0,00; 0,41]      |                   |                 |              |
|                                      | kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit  | Rate                   |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,92</b>     | <b>99,83</b>     | <b>99,74</b>     | <b>99,74</b>     | <b>99,74</b>     | <b>99,74</b>      | <b>99,74</b>      | <b>99,74</b>      | <b>99,61</b>      | <b>99,47</b>      |                   |                 |              |
| CI                                   |  |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,76; 100,00]  | [99,59; 100,00]  | [99,44; 100,00]  | [99,44; 100,00]  | [99,44; 100,00]  | [99,44; 100,00]  | [99,44; 100,00]   | [99,44; 100,00]   | [99,22; 100,00]   | [99,00; 99,94]    |                   |                   |                 |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1759</i>            | <i>1578</i>      | <i>1380</i>      | <i>1253</i>      | <i>1159</i>      | <i>1105</i>      | <i>1057</i>      | <i>991</i>       | <i>933</i>       | <i>884</i>        | <i>844</i>        | <i>797</i>        | <i>747</i>        |                   |                   |                 |              |

| EZ                                   | Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr     | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3042             | 2695             | 2381            | 2168            | 2041            | 1912            | 1784            | 1680            | 1594              | 1497              | 1425              | 1357              |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2634             | 2298            | 2117            | 1928            | 1851            | 1733            | 1642            | 1571              | 1469              | 1403              | 1328              |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 1               | 0               | 1               | 1               | 1               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,04            | 0,00            | 0,05            | 0,05            | 0,06            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,08              |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,13]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,15]    | [0,00; 0,16]    | [0,00; 0,17]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,22]      |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>99,96</b>    | <b>99,96</b>    | <b>99,91</b>    | <b>99,85</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>      | <b>99,80</b>      | <b>99,80</b>      | <b>99,72</b>      |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [99,88; 100,00] | [99,88; 100,00] | [99,78; 100,00] | [99,68; 100,00] | [99,60; 100,00] | [99,60; 100,00] | [99,60; 100,00]   | [99,60; 100,00]   | [99,60; 100,00]   | [99,47; 99,97]    |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3054</i>      | <i>2707</i>      | <i>2393</i>     | <i>2179</i>     | <i>2052</i>     | <i>1924</i>     | <i>1796</i>     | <i>1691</i>     | <i>1605</i>       | <i>1506</i>       | <i>1434</i>       | <i>1366</i>       |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2333             | 2080             | 1865            | 1744            | 1626            | 1542            | 1419            | 1320            | 1250              | 1194              | 1134              | 1077              |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2024             | 1820            | 1689            | 1523            | 1479            | 1374            | 1288            | 1231              | 1169              | 1111              | 1062              |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0               | 4               | 0               | 1               | 0               | 1               | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00            | 0,24            | 0,00            | 0,07            | 0,00            | 0,08            | 0,00              | 0,09              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,47]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,20]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,23]    | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,25]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>99,76</b>    | <b>99,76</b>    | <b>99,70</b>    | <b>99,70</b>    | <b>99,62</b>    | <b>99,62</b>      | <b>99,54</b>      | <b>99,54</b>      | <b>99,54</b>      |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,53; 99,99]  | [99,53; 99,99]  | [99,44; 99,96]  | [99,44; 99,96]  | [99,32; 99,92]  | [99,32; 99,92]  | [99,19; 99,89]    | [99,19; 99,89]    | [99,19; 99,89]    |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2346</i>            | <i>2091</i>      | <i>1875</i>      | <i>1753</i>     | <i>1639</i>     | <i>1555</i>     | <i>1433</i>     | <i>1332</i>     | <i>1263</i>     | <i>1206</i>       | <i>1147</i>       | <i>1090</i>       |                   |                   |                   |
| 2007-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 6488             | 5877             | 5307            | 4963            | 4698            | 4417            | 4169            | 3968            | 3789              | 3641              | 3495              |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 5726             | 5189            | 4764            | 4555            | 4334            | 4089            | 3899            | 3737              | 3578              | 3420              |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 2                | 5               | 5               | 3               | 1               | 1               | 1               | 0                 | 0                 | 1                 |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,03             | 0,10            | 0,10            | 0,07            | 0,02            | 0,02            | 0,03            | 0,00              | 0,00              | 0,03              |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,08]     | [0,01; 0,18]    | [0,01; 0,20]    | [0,00; 0,14]    | [0,00; 0,07]    | [0,00; 0,07]    | [0,00; 0,08]    | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,09]      |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,97</b>     | <b>99,87</b>    | <b>99,77</b>    | <b>99,70</b>    | <b>99,68</b>    | <b>99,66</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,63</b>      | <b>99,63</b>      | <b>99,60</b>      |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,92; 100,00]  | [99,77; 99,97]  | [99,64; 99,90]  | [99,55; 99,85]  | [99,52; 99,84]  | [99,50; 99,82]  | [99,46; 99,80]  | [99,46; 99,80]    | [99,46; 99,80]    | [99,42; 99,78]    |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>6522</i>      | <i>5910</i>      | <i>5338</i>     | <i>4997</i>     | <i>4736</i>     | <i>4458</i>     | <i>4205</i>     | <i>4002</i>     | <i>3822</i>       | <i>3669</i>       | <i>3522</i>       |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 5276             | 4843             | 4437            | 4162            | 3905            | 3690            | 3508            | 3338            | 3187              | 3049              | 2923              |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 4743             | 4332            | 3969            | 3797            | 3604            | 3451            | 3258            | 3124              | 2983              | 2865              |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 2                | 1               | 1               | 0               | 1               | 0               | 0               | 1                 | 0                 | 1                 |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,04             | 0,02            | 0,03            | 0,00            | 0,03            | 0,00            | 0,00            | 0,03              | 0,00              | 0,03              |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,10]     | [0,00; 0,07]    | [0,00; 0,07]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,08]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,09]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,10]      |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,96</b>     | <b>99,94</b>    | <b>99,91</b>    | <b>99,91</b>    | <b>99,88</b>    | <b>99,88</b>    | <b>99,88</b>    | <b>99,85</b>      | <b>99,85</b>      | <b>99,82</b>      |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,90; 100,00]  | [99,87; 100,00]  | [99,82; 100,00] | [99,82; 100,00] | [99,78; 99,98]  | [99,78; 99,98]  | [99,78; 99,98]  | [99,73; 99,97]  | [99,73; 99,97]    | [99,68; 99,96]    |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>5314</i>            | <i>4880</i>      | <i>4472</i>      | <i>4196</i>     | <i>3934</i>     | <i>3716</i>     | <i>3532</i>     | <i>3362</i>     | <i>3209</i>     | <i>3071</i>       | <i>2944</i>       |                   |                   |                   |                   |
| 2007-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 4388             | 3870             | 3492            | 3170            | 2875            | 2654            | 2494            | 2351            | 2232              | 2121              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 3741             | 3294            | 3044            | 2777            | 2578            | 2424            | 2285            | 2174              | 2068              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 1                | 6               | 2               | 1               | 0               | 1               | 0               | 3                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,03             | 0,18            | 0,07            | 0,04            | 0,00            | 0,04            | 0,00            | 0,14              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,08]     | [0,04; 0,33]    | [0,00; 0,16]    | [0,00; 0,11]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,12]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,29]      | [0,00; 0,00]      |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,97</b>     | <b>99,80</b>    | <b>99,73</b>    | <b>99,70</b>    | <b>99,70</b>    | <b>99,66</b>    | <b>99,66</b>    | <b>99,52</b>      | <b>99,52</b>      |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,92; 100,00]  | [99,65; 99,95]  | [99,55; 99,91]  | [99,51; 99,89]  | [99,51; 99,89]  | [99,46; 99,86]  | [99,46; 99,86]  | [99,26; 99,78]    | [99,26; 99,78]    |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>4414</i>      | <i>3892</i>      | <i>3512</i>     | <i>3195</i>     | <i>2899</i>     | <i>2676</i>     | <i>2514</i>     | <i>2368</i>     | <i>2249</i>       | <i>2141</i>       |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3438             | 3073             | 2810            | 2554            | 2309            | 2150            | 2022            | 1923            | 1818              | 1740              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2980             | 2628            | 2454            | 2244            | 2101            | 1964            | 1880            | 1782              | 1696              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 3                | 6               | 0               | 0               | 1               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,10             | 0,23            | 0,00            | 0,00            | 0,05            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,21]     | [0,05; 0,41]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,14]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,90</b>     | <b>99,68</b>    | <b>99,68</b>    | <b>99,68</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,63</b>      | <b>99,63</b>      | <b>99,63</b>      |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,79; 100,00]  | [99,47; 99,89]   | [99,47; 99,89]  | [99,47; 99,89]  | [99,40; 99,86]  | [99,40; 99,86]  | [99,40; 99,86]  | [99,40; 99,86]  | [99,40; 99,86]    | [99,40; 99,86]    |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3459</i>            | <i>3091</i>      | <i>2830</i>      | <i>2577</i>     | <i>2330</i>     | <i>2170</i>     | <i>2043</i>     | <i>1941</i>     | <i>1835</i>     | <i>1756</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                   | Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr     | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 4177             | 3677             | 3295             | 2903            | 2642            | 2448            | 2264            | 2134            | 2037              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 3465             | 3110             | 2780            | 2558            | 2368            | 2197            | 2080            | 1974              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 2                | 1                | 2               | 1               | 0               | 0               | 0               | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,06             | 0,03             | 0,07            | 0,04            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,05              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,14]     | [0,00; 0,10]     | [0,00; 0,17]    | [0,00; 0,12]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,15]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,94</b>     | <b>99,91</b>     | <b>99,84</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,75</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,86; 100,00]  | [99,81; 100,00]  | [99,70; 99,98]  | [99,64; 99,96]  | [99,64; 99,96]  | [99,64; 99,96]  | [99,64; 99,96]  | [99,56; 99,94]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>4190</i>      | <i>3689</i>      | <i>3307</i>      | <i>2914</i>     | <i>2653</i>     | <i>2459</i>     | <i>2274</i>     | <i>2144</i>     | <i>2046</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3167             | 2851             | 2559             | 2299            | 2101            | 1956            | 1820            | 1721            | 1636              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2705             | 2428             | 2219            | 2048            | 1896            | 1779            | 1672            | 1582              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 0               | 1               | 0               | 2               | 0               | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,05            | 0,00            | 0,11            | 0,00            | 0,00              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,14]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>99,95</b>    | <b>99,95</b>    | <b>99,84</b>    | <b>99,84</b>    | <b>99,84</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,86; 100,00] | [99,86; 100,00] | [99,66; 100,00] | [99,66; 100,00] | [99,66; 100,00] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3188</i>            | <i>2871</i>      | <i>2579</i>      | <i>2319</i>      | <i>2120</i>     | <i>1972</i>     | <i>1834</i>     | <i>1736</i>     | <i>1650</i>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2882             | 2486             | 2146             | 1898            | 1732            | 1599            | 1499            | 1406            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2372             | 2052             | 1827            | 1677            | 1537            | 1438            | 1356            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 2               | 0               | 1               | 0               | 0               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,11            | 0,00            | 0,07            | 0,00            | 0,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,26]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,89</b>    | <b>99,89</b>    | <b>99,83</b>    | <b>99,83</b>    | <b>99,83</b>    | <b>99,83</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,74; 100,00] | [99,74; 100,00] | [99,63; 100,00] | [99,63; 100,00] | [99,63; 100,00] | [99,63; 100,00]   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2893</i>      | <i>2495</i>      | <i>2153</i>      | <i>1904</i>     | <i>1738</i>     | <i>1605</i>     | <i>1505</i>     | <i>1412</i>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2093             | 1843             | 1609             | 1415            | 1282            | 1191            | 1117            | 1053            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1768             | 1549             | 1357            | 1229            | 1142            | 1087            | 1009            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 1                | 3                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,06             | 0,19             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,17]     | [0,00; 0,41]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,94</b>     | <b>99,75</b>     | <b>99,75</b>    | <b>99,75</b>    | <b>99,75</b>    | <b>99,75</b>    | <b>99,75</b>    | <b>99,75</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,83; 100,00]  | [99,51; 99,99]   | [99,51; 99,99]   | [99,51; 99,99]  | [99,51; 99,99]  | [99,51; 99,99]  | [99,51; 99,99]  | [99,51; 99,99]  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2099</i>            | <i>1848</i>      | <i>1615</i>      | <i>1424</i>      | <i>1290</i>     | <i>1198</i>     | <i>1124</i>     | <i>1060</i>     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3203             | 2771             | 2399             | 2135            | 1963            | 1815            | 1691            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2665             | 2305             | 2071            | 1898            | 1760            | 1641            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 1                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,04             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,11]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,96</b>     | <b>99,96</b>     | <b>99,96</b>    | <b>99,96</b>    | <b>99,96</b>    | <b>99,96</b>    | <b>99,96</b>    | <b>99,96</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,89; 100,00]  | [99,89; 100,00]  | [99,89; 100,00] | [99,89; 100,00] | [99,89; 100,00] | [99,89; 100,00] | [99,89; 100,00] | [99,89; 100,00]   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3215</i>      | <i>2781</i>      | <i>2408</i>      | <i>2143</i>     | <i>1971</i>     | <i>1823</i>     | <i>1697</i>     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2410             | 2067             | 1805             | 1622            | 1490            | 1360            | 1262            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1990             | 1734             | 1567            | 1428            | 1309            | 1217            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 1                | 0                | 1               | 1               | 0               | 0               |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,05             | 0,00             | 0,06            | 0,07            | 0,00            | 0,00            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,15]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,21]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,95</b>     | <b>99,95</b>     | <b>99,89</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,85; 100,00]  | [99,85; 100,00]  | [99,73; 100,00]  | [99,61; 100,00] | [99,61; 100,00] | [99,61; 100,00] | [99,61; 100,00] | [99,61; 100,00] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2420</i>            | <i>2074</i>      | <i>1813</i>      | <i>1629</i>      | <i>1496</i>     | <i>1367</i>     | <i>1268</i>     |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                   | Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2725             | 2300             | 1966            | 1724            | 1560            | 1447           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2217             | 1882            | 1660            | 1492            | 1391           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 2                | 2               | 0               | 1               | 1              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,09             | 0,11            | 0,00            | 0,07            | 0,07           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,22]     | [0,00; 0,25]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,20]    | [0,00; 0,21]   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,91</b>     | <b>99,81</b>    | <b>99,81</b>    | <b>99,74</b>    | <b>99,67</b>   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,79; 100,00]  | [99,62; 100,00] | [99,62; 100,00] | [99,51; 99,97]  | [99,40; 99,94] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2729</i>      | <i>2303</i>      | <i>1970</i>     | <i>1730</i>     | <i>1565</i>     | <i>1452</i>    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2121             | 1834             | 1611            | 1452            | 1323            | 1241           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1763             | 1539            | 1403            | 1276            | 1193           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 1               | 0               | 0               | 1              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,06            | 0,00            | 0,00            | 0,08           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,25]   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>99,94</b>    | <b>99,94</b>    | <b>99,94</b>    | <b>99,85</b>   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI                                   |  |                        | [100,00; 100,00] | [99,81; 100,00]  | [99,81; 100,00] | [99,81; 100,00] | [99,64; 100,00] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2127</i>            | <i>1839</i>      | <i>1616</i>      | <i>1458</i>     | <i>1328</i>     | <i>1245</i>     |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3017             | 2533             | 2199            | 1967            | 1808            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2436             | 2118            | 1907            | 1751            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 2                | 0               | 1               | 0               |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,08             | 0,00            | 0,05            | 0,00            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,20]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,16]    | [0,00; 0,00]    |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,92</b>     | <b>99,92</b>    | <b>99,87</b>    | <b>99,87</b>    |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,81; 100,00]  | [99,81; 100,00] | [99,72; 100,00] | [99,72; 100,00] |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3025</i>      | <i>2538</i>      | <i>2206</i>     | <i>1972</i>     | <i>1813</i>     |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2161             | 1840             | 1578            | 1415            | 1286            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1774             | 1522            | 1365            | 1238            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 5                | 1               | 0               | 0               |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,28             | 0,07            | 0,00            | 0,00            |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,04; 0,53]     | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,72</b>     | <b>99,66</b>    | <b>99,66</b>    | <b>99,66</b>    |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI                                   |  |                        | [99,48; 99,96]   | [99,39; 99,93]   | [99,39; 99,93]  | [99,39; 99,93]  |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2174</i>            | <i>1850</i>      | <i>1591</i>      | <i>1428</i>     | <i>1299</i>     |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2010-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3079             | 2619             | 2244            | 2020            |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2537             | 2164            | 1944            |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 1               | 0               |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,05            | 0,00            |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,14]    | [0,00; 0,00]    |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>99,95</b>    | <b>99,95</b>    |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [99,86; 100,00] | [99,86; 100,00] |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3086</i>      | <i>2626</i>      | <i>2248</i>     | <i>2023</i>     |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2307             | 2018             | 1762            | 1568            |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1960             | 1702            | 1521            |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 5                | 0               | 1               |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,26             | 0,00            | 0,07            |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,03; 0,48]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,19]    |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,75</b>     | <b>99,75</b>    | <b>99,68</b>    |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI                                   |  |                        | [99,53; 99,97]   | [99,53; 99,97]   | [99,42; 99,94]  |                 |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2312</i>            | <i>2021</i>      | <i>1768</i>      | <i>1574</i>     |                 |                 |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ   | Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3138             | 2661             | 2266            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2570             | 2172            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 2               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            |                  |                  | 0,00            | 0,09        |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,22]    |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>99,91</b>    |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [99,78; 100,00] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3146</i>      | <i>2666</i>      | <i>2269</i>     |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2369             | 2080             | 1800            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2032             | 1744            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                | 0               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            |                  |                  | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                        | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI   |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>  | <i>2382</i>            | <i>2091</i>      | <i>1809</i>      |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3025             | 2597             |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 2479             |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 2                |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            |                  |                  | 0,08            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,19]     |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,92</b>     |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI                     |                  | [99,81; 100,00]  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3031</i>      | <i>2602</i>      |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2265             | 1958             |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1867             |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  | 0                |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            |                  |                  | 0,00            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                        | <b>100,00</b>    |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI   |                        | [100,00; 100,00] |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>  | <i>2272</i>            | <i>1963</i>      |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2012-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3416             |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI                     |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3423</i>      |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2485             |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | erstmalig aufgetretene Erblindung  | Anzahl                 |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | Anteil in %            |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | CI Anteil in %         |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                        |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | CI   |                        |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>  | <i>2494</i>            |                  |                  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

Das Endstadium einer diabetischen Nephropathie führt zum lebensbedrohenden Ausfall der Filterfunktion der Nieren, dem Nierenversagen (terminale Niereninsuffizienz) und damit zur Notwendigkeit der Dialyse oder gar einer Nierentransplantation.

In Tabelle 3.6.2 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einer **erstmalig aufgetretenen diabetischen Nephropathie** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Nephropathie vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine diabetische Nephropathie dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie dokumentiert ist.

**Tabelle 3.6.2 Ereigniszeitanalyse: Erstaufreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation**

| EZ                                   | Erstaufreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |                |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 301             | 278              | 239             | 207             | 182             | 168             | 157            | 151            | 140            | 135            | 131            | 123            | 118            | 113            | 107            |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 270              | 229             | 203             | 180             | 168             | 157            | 150            | 139            | 132            | 126            | 119            | 115            | 110            | 105            |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie  | Anzahl             |                 | 0                | 2               | 3               | 3               | 1               | 0              | 5              | 2              | 1              | 2              | 0              | 1              | 0              | 0              |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 0,00             | 0,87            | 1,48            | 1,67            | 0,60            | 0,00           | 3,33           | 1,44           | 0,76           | 1,59           | 0,00           | 0,87           | 0,00           | 0,00           |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,00]     | [0,00; 2,08]    | [0,00; 3,14]    | [0,00; 3,54]    | [0,00; 1,76]    | [0,00; 0,00]   | [0,45; 6,22]   | [0,00; 3,43]   | [0,00; 2,24]   | [0,00; 3,78]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 2,57]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate               |                 | <b>100,00</b>    | <b>99,16</b>    | <b>97,71</b>    | <b>96,10</b>    | <b>95,53</b>    | <b>95,53</b>   | <b>92,34</b>   | <b>91,02</b>   | <b>90,34</b>   | <b>88,93</b>   | <b>88,93</b>   | <b>88,16</b>   | <b>88,16</b>   | <b>88,16</b>   |
|                                      |  | CI                 |                 | [100,00; 100,00] | [98,00; 100,00] | [95,72; 99,70]  | [93,44; 98,76]  | [92,66; 98,40]  | [92,66; 98,40] | [88,43; 96,25] | [86,76; 95,28] | [85,91; 94,77] | [84,16; 93,70] | [84,16; 93,70] | [83,20; 93,12] | [83,20; 93,12] | [83,20; 93,12] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | Anzahl             | 342             | 318              | 277             | 242             | 220             | 207             | 194            | 186            | 176            | 172            | 167            | 159            | 152            | 147            | 141            |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 260             | 249              | 219             | 188             | 171             | 162             | 155            | 148            | 134            | 124            | 119            | 115            | 115            | 113            | 109            |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 245              | 202             | 184             | 170             | 161             | 150            | 146            | 130            | 120            | 117            | 113            | 112            | 108            | 106            |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie  | Anzahl             |                 | 2                | 1               | 0               | 0               | 0               | 0              | 12             | 1              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 0,82             | 0,50            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 8,22           | 0,77           | 0,00           | 0,85           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 1,95]     | [0,00; 1,47]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   | [3,75; 12,69]  | [0,00; 2,28]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 2,53]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate               |                 | <b>99,19</b>     | <b>98,73</b>    | <b>98,73</b>    | <b>98,73</b>    | <b>98,73</b>    | <b>98,73</b>   | <b>90,67</b>   | <b>89,97</b>   | <b>89,97</b>   | <b>89,21</b>   | <b>89,21</b>   | <b>89,21</b>   | <b>89,21</b>   | <b>89,21</b>   |
| CI                                   |  |                    | [98,07; 100,00] | [97,30; 100,00]  | [97,30; 100,00] | [97,30; 100,00] | [97,30; 100,00] | [97,30; 100,00] | [86,11; 95,23] | [85,24; 94,70] | [85,24; 94,70] | [84,29; 94,13] | [84,29; 94,13] | [84,29; 94,13] | [84,29; 94,13] | [84,29; 94,13] |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | Anzahl   | 292                | 281             | 246              | 214             | 195             | 183             | 174             | 167            | 160            | 151            | 145            | 141            | 139            | 136            | 129            |                |
| 2005-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1965            | 1790             | 1557            | 1402            | 1307            | 1243            | 1173           | 1047           | 983            | 932            | 869            | 838            | 789            | 745            |                |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 1741             | 1523            | 1379            | 1284            | 1215            | 1138           | 1025           | 963            | 912            | 851            | 823            | 769            | 730            |                |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie  | Anzahl             |                 | 23               | 9               | 8               | 4               | 4               | 78             | 21             | 15             | 14             | 10             | 18             | 8              | 12             |                |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 1,32             | 0,59            | 0,58            | 0,31            | 0,33            | 6,85           | 2,05           | 1,56           | 1,54           | 1,18           | 2,19           | 1,04           | 1,64           |                |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,78; 1,86]     | [0,21; 0,98]    | [0,18; 0,98]    | [0,01; 0,62]    | [0,01; 0,65]    | [5,39; 8,32]   | [1,18; 2,92]   | [0,78; 2,34]   | [0,74; 2,33]   | [0,45; 1,90]   | [1,19; 3,19]   | [0,32; 1,76]   | [0,72; 2,57]   |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate               |                 | <b>98,69</b>     | <b>98,11</b>    | <b>97,55</b>    | <b>97,25</b>    | <b>96,93</b>    | <b>90,39</b>   | <b>88,55</b>   | <b>87,18</b>   | <b>85,84</b>   | <b>84,84</b>   | <b>83,00</b>   | <b>82,14</b>   | <b>80,79</b>   |                |
|                                      |  | CI                 |                 | [98,16; 99,22]   | [97,46; 98,76]  | [96,80; 98,30]  | [96,44; 98,06]  | [96,07; 97,79]  | [88,77; 92,01] | [86,79; 90,31] | [85,31; 89,05] | [83,87; 87,81] | [82,80; 86,88] | [80,83; 85,17] | [79,92; 84,36] | [78,48; 83,10] |                |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | Anzahl             | 2287            | 2094             | 1857            | 1690            | 1582            | 1510            | 1432           | 1368           | 1309           | 1254           | 1185           | 1153           | 1103           | 1050           |                |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1560            | 1431             | 1240            | 1135            | 1068            | 1003            | 956            | 877            | 819            | 761            | 726            | 695            | 668            | 639            |                |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 1378             | 1210            | 1107            | 1049            | 980             | 922            | 847            | 791            | 745            | 713            | 681            | 656            | 617            |                |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie  | Anzahl             |                 | 16               | 5               | 5               | 3               | 2               | 52             | 19             | 13             | 12             | 7              | 10             | 10             | 5              |                |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 1,16             | 0,41            | 0,45            | 0,29            | 0,20            | 5,64           | 2,24           | 1,64           | 1,61           | 0,98           | 1,47           | 1,52           | 0,81           |                |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,60; 1,73]     | [0,05; 0,77]    | [0,06; 0,85]    | [0,00; 0,61]    | [0,00; 0,49]    | [4,15; 7,13]   | [1,25; 3,24]   | [0,76; 2,53]   | [0,71; 2,52]   | [0,26; 1,71]   | [0,56; 2,37]   | [0,59; 2,46]   | [0,10; 1,52]   |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate               |                 | <b>98,85</b>     | <b>98,44</b>    | <b>98,00</b>    | <b>97,73</b>    | <b>97,53</b>    | <b>92,12</b>   | <b>90,07</b>   | <b>88,61</b>   | <b>87,19</b>   | <b>86,34</b>   | <b>85,08</b>   | <b>83,80</b>   | <b>83,12</b>   |                |
| CI                                   |  |                    | [98,29; 99,41]  | [97,78; 99,10]   | [97,24; 98,76]  | [96,91; 98,55]  | [96,66; 98,40]  | [90,47; 93,77]  | [88,22; 91,92] | [86,63; 90,59] | [85,08; 89,30] | [84,16; 88,52] | [82,80; 87,36] | [81,42; 86,18] | [80,68; 85,56] |                |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | Anzahl   | 1772               | 1624            | 1439             | 1318            | 1242            | 1172            | 1116            | 1075           | 1026           | 966            | 936            | 903            | 870            | 839            |                |                |



| EZ                                   | Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2006-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2018           | 1811           | 1555           | 1413           | 1290           | 1224           | 1097           | 993            | 917            | 856            | 804            | 756            | 714            |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 1761           | 1522           | 1367           | 1253           | 1171           | 1058           | 971            | 902            | 845            | 790            | 744            | 695            |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 19             | 8              | 9              | 5              | 61             | 23             | 18             | 15             | 10             | 11             | 3              | 9              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 1,08           | 0,53           | 0,66           | 0,40           | 5,21           | 2,17           | 1,85           | 1,66           | 1,18           | 1,39           | 0,40           | 1,29           |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [0,60; 1,56]   | [0,16; 0,89]   | [0,23; 1,09]   | [0,05; 0,75]   | [3,94; 6,48]   | [1,29; 3,05]   | [1,00; 2,70]   | [0,83; 2,50]   | [0,45; 1,91]   | [0,57; 2,21]   | [0,00; 0,86]   | [0,45; 2,14]   |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>98,93</b>   | <b>98,41</b>   | <b>97,77</b>   | <b>97,38</b>   | <b>92,43</b>   | <b>90,44</b>   | <b>88,77</b>   | <b>87,30</b>   | <b>86,27</b>   | <b>85,08</b>   | <b>84,74</b>   | <b>83,64</b>   |              |
|                                      |   | CI                 |                | [98,45; 99,41] | [97,81; 99,01] | [97,04; 98,50] | [96,58; 98,18] | [91,00; 93,86] | [88,83; 92,05] | [87,01; 90,53] | [85,42; 89,18] | [84,31; 88,23] | [83,02; 87,14] | [82,66; 86,82] | [81,46; 85,82] |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2245</i>    | <i>2019</i>    | <i>1756</i>    | <i>1611</i>    | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>     |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1609           | 1444           | 1250           | 1126           | 1047           | 993            | 899            | 834            | 773            | 725            | 681            | 638            | 589            |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 1400           | 1212           | 1090           | 1008           | 948            | 877            | 808            | 752            | 712            | 667            | 626            | 579            |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 14             | 5              | 4              | 3              | 55             | 15             | 12             | 8              | 9              | 4              | 4              | 6              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 1,00           | 0,41           | 0,37           | 0,30           | 5,80           | 1,71           | 1,49           | 1,06           | 1,26           | 0,60           | 0,64           | 1,04           |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [0,48; 1,52]   | [0,05; 0,77]   | [0,01; 0,73]   | [0,00; 0,63]   | [4,31; 7,29]   | [0,85; 2,57]   | [0,65; 2,32]   | [0,33; 1,80]   | [0,44; 2,09]   | [0,01; 1,19]   | [0,01; 1,26]   | [0,21; 1,86]   |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>99,01</b>   | <b>98,61</b>   | <b>98,25</b>   | <b>97,96</b>   | <b>92,42</b>   | <b>90,84</b>   | <b>89,50</b>   | <b>88,56</b>   | <b>87,44</b>   | <b>86,92</b>   | <b>86,37</b>   | <b>85,47</b>   |              |
| CI                                   |   |                    | [98,49; 99,53] | [97,99; 99,23] | [97,54; 98,96] | [97,18; 98,74] | [90,82; 94,02] | [89,08; 92,60] | [87,61; 91,39] | [86,58; 90,54] | [85,35; 89,53] | [84,78; 89,06] | [84,18; 88,56] | [83,19; 87,75] |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1759</i>        | <i>1578</i>    | <i>1380</i>    | <i>1253</i>    | <i>1159</i>    | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     |                |              |
| 2006-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2719           | 2399           | 2088           | 1883           | 1763           | 1551           | 1409           | 1297           | 1217           | 1121           | 1047           | 975            |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 2348           | 2012           | 1839           | 1661           | 1508           | 1371           | 1269           | 1201           | 1098           | 1032           | 957            |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 27             | 13             | 9              | 103            | 42             | 29             | 16             | 16             | 24             | 15             | 18             |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 1,15           | 0,65           | 0,49           | 6,20           | 2,79           | 2,12           | 1,26           | 1,33           | 2,19           | 1,45           | 1,88           |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [0,72; 1,58]   | [0,30; 1,00]   | [0,17; 0,81]   | [5,04; 7,36]   | [1,95; 3,62]   | [1,35; 2,88]   | [0,65; 1,87]   | [0,68; 1,98]   | [1,32; 3,05]   | [0,72; 2,18]   | [1,02; 2,74]   |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>98,86</b>   | <b>98,23</b>   | <b>97,75</b>   | <b>91,90</b>   | <b>89,37</b>   | <b>87,49</b>   | <b>86,40</b>   | <b>85,26</b>   | <b>83,41</b>   | <b>82,21</b>   | <b>80,66</b>   |                |              |
|                                      |   | CI                 |                | [98,43; 99,29] | [97,68; 98,78] | [97,12; 98,38] | [90,66; 93,14] | [87,94; 90,80] | [85,94; 89,04] | [84,78; 88,02] | [83,57; 86,95] | [81,60; 85,22] | [80,33; 84,09] | [78,68; 82,64] |                |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3054</i>    | <i>2707</i>    | <i>2393</i>    | <i>2179</i>    | <i>2052</i>    | <i>1924</i>    | <i>1796</i>    | <i>1691</i>    | <i>1605</i>    | <i>1506</i>    | <i>1434</i>    | <i>1366</i>    |                |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2119           | 1894           | 1682           | 1568           | 1458           | 1313           | 1184           | 1088           | 1008           | 958            | 899            | 855            |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 1845           | 1640           | 1522           | 1366           | 1259           | 1145           | 1058           | 992            | 936            | 882            | 842            |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 12             | 7              | 11             | 68             | 25             | 18             | 25             | 4              | 12             | 5              | 7              |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 0,65           | 0,43           | 0,72           | 4,98           | 1,99           | 1,57           | 2,36           | 0,40           | 1,28           | 0,57           | 0,83           |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [0,28; 1,02]   | [0,11; 0,74]   | [0,30; 1,15]   | [3,82; 6,13]   | [1,21; 2,76]   | [0,85; 2,29]   | [1,45; 3,28]   | [0,01; 0,80]   | [0,56; 2,00]   | [0,07; 1,06]   | [0,22; 1,45]   |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>99,36</b>   | <b>98,94</b>   | <b>98,23</b>   | <b>93,51</b>   | <b>91,67</b>   | <b>90,24</b>   | <b>88,14</b>   | <b>87,79</b>   | <b>86,67</b>   | <b>86,19</b>   | <b>85,47</b>   |                |              |
| CI                                   |   |                    | [99,00; 99,72] | [98,46; 99,42] | [97,60; 98,86] | [92,26; 94,76] | [90,25; 93,09] | [88,70; 91,78] | [86,43; 89,85] | [86,05; 89,53] | [84,84; 88,50] | [84,32; 88,06] | [83,55; 87,39] |                |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2346</i>        | <i>2091</i>    | <i>1875</i>    | <i>1753</i>    | <i>1639</i>    | <i>1555</i>    | <i>1433</i>    | <i>1332</i>    | <i>1263</i>    | <i>1206</i>    | <i>1147</i>    | <i>1090</i>    |                |                |              |
| 2007-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 5760           | 5198           | 4629           | 4300           | 3822           | 3495           | 3254           | 3051           | 2885           | 2732           | 2581           |                |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 5065           | 4528           | 4130           | 3706           | 3422           | 3185           | 2999           | 2842           | 2681           | 2521           |                |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 57             | 44             | 254            | 97             | 48             | 46             | 37             | 38             | 41             | 32             |                |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 1,13           | 0,97           | 6,15           | 2,62           | 1,40           | 1,44           | 1,23           | 1,34           | 1,53           | 1,27           |                |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [0,83; 1,42]   | [0,69; 1,26]   | [5,42; 6,88]   | [2,10; 3,13]   | [1,01; 1,80]   | [1,03; 1,86]   | [0,84; 1,63]   | [0,91; 1,76]   | [1,06; 1,99]   | [0,83; 1,71]   |                |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>98,89</b>   | <b>97,94</b>   | <b>92,07</b>   | <b>89,71</b>   | <b>88,46</b>   | <b>87,19</b>   | <b>86,13</b>   | <b>84,98</b>   | <b>83,69</b>   | <b>82,63</b>   |                |                |              |
|                                      |   | CI                 |                | [98,60; 99,18] | [97,54; 98,34] | [91,28; 92,86] | [88,81; 90,61] | [87,50; 89,42] | [86,18; 88,20] | [85,08; 87,18] | [83,88; 86,08] | [82,54; 84,84] | [81,43; 83,83] |                |                |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>6522</i>    | <i>5910</i>    | <i>5338</i>    | <i>4997</i>    | <i>4736</i>    | <i>4458</i>    | <i>4205</i>    | <i>4002</i>    | <i>3822</i>    | <i>3669</i>    | <i>3522</i>    |                |                |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 4784           | 4390           | 3956           | 3690           | 3290           | 3048           | 2854           | 2680           | 2534           | 2393           | 2259           |                |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 4296           | 3862           | 3513           | 3199           | 2971           | 2813           | 2620           | 2485           | 2337           | 2212           |                |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 53             | 24             | 177            | 61             | 35             | 40             | 33             | 37             | 30             | 33             |                |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 1,23           | 0,62           | 5,04           | 1,91           | 1,18           | 1,42           | 1,26           | 1,49           | 1,28           | 1,49           |                |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [0,90; 1,56]   | [0,37; 0,87]   | [4,31; 5,76]   | [1,43; 2,38]   | [0,79; 1,57]   | [0,98; 1,86]   | [0,83; 1,69]   | [1,01; 1,97]   | [0,83; 1,74]   | [0,99; 2,00]   |                |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>98,78</b>   | <b>98,17</b>   | <b>93,37</b>   | <b>91,61</b>   | <b>90,55</b>   | <b>89,27</b>   | <b>88,15</b>   | <b>86,85</b>   | <b>85,74</b>   | <b>84,46</b>   |                |                |              |
| CI                                   |   |                    | [98,45; 99,11] | [97,76; 98,58] | [92,58; 94,16] | [90,72; 92,50] | [89,60; 91,50] | [88,26; 90,28] | [87,08; 89,22] | [85,72; 87,98] | [84,55; 86,93] | [83,21; 85,71] |                |                |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>5314</i>        | <i>4880</i>    | <i>4472</i>    | <i>4196</i>    | <i>3934</i>    | <i>3716</i>    | <i>3532</i>    | <i>3362</i>    | <i>3209</i>    | <i>3071</i>    | <i>2944</i>    |                |                |                |              |

| EZ   | Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2007-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 4002           | 3516           | 3150           | 2731           | 2419           | 2179           | 2014           | 1887           | 1766           | 1669           |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 3398           | 2975           | 2618           | 2331           | 2118           | 1955           | 1833           | 1719           | 1625           |              |              |              |              |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 20             | 140            | 61             | 57             | 35             | 12             | 27             | 15             | 10             |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                | 0,59           | 4,71           | 2,33           | 2,45           | 1,65           | 0,61           | 1,47           | 0,87           | 0,62           |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [0,33; 0,85]   | [3,94; 5,47]   | [1,75; 2,91]   | [1,82; 3,07]   | [1,11; 2,20]   | [0,27; 0,96]   | [0,92; 2,02]   | [0,43; 1,31]   | [0,24; 1,00]   |              |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>99,42</b>   | <b>94,88</b>   | <b>92,69</b>   | <b>90,45</b>   | <b>88,97</b>   | <b>88,43</b>   | <b>87,14</b>   | <b>86,39</b>   | <b>85,85</b>   |              |              |              |              |
|  |   | CI                 |                | [99,17; 99,67] | [94,11; 95,65] | [91,76; 93,62] | [89,38; 91,52] | [87,81; 90,13] | [87,23; 89,63] | [85,87; 88,41] | [85,07; 87,71] | [84,50; 87,20] |              |              |              |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4414</i>    | <i>3892</i>    | <i>3512</i>    | <i>3195</i>    | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>    | <i>2141</i>    |              |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3195           | 2848           | 2587           | 2275           | 2004           | 1843           | 1717           | 1624           | 1516           | 1426           |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 2763           | 2415           | 2179           | 1948           | 1806           | 1671           | 1589           | 1486           | 1388           |              |              |              |              |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 20             | 85             | 48             | 27             | 15             | 19             | 22             | 25             | 14             |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                | 0,72           | 3,52           | 2,20           | 1,39           | 0,83           | 1,14           | 1,38           | 1,68           | 1,01           |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [0,41; 1,04]   | [2,78; 4,25]   | [1,59; 2,82]   | [0,87; 1,91]   | [0,41; 1,25]   | [0,63; 1,65]   | [0,81; 1,96]   | [1,03; 2,34]   | [0,48; 1,53]   |              |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>99,28</b>   | <b>95,91</b>   | <b>93,83</b>   | <b>92,54</b>   | <b>91,78</b>   | <b>90,75</b>   | <b>89,50</b>   | <b>88,01</b>   | <b>87,12</b>   |                |              |              |              |              |
|  | CI  |                    | [98,97; 99,59] | [95,14; 96,68] | [92,88; 94,78] | [91,49; 93,59] | [90,67; 92,89] | [89,56; 91,94] | [88,21; 90,79] | [86,62; 89,40] | [85,67; 88,57] |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>3459</i>        | <i>3091</i>    | <i>2830</i>    | <i>2577</i>    | <i>2330</i>    | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>    |                |              |              |              |              |
| 2008-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3827           | 3370           | 2922           | 2519           | 2254           | 2058           | 1883           | 1748           | 1641           |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 3172           | 2759           | 2405           | 2178           | 1988           | 1825           | 1705           | 1589           |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 113            | 67             | 45             | 36             | 25             | 26             | 27             | 15             |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                | 3,56           | 2,43           | 1,87           | 1,65           | 1,26           | 1,42           | 1,58           | 0,94           |                |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [2,92; 4,21]   | [1,85; 3,00]   | [1,33; 2,41]   | [1,12; 2,19]   | [0,77; 1,75]   | [0,88; 1,97]   | [0,99; 2,18]   | [0,47; 1,42]   |                |              |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>96,56</b>   | <b>94,25</b>   | <b>92,53</b>   | <b>91,02</b>   | <b>89,89</b>   | <b>88,63</b>   | <b>87,24</b>   | <b>86,42</b>   |                |              |              |              |              |
|  |   | CI                 |                | [95,94; 97,18] | [93,43; 95,07] | [91,58; 93,48] | [89,97; 92,07] | [88,76; 91,02] | [87,42; 89,84] | [85,94; 88,54] | [85,07; 87,77] |                |              |              |              |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4190</i>    | <i>3689</i>    | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>    |                |              |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2972           | 2672           | 2300           | 2029           | 1828           | 1671           | 1541           | 1442           | 1361           |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 2536           | 2184           | 1955           | 1780           | 1618           | 1508           | 1398           | 1310           |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 100            | 42             | 31             | 32             | 21             | 16             | 10             | 13             |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                | 3,94           | 1,92           | 1,59           | 1,80           | 1,30           | 1,06           | 0,72           | 0,99           |                |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [3,19; 4,70]   | [1,35; 2,50]   | [1,03; 2,14]   | [1,18; 2,42]   | [0,75; 1,85]   | [0,54; 1,58]   | [0,27; 1,16]   | [0,46; 1,53]   |                |              |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>96,17</b>   | <b>94,34</b>   | <b>92,87</b>   | <b>91,22</b>   | <b>90,05</b>   | <b>89,10</b>   | <b>88,46</b>   | <b>87,59</b>   |                |                |              |              |              |              |
|  | CI  |                    | [95,43; 96,91] | [93,43; 95,25] | [91,84; 93,90] | [90,06; 92,38] | [88,80; 91,30] | [87,78; 90,42] | [87,09; 89,83] | [86,16; 89,02] |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>3188</i>        | <i>2871</i>    | <i>2579</i>    | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                |                |              |              |              |              |
| 2008-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2666           | 2294           | 1901           | 1646           | 1484           | 1345           | 1243           | 1162           |                |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 2185           | 1817           | 1582           | 1434           | 1288           | 1191           | 1114           |                |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 88             | 33             | 20             | 22             | 17             | 11             | 11             |                |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                | 4,03           | 1,82           | 1,26           | 1,53           | 1,32           | 0,92           | 0,99           |                |                |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [3,20; 4,85]   | [1,20; 2,43]   | [0,71; 1,81]   | [0,90; 2,17]   | [0,70; 1,94]   | [0,38; 1,47]   | [0,41; 1,57]   |                |                |              |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>96,03</b>   | <b>94,31</b>   | <b>93,13</b>   | <b>91,71</b>   | <b>90,52</b>   | <b>89,69</b>   | <b>88,80</b>   |                |                |              |              |              |              |
|  |   | CI                 |                | [95,22; 96,84] | [93,32; 95,30] | [92,03; 94,23] | [90,48; 92,94] | [89,18; 91,86] | [88,27; 91,11] | [87,30; 90,30] |                |                |              |              |              |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>    | <i>2495</i>    | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |                |                |              |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1955           | 1716           | 1451           | 1253           | 1120           | 1027           | 953            | 891            |                |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                | 1645           | 1397           | 1203           | 1077           | 985            | 927            | 855            |                |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 53             | 25             | 13             | 13             | 11             | 10             | 10             |                |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                | 3,22           | 1,79           | 1,08           | 1,21           | 1,12           | 1,08           | 1,17           |                |                |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                | [2,37; 4,08]   | [1,09; 2,48]   | [0,50; 1,67]   | [0,55; 1,86]   | [0,46; 1,77]   | [0,41; 1,74]   | [0,45; 1,89]   |                |                |              |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>96,82</b>   | <b>95,10</b>   | <b>94,09</b>   | <b>92,98</b>   | <b>91,96</b>   | <b>90,98</b>   | <b>89,91</b>   |                |                |                |              |              |              |              |
|  | CI  |                    | [95,98; 97,66] | [94,04; 96,16] | [92,90; 95,28] | [91,66; 94,30] | [90,53; 93,39] | [89,44; 92,52] | [88,25; 91,57] |                |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2099</i>        | <i>1848</i>    | <i>1615</i>    | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |                |                |              |              |              |              |

| EZ                                   | Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2009-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2961           | 2561           | 2153           | 1887           | 1709           | 1562           | 1443           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 2464           | 2066           | 1831           | 1653           | 1517           | 1398           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 71             | 32             | 22             | 20             | 16             | 17             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 2,88           | 1,55           | 1,20           | 1,21           | 1,05           | 1,22           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [2,22; 3,54]   | [1,02; 2,08]   | [0,70; 1,70]   | [0,68; 1,74]   | [0,54; 1,57]   | [0,64; 1,79]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>97,16</b>   | <b>95,68</b>   | <b>94,54</b>   | <b>93,41</b>   | <b>92,43</b>   | <b>91,31</b>   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI                 |                | [96,51; 97,81] | [94,86; 96,50] | [93,60; 95,48] | [92,36; 94,46] | [91,29; 93,57] | [90,06; 92,56] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3215</i>    | <i>2781</i>    | <i>2408</i>    | <i>2143</i>    | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i>    |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2266           | 1940           | 1650           | 1452           | 1321           | 1199           | 1104           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 1869           | 1583           | 1403           | 1264           | 1149           | 1063           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 49             | 31             | 14             | 13             | 8              | 8              |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 2,62           | 1,96           | 1,00           | 1,03           | 0,70           | 0,75           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [1,90; 3,35]   | [1,28; 2,64]   | [0,48; 1,52]   | [0,47; 1,58]   | [0,22; 1,18]   | [0,23; 1,27]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>97,42</b>   | <b>95,54</b>   | <b>94,59</b>   | <b>93,63</b>   | <b>92,98</b>   | <b>92,28</b>   |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI                                   |   |                    | [96,71; 98,13] | [94,58; 96,50] | [93,52; 95,66] | [92,45; 94,81] | [91,73; 94,23] | [90,95; 93,61] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2420</i>        | <i>2074</i>    | <i>1813</i>    | <i>1629</i>    | <i>1496</i>    | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2009-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2519           | 2127           | 1754           | 1512           | 1343           | 1240           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 2050           | 1682           | 1453           | 1282           | 1188           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 68             | 36             | 20             | 10             | 16             |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 3,32           | 2,14           | 1,38           | 0,78           | 1,35           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [2,54; 4,09]   | [1,45; 2,83]   | [0,78; 1,98]   | [0,30; 1,26]   | [0,69; 2,00]   |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>96,72</b>   | <b>94,67</b>   | <b>93,39</b>   | <b>92,67</b>   | <b>91,42</b>   |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI                 |                | [95,95; 97,49] | [93,67; 95,67] | [92,26; 94,52] | [91,46; 93,88] | [90,08; 92,76] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2729</i>    | <i>2303</i>    | <i>1970</i>    | <i>1730</i>    | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1975           | 1709           | 1458           | 1303           | 1168           | 1081           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 1644           | 1395           | 1259           | 1129           | 1039           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 50             | 18             | 19             | 15             | 12             |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 3,04           | 1,29           | 1,51           | 1,33           | 1,15           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [2,21; 3,87]   | [0,70; 1,88]   | [0,84; 2,18]   | [0,66; 2,00]   | [0,50; 1,80]   |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>97,00</b>   | <b>95,76</b>   | <b>94,32</b>   | <b>93,08</b>   | <b>92,00</b>   |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI                                   |   |                    | [96,18; 97,82] | [94,77; 96,75] | [93,15; 95,49] | [91,77; 94,39] | [90,57; 93,43] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2127</i>        | <i>1839</i>    | <i>1616</i>    | <i>1458</i>    | <i>1328</i>    | <i>1245</i>    |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2010-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2786           | 2337           | 1983           | 1748           | 1587           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 2250           | 1914           | 1694           | 1539           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 50             | 31             | 20             | 15             |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 2,22           | 1,62           | 1,18           | 0,97           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [1,61; 2,83]   | [1,05; 2,19]   | [0,67; 1,70]   | [0,48; 1,47]   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>97,80</b>   | <b>96,23</b>   | <b>95,11</b>   | <b>94,18</b>   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI                 |                | [97,20; 98,40] | [95,42; 97,04] | [94,17; 96,05] | [93,14; 95,22] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3025</i>    | <i>2538</i>    | <i>2206</i>    | <i>1972</i>    | <i>1813</i>    |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2019           | 1717           | 1449           | 1275           | 1150           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                | 1658           | 1401           | 1231           | 1106           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl             |                | 38             | 28             | 12             | 25             |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                | 2,29           | 2,00           | 0,97           | 2,26           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                | [1,57; 3,01]   | [1,27; 2,73]   | [0,43; 1,52]   | [1,38; 3,14]   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                | <b>97,73</b>   | <b>95,80</b>   | <b>94,88</b>   | <b>92,73</b>   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI                                   |   |                    | [97,02; 98,44] | [94,81; 96,79] | [93,77; 95,99] | [91,36; 94,10] |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2174</i>        | <i>1850</i>    | <i>1591</i>    | <i>1428</i>    | <i>1299</i>    |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ   | Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2010-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2855           | 2418           | 2013           | 1790           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 2340           | 1939           | 1718           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl                 |                | 66             | 31             | 34             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 2,82           | 1,60           | 1,98           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         |                | [2,15; 3,49]   | [1,04; 2,16]   | [1,32; 2,64]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>97,21</b>   | <b>95,67</b>   | <b>93,77</b>   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI                     |                | [96,55; 97,87] | [94,82; 96,52] | [92,73; 94,81] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3086</i>    | <i>2626</i>    | <i>2248</i>    | <i>2023</i>    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2137           | 1867           | 1581           | 1376           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1816           | 1524           | 1333           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl                 |                | 62             | 28             | 13             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 3,41           | 1,84           | 0,98           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         |                | [2,58; 4,25]   | [1,16; 2,51]   | [0,45; 1,50]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>96,62</b>   | <b>94,86</b>   | <b>93,94</b>   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI  |                        | [95,79; 97,45] | [93,82; 95,90] | [92,80; 95,08] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2312</i>            | <i>2021</i>    | <i>1768</i>    | <i>1574</i>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2906           | 2457           | 2036           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 2369           | 1952           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl                 |                | 66             | 31             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 2,79           | 1,59           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         |                | [2,12; 3,45]   | [1,03; 2,14]   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>97,24</b>   | <b>95,69</b>   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI                     |                | [96,58; 97,90] | [94,85; 96,53] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3146</i>    | <i>2666</i>    | <i>2269</i>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2197           | 1924           | 1631           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1878           | 1583           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl                 |                | 37             | 23             |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 1,97           | 1,45           |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         |                | [1,34; 2,60]   | [0,86; 2,04]   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>98,04</b>   | <b>96,62</b>   |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI  |                        | [97,42; 98,66] | [95,78; 97,46] |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2382</i>            | <i>2091</i>    | <i>1809</i>    |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2761           | 2369           |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 2262           |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl                 |                | 65             |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 2,87           |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         |                | [2,18; 3,56]   |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>97,13</b>   |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI                     |                | [96,44; 97,82] |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3031</i>    | <i>2602</i>    |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2093           | 1806           |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1723           |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl                 |                | 48             |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 2,79           |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI Anteil in %         |                | [2,01; 3,56]   |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>97,21</b>   |                |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI  |                        | [96,43; 97,99] |                |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2272</i>            | <i>1963</i>    |                |                |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                   | Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation |                | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl         | 3164                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl         |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl         |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %    |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in % |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>    |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI             |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>  | <i>3423</i>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl         | 2324                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl         |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie   | Anzahl         |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %    |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in % |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>    |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI  |                |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2494</i>    |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In Tabelle 3.6.3 wird dokumentiert, bei wie vielen erwachsenen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **ein erheblich auffälliger Fußstatus** (definiert als erstmalig vermerkte Wagner-Stadien 2 bis 5 oder Armstrong-Stadien C bis D) dokumentiert war. Dazu wird das Kollektiv derjenigen erwachsenen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation kein auffälliger oder ein leicht auffälliger Fußstatus vorlag. Dieser Status ist wie folgt definiert: Keine Amputationen und unauffälliger Fußstatus und keine Angaben zu Wagner-oder Armstrong-Stadien oder Wagner-Stadien 0 bis 1 oder Armstrong-Stadien A bis B. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte **„Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „erwachsene männliche bzw. erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. bei welchem Anteil im Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert ist (Wagner-Stadium 2 bis 5 oder Armstrong-Stadium C bis D).

**Tabelle 3.6.3 Ereigniszeitanalyse: Erstauffreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation**

| EZ  | Erstauffreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                  |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2005-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 288              | 272             | 229              | 203            | 185              | 173              | 165              | 158              | 146               | 142               | 140               | 132               | 127               | 124               | 118              |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 213             | 178              | 146            | 140              | 131              | 117              | 128              | 117               | 109               | 112               | 121               | 118               | 117               | 114              |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                  | 4               | 2                | 0              | 1                | 1                | 1                | 5                | 2                 | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 1                 | 1                |
|   |   | Anteil in %            |                  | 1,88            | 1,12             | 0,00           | 0,71             | 0,76             | 0,85             | 3,91             | 1,71              | 0,00              | 0,89              | 0,00              | 0,00              | 0,85              | 0,88             |
|   |   | CI Anteil in %         |                  | [0,05; 3,71]    | [0,00; 2,68]     | [0,00; 0,00]   | [0,00; 2,11]     | [0,00; 2,26]     | [0,00; 2,53]     | [0,54; 7,28]     | [0,00; 4,07]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 2,64]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 2,53]      | [0,00; 2,60]     |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                  | 1               | 0                |                | 1                | 0                | 0                | 0                | 1                 |                   | 0                 |                   |                   | 1                 | 0                |
|   |   | Anteil in %            |                  | 25,00           | 0,00             |                | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50,00             |                   | 0,00              |                   |                   | 100,00            | 0,00             |
|   |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 74,00]   | [0,00; 0,00]     |                | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 100,00]    |                   | [0,00; 0,00]      |                   |                   | [100,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]     |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                  | 3               | 2                |                | 0                | 1                | 1                | 5                | 1                 |                   | 1                 |                   |                   | 1                 | 1                |
|   |   | Anteil in %            |                  | 75,00           | 100,00           |                | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 50,00             |                   | 100,00            |                   |                   | 100,00            | 100,00           |
|   |   | CI Anteil in %         |                  | [26,00; 100,00] | [100,00; 100,00] |                | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [0,00; 100,00]    |                   | [100,00; 100,00]  |                   |                   | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00] |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>98,46</b>    | <b>97,58</b>     | <b>97,58</b>   | <b>97,03</b>     | <b>96,46</b>     | <b>95,87</b>     | <b>92,80</b>     | <b>91,52</b>      | <b>91,52</b>      | <b>90,84</b>      | <b>90,84</b>      | <b>90,84</b>      | <b>90,09</b>      | <b>89,30</b>     |
|   |   | CI                     |                  | [96,96; 99,96]  | [95,66; 99,50]   | [95,66; 99,50] | [94,85; 99,21]   | [94,02; 98,90]   | [93,18; 98,56]   | [89,08; 96,52]   | [87,45; 95,59]    | [87,45; 95,59]    | [86,60; 95,08]    | [86,60; 95,08]    | [86,60; 95,08]    | [85,63; 94,55]    | [84,62; 93,98]   |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>319</i>       | <i>298</i>      | <i>257</i>       | <i>226</i>     | <i>207</i>       | <i>195</i>       | <i>186</i>       | <i>178</i>       | <i>168</i>        | <i>164</i>        | <i>160</i>        | <i>152</i>        | <i>146</i>        | <i>142</i>        | <i>137</i>       |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 249              | 240             | 206              | 177            | 158              | 150              | 145              | 139              | 133               | 126               | 121               | 117               | 115               | 111               | 105              |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 193             | 144              | 127            | 122              | 114              | 108              | 120              | 110               | 106               | 104               | 110               | 110               | 104               | 98               |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                  | 2               | 3                | 2              | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 | 0                 | 1                |
|   |   | Anteil in %            |                  | 1,04            | 2,08             | 1,57           | 0,00             | 0,00             | 0,93             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,91              | 0,00              | 1,02             |
|   |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 2,47]    | [0,00; 4,42]     | [0,00; 3,75]   | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 2,74]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 2,69]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 3,02]     |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                  | 0               | 1                | 1              |                  |                  | 0                |                  |                   |                   |                   |                   | 0                 |                   | 1                |
|   |   | Anteil in %            |                  | 0,00            | 33,33            | 50,00          |                  |                  | 0,00             |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |                   | 100,00           |
|   |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]    | [0,00; 98,67]    | [0,00; 100,00] |                  |                  | [0,00; 0,00]     |                  |                   |                   |                   |                   | [0,00; 0,00]      |                   | [100,00; 100,00] |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                  | 2               | 2                | 1              |                  |                  | 1                |                  |                   |                   |                   |                   | 1                 |                   | 1                |
| Anteil in %                                     |   |                        | 100,00           | 66,67           | 50,00            |                |                  | 100,00           |                  |                  |                   |                   |                   | 100,00            |                   | 100,00            |                  |
| CI Anteil in %                                  |   |                        | [100,00; 100,00] | [1,33; 100,00]  | [0,00; 100,00]   |                |                  | [100,00; 100,00] |                  |                  |                   |                   |                   | [100,00; 100,00]  |                   | [100,00; 100,00]  |                  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,11</b>     | <b>97,58</b>    | <b>96,43</b>     | <b>96,43</b>   | <b>96,43</b>     | <b>95,74</b>     | <b>95,74</b>     | <b>95,74</b>     | <b>95,74</b>      | <b>95,74</b>      | <b>95,74</b>      | <b>94,90</b>      | <b>94,90</b>      | <b>93,93</b>      |                  |
|   | CI  |                        | [97,88; 100,00]  | [95,48; 99,68]  | [93,82; 99,04]   | [93,82; 99,04] | [93,82; 99,04]   | [92,82; 98,66]   | [92,82; 98,66]   | [92,82; 98,66]   | [92,82; 98,66]    | [92,82; 98,66]    | [92,82; 98,66]    | [91,57; 98,23]    | [91,57; 98,23]    | [90,13; 97,73]    |                  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>275</i>             | <i>265</i>       | <i>231</i>      | <i>202</i>       | <i>184</i>     | <i>172</i>       | <i>164</i>       | <i>158</i>       | <i>151</i>       | <i>144</i>        | <i>138</i>        | <i>134</i>        | <i>132</i>        | <i>129</i>        | <i>122</i>        |                  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---|---|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2005-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1779        | 1644             | 1458             | 1330             | 1236             | 1177            | 1121           | 1078             | 1035              | 1000              | 943               | 918               | 879               | 843               |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1306             | 1165             | 1031             | 977              | 913             | 868            | 846              | 799               | 781               | 737               | 732               | 679               | 657               |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 8                | 1                | 6                | 3                | 2               | 2              | 4                | 1                 | 3                 | 2                 | 4                 | 4                 | 1                 |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,61             | 0,09             | 0,58             | 0,31             | 0,22            | 0,23           | 0,47             | 0,13              | 0,38              | 0,27              | 0,55              | 0,59              | 0,15              |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,19; 1,04]     | [0,00; 0,25]     | [0,12; 1,05]     | [0,00; 0,65]     | [0,00; 0,52]    | [0,00; 0,55]   | [0,01; 0,94]     | [0,00; 0,37]      | [0,00; 0,82]      | [0,00; 0,65]      | [0,01; 1,08]      | [0,01; 1,17]      | [0,00; 0,45]      |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 7                | 0                | 4                | 3                | 1               | 1              | 1                | 1                 | 3                 | 1                 | 1                 | 1                 | 0                 |
|   |   | Anteil in %            |             | 87,50            | 0,00             | 66,67            | 100,00           | 50,00           | 50,00          | 25,00            | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 25,00             | 25,00             | 0,00              |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [63,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]     | [25,35; 100,00]  | [100,00; 100,00] | [0,00; 100,00]  | [0,00; 100,00] | [0,00; 74,00]    | [0,00; 100,00]    | [100,00; 100,00]  | [0,00; 100,00]    | [0,00; 74,00]     | [0,00; 74,00]     | [0,00; 0,00]      |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 5                | 1                | 4                | 1                | 1               | 1              | 3                | 0                 | 1                 | 1                 | 3                 | 3                 | 1                 |
|   |   | Anteil in %            |             | 62,50            | 100,00           | 66,67            | 33,33            | 50,00           | 50,00          | 75,00            | 0,00              | 33,33             | 50,00             | 75,00             | 75,00             | 100,00            |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [26,64; 98,36]   | [100,00; 100,00] | [25,35; 100,00]  | [0,00; 98,67]    | [0,00; 100,00]  | [0,00; 100,00] | [26,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]      | [0,00; 98,67]     | [0,00; 100,00]    | [26,00; 100,00]   | [26,00; 100,00]   | [100,00; 100,00]  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate                   |             | <b>99,49</b>     | <b>99,42</b>     | <b>98,95</b>     | <b>98,70</b>     | <b>98,52</b>    | <b>98,33</b>   | <b>97,94</b>     | <b>97,84</b>      | <b>97,53</b>      | <b>97,31</b>      | <b>96,85</b>      | <b>96,35</b>      | <b>96,20</b>      |
|   |   | CI                     |             | [99,14; 99,84]   | [99,04; 99,80]   | [98,42; 99,48]   | [98,10; 99,30]   | [97,87; 99,17]  | [97,63; 99,03] | [97,15; 98,73]   | [97,02; 98,66]    | [96,64; 98,42]    | [96,37; 98,25]    | [95,81; 97,89]    | [95,21; 97,49]    | [95,03; 97,37]    |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | Anzahl                 | 2160        | 1982             | 1754             | 1603             | 1498             | 1430            | 1359           | 1307             | 1254              | 1202              | 1134              | 1103              | 1058              | 1010              |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1412        | 1301             | 1161             | 1063             | 999              | 947             | 904            | 869              | 833               | 788               | 766               | 743               | 715               | 690               |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1035             | 927              | 827              | 810              | 756             | 709            | 685              | 658               | 602               | 603               | 584               | 552               | 514               |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 3                | 2                | 2                | 2                | 4               | 3              | 1                | 0                 | 2                 | 1                 | 1                 | 1                 | 2                 |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,29             | 0,22             | 0,24             | 0,25             | 0,53            | 0,42           | 0,15             | 0,00              | 0,33              | 0,17              | 0,17              | 0,18              | 0,39              |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 0,62]     | [0,00; 0,51]     | [0,00; 0,58]     | [0,00; 0,59]     | [0,01; 1,05]    | [0,00; 0,90]   | [0,00; 0,43]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,79]      | [0,00; 0,49]      | [0,00; 0,51]      | [0,00; 0,54]      | [0,00; 0,93]      |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 3                | 2                | 0                | 2                | 3               | 1              | 0                |                   | 1                 | 1                 | 0                 | 1                 | 2                 |
|   |   | Anteil in %            |             | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 75,00           | 33,33          | 0,00             |                   | 50,00             | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] | [26,00; 100,00] | [0,00; 98,67]  | [0,00; 0,00]     |                   | [0,00; 100,00]    | [100,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]      | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 0                | 1                | 2                | 0                | 2               | 2              | 1                |                   | 1                 | 0                 | 1                 | 0                 | 1                 |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,00             | 50,00            | 100,00           | 0,00             | 50,00           | 66,67          | 100,00           |                   | 50,00             | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 50,00             |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 0,00]     | [0,00; 100,00]   | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 100,00]  | [1,33; 100,00] | [100,00; 100,00] |                   | [0,00; 100,00]    | [0,00; 0,00]      | [100,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]      | [0,00; 100,00]    |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate                   |             | <b>99,76</b>     | <b>99,57</b>     | <b>99,38</b>     | <b>99,17</b>     | <b>98,73</b>    | <b>98,39</b>   | <b>98,27</b>     | <b>98,27</b>      | <b>98,00</b>      | <b>97,87</b>      | <b>97,72</b>      | <b>97,56</b>      | <b>97,18</b>      |
|   |   | CI                     |             | [99,48; 100,00]  | [99,20; 99,94]   | [98,92; 99,84]   | [98,63; 99,71]   | [98,04; 99,42]  | [97,60; 99,18] | [97,45; 99,09]   | [97,45; 99,09]    | [97,10; 98,90]    | [96,93; 98,81]    | [96,74; 98,70]    | [96,54; 98,58]    | [96,03; 98,33]    |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | Anzahl  | 1650                   | 1517        | 1356             | 1248             | 1178             | 1120             | 1069            | 1031           | 986              | 932               | 906               | 877               | 845               | 815               |                   |



| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---|---|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1773        | 1597             | 1384             | 1270             | 1172             | 1113            | 1053             | 981              | 925               | 877               | 835               | 787               | 747               |                   |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1408             | 1244             | 1122             | 1029             | 956             | 912              | 866              | 806               | 770               | 738               | 703               | 658               |                   |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 4                | 2                | 3                | 2                | 7               | 1                | 3                | 2                 | 3                 | 2                 | 2                 | 1                 |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,28             | 0,16             | 0,27             | 0,19             | 0,73            | 0,11             | 0,35             | 0,25              | 0,39              | 0,27              | 0,28              | 0,15              |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,01; 0,56]     | [0,00; 0,38]     | [0,00; 0,57]     | [0,00; 0,46]     | [0,19; 1,27]    | [0,00; 0,32]     | [0,00; 0,74]     | [0,00; 0,59]      | [0,00; 0,83]      | [0,00; 0,65]      | [0,00; 0,68]      | [0,00; 0,45]      |                   |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 2                | 2                | 1                | 2                | 6               | 1                | 1                | 1                 | 2                 | 1                 | 2                 | 1                 |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 50,00            | 100,00           | 33,33            | 100,00           | 85,71           | 100,00           | 33,33            | 50,00             | 66,67             | 50,00             | 100,00            | 100,00            |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 100,00]   | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]    | [100,00; 100,00] | [57,71; 100,00] | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]    | [0,00; 100,00]    | [1,33; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  |                   |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 3                | 1                | 2                | 1                | 2               | 1                | 2                | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 75,00            | 50,00            | 66,67            | 50,00            | 28,57           | 100,00           | 66,67            | 50,00             | 33,33             | 50,00             | 50,00             | 100,00            |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [26,00; 100,00]  | [0,00; 100,00]   | [1,33; 100,00]   | [0,00; 100,00]   | [0,00; 64,72]   | [100,00; 100,00] | [1,33; 100,00]   | [0,00; 100,00]    | [0,00; 98,67]     | [0,00; 100,00]    | [0,00; 100,00]    | [100,00; 100,00]  |                   |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,74</b>     | <b>99,59</b>     | <b>99,35</b>     | <b>99,17</b>     | <b>98,53</b>    | <b>98,43</b>     | <b>98,12</b>     | <b>97,90</b>      | <b>97,55</b>      | <b>97,30</b>      | <b>97,03</b>      | <b>96,89</b>      |                   |
|   |   | CI                     |             | [99,49; 99,99]   | [99,26; 99,92]   | [98,92; 99,78]   | [98,68; 99,66]   | [97,85; 99,21]  | [97,72; 99,14]   | [97,33; 98,91]   | [97,06; 98,74]    | [96,62; 98,48]    | [96,31; 98,29]    | [95,98; 98,08]    | [95,80; 97,98]    |                   |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2101</i> | <i>1884</i>      | <i>1636</i>      | <i>1499</i>      | <i>1384</i>      | <i>1313</i>     | <i>1247</i>      | <i>1155</i>      | <i>1086</i>       | <i>1032</i>       | <i>988</i>        | <i>935</i>        | <i>886</i>        |                   |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1349        | 1213             | 1065             | 970              | 896              | 856             | 820              | 773              | 733               | 695               | 664               | 627               | 592               |                   |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1066             | 935              | 827              | 776              | 725             | 709              | 664              | 641               | 609               | 586               | 559               | 527               |                   |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 4                | 3                | 1                | 1                | 2               | 1                | 1                | 1                 | 1                 | 0                 | 1                 | 3                 |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,38             | 0,32             | 0,12             | 0,13             | 0,28            | 0,14             | 0,15             | 0,16              | 0,16              | 0,00              | 0,18              | 0,57              |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,01; 0,74]     | [0,00; 0,68]     | [0,00; 0,36]     | [0,00; 0,38]     | [0,00; 0,66]    | [0,00; 0,42]     | [0,00; 0,45]     | [0,00; 0,46]      | [0,00; 0,49]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,53]      | [0,00; 1,21]      |                   |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 4                | 3                | 1                | 0                | 1               | 0                | 1                | 1                 | 0                 |                   | 1                 | 2                 |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 50,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00            | 0,00              |                   | 100,00            | 66,67             |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]      |                   | [100,00; 100,00]  | [1,33; 100,00]    |                   |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 1                | 0                | 0                | 1                | 1               | 1                | 0                | 1                 | 1                 |                   | 0                 | 1                 |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 25,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 50,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00            | 100,00            |                   | 0,00              | 33,33             |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 74,00]    | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] | [0,00; 100,00]  | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  |                   | [0,00; 0,00]      | [0,00; 98,67]     |                   |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,66</b>     | <b>99,36</b>     | <b>99,26</b>     | <b>99,14</b>     | <b>98,90</b>    | <b>98,77</b>     | <b>98,64</b>     | <b>98,50</b>      | <b>98,35</b>      | <b>98,35</b>      | <b>98,18</b>      | <b>97,63</b>      |                   |
|   |   | CI                     |             | [99,32; 100,00]  | [98,89; 99,83]   | [98,74; 99,78]   | [98,58; 99,70]   | [98,25; 99,55]  | [98,07; 99,47]   | [97,90; 99,38]   | [97,71; 99,29]    | [97,51; 99,19]    | [97,51; 99,19]    | [97,28; 99,08]    | [96,53; 98,73]    |                   |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1598</i>            | <i>1429</i> | <i>1256</i>      | <i>1138</i>      | <i>1052</i>      | <i>1005</i>      | <i>964</i>      | <i>908</i>       | <i>856</i>       | <i>812</i>        | <i>779</i>        | <i>738</i>        | <i>696</i>        |                   |                   |

| EZ     | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------|---|------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006-2 | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2317        | 2059             | 1805             | 1645           | 1546            | 1445             | 1342             | 1256             | 1185              | 1118              | 1059              | 1002              |                   |                   |
|        | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1726             | 1482             | 1358           | 1232            | 1168             | 1097             | 1037             | 979               | 946               | 891               | 823               |                   |                   |
|        | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 9                | 4                | 2              | 5               | 4                | 3                | 4                | 3                 | 5                 | 4                 | 2                 |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 0,52             | 0,27             | 0,15           | 0,41            | 0,34             | 0,27             | 0,39             | 0,31              | 0,53              | 0,45              | 0,24              |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [0,18; 0,86]     | [0,01; 0,53]     | [0,00; 0,35]   | [0,05; 0,76]    | [0,01; 0,68]     | [0,00; 0,58]     | [0,01; 0,76]     | [0,00; 0,65]      | [0,07; 0,99]      | [0,01; 0,89]      | [0,00; 0,58]      |                   |                   |
|        | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 5                | 2                | 1              | 4               | 1                | 3                | 1                | 1                 | 4                 | 3                 | 0                 |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 55,56            | 50,00            | 50,00          | 80,00           | 25,00            | 100,00           | 25,00            | 33,33             | 80,00             | 75,00             | 0,00              |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [21,12; 89,99]   | [0,00; 100,00]   | [0,00; 100,00] | [40,80; 100,00] | [0,00; 74,00]    | [100,00; 100,00] | [0,00; 74,00]    | [0,00; 98,67]     | [40,80; 100,00]   | [26,00; 100,00]   | [0,00; 0,00]      |                   |                   |
|        | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 6                | 2                | 1              | 3               | 4                | 1                | 4                | 2                 | 3                 | 1                 | 2                 |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 66,67            | 50,00            | 50,00          | 60,00           | 100,00           | 33,33            | 100,00           | 66,67             | 60,00             | 25,00             | 100,00            |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [34,00; 99,33]   | [0,00; 100,00]   | [0,00; 100,00] | [11,99; 100,00] | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]    | [100,00; 100,00] | [1,33; 100,00]    | [11,99; 100,00]   | [0,00; 74,00]     | [100,00; 100,00]  |                   |                   |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,54</b>     | <b>99,31</b>     | <b>99,18</b>   | <b>98,84</b>    | <b>98,55</b>     | <b>98,32</b>     | <b>97,99</b>     | <b>97,73</b>      | <b>97,27</b>      | <b>96,87</b>      | <b>96,63</b>      |                   |                   |
|        |   | CI                     |             | [99,24; 99,84]   | [98,94; 99,68]   | [98,77; 99,59] | [98,33; 99,35]  | [97,97; 99,13]   | [97,68; 98,96]   | [97,28; 98,70]   | [96,96; 98,50]    | [96,41; 98,13]    | [95,92; 97,82]    | [95,63; 97,63]    |                   |                   |
|        | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2885</i> | <i>2561</i>      | <i>2258</i>      | <i>2061</i>    | <i>1941</i>     | <i>1826</i>      | <i>1708</i>      | <i>1608</i>      | <i>1526</i>       | <i>1433</i>       | <i>1364</i>       | <i>1300</i>       |                   |                   |
|        | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1730        | 1539             | 1389             | 1310           | 1222            | 1157             | 1063             | 989              | 946               | 910               | 865               | 822               |                   |                   |
|        | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1287             | 1141             | 1082           | 987             | 925              | 898              | 820              | 795               | 763               | 729               | 682               |                   |                   |
|        | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 3                | 2                | 4              | 4               | 2                | 1                | 0                | 0                 | 2                 | 1                 | 1                 |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 0,23             | 0,18             | 0,37           | 0,41            | 0,22             | 0,11             | 0,00             | 0,00              | 0,26              | 0,14              | 0,15              |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 0,50]     | [0,00; 0,42]     | [0,01; 0,73]   | [0,01; 0,80]    | [0,00; 0,52]     | [0,00; 0,33]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,63]      | [0,00; 0,41]      | [0,00; 0,43]      |                   |                   |
|        | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 3                | 0                | 2              | 3               | 0                | 0                |                  |                   | 1                 | 0                 | 1                 |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 100,00           | 0,00             | 50,00          | 75,00           | 0,00             | 0,00             |                  |                   | 50,00             | 0,00              | 100,00            |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 100,00] | [26,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     |                  |                   | [0,00; 100,00]    | [0,00; 0,00]      | [100,00; 100,00]  |                   |                   |
|        | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 2                | 2                | 2              | 2               | 2                | 1                |                  |                   | 1                 | 1                 | 0                 |                   |                   |
|        |   | Anteil in %            |             | 66,67            | 100,00           | 50,00          | 50,00           | 100,00           | 100,00           |                  |                   | 50,00             | 100,00            | 0,00              |                   |                   |
|        |   | CI Anteil in %         |             | [1,33; 100,00]   | [100,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 100,00]  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] |                  |                   | [0,00; 100,00]    | [100,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]      |                   |                   |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,80</b>     | <b>99,65</b>     | <b>99,33</b>   | <b>98,98</b>    | <b>98,80</b>     | <b>98,70</b>     | <b>98,70</b>     | <b>98,70</b>      | <b>98,47</b>      | <b>98,35</b>      | <b>98,20</b>      |                   |                   |
|        |   | CI                     |             | [99,57; 100,00]  | [99,34; 99,96]   | [98,89; 99,77] | [98,43; 99,53]  | [98,19; 99,41]   | [98,07; 99,33]   | [98,07; 99,33]   | [98,07; 99,33]    | [98,07; 99,33]    | [97,76; 99,18]    | [97,60; 99,10]    | [97,40; 99,00]    |                   |
|        | <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2151</i> | <i>1915</i>      | <i>1729</i>      | <i>1619</i>    | <i>1514</i>     | <i>1441</i>      | <i>1333</i>      | <i>1247</i>      | <i>1194</i>       | <i>1143</i>       | <i>1091</i>       | <i>1037</i>       |                   |                   |

| EZ     | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr     | 10. Halb-jahr   | 11. Halb-jahr    | 12. Halb-jahr    | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|--------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2007-1 | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 4908        | 4459            | 4031            | 3765            | 3571            | 3372            | 3192            | 3041            | 2903            | 2779             | 2667             |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 3548            | 3300            | 2926            | 2808            | 2687            | 2509            | 2333            | 2224            | 2152             | 2004             |               |               |               |
|        | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl             |             | 15              | 8               | 9               | 5               | 5               | 8               | 8               | 8               | 7                | 7                |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,42            | 0,24            | 0,31            | 0,18            | 0,19            | 0,32            | 0,34            | 0,36            | 0,33             | 0,35             |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [0,21; 0,64]    | [0,07; 0,41]    | [0,11; 0,51]    | [0,02; 0,33]    | [0,02; 0,35]    | [0,10; 0,54]    | [0,11; 0,58]    | [0,11; 0,61]    | [0,08; 0,57]     | [0,09; 0,61]     |               |               |               |
|        | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl             |             | 12              | 7               | 6               | 3               | 3               | 5               | 4               | 5               | 7                | 4                |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 80,00           | 87,50           | 66,67           | 60,00           | 60,00           | 62,50           | 50,00           | 62,50           | 100,00           | 57,14            |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [59,05; 100,00] | [63,00; 100,00] | [34,00; 99,33]  | [11,99; 100,00] | [11,99; 100,00] | [26,64; 98,36]  | [12,96; 87,04]  | [26,64; 98,36]  | [100,00; 100,00] | [17,54; 96,74]   |               |               |               |
|        | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl             |             | 6               | 5               | 5               | 2               | 2               | 3               | 6               | 5               | 3                | 4                |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 40,00           | 62,50           | 55,56           | 40,00           | 40,00           | 37,50           | 75,00           | 62,50           | 42,86            | 57,14            |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [14,34; 65,66]  | [26,64; 98,36]  | [21,12; 89,99]  | [0,00; 88,01]   | [0,00; 88,01]   | [1,64; 73,36]   | [42,92; 100,00] | [26,64; 98,36]  | [3,26; 82,46]    | [17,54; 96,74]   |               |               |               |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |             | <b>99,65</b>    | <b>99,44</b>    | <b>99,19</b>    | <b>99,05</b>    | <b>98,89</b>    | <b>98,63</b>    | <b>98,35</b>    | <b>98,05</b>    | <b>97,77</b>     | <b>97,43</b>     |               |               |               |
|        |   | CI                 |             | [99,47; 99,83]  | [99,21; 99,67]  | [98,91; 99,47]  | [98,74; 99,36]  | [98,55; 99,23]  | [98,25; 99,01]  | [97,92; 98,78]  | [97,58; 98,52]  | [97,25; 98,29]   | [96,86; 98,00]   |               |               |               |
|        | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | Anzahl             | 6090        | 5508            | 4973            | 4653            | 4423            | 4172            | 3943            | 3762            | 3595            | 3456             | 3318             |               |               |               |
|        | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 3973        | 3646            | 3328            | 3109            | 2932            | 2775            | 2642            | 2511            | 2397            | 2295             | 2194             |               |               |               |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 2959            | 2719            | 2402            | 2310            | 2181            | 2085            | 1921            | 1830            | 1769             | 1694             |               |               |               |
|        | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl             |             | 14              | 5               | 6               | 5               | 6               | 5               | 9               | 4               | 5                | 2                |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,47            | 0,18            | 0,25            | 0,22            | 0,28            | 0,24            | 0,47            | 0,22            | 0,28             | 0,12             |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [0,23; 0,72]    | [0,02; 0,34]    | [0,05; 0,45]    | [0,03; 0,41]    | [0,06; 0,49]    | [0,03; 0,45]    | [0,16; 0,77]    | [0,00; 0,43]    | [0,04; 0,53]     | [0,00; 0,28]     |               |               |               |
|        | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl             |             | 9               | 4               | 3               | 3               | 3               | 4               | 7               | 2               | 1                | 0                |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 64,29           | 80,00           | 50,00           | 60,00           | 50,00           | 80,00           | 77,78           | 50,00           | 20,00            | 0,00             |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [38,24; 90,33]  | [40,80; 100,00] | [6,17; 93,83]   | [11,99; 100,00] | [6,17; 93,83]   | [40,80; 100,00] | [48,97; 100,00] | [0,00; 100,00]  | [0,00; 59,20]    | [0,00; 0,00]     |               |               |               |
|        | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl             |             | 7               | 2               | 5               | 2               | 3               | 1               | 2               | 3               | 4                | 2                |               |               |               |
|        |   | Anteil in %        |             | 50,00           | 40,00           | 83,33           | 40,00           | 50,00           | 20,00           | 22,22           | 75,00           | 80,00            | 100,00           |               |               |               |
|        |   | CI Anteil in %     |             | [22,82; 77,18]  | [0,00; 88,01]   | [50,67; 100,00] | [0,00; 88,01]   | [6,17; 93,83]   | [0,00; 59,20]   | [0,00; 51,03]   | [26,00; 100,00] | [40,80; 100,00]  | [100,00; 100,00] |               |               |               |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |             | <b>99,60</b>    | <b>99,44</b>    | <b>99,24</b>    | <b>99,06</b>    | <b>98,84</b>    | <b>98,64</b>    | <b>98,26</b>    | <b>98,08</b>    | <b>97,83</b>     | <b>97,72</b>     |               |               |               |
|        |   | CI                 |             | [99,39; 99,81]  | [99,19; 99,69]  | [98,94; 99,54]  | [98,72; 99,40]  | [98,46; 99,22]  | [98,22; 99,06]  | [97,78; 98,74]  | [97,57; 98,59]  | [97,27; 98,39]   | [97,14; 98,30]   |               |               |               |
|        | <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i>   | Anzahl             | 4916        | 4513            | 4134            | 3883            | 3662            | 3461            | 3293            | 3142            | 3004            | 2874             | 2757             |               |               |               |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---|---|------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2943        | 2580            | 2324             | 2112             | 1923            | 1779             | 1675             | 1585           | 1504              | 1431              |                   |                   |                   |                   |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 2145            | 1857             | 1670             | 1517            | 1402             | 1334             | 1248           | 1227              | 1129              |                   |                   |                   |                   |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 11              | 9                | 5                | 8               | 7                | 3                | 3              | 4                 | 3                 |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,51            | 0,48             | 0,30             | 0,53            | 0,50             | 0,22             | 0,24           | 0,33              | 0,27              |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,21; 0,82]    | [0,17; 0,80]     | [0,04; 0,56]     | [0,16; 0,89]    | [0,13; 0,87]     | [0,00; 0,48]     | [0,00; 0,51]   | [0,01; 0,65]      | [0,00; 0,57]      |                   |                   |                   |                   |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 6               | 6                | 3                | 6               | 6                | 1                | 2              | 4                 | 2                 |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 54,55           | 66,67            | 60,00            | 75,00           | 85,71            | 33,33            | 66,67          | 100,00            | 66,67             |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [23,68; 85,41]  | [34,00; 99,33]   | [11,99; 100,00]  | [42,92; 100,00] | [57,71; 100,00]  | [0,00; 98,67]    | [1,33; 100,00] | [100,00; 100,00]  | [1,33; 100,00]    |                   |                   |                   |                   |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 7               | 4                | 3                | 5               | 3                | 3                | 2              | 1                 | 2                 |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 63,64           | 44,44            | 60,00            | 62,50           | 42,86            | 100,00           | 66,67          | 25,00             | 66,67             |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [33,82; 93,45]  | [10,01; 78,88]   | [11,99; 100,00]  | [26,64; 98,36]  | [3,26; 82,46]    | [100,00; 100,00] | [1,33; 100,00] | [0,00; 74,00]     | [1,33; 100,00]    |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,55</b>    | <b>99,14</b>     | <b>98,89</b>     | <b>98,45</b>    | <b>98,04</b>     | <b>97,85</b>     | <b>97,65</b>   | <b>97,36</b>      | <b>97,10</b>      |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI                     |             | [99,29; 99,81]  | [98,76; 99,52]   | [98,46; 99,32]   | [97,92; 98,98]  | [97,43; 98,65]   | [97,21; 98,49]   | [96,97; 98,33] | [96,62; 98,10]    | [96,31; 97,89]    |                   |                   |                   |                   |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3831</i> | <i>3352</i>     | <i>3019</i>      | <i>2744</i>      | <i>2493</i>     | <i>2304</i>      | <i>2170</i>      | <i>2045</i>    | <i>1950</i>       | <i>1862</i>       |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2322        | 2089            | 1908             | 1745             | 1572            | 1460             | 1377             | 1312           | 1240              | 1188              |                   |                   |                   |                   |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1711            | 1497             | 1397             | 1264            | 1151             | 1094             | 1039           | 981               | 937               |                   |                   |                   |                   |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 5               | 2                | 4                | 0               | 1                | 4                | 0              | 1                 | 3                 |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,29            | 0,13             | 0,29             | 0,00            | 0,09             | 0,37             | 0,00           | 0,10              | 0,32              |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,04; 0,55]    | [0,00; 0,32]     | [0,01; 0,57]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,26]     | [0,01; 0,72]     | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,30]      | [0,00; 0,68]      |                   |                   |                   |                   |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 3               | 2                | 4                |                 | 1                | 1                |                | 0                 | 1                 |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 60,00           | 100,00           | 100,00           |                 | 100,00           | 25,00            |                | 0,00              | 33,33             |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [11,99; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] |                 | [100,00; 100,00] | [0,00; 74,00]    |                | [0,00; 0,00]      | [0,00; 98,67]     |                   |                   |                   |                   |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 2               | 1                | 2                |                 | 0                | 4                |                | 1                 | 3                 |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             | 40,00           | 50,00            | 50,00            |                 | 0,00             | 100,00           |                | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 88,01]   | [0,00; 100,00]   | [0,00; 100,00]   |                 | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] |                | [100,00; 100,00]  | [100,00; 100,00]  |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,75</b>    | <b>99,63</b>     | <b>99,39</b>     | <b>99,39</b>    | <b>99,32</b>     | <b>99,01</b>     | <b>99,01</b>   | <b>98,92</b>      | <b>98,60</b>      |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI                     |             | [99,53; 99,97]  | [99,36; 99,90]   | [99,03; 99,75]   | [99,03; 99,75]  | [98,93; 99,71]   | [98,52; 99,50]   | [98,52; 99,50] | [98,40; 99,44]    | [97,97; 99,23]    |                   |                   |                   |                   |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2944</i>            | <i>2632</i> | <i>2409</i>     | <i>2203</i>      | <i>1998</i>      | <i>1862</i>     | <i>1758</i>      | <i>1670</i>      | <i>1581</i>    | <i>1516</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ     | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr                                       | 2. Halbjahr   | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------|---|--|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2006-1 | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl   | 2889          | 2523             | 2254             | 1979             | 1806            | 1678             | 1558            | 1462             | 1399              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar  | Anzahl   |               | 2000             | 1748             | 1519             | 1414            | 1256             | 1204            | 1124             | 1074              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl   |               | 10               | 2                | 9                | 5               | 2                | 8               | 1                | 2                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %  |               | 0,50             | 0,11             | 0,59             | 0,35            | 0,16             | 0,66            | 0,09             | 0,19              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %   |               | [0,19; 0,81]     | [0,00; 0,27]     | [0,21; 0,98]     | [0,04; 0,66]    | [0,00; 0,38]     | [0,21; 1,12]    | [0,00; 0,26]     | [0,00; 0,44]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl   |               | 7                | 0                | 8                | 4               | 1                | 6               | 1                | 2                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %  |               | 70,00            | 0,00             | 88,89            | 80,00           | 50,00            | 75,00           | 100,00           | 100,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %   |               | [40,06; 99,94]   | [0,00; 0,00]     | [67,11; 100,00]  | [40,80; 100,00] | [0,00; 100,00]   | [42,92; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00]  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl   |               | 6                | 2                | 3                | 2               | 2                | 6               | 0                | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %  |               | 60,00            | 100,00           | 33,33            | 40,00           | 100,00           | 75,00           | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %   |               | [27,99; 92,01]   | [100,00; 100,00] | [0,67; 66,00]    | [0,00; 88,01]   | [100,00; 100,00] | [42,92; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>  |               | <b>99,58</b>     | <b>99,48</b>     | <b>99,00</b>     | <b>98,70</b>    | <b>98,58</b>     | <b>98,02</b>    | <b>97,94</b>     | <b>97,76</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI   |               | [99,32; 99,84]   | [99,19; 99,77]   | [98,57; 99,43]   | [98,20; 99,20]  | [98,05; 99,11]   | [97,37; 98,67]  | [97,27; 98,61]   | [97,05; 98,47]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>              | <i>Anzahl</i> | <i>3801</i>      | <i>3327</i>      | <i>2978</i>      | <i>2612</i>     | <i>2374</i>      | <i>2200</i>     | <i>2035</i>      | <i>1923</i>       | <i>1841</i>       |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b> | Anzahl        | 2176             | 1973             | 1786             | 1597            | 1457             | 1343            | 1250             | 1184              | 1123              |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | auswertbar   | Anzahl        |                  | 1548             | 1398             | 1219            | 1140             | 1039            | 984              | 926               | 871               |                   |                   |                   |                   |  |
|        | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl   |               | 4                | 3                | 1                | 3               | 3                | 3               | 3                | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %  |               | 0,26             | 0,21             | 0,08             | 0,26            | 0,29             | 0,30            | 0,32             | 0,11              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %   |               | [0,01; 0,51]     | [0,00; 0,46]     | [0,00; 0,24]     | [0,00; 0,56]    | [0,00; 0,62]     | [0,00; 0,65]    | [0,00; 0,69]     | [0,00; 0,34]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl   |               | 4                | 0                | 1                | 1               | 1                | 1               | 0                | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %  |               | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 33,33           | 33,33            | 33,33           | 0,00             | 100,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %   |               | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]   | [0,00; 98,67]    | [0,00; 98,67]   | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00]  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl   |               | 0                | 3                | 1                | 2               | 2                | 2               | 3                | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %  |               | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 66,67           | 66,67            | 66,67           | 100,00           | 0,00              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI Anteil in %   |               | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [1,33; 100,00]  | [1,33; 100,00]   | [1,33; 100,00]  | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>  |               | <b>99,78</b>     | <b>99,60</b>     | <b>99,53</b>     | <b>99,31</b>    | <b>99,08</b>     | <b>98,82</b>    | <b>98,53</b>     | <b>98,42</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI   |               | [99,57; 99,99]   | [99,30; 99,90]   | [99,21; 99,85]   | [98,90; 99,72]  | [98,59; 99,57]   | [98,25; 99,39]  | [97,88; 99,18]   | [97,73; 99,11]    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i>              | <i>Anzahl</i> | <i>2805</i>      | <i>2533</i>      | <i>2275</i>      | <i>2042</i>     | <i>1868</i>      | <i>1733</i>     | <i>1616</i>      | <i>1535</i>       | <i>1460</i>       |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2006-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1969        | 1703             | 1461             | 1294             | 1185             | 1096           | 1029             | 959              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 1394             | 1176             | 1025             | 953              | 865            | 806              | 756              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 7                | 6                | 1                | 2                | 3              | 3                | 3                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,50             | 0,51             | 0,10             | 0,21             | 0,35           | 0,37             | 0,40             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,13; 0,87]     | [0,10; 0,92]     | [0,00; 0,29]     | [0,00; 0,50]     | [0,00; 0,74]   | [0,00; 0,79]     | [0,00; 0,85]     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 4                | 5                | 1                | 2                | 2              | 3                | 1                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |             | 57,14            | 83,33            | 100,00           | 100,00           | 66,67          | 100,00           | 33,33            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [17,54; 96,74]   | [50,67; 100,00]  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [1,33; 100,00] | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 5                | 2                | 0                | 0                | 2              | 1                | 3                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |             | 71,43            | 33,33            | 0,00             | 0,00             | 66,67          | 33,33            | 100,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [35,28; 100,00]  | [0,00; 74,65]    | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [1,33; 100,00] | [0,00; 98,67]    | [100,00; 100,00] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,55</b>     | <b>99,11</b>     | <b>99,03</b>     | <b>98,84</b>     | <b>98,54</b>   | <b>98,21</b>     | <b>97,82</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI                     |             | [99,22; 99,88]   | [98,63; 99,59]   | [98,52; 99,54]   | [98,27; 99,41]   | [97,88; 99,20] | [97,45; 98,97]   | [96,95; 98,69]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2583</i> | <i>2211</i>      | <i>1898</i>      | <i>1677</i>      | <i>1530</i>      | <i>1414</i>    | <i>1323</i>      | <i>1240</i>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1383        | 1206             | 1046             | 921              | 833              | 777            | 738              | 704              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             | 961              | 833              | 724              | 665              | 598            | 597              | 558              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             | 2                | 2                | 4                | 3                | 0              | 1                | 3                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |             | 0,21             | 0,24             | 0,55             | 0,45             | 0,00           | 0,17             | 0,54             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 0,50]     | [0,00; 0,57]     | [0,01; 1,09]     | [0,00; 0,96]     | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,50]     | [0,00; 1,14]     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             | 2                | 2                | 2                | 2                |                | 0                | 1                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |             | 100,00           | 100,00           | 50,00            | 66,67            |                | 0,00             | 33,33            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [0,00; 100,00]   | [1,33; 100,00]   |                | [0,00; 0,00]     | [0,00; 98,67]    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             | 1                | 1                | 2                | 1                |                | 1                | 2                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 33,33            |                | 100,00           | 66,67            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |             | [0,00; 100,00]   | [0,00; 100,00]   | [0,00; 100,00]   | [0,00; 98,67]    |                | [100,00; 100,00] | [1,33; 100,00]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             | <b>99,82</b>     | <b>99,61</b>     | <b>99,15</b>     | <b>98,77</b>     | <b>98,77</b>   | <b>98,62</b>     | <b>98,09</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI                     |             | [99,57; 100,00]  | [99,23; 99,99]   | [98,56; 99,74]   | [98,04; 99,50]   | [98,04; 99,50] | [97,84; 99,40]   | [97,11; 99,07]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1849</i>            | <i>1617</i> | <i>1409</i>      | <i>1246</i>      | <i>1130</i>      | <i>1052</i>      | <i>987</i>     | <i>938</i>       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2009-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2049        | 1772            | 1506             | 1333            | 1210             | 1116           | 1059             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             |             | 1439            | 1214             | 1042            | 973              | 873            | 835              |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl             |             | 11              | 5                | 9               | 7                | 2              | 3                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | Anteil in %        |             | 0,76            | 0,41             | 0,86            | 0,72             | 0,23           | 0,36             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI Anteil in %     |             | [0,31; 1,21]    | [0,05; 0,77]     | [0,30; 1,43]    | [0,19; 1,25]     | [0,00; 0,55]   | [0,00; 0,77]     |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl             |             | 5               | 2                | 7               | 0                | 1              | 1                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | Anteil in %        |             | 45,45           | 40,00            | 77,78           | 0,00             | 50,00          | 33,33            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI Anteil in %     |             | [14,59; 76,32]  | [0,00; 88,01]    | [48,97; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 100,00] | [0,00; 98,67]    |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl             |             | 8               | 4                | 3               | 7                | 1              | 3                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | Anteil in %        |             | 72,73           | 80,00            | 33,33           | 100,00           | 50,00          | 100,00           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI Anteil in %     |             | [45,12; 100,00] | [40,80; 100,00]  | [0,67; 66,00]   | [100,00; 100,00] | [0,00; 100,00] | [100,00; 100,00] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,33</b>    | <b>98,97</b>     | <b>98,25</b>    | <b>97,63</b>     | <b>97,43</b>   | <b>97,08</b>     |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI                 |             | [98,93; 99,73]  | [98,47; 99,47]   | [97,57; 98,93]  | [96,81; 98,45]   | [96,57; 98,29] | [96,13; 98,03]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2879</i> | <i>2469</i>     | <i>2119</i>      | <i>1871</i>     | <i>1720</i>      | <i>1590</i>    | <i>1479</i>      |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1551        | 1322            | 1141             | 1019            | 930              | 857            | 792              |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | auswertbar  | Anzahl             |             | 1082            | 942              | 812             | 753              | 671            | 637              |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl             |             | 2               | 2                | 3               | 2                | 0              | 0                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | Anteil in %        |             | 0,18            | 0,21             | 0,37            | 0,27             | 0,00           | 0,00             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI Anteil in %     |             | [0,00; 0,44]    | [0,00; 0,51]     | [0,00; 0,79]    | [0,00; 0,63]     | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]     |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl             |             | 1               | 0                | 2               | 0                |                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | Anteil in %        |             | 50,00           | 0,00             | 66,67           | 0,00             |                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI Anteil in %     |             | [0,00; 100,00]  | [0,00; 0,00]     | [1,33; 100,00]  | [0,00; 0,00]     |                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl             |             | 1               | 2                | 1               | 2                |                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | Anteil in %        |             | 50,00           | 100,00           | 33,33           | 100,00           |                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI Anteil in %     |             | [0,00; 100,00]  | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]   | [100,00; 100,00] |                |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,84</b>    | <b>99,65</b>     | <b>99,33</b>    | <b>99,10</b>     | <b>99,10</b>   | <b>99,10</b>     |             |               |               |               |               |               |               |  |
|   |   | CI                 |             | [99,62; 100,00] | [99,31; 99,99]   | [98,83; 99,83]  | [98,51; 99,69]   | [98,51; 99,69] | [98,51; 99,69]   |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2092</i>        | <i>1773</i> | <i>1540</i>     | <i>1383</i>      | <i>1272</i>     | <i>1168</i>      | <i>1085</i>    |                  |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2009-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1742            | 1470            | 1255           | 1106            | 1004             | 937              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1202            | 1027           | 880             | 778              | 731              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                 | 7               | 4              | 5               | 2                | 3                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 0,58            | 0,39           | 0,57            | 0,26             | 0,41             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [0,15; 1,01]    | [0,01; 0,77]   | [0,07; 1,07]    | [0,00; 0,61]     | [0,00; 0,87]     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                 | 5               | 2              | 2               | 2                | 1                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 71,43           | 50,00          | 40,00           | 100,00           | 33,33            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [35,28; 100,00] | [0,00; 100,00] | [0,00; 88,01]   | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]    |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                 | 3               | 2              | 3               | 1                | 3                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 42,86           | 50,00          | 60,00           | 50,00            | 100,00           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [3,26; 82,46]   | [0,00; 100,00] | [11,99; 100,00] | [0,00; 100,00]   | [100,00; 100,00] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,49</b>    | <b>99,14</b>   | <b>98,65</b>    | <b>98,42</b>     | <b>98,02</b>     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI                     |                 | [99,11; 99,87]  | [98,63; 99,65] | [97,99; 99,31]  | [97,69; 99,15]   | [97,16; 98,88]   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2435</i>     | <i>2039</i>     | <i>1736</i>    | <i>1519</i>     | <i>1384</i>      | <i>1290</i>      |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1361            | 1182            | 1041           | 937             | 852              | 802              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 989             | 858            | 752             | 680              | 647              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                 | 3               | 3              | 3               | 1                | 1                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 0,30            | 0,35           | 0,40            | 0,15             | 0,15             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,65]    | [0,00; 0,74]   | [0,00; 0,85]    | [0,00; 0,44]     | [0,00; 0,46]     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                 | 2               | 1              | 2               | 1                | 0                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 66,67           | 33,33          | 66,67           | 100,00           | 0,00             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [1,33; 100,00]  | [0,00; 98,67]  | [1,33; 100,00]  | [100,00; 100,00] | [0,00; 0,00]     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                 | 2               | 2              | 1               | 0                | 1                |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 66,67           | 66,67          | 33,33           | 0,00             | 100,00           |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [1,33; 100,00]  | [1,33; 100,00] | [0,00; 98,67]   | [0,00; 0,00]     | [100,00; 100,00] |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,73</b>    | <b>99,42</b>   | <b>99,07</b>    | <b>98,94</b>     | <b>98,78</b>     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI  |   |                        | [99,42; 100,00] | [98,96; 99,88]  | [98,46; 99,68] | [98,28; 99,60]  | [98,05; 99,51]   |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1814</i>            | <i>1559</i>     | <i>1373</i>     | <i>1232</i>    | <i>1122</i>     | <i>1055</i>      |                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |



| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2034            | 1706             | 1466           | 1299             | 1187            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1405             | 1233           | 1074             | 990             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                 | 7                | 12             | 3                | 5               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 0,50             | 0,97           | 0,28             | 0,51            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [0,13; 0,87]     | [0,43; 1,52]   | [0,00; 0,60]     | [0,06; 0,95]    |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                 | 4                | 6              | 3                | 2               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 57,14            | 50,00          | 100,00           | 40,00           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [17,54; 96,74]   | [20,45; 79,55] | [100,00; 100,00] | [0,00; 88,01]   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                 | 6                | 8              | 1                | 3               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 85,71            | 66,67          | 33,33            | 60,00           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [57,71; 100,00]  | [38,81; 94,52] | [0,00; 98,67]    | [11,99; 100,00] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,56</b>     | <b>98,67</b>   | <b>98,42</b>     | <b>97,92</b>    |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI                     |                 | [99,23; 99,89]   | [98,07; 99,27] | [97,76; 99,08]   | [97,13; 98,71]  |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2744</i>     | <i>2296</i>      | <i>1985</i>    | <i>1768</i>      | <i>1620</i>     |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1413            | 1203             | 1029           | 928              | 841             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 994              | 851            | 748              | 701             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                 | 3                | 0              | 3                | 3               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 0,30             | 0,00           | 0,40             | 0,43            |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,64]     | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,85]     | [0,00; 0,91]    |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                 | 3                |                | 3                | 1               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 100,00           |                | 100,00           | 33,33           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                 | [100,00; 100,00] |                | [100,00; 100,00] | [0,00; 98,67]   |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                 | 0                |                | 0                | 2               |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                 | 0,00             |                | 0,00             | 66,67           |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                                  |   |                        | [0,00; 0,00]    |                  | [0,00; 0,00]   | [1,33; 100,00]   |                 |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,73</b>    | <b>99,73</b>     | <b>99,37</b>   | <b>98,95</b>     |                 |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI  |                        | [99,43; 100,00] | [99,43; 100,00]  | [98,86; 99,88] | [98,25; 99,65]   |                 |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1915</i>            | <i>1622</i>     | <i>1389</i>      | <i>1250</i>    | <i>1143</i>      |                 |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1964           | 1665            | 1416             | 1286             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1385            | 1157             | 1034             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                | 12              | 3                | 3                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 0,87            | 0,26             | 0,29             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,38; 1,35]    | [0,00; 0,55]     | [0,00; 0,62]     |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                | 6               | 3                | 3                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 50,00           | 100,00           | 100,00           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [20,45; 79,55]  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                | 9               | 0                | 1                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 75,00           | 0,00             | 33,33            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [49,41; 100,00] | [0,00; 0,00]     | [0,00; 98,67]    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>99,22</b>    | <b>98,98</b>     | <b>98,69</b>     |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI                     |                | [98,78; 99,66]  | [98,46; 99,50]   | [98,08; 99,30]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2745</i>    | <i>2321</i>     | <i>1986</i>      | <i>1790</i>      |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1464           | 1280            | 1127             | 1003             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1070            | 942              | 822              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                | 6               | 3                | 4                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 0,56            | 0,32             | 0,49             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,11; 1,01]    | [0,00; 0,68]     | [0,01; 0,96]     |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                | 5               | 3                | 3                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 83,33           | 100,00           | 75,00            |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [50,67; 100,00] | [100,00; 100,00] | [26,00; 100,00]  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                | 2               | 0                | 1                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %                                     |   |                        | 33,33          | 0,00            | 25,00            |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                                  |   |                        | [0,00; 74,65]  | [0,00; 0,00]    | [0,00; 74,00]    |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,50</b>   | <b>99,20</b>    | <b>98,72</b>     |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI  |                        | [99,10; 99,90] | [98,68; 99,72]  | [98,02; 99,42]   |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2012</i>            | <i>1752</i>    | <i>1532</i>     | <i>1368</i>      |                  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2022           | 1715             | 1459            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1393             | 1204            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                | 6                | 5               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 0,43             | 0,42            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,09; 0,77]     | [0,05; 0,78]    |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                | 6                | 3               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 100,00           | 60,00           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [100,00; 100,00] | [11,99; 100,00] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                | 2                | 2               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 33,33            | 40,00           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,00; 74,65]    | [0,00; 88,01]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>99,60</b>     | <b>99,19</b>    |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI                     |                | [99,28; 99,92]   | [98,71; 99,67]  |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2860</i>    | <i>2410</i>      | <i>2033</i>     |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1499           | 1314             | 1125            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1107             | 949             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |                | 4                | 4               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 0,36             | 0,42            |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,01; 0,71]     | [0,01; 0,83]    |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                | 2                | 1               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 50,00            | 25,00           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,00; 100,00]   | [0,00; 74,00]   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                | 2                | 3               |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %                                     |   |                        | 50,00          | 75,00            |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                                  |   |                        | [0,00; 100,00] | [26,00; 100,00]  |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,66</b>   | <b>99,24</b>     |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI  |                        | [99,33; 99,99] | [98,71; 99,77]   |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2111</i>            | <i>1841</i>    | <i>1586</i>      |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|---|---|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2011-2  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1919           | 1646             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1340             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmals aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus  | Anzahl                 |                | 8                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 0,60             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,18; 1,01]     |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                | 2                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 25,00            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,00; 57,08]    |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                | 6                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 75,00            |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [42,92; 100,00]  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>99,40</b>     |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI                     |                | [98,99; 99,81]   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2740</i>    | <i>2342</i>      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1394           | 1215             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |                | 991              |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | erstmals aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus  | Anzahl                 |                | 4                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 0,40             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [0,01; 0,80]     |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |                | 4                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | Anteil in %            |                | 100,00           |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   |   | CI Anteil in %         |                | [100,00; 100,00] |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |                | 2                |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Anteil in %                                     |   |                        | 50,00          |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI Anteil in %                                  |   |                        | [0,00; 100,00] |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,60</b>   |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|   | CI  |                        | [99,21; 99,99] |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2025</i>            | <i>1750</i>    |                  |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ  | Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei erwachsenen Patienten zur ED mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2012-1  | <b>erwachsene männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2191        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | davon Armstrong Stadium C bis D   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <i>erwachsene männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3105</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>erwachsene weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1555        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | davon Wagner-Stadium 2 bis 5  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anteil in %                                     |   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI Anteil in %                                  |   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon Armstrong Stadium C bis D                 | Anzahl  |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Anteil in %   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | CI Anteil in %  |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | CI  |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>erwachsene weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2226</i>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

In Tabelle 3.6.4 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Amputation** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Amputation erfolgt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Ampu-

tation durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig vorgenommene Amputation dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

**Tabelle 3.6.4 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation**

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr      | 7. Halbjahr      | 8. Halbjahr      | 9. Halbjahr      | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                 |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 337              | 313              | 272              | 238              | 216              | 203              | 190              | 183              | 174               | 169               | 164               | 156               | 149               | 144               | 138             |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 305              | 261              | 234              | 214              | 203              | 190              | 181              | 172               | 165               | 158               | 152               | 145               | 141               | 135             |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,58              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 1,72]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]    |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate                   |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,42</b>      | <b>99,42</b>      | <b>99,42</b>      | <b>99,42</b>      | <b>99,42</b>      | <b>99,42</b>      | <b>99,42</b>    |
|                                      |  | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [98,29; 100,00]   | [98,29; 100,00]   | [98,29; 100,00]   | [98,29; 100,00]   | [98,29; 100,00]   | [98,29; 100,00]   | [98,29; 100,00] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>342</i>       | <i>318</i>       | <i>277</i>       | <i>242</i>       | <i>220</i>       | <i>207</i>       | <i>194</i>       | <i>186</i>       | <i>176</i>        | <i>172</i>        | <i>167</i>        | <i>159</i>        | <i>152</i>        | <i>147</i>        | <i>141</i>      |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 289              | 279              | 244              | 212              | 193              | 182              | 173              | 166              | 158               | 149               | 144               | 140               | 138               | 135               | 128             |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 275              | 222              | 208              | 192              | 180              | 168              | 164              | 154               | 146               | 142               | 138               | 135               | 128               | 124             |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,61             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 1,80]     | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]    |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate                   |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,39</b>     | <b>99,39</b>      | <b>99,39</b>      | <b>99,39</b>      | <b>99,39</b>      | <b>99,39</b>      | <b>99,39</b>      | <b>99,39</b>    |
| CI                                   |  |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [98,21; 100,00]  | [98,21; 100,00]  | [98,21; 100,00]   | [98,21; 100,00]   | [98,21; 100,00]   | [98,21; 100,00]   | [98,21; 100,00]   | [98,21; 100,00]   |                 |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>292</i>             | <i>281</i>       | <i>246</i>       | <i>214</i>       | <i>195</i>       | <i>183</i>       | <i>174</i>       | <i>167</i>       | <i>160</i>       | <i>151</i>        | <i>145</i>        | <i>141</i>        | <i>139</i>        | <i>136</i>        | <i>129</i>        |                 |
| 2005-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2235             | 2045             | 1808             | 1641             | 1533             | 1460             | 1383             | 1319             | 1262              | 1212              | 1145              | 1112              | 1065              | 1015              |                 |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1990             | 1769             | 1609             | 1501             | 1423             | 1341             | 1293             | 1241              | 1188              | 1126              | 1096              | 1039              | 999               |                 |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                  | 4                | 5                | 2                | 2                | 2                | 6                | 1                | 1                 | 2                 | 2                 | 2                 | 3                 | 1                 |                 |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,20             | 0,28             | 0,12             | 0,13             | 0,14             | 0,45             | 0,08             | 0,08              | 0,17              | 0,18              | 0,18              | 0,29              | 0,10              |                 |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,40]     | [0,04; 0,53]     | [0,00; 0,30]     | [0,00; 0,32]     | [0,00; 0,34]     | [0,09; 0,80]     | [0,00; 0,23]     | [0,00; 0,24]      | [0,00; 0,40]      | [0,00; 0,42]      | [0,00; 0,44]      | [0,00; 0,62]      | [0,00; 0,30]      |                 |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate                   |                  | <b>99,80</b>     | <b>99,52</b>     | <b>99,40</b>     | <b>99,27</b>     | <b>99,13</b>     | <b>98,69</b>     | <b>98,61</b>     | <b>98,54</b>      | <b>98,37</b>      | <b>98,20</b>      | <b>98,02</b>      | <b>97,74</b>      | <b>97,64</b>      |                 |
|                                      |  | CI                     |                  | [99,61; 99,99]   | [99,21; 99,83]   | [99,04; 99,76]   | [98,87; 99,67]   | [98,69; 99,57]   | [98,13; 99,25]   | [98,03; 99,19]   | [97,94; 99,14]    | [97,73; 99,01]    | [97,52; 98,88]    | [97,29; 98,75]    | [96,95; 98,53]    | [96,83; 98,45]    |                 |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2287</i>      | <i>2094</i>      | <i>1857</i>      | <i>1690</i>      | <i>1582</i>      | <i>1510</i>      | <i>1432</i>      | <i>1368</i>      | <i>1309</i>       | <i>1254</i>       | <i>1185</i>       | <i>1153</i>       | <i>1103</i>       | <i>1050</i>       |                 |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 1755             | 1608             | 1423             | 1305             | 1230             | 1160             | 1106             | 1066             | 1018              | 959               | 929               | 897               | 864               | 834               |                 |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                  | 1554             | 1386             | 1273             | 1207             | 1133             | 1065             | 1032             | 985               | 941               | 912               | 878               | 847               | 801               |                 |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1                | 0                | 1                 | 0                 | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 |                 |
|                                      |  | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,09             | 0,00             | 0,10              | 0,00              | 0,00              | 0,11              | 0,00              | 0,00              |                 |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,28]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,30]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,34]      | [0,00; 0,00]      | [0,00; 0,00]      |                 |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | Rate                   |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,91</b>     | <b>99,91</b>     | <b>99,81</b>      | <b>99,81</b>      | <b>99,81</b>      | <b>99,69</b>      | <b>99,69</b>      | <b>99,69</b>      |                 |
| CI                                   |  |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,73; 100,00]  | [99,73; 100,00]  | [99,54; 100,00]  | [99,54; 100,00]   | [99,54; 100,00]   | [99,34; 100,00]   | [99,34; 100,00]   | [99,34; 100,00]   |                   |                 |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1772</i>            | <i>1624</i>      | <i>1439</i>      | <i>1318</i>      | <i>1242</i>      | <i>1172</i>      | <i>1116</i>      | <i>1075</i>      | <i>1026</i>      | <i>966</i>        | <i>936</i>        | <i>903</i>        | <i>870</i>        | <i>839</i>        |                   |                 |

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr |  |
|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 2006-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2204             | 1981             | 1720            | 1578            | 1452            | 1380           | 1298           | 1197           | 1125           | 1067           | 1015           | 960            | 907            |              |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 1927             | 1684            | 1526            | 1412            | 1319           | 1251           | 1170           | 1107           | 1054           | 995            | 946            | 884            |              |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 0                | 1               | 1               | 1               | 4              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 3              | 2              |              |  |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,00             | 0,06            | 0,07            | 0,07            | 0,30           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,09           | 0,00           | 0,32           | 0,23           |              |  |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,18]    | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,21]    | [0,01; 0,60]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,68]   | [0,00; 0,54]   |              |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>100,00</b>    | <b>99,94</b>    | <b>99,88</b>    | <b>99,81</b>    | <b>99,51</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,42</b>   | <b>99,42</b>   | <b>99,10</b>   | <b>98,88</b> |  |
|                                      |  | CI                 |                  | [100,00; 100,00] | [99,82; 100,00] | [99,71; 100,00] | [99,59; 100,00] | [99,15; 99,87] | [99,15; 99,87] | [99,15; 99,87] | [99,15; 99,87] | [99,01; 99,83] | [99,01; 99,83] | [98,56; 99,64] | [98,26; 99,50] |              |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2245</i>      | <i>2019</i>      | <i>1756</i>     | <i>1611</i>     | <i>1483</i>     | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>     |              |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1743             | 1565             | 1370            | 1245            | 1148            | 1094           | 1046           | 981            | 923            | 875            | 836            | 788            | 739            |              |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 1519             | 1329            | 1203            | 1106            | 1045           | 1019           | 951            | 901            | 859            | 818            | 773            | 726            |              |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 0                | 0               | 3               | 0               | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 1              | 0              | 2              |              |  |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,00             | 0,00            | 0,25            | 0,00            | 0,10           | 0,00           | 0,11           | 0,11           | 0,00           | 0,12           | 0,00           | 0,28           |              |  |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,53]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,33]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,36]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,66]   |              |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>99,75</b>    | <b>99,75</b>    | <b>99,66</b>   | <b>99,66</b>   | <b>99,56</b>   | <b>99,45</b>   | <b>99,45</b>   | <b>99,33</b>   | <b>99,33</b>   | <b>99,05</b>   |              |  |
| CI                                   |  |                    | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,47; 100,00] | [99,47; 100,00] | [99,33; 99,99]  | [99,33; 99,99] | [99,17; 99,95] | [99,01; 99,89] | [99,01; 99,89] | [98,83; 99,83] | [98,83; 99,83] | [98,42; 99,68] |                |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1759</i>        | <i>1578</i>      | <i>1380</i>      | <i>1253</i>     | <i>1159</i>     | <i>1105</i>     | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     |                |              |  |
| 2006-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 3005             | 2664             | 2355            | 2143            | 2017            | 1887           | 1761           | 1656           | 1573           | 1477           | 1401           | 1334           |                |              |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 2603             | 2272            | 2094            | 1907            | 1828           | 1712           | 1618           | 1551           | 1450           | 1379           | 1307           |                |              |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 1                | 1               | 0               | 5               | 1              | 3              | 0              | 1              | 5              | 2              | 3              |                |              |  |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,04             | 0,04            | 0,00            | 0,26            | 0,05           | 0,18           | 0,00           | 0,06           | 0,34           | 0,15           | 0,23           |                |              |  |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,11]     | [0,00; 0,13]    | [0,00; 0,00]    | [0,03; 0,49]    | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,37]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,19]   | [0,04; 0,65]   | [0,00; 0,35]   | [0,00; 0,49]   |                |              |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,96</b>     | <b>99,92</b>    | <b>99,92</b>    | <b>99,66</b>    | <b>99,61</b>   | <b>99,44</b>   | <b>99,44</b>   | <b>99,37</b>   | <b>99,03</b>   | <b>98,89</b>   | <b>98,66</b>   |                |              |  |
|                                      |  | CI                 |                  | [99,89; 100,00]  | [99,81; 100,00] | [99,81; 100,00] | [99,41; 99,91]  | [99,34; 99,88] | [99,11; 99,77] | [99,11; 99,77] | [99,01; 99,73] | [98,57; 99,49] | [98,39; 99,39] | [98,10; 99,22] |                |              |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>3054</i>      | <i>2707</i>      | <i>2393</i>     | <i>2179</i>     | <i>2052</i>     | <i>1924</i>    | <i>1796</i>    | <i>1691</i>    | <i>1605</i>    | <i>1506</i>    | <i>1434</i>    | <i>1366</i>    |                |              |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2327             | 2075             | 1861            | 1738            | 1627            | 1542           | 1418           | 1319           | 1251           | 1196           | 1138           | 1081           |                |              |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 2021             | 1815            | 1685            | 1523            | 1480           | 1373           | 1286           | 1232           | 1172           | 1114           | 1067           |                |              |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 0                | 1               | 0               | 1               | 3              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              |                |              |  |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,00             | 0,06            | 0,00            | 0,07            | 0,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,09           | 0,00           |                |              |  |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,16]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,43]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,00]   |                |              |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>100,00</b>    | <b>99,95</b>    | <b>99,95</b>    | <b>99,88</b>    | <b>99,68</b>   | <b>99,68</b>   | <b>99,68</b>   | <b>99,68</b>   | <b>99,68</b>   | <b>99,59</b>   | <b>99,59</b>   |                |              |  |
| CI                                   |  |                    | [100,00; 100,00] | [99,84; 100,00]  | [99,84; 100,00] | [99,72; 100,00] | [99,40; 99,96]  | [99,40; 99,96] | [99,40; 99,96] | [99,40; 99,96] | [99,40; 99,96] | [99,26; 99,92] | [99,26; 99,92] |                |                |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2346</i>        | <i>2091</i>      | <i>1875</i>      | <i>1753</i>     | <i>1639</i>     | <i>1555</i>     | <i>1433</i>    | <i>1332</i>    | <i>1263</i>    | <i>1206</i>    | <i>1147</i>    | <i>1090</i>    |                |                |              |  |
| 2007-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 6436             | 5835             | 5261            | 4931            | 4667            | 4390           | 4142           | 3940           | 3762           | 3611           | 3465           |                |                |              |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 5683             | 5145            | 4735            | 4528            | 4307           | 4060           | 3872           | 3708           | 3550           | 3390           |                |                |              |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 11               | 1               | 9               | 4               | 1              | 3              | 4              | 0              | 4              | 0              |                |                |              |  |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,19             | 0,02            | 0,19            | 0,09            | 0,02           | 0,07           | 0,10           | 0,00           | 0,11           | 0,00           |                |                |              |  |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,08; 0,31]     | [0,00; 0,06]    | [0,07; 0,31]    | [0,00; 0,17]    | [0,00; 0,07]   | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,20]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,00]   |                |                |              |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,81</b>     | <b>99,79</b>    | <b>99,61</b>    | <b>99,52</b>    | <b>99,50</b>   | <b>99,42</b>   | <b>99,32</b>   | <b>99,32</b>   | <b>99,21</b>   | <b>99,21</b>   |                |                |              |  |
|                                      |  | CI                 |                  | [99,70; 99,92]   | [99,67; 99,91]  | [99,44; 99,78]  | [99,33; 99,71]  | [99,31; 99,69] | [99,21; 99,63] | [99,09; 99,55] | [99,09; 99,55] | [98,95; 99,47] | [98,95; 99,47] |                |                |              |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>6522</i>      | <i>5910</i>      | <i>5338</i>     | <i>4997</i>     | <i>4736</i>     | <i>4458</i>    | <i>4205</i>    | <i>4002</i>    | <i>3822</i>    | <i>3669</i>    | <i>3522</i>    |                |                |              |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 5285             | 4853             | 4444            | 4168            | 3907            | 3689           | 3505           | 3338           | 3187           | 3050           | 2926           |                |                |              |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 4753             | 4339            | 3974            | 3800            | 3604           | 3448           | 3259           | 3125           | 2985           | 2868           |                |                |              |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 4                | 1               | 2               | 3               | 2              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1              |                |                |              |  |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,08             | 0,02            | 0,05            | 0,08            | 0,06           | 0,00           | 0,03           | 0,00           | 0,00           | 0,03           |                |                |              |  |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,17]     | [0,00; 0,07]    | [0,00; 0,12]    | [0,00; 0,17]    | [0,00; 0,13]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,09]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,10]   |                |                |              |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,92</b>     | <b>99,89</b>    | <b>99,85</b>    | <b>99,77</b>    | <b>99,71</b>   | <b>99,71</b>   | <b>99,68</b>   | <b>99,68</b>   | <b>99,68</b>   | <b>99,65</b>   |                |                |              |  |
| CI                                   |  |                    | [99,84; 100,00]  | [99,80; 99,98]   | [99,73; 99,97]  | [99,63; 99,91]  | [99,55; 99,87]  | [99,55; 99,87] | [99,51; 99,85] | [99,51; 99,85] | [99,51; 99,85] | [99,46; 99,84] |                |                |                |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>5314</i>        | <i>4880</i>      | <i>4472</i>      | <i>4196</i>     | <i>3934</i>     | <i>3716</i>     | <i>3532</i>    | <i>3362</i>    | <i>3209</i>    | <i>3071</i>    | <i>2944</i>    |                |                |                |              |  |

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2007-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 4352             | 3842            | 3465            | 3149            | 2854           | 2638           | 2480           | 2336           | 2215           | 2107           |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 3716            | 3269            | 3024            | 2759           | 2564           | 2412           | 2270           | 2159           | 2056           |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 4               | 4               | 2               | 5              | 0              | 3              | 3              | 2              | 4              |              |              |              |              |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,11            | 0,12            | 0,07            | 0,18           | 0,00           | 0,12           | 0,13           | 0,09           | 0,19           |              |              |              |              |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,21]    | [0,00; 0,24]    | [0,00; 0,16]    | [0,02; 0,34]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,39]   |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,89</b>    | <b>99,78</b>    | <b>99,71</b>    | <b>99,53</b>   | <b>99,53</b>   | <b>99,41</b>   | <b>99,28</b>   | <b>99,19</b>   | <b>98,99</b>   |              |              |              |              |
|                                      |  | CI                 |                  | [99,79; 99,99]  | [99,62; 99,94]  | [99,53; 99,89]  | [99,29; 99,77] | [99,29; 99,77] | [99,13; 99,69] | [98,97; 99,59] | [98,85; 99,53] | [98,60; 99,38] |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>4414</i>      | <i>3892</i>     | <i>3512</i>     | <i>3195</i>     | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>    | <i>2141</i>    |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 3439             | 3075            | 2815            | 2564            | 2315           | 2158           | 2030           | 1930           | 1825           | 1745           |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 2981            | 2633            | 2464            | 2251           | 2110           | 1973           | 1887           | 1789           | 1701           |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 3               | 1               | 4               | 0              | 2              | 2              | 0              | 1              | 0              |              |              |              |              |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,10            | 0,04            | 0,16            | 0,00           | 0,09           | 0,10           | 0,00           | 0,06           | 0,00           |              |              |              |              |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,21]    | [0,00; 0,11]    | [0,00; 0,32]    | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,24]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,17]   | [0,00; 0,00]   |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,90</b>    | <b>99,86</b>    | <b>99,70</b>    | <b>99,70</b>   | <b>99,61</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,46</b>   | <b>99,46</b>   |              |              |              |              |
| CI                                   |  |                    | [99,79; 100,00]  | [99,73; 99,99]  | [99,49; 99,91]  | [99,49; 99,91]  | [99,37; 99,85] | [99,23; 99,79] | [99,23; 99,79] | [99,16; 99,76] | [99,16; 99,76] |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3459</i>        | <i>3091</i>      | <i>2830</i>     | <i>2577</i>     | <i>2330</i>     | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>    |                |              |              |              |              |
| 2008-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 4143             | 3649            | 3264            | 2874            | 2618           | 2423           | 2241           | 2113           | 2016           |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 3436            | 3080            | 2750            | 2536           | 2342           | 2174           | 2059           | 1954           |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 8               | 6               | 0               | 4              | 3              | 2              | 2              | 1              |                |              |              |              |              |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,23            | 0,19            | 0,00            | 0,16           | 0,13           | 0,09           | 0,10           | 0,05           |                |              |              |              |              |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,07; 0,39]    | [0,04; 0,35]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,15]   |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,78</b>    | <b>99,58</b>    | <b>99,58</b>    | <b>99,43</b>   | <b>99,30</b>   | <b>99,21</b>   | <b>99,12</b>   | <b>99,07</b>   |                |              |              |              |              |
|                                      |  | CI                 |                  | [99,62; 99,94]  | [99,36; 99,80]  | [99,36; 99,80]  | [99,16; 99,70] | [99,00; 99,60] | [98,88; 99,54] | [98,77; 99,47] | [98,71; 99,43] |                |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>4190</i>      | <i>3689</i>     | <i>3307</i>     | <i>2914</i>     | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>    |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 3170             | 2855            | 2562            | 2304            | 2105           | 1958           | 1820           | 1724           | 1637           |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 2711            | 2432            | 2222            | 2050           | 1897           | 1778           | 1673           | 1582           |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 4               | 3               | 1               | 1              | 0              | 0              | 1              | 1              |                |              |              |              |              |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,15            | 0,12            | 0,05            | 0,05           | 0,00           | 0,00           | 0,06           | 0,06           |                |              |              |              |              |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,29]    | [0,00; 0,26]    | [0,00; 0,13]    | [0,00; 0,14]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,19]   |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,86</b>    | <b>99,73</b>    | <b>99,69</b>    | <b>99,64</b>   | <b>99,64</b>   | <b>99,64</b>   | <b>99,58</b>   | <b>99,52</b>   |                |              |              |              |              |
| CI                                   |  |                    | [99,72; 100,00]  | [99,53; 99,93]  | [99,48; 99,90]  | [99,41; 99,87]  | [99,41; 99,87] | [99,41; 99,87] | [99,32; 99,84] | [99,23; 99,81] |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>3188</i>        | <i>2871</i>      | <i>2579</i>     | <i>2319</i>     | <i>2120</i>     | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                |                |              |              |              |              |
| 2008-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2853             | 2462            | 2125            | 1881            | 1715           | 1583           | 1483           | 1394           |                |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 2350            | 2033            | 1811            | 1660           | 1522           | 1423           | 1344           |                |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 2               | 2               | 3               | 1              | 2              | 1              | 2              |                |                |              |              |              |              |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,09            | 0,10            | 0,17            | 0,06           | 0,13           | 0,07           | 0,15           |                |                |              |              |              |              |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,20]    | [0,00; 0,23]    | [0,00; 0,35]    | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,35]   |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,92</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,66</b>    | <b>99,60</b>   | <b>99,47</b>   | <b>99,40</b>   | <b>99,25</b>   |                |                |              |              |              |              |
|                                      |  | CI                 |                  | [99,80; 100,00] | [99,64; 100,00] | [99,40; 99,92]  | [99,32; 99,88] | [99,14; 99,80] | [99,04; 99,76] | [98,84; 99,66] |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>      | <i>2495</i>     | <i>2153</i>     | <i>1904</i>     | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2089             | 1839            | 1607            | 1414            | 1281           | 1191           | 1118           | 1054           |                |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                  | 1764            | 1547            | 1356            | 1229           | 1142           | 1088           | 1010           |                |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl             |                  | 0               | 3               | 0               | 0              | 1              | 0              | 0              |                |                |              |              |              |              |
|                                      |  | Anteil in %        |                  | 0,00            | 0,19            | 0,00            | 0,00           | 0,09           | 0,00           | 0,00           |                |                |              |              |              |              |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,41]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                  | <b>100,00</b>   | <b>99,81</b>    | <b>99,81</b>    | <b>99,81</b>   | <b>99,72</b>   | <b>99,72</b>   | <b>99,72</b>   |                |                |              |              |              |              |
| CI                                   |  |                    | [100,00; 100,00] | [99,59; 100,00] | [99,59; 100,00] | [99,59; 100,00] | [99,45; 99,99] | [99,45; 99,99] | [99,45; 99,99] |                |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2099</i>        | <i>1848</i>      | <i>1615</i>     | <i>1424</i>     | <i>1290</i>     | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |                |                |              |              |              |              |



| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3186            | 2759            | 2384            | 2123            | 1951           | 1805           | 1682           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 2656            | 2292            | 2060            | 1888           | 1749           | 1632           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 7               | 2               | 1               | 1              | 2              | 2              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,26            | 0,09            | 0,05            | 0,05           | 0,11           | 0,12           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,07; 0,46]    | [0,00; 0,21]    | [0,00; 0,14]    | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,29]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,74</b>    | <b>99,65</b>    | <b>99,61</b>    | <b>99,55</b>   | <b>99,44</b>   | <b>99,32</b>   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                 | [99,55; 99,93]  | [99,42; 99,88]  | [99,37; 99,85]  | [99,29; 99,81] | [99,13; 99,75] | [98,97; 99,67] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3215</i>     | <i>2781</i>     | <i>2408</i>     | <i>2143</i>     | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i>    |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2412            | 2068            | 1806            | 1620            | 1486           | 1355           | 1256           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 1990            | 1735            | 1565            | 1424           | 1303           | 1211           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 1               | 2               | 3               | 2              | 0              | 0              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,05            | 0,12            | 0,19            | 0,14           | 0,00           | 0,00           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,15]    | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,41]    | [0,00; 0,34]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,95</b>    | <b>99,84</b>    | <b>99,65</b>    | <b>99,51</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,51</b>   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,85; 100,00] | [99,66; 100,00] | [99,37; 99,93]  | [99,17; 99,85]  | [99,17; 99,85] | [99,17; 99,85] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2420</i>            | <i>2074</i>     | <i>1813</i>     | <i>1629</i>     | <i>1496</i>     | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2699            | 2277            | 1946            | 1708            | 1544           | 1431           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 2194            | 1866            | 1645            | 1476           | 1375           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 1               | 4               | 2               | 2              | 0              |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,05            | 0,21            | 0,12            | 0,14           | 0,00           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,13]    | [0,00; 0,42]    | [0,00; 0,29]    | [0,00; 0,32]   | [0,00; 0,00]   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,95</b>    | <b>99,74</b>    | <b>99,62</b>    | <b>99,49</b>   | <b>99,49</b>   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                 | [99,86; 100,00] | [99,51; 99,97]  | [99,34; 99,90]  | [99,15; 99,83] | [99,15; 99,83] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>2729</i>     | <i>2303</i>     | <i>1970</i>     | <i>1730</i>     | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2117            | 1830            | 1607            | 1448            | 1320           | 1237           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 1759            | 1535            | 1399            | 1274           | 1191           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 2               | 1               | 0               | 1              | 1              |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,11            | 0,07            | 0,00            | 0,08           | 0,08           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,25]   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,89</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,75</b>   | <b>99,66</b>   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,73; 100,00] | [99,62; 100,00] | [99,62; 100,00] | [99,50; 100,00] | [99,36; 99,96] |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2127</i>            | <i>1839</i>     | <i>1616</i>     | <i>1458</i>     | <i>1328</i>     | <i>1245</i>    |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3003            | 2522            | 2188            | 1953            | 1790           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 2425            | 2108            | 1894            | 1735           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 5               | 3               | 5               | 1              |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,21            | 0,14            | 0,26            | 0,06           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,03; 0,39]    | [0,00; 0,30]    | [0,03; 0,50]    | [0,00; 0,17]   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,80</b>    | <b>99,66</b>    | <b>99,39</b>    | <b>99,34</b>   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                 | [99,62; 99,98]  | [99,42; 99,90]  | [99,06; 99,72]  | [98,99; 99,69] |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3025</i>     | <i>2538</i>     | <i>2206</i>     | <i>1972</i>     | <i>1813</i>    |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2159            | 1839            | 1581            | 1419            | 1290           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 1773            | 1526            | 1370            | 1242           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 2               | 0               | 1               | 0              |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,11            | 0,00            | 0,07            | 0,00           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,22]    | [0,00; 0,00]   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,89</b>    | <b>99,89</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,74; 100,00] | [99,74; 100,00] | [99,61; 100,00] | [99,61; 100,00] |                |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2174</i>            | <i>1850</i>     | <i>1591</i>     | <i>1428</i>     | <i>1299</i>     |                |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2010-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3055            | 2598            | 2213            | 1991           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 2515            | 2133            | 1916           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 8               | 0               | 1              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,32            | 0,00            | 0,05           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,10; 0,54]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,15]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,69</b>    | <b>99,69</b>    | <b>99,63</b>   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                 | [99,47; 99,91]  | [99,47; 99,91]  | [99,39; 99,87] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3086</i>     | <i>2626</i>     | <i>2248</i>     | <i>2023</i>    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2302            | 2012            | 1758            | 1564           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 1954            | 1698            | 1517           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 2               | 0               | 0              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,10            | 0,00            | 0,00           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,24]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,90</b>    | <b>99,90</b>    | <b>99,90</b>   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,76; 100,00] | [99,76; 100,00] | [99,76; 100,00] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2312</i>            | <i>2021</i>     | <i>1768</i>     | <i>1574</i>     |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3116            | 2643            | 2249            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 2554            | 2159            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 3               | 4               |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,12            | 0,19            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,25]    | [0,00; 0,37]    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,88</b>    | <b>99,70</b>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                 | [99,75; 100,00] | [99,48; 99,92]  |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3146</i>     | <i>2666</i>     | <i>2269</i>     |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2373            | 2083            | 1801            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 2035            | 1746            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 1               | 0               |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,05            | 0,00            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,15]    | [0,00; 0,00]    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,95</b>    | <b>99,95</b>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,85; 100,00] | [99,85; 100,00] |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2382</i>            | <i>2091</i>     | <i>1809</i>     |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2996            | 2573            |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 2456            |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 1               |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,04            |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,12]    |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,96</b>    |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI                     |                 | [99,88; 100,00] |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3031</i>     | <i>2602</i>     |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2259            | 1955            |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |                 | 1864            |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |                 | 4               |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | Anteil in %            |                 | 0,21            |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |  | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,42]    |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,79</b>    |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |  |                        | [99,58; 100,00] |                 |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2272</i>            | <i>1963</i>     |                 |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |  |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2012-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 3394        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      |  | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      |  | CI                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>          | <i>3423</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 2488        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | auswertbar   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Amputation   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      |  | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      |  | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                      | CI   |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>2494</i>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

In Tabelle 3.6.5 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Herzinfarkt** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Herzinfarkt hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Herzin-

farkt dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein erstmalig aufgetretener Herzinfarkt dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier** dargestellt.

**Tabelle 3.6.5 Ereigniszeitanalyse: Erstauffreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation**

| EZ                                   | Erstauffreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr      | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr     | 10. Halbjahr    | 11. Halbjahr    | 12. Halbjahr    | 13. Halbjahr    | 14. Halbjahr    | 15. Halbjahr    |                |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 332              | 309              | 269              | 234              | 210             | 197             | 184             | 176             | 167             | 164             | 159             | 152             | 145             | 139             | 133            |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                  | 301              | 259              | 230              | 208             | 197             | 184             | 174             | 166             | 160             | 154             | 148             | 142             | 137             | 130            |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                  | 0                | 0                | 2                | 0               | 0               | 1               | 0               | 1               | 0               | 1               | 0               | 1               | 0               | 0              |
|                                      |   | Anteil in %        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,87             | 0,00            | 0,00            | 0,54            | 0,00            | 0,60            | 0,00            | 0,65            | 0,00            | 0,70            | 0,00            | 0,00           |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 2,07]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,61]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,78]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,92]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,08]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,14</b>     | <b>99,14</b>    | <b>99,14</b>    | <b>98,60</b>    | <b>98,60</b>    | <b>98,01</b>    | <b>98,01</b>    | <b>97,38</b>    | <b>97,38</b>    | <b>96,69</b>    | <b>96,69</b>    | <b>96,69</b>   |
|                                      |   | CI                 |                  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [97,95; 100,00]  | [97,95; 100,00] | [97,95; 100,00] | [97,02; 100,00] | [97,02; 100,00] | [96,06; 99,96]  | [96,06; 99,96]  | [95,08; 99,68]  | [95,08; 99,68]  | [94,05; 99,33]  | [94,05; 99,33]  | [94,05; 99,33] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>342</i>       | <i>318</i>       | <i>277</i>       | <i>242</i>       | <i>220</i>      | <i>207</i>      | <i>194</i>      | <i>186</i>      | <i>176</i>      | <i>172</i>      | <i>167</i>      | <i>159</i>      | <i>152</i>      | <i>147</i>      | <i>141</i>     |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 280              | 269              | 234              | 204              | 185             | 175             | 164             | 157             | 149             | 140             | 135             | 132             | 130             | 128             | 121            |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                  | 265              | 212              | 200              | 184             | 173             | 159             | 155             | 145             | 137             | 133             | 130             | 127             | 122             | 118            |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                  | 0                | 0                | 0                | 0               | 2               | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|                                      |   | Anteil in %        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1,16            | 0,00            | 0,65            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,75]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,91]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>98,84</b>    | <b>98,84</b>    | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>   |
| CI                                   |   |                    | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [97,25; 100,00] | [97,25; 100,00] | [96,20; 100,00] | [96,20; 100,00] | [96,20; 100,00] | [96,20; 100,00] | [96,20; 100,00] | [96,20; 100,00] | [96,20; 100,00] | [96,20; 100,00] |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>292</i>         | <i>281</i>       | <i>246</i>       | <i>214</i>       | <i>195</i>       | <i>183</i>      | <i>174</i>      | <i>167</i>      | <i>160</i>      | <i>151</i>      | <i>145</i>      | <i>141</i>      | <i>139</i>      | <i>136</i>      | <i>129</i>      |                |
| 2005-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2191             | 2003             | 1764             | 1601             | 1500            | 1433            | 1356            | 1294            | 1231            | 1177            | 1117            | 1086            | 1042            | 994             |                |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                  | 1948             | 1723             | 1571             | 1472            | 1398            | 1311            | 1268            | 1204            | 1156            | 1097            | 1066            | 1015            | 977             |                |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                  | 8                | 2                | 1                | 0               | 4               | 3               | 6               | 2               | 2               | 2               | 2               | 0               | 3               |                |
|                                      |   | Anteil in %        |                  | 0,41             | 0,12             | 0,06             | 0,00            | 0,29            | 0,23            | 0,47            | 0,17            | 0,17            | 0,18            | 0,19            | 0,00            | 0,31            |                |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                  | [0,13; 0,69]     | [0,00; 0,28]     | [0,00; 0,19]     | [0,00; 0,00]    | [0,01; 0,57]    | [0,00; 0,49]    | [0,10; 0,85]    | [0,00; 0,40]    | [0,00; 0,41]    | [0,00; 0,43]    | [0,00; 0,45]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,65]    |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,59</b>     | <b>99,48</b>     | <b>99,42</b>     | <b>99,42</b>    | <b>99,13</b>    | <b>98,91</b>    | <b>98,44</b>    | <b>98,28</b>    | <b>98,11</b>    | <b>97,93</b>    | <b>97,75</b>    | <b>97,75</b>    | <b>97,45</b>    |                |
|                                      |   | CI                 |                  | [99,31; 99,87]   | [99,16; 99,80]   | [99,07; 99,77]   | [99,07; 99,77]  | [98,69; 99,57]  | [98,40; 99,42]  | [97,81; 99,07]  | [97,61; 98,95]  | [97,41; 98,81]  | [97,18; 98,68]  | [96,96; 98,54]  | [96,96; 98,54]  | [96,60; 98,30]  |                |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2287</i>      | <i>2094</i>      | <i>1857</i>      | <i>1690</i>      | <i>1582</i>     | <i>1510</i>     | <i>1432</i>     | <i>1368</i>     | <i>1309</i>     | <i>1254</i>     | <i>1185</i>     | <i>1153</i>     | <i>1103</i>     | <i>1050</i>     |                |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1720             | 1576             | 1387             | 1267             | 1193            | 1122            | 1068            | 1030            | 981             | 921             | 891             | 860             | 829             | 800             |                |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                  | 1524             | 1351             | 1237             | 1170            | 1097            | 1027            | 996             | 951             | 903             | 874             | 840             | 814             | 767             |                |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                  | 12               | 3                | 3                | 3               | 3               | 1               | 4               | 1               | 1               | 0               | 1               | 0               | 0               |                |
|                                      |   | Anteil in %        |                  | 0,79             | 0,22             | 0,24             | 0,26            | 0,27            | 0,10            | 0,40            | 0,11            | 0,11            | 0,00            | 0,12            | 0,00            | 0,00            |                |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                  | [0,34; 1,23]     | [0,00; 0,47]     | [0,00; 0,52]     | [0,00; 0,55]    | [0,00; 0,58]    | [0,00; 0,29]    | [0,01; 0,79]    | [0,00; 0,31]    | [0,00; 0,33]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,35]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,22</b>     | <b>99,00</b>     | <b>98,76</b>     | <b>98,51</b>    | <b>98,24</b>    | <b>98,15</b>    | <b>97,76</b>    | <b>97,66</b>    | <b>97,55</b>    | <b>97,55</b>    | <b>97,43</b>    | <b>97,43</b>    | <b>97,43</b>    |                |
| CI                                   |   |                    | [98,78; 99,66]   | [98,50; 99,50]   | [98,19; 99,33]   | [97,87; 99,15]   | [97,54; 98,94]  | [97,42; 98,88]  | [96,94; 98,58]  | [96,82; 98,50]  | [96,68; 98,42]  | [96,68; 98,42]  | [96,54; 98,32]  | [96,54; 98,32]  | [96,54; 98,32]  |                 |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1772</i>        | <i>1624</i>      | <i>1439</i>      | <i>1318</i>      | <i>1242</i>      | <i>1172</i>     | <i>1116</i>     | <i>1075</i>     | <i>1026</i>     | <i>966</i>      | <i>936</i>      | <i>903</i>      | <i>870</i>      | <i>839</i>      |                 |                |

| EZ                                   | Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2006-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2190            | 1971             | 1713             | 1571            | 1444           | 1366           | 1283           | 1185           | 1109           | 1051           | 1001           | 947            | 895            |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1918             | 1676             | 1519            | 1403           | 1307           | 1236           | 1159           | 1092           | 1039           | 983            | 933            | 871            |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                 | 0                | 0                | 1               | 5              | 5              | 2              | 1              | 2              | 1              | 0              | 2              | 1              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,00             | 0,00             | 0,07            | 0,36           | 0,38           | 0,16           | 0,09           | 0,18           | 0,10           | 0,00           | 0,21           | 0,11           |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,19]    | [0,04; 0,67]   | [0,05; 0,72]   | [0,00; 0,39]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,44]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,51]   | [0,00; 0,34]   |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,93</b>    | <b>99,58</b>   | <b>99,21</b>   | <b>99,05</b>   | <b>98,97</b>   | <b>98,79</b>   | <b>98,69</b>   | <b>98,69</b>   | <b>98,48</b>   | <b>98,37</b>   |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,80; 100,00] | [99,25; 99,91] | [98,74; 99,68] | [98,54; 99,56] | [98,43; 99,51] | [98,20; 99,38] | [98,07; 99,31] | [98,07; 99,31] | [97,79; 99,17] | [97,65; 99,09] |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2245</i>     | <i>2019</i>      | <i>1756</i>      | <i>1611</i>     | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>     |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1724            | 1551             | 1353             | 1228            | 1137           | 1083           | 1037           | 971            | 911            | 861            | 822            | 776            | 728            |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1505             | 1312             | 1186            | 1095           | 1035           | 1011           | 941            | 888            | 846            | 805            | 763            | 715            |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                 | 3                | 1                | 0               | 0              | 1              | 2              | 2              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,20             | 0,08             | 0,00            | 0,00           | 0,10           | 0,20           | 0,21           | 0,11           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,42]     | [0,00; 0,23]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,29]   | [0,00; 0,47]   | [0,00; 0,51]   | [0,00; 0,33]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,80</b>     | <b>99,73</b>     | <b>99,73</b>    | <b>99,73</b>   | <b>99,63</b>   | <b>99,44</b>   | <b>99,23</b>   | <b>99,12</b>   | <b>99,12</b>   | <b>99,12</b>   | <b>99,12</b>   | <b>99,12</b>   |              |
| CI                                   |   |                    | [99,58; 100,00] | [99,46; 100,00]  | [99,46; 100,00]  | [99,46; 100,00] | [99,31; 99,95] | [99,02; 99,86] | [98,72; 99,74] | [98,56; 99,68] | [98,56; 99,68] | [98,56; 99,68] | [98,56; 99,68] | [98,56; 99,68] |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1759</i>        | <i>1578</i>     | <i>1380</i>      | <i>1253</i>      | <i>1159</i>     | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     |                |              |
| 2006-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2964            | 2624             | 2317             | 2101            | 1977           | 1853           | 1729           | 1625           | 1540           | 1441           | 1372           | 1306           |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2565             | 2235             | 2053            | 1867           | 1796           | 1682           | 1589           | 1517           | 1415           | 1351           | 1280           |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                 | 3                | 10               | 3               | 4              | 1              | 5              | 3              | 5              | 3              | 1              | 3              |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,12             | 0,45             | 0,15            | 0,21           | 0,06           | 0,30           | 0,19           | 0,33           | 0,21           | 0,07           | 0,23           |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,25]     | [0,17; 0,72]     | [0,00; 0,31]    | [0,00; 0,42]   | [0,00; 0,16]   | [0,04; 0,56]   | [0,00; 0,40]   | [0,04; 0,62]   | [0,00; 0,45]   | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,50]   |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,88</b>     | <b>99,44</b>     | <b>99,30</b>    | <b>99,09</b>   | <b>99,04</b>   | <b>98,75</b>   | <b>98,56</b>   | <b>98,24</b>   | <b>98,03</b>   | <b>97,96</b>   | <b>97,73</b>   |                |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,75; 100,00]  | [99,14; 99,74]   | [98,96; 99,64]  | [98,69; 99,49] | [98,63; 99,45] | [98,27; 99,23] | [98,03; 99,09] | [97,64; 98,84] | [97,39; 98,67] | [97,31; 98,61] | [97,03; 98,43] |                |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3054</i>     | <i>2707</i>      | <i>2393</i>      | <i>2179</i>     | <i>2052</i>    | <i>1924</i>    | <i>1796</i>    | <i>1691</i>    | <i>1605</i>    | <i>1506</i>    | <i>1434</i>    | <i>1366</i>    |                |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2305            | 2051             | 1833             | 1708            | 1593           | 1508           | 1390           | 1294           | 1226           | 1171           | 1116           | 1062           |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1996             | 1790             | 1657            | 1493           | 1448           | 1348           | 1262           | 1208           | 1148           | 1095           | 1050           |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                 | 5                | 5                | 3               | 2              | 2              | 2              | 3              | 1              | 0              | 0              | 2              |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,25             | 0,28             | 0,18            | 0,13           | 0,14           | 0,15           | 0,24           | 0,08           | 0,00           | 0,00           | 0,19           |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,03; 0,47]     | [0,03; 0,52]     | [0,00; 0,39]    | [0,00; 0,32]   | [0,00; 0,33]   | [0,00; 0,35]   | [0,00; 0,51]   | [0,00; 0,25]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,45]   |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,75</b>     | <b>99,48</b>     | <b>99,30</b>    | <b>99,17</b>   | <b>99,03</b>   | <b>98,89</b>   | <b>98,66</b>   | <b>98,58</b>   | <b>98,58</b>   | <b>98,58</b>   | <b>98,39</b>   |                |              |
| CI                                   |   |                    | [99,53; 99,97]  | [99,16; 99,80]   | [98,92; 99,68]   | [98,75; 99,59]  | [98,57; 99,49] | [98,39; 99,39] | [98,10; 99,22] | [97,99; 99,17] | [97,99; 99,17] | [97,99; 99,17] | [97,75; 99,03] |                |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2346</i>        | <i>2091</i>     | <i>1875</i>      | <i>1753</i>      | <i>1639</i>     | <i>1555</i>    | <i>1433</i>    | <i>1332</i>    | <i>1263</i>    | <i>1206</i>    | <i>1147</i>    | <i>1090</i>    |                |                |              |
| 2007-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 6345            | 5757             | 5197             | 4857            | 4595           | 4319           | 4071           | 3868           | 3695           | 3544           | 3402           |                |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 5608             | 5083             | 4663            | 4457           | 4238           | 3994           | 3801           | 3644           | 3484           | 3327           |                |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                 | 11               | 8                | 10              | 8              | 7              | 9              | 6              | 3              | 3              | 1              |                |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,20             | 0,16             | 0,21            | 0,18           | 0,17           | 0,23           | 0,16           | 0,08           | 0,09           | 0,03           |                |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,08; 0,31]     | [0,05; 0,27]     | [0,08; 0,35]    | [0,06; 0,30]   | [0,04; 0,29]   | [0,08; 0,37]   | [0,03; 0,28]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,09]   |                |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,81</b>     | <b>99,65</b>     | <b>99,44</b>    | <b>99,27</b>   | <b>99,10</b>   | <b>98,88</b>   | <b>98,73</b>   | <b>98,65</b>   | <b>98,56</b>   | <b>98,53</b>   |                |                |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,70; 99,92]   | [99,49; 99,81]   | [99,24; 99,64]  | [99,03; 99,51] | [98,84; 99,36] | [98,58; 99,18] | [98,40; 99,06] | [98,31; 98,99] | [98,21; 98,91] | [98,17; 98,89] |                |                |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>6522</i>     | <i>5910</i>      | <i>5338</i>      | <i>4997</i>     | <i>4736</i>    | <i>4458</i>    | <i>4205</i>    | <i>4002</i>    | <i>3822</i>    | <i>3669</i>    | <i>3522</i>    |                |                |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 5227            | 4798             | 4390             | 4115            | 3847           | 3632           | 3448           | 3279           | 3128           | 2994           | 2870           |                |                |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 4699             | 4286             | 3921            | 3742           | 3546           | 3392           | 3201           | 3069           | 2928           | 2812           |                |                |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl             |                 | 4                | 1                | 10              | 4              | 2              | 2              | 3              | 3              | 1              | 1              |                |                |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,09             | 0,02             | 0,26            | 0,11           | 0,06           | 0,06           | 0,09           | 0,10           | 0,03           | 0,04           |                |                |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,17]     | [0,00; 0,07]     | [0,10; 0,41]    | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,13]   | [0,00; 0,14]   | [0,00; 0,20]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,10]   | [0,00; 0,11]   |                |                |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,92</b>     | <b>99,89</b>     | <b>99,64</b>    | <b>99,54</b>   | <b>99,48</b>   | <b>99,43</b>   | <b>99,33</b>   | <b>99,24</b>   | <b>99,20</b>   | <b>99,17</b>   |                |                |              |
| CI                                   |   |                    | [99,84; 100,00] | [99,80; 99,98]   | [99,46; 99,82]   | [99,33; 99,75]  | [99,26; 99,70] | [99,20; 99,66] | [99,07; 99,59] | [98,96; 99,52] | [98,91; 99,49] | [98,88; 99,46] |                |                |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>5314</i>        | <i>4880</i>     | <i>4472</i>      | <i>4196</i>      | <i>3934</i>     | <i>3716</i>    | <i>3532</i>    | <i>3362</i>    | <i>3209</i>    | <i>3071</i>    | <i>2944</i>    |                |                |                |              |

| EZ                                   | Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2007-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 4318            | 3805            | 3427           | 3106           | 2815           | 2598           | 2440           | 2298           | 2189              | 2084              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 3679            | 3236           | 2985           | 2719           | 2522           | 2371           | 2235           | 2134              | 2032              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 3               | 14             | 4              | 2              | 2              | 1              | 2              | 2                 | 4                 |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,08            | 0,43           | 0,13           | 0,07           | 0,08           | 0,04           | 0,09           | 0,09              | 0,20              |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,17]    | [0,21; 0,66]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,12]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,22]      | [0,00; 0,39]      |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,92</b>    | <b>99,50</b>   | <b>99,37</b>   | <b>99,30</b>   | <b>99,22</b>   | <b>99,18</b>   | <b>99,09</b>   | <b>99,00</b>      | <b>98,80</b>      |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,83; 100,00] | [99,26; 99,74] | [99,10; 99,64] | [99,01; 99,59] | [98,91; 99,53] | [98,86; 99,50] | [98,75; 99,43] | [98,64; 99,36]    | [98,39; 99,21]    |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>4414</i>     | <i>3892</i>     | <i>3512</i>    | <i>3195</i>    | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>       | <i>2141</i>       |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3400            | 3033            | 2775           | 2526           | 2281           | 2122           | 2000           | 1901           | 1797              | 1720              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2942            | 2595           | 2429           | 2219           | 2076           | 1945           | 1860           | 1761              | 1676              |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 2               | 4              | 1              | 2              | 0              | 1              | 3              | 1                 | 3                 |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,07            | 0,15           | 0,04           | 0,09           | 0,00           | 0,05           | 0,16           | 0,06              | 0,18              |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,16]    | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,12]   | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,15]   | [0,00; 0,34]   | [0,00; 0,17]      | [0,00; 0,38]      |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,93</b>    | <b>99,78</b>   | <b>99,74</b>   | <b>99,65</b>   | <b>99,65</b>   | <b>99,60</b>   | <b>99,44</b>   | <b>99,39</b>      | <b>99,21</b>      |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,84; 100,00] | [99,61; 99,95]  | [99,55; 99,93] | [99,42; 99,88] | [99,42; 99,88] | [99,35; 99,85] | [99,13; 99,75] | [99,07; 99,71] | [98,83; 99,59]    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3459</i>            | <i>3091</i>     | <i>2830</i>     | <i>2577</i>    | <i>2330</i>    | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 4089            | 3602            | 3217           | 2823           | 2569           | 2383           | 2202           | 2075           | 1980              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 3389            | 3032           | 2700           | 2489           | 2305           | 2137           | 2022           | 1918              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 9               | 7              | 3              | 3              | 2              | 3              | 2              | 3                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,27            | 0,23           | 0,11           | 0,12           | 0,09           | 0,14           | 0,10           | 0,16              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,09; 0,44]    | [0,06; 0,40]   | [0,00; 0,24]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,30]   | [0,00; 0,24]   | [0,00; 0,33]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,74</b>    | <b>99,52</b>   | <b>99,41</b>   | <b>99,29</b>   | <b>99,21</b>   | <b>99,07</b>   | <b>98,97</b>   | <b>98,82</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,57; 99,91]  | [99,28; 99,76] | [99,14; 99,68] | [98,99; 99,59] | [98,89; 99,53] | [98,71; 99,43] | [98,59; 99,35] | [98,40; 99,24]    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>4190</i>     | <i>3689</i>     | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3140            | 2829            | 2537           | 2276           | 2077           | 1928           | 1795           | 1699           | 1613              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2687            | 2408           | 2197           | 2022           | 1867           | 1754           | 1649           | 1559              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 6               | 2              | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,22            | 0,08           | 0,05           | 0,05           | 0,00           | 0,06           | 0,06           | 0,06              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,04; 0,40]    | [0,00; 0,20]   | [0,00; 0,13]   | [0,00; 0,15]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,17]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,19]      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,78</b>    | <b>99,70</b>   | <b>99,66</b>   | <b>99,61</b>   | <b>99,61</b>   | <b>99,55</b>   | <b>99,49</b>   | <b>99,43</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,61; 99,95]  | [99,49; 99,91]  | [99,43; 99,89] | [99,37; 99,85] | [99,37; 99,85] | [99,28; 99,82] | [99,20; 99,78] | [99,11; 99,75] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3188</i>            | <i>2871</i>     | <i>2579</i>     | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2008-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2852            | 2457            | 2113           | 1869           | 1703           | 1571           | 1472           | 1378           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2345            | 2021           | 1799           | 1650           | 1511           | 1412           | 1328           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 7               | 3              | 3              | 1              | 2              | 3              | 1              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,30            | 0,15           | 0,17           | 0,06           | 0,13           | 0,21           | 0,08           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,08; 0,52]    | [0,00; 0,32]   | [0,00; 0,36]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,32]   | [0,00; 0,45]   | [0,00; 0,22]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,71</b>    | <b>99,56</b>   | <b>99,39</b>   | <b>99,33</b>   | <b>99,20</b>   | <b>99,00</b>   | <b>98,92</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,49; 99,93]  | [99,29; 99,83] | [99,06; 99,72] | [98,98; 99,68] | [98,81; 99,59] | [98,54; 99,46] | [98,44; 99,40] |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>2893</i>     | <i>2495</i>     | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2082            | 1834            | 1600           | 1407           | 1272           | 1180           | 1108           | 1043           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1759            | 1540           | 1348           | 1220           | 1132           | 1079           | 1001           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 2               | 2              | 2              | 1              | 1              | 2              | 1              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,11            | 0,13           | 0,15           | 0,08           | 0,09           | 0,19           | 0,10           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,35]   | [0,00; 0,24]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,44]   | [0,00; 0,30]   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,89</b>    | <b>99,76</b>   | <b>99,61</b>   | <b>99,53</b>   | <b>99,45</b>   | <b>99,26</b>   | <b>99,17</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,73; 100,00] | [99,52; 100,00] | [99,30; 99,92] | [99,18; 99,88] | [99,06; 99,84] | [98,80; 99,72] | [98,67; 99,67] |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2099</i>            | <i>1848</i>     | <i>1615</i>     | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                   | Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3176            | 2747            | 2378            | 2115           | 1943           | 1796           | 1674           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2642            | 2286            | 2052           | 1877           | 1741           | 1625           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 2               | 1               | 1              | 1              | 1              | 2              | 1           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,08            | 0,04            | 0,05           | 0,05           | 0,11           | 0,06           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,18]    | [0,00; 0,13]    | [0,00; 0,14]   | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,18]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,93</b>    | <b>99,88</b>    | <b>99,83</b>   | <b>99,78</b>   | <b>99,67</b>   | <b>99,61</b>   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,83; 100,00] | [99,75; 100,00] | [99,67; 99,99] | [99,59; 99,97] | [99,42; 99,92] | [99,33; 99,89] |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3215</i>     | <i>2781</i>     | <i>2408</i>     | <i>2143</i>    | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i>    |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2397            | 2054            | 1794            | 1612           | 1478           | 1349           | 1251           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1976            | 1724            | 1556           | 1417           | 1299           | 1207           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 2               | 2               | 1              | 1              | 0              | 1              |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,10            | 0,12            | 0,06           | 0,07           | 0,00           | 0,08           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,24]    | [0,00; 0,28]    | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,25]   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,90</b>    | <b>99,79</b>    | <b>99,72</b>   | <b>99,65</b>   | <b>99,65</b>   | <b>99,57</b>   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,76; 100,00] | [99,58; 100,00] | [99,48; 99,96]  | [99,37; 99,93] | [99,37; 99,93] | [99,25; 99,89] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2420</i>            | <i>2074</i>     | <i>1813</i>     | <i>1629</i>     | <i>1496</i>    | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2009-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2700            | 2277            | 1946            | 1705           | 1543           | 1427           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2196            | 1864            | 1643           | 1476           | 1372           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 2               | 2               | 1              | 3              | 3              |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,09            | 0,11            | 0,06           | 0,20           | 0,22           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,22]    | [0,00; 0,26]    | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,43]   | [0,00; 0,47]   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,91</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,74</b>   | <b>99,54</b>   | <b>99,33</b>   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,79; 100,00] | [99,61; 99,99]  | [99,51; 99,97] | [99,22; 99,86] | [98,93; 99,73] |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>2729</i>     | <i>2303</i>     | <i>1970</i>     | <i>1730</i>    | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2105            | 1823            | 1598            | 1443           | 1314           | 1232           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1752            | 1528            | 1394           | 1267           | 1184           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 3               | 0               | 2              | 1              | 2              |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,17            | 0,00            | 0,14           | 0,08           | 0,17           |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,36]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,34]   | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,40]   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,83</b>    | <b>99,83</b>    | <b>99,69</b>   | <b>99,61</b>   | <b>99,44</b>   |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,64; 100,00] | [99,64; 100,00] | [99,42; 99,96]  | [99,30; 99,92] | [99,05; 99,83] |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2127</i>            | <i>1839</i>     | <i>1616</i>     | <i>1458</i>     | <i>1328</i>    | <i>1245</i>    |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2010-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2985            | 2504            | 2172            | 1939           | 1782           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2407            | 2091            | 1879           | 1726           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 5               | 1               | 1              | 2              |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,21            | 0,05            | 0,05           | 0,12           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,03; 0,39]    | [0,00; 0,14]    | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,28]   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,79</b>    | <b>99,75</b>    | <b>99,69</b>   | <b>99,58</b>   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,61; 99,97]  | [99,55; 99,95]  | [99,46; 99,92] | [99,30; 99,86] |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3025</i>     | <i>2538</i>     | <i>2206</i>     | <i>1972</i>    | <i>1813</i>    |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2159            | 1837            | 1579            | 1417           | 1287           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1771            | 1525            | 1368           | 1242           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                 | 2               | 2               | 1              | 0              |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                 | 0,11            | 0,13            | 0,07           | 0,00           |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,31]    | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,00]   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,89</b>    | <b>99,76</b>    | <b>99,69</b>   | <b>99,69</b>   |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,74; 100,00] | [99,52; 100,00] | [99,41; 99,97]  | [99,41; 99,97] |                |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2174</i>            | <i>1850</i>     | <i>1591</i>     | <i>1428</i>     | <i>1299</i>    |                |                |                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| EZ                                   | Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2010-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3059             | 2605             | 2223            | 2003           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 2524             | 2144            | 1927           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                  | 6                | 3               | 1              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                  | 0,24             | 0,14            | 0,05           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                  | [0,05; 0,43]     | [0,00; 0,30]    | [0,00; 0,15]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,76</b>     | <b>99,63</b>    | <b>99,57</b>   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                  | [99,57; 99,95]   | [99,39; 99,87]  | [99,31; 99,83] |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3086</i>      | <i>2626</i>      | <i>2248</i>     | <i>2023</i>    |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2297             | 2010             | 1755            | 1563           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 1952             | 1696            | 1516           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                  | 3                | 0               | 0              |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                  | 0,15             | 0,00            | 0,00           |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,33]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,85</b>     | <b>99,85</b>    | <b>99,85</b>   |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,68; 100,00]  | [99,68; 100,00]  | [99,68; 100,00] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2312</i>            | <i>2021</i>      | <i>1768</i>      | <i>1574</i>     |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3108             | 2638             | 2241            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 2548             | 2149            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                  | 2                | 2               |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                  | 0,08             | 0,09            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,19]     | [0,00; 0,22]    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,92</b>     | <b>99,83</b>    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                  | [99,81; 100,00]  | [99,66; 100,00] |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3146</i>      | <i>2666</i>      | <i>2269</i>     |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2366             | 2077             | 1797            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 2028             | 1742            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                  | 0                | 0               |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00            |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2382</i>            | <i>2091</i>      | <i>1809</i>      |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3003             | 2574             |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 2457             |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                  | 4                |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                  | 0,16             |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,32]     |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,84</b>     |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI                     |                  | [99,68; 100,00]  |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3031</i>      | <i>2602</i>      |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2254             | 1948             |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 1857             |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |                  | 3                |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | Anteil in %            |                  | 0,16             |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                  | [0,00; 0,34]     |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,84</b>     |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CI                                   |   |                        | [99,66; 100,00]  |                  |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2272</i>            | <i>1963</i>      |                  |                 |                |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



| EZ     | Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3380        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3423</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2476        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | erstmalig aufgetretener Herzinfarkt   | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <i>weibliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>2494</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In Tabelle 3.6.6 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Schlaganfall** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Schlaganfall hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein Schlag-

anfall dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein erstmalig aufgetretener Schlaganfall dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier** dargestellt.

**Tabelle 3.6.6 Ereigniszeitanalyse: Erstaufreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation**

| EZ                                   | Erstaufreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |                |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 337             | 314              | 273             | 238             | 216             | 202             | 189             | 181            | 168            | 164            | 159            | 150            | 145            | 140            | 134            |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 306              | 262             | 234             | 214             | 202             | 189             | 180            | 166            | 160            | 154            | 146            | 141            | 137            | 131            |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall   | Anzahl             |                 | 0                | 1               | 0               | 1               | 0               | 0               | 3              | 0              | 0              | 3              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 0,00             | 0,38            | 0,00            | 0,47            | 0,00            | 0,00            | 1,67           | 0,00           | 0,00           | 1,95           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,00]     | [0,00; 1,13]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,38]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 3,54]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 4,14]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                 | <b>100,00</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,17</b>    | <b>99,17</b>    | <b>99,17</b>    | <b>97,52</b>   | <b>97,52</b>   | <b>97,52</b>   | <b>95,64</b>   | <b>95,64</b>   | <b>95,64</b>   | <b>95,64</b>   | <b>95,64</b>   |
|                                      |  | CI                 |                 | [100,00; 100,00] | [98,91; 100,00] | [98,91; 100,00] | [98,02; 100,00] | [98,02; 100,00] | [98,02; 100,00] | [95,35; 99,69] | [95,35; 99,69] | [95,35; 99,69] | [92,65; 98,63] | [92,65; 98,63] | [92,65; 98,63] | [92,65; 98,63] | [92,65; 98,63] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>342</i>      | <i>318</i>       | <i>277</i>      | <i>242</i>      | <i>220</i>      | <i>207</i>      | <i>194</i>      | <i>186</i>     | <i>176</i>     | <i>172</i>     | <i>167</i>     | <i>159</i>     | <i>152</i>     | <i>147</i>     | <i>141</i>     |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 288             | 277              | 242             | 208             | 189             | 177             | 168             | 160            | 154            | 145            | 140            | 137            | 135            | 133            | 126            |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 273              | 220             | 204             | 188             | 175             | 164             | 158            | 150            | 142            | 138            | 135            | 132            | 126            | 122            |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall   | Anzahl             |                 | 1                | 2               | 0               | 2               | 0               | 2               | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 0,37             | 0,91            | 0,00            | 1,06            | 0,00            | 1,22            | 0,63           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 1,08]     | [0,00; 2,17]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,53]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 2,90]    | [0,00; 1,87]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,64</b>     | <b>98,80</b>    | <b>98,80</b>    | <b>97,75</b>    | <b>97,75</b>    | <b>96,57</b>    | <b>95,96</b>   | <b>95,96</b>   | <b>95,96</b>   | <b>95,96</b>   | <b>95,96</b>   | <b>95,96</b>   | <b>95,96</b>   | <b>95,96</b>   |
| CI                                   |  |                    | [98,93; 100,00] | [97,45; 100,00]  | [97,45; 100,00] | [95,78; 99,72]  | [95,78; 99,72]  | [94,03; 99,11]  | [93,17; 98,75]  | [93,17; 98,75] | [93,17; 98,75] | [93,17; 98,75] | [93,17; 98,75] | [93,17; 98,75] | [93,17; 98,75] | [93,17; 98,75] |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>292</i>         | <i>281</i>      | <i>246</i>       | <i>214</i>      | <i>195</i>      | <i>183</i>      | <i>174</i>      | <i>167</i>      | <i>160</i>     | <i>151</i>     | <i>145</i>     | <i>141</i>     | <i>139</i>     | <i>136</i>     | <i>129</i>     |                |
| 2005-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2225            | 2034             | 1795            | 1626            | 1519            | 1449            | 1365            | 1294           | 1233           | 1179           | 1116           | 1086           | 1034           | 990            |                |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 1982             | 1754            | 1594            | 1492            | 1413            | 1320            | 1269           | 1206           | 1156           | 1097           | 1068           | 1011           | 973            |                |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall   | Anzahl             |                 | 8                | 7               | 5               | 3               | 10              | 13              | 5              | 3              | 2              | 1              | 6              | 0              | 3              |                |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 0,40             | 0,40            | 0,31            | 0,20            | 0,71            | 0,98            | 0,39           | 0,25           | 0,17           | 0,09           | 0,56           | 0,00           | 0,31           |                |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,12; 0,68]     | [0,10; 0,69]    | [0,04; 0,59]    | [0,00; 0,43]    | [0,27; 1,14]    | [0,45; 1,52]    | [0,05; 0,74]   | [0,00; 0,53]   | [0,00; 0,41]   | [0,00; 0,27]   | [0,11; 1,01]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,66]   |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,60</b>     | <b>99,21</b>    | <b>98,90</b>    | <b>98,70</b>    | <b>98,00</b>    | <b>97,05</b>    | <b>96,67</b>   | <b>96,44</b>   | <b>96,27</b>   | <b>96,18</b>   | <b>95,64</b>   | <b>95,64</b>   | <b>95,35</b>   |                |
|                                      |  | CI                 |                 | [99,32; 99,88]   | [98,81; 99,61]  | [98,42; 99,38]  | [98,17; 99,23]  | [97,32; 98,68]  | [96,20; 97,90]  | [95,76; 97,58] | [95,50; 97,38] | [95,30; 97,24] | [95,20; 97,16] | [94,57; 96,71] | [94,57; 96,71] | [94,23; 96,47] |                |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>   | <i>Anzahl</i>      | <i>2287</i>     | <i>2094</i>      | <i>1857</i>     | <i>1690</i>     | <i>1582</i>     | <i>1510</i>     | <i>1432</i>     | <i>1368</i>    | <i>1309</i>    | <i>1254</i>    | <i>1185</i>    | <i>1153</i>    | <i>1103</i>    | <i>1050</i>    |                |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1730            | 1586             | 1401            | 1284            | 1209            | 1133            | 1081            | 1037           | 984            | 923            | 893            | 860            | 831            | 801            |                |
|                                      | auswertbar   | Anzahl             |                 | 1533             | 1365            | 1252            | 1187            | 1107            | 1040            | 1003           | 951            | 905            | 876            | 840            | 816            | 769            |                |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall   | Anzahl             |                 | 3                | 1               | 0               | 6               | 0               | 6               | 7              | 2              | 1              | 2              | 0              | 1              | 0              |                |
|                                      |  | Anteil in %        |                 | 0,20             | 0,07            | 0,00            | 0,51            | 0,00            | 0,58            | 0,70           | 0,21           | 0,11           | 0,23           | 0,00           | 0,12           | 0,00           |                |
|                                      |  | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,42]     | [0,00; 0,22]    | [0,00; 0,00]    | [0,10; 0,91]    | [0,00; 0,00]    | [0,12; 1,04]    | [0,18; 1,21]   | [0,00; 0,50]   | [0,00; 0,33]   | [0,00; 0,54]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,36]   | [0,00; 0,00]   |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,81</b>     | <b>99,73</b>    | <b>99,73</b>    | <b>99,23</b>    | <b>99,23</b>    | <b>98,67</b>    | <b>97,99</b>   | <b>97,78</b>   | <b>97,68</b>   | <b>97,45</b>   | <b>97,45</b>   | <b>97,33</b>   | <b>97,33</b>   |                |
| CI                                   |  |                    | [99,59; 100,00] | [99,47; 99,99]   | [99,47; 99,99]  | [98,75; 99,71]  | [98,75; 99,71]  | [98,02; 99,32]  | [97,17; 98,81]  | [96,91; 98,65] | [96,79; 98,57] | [96,51; 98,39] | [96,51; 98,39] | [96,36; 98,30] | [96,36; 98,30] |                |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>  | <i>1772</i>        | <i>1624</i>     | <i>1439</i>      | <i>1318</i>     | <i>1242</i>     | <i>1172</i>     | <i>1116</i>     | <i>1075</i>     | <i>1026</i>    | <i>966</i>     | <i>936</i>     | <i>903</i>     | <i>870</i>     | <i>839</i>     |                |                |

| EZ   | Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2006-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2198            | 1977            | 1713            | 1570           | 1444           | 1370           | 1283           | 1177           | 1100           | 1042           | 993            | 942            | 890            |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1925            | 1676            | 1520           | 1405           | 1308           | 1235           | 1148           | 1084           | 1029           | 974            | 927            | 869            |              |
|  | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 4               | 3               | 2              | 2              | 11             | 6              | 3              | 3              | 1              | 3              | 3              | 0              |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,21            | 0,18            | 0,13           | 0,14           | 0,84           | 0,49           | 0,26           | 0,28           | 0,10           | 0,31           | 0,32           | 0,00           |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,41]    | [0,00; 0,38]    | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,34]   | [0,35; 1,34]   | [0,10; 0,87]   | [0,00; 0,56]   | [0,00; 0,59]   | [0,00; 0,29]   | [0,00; 0,66]   | [0,00; 0,69]   | [0,00; 0,00]   |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,79</b>    | <b>99,62</b>    | <b>99,49</b>   | <b>99,35</b>   | <b>98,53</b>   | <b>98,06</b>   | <b>97,80</b>   | <b>97,53</b>   | <b>97,44</b>   | <b>97,14</b>   | <b>96,83</b>   | <b>96,83</b>   |              |
|  |   | CI                 |                 | [99,59; 99,99]  | [99,34; 99,90]  | [99,15; 99,83] | [98,96; 99,74] | [97,92; 99,14] | [97,34; 98,78] | [97,03; 98,57] | [96,70; 98,36] | [96,59; 98,29] | [96,23; 98,05] | [95,86; 97,80] | [95,86; 97,80] |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | Anzahl             | 2245            | 2019            | 1756            | 1611           | 1483           | 1408           | 1329           | 1225           | 1149           | 1090           | 1039           | 984            | 932            |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1730            | 1556            | 1362            | 1238           | 1143           | 1087           | 1034           | 967            | 907            | 860            | 819            | 773            | 725            |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1511            | 1321            | 1196           | 1101           | 1039           | 1008           | 938            | 886            | 844            | 802            | 759            | 712            |              |
|  | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 1               | 0               | 2              | 2              | 6              | 2              | 2              | 0              | 1              | 2              | 0              | 1              |              |
| Anteil in %                                    |   |                    | 0,07            | 0,00            | 0,17            | 0,18           | 0,58           | 0,20           | 0,21           | 0,00           | 0,12           | 0,25           | 0,00           | 0,14           |                |              |
|  | CI Anteil in %  |                    | [0,00; 0,20]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,40]    | [0,00; 0,43]   | [0,12; 1,04]   | [0,00; 0,47]   | [0,00; 0,51]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,35]   | [0,00; 0,59]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,42]   |                |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | Rate  |                    | <b>99,93</b>    | <b>99,93</b>    | <b>99,77</b>    | <b>99,59</b>   | <b>99,03</b>   | <b>98,83</b>   | <b>98,62</b>   | <b>98,62</b>   | <b>98,51</b>   | <b>98,26</b>   | <b>98,26</b>   | <b>98,12</b>   |                |              |
|  | CI  |                    | [99,80; 100,00] | [99,80; 100,00] | [99,51; 100,00] | [99,23; 99,95] | [98,46; 99,60] | [98,20; 99,46] | [97,92; 99,32] | [97,92; 99,32] | [97,78; 99,24] | [97,46; 99,06] | [97,46; 99,06] | [97,27; 98,97] |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | Anzahl  | 1759               | 1578            | 1380            | 1253            | 1159           | 1105           | 1057           | 991            | 933            | 884            | 844            | 797            | 747            |                |              |
| 2006-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2989            | 2648            | 2338            | 2129           | 2004           | 1866           | 1738           | 1637           | 1553           | 1458           | 1387           | 1315           |                |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2589            | 2257            | 2078           | 1891           | 1806           | 1688           | 1601           | 1531           | 1432           | 1366           | 1288           |                |              |
|  | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 6               | 2               | 1              | 14             | 5              | 2              | 1              | 1              | 2              | 7              | 0              |                |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,23            | 0,09            | 0,05           | 0,74           | 0,28           | 0,12           | 0,06           | 0,07           | 0,14           | 0,51           | 0,00           |                |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                 | [0,05; 0,42]    | [0,00; 0,21]    | [0,00; 0,14]   | [0,35; 1,13]   | [0,03; 0,52]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,33]   | [0,13; 0,89]   | [0,00; 0,00]   |                |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,77</b>    | <b>99,68</b>    | <b>99,63</b>   | <b>98,92</b>   | <b>98,65</b>   | <b>98,54</b>   | <b>98,47</b>   | <b>98,41</b>   | <b>98,27</b>   | <b>97,77</b>   | <b>97,77</b>   |                |              |
|  |   | CI                 |                 | [99,59; 99,95]  | [99,46; 99,90]  | [99,39; 99,87] | [98,48; 99,36] | [98,15; 99,15] | [98,02; 99,06] | [97,93; 99,01] | [97,86; 98,96] | [97,69; 98,85] | [97,08; 98,46] | [97,08; 98,46] |                |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | Anzahl             | 3054            | 2707            | 2393            | 2179           | 2052           | 1924           | 1796           | 1691           | 1605           | 1506           | 1434           | 1366           |                |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2305            | 2051            | 1835            | 1715           | 1602           | 1512           | 1394           | 1293           | 1225           | 1169           | 1114           | 1059           |                |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1996            | 1789            | 1661           | 1499           | 1450           | 1349           | 1261           | 1206           | 1146           | 1090           | 1044           |                |              |
|  | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 3               | 0               | 0              | 8              | 1              | 1              | 3              | 1              | 0              | 1              | 2              |                |              |
| Anteil in %                                    |   |                    | 0,15            | 0,00            | 0,00            | 0,53           | 0,07           | 0,07           | 0,24           | 0,08           | 0,00           | 0,09           | 0,19           |                |                |              |
|  | CI Anteil in %  |                    | [0,00; 0,32]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,16; 0,90]   | [0,00; 0,20]   | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,51]   | [0,00; 0,25]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,46]   |                |                |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | Rate  |                    | <b>99,85</b>    | <b>99,85</b>    | <b>99,85</b>    | <b>99,34</b>   | <b>99,27</b>   | <b>99,20</b>   | <b>98,96</b>   | <b>98,88</b>   | <b>98,88</b>   | <b>98,79</b>   | <b>98,60</b>   |                |                |              |
|  | CI  |                    | [99,68; 100,00] | [99,68; 100,00] | [99,68; 100,00] | [98,95; 99,73] | [98,86; 99,68] | [98,76; 99,64] | [98,45; 99,47] | [98,35; 99,41] | [98,35; 99,41] | [98,23; 99,35] | [97,98; 99,22] |                |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | Anzahl  | 2346               | 2091            | 1875            | 1753            | 1639           | 1555           | 1433           | 1332           | 1263           | 1206           | 1147           | 1090           |                |                |              |
| 2007-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 6392            | 5788            | 5227            | 4890           | 4600           | 4312           | 4066           | 3868           | 3692           | 3539           | 3391           |                |                |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 5639            | 5112            | 4692           | 4464           | 4232           | 3987           | 3800           | 3640           | 3478           | 3317           |                |                |              |
|  | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 13              | 8               | 34             | 16             | 5              | 4              | 6              | 5              | 6              | 4              |                |                |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,23            | 0,16            | 0,72           | 0,36           | 0,12           | 0,10           | 0,16           | 0,14           | 0,17           | 0,12           |                |                |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                 | [0,11; 0,36]    | [0,05; 0,26]    | [0,48; 0,97]   | [0,18; 0,53]   | [0,01; 0,22]   | [0,00; 0,20]   | [0,03; 0,28]   | [0,02; 0,26]   | [0,03; 0,31]   | [0,00; 0,24]   |                |                |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,77</b>    | <b>99,62</b>    | <b>98,92</b>   | <b>98,57</b>   | <b>98,45</b>   | <b>98,35</b>   | <b>98,20</b>   | <b>98,06</b>   | <b>97,90</b>   | <b>97,78</b>   |                |                |              |
|  |   | CI                 |                 | [99,65; 99,89]  | [99,46; 99,78]  | [98,63; 99,21] | [98,24; 98,90] | [98,10; 98,80] | [97,99; 98,71] | [97,82; 98,58] | [97,66; 98,46] | [97,48; 98,32] | [97,35; 98,21] |                |                |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | Anzahl             | 6522            | 5910            | 5338            | 4997           | 4736           | 4458           | 4205           | 4002           | 3822           | 3669           | 3522           |                |                |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 5230            | 4803            | 4393            | 4115           | 3840           | 3622           | 3437           | 3270           | 3119           | 2985           | 2857           |                |                |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 4705            | 4289            | 3923           | 3733           | 3538           | 3381           | 3190           | 3060           | 2921           | 2799           |                |                |              |
|  | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 9               | 8               | 21             | 5              | 3              | 3              | 1              | 5              | 7              | 6              |                |                |              |
| Anteil in %                                    |   |                    | 0,19            | 0,19            | 0,54            | 0,13           | 0,08           | 0,09           | 0,03           | 0,16           | 0,24           | 0,21           |                |                |                |              |
|  | CI Anteil in %  |                    | [0,07; 0,32]    | [0,06; 0,32]    | [0,31; 0,76]    | [0,02; 0,25]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,09]   | [0,02; 0,31]   | [0,06; 0,42]   | [0,04; 0,39]   |                |                |                |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | Rate  |                    | <b>99,81</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,11</b>    | <b>98,98</b>   | <b>98,89</b>   | <b>98,81</b>   | <b>98,78</b>   | <b>98,62</b>   | <b>98,38</b>   | <b>98,17</b>   |                |                |                |              |
|  | CI  |                    | [99,69; 99,93]  | [99,45; 99,81]  | [98,83; 99,39]  | [98,67; 99,29] | [98,57; 99,21] | [98,48; 99,14] | [98,44; 99,12] | [98,25; 98,99] | [97,98; 98,78] | [97,73; 98,61] |                |                |                |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | Anzahl  | 5314               | 4880            | 4472            | 4196            | 3934           | 3716           | 3532           | 3362           | 3209           | 3071           | 2944           |                |                |                |              |

| EZ                                   | Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2007-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 4340            | 3823            | 3440            | 3110            | 2820           | 2602           | 2443           | 2296           | 2177           | 2073           |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 3699            | 3247            | 2988            | 2726           | 2530           | 2374           | 2232           | 2121           | 2024           |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 11              | 16              | 5               | 2              | 2              | 4              | 5              | 2              | 6              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,30            | 0,49            | 0,17            | 0,07           | 0,08           | 0,17           | 0,22           | 0,09           | 0,30           |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,12; 0,47]    | [0,25; 0,73]    | [0,02; 0,31]    | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,33]   | [0,03; 0,42]   | [0,00; 0,22]   | [0,06; 0,53]   |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,71</b>    | <b>99,23</b>    | <b>99,07</b>    | <b>98,99</b>   | <b>98,92</b>   | <b>98,75</b>   | <b>98,53</b>   | <b>98,44</b>   | <b>98,15</b>   |              |              |              |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,54; 99,88]  | [98,94; 99,52]  | [98,75; 99,39]  | [98,65; 99,33] | [98,57; 99,27] | [98,36; 99,14] | [98,10; 98,96] | [97,99; 98,89] | [97,64; 98,66] |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4414</i>     | <i>3892</i>     | <i>3512</i>     | <i>3195</i>     | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>    | <i>2141</i>    |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3410            | 3050            | 2795            | 2543            | 2293           | 2133           | 2004           | 1905           | 1801           | 1720           |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2958            | 2612            | 2443            | 2229           | 2084           | 1948           | 1862           | 1765           | 1676           |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 2               | 3               | 7               | 3              | 3              | 1              | 1              | 3              | 0              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,07            | 0,11            | 0,29            | 0,13           | 0,14           | 0,05           | 0,05           | 0,17           | 0,00           |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,16]    | [0,00; 0,24]    | [0,07; 0,50]    | [0,00; 0,29]   | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,15]   | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,36]   | [0,00; 0,00]   |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,93</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,54</b>    | <b>99,41</b>   | <b>99,27</b>   | <b>99,22</b>   | <b>99,16</b>   | <b>99,00</b>   | <b>99,00</b>   |              |              |              |              |
| CI                                   |   |                    | [99,84; 100,00] | [99,66; 99,98]  | [99,28; 99,80]  | [99,11; 99,71]  | [98,93; 99,61] | [98,87; 99,57] | [98,79; 99,53] | [98,59; 99,41] | [98,59; 99,41] |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3459</i>        | <i>3091</i>     | <i>2830</i>     | <i>2577</i>     | <i>2330</i>     | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>    |                |              |              |              |              |
| 2008-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 4106            | 3612            | 3224            | 2837            | 2581           | 2392           | 2211           | 2082           | 1981           |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 3404            | 3043            | 2717            | 2499           | 2311           | 2143           | 2027           | 1920           |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 16              | 6               | 7               | 2              | 5              | 1              | 4              | 2              |                |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,47            | 0,20            | 0,26            | 0,08           | 0,22           | 0,05           | 0,20           | 0,10           |                |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,24; 0,70]    | [0,04; 0,35]    | [0,07; 0,45]    | [0,00; 0,19]   | [0,03; 0,41]   | [0,00; 0,14]   | [0,00; 0,39]   | [0,00; 0,25]   |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,55</b>    | <b>99,35</b>    | <b>99,10</b>    | <b>99,02</b>   | <b>98,81</b>   | <b>98,77</b>   | <b>98,57</b>   | <b>98,47</b>   |                |              |              |              |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,33; 99,77]  | [99,08; 99,62]  | [98,77; 99,43]  | [98,68; 99,36] | [98,42; 99,20] | [98,37; 99,17] | [98,13; 99,01] | [98,01; 98,93] |                |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4190</i>     | <i>3689</i>     | <i>3307</i>     | <i>2914</i>     | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>    |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3132            | 2821            | 2521            | 2263            | 2063           | 1917           | 1785           | 1690           | 1605           |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2679            | 2394            | 2182            | 2008           | 1857           | 1744           | 1639           | 1550           |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 12              | 6               | 5               | 3              | 2              | 3              | 2              | 2              |                |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,45            | 0,25            | 0,23            | 0,15           | 0,11           | 0,17           | 0,12           | 0,13           |                |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,20; 0,70]    | [0,05; 0,45]    | [0,03; 0,43]    | [0,00; 0,32]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,37]   | [0,00; 0,29]   | [0,00; 0,31]   |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,56</b>    | <b>99,32</b>    | <b>99,09</b>    | <b>98,95</b>   | <b>98,84</b>   | <b>98,67</b>   | <b>98,55</b>   | <b>98,43</b>   |                |              |              |              |              |
| CI                                   |   |                    | [99,31; 99,81]  | [99,01; 99,63]  | [98,72; 99,46]  | [98,54; 99,36]  | [98,41; 99,27] | [98,20; 99,14] | [98,05; 99,05] | [97,90; 98,96] |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>3188</i>        | <i>2871</i>     | <i>2579</i>     | <i>2319</i>     | <i>2120</i>     | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                |                |              |              |              |              |
| 2008-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2852            | 2459            | 2116            | 1872            | 1704           | 1570           | 1473           | 1381           |                |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2348            | 2023            | 1801            | 1649           | 1509           | 1413           | 1332           |                |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 10              | 0               | 4               | 1              | 1              | 1              | 1              |                |                |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,43            | 0,00            | 0,22            | 0,06           | 0,07           | 0,07           | 0,08           |                |                |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,16; 0,69]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,44]    | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,20]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,22]   |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,58</b>    | <b>99,58</b>    | <b>99,36</b>    | <b>99,30</b>   | <b>99,24</b>   | <b>99,17</b>   | <b>99,09</b>   |                |                |              |              |              |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,32; 99,84]  | [99,32; 99,84]  | [99,02; 99,70]  | [98,94; 99,66] | [98,86; 99,62] | [98,77; 99,57] | [98,66; 99,52] |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>     | <i>2495</i>     | <i>2153</i>     | <i>1904</i>     | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2058            | 1812            | 1582            | 1394            | 1262           | 1171           | 1096           | 1033           |                |                |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1739            | 1522            | 1338            | 1210           | 1122           | 1066           | 988            |                |                |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 2               | 1               | 0               | 0              | 4              | 1              | 3              |                |                |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,12            | 0,07            | 0,00            | 0,00           | 0,36           | 0,09           | 0,30           |                |                |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   | [0,01; 0,71]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,65]   |                |                |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,89</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>   | <b>99,47</b>   | <b>99,38</b>   | <b>99,08</b>   |                |                |              |              |              |              |
| CI                                   |   |                    | [99,73; 100,00] | [99,62; 100,00] | [99,62; 100,00] | [99,62; 100,00] | [99,07; 99,87] | [98,95; 99,81] | [98,53; 99,63] |                |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2099</i>        | <i>1848</i>     | <i>1615</i>     | <i>1424</i>     | <i>1290</i>     | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |                |                |              |              |              |              |

| EZ                                   | Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halbjahr | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2009-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3169            | 2739            | 2362           | 2096           | 1924           | 1776           | 1652           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2634            | 2270           | 2033           | 1860           | 1721           | 1604           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 7               | 4              | 1              | 4              | 2              | 1              |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,27            | 0,18           | 0,05           | 0,22           | 0,12           | 0,06           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,07; 0,46]    | [0,00; 0,35]   | [0,00; 0,15]   | [0,00; 0,43]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,18]   |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,74</b>    | <b>99,56</b>   | <b>99,52</b>   | <b>99,30</b>   | <b>99,19</b>   | <b>99,13</b>   |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,55; 99,93]  | [99,30; 99,82] | [99,25; 99,79] | [98,96; 99,64] | [98,81; 99,57] | [98,73; 99,53] |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3215</i>     | <i>2781</i>     | <i>2408</i>    | <i>2143</i>    | <i>1971</i>    | <i>1823</i>    | <i>1697</i>    |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2385            | 2045            | 1785           | 1603           | 1470           | 1338           | 1241           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1967            | 1715           | 1549           | 1408           | 1287           | 1196           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 2               | 0              | 2              | 3              | 3              | 3              |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,10            | 0,00           | 0,13           | 0,21           | 0,23           | 0,25           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,24]    | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,45]   | [0,00; 0,50]   | [0,00; 0,53]   |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,90</b>    | <b>99,90</b>   | <b>99,77</b>   | <b>99,56</b>   | <b>99,33</b>   | <b>99,08</b>   |             |              |              |              |              |              |              |
| CI                                   |   |                    | [99,76; 100,00] | [99,76; 100,00] | [99,55; 99,99] | [99,23; 99,89] | [98,91; 99,75] | [98,58; 99,58] |                |             |              |              |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2420</i>        | <i>2074</i>     | <i>1813</i>     | <i>1629</i>    | <i>1496</i>    | <i>1367</i>    | <i>1268</i>    |                |             |              |              |              |              |              |              |
| 2009-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2676            | 2256            | 1926           | 1689           | 1529           | 1418           |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2174            | 1845           | 1627           | 1462           | 1362           |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 5               | 2              | 0              | 1              | 4              |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,23            | 0,11           | 0,00           | 0,07           | 0,29           |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,03; 0,43]    | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,20]   | [0,01; 0,58]   |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,77</b>    | <b>99,67</b>   | <b>99,67</b>   | <b>99,60</b>   | <b>99,31</b>   |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,57; 99,97]  | [99,42; 99,92] | [99,42; 99,92] | [99,32; 99,88] | [98,91; 99,71] |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2729</i>     | <i>2303</i>     | <i>1970</i>    | <i>1730</i>    | <i>1565</i>    | <i>1452</i>    |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2100            | 1815            | 1595           | 1437           | 1310           | 1223           |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1746            | 1524           | 1390           | 1264           | 1175           |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 3               | 2              | 1              | 5              | 0              |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,17            | 0,13           | 0,07           | 0,40           | 0,00           |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,37]    | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,21]   | [0,05; 0,74]   | [0,00; 0,00]   |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,83</b>    | <b>99,70</b>   | <b>99,63</b>   | <b>99,24</b>   | <b>99,24</b>   |                |             |              |              |              |              |              |              |
| CI                                   |   |                    | [99,64; 100,00] | [99,44; 99,96]  | [99,33; 99,93] | [98,79; 99,69] | [98,79; 99,69] |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2127</i>        | <i>1839</i>     | <i>1616</i>     | <i>1458</i>    | <i>1328</i>    | <i>1245</i>    |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
| 2010-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2979            | 2496            | 2159           | 1928           | 1771           |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2402            | 2080           | 1869           | 1716           |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 14              | 3              | 2              | 3              |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,58            | 0,14           | 0,11           | 0,17           |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,28; 0,89]    | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,37]   |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,42</b>    | <b>99,28</b>   | <b>99,18</b>   | <b>99,00</b>   |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,12; 99,72]  | [98,94; 99,62] | [98,81; 99,55] | [98,58; 99,42] |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3025</i>     | <i>2538</i>     | <i>2206</i>    | <i>1972</i>    | <i>1813</i>    |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2154            | 1835            | 1577           | 1417           | 1285           |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1769            | 1523           | 1367           | 1238           |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 5               | 1              | 4              | 2              |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,28            | 0,07           | 0,29           | 0,16           |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,04; 0,53]    | [0,00; 0,19]   | [0,01; 0,58]   | [0,00; 0,39]   |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,72</b>    | <b>99,66</b>   | <b>99,37</b>   | <b>99,21</b>   |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
| CI                                   |   |                    | [99,48; 99,96]  | [99,38; 99,94]  | [98,98; 99,76] | [98,76; 99,66] |                |                |                |             |              |              |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2174</i>        | <i>1850</i>     | <i>1591</i>     | <i>1428</i>    | <i>1299</i>    |                |                |                |             |              |              |              |              |              |              |

| EZ                                   | Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2010-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3044            | 2592           | 2213           | 1988           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2510           | 2132           | 1912           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 6              | 4              | 2              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,24           | 0,19           | 0,10           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,05; 0,43]   | [0,00; 0,37]   | [0,00; 0,25]   |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,76</b>   | <b>99,58</b>   | <b>99,47</b>   |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,57; 99,95] | [99,32; 99,84] | [99,17; 99,77] |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3086</i>     | <i>2626</i>    | <i>2248</i>    | <i>2023</i>    |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2282            | 1997           | 1745           | 1551           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1940           | 1686           | 1504           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 3              | 3              | 1              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,15           | 0,18           | 0,07           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,33]   | [0,00; 0,38]   | [0,00; 0,20]   |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,85</b>   | <b>99,67</b>   | <b>99,60</b>   |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI                                   |   |                    | [99,68; 100,00] | [99,41; 99,93] | [99,31; 99,89] |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2312</i>        | <i>2021</i>     | <i>1768</i>    | <i>1574</i>    |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2011-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3093            | 2622           | 2229           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2533           | 2137           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 5              | 3              |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,20           | 0,14           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,02; 0,37]   | [0,00; 0,30]   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,80</b>   | <b>99,66</b>   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,63; 99,97] | [99,43; 99,89] |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3146</i>     | <i>2666</i>    | <i>2269</i>    |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2349            | 2062           | 1784           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2015           | 1728           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 2              | 5              |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,10           | 0,29           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,24]   | [0,04; 0,54]   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,90</b>   | <b>99,61</b>   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI                                   |   |                    | [99,76; 100,00] | [99,32; 99,90] |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2382</i>        | <i>2091</i>     | <i>1809</i>    |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2011-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2991            | 2568           |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2452           |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 7              |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,29           |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,07; 0,50]   |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,71</b>   |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,50; 99,92] |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3031</i>     | <i>2602</i>    |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2247            | 1940           |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1851           |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl             |                 | 5              |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,27           |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,03; 0,51]   |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,73</b>   |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| CI                                   |   |                    | [99,49; 99,97]  |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2272</i>        | <i>1963</i>     |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ     | Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3370        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3423</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2460        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | erstmalig aufgetretener Schlaganfall  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |   | CI                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <i>weibliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>2494</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In der folgenden Tabelle 3.6.7 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Nierenersatztherapie** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen in der Erstdokumentation noch keine Nierenersatztherapie vermerkt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Nieren-

ersatztherapie durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil im Berichtshalbjahr eine erstmalige Nierenersatztherapie dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte **„Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** dargestellt.

**Tabelle 3.6.7 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut Erstdokumentation**

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |                |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 337             | 313              | 272             | 237             | 213             | 200             | 187            | 178            | 169            | 166            | 163            | 155            | 149            | 144            | 137            |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 305              | 261             | 233             | 211             | 200             | 187            | 177            | 168            | 163            | 157            | 151            | 145            | 141            | 134            |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 0                | 1               | 2               | 0               | 0               | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,00             | 0,38            | 0,86            | 0,00            | 0,00            | 0,53           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,71           | 0,00           |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,00]     | [0,00; 1,13]    | [0,00; 2,05]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,58]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 2,10]   | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>100,00</b>    | <b>99,63</b>    | <b>98,78</b>    | <b>98,78</b>    | <b>98,78</b>    | <b>98,25</b>   | <b>98,25</b>   | <b>98,25</b>   | <b>98,25</b>   | <b>98,25</b>   | <b>98,25</b>   | <b>98,25</b>   | <b>97,56</b>   | <b>97,56</b>   |
|                                      |   | CI                 |                 | [100,00; 100,00] | [98,91; 100,00] | [97,41; 100,00] | [97,41; 100,00] | [97,41; 100,00] | [96,54; 99,96] | [96,54; 99,96] | [96,54; 99,96] | [96,54; 99,96] | [96,54; 99,96] | [96,54; 99,96] | [96,54; 99,96] | [95,39; 99,73] | [95,39; 99,73] |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>342</i>      | <i>318</i>       | <i>277</i>      | <i>242</i>      | <i>220</i>      | <i>207</i>      | <i>194</i>     | <i>186</i>     | <i>176</i>     | <i>172</i>     | <i>167</i>     | <i>159</i>     | <i>152</i>     | <i>147</i>     | <i>141</i>     |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 291             | 280              | 244             | 212             | 192             | 180             | 171            | 163            | 157            | 148            | 142            | 138            | 136            | 133            | 126            |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 276              | 222             | 208             | 191             | 178             | 166            | 161            | 153            | 144            | 140            | 136            | 133            | 126            | 122            |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 1                | 0               | 1               | 0               | 0               | 1              | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,36             | 0,00            | 0,48            | 0,00            | 0,00            | 0,60           | 0,62           | 0,00           | 0,00           | 0,71           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 1,07]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,42]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 1,78]   | [0,00; 1,84]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 2,11]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,64</b>     | <b>99,64</b>    | <b>99,17</b>    | <b>99,17</b>    | <b>99,17</b>    | <b>98,58</b>   | <b>97,97</b>   | <b>97,97</b>   | <b>97,97</b>   | <b>97,27</b>   | <b>97,27</b>   | <b>97,27</b>   | <b>97,27</b>   | <b>97,27</b>   |
| CI                                   |   |                    | [98,94; 100,00] | [98,94; 100,00]  | [98,01; 100,00] | [98,01; 100,00] | [98,01; 100,00] | [96,95; 100,00] | [95,96; 99,98] | [95,96; 99,98] | [95,96; 99,98] | [95,96; 99,98] | [94,86; 99,68] | [94,86; 99,68] | [94,86; 99,68] | [94,86; 99,68] |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>292</i>         | <i>281</i>      | <i>246</i>       | <i>214</i>      | <i>195</i>      | <i>183</i>      | <i>174</i>      | <i>167</i>     | <i>160</i>     | <i>151</i>     | <i>145</i>     | <i>141</i>     | <i>139</i>     | <i>136</i>     | <i>129</i>     |                |
| 2005-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2266            | 2074             | 1837            | 1672            | 1563            | 1490            | 1411           | 1346           | 1291           | 1236           | 1170           | 1136           | 1087           | 1035           |                |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2020             | 1797            | 1640            | 1532            | 1453            | 1367           | 1321           | 1263           | 1213           | 1151           | 1116           | 1058           | 1017           |                |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 4                | 1               | 5               | 2               | 2               | 3              | 2              | 1              | 0              | 3              | 1              | 1              | 2              |                |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,20             | 0,06            | 0,30            | 0,13            | 0,14            | 0,22           | 0,15           | 0,08           | 0,00           | 0,26           | 0,09           | 0,09           | 0,20           |                |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,39]     | [0,00; 0,16]    | [0,04; 0,57]    | [0,00; 0,31]    | [0,00; 0,33]    | [0,00; 0,47]   | [0,00; 0,36]   | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,56]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,47]   |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,80</b>     | <b>99,75</b>    | <b>99,45</b>    | <b>99,32</b>    | <b>99,18</b>    | <b>98,97</b>   | <b>98,82</b>   | <b>98,74</b>   | <b>98,74</b>   | <b>98,48</b>   | <b>98,40</b>   | <b>98,30</b>   | <b>98,11</b>   |                |
|                                      |   | CI                 |                 | [99,61; 99,99]   | [99,53; 99,97]  | [99,11; 99,79]  | [98,93; 99,71]  | [98,75; 99,61]  | [98,48; 99,46] | [98,29; 99,35] | [98,19; 99,29] | [98,19; 99,29] | [97,86; 99,10] | [97,75; 99,05] | [97,63; 98,97] | [97,39; 98,83] |                |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2287</i>     | <i>2094</i>      | <i>1857</i>     | <i>1690</i>     | <i>1582</i>     | <i>1510</i>     | <i>1432</i>    | <i>1368</i>    | <i>1309</i>    | <i>1254</i>    | <i>1185</i>    | <i>1153</i>    | <i>1103</i>    | <i>1050</i>    |                |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1759            | 1613             | 1425            | 1303            | 1227            | 1158            | 1103           | 1064           | 1016           | 956            | 924            | 892            | 859            | 829            |                |
|                                      | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1559             | 1388            | 1271            | 1204            | 1130            | 1064           | 1029           | 982            | 938            | 908            | 872            | 843            | 796            |                |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 3                | 4               | 1               | 1               | 0               | 2              | 2              | 0              | 2              | 2              | 0              | 0              | 0              |                |
|                                      |   | Anteil in %        |                 | 0,19             | 0,29            | 0,08            | 0,08            | 0,00            | 0,19           | 0,19           | 0,00           | 0,21           | 0,22           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |
|                                      |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,41]     | [0,01; 0,57]    | [0,00; 0,23]    | [0,00; 0,25]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,45]   | [0,00; 0,46]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,51]   | [0,00; 0,53]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |                |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | Rate               |                 | <b>99,81</b>     | <b>99,52</b>    | <b>99,45</b>    | <b>99,36</b>    | <b>99,36</b>    | <b>99,18</b>   | <b>98,99</b>   | <b>98,99</b>   | <b>98,78</b>   | <b>98,56</b>   | <b>98,56</b>   | <b>98,56</b>   | <b>98,56</b>   |                |
| CI                                   |   |                    | [99,59; 100,00] | [99,17; 99,87]   | [99,07; 99,83]  | [98,94; 99,78]  | [98,94; 99,78]  | [98,69; 99,67]  | [98,44; 99,54] | [98,44; 99,54] | [98,16; 99,40] | [97,87; 99,25] | [97,87; 99,25] | [97,87; 99,25] | [97,87; 99,25] |                |                |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1772</i>        | <i>1624</i>     | <i>1439</i>      | <i>1318</i>     | <i>1242</i>     | <i>1172</i>     | <i>1116</i>     | <i>1075</i>    | <i>1026</i>    | <i>966</i>     | <i>936</i>     | <i>903</i>     | <i>870</i>     | <i>839</i>     |                |                |



| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED | Beitritts-halb-jahr | 2. Halb-jahr    | 3. Halb-jahr    | 4. Halb-jahr    | 5. Halb-jahr   | 6. Halb-jahr   | 7. Halb-jahr   | 8. Halb-jahr   | 9. Halb-jahr   | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr  | 13. Halb-jahr  | 14. Halb-jahr  | 15. Halb-jahr |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2006-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl              | 2232            | 2008            | 1745            | 1597           | 1470           | 1394           | 1310           | 1208           | 1134           | 1075           | 1024           | 968            | 916            |               |
|                                      | auswertbar  | Anzahl              |                 | 1954            | 1707            | 1546           | 1429           | 1331           | 1262           | 1180           | 1117           | 1062           | 1004           | 952            | 892            |               |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl              |                 | 4               | 3               | 1              | 1              | 6              | 0              | 0              | 2              | 0              | 1              | 0              | 1              |               |
|                                      |   | Anteil in %         |                 | 0,20            | 0,18            | 0,06           | 0,07           | 0,45           | 0,00           | 0,00           | 0,18           | 0,00           | 0,10           | 0,00           | 0,11           |               |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                 | [0,00; 0,41]    | [0,00; 0,37]    | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,21]   | [0,09; 0,81]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,43]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,29]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,33]   |               |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>         |                 | <b>99,80</b>    | <b>99,62</b>    | <b>99,56</b>   | <b>99,49</b>   | <b>99,05</b>   | <b>99,05</b>   | <b>99,05</b>   | <b>98,88</b>   | <b>98,88</b>   | <b>98,78</b>   | <b>98,78</b>   | <b>98,67</b>   |               |
|                                      |   | CI                  |                 | [99,60; 100,00] | [99,34; 99,90]  | [99,25; 99,87] | [99,15; 99,83] | [98,57; 99,53] | [98,57; 99,53] | [98,57; 99,53] | [98,34; 99,42] | [98,34; 99,42] | [98,21; 99,35] | [98,21; 99,35] | [98,06; 99,28] |               |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>       | <i>2245</i>     | <i>2019</i>     | <i>1756</i>     | <i>1611</i>    | <i>1483</i>    | <i>1408</i>    | <i>1329</i>    | <i>1225</i>    | <i>1149</i>    | <i>1090</i>    | <i>1039</i>    | <i>984</i>     | <i>932</i>     |               |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl              | 1746            | 1567            | 1370            | 1244           | 1152           | 1097           | 1050           | 983            | 926            | 875            | 834            | 787            | 738            |               |
|                                      | auswertbar  | Anzahl              |                 | 1521            | 1329            | 1202           | 1110           | 1048           | 1024           | 953            | 903            | 859            | 816            | 773            | 725            |               |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl              |                 | 2               | 1               | 0              | 2              | 1              | 3              | 0              | 2              | 2              | 0              | 0              | 0              |               |
|                                      |   | Anteil in %         |                 | 0,13            | 0,08            | 0,00           | 0,18           | 0,10           | 0,29           | 0,00           | 0,22           | 0,23           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |               |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                 | [0,00; 0,31]    | [0,00; 0,22]    | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,43]   | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,62]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,53]   | [0,00; 0,56]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   |               |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>         |                 | <b>99,87</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>   | <b>99,62</b>   | <b>99,53</b>   | <b>99,23</b>   | <b>99,23</b>   | <b>99,02</b>   | <b>98,79</b>   | <b>98,79</b>   | <b>98,79</b>   | <b>98,79</b>   |               |
| CI                                   |   |                     | [99,69; 100,00] | [99,57; 100,00] | [99,57; 100,00] | [99,28; 99,96] | [99,15; 99,91] | [98,73; 99,73] | [98,73; 99,73] | [98,43; 99,61] | [98,12; 99,46] | [98,12; 99,46] | [98,12; 99,46] | [98,12; 99,46] |                |               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>1759</i>         | <i>1578</i>     | <i>1380</i>     | <i>1253</i>     | <i>1159</i>    | <i>1105</i>    | <i>1057</i>    | <i>991</i>     | <i>933</i>     | <i>884</i>     | <i>844</i>     | <i>797</i>     | <i>747</i>     |                |               |
| 2006-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl              | 3028            | 2684            | 2369            | 2158           | 2031           | 1897           | 1769           | 1665           | 1581           | 1482           | 1408           | 1340           |                |               |
|                                      | auswertbar  | Anzahl              |                 | 2624            | 2287            | 2109           | 1918           | 1839           | 1719           | 1627           | 1558           | 1454           | 1387           | 1314           |                |               |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl              |                 | 2               | 1               | 3              | 8              | 4              | 1              | 2              | 3              | 4              | 1              | 2              |                |               |
|                                      |   | Anteil in %         |                 | 0,08            | 0,04            | 0,14           | 0,42           | 0,22           | 0,06           | 0,12           | 0,19           | 0,28           | 0,07           | 0,15           |                |               |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                 | [0,00; 0,18]    | [0,00; 0,13]    | [0,00; 0,30]   | [0,13; 0,71]   | [0,00; 0,43]   | [0,00; 0,17]   | [0,00; 0,29]   | [0,00; 0,41]   | [0,01; 0,54]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,36]   |                |               |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>         |                 | <b>99,92</b>    | <b>99,88</b>    | <b>99,74</b>   | <b>99,34</b>   | <b>99,12</b>   | <b>99,07</b>   | <b>98,95</b>   | <b>98,76</b>   | <b>98,49</b>   | <b>98,42</b>   | <b>98,27</b>   |                |               |
|                                      |   | CI                  |                 | [99,82; 100,00] | [99,75; 100,00] | [99,53; 99,95] | [98,99; 99,69] | [98,72; 99,52] | [98,65; 99,49] | [98,50; 99,40] | [98,26; 99,26] | [97,93; 99,05] | [97,84; 99,00] | [97,66; 98,88] |                |               |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>       | <i>3054</i>     | <i>2707</i>     | <i>2393</i>     | <i>2179</i>    | <i>2052</i>    | <i>1924</i>    | <i>1796</i>    | <i>1691</i>    | <i>1605</i>    | <i>1506</i>    | <i>1434</i>    | <i>1366</i>    |                |               |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl              | 2331            | 2077            | 1860            | 1738           | 1626           | 1543           | 1423           | 1322           | 1254           | 1197           | 1138           | 1080           |                |               |
|                                      | auswertbar  | Anzahl              |                 | 2022            | 1815            | 1684           | 1523           | 1482           | 1377           | 1289           | 1235           | 1172           | 1114           | 1066           |                |               |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl              |                 | 4               | 0               | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              | 1              |                |               |
|                                      |   | Anteil in %         |                 | 0,20            | 0,00            | 0,00           | 0,07           | 0,00           | 0,07           | 0,00           | 0,08           | 0,00           | 0,09           | 0,09           |                |               |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                 | [0,00; 0,39]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,24]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,28]   |                |               |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>         |                 | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>    | <b>99,80</b>   | <b>99,74</b>   | <b>99,74</b>   | <b>99,67</b>   | <b>99,67</b>   | <b>99,59</b>   | <b>99,59</b>   | <b>99,50</b>   | <b>99,41</b>   |                |               |
| CI                                   |   |                     | [99,61; 99,99]  | [99,61; 99,99]  | [99,61; 99,99]  | [99,51; 99,97] | [99,51; 99,97] | [99,40; 99,94] | [99,40; 99,94] | [99,28; 99,90] | [99,28; 99,90] | [99,14; 99,86] | [99,01; 99,81] |                |                |               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2346</i>         | <i>2091</i>     | <i>1875</i>     | <i>1753</i>     | <i>1639</i>    | <i>1555</i>    | <i>1433</i>    | <i>1332</i>    | <i>1263</i>    | <i>1206</i>    | <i>1147</i>    | <i>1090</i>    |                |                |               |
| 2007-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl              | 6456            | 5850            | 5282            | 4944           | 4677           | 4399           | 4149           | 3940           | 3760           | 3609           | 3464           |                |                |               |
|                                      | auswertbar  | Anzahl              |                 | 5699            | 5167            | 4748           | 4537           | 4317           | 4068           | 3871           | 3708           | 3546           | 3390           |                |                |               |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl              |                 | 7               | 5               | 12             | 7              | 5              | 11             | 5              | 4              | 2              | 4              |                |                |               |
|                                      |   | Anteil in %         |                 | 0,12            | 0,10            | 0,25           | 0,15           | 0,12           | 0,27           | 0,13           | 0,11           | 0,06           | 0,12           |                |                |               |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                 | [0,03; 0,21]    | [0,01; 0,18]    | [0,11; 0,40]   | [0,04; 0,27]   | [0,01; 0,22]   | [0,11; 0,43]   | [0,02; 0,24]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,13]   | [0,00; 0,23]   |                |                |               |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>         |                 | <b>99,88</b>    | <b>99,78</b>    | <b>99,54</b>   | <b>99,39</b>   | <b>99,27</b>   | <b>99,01</b>   | <b>98,88</b>   | <b>98,77</b>   | <b>98,72</b>   | <b>98,60</b>   |                |                |               |
|                                      |   | CI                  |                 | [99,79; 99,97]  | [99,66; 99,90]  | [99,36; 99,72] | [99,17; 99,61] | [99,03; 99,51] | [98,73; 99,29] | [98,57; 99,19] | [98,45; 99,09] | [98,39; 99,05] | [98,25; 98,95] |                |                |               |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>       | <i>6522</i>     | <i>5910</i>     | <i>5338</i>     | <i>4997</i>    | <i>4736</i>    | <i>4458</i>    | <i>4205</i>    | <i>4002</i>    | <i>3822</i>    | <i>3669</i>    | <i>3522</i>    |                |                |               |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl              | 5289            | 4858            | 4447            | 4171           | 3906           | 3687           | 3504           | 3335           | 3184           | 3047           | 2919           |                |                |               |
|                                      | auswertbar  | Anzahl              |                 | 4758            | 4343            | 3978           | 3799           | 3601           | 3447           | 3256           | 3121           | 2981           | 2861           |                |                |               |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl              |                 | 6               | 3               | 7              | 5              | 3              | 2              | 1              | 0              | 2              | 3              |                |                |               |
|                                      |   | Anteil in %         |                 | 0,13            | 0,07            | 0,18           | 0,13           | 0,08           | 0,06           | 0,03           | 0,00           | 0,07           | 0,10           |                |                |               |
|                                      |   | CI Anteil in %      |                 | [0,03; 0,23]    | [0,00; 0,15]    | [0,05; 0,31]   | [0,02; 0,25]   | [0,00; 0,18]   | [0,00; 0,14]   | [0,00; 0,09]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,22]   |                |                |               |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>         |                 | <b>99,88</b>    | <b>99,81</b>    | <b>99,64</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,42</b>   | <b>99,37</b>   | <b>99,34</b>   | <b>99,34</b>   | <b>99,27</b>   | <b>99,17</b>   |                |                |               |
| CI                                   |   |                     | [99,78; 99,98]  | [99,68; 99,94]  | [99,46; 99,82]  | [99,30; 99,72] | [99,19; 99,65] | [99,13; 99,61] | [99,09; 99,59] | [99,09; 99,59] | [99,00; 99,54] | [98,88; 99,46] |                |                |                |               |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>5314</i>         | <i>4880</i>     | <i>4472</i>     | <i>4196</i>     | <i>3934</i>    | <i>3716</i>    | <i>3532</i>    | <i>3362</i>    | <i>3209</i>    | <i>3071</i>    | <i>2944</i>    |                |                |                |               |

| EZ   | Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2007-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 4366            | 3849           | 3470           | 3150           | 2855           | 2640           | 2479           | 2339           | 2221           | 2113           |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 3721           | 3276           | 3026           | 2759           | 2566           | 2410           | 2273           | 2164           | 2061           |              |              |              |              |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 6              | 11             | 5              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 3            |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,16           | 0,34           | 0,17           | 0,07           | 0,08           | 0,08           | 0,09           | 0,09           | 0,09           | 0,15         |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                 | [0,03; 0,29]   | [0,14; 0,53]   | [0,02; 0,31]   | [0,00; 0,17]   | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,20]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,22]   | [0,00; 0,31]   |              |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,84</b>   | <b>99,52</b>   | <b>99,35</b>   | <b>99,28</b>   | <b>99,21</b>   | <b>99,12</b>   | <b>99,04</b>   | <b>98,95</b>   | <b>98,80</b>   |              |              |              |              |
|  |   | CI                 |                 | [99,71; 99,97] | [99,29; 99,75] | [99,08; 99,62] | [98,99; 99,57] | [98,90; 99,52] | [98,79; 99,45] | [98,69; 99,39] | [98,58; 99,32] | [98,40; 99,20] |              |              |              |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4414</i>     | <i>3892</i>    | <i>3512</i>    | <i>3195</i>    | <i>2899</i>    | <i>2676</i>    | <i>2514</i>    | <i>2368</i>    | <i>2249</i>    | <i>2141</i>    |              |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3432            | 3070           | 2810           | 2555           | 2308           | 2152           | 2027           | 1928           | 1825           | 1748           |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2976           | 2629           | 2456           | 2243           | 2106           | 1970           | 1886           | 1789           | 1704           |              |              |              |              |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 2              | 5              | 3              | 2              | 2              | 0              | 0              | 1              | 2              |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,07           | 0,19           | 0,12           | 0,09           | 0,09           | 0,00           | 0,00           | 0,06           | 0,12           |              |              |              |              |
| CI Anteil in %                                 |   |                    | [0,00; 0,16]    | [0,02; 0,36]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,21]   | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,17]   | [0,00; 0,28]   |                |              |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>99,93</b>    | <b>99,75</b>   | <b>99,63</b>   | <b>99,54</b>   | <b>99,45</b>   | <b>99,45</b>   | <b>99,45</b>   | <b>99,39</b>   | <b>99,28</b>   |                |              |              |              |              |
|  | CI  |                    | [99,84; 100,00] | [99,56; 99,94] | [99,40; 99,86] | [99,28; 99,80] | [99,16; 99,74] | [99,16; 99,74] | [99,16; 99,74] | [99,08; 99,70] | [98,93; 99,63] |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>3459</i>        | <i>3091</i>     | <i>2830</i>    | <i>2577</i>    | <i>2330</i>    | <i>2170</i>    | <i>2043</i>    | <i>1941</i>    | <i>1835</i>    | <i>1756</i>    |                |              |              |              |              |
| 2008-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 4162            | 3670           | 3287           | 2891           | 2629           | 2437           | 2251           | 2123           | 2023           |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 3458           | 3102           | 2766           | 2546           | 2357           | 2184           | 2069           | 1959           |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 5              | 8              | 7              | 2              | 3              | 1              | 2              | 4              |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,14           | 0,26           | 0,25           | 0,08           | 0,13           | 0,05           | 0,10           | 0,20           |                |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                 | [0,02; 0,27]   | [0,08; 0,44]   | [0,07; 0,44]   | [0,00; 0,19]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,14]   | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,40]   |                |              |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,86</b>   | <b>99,61</b>   | <b>99,36</b>   | <b>99,28</b>   | <b>99,16</b>   | <b>99,11</b>   | <b>99,02</b>   | <b>98,82</b>   |                |              |              |              |              |
|  |   | CI                 |                 | [99,74; 99,98] | [99,40; 99,82] | [99,08; 99,64] | [98,98; 99,58] | [98,83; 99,49] | [98,77; 99,45] | [98,65; 99,39] | [98,40; 99,24] |                |              |              |              |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>4190</i>     | <i>3689</i>    | <i>3307</i>    | <i>2914</i>    | <i>2653</i>    | <i>2459</i>    | <i>2274</i>    | <i>2144</i>    | <i>2046</i>    |                |              |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3173            | 2858           | 2560           | 2304           | 2103           | 1950           | 1815           | 1715           | 1629           |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2713           | 2429           | 2222           | 2046           | 1888           | 1772           | 1663           | 1574           |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 8              | 0              | 4              | 5              | 1              | 2              | 0              | 1              |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,29           | 0,00           | 0,18           | 0,24           | 0,05           | 0,11           | 0,00           | 0,06           |                |              |              |              |              |
| CI Anteil in %                                 |   |                    | [0,09; 0,50]    | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,36]   | [0,03; 0,46]   | [0,00; 0,16]   | [0,00; 0,27]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,19]   |                |                |              |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>99,71</b>    | <b>99,71</b>   | <b>99,54</b>   | <b>99,30</b>   | <b>99,24</b>   | <b>99,13</b>   | <b>99,13</b>   | <b>99,07</b>   |                |                |              |              |              |              |
|  | CI  |                    | [99,51; 99,91]  | [99,51; 99,91] | [99,28; 99,80] | [98,96; 99,64] | [98,89; 99,59] | [98,75; 99,51] | [98,75; 99,51] | [98,67; 99,47] |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>3188</i>        | <i>2871</i>     | <i>2579</i>    | <i>2319</i>    | <i>2120</i>    | <i>1972</i>    | <i>1834</i>    | <i>1736</i>    | <i>1650</i>    |                |                |              |              |              |              |
| 2008-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2880            | 2485           | 2143           | 1894           | 1726           | 1593           | 1491           | 1398           |                |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 2372           | 2049           | 1823           | 1672           | 1531           | 1430           | 1348           |                |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 4              | 2              | 2              | 2              | 3              | 2              | 0              |                |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,17           | 0,10           | 0,11           | 0,12           | 0,20           | 0,14           | 0,00           |                |                |              |              |              |              |
|  |   | CI Anteil in %     |                 | [0,00; 0,33]   | [0,00; 0,23]   | [0,00; 0,26]   | [0,00; 0,29]   | [0,00; 0,42]   | [0,00; 0,33]   | [0,00; 0,00]   |                |                |              |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                 | <b>99,83</b>   | <b>99,74</b>   | <b>99,63</b>   | <b>99,51</b>   | <b>99,32</b>   | <b>99,18</b>   | <b>99,18</b>   |                |                |              |              |              |              |
|  |   | CI                 |                 | [99,67; 99,99] | [99,53; 99,95] | [99,37; 99,89] | [99,20; 99,82] | [98,94; 99,70] | [98,76; 99,60] | [98,76; 99,60] |                |                |              |              |              |              |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2893</i>     | <i>2495</i>    | <i>2153</i>    | <i>1904</i>    | <i>1738</i>    | <i>1605</i>    | <i>1505</i>    | <i>1412</i>    |                |                |              |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2082            | 1833           | 1600           | 1412           | 1276           | 1185           | 1113           | 1050           |                |                |              |              |              |              |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                 | 1759           | 1540           | 1353           | 1225           | 1137           | 1084           | 1007           |                |                |              |              |              |              |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                 | 3              | 2              | 2              | 0              | 0              | 0              | 1              |                |                |              |              |              |              |
|  |   | Anteil in %        |                 | 0,17           | 0,13           | 0,15           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,10           |                |                |              |              |              |              |
| CI Anteil in %                                 |   |                    | [0,00; 0,36]    | [0,00; 0,31]   | [0,00; 0,35]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,00]   | [0,00; 0,29]   |                |                |                |              |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>99,83</b>    | <b>99,70</b>   | <b>99,56</b>   | <b>99,56</b>   | <b>99,56</b>   | <b>99,56</b>   | <b>99,46</b>   |                |                |                |              |              |              |              |
|  | CI  |                    | [99,64; 100,00] | [99,44; 99,96] | [99,23; 99,89] | [99,23; 99,89] | [99,23; 99,89] | [99,23; 99,89] | [99,08; 99,84] |                |                |                |              |              |              |              |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2099</i>        | <i>1848</i>     | <i>1615</i>    | <i>1424</i>    | <i>1290</i>    | <i>1198</i>    | <i>1124</i>    | <i>1060</i>    |                |                |                |              |              |              |              |

| EZ   | Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halbjahr | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |  |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2009-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3186             | 2757             | 2382            | 2119            | 1949            | 1802            | 1679           |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                  | 2653             | 2290            | 2057            | 1887            | 1747            | 1631           |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                  | 6                | 3               | 0               | 1               | 2               | 3              |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | Anteil in %        |                  | 0,23             | 0,13            | 0,00            | 0,05            | 0,11            | 0,18           |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI Anteil in %     |                  | [0,05; 0,41]     | [0,00; 0,28]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,16]    | [0,00; 0,27]    | [0,00; 0,39]   |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,78</b>     | <b>99,65</b>    | <b>99,65</b>    | <b>99,60</b>    | <b>99,48</b>    | <b>99,30</b>   |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI                 |                  | [99,60; 99,96]   | [99,42; 99,88]  | [99,42; 99,88]  | [99,35; 99,85]  | [99,18; 99,78]  | [98,94; 99,66] |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3215</i>      | <i>2781</i>      | <i>2408</i>     | <i>2143</i>     | <i>1971</i>     | <i>1823</i>     | <i>1697</i>    |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2403             | 2061             | 1801            | 1618            | 1485            | 1357            | 1259           |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                  | 1983             | 1730            | 1563            | 1423            | 1305            | 1214           |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                  | 0                | 0               | 1               | 1               | 0               | 1              |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | Anteil in %        |                  | 0,00             | 0,00            | 0,06            | 0,07            | 0,00            | 0,08           |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,00]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,21]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,24]   |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,94</b>    | <b>99,87</b>    | <b>99,87</b>    | <b>99,78</b>    |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | CI  |                    | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [99,82; 100,00] | [99,69; 100,00] | [99,69; 100,00] | [99,54; 100,00] |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2420</i>        | <i>2074</i>      | <i>1813</i>      | <i>1629</i>     | <i>1496</i>     | <i>1367</i>     | <i>1268</i>     |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
| 2009-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2709             | 2291             | 1958            | 1722            | 1555            | 1441            |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                  | 2209             | 1876            | 1658            | 1487            | 1385            |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                  | 6                | 0               | 3               | 1               | 1               |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | Anteil in %        |                  | 0,27             | 0,00            | 0,18            | 0,07            | 0,07            |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI Anteil in %     |                  | [0,05; 0,49]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,39]    | [0,00; 0,20]    | [0,00; 0,21]    |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,73</b>     | <b>99,73</b>    | <b>99,55</b>    | <b>99,49</b>    | <b>99,41</b>    |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI                 |                  | [99,52; 99,94]   | [99,52; 99,94]  | [99,26; 99,84]  | [99,17; 99,81]  | [99,06; 99,76]  |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>2729</i>      | <i>2303</i>      | <i>1970</i>     | <i>1730</i>     | <i>1565</i>     | <i>1452</i>     |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2121             | 1835             | 1611            | 1453            | 1322            | 1240            |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                  | 1764             | 1539            | 1404            | 1275            | 1192            |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                  | 2                | 0               | 1               | 1               | 1               |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | Anteil in %        |                  | 0,11             | 0,00            | 0,07            | 0,08            | 0,08            |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,27]     | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,21]    | [0,00; 0,23]    | [0,00; 0,25]    |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>99,89</b>     | <b>99,89</b>     | <b>99,82</b>    | <b>99,74</b>    | <b>99,66</b>    |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | CI  |                    | [99,73; 100,00]  | [99,73; 100,00]  | [99,61; 100,00] | [99,48; 100,00] | [99,35; 99,97]  |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2127</i>        | <i>1839</i>      | <i>1616</i>      | <i>1458</i>     | <i>1328</i>     | <i>1245</i>     |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
| 2010-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3007             | 2523             | 2194            | 1962            | 1802            |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                  | 2428             | 2114            | 1902            | 1745            |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                  | 3                | 2               | 3               | 0               |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | Anteil in %        |                  | 0,12             | 0,09            | 0,16            | 0,00            |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,26]     | [0,00; 0,23]    | [0,00; 0,34]    | [0,00; 0,00]    |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |                  | <b>99,88</b>     | <b>99,78</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,63</b>    |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI                 |                  | [99,74; 100,00]  | [99,59; 99,97]  | [99,37; 99,89]  | [99,37; 99,89]  |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>      | <i>3025</i>      | <i>2538</i>      | <i>2206</i>     | <i>1972</i>     | <i>1813</i>     |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2158             | 1840             | 1580            | 1415            | 1286            |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | auswertbar  | Anzahl             |                  | 1775             | 1524            | 1365            | 1239            |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl             |                  | 4                | 3               | 0               | 1               |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | Anteil in %        |                  | 0,23             | 0,20            | 0,00            | 0,08            |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  |   | CI Anteil in %     |                  | [0,00; 0,45]     | [0,00; 0,42]    | [0,00; 0,00]    | [0,00; 0,24]    |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                    | <b>99,78</b>     | <b>99,58</b>     | <b>99,58</b>    | <b>99,50</b>    |                 |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
|  | CI  |                    | [99,56; 100,00]  | [99,27; 99,89]   | [99,27; 99,89]  | [99,15; 99,85]  |                 |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i>           | <i>Anzahl</i>   | <i>2174</i>        | <i>1850</i>      | <i>1591</i>      | <i>1428</i>     | <i>1299</i>     |                 |                 |                |             |              |              |              |              |              |              |  |

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr     | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr     | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr  | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2010-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3070            | 2611            | 2233            | 2011           |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2533            | 2154            | 1935           |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |                 | 5               | 1               | 2              |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |                 |                 | 0,20            | 0,05           | 0,10         |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 |                 | [0,02; 0,37]    | [0,00; 0,14]   | [0,00; 0,25] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,80</b>    | <b>99,76</b>    | <b>99,66</b>   |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,63; 99,97]  | [99,57; 99,95]  | [99,42; 99,90] |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3086</i>     | <i>2626</i>     | <i>2248</i>     | <i>2023</i>    |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2300            | 2011            | 1754            | 1560           |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1954            | 1695            | 1514           |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |                 | 5               | 2               | 1              |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |                 |                 | 0,26            | 0,12           | 0,07         |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 |                 | [0,03; 0,48]    | [0,00; 0,28]   | [0,00; 0,20] |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,75</b>    | <b>99,63</b>    | <b>99,56</b>   |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI                                   |   |                        | [99,53; 99,97]  | [99,36; 99,90]  | [99,26; 99,86]  |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2312</i>            | <i>2021</i>     | <i>1768</i>     | <i>1574</i>     |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3124            | 2649            | 2254            |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2560            | 2161            |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |                 | 2               | 2               |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |                 |                 | 0,08            | 0,09           |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 |                 | [0,00; 0,19]    | [0,00; 0,22]   |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,92</b>    | <b>99,83</b>    |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,81; 100,00] | [99,66; 100,00] |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3146</i>     | <i>2666</i>     | <i>2269</i>     |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2369            | 2078            | 1795            |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2031            | 1741            |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |                 | 3               | 0               |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |                 |                 | 0,15            | 0,00           |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 |                 | [0,00; 0,31]    | [0,00; 0,00]   |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,85</b>    | <b>99,85</b>    |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI                                   |   |                        | [99,68; 100,00] | [99,68; 100,00] |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2382</i>            | <i>2091</i>     | <i>1809</i>     |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 2011-2                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3011            | 2587            |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 2469            |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |                 | 4               |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |                 |                 | 0,16            |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 |                 | [0,00; 0,32]    |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,84</b>    |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI                     |                 | [99,68; 100,00] |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3031</i>     | <i>2602</i>     |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2263            | 1956            |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |                 | 1865            |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |                 | 3               |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |                 |                 | 0,16            |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |                 |                 | [0,00; 0,34]    |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                 | <b>99,84</b>    |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CI                                   |   |                        | [99,66; 100,00] |                 |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2272</i>            | <i>1963</i>     |                 |                 |                |              |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

| EZ                                   | Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr | 4. Halbjahr | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2012-1                               | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 3409        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <i>männliche Patienten insgesamt</i>  | <i>Anzahl</i>          | <i>3423</i> |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2480        |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | auswertbar  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie  | Anzahl                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | Anteil in %            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      |   | CI Anteil in %         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                      | CI  |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <i>weibliche Patienten insgesamt</i> | <i>Anzahl</i>   | <i>2494</i>            |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |

In der Tabelle 3.6.8 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten bis einschließlich des Berichtshalbjahres keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren und bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

**Tabelle 3.6.8 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation**

| EZ   | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr      | 3. Halbjahr      | 4. Halbjahr      | 5. Halbjahr     | 6. Halbjahr     | 7. Halbjahr     | 8. Halbjahr     | 9. Halbjahr     | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                |
|--|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2005-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 206              | 189              | 163              | 139             | 124             | 118             | 110             | 107             | 101               | 98                | 95                | 87                | 85                | 82                | 77             |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 183              | 157              | 138             | 122             | 118             | 110             | 106             | 100               | 95                | 93                | 85                | 83                | 81                | 76             |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                  | 0                | 0                | 1               | 0               | 0               | 0               | 1               | 1                 | 0                 | 5                 | 0                 | 1                 | 2                 | 0              |
|  |   | Anteil in %            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,72            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,94            | 1,00              | 0,00              | 5,38              | 0,00              | 1,20              | 2,47              | 0,00           |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>99,28</b>    | <b>99,28</b>    | <b>99,28</b>    | <b>99,28</b>    | <b>98,34</b>    | <b>97,37</b>      | <b>97,37</b>      | <b>92,24</b>      | <b>92,24</b>      | <b>91,13</b>      | <b>88,88</b>      | <b>88,88</b>   |
|  |   | CI                     |                  | [100,00; 100,00] | [100,00; 100,00] | [97,86; 100,00] | [97,86; 100,00] | [97,86; 100,00] | [97,86; 100,00] | [96,04; 100,00] | [94,40; 100,00]   | [94,40; 100,00]   | [87,04; 97,44]    | [87,04; 97,44]    | [85,56; 96,70]    | [82,63; 95,13]    | [82,63; 95,13] |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 178              | 169              | 146              | 124             | 112             | 105             | 98              | 95              | 93                | 85                | 83                | 82                | 82                | 82                | 79             |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 167              | 136              | 121             | 112             | 105             | 97              | 94              | 89                | 83                | 81                | 81                | 80                | 78                | 77             |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                  | 0                | 2                | 0               | 1               | 1               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|  |   | Anteil in %            |                  | 0,00             | 1,47             | 0,00            | 0,89            | 0,95            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>100,00</b>    | <b>98,60</b>     | <b>98,60</b>     | <b>97,72</b>    | <b>96,79</b>    | <b>96,79</b>    | <b>96,79</b>    | <b>96,79</b>    | <b>96,79</b>      | <b>96,79</b>      | <b>96,79</b>      | <b>96,79</b>      | <b>96,79</b>      | <b>96,79</b>      |                |
|  | CI  |                        | [100,00; 100,00] | [96,68; 100,00]  | [96,68; 100,00]  | [95,15; 100,00] | [93,67; 99,91]  | [93,67; 99,91]  | [93,67; 99,91]  | [93,67; 99,91]  | [93,67; 99,91]    | [93,67; 99,91]    | [93,67; 99,91]    | [93,67; 99,91]    | [93,67; 99,91]    | [93,67; 99,91]    |                |
| 2005-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 1230             | 1097             | 939              | 836             | 780             | 742             | 699             | 663             | 632               | 607               | 578               | 565               | 545               | 516               |                |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 1065             | 918              | 824             | 767             | 727             | 678             | 652             | 623               | 597               | 573               | 559               | 532               | 509               |                |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                  | 6                | 5                | 8               | 6               | 6               | 3               | 5               | 6                 | 2                 | 4                 | 6                 | 3                 | 6                 |                |
|  |   | Anteil in %            |                  | 0,56             | 0,54             | 0,97            | 0,78            | 0,83            | 0,44            | 0,77            | 0,96              | 0,34              | 0,70              | 1,07              | 0,56              | 1,18              |                |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,44</b>     | <b>98,91</b>     | <b>97,95</b>    | <b>97,19</b>    | <b>96,39</b>    | <b>95,97</b>    | <b>95,24</b>    | <b>94,33</b>      | <b>94,02</b>      | <b>93,36</b>      | <b>92,37</b>      | <b>91,86</b>      | <b>90,77</b>      |                |
|  |   | CI                     |                  | [99,00; 99,88]   | [98,27; 99,55]   | [97,03; 98,87]  | [96,10; 98,28]  | [95,13; 97,65]  | [94,63; 97,31]  | [93,77; 96,71]  | [92,70; 95,96]    | [92,34; 95,70]    | [91,57; 95,15]    | [90,43; 94,31]    | [89,85; 93,87]    | [88,60; 92,94]    |                |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 1002             | 913              | 784              | 709             | 666             | 619             | 592             | 575             | 543               | 513               | 490               | 470               | 458               | 441               |                |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 876              | 766              | 697             | 654             | 608             | 568             | 551             | 524               | 501               | 482               | 460               | 452               | 425               |                |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                  | 6                | 1                | 5               | 6               | 2               | 3               | 6               | 0                 | 2                 | 3                 | 0                 | 2                 | 1                 |                |
|  |   | Anteil in %            |                  | 0,68             | 0,13             | 0,72            | 0,92            | 0,33            | 0,53            | 1,09            | 0,00              | 0,40              | 0,62              | 0,00              | 0,44              | 0,24              |                |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,32</b>     | <b>99,19</b>     | <b>98,49</b>     | <b>97,59</b>    | <b>97,27</b>    | <b>96,77</b>    | <b>95,72</b>    | <b>95,72</b>    | <b>95,34</b>      | <b>94,75</b>      | <b>94,75</b>      | <b>94,33</b>      | <b>94,11</b>      |                   |                |
|  | CI  |                        | [98,78; 99,86]   | [98,59; 99,79]   | [97,63; 99,35]   | [96,48; 98,70]  | [96,08; 98,46]  | [95,46; 98,08]  | [94,18; 97,26]  | [94,18; 97,26]  | [93,72; 96,96]    | [93,00; 96,50]    | [93,00; 96,50]    | [92,50; 96,16]    | [92,23; 95,99]    |                   |                |
| 2006-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 1450             | 1300             | 1105             | 1006            | 914             | 866             | 802             | 740             | 682               | 651               | 617               | 586               | 556               |                   |                |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 1261             | 1082             | 979             | 891             | 826             | 774             | 721             | 669               | 646               | 610               | 580               | 547               |                   |                |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                  | 8                | 9                | 5               | 6               | 6               | 5               | 8               | 4                 | 6                 | 4                 | 4                 | 2                 |                   |                |
|  |   | Anteil in %            |                  | 0,63             | 0,83             | 0,51            | 0,67            | 0,73            | 0,65            | 1,11            | 0,60              | 0,93              | 0,66              | 0,69              | 0,37              |                   |                |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                  | <b>99,37</b>     | <b>98,55</b>     | <b>98,05</b>    | <b>97,39</b>    | <b>96,70</b>    | <b>96,08</b>    | <b>95,03</b>    | <b>94,46</b>      | <b>93,59</b>      | <b>92,98</b>      | <b>92,34</b>      | <b>92,00</b>      |                   |                |
|  |   | CI                     |                  | [98,94; 99,80]   | [97,86; 99,24]   | [97,24; 98,86]  | [96,43; 98,35]  | [95,60; 97,80]  | [94,86; 97,30]  | [93,62; 96,44]  | [92,95; 95,97]    | [91,94; 95,24]    | [91,24; 94,72]    | [90,50; 94,18]    | [90,11; 93,89]    |                   |                |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 1177             | 1052             | 912              | 821             | 758             | 716             | 691             | 645             | 601               | 566               | 537               | 503               | 466               |                   |                |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                  | 1021             | 880              | 798             | 729             | 678             | 671             | 625             | 587               | 557               | 526               | 496               | 458               |                   |                |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                  | 2                | 3                | 11              | 3               | 3               | 3               | 3               | 3                 | 3                 | 0                 | 4                 | 4                 |                   |                |
|  |   | Anteil in %            |                  | 0,20             | 0,34             | 1,38            | 0,41            | 0,44            | 0,45            | 0,48            | 0,51              | 0,54              | 0,00              | 0,81              | 0,87              |                   |                |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,81</b>     | <b>99,47</b>     | <b>98,11</b>     | <b>97,72</b>    | <b>97,30</b>    | <b>96,86</b>    | <b>96,40</b>    | <b>95,91</b>    | <b>95,40</b>      | <b>95,40</b>      | <b>94,63</b>      | <b>93,80</b>      |                   |                   |                |
|  | CI  |                        | [99,54; 100,00]  | [99,01; 99,93]   | [97,19; 99,03]   | [96,70; 98,74]  | [96,18; 98,42]  | [95,64; 98,08]  | [95,08; 97,72]  | [94,49; 97,33]  | [93,87; 96,93]    | [93,87; 96,93]    | [92,94; 96,32]    | [91,94; 95,66]    |                   |                   |                |

| EZ     | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr     | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--------|---|--------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2006-2 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2049        | 1795            | 1561           | 1403           | 1315           | 1223           | 1132           | 1061           | 1008           | 944            | 898            | 852            |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1758            | 1503           | 1375           | 1236           | 1193           | 1108           | 1040           | 1000           | 928            | 886            | 835            |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 10              | 8              | 5              | 17             | 9              | 6              | 4              | 7              | 4              | 3              | 5              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,57            | 0,53           | 0,36           | 1,38           | 0,75           | 0,54           | 0,38           | 0,70           | 0,43           | 0,34           | 0,60           |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,44</b>    | <b>98,91</b>   | <b>98,56</b>   | <b>97,25</b>   | <b>96,53</b>   | <b>96,01</b>   | <b>95,65</b>   | <b>94,98</b>   | <b>94,57</b>   | <b>94,25</b>   | <b>93,69</b>   |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,09; 99,79]  | [98,41; 99,41] | [97,97; 99,15] | [96,40; 98,10] | [95,57; 97,49] | [94,97; 97,05] | [94,55; 96,75] | [93,78; 96,18] | [93,31; 95,83] | [92,95; 95,55] | [92,30; 95,08] |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1625        | 1446            | 1285           | 1195           | 1118           | 1051           | 964            | 900            | 854            | 812            | 770            | 733            |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1410            | 1254           | 1164           | 1053           | 1008           | 933            | 877            | 843            | 798            | 758            | 723            |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 3               | 4              | 2              | 7              | 2              | 4              | 4              | 3              | 2              | 2              | 3              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,21            | 0,32           | 0,17           | 0,66           | 0,20           | 0,43           | 0,46           | 0,36           | 0,25           | 0,26           | 0,41           |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,79</b>    | <b>99,47</b>   | <b>99,30</b>   | <b>98,67</b>   | <b>98,47</b>   | <b>98,05</b>   | <b>97,61</b>   | <b>97,27</b>   | <b>97,03</b>   | <b>96,77</b>   | <b>96,37</b>   |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,55; 100,00] | [99,08; 99,86] | [98,85; 99,75] | [98,02; 99,32] | [97,77; 99,17] | [97,24; 98,86] | [96,69; 98,53] | [96,28; 98,26] | [95,99; 98,07] | [95,67; 97,87] | [95,18; 97,56] |              |              |
| 2007-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 4278        | 3823            | 3441           | 3227           | 3022           | 2813           | 2648           | 2511           | 2400           | 2302           | 2210           |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 3724            | 3377           | 3092           | 2942           | 2758           | 2600           | 2469           | 2374           | 2268           | 2166           |                |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 13              | 13             | 25             | 21             | 20             | 9              | 18             | 13             | 10             | 11             |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,35            | 0,38           | 0,81           | 0,71           | 0,73           | 0,35           | 0,73           | 0,55           | 0,44           | 0,51           |                |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,66</b>    | <b>99,27</b>   | <b>98,50</b>   | <b>97,80</b>   | <b>97,10</b>   | <b>96,77</b>   | <b>96,07</b>   | <b>95,54</b>   | <b>95,13</b>   | <b>94,64</b>   |                |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,47; 99,85]  | [98,99; 99,55] | [98,09; 98,91] | [97,30; 98,30] | [96,51; 97,69] | [96,15; 97,39] | [95,37; 96,77] | [94,79; 96,29] | [94,34; 95,92] | [93,80; 95,48] |                |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3574        | 3265            | 2960           | 2768           | 2571           | 2413           | 2273           | 2162           | 2062           | 1980           | 1893           |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 3194            | 2894           | 2632           | 2502           | 2353           | 2239           | 2117           | 2027           | 1937           | 1856           |                |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 12              | 9              | 17             | 6              | 8              | 7              | 9              | 9              | 10             | 6              |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,38            | 0,31           | 0,65           | 0,24           | 0,34           | 0,31           | 0,43           | 0,44           | 0,52           | 0,32           |                |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,63</b>    | <b>99,32</b>   | <b>98,70</b>   | <b>98,47</b>   | <b>98,14</b>   | <b>97,83</b>   | <b>97,42</b>   | <b>96,99</b>   | <b>96,49</b>   | <b>96,18</b>   |                |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,42; 99,84]  | [99,03; 99,61] | [98,29; 99,11] | [98,02; 98,92] | [97,64; 98,64] | [97,28; 98,38] | [96,81; 98,03] | [96,32; 97,66] | [95,76; 97,22] | [95,41; 96,95] |                |              |              |
| 2007-2 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3157        | 2766            | 2470           | 2223           | 2014           | 1859           | 1738           | 1629           | 1552           | 1469           |                |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 2676            | 2339           | 2142           | 1955           | 1805           | 1691           | 1587           | 1512           | 1434           |                |                |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 16              | 21             | 9              | 16             | 5              | 7              | 8              | 11             | 11             |                |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,60            | 0,90           | 0,42           | 0,82           | 0,28           | 0,41           | 0,50           | 0,73           | 0,77           |                |                |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,41</b>    | <b>98,55</b>   | <b>98,14</b>   | <b>97,34</b>   | <b>97,07</b>   | <b>96,68</b>   | <b>96,19</b>   | <b>95,50</b>   | <b>94,77</b>   |                |                |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,12; 99,70]  | [98,08; 99,02] | [97,60; 98,68] | [96,68; 98,00] | [96,37; 97,77] | [95,93; 97,43] | [95,37; 97,01] | [94,59; 96,41] | [93,77; 95,77] |                |                |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2529        | 2243            | 2055           | 1867           | 1679           | 1565           | 1462           | 1395           | 1318           | 1255           |                |                |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 2176            | 1916           | 1789           | 1631           | 1529           | 1430           | 1364           | 1289           | 1224           |                |                |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 6               | 10             | 11             | 6              | 6              | 5              | 3              | 8              | 7              |                |                |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,28            | 0,52           | 0,61           | 0,37           | 0,39           | 0,35           | 0,22           | 0,62           | 0,57           |                |                |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,73</b>    | <b>99,23</b>   | <b>98,63</b>   | <b>98,27</b>   | <b>97,89</b>   | <b>97,55</b>   | <b>97,34</b>   | <b>96,74</b>   | <b>96,18</b>   |                |                |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,51; 99,95]  | [98,85; 99,61] | [98,11; 99,15] | [97,68; 98,86] | [97,23; 98,55] | [96,83; 98,27] | [96,58; 98,10] | [95,88; 97,60] | [95,23; 97,13] |                |                |              |              |



| EZ     | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr | 12. Halbjahr | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--------|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2008-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 3014        | 2644           | 2353           | 2071           | 1876           | 1741           | 1603           | 1506           | 1429           |              |              |              |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 2491           | 2217           | 1982           | 1815           | 1684           | 1558           | 1468           | 1389           |              |              |              |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 18             | 14             | 13             | 5              | 8              | 9              | 9              | 10             |              |              |              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,72           | 0,63           | 0,66           | 0,28           | 0,48           | 0,58           | 0,61           | 0,72           |              |              |              |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,30</b>   | <b>98,69</b>   | <b>98,05</b>   | <b>97,78</b>   | <b>97,33</b>   | <b>96,77</b>   | <b>96,18</b>   | <b>95,49</b>   |              |              |              |              |              |
|        |   | CI                 |             | [98,98; 99,62] | [98,24; 99,14] | [97,48; 98,62] | [97,17; 98,39] | [96,64; 98,02] | [96,00; 97,54] | [95,32; 97,04] | [94,54; 96,44] |              |              |              |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2278        | 2032           | 1806           | 1616           | 1473           | 1354           | 1260           | 1186           | 1124           |              |              |              |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1932           | 1724           | 1571           | 1436           | 1316           | 1232           | 1152           | 1081           |              |              |              |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 12             | 6              | 5              | 7              | 4              | 6              | 4              | 2              |              |              |              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,62           | 0,35           | 0,32           | 0,49           | 0,30           | 0,49           | 0,35           | 0,19           |              |              |              |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,40</b>   | <b>99,05</b>   | <b>98,74</b>   | <b>98,27</b>   | <b>97,97</b>   | <b>97,50</b>   | <b>97,16</b>   | <b>96,98</b>   |              |              |              |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,06; 99,74] | [98,61; 99,49] | [98,23; 99,25] | [97,65; 98,89] | [97,29; 98,65] | [96,72; 98,28] | [96,32; 98,00] | [96,10; 97,86] |              |              |              |              |              |
| 2008-2 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2093        | 1782           | 1524           | 1350           | 1229           | 1123           | 1052           | 982            |                |              |              |              |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1698           | 1459           | 1302           | 1193           | 1084           | 1009           | 947            |                |              |              |              |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 13             | 6              | 10             | 10             | 8              | 6              | 3              |                |              |              |              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,77           | 0,41           | 0,77           | 0,84           | 0,74           | 0,59           | 0,32           |                |              |              |              |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,25</b>   | <b>98,84</b>   | <b>98,09</b>   | <b>97,28</b>   | <b>96,57</b>   | <b>96,00</b>   | <b>95,69</b>   |                |              |              |              |              |              |
|        |   | CI                 |             | [98,84; 99,66] | [98,32; 99,36] | [97,40; 98,78] | [96,43; 98,13] | [95,59; 97,55] | [94,93; 97,07] | [94,57; 96,81] |                |              |              |              |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1583        | 1381           | 1198           | 1048           | 936            | 863            | 811            | 759            |                |              |              |              |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1319           | 1159           | 1005           | 898            | 829            | 792            | 729            |                |              |              |              |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 7              | 8              | 5              | 2              | 3              | 2              | 3              |                |              |              |              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,53           | 0,69           | 0,50           | 0,22           | 0,36           | 0,25           | 0,41           |                |              |              |              |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,48</b>   | <b>98,80</b>   | <b>98,31</b>   | <b>98,10</b>   | <b>97,75</b>   | <b>97,50</b>   | <b>97,10</b>   |                |              |              |              |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,09; 99,87] | [98,19; 99,41] | [97,57; 99,05] | [97,31; 98,89] | [96,87; 98,63] | [96,56; 98,44] | [96,06; 98,14] |                |              |              |              |              |              |
| 2009-1 | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 2357        | 2046           | 1773           | 1587           | 1441           | 1332           | 1243           |                |                |              |              |              |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1963           | 1706           | 1542           | 1399           | 1292           | 1204           |                |                |              |              |              |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 14             | 11             | 12             | 9              | 7              | 7              |                |                |              |              |              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,71           | 0,64           | 0,78           | 0,64           | 0,54           | 0,58           |                |                |              |              |              |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,30</b>   | <b>98,67</b>   | <b>97,91</b>   | <b>97,28</b>   | <b>96,76</b>   | <b>96,20</b>   |                |                |              |              |              |              |              |
|        |   | CI                 |             | [98,93; 99,67] | [98,15; 99,19] | [97,24; 98,58] | [96,50; 98,06] | [95,89; 97,63] | [95,24; 97,16] |                |                |              |              |              |              |              |
|        | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl             | 1839        | 1570           | 1357           | 1210           | 1107           | 1010           | 936            |                |                |              |              |              |              |              |
|        | auswertbar  | Anzahl             |             | 1510           | 1304           | 1173           | 1062           | 973            | 897            |                |                |              |              |              |              |              |
|        | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl             |             | 7              | 5              | 9              | 6              | 4              | 1              |                |                |              |              |              |              |              |
|        |   | Anteil in %        |             | 0,46           | 0,38           | 0,77           | 0,56           | 0,41           | 0,11           |                |                |              |              |              |              |              |
|        | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>        |             | <b>99,54</b>   | <b>99,17</b>   | <b>98,41</b>   | <b>97,86</b>   | <b>97,46</b>   | <b>97,35</b>   |                |                |              |              |              |              |              |
|        |   | CI                 |             | [99,20; 99,88] | [98,70; 99,64] | [97,73; 99,09] | [97,06; 98,66] | [96,57; 98,35] | [96,43; 98,27] |                |                |              |              |              |              |              |

| EZ   | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2009-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2030           | 1695           | 1441           | 1263           | 1133           | 1050           |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1637           | 1383           | 1218           | 1083           | 1009           |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 13             | 9              | 5              | 5              | 10             |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 0,79           | 0,65           | 0,41           | 0,46           | 0,99           |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>99,22</b>   | <b>98,58</b>   | <b>98,18</b>   | <b>97,73</b>   | <b>96,76</b>   |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [98,80; 99,64] | [97,99; 99,17] | [97,49; 98,87] | [96,94; 98,52] | [95,78; 97,74] |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1628           | 1399           | 1219           | 1098           | 998            | 929            |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1346           | 1166           | 1061           | 965            | 896            |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 9              | 5              | 4              | 7              | 3              |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 0,67           | 0,43           | 0,38           | 0,73           | 0,33           |             |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>99,34</b>   | <b>98,92</b>   | <b>98,55</b>   | <b>97,84</b>   | <b>97,51</b>   |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI   |                    | [98,91; 99,77] | [98,36; 99,48] | [97,88; 99,22] | [96,99; 98,69] | [96,59; 98,43] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
| 2010-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2208           | 1852           | 1595           | 1432           | 1314           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1788           | 1544           | 1393           | 1277           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 20             | 8              | 6              | 9              |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 1,12           | 0,52           | 0,43           | 0,70           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>98,89</b>   | <b>98,39</b>   | <b>97,97</b>   | <b>97,28</b>   |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [98,41; 99,37] | [97,80; 98,98] | [97,29; 98,65] | [96,47; 98,09] |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1662           | 1411           | 1204           | 1079           | 978            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1361           | 1167           | 1044           | 945            |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 13             | 9              | 6              | 1              |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 0,96           | 0,77           | 0,57           | 0,11           |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>99,06</b>   | <b>98,30</b>   | <b>97,74</b>   | <b>97,64</b>   |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI   |                    | [98,55; 99,57] | [97,59; 99,01] | [96,91; 98,57] | [96,78; 98,50] |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
| 2010-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2269           | 1915           | 1631           | 1473           |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1857           | 1572           | 1415           |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 14             | 7              | 10             |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 0,75           | 0,45           | 0,71           |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>99,25</b>   | <b>98,82</b>   | <b>98,12</b>   |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [98,86; 99,64] | [98,31; 99,33] | [97,46; 98,78] |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1740           | 1524           | 1319           | 1166           |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1480           | 1274           | 1127           |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 15             | 3              | 3              |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 1,01           | 0,24           | 0,27           |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>99,00</b>   | <b>98,77</b>   | <b>98,51</b>   |                |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI   |                    | [98,50; 99,50] | [98,20; 99,34] | [97,87; 99,15] |                |                |                |             |             |               |               |               |               |               |               |

| EZ   | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2011-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2302           | 1952           | 1640           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1887           | 1578           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                | 21             | 2              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 1,11           | 0,13           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>98,90</b>   | <b>98,77</b>   |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI                     |                | [98,43; 99,37] | [98,27; 99,27] |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 1798           | 1570           | 1350           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1532           | 1308           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                | 10             | 5              |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 0,65           | 0,38           |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,35</b>   | <b>98,97</b>   |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI  |                        | [98,95; 99,75] | [98,45; 99,49] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2011-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2210           | 1882           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1792           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                | 15             |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 0,84           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                | <b>99,16</b>   |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI                     |                | [98,74; 99,58] |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 1689           | 1453           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                | 1384           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                | 10             |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                | 0,72           |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        | <b>99,28</b>   |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI  |                        | [98,83; 99,73] |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2012-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 2557           |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>  | <b>Rate</b>            |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | CI                     |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>   | Anzahl                 | 1909           |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | auswertbar  | Anzahl                 |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte  | Anzahl                 |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   | Anteil in %            |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>   |                        |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | CI  |                        |                |                |                |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

In der Tabelle 3.6.9 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten in der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären aber ein oder mehrere sekundäre Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

**Tabelle 3.6.9 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation**

| EZ   | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED | Beitritts-<br>halbjahr | 2. Halbjahr        | 3. Halbjahr        | 4. Halbjahr       | 5. Halbjahr       | 6. Halbjahr       | 7. Halbjahr       | 8. Halbjahr       | 9. Halbjahr       | 10. Halb-<br>jahr | 11. Halb-<br>jahr | 12. Halb-<br>jahr | 13. Halb-<br>jahr | 14. Halb-<br>jahr | 15. Halb-<br>jahr |                   |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2005-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 110                | 105                | 91                | 81                | 71                | 65                | 60                | 56                | 52                | 52                | 51                | 48                | 46                | 45                |                   |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 104                | 88                | 78                | 71                | 65                | 60                | 56                | 52                | 52                | 51                | 48                | 46                | 45                |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 1                  | 4                 | 2                 | 1                 | 0                 | 1                 | 2                 | 0                 | 0                 | 1                 | 2                 | 0                 | 0                 | 2                 |
|  |  | Anteil in %            |                    | 0,96               | 4,55              | 2,56              | 1,41              | 0,00              | 1,67              | 3,57              | 0,00              | 0,00              | 1,92              | 3,92              | 0,00              | 0,00              | 4,44              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                    | <b>99,04</b>       | <b>94,69</b>      | <b>92,32</b>      | <b>91,02</b>      | <b>91,02</b>      | <b>89,50</b>      | <b>86,30</b>      | <b>86,30</b>      | <b>86,30</b>      | <b>84,64</b>      | <b>81,33</b>      | <b>81,33</b>      | <b>81,33</b>      | <b>77,71</b>      |
|  |  | CI                     |                    | [97,16;<br>100,00] | [90,15;<br>99,23] | [86,83;<br>97,81] | [85,05;<br>96,99] | [85,05;<br>96,99] | [82,93;<br>96,07] | [78,61;<br>93,99] | [78,61;<br>93,99] | [78,61;<br>93,99] | [76,44;<br>92,84] | [72,25;<br>90,41] | [72,25;<br>90,41] | [72,25;<br>90,41] | [67,75;<br>87,67] |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 92                 | 91                 | 79                | 69                | 61                | 59                | 55                | 50                | 47                | 46                | 44                | 42                | 40                | 38                | 34                |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 89                 | 68                | 69                | 60                | 59                | 52                | 49                | 47                | 46                | 44                | 41                | 39                | 36                | 33                |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 3                  | 2                 | 3                 | 1                 | 3                 | 2                 | 1                 | 0                 | 0                 | 1                 | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 |
|  |  | Anteil in %            |                    | 3,37               | 2,94              | 4,35              | 1,67              | 5,08              | 3,85              | 2,04              | 0,00              | 0,00              | 2,27              | 0,00              | 2,56              | 0,00              | 0,00              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                        | <b>96,70</b>       | <b>94,22</b>       | <b>90,13</b>      | <b>88,62</b>      | <b>84,12</b>      | <b>81,00</b>      | <b>79,38</b>      | <b>79,38</b>      | <b>79,38</b>      | <b>77,58</b>      | <b>77,58</b>      | <b>75,64</b>      | <b>75,64</b>      | <b>75,64</b>      |                   |
|  | CI   |                        | [93,03;<br>100,00] | [89,29;<br>99,15]  | [83,59;<br>96,67] | [81,56;<br>95,68] | [75,78;<br>92,46] | [71,92;<br>90,08] | [69,94;<br>88,82] | [69,94;<br>88,82] | [69,94;<br>88,82] | [67,71;<br>87,45] | [67,71;<br>87,45] | [65,31;<br>85,97] | [65,31;<br>85,97] | [65,31;<br>85,97] |                   |
| 2005-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 853                | 803                | 721               | 661               | 615               | 585               | 552               | 515               | 485               | 461               | 439               | 421               | 400               | 389               |                   |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 787                | 709               | 649               | 609               | 573               | 539               | 507               | 479               | 459               | 432               | 417               | 393               | 384               |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 27                 | 15                | 14                | 11                | 11                | 27                | 16                | 7                 | 9                 | 8                 | 11                | 6                 | 8                 |                   |
|  |  | Anteil in %            |                    | 3,43               | 2,12              | 2,16              | 1,81              | 1,92              | 5,01              | 3,16              | 1,46              | 1,96              | 1,85              | 2,64              | 1,53              | 2,08              |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                    | <b>96,60</b>       | <b>94,57</b>      | <b>92,55</b>      | <b>90,88</b>      | <b>89,14</b>      | <b>84,75</b>      | <b>82,08</b>      | <b>80,89</b>      | <b>79,30</b>      | <b>77,84</b>      | <b>75,79</b>      | <b>74,64</b>      | <b>73,09</b>      |                   |
|  |  | CI                     |                    | [95,34;<br>97,86]  | [92,97;<br>96,17] | [90,67;<br>94,43] | [88,79;<br>92,97] | [86,85;<br>91,43] | [82,04;<br>87,46] | [79,16;<br>85,00] | [77,88;<br>83,90] | [76,17;<br>82,43] | [74,61;<br>81,07] | [72,43;<br>79,15] | [71,21;<br>78,07] | [69,56;<br>76,62] |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 647                | 598                | 539               | 499               | 469               | 442               | 422               | 401               | 383               | 354               | 346               | 336               | 322               | 311               |                   |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 584                | 528               | 490               | 461               | 432               | 411               | 396               | 376               | 349               | 341               | 331               | 318               | 302               |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 11                 | 9                 | 9                 | 7                 | 6                 | 8                 | 9                 | 10                | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 8                 |                   |
|  |  | Anteil in %            |                    | 1,88               | 1,70              | 1,84              | 1,52              | 1,39              | 1,95              | 2,27              | 2,66              | 0,86              | 0,88              | 0,91              | 0,94              | 2,65              |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                        | <b>98,13</b>       | <b>96,47</b>       | <b>94,73</b>      | <b>93,29</b>      | <b>92,01</b>      | <b>90,24</b>      | <b>88,20</b>      | <b>85,87</b>      | <b>85,13</b>      | <b>84,39</b>      | <b>83,63</b>      | <b>82,84</b>      | <b>80,65</b>      |                   |                   |
|  | CI   |                        | [97,03;<br>99,23]  | [94,95;<br>97,99]  | [92,86;<br>96,60] | [91,17;<br>95,41] | [89,68;<br>94,34] | [87,65;<br>92,83] | [85,35;<br>91,05] | [82,75;<br>88,99] | [81,93;<br>88,33] | [81,11;<br>87,67] | [80,26;<br>87,00] | [79,39;<br>86,29] | [76,97;<br>84,33] |                   |                   |
| 2006-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 648                | 586                | 526               | 486               | 455               | 425               | 395               | 363               | 347               | 323               | 309               | 290               | 269               |                   |                   |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 580                | 519               | 471               | 444               | 410               | 383               | 360               | 347               | 319               | 302               | 285               | 265               |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 9                  | 4                 | 7                 | 9                 | 19                | 6                 | 6                 | 9                 | 4                 | 5                 | 6                 | 6                 |                   |                   |
|  |  | Anteil in %            |                    | 1,55               | 0,77              | 1,49              | 2,03              | 4,63              | 1,57              | 1,67              | 2,59              | 1,25              | 1,66              | 2,11              | 2,26              |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                    | <b>98,46</b>       | <b>97,70</b>      | <b>96,26</b>      | <b>94,33</b>      | <b>90,06</b>      | <b>88,65</b>      | <b>87,18</b>      | <b>84,92</b>      | <b>83,85</b>      | <b>82,47</b>      | <b>80,74</b>      | <b>78,92</b>      |                   |                   |
|  |  | CI                     |                    | [97,46;<br>99,46]  | [96,46;<br>98,94] | [94,65;<br>97,87] | [92,31;<br>96,35] | [87,37;<br>92,75] | [85,78;<br>91,52] | [84,12;<br>90,24] | [81,60;<br>88,24] | [80,42;<br>87,28] | [78,89;<br>86,05] | [76,97;<br>84,51] | [74,96;<br>82,88] |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 489                | 449                | 399               | 371               | 341               | 327               | 306               | 285               | 268               | 254               | 243               | 232               | 222               |                   |                   |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 439                | 394               | 359               | 330               | 320               | 303               | 278               | 262               | 250               | 240               | 230               | 219               |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 4                  | 4                 | 3                 | 4                 | 7                 | 7                 | 6                 | 6                 | 4                 | 5                 | 5                 | 2                 |                   |                   |
|  |  | Anteil in %            |                    | 0,91               | 1,02              | 0,84              | 1,21              | 2,19              | 2,31              | 2,16              | 2,29              | 1,60              | 2,08              | 2,17              | 0,91              |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                        | <b>99,09</b>       | <b>98,09</b>       | <b>97,28</b>      | <b>96,13</b>      | <b>94,04</b>      | <b>91,88</b>      | <b>89,91</b>      | <b>87,86</b>      | <b>86,46</b>      | <b>84,67</b>      | <b>82,83</b>      | <b>82,08</b>      |                   |                   |                   |
|  | CI   |                        | [98,21;<br>99,97]  | [96,78;<br>99,40]  | [95,69;<br>98,87] | [94,20;<br>98,06] | [91,61;<br>96,47] | [89,03;<br>94,73] | [86,71;<br>93,11] | [84,34;<br>91,38] | [82,74;<br>90,18] | [80,71;<br>88,63] | [78,64;<br>87,02] | [77,80;<br>86,36] |                   |                   |                   |
| 2006-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 796                | 722                | 656               | 607               | 576               | 528               | 495               | 468               | 445               | 416               | 392               | 374               |                   |                   |                   |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 703                | 641               | 592               | 554               | 509               | 483               | 460               | 433               | 409               | 385               | 370               |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 10                 | 13                | 5                 | 20                | 7                 | 11                | 6                 | 8                 | 9                 | 4                 | 4                 |                   |                   |                   |
|  |  | Anteil in %            |                    | 1,42               | 2,03              | 0,84              | 3,61              | 1,38              | 2,28              | 1,30              | 1,85              | 2,20              | 1,04              | 1,08              |                   |                   |                   |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>            |                    | <b>98,59</b>       | <b>96,60</b>      | <b>95,80</b>      | <b>92,41</b>      | <b>91,16</b>      | <b>89,10</b>      | <b>87,94</b>      | <b>86,34</b>      | <b>84,45</b>      | <b>83,58</b>      | <b>82,67</b>      |                   |                   |                   |
|  |  | CI                     |                    | [97,72;<br>99,46]  | [95,23;<br>97,97] | [94,27;<br>97,33] | [90,34;<br>94,48] | [88,92;<br>93,40] | [86,60;<br>91,60] | [85,31;<br>90,57] | [83,53;<br>89,15] | [81,44;<br>87,46] | [80,48;<br>86,68] | [79,48;<br>85,86] |                   |                   |                   |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl                 | 610                | 542                | 488               | 456               | 421               | 397               | 370               | 340               | 319               | 307               | 297               | 282               |                   |                   |                   |
|  | auswertbar   | Anzahl                 |                    | 527                | 477               | 442               | 396               | 385               | 363               | 335               | 315               | 301               | 291               | 281               |                   |                   |                   |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl                 |                    | 11                 | 4                 | 8                 | 11                | 7                 | 4                 | 7                 | 6                 | 1                 | 6                 | 5                 |                   |                   |                   |
|  |  | Anteil in %            |                    | 2,09               | 0,84              | 1,81              | 2,78              | 1,82              | 1,10              | 2,09              | 1,90              | 0,33              | 2,06              | 1,78              |                   |                   |                   |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                        | <b>97,94</b>       | <b>97,12</b>       | <b>95,38</b>      | <b>92,84</b>      | <b>91,17</b>      | <b>90,17</b>      | <b>88,31</b>      | <b>86,64</b>      | <b>86,35</b>      | <b>84,60</b>      | <b>83,09</b>      |                   |                   |                   |                   |
|  | CI   |                        | [96,73;<br>99,15]  | [95,68;<br>98,56]  | [93,53;<br>97,23] | [90,51;<br>95,17] | [88,57;<br>93,77] | [87,42;<br>92,92] | [85,29;<br>91,33] | [83,40;<br>89,88] | [83,07;<br>89,63] | [81,10;<br>88,10] | [79,41;<br>86,77] |                   |                   |                   |                   |

| EZ   | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halb-jahr  | 11. Halb-jahr  | 12. Halb-jahr  | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2007-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1821           | 1706           | 1543           | 1428           | 1339           | 1260           | 1191           | 1128           | 1068           | 1022           | 978            |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1666           | 1512           | 1383           | 1300           | 1247           | 1172           | 1115           | 1057           | 1009           | 961            |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 39             | 33             | 43             | 29             | 21             | 28             | 25             | 17             | 16             | 13             |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,34           | 2,18           | 3,11           | 2,23           | 1,68           | 2,39           | 2,24           | 1,61           | 1,59           | 1,35           |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>97,69</b>   | <b>95,59</b>   | <b>92,69</b>   | <b>90,66</b>   | <b>89,14</b>   | <b>87,03</b>   | <b>85,09</b>   | <b>83,73</b>   | <b>82,41</b>   | <b>81,29</b>   |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [96,97; 98,41] | [94,59; 96,59] | [91,40; 93,98] | [89,20; 92,12] | [87,57; 90,71] | [85,31; 88,75] | [83,25; 86,93] | [81,81; 85,65] | [80,41; 84,41] | [79,23; 83,35] |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1510           | 1400           | 1295           | 1216           | 1138           | 1082           | 1038           | 985            | 939            | 892            | 857            |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1375           | 1269           | 1174           | 1114           | 1065           | 1023           | 967            | 922            | 875            | 840            |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 18             | 15             | 32             | 25             | 16             | 15             | 11             | 14             | 11             | 13             |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 1,31           | 1,18           | 2,73           | 2,24           | 1,50           | 1,47           | 1,14           | 1,52           | 1,26           | 1,55           |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>98,71</b>   | <b>97,55</b>   | <b>94,94</b>   | <b>92,83</b>   | <b>91,45</b>   | <b>90,12</b>   | <b>89,10</b>   | <b>87,76</b>   | <b>86,66</b>   | <b>85,32</b>   |                |               |               |               |
|  | CI   |                    | [98,12; 99,30] | [96,72; 98,38] | [93,74; 96,14] | [91,40; 94,26] | [89,89; 93,01] | [88,44; 91,80] | [87,34; 90,86] | [85,89; 89,63] | [84,70; 88,62] | [83,26; 87,38] |                |               |               |               |
| 2007-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 999            | 895            | 817            | 735            | 662            | 612            | 584            | 556            | 524            | 504            |                |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 871            | 773            | 712            | 645            | 602            | 574            | 546            | 518            | 494            |                |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 17             | 33             | 17             | 14             | 8              | 11             | 11             | 11             | 11             |                |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 1,95           | 4,27           | 2,39           | 2,17           | 1,33           | 1,92           | 2,01           | 2,12           | 2,23           |                |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>98,07</b>   | <b>94,01</b>   | <b>91,78</b>   | <b>89,80</b>   | <b>88,62</b>   | <b>86,94</b>   | <b>85,20</b>   | <b>83,39</b>   | <b>81,54</b>   |                |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [97,16; 98,98] | [92,40; 95,62] | [89,89; 93,67] | [87,69; 91,91] | [86,38; 90,86] | [84,53; 89,35] | [82,63; 87,77] | [80,66; 86,12] | [78,66; 84,42] |                |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 776            | 713            | 646            | 581            | 522            | 485            | 463            | 440            | 421            | 405            |                |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 696            | 614            | 571            | 513            | 477            | 449            | 435            | 416            | 399            |                |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 18             | 20             | 12             | 7              | 4              | 6              | 5              | 4              | 7              |                |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,59           | 3,26           | 2,10           | 1,36           | 0,84           | 1,34           | 1,15           | 0,96           | 1,75           |                |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,43</b>   | <b>94,36</b>   | <b>92,39</b>   | <b>91,13</b>   | <b>90,37</b>   | <b>89,19</b>   | <b>88,17</b>   | <b>87,32</b>   | <b>85,79</b>   |                |                |               |               |               |
|  | CI   |                    | [96,26; 98,60] | [92,62; 96,10] | [90,36; 94,42] | [88,92; 93,34] | [88,06; 92,68] | [86,72; 91,66] | [85,57; 90,77] | [84,62; 90,02] | [82,91; 88,67] |                |                |               |               |               |
| 2008-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 937            | 838            | 740            | 638            | 582            | 537            | 498            | 474            | 452            |                |                |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 795            | 713            | 619            | 572            | 522            | 488            | 463            | 439            |                |                |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 29             | 22             | 15             | 12             | 10             | 7              | 5              | 7              |                |                |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,65           | 3,09           | 2,42           | 2,10           | 1,92           | 1,43           | 1,08           | 1,59           |                |                |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,49</b>   | <b>93,54</b>   | <b>91,31</b>   | <b>89,42</b>   | <b>87,73</b>   | <b>86,48</b>   | <b>85,56</b>   | <b>84,19</b>   |                |                |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [95,23; 97,75] | [91,82; 95,26] | [89,30; 93,32] | [87,18; 91,66] | [85,30; 90,16] | [83,92; 89,04] | [82,90; 88,22] | [81,39; 86,99] |                |                |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 770            | 716            | 642            | 578            | 520            | 489            | 457            | 438            | 417            |                |                |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 682            | 611            | 557            | 510            | 472            | 449            | 428            | 410            |                |                |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 20             | 15             | 18             | 8              | 7              | 5              | 4              | 7              |                |                |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,93           | 2,45           | 3,23           | 1,57           | 1,48           | 1,11           | 0,93           | 1,71           |                |                |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,14</b>   | <b>94,80</b>   | <b>91,79</b>   | <b>90,36</b>   | <b>89,05</b>   | <b>88,06</b>   | <b>87,25</b>   | <b>85,76</b>   |                |                |                |               |               |               |
|  | CI   |                    | [95,91; 98,37] | [93,12; 96,48] | [89,66; 93,92] | [88,05; 92,67] | [86,58; 91,52] | [85,47; 90,65] | [84,56; 89,94] | [82,90; 88,62] |                |                |                |               |               |               |
| 2008-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 671            | 601            | 522            | 460            | 415            | 388            | 359            | 338            |                |                |                |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 580            | 503            | 447            | 406            | 373            | 349            | 325            |                |                |                |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 18             | 10             | 12             | 6              | 8              | 10             | 4              |                |                |                |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,10           | 1,99           | 2,68           | 1,48           | 2,14           | 2,87           | 1,23           |                |                |                |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,93</b>   | <b>95,02</b>   | <b>92,48</b>   | <b>91,12</b>   | <b>89,19</b>   | <b>86,64</b>   | <b>85,58</b>   |                |                |                |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [95,53; 98,33] | [93,22; 96,82] | [90,22; 94,74] | [88,65; 93,59] | [86,43; 91,95] | [83,54; 89,74] | [82,35; 88,81] |                |                |                |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 434            | 397            | 348            | 307            | 286            | 270            | 252            | 241            |                |                |                |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 391            | 333            | 297            | 277            | 258            | 244            | 234            |                |                |                |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 10             | 13             | 1              | 3              | 7              | 2              | 7              |                |                |                |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,56           | 3,90           | 0,34           | 1,08           | 2,71           | 0,82           | 2,99           |                |                |                |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,46</b>   | <b>93,72</b>   | <b>93,41</b>   | <b>92,40</b>   | <b>89,97</b>   | <b>89,25</b>   | <b>86,58</b>   |                |                |                |                |               |               |               |
|  | CI   |                    | [95,90; 99,02] | [91,23; 96,21] | [90,85; 95,97] | [89,63; 95,17] | [86,74; 93,20] | [85,89; 92,61] | [82,78; 90,38] |                |                |                |                |               |               |               |

| EZ   | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2009-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 721            | 617            | 511            | 440            | 416            | 382            | 354            |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 604            | 501            | 433            | 408            | 376            | 350            |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 22             | 17             | 9              | 12             | 11             | 8              |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,64           | 3,39           | 2,08           | 2,94           | 2,93           | 2,29           |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,39</b>   | <b>93,13</b>   | <b>91,20</b>   | <b>88,55</b>   | <b>85,96</b>   | <b>83,99</b>   |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [94,91; 97,87] | [91,04; 95,22] | [88,80; 93,60] | [85,79; 91,31] | [82,89; 89,03] | [80,70; 87,28] |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 493            | 432            | 385            | 353            | 321            | 285            | 265            |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 418            | 370            | 344            | 311            | 276            | 263            |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 9              | 2              | 8              | 11             | 3              | 7              |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,15           | 0,54           | 2,33           | 3,54           | 1,09           | 2,66           |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,90</b>   | <b>97,38</b>   | <b>95,13</b>   | <b>91,80</b>   | <b>90,82</b>   | <b>88,40</b>   |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI   |                    | [96,54; 99,26] | [95,85; 98,91] | [92,98; 97,28] | [88,97; 94,63] | [87,81; 93,83] | [84,98; 91,82] |                |             |               |               |               |               |               |               |
| 2009-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 574            | 504            | 432            | 374            | 346            | 315            |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 488            | 420            | 364            | 337            | 305            |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 17             | 12             | 7              | 12             | 6              |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,48           | 2,86           | 1,92           | 3,56           | 1,97           |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,54</b>   | <b>93,81</b>   | <b>92,02</b>   | <b>88,78</b>   | <b>87,03</b>   |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [94,93; 98,15] | [91,62; 96,00] | [89,51; 94,53] | [85,76; 91,80] | [83,76; 90,30] |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 432            | 386            | 343            | 306            | 283            | 266            |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 371            | 326            | 300            | 274            | 255            |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 6              | 5              | 5              | 3              | 6              |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 1,62           | 1,53           | 1,67           | 1,09           | 2,35           |                |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>98,40</b>   | <b>96,91</b>   | <b>95,29</b>   | <b>94,25</b>   | <b>92,03</b>   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI   |                    | [97,13; 99,67] | [95,11; 98,71] | [93,03; 97,55] | [91,72; 96,78] | [89,00; 95,06] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
| 2010-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 697            | 585            | 507            | 441            | 402            |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 562            | 491            | 426            | 393            |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 17             | 13             | 10             | 4              |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,02           | 2,65           | 2,35           | 1,02           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>97,02</b>   | <b>94,49</b>   | <b>92,29</b>   | <b>91,35</b>   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [95,63; 98,41] | [92,57; 96,41] | [89,98; 94,60] | [88,89; 93,81] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 443            | 387            | 333            | 299            | 267            |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 374            | 321            | 288            | 258            |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 10             | 8              | 3              | 4              |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,67           | 2,49           | 1,04           | 1,55           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,35</b>   | <b>94,97</b>   | <b>93,98</b>   | <b>92,53</b>   |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI   |                    | [95,73; 98,97] | [92,70; 97,24] | [91,47; 96,49] | [89,68; 95,38] |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
| 2010-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 704            | 614            | 510            | 453            |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 601            | 498            | 443            |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 20             | 12             | 7              |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,33           | 2,41           | 1,58           |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,70</b>   | <b>94,38</b>   | <b>92,89</b>   |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | CI                 |                | [95,28; 98,12] | [92,48; 96,28] | [90,72; 95,06] |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 506            | 444            | 389            | 349            |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 437            | 379            | 344            |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |                | 10             | 8              | 4              |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,29           | 2,11           | 1,16           |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,72</b>   | <b>95,68</b>   | <b>94,56</b>   |                |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |
|  | CI   |                    | [96,32; 99,12] | [93,72; 97,64] | [92,34; 96,78] |                |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |

| EZ   | Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--|--|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2011-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 708         | 607            | 533            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |             | 592            | 516            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |             | 8              | 17             |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |             |                | 1,35           | 3,29           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |             |                | <b>98,66</b>   | <b>95,41</b>   |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |             |                | [97,74; 99,58] | [93,65; 97,17] |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 515         | 458            | 402            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |             | 453            | 393            |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |             | 7              | 8              |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |             |                | 1,55           | 2,04           |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    |             | <b>98,46</b>   | <b>96,45</b>   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    |             | [97,33; 99,59] | [94,68; 98,22] |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2011-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 708         | 623            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |             | 601            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |             | 16             |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |             |                | 2,66           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |             |                | <b>97,34</b>   |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |             |                | [96,05; 98,63] |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 517         | 456            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |             | 438            |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |             | 10             |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |             |                | 2,28           |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    |             | <b>97,72</b>   |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    |             | [96,32; 99,12] |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2012-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 734         |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 515         |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre Endpunkte   | Anzahl             |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    |             |                |                |                |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |



In Tabelle 3.6.10 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer oder sekundärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre oder sekundäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

**Tabelle 3.6.10 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation**

| EZ   | Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr   | 14. Halbjahr   | 15. Halbjahr   |                |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2005-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 206            | 189            | 157            | 131            | 116            | 107            | 100            | 95             | 74             | 70             | 66             | 60             | 57             | 53             | 47             |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 183            | 151            | 130            | 114            | 107            | 100            | 94             | 73             | 68             | 64             | 58             | 56             | 52             | 46             |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 6              | 3              | 2              | 3              | 0              | 2              | 16             | 2              | 2              | 4              | 2              | 3              | 3              | 1              |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,28           | 1,99           | 1,54           | 2,63           | 0,00           | 2,00           | 17,02          | 2,74           | 2,94           | 6,25           | 3,45           | 5,36           | 5,77           | 2,17           |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,76</b>   | <b>94,90</b>   | <b>93,44</b>   | <b>91,02</b>   | <b>91,02</b>   | <b>89,20</b>   | <b>74,02</b>   | <b>72,02</b>   | <b>69,93</b>   | <b>65,69</b>   | <b>63,46</b>   | <b>60,06</b>   | <b>56,60</b>   | <b>55,37</b>   |
|  |  | CI                 |                | [94,21; 99,31] | [91,64; 98,16] | [89,66; 97,22] | [86,45; 95,59] | [86,45; 95,59] | [84,07; 94,33] | [66,02; 82,02] | [63,77; 80,27] | [61,43; 78,43] | [56,74; 74,64] | [54,30; 72,62] | [50,62; 69,50] | [46,92; 66,28] | [45,61; 65,13] |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 178            | 169            | 143            | 119            | 106            | 100            | 92             | 89             | 76             | 65             | 59             | 56             | 56             | 55             | 52             |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 167            | 133            | 116            | 106            | 100            | 91             | 88             | 72             | 63             | 58             | 55             | 54             | 51             | 50             |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 5              | 4              | 1              | 1              | 2              | 0              | 13             | 3              | 5              | 2              | 0              | 1              | 0              | 1              |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,99           | 3,01           | 0,86           | 0,94           | 2,00           | 0,00           | 14,77          | 4,17           | 7,94           | 3,45           | 0,00           | 1,85           | 0,00           | 2,00           |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,01</b>   | <b>94,23</b>   | <b>93,44</b>   | <b>92,55</b>   | <b>90,70</b>   | <b>90,70</b>   | <b>77,30</b>   | <b>74,08</b>   | <b>68,20</b>   | <b>65,85</b>   | <b>65,85</b>   | <b>64,65</b>   | <b>64,65</b>   | <b>63,36</b>   |                |
|  | CI   |                    | [94,43; 99,59] | [90,56; 97,90] | [89,48; 97,40] | [88,27; 96,83] | [85,79; 95,61] | [85,79; 95,61] | [69,38; 85,22] | [65,69; 82,47] | [59,03; 77,37] | [56,44; 75,26] | [56,44; 75,26] | [55,12; 74,18] | [55,12; 74,18] | [53,69; 73,03] |                |
| 2005-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1230           | 1097           | 911            | 800            | 732            | 687            | 634            | 497            | 439            | 408            | 375            | 359            | 331            | 310            |                |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1065           | 891            | 788            | 719            | 673            | 614            | 487            | 430            | 401            | 370            | 355            | 321            | 307            |                |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 38             | 16             | 22             | 14             | 17             | 108            | 38             | 18             | 10             | 12             | 17             | 8              | 7              |                |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,57           | 1,80           | 2,79           | 1,95           | 2,53           | 17,59          | 7,80           | 4,19           | 2,49           | 3,24           | 4,79           | 2,49           | 2,28           |                |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,48</b>   | <b>94,76</b>   | <b>92,13</b>   | <b>90,35</b>   | <b>88,08</b>   | <b>72,86</b>   | <b>67,22</b>   | <b>64,44</b>   | <b>62,84</b>   | <b>60,81</b>   | <b>57,93</b>   | <b>56,50</b>   | <b>55,21</b>   |                |
|  |  | CI                 |                | [95,38; 97,58] | [93,40; 96,12] | [90,42; 93,84] | [88,43; 92,27] | [85,93; 90,23] | [69,70; 76,02] | [63,83; 70,61] | [60,96; 67,92] | [59,31; 66,37] | [57,21; 64,41] | [54,25; 61,61] | [52,78; 60,22] | [51,45; 58,97] |                |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1002           | 913            | 756            | 671            | 625            | 572            | 539            | 447            | 403            | 365            | 339            | 311            | 290            | 270            |                |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 876            | 738            | 660            | 613            | 561            | 517            | 429            | 388            | 356            | 332            | 302            | 287            | 260            |                |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 37             | 14             | 11             | 12             | 8              | 79             | 23             | 14             | 10             | 17             | 13             | 11             | 4              |                |
|  |  | Anteil in %        |                | 4,22           | 1,90           | 1,67           | 1,96           | 1,43           | 15,28          | 5,36           | 3,61           | 2,81           | 5,12           | 4,30           | 3,83           | 1,54           |                |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>95,82</b>   | <b>94,02</b>   | <b>92,46</b>   | <b>90,66</b>   | <b>89,38</b>   | <b>75,98</b>   | <b>71,93</b>   | <b>69,38</b>   | <b>67,45</b>   | <b>64,01</b>   | <b>61,29</b>   | <b>58,95</b>   | <b>58,04</b>   |                |                |
|  | CI   |                    | [94,50; 97,14] | [92,42; 95,62] | [90,64; 94,28] | [88,61; 92,71] | [87,18; 91,58] | [72,67; 79,29] | [68,41; 75,45] | [65,74; 73,02] | [63,72; 71,18] | [60,13; 67,89] | [57,30; 65,28] | [54,88; 63,02] | [53,94; 62,14] |                |                |
| 2006-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1450           | 1300           | 1074           | 958            | 856            | 800            | 630            | 548            | 493            | 457            | 419            | 388            | 358            |                |                |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1261           | 1053           | 931            | 834            | 763            | 605            | 534            | 480            | 453            | 413            | 384            | 351            |                |                |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 45             | 28             | 17             | 18             | 121            | 35             | 18             | 15             | 18             | 14             | 11             | 14             |                |                |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,57           | 2,66           | 1,83           | 2,16           | 15,86          | 5,79           | 3,37           | 3,13           | 3,97           | 3,39           | 2,86           | 3,99           |                |                |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,47</b>   | <b>93,91</b>   | <b>92,20</b>   | <b>90,23</b>   | <b>76,29</b>   | <b>71,92</b>   | <b>69,51</b>   | <b>67,37</b>   | <b>64,70</b>   | <b>62,53</b>   | <b>60,74</b>   | <b>58,32</b>   |                |                |
|  |  | CI                 |                | [95,46; 97,48] | [92,55; 95,27] | [90,64; 93,76] | [88,46; 92,00] | [73,56; 79,02] | [68,99; 74,85] | [66,47; 72,55] | [64,24; 70,50] | [61,46; 67,94] | [59,20; 65,86] | [57,34; 64,14] | [54,83; 61,81] |                |                |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1177           | 1052           | 894            | 792            | 725            | 670            | 558            | 499            | 450            | 415            | 376            | 346            | 307            |                |                |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1021           | 863            | 770            | 697            | 633            | 541            | 481            | 437            | 407            | 367            | 340            | 301            |                |                |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 22             | 15             | 17             | 17             | 91             | 28             | 14             | 13             | 19             | 7              | 14             | 13             |                |                |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,15           | 1,74           | 2,21           | 2,44           | 14,38          | 5,18           | 2,91           | 2,97           | 4,67           | 1,91           | 4,12           | 4,32           |                |                |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,87</b>   | <b>96,19</b>   | <b>94,09</b>   | <b>91,82</b>   | <b>79,03</b>   | <b>74,95</b>   | <b>72,78</b>   | <b>70,64</b>   | <b>67,35</b>   | <b>66,08</b>   | <b>63,37</b>   | <b>60,63</b>   |                |                |                |
|  | CI   |                    | [96,99; 98,75] | [94,98; 97,40] | [92,55; 95,63] | [89,98; 93,66] | [76,12; 81,94] | [71,82; 78,08] | [69,54; 76,02] | [67,30; 73,98] | [63,85; 70,85] | [62,52; 69,64] | [59,69; 67,05] | [56,82; 64,44] |                |                |                |
| 2006-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2049           | 1795           | 1507           | 1336           | 1231           | 972            | 838            | 754            | 698            | 631            | 584            | 536            |                |                |                |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1758           | 1452           | 1309           | 1158           | 944            | 817            | 739            | 693            | 617            | 577            | 523            |                |                |                |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 67             | 27             | 25             | 194            | 65             | 36             | 20             | 25             | 15             | 20             | 14             |                |                |                |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,81           | 1,86           | 1,91           | 16,75          | 6,89           | 4,41           | 2,71           | 3,61           | 2,43           | 3,47           | 2,68           |                |                |                |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>96,21</b>   | <b>94,45</b>   | <b>92,66</b>   | <b>77,77</b>   | <b>72,47</b>   | <b>69,31</b>   | <b>67,46</b>   | <b>65,03</b>   | <b>63,48</b>   | <b>61,29</b>   | <b>59,65</b>   |                |                |                |
|  |  | CI                 |                | [95,32; 97,10] | [93,36; 95,54] | [91,38; 93,94] | [75,57; 79,97] | [70,07; 74,87] | [66,81; 71,81] | [64,89; 70,03] | [62,39; 67,67] | [60,78; 66,18] | [58,52; 64,06] | [56,83; 62,47] |                |                |                |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1625           | 1446           | 1255           | 1155           | 1056           | 855            | 729            | 655            | 591            | 552            | 504            | 464            |                |                |                |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1410           | 1226           | 1125           | 993            | 819            | 705            | 636            | 584            | 542            | 496            | 458            |                |                |                |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 38             | 19             | 25             | 146            | 54             | 25             | 24             | 12             | 19             | 16             | 10             |                |                |                |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,70           | 1,55           | 2,22           | 14,70          | 6,59           | 3,55           | 3,77           | 2,05           | 3,51           | 3,23           | 2,18           |                |                |                |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,33</b>   | <b>95,84</b>   | <b>93,72</b>   | <b>80,41</b>   | <b>75,15</b>   | <b>72,50</b>   | <b>69,81</b>   | <b>68,38</b>   | <b>66,01</b>   | <b>63,90</b>   | <b>62,50</b>   |                |                |                |                |
|  | CI   |                    | [96,49; 98,17] | [94,78; 96,90] | [92,40; 95,04] | [78,11; 82,71] | [72,61; 77,69] | [69,84; 75,16] | [67,04; 72,58] | [65,55; 71,21] | [63,09; 68,93] | [60,89; 66,91] | [59,44; 65,56] |                |                |                |                |

| EZ   | Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr    | 10. Halbjahr   | 11. Halbjahr   | 12. Halbjahr   | 13. Halbjahr | 14. Halbjahr | 15. Halbjahr |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2007-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 4278           | 3823           | 3355           | 3069           | 2500           | 2191           | 2000           | 1822           | 1697           | 1548           | 1449           |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 3724           | 3293           | 2937           | 2428           | 2146           | 1963           | 1792           | 1677           | 1521           | 1415           |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 108            | 92             | 401            | 154            | 85             | 68             | 56             | 85             | 48             | 41             |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,90           | 2,79           | 13,65          | 6,34           | 3,96           | 3,46           | 3,13           | 5,07           | 3,16           | 2,90           |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>97,13</b>   | <b>94,44</b>   | <b>81,93</b>   | <b>76,83</b>   | <b>73,81</b>   | <b>71,28</b>   | <b>69,07</b>   | <b>65,59</b>   | <b>63,54</b>   | <b>61,70</b>   |              |              |              |
|  |  | CI                 |                | [96,60; 97,66] | [93,69; 95,19] | [80,62; 83,24] | [75,37; 78,29] | [72,27; 75,35] | [69,68; 72,88] | [67,42; 70,72] | [63,87; 67,31] | [61,78; 65,30] | [59,90; 63,50] |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 3574           | 3265           | 2894           | 2670           | 2150           | 1925           | 1753           | 1612           | 1485           | 1376           | 1284           |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 3194           | 2828           | 2536           | 2087           | 1872           | 1727           | 1575           | 1454           | 1345           | 1253           |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 82             | 47             | 358            | 103            | 67             | 63             | 53             | 55             | 39             | 46             |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,57           | 1,66           | 14,12          | 4,94           | 3,58           | 3,65           | 3,37           | 3,78           | 2,90           | 3,67           |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,46</b>   | <b>95,86</b>   | <b>82,74</b>   | <b>78,73</b>   | <b>75,96</b>   | <b>73,20</b>   | <b>70,77</b>   | <b>68,12</b>   | <b>66,16</b>   | <b>63,73</b>   |                |              |              |              |
|  | CI   |                    | [96,92; 98,00] | [95,16; 96,56] | [81,34; 84,14] | [77,20; 80,26] | [74,35; 77,57] | [71,51; 74,89] | [69,01; 72,53] | [66,29; 69,95] | [64,28; 68,04] | [61,80; 65,66] |                |              |              |              |
| 2007-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 3157           | 2766           | 2431           | 1949           | 1677           | 1481           | 1335           | 1229           | 1133           | 1047           |                |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 2676           | 2303           | 1877           | 1629           | 1437           | 1298           | 1195           | 1100           | 1020           |                |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 63             | 276            | 99             | 74             | 53             | 32             | 45             | 31             | 33             |                |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 2,35           | 11,98          | 5,27           | 4,54           | 3,69           | 2,47           | 3,77           | 2,82           | 3,24           |                |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>97,69</b>   | <b>86,32</b>   | <b>81,81</b>   | <b>78,13</b>   | <b>75,28</b>   | <b>73,44</b>   | <b>70,70</b>   | <b>68,73</b>   | <b>66,50</b>   |                |              |              |              |
|  |  | CI                 |                | [97,13; 98,25] | [84,96; 87,68] | [80,26; 83,36] | [76,44; 79,82] | [73,48; 77,08] | [71,58; 75,30] | [68,74; 72,66] | [66,71; 70,75] | [64,41; 68,59] |                |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2529           | 2243           | 1998           | 1620           | 1389           | 1252           | 1139           | 1061           | 963            | 886            |                |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 2176           | 1863           | 1548           | 1348           | 1223           | 1111           | 1036           | 936            | 861            |                |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 66             | 213            | 75             | 50             | 33             | 34             | 45             | 36             | 28             |                |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 3,03           | 11,43          | 4,84           | 3,71           | 2,70           | 3,06           | 4,34           | 3,85           | 3,25           |                |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>97,00</b>   | <b>86,30</b>   | <b>82,19</b>   | <b>79,18</b>   | <b>77,07</b>   | <b>74,74</b>   | <b>71,53</b>   | <b>68,80</b>   | <b>66,57</b>   |                |                |              |              |              |
|  | CI   |                    | [96,29; 97,71] | [84,80; 87,80] | [80,50; 83,88] | [77,36; 81,00] | [75,16; 78,98] | [72,73; 76,75] | [69,40; 73,66] | [66,57; 71,03] | [64,27; 68,87] |                |                |              |              |              |
| 2008-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 3014           | 2644           | 2098           | 1736           | 1512           | 1346           | 1202           | 1092           | 986            |                |                |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 2491           | 1970           | 1661           | 1456           | 1295           | 1163           | 1061           | 956            |                |                |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 300            | 126            | 72             | 59             | 44             | 42             | 54             | 22             |                |                |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 12,04          | 6,40           | 4,33           | 4,05           | 3,40           | 3,61           | 5,09           | 2,30           |                |                |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>88,36</b>   | <b>82,82</b>   | <b>79,30</b>   | <b>76,14</b>   | <b>73,59</b>   | <b>70,98</b>   | <b>67,40</b>   | <b>65,85</b>   |                |                |              |              |              |
|  |  | CI                 |                | [87,12; 89,60] | [81,33; 84,31] | [77,67; 80,93] | [74,38; 77,90] | [71,74; 75,44] | [69,03; 72,93] | [65,33; 69,47] | [63,73; 67,97] |                |                |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2278           | 2032           | 1604           | 1365           | 1198           | 1060           | 963            | 871            | 801            |                |                |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1932           | 1529           | 1327           | 1168           | 1025           | 939            | 844            | 767            |                |                |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 222            | 75             | 49             | 51             | 28             | 33             | 26             | 25             |                |                |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 11,49          | 4,91           | 3,69           | 4,37           | 2,73           | 3,51           | 3,08           | 3,26           |                |                |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>88,84</b>   | <b>84,52</b>   | <b>81,43</b>   | <b>77,91</b>   | <b>75,81</b>   | <b>73,16</b>   | <b>70,91</b>   | <b>68,60</b>   |                |                |                |              |              |              |
|  | CI   |                    | [87,46; 90,22] | [82,89; 86,15] | [79,65; 83,21] | [75,96; 79,86] | [73,76; 77,86] | [71,00; 75,32] | [68,65; 73,17] | [66,24; 70,96] |                |                |                |              |              |              |
| 2008-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2093           | 1782           | 1382           | 1165           | 1025           | 907            | 832            | 754            |                |                |                |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1698           | 1320           | 1120           | 994            | 873            | 793            | 724            |                |                |                |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 171            | 65             | 47             | 38             | 27             | 26             | 20             |                |                |                |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 10,07          | 4,92           | 4,20           | 3,82           | 3,09           | 3,28           | 2,76           |                |                |                |              |              |              |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>90,08</b>   | <b>85,69</b>   | <b>82,15</b>   | <b>79,03</b>   | <b>76,60</b>   | <b>74,12</b>   | <b>72,07</b>   |                |                |                |              |              |              |
|  |  | CI                 |                | [88,67; 91,49] | [83,99; 87,39] | [80,24; 84,06] | [76,95; 81,11] | [74,40; 78,80] | [71,79; 76,45] | [69,64; 74,50] |                |                |                |              |              |              |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1583           | 1381           | 1104           | 929            | 802            | 717            | 654            | 596            |                |                |                |              |              |              |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1319           | 1067           | 887            | 769            | 686            | 638            | 571            |                |                |                |              |              |              |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 107            | 45             | 40             | 25             | 23             | 17             | 18             |                |                |                |              |              |              |
|  |  | Anteil in %        |                | 8,11           | 4,22           | 4,51           | 3,25           | 3,35           | 2,66           | 3,15           |                |                |                |              |              |              |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>92,02</b>   | <b>88,17</b>   | <b>84,26</b>   | <b>81,59</b>   | <b>78,91</b>   | <b>76,82</b>   | <b>74,40</b>   |                |                |                |                |              |              |              |
|  | CI   |                    | [90,57; 93,47] | [86,40; 89,94] | [82,19; 86,33] | [79,34; 83,84] | [76,48; 81,34] | [74,26; 79,38] | [71,69; 77,11] |                |                |                |                |              |              |              |

| EZ   | Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr    | 6. Halbjahr    | 7. Halbjahr    | 8. Halbjahr    | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2009-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2357           | 2046           | 1669           | 1444           | 1261           | 1122           | 1006           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1963           | 1605           | 1400           | 1222           | 1089           | 971            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 132            | 66             | 63             | 50             | 43             | 35             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 6,72           | 4,11           | 4,50           | 4,09           | 3,95           | 3,60           |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>93,39</b>   | <b>89,61</b>   | <b>85,61</b>   | <b>82,15</b>   | <b>78,94</b>   | <b>76,09</b>   |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |                | [92,30; 94,48] | [88,23; 90,99] | [83,98; 87,24] | [80,33; 83,97] | [76,95; 80,93] | [73,96; 78,22] |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1839           | 1570           | 1254           | 1071           | 961            | 851            | 779            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1510           | 1202           | 1036           | 919            | 815            | 742            |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 120            | 54             | 26             | 33             | 15             | 24             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 7,95           | 4,49           | 2,51           | 3,59           | 1,84           | 3,23           |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>92,17</b>   | <b>88,08</b>   | <b>85,88</b>   | <b>82,84</b>   | <b>81,32</b>   | <b>78,69</b>   |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    | [90,82; 93,52] | [86,41; 89,75] | [84,05; 87,71] | [80,80; 84,88] | [79,18; 83,46] | [76,37; 81,01] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2009-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2030           | 1695           | 1329           | 1107           | 954            | 856            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1637           | 1274           | 1063           | 908            | 820            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 133            | 66             | 41             | 31             | 35             |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 8,12           | 5,18           | 3,86           | 3,41           | 4,27           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>91,97</b>   | <b>87,27</b>   | <b>83,96</b>   | <b>81,12</b>   | <b>77,66</b>   |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |                | [90,66; 93,28] | [85,61; 88,93] | [82,08; 85,84] | [79,05; 83,19] | [75,38; 79,94] |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1628           | 1399           | 1135           | 990            | 867            | 786            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1346           | 1086           | 956            | 837            | 756            |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 103            | 40             | 35             | 27             | 23             |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 7,65           | 3,68           | 3,66           | 3,23           | 3,04           |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>92,44</b>   | <b>89,08</b>   | <b>85,84</b>   | <b>83,09</b>   | <b>80,56</b>   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    | [91,04; 93,84] | [87,38; 90,78] | [83,90; 87,78] | [80,95; 85,23] | [78,25; 82,87] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2010-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2208           | 1852           | 1479           | 1269           | 1133           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1788           | 1429           | 1234           | 1101           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 143            | 73             | 38             | 33             |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 8,00           | 5,11           | 3,08           | 3,00           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>92,08</b>   | <b>87,43</b>   | <b>84,77</b>   | <b>82,23</b>   |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |                | [90,83; 93,33] | [85,86; 89,00] | [83,03; 86,51] | [80,34; 84,12] |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1662           | 1411           | 1136           | 966            | 856            |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1361           | 1101           | 933            | 823            |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 90             | 61             | 30             | 27             |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 6,61           | 5,54           | 3,22           | 3,28           |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>93,47</b>   | <b>88,35</b>   | <b>85,53</b>   | <b>82,72</b>   |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    | [92,17; 94,77] | [86,59; 90,11] | [83,56; 87,50] | [80,55; 84,89] |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2010-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2269           | 1915           | 1516           | 1301           |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1857           | 1458           | 1244           |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 136            | 78             | 56             |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 7,32           | 5,35           | 4,50           |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>92,75</b>   | <b>87,83</b>   | <b>83,88</b>   |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |                | [91,58; 93,92] | [86,29; 89,37] | [82,10; 85,66] |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1740           | 1524           | 1216           | 1031           |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1480           | 1172           | 994            |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 124            | 45             | 36             |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 8,38           | 3,84           | 3,62           |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>91,73</b>   | <b>88,24</b>   | <b>85,05</b>   |                |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    | [90,34; 93,12] | [86,57; 89,91] | [83,14; 86,96] |                |                |                |                |             |               |               |               |               |               |               |  |

| EZ   | Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED | Beitritts-halbjahr | 2. Halbjahr    | 3. Halbjahr    | 4. Halbjahr    | 5. Halbjahr | 6. Halbjahr | 7. Halbjahr | 8. Halbjahr | 9. Halbjahr | 10. Halb-jahr | 11. Halb-jahr | 12. Halb-jahr | 13. Halb-jahr | 14. Halb-jahr | 15. Halb-jahr |  |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2011-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2302           | 1952           | 1539           |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1887           | 1480           |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 138            | 75             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 7,31           | 5,07           |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>92,74</b>   | <b>88,04</b>   |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |                | [91,57; 93,91] | [86,52; 89,56] |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1798           | 1570           | 1268           |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1532           | 1230           |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 104            | 45             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 6,79           | 3,66           |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>93,26</b>   | <b>89,84</b>   |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    | [92,01; 94,51] | [88,29; 91,39] |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2011-2   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2210           | 1882           |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1792           |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 138            |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 7,70           |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                | <b>92,30</b>   |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |                | [91,07; 93,53] |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1689           | 1453           |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                | 1384           |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                | 116            |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                | 8,38           |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    | <b>91,62</b>   |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    | [90,16; 93,08] |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| 2012-1   | <b>männliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 2557           |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>   | <b>Rate</b>        |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | CI                 |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | <b>weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko</b>  | Anzahl             | 1909           |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | auswertbar   | Anzahl             |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte  | Anzahl             |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  |  | Anteil in %        |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b> | <b>Rate</b>  |                    |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |
|  | CI   |                    |                |                |                |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |  |

## Anhang A: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Abschlussbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um drei Arten von Datensätzen, die jeweils für einen Patienten erhoben wurden:


- Patientenmerkmale
- Medizinische Daten
- Ökonomische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung A.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Diabetes mellitus Typ 1 von AOK und Knappschaft.

### A.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung eines Patienten in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten.

Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP DM1 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP



Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) ab Juli 2008 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen **medizinischen Behandlungsdaten** sowie die **personenbezogenen Merkmale** enthält.<sup>5</sup> Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Diabetes mellitus Typ 1 finden die Satzartbeschreibungen SA400EA/FA und SA400ED/FD<sup>6</sup> Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA400ED/SA400FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 400EA/FA übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2008-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA400ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jedem Patienten vorhandenen **Patientenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patienten fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 400 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass ein Patient in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für ihn eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt. Sobald dem Evaluator die Patientenmerkmale vorliegen, zieht er eine Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit der Programmteilnehmer für die **Evaluation** der ökonomischen Daten. Der Stichprobenumfang beträgt dabei jeweils 10 Prozent der Ist-Größe einer Kohorte, jedoch mindestens 100 und höchstens 500 Patienten. Falls an einem Programm zwischen 10 und 100 Patienten teilnahmen, wird eine Vollerhebung durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als 10 Teilnehmer umfasst, da in diesem Fall aus Gründen der Wahrung der Anonymität auf eine Auswertung verzichtet wird. Der Evaluator übermittelt der Krankenkasse eine Liste mit den Pseudonymen der Stichprobe. Die Kasse spielt diesen Pseudonymen die mit der medizinischen Behandlung verbundenen Leistungsausgaben zu und erstellt daraus einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 400 OD. Ferner liefert sie Angaben zu den Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. („**ökonomische Daten**“).

Dieser im Rahmen der Evaluation stattfindende Datenfluss ist schematisch in Abbildung A.1.1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Ab der Kohorte 2008-2 wurden die Auswertungen darüber hinaus um die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung zur Veränderung der subjektiven Lebensqualität ergänzt. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen.

Befragt wird grundsätzlich die im Berichtsteil II beschriebene Stichprobe von Patienten. Die Kasse ermittelt dazu, für die vom Evaluator übermittelte Pseudonymliste, die zugehörigen Adressdaten und versendet an diese Patienten den Fragebogen. Die Patienten senden die ausgefüllten Fragebögen direkt an den Evaluator zurück, wo sie ausgewertet werden.

Für die Indikation DM1 ist zu beachten, dass in den SF36-Auswertungen im Gegensatz zu den OD-Auswertungen keine Patienten < 18 Jahre enthalten sein dürfen. Für die SF36-Auswertungen müssen also Kinder aus der – ansonsten identischen – Stichprobe ausgeschlossen werden.

Damit die Fallzahlen für die SF36-Auswertungen nicht zu gering ausfallen, wird die gemeinsam zu ziehende Stichprobe in einem ersten Schritt um einen Korrekturfaktor erhöht, der sich in Abhängigkeit von dem bundesweiten Kinderanteil ergibt. Das heißt: Alle oben beschriebenen Grenzen für die Stichprobenziehung werden um den bundesdurchschnittlichen Anteil der Kinder in allen DM1-DMPs angehoben. Im Ergebnis sind die so gezogenen DM1-OD-Stichproben größer als bei den Indikationen, bei denen keine Versicherten unter 18 Jahre am DMP teilnehmen.

In einem zweiten Schritt wird die SF36-Stichprobe aus der um den Korrekturfaktor erhöhten OD-Stichprobe abgeleitet, in dem die Patienten < 18 ausgeschlossen werden. Dies führt dazu, dass die SF36-Stichproben im Bundesdurchschnitt den vorgegebenen Größenanforderungen, wie sie im vorherigen Absatz beschrieben sind, entsprechen. Um diesen bundesweiten Kinderanteil zu ermitteln, bestimmen zunächst beide an der DMP-Evaluation beteiligten Institute den Kinderanteil - für die jeweils relevante Kohorte - in ihrem Datenbestand. In Abstimmung zwischen beiden Instituten wird daraus anschließend der bundesweite Kinderanteil ermittelt und auf dessen Basis der Korrekturfaktor berechnet.<sup>7</sup>

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmern“ und „Patienten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientenbezogenen Auswertung würde hingegen der Patient weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Der Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschieden werden mussten und sich in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP ein Teilnehmer der Kohorte 2006-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit Sicherheit geschlossen werden, dass er sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat der betreffende Patient „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patienten dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergibt sich eine Besonderheit. Die Patienten werden verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen.

<sup>5</sup> Bis zum 30.06.2008 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patienten bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

<sup>6</sup> Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „A“ (alt) und „D“ wird unterschieden, ob sich die Dokumentation auf die Zeit vor oder nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen bezieht.

<sup>7</sup> Als Kinder werden analog zur sonstigen Vorgehensweise diejenigen Patienten betrachtet, die zum 1.1. des SF-36-Versandjahres (aktuell also 1.1.2012) noch keine 18 vollendeten Lebensjahre aufweisen konnten. Berücksichtigt werden alle PM-Datensätze, die zum Stichtag vorliegen. Liegen die Datensätze von einzelnen Kassen noch nicht oder noch nicht endgültig vor, ist dies für die Quotenermittlung unerheblich. Bei der Bildung des Korrekturfaktors wird der Anteil der Kinder mit 4 Nachkommastellen angegeben. Zum Beispiel 9,53 Prozent Kinder -> Korrekturfaktor  $1/(1-0,0953) = 1/0,9047$ . Bei Ermittlung der korrigierten Stichprobenfallzahlen wird auf Ganzzahlige aufgerundet.

Beispiel: Bei 15 Prozent Kinderanteil müsste demnach die Stichprobenquote 10/0,85 auf 11,76 Prozent angehoben werden, die untere Grenze auf 118 (=100/0,85) und die obere Grenze auf 588 (=500/0,85).

In einem ersten Schritt wird ermittelt, wie viele Patienten ohne Deckelung zu befragen wären. Die ungedeckelte Fallzahl ergibt sich als: Anzahl der Kohortenmitglieder \* 10 Prozent \* Korrekturfaktor. Liegt die ungedeckelte Fallzahl unterhalb der korrigierten unteren Grenze (=100\*Korrekturfaktor), wird die Stichprobenfallzahl auf die korrigierte Untergrenze angehoben. Umfasst die Kohorte weniger oder gleich viel Patienten wie die korrigierte Untergrenze, erfolgt eine Vollerhebung. Liegt die ungedeckelte Fallzahl oberhalb der korrigierten oberen Grenze (=500\*Korrekturfaktor), wird die Stichprobenfallzahl auf die korrigierte Obergrenze abgesenkt.



## A.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung der Datenverarbeitung kam es zu Abweichungen bei der erwarteten Datenqualität. Diese Abweichungen traten insbesondere zu Beginn der Programmlaufzeit, z.B. aufgrund der allgemeinen Anlaufschwierigkeiten, auf. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Rücklaufkontrolle (OD-Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf (PM-Datensätze)

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.<sup>8</sup> Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln und den medizinischen Plausibilitätskriterien des BVA (siehe Tabelle 0.1.2) folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen kein Regelverstoß vorlag und die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen Regelverstöße vorlagen oder die gemäß Rechenregeln nicht auswertbar waren, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden **„Komplett-Dubletten“** aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden **„Auswertungsdubletten“** aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze, Ökonomische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung (**„Matching“**) von Personenmerkmalen, medizinischen Daten und ökonomischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patienten ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei den ökonomischen Datensätzen war eine Überprüfung auf Verknüpfbarkeit entbehrlich. Da sie durch das Zuspielen der Leistungsausgaben zu denjenigen Pseudonymnummern generiert wurden, die in einer Stichprobe aus den PM-Datensätzen gezogen worden waren, war für die zugespielten Leistungsausgaben eine Verknüpfbarkeit mit den PM-Datensätzen in jedem Fall gegeben. Dennoch konnten auch hier drei Arten von Problemfällen auftreten:

- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen keine Leistungsausgaben zugespielt worden waren
- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen die Leistungsausgaben doppelt und mit teils unterschiedlichen Werten zugespielt worden waren
- In der Stichprobe nicht gezogene Pseudonymnummern, die dennoch um Leistungsausgaben ergänzt geliefert wurden

Im Rahmen einer **Rücklaufkontrolle** wurde daher ein Abgleich vorgenommen zwischen denjenigen Pseudonymnummern, die der Evaluator in der Stichprobe gezogen hatte, und denjenigen Pseudonymnummern, für welche die Krankenkasse die zugehörigen Leistungsausgaben zugespielt hatte. Damit wurden – differenziert nach Kassen, Eintrittskohorte und Antragsregion – die Problemfälle identifiziert. Da es sich bei der letztgenannten Art von Problemfällen um nicht auswertungsrelevante Informationen handelt, wurden die entsprechenden Datensätze bei der Auswertung ignoriert. Analog wurde vorgegangen, wenn den Pseudonymnummern Leistungsausgaben für Halbjahre zugespielt wurden, in denen die entsprechenden Patienten nicht mehr Programmteilnehmer waren.

Dass die Krankenkassen nicht allen gezogenen Pseudonymnummern die Leistungsausgaben für die erwarteten Berichtshalbjahre zuspielten, lag zum Teil daran, dass die entsprechenden Patienten rückwirkend aus dem Programm ausgeschrieben worden waren, diese Information zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung aber noch nicht vorlag. Lagen andere Gründe dafür vor, wurden die Daten ggf. von Kassen ergänzt und eine Neulieferung der überarbeiteten ökonomischen Datensätze an den Evaluator vorgenommen. Lagen in einer Datenlieferung für eine Pseudonymnummer zwei oder mehr ökonomische Datensätze mit unterschiedlichen Leistungsausgaben vor, floss der ökonomisch ungünstigste Wert in die Evaluation ein.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine **Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf** vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis sind die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (bis zum Berichtshalbjahr 2012-1)
- Sie werden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung werden auch dann berücksichtigt, wenn sie sich auf bereits veröffentlichte Kohorten bzw. Halbjahre beziehen.

Der letzte Punkt stellt eine Änderung gegenüber den bisherigen Berichten dar, die gemäß der Abstimmung mit dem BVA zum 30.09.2013 sowohl für die medizinischen als auch für die stichprobenbasierten Auswertungen umzusetzen war. Im Kern wird dabei zugunsten einer aktuelleren Datenbasis die Reproduzierbarkeit der Berichte aufgehoben. Durch die rückwirkende Bereinigung der Datenbasis kann es im Vergleich zu den bisherigen Berichten insbesondere zu folgenden Änderungen kommen: Die Restkohorte kann durch die rückwirkende Bereinigung im Zeitverlauf stärker absinken als in bisherigen Berichten. Da diese Bereinigung im Wesentlichen Patienten ohne medizinische Dokumentation betrifft, ist in der Regel jedoch mit keinen oder nur geringen Auswirkungen auf die **Anzahl der auswertbaren Patienten und ihre Auswertungsergebnisse** (Durchschnittswerte, Patientenanteile) zu rechnen. Dagegen ist davon auszugehen, dass der **Anteil** der auswertbaren Patienten an allen Patienten steigt, wenn die Restkohorte als Bezugsgröße kleiner ausfällt als in bisherigen Berichten. Analog ist in diesem Fall auch ein Anstieg der Anteilswerte aus anderen Auswertungen zu erwarten, deren Bezugsgröße die Restkohorte darstellt.

<sup>8</sup> Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

### A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für einen DMP-Teilnehmer für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kam es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu Abweichungen von diesem Schema. Im Folgenden wird beschrieben, wie bei diesen Sonderfällen in der Auswertung vorgegangen wurde:

- **1. Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**  
Liegen für das Beitrittsjahr eines Patienten eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führt dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugerechnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle A.3.1.
- **2. Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**  
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **3. Mehrere Folgedokumentationen in einem Halbjahr**  
Lagen für ein Halbjahr mehrere Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle A.3.1 Anwendung.
- **4. Mehrere Erstdokumentationen im Beitrittsjahr**  
Lagen für das Beitrittsjahr zwei oder mehr Erstdokumentationen vor, wurde grundsätzlich diejenige mit dem frühesten Unterschriftsdatum des Arztes herangezogen. Sofern zwei oder mehr Erstdokumentationen mit diesem Datum vorliegen, werden die auszuwertenden medizinischen Werte gemäß Tabelle A.3.1 festgelegt.
- **5. Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später**  
Lagen Erstdokumentationen für Halbjahre nach dem Beitrittsjahr vor, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die beiden letztgenannten Punkte wurden im Herbst 2010 neu in die Berechnungsvorschriften aufgenommen.<sup>9</sup> In den Fällen, in denen die Datenlage widersprüchlich ist, kann es dadurch zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen. Da in einer chronologisch ersten Erstdokumentation nicht zwangsläufig alle Parameter gleich dokumentiert sind, wie in etwaigen weiteren Erstdokumentationen im Beitrittsjahr, kann es aufgrund der Neuregelung in Punkt 4 zu einer Änderung medizinischer Parameter im *Beitrittsjahr* und infolgedessen auch zu Änderungen der Basis von kollektivbasierten Auswertungen kommen. Die Neuregelung unter Punkt 5 kann zu einer Änderung medizinischer Parameter in den *Folgehalbjahren* führen.<sup>10</sup> Darüber hinaus wurden die Berechnungsvorschriften bezüglich Tabelle A.3.1 dahingehend geändert, dass bei den Laborparametern/Messwerten nicht mehr der letzte chronologisch verfügbare, sondern der letzte *plausible* Wert zu verwenden ist. Dadurch kann es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen.

<sup>9</sup> Zuvor war in den Berechnungsvorschriften des BVA nur definiert, wie bei Sonderfällen bezüglich der Folgedokumentationen zu verfahren ist (mehrerer Folgedokumentationen in einem Halbjahr, Folgedokumentationen im „falschen“ Halbjahr). Die Handhabung von Sonderfällen bei den Erstdokumentationen war nicht geregelt. Sie wurden bislang weitestgehend analog zu den Sonderfällen bei den Folgedokumentationen in die Auswertung einbezogen.

<sup>10</sup> Da medizinische Informationen aus Erstdokumentationen in den Folgehalbjahren explizit zu ignorieren sind, entfällt nun in den betroffenen Fällen und Halbjahren ein medizinischer Wert. Sofern im betroffenen Halbjahr aus einer oder mehreren Folgedokumentationen abweichende Werte vorliegen, kann es – je nach Auswahl gemäß Tabelle A.3.1 – zu veränderten medizinischen Parametern führen. Sofern im betroffenen Halbjahr keine Folgedokumentationen vorliegen, kommt es durch die Neuregelung zu fehlenden Angaben.

**Tabelle A.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr**

| Parameter                                 | Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr  |
|---|--|
| BMI                                       | Jeweils <b>letzter</b> vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres  |
| Definition „Raucher“                      | Für das betreffende Halbjahr als „Raucher“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde  |
| Hypertonus                                | Jeweils <b>letztes</b> vorliegendes plausibles <b>Blutdruck-Wert-Paar</b> des Auswertungshalbjahres*   |
| HbA1c                                     | Jeweils <b>letzter</b> vorliegender plausibler HbA1c-Wert des Auswertungshalbjahres*   |
| Serum-Kreatinin und GFR                   | Jeweils <b>letzter</b> vorliegender plausibler Kreatinin-Wert des Auswertungshalbjahres*   |
| Medikation                                | Jeweils <b>letzter</b> vorliegender Wert des Auswertungshalbjahres**   |
| Empfohlene Diabetes-Schulung              | Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“). |
| Empfohlene Hypertonie-Schulung            | Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“). |
| Erblindung                                | als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde  |
| Nephropathie                              | als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde  |
| Path. Albuminausscheidung                 | als „untersucht“ zu werten, wenn in mindestens einer Dokumentation „ja“ oder „nein“ angegeben wurde***   |
| Diabetischer Fuß (Wagner/Armstrong)       | Jeweils die höchste (pathologischste) dokumentierte Kategorie für Wagner und Armstrong ist zu werten (s.u.)****  |
| Amputationen                              | als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde  |
| Herzinfarkt                               | als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde  |
| Schlaganfall                              | als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde  |
| Nierenersatztherapie                      | als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde  |
| proliferative Retinopathie                | als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde  |
| Ophthalmologische Netzhautuntersuchung*** | als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde***   |

\* Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit plausiblen Angaben vorliegen, wird der ungünstigste (höchste) Wert verwendet.

\*\* Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit Angaben zur Medikation vorliegen, sind alle Informationen zu verwenden. Bei Widersprüchen (z.B. Medikament X ja und nein) ist von der Anwendung des Medikamentes auszugehen.

\*\*\* Diese Parameter können halbjährlich pro Folgedokumentation dokumentiert werden, sie werden aber nicht halbjährlich sondern jährlich ausgewertet, so dass immer zwei aufeinanderfolgende Halbjahre ein Berichtsjahr ergeben. Berichtsjahre sind dabei nicht gleichzusetzen mit Kalenderjahren.

\*\*\*\* DFS (Wagner/Armstrong): Beim Vorliegen mehrerer FD ist aus allen vorliegenden FD das Maximum für das Wagner-Stadium UND das Maximum für das Armstrong-Stadium zu werten, unabhängig davon, aus welcher FD die beiden höchsten Angaben entstammen. Dadurch wird sichergestellt, dass für beide Angaben (Wagner und Armstrong) in einem Halbjahr die jeweils höchste dokumentierte Kategorie in die Auswertung einfließt. Laut Ausfüllanleitungen zu SA400EA/FA und SA400ED/FD sind KEINE Angaben zum DFS für Kinder unter 18 Jahren zu machen. Sofern dennoch in den Daten der Datenstellen Angaben bei Kindern enthalten sein sollten, werden diese Angaben für die Evaluation nicht berücksichtigt (auf „missing“ gesetzt).

## Anhang B: Glossar

**ACE-Hemmer** sind Hemmstoffe (Inhibitoren) des Angiotensin-konvertierenden Enzyms (Angiotensin Converting Enzyme = ACE)

**Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung)** – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

**Antragsregion** – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

**arithmetisches Mittel** – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

**Armstrong-Klassen** – Die Armstrong-Klassen werden in der Beschreibung des diabetischen Fußsyndroms ergänzend zu den Wagner-Stadien verwendet. Armstrong-Stadium A: Keine zusätzliche Komplikation; Stadium B: Mit Infektion (Besiedlung mit Krankheitserregern); Stadium C: Mit Ischämie (Minderdurchblutung); Stadium D: mit Ischämie und Infektion.

**auswertbare Patienten** – Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

**Auswertungs(halb)jahr** – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmer erfolgen.

**Beitritts(halb)jahr** – Kalenderhalbjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

**Bluthochdruck** – Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

**BMI (Body-Mass-Index)** – Verhältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts, berechnet durch Körpergewicht in kg dividiert durch Körpergröße in m zum Quadrat.

**Body-Mass-Index** – siehe BMI

**CI (confidence interval)** – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

**diastolischer Blutdruck** – Der sich während der Erschlaffung der Herzkammer (Diastole) ergebende niedrigste Punkt der Blutdruckkurve (auch als unterer Blutdruckwert bezeichnet). Da dieser Druck während des größten Teils des Herzzyklus auf den Gefäßwänden lastet, ist er für die Langzeitprognose bedeutend.

**Diabetes mellitus** – Diabetes mellitus - Zuckerkrankheit, die häufigste endokrine Störung. Es wird vor allem zwischen den beiden wichtigsten Gruppen, dem Typ 1 und dem Typ 2 unterschieden. Allen Typen ist ein absoluter oder relativer Mangel an Insulin gemeinsam. Gefürchtet sind vor allem die Spätfolgen des Diabetes, die Makro- und Mikroangiopathie sowie die Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven.

**DMP (Disease-Management-Programm[e])** – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

**ED** – siehe Erstdokumentation

**Erstdokumentation** – Mit der Einschreibung des Patienten in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

**Erstmanifestation** – Erstmaliges Erkennbarwerden z.B. einer Erkrankung oder einer Erbanlage.

**EZ** – Eintrittszeitpunkt bzw. Halbjahr, in das der Programmeintritt fiel.

**FD** – siehe Folgedokumentation

**Folgedokumentation** – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

**Fußstatus, auffälliger** – Unter einem „auffälligen Fußstatus“ werden gefäß- (angiologische), nerven- (neurologische) und/oder knochen- bzw. gelenkbedingte (osteoarthropathische) Auffälligkeiten verstanden. Die Spätkomplikation diabetischer Fuß kann sich in Form schmerzloser Geschwüre (Ulzera) oder sogar Gewebstod (Nekrose, diabetische Gangrän) manifestieren. Liegt eine Polyneuropathie vor, so sind die Füße durch unbemerkte Verletzungen besonders gefährdet. Bereits kleine Verletzungen, bei der Fußpflege oder durch Druck der Schuhe zugezogen, können sich entzünden und damit den Fuß gefährden. Veränderungen können mittels der Klassifikation nach Wagner/Armstrong klassifiziert werden.

**Fußsyndrom** – Das diabetische Fußsyndrom oder umgangssprachlich auch der "diabetische Fuß" steht für einen Komplex von nervlich (neuropathischen) und/oder gefäßbedingten (angio-pathischen) Symptomen wie Infektionen, Geschwürbildungen (Ulzerationen) und/oder Destruktionen tiefen Gewebes (Knochen, Knorpel, Sehnen) der unteren Extremitäten als Folge eines Diabetes mellitus. Die Schädigungen werden u.a. anhand der Klassifikation nach Wagner klassifiziert.

**Glomeruläre Filtrationsrate** - Die über eine Million Nierenkörperchen oder Glomeruli sind die kleinsten Funktionseinheiten der Niere mit einer wichtigen Filterfunktion. Die Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) gibt das Gesamtvolumen des Primärharns an, das von allen Glomeruli beider Nieren gefiltert wird. Dies sind bei einem Menschen etwa 120 Milliliter pro Minute bzw. etwa 180 Liter pro Tag.

**Glibenclamid** – Arzneimittel zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus, das zur Gruppe der Sulfonylharnstoffe gehört. Glibenclamid fördert die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. B-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

**Glukosidase** – Die Kohlenhydratspaltung erfolgt durch eine Reihe von Enzymen (Glucosidasen) im Magen-Darm-Trakt. Diese Enzyme werden durch eine Gruppe von oralen Antidiabetika, sog. Glukosidase-Hemmer gehemmt, wodurch sich die Resorption von Kohlenhydraten verlangsamt und dadurch der Blutzuckeranstieg nach Nahrungsaufnahme (postprandial) geglättet wird.

**Häusliche Krankenpflege** – In der Wohnung der Patienten erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungspflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

**Hemmer** – siehe Inhibitoren

**HbA1c** – Ein Derivat aus der Gruppe des sog. Glykohämoglobins. In roten Blutkörperchen binden sich Zuckermoleküle (Glukose) an die Moleküle des Blutfarbstoffs (Hämoglobin). Der Anteil des HbA1c am Gesamthämoglobin bei Gesunden beträgt 4-6. Mit steigendem Blutzuckerspiegel steigt sein Anteil und bleibt bis zu acht Wochen lang erhöht, auch wenn der Blutzucker zeitweise wieder auf normale Werte absinkt. Die Bestimmung von HbA1c dient als Qualitätskontrolle der Blutzuckereinstellung (sog. Blutzuckergedächtnis).

**Heilmittel** – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen oder einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) und Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

**Herzinfarkt** – Der Herzinfarkt oder Myokardinfarkt ist eine akute und lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens. Es handelt sich dabei um Absterben oder Gewebsuntergang von Teilen des Herzmuskels auf Grund einer Minderversorgung des Gewebes mit Sauerstoff bedingt durch den Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße. Im Laufe der diabetesbedingten Gefäßschädigungen und gleichzeitiger Nervenschädigungen kann es zu sog. „stummen Infarkten“ ohne jegliche Schmerzsymptome kommen.

**Hilfsmittel** – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

**Hypertoniker** – Patienten mit dauerhaft erhöhten Blutdruckwerten.

**Hypertonus (Hypertonie)** – Bluthochdruck, Hochdruckkrankheit. Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

**Inhibitoren** – Es handelt sich um Substanzen, die chemische Reaktionen beeinflussen. Inhibitoren sind Zusatzstoffe, die Reaktionen verschiedenster Art zu verlangsamen oder zu verhindern suchen. Die gegenteilige Eigenschaft zeichnet einen Katalysator aus - dieser beschleunigt chemische Reaktionen.

**Insulin** – Blutzuckersenkendes Hormon, das in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gebildet wird. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Blutzuckers und der Therapie des Diabetes mellitus. Bei der Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus kommt v.a. dem Humaninsulin, das gentechnisch hergestellt wird, eine herausragende Bedeutung zu. Insuline werden zumeist in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme oder den Blutzuckermesswerten mittels (Selbst-)Injektion ins Unterhautfettgewebe (subkutan) oder halbautomatisch mittels Insulinpumpe verabreicht. Es stehen verschiedene Darreichungsformen mit langer und kurzer Wirkdauer zur Verfügung. Insulinanaloga sind Insuline mit veränderter Wirkungsweise (insbes. Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung im Organismus und damit auch der Wirkdauer aufgrund einer gentechnisch gegenüber dem Humaninsulin veränderten Aminosäurezusammensetzung).

**Kohorte bzw. Halbjahreskohorte** – Gesamtheit der Teilnehmer eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patienten, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

**Kollektiv** – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

**Konfidenzintervall** – siehe CI

**Koronare Herzkrankheit (KHK)** – Die KHK ist die Manifestation einer Arteriosklerose an den Herzkranzgefäßen. Bei höhergradigen Einengungen resultiert ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot in der Herzmuskulatur. Die Koronare Herzkrankheit ist in den Industrieländern die häufigste Todesursache

**Krankengeld** – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstaufschlag ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

**Lasertherapie** – Bei der Laser-Therapie - auch Laser-Koagulation oder Photo-Koagulation genannt - werden gezielte Lichtstrahlen auf die geschädigte Netzhaut gerichtet, die diabetesbedingte Blutgefäß-Wucherungen zerstören. Dadurch wird auch die Bildung weiterer Gefäßveränderungen unterdrückt.

**Makroangiopathie** – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die großen Gefäße (Arterien) durch Arteriosklerose geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie koronare Herzkrankheit (KHK), Herzinfarkt, Schlaganfall und arterielle Verschlusskrankheit (AVK) auftreten können.

**Mean** – siehe arithmetisches Mittel

**Median** – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

**Medizinische Datensätze** – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 100 EA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 EN sowie für die Folgedokumentationen die SA 100 FA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 FN.

**Metformin** – Der einzige heute noch in Deutschland zugelassene Wirkstoff aus der Gruppe der Biguanide ist das Metformin. Diese Substanzklasse der oralen Antidiabetika, entsteht aus zwei Molekülen Guanidin unter Abspaltung von Ammoniak. Der blutzuckersenkende Effekt ist auf mehrere, zum Teil noch unklare, Mechanismen zurückzuführen. Es wird die körpereigene Glucoseproduktion (Gluconeogenese), die Glucosefreisetzung (Glykogenolyse) aus der Leber und auch die Aufnahme (Resorption) der Kohlenhydrate aus dem Darm gehemmt. Durch den letztgenannten Wirkmechanismus ist Metformin auch besonders gut für die Therapie übergewichtiger Diabetiker geeignet. Eine verbesserte Glucoseaufnahme in den Muskel führt zu einer Zunahme der Glykogenkonzentration und trägt dadurch ebenfalls zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei.

**Mikroangiopathie** – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die die kleinen und kleinsten Gefäße (Kapillaren) geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie Netzhautschädigung (Retinopathie) oder Nierenschädigung (Nephropathie) mit den Endstadien Erblindung und Nierenversagen auftreten können.

**Monotherapie** – Unter einer Monotherapie versteht man die Behandlung mit einem Medikament, das nur eine Wirksubstanz enthält. Eine Kombinationstherapie arbeitet dagegen mit Medikamenten mit zwei oder mehr Wirksubstanzen.

**Nephropathie, diabetische** – Eine durch Diabetes mellitus verursachte Veränderung der Nierengefäße, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Erstes Anzeichen für eine diabetische Nephropathie ist die Ausscheidung von kleinsten Eiweißmengen mit dem Urin (Mikroalbuminurie). Nimmt die Nierenfunktion weiter ab, können bestimmte Stoffwechselprodukte nicht mehr in ausreichendem Maße über die Niere ausgeschieden werden. Man spricht dann von einer Niereninsuffizienz, die in ihrem Endstadium eine Blutwäsche (Dialyse) notwendig macht.

**Neuropathie (Polyneuropathie)** – Nervenerkrankung, die zu den diabetischen Folgeerkrankungen zählt. Man unterscheidet zwischen der häufigeren peripheren Neuropathie und der selteneren autonomen Neuropathie. Die periphere Neuropathie (z.B. nervenbedingte Störungen des Temperatur- und Schmerzempfindens an den Extremitäten) tritt meist als Empfindungsstörung an beiden Füßen auf. Der Gefühlsverlust wird von einem Fehlen der Sehnenreflexe begleitet. Häufig ist auch eine motorische Störung festzustellen, die sich in einer Schwäche und Rückbildung der kleinen Fußmuskulatur zeigt. Dadurch kommt es zu Veränderungen des Fußes mit Fehlstellungen. Unangenehm ist die schmerzhaft Polyneuropathie, die sich vornehmlich in der Nacht mit einem Gefühl von Pelzigkeit, Spannung, Fußsohlenbrennen oder starkem Kribbeln äußert. Die autonome Polyneuropathie gehört ebenso zu den Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus und äußert sich in Funktionsstörungen der inneren Organe. Von den häufig unspezifischen Symptomen können alle Organsysteme betroffen sein, wie z.B. Magen-Darm-Trakt (Magenentleerungsstörungen, Übelkeit), Herz (Verringerung der Herzfrequenzvariabilität), Sexualorgane (erektile Dysfunktion), Blase (Entleerungsstörungen). An den Füßen kann es als Folge einer verminderten Schweißbildung zu erhöhter Austrocknungsgefahr der Fußhaut, starker Hornhautbildung und Rissen kommen. Außerdem gibt es vermehrt Veränderungen in der Haut (Pergamenthaut) und den Nägeln (eingerissene, brüchige Nägel).

**Nierenersatztherapie** – Verlieren als Folge des Diabetes die Nieren ihre Ausscheidungs- und Filterfunktion, muss mittels Blutwäsche (Dialyse) oder gar Nierentransplantation eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

**Niereninsuffizienz** – Sind die Nieren durch eine Erkrankung derart geschädigt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die bei normaler Ernährung anfallenden Stoffwechselprodukte vollständig auszuschleiden bzw. ihre Filterfunktion auszuüben, so spricht man von Nierenversagen oder Niereninsuffizienz. Im Endstadium der terminalen Niereninsuffizienz muss eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

**OAD** – Unter dem Begriff orale Antidiabetika werden Tabletten aus verschiedenen Substanzklassen zusammengefasst. Dazu zählen Glucosidase-Hemmer, Biguanide, Sulfonylharnstoffe bzw. deren Derivate und Repaglinide. In der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 sind sowohl Kombinationen zwischen oralen Antidiabetika untereinander als auch zwischen dem nicht oral applizierbaren Insulin und oralen Antidiabetika möglich. Die Therapie ist in jedem Fall an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anzupassen.

**OD-Daten** – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmer verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmer vor. Diese Daten werden als Satzart 100 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patient und Jahr vor.

**ophthalmologische Netzhautuntersuchung** – Vom Augenarzt zur frühzeitigen Erkennung und Therapie von Mikroangiopathien (Erweiterungen, Neubildungen, Blutungen etc.) der Netzhaut (Retina) durchgeführte Untersuchung des Augenhintergrunds.

**orale Antidiabetika** – siehe OAD

**Osteoarthropathie** – Das Absterben von Knochengewebe (Knochennekrosen) kann bei Diabetes-Patienten z.B. im Vor- und Rückfuß zu schmerzlosen Destruktionen, Statikverlust und Geschwürbildungen (Ulzerationen) mit nachfolgenden schwerwiegenden Infektverläufen und Schädigung der Gewölbefunktion des Fußes führen.

**periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)** – Durch verengende (stenosierende) bzw. verschließende (obliterierende) Veränderungen an Arterien verursachte Erkrankung, die zu Störungen der arteriellen Durchblutung an den Extremitäten durch Einengung der Gefäßlichtung führt. Verschlüsse peripherer Arterien sind oft multipel und langstreckig und betreffen zumeist Arterien der unteren Extremität (Beine). Beschwerden an den Beinen, die zum Stehenbleiben zwingen, werden als Schaufensterkrankheit bezeichnet.

**PM-Daten** – Patientenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientenmerkmale wie Geschlecht und Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

**Programtteilnehmer** – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

**Restkohorte** – Gesamtheit der Patienten einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programtteilnehmer sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

**Retinopathie** – Die diabetische Retinopathie ist eine durch Diabetes mellitus hervorgerufene Erkrankung der Netzhaut des Auges. Die Schädigung kleiner Blutgefäße (Mikroangiopathie) verursacht eine Minderung der Sehschärfe sowie Einschränkung des Gesichtsfelds und kann im Verlauf zur Erblindung führen. Eine schlechte Diätführung bzw. Blutzuckereinstellung begünstigt die Entstehung des Krankheitsbilds. 30% aller Erblindungen in Europa sind auf die diabetische Retinopathie zurückzuführen

**Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV)** – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidität) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

**Schlaganfall** – Als Schlaganfall (medizinisch auch Apoplex oder Insult), wird eine plötzlich oder innerhalb kurzer Zeit auftretende Erkrankung des Gehirns bezeichnet, die zu einem anhaltenden Ausfall von Funktionen des Zentralen Nervensystems führt und durch kritische Störungen der Blutversorgung des Gehirns (Gefäßverschluss oder Einblutung) verursacht wird.

**Serum-Kreatinin** – Kreatinin ist ein Produkt des Muskelstoffwechsels. Ein Anstieg seiner Konzentration im Blut (Serum-Kreatinin) kann ein Hinweis auf eine Nierenschädigung (Nephropathie) sein.

**Subkohorte** – Untergruppe der Patienten einer Kohorte. Alle Patienten werden zum Zeitpunkt der Erstdokumentation nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen in drei Subkohorten unterteilt. Diese Einteilung bleibt über den gesamten Berichtszeitraum bestehen, auch wenn sich der Schweregrad der Begleit- oder Folgeerkrankungen im Zeitverlauf ändert.

**subkutan** – bedeutet "unter der Haut" oder "unter die Haut verabreicht". Die subkutane Verabreichung von Medikamenten ist einfach zu handhaben. Dadurch eignet sich dieses Verfahren gut, um vom Patienten selbst angewandt zu werden.

**Sulfonylharnstoffe** – Arzneimittelgruppe zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus (z.B. Glibenclamid) Sie fördern die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. Beta-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

**systolischer Blutdruck** – Der sich während des Zusammenziehens bzw. der Kontraktion der Herzkammer (Systole) ergebende höchste Punkt der Blutdruckkurve (auch als oberer Blutdruckwert bezeichnet).

**Statin** ist im allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch ein Arzneistoff, der der pharmakologischen Substanzklasse der 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase-(HMG-CoA-Reduktase-)Inhibitoren angehört. Da HMG-CoA ein Zwischenprodukt der menschlichen Cholesterinsynthese ist, werden Statine bislang hauptsächlich bei Fettstoffwechselstörungen als Cholesterinsenker eingesetzt

**Thrombozyten-Aggregationshemmer** – Diese Arzneimittel, wie z.B. Acetylsalicylsäure, verhindern das Zusammenkleben von Blutplättchen (Thrombozyten) und senken dadurch die Blutgerinnungsneigung, wodurch in den Blutgefäßen seltener Blutgerinnsel (Thrombosen) entstehen.

**Urin-Albumin** – Albumin ist das häufigste Eiweiß im Blutplasma. Während die Filterfunktion gesunder Nieren nur geringe Albuminmengen im Primärharn zulässt, die außerdem fast vollständig rückgewonnen (resorbiert) werden, erhöht sich bei zunehmender Nierenfunktionsstörung die Menge von Albumin im Primärharn. Dieses Albumin wird bei Überschreitung der Rückresorptionskapazität zunächst in geringen Mengen (Mikroalbuminurie), dann auch in größeren Mengen (Makroalbuminurie, Eiweissverlustniere) mit dem Urin/Harn ausgeschieden.

**Wagner-Stadien** – Zur klinischen Einteilung des Schweregrads des diabetischen Fußsyndroms hat sich die Einteilung nach Wagner in 5 Stadien bewährt (Stadium 0: Risikofuß ohne Läsion [ggf. Fußdeformation], 1: oberflächliches Geschwür (Ulcus) [mit potentieller Infektion oder mit Infektion nur im Wundbereich], 2: tiefes, gelenknah infiziertes Ulcus, 3: penetrierende Infektion mit Knochenbeteiligung, Knochenmarksentzündung (Osteomyelitis) oder Abszess, 4: Begrenzte Vorfuß- oder Fersennekrose, 5: Nekrose (Zelltod) des Fußes.