

AOK Curaplan und "gut Dabei" der Knappschaft für Diabetes mellitus Typ 2 - bundesweite Gender-Auswertungen

Berichtstyp: bundesweiter Evaluationsbericht - Gender-Auswertungen

Auswertungshalbjahre: 2003-1 bis 2012-1

Abgabedatum: 30. September 2013

Evaluatoren:

infas infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn

prognos
Prognos AG
Schwanenmarkt 21
40231 Düsseldorf

WIAD Wissenschaftliches Institut der Ärzte
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.
Uhierstr. 78
53175 Bonn

0. Einleitung	4
Tabelle 0.1 Inhalte des Evaluationsberichtes	5
0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten	7
Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard	8
Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche	10
0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung	11
Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration	11
0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Kollektive	12
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	13
Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale	13
Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung	13
Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	15
Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	25
Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres	29
Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	33
Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	34
Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation	36
Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung	39
3.1 Risikofaktoren	40
Tabelle 3.1.1 Patienten und ihr Body-Mass-Index	41
Tabelle 3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	60
Tabelle 3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten	65
Tabelle 3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation	69
Tabelle 3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation	107
Tabelle 3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation	112
3.2 Laborwerte	119
Tabelle 3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	120
Tabelle 3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	130
Tabelle 3.2.3 Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	144
3.3 Medikation	153
Tabelle 3.3.1 Patienten und ihre Medikation	154
3.4 Prozessparameter	192
Tabelle 3.4.1 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	193
Tabelle 3.4.2 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	204
Tabelle 3.4.3 Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	215
3.5 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten	219
Tabelle 3.5.1 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	220
Tabelle 3.5.2 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	227
Tabelle 3.5.3 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	235
Tabelle 3.5.4 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	254
Tabelle 3.5.5 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	261
Tabelle 3.5.6 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	268
Tabelle 3.5.7 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut Erstdokumentation	275
Tabelle 3.5.8 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation	282
Tabelle 3.5.9 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation	289
Tabelle 3.5.10 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre	

Endpunkte laut Erstdokumentation	296
Anhang A: Methodik und Datengrundlage	302
A.1 Datengrundlage	302
Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP DM2 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP	303
A.2 Qualitätssicherung	305
A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen	306
Tabelle A.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr	307
Anhang B: Glossar	308

0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patienten wird über den gesamten Verlauf einer chronischen Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patienten sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es, zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen, sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patienten durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrunde liegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 2 sind sämtliche DMP zum 30.09.2009 zu evaluieren. Anschließend erfolgt alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 30.09.2011, zum 30.09.2013, etc.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welchen Inhalt der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Die in den Evaluationskriterien vorgesehenen geschlechtsspezifischen Zusatzauswertungen sind darin nicht enthalten. Sie werden in einem gesonderten Genderbericht ausgewiesen, für den bundesweite und kassenarten übergreifende (AOK, Knappschaft) Auswertungen vorgenommen werden.

Tabelle 0.1 **Inhalte des Evaluationsberichtes**

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	
1. Patientenzahlen und -merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) - Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Alter - Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Patienten und ihre Beobachtungszeit - Patienten ohne medizinische Dokumentation
3. Krankheitsverlauf nach Einschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewichtsentwicklung (BMI) - Raucherstatus - Hypertonus - HbA1c-Werte - Serum-Kreatinin-Werte - Medikation - Wahrnehmung von Schulungen - Augenärztliche Untersuchung <p>Ereigniszeitanalysen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erblindung - Nephropathie - erheblich auffälliger Fußstatus - Amputation - Herzinfarkt - Schlaganfall - Nierenersatztherapie - primäre und sekundäre Endpunkte
Anhang A: Methodik und Datengrundlage	
Anhang B: Glossar	

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme in der Version 5.4 vom 04. Dezember 2012 veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbeobachtung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Evaluationsberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen. Um eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf die Patientenpopulation herzustellen, erfolgt dazu eine risikoadjustierte Schätzung der interessierenden Parameter.

Der vorliegende Bericht enthält bundesweite, genderspezifische Auswertungen für die Summe aller DMPs Curaplan der AOK und "gut Dabei" der Knappschaft zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2. Die Akkreditierung für das erste dieser Programme erfolgte im Halbjahr 2003-1. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmer des Programms vom Zeitpunkt ihres Beitritts bis einschließlich des Halbjahres 2012-1 beobachtet. Betrachtet werden Versicherte der jeweiligen AOK sowie gegebenenfalls länderübergreifend betreute Versicherte anderer AOKen und die Versicherten der Knappschaft, zu denen nach der Fusion beider Kassen auch die ehemaligen Versicherten der See-Krankenkasse gehören.

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.¹ Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs der Knappschaft teil.² Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Für den vorliegenden Bericht ist zudem die Fusion von AOK Niedersachsen und IKK Niedersachsen relevant, die bezüglich der DMPs zum 1.4.2010 umgesetzt wurde sowie die Fusion von AOK Sachsen-Anhalt und BKK Sachsen-Anhalt, die bezüglich der DMPs zum 1.4.2010 umgesetzt wurde. Ab den jeweiligen Fusionszeitpunkten nahmen die Versicherten der ehemaligen IKK Niedersachsen bzw. der ehemaligen BKK Sachsen-Anhalt an den DMP's der AOK Niedersachsen bzw. der AOK Sachsen-Anhalt teil. Die Patientenmerkmale und die dokumentierten medizinischen Parameter der ehemaligen IKK- bzw. BKK-Versicherten wurden mit ihrem historischen Fallverlauf im vorliegenden bundesweiten Evaluationsbericht (Gender-Auswertungen) berücksichtigt. Daher können die Patientenzahlen höher ausfallen als die Patientenzahlen im bundesweiten Evaluationsbericht (Genderauswertungen) vom September 2009.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden DM2-Berichten Daten aus eDMP enthalten sind. Ab dem Halbjahr 2008-2 kann daher - je nach Auswertungsinhalt - die Vergleichbarkeit der Auswertungsinhalte eingeschränkt sein. Zum einen werden seit eDMP einige Parameter auf geänderte Art und Weise erfasst. Zum anderen besteht - je nach Praxissoftware - seit eDMP die Möglichkeit, auf ergänzende Patienteninformationen zuzugreifen, so dass ggf. ein bisher möglicherweise unterrepräsentierter Parameter korrigiert dargestellt wird.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

Zur Vereinfachung wird im folgenden von „Patienten“, „Teilnehmern“ und „Personen“ usw. gesprochen. Damit sind jedoch stets männliche und weibliche Personen gemeint.

¹ Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

² Eine Ausnahme bilden die DMPs zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 und 2 in der Antragsregion Mecklenburg-Vorpommern. In diesen beiden Fällen hatte die Knappschaft bis zum Fusionszeitpunkt keine eigenen Programme angeboten.

0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patienten in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patienten mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patienten und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patienten halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2003-1“, Kohorte „2003-2“, „Kohorte 2004-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt des einzelnen Teilnehmers in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1. verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2003-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc.. Zu beachten ist dabei, dass die Spaltenüberschriften sich auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patienten beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche Kalenderhalbjahre.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

Eintrittszeitpunkt	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	20. Halbjahr
2003-1	Wert für 2003-1	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...
2003-2	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...	
2004-1	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...		
2004-2	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...			
2005-1	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...				
2005-2	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...					
2006-1	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...						
2006-2	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...							
2007-1	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...								
2007-2	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...									
2008-1	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...										
2008-2	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...											
2009-1	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...												
2009-2	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...													
2010-1	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...														
2010-2	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...															
2011-1	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...																
2011-2	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...																	
2012-1	Wert für 2012-1	...																		
...	...																			

Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patienten zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte der Patient zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2004 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2004-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2004 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2004-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patienten keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patienten bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet.

Ab dem zweiten Halbjahr ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patienten aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen zu einem Ausschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patienten, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patienten in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patienten.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patienten der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“ (vgl. Tabelle 0.1.2.).

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind.

Zu beachten ist weiterhin, dass im Sommer 2010 in Abstimmung mit dem BVA erstmals Regelungen getroffen wurden, die festlegen welcher Wert beim Vorliegen mehrerer Erstdokumentationen pro Halbjahr zu verwenden ist. Zudem wurden auf Basis aktualisierter BVA-Vorgaben seit Herbst 2013 – also erstmalig im vorliegenden Bericht – Anpassungen bei der Aufbereitung der Patientendaten vorgenommen (siehe Kapitel A.3 bzw. A..2).

Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche

Parameter	definierter medizinischer Bereich*
Größe (m)	1,20 bis 2,50
Gewicht (kg)	40,00 bis 300,00
RR systolisch (mmHg)	50 bis 300
RR diastolisch (mmHg)	10 bis 200
HbA1c-Werte (%)	2 bis 40
Serum-Kreatinin-Werte (µmol/l)	20 bis 999

* Basis: Expertenmeinungen nach Kenntnisstand September 2006. Wertebereiche sind vom BVA als Evaluationsgrundlage abgenommen und werden aufgrund der jeweils aktuellen Evaluationsergebnisse regelmäßig aktualisiert (mindestens einmal jährlich).

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind. Diejenigen Patienten, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare**“ Patienten bezeichnet und in der Regel in den Tabellen gesondert ausgewiesen.³ Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patienten zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

³ Die „nicht auswertbaren“ Patienten ergeben sich als Differenz zwischen den „Patienten insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patienten.

0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der Entwicklung der **HbA1c-Konzentration** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2.1). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, ist in diesem Bericht jede Tabelle mit einem entsprechenden Erläuterungstext versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patienten in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 eine Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ **Tabelle zur Entwicklung der HbA1c-Konzentration** mit der zweiten Spalte. Für jede Kohorte werden dort zunächst Angaben zu den Patienten gemacht. Zuerst werden unter „männliche

bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch als Programmteilnehmer definiert werden. Die „auswertbaren“ Patienten, also diejenigen, für die im betrachteten Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorlagen, bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der mittleren patientenbezogenen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus beiden Halbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtsjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Das Konfidenzintervall wird ausgewiesen, indem die untere und obere Grenze durch ein Semikolon getrennt in eckigen Klammern dargestellt werden.

Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
Kohorte	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910	
	auswertbar	Anzahl	16872	11948	11399	10378	9315	8484	7747	6935	6362	6044	5741	5458	5234	4965	4682	4441	4156	3981	3758	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,00	6,76	6,85	6,78	6,92	6,89	7,00	6,91	6,97	6,94	7,00	6,96	7,05	7,04	7,11	7,05	7,10	7,01	7,11	
		CI Mean	[6,98; 7,02]	[6,74; 6,78]	[6,83; 6,87]	[6,76; 6,80]	[6,89; 6,94]	[6,87; 6,91]	[6,98; 7,03]	[6,88; 6,93]	[6,94; 6,99]	[6,91; 6,96]	[6,97; 7,03]	[6,93; 6,98]	[7,02; 7,08]	[7,01; 7,07]	[7,08; 7,15]	[7,02; 7,09]	[7,06; 7,13]	[6,98; 7,05]	[7,07; 7,14]	
		Median	6,80	6,60	6,70	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,80	6,90
		Fallbasis mittlere Differenz		11928	11378	10358	9297	8467	7733	6922	6352	6033	5730	5450	5225	4955	4672	4432	4148	3973	3752	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,22	-0,11	-0,15	-0,01	-0,02	0,09	0,00	0,07	0,05	0,12	0,09	0,17	0,19	0,27	0,22	0,27	0,19	0,28	
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,20]	[-0,12; -0,09]	[-0,17; -0,13]	[-0,03; 0,02]	[-0,05; 0,00]	[0,06; 0,11]	[-0,03; 0,03]	[0,04; 0,10]	[0,02; 0,08]	[0,09; 0,15]	[0,05; 0,12]	[0,14; 0,21]	[0,15; 0,22]	[0,23; 0,30]	[0,18; 0,26]	[0,24; 0,31]	[0,15; 0,23]	[0,25; 0,32]	
	Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695	
	auswertbar	Anzahl	23392	16849	16210	14916	13467	12461	11397	10204	9347	8927	8411	7957	7617	7202	6810	6469	6079	5807	5510	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,04	6,83	6,92	6,86	6,97	6,95	7,03	6,95	7,01	6,99	7,06	6,98	7,07	7,06	7,15	7,10	7,15	7,08	7,17	
		CI Mean	[7,03; 7,06]	[6,82; 6,85]	[6,90; 6,94]	[6,84; 6,88]	[6,95; 6,99]	[6,93; 6,97]	[7,01; 7,05]	[6,93; 6,97]	[6,99; 7,04]	[6,97; 7,01]	[7,03; 7,08]	[6,96; 7,01]	[7,04; 7,09]	[7,04; 7,09]	[7,12; 7,18]	[7,07; 7,13]	[7,13; 7,18]	[7,06; 7,11]	[7,14; 7,20]	
		Median	6,80	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00
		Fallbasis mittlere Differenz		16823	16183	14890	13442	12440	11375	10185	9328	8913	8396	7943	7602	7189	6796	6455	6067	5794	5498	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,18	-0,08	-0,13	-0,01	-0,02	0,07	-0,01	0,07	0,05	0,12	0,06	0,14	0,14	0,24	0,19	0,25	0,19	0,28	
		CI mittlere Differenz		[-0,19; -0,16]	[-0,10; -0,07]	[-0,15; -0,11]	[-0,03; 0,01]	[-0,04; 0,00]	[0,04; 0,09]	[-0,03; 0,02]	[0,05; 0,09]	[0,02; 0,07]	[0,09; 0,14]	[0,03; 0,08]	[0,12; 0,17]	[0,12; 0,17]	[0,21; 0,27]	[0,16; 0,22]	[0,22; 0,28]	[0,16; 0,22]	[0,24; 0,31]	
	Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30		

0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Kollektive

Bei der tabellarischen Darstellung wird nicht nur danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patienten dem DMP beigetreten sind, sondern – in den Tabellen zu Patientenmerkmalen und -zahlen – auch nach Frauen und Männern sowie nach Altersgruppen. Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach Patientenkollektiven.

Für einen Teil der Tabellen wird demzufolge nach „**Kollektiven**“ unterschieden. Die sich hierdurch ergebenden Gruppierungen unterliegen entweder besonderen Risiken (z.B. Raucherstatus) oder weisen bestimmte Begleiterkrankungen auf, die spezifische Therapien erfordern (z.B. Hypertoniker). Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei der zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt wiederum unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. So wird beispielsweise ein Patient dem Kollektiv der Raucher zugeordnet, wenn in der Erstdokumentation der entsprechende Raucherstatus vermerkt ist. Der Patient bleibt dann – sofern er nicht aus dem DMP ausscheidet – über den gesamten Berichtszeitraum hinweg Mitglied des Raucherkollektivs, selbst wenn er noch innerhalb dieses Zeitraums mit dem Rauchen aufhört.

Wenn die Patientenzahl bzw. die Gruppe der auswertbaren Patienten oder ein Kollektiv in einer Kohorte im jeweiligen Berichtshalbjahr kleiner als 10 ist, wird aus Datenschutzgründen auf den Ausweis von Ergebnissen verzichtet. Die entsprechenden Tabellen bzw. Halbjahre sind dann leer bzw. ausgestrichelt.

Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte

Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	40324	33856	29378	25894	23381	21351	19757	17558	16478	15392	14743	13959	13286	12557	11874	11241	10574	10076	9605
	männlich	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910
		Anteil in %	41,91	41,59	41,37	41,14	40,88	40,60	40,47	40,46	40,58	40,41	40,48	40,67	40,71	40,81	40,85	40,84	40,72	40,65	40,71
	weiblich	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695
		Anteil in %	58,09	58,41	58,63	58,86	59,12	59,40	59,53	59,54	59,42	59,59	59,52	59,33	59,29	59,19	59,15	59,16	59,28	59,35	59,29
	2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	256217	200109	167362	144099	126500	113929	103291	96418	91929	88202	84708	81295	77331	73886	70624	67394	64377	61623
männlich		Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736	
		Anteil in %	44,24	44,00	43,85	43,75	43,57	43,57	43,53	43,59	43,54	43,51	43,49	43,51	43,49	43,47	43,48	43,44	43,39	43,39	
weiblich		Anzahl	142866	112069	93979	81049	71389	64294	58333	54388	51899	49824	47865	45920	43703	41770	39917	38116	36445	34887	
		Anteil in %	55,76	56,00	56,15	56,25	56,43	56,43	56,47	56,41	56,46	56,49	56,51	56,49	56,51	56,53	56,52	56,56	56,61	56,61	
2004-1		Patienten insgesamt	Anzahl	298545	260083	230730	203632	185595	170592	159817	152975	146779	141146	135447	129238	123708	118414	113021	108215	103722	
	männlich	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232		
		Anteil in %	45,26	45,11	44,99	44,84	44,78	44,72	44,71	44,67	44,65	44,56	44,59	44,65	44,71	44,68	44,67	44,66	44,57		
	weiblich	Anzahl	163432	142749	126918	112329	102494	94300	88366	84645	81247	78247	75048	71529	68399	65504	62532	59887	57490		
		Anteil in %	54,74	54,89	55,01	55,16	55,22	55,28	55,29	55,33	55,35	55,44	55,41	55,35	55,29	55,32	55,33	55,34	55,43		
	2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	214812	190173	166551	148305	133893	124516	118769	113509	108762	104211	99224	94777	90700	86623	82997	79454		
männlich		Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933			
		Anteil in %	46,01	45,83	45,63	45,53	45,39	45,30	45,25	45,22	45,19	45,18	45,19	45,20	45,20	45,23	45,20	45,22			
weiblich		Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521			
		Anteil in %	53,99	54,17	54,37	54,47	54,61	54,70	54,75	54,78	54,81	54,82	54,81	54,80	54,75	54,77	54,80	54,78			
2005-1		Patienten insgesamt	Anzahl	229101	204539	182837	163494	151059	143167	136474	130536	124500	118386	113053	107984	103198	98677	94446			
	männlich	Anzahl	105631	93726	83366	74241	68487	64764	61675	58977	56190	53398	50980	48671	46510	44483	42590				
		Anteil in %	46,11	45,82	45,60	45,41	45,34	45,24	45,19	45,18	45,13	45,10	45,09	45,07	45,07	45,08	45,09				
	weiblich	Anzahl	123470	110813	99471	89253	82572	78403	74799	71559	68310	64988	62073	59313	56688	54194	51856				
		Anteil in %	53,89	54,18	54,40	54,59	54,66	54,76	54,81	54,82	54,87	54,90	54,91	54,93	54,93	54,92	54,91				
	2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	177270	159758	142371	129725	122111	115844	110293	104904	99308	94518	89909	85713	81808	78228				
männlich		Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545					
		Anteil in %	46,40	46,14	45,95	45,82	45,68	45,63	45,56	45,51	45,49	45,45	45,48	45,51	45,48	45,44					
weiblich		Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683					
		Anteil in %	53,60	53,86	54,05	54,18	54,32	54,37	54,44	54,49	54,51	54,55	54,52	54,49	54,52	54,56					
2006-1		Patienten insgesamt	Anzahl	211114	189946	172302	160139	151089	143449	136299	128618	121959	115953	110322	105101	100516					
	männlich	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133						
		Anteil in %	46,71	46,44	46,28	46,10	46,01	45,92	45,87	45,81	45,82	45,82	45,89	45,89	45,90						
	weiblich	Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383						
		Anteil in %	53,29	53,56	53,72	53,90	53,99	54,08	54,13	54,19	54,18	54,18	54,11	54,11	54,10						
	2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	200388	183534	168109	157005	148259	140163	131722	124772	118242	112411	107119	102339						
männlich		Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138							
		Anteil in %	46,92	46,70	46,48	46,41	46,33	46,25	46,20	46,19	46,15	46,12	46,10	46,06							
weiblich		Anzahl	106368	97818	89965	84145	79567	75344	70865	67146	63673	60566	57735	55201							
		Anteil in %	53,08	53,30	53,52	53,59	53,67	53,75	53,80	53,81	53,85	53,88	53,90	53,94							

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	211228	192975	178198	166760	156952	146747	138391	130699	123849	117841	112400										
	männlich	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740										
		Anteil in %	46,88	46,58	46,40	46,34	46,30	46,20	46,12	46,04	46,06	46,07	46,03										
	weiblich	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660										
		Anteil in %	53,12	53,42	53,60	53,66	53,70	53,80	53,88	53,96	53,94	53,93	53,97										
	2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	194734	178533	165641	154423	143025	134294	126418	119395	113475	108145										
männlich		Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931											
		Anteil in %	47,04	46,81	46,63	46,51	46,35	46,31	46,24	46,22	46,18	46,17											
weiblich		Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214											
		Anteil in %	52,96	53,19	53,37	53,49	53,65	53,69	53,76	53,78	53,82	53,83											
2008-1		Patienten insgesamt	Anzahl	209502	193178	178308	162081	150859	141384	133381	126309	120011											
	männlich	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783												
		Anteil in %	47,54	47,27	47,12	46,95	46,79	46,71	46,60	46,56	46,48												
	weiblich	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228												
		Anteil in %	52,46	52,73	52,88	53,05	53,21	53,29	53,40	53,44	53,52												
	2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	141760	129449	117267	108166	101115	94917	89915	85398												
männlich		Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871													
		Anteil in %	47,68	47,45	47,17	47,01	46,89	46,83	46,73	46,69													
weiblich		Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527													
		Anteil in %	52,32	52,55	52,83	52,99	53,11	53,17	53,27	53,31													
2009-1		Patienten insgesamt	Anzahl	149236	134099	121764	112309	104842	98657	93524													
	männlich	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446														
		Anteil in %	48,43	48,15	47,90	47,77	47,74	47,63	47,52														
	weiblich	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078														
		Anteil in %	51,57	51,85	52,10	52,23	52,26	52,37	52,48														
	2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	138203	124583	112850	104048	97351	91727														
männlich		Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280															
		Anteil in %	47,97	47,68	47,41	47,21	47,20	47,18															
weiblich		Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447															
		Anteil in %	52,03	52,32	52,59	52,79	52,80	52,82															
2010-1		Patienten insgesamt	Anzahl	156054	141244	128741	119210	111825															
	männlich	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460																
		Anteil in %	48,71	48,35	48,10	47,91	47,81																
	weiblich	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365																
		Anteil in %	51,29	51,65	51,90	52,09	52,19																
	2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	141745	128551	117146	108693																
männlich		Anzahl	68337	61608	55900	51784																	
		Anteil in %	48,21	47,92	47,72	47,64																	
weiblich		Anzahl	73408	66943	61246	56909																	
		Anteil in %	51,79	52,08	52,28	52,36																	
2011-1		Patienten insgesamt	Anzahl	153653	139143	127131																	
	männlich	Anzahl	74139	66585	60521																		
		Anteil in %	48,25	47,85	47,61																		
	weiblich	Anzahl	79514	72558	66610																		
		Anteil in %	51,75	52,15	52,39																		
	2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	139695	127218																		
männlich		Anzahl	67230	60721																			
		Anteil in %	48,13	47,73																			
weiblich		Anzahl	72465	66497																			
		Anteil in %	51,87	52,27																			
2012-1		Patienten insgesamt	Anzahl	152593																			
	männlich	Anzahl	74714																				
		Anteil in %	48,96																				
	weiblich	Anzahl	77879																				
		Anteil in %	51,04																				

Tabelle 1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Kranken-

kasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2003-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	2817	4746	6247	7342	8230	8903	9795	10212	10679	10931	11222	11490	11774	12048	12308	12593	12803	12989	13140	
		Anteil in %	16,67	28,08	36,97	43,45	48,70	52,68	57,96	60,43	63,19	64,68	66,41	67,99	69,67	71,29	72,83	74,52	75,76	76,86	77,76	
		CI Anteil in %	[16,11; 17,23]	[27,41; 28,76]	[36,24; 37,69]	[42,70; 44,19]	[47,95; 49,45]	[51,93; 53,44]	[57,22; 58,71]	[59,69; 61,17]	[62,47; 63,92]	[63,96; 65,40]	[65,69; 67,12]	[67,29; 68,70]	[68,98; 70,37]	[70,61; 71,98]	[72,16; 73,50]	[73,86; 75,18]	[75,12; 76,41]	[76,23; 77,50]	[77,13; 78,38]	
	davon wegen Tod	Anzahl	34	153	291	356	492	632	782	937	1110	1233	1363	1506	1654	1788	1931	2071	2193	2298	2389	
		Anteil in %	0,20	0,91	1,72	2,11	2,91	3,74	4,63	5,54	6,57	7,30	8,07	8,91	9,79	10,58	11,43	12,26	12,98	13,60	14,14	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2123	3308	4097	4716	5225	5633	5893	6029	6103	6156	6210	6260	6356	6434	6486	6592	6645	6692	6718	
		Anteil in %	12,56	19,58	24,24	27,91	30,92	33,33	34,87	35,68	36,11	36,43	36,75	37,04	37,61	38,07	38,38	39,01	39,32	39,60	39,75	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	8	33	72	118	141	160	181	202	257	294	343	357	375	402	440	458	468	482	498	
		Anteil in %	0,05	0,20	0,43	0,70	0,83	0,95	1,07	1,20	1,52	1,74	2,03	2,11	2,22	2,38	2,60	2,71	2,77	2,85	2,95	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	652	1252	1787	2152	2372	2478	2939	3044	3209	3248	3306	3367	3389	3424	3451	3472	3497	3517	3535	
		Anteil %	3,86	7,41	10,57	12,73	14,04	14,66	17,39	18,01	18,99	19,22	19,56	19,92	20,05	20,26	20,42	20,55	20,69	20,81	20,92	
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910	3759
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	3651	6200	8183	9601	10743	11664	12971	13634	14253	14650	15143	15548	15993	16402	16775	17157	17445	17730	17978	
		Anteil in %	15,59	26,47	34,93	40,99	45,86	49,79	55,37	58,20	60,85	62,54	64,64	66,37	68,27	70,02	71,61	73,24	74,47	75,69	76,75	
		CI Anteil in %	[15,12; 16,05]	[25,90; 27,03]	[34,32; 35,54]	[40,36; 41,62]	[45,22; 46,50]	[49,15; 50,43]	[54,74; 56,01]	[57,57; 58,83]	[60,22; 61,47]	[61,92; 63,16]	[64,03; 65,26]	[65,77; 66,98]	[67,68; 68,87]	[69,43; 70,61]	[71,03; 72,19]	[72,68; 73,81]	[73,91; 75,03]	[75,14; 76,24]	[76,21; 77,29]	
	davon wegen Tod	Anzahl	43	177	348	425	595	749	944	1142	1348	1517	1733	1925	2130	2306	2491	2648	2797	2943	3109	
		Anteil in %	0,18	0,76	1,49	1,81	2,54	3,20	4,03	4,88	5,75	6,48	7,40	8,22	9,09	9,84	10,63	11,30	11,94	12,56	13,27	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2770	4320	5399	6245	6911	7533	7908	8167	8304	8403	8499	8589	8757	8903	9001	9170	9254	9337	9375	
		Anteil in %	11,82	18,44	23,05	26,66	29,50	32,16	33,76	34,86	35,45	35,87	36,28	36,67	37,38	38,01	38,42	39,15	39,50	39,86	40,02	
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	14	50	96	151	179	201	229	251	288	334	413	438	474	510	556	580	593	617	634		
	Anteil in %	0,06	0,21	0,41	0,64	0,76	0,86	0,98	1,07	1,23	1,43	1,76	1,87	2,02	2,18	2,37	2,48	2,53	2,63	2,71		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	824	1653	2340	2780	3058	3181	3890	4074	4313	4396	4498	4596	4632	4683	4727	4759	4801	4833	4860		
	Anteil %	3,52	7,06	9,99	11,87	13,05	13,58	16,61	17,39	18,41	18,77	19,20	19,62	19,77	19,99	20,18	20,32	20,50	20,63	20,75		
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695	5447	

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2005-2	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	8535	16831	22817	26477	29397	32000	34511	37076	39295	41360	43245	45044	46708	48101							
		Anteil in %	10,38	20,46	27,74	32,19	35,74	38,90	41,96	45,08	47,77	50,28	52,58	54,76	56,79	58,48							
		CI Anteil in %	[10,17; 10,58]	[20,19; 20,74]	[27,43; 28,05]	[31,87; 32,51]	[35,41; 36,07]	[38,57; 39,24]	[41,62; 42,29]	[44,74; 45,42]	[47,43; 48,11]	[49,94; 50,63]	[52,23; 52,92]	[54,42; 55,10]	[56,45; 57,12]	[58,14; 58,82]							
	davon wegen Tod	Anzahl	401	1498	2580	3618	4565	5548	6520	7465	8300	9203	10071	10917	11686	12456							
		Anteil in %	0,49	1,82	3,14	4,40	5,55	6,75	7,93	9,08	10,09	11,19	12,24	13,27	14,21	15,14							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	7680	13538	17678	19441	20745	21798	22994	24172	25238	26158	26996	27768	28485	28963							
		Anteil in %	9,34	16,46	21,49	23,64	25,22	26,50	27,96	29,39	30,68	31,80	32,82	33,76	34,63	35,21							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	225	747	1230	1860	2395	2802	3053	3398	3650	3816	3935	4059	4176	4283							
		Anteil in %	0,27	0,91	1,50	2,26	2,91	3,41	3,71	4,13	4,44	4,64	4,78	4,93	5,08	5,21							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	229	1048	1329	1558	1692	1852	1944	2041	2107	2183	2243	2300	2361	2399							
		Anteil in %	0,28	1,27	1,62	1,89	2,06	2,25	2,36	2,48	2,56	2,65	2,73	2,80	2,87	2,92							
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545	35545					
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545	34152						
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	8977	18068	24728	28682	32029	34977	37855	40886	43457	46001	48312	50418	52334	53961							
		Anteil in %	9,45	19,02	26,02	30,19	33,71	36,81	39,84	43,03	45,74	48,41	50,85	53,06	55,08	56,79							
		CI Anteil in %	[9,26; 9,63]	[18,77; 19,27]	[25,75; 26,30]	[29,89; 30,48]	[33,41; 34,01]	[36,50; 37,12]	[39,53; 40,15]	[42,72; 43,35]	[45,42; 46,05]	[48,10; 48,73]	[50,53; 51,16]	[52,74; 53,38]	[54,76; 55,39]	[56,48; 57,11]							
		davon wegen Tod	Anzahl	417	1490	2561	3593	4531	5507	6460	7494	8358	9277	10153	11012	11814	12678						
			Anteil in %	0,44	1,57	2,70	3,78	4,77	5,80	6,80	7,89	8,80	9,76	10,69	11,59	12,43	13,34						
davon wegen Ausschluss		Anzahl	8077	14598	19279	21337	23008	24376	25909	27454	28807	30123	31308	32341	33248	33826							
		Anteil in %	8,50	15,36	20,29	22,46	24,21	25,65	27,27	28,89	30,32	31,70	32,95	34,04	34,99	35,60							
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	229	737	1298	1880	2461	2898	3151	3495	3755	3977	4154	4293	4433	4571							
		Anteil in %	0,24	0,78	1,37	1,98	2,59	3,05	3,32	3,68	3,95	4,19	4,37	4,52	4,67	4,81							
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	254	1243	1590	1872	2029	2196	2335	2443	2537	2624	2697	2772	2839	2886							
		Anteil in %	0,27	1,31	1,67	1,97	2,14	2,31	2,46	2,57	2,67	2,76	2,84	2,92	2,99	3,04							
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683	42683						
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683	41056							
2006-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	10401	18864	24773	29090	32728	36087	39688	42724	45478	47976	50376	52470	54263								
		Anteil in %	10,55	19,13	25,12	29,50	33,19	36,60	40,25	43,33	46,12	48,66	51,09	53,21	55,03								
		CI Anteil in %	[10,36; 10,74]	[18,89; 19,38]	[24,85; 25,39]	[29,22; 29,79]	[32,90; 33,49]	[36,30; 36,90]	[39,94; 40,56]	[43,02; 43,64]	[45,81; 46,43]	[48,34; 48,97]	[50,78; 51,40]	[52,90; 53,52]	[54,72; 55,34]								
	davon wegen Tod	Anzahl	575	2000	3458	4630	5825	7059	8369	9499	10623	11664	12735	13740	14742								
		Anteil in %	0,58	2,03	3,51	4,70	5,91	7,16	8,49	9,63	10,77	11,83	12,92	13,93	14,95								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	9221	15073	18210	20233	21870	23545	25282	26747	28039	29253	30336	31200	31825								
		Anteil in %	9,35	15,29	18,47	20,52	22,18	23,88	25,64	27,13	28,44	29,67	30,77	31,64	32,28								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	395	1232	2246	3199	3815	4131	4593	4945	5188	5374	5538	5704	5824								
		Anteil in %	0,40	1,25	2,28	3,24	3,87	4,19	4,66	5,02	5,26	5,45	5,62	5,78	5,91								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	210	559	859	1028	1218	1352	1444	1533	1628	1685	1767	1826	1872								
		Anteil in %	0,21	0,57	0,87	1,04	1,24	1,37	1,46	1,55	1,65	1,71	1,79	1,85	1,90								
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133	46133						
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133	44340							
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	10767	19948	26202	30935	34937	38728	42808	46431	49683	52816	55637	58128	60123								
		Anteil in %	9,57	17,73	23,29	27,50	31,05	34,42	38,05	41,27	44,16	46,94	49,45	51,66	53,44								
		CI Anteil in %	[9,40; 9,74]	[17,51; 17,95]	[23,04; 23,54]	[27,23; 27,76]	[30,78; 31,32]	[34,14; 34,70]	[37,76; 38,33]	[40,98; 41,56]	[43,87; 44,45]	[46,65; 47,23]	[49,16; 49,74]	[51,37; 51,96]	[53,15; 53,73]								
		davon wegen Tod	Anzahl	626	2094	3546	4807	6107	7369	8749	9982	11129	12284	13436	14491	15525							
			Anteil in %	0,56	1,86	3,15	4,27	5,43	6,55	7,78	8,87	9,89	10,92	11,94	12,88	13,80							
davon wegen Ausschluss		Anzahl	9529	16085	19617	21978	23888	25895	27938	29849	31548	33220	34626	35847	36555								
		Anteil in %	8,47	14,30	17,44	19,53	21,23	23,02	24,83	26,53	28,04	29,53	30,78	31,86	32,49								
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	363	1158	2079	3015	3589	3943	4477	4839	5141	5365	5538	5690	5875								
		Anteil in %	0,32	1,03	1,85	2,68	3,19	3,50	3,98	4,30	4,57	4,77	4,92	5,06	5,22								
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	249	611	960	1135	1353	1521	1644	1761	1865	1947	2037	2100	2168								
		Anteil in %	0,22	0,54	0,85	1,01	1,20	1,35	1,46	1,57	1,66	1,73	1,81	1,87	1,93								
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383	54383							
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383	52388								

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	8304	15876	21160	25328	29201	33163	36394	39451	42175	44636	46882	48798								
		Anteil in %	8,83	16,89	22,51	26,94	31,06	35,27	38,71	41,96	44,86	47,48	49,86	51,90								
		CI Anteil in %	[8,65; 9,01]	[16,65; 17,13]	[22,24; 22,77]	[26,66; 27,22]	[30,76; 31,35]	[34,97; 35,58]	[38,40; 39,02]	[41,64; 42,28]	[44,54; 45,18]	[47,16; 47,79]	[49,54; 50,18]	[51,58; 52,22]								
	davon wegen Tod	Anzahl	535	2010	3264	4493	5787	7114	8228	9383	10471	11559	12609	13686								
		Anteil in %	0,57	2,14	3,47	4,78	6,16	7,57	8,75	9,98	11,14	12,29	13,41	14,56								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	7175	11715	14387	16351	18376	20329	21960	23481	24836	25963	26939	27568								
		Anteil in %	7,63	12,46	15,30	17,39	19,54	21,62	23,36	24,97	26,42	27,61	28,65	29,32								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	482	1702	2775	3489	3876	4437	4820	5095	5307	5467	5636	5788								
		Anteil in %	0,51	1,81	2,95	3,71	4,12	4,72	5,13	5,42	5,64	5,81	5,99	6,16								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	112	449	734	995	1162	1283	1386	1492	1561	1647	1698	1756								
		Anteil %	0,12	0,48	0,78	1,06	1,24	1,36	1,47	1,59	1,66	1,75	1,81	1,87								
	<i>männl. Pat. insgesamt:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>94020</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>							
		<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>	<i>45222</i>							
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	8550	16403	22223	26801	31024	35503	39222	42695	45802	48633	51167	53282								
Anteil in %		8,04	15,42	20,89	25,20	29,17	33,38	36,87	40,14	43,06	45,72	48,10	50,09									
CI Anteil in %		[7,87; 8,20]	[15,20; 15,64]	[20,65; 21,14]	[24,94; 25,46]	[28,89; 29,44]	[33,09; 33,66]	[36,58; 37,16]	[39,84; 40,43]	[42,76; 43,36]	[45,42; 46,02]	[47,80; 48,40]	[49,79; 50,39]									
davon wegen Tod	Anzahl	491	2012	3293	4550	5795	7179	8310	9479	10602	11668	12716	13799									
	Anteil in %	0,46	1,89	3,10	4,28	5,45	6,75	7,81	8,91	9,97	10,97	11,95	12,97									
davon wegen Ausschluss	Anzahl	7441	12209	15324	17623	20008	22284	24346	26198	27837	29314	30534	31337									
	Anteil in %	7,00	11,48	14,41	16,57	18,81	20,95	22,89	24,63	26,17	27,56	28,71	29,46									
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	508	1630	2724	3416	3798	4475	4863	5176	5427	5616	5803	5961									
	Anteil in %	0,48	1,53	2,56	3,21	3,57	4,21	4,57	4,87	5,10	5,28	5,46	5,60									
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	110	552	882	1212	1423	1565	1703	1842	1936	2035	2114	2185									
	Anteil %	0,10	0,52	0,83	1,14	1,34	1,47	1,60	1,73	1,82	1,91	1,99	2,05									
<i>weibl. Pat. insgesamt:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>106368</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>								
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>	<i>53086</i>								
2007-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	9133	16329	21744	26347	31223	35189	38843	41975	44727	47274	49386									
		Anteil in %	9,22	16,49	21,96	26,61	31,53	35,54	39,23	42,39	45,17	47,74	49,88									
		CI Anteil in %	[9,04; 9,40]	[16,26; 16,72]	[21,70; 22,22]	[26,33; 26,88]	[31,24; 31,82]	[35,24; 35,84]	[38,93; 39,53]	[42,09; 42,70]	[44,86; 45,48]	[47,43; 48,06]	[49,57; 50,19]									
	davon wegen Tod	Anzahl	502	1830	3196	4541	5960	7197	8535	9666	10819	11890	12974									
		Anteil in %	0,51	1,85	3,23	4,59	6,02	7,27	8,62	9,76	10,93	12,01	13,10									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	7688	11791	14420	16865	19391	21429	23286	24895	26192	27333	28073									
		Anteil in %	7,76	11,91	14,56	17,03	19,58	21,64	23,52	25,14	26,45	27,61	28,35									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	826	2254	3320	3894	4665	5232	5588	5884	6095	6345	6556									
		Anteil in %	0,83	2,28	3,35	3,93	4,71	5,28	5,64	5,94	6,16	6,41	6,62									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	117	454	808	1047	1207	1331	1434	1530	1621	1706	1783									
		Anteil %	0,12	0,46	0,82	1,06	1,22	1,34	1,45	1,55	1,64	1,72	1,80									
	<i>männl. Pat. insgesamt:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>								
		<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>	<i>49628</i>								
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	9120	16701	22724	27929	33258	37648	41686	45404	48660	51554	53996									
Anteil in %		8,13	14,88	20,25	24,89	29,64	33,55	37,15	40,46	43,36	45,94	48,12										
CI Anteil in %		[7,97; 8,29]	[14,67; 15,09]	[20,02; 20,49]	[24,64; 25,14]	[29,37; 29,91]	[33,27; 33,83]	[36,87; 37,43]	[40,17; 40,75]	[43,07; 43,65]	[45,65; 46,23]	[47,83; 48,41]										
davon wegen Tod	Anzahl	490	1883	3285	4619	6106	7359	8634	9856	11070	12174	13333										
	Anteil in %	0,44	1,68	2,93	4,12	5,44	6,56	7,69	8,78	9,87	10,85	11,88										
davon wegen Ausschluss	Anzahl	7681	12078	15148	18124	20861	23276	25494	27532	29217	30619	31543										
	Anteil in %	6,84	10,76	13,50	16,15	18,59	20,74	22,72	24,54	26,04	27,29	28,11										
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	785	2188	3299	3894	4774	5359	5742	6051	6283	6557	6810										
	Anteil in %	0,70	1,95	2,94	3,47	4,25	4,78	5,12	5,39	5,60	5,84	6,07										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	164	552	992	1292	1517	1654	1816	1965	2090	2204	2310										
	Anteil %	0,15	0,49	0,88	1,15	1,35	1,47	1,62	1,75	1,86	1,96	2,06										
<i>weibl. Pat. insgesamt:</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>									
	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>	<i>58218</i>									

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2007-2	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	8033	14357	19772	25301	29408	33140	36411	39192	41665	43759										
		Anteil in %	8,77	15,67	21,59	27,62	32,11	36,18	39,75	42,79	45,49	47,77										
		CI Anteil in %	[8,59; 8,95]	[15,44; 15,91]	[21,32; 21,85]	[27,33; 27,91]	[31,80; 32,41]	[35,87; 36,49]	[39,43; 40,07]	[42,47; 43,11]	[45,17; 45,81]	[47,45; 48,10]										
	davon wegen Tod	Anzahl	510	1871	3270	4658	5844	7040	8197	9295	10295	11361										
		Anteil in %	0,56	2,04	3,57	5,09	6,38	7,69	8,95	10,15	11,24	12,40										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	6296	9761	12796	15648	17834	19890	21583	22969	24148	24891										
		Anteil in %	6,87	10,66	13,97	17,08	19,47	21,71	23,56	25,08	26,36	27,17										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1101	2314	3076	4179	4799	5181	5513	5737	5971	6202										
		Anteil in %	1,20	2,53	3,36	4,56	5,24	5,66	6,02	6,26	6,52	6,77										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	126	411	630	816	931	1029	1118	1191	1251	1305										
		Anteil %	0,14	0,45	0,69	0,89	1,02	1,12	1,22	1,30	1,37	1,42										
	männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931	47837									
	insgesamt: am Ende des Halbjahres	Anzahl	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931	47837										
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	8168	14736	20539	26408	31032	35176	38928	42067	44924	47162										
		Anteil in %	7,92	14,29	19,91	25,60	30,09	34,11	37,74	40,79	43,56	45,73										
		CI Anteil in %	[7,75; 8,08]	[14,07; 14,50]	[19,67; 20,16]	[25,34; 25,87]	[29,81; 30,37]	[33,82; 34,40]	[37,45; 38,04]	[40,49; 41,09]	[43,25; 43,86]	[45,42; 46,03]										
		davon wegen Tod	Anzahl	513	1880	3308	4731	5895	7187	8343	9411	10419	11493									
			Anteil in %	0,50	1,82	3,21	4,59	5,72	6,97	8,09	9,12	10,10	11,14									
		davon wegen Ausschluss	Anzahl	6384	10168	13492	16550	19207	21493	23550	25264	26748	27589									
			Anteil in %	6,19	9,86	13,08	16,05	18,62	20,84	22,83	24,50	25,93	26,75									
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	1147	2242	3020	4201	4877	5307	5732	5982	6262	6513										
		Anteil in %	1,11	2,17	2,93	4,07	4,73	5,15	5,56	5,80	6,07	6,31										
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	124	446	719	926	1053	1189	1303	1410	1495	1567										
		Anteil %	0,12	0,43	0,70	0,90	1,02	1,15	1,26	1,37	1,45	1,52										
weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres		Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214										
insgesamt: am Ende des Halbjahres	Anzahl	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214	55976											
2008-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	8281	15583	23510	29017	33552	37441	40791	43816	46175											
		Anteil in %	8,31	15,65	23,60	29,13	33,69	37,59	40,96	43,99	46,36											
		CI Anteil in %	[8,14; 8,49]	[15,42; 15,87]	[23,34; 23,87]	[28,85; 29,42]	[33,39; 33,98]	[37,29; 37,89]	[40,65; 41,26]	[43,68; 44,30]	[46,05; 46,67]											
	davon wegen Tod	Anzahl	558	1964	3540	4819	6122	7315	8491	9630	10693											
		Anteil in %	0,56	1,97	3,55	4,84	6,15	7,34	8,53	9,67	10,74											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	7188	11744	15984	19186	21784	23972	25764	27290	28260											
		Anteil in %	7,22	11,79	16,05	19,26	21,87	24,07	25,87	27,40	28,37											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	406	1486	3309	4192	4686	5075	5363	5634	5890											
		Anteil in %	0,41	1,49	3,32	4,21	4,70	5,10	5,38	5,66	5,91											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	129	389	677	820	960	1079	1173	1262	1332											
		Anteil %	0,13	0,39	0,68	0,82	0,96	1,08	1,18	1,27	1,34											
	männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783	53424										
	insgesamt: am Ende des Halbjahres	Anzahl	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783	53424											
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	8043	15611	23911	29626	34566	38680	42402	45675	48309											
		Anteil in %	7,32	14,20	21,76	26,96	31,45	35,19	38,58	41,56	43,96											
		CI Anteil in %	[7,16; 7,47]	[14,00; 14,41]	[21,51; 22,00]	[26,69; 27,22]	[31,18; 31,73]	[34,91; 35,48]	[38,29; 38,87]	[41,27; 41,85]	[43,66; 44,25]											
		davon wegen Tod	Anzahl	556	2016	3580	4900	6265	7402	8634	9751	10832										
			Anteil in %	0,51	1,83	3,26	4,46	5,70	6,74	7,86	8,87	9,86										
		davon wegen Ausschluss	Anzahl	6955	11862	16368	19669	22533	24988	27077	28807	29966										
			Anteil in %	6,33	10,79	14,89	17,90	20,50	22,74	24,64	26,21	27,27										
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	394	1316	3215	4138	4701	5121	5412	5727	6025											
		Anteil in %	0,36	1,20	2,93	3,77	4,28	4,66	4,92	5,21	5,48											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	138	417	748	919	1067	1169	1279	1390	1486											
		Anteil %	0,13	0,38	0,68	0,84	0,97	1,06	1,16	1,26	1,35											
weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres		Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228											
insgesamt: am Ende des Halbjahres	Anzahl	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228	61594												

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2008-2	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	6176	12286	16742	20179	23146	25577	27725	29500												
		Anteil in %	9,14	18,18	24,77	29,85	34,24	37,84	41,02	43,64												
		CI Anteil in %	[8,92; 9,35]	[17,88; 18,47]	[24,44; 25,09]	[29,51; 30,20]	[33,88; 34,60]	[37,47; 38,20]	[40,64; 41,39]	[43,27; 44,02]												
	davon wegen Tod	Anzahl	375	1459	2443	3363	4218	5027	5775	6570												
		Anteil in %	0,55	2,16	3,61	4,98	6,24	7,44	8,54	9,72												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	5471	9281	11947	13944	15604	16948	18060	18791												
		Anteil in %	8,09	13,73	17,67	20,63	23,08	25,07	26,72	27,80												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	263	1307	1997	2422	2784	2997	3239	3440												
		Anteil in %	0,39	1,93	2,95	3,58	4,12	4,43	4,79	5,09												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	67	239	355	450	540	605	651	699												
		Anteil %	0,10	0,35	0,53	0,67	0,80	0,90	0,96	1,03												
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871											
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871	38096											
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	6135	12207	16852	20466	23697	26268	28637	30548												
		Anteil in %	8,27	16,46	22,72	27,60	31,95	35,42	38,61	41,19												
CI Anteil in %		[8,07; 8,47]	[16,19; 16,73]	[22,42; 23,02]	[27,27; 27,92]	[31,62; 32,29]	[35,07; 35,76]	[38,26; 38,96]	[40,84; 41,54]													
davon wegen Tod	Anzahl	343	1459	2451	3373	4224	5036	5830	6641													
	Anteil in %	0,46	1,97	3,30	4,55	5,70	6,79	7,86	8,95													
davon wegen Ausschluss	Anzahl	5511	9308	12085	14243	16184	17629	18870	19713													
	Anteil in %	7,43	12,55	16,29	19,20	21,82	23,77	25,44	26,58													
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	213	1170	1894	2314	2646	2876	3142	3343													
	Anteil in %	0,29	1,58	2,55	3,12	3,57	3,88	4,24	4,51													
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	68	270	422	536	643	727	795	851													
	Anteil %	0,09	0,36	0,57	0,72	0,87	0,98	1,07	1,15													
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527	43616												
2009-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7718	13954	18625	22231	25287	27834	29890													
		Anteil in %	10,68	19,31	25,77	30,76	34,98	38,51	41,35													
		CI Anteil in %	[10,45; 10,90]	[19,02; 19,59]	[25,45; 26,09]	[30,42; 31,09]	[34,64; 35,33]	[38,15; 38,86]	[40,99; 41,71]													
	davon wegen Tod	Anzahl	385	1473	2484	3447	4345	5162	5954													
		Anteil in %	0,53	2,04	3,44	4,77	6,01	7,14	8,24													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	7019	11094	14051	16199	17992	19401	20373													
		Anteil in %	9,71	15,35	19,44	22,41	24,89	26,84	28,19													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	238	1176	1762	2141	2412	2681	2915													
		Anteil in %	0,33	1,63	2,44	2,96	3,34	3,71	4,03													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	76	211	328	444	538	590	648													
		Anteil %	0,11	0,29	0,45	0,61	0,74	0,82	0,90													
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446	42390											
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	64562	58326	53655	50049	46993	44446	42390												
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	7419	13518	18302	22163	25292	27878	29983													
		Anteil in %	9,64	17,57	23,78	28,80	32,87	36,23	38,96													
CI Anteil in %		[9,43; 9,85]	[17,30; 17,83]	[23,48; 24,08]	[28,48; 29,12]	[32,53; 33,20]	[35,89; 36,57]	[38,62; 39,31]														
davon wegen Tod	Anzahl	434	1463	2469	3412	4259	4995	5762														
	Anteil in %	0,56	1,90	3,21	4,43	5,53	6,49	7,49														
davon wegen Ausschluss	Anzahl	6694	10687	13714	16093	17992	19512	20528														
	Anteil in %	8,70	13,89	17,82	20,91	23,38	25,35	26,67														
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	220	1112	1709	2139	2420	2684	2935														
	Anteil in %	0,29	1,44	2,22	2,78	3,14	3,49	3,81														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	71	256	410	519	621	687	758														
	Anteil %	0,09	0,33	0,53	0,67	0,81	0,89	0,98														
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078	46973												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	69537	63438	58654	54793	51664	49078	46973													

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2009-2	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	6894	12799	17179	20354	23021	25107														
		Anteil in %	10,40	19,30	25,91	30,70	34,72	37,87														
		CI Anteil in %	[10,17; 10,63]	[19,00; 19,60]	[25,58; 26,24]	[30,35; 31,05]	[34,36; 35,08]	[37,50; 38,24]														
	davon wegen Tod	Anzahl	431	1460	2410	3243	4039	4827														
		Anteil in %	0,65	2,20	3,63	4,89	6,09	7,28														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	6146	10104	12887	14831	16318	17296														
		Anteil in %	9,27	15,24	19,44	22,37	24,61	26,09														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	240	1008	1554	1879	2196	2453														
		Anteil in %	0,36	1,52	2,34	2,83	3,31	3,70														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	77	227	328	401	468	531														
		Anteil %	0,12	0,34	0,49	0,60	0,71	0,80														
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	66301 59407	59407 53502	53502 49122	49122 45947	45947 43280	43280 41194													
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	6726	12554	16976	20498	23455	25562														
		Anteil in %	9,35	17,46	23,61	28,51	32,62	35,55														
		CI Anteil in %	[9,14; 9,57]	[17,18; 17,74]	[23,30; 23,92]	[28,18; 28,84]	[32,28; 32,96]	[35,20; 35,90]														
		davon wegen Tod	Anzahl	410	1444	2396	3315	4110	4840													
			Anteil in %	0,57	2,01	3,33	4,61	5,72	6,73													
davon wegen Ausschluss		Anzahl	5991	9894	12704	14876	16628	17695														
		Anteil in %	8,33	13,76	17,67	20,69	23,13	24,61														
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	241	958	1498	1821	2129	2373														
		Anteil in %	0,34	1,33	2,08	2,53	2,96	3,30														
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	84	258	378	486	588	654														
	Anteil %	0,12	0,36	0,53	0,68	0,82	0,91															
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	71902 65176	65176 59348	59348 54926	54926 51404	51404 48447	48447 46340														
2010-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7722	14082	18900	22550	25170															
		Anteil in %	10,16	18,53	24,87	29,67	33,11															
		CI Anteil in %	[9,94; 10,37]	[18,25; 18,80]	[24,56; 25,17]	[29,34; 29,99]	[32,78; 33,45]															
	davon wegen Tod	Anzahl	388	1413	2495	3399	4303															
		Anteil in %	0,51	1,86	3,28	4,47	5,66															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	7022	11358	14429	16622	17900															
		Anteil in %	9,24	14,94	18,98	21,87	23,55															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	232	1078	1602	2061	2397															
		Anteil in %	0,31	1,42	2,11	2,71	3,15															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	80	233	374	468	570															
		Anteil %	0,11	0,31	0,49	0,62	0,75															
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	76010 68288	68288 61928	61928 57110	57110 53460	53460 50840														
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	7088	13231	17944	21679	24377															
		Anteil in %	8,86	16,53	22,42	27,08	30,45															
		CI Anteil in %	[8,66; 9,05]	[16,27; 16,79]	[22,13; 22,71]	[26,78; 27,39]	[30,14; 30,77]															
		davon wegen Tod	Anzahl	367	1387	2377	3273	4130														
			Anteil in %	0,46	1,73	2,97	4,09	5,16														
davon wegen Ausschluss		Anzahl	6421	10587	13658	15978	17361															
		Anteil in %	8,02	13,23	17,06	19,96	21,69															
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	211	988	1487	1909	2255															
		Anteil in %	0,26	1,23	1,86	2,38	2,82															
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	89	269	422	519	631															
	Anteil %	0,11	0,34	0,53	0,65	0,79																
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	80044 72956	72956 66813	66813 62100	62100 58365	58365 55667															

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2010-2	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	6729	12437	16553	19540																
		Anteil in %	9,85	18,20	24,22	28,59																
		CI Anteil in %	[9,62; 10,07]	[17,91; 18,49]	[23,90; 24,54]	[28,25; 28,93]																
	davon wegen Tod	Anzahl	400	1346	2234	3194																
		Anteil in %	0,59	1,97	3,27	4,67																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	6002	10005	12565	14089																
		Anteil in %	8,78	14,64	18,39	20,62																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	236	860	1391	1802																
		Anteil in %	0,35	1,26	2,04	2,64																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	91	226	363	455																
		Anteil %	0,13	0,33	0,53	0,67																
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	68337 61608	61608 55900	55900 51784	51784 48797															
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	6465	12162	16499	19372																
			Anteil in %	8,81	16,57	22,48	26,39															
		CI Anteil in %	[8,60; 9,01]	[16,30; 16,84]	[22,17; 22,78]	[26,07; 26,71]																
			davon wegen Tod	Anzahl	438	1433	2344	3175														
Anteil in %		0,60		1,95	3,19	4,33																
davon wegen Ausschluss		Anzahl	5724	9684	12382	13913																
		Anteil in %	7,80	13,19	16,87	18,95																
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	210	775	1352	1763																
		Anteil in %	0,29	1,06	1,84	2,40																
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	93	270	421	521																
	Anteil %	0,13	0,37	0,57	0,71																	
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	73408 66943	66943 61246	61246 56909	56909 54036																
2011-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	7554	13618	17513																	
		Anteil in %	10,19	18,37	23,62																	
		CI Anteil in %	[9,97; 10,41]	[18,09; 18,65]	[23,32; 23,93]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	405	1446	2370																	
		Anteil in %	0,55	1,95	3,20																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	6830	10826	13031																	
		Anteil in %	9,21	14,60	17,58																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	252	1105	1748																	
		Anteil in %	0,34	1,49	2,36																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	67	241	364																	
		Anteil %	0,09	0,33	0,49																	
	männl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	74139 66585	66585 60521	60521 56626	56626															
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	6956	12904	16882																	
			Anteil in %	8,75	16,23	21,23																
		CI Anteil in %	[8,55; 8,94]	[15,97; 16,48]	[20,95; 21,52]																	
			davon wegen Tod	Anzahl	383	1378	2355															
Anteil in %		0,48		1,73	2,96																	
davon wegen Ausschluss		Anzahl	6265	10328	12535																	
		Anteil in %	7,88	12,99	15,76																	
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	215	936	1575																	
		Anteil in %	0,27	1,18	1,98																	
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	93	262	417																	
	Anteil %	0,12	0,33	0,52																		
weibl. Pat. insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres am Ende des Halbjahres	Anzahl	79514 72558	72558 66610	66610 62632	62632																

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2011-2	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	6509	11476																	
		Anteil in %	9,68	17,07																	
		CI Anteil in %	[9,46; 9,91]	[16,79; 17,35]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	403	1382																	
		Anteil in %	0,60	2,06																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	5785	8887																	
		Anteil in %	8,60	13,22																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	256	1004																	
		Anteil in %	0,38	1,49																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	65	203																	
		Anteil %	0,10	0,30																	
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																	
	<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>60721</i>	<i>55754</i>																	
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	5968	10981																	
Anteil in %		8,24	15,15																		
CI Anteil in %		[8,04; 8,44]	[14,89; 15,41]																		
davon wegen Tod	Anzahl	397	1378																		
	Anteil in %	0,55	1,90																		
davon wegen Ausschluss	Anzahl	5283	8394																		
	Anteil in %	7,29	11,58																		
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	224	987																		
	Anteil in %	0,31	1,36																		
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	64	222																		
	Anteil %	0,09	0,31																		
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																		
<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66497</i>	<i>61484</i>																		
2012-1	ausgeschiedene männliche Patienten insgesamt	Anzahl	5520																		
		Anteil in %	7,39																		
		CI Anteil in %	[7,20; 7,58]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	406																		
		Anteil in %	0,54																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	4775																		
		Anteil in %	6,39																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	266																		
		Anteil in %	0,36																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	73																		
		Anteil %	0,10																		
	<i>männl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																		
	<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>69194</i>																		
	ausgeschiedene weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	4996																		
Anteil in %		6,42																			
CI Anteil in %		[6,24; 6,59]																			
davon wegen Tod	Anzahl	408																			
	Anteil in %	0,52																			
davon wegen Ausschluss	Anzahl	4276																			
	Anteil in %	5,49																			
davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	254																			
	Anteil in %	0,33																			
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	58																			
	Anteil %	0,07																			
<i>weibl. Pat. zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																			
<i>insgesamt: am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72883</i>																			

In Tabelle 1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebens-

jahren zum 1.1 des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2003-1	männliche Patienten	Mean	65,80
		CI Mean	[65,65; 65,96]
		Median	66,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>16899</i>
	weibliche Patienten	Mean	70,25
		CI Mean	[70,12; 70,37]
Median		71,00	
	<i>Fallbasis</i>	<i>23425</i>	
2003-2	männliche Patienten	Mean	64,46
		CI Mean	[64,40; 64,52]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>113351</i>
	weibliche Patienten	Mean	68,47
		CI Mean	[68,42; 68,53]
Median		69,00	
	<i>Fallbasis</i>	<i>142866</i>	
2004-1	männliche Patienten	Mean	64,85
		CI Mean	[64,79; 64,90]
		Median	66,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>135113</i>
	weibliche Patienten	Mean	68,88
		CI Mean	[68,83; 68,93]
Median		70,00	
	<i>Fallbasis</i>	<i>163432</i>	
2004-2	männliche Patienten	Mean	63,69
		CI Mean	[63,62; 63,75]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>98842</i>
	weibliche Patienten	Mean	67,89
		CI Mean	[67,83; 67,96]
Median		69,00	
	<i>Fallbasis</i>	<i>115970</i>	
2005-1	männliche Patienten	Mean	63,98
		CI Mean	[63,91; 64,04]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>105631</i>
	weibliche Patienten	Mean	68,08
		CI Mean	[68,02; 68,15]
Median		69,00	
	<i>Fallbasis</i>	<i>123470</i>	

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr	
2005-2	männliche Patienten	Mean	63,23
		CI Mean	[63,16; 63,31]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>82253</i>
	weibliche Patienten	Mean	67,22
		CI Mean	[67,15; 67,30]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>95017</i>
2006-1	männliche Patienten	Mean	64,02
		CI Mean	[63,95; 64,08]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>98603</i>
	weibliche Patienten	Mean	68,12
		CI Mean	[68,05; 68,18]
		Median	70,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>112511</i>
2006-2	männliche Patienten	Mean	63,56
		CI Mean	[63,49; 63,63]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>94020</i>
	weibliche Patienten	Mean	67,63
		CI Mean	[67,56; 67,70]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>106368</i>
2007-1	männliche Patienten	Mean	63,75
		CI Mean	[63,68; 63,82]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>99014</i>
	weibliche Patienten	Mean	67,81
		CI Mean	[67,74; 67,88]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>112214</i>
2007-2	männliche Patienten	Mean	63,31
		CI Mean	[63,23; 63,38]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>91596</i>
	weibliche Patienten	Mean	67,36
		CI Mean	[67,28; 67,43]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>103138</i>
2008-1	männliche Patienten	Mean	63,48
		CI Mean	[63,41; 63,56]
		Median	65,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>99599</i>
	weibliche Patienten	Mean	67,56
		CI Mean	[67,49; 67,64]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>109903</i>

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr	
2008-2	männliche Patienten	Mean	62,69
		CI Mean	[62,60; 62,78]
		Median	64,00
		<i>Fallbasis</i>	67596
	weibliche Patienten	Mean	66,79
		CI Mean	[66,69; 66,88]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	74164
2009-1	männliche Patienten	Mean	62,83
		CI Mean	[62,74; 62,92]
		Median	64,00
		<i>Fallbasis</i>	72280
	weibliche Patienten	Mean	66,92
		CI Mean	[66,83; 67,01]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	76956
2009-2	männliche Patienten	Mean	62,35
		CI Mean	[62,26; 62,44]
		Median	64,00
		<i>Fallbasis</i>	66301
	weibliche Patienten	Mean	66,36
		CI Mean	[66,26; 66,45]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	71902
2010-1	männliche Patienten	Mean	62,81
		CI Mean	[62,72; 62,89]
		Median	64,00
		<i>Fallbasis</i>	76010
	weibliche Patienten	Mean	66,78
		CI Mean	[66,69; 66,87]
		Median	69,00
		<i>Fallbasis</i>	80044
2010-2	männliche Patienten	Mean	62,25
		CI Mean	[62,15; 62,34]
		Median	63,00
		<i>Fallbasis</i>	68337
	weibliche Patienten	Mean	65,98
		CI Mean	[65,88; 66,07]
		Median	68,00
		<i>Fallbasis</i>	73408
2011-1	männliche Patienten	Mean	62,67
		CI Mean	[62,58; 62,76]
		Median	63,00
		<i>Fallbasis</i>	74139
	weibliche Patienten	Mean	66,28
		CI Mean	[66,19; 66,37]
		Median	68,00
		<i>Fallbasis</i>	79514

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr	
2011-2	männliche Patienten	Mean	62,21
		CI Mean	[62,12; 62,31]
		Median	63,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>67230</i>
	weibliche Patienten	Mean	65,92
		CI Mean	[65,82; 66,02]
		Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>72465</i>	
2012-1	männliche Patienten	Mean	62,46
		CI Mean	[62,37; 62,55]
		Median	63,00
		<i>Fallbasis</i>	<i>74714</i>
	weibliche Patienten	Mean	66,03
		CI Mean	[65,94; 66,13]
		Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>77879</i>	

In Tabelle 1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitritts halbjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter

in vollendeten Lebensjahren zum 1.1 des Beitritts halbjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitritts halbjahres

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres	Beitritts halbjahr	
2003-1	männliche Patienten	bis 50	1398
		51 bis 60	2840
		61 bis 70	7087
		71 bis 80	4582
		81 und älter	992
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	16899
	weibliche Patienten	bis 50	1044
		51 bis 60	2223
		61 bis 70	7864
		71 bis 80	8973
81 und älter		3319	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	23423	
2003-2	männliche Patienten	bis 50	11312
		51 bis 60	21711
		61 bis 70	48334
		71 bis 80	27485
		81 und älter	4501
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	113343
	weibliche Patienten	bis 50	9031
		51 bis 60	17921
		61 bis 70	50526
		71 bis 80	49885
81 und älter		15492	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	142855	
2004-1	männliche Patienten	bis 50	12777
		51 bis 60	26416
		61 bis 70	55541
		71 bis 80	34046
		81 und älter	6328
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	135108
	weibliche Patienten	bis 50	10149
		51 bis 60	21345
		61 bis 70	54449
		71 bis 80	56239
81 und älter		21243	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	163425	
2004-2	männliche Patienten	bis 50	11855
		51 bis 60	21142
		61 bis 70	39338
		71 bis 80	22639
		81 und älter	3859
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	98833
	weibliche Patienten	bis 50	9039
		51 bis 60	16440
		61 bis 70	39388
		71 bis 80	37853
81 und älter		13240	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	115960	

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2005-1	männliche Patienten	bis 50	12704
		51 bis 60	22243
		61 bis 70	41164
		71 bis 80	24950
		81 und älter	4564
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	105625
	weibliche Patienten	bis 50	9803
		51 bis 60	17743
		61 bis 70	40329
		71 bis 80	40462
81 und älter		15124	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	123461	
2005-2	männliche Patienten	bis 50	11213
		51 bis 60	18128
		61 bis 70	31606
		71 bis 80	18040
		81 und älter	3255
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	82242
	weibliche Patienten	bis 50	8796
		51 bis 60	14859
		61 bis 70	31245
		71 bis 80	29592
81 und älter		10513	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	95005	
2006-1	männliche Patienten	bis 50	12509
		51 bis 60	20838
		61 bis 70	36246
		71 bis 80	24259
		81 und älter	4740
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	98592
	weibliche Patienten	bis 50	9453
		51 bis 60	16882
		61 bis 70	34377
		71 bis 80	36626
81 und älter		15163	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	112501	
2006-2	männliche Patienten	bis 50	12737
		51 bis 60	20377
		61 bis 70	34625
		71 bis 80	22377
		81 und älter	3892
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	94008
	weibliche Patienten	bis 50	9512
		51 bis 60	16452
		61 bis 70	32997
		71 bis 80	34684
81 und älter		12709	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	106354	
2007-1	männliche Patienten	bis 50	13632
		51 bis 60	21930
		61 bis 70	34022
		71 bis 80	24664
		81 und älter	4756
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	99004
	weibliche Patienten	bis 50	10205
		51 bis 60	18099
		61 bis 70	32252
		71 bis 80	36968
81 und älter		14677	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	112201	

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2007-2	männliche Patienten	bis 50	13723
		51 bis 60	20646
		61 bis 70	30814
		71 bis 80	22257
		81 und älter	4140
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	91580
	weibliche Patienten	bis 50	10349
		51 bis 60	17061
		61 bis 70	29621
		71 bis 80	32972
81 und älter		13106	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	103109	
2008-1	männliche Patienten	bis 50	14958
		51 bis 60	22866
		61 bis 70	31888
		71 bis 80	24749
		81 und älter	5128
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	99589
	weibliche Patienten	bis 50	11210
		51 bis 60	18509
		61 bis 70	29706
		71 bis 80	35325
81 und älter		15135	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	109885	
2008-2	männliche Patienten	bis 50	11512
		51 bis 60	15916
		61 bis 70	21116
		71 bis 80	15925
		81 und älter	3115
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	67584
	weibliche Patienten	bis 50	8651
		51 bis 60	13149
		61 bis 70	19661
		71 bis 80	23199
81 und älter		9482	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	74142	
2009-1	männliche Patienten	bis 50	12364
		51 bis 60	17261
		61 bis 70	21531
		71 bis 80	17197
		81 und älter	3914
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	72267
	weibliche Patienten	bis 50	9105
		51 bis 60	13822
		61 bis 70	19683
		71 bis 80	23761
81 und älter		10558	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	76929	
2009-2	männliche Patienten	bis 50	12095
		51 bis 60	16098
		61 bis 70	19616
		71 bis 80	15113
		81 und älter	3359
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	66281
	weibliche Patienten	bis 50	9245
		51 bis 60	13399
		61 bis 70	18236
		71 bis 80	21678
81 und älter		9321	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	71879	

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr	
2010-1	männliche Patienten	bis 50	13222
		51 bis 60	18335
		61 bis 70	21792
		71 bis 80	18351
		81 und älter	4295
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	75995
	weibliche Patienten	bis 50	9645
		51 bis 60	14578
		61 bis 70	20138
		71 bis 80	24977
81 und älter		10681	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	80019	
2010-2	männliche Patienten	bis 50	12564
		51 bis 60	17044
		61 bis 70	19491
		71 bis 80	15744
		81 und älter	3477
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	68320
	weibliche Patienten	bis 50	10067
		51 bis 60	13787
		61 bis 70	18518
		71 bis 80	21677
81 und älter		9332	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	73381	
2011-1	männliche Patienten	bis 50	13198
		51 bis 60	18028
		61 bis 70	20712
		71 bis 80	17834
		81 und älter	4346
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	74118
	weibliche Patienten	bis 50	10346
		51 bis 60	15047
		61 bis 70	19421
		71 bis 80	24176
81 und älter		10498	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	79488	
2011-2	männliche Patienten	bis 50	12694
		51 bis 60	16561
		61 bis 70	18344
		71 bis 80	16062
		81 und älter	3554
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	67215
	weibliche Patienten	bis 50	9994
		51 bis 60	13909
		61 bis 70	17321
		71 bis 80	21884
81 und älter		9328	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	72436	
2012-1	männliche Patienten	bis 50	13715
		51 bis 60	18471
		61 bis 70	19843
		71 bis 80	18091
		81 und älter	4574
	männliche Patienten zusammen	Anzahl	74694
	weibliche Patienten	bis 50	10637
		51 bis 60	14877
		61 bis 70	18380
		71 bis 80	23330
81 und älter		10626	
weibliche Patienten zusammen	Anzahl	77850	

In Tabelle 1.6 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **über alle Kohorten und alle Folgehalbjahre**. In diese Auswertung fließen alle Patienten unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet

zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	Folgehalbjahre	
Kohorte	männliche Patienten insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	5,65
		Median	4,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>9018721</i>
	weibliche Patienten insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	5,90
		Median	5,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>10675236</i>

In Tabelle 1.7 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **pro Kohorte und über alle Folgehalbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
2003-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,60
		Median	6,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>103632</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,99
		Median	7,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>151091</i>	
2003-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,59
		Median	3,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>747061</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,76
		Median	3,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>965832</i>	
2004-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,23
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>1111430</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,39
		Median	7,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>1371684</i>	
2004-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,00
		Median	7,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>790539</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,21
		Median	8,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>951925</i>	
2005-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,03
		Median	9,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>848058</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,30
		Median	10,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>1024292</i>	
2005-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,85
		Median	9,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>645993</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,09
		Median	10,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>768497</i>	
2006-1	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,63
		Median	10,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>752581</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,85
		Median	11,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>883112</i>	
2006-2	männliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,36
		Median	11,00
	<i>Halbjahressumme</i>		<i>691650</i>
	weibliche Patient* insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,54
		Median	11,00
<i>Halbjahressumme</i>		<i>802025</i>	

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	Folgehalbjahre
2007-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 6,84 Median 10,00
	<i>Halbjahressumme</i> 677356	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 7,02 Median 10,00
	<i>Halbjahressumme</i> 787456	
2007-2	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 6,30 Median 9,00
	<i>Halbjahressumme</i> 577085	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 6,46 Median 9,00
	<i>Halbjahressumme</i> 666264	
2008-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,67 Median 8,00
	<i>Halbjahressumme</i> 564801	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,83 Median 8,00
	<i>Halbjahressumme</i> 640710	
2008-2	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,05 Median 7,00
	<i>Halbjahressumme</i> 341341	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 5,19 Median 7,00
	<i>Halbjahressumme</i> 384886	
2009-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 4,40 Median 6,00
	<i>Halbjahressumme</i> 318031	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 4,51 Median 6,00
	<i>Halbjahressumme</i> 347164	
2009-2	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 3,79 Median 5,00
	<i>Halbjahressumme</i> 251258	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 3,88 Median 5,00
	<i>Halbjahressumme</i> 279301	
2010-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 3,17 Median 4,00
	<i>Halbjahressumme</i> 240786	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 3,25 Median 4,00
	<i>Halbjahressumme</i> 260234	
2010-2	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 2,48 Median 3,00
	<i>Halbjahressumme</i> 169292	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 2,52 Median 3,00
	<i>Halbjahressumme</i> 185098	
2011-1	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 1,71 Median 2,00
	<i>Halbjahressumme</i> 127106	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 1,75 Median 2,00
	<i>Halbjahressumme</i> 139168	
2011-2	männliche Patient*in insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 0,90 Median 1,00
	<i>Halbjahressumme</i> 60721	
	weibliche Patient*innen insgesamt und ihre fallbezogene Beobachtungszeit	Mean 0,92 Median 1,00
	<i>Halbjahressumme</i> 66497	

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation

EZ	Patients ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2109	748	271	239	183	249	169	324	174	226	219	174	160	168	150	150	114	152
		Anteil in %		14,98	6,15	2,54	2,50	2,11	3,11	2,38	4,85	2,80	3,79	3,86	3,22	3,12	3,46	3,27	3,48	2,78	3,89
		CI Anteil in %		[14,39; 15,57]	[5,73; 6,58]	[2,25; 2,84]	[2,19; 2,81]	[1,81; 2,41]	[2,73; 3,49]	[2,02; 2,73]	[4,33; 5,36]	[2,39; 3,21]	[3,30; 4,27]	[3,36; 4,36]	[2,75; 3,69]	[2,65; 3,60]	[2,95; 3,98]	[2,75; 3,78]	[2,94; 4,03]	[2,28; 3,29]	[3,28; 4,49]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2910	1013	324	351	220	362	250	443	243	363	325	259	228	213	181	188	173	184
Anteil in %			14,72	5,88	2,13	2,54	1,73	3,08	2,39	4,52	2,65	4,14	3,92	3,29	3,07	3,03	2,72	3,00	2,89	3,23	
CI Anteil in %			[14,22; 15,21]	[5,53; 6,23]	[1,90; 2,35]	[2,28; 2,80]	[1,51; 1,96]	[2,77; 3,39]	[2,10; 2,68]	[4,11; 4,94]	[2,32; 2,98]	[3,72; 4,55]	[3,51; 4,34]	[2,89; 3,68]	[2,68; 3,46]	[2,63; 3,43]	[2,33; 3,11]	[2,58; 3,42]	[2,47; 3,32]	[2,77; 3,69]	
2003-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		8311	2751	1904	1355	1370	1124	1663	1506	1979	2431	1893	1614	1593	1581	1580	1495	1596	
		Anteil in %		9,44	3,75	3,02	2,46	2,76	2,50	3,96	3,76	5,16	6,60	5,35	4,80	4,96	5,15	5,40	5,35	5,97	
		CI Anteil in %		[9,25; 9,63]	[3,61; 3,89]	[2,89; 3,15]	[2,33; 2,59]	[2,62; 2,90]	[2,36; 2,64]	[3,77; 4,14]	[3,58; 3,95]	[4,94; 5,38]	[6,34; 6,85]	[5,12; 5,59]	[4,57; 5,03]	[4,72; 5,20]	[4,90; 5,40]	[5,14; 5,66]	[5,09; 5,62]	[5,69; 6,25]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	142866	112069	93979	81049	71389	64294	58333	54388	51899	49824	47865	45920	43703	41770	39917	38116	36445	34887	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		9813	3342	2356	1670	1622	1413	2150	1764	2409	3084	2430	2098	2099	1969	1967	1940	2070	
Anteil in %			8,76	3,56	2,91	2,34	2,52	2,42	3,95	3,40	4,84	6,44	5,29	4,80	5,03	4,93	5,16	5,32	5,93		
CI Anteil in %			[8,59; 8,92]	[3,44; 3,67]	[2,79; 3,02]	[2,23; 2,45]	[2,40; 2,64]	[2,30; 2,55]	[3,79; 4,12]	[3,24; 3,55]	[4,65; 5,02]	[6,22; 6,66]	[5,09; 5,50]	[4,60; 5,00]	[4,82; 5,23]	[4,72; 5,15]	[4,94; 5,38]	[5,09; 5,55]	[5,69; 6,18]		
2004-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		5244	3575	4625	2613	2219	3223	2821	3586	3996	3266	2951	3034	2921	3039	2860	2978		
		Anteil in %		4,47	3,44	5,07	3,14	2,91	4,51	4,13	5,47	6,35	5,41	5,11	5,49	5,52	6,02	5,92	6,44		
		CI Anteil in %		[4,35; 4,59]	[3,33; 3,55]	[4,92; 5,21]	[3,03; 3,26]	[2,79; 3,03]	[4,36; 4,66]	[3,98; 4,28]	[5,30; 5,65]	[6,16; 6,54]	[5,23; 5,59]	[4,93; 5,29]	[5,30; 5,68]	[5,33; 5,72]	[5,81; 6,23]	[5,71; 6,13]	[6,22; 6,67]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	163432	142749	126918	112329	102494	94300	88366	84645	81247	78247	75048	71529	68399	65504	62532	59887	57490		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6036	4330	5590	3288	2721	3979	3517	4336	4990	4309	3791	3789	3659	3720	3635	3751		
Anteil in %			4,23	3,41	4,98	3,21	2,89	4,50	4,16	5,34	6,38	5,74	5,30	5,54	5,59	5,95	6,07	6,52			
CI Anteil in %			[4,12; 4,33]	[3,31; 3,51]	[4,85; 5,10]	[3,10; 3,32]	[2,78; 2,99]	[4,37; 4,64]	[4,02; 4,29]	[5,18; 5,49]	[6,21; 6,55]	[5,58; 5,91]	[5,14; 5,46]	[5,37; 5,71]	[5,41; 5,76]	[5,76; 6,13]	[5,88; 6,26]	[6,32; 6,73]			
2004-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		4708	3771	2616	2227	3056	2745	3555	4017	3500	3150	3092	2991	3003	2888	3029			
		Anteil in %		5,40	4,96	3,87	3,66	5,42	5,11	6,93	8,17	7,43	7,02	7,22	7,29	7,66	7,70	8,43			
		CI Anteil in %		[5,25; 5,55]	[4,81; 5,12]	[3,73; 4,02]	[3,51; 3,81]	[5,23; 5,60]	[4,92; 5,29]	[6,71; 7,15]	[7,93; 8,42]	[7,20; 7,67]	[6,79; 7,26]	[6,97; 7,46]	[7,04; 7,54]	[7,40; 7,93]	[7,43; 7,97]	[8,14; 8,72]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		5404	4415	2835	2544	3498	3187	4304	4894	4280	3819	3812	3666	3674	3530	3636			
Anteil in %			5,25	4,88	3,51	3,48	5,14	4,90	6,92	8,21	7,49	7,02	7,34	7,38	7,74	7,76	8,35				
CI Anteil in %			[5,11; 5,38]	[4,74; 5,02]	[3,38; 3,64]	[3,35; 3,61]	[4,97; 5,30]	[4,74; 5,07]	[6,72; 7,12]	[7,99; 8,43]	[7,28; 7,71]	[6,81; 7,24]	[7,12; 7,56]	[7,15; 7,61]	[7,50; 7,98]	[7,52; 8,01]	[8,09; 8,61]				
2005-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	105631	93726	83366	74241	68487	64764	61675	58977	56190	53398	50980	48671	46510	44483	42590				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		4044	3438	2229	2998	2690	3455	4290	3058	2615	2593	2513	2509	2473	2514				
		Anteil in %		4,31	4,12	3,00	4,38	4,15	5,60	7,27	5,44	4,90	5,09	5,16	5,39	5,56	5,90				
		CI Anteil in %		[4,18; 4,44]	[3,99; 4,26]	[2,88; 3,13]	[4,22; 4,53]	[4,00; 4,31]	[5,42; 5,78]	[7,06; 7,48]	[5,25; 5,63]	[4,71; 5,08]	[4,90; 5,28]	[4,97; 5,36]	[5,19; 5,60]	[5,35; 5,77]	[5,68; 6,13]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	123470	110813	99471	89253	82572	78403	74799	71559	68310	64988	62073	59313	56688	54194	51856				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		4748	4077	2648	3519	3108	4082	5146	3787	3165	3099	2941	3018	2915	3082				
Anteil in %			4,28	4,10	2,97	4,26	3,96	5,46	7,19	5,54	4,87	4,99	4,96	5,32	5,38						
CI Anteil in %			[4,17; 4,40]	[3,98; 4,22]	[2,86; 3,08]	[4,12; 4,40]	[3,83; 4,10]	[5,29; 5,62]	[7,00; 7,38]	[5,37; 5,72]	[4,70; 5,04]	[4,82; 5,16]	[4,78; 5,13]	[5,14; 5,51]	[5,19; 5,57]	[5,74; 6,15]					
2005-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3088	2387	2686	2314	2775	3207	2352	2023	1967	1887	1875	1786	1794					
		Anteil in %		4,19	3,65	4,52	4,15	5,25	6,38	4,93	4,48	4,58	4,61	4,81	4,80	5,05					
		CI Anteil in %		[4,04; 4,33]	[3,50; 3,79]	[4,35; 4,69]	[3,98; 4,31]	[5,06; 5,44]	[6,17; 6,60]	[4,73; 5,12]	[4,29; 4,67]	[4,38; 4,78]	[4,41; 4,82]	[4,59; 5,02]	[4,58; 5,02]	[4,82; 5,27]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3280	2586	2894	2663	3229	3712	2758	2311	2207	2140	2081	2070	2097					
Anteil in %			3,81	3,36	4,12	4,01	5,13	6,18	4,82	4,27	4,28	4,37	4,46	4,64	4,91						
CI Anteil in %			[3,68; 3,94]	[3,23; 3,49]	[3,97; 4,26]	[3,87; 4,16]	[4,95; 5,30]	[5,99; 6,38]	[4,65; 5,00]	[4,10; 4,44]	[4,11; 4,46]	[4,19; 4,55]	[4,27; 4,64]	[4,45; 4,84]	[4,71; 5,12]						

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3030	4258	3327	3931	5006	3562	3217	3068	2852	2936	2818	2934							
		Anteil in %		3,44	5,34	4,51	5,66	7,60	5,70	5,46	5,49	5,37	5,80	5,84	6,36							
		CI Anteil in %		[3,32; 3,56]	[5,18; 5,50]	[4,36; 4,66]	[5,48; 5,83]	[7,40; 7,80]	[5,52; 5,88]	[5,28; 5,64]	[5,30; 5,68]	[5,18; 5,56]	[5,60; 6,00]	[5,63; 6,05]	[6,14; 6,58]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3146	4806	3619	4505	5735	4080	3673	3441	3318	3317	3129	3316							
Anteil in %			3,09	5,19	4,19	5,52	7,39	5,53	5,27	5,21	5,28	5,56	5,50	6,10								
CI Anteil in %			[2,99; 3,20]	[5,05; 5,34]	[4,06; 4,33]	[5,37; 5,68]	[7,21; 7,58]	[5,36; 5,69]	[5,10; 5,44]	[5,04; 5,38]	[5,11; 5,46]	[5,37; 5,74]	[5,31; 5,69]	[5,90; 6,30]								
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3786	3631	4352	5142	3960	3261	3327	3033	3004	2925	3097								
		Anteil in %		4,42	4,65	5,97	7,49	6,11	5,36	5,77	5,56	5,79	5,92	6,57								
		CI Anteil in %		[4,28; 4,55]	[4,50; 4,79]	[5,80; 6,15]	[7,29; 7,68]	[5,92; 6,29]	[5,18; 5,54]	[5,58; 5,96]	[5,37; 5,75]	[5,59; 6,00]	[5,71; 6,13]	[6,35; 6,79]								
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	106368	97818	89965	84145	79567	75344	70865	67146	63673	60566	57735	55201								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		4046	4102	4966	5909	4627	3818	3830	3583	3572	3351	3561								
Anteil in %			4,14	4,56	5,90	7,43	6,14	5,39	5,70	5,63	5,90	5,80	6,45									
CI Anteil in %			[4,01; 4,26]	[4,42; 4,70]	[5,74; 6,06]	[7,24; 7,61]	[5,97; 6,31]	[5,22; 5,55]	[5,53; 5,88]	[5,45; 5,81]	[5,71; 6,09]	[5,61; 5,99]	[6,25; 6,66]									
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3437	4817	5678	4265	3487	3330	2997	2972	2809	2869									
		Anteil in %		3,82	5,83	7,35	5,87	5,14	5,22	4,98	5,21	5,17	5,55									
		CI Anteil in %		[3,70; 3,95]	[5,67; 5,99]	[7,16; 7,53]	[5,70; 6,04]	[4,98; 5,31]	[5,04; 5,39]	[4,81; 5,15]	[5,03; 5,39]	[4,99; 5,36]	[5,35; 5,74]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3758	5368	6314	4799	3937	3700	3520	3422	3246	3381									
Anteil in %			3,65	5,62	7,06	5,69	4,99	4,96	4,99	5,12	5,11	5,57										
CI Anteil in %			[3,53; 3,76]	[5,47; 5,77]	[6,89; 7,22]	[5,54; 5,85]	[4,83; 5,14]	[4,81; 5,12]	[4,83; 5,15]	[4,95; 5,29]	[4,94; 5,28]	[5,39; 5,76]										
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		4677	6448	4826	3779	3507	3291	3223	2961	3178										
		Anteil in %		5,60	8,35	6,72	5,70	5,64	5,63	5,84	5,65	6,36										
		CI Anteil in %		[5,44; 5,75]	[8,15; 8,54]	[6,54; 6,90]	[5,52; 5,88]	[5,46; 5,82]	[5,44; 5,82]	[5,64; 6,04]	[5,45; 5,85]	[6,15; 6,58]										
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		5080	7437	5550	4429	4154	3951	3728	3551	3782										
Anteil in %			5,35	8,41	6,72	5,77	5,76	5,81	5,81	5,81	6,50											
CI Anteil in %			[5,21; 5,49]	[8,23; 8,60]	[6,55; 6,89]	[5,61; 5,94]	[5,59; 5,93]	[5,64; 5,99]	[5,63; 5,99]	[5,63; 6,00]	[6,30; 6,70]											
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		5806	4961	3250	2815	2481	2316	2187	2306											
		Anteil in %		6,36	5,90	4,27	3,99	3,76	3,73	3,72	4,13											
		CI Anteil in %		[6,20; 6,52]	[5,75; 6,06]	[4,13; 4,41]	[3,84; 4,13]	[3,61; 3,90]	[3,58; 3,87]	[3,57; 3,87]	[3,97; 4,30]											
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6089	5165	3498	3040	2619	2557	2340	2519											
Anteil in %			5,98	5,48	4,07	3,79	3,48	3,59	3,47	3,92												
CI Anteil in %			[5,83; 6,12]	[5,33; 5,62]	[3,94; 4,20]	[3,65; 3,92]	[3,35; 3,61]	[3,45; 3,73]	[3,33; 3,60]	[3,77; 4,07]												
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2401	1944	1635	1381	1267	1171	1252												
		Anteil in %		3,91	3,51	3,22	2,91	2,85	2,79	3,14												
		CI Anteil in %		[3,76; 4,06]	[3,36; 3,67]	[3,06; 3,37]	[2,76; 3,06]	[2,70; 3,01]	[2,63; 2,94]	[2,97; 3,31]												
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2553	2064	1724	1422	1378	1253	1345												
Anteil in %			3,75	3,33	3,01	2,65	2,73	2,62	2,95													
CI Anteil in %			[3,61; 3,90]	[3,19; 3,47]	[2,87; 3,15]	[2,51; 2,78]	[2,59; 2,87]	[2,47; 2,76]	[2,80; 3,11]													
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2072	1809	1477	1363	1264	1291													
		Anteil in %		3,21	3,10	2,75	2,72	2,69	2,90													
		CI Anteil in %		[3,07; 3,35]	[2,96; 3,24]	[2,61; 2,89]	[2,58; 2,87]	[2,54; 2,84]	[2,75; 3,06]													
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2133	1818	1609	1383	1146	1268													
Anteil in %			3,07	2,87	2,74	2,52	2,22	2,58														
CI Anteil in %			[2,94; 3,20]	[2,74; 3,00]	[2,61; 2,88]	[2,39; 2,66]	[2,09; 2,35]	[2,44; 2,72]														

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1761	1658	1462	1197	1300														
		Anteil in %			2,96	3,10	2,98	2,61	3,00													
		CI Anteil in %			[2,83; 3,10]	[2,95; 3,25]	[2,83; 3,13]	[2,46; 2,75]	[2,84; 3,16]													
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1666	1755	1536	1247	1235														
Anteil in %				2,56	2,96	2,80	2,43	2,55														
CI Anteil in %				[2,44; 2,68]	[2,82; 3,09]	[2,66; 2,93]	[2,29; 2,56]	[2,41; 2,69]														
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1856	1817	1537	1472															
		Anteil in %			2,72	2,93	2,69	2,75														
		CI Anteil in %			[2,60; 2,84]	[2,80; 3,07]	[2,56; 2,82]	[2,61; 2,89]														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1828	1756	1450	1509															
Anteil in %				2,51	2,63	2,33	2,59															
CI Anteil in %				[2,39; 2,62]	[2,51; 2,75]	[2,22; 2,45]	[2,46; 2,71]															
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	61608	55900	51784																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1493	1463	1518																
		Anteil in %			2,42	2,62	2,93															
		CI Anteil in %			[2,30; 2,54]	[2,48; 2,75]	[2,79; 3,08]															
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	66943	61246	56909																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1441	1496	1476																
Anteil in %				2,15	2,44	2,59																
CI Anteil in %				[2,04; 2,26]	[2,32; 2,56]	[2,46; 2,72]																
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	66585	60521																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1666	1926																	
		Anteil in %			2,50	3,18																
		CI Anteil in %			[2,38; 2,62]	[3,04; 3,32]																
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	72558	66610																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1617	1954																	
Anteil in %				2,23	2,93																	
CI Anteil in %				[2,12; 2,34]	[2,81; 3,06]																	
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67230	60721																		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1686																		
		Anteil in %			2,78																	
		CI Anteil in %			[2,65; 2,91]																	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465	66497																		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1758																		
Anteil in %				2,64																		
CI Anteil in %				[2,52; 2,77]																		
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714																			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879																			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																				
Anteil in %																						
CI Anteil in %																						

Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Gewichtsentwicklung (BMI)
- Raucherstatus
- Hypertonus

Laborwerte

- HbA1c-Werte
- Serum-Kreatinin-Werte

Medikation

- Medikation nach Medikamentengruppen

Prozessparameter

- Diabetes-Schulungen
- Hypertonie-Schulung
- Ophthalmologische Netzhautuntersuchung

Ereigniszeitanalysen: Neu auftretende Begleit- und Folgeerkrankungen, Endpunktfreiheit

- Erblindung
- Diabetische Nephropathie
- Erheblich auffälliger Fußstatus
- Amputation
- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Nierenersatztherapie
- Überlebensraten bei primären und sekundären Endpunkten

3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu drei Variablen dargestellt. Zunächst werden Angaben zur Gewichtsentwicklung anhand des Body-Mass-Index (BMI) dargestellt. Der BMI wird durch den Quotienten aus Körpergewicht in kg und Körpergröße in m im Quadrat errechnet (kg/m^2). BMI-Werte unter $25 \text{ kg}/\text{m}^2$ sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und $30 \text{ kg}/\text{m}^2$ als leicht übergewichtig und BMI-Werte über $30 \text{ kg}/\text{m}^2$ als übergewichtig (adipös) zu werten.

Anschließend werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortality ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle 3.1.1 ist die Entwicklung des **Body-Mass-Index** ausgewiesen. Für jede Kohorte werden dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnung, Differenzbildung und Kategorienbildung. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen BMI im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei nicht um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen (plausible) Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtsjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Abschließend werden die Patientenzahlen in den BMI-Kategorien (normalgewichtig, leicht übergewichtig, übergewichtig) dargestellt.

Tabelle 3.1.1 Patienten und ihr Body-Mass-Index

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910
	auswertbar	Anzahl	16859	11932	11379	10363	9300	8467	7735	6921	6351	6034	5728	5443	5216	4945	4672	4431	4149	3975	3749
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	29,59	29,60	29,73	29,68	29,78	29,75	29,90	29,80	29,90	29,85	29,91	29,86	29,91	29,88	29,94	29,89	29,92	29,85	29,93
		CI Mean	[29,51; 29,66]	[29,51; 29,68]	[29,64; 29,82]	[29,59; 29,78]	[29,69; 29,88]	[29,64; 29,85]	[29,79; 30,01]	[29,69; 29,92]	[29,77; 30,02]	[29,72; 29,97]	[29,78; 30,04]	[29,73; 29,99]	[29,77; 30,04]	[29,74; 30,02]	[29,80; 30,09]	[29,75; 30,04]	[29,77; 30,08]	[29,69; 30,01]	[29,76; 30,09]
		Median	29,05	29,05	29,07	29,07	29,30	29,07	29,37	29,14	29,35	29,32	29,38	29,30	29,38	29,38	29,39	29,36	29,36	29,32	29,38
		Fallbasis mittlere Differenz		11918	11369	10354	9292	8460	7729	6914	6344	6027	5722	5438	5212	4941	4668	4427	4145	3971	3745
		Mittlere Differenz zur ED		-0,02	0,10	0,04	0,10	0,04	0,13	0,04	0,08	0,05	0,10	0,05	0,07	0,05	0,11	0,07	0,05	-0,01	0,05
		CI mittlere Differenz		[-0,05; 0,01]	[0,06; 0,13]	[0,01; 0,08]	[0,05; 0,14]	[-0,01; 0,08]	[0,08; 0,18]	[-0,01; 0,10]	[0,02; 0,14]	[-0,01; 0,12]	[0,03; 0,17]	[-0,02; 0,12]	[0,00; 0,15]	[-0,03; 0,12]	[0,03; 0,20]	[-0,02; 0,15]	[-0,04; 0,14]	[-0,10; 0,08]	[-0,05; 0,14]
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	2437	1733	1596	1477	1256	1196	1016	967	848	837	773	755	709	680	644	618	568	575	538
		Anteil in %	14,46	14,52	14,03	14,25	13,51	14,13	13,14	13,97	13,35	13,87	13,50	13,87	13,59	13,75	13,78	13,95	13,69	14,47	14,35
		CI Anteil in %	[13,92; 14,99]	[13,89; 15,16]	[13,39; 14,66]	[13,58; 14,93]	[12,81; 14,20]	[13,38; 14,87]	[12,38; 13,89]	[13,16; 14,79]	[12,52; 14,19]	[13,00; 14,74]	[12,61; 14,38]	[12,95; 14,79]	[12,66; 14,52]	[12,79; 14,71]	[12,80; 14,77]	[12,93; 14,97]	[12,64; 14,74]	[13,37; 15,56]	[13,23; 15,47]
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	7444	5254	4888	4470	4027	3648	3326	2998	2704	2554	2415	2311	2186	2072	1936	1848	1742	1650	1536
		Anteil in %	44,15	44,03	42,96	43,13	43,30	43,08	43,00	43,32	42,58	42,33	42,16	42,46	41,91	41,90	41,44	41,71	41,99	41,51	40,97
		CI Anteil in %	[43,40; 44,90]	[43,14; 44,92]	[42,05; 43,87]	[42,18; 44,09]	[42,29; 44,31]	[42,03; 44,14]	[41,90; 44,10]	[42,15; 44,48]	[41,36; 43,79]	[41,08; 43,57]	[40,88; 43,44]	[41,14; 43,77]	[40,57; 43,25]	[40,53; 43,28]	[40,03; 42,85]	[40,25; 43,16]	[40,48; 43,49]	[39,98; 43,04]	[39,40; 42,55]
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	6978	4945	4895	4416	4017	3623	3393	2956	2799	2643	2540	2377	2252	2193	2092	1965	1839	1750	1675
		Anteil in %	41,39	41,44	43,02	42,61	43,19	42,79	43,87	42,71	44,07	43,80	44,34	43,67	44,50	44,35	44,78	44,35	44,32	44,03	44,68
		CI Anteil in %	[40,65; 42,13]	[40,56; 42,33]	[42,11; 43,93]	[41,66; 43,57]	[42,19; 44,20]	[41,74; 43,84]	[42,76; 44,97]	[41,55; 43,88]	[42,85; 45,29]	[42,55; 45,05]	[43,06; 45,63]	[42,35; 44,99]	[43,15; 45,85]	[42,96; 45,73]	[43,35; 46,20]	[42,88; 45,81]	[42,81; 45,84]	[42,48; 45,57]	[43,09; 46,27]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695
	auswertbar	Anzahl	23356	16796	16169	14882	13438	12431	11375	10184	9325	8903	8387	7934	7585	7173	6785	6446	6063	5788	5489
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,19	30,20	30,34	30,36	30,47	30,45	30,53	30,43	30,46	30,45	30,52	30,49	30,54	30,52	30,57	30,52	30,49	30,43	30,41
		CI Mean	[30,12; 30,27]	[30,11; 30,29]	[30,24; 30,43]	[30,27; 30,46]	[30,36; 30,57]	[30,34; 30,55]	[30,42; 30,64]	[30,31; 30,55]	[30,34; 30,58]	[30,32; 30,58]	[30,39; 30,65]	[30,35; 30,62]	[30,40; 30,68]	[30,38; 30,66]	[30,43; 30,72]	[30,38; 30,67]	[30,33; 30,64]	[30,27; 30,58]	[30,25; 30,57]
		Median	29,41	29,41	29,64	29,67	29,72	29,72	29,74	29,72	29,74	29,72	29,74	29,75	29,75	29,75	29,76	29,75	29,74	29,72	29,72
		Fallbasis mittlere Differenz		16776	16147	14862	13420	12416	11361	10170	9313	8893	8378	7926	7577	7165	6778	6441	6057	5782	5484
		Mittlere Differenz zur ED		-0,01	0,08	0,05	0,12	0,06	0,11	0,00	0,01	-0,05	-0,03	-0,09	-0,08	-0,13	-0,09	-0,16	-0,21	-0,21	-0,30
		CI mittlere Differenz		[-0,04; 0,01]	[0,05; 0,11]	[0,01; 0,08]	[0,08; 0,16]	[0,02; 0,10]	[0,06; 0,16]	[-0,05; 0,05]	[-0,04; 0,07]	[-0,11; 0,01]	[-0,10; 0,03]	[-0,16; 0,02]	[-0,15; 0,01]	[-0,20; 0,06]	[-0,17; 0,01]	[-0,24; 0,07]	[-0,30; 0,12]	[-0,38; 0,21]	[-0,40; 0,22]
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	4281	3093	2871	2609	2289	2117	1924	1769	1576	1522	1414	1389	1322	1250	1163	1140	1074	1043	999
Anteil in %		18,33	18,42	17,76	17,53	17,03	17,03	16,91	17,37	16,90	17,10	16,86	17,51	17,43	17,43	17,14	17,69	17,71	18,02	18,20	
CI Anteil in %		[17,83; 18,83]	[17,83; 19,00]	[17,17; 18,35]	[16,92; 18,14]	[16,40; 17,67]	[16,37; 17,69]	[16,23; 17,60]	[16,63; 18,11]	[16,14; 17,66]	[16,31; 17,88]	[16,06; 17,66]	[16,67; 18,34]	[16,58; 18,28]	[16,55; 18,30]	[16,24; 18,04]	[16,75; 18,62]	[16,75; 18,68]	[17,03; 19,01]	[17,18; 19,22]	
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	8214	5904	5640	5188	4675	4345	3935	3493	3222	3090	2908	2664	2566	2412	2282	2157	2051	1955	1850	
	Anteil in %	35,17	35,15	34,88	34,86	34,79	34,95	34,59	34,30	34,55	34,71	34,67	33,58	33,83	33,63	33,63	33,46	33,83	33,78	33,70	
	CI Anteil in %	[34,56; 35,78]	[34,43; 35,87]	[34,15; 35,62]	[34,10; 35,63]	[33,98; 35,59]	[34,11; 35,79]	[33,72; 35,47]	[33,38; 35,22]	[33,59; 35,52]	[33,72; 35,70]	[33,65; 35,69]	[32,54; 34,62]	[32,77; 34,89]	[32,53; 34,72]	[32,51; 34,76]	[32,31; 34,61]	[32,64; 35,02]	[32,56; 35,00]	[32,45; 34,95]	
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	10861	7799	7658	7085	6474	5969	5516	4922	4527	4291	4065	3881	3697	3511	3340	3149	2938	2790	2640	
	Anteil in %	46,50	46,43	47,36	47,61	48,18	48,02	48,49	48,33	48,55	48,20	48,47	48,92	48,74	48,95	49,23	48,85	48,46	48,20	48,10	
	CI Anteil in %	[45,86; 47,14]	[45,68; 47,19]	[46,59; 48,13]	[46,81; 48,41]	[47,33; 49,02]	[47,14; 48,90]	[47,57; 49,41]	[47,36; 49,30]	[47,53; 49,56]	[47,16; 49,24]	[47,40; 49,54]	[47,82; 50,02]	[47,62; 49,87]	[47,79; 50,10]	[48,04; 50,42]	[47,63; 50,07]	[47,20; 49,72]	[46,92; 49,49]	[46,77; 49,42]	

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736	
	auswertbar	Anzahl	112824	79505	70504	61033	53660	48182	43751	40301	38464	36326	34296	33342	31886	30413	29008	27582	26338	25044	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	29,70	29,81	29,80	29,84	29,81	29,87	29,82	29,85	29,84	29,88	29,87	29,92	29,90	29,93	29,90	29,91	29,88	29,88	
		CI Mean	[29,67; 29,72]	[29,78; 29,85]	[29,77; 29,84]	[29,80; 29,88]	[29,77; 29,85]	[29,83; 29,92]	[29,77; 29,86]	[29,81; 29,90]	[29,79; 29,89]	[29,83; 29,93]	[29,82; 29,92]	[29,86; 29,97]	[29,84; 29,95]	[29,87; 29,98]	[29,84; 29,95]	[29,85; 29,96]	[29,82; 29,94]	[29,82; 29,94]	
		Median	29,06	29,07	29,07	29,30	29,09	29,32	29,24	29,32	29,30	29,32	29,32	29,32	29,35	29,32	29,35	29,32	29,30	29,24	29,22
		Fallbasis mittlere Differenz		79289	70306	60880	53534	48074	43653	40207	38375	36244	34222	33269	31814	30344	28943	27523	26283	24991	
		Mittlere Differenz zur ED		0,07	0,04	0,07	0,04	0,09	0,03	0,06	0,03	0,06	0,02	0,06	0,04	0,07	0,03	0,03	0,00	0,01	
		CI mittlere Differenz		[0,05; 0,08]	[0,03; 0,06]	[0,05; 0,09]	[0,02; 0,06]	[0,07; 0,12]	[0,01; 0,05]	[0,03; 0,08]	[0,01; 0,06]	[0,03; 0,08]	[-0,01; 0,05]	[0,03; 0,09]	[0,01; 0,07]	[0,04; 0,10]	[0,00; 0,07]	[-0,01; 0,06]	[-0,04; 0,03]	[-0,03; 0,04]	
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	15954	10812	9667	8134	7188	6346	5933	5433	5227	4875	4700	4540	4334	4146	3987	3761	3657	3437	
		Anteil in %	14,14	13,60	13,71	13,33	13,40	13,17	13,56	13,48	13,59	13,42	13,70	13,62	13,59	13,63	13,74	13,64	13,88	13,72	
		CI Anteil in %	[13,94; 14,34]	[13,36; 13,84]	[13,46; 13,97]	[13,06; 13,60]	[13,11; 13,68]	[12,87; 13,47]	[13,24; 13,88]	[13,15; 13,81]	[13,25; 13,93]	[13,07; 13,77]	[13,34; 14,07]	[13,25; 13,98]	[13,22; 13,97]	[13,25; 14,02]	[13,35; 14,14]	[13,23; 14,04]	[13,47; 14,30]	[13,30; 14,15]	
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	49334	34412	30436	26305	23260	20737	18859	17219	16472	15512	14598	14159	13576	12914	12417	11827	11233	10749	
		Anteil in %	43,73	43,28	43,17	43,10	43,35	43,04	43,11	42,73	42,82	42,70	42,56	42,47	42,58	42,46	42,81	42,88	42,65	42,92	
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	47536	34281	30401	26594	23212	21099	18959	17649	16765	15939	14998	14643	13976	13353	12604	11994	11448	10858	
		Anteil in %	42,13	43,12	43,12	43,57	43,26	43,79	43,33	43,79	43,59	43,88	43,73	43,92	43,83	43,91	43,45	43,48	43,47	43,36	
		CI Anteil in %	[41,84; 42,42]	[42,77; 43,46]	[42,75; 43,49]	[43,18; 43,97]	[42,84; 43,68]	[43,35; 44,23]	[42,87; 43,80]	[43,31; 44,28]	[43,09; 44,08]	[43,37; 44,39]	[43,21; 44,26]	[43,38; 44,45]	[43,29; 44,38]	[43,35; 44,46]	[42,88; 44,02]	[42,90; 44,07]	[42,87; 44,06]	[42,74; 43,97]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	142866	112069	93979	81049	71389	64294	58333	54388	51899	49824	47865	45920	43703	41770	39917	38116	36445	34887	
	auswertbar	Anzahl	142324	101948	90429	78511	69555	62535	56796	52113	50016	47271	44595	43274	41398	39464	37744	35963	34332	32659	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,49	30,59	30,59	30,65	30,63	30,71	30,66	30,71	30,68	30,72	30,71	30,73	30,71	30,76	30,70	30,71	30,67	30,65	
		CI Mean	[30,46; 30,52]	[30,55; 30,62]	[30,56; 30,63]	[30,61; 30,69]	[30,59; 30,67]	[30,66; 30,75]	[30,61; 30,71]	[30,66; 30,77]	[30,63; 30,73]	[30,67; 30,78]	[30,65; 30,76]	[30,68; 30,79]	[30,65; 30,77]	[30,70; 30,82]	[30,64; 30,76]	[30,65; 30,77]	[30,61; 30,74]	[30,59; 30,72]	
		Median	29,75	29,90	29,97	30,02	29,97	30,04	30,02	30,06	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	30,07	30,04	30,04	30,02	30,00
		Fallbasis mittlere Differenz		101763	90262	78368	69418	62409	56676	52007	49916	47177	44510	43189	41317	39387	37670	35893	34261	32590	
		Mittlere Differenz zur ED		0,04	0,02	0,04	0,00	0,06	-0,01	0,00	-0,05	-0,04	-0,09	-0,09	-0,14	-0,12	-0,19	-0,22	-0,28	-0,31	
		CI mittlere Differenz		[0,03; 0,06]	[0,00; 0,03]	[0,02; 0,06]	[-0,02; 0,02]	[0,04; 0,08]	[-0,04; 0,01]	[-0,02; 0,03]	[-0,08; - 0,03]	[-0,07; - 0,02]	[-0,12; - 0,06]	[-0,12; - 0,06]	[-0,17; - 0,11]	[-0,15; - 0,09]	[-0,23; - 0,16]	[-0,25; - 0,19]	[-0,32; - 0,24]	[-0,35; - 0,27]	
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,35	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	23650	16521	14475	12321	10877	9556	8857	7952	7702	7257	6934	6749	6551	6174	6020	5738	5503	5241	
		Anteil in %	16,62	16,21	16,01	15,69	15,64	15,28	15,59	15,26	15,40	15,35	15,55	15,60	15,82	15,64	15,95	15,96	16,03	16,05	
		CI Anteil in %	[16,42; 16,81]	[15,98; 16,43]	[15,77; 16,25]	[15,44; 15,95]	[15,37; 15,91]	[15,00; 15,56]	[15,30; 15,89]	[14,95; 15,57]	[15,08; 15,72]	[15,03; 15,68]	[15,21; 15,89]	[15,25; 15,94]	[15,47; 16,18]	[15,29; 16,00]	[15,58; 16,32]	[15,58; 16,33]	[15,64; 16,42]	[15,65; 16,45]	
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	49161	34850	30911	26912	23991	21466	19479	17830	17186	16220	15250	14717	14028	13352	12753	12126	11620	11102	
		Anteil in %	34,54	34,18	34,18	34,28	34,49	34,33	34,30	34,21	34,36	34,31	34,20	34,01	33,89	33,83	33,79	33,72	33,85	33,99	
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	69513	50577	45043	39278	34687	31513	28460	26331	25128	23794	22411	21808	20819	19938	18971	18099	17209	16316	
		Anteil in %	48,84	49,61	49,81	50,03	49,87	50,39	50,11	50,53	50,24	50,34	50,25	50,40	50,29	50,52	50,26	50,33	50,13	49,96	
CI Anteil in %		[48,58; 49,10]	[49,30; 49,92]	[49,48; 50,14]	[49,68; 50,38]	[49,50; 50,24]	[50,00; 50,78]	[49,70; 50,52]	[50,10; 50,96]	[49,80; 50,68]	[49,88; 50,79]	[49,79; 50,72]	[49,92; 50,87]	[49,81; 50,77]	[50,03; 51,02]	[49,76; 50,77]	[49,81; 50,84]	[49,60; 50,65]	[49,42; 50,50]		

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232		
	auswertbar	Anzahl	133626	111631	99821	86303	80139	73758	67918	65220	61670	58566	56755	54383	51945	49678	47157	45188	43005		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	29,82	29,81	29,84	29,84	29,89	29,83	29,86	29,86	29,89	29,90	29,92	29,93	29,95	29,92	29,93	29,90	29,91		
		CI Mean	[29,79; 29,84]	[29,78; 29,84]	[29,81; 29,87]	[29,80; 29,87]	[29,85; 29,92]	[29,79; 29,86]	[29,82; 29,90]	[29,82; 29,89]	[29,85; 29,92]	[29,86; 29,94]	[29,88; 29,96]	[29,89; 29,97]	[29,91; 30,00]	[29,88; 29,96]	[29,88; 29,97]	[29,85; 29,95]	[29,86; 29,96]		
		Median	29,26	29,14	29,28	29,30	29,34	29,28	29,32	29,28	29,32	29,30	29,34	29,34	29,37	29,32	29,34	29,28	29,32		
		Fallbasis mittlere Differenz		110971	99226	85771	79657	73311	67502	64813	61287	58205	56405	54047	51626	49370	46863	44911	42741		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,05	-0,05	-0,07	-0,03	-0,10	-0,08	-0,10	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,07	-0,12	-0,12	-0,16	-0,15	
		CI mittlere Differenz		[-0,06; -0,04]	[-0,06; -0,03]	[-0,08; -0,05]	[-0,05; -0,01]	[-0,11; -0,08]	[-0,10; -0,06]	[-0,11; -0,08]	[-0,10; -0,06]	[-0,11; -0,07]	[-0,11; -0,06]	[-0,11; -0,06]	[-0,11; -0,06]	[-0,09; -0,05]	[-0,14; -0,09]	[-0,15; -0,10]	[-0,18; -0,13]	[-0,18; -0,13]	
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	17788	15068	13253	11579	10654	10032	9133	8818	8321	7953	7605	7304	6980	6784	6423	6223	5904		
		Anteil in %	13,31	13,50	13,28	13,42	13,29	13,60	13,45	13,52	13,49	13,58	13,40	13,43	13,44	13,66	13,62	13,77	13,73		
		CI Anteil in %	[13,13; 13,49]	[13,30; 13,70]	[13,07; 13,49]	[13,19; 13,64]	[13,06; 13,53]	[13,35; 13,85]	[13,19; 13,70]	[13,26; 13,78]	[13,22; 13,76]	[13,30; 13,86]	[13,12; 13,68]	[13,14; 13,72]	[13,14; 13,73]	[13,35; 13,96]	[13,31; 13,93]	[13,45; 14,09]	[13,40; 14,05]		
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	58136	48426	43172	37304	34409	31792	29154	28001	26307	25009	24215	23188	22008	21160	20042	19247	18317		
		Anteil in %	43,51	43,38	43,25	43,22	42,94	43,10	42,93	42,93	42,66	42,70	42,67	42,64	42,37	42,59	42,50	42,59	42,59		
		CI Anteil in %	[43,24; 43,77]	[43,09; 43,67]	[42,94; 43,56]	[42,89; 43,55]	[42,59; 43,28]	[42,75; 43,46]	[42,55; 43,30]	[42,55; 43,31]	[42,27; 43,05]	[42,30; 43,10]	[42,26; 43,07]	[42,22; 43,05]	[41,94; 42,79]	[42,16; 43,03]	[42,05; 42,95]	[42,14; 43,05]	[42,13; 43,06]		
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	57702	48137	43396	37420	35076	31934	29631	28401	27042	25604	24935	23891	22957	21734	20692	19718	18784		
		Anteil in %	43,18	43,12	43,47	43,36	43,77	43,30	43,63	43,55	43,85	43,72	43,93	43,93	44,19	43,75	43,88	43,64	43,68		
		CI Anteil in %	[42,92; 43,45]	[42,83; 43,41]	[43,17; 43,78]	[43,03; 43,69]	[43,43; 44,11]	[42,94; 43,65]	[43,25; 44,00]	[43,17; 43,93]	[43,46; 44,24]	[43,32; 44,12]	[43,53; 44,34]	[43,51; 44,35]	[43,77; 44,62]	[43,31; 44,19]	[43,43; 44,33]	[43,18; 44,09]	[43,21; 44,15]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	163432	142749	126918	112329	102494	94300	88366	84645	81247	78247	75048	71529	68399	65504	62532	59887	57490		
	auswertbar	Anzahl	162124	136217	122154	106372	98848	91246	84082	80834	76615	72853	70264	67266	64196	61454	58438	55909	53411		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,60	30,59	30,62	30,60	30,65	30,59	30,62	30,59	30,64	30,62	30,67	30,65	30,68	30,62	30,63	30,59	30,61		
		CI Mean	[30,57; 30,63]	[30,56; 30,62]	[30,59; 30,65]	[30,57; 30,64]	[30,61; 30,69]	[30,55; 30,63]	[30,58; 30,66]	[30,55; 30,64]	[30,60; 30,68]	[30,58; 30,67]	[30,62; 30,71]	[30,60; 30,69]	[30,63; 30,72]	[30,58; 30,67]	[30,58; 30,68]	[30,54; 30,64]	[30,56; 30,66]		
		Median	29,90	29,82	29,94	29,90	29,97	29,82	29,86	29,78	29,94	29,90	29,97	29,96	30,00	29,90	29,94	29,86	29,90		
		Fallbasis mittlere Differenz		135752	121737	106007	98510	90926	83790	80552	76347	72600	70018	67024	63959	61225	58226	55703	53212		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,06	-0,05	-0,09	-0,06	-0,14	-0,14	-0,18	-0,17	-0,24	-0,22	-0,26	-0,26	-0,34	-0,36	-0,42	-0,43		
		CI mittlere Differenz		[-0,07; -0,05]	[-0,07; -0,04]	[-0,11; -0,08]	[-0,07; -0,04]	[-0,15; -0,12]	[-0,15; -0,12]	[-0,19; -0,16]	[-0,19; -0,15]	[-0,26; -0,21]	[-0,24; -0,20]	[-0,29; -0,24]	[-0,29; -0,24]	[-0,36; -0,31]	[-0,39; -0,33]	[-0,44; -0,39]	[-0,46; -0,40]		
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,37	-0,38		
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	26122	22232	19574	17093	15712	14807	13473	13127	12359	11909	11366	10960	10379	10110	9740	9393	8853		
		Anteil in %	16,11	16,32	16,02	16,07	15,90	16,23	16,02	16,24	16,13	16,35	16,18	16,29	16,17	16,45	16,67	16,80	16,58		
		CI Anteil in %	[15,93; 16,29]	[16,12; 16,52]	[15,82; 16,23]	[15,85; 16,29]	[15,67; 16,12]	[15,99; 16,47]	[15,78; 16,27]	[15,99; 16,49]	[15,87; 16,39]	[16,08; 16,62]	[15,90; 16,45]	[16,01; 16,57]	[15,88; 16,45]	[16,16; 16,74]	[16,37; 16,97]	[16,49; 17,11]	[16,26; 16,89]		
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	55724	46805	42000	36594	33948	31423	29025	27891	26205	24891	23930	22863	21797	20867	19682	18870	18136		
		Anteil in %	34,37	34,36	34,38	34,40	34,34	34,44	34,52	34,50	34,20	34,17	34,06	33,99	33,95	33,96	33,68	33,75	33,96		
		CI Anteil in %	[34,14; 34,60]	[34,11; 34,61]	[34,12; 34,65]	[34,12; 34,69]	[34,05; 34,64]	[34,13; 34,75]	[34,20; 34,84]	[34,18; 34,83]	[33,87; 34,54]	[33,82; 34,51]	[33,71; 34,41]	[33,63; 34,35]	[33,59; 34,32]	[33,58; 34,33]	[33,30; 34,06]	[33,36; 34,14]	[33,55; 34,36]		
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	80278	67180	60580	52685	49188	45016	41584	39816	38051	36053	34968	33443	32020	30477	29016	27646	26422			
	Anteil in %	49,52	49,32	49,59	49,53	49,76	49,33	49,46	49,26	49,67	49,49	49,77	49,72	49,88	49,59	49,65	49,45	49,47			
	CI Anteil in %	[49,27; 49,76]	[49,05; 49,58]	[49,31; 49,87]	[49,23; 49,83]	[49,45; 50,07]	[49,01; 49,66]	[49,12; 49,79]	[48,91; 49,60]	[49,31; 50,02]	[49,12; 49,85]	[49,40; 50,14]	[49,34; 50,10]	[49,49; 50,27]	[49,20; 49,99]	[49,25; 50,06]	[49,03; 49,86]	[49,05; 49,89]			

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933			
	auswertbar	Anzahl	98426	82204	71979	64695	58353	53166	50826	47601	44904	43334	41448	39539	37860	35971	34425	32713			
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	29,95	29,98	29,95	30,00	29,96	29,99	29,98	30,03	30,02	30,06	30,06	30,08	30,05	30,06	30,04	30,06			
		CI Mean	[29,92; 29,98]	[29,95; 30,02]	[29,91; 29,98]	[29,96; 30,04]	[29,92; 30,00]	[29,95; 30,04]	[29,93; 30,02]	[29,99; 30,08]	[29,97; 30,06]	[30,01; 30,11]	[30,01; 30,11]	[30,03; 30,13]	[30,00; 30,11]	[30,00; 30,11]	[29,99; 30,09]	[30,00; 30,11]			
		Median	29,36	29,38	29,36	29,38	29,38	29,38	29,37	29,39	29,37	29,39	29,39	29,39	29,39	29,38	29,38	29,38	29,38		
		Fallbasis mittlere Differenz		82090	71875	64603	58268	53091	50756	47538	44847	43277	41393	39490	37811	35926	34384	32674			
		Mittlere Differenz zur ED		0,01	-0,05	-0,01	-0,06	-0,04	-0,08	-0,05	-0,09	-0,07	-0,09	-0,08	-0,12	-0,13	-0,16	-0,15			
		CI mittlere Differenz		[-0,01; 0,02]	[-0,07; -0,04]	[-0,03; 0,01]	[-0,08; -0,04]	[-0,06; -0,02]	[-0,10; -0,06]	[-0,08; -0,03]	[-0,12; -0,07]	[-0,10; -0,04]	[-0,12; -0,07]	[-0,11; -0,05]	[-0,14; -0,09]	[-0,16; -0,10]	[-0,19; -0,13]	[-0,18; -0,12]			
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	13101	10898	9585	8487	7750	6973	6699	6295	6007	5681	5457	5203	4986	4758	4571	4363			
		Anteil in %	13,31	13,26	13,32	13,12	13,28	13,12	13,18	13,22	13,38	13,11	13,17	13,16	13,17	13,23	13,28	13,34			
		CI Anteil in %	[13,10; 13,52]	[13,03; 13,49]	[13,07; 13,56]	[12,86; 13,38]	[13,01; 13,56]	[12,83; 13,40]	[12,89; 13,47]	[12,92; 13,53]	[13,06; 13,69]	[12,79; 13,43]	[12,84; 13,49]	[12,83; 13,49]	[12,83; 13,51]	[12,88; 13,58]	[12,92; 13,64]	[12,97; 13,71]			
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	41973	34845	30600	27313	24718	22524	21618	20036	18994	18244	17424	16647	16029	15148	14541	13764			
		Anteil in %	42,64	42,39	42,51	42,22	42,36	42,37	42,53	42,09	42,30	42,10	42,04	42,10	42,34	42,11	42,24	42,08			
		CI Anteil in %	[42,34; 42,95]	[42,05; 42,73]	[42,15; 42,87]	[41,84; 42,60]	[41,96; 42,76]	[41,95; 42,79]	[42,10; 42,96]	[41,65; 42,54]	[41,84; 42,76]	[41,64; 42,57]	[41,56; 42,51]	[41,62; 42,59]	[41,84; 42,84]	[41,60; 42,62]	[41,72; 42,76]	[41,54; 42,61]			
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	43352	36461	31794	28895	25885	23669	22509	21270	19903	19409	18567	17689	16845	16065	15313	14586			
		Anteil in %	44,05	44,35	44,17	44,66	44,36	44,52	44,29	44,68	44,32	44,79	44,80	44,74	44,49	44,66	44,48	44,59			
		CI Anteil in %	[43,74; 44,36]	[44,01; 44,69]	[43,81; 44,53]	[44,28; 45,05]	[43,96; 44,76]	[44,10; 44,94]	[43,85; 44,72]	[44,24; 45,13]	[43,86; 44,78]	[44,32; 45,26]	[44,32; 45,27]	[44,25; 45,23]	[43,99; 44,99]	[44,15; 45,17]	[43,96; 45,01]	[44,05; 45,13]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521			
	auswertbar	Anzahl	115454	97243	85813	77639	70309	64373	61594	57634	54425	52483	50201	47793	45686	43461	41664	39615			
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,78	30,78	30,73	30,77	30,70	30,74	30,72	30,75	30,72	30,75	30,75	30,78	30,72	30,73	30,70	30,69			
		CI Mean	[30,74; 30,81]	[30,74; 30,82]	[30,69; 30,77]	[30,73; 30,82]	[30,65; 30,74]	[30,69; 30,79]	[30,67; 30,76]	[30,70; 30,80]	[30,67; 30,77]	[30,70; 30,80]	[30,70; 30,80]	[30,73; 30,84]	[30,66; 30,77]	[30,67; 30,79]	[30,64; 30,76]	[30,63; 30,75]			
		Median	30,08	30,08	30,04	30,08	30,04	30,08	30,04	30,04	30,02	30,04	30,04	30,06	30,00	30,04	30,02	30,00			
		Fallbasis mittlere Differenz		97116	85700	77531	70212	64287	61512	57556	54355	52408	50130	47724	45625	43401	41610	39564			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,03	-0,08	-0,06	-0,15	-0,14	-0,19	-0,19	-0,27	-0,26	-0,29	-0,29	-0,37	-0,40	-0,45	-0,47			
		CI mittlere Differenz		[-0,04; -0,01]	[-0,10; -0,07]	[-0,08; -0,04]	[-0,17; -0,13]	[-0,16; -0,12]	[-0,21; -0,17]	[-0,21; -0,17]	[-0,29; -0,24]	[-0,29; -0,24]	[-0,32; -0,27]	[-0,32; -0,26]	[-0,40; -0,34]	[-0,43; -0,37]	[-0,48; -0,42]	[-0,51; -0,44]			
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,38				
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	17978	15258	13586	12120	11196	10089	9820	9041	8775	8321	8019	7556	7366	6998	6698	6391			
		Anteil in %	15,57	15,69	15,83	15,61	15,92	15,67	15,94	15,69	16,12	15,85	15,97	15,81	16,12	16,10	16,08	16,13			
		CI Anteil in %	[15,36; 15,78]	[15,46; 15,92]	[15,59; 16,08]	[15,36; 15,87]	[15,65; 16,19]	[15,39; 15,95]	[15,65; 16,23]	[15,39; 15,98]	[15,81; 16,43]	[15,54; 16,17]	[15,65; 16,29]	[15,48; 16,14]	[15,79; 16,46]	[15,76; 16,45]	[15,72; 16,43]	[15,77; 16,50]			
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	39012	32786	28961	26145	23776	21759	20777	19544	18426	17729	16900	16131	15492	14621	14116	13468			
		Anteil in %	33,79	33,72	33,75	33,68	33,82	33,80	33,73	33,91	33,86	33,78	33,66	33,75	33,91	33,64	33,88	34,00			
		CI Anteil in %	[33,52; 34,06]	[33,42; 34,01]	[33,43; 34,07]	[33,34; 34,01]	[33,47; 34,17]	[33,44; 34,17]	[33,36; 34,11]	[33,52; 34,30]	[33,46; 34,25]	[33,38; 34,19]	[33,25; 34,08]	[33,33; 34,18]	[33,48; 34,34]	[33,20; 34,09]	[33,43; 34,34]	[33,53; 34,46]			
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	58464	49199	43266	39374	35337	32525	30997	29049	27224	26433	25282	24106	22828	21842	20850	19756			
		Anteil in %	50,64	50,59	50,42	50,71	50,26	50,53	50,32	50,40	50,02	50,36	50,36	50,44	49,97	50,26	50,04	49,87			
		CI Anteil in %	[50,35; 50,93]	[50,28; 50,91]	[50,08; 50,75]	[50,36; 51,07]	[49,89; 50,63]	[50,14; 50,91]	[49,93; 50,72]	[49,99; 50,81]	[49,60; 50,44]	[49,94; 50,79]	[49,92; 50,80]	[49,99; 50,89]	[49,51; 50,43]	[49,79; 50,73]	[49,56; 50,52]	[49,38; 50,36]			

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	105631	93726	83366	74241	68487	64764	61675	58977	56190	53398	50980	48671	46510	44483	42590					
	auswertbar	Anzahl	105128	89308	79589	71703	65207	61803	57954	54349	52684	50372	48011	45817	43686	41711	39786					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,10	30,04	30,09	30,04	30,08	30,07	30,13	30,12	30,16	30,15	30,19	30,16	30,16	30,15	30,17					
		CI Mean	[30,07; 30,13]	[30,01; 30,07]	[30,05; 30,12]	[30,00; 30,07]	[30,04; 30,12]	[30,03; 30,11]	[30,09; 30,17]	[30,08; 30,16]	[30,12; 30,21]	[30,10; 30,19]	[30,14; 30,23]	[30,11; 30,21]	[30,11; 30,20]	[30,10; 30,20]	[30,12; 30,22]					
		Median	29,41	29,39	29,41	29,40	29,41	29,40	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41				
		Fallbasis mittlere Differenz		89220	79504	71628	65135	61736	57889	54287	52624	50315	47957	45764	43636	41664	39740					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,09	-0,06	-0,14	-0,12	-0,14	-0,11	-0,15	-0,11	-0,13	-0,10	-0,15	-0,16	-0,18	-0,17					
		CI mittlere Differenz		[-0,11; - 0,08]	[-0,08; - 0,05]	[-0,16; - 0,12]	[-0,13; - 0,10]	[-0,16; - 0,13]	[-0,13; - 0,09]	[-0,17; - 0,12]	[-0,13; - 0,09]	[-0,16; - 0,11]	[-0,12; - 0,07]	[-0,17; - 0,12]	[-0,19; - 0,13]	[-0,21; - 0,15]	[-0,20; - 0,15]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	13191	11624	10153	9356	8437	8053	7420	7075	6785	6509	6081	5915	5689	5471	5147					
		Anteil in %	12,55	13,02	12,76	13,05	12,94	13,03	12,80	13,02	12,88	12,92	12,67	12,91	13,02	13,12	12,94					
		CI Anteil in %	[12,35; 12,75]	[12,79; 13,24]	[12,53; 12,99]	[12,80; 13,29]	[12,68; 13,20]	[12,76; 13,30]	[12,53; 13,08]	[12,73; 13,30]	[12,59; 13,16]	[12,63; 13,21]	[12,37; 12,96]	[12,60; 13,22]	[12,71; 13,34]	[12,79; 13,44]	[12,61; 13,27]					
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	44162	37528	33307	29986	27150	25674	23973	22532	21753	20951	19844	18918	17964	17199	16390					
		Anteil in %	42,01	42,02	41,85	41,82	41,64	41,54	41,37	41,46	41,29	41,59	41,33	41,29	41,12	41,23	41,20					
		CI Anteil in %	[41,71; 42,31]	[41,70; 42,34]	[41,51; 42,19]	[41,46; 42,18]	[41,26; 42,02]	[41,15; 41,93]	[40,96; 41,77]	[41,04; 41,87]	[40,87; 41,71]	[41,16; 42,02]	[40,89; 41,77]	[40,84; 41,74]	[40,66; 41,58]	[40,76; 41,71]	[40,71; 41,68]					
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	47775	40156	36129	32361	29620	28076	26561	24742	24146	22912	22086	20984	20033	19041	18249					
		Anteil in %	45,44	44,96	45,39	45,13	45,42	45,43	45,83	45,52	45,83	45,49	46,00	45,80	45,86	45,65	45,87					
		CI Anteil in %	[45,14; 45,75]	[44,64; 45,29]	[45,05; 45,74]	[44,77; 45,50]	[45,04; 45,81]	[45,04; 45,82]	[45,43; 46,24]	[45,11; 45,94]	[45,41; 46,26]	[45,05; 45,92]	[45,56; 46,45]	[45,34; 46,26]	[45,39; 46,32]	[45,17; 46,13]	[45,38; 46,36]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	123470	110813	99471	89253	82572	78403	74799	71559	68310	64988	62073	59313	56688	54194	51856					
	auswertbar	Anzahl	122817	105596	94968	86216	78703	74950	70366	65957	63972	61280	58483	55902	53220	50854	48361					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,97	30,87	30,89	30,83	30,88	30,86	30,89	30,87	30,90	30,88	30,92	30,87	30,87	30,86	30,86					
		CI Mean	[30,93; 31,00]	[30,83; 30,93]	[30,86; 30,93]	[30,79; 30,87]	[30,83; 30,92]	[30,81; 30,90]	[30,84; 30,93]	[30,82; 30,91]	[30,85; 30,95]	[30,83; 30,93]	[30,87; 30,97]	[30,82; 30,92]	[30,82; 30,91]	[30,80; 30,91]	[30,81; 30,92]					
		Median	30,12	30,10	30,12	30,09	30,11	30,10	30,11	30,10	30,11	30,10	30,11	30,10	30,10	30,09	30,08					
		Fallbasis mittlere Differenz		105465	94851	86119	78611	74866	70292	65885	63900	61211	58417	55839	53161	50796	48305					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,10	-0,18	-0,17	-0,21	-0,20	-0,28	-0,28	-0,33	-0,31	-0,38	-0,41	-0,46	-0,48					
		CI mittlere Differenz		[-0,13; - 0,11]	[-0,11; - 0,08]	[-0,20; - 0,16]	[-0,18; - 0,15]	[-0,23; - 0,19]	[-0,23; - 0,18]	[-0,31; - 0,26]	[-0,30; - 0,26]	[-0,35; - 0,30]	[-0,34; - 0,29]	[-0,41; - 0,36]	[-0,44; - 0,39]	[-0,48; - 0,43]	[-0,51; - 0,45]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	-0,36	-0,37	-0,38					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	18307	16251	14482	13441	12021	11484	10724	10232	9874	9548	9053	8792	8424	8026	7631					
		Anteil in %	14,91	15,39	15,25	15,59	15,27	15,32	15,24	15,51	15,43	15,58	15,48	15,73	15,83	15,78	15,78					
		CI Anteil in %	[14,71; 15,11]	[15,17; 15,61]	[15,02; 15,48]	[15,35; 15,83]	[15,02; 15,53]	[15,06; 15,58]	[14,97; 15,51]	[15,24; 15,79]	[15,15; 15,71]	[15,29; 15,87]	[15,19; 15,77]	[15,43; 16,03]	[15,52; 16,14]	[15,47; 16,10]	[15,45; 16,10]					
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	40983	35427	31644	28862	26338	25179	23610	22095	21368	20450	19448	18674	17647	17008	16168					
		Anteil in %	33,37	33,55	33,32	33,48	33,47	33,59	33,55	33,50	33,40	33,37	33,25	33,40	33,16	33,44	33,43					
		CI Anteil in %	[33,11; 33,63]	[33,26; 33,83]	[33,02; 33,62]	[33,16; 33,79]	[33,14; 33,79]	[33,26; 33,93]	[33,20; 33,90]	[33,14; 33,86]	[33,04; 33,77]	[33,00; 33,74]	[32,87; 33,64]	[33,01; 33,80]	[32,76; 33,56]	[33,03; 33,85]	[33,01; 33,85]					
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	63527	53918	48842	43913	40344	38287	36032	33630	32730	31282	29982	28436	27149	25820	24562						
	Anteil in %	51,72	51,06	51,43	50,93	51,26	51,08	51,21	50,99	51,16	51,05	51,27	50,87	51,01	50,77	50,79						
	CI Anteil in %	[51,45; 52,00]	[50,76; 51,36]	[51,11; 51,75]	[50,60; 51,27]	[50,91; 51,61]	[50,73; 51,44]	[50,84; 51,58]	[50,61; 51,37]	[50,78; 51,55]	[50,65; 51,44]	[50,86; 51,67]	[50,45; 51,28]	[50,59; 51,44]	[50,34; 51,21]	[50,34; 51,23]						

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545					
	auswertbar	Anzahl	81779	70280	62687	56453	53140	49779	46728	45018	42805	40674	38723	36841	35143	33502					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,13	30,19	30,13	30,17	30,16	30,19	30,20	30,23	30,21	30,24	30,21	30,21	30,19	30,18					
		CI Mean	[30,09; 30,16]	[30,15; 30,22]	[30,09; 30,17]	[30,13; 30,22]	[30,12; 30,20]	[30,14; 30,23]	[30,15; 30,24]	[30,18; 30,27]	[30,16; 30,26]	[30,19; 30,29]	[30,16; 30,26]	[30,15; 30,26]	[30,14; 30,25]	[30,13; 30,24]					
		Median	29,40	29,41	29,40	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41					
		Fallbasis mittlere Differenz		70215	62631	56408	53098	49737	46691	44979	42770	40638	38688	36808	35113	33475					
		Mittlere Differenz zur ED		0,03	-0,03	-0,01	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02	-0,05	-0,03	-0,07	-0,08	-0,09	-0,10					
		CI mittlere Differenz		[0,02; 0,05]	[-0,05; - 0,01]	[-0,03; - 0,01]	[-0,06; - 0,02]	[-0,04; - 0,00]	[-0,06; - 0,01]	[-0,05; - 0,00]	[-0,08; - 0,03]	[-0,05; - 0,00]	[-0,09; - 0,04]	[-0,11; - 0,05]	[-0,12; - 0,06]	[-0,13; - 0,07]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	10364	8829	8010	7066	6677	6300	5885	5569	5348	5019	4897	4697	4485	4301					
		Anteil in %	12,67	12,56	12,78	12,52	12,56	12,66	12,59	12,37	12,49	12,34	12,65	12,75	12,76	12,84					
		CI Anteil in %	[12,45; 12,90]	[12,32; 12,81]	[12,52; 13,04]	[12,24; 12,79]	[12,28; 12,85]	[12,36; 12,95]	[12,29; 12,89]	[12,07; 12,67]	[12,18; 12,81]	[12,02; 12,66]	[12,32; 12,98]	[12,41; 13,09]	[12,41; 13,11]	[12,48; 13,20]					
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	34300	29350	26341	23661	22365	20788	19512	18790	17865	16950	16057	15237	14551	13830					
		Anteil in %	41,94	41,76	42,02	41,91	42,09	41,76	41,76	41,74	41,74	41,67	41,47	41,36	41,41	41,28					
		CI Anteil in %	[41,60; 42,28]	[41,40; 42,13]	[41,63; 42,41]	[41,51; 42,32]	[41,67; 42,51]	[41,33; 42,19]	[41,31; 42,20]	[41,28; 42,19]	[41,27; 42,20]	[41,19; 42,15]	[40,98; 41,96]	[40,86; 41,86]	[40,89; 41,92]	[40,75; 41,81]					
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	37115	32101	28336	25726	24098	22691	21331	20659	19592	18705	17769	16907	16107	15371					
		Anteil in %	45,38	45,68	45,20	45,57	45,35	45,58	45,65	45,89	45,77	45,99	45,89	45,89	45,83	45,88					
		CI Anteil in %	[45,04; 45,73]	[45,31; 46,04]	[44,81; 45,59]	[45,16; 45,98]	[44,92; 45,77]	[45,15; 46,02]	[45,20; 46,10]	[45,43; 46,35]	[45,30; 46,24]	[45,50; 46,47]	[45,39; 46,38]	[45,38; 46,40]	[45,31; 46,35]	[45,35; 46,41]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683					
	auswertbar	Anzahl	94473	82349	73946	67051	63318	59409	55936	53936	51348	48911	46483	44253	42176	40253					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,05	31,06	30,95	30,98	30,97	31,00	30,97	30,99	30,97	30,99	30,94	30,94	30,90	30,90					
		CI Mean	[31,01; 31,09]	[31,01; 31,10]	[30,91; 30,99]	[30,94; 31,03]	[30,92; 31,01]	[30,95; 31,05]	[30,92; 31,03]	[30,93; 31,04]	[30,91; 31,02]	[30,93; 31,04]	[30,89; 31,00]	[30,89; 31,00]	[30,84; 30,96]	[30,84; 30,97]					
		Median	30,33	30,36	30,12	30,22	30,13	30,30	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,11	30,11					
		Fallbasis mittlere Differenz		82259	73868	66985	63251	59348	55882	53882	51298	48862	46436	44209	42139	40218					
		Mittlere Differenz zur ED		0,00	-0,11	-0,10	-0,14	-0,14	-0,21	-0,21	-0,25	-0,26	-0,33	-0,35	-0,40	-0,43					
		CI mittlere Differenz		[-0,01; 0,02]	[-0,13; - 0,09]	[-0,12; - 0,08]	[-0,16; - 0,12]	[-0,16; - 0,12]	[-0,23; - 0,18]	[-0,24; - 0,19]	[-0,28; - 0,23]	[-0,29; - 0,23]	[-0,35; - 0,30]	[-0,38; - 0,32]	[-0,44; - 0,37]	[-0,47; - 0,40]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,35	-0,36	-0,37					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	14053	12296	11254	10152	9612	8976	8500	8128	7745	7280	6966	6619	6400	6132					
		Anteil in %	14,88	14,93	15,22	15,14	15,18	15,11	15,20	15,07	15,08	14,88	14,99	14,96	15,17	15,23					
		CI Anteil in %	[14,65; 15,10]	[14,69; 15,17]	[14,96; 15,48]	[14,87; 15,41]	[14,90; 15,46]	[14,82; 15,40]	[14,90; 15,49]	[14,77; 15,37]	[14,77; 15,39]	[14,57; 15,20]	[14,66; 15,31]	[14,62; 15,29]	[14,83; 15,52]	[14,88; 15,58]					
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	30967	26863	24351	21986	20784	19369	18433	17795	17038	16246	15563	14862	14176	13491					
		Anteil in %	32,78	32,62	32,93	32,79	32,82	32,60	32,95	32,99	33,18	33,22	33,48	33,58	33,61	33,52					
		CI Anteil in %	[32,48; 33,08]	[32,30; 32,94]	[32,59; 33,27]	[32,43; 33,15]	[32,46; 33,19]	[32,23; 32,98]	[32,56; 33,34]	[32,60; 33,39]	[32,77; 33,59]	[32,80; 33,63]	[33,05; 33,91]	[33,14; 34,02]	[33,16; 34,06]	[33,05; 33,98]					
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	49453	43190	38341	34913	32922	31064	29003	28013	26565	25385	23954	22772	21600	20630					
		Anteil in %	52,35	52,45	51,85	52,07	51,99	52,29	51,85	51,94	51,74	51,90	51,53	51,46	51,21	51,25					
		CI Anteil in %	[52,03; 52,66]	[52,11; 52,79]	[51,49; 52,21]	[51,69; 52,45]	[51,61; 52,38]	[51,89; 52,69]	[51,44; 52,26]	[51,52; 52,36]	[51,30; 52,17]	[51,46; 52,34]	[51,08; 51,99]	[50,99; 51,92]	[50,74; 51,69]	[50,76; 51,74]					

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133								
	auswertbar	Anzahl	97980	84700	75053	70089	65181	60441	58456	55177	52334	49837	47290	45017	42839								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,16	30,07	30,12	30,10	30,13	30,13	30,12	30,16	30,14	30,18	30,15	30,17	30,13	30,15							
		CI Mean	[30,12; 30,19]	[30,04; 30,11]	[30,08; 30,16]	[30,06; 30,13]	[30,09; 30,17]	[30,08; 30,16]	[30,12; 30,20]	[30,10; 30,19]	[30,13; 30,22]	[30,10; 30,19]	[30,12; 30,21]	[30,09; 30,18]	[30,10; 30,20]								
		Median	29,41	29,40	29,41	29,40	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41							
		Fallbasis mittlere Differenz		84612	74981	70023	65123	60389	58406	55129	52289	49795	47252	44983	42806								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,10	-0,12	-0,10	-0,14	-0,10	-0,13	-0,10	-0,14	-0,15	-0,18	-0,17								
		CI mittlere Differenz		[-0,13; - 0,11]	[-0,11; - 0,08]	[-0,14; - 0,11]	[-0,12; - 0,08]	[-0,16; - 0,11]	[-0,12; - 0,08]	[-0,15; - 0,11]	[-0,12; - 0,08]	[-0,16; - 0,12]	[-0,17; - 0,12]	[-0,20; - 0,15]	[-0,20; - 0,15]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	12430	11182	9726	9068	8380	7774	7502	7133	6648	6451	6095	5871	5559								
		Anteil in %	12,69	13,20	12,96	12,94	12,86	12,86	12,83	12,93	12,70	12,94	12,89	13,04	12,98								
		CI Anteil in %	[12,48; 12,89]	[12,97; 13,43]	[12,72; 13,20]	[12,69; 13,19]	[12,60; 13,11]	[12,60; 13,13]	[12,56; 13,10]	[12,65; 13,21]	[12,42; 12,99]	[12,65; 13,24]	[12,59; 13,19]	[12,73; 13,35]	[12,66; 13,29]								
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	40667	35325	31087	29152	27011	25125	24105	22741	21603	20590	19503	18649	17665								
		Anteil in %	41,51	41,71	41,42	41,59	41,44	41,57	41,24	41,21	41,28	41,31	41,24	41,43	41,24								
		CI Anteil in %	[41,20; 41,81]	[41,37; 42,04]	[41,07; 41,77]	[41,23; 41,96]	[41,06; 41,82]	[41,18; 41,96]	[40,84; 41,64]	[40,80; 41,63]	[40,86; 41,70]	[40,88; 41,75]	[40,80; 41,68]	[40,97; 41,88]	[40,77; 41,70]								
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	44883	38193	34240	31869	29790	27542	26849	25303	24083	22796	21692	20497	19615								
		Anteil in %	45,81	45,09	45,62	45,47	45,70	45,57	45,93	45,86	46,02	45,74	45,87	45,53	45,79								
		CI Anteil in %	[45,50; 46,12]	[44,76; 45,43]	[45,26; 45,98]	[45,10; 45,84]	[45,32; 46,09]	[45,17; 45,97]	[45,53; 46,33]	[45,44; 46,27]	[45,59; 46,44]	[45,30; 46,18]	[45,42; 46,32]	[45,07; 45,99]	[45,32; 46,26]								
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383								
	auswertbar	Anzahl	111781	98004	87235	82180	76559	71294	69041	65399	62038	58983	55870	53261	50640								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,08	30,95	31,00	30,95	31,00	30,99	31,01	31,01	31,04	30,99	31,01	30,97	30,98								
		CI Mean	[31,05; 31,12]	[30,91; 30,99]	[30,96; 31,04]	[30,91; 30,99]	[30,96; 31,05]	[30,94; 31,03]	[30,96; 31,06]	[30,96; 31,06]	[30,99; 31,09]	[30,94; 31,04]	[30,95; 31,06]	[30,92; 31,02]	[30,92; 31,03]								
		Median	30,33	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12								
		Fallbasis mittlere Differenz		97909	87155	82099	76482	71227	68973	65337	61982	58928	55820	53212	50593								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,13	-0,15	-0,20	-0,19	-0,25	-0,24	-0,28	-0,28	-0,35	-0,37	-0,43	-0,47								
		CI mittlere Differenz		[-0,15; - 0,12]	[-0,16; - 0,13]	[-0,22; - 0,18]	[-0,21; - 0,18]	[-0,28; - 0,23]	[-0,27; - 0,22]	[-0,30; - 0,26]	[-0,31; - 0,26]	[-0,38; - 0,33]	[-0,40; - 0,35]	[-0,46; - 0,41]	[-0,49; - 0,44]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,37								
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	16591	15139	13273	12624	11588	10912	10501	9967	9415	9066	8636	8266	7852								
		Anteil in %	14,84	15,45	15,22	15,36	15,14	15,31	15,21	15,24	15,18	15,37	15,46	15,52	15,51								
		CI Anteil in %	[14,63; 15,05]	[15,22; 15,67]	[14,98; 15,45]	[15,11; 15,61]	[14,88; 15,39]	[15,04; 15,57]	[14,94; 15,48]	[14,96; 15,52]	[14,89; 15,46]	[15,08; 15,66]	[15,16; 15,76]	[15,21; 15,83]	[15,19; 15,82]								
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	36663	32482	28790	27259	25344	23611	22822	21648	20401	19534	18296	17611	16687								
		Anteil in %	32,80	33,14	33,00	33,17	33,10	33,12	33,06	33,10	32,88	33,12	32,75	33,07	32,95								
		CI Anteil in %	[32,52; 33,07]	[32,85; 33,44]	[32,69; 33,31]	[32,85; 33,49]	[32,77; 33,44]	[32,77; 33,46]	[32,70; 33,41]	[32,74; 33,46]	[32,51; 33,25]	[32,74; 33,50]	[32,36; 33,14]	[32,67; 33,47]	[32,54; 33,36]								
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	58527	50383	45172	42297	39627	36771	35718	33784	32222	30383	28938	27384	26101								
		Anteil in %	52,36	51,41	51,78	51,47	51,76	51,58	51,73	51,66	51,94	51,51	51,80	51,41	51,54								
		CI Anteil in %	[52,07; 52,65]	[51,10; 51,72]	[51,45; 52,11]	[51,13; 51,81]	[51,41; 52,11]	[51,21; 51,94]	[51,36; 52,11]	[51,28; 52,04]	[51,55; 52,33]	[51,11; 51,91]	[51,38; 52,21]	[50,99; 51,84]	[51,11; 51,98]								

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138									
	auswertbar	Anzahl	93449	81458	74077	68072	63040	60274	57017	53794	51093	48426	46041	43657									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,15	30,18	30,18	30,21	30,18	30,23	30,23	30,27	30,27	30,22	30,22	30,20	30,22								
		CI Mean	[30,11; 30,18]	[30,14; 30,21]	[30,14; 30,21]	[30,17; 30,25]	[30,14; 30,22]	[30,19; 30,27]	[30,19; 30,27]	[30,23; 30,32]	[30,17; 30,27]	[30,17; 30,26]	[30,15; 30,25]	[30,17; 30,27]									
		Median	29,40	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41								
		Fallbasis mittlere Differenz		81405	74028	68030	63000	60235	56984	53762	51063	48395	46013	43629									
		Mittlere Differenz zur ED		0,01	-0,03	-0,01	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02	-0,07	-0,08	-0,12	-0,11									
		CI mittlere Differenz		[-0,01; 0,02]	[-0,04; 0,01]	[-0,03; 0,01]	[-0,07; 0,04]	[-0,05; 0,01]	[-0,06; 0,02]	[-0,04; 0,00]	[-0,10; 0,05]	[-0,11; 0,06]	[-0,14; 0,09]	[-0,14; 0,09]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	12080	10428	9396	8583	8167	7611	7233	6698	6538	6174	5928	5604									
		Anteil in %	12,93	12,80	12,68	12,61	12,96	12,63	12,69	12,45	12,80	12,75	12,88	12,84									
		CI Anteil in %	[12,71; 13,14]	[12,57; 13,03]	[12,44; 12,92]	[12,36; 12,86]	[12,69; 13,22]	[12,36; 12,89]	[12,41; 12,96]	[12,17; 12,73]	[12,51; 13,09]	[12,45; 13,05]	[12,57; 13,18]	[12,52; 13,15]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	38966	33840	30715	28112	26062	24981	23605	22235	21090	20026	19038	18032									
		Anteil in %	41,70	41,54	41,46	41,30	41,34	41,45	41,40	41,33	41,28	41,35	41,35	41,30									
		CI Anteil in %	[41,38; 42,01]	[41,20; 41,88]	[41,11; 41,82]	[40,93; 41,67]	[40,96; 41,73]	[41,05; 41,84]	[41,00; 41,80]	[40,92; 41,75]	[40,85; 41,70]	[40,92; 41,79]	[40,90; 41,80]	[40,84; 41,77]									
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	42403	37190	33966	31377	28811	27682	26179	24861	23465	22226	21075	20021									
		Anteil in %	45,38	45,66	45,85	46,09	45,70	45,93	45,91	46,22	45,93	45,90	45,77	45,86									
		CI Anteil in %	[45,06; 45,69]	[45,31; 46,00]	[45,49; 46,21]	[45,72; 46,47]	[45,31; 46,09]	[45,53; 46,32]	[45,51; 46,32]	[45,79; 46,64]	[45,49; 46,36]	[45,45; 46,34]	[45,32; 46,23]	[45,39; 46,33]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	106368	97818	89965	84145	79567	75344	70865	67146	63673	60566	57735	55201									
	auswertbar	Anzahl	105701	93223	85334	78671	73046	70018	66355	62700	59519	56462	53869	51153									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,10	31,08	31,01	31,03	31,00	31,04	31,02	31,07	31,02	31,03	30,99	31,00									
		CI Mean	[31,06; 31,14]	[31,04; 31,12]	[30,97; 31,06]	[30,98; 31,07]	[30,96; 31,05]	[30,99; 31,09]	[30,98; 31,07]	[31,02; 31,12]	[30,97; 31,07]	[30,97; 31,08]	[30,94; 31,04]	[30,94; 31,05]									
		Median	30,33	30,26	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,22	30,12	30,12	30,12									
		Fallbasis mittlere Differenz		93157	85269	78608	72990	69965	66304	62653	59476	56417	53831	51117									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,04	-0,12	-0,13	-0,19	-0,19	-0,24	-0,23	-0,31	-0,33	-0,39	-0,41									
		CI mittlere Differenz		[-0,05; 0,02]	[-0,14; 0,10]	[-0,14; 0,11]	[-0,21; 0,17]	[-0,21; 0,17]	[-0,26; 0,22]	[-0,25; 0,20]	[-0,33; 0,28]	[-0,36; 0,31]	[-0,42; 0,37]	[-0,44; 0,39]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35								
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	15776	14074	13038	11915	11331	10706	10168	9461	9095	8630	8317	7886									
		Anteil in %	14,93	15,10	15,28	15,15	15,51	15,29	15,32	15,09	15,28	15,28	15,44	15,42									
		CI Anteil in %	[14,71; 15,14]	[14,87; 15,33]	[15,04; 15,52]	[14,89; 15,40]	[15,25; 15,77]	[15,02; 15,56]	[15,05; 15,60]	[14,81; 15,37]	[14,99; 15,57]	[14,99; 15,58]	[15,13; 15,74]	[15,10; 15,73]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	34607	30593	28112	25957	23956	22967	21795	20520	19511	18493	17731	16839									
		Anteil in %	32,74	32,82	32,94	32,99	32,80	32,80	32,85	32,73	32,78	32,75	32,92	32,92									
		CI Anteil in %	[32,46; 33,02]	[32,52; 33,12]	[32,63; 33,26]	[32,67; 33,32]	[32,46; 33,14]	[32,45; 33,15]	[32,49; 33,20]	[32,36; 33,09]	[32,40; 33,16]	[32,37; 33,14]	[32,52; 33,31]	[32,51; 33,33]									
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	55318	48556	44184	40799	37759	36345	34392	32719	30913	29339	27821	26428										
	Anteil in %	52,33	52,09	51,78	51,86	51,69	51,91	51,83	52,18	51,94	51,96	51,65	51,66										
	CI Anteil in %	[52,03; 52,64]	[51,77; 52,41]	[51,44; 52,11]	[51,51; 52,21]	[51,33; 52,05]	[51,54; 52,28]	[51,45; 52,21]	[51,79; 52,57]	[51,54; 52,34]	[51,55; 52,37]	[51,22; 52,07]	[51,23; 52,10]										

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740									
	auswertbar	Anzahl	98384	85905	77347	71029	67702	63674	59958	56649	53575	51006	48454									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,29	30,21	30,26	30,23	30,29	30,30	30,33	30,31	30,30	30,27	30,28									
		CI Mean	[30,26; 30,33]	[30,17; 30,24]	[30,22; 30,30]	[30,20; 30,27]	[30,25; 30,33]	[30,26; 30,34]	[30,29; 30,37]	[30,26; 30,35]	[30,26; 30,35]	[30,22; 30,31]	[30,24; 30,33]									
		Median	29,63	29,41	29,41	29,41	29,54	29,59	29,64	29,61	29,59	29,41	29,54									
		Fallbasis mittlere Differenz		85842	77286	70975	67652	63626	59910	56603	53534	50966	48414									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,11	-0,16	-0,12	-0,13	-0,12	-0,16	-0,16	-0,20	-0,20									
		CI mittlere Differenz		[-0,13; - 0,10]	[-0,12; - 0,09]	[-0,18; - 0,14]	[-0,14; - 0,10]	[-0,15; - 0,11]	[-0,14; - 0,10]	[-0,18; - 0,13]	[-0,18; - 0,14]	[-0,22; - 0,18]	[-0,22; - 0,17]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	12295	11130	9795	9169	8423	7930	7378	6998	6602	6354	5941									
		Anteil in %	12,50	12,96	12,66	12,91	12,44	12,45	12,31	12,35	12,32	12,46	12,26									
		CI Anteil in %	[12,29; 12,70]	[12,73; 13,18]	[12,43; 12,90]	[12,66; 13,16]	[12,19; 12,69]	[12,20; 12,71]	[12,04; 12,57]	[12,08; 12,62]	[12,08; 12,60]	[12,04; 12,74]	[12,17; 12,55]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	39965	35199	31648	29045	27792	26080	24533	23238	21988	20998	19969									
		Anteil in %	40,62	40,97	40,92	40,89	41,05	40,96	40,92	41,02	41,04	41,17	41,21									
		CI Anteil in %	[40,31; 40,93]	[40,65; 41,30]	[40,57; 41,26]	[40,53; 41,25]	[40,68; 41,42]	[40,58; 41,34]	[40,52; 41,31]	[40,62; 41,43]	[40,62; 41,46]	[40,62; 41,59]	[40,74; 41,65]									
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	46124	39576	35904	32815	31487	29664	28047	26413	24985	23654	22544									
		Anteil in %	46,88	46,07	46,42	46,20	46,51	46,59	46,78	46,63	46,64	46,37	46,53									
		CI Anteil in %	[46,57; 47,19]	[45,74; 46,40]	[46,07; 46,77]	[45,83; 46,57]	[46,13; 46,88]	[46,20; 46,97]	[46,38; 47,18]	[46,21; 47,04]	[46,21; 47,06]	[45,94; 46,81]	[46,08; 46,97]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660									
	auswertbar	Anzahl	111453	98661	89491	82460	78618	74211	70139	66311	62737	59702	56720									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,28	31,13	31,16	31,11	31,16	31,12	31,17	31,11	31,12	31,09	31,10									
		CI Mean	[31,25; 31,32]	[31,10; 31,17]	[31,12; 31,20]	[31,06; 31,15]	[31,12; 31,20]	[31,07; 31,16]	[31,12; 31,22]	[31,06; 31,16]	[31,07; 31,17]	[31,04; 31,14]	[31,05; 31,15]									
		Median	30,48	30,41	30,44	30,41	30,43	30,39	30,42	30,36	30,39	30,30	30,36									
		Fallbasis mittlere Differenz		98583	89423	82393	78550	74151	70085	66262	62691	59658	56677									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,15	-0,23	-0,22	-0,28	-0,25	-0,33	-0,35	-0,41	-0,43									
		CI mittlere Differenz		[-0,16; - 0,13]	[-0,16; - 0,13]	[-0,25; - 0,22]	[-0,24; - 0,20]	[-0,30; - 0,26]	[-0,28; - 0,23]	[-0,35; - 0,31]	[-0,38; - 0,33]	[-0,44; - 0,39]	[-0,46; - 0,41]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	15719	14540	13051	12167	11423	10882	10102	9650	9170	8767	8315									
		Anteil in %	14,10	14,74	14,58	14,76	14,53	14,66	14,40	14,55	14,62	14,68	14,66									
		CI Anteil in %	[13,90; 14,31]	[14,52; 14,96]	[14,35; 14,81]	[14,51; 15,00]	[14,28; 14,78]	[14,41; 14,92]	[14,14; 14,66]	[14,28; 14,82]	[14,34; 14,89]	[14,40; 14,97]	[14,37; 14,95]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	35863	32162	29025	26965	25666	24366	22962	21958	20645	19758	18659									
		Anteil in %	32,18	32,60	32,43	32,70	32,65	32,83	32,74	33,11	32,91	33,09	32,90									
		CI Anteil in %	[31,90; 32,45]	[32,31; 32,89]	[32,13; 32,74]	[32,38; 33,02]	[32,32; 32,97]	[32,50; 33,17]	[32,39; 33,09]	[32,76; 33,47]	[32,76; 33,27]	[32,72; 33,47]	[32,51; 33,28]									
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	59871	51959	47415	43328	41529	38963	37075	34703	32922	31177	29746									
		Anteil in %	53,72	52,66	52,98	52,54	52,82	52,50	52,86	52,33	52,48	52,22	52,44									
		CI Anteil in %	[53,43; 54,01]	[52,35; 52,98]	[52,66; 53,31]	[52,20; 52,89]	[52,47; 53,17]	[52,14; 52,86]	[52,49; 53,23]	[51,95; 52,71]	[52,09; 52,87]	[51,82; 52,62]	[52,03; 52,85]									

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931												
	auswertbar	Anzahl	90996	78381	70231	66343	61899	58142	54662	51505	49009	46348												
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,23	30,25	30,22	30,26	30,28	30,32	30,27	30,29	30,25	30,26												
		CI Mean	[30,20; 30,27]	[30,21; 30,29]	[30,18; 30,26]	[30,22; 30,30]	[30,24; 30,32]	[30,27; 30,36]	[30,23; 30,32]	[30,24; 30,34]	[30,20; 30,30]	[30,22; 30,31]												
		Median	29,41	29,41	29,41	29,41	29,51	29,59	29,45	29,56	29,41	29,41												
		Fallbasis mittlere Differenz		78314	70171	66290	61848	58093	54616	51461	48966	46307												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,01	-0,08	-0,05	-0,06	-0,03	-0,09	-0,09	-0,12	-0,12												
		CI mittlere Differenz		[-0,03; 0,00]	[-0,09; 0,06]	[-0,07; 0,03]	[-0,07; 0,04]	[-0,05; 0,01]	[-0,11; 0,07]	[-0,11; 0,07]	[-0,15; 0,10]	[-0,15; 0,10]												
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	11854	10167	9241	8525	7818	7342	6982	6533	6267	5898												
		Anteil in %	13,03	12,97	13,16	12,85	12,63	12,63	12,77	12,68	12,79	12,73												
		CI Anteil in %	[12,81; 13,25]	[12,74; 13,21]	[12,91; 13,41]	[12,60; 13,10]	[12,37; 12,89]	[12,36; 12,90]	[12,49; 13,05]	[12,40; 12,97]	[12,49; 13,08]	[12,42; 13,03]												
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	37287	32034	28810	27157	25323	23631	22330	20966	20069	19002												
		Anteil in %	40,98	40,87	41,02	40,93	40,91	40,64	40,85	40,71	40,95	41,00												
		CI Anteil in %	[40,66; 41,30]	[40,53; 41,21]	[40,66; 41,39]	[40,56; 41,31]	[40,52; 41,30]	[40,24; 41,04]	[40,44; 41,26]	[40,28; 41,13]	[40,51; 41,38]	[40,55; 41,45]												
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	41855	36180	32180	30661	28758	27169	25350	24006	22673	21448												
		Anteil in %	46,00	46,16	45,82	46,22	46,46	46,73	46,38	46,61	46,26	46,28												
		CI Anteil in %	[45,67; 46,32]	[45,81; 46,51]	[45,45; 46,19]	[45,84; 46,60]	[46,07; 46,85]	[46,32; 47,13]	[45,96; 46,79]	[46,18; 47,04]	[45,82; 46,70]	[45,82; 46,73]												
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214												
	auswertbar	Anzahl	102403	89260	80267	76263	71567	67315	63424	59932	56998	53962												
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,18	31,14	31,04	31,08	31,06	31,10	31,07	31,07	31,03	31,03												
		CI Mean	[31,14; 31,22]	[31,10; 31,18]	[31,00; 31,08]	[31,03; 31,12]	[31,01; 31,11]	[31,05; 31,15]	[31,02; 31,12]	[31,01; 31,12]	[30,97; 31,08]	[30,98; 31,08]												
		Median	30,43	30,36	30,12	30,26	30,22	30,36	30,30	30,30	30,12	30,12												
		Fallbasis mittlere Differenz		89179	80198	76198	71506	67257	63370	59883	56947	53916												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,06	-0,19	-0,17	-0,22	-0,22	-0,29	-0,32	-0,38	-0,40												
		CI mittlere Differenz		[-0,07; 0,04]	[-0,20; 0,17]	[-0,19; 0,15]	[-0,24; 0,20]	[-0,24; 0,20]	[-0,31; 0,27]	[-0,34; 0,29]	[-0,40; 0,35]	[-0,43; 0,38]												
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	15094	13374	12328	11629	10916	10217	9625	9089	8678	8237												
		Anteil in %	14,74	14,98	15,36	15,25	15,25	15,18	15,18	15,17	15,23	15,26												
		CI Anteil in %	[14,52; 14,96]	[14,75; 15,22]	[15,11; 15,61]	[14,99; 15,50]	[14,99; 15,52]	[14,91; 15,45]	[14,90; 15,45]	[14,88; 15,45]	[14,93; 15,52]	[14,96; 15,57]												
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	33218	29079	26396	24905	23406	21776	20660	19568	18735	17666												
		Anteil in %	32,44	32,58	32,89	32,66	32,71	32,35	32,57	32,65	32,87	32,74												
		CI Anteil in %	[32,15; 32,73]	[32,27; 32,89]	[32,56; 33,21]	[32,32; 32,99]	[32,36; 33,05]	[32,00; 32,70]	[32,21; 32,94]	[32,27; 33,03]	[32,48; 33,26]	[32,34; 33,13]												
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	54091	46807	41543	39729	37245	35322	33139	31275	29585	28059													
	Anteil in %	52,82	52,44	51,76	52,09	52,04	52,47	52,25	52,18	51,91	52,00													
	CI Anteil in %	[52,52; 53,13]	[52,11; 52,77]	[51,41; 52,10]	[51,74; 52,45]	[51,68; 52,41]	[52,10; 52,85]	[51,86; 52,64]	[51,78; 52,58]	[51,50; 52,32]	[51,58; 52,42]													

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808										
	auswertbar	Anzahl	98875	84857	78205	72074	67085	62936	59278	56074	52975									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,38	30,25	30,32	30,32	30,37	30,33	30,33	30,35	30,34	30,36								
		CI Mean	[30,34; 30,41]	[30,22; 30,29]	[30,28; 30,36]	[30,28; 30,36]	[30,33; 30,41]	[30,29; 30,37]	[30,31; 30,39]	[30,29; 30,38]	[30,32; 30,41]									
		Median	29,69	29,41	29,59	29,59	29,67	29,59	29,63	29,61	29,67									
		Fallbasis mittlere Differenz		84778	78132	72007	67027	62880	59228	56028	52932									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,13	-0,16	-0,12	-0,18	-0,18	-0,21	-0,20									
		CI mittlere Differenz		[-0,18; - 0,15]	[-0,15; - 0,12]	[-0,17; - 0,14]	[-0,14; - 0,10]	[-0,20; - 0,16]	[-0,20; - 0,16]	[-0,23; - 0,19]	[-0,22; - 0,18]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	12418	11063	10013	9078	8273	7926	7386	7088	6648									
		Anteil in %	12,56	13,04	12,80	12,60	12,33	12,59	12,46	12,64	12,55									
		CI Anteil in %	[12,35; 12,77]	[12,81; 13,26]	[12,57; 13,04]	[12,35; 12,84]	[12,08; 12,58]	[12,33; 12,85]	[12,19; 12,73]	[12,37; 12,92]	[12,27; 12,83]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	39668	34615	31629	29410	27262	25630	24063	22777	21391									
		Anteil in %	40,12	40,79	40,44	40,81	40,64	40,72	40,59	40,62	40,38									
		CI Anteil in %	[39,81; 40,42]	[40,46; 41,12]	[40,10; 40,79]	[40,45; 41,16]	[40,27; 41,01]	[40,34; 41,11]	[40,20; 40,99]	[40,21; 41,03]	[39,96; 40,80]									
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	46789	39179	36563	33586	31550	29380	27829	26209	24936									
		Anteil in %	47,32	46,17	46,75	46,60	47,03	46,68	46,95	46,74	47,07									
		CI Anteil in %	[47,01; 47,63]	[45,84; 46,51]	[46,40; 47,10]	[46,24; 46,96]	[46,65; 47,41]	[46,29; 47,07]	[46,54; 47,35]	[46,33; 47,15]	[46,65; 47,50]									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228									
	auswertbar	Anzahl	109020	94925	88095	81546	76404	71952	67935	64479	61083									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,32	31,15	31,16	31,13	31,18	31,13	31,16	31,13	31,14									
		CI Mean	[31,29; 31,36]	[31,11; 31,19]	[31,12; 31,20]	[31,09; 31,18]	[31,14; 31,23]	[31,09; 31,18]	[31,11; 31,20]	[31,08; 31,17]	[31,09; 31,19]									
		Median	30,47	30,36	30,41	30,37	30,41	30,33	30,39	30,30	30,35									
		Fallbasis mittlere Differenz		94833	88014	81470	76332	71890	67873	64416	61027									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,20	-0,22	-0,26	-0,25	-0,32	-0,35	-0,40	-0,43									
		CI mittlere Differenz		[-0,22; - 0,19]	[-0,23; - 0,20]	[-0,28; - 0,25]	[-0,27; - 0,23]	[-0,34; - 0,30]	[-0,37; - 0,33]	[-0,42; - 0,38]	[-0,45; - 0,40]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	15707	14277	13127	12148	11203	10693	10033	9597	9043									
		Anteil in %	14,41	15,04	14,90	14,90	14,66	14,86	14,77	14,88	14,80									
		CI Anteil in %	[14,20; 14,62]	[14,81; 15,27]	[14,67; 15,14]	[14,65; 15,14]	[14,41; 14,91]	[14,60; 15,12]	[14,50; 15,04]	[14,61; 15,16]	[14,52; 15,09]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	34804	30925	28609	26681	24873	23511	22200	21119	20004									
		Anteil in %	31,92	32,58	32,48	32,72	32,55	32,68	32,68	32,75	32,75									
		CI Anteil in %	[31,65; 32,20]	[32,28; 32,88]	[32,17; 32,78]	[32,40; 33,04]	[32,22; 32,89]	[32,33; 33,02]	[32,33; 33,03]	[32,39; 33,12]	[32,38; 33,12]									
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	58509	49723	46359	42717	40328	37748	35702	33763	32036										
	Anteil in %	53,67	52,38	52,62	52,38	52,78	52,46	52,55	52,36	52,45										
	CI Anteil in %	[53,37; 53,96]	[52,06; 52,70]	[52,29; 52,95]	[52,04; 52,73]	[52,43; 53,14]	[52,10; 52,83]	[52,18; 52,93]	[51,98; 52,75]	[52,05; 52,84]										

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871										
	auswertbar	Anzahl	67164	58543	52897	48807	45658	42828	40512	38303										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,31	30,31	30,32	30,37	30,35	30,35	30,34	30,38										
		CI Mean	[30,27; 30,35]	[30,27; 30,35]	[30,27; 30,36]	[30,32; 30,41]	[30,30; 30,40]	[30,30; 30,40]	[30,29; 30,39]	[30,32; 30,43]										
		Median	29,59	29,59	29,64	29,69	29,67	29,67	29,67	29,70										
		Fallbasis mittlere Differenz		58515	52870	48780	45633	42804	40488	38282										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,03	-0,04	-0,01	-0,05	-0,05	-0,09	-0,08										
		CI mittlere Differenz		[-0,04; - 0,01]	[-0,06; - 0,03]	[-0,03; - 0,01]	[-0,07; - 0,03]	[-0,08; - 0,03]	[-0,12; - 0,07]	[-0,11; - 0,06]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	8788	7602	6798	6126	5755	5364	5121	4798										
		Anteil in %	13,08	12,99	12,85	12,55	12,60	12,52	12,64	12,53										
		CI Anteil in %	[12,83; 13,34]	[12,71; 13,26]	[12,57; 13,14]	[12,26; 12,85]	[12,30; 12,91]	[12,21; 12,84]	[12,32; 12,96]	[12,19; 12,86]										
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	26915	23493	21284	19621	18356	17231	16272	15374										
		Anteil in %	40,07	40,13	40,24	40,20	40,20	40,23	40,17	40,14										
		CI Anteil in %	[39,70; 40,44]	[39,73; 40,53]	[39,82; 40,65]	[39,77; 40,64]	[39,75; 40,65]	[39,77; 40,70]	[39,69; 40,64]	[39,65; 40,63]										
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	31461	27448	24815	23060	21547	20233	19119	18131										
		Anteil in %	46,84	46,89	46,91	47,25	47,19	47,24	47,19	47,34										
		CI Anteil in %	[46,46; 47,22]	[46,48; 47,29]	[46,49; 47,34]	[46,80; 47,69]	[46,73; 47,65]	[46,77; 47,72]	[46,71; 47,68]	[46,84; 47,84]										
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527										
	auswertbar	Anzahl	73587	64870	59321	55042	51761	48620	46199	43760										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,29	31,21	31,17	31,21	31,16	31,17	31,12	31,16										
		CI Mean	[31,24; 31,33]	[31,16; 31,26]	[31,12; 31,22]	[31,15; 31,26]	[31,10; 31,21]	[31,12; 31,23]	[31,07; 31,18]	[31,10; 31,22]										
		Median	30,46	30,43	30,41	30,43	30,41	30,39	30,36	30,39										
		Fallbasis mittlere Differenz		64839	59289	55014	51738	48600	46180	43741										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,10	-0,16	-0,15	-0,22	-0,24	-0,32	-0,32										
		CI mittlere Differenz		[-0,12; - 0,09]	[-0,18; - 0,15]	[-0,17; - 0,13]	[-0,24; - 0,20]	[-0,27; - 0,22]	[-0,34; - 0,29]	[-0,35; - 0,30]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	10684	9631	8833	8037	7672	7144	6862	6457										
		Anteil in %	14,52	14,85	14,89	14,60	14,82	14,69	14,85	14,76										
		CI Anteil in %	[14,26; 14,77]	[14,57; 15,12]	[14,60; 15,18]	[14,31; 14,90]	[14,52; 15,13]	[14,38; 15,01]	[14,53; 15,18]	[14,42; 15,09]										
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	23796	20962	19338	17953	16859	15883	15135	14293										
		Anteil in %	32,34	32,31	32,60	32,62	32,57	32,67	32,76	32,66										
		CI Anteil in %	[32,00; 32,68]	[31,95; 32,67]	[32,22; 32,98]	[32,23; 33,01]	[32,17; 32,97]	[32,25; 33,08]	[32,33; 33,19]	[32,22; 33,10]										
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	39107	34277	31150	29052	27230	25593	24202	23010											
	Anteil in %	53,14	52,84	52,51	52,78	52,61	52,64	52,39	52,58											
	CI Anteil in %	[52,78; 53,50]	[52,46; 53,22]	[52,11; 52,91]	[52,36; 53,20]	[52,18; 53,04]	[52,20; 53,08]	[51,93; 52,84]	[52,11; 53,05]											

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446														
	auswertbar	Anzahl	71771	62037	56091	51791	48327	45381	42824														
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,38	30,31	30,37	30,34	30,37	30,37	30,39														
		CI Mean	[30,34; 30,42]	[30,27; 30,35]	[30,32; 30,41]	[30,29; 30,38]	[30,32; 30,42]	[30,32; 30,41]	[30,34; 30,44]														
		Median	29,67	29,45	29,63	29,59	29,67	29,67	29,71														
		Fallbasis mittlere Differenz		62008	56062	51762	48303	45360	42806														
		Mittlere Differenz zur ED			-0,12	-0,09	-0,14	-0,13	-0,16	-0,15													
		CI mittlere Differenz			[-0,13; - 0,10]	[-0,11; - 0,07]	[-0,16; - 0,12]	[-0,15; - 0,11]	[-0,18; - 0,14]	[-0,17; - 0,13]													
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	9034	7912	6863	6383	5874	5504	5202														
		Anteil in %	12,59	12,75	12,24	12,32	12,15	12,13	12,15														
		CI Anteil in %	[12,34; 12,83]	[12,49; 13,02]	[11,96; 12,51]	[12,04; 12,61]	[11,86; 12,45]	[11,83; 12,43]	[11,84; 12,46]														
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	28944	25350	22951	21237	19728	18521	17305														
		Anteil in %	40,33	40,86	40,92	41,01	40,82	40,81	40,41														
		CI Anteil in %	[39,97; 40,69]	[40,48; 41,25]	[40,51; 41,32]	[40,58; 41,43]	[40,38; 41,26]	[40,36; 41,26]	[39,94; 40,87]														
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	33793	28775	26277	24171	22725	21356	20317														
		Anteil in %	47,08	46,38	46,85	46,67	47,02	47,06	47,44														
		CI Anteil in %	[46,72; 47,45]	[45,99; 46,78]	[46,43; 47,26]	[46,24; 47,10]	[46,58; 47,47]	[46,60; 47,52]	[46,97; 47,92]														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078														
	auswertbar	Anzahl	76446	66941	61185	56637	53028	50151	47462														
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,32	31,15	31,16	31,10	31,13	31,10	31,12														
		CI Mean	[31,28; 31,37]	[31,10; 31,20]	[31,11; 31,21]	[31,04; 31,15]	[31,08; 31,18]	[31,05; 31,16]	[31,07; 31,18]														
		Median	30,47	30,36	30,39	30,22	30,39	30,30	30,39														
		Fallbasis mittlere Differenz		66908	61157	56608	52997	50121	47432														
		Mittlere Differenz zur ED			-0,17	-0,18	-0,25	-0,26	-0,30	-0,32													
		CI mittlere Differenz			[-0,19; - 0,16]	[-0,20; - 0,16]	[-0,27; - 0,23]	[-0,28; - 0,24]	[-0,33; - 0,28]	[-0,35; - 0,30]													
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	11124	10176	9145	8598	7954	7517	7113														
		Anteil in %	14,55	15,20	14,95	15,18	15,00	14,99	14,99														
		CI Anteil in %	[14,30; 14,80]	[14,93; 15,47]	[14,66; 15,23]	[14,89; 15,48]	[14,70; 15,30]	[14,68; 15,30]	[14,67; 15,31]														
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	24439	21711	19925	18547	17246	16441	15466														
		Anteil in %	31,97	32,43	32,57	32,75	32,52	32,78	32,59														
		CI Anteil in %	[31,64; 32,30]	[32,08; 32,79]	[32,19; 32,94]	[32,36; 33,13]	[32,12; 32,92]	[32,37; 33,19]	[32,16; 33,01]														
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	40883	35054	32115	29492	27828	26193	24883														
		Anteil in %	53,48	52,37	52,49	52,07	52,48	52,23	52,43														
		CI Anteil in %	[53,13; 53,83]	[51,99; 52,74]	[52,09; 52,88]	[51,66; 52,48]	[52,05; 52,90]	[51,79; 52,67]	[51,98; 52,88]														

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280														
	auswertbar	Anzahl	65846	57232	51451	47295	44417	41666														
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,42	30,40	30,38	30,42	30,44	30,46														
		CI Mean	[30,38; 30,47]	[30,35; 30,44]	[30,33; 30,43]	[30,38; 30,47]	[30,39; 30,49]	[30,41; 30,51]														
		Median	29,67	29,67	29,65	29,70	29,70	29,71														
		Fallbasis mittlere Differenz		57207	51424	47269	44392	41643														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,04	-0,09	-0,07	-0,09	-0,08														
		CI mittlere Differenz		[-0,05; - 0,03]	[-0,10; - 0,07]	[-0,09; - 0,05]	[-0,11; - 0,07]	[-0,11; - 0,06]														
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	8445	7280	6515	5888	5489	5030														
		Anteil in %	12,83	12,72	12,66	12,45	12,36	12,07														
		CI Anteil in %	[12,57; 13,08]	[12,45; 12,99]	[12,38; 12,95]	[12,15; 12,75]	[12,05; 12,66]	[11,76; 12,39]														
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	26188	22902	20753	18964	17855	16768														
		Anteil in %	39,77	40,02	40,34	40,10	40,20	40,24														
		CI Anteil in %	[39,40; 40,15]	[39,61; 40,42]	[39,91; 40,76]	[39,66; 40,54]	[39,74; 40,65]	[39,77; 40,71]														
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	31213	27050	24183	22443	21073	19868														
		Anteil in %	47,40	47,26	47,00	47,45	47,44	47,68														
		CI Anteil in %	[47,02; 47,78]	[46,85; 47,67]	[46,57; 47,43]	[47,00; 47,90]	[46,98; 47,91]	[47,20; 48,16]														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447														
	auswertbar	Anzahl	71377	63050	57157	52992	49787	46869														
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,35	31,25	31,20	31,19	31,16	31,18														
		CI Mean	[31,30; 31,40]	[31,20; 31,31]	[31,15; 31,25]	[31,14; 31,25]	[31,10; 31,22]	[31,13; 31,24]														
		Median	30,47	30,43	30,39	30,39	30,32	30,41														
		Fallbasis mittlere Differenz		63021	57132	52966	49764	46850														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,11	-0,18	-0,21	-0,25	-0,26														
		CI mittlere Differenz		[-0,13; - 0,09]	[-0,20; - 0,16]	[-0,23; - 0,19]	[-0,28; - 0,23]	[-0,28; - 0,24]														
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	10596	9565	8685	8050	7576	7039														
		Anteil in %	14,85	15,17	15,19	15,19	15,22	15,02														
		CI Anteil in %	[14,58; 15,11]	[14,89; 15,45]	[14,90; 15,49]	[14,89; 15,50]	[14,90; 15,53]	[14,70; 15,34]														
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	22711	20121	18471	17057	16196	15169														
		Anteil in %	31,82	31,91	32,32	32,19	32,53	32,36														
CI Anteil in %		[31,48; 32,16]	[31,55; 32,28]	[31,93; 32,70]	[31,79; 32,59]	[32,12; 32,94]	[31,94; 32,79]															
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	38070	33364	30001	27885	26015	24661															
	Anteil in %	53,34	52,92	52,49	52,62	52,25	52,62															
	CI Anteil in %	[52,97; 53,70]	[52,53; 53,31]	[52,08; 52,90]	[52,20; 53,05]	[51,81; 52,69]	[52,16; 53,07]															

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460													
	auswertbar	Anzahl	75437	65947	59666	55173	51614													
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,51	30,40	30,42	30,41	30,44													
		CI Mean	[30,48; 30,55]	[30,36; 30,44]	[30,38; 30,46]	[30,36; 30,45]	[30,40; 30,49]													
		Median	29,75	29,70	29,71	29,71	29,73													
		Fallbasis mittlere Differenz		65919	59633	55142	51583													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,14	-0,17	-0,14													
		CI mittlere Differenz		[-0,16; - 0,13]	[-0,16; - 0,13]	[-0,18; - 0,15]	[-0,16; - 0,12]													
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00													
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	9187	8267	7312	6772	6247													
		Anteil in %	12,18	12,54	12,25	12,27	12,10													
		CI Anteil in %	[11,94; 12,41]	[12,28; 12,79]	[11,99; 12,52]	[12,00; 12,55]	[11,82; 12,38]													
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	29670	26420	23918	22178	20632													
		Anteil in %	39,33	40,06	40,09	40,20	39,97													
		CI Anteil in %	[38,98; 39,68]	[39,69; 40,44]	[39,69; 40,48]	[39,79; 40,61]	[39,55; 40,40]													
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	36580	31260	28436	26223	24735													
		Anteil in %	48,49	47,40	47,66	47,53	47,92													
		CI Anteil in %	[48,13; 48,85]	[47,02; 47,78]	[47,26; 48,06]	[47,11; 47,95]	[47,49; 48,35]													
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365													
	auswertbar	Anzahl	79414	70596	64551	60180	56416													
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,46	31,25	31,23	31,20	31,20													
		CI Mean	[31,41; 31,50]	[31,20; 31,30]	[31,18; 31,28]	[31,15; 31,25]	[31,15; 31,25]													
		Median	30,49	30,44	30,44	30,41	30,43													
		Fallbasis mittlere Differenz		70561	64512	60143	56382													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,19	-0,23	-0,27	-0,30													
		CI mittlere Differenz		[-0,21; - 0,18]	[-0,24; - 0,21]	[-0,29; - 0,26]	[-0,32; - 0,27]													
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00													
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	11073	10441	9589	9002	8351													
		Anteil in %	13,94	14,79	14,85	14,96	14,80													
		CI Anteil in %	[13,70; 14,18]	[14,53; 15,05]	[14,58; 15,13]	[14,67; 15,24]	[14,51; 15,10]													
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	25128	22665	20788	19444	18205													
		Anteil in %	31,64	32,11	32,20	32,31	32,27													
		CI Anteil in %	[31,32; 31,97]	[31,76; 32,45]	[31,84; 32,56]	[31,94; 32,68]	[31,88; 32,66]													
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	43213	37490	34174	31734	29860														
	Anteil in %	54,41	53,10	52,94	52,73	52,93														
	CI Anteil in %	[54,07; 54,76]	[52,74; 53,47]	[52,56; 53,33]	[52,33; 53,13]	[52,52; 53,34]														

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	61608	55900	51784															
	auswertbar	Anzahl	67853	59697	54058	49912															
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,49	30,44	30,43	30,48															
		CI Mean	[30,45; 30,53]	[30,39; 30,48]	[30,39; 30,48]	[30,44; 30,53]															
		Median	29,70	29,67	29,70	29,73															
		Fallbasis mittlere Differenz		59669	54023	49880															
		Mittlere Differenz zur ED			-0,07	-0,10	-0,07														
		CI mittlere Differenz			[-0,08; - 0,05]	[-0,11; - 0,08]	[-0,09; - 0,05]														
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00														
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	8695	7663	6836	6167															
		Anteil in %	12,81	12,84	12,65	12,36															
		CI Anteil in %	[12,56; 13,07]	[12,57; 13,10]	[12,37; 12,93]	[12,07; 12,64]															
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	26863	23820	21592	19887															
		Anteil in %	39,59	39,90	39,94	39,84															
		CI Anteil in %	[39,22; 39,96]	[39,51; 40,29]	[39,53; 40,36]	[39,41; 40,27]															
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	32295	28214	25630	23858															
		Anteil in %	47,60	47,26	47,41	47,80															
		CI Anteil in %	[47,22; 47,97]	[46,86; 47,66]	[46,99; 47,83]	[47,36; 48,24]															
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	66943	61246	56909															
	auswertbar	Anzahl	72892	65027	59303	55025															
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,47	31,34	31,25	31,28															
		CI Mean	[31,42; 31,52]	[31,29; 31,39]	[31,20; 31,31]	[31,23; 31,34]															
		Median	30,48	30,47	30,44	30,46															
		Fallbasis mittlere Differenz		65011	59287	55004															
		Mittlere Differenz zur ED			-0,13	-0,21	-0,21														
		CI mittlere Differenz			[-0,14; - 0,11]	[-0,23; - 0,20]	[-0,23; - 0,19]														
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00														
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	10510	9642	8869	8113															
		Anteil in %	14,42	14,83	14,96	14,74															
		CI Anteil in %	[14,16; 14,67]	[14,55; 15,10]	[14,67; 15,24]	[14,45; 15,04]															
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	22916	20621	19103	17685															
		Anteil in %	31,44	31,71	32,21	32,14															
		CI Anteil in %	[31,10; 31,78]	[31,35; 32,07]	[31,84; 32,59]	[31,75; 32,53]															
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	39466	34764	31331	29227																
	Anteil in %	54,14	53,46	52,83	53,12																
	CI Anteil in %	[53,78; 54,50]	[53,08; 53,84]	[52,43; 53,23]	[52,70; 53,53]																

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	66585	60521																		
	auswertbar	Anzahl	73649	64503	58204																		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,48	30,36	30,40																	
		CI Mean		[30,44; 30,52]	[30,32; 30,40]	[30,36; 30,45]																	
		Median		29,73	29,63	29,70																	
		Fallbasis mittlere Differenz			64480	58182																	
		Mittlere Differenz zur ED			-0,13	-0,11																	
		CI mittlere Differenz			[-0,14; - 0,11]	[-0,13; - 0,10]																	
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00																	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		9178	8234	7266																	
		Anteil in %		12,46	12,77	12,48																	
		CI Anteil in %		[12,22; 12,70]	[12,51; 13,02]	[12,22; 12,75]																	
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		29193	26008	23328																	
		Anteil in %		39,64	40,32	40,08																	
		CI Anteil in %		[39,28; 39,99]	[39,94; 40,70]	[39,68; 40,48]																	
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		35278	30261	27610																	
		Anteil in %		47,90	46,91	47,44																	
		CI Anteil in %		[47,54; 48,26]	[46,53; 47,30]	[47,03; 47,84]																	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	72558	66610																		
	auswertbar	Anzahl	78866	70384	64147																		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,55	31,35	31,34																	
		CI Mean		[31,51; 31,60]	[31,30; 31,39]	[31,29; 31,39]																	
		Median		30,73	30,47	30,47																	
		Fallbasis mittlere Differenz			70348	64114																	
		Mittlere Differenz zur ED			-0,18	-0,21																	
		CI mittlere Differenz			[-0,20; - 0,17]	[-0,22; - 0,19]																	
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00																	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		11058	10369	9427																	
		Anteil in %		14,02	14,73	14,70																	
		CI Anteil in %		[13,78; 14,26]	[14,47; 14,99]	[14,42; 14,97]																	
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		24732	22368	20317																	
		Anteil in %		31,36	31,78	31,67																	
CI Anteil in %			[31,04; 31,68]	[31,44; 32,12]	[31,31; 32,03]																		
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		43076	37647	34403																		
	Anteil in %		54,62	53,49	53,63																		
	CI Anteil in %		[54,27; 54,97]	[53,12; 53,86]	[53,25; 54,02]																		

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67230	60721																				
	auswertbar	Anzahl	66764	58635																				
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,54	30,50																			
		CI Mean		[30,50; 30,58]	[30,46; 30,55]																			
		Median		29,73	29,73																			
		Fallbasis mittlere Differenz			58610																			
		Mittlere Differenz zur ED				-0,05																		
		CI mittlere Differenz				[-0,07; - 0,04]																		
		Median mittlere Differenz				0,00																		
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		8466	7437																			
		Anteil in %		12,68	12,68																			
		CI Anteil in %		[12,43; 12,93]	[12,41; 12,95]																			
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		26272	23155																			
		Anteil in %		39,35	39,49																			
		CI Anteil in %		[38,98; 39,72]	[39,09; 39,89]																			
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		32026	28043																			
		Anteil in %		47,97	47,83																			
		CI Anteil in %		[47,59; 48,35]	[47,42; 48,23]																			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465	66497																				
	auswertbar	Anzahl	71930	64273																				
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,59	31,45																			
		CI Mean		[31,54; 31,64]	[31,40; 31,50]																			
		Median		30,73	30,48																			
		Fallbasis mittlere Differenz			64252																			
		Mittlere Differenz zur ED				-0,13																		
		CI mittlere Differenz				[-0,15; - 0,12]																		
		Median mittlere Differenz				0,00																		
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		10125	9333																			
		Anteil in %		14,08	14,52																			
		CI Anteil in %		[13,82; 14,33]	[14,25; 14,79]																			
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		22488	20192																			
		Anteil in %		31,26	31,42																			
CI Anteil in %			[30,92; 31,60]	[31,06; 31,77]																				
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		39317	34748																				
	Anteil in %		54,66	54,06																				
	CI Anteil in %		[54,30; 55,02]	[53,68; 54,45]																				

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714																				
	auswertbar	Anzahl	74197																				
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	30,63																				
		CI Mean	[30,59; 30,67]																				
		Median	29,76																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
		Median mittlere Differenz																					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	9051																				
		Anteil in %	12,20																				
		CI Anteil in %	[11,96; 12,43]																				
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	28996																				
		Anteil in %	39,08																				
		CI Anteil in %	[38,73; 39,43]																				
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	36150																				
		Anteil in %	48,72																				
		CI Anteil in %	[48,36; 49,08]																				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879																				
	auswertbar	Anzahl	77349																				
	Auswertungsergebnisse zum BMI	Mean	31,67																				
		CI Mean	[31,62; 31,72]																				
		Median	30,83																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
		Median mittlere Differenz																					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	10836																				
		Anteil in %	14,01																				
		CI Anteil in %	[13,76; 14,25]																				
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	23735																				
		Anteil in %	30,69																				
		CI Anteil in %	[30,36; 31,01]																				
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	42778																					
	Anteil in %	55,31																					
	CI Anteil in %	[54,95; 55,66]																					

In Tabelle 3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen

Tabelle 3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2539	2108	1808	1530	1346	1192	1084	963	896	826	786	743	701	665	629	590	552	518	488
	auswertbar	Anzahl		1781	1681	1470	1315	1167	1056	928	857	799	746	702	676	633	599	566	527	494	470
	Raucher	Anzahl		1501	1339	1063	837	698	599	494	456	399	384	347	326	301	282	269	258	238	225
		Anteil in %		84,28	79,65	72,31	63,65	59,81	56,72	53,23	53,21	49,94	51,47	49,43	48,22	47,55	47,08	47,53	48,96	48,18	47,87
		CI Anteil in %		[82,59; 85,97]	[77,73; 81,58]	[70,02; 74,60]	[61,05; 66,25]	[57,00; 62,63]	[53,73; 59,71]	[50,02; 56,44]	[49,87; 56,55]	[46,47; 53,41]	[47,89; 55,06]	[45,73; 53,13]	[44,46; 51,99]	[43,66; 51,44]	[43,08; 51,08]	[43,41; 51,64]	[44,68; 53,23]	[43,77; 52,59]	[43,35; 52,39]
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16899</i>	<i>14082</i>	<i>12153</i>	<i>10652</i>	<i>9557</i>	<i>8669</i>	<i>7996</i>	<i>7104</i>	<i>6687</i>	<i>6220</i>	<i>5968</i>	<i>5677</i>	<i>5409</i>	<i>5125</i>	<i>4851</i>	<i>4591</i>	<i>4306</i>	<i>4096</i>	<i>3910</i>
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1207	1024	884	791	705	653	601	522	483	442	426	407	385	367	351	328	313	294	280
	auswertbar	Anzahl		861	834	766	689	641	590	511	459	427	406	385	374	350	334	315	299	281	270
	Raucher	Anzahl		719	640	532	434	376	339	275	233	210	190	187	178	160	153	147	137	129	125
		Anteil in %		83,51	76,74	69,45	62,99	58,66	57,46	53,82	50,76	49,18	46,80	48,57	47,59	45,71	45,81	46,67	45,82	45,91	46,30
CI Anteil in %			[81,03; 85,99]	[73,87; 79,61]	[66,19; 72,72]	[59,38; 66,60]	[54,84; 62,47]	[53,46; 61,45]	[49,49; 58,14]	[46,18; 55,34]	[44,43; 53,93]	[41,94; 51,66]	[43,57; 53,57]	[42,53; 52,66]	[40,49; 50,94]	[40,46; 51,16]	[41,15; 52,18]	[40,16; 51,48]	[40,07; 51,74]	[40,34; 52,26]	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23425</i>	<i>19774</i>	<i>17225</i>	<i>15242</i>	<i>13824</i>	<i>12682</i>	<i>11761</i>	<i>10454</i>	<i>9791</i>	<i>9172</i>	<i>8775</i>	<i>8282</i>	<i>7877</i>	<i>7432</i>	<i>7023</i>	<i>6650</i>	<i>6268</i>	<i>5980</i>	<i>5695</i>	
2003-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	21169	15594	12534	10430	8894	7906	7047	6528	6159	5890	5626	5387	5095	4845	4640	4405	4174	3975	
	auswertbar	Anzahl		14088	12036	10103	8670	7674	6885	6256	5919	5589	5236	5104	4874	4633	4415	4185	3972	3745	
	Raucher	Anzahl		12103	9112	6995	5634	4772	4066	3519	3207	2946	2735	2606	2450	2322	2192	2046	1929	1811	
		Anteil in %		85,91	75,71	69,24	64,98	62,18	59,06	56,25	54,18	52,71	52,23	51,06	50,27	50,12	49,65	48,89	48,56	48,36	
		CI Anteil in %		[85,34; 86,48]	[74,94; 76,47]	[68,34; 70,14]	[63,98; 65,99]	[61,10; 63,27]	[57,89; 60,22]	[55,02; 57,48]	[52,91; 55,45]	[51,40; 54,02]	[50,88; 53,59]	[49,69; 52,43]	[48,86; 51,67]	[48,68; 51,56]	[48,17; 51,12]	[47,37; 50,40]	[47,01; 50,12]	[46,76; 49,96]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>113351</i>	<i>88040</i>	<i>73383</i>	<i>63050</i>	<i>55111</i>	<i>49635</i>	<i>44958</i>	<i>42030</i>	<i>40030</i>	<i>38378</i>	<i>36843</i>	<i>35375</i>	<i>33628</i>	<i>32116</i>	<i>30707</i>	<i>29278</i>	<i>27932</i>	<i>26736</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	11023	8158	6617	5548	4775	4251	3817	3542	3387	3237	3119	2997	2849	2716	2586	2445	2354	2254	
	auswertbar	Anzahl		7446	6369	5379	4661	4164	3721	3411	3262	3086	2929	2837	2715	2580	2468	2341	2241	2139	
	Raucher	Anzahl		6214	4669	3619	2962	2540	2150	1910	1725	1574	1492	1412	1312	1228	1165	1095	1045	995	
		Anteil in %		83,45	73,31	67,28	63,55	61,00	57,78	56,00	52,88	51,00	50,94	49,77	48,32	47,60	47,20	46,77	46,63	46,52	
CI Anteil in %			[82,61; 84,30]	[72,22; 74,39]	[66,03; 68,53]	[62,17; 64,93]	[59,52; 62,48]	[56,19; 59,37]	[54,33; 57,66]	[51,17; 54,59]	[49,24; 52,77]	[49,13; 51,61]	[47,93; 51,61]	[46,44; 50,20]	[45,67; 49,52]	[45,23; 49,17]	[44,75; 48,80]	[44,57; 48,70]	[44,40; 48,63]		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>142866</i>	<i>112069</i>	<i>93979</i>	<i>81049</i>	<i>71389</i>	<i>64294</i>	<i>58333</i>	<i>54388</i>	<i>51899</i>	<i>49824</i>	<i>47865</i>	<i>45920</i>	<i>43703</i>	<i>41770</i>	<i>39917</i>	<i>38116</i>	<i>36445</i>	<i>34887</i>		
2004-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	22947	19273	16578	14280	12787	11535	10679	10183	9712	9262	8845	8413	8014	7643	7249	6894	6576		
	auswertbar	Anzahl		18332	15932	13550	12335	11169	10177	9741	9161	8687	8373	7994	7596	7223	6822	6512	6167		
	Raucher	Anzahl		15582	11715	9366	8073	6937	6023	5595	5041	4769	4489	4223	4007	3763	3526	3316	3096		
		Anteil in %		85,00	73,53	69,12	65,45	62,11	59,18	57,44	55,03	54,90	53,61	52,83	52,75	52,10	51,69	50,92	50,20		
		CI Anteil in %		[84,48; 85,52]	[72,85; 74,22]	[68,34; 69,90]	[64,61; 66,29]	[61,21; 63,01]	[58,23; 60,14]	[56,46; 58,42]	[54,01; 56,05]	[53,85; 55,94]	[52,54; 54,68]	[51,73; 53,92]	[51,63; 53,87]	[50,95; 53,25]	[50,50; 52,87]	[49,71; 52,14]	[48,95; 51,45]		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>135113</i>	<i>117334</i>	<i>103812</i>	<i>91303</i>	<i>83101</i>	<i>76292</i>	<i>71451</i>	<i>68330</i>	<i>65532</i>	<i>62899</i>	<i>60399</i>	<i>57709</i>	<i>55309</i>	<i>52910</i>	<i>50489</i>	<i>48328</i>	<i>46232</i>		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	11569	9850	8524	7486	6696	6126	5685	5442	5215	5021	4816	4552	4338	4159	3950	3777	3635		
	auswertbar	Anzahl		9389	8210	7165	6482	5957	5426	5176	4940	4717	4542	4325	4112	3932	3739	3570	3426		
	Raucher	Anzahl		7670	5779	4780	4088	3583	3092	2855	2613	2535	2410	2270	2110	2002	1907	1811	1707		
		Anteil in %		81,69	70,39	66,71	63,07	60,15	56,98	55,16	52,89	53,74	53,06	52,49	51,31	50,92	51,00	50,73	49,82		
CI Anteil in %			[80,91; 82,47]	[69,40; 71,38]	[65,62; 67,80]	[61,89; 64,24]	[58,90; 61,39]	[55,67; 58,30]	[53,80; 56,51]	[51,50; 54,29]	[52,32; 55,16]	[51,61; 54,51]	[51,00; 53,97]	[49,79; 52,84]	[49,35; 52,48]	[49,40; 52,61]	[49,09; 52,37]	[48,15; 51,50]			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>163432</i>	<i>142749</i>	<i>126918</i>	<i>112329</i>	<i>102494</i>	<i>94300</i>	<i>88366</i>	<i>84645</i>	<i>81247</i>	<i>78247</i>	<i>75048</i>	<i>71529</i>	<i>68399</i>	<i>65504</i>	<i>62532</i>	<i>59887</i>	<i>57490</i>			

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	18612	15859	13384	11650	10277	9409	8894	8423	8042	7675	7284	6933	6610	6297	6002	5709		
	auswertbar	Anzahl		14921	12682	11180	9885	8904	8451	7870	7420	7136	6842	6504	6187	5860	5583	5275		
	Raucher	Anzahl		12679	9662	8069	6767	5744	5297	4709	4330	4094	3855	3668	3422	3228	3019	2818		
		Anteil in %		84,97	76,19	72,17	68,46	64,51	62,68	59,83	58,36	57,37	56,34	56,40	55,31	55,09	54,07	53,42		
		CI Anteil in %		[84,40; 85,55]	[75,45; 76,93]	[71,34; 73,00]	[67,54; 69,37]	[63,52; 65,50]	[61,65; 63,71]	[58,75; 60,92]	[57,23; 59,48]	[56,22; 58,52]	[55,17; 57,52]	[55,19; 57,60]	[54,07; 56,55]	[53,81; 56,36]	[52,77; 55,38]	[52,08; 54,77]		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98842</i>	<i>87165</i>	<i>76003</i>	<i>67529</i>	<i>60776</i>	<i>56404</i>	<i>53744</i>	<i>51331</i>	<i>49147</i>	<i>47087</i>	<i>44843</i>	<i>42838</i>	<i>41044</i>	<i>39180</i>	<i>37515</i>	<i>35933</i>		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9343	8074	6943	6081	5419	4975	4712	4505	4309	4117	3926	3754	3598	3437	3287	3150		
	auswertbar	Anzahl		7623	6578	5882	5220	4720	4486	4233	3974	3839	3684	3520	3374	3202	3062	2913		
	Raucher	Anzahl		6278	4857	4088	3488	3005	2772	2503	2297	2191	2079	1956	1847	1747	1663	1571		
		Anteil in %		82,36	73,84	69,50	66,82	63,67	61,79	59,13	57,80	57,07	56,43	55,57	54,74	54,56	54,31	53,93		
		CI Anteil in %		[81,50; 83,21]	[72,77; 74,90]	[68,32; 70,68]	[65,54; 68,10]	[62,29; 65,04]	[60,37; 63,21]	[57,65; 60,61]	[56,26; 59,34]	[55,51; 58,64]	[54,83; 58,03]	[53,93; 57,21]	[53,06; 56,42]	[52,83; 56,28]	[52,55; 56,08]	[52,12; 55,74]		
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>115970</i>	<i>103008</i>	<i>90548</i>	<i>80776</i>	<i>73117</i>	<i>68112</i>	<i>65025</i>	<i>62178</i>	<i>59615</i>	<i>57124</i>	<i>54381</i>	<i>51939</i>	<i>49656</i>	<i>47443</i>	<i>45482</i>	<i>43521</i>		
2005-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	19557	16842	14511	12511	11288	10565	10010	9518	9017	8515	8056	7636	7243	6901	6593			
	auswertbar	Anzahl		16051	13842	12055	10783	10104	9422	8816	8499	8114	7659	7253	6861	6523	6204			
	Raucher	Anzahl		13892	10780	8846	7515	6769	6082	5479	5164	4877	4555	4247	3975	3758	3545			
		Anteil in %		86,55	77,88	73,38	69,69	66,99	64,55	62,15	60,76	60,11	59,47	58,56	57,94	57,61	57,14			
		CI Anteil in %		[86,02; 87,08]	[77,19; 78,57]	[72,59; 74,17]	[68,83; 70,56]	[66,08; 67,91]	[63,59; 65,52]	[61,14; 63,16]	[59,72; 61,80]	[59,04; 61,17]	[58,37; 60,57]	[57,42; 59,69]	[56,77; 59,10]	[56,41; 58,81]	[55,91; 58,37]			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>105631</i>	<i>93726</i>	<i>83366</i>	<i>74241</i>	<i>68487</i>	<i>64764</i>	<i>61675</i>	<i>58977</i>	<i>56190</i>	<i>53398</i>	<i>50980</i>	<i>48671</i>	<i>46510</i>	<i>44483</i>	<i>42590</i>			
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9954	8737	7633	6710	6134	5783	5518	5251	4995	4769	4528	4325	4116	3927	3744			
	auswertbar	Anzahl		8313	7294	6509	5878	5558	5209	4902	4763	4557	4320	4141	3926	3725	3536			
	Raucher	Anzahl		7010	5547	4684	4040	3673	3319	2995	2871	2733	2571	2432	2258	2138	1981			
		Anteil in %		84,33	76,05	71,96	68,73	66,08	63,72	61,10	60,28	59,97	59,51	58,73	57,51	57,40	56,02			
		CI Anteil in %		[83,54; 85,11]	[75,07; 77,03]	[70,87; 73,05]	[67,55; 69,92]	[64,84; 67,33]	[62,41; 65,02]	[59,73; 62,46]	[58,89; 61,67]	[58,55; 61,40]	[58,05; 60,98]	[57,23; 60,23]	[56,77; 59,06]	[55,81; 58,98]	[54,39; 57,66]			
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>123470</i>	<i>110813</i>	<i>99471</i>	<i>89253</i>	<i>82572</i>	<i>78403</i>	<i>74799</i>	<i>71559</i>	<i>68310</i>	<i>64988</i>	<i>62073</i>	<i>59313</i>	<i>56688</i>	<i>54194</i>	<i>51856</i>			
2005-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15521	13501	11622	10255	9504	8967	8492	8044	7557	7160	6790	6459	6129	5827				
	auswertbar	Anzahl		12828	11140	9748	9087	8477	7940	7630	7217	6825	6463	6157	5838	5546				
	Raucher	Anzahl		11052	8729	7196	6489	5780	5168	4873	4543	4220	3954	3727	3509	3265				
		Anteil in %		86,16	78,36	73,82	71,41	68,18	65,09	63,87	62,95	61,83	61,18	60,53	60,11	58,87				
		CI Anteil in %		[85,56; 86,75]	[77,59; 79,12]	[72,95; 74,69]	[70,48; 72,34]	[67,19; 69,18]	[64,04; 66,14]	[62,79; 64,94]	[61,83; 64,06]	[60,68; 62,98]	[59,99; 62,37]	[59,31; 61,75]	[58,85; 61,36]	[57,58; 60,17]				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>82253</i>	<i>73718</i>	<i>65422</i>	<i>59436</i>	<i>55776</i>	<i>52856</i>	<i>50253</i>	<i>47742</i>	<i>45177</i>	<i>42958</i>	<i>40893</i>	<i>39008</i>	<i>37209</i>	<i>35545</i>				
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8121	7114	6193	5531	5188	4893	4643	4403	4170	3928	3735	3547	3376	3201				
	auswertbar	Anzahl		6802	5988	5285	4967	4634	4378	4212	4000	3775	3589	3395	3227	3055				
	Raucher	Anzahl		5781	4629	3861	3455	3103	2779	2622	2455	2294	2155	2003	1877	1768				
		Anteil in %		84,99	77,30	73,06	69,56	66,96	63,48	62,25	61,38	60,77	60,04	59,00	58,17	57,87				
		CI Anteil in %		[84,14; 85,84]	[76,24; 78,37]	[71,86; 74,25]	[68,28; 70,84]	[65,61; 68,32]	[62,05; 64,90]	[60,79; 63,71]	[59,87; 62,88]	[59,21; 62,33]	[58,44; 61,65]	[57,34; 60,65]	[56,46; 59,87]	[56,12; 59,62]				
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>95017</i>	<i>86040</i>	<i>76949</i>	<i>70289</i>	<i>66335</i>	<i>62988</i>	<i>60040</i>	<i>57162</i>	<i>54131</i>	<i>51560</i>	<i>49016</i>	<i>46705</i>	<i>44599</i>	<i>42683</i>				
2006-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	17680	15407	13539	12334	11432	10731	10112	9418	8829	8368	7934	7538	7155					
	auswertbar	Anzahl		14815	12807	11745	10781	9876	9523	8916	8345	7919	7484	7098	6725					
	Raucher	Anzahl		12822	9942	8721	7685	6534	6171	5701	5246	4931	4591	4315	4044					
		Anteil in %		86,55	77,63	74,25	71,28	66,16	64,80	63,94	62,86	62,27	61,34	60,79	60,13					
		CI Anteil in %		[86,00; 87,10]	[76,91; 78,35]	[73,46; 75,04]	[70,43; 72,14]	[65,23; 67,09]	[63,84; 65,76]	[62,94; 64,94]	[61,83; 63,90]	[61,20; 63,34]	[60,24; 62,45]	[59,66; 61,93]	[58,96; 61,30]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98603</i>	<i>88202</i>	<i>79739</i>	<i>73830</i>	<i>69513</i>	<i>65875</i>	<i>62516</i>	<i>58915</i>	<i>55879</i>	<i>53125</i>	<i>50627</i>	<i>48227</i>	<i>46133</i>					
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8905	7813	6917	6370	5948	5630	5299	4975	4683	4447	4210	4006	3816					
	auswertbar	Anzahl		7542	6535	6075	5597	5212	5005	4747	4478	4251	3999	3809	3590					
	Raucher	Anzahl		6343	4947	4348	3868	3379	3127	2937	2740	2586	2414	2276	2119					
		Anteil in %		84,10	75,70	71,57	69,11	64,83	62,48	61,87	61,19	60,83	60,37	59,75	59,03					
		CI Anteil in %		[83,28; 84,93]	[74,66; 76,74]	[70,44; 72,71]	[67,90; 70,32]	[63,53; 66,13]	[61,14; 63,82]	[60,49; 63,25]	[59,76; 62,62]	[59,37; 62,30]	[58,85; 61,88]	[58,20; 61,31]	[57,42; 60,63]					
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112511</i>	<i>101744</i>	<i>92563</i>	<i>86309</i>	<i>81576</i>	<i>77574</i>	<i>73783</i>	<i>69703</i>	<i>66080</i>	<i>62828</i>	<i>59695</i>	<i>56874</i>	<i>54383</i>					

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	16869	14927	13257	12180	11374	10663	9928	9324	8731	8228	7804	7410							
	auswertbar	Anzahl		14225	12572	11446	10530	10025	9436	8800	8277	7754	7344	6944							
	Raucher	Anzahl		12215	9848	8582	7265	6778	6303	5821	5371	4958	4615	4298							
		Anteil in %		85,87	78,33	74,98	68,99	67,61	66,80	66,15	64,89	63,94	62,84	61,90							
		CI Anteil in %		[85,30; 86,44]	[77,61; 79,05]	[74,18; 75,77]	[68,11; 69,88]	[66,69; 68,53]	[65,85; 67,75]	[65,16; 67,14]	[63,86; 65,92]	[62,87; 65,01]	[61,74; 63,95]	[60,75; 63,04]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>94020</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8561	7628	6918	6374	6013	5674	5322	5037	4745	4504	4299	4094							
	auswertbar	Anzahl		7274	6595	5967	5540	5321	5049	4775	4509	4258	4069	3851							
	Raucher	Anzahl		6130	5027	4374	3741	3503	3305	3083	2867	2701	2543	2369							
		Anteil in %		84,27	76,22	73,30	67,53	65,83	65,46	64,57	63,58	63,43	62,50	61,52							
		CI Anteil in %		[83,44; 85,11]	[75,20; 77,25]	[72,18; 74,43]	[66,29; 68,76]	[64,56; 67,11]	[64,15; 66,77]	[63,21; 65,92]	[62,18; 64,99]	[61,99; 64,88]	[61,01; 63,98]	[59,98; 63,05]							
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>106368</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>							
2007-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	18088	15983	14396	13250	12277	11254	10485	9818	9217	8718	8245								
	auswertbar	Anzahl		15265	13514	12170	11487	10647	9951	9319	8705	8243	7789								
	Raucher	Anzahl		13200	10634	8753	8046	7371	6788	6295	5815	5448	5072								
		Anteil in %		86,47	78,69	71,92	70,04	69,23	68,21	67,55	66,80	66,09	65,12								
		CI Anteil in %		[85,93; 87,01]	[78,00; 79,38]	[71,12; 72,72]	[69,21; 70,88]	[68,35; 70,11]	[67,30; 69,13]	[66,60; 68,50]	[65,81; 67,79]	[65,07; 67,11]	[64,06; 66,18]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9521	8636	7834	7215	6708	6260	5842	5496	5181	4909	4664								
	auswertbar	Anzahl		8254	7349	6680	6309	5934	5550	5229	4926	4641	4398								
	Raucher	Anzahl		7089	5742	4726	4371	4096	3752	3521	3270	3055	2849								
		Anteil in %		85,89	78,13	70,75	69,28	69,03	67,60	67,34	66,38	65,83	64,78								
		CI Anteil in %		[85,13; 86,64]	[77,19; 79,08]	[69,66; 71,84]	[68,14; 70,42]	[67,85; 70,20]	[66,37; 68,83]	[66,06; 68,61]	[65,06; 67,70]	[64,46; 67,19]	[63,37; 66,19]								
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>								
2007-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	17372	15435	13982	12729	11529	10615	9836	9185	8636	8160									
	auswertbar	Anzahl		14530	12730	11858	10871	10036	9308	8691	8166	7642									
	Raucher	Anzahl		12550	9631	8707	7842	7141	6518	6014	5587	5152									
		Anteil in %		86,37	75,66	73,43	72,14	71,15	70,03	69,20	68,42	67,42									
		CI Anteil in %		[85,82; 86,93]	[74,91; 76,40]	[72,63; 74,22]	[71,29; 72,98]	[70,27; 72,04]	[69,09; 70,96]	[68,23; 70,17]	[67,41; 69,43]	[66,37; 68,47]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9012	8079	7400	6818	6243	5800	5441	5100	4823	4567									
	auswertbar	Anzahl		7618	6724	6342	5882	5457	5131	4799	4556	4268									
	Raucher	Anzahl		6496	4953	4523	4147	3821	3533	3289	3095	2878									
		Anteil in %		85,27	73,66	71,32	70,50	70,02	68,86	68,54	67,93	67,43									
		CI Anteil in %		[84,48; 86,07]	[72,61; 74,71]	[70,20; 72,43]	[69,34; 71,67]	[68,80; 71,24]	[67,59; 70,12]	[67,22; 69,85]	[66,58; 69,29]	[66,03; 68,84]									
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>									
2008-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	19217	17259	15596	13692	12493	11531	10720	10033	9482										
	auswertbar	Anzahl		15990	14455	13113	11962	11106	10305	9648	9094										
	Raucher	Anzahl		13655	11245	10003	8887	8132	7459	6902	6415										
		Anteil in %		85,40	77,79	76,28	74,29	73,22	72,38	71,54	70,54										
		CI Anteil in %		[84,85; 85,94]	[77,12; 78,47]	[75,56; 77,01]	[73,51; 75,08]	[72,40; 74,05]	[71,52; 73,25]	[70,64; 72,44]	[69,60; 71,48]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9965	9121	8276	7381	6778	6279	5916	5573	5262										
	auswertbar	Anzahl		8518	7730	7075	6484	6079	5709	5385	5054										
	Raucher	Anzahl		7117	5895	5304	4801	4398	4103	3804	3546										
		Anteil in %		83,55	76,26	74,97	74,04	72,35	71,87	70,64	70,16										
		CI Anteil in %		[82,77; 84,34]	[75,31; 77,21]	[73,96; 75,98]	[72,98; 75,11]	[71,22; 73,47]	[70,70; 73,04]	[69,42; 71,86]	[68,90; 71,42]										
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>										

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2008-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	13360	11848	10359	9347	8578	7953	7425	7045												
	auswertbar	Anzahl		11318	9963	8996	8312	7672	7200	6802												
	Raucher	Anzahl		10511	8828	7769	7043	6366	5862	5480												
		Anteil in %		92,87	88,61	86,36	84,73	82,98	81,42	80,56												
		CI Anteil in %		[92,40; 93,34]	[87,98; 89,23]	[85,65; 87,07]	[83,96; 85,51]	[82,14; 83,82]	[80,52; 82,32]	[79,62; 81,50]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7090	6370	5688	5116	4710	4376	4120	3873												
	auswertbar	Anzahl		6073	5458	4952	4586	4253	3993	3757												
	Raucher	Anzahl		5591	4817	4253	3886	3522	3235	3008												
		Anteil in %		92,06	88,26	85,88	84,74	82,81	81,02	80,06												
		CI Anteil in %		[91,38; 92,74]	[87,40; 89,11]	[84,91; 86,85]	[83,70; 85,78]	[81,68; 83,95]	[79,80; 82,23]	[78,79; 81,34]												
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>												
2009-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	14036	12273	10689	9654	8879	8206	7701													
	auswertbar	Anzahl		11813	10321	9371	8615	7980	7447													
	Raucher	Anzahl		11096	9295	8214	7441	6757	6191													
		Anteil in %		93,93	90,06	87,65	86,37	84,67	83,13													
		CI Anteil in %		[93,50; 94,36]	[89,48; 90,64]	[86,99; 88,32]	[85,65; 87,10]	[83,88; 85,46]	[82,28; 83,98]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7170	6335	5635	5117	4707	4370	4108													
	auswertbar	Anzahl		6139	5455	4956	4593	4252	3988													
	Raucher	Anzahl		5716	4867	4328	3912	3559	3272													
		Anteil in %		93,11	89,22	87,33	85,17	83,70	82,05													
		CI Anteil in %		[92,48; 93,74]	[88,40; 90,04]	[86,40; 88,25]	[84,15; 86,20]	[82,59; 84,81]	[80,85; 83,24]													
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>													
2009-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	13207	11435	10008	8956	8297	7753														
	auswertbar	Anzahl		11055	9644	8703	8037	7513														
	Raucher	Anzahl		10452	8781	7745	7027	6463														
		Anteil in %		94,55	91,05	88,99	87,43	86,02														
		CI Anteil in %		[94,12; 94,97]	[90,48; 91,62]	[88,33; 89,65]	[86,71; 88,16]	[85,24; 86,81]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7009	6218	5538	5004	4631	4335														
	auswertbar	Anzahl		6036	5338	4851	4513	4182														
	Raucher	Anzahl		5721	4783	4240	3888	3549														
		Anteil in %		94,78	89,60	87,40	86,15	84,86														
		CI Anteil in %		[94,22; 95,34]	[88,78; 90,42]	[86,47; 88,34]	[85,14; 87,16]	[83,78; 85,95]														
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>														
2010-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	14925	13015	11528	10435	9611															
	auswertbar	Anzahl		12589	11144	10137	9312															
	Raucher	Anzahl		11978	10149	9018	8154															
		Anteil in %		95,15	91,07	88,96	87,56															
		CI Anteil in %		[94,77; 95,52]	[90,54; 91,60]	[88,35; 89,57]	[86,89; 88,23]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7674	6877	6130	5598	5224															
	auswertbar	Anzahl		6684	5947	5449	5080															
	Raucher	Anzahl		6352	5409	4840	4408															
		Anteil in %		95,03	90,95	88,82	86,77															
		CI Anteil in %		[94,51; 95,55]	[90,22; 91,68]	[87,99; 89,66]	[85,84; 87,70]															
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>															

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2010-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	13763	11997	10639	9657															
	auswertbar	Anzahl		11656	10312	9336															
	Raucher	Anzahl		11087	9438	8370															
		Anteil in %		95,12	91,52	89,65															
		CI Anteil in %		[94,73; 95,51]	[90,99; 92,06]	[89,04; 90,27]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7716	6792	6121	5562															
	auswertbar	Anzahl		6630	5948	5396															
	Raucher	Anzahl		6320	5438	4800															
		Anteil in %		95,32	91,43	88,95															
		CI Anteil in %		[94,82; 95,83]	[90,71; 92,14]	[88,12; 89,79]															
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>															
2011-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15009	13090	11648																
	auswertbar	Anzahl		12683	11235																
	Raucher	Anzahl		12141	10398																
		Anteil in %		95,73	92,55																
		CI Anteil in %		[95,37; 96,08]	[92,06; 93,04]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8302	7446	6687																
	auswertbar	Anzahl		7268	6467																
	Raucher	Anzahl		6937	5963																
		Anteil in %		95,45	92,21																
		CI Anteil in %		[94,97; 95,93]	[91,55; 92,86]																
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																
2011-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	13873	12152																	
	auswertbar	Anzahl		11741																	
	Raucher	Anzahl		11282																	
		Anteil in %		96,09																	
		CI Anteil in %		[95,74; 96,44]																	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7925	7067																	
	auswertbar	Anzahl		6856																	
	Raucher	Anzahl		6573																	
		Anteil in %		95,87																	
		CI Anteil in %		[95,40; 96,34]																	
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																	
2012-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15340																		
	auswertbar	Anzahl																			
	Raucher	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8407																		
	auswertbar	Anzahl																			
	Raucher	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																		

In Tabelle 3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

Tabelle 3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten

EZ	Raucherquote bei allen Patienten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910
	auswertbar	Anzahl	16899	11973	11405	10381	9318	8486	7747	6935	6363	6046	5742	5458	5235	4965	4683	4441	4156	3982	3758
	Raucher	Anzahl	2539	1674	1536	1333	1021	852	733	610	570	497	480	481	448	421	398	373	355	333	307
		Anteil in %	15,02	13,98	13,47	12,84	10,96	10,04	9,46	8,80	8,96	8,22	8,36	8,81	8,56	8,48	8,50	8,40	8,54	8,36	8,17
		CI Anteil in %	[14,49; 15,56]	[13,36; 14,60]	[12,84; 14,09]	[12,20; 13,48]	[10,32; 11,59]	[9,40; 10,68]	[8,81; 10,11]	[8,13; 9,46]	[8,26; 9,66]	[7,53; 8,91]	[7,64; 9,08]	[8,06; 9,56]	[7,80; 9,32]	[7,70; 9,25]	[7,70; 9,30]	[7,58; 9,21]	[7,69; 9,39]	[7,50; 9,22]	[7,29; 9,05]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695
	auswertbar	Anzahl	23425	16864	16212	14918	13473	12462	11399	10204	9348	8929	8412	7957	7618	7204	6810	6469	6080	5807	5511
	Raucher	Anzahl	1207	836	771	759	567	471	423	342	282	257	230	249	236	215	214	207	191	187	182
		Anteil in %	5,15	4,96	4,76	5,09	4,21	3,78	3,71	3,35	3,02	2,88	2,73	3,13	3,10	2,98	3,14	3,20	3,14	3,22	3,30
		CI Anteil in %	[4,87; 5,44]	[4,63; 5,28]	[4,43; 5,08]	[4,74; 5,44]	[3,87; 4,55]	[3,44; 4,11]	[3,36; 4,06]	[3,00; 3,70]	[2,67; 3,36]	[2,53; 3,23]	[2,39; 3,08]	[2,75; 3,51]	[2,71; 3,49]	[2,59; 3,38]	[2,73; 3,56]	[2,77; 3,63]	[2,70; 3,58]	[2,77; 3,67]	[2,83; 3,77]
2003-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736	
	auswertbar	Anzahl	113351	79728	70632	61146	53756	48265	43834	40367	38524	36399	34412	33482	32014	30523	29126	27698	26437	25140	
	Raucher	Anzahl	21169	13683	11040	8313	6739	5706	4909	4278	3948	3605	3500	3319	3115	2970	2827	2640	2491	2371	
		Anteil in %	18,68	17,16	15,63	13,60	12,54	11,82	11,20	10,60	10,25	9,90	10,17	9,91	9,73	9,73	9,71	9,53	9,42	9,43	
		CI Anteil in %	[18,45; 18,90]	[16,90; 17,42]	[15,36; 15,90]	[13,32; 13,87]	[12,26; 12,82]	[11,53; 12,11]	[10,90; 11,49]	[10,30; 10,90]	[9,95; 10,55]	[9,60; 10,21]	[9,85; 10,49]	[9,59; 10,23]	[9,41; 10,05]	[9,40; 10,06]	[9,37; 10,05]	[9,19; 9,88]	[9,07; 9,77]	[9,07; 9,79]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	142866	112069	93979	81049	71389	64294	58333	54388	51899	49824	47865	45920	43703	41770	39917	38116	36445	34887	
	auswertbar	Anzahl	142866	102255	90637	78693	69719	62672	56920	52238	50134	47414	44781	43490	41605	39671	37948	36149	34505	32817	
	Raucher	Anzahl	11023	7440	6265	4643	3738	3221	2757	2423	2214	2035	2016	1918	1799	1696	1605	1515	1469	1398	
		Anteil in %	7,72	7,28	6,91	5,90	5,36	5,14	4,84	4,64	4,42	4,29	4,50	4,41	4,42	4,28	4,23	4,19	4,26	4,26	
		CI Anteil in %	[7,58; 7,85]	[7,12; 7,44]	[6,75; 7,08]	[5,74; 6,06]	[5,19; 5,53]	[4,97; 5,31]	[4,67; 5,02]	[4,46; 4,82]	[4,24; 4,60]	[4,11; 4,47]	[4,31; 4,69]	[4,22; 4,60]	[4,13; 4,52]	[4,08; 4,47]	[4,03; 4,43]	[3,98; 4,40]	[4,04; 4,47]	[4,04; 4,48]	
2004-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232		
	auswertbar	Anzahl	135112	112089	100237	86678	80488	74073	68228	65509	61946	58903	57133	54758	52275	49989	47450	45468	43254		
	Raucher	Anzahl	22947	18833	14142	11349	9889	8594	7479	7033	6356	6420	6092	5746	5470	5160	4864	4593	4322		
		Anteil in %	16,98	16,80	14,11	13,09	12,29	11,60	10,96	10,74	10,26	10,90	10,66	10,49	10,46	10,32	10,25	10,10	9,99		
		CI Anteil in %	[16,78; 17,18]	[16,58; 17,02]	[13,89; 14,32]	[12,87; 13,32]	[12,06; 12,51]	[11,37; 11,83]	[10,73; 11,20]	[10,50; 10,97]	[10,02; 10,50]	[10,65; 11,15]	[10,41; 10,92]	[10,24; 10,75]	[10,20; 10,73]	[10,06; 10,59]	[9,98; 10,52]	[9,82; 10,38]	[9,71; 10,27]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	163432	142749	126918	112329	102494	94300	88366	84645	81247	78247	75048	71529	68399	65504	62532	59887	57490		
	auswertbar	Anzahl	163431	136713	122588	106739	99206	91579	84387	81128	76911	73257	70739	67738	64610	61845	58812	56252	53739		
	Raucher	Anzahl	11569	9722	7269	5973	5160	4608	3984	3732	3414	3558	3385	3214	2975	2831	2716	2577	2471		
		Anteil in %	7,08	7,11	5,93	5,60	5,20	5,03	4,72	4,60	4,44	4,86	4,79	4,74	4,60	4,58	4,62	4,58	4,60		
		CI Anteil in %	[6,95; 7,20]	[6,98; 7,25]	[5,80; 6,06]	[5,46; 5,73]	[5,06; 5,34]	[4,89; 5,17]	[4,58; 4,86]	[4,46; 4,74]	[4,29; 4,58]	[4,70; 5,01]	[4,63; 4,94]	[4,58; 4,90]	[4,44; 4,77]	[4,41; 4,74]	[4,45; 4,79]	[4,41; 4,75]	[4,42; 4,78]		
2004-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933			
	auswertbar	Anzahl	98841	82457	72232	64913	58549	53348	50999	47776	45130	43587	41693	39746	38053	36177	34627	32904			
	Raucher	Anzahl	18612	14604	11146	9428	7981	6811	6352	5699	5576	5261	4957	4716	4411	4185	3902	3685			
		Anteil in %	18,83	17,71	15,43	14,52	13,63	12,77	12,46	11,93	12,36	12,07	11,89	11,87	11,59	11,57	11,27	11,20			
		CI Anteil in %	[18,59; 19,07]	[17,45; 17,97]	[15,17; 15,69]	[14,25; 14,80]	[13,35; 13,91]	[12,48; 13,05]	[12,17; 12,74]	[11,64; 12,22]	[12,05; 12,66]	[11,76; 12,38]	[11,58; 12,20]	[11,55; 12,18]	[11,27; 11,91]	[11,24; 11,90]	[10,94; 11,60]	[10,86; 11,54]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521			
	auswertbar	Anzahl	115969	97604	86133	77941	70573	64614	61837	57874	54721	52844	50562	48127	45990	43769	41952	39885			
	Raucher	Anzahl	9343	7570	5780	4915	4249	3701	3424	3100	3047	2916	2766	2624	2482	2356	2260	2155			
		Anteil in %	8,06	7,76	6,71	6,31	6,02	5,73	5,54	5,36	5,57	5,52	5,47	5,45	5,40	5,38	5,39	5,40			
		CI Anteil in %	[7,90; 8,21]	[7,59; 7,92]	[6,54; 6,88]	[6,14; 6,48]	[5,85; 6,20]	[5,55; 5,91]	[5,36; 5,72]	[5,17; 5,54]	[5,38; 5,76]	[5,32; 5,71]	[5,27; 5,67]	[5,25; 5,66]	[5,19; 5,60]	[5,17; 5,59]	[5,17; 5,60]	[5,18; 5,62]			

EZ	Raucherquote bei allen Patienten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931												
	auswertbar	Anzahl	91596	78886	70791	66998	62516	58681	55165	51962	49443	46753												
	Raucher	Anzahl	17372	14111	12138	11068	10059	9218	8496	7861	7366	6864												
		Anteil in %	18,97	17,89	17,15	16,52	16,09	15,71	15,40	15,13	14,90	14,68												
		CI Anteil in %	[18,71; 19,22]	[17,62; 18,16]	[16,87; 17,42]	[16,24; 16,80]	[15,80; 16,38]	[15,41; 16,00]	[15,10; 15,70]	[14,82; 15,44]	[14,58; 15,21]	[14,36; 15,00]												
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214												
	auswertbar	Anzahl	103137	89890	80965	77049	72301	67952	64011	60482	57520	54432												
	Raucher	Anzahl	9012	7508	6465	5970	5518	5114	4750	4464	4216	3955												
		Anteil in %	8,74	8,35	7,98	7,75	7,63	7,53	7,42	7,38	7,33	7,27												
		CI Anteil in %	[8,57; 8,91]	[8,17; 8,53]	[7,80; 8,17]	[7,56; 7,94]	[7,44; 7,83]	[7,33; 7,72]	[7,22; 7,62]	[7,17; 7,59]	[7,12; 7,54]	[7,05; 7,48]												
	2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783												
		auswertbar	Anzahl	99597	85512	79055	72839	67767	63566	59842	56621	53477												
Raucher		Anzahl	19217	16869	14199	12757	11477	10616	9779	9148	8535													
		Anteil in %	19,29	19,73	17,96	17,51	16,94	16,70	16,34	16,16	15,96													
		CI Anteil in %	[19,05; 19,54]	[19,46; 19,99]	[17,69; 18,23]	[17,24; 17,79]	[16,65; 17,22]	[16,41; 16,99]	[16,05; 16,64]	[15,85; 16,46]	[15,65; 16,27]													
weibliche Patienten insgesamt		Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228													
auswertbar		Anzahl	109902	95771	89127	82494	77237	72718	68666	65161	61709													
Raucher		Anzahl	9965	9076	7672	6994	6397	5927	5595	5242	4909													
		Anteil in %	9,07	9,48	8,61	8,48	8,28	8,15	8,15	8,04	7,96													
		CI Anteil in %	[8,90; 9,24]	[9,29; 9,66]	[8,42; 8,79]	[8,29; 8,67]	[8,09; 8,48]	[7,95; 8,35]	[7,94; 8,35]	[7,84; 8,25]	[7,74; 8,17]													
2008-2		männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871													
		auswertbar	Anzahl	67596	59019	53366	49219	46036	43183	40848	38619													
	Raucher	Anzahl	13360	11749	10034	8907	8229	7521	7004	6610														
		Anteil in %	19,76	19,91	18,80	18,10	17,88	17,42	17,15	17,12														
		CI Anteil in %	[19,46; 20,06]	[19,58; 20,23]	[18,47; 19,13]	[17,76; 18,44]	[17,53; 18,23]	[17,06; 17,77]	[16,78; 17,51]	[16,74; 17,49]														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527														
	auswertbar	Anzahl	74164	65476	59893	55588	52276	49089	46643	44182														
	Raucher	Anzahl	7090	6306	5539	4998	4643	4283	3974	3753														
		Anteil in %	9,56	9,63	9,25	8,99	8,88	8,72	8,52	8,49														
		CI Anteil in %	[9,35; 9,77]	[9,41; 9,86]	[9,02; 9,48]	[8,75; 9,23]	[8,64; 9,13]	[8,48; 8,97]	[8,27; 8,77]	[8,23; 8,75]														
	2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446														
		auswertbar	Anzahl	72280	62490	56517	52178	48686	45729	43155														
Raucher		Anzahl	14036	12341	10495	9405	8687	7990	7432															
		Anteil in %	19,42	19,75	18,57	18,02	17,84	17,47	17,22															
		CI Anteil in %	[19,13; 19,71]	[19,44; 20,06]	[18,25; 18,89]	[17,70; 18,35]	[17,50; 18,18]	[17,12; 17,82]	[16,87; 17,58]															
weibliche Patienten insgesamt		Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078															
auswertbar		Anzahl	76956	67404	61620	57045	53410	50518	47810															
Raucher		Anzahl	7170	6466	5584	5076	4711	4353	4066															
		Anteil in %	9,32	9,59	9,06	8,90	8,82	8,62	8,50															
		CI Anteil in %	[9,11; 9,52]	[9,37; 9,82]	[8,84; 9,29]	[8,66; 9,13]	[8,58; 9,06]	[8,37; 8,86]	[8,25; 8,75]															
2009-2		männliche Patienten insgesamt	Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280															
		auswertbar	Anzahl	66301	57646	51844	47660	44750	41980															
	Raucher	Anzahl	13207	11494	9806	8793	8130	7539																
		Anteil in %	19,92	19,94	18,91	18,45	18,17	17,96																
		CI Anteil in %	[19,62; 20,22]	[19,61; 20,27]	[18,58; 19,25]	[18,10; 18,80]	[17,81; 18,52]	[17,59; 18,33]																
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447																
	auswertbar	Anzahl	71902	63510	57593	53390	50157	47212																
	Raucher	Anzahl	7009	6390	5419	4952	4609	4274																
		Anteil in %	9,75	10,06	9,41	9,28	9,19	9,05																
		CI Anteil in %	[9,53; 9,96]	[9,83; 10,30]	[9,17; 9,65]	[9,03; 9,52]	[8,94; 9,44]	[8,79; 9,31]																

EZ	Raucherquote bei allen Patienten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460																
	auswertbar	Anzahl	76010	66432	60111	55573	51988																
	Raucher	Anzahl	14925	13064	11244	10205	9406																
		Anteil in %		19,64	19,67	18,71	18,36	18,09															
		CI Anteil in %		[19,35; 19,92]	[19,36; 19,97]	[18,39; 19,02]	[18,04; 18,69]	[17,76; 18,42]															
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365																
	auswertbar	Anzahl	80044	71128	65057	60650	56856																
	Raucher	Anzahl	7674	7001	6074	5554	5137																
		Anteil in %		9,59	9,84	9,34	9,16	9,04															
		CI Anteil in %		[9,38; 9,79]	[9,62; 10,06]	[9,11; 9,56]	[8,93; 9,39]	[8,80; 9,27]															
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	61608	55900	51784																	
	auswertbar	Anzahl	68337	60115	54437	50266																	
	Raucher	Anzahl	13763	12088	10465	9479																	
		Anteil in %		20,14	20,11	19,22	18,86																
		CI Anteil in %		[19,84; 20,44]	[19,79; 20,43]	[18,89; 19,56]	[18,52; 19,20]																
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	66943	61246	56909																	
	auswertbar	Anzahl	73408	65502	59750	55433																	
	Raucher	Anzahl	7716	6989	6086	5520																	
		Anteil in %		10,51	10,67	10,19	9,96																
		CI Anteil in %		[10,29; 10,73]	[10,43; 10,91]	[9,94; 10,43]	[9,71; 10,21]																
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	66585	60521																		
	auswertbar	Anzahl	74139	64919	58595																		
	Raucher	Anzahl	15009	13109	11401																		
		Anteil in %		20,24	20,19	19,46																	
		CI Anteil in %		[19,96; 20,53]	[19,88; 20,50]	[19,14; 19,78]																	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	72558	66610																		
	auswertbar	Anzahl	79514	70941	64656																		
	Raucher	Anzahl	8302	7577	6661																		
		Anteil in %		10,44	10,68	10,30																	
		CI Anteil in %		[10,23; 10,65]	[10,45; 10,91]	[10,07; 10,54]																	
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67230	60721																			
	auswertbar	Anzahl	67230	59035																			
	Raucher	Anzahl	13873	12228																			
		Anteil in %		20,64	20,71																		
		CI Anteil in %		[20,33; 20,94]	[20,39; 21,04]																		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465	66497																			
	auswertbar	Anzahl	72465	64739																			
	Raucher	Anzahl	7925	7183																			
		Anteil in %		10,94	11,10																		
		CI Anteil in %		[10,71; 11,16]	[10,85; 11,34]																		
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714																				
	auswertbar	Anzahl	74714																				
	Raucher	Anzahl	15340																				
		Anteil in %		20,53																			
		CI Anteil in %		[20,24; 20,82]																			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879																				
	auswertbar	Anzahl	77879																				
Raucher	Anzahl	8407																					
	Anteil in %		10,79																				
	CI Anteil in %		[10,58; 11,01]																				

In Tabelle 3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte werden unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahlen derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren.

Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

Tabelle 3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation

* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also mit „6. Patienten mit Blutdruck systolisch > 160 oder diastolisch > 100 und antihypertensive Therapie“. Die dort eingestufteten Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc.

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	13447	11183	9654	8484	7626	6946	6424	5695	5364	4978	4773	4533	4313	4089	3878	3664	3426	3259	3094
	auswertbar	Anzahl	13447	9540	9071	7303	6564	6138	5656	5055	4651	4410	4204	4361	4169	3958	3742	3536	3307	3166	2966
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	5070	4159	4194	3417	3077	2990	2810	2615	2440	2395	2370	2389	2321	2193	1994	1981	1868	1858	1728
		Anteil in %	37,70	43,60	46,24	46,79	46,88	48,71	49,68	51,73	52,46	54,31	56,37	54,78	55,67	55,41	53,29	56,02	56,49	58,69	58,26
		CI Anteil in %	[36,88; 38,52]	[42,60; 44,59]	[45,21; 47,26]	[45,64; 47,93]	[45,67; 48,08]	[47,46; 49,96]	[48,38; 50,98]	[50,35; 53,11]	[51,03; 53,90]	[52,84; 55,78]	[54,88; 57,87]	[53,30; 56,26]	[54,16; 57,18]	[53,86; 56,96]	[51,69; 54,89]	[54,39; 57,66]	[54,80; 58,18]	[56,97; 60,40]	[56,49; 60,04]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	234	432	436	67	57	50	44	33	29	27	28	99	93	84	83	61	60	54	51
		Anteil in %	1,74	4,53	4,81	0,92	0,87	0,81	0,78	0,65	0,62	0,61	0,67	2,27	2,23	2,12	2,22	1,73	1,81	1,71	1,72
		CI Anteil in %	[1,52; 1,96]	[4,11; 4,95]	[4,37; 5,25]	[0,70; 1,14]	[0,64; 1,09]	[0,59; 1,04]	[0,55; 1,01]	[0,43; 0,87]	[0,40; 0,85]	[0,38; 0,84]	[0,42; 0,91]	[1,83; 2,71]	[1,78; 2,68]	[1,67; 2,57]	[1,75; 2,69]	[1,30; 2,15]	[1,36; 2,27]	[1,25; 2,16]	[1,25; 2,19]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	4836	3727	3758	3350	3020	2940	2766	2582	2411	2368	2342	2290	2228	2109	1911	1920	1808	1804	1677
		Anteil in %	35,96	39,07	41,43	45,87	46,01	47,90	48,90	51,08	51,84	53,70	55,71	52,51	53,44	53,28	51,07	54,30	54,67	56,98	56,54
		CI Anteil in %	[35,15; 36,77]	[38,09; 40,05]	[40,41; 42,44]	[44,73; 47,01]	[44,80; 47,21]	[46,65; 49,15]	[47,60; 50,21]	[49,70; 52,46]	[50,40; 53,27]	[52,22; 55,17]	[54,21; 57,21]	[51,03; 53,99]	[51,93; 54,96]	[51,73; 54,84]	[49,47; 52,67]	[52,66; 55,94]	[52,97; 56,37]	[55,26; 58,71]	[54,76; 58,33]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	8377	5381	4877	3886	3487	3148	2846	2440	2211	2015	1834	1972	1848	1765	1748	1555	1439	1308	1238
		Anteil in %	62,30	56,40	53,76	53,21	53,12	51,29	50,32	48,27	47,54	45,69	43,63	45,22	44,33	44,59	46,71	43,98	43,51	41,31	41,74
		CI Anteil in %	[61,48; 63,12]	[55,41; 57,40]	[52,74; 54,79]	[52,07; 54,36]	[51,92; 54,33]	[50,04; 52,54]	[49,02; 51,62]	[46,89; 49,65]	[46,10; 48,97]	[44,22; 47,16]	[42,13; 45,12]	[43,74; 46,70]	[42,82; 45,84]	[43,04; 46,14]	[45,11; 48,31]	[42,34; 45,61]	[41,82; 45,20]	[39,60; 43,03]	[39,96; 43,51]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	419	471	361	49	51	37	36	30	18	15	18	71	48	55	45	47	34	30	29
		Anteil in %	3,12	4,94	3,98	0,67	0,78	0,60	0,64	0,59	0,39	0,34	0,43	1,63	1,15	1,39	1,20	1,33	1,03	0,95	0,98
		CI Anteil in %	[2,82; 3,41]	[4,50; 5,37]	[3,58; 4,38]	[0,48; 0,86]	[0,56; 0,99]	[0,41; 0,80]	[0,43; 0,84]	[0,38; 0,81]	[0,21; 0,57]	[0,17; 0,51]	[0,23; 0,63]	[1,25; 2,00]	[0,83; 1,48]	[1,02; 1,75]	[0,85; 1,55]	[0,95; 1,71]	[0,68; 1,37]	[0,61; 1,29]	[0,62; 1,33]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	6902	4302	3994	3457	3109	2854	2570	2205	2016	1820	1674	1722	1617	1525	1530	1372	1281	1165	1090
		Anteil in %	51,33	45,09	44,03	47,34	47,36	46,50	45,44	43,62	43,35	41,27	39,82	39,49	38,79	38,53	40,89	38,80	38,74	36,80	36,75
		CI Anteil in %	[50,48; 52,17]	[44,10; 46,09]	[43,01; 45,05]	[46,19; 48,48]	[46,16; 48,57]	[45,25; 47,75]	[44,14; 46,74]	[42,25; 44,99]	[41,92; 44,77]	[39,82; 42,72]	[38,34; 41,30]	[38,04; 40,94]	[37,31; 40,27]	[37,01; 40,05]	[39,31; 42,46]	[37,19; 40,41]	[37,08; 40,40]	[35,12; 38,48]	[35,01; 38,49]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	50	47	48	7	10	6	4	5	5	6	4	4	6	2	2	5	5	5	4	
	Anteil in %	0,37	0,49	0,53	0,10	0,15	0,10	0,07	0,10	0,11	0,14	0,10	0,09	0,14	0,05	0,05	0,14	0,15	0,16	0,13	
	CI Anteil in %	[0,27; 0,47]	[0,35; 0,63]	[0,38; 0,68]	[0,02; 0,17]	[0,06; 0,25]	[0,02; 0,18]	[0,00; 0,14]	[0,01; 0,19]	[0,01; 0,20]	[0,03; 0,24]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,18]	[0,03; 0,26]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,13]	[0,02; 0,27]	[0,02; 0,28]	[0,02; 0,30]	[0,00; 0,27]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1006	561	474	373	317	251	236	200	172	174	138	175	177	183	171	131	119	108	115	
	Anteil in %	7,48	5,88	5,23	5,11	4,83	4,09	4,17	3,96	3,70	3,95	3,28	4,01	4,25	4,62	4,57	3,70	3,60	3,41	3,88	
	CI Anteil in %	[7,04; 7,93]	[5,41; 6,35]	[4,77; 5,68]	[4,60; 5,61]	[4,31; 5,35]	[3,59; 4,58]	[3,65; 4,69]	[3,42; 4,49]	[3,16; 4,24]	[3,37; 4,52]	[2,74; 3,82]	[3,43; 4,60]	[3,63; 4,86]	[3,97; 5,28]	[3,90; 5,24]	[3,08; 4,33]	[2,96; 4,23]	[2,78; 4,04]	[3,18; 4,57]	
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	19952	16855	14665	12971	11784	10832	10060	8943	8375	7844	7493	7067	6715	6349	6000	5675	5344	5092	4852
	auswertbar	Anzahl	19952	14440	13844	11255	10223	9650	8885	7912	7301	6940	6562	6789	6494	6158	5813	5516	5178	4941	4690
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	7163	6181	6177	4991	4541	4524	4379	3954	3813	3613	3504	3591	3368	3270	3098	2963	2812	2786	2616
		Anteil in %	35,90	42,80	44,62	44,34	44,42	46,88	49,29	49,97	52,23	52,06	53,40	52,89	51,86	53,10	53,29	53,72	54,31	56,39	55,78
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[35,24; 36,57]	[42,00; 43,61]	[43,79; 45,45]	[43,43; 45,26]	[43,46; 45,38]	[45,89; 47,88]	[48,25; 50,32]	[48,87; 51,08]	[51,08; 53,37]	[50,89; 53,24]	[52,19; 54,61]	[51,71; 54,08]	[50,65; 53,08]	[51,86; 54,35]	[52,01; 54,58]	[52,40; 55,03]	[52,95; 55,66]	[55,00; 57,77]	[54,36; 57,20]
		Anzahl	289	590	563	77	89	49	58	54	61	47	43	155	141	131	118	105	93	84	85
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,45	4,09	4,07	0,68	0,87	0,51	0,65	0,68	0,84	0,68	0,66	2,28	2,17	2,13	2,03	1,90	1,80	1,70	1,81
		CI Anteil in %	[1,28; 1,61]	[3,76; 4,41]	[3,74; 4,40]	[0,53; 0,84]	[0,69; 1,05]	[0,37; 0,65]	[0,49; 0,82]	[0,50; 0,86]	[0,63; 1,04]	[0,48; 0,87]	[0,46; 0,85]	[1,93; 2,64]	[1,82; 2,53]	[1,77; 2,49]	[1,67; 2,39]	[1,54; 2,26]	[1,43; 2,16]	[1,34; 2,06]	[1,43; 2,19]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	6874	5591	5614	4914	4452	4475	4321	3900	3752	3566	3461	3436	3227	3139	2980	2858	2719	2702	2531
		Anteil in %	34,45	38,72	40,55	43,66	43,55	46,37	48,63	49,29	51,39	51,38	52,74	50,61	49,69	50,97	51,26	51,81	52,51	54,69	53,97
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[33,79; 35,11]	[37,92; 39,51]	[39,73; 41,37]	[42,74; 44,58]	[42,59; 44,51]	[45,38; 47,37]	[47,59; 49,67]	[48,19; 50,39]	[50,24; 52,54]	[50,21; 52,56]	[51,54; 53,95]	[49,42; 51,80]	[48,48; 50,91]	[49,73; 52,22]	[49,98; 52,55]	[50,49; 53,13]	[51,15; 53,87]	[53,30; 56,07]	[52,54; 55,39]
		Anzahl	12789	8259	7667	6264	5682	5126	4506	3958	3488	3327	3058	3198	3126	2888	2715	2553	2366	2155	2074
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	64,10	57,20	55,38	55,66	55,58	53,12	50,71	50,03	47,77	47,94	46,60	47,11	48,14	46,90	46,71	46,28	45,69	43,61	44,22
		CI Anteil in %	[63,43; 64,76]	[56,39; 58,00]	[54,55; 56,21]	[54,74; 56,57]	[54,62; 56,54]	[52,12; 54,11]	[49,68; 51,75]	[48,92; 51,13]	[46,63; 48,92]	[46,76; 49,11]	[45,39; 47,81]	[45,92; 48,29]	[46,92; 49,35]	[45,65; 48,14]	[45,42; 47,99]	[44,97; 47,60]	[44,34; 47,05]	[42,23; 45,00]	[42,80; 45,64]
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	422	628	482	58	49	44	30	31	26	26	27	100	95	85	83	78	64	52	42
		Anteil in %	2,12	4,35	3,48	0,52	0,48	0,46	0,34	0,39	0,36	0,37	0,41	1,47	1,46	1,38	1,43	1,41	1,24	1,05	0,90
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[1,92; 2,31]	[4,02; 4,68]	[3,18; 3,79]	[0,38; 0,65]	[0,35; 0,61]	[0,32; 0,59]	[0,22; 0,46]	[0,25; 0,53]	[0,22; 0,49]	[0,23; 0,52]	[0,26; 0,57]	[1,19; 1,76]	[1,17; 1,75]	[1,09; 1,67]	[1,12; 1,73]	[1,10; 1,73]	[0,94; 1,54]	[0,77; 1,34]	[0,63; 1,17]
		Anzahl	10711	6634	6351	5565	5039	4607	4081	3615	3137	2985	2734	2785	2740	2504	2328	2187	2067	1920	1816
	Kategorie 7 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	53,68	45,94	45,88	49,44	49,29	47,74	45,93	45,69	42,97	43,01	41,66	41,02	42,19	40,66	40,05	39,65	39,92	38,86	38,72
		CI Anteil in %	[52,99; 54,38]	[45,13; 46,75]	[45,05; 46,71]	[48,52; 50,37]	[48,32; 50,26]	[46,74; 48,74]	[44,90; 46,97]	[44,59; 46,79]	[41,83; 44,10]	[41,85; 44,18]	[40,47; 42,86]	[39,85; 42,19]	[40,99; 43,39]	[39,44; 41,89]	[38,79; 41,31]	[38,36; 40,94]	[38,58; 41,25]	[37,50; 40,22]	[37,33; 40,11]
	Kategorie 8 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	53	63	64	11	9	2	5	1	3	2	4	7	8	4	8	5	4	0	3
Anteil in %		0,27	0,44	0,46	0,10	0,09	0,02	0,06	0,01	0,04	0,03	0,06	0,10	0,12	0,06	0,14	0,09	0,08	0,00	0,06	
Kategorie 9 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,19; 0,34]	[0,33; 0,54]	[0,35; 0,58]	[0,04; 0,16]	[0,03; 0,15]	[0,00; 0,05]	[0,01; 0,11]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,12]	[0,03; 0,18]	[0,04; 0,21]	[0,00; 0,13]	[0,04; 0,23]	[0,01; 0,17]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,14]	
	Anzahl	1603	934	770	630	585	473	390	311	322	314	293	306	283	295	296	283	231	183	213	
weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	8,03	6,47	5,56	5,60	5,72	4,90	4,39	3,93	4,41	4,52	4,47	4,51	4,36	4,79	5,09	5,13	4,46	3,70	4,54	
	CI Anteil in %	[7,66; 8,41]	[6,07; 6,87]	[5,18; 5,94]	[5,17; 6,02]	[5,27; 6,17]	[4,47; 5,33]	[3,96; 4,82]	[3,50; 4,36]	[3,94; 4,88]	[4,04; 5,01]	[3,97; 4,96]	[4,01; 5,00]	[3,86; 4,85]	[4,26; 5,32]	[4,53; 5,66]	[4,55; 5,71]	[3,90; 5,02]	[3,18; 4,23]	[3,95; 5,14]	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	83073	65199	54697	47219	41468	37373	33941	31725	30191	28928	27755	26597	25242	24056	22959	21841	20780	19839
	auswertbar	Anzahl	83072	59282	46522	40640	36364	32890	30052	27775	26614	25247	25996	25222	24093	22915	21817	20695	19711	18680
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	32707	26841	20916	19150	17608	16729	15509	14722	14052	13922	13662	13628	12976	12571	12095	11638	10968	10723
		Anteil in %	39,37	45,28	44,96	47,12	48,42	50,86	51,61	53,00	52,80	55,14	52,55	54,03	53,86	54,86	55,44	56,24	55,64	57,40
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[39,04; 39,70]	[44,88; 45,68]	[44,51; 45,41]	[46,64; 47,61]	[47,91; 48,94]	[50,32; 51,40]	[51,04; 52,17]	[52,42; 53,59]	[52,20; 53,40]	[54,53; 55,76]	[51,95; 53,16]	[53,42; 54,65]	[53,23; 54,49]	[54,21; 55,50]	[54,78; 56,10]	[55,56; 56,91]	[54,95; 56,34]	[56,69; 58,11]
		Anzahl	1873	2615	590	524	387	374	341	289	284	261	804	721	624	609	573	532	495	442
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	2,25	4,41	1,27	1,29	1,06	1,14	1,13	1,04	1,07	1,03	3,09	2,86	2,59	2,66	2,63	2,57	2,51	2,37
		CI Anteil in %	[2,15; 2,36]	[4,25; 4,58]	[1,17; 1,37]	[1,18; 1,40]	[0,96; 1,17]	[1,02; 1,25]	[1,01; 1,25]	[0,92; 1,16]	[0,94; 1,19]	[0,91; 1,16]	[2,88; 3,30]	[2,65; 3,06]	[2,39; 2,79]	[2,45; 2,87]	[2,41; 2,84]	[2,36; 2,79]	[2,29; 2,73]	[2,15; 2,58]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	30834	24226	20326	18626	17221	16355	15168	14433	13768	13661	12858	12907	12352	11962	11522	11106	10473	10281
		Anteil in %	37,12	40,87	43,69	45,83	47,36	49,73	50,47	51,96	51,73	54,11	49,46	51,17	51,27	52,20	52,81	53,67	53,13	55,04
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[36,79; 37,45]	[40,47; 41,26]	[43,24; 44,14]	[45,35; 46,32]	[46,84; 47,87]	[49,19; 50,27]	[49,91; 51,04]	[51,38; 52,55]	[51,13; 52,33]	[53,49; 54,72]	[48,85; 50,07]	[50,56; 51,79]	[50,64; 51,90]	[51,55; 52,85]	[52,15; 53,47]	[52,99; 54,34]	[52,44; 53,83]	[54,32; 55,75]
		Anzahl	50365	32441	25606	21490	18756	16161	14543	13053	12562	11325	12334	11594	11117	10344	9722	9057	8743	7957
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	60,63	54,72	55,04	52,88	51,58	49,14	48,39	47,00	47,20	44,86	47,45	45,97	46,14	45,14	44,56	43,76	44,36	42,60
		CI Anteil in %	[60,30; 60,96]	[54,32; 55,12]	[54,59; 55,49]	[52,39; 53,36]	[51,06; 52,09]	[48,60; 49,68]	[47,83; 48,96]	[46,41; 47,58]	[46,60; 47,80]	[44,24; 45,47]	[46,84; 48,05]	[45,35; 46,58]	[45,51; 46,77]	[44,50; 45,79]	[43,90; 45,22]	[43,09; 44,44]	[43,66; 45,05]	[41,89; 43,31]
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2893	2589	531	380	345	287	238	187	188	176	608	537	495	435	367	353	309	295
		Anteil in %	3,48	4,37	1,14	0,94	0,95	0,87	0,79	0,67	0,71	0,70	2,34	2,13	2,05	1,90	1,68	1,71	1,57	1,58
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[3,36; 3,61]	[4,20; 4,53]	[1,04; 1,24]	[0,84; 1,03]	[0,85; 1,05]	[0,77; 0,97]	[0,69; 0,89]	[0,58; 0,77]	[0,61; 0,81]	[0,59; 0,80]	[2,16; 2,52]	[1,95; 2,31]	[1,88; 2,23]	[1,72; 2,08]	[1,51; 1,85]	[1,53; 1,88]	[1,39; 1,74]	[1,40; 1,76]
		Anzahl	39782	25864	21878	18650	16267	14228	12767	11594	11032	10038	10457	9896	9475	8830	8325	7828	7546	6873
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	47,89	43,63	47,03	45,89	44,73	43,26	42,48	41,74	41,45	39,76	40,23	39,24	39,33	38,53	38,16	37,83	38,28	36,79
		CI Anteil in %	[47,55; 48,23]	[43,23; 44,03]	[46,57; 47,48]	[45,41; 46,38]	[44,22; 45,24]	[42,72; 43,79]	[41,92; 43,04]	[41,16; 42,32]	[40,86; 42,04]	[39,16; 40,36]	[39,63; 40,82]	[38,63; 39,84]	[38,71; 39,94]	[37,90; 39,16]	[37,51; 38,80]	[37,16; 38,49]	[37,60; 38,96]	[36,10; 37,48]
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	504	314	55	28	28	18	16	11	15	14	84	47	65	46	50	46	39	38	
	Anteil in %	0,61	0,53	0,12	0,07	0,08	0,05	0,05	0,04	0,06	0,06	0,32	0,19	0,27	0,20	0,23	0,22	0,20	0,20	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,55; 0,66]	[0,47; 0,59]	[0,09; 0,15]	[0,04; 0,09]	[0,05; 0,11]	[0,03; 0,08]	[0,03; 0,08]	[0,02; 0,06]	[0,03; 0,08]	[0,03; 0,08]	[0,25; 0,39]	[0,13; 0,24]	[0,20; 0,34]	[0,14; 0,26]	[0,17; 0,29]	[0,16; 0,29]	[0,14; 0,26]	[0,14; 0,27]	
	Anzahl	7186	3674	3142	2432	2116	1628	1522	1261	1327	1097	1185	1114	1082	1033	980	830	849	751	
männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	8,65	6,20	6,75	5,98	5,82	4,95	5,06	4,54	4,99	4,35	4,56	4,42	4,49	4,51	4,49	4,01	4,31	4,02	
	CI Anteil in %	[8,46; 8,84]	[6,00; 6,39]	[6,53; 6,98]	[5,75; 6,21]	[5,58; 6,06]	[4,72; 5,18]	[4,82; 5,31]	[4,30; 4,78]	[4,72; 5,25]	[4,09; 4,60]	[4,30; 4,81]	[4,16; 4,67]	[4,23; 4,75]	[4,24; 4,78]	[4,22; 4,77]	[3,74; 4,28]	[4,02; 4,59]	[3,74; 4,30]	
	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	114785	90557	76268	65984	58242	52529	47703	44460	42375	40668	39032	37396	35546	33933	32379	30861	29458	28157
	auswertbar	Anzahl	114780	82859	65220	56948	51118	46328	42331	38917	37419	35505	36578	35444	33856	32244	30805	29281	27915	26499
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	42407	35252	27654	25015	23119	22205	20677	19873	18962	18667	18764	18479	17709	16662	16171	15879	15075	14607
		Anteil in %	36,95	42,54	42,40	43,93	45,23	47,93	48,85	51,07	50,67	52,58	51,30	52,14	52,31	51,67	52,49	54,23	54,00	55,12
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[36,67; 37,23]	[42,21; 42,88]	[42,02; 42,78]	[43,52; 44,33]	[44,80; 45,66]	[47,48; 48,38]	[48,37; 49,32]	[50,57; 51,56]	[50,17; 51,18]	[52,06; 53,10]	[50,79; 51,81]	[51,62; 52,66]	[51,77; 52,84]	[51,13; 52,22]	[51,94; 53,05]	[53,66; 54,80]	[53,42; 54,59]	[54,52; 55,72]
		Anzahl	2211	3176	671	518	453	432	375	317	315	319	1045	904	799	718	641	633	581	529
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,93	3,83	1,03	0,91	0,89	0,93	0,89	0,81	0,84	0,90	2,86	2,55	2,36	2,23	2,08	2,16	2,08	2,00
		CI Anteil in %	[1,85; 2,01]	[3,70; 3,96]	[0,95; 1,11]	[0,83; 0,99]	[0,80; 0,97]	[0,84; 1,02]	[0,80; 0,98]	[0,73; 0,90]	[0,75; 0,93]	[0,80; 1,00]	[2,69; 3,03]	[2,39; 2,71]	[2,20; 2,52]	[2,07; 2,39]	[1,92; 2,24]	[2,00; 2,33]	[1,91; 2,25]	[1,83; 2,16]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	40196	32076	26983	24497	22666	21773	20302	19556	18647	18348	17719	17575	16910	15944	15530	15246	14494	14078
		Anteil in %	35,02	38,71	41,37	43,02	44,34	47,00	47,96	50,25	49,83	51,68	48,44	49,59	49,95	49,45	50,41	52,07	51,92	53,13
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[34,74; 35,30]	[38,38; 39,04]	[40,99; 41,75]	[42,61; 43,42]	[43,91; 44,77]	[46,54; 47,45]	[47,48; 48,44]	[49,75; 50,75]	[49,33; 50,34]	[51,16; 52,20]	[47,93; 48,95]	[49,06; 50,11]	[49,41; 50,48]	[48,90; 49,99]	[49,86; 50,97]	[51,50; 52,64]	[51,34; 52,51]	[52,53; 53,73]
		Anzahl	72373	47607	37566	31933	27999	24123	21654	19044	18457	16838	17814	16965	16147	15582	14634	13402	12840	11892
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	63,05	57,46	57,60	56,07	54,77	52,07	51,15	48,93	49,33	47,42	48,70	47,86	47,69	48,33	47,51	45,77	46,00	44,88
		CI Anteil in %	[62,77; 63,33]	[57,12; 57,79]	[57,22; 57,98]	[55,67; 56,48]	[54,34; 55,20]	[51,62; 52,52]	[50,68; 51,63]	[48,44; 49,43]	[48,82; 49,83]	[46,90; 47,94]	[48,19; 49,21]	[47,34; 48,38]	[47,16; 48,23]	[47,78; 48,87]	[46,95; 48,06]	[45,20; 46,34]	[45,41; 46,58]	[44,28; 45,48]
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3015	3222	580	492	360	305	283	229	236	199	750	676	595	563	489	420	402	372
		Anteil in %	2,63	3,89	0,89	0,86	0,70	0,66	0,67	0,59	0,63	0,56	2,05	1,91	1,76	1,75	1,59	1,43	1,44	1,40
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[2,53; 2,72]	[3,76; 4,02]	[0,82; 0,96]	[0,79; 0,94]	[0,63; 0,78]	[0,58; 0,73]	[0,59; 0,75]	[0,51; 0,66]	[0,55; 0,71]	[0,48; 0,64]	[1,91; 2,20]	[1,76; 2,05]	[1,62; 1,90]	[1,60; 1,89]	[1,45; 1,73]	[1,30; 1,57]	[1,30; 1,58]	[1,26; 1,55]
		Anzahl	57676	37958	32016	27433	24300	21018	18907	16680	16205	14851	14953	14341	13682	13337	12479	11455	10973	10127
	Kategorie 7 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	50,25	45,81	49,09	48,17	47,54	45,37	44,66	42,86	43,31	41,83	40,88	40,46	40,41	41,36	40,51	39,12	39,31	38,22
		CI Anteil in %	[49,96; 50,54]	[45,47; 46,15]	[48,71; 49,47]	[47,76; 48,58]	[47,10; 47,97]	[44,91; 45,82]	[44,19; 45,14]	[42,37; 43,35]	[42,80; 43,81]	[41,31; 42,34]	[40,38; 41,38]	[39,95; 40,97]	[39,89; 40,94]	[40,83; 41,90]	[39,96; 41,06]	[38,56; 39,68]	[38,74; 39,88]	[37,63; 38,80]
	Kategorie 8 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	499	415	83	52	43	29	30	25	20	15	97	86	77	66	72	63	69	62
Anteil in %		0,43	0,50	0,13	0,09	0,08	0,06	0,07	0,06	0,05	0,04	0,27	0,24	0,23	0,20	0,23	0,22	0,25	0,23	
Kategorie 9 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,40; 0,47]	[0,45; 0,55]	[0,10; 0,15]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,11]	[0,04; 0,09]	[0,05; 0,10]	[0,04; 0,09]	[0,03; 0,08]	[0,02; 0,06]	[0,21; 0,32]	[0,19; 0,29]	[0,18; 0,28]	[0,16; 0,25]	[0,18; 0,29]	[0,16; 0,27]	[0,19; 0,31]	[0,18; 0,29]	
	Anzahl	11183	6012	4887	3956	3296	2771	2434	2110	1996	1773	2014	1862	1793	1616	1594	1464	1396	1331	
weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	9,74	7,26	7,49	6,95	6,45	5,98	5,75	5,42	5,33	4,99	5,51	5,25	5,30	5,01	5,17	5,00	5,00	5,02	
	CI Anteil in %	[9,57; 9,91]	[7,08; 7,43]	[7,29; 7,70]	[6,74; 7,16]	[6,23; 6,66]	[5,77; 6,20]	[5,53; 5,97]	[5,20; 5,65]	[5,11; 5,56]	[4,77; 5,22]	[5,27; 5,74]	[5,02; 5,49]	[5,06; 5,53]	[4,77; 5,25]	[4,93; 5,42]	[4,75; 5,25]	[4,75; 5,26]	[4,76; 5,29]	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	96476	84366	74877	66203	60392	55502	51956	49603	47523	45557	43673	41666	39872	38079	36244	34632	33054	
	auswertbar	Anzahl	96335	71078	61674	55270	51982	48249	44672	42935	40824	42697	41355	39542	37685	35991	34077	32585	30912	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	34229	30203	27476	25412	25004	23714	22791	21733	21428	21869	21651	20884	20454	19431	18879	17803	17116	
		Anteil in %	35,53	42,49	44,55	45,98	48,10	49,15	51,02	50,62	52,49	51,22	52,35	52,81	54,28	53,99	55,40	54,64	55,37	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[35,23; 35,83]	[42,13; 42,86]	[44,16; 44,94]	[45,56; 46,39]	[47,67; 48,53]	[48,70; 49,60]	[50,55; 51,48]	[50,15; 51,09]	[52,00; 52,97]	[50,74; 51,69]	[51,87; 52,84]	[52,32; 53,31]	[53,77; 54,78]	[53,47; 54,50]	[54,87; 55,93]	[54,10; 55,18]	[54,82; 55,92]	
		Anzahl	2300	1608	884	720	689	651	580	571	551	1589	1461	1233	1202	1073	971	870	835	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	2,39	2,26	1,43	1,30	1,33	1,35	1,30	1,33	1,35	3,72	3,53	3,12	3,19	2,98	2,85	2,67	2,70	
		CI Anteil in %	[2,29; 2,48]	[2,15; 2,37]	[1,34; 1,53]	[1,21; 1,40]	[1,23; 1,42]	[1,25; 1,45]	[1,19; 1,40]	[1,22; 1,44]	[1,24; 1,46]	[3,54; 3,90]	[3,35; 3,71]	[2,95; 3,29]	[3,01; 3,37]	[2,81; 3,16]	[2,67; 3,03]	[2,49; 2,84]	[2,52; 2,88]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	31929	28595	26592	24692	24315	23063	22211	21162	20877	20280	20190	19651	19252	18358	17908	16933	16281	
		Anteil in %	33,14	40,23	43,12	44,68	46,78	47,80	49,72	49,29	51,14	47,50	48,82	49,70	51,09	51,01	52,55	51,97	52,67	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[32,85; 33,44]	[39,87; 40,59]	[42,73; 43,51]	[44,26; 45,09]	[46,35; 47,20]	[47,35; 48,25]	[49,26; 50,18]	[48,82; 49,76]	[50,65; 51,62]	[47,02; 47,97]	[48,34; 49,30]	[49,20; 50,19]	[50,58; 51,59]	[50,49; 51,52]	[52,02; 53,08]	[51,42; 52,51]	[52,11; 53,23]	
		Anzahl	62106	40875	34198	29858	26978	24535	21881	21202	19396	20828	19704	18658	17231	16560	15198	14782	13796	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	64,47	57,51	55,45	54,02	51,90	50,85	48,98	49,38	47,51	48,78	47,65	47,19	45,72	46,01	44,60	45,36	44,63	
		CI Anteil in %	[64,17; 64,77]	[57,14; 57,87]	[55,06; 55,84]	[53,61; 54,44]	[51,47; 52,33]	[50,40; 51,30]	[48,52; 49,45]	[48,91; 49,85]	[47,03; 48,00]	[48,31; 49,26]	[47,16; 48,13]	[46,69; 47,68]	[45,22; 46,23]	[45,50; 46,53]	[44,07; 45,13]	[44,82; 45,90]	[44,08; 45,18]	
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4165	1475	721	610	548	438	430	389	353	1271	1069	994	872	787	714	662	597	
		Anteil in %	4,32	2,08	1,17	1,10	1,05	0,91	0,96	0,91	0,86	2,98	2,58	2,51	2,31	2,19	2,10	2,03	1,93	
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[4,20; 4,45]	[1,97; 2,18]	[1,08; 1,25]	[1,02; 1,19]	[0,97; 1,14]	[0,82; 0,99]	[0,87; 1,05]	[0,82; 1,00]	[0,77; 0,95]	[2,82; 3,14]	[2,43; 2,74]	[2,36; 2,67]	[2,16; 2,47]	[2,04; 2,34]	[1,94; 2,25]	[1,88; 2,18]	[1,78; 2,08]	
		Anzahl	46625	33340	28602	25283	23035	21044	18983	18123	16778	17001	16294	15442	14318	13848	12740	12377	11580	
	männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	48,40	46,91	46,38	45,74	44,31	43,62	42,49	42,21	41,10	39,82	39,40	39,05	37,99	38,48	37,39	37,98	37,46	
		CI Anteil in %	[48,08; 48,71]	[46,54; 47,27]	[45,98; 46,77]	[45,33; 46,16]	[43,89; 44,74]	[43,17; 44,06]	[42,04; 42,95]	[41,74; 42,68]	[40,62; 41,58]	[39,35; 40,28]	[38,93; 39,87]	[38,57; 39,53]	[37,50; 38,48]	[37,97; 38,98]	[36,87; 37,90]	[37,46; 38,51]	[36,92; 38,00]	
männliche Patienten insgesamt	Anzahl	922	203	87	78	61	41	35	55	49	168	131	123	91	93	78	80	75		
	Anteil in %	0,96	0,29	0,14	0,14	0,12	0,08	0,08	0,13	0,12	0,39	0,32	0,31	0,24	0,26	0,23	0,25	0,24		
männliche Patienten insgesamt	CI Anteil in %	[0,90; 1,02]	[0,25; 0,32]	[0,11; 0,17]	[0,11; 0,17]	[0,09; 0,15]	[0,06; 0,11]	[0,05; 0,10]	[0,09; 0,16]	[0,09; 0,15]	[0,33; 0,45]	[0,26; 0,37]	[0,26; 0,37]	[0,19; 0,29]	[0,21; 0,31]	[0,18; 0,28]	[0,19; 0,30]	[0,19; 0,30]		
	Anzahl	10394	5857	4788	3887	3334	3012	2433	2635	2216	2388	2210	2099	1950	1832	1666	1663	1544		
männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	10,79	8,24	7,76	7,03	6,41	6,24	5,45	6,14	5,43	5,59	5,34	5,31	5,17	5,09	4,89	5,10	4,99		
	CI Anteil in %	[10,59; 10,99]	[8,04; 8,44]	[7,55; 7,97]	[6,82; 7,25]	[6,20; 6,62]	[6,03; 6,46]	[5,24; 5,66]	[5,91; 6,36]	[5,21; 5,65]	[5,37; 5,81]	[5,13; 5,56]	[5,09; 5,53]	[4,95; 5,40]	[4,86; 5,32]	[4,66; 5,12]	[4,86; 5,34]	[4,75; 5,24]		
	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	128029	112344	100111	88932	81301	74849	70184	67198	64452	62070	59467	56602	54031	51707	49295	47149	45192	
	auswertbar	Anzahl	127860	95174	82868	74741	70211	65201	60516	58306	55460	58084	56005	53554	51015	48782	46308	44252	42188	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	42275	38174	34900	32581	31927	30210	29385	28099	27744	28701	28267	27207	26441	25549	24756	23193	22706	
		Anteil in %	33,06	40,11	42,12	43,59	45,47	46,33	48,56	48,19	50,03	49,41	50,47	50,80	51,83	52,37	53,46	52,41	53,82	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[32,81; 33,32]	[39,80; 40,42]	[41,78; 42,45]	[43,24; 43,95]	[45,10; 45,84]	[45,95; 46,72]	[48,16; 48,96]	[47,79; 48,60]	[49,61; 50,44]	[49,01; 49,82]	[50,06; 50,89]	[50,38; 51,23]	[51,40; 52,26]	[51,93; 52,82]	[53,01; 53,91]	[51,95; 52,88]	[53,35; 54,30]	
		Anzahl	2667	1694	908	777	715	712	648	617	613	2046	1832	1613	1468	1392	1268	1166	1112	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	2,09	1,78	1,10	1,04	1,02	1,09	1,07	1,06	1,11	3,52	3,27	3,01	2,88	2,85	2,74	2,63	2,64	
		CI Anteil in %	[2,01; 2,16]	[1,70; 1,86]	[1,02; 1,17]	[0,97; 1,11]	[0,94; 1,09]	[1,01; 1,17]	[0,99; 1,15]	[0,98; 1,14]	[1,02; 1,19]	[3,37; 3,67]	[3,12; 3,42]	[2,87; 3,16]	[2,73; 3,02]	[2,71; 3,00]	[2,59; 2,89]	[2,49; 2,78]	[2,48; 2,79]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	39608	36480	33992	31804	31212	29498	28737	27482	27131	26655	26435	25594	24973	24157	23488	22027	21594	
		Anteil in %	30,98	38,33	41,02	42,55	44,45	45,24	47,49	47,13	48,92	45,89	47,20	47,79	48,95	49,52	50,72	49,78	51,19	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[30,72; 31,23]	[38,02; 38,64]	[40,68; 41,35]	[42,20; 42,91]	[44,09; 44,82]	[44,86; 45,62]	[47,09; 47,88]	[46,73; 47,54]	[48,50; 49,34]	[45,49; 46,30]	[46,79; 47,61]	[47,37; 48,21]	[48,52; 49,39]	[49,08; 49,96]	[50,27; 51,18]	[49,31; 50,24]	[50,71; 51,66]	
		Anzahl	85585	57000	47968	42160	38284	34991	31131	30207	27716	29383	27738	26347	24574	23233	21552	21059	19482	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	66,94	59,89	57,88	56,41	54,53	53,67	51,44	51,81	49,97	50,59	49,53	49,20	48,17	47,63	46,54	47,59	46,18	
		CI Anteil in %	[66,68; 67,19]	[59,58; 60,20]	[57,55; 58,22]	[56,05; 56,76]	[54,16; 54,90]	[53,28; 54,05]	[51,04; 51,84]	[51,40; 52,21]	[49,56; 50,39]	[50,18; 50,99]	[49,11; 49,94]	[48,77; 49,62]	[47,74; 48,60]	[47,18; 48,07]	[46,09; 46,99]	[47,12; 48,05]	[45,70; 46,65]	
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4439	1652	796	670	574	500	433	418	362	1562	1327	1242	1058	959	862	813	682	
		Anteil in %	3,47	1,74	0,96	0,90	0,82	0,77	0,72	0,72	0,65	2,69	2,37	2,32	2,07	1,97	1,86	1,84	1,62	
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[3,37; 3,57]	[1,65; 1,82]	[0,89; 1,03]	[0,83; 0,96]	[0,75; 0,88]	[0,70; 0,83]	[0,65; 0,78]	[0,65; 0,79]	[0,59; 0,72]	[2,56; 2,82]	[2,24; 2,50]	[2,19; 2,45]	[1,95; 2,20]	[1,84; 2,09]	[1,74; 1,98]	[1,71; 1,96]	[1,50; 1,74]	
		Anzahl	64985	46277	39929	35347	32462	29743	26616	25653	23790	24014	22857	21746	20438	19231	18010	17619	16312	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	50,83	48,62	48,18	47,29	46,23	45,62	43,98	44,00	42,90	41,34	40,81	40,61	40,06	39,42	38,89	39,82	38,67	
		CI Anteil in %	[50,55; 51,10]	[48,31; 48,94]	[47,84; 48,52]	[46,93; 47,65]	[45,87; 46,60]	[45,24; 46,00]	[43,59; 44,38]	[43,59; 44,40]	[42,48; 43,31]	[40,94; 41,74]	[40,41; 41,22]	[40,19; 41,02]	[39,64; 40,49]	[38,99; 39,86]	[38,45; 39,34]	[39,36; 40,27]	[38,20; 39,13]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	962	236	81	65	64	63	40	53	41	204	185	145	136	137	105	106	90	
Anteil in %		0,75	0,25	0,10	0,09	0,09	0,10	0,07	0,09	0,07	0,35	0,33	0,27	0,27	0,28	0,23	0,24	0,21		
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,71; 0,80]	[0,22; 0,28]	[0,08; 0,12]	[0,07; 0,11]	[0,07; 0,11]	[0,07; 0,12]	[0,05; 0,09]	[0,07; 0,12]	[0,05; 0,10]	[0,30; 0,40]	[0,28; 0,38]	[0,23; 0,31]	[0,22; 0,31]	[0,23; 0,33]	[0,18; 0,27]	[0,19; 0,29]	[0,17; 0,26]		
	Anzahl	15199	8835	7162	6078	5184	4685	4042	4083	3523	3603	3369	3214	2942	2906	2575	2521	2398		
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	11,89	9,28	8,64	8,13	7,38	7,19	6,68	7,00	6,35	6,20	6,02	6,00	5,77	5,96	5,56	5,70	5,68		
	CI Anteil in %	[11,71; 12,06]	[9,10; 9,47]	[8,45; 8,83]	[7,94; 8,33]	[7,19; 7,58]	[6,99; 7,38]	[6,48; 6,88]	[6,80; 7,21]	[6,15; 6,56]	[6,01; 6,40]	[5,82; 6,21]	[5,80; 6,20]	[5,56; 5,97]	[5,75; 6,17]	[5,35; 5,77]	[5,48; 5,91]	[5,46; 5,91]		
weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	163432	142749	126918	112329	102494	94300	88366	84645	81247	78247	75048	71529	68399	65504	62532	59887	57490		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	71275	63235	55388	49379	44552	41443	39520	37719	36115	34582	32916	31368	29986	28575	27325	26102		
	auswertbar	Anzahl	57236	51046	45614	41636	37926	34914	33592	31567	33268	32046	30676	29156	27837	26449	25255	23944		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	22525	22535	20772	19955	18405	17857	16834	16629	16963	16723	16150	15515	14927	14603	13700	13220		
		Anteil in %	39,35	44,15	45,54	47,93	48,53	51,15	50,11	52,68	50,99	52,18	52,65	53,21	53,62	55,21	54,25	55,21		
		CI Anteil in %	[38,95; 39,75]	[43,72; 44,58]	[45,08; 46,00]	[47,45; 48,41]	[48,03; 49,03]	[50,62; 51,67]	[49,58; 50,65]	[52,13; 53,23]	[50,45; 51,53]	[51,64; 52,73]	[52,09; 53,21]	[52,64; 53,79]	[53,04; 54,21]	[54,61; 55,81]	[53,63; 54,86]	[54,58; 55,84]		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	638	719	609	601	541	478	436	415	1339	1221	1054	984	956	845	770	716		
		Anteil in %	1,11	1,41	1,34	1,44	1,43	1,37	1,30	1,31	4,02	3,81	3,44	3,37	3,43	3,19	3,05	2,99		
		CI Anteil in %	[1,03; 1,20]	[1,31; 1,51]	[1,23; 1,44]	[1,33; 1,56]	[1,31; 1,55]	[1,25; 1,49]	[1,18; 1,42]	[1,19; 1,44]	[3,81; 4,24]	[3,60; 4,02]	[3,23; 3,64]	[3,17; 3,58]	[3,22; 3,65]	[2,98; 3,41]	[2,84; 3,26]	[2,77; 3,21]		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	21887	21816	20163	19354	17864	17379	16398	16214	15624	15502	15096	14531	13971	13758	12930	12504		
		Anteil in %	38,24	42,74	44,20	46,48	47,10	49,78	48,82	51,36	46,96	48,37	49,21	49,84	50,19	52,02	51,20	52,22		
		CI Anteil in %	[37,84; 38,64]	[42,31; 43,17]	[43,75; 44,66]	[46,00; 46,96]	[46,60; 47,60]	[49,25; 50,30]	[48,28; 49,35]	[50,81; 51,92]	[46,43; 47,50]	[47,83; 48,92]	[48,65; 49,77]	[49,26; 50,41]	[49,60; 50,78]	[51,41; 52,62]	[50,58; 51,81]	[51,59; 52,85]		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	34711	28511	24842	21681	19521	17057	16758	14938	16305	15323	14526	13641	12910	11846	11555	10724		
		Anteil in %	60,65	55,85	54,46	52,07	51,47	48,85	49,89	47,32	49,01	47,82	47,35	46,79	46,38	44,79	45,75	44,79		
		CI Anteil in %	[60,25; 61,05]	[55,42; 56,28]	[54,00; 54,92]	[51,59; 52,55]	[50,97; 51,97]	[48,33; 49,38]	[49,35; 50,42]	[46,77; 47,87]	[48,47; 49,55]	[47,27; 48,36]	[46,79; 47,91]	[46,21; 47,36]	[45,79; 46,96]	[44,19; 45,39]	[45,14; 46,37]	[44,16; 45,42]		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	792	622	511	420	358	288	312	270	1048	901	880	764	640	573	530	474		
		Anteil in %	1,38	1,22	1,12	1,01	0,94	0,82	0,93	0,86	3,15	2,81	2,87	2,62	2,30	2,17	2,10	1,98		
		CI Anteil in %	[1,29; 1,48]	[1,12; 1,31]	[1,02; 1,22]	[0,91; 1,10]	[0,85; 1,04]	[0,73; 0,92]	[0,83; 1,03]	[0,75; 0,96]	[2,96; 3,34]	[2,63; 2,99]	[2,68; 3,06]	[2,44; 2,80]	[2,12; 2,48]	[1,99; 2,34]	[1,92; 2,28]	[1,80; 2,16]		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	27956	23991	21063	18587	16795	14849	14438	13004	13394	12700	11987	11429	10850	9994	9736	9081		
		Anteil in %	48,84	47,00	46,18	44,64	44,28	42,53	42,98	41,19	40,26	39,63	39,08	39,20	38,98	37,79	38,55	37,93		
		CI Anteil in %	[48,43; 49,25]	[46,57; 47,43]	[45,72; 46,63]	[44,16; 45,12]	[43,78; 44,78]	[42,01; 43,05]	[42,45; 43,51]	[40,65; 41,74]	[39,73; 40,79]	[39,09; 40,17]	[38,53; 39,62]	[38,64; 39,76]	[38,40; 39,55]	[37,20; 38,37]	[37,95; 39,15]	[37,31; 38,54]		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	131	87	41	45	40	26	33	26	111	99	79	73	73	61	68	56			
	Anteil in %	0,23	0,17	0,09	0,11	0,11	0,07	0,10	0,08	0,33	0,31	0,26	0,25	0,26	0,23	0,27	0,23			
	CI Anteil in %	[0,19; 0,27]	[0,13; 0,21]	[0,06; 0,12]	[0,08; 0,14]	[0,07; 0,14]	[0,05; 0,10]	[0,06; 0,13]	[0,05; 0,11]	[0,27; 0,40]	[0,25; 0,37]	[0,20; 0,31]	[0,19; 0,31]	[0,20; 0,32]	[0,17; 0,29]	[0,21; 0,33]	[0,17; 0,30]			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5832	3811	3227	2629	2328	1894	1975	1638	1752	1623	1580	1375	1347	1218	1221	1113			
	Anteil in %	10,19	7,47	7,07	6,31	6,14	5,42	5,88	5,19	5,27	5,06	5,15	4,72	4,84	4,61	4,83	4,65			
	CI Anteil in %	[9,94; 10,44]	[7,24; 7,69]	[6,84; 7,31]	[6,08; 6,55]	[5,90; 6,38]	[5,19; 5,66]	[5,63; 6,13]	[4,94; 5,43]	[5,03; 5,51]	[4,82; 5,30]	[4,90; 5,40]	[4,47; 4,96]	[4,59; 5,09]	[4,35; 4,86]	[4,57; 5,10]	[4,38; 4,92]			
männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	91550	81594	71862	64255	58236	54325	51854	49561	47477	45477	43244	41271	39403	37604	35999	34392		
	auswertbar	Anzahl	73763	66079	59332	54481	49802	46087	44166	41407	43688	42120	40265	38309	36548	34760	33260	31565		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	27115	27358	25852	24938	23226	22636	21653	20978	21599	21311	20546	19760	19197	18605	17446	16890		
		Anteil in %	36,76	41,40	43,57	45,77	46,64	49,12	49,03	50,66	49,44	50,60	51,03	51,58	52,53	53,52	52,45	53,51		
		CI Anteil in %	[36,41; 37,11]	[41,03; 41,78]	[43,17; 43,97]	[45,36; 46,19]	[46,20; 47,07]	[48,66; 49,57]	[48,56; 49,49]	[50,18; 51,14]	[48,97; 49,91]	[50,12; 51,07]	[50,54; 51,52]	[51,08; 52,08]	[52,01; 53,04]	[53,00; 54,05]	[51,92; 52,99]	[52,96; 54,06]		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	606	711	622	592	536	504	441	412	1475	1358	1213	1061	1030	951	859	855		
		Anteil in %	0,82	1,08	1,05	1,09	1,08	1,09	1,00	1,00	3,38	3,22	3,01	2,77	2,82	2,74	2,58	2,71		
		CI Anteil in %	[0,76; 0,89]	[1,00; 1,15]	[0,97; 1,13]	[1,00; 1,17]	[0,99; 1,17]	[1,00; 1,19]	[0,91; 1,09]	[0,90; 1,09]	[3,21; 3,55]	[3,06; 3,39]	[2,85; 3,18]	[2,61; 2,93]	[2,65; 2,99]	[2,56; 2,91]	[2,41; 2,75]	[2,53; 2,89]		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	26509	26647	25230	24346	22690	22132	21212	20566	20124	19953	19333	18699	18167	17654	16587	16035		
		Anteil in %	35,94	40,33	42,52	44,69	45,56	48,02	48,03	49,67	46,06	47,37	48,01	48,81	49,71	50,79	49,87	50,80		
		CI Anteil in %	[35,59; 36,28]	[39,95; 40,70]	[42,13; 42,92]	[44,27; 45,10]	[45,12; 46,00]	[47,57; 48,48]	[47,56; 48,49]	[49,19; 50,15]	[45,60; 46,53]	[46,89; 47,85]	[47,53; 48,50]	[48,31; 49,31]	[49,19; 50,22]	[50,26; 51,31]	[49,33; 50,41]	[50,25; 51,35]		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	46648	38721	33480	29543	26576	23451	22513	20429	22089	20809	19719	18549	17351	16155	15814	14675		
		Anteil in %	63,24	58,60	56,43	54,23	53,36	50,88	50,97	49,34	50,56	49,40	48,97	48,42	47,47	46,48	47,55	46,49		
		CI Anteil in %	[62,89; 63,59]	[58,22; 58,97]	[56,03; 56,83]	[53,81; 54,64]	[52,93; 53,80]	[50,43; 51,34]	[50,51; 51,44]	[48,86; 49,82]	[50,09; 51,03]	[48,93; 49,88]	[48,48; 49,46]	[47,92; 48,92]	[46,96; 47,99]	[45,95; 47,00]	[47,01; 48,08]	[45,94; 47,04]		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	804	611	497	419	361	304	323	267	1164	1011	921	843	720	652	673	579		
		Anteil in %	1,09	0,92	0,84	0,77	0,72	0,66	0,73	0,64	2,66	2,40	2,29	2,20	1,97	1,88	2,02	1,83		
		CI Anteil in %	[1,02; 1,16]	[0,85; 1,00]	[0,76; 0,91]	[0,70; 0,84]	[0,65; 0,80]	[0,59; 0,73]	[0,65; 0,81]	[0,57; 0,72]	[2,51; 2,82]	[2,25; 2,55]	[2,14; 2,43]	[2,05; 2,35]	[1,83; 2,11]	[1,73; 2,02]	[1,87; 2,17]	[1,69; 1,98]		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	37599	32227	28182	25254	22727	20133	19265	17657	18147	17147	16313	15445	14438	13505	13181	12212		
		Anteil in %	50,97	48,77	47,50	46,35	45,63	43,68	43,62	42,64	41,54	40,71	40,51	40,32	39,50	38,85	39,63	38,69		
		CI Anteil in %	[50,61; 51,33]	[48,39; 49,15]	[47,10; 47,90]	[45,94; 46,77]	[45,20; 46,07]	[43,23; 44,14]	[43,16; 44,08]	[42,17; 43,12]	[41,08; 42,00]	[40,24; 41,18]	[40,03; 40,99]	[39,83; 40,81]	[39,00; 40,01]	[38,34; 39,36]	[39,10; 40,16]	[38,15; 39,23]		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	128	104	59	45	59	33	41	30	138	147	95	100	97	79	79	74			
	Anteil in %	0,17	0,16	0,10	0,08	0,12	0,07	0,09	0,07	0,32	0,35	0,24	0,26	0,27	0,23	0,24	0,23			
	CI Anteil in %	[0,14; 0,20]	[0,13; 0,19]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,11]	[0,09; 0,15]	[0,05; 0,10]	[0,06; 0,12]	[0,05; 0,10]	[0,26; 0,37]	[0,29; 0,41]	[0,19; 0,28]	[0,21; 0,31]	[0,21; 0,32]	[0,18; 0,28]	[0,19; 0,29]	[0,18; 0,29]			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	8117	5779	4742	3825	3429	2981	2884	2475	2640	2504	2390	2161	2096	1919	1881	1810			
	Anteil in %	11,00	8,75	7,99	7,02	6,89	6,47	6,53	5,98	6,04	5,94	5,94	5,64	5,73	5,52	5,66	5,73			
	CI Anteil in %	[10,78; 11,23]	[8,53; 8,96]	[7,77; 8,21]	[6,81; 7,24]	[6,66; 7,11]	[6,24; 6,69]	[6,30; 6,76]	[5,75; 6,21]	[5,82; 6,27]	[5,72; 6,17]	[5,70; 6,17]	[5,41; 5,87]	[5,50; 5,97]	[5,28; 5,76]	[5,41; 5,90]	[5,48; 5,99]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	76627	68516	61280	54855	50781	48057	45753	43721	41623	39529	37733	36016	34356	32810	31332				
	auswertbar	Anzahl	62126	56645	50957	46713	43013	40987	38679	40569	39376	37618	35845	34177	32528	30988	29497				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	24192	25625	24298	22811	22030	20900	20328	21071	20773	19830	19042	18342	17955	16881	16200				
		Anteil in %	38,94	45,24	47,68	48,83	51,22	50,99	52,56	51,94	52,76	52,71	53,12	53,67	55,20	54,48	54,92				
		CI Anteil in %	[38,56; 39,32]	[44,83; 45,65]	[47,25; 48,12]	[48,38; 49,29]	[50,74; 51,69]	[50,51; 51,48]	[52,06; 53,05]	[51,45; 52,42]	[52,26; 53,25]	[52,21; 53,22]	[52,61; 53,64]	[53,14; 54,20]	[54,66; 55,74]	[53,92; 55,03]	[54,35; 55,49]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	650	817	775	636	562	551	544	1635	1500	1327	1198	1109	1020	923	859				
		Anteil in %	1,05	1,44	1,52	1,36	1,31	1,34	1,41	4,03	3,81	3,53	3,34	3,24	3,14	2,98	2,91				
		CI Anteil in %	[0,97; 1,13]	[1,34; 1,54]	[1,41; 1,63]	[1,26; 1,47]	[1,20; 1,41]	[1,23; 1,46]	[1,29; 1,52]	[3,84; 4,22]	[3,62; 4,00]	[3,34; 3,71]	[3,16; 3,53]	[3,06; 3,43]	[2,95; 3,33]	[2,79; 3,17]	[2,72; 3,10]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	23542	24808	23523	22175	21468	20349	19784	19436	19273	18503	17844	17233	16935	15958	15341				
		Anteil in %	37,89	43,80	46,16	47,47	49,91	49,65	51,15	47,91	48,95	49,19	49,78	50,42	52,06	51,50	52,01				
		CI Anteil in %	[37,51; 38,28]	[43,39; 44,20]	[45,73; 46,60]	[47,02; 47,92]	[49,44; 50,38]	[49,16; 50,13]	[50,65; 51,65]	[47,42; 48,39]	[48,45; 49,44]	[48,68; 49,69]	[49,26; 50,30]	[49,89; 50,95]	[51,52; 52,61]	[50,94; 52,05]	[51,44; 52,58]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	37934	31020	26659	23902	20983	20087	18351	19498	18603	17788	16803	15835	14573	14107	13297				
		Anteil in %	61,06	54,76	52,32	51,17	48,78	49,01	47,44	48,06	47,24	47,29	46,88	46,33	44,80	45,52	45,08				
		CI Anteil in %	[60,68; 61,44]	[54,35; 55,17]	[51,88; 52,75]	[50,71; 51,62]	[48,31; 49,26]	[48,52; 49,49]	[46,95; 47,94]	[47,58; 48,55]	[46,75; 47,74]	[46,78; 47,79]	[46,36; 47,39]	[45,80; 46,86]	[44,26; 45,34]	[44,97; 46,08]	[44,51; 45,65]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	842	702	528	450	438	354	353	1232	1075	991	931	805	710	638	602				
		Anteil in %	1,36	1,24	1,04	0,96	1,02	0,86	0,91	3,04	2,73	2,63	2,60	2,36	2,18	2,06	2,04				
		CI Anteil in %	[1,26; 1,45]	[1,15; 1,33]	[0,95; 1,12]	[0,87; 1,05]	[0,92; 1,11]	[0,77; 0,95]	[0,82; 1,01]	[2,87; 3,20]	[2,57; 2,89]	[2,47; 2,80]	[2,43; 2,76]	[2,19; 2,52]	[2,02; 2,34]	[1,90; 2,22]	[1,88; 2,20]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	30803	26135	22729	20708	18137	17333	15979	16020	15392	14800	13935	13214	12269	11823	11153				
		Anteil in %	49,58	46,14	44,60	44,33	42,17	42,29	41,31	39,49	39,09	39,34	38,88	38,66	37,72	38,15	37,81				
		CI Anteil in %	[49,19; 49,97]	[45,73; 46,55]	[44,17; 45,04]	[43,88; 44,78]	[41,70; 42,63]	[41,81; 42,77]	[40,82; 41,80]	[39,01; 39,96]	[38,61; 39,57]	[38,85; 39,84]	[38,37; 39,38]	[38,15; 39,18]	[37,19; 38,25]	[37,61; 38,69]	[37,26; 38,36]				
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	144	74	63	43	34	36	29	162	131	122	105	99	68	89	73					
	Anteil in %	0,23	0,13	0,12	0,09	0,08	0,09	0,07	0,40	0,33	0,32	0,29	0,29	0,21	0,29	0,25					
	CI Anteil in %	[0,19; 0,27]	[0,10; 0,16]	[0,09; 0,15]	[0,06; 0,12]	[0,05; 0,11]	[0,06; 0,12]	[0,05; 0,10]	[0,34; 0,46]	[0,28; 0,39]	[0,27; 0,38]	[0,24; 0,35]	[0,23; 0,35]	[0,16; 0,26]	[0,23; 0,35]	[0,19; 0,30]					
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	6145	4109	3339	2701	2374	2364	1990	2084	2005	1875	1832	1717	1526	1557	1469					
	Anteil in %	9,89	7,25	6,55	5,78	5,52	5,77	5,14	5,14	5,09	4,98	5,11	5,02	4,69	5,02	4,98					
	CI Anteil in %	[9,66; 10,13]	[7,04; 7,47]	[6,34; 6,77]	[5,57; 5,99]	[5,30; 5,74]	[5,54; 5,99]	[4,92; 5,37]	[4,92; 5,35]	[4,87; 5,31]	[4,76; 5,20]	[4,88; 5,34]	[4,79; 5,26]	[4,46; 4,92]	[4,78; 5,27]	[4,73; 5,23]					
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	105631	93726	83366	74241	68487	64764	61675	58977	56190	53398	50980	48671	46510	44483	42590				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	97537	87960	79278	71451	66251	62938	60029	57403	54796	52081	49683	47413	45271	43259	41327				
	auswertbar	Anzahl	79549	73222	66336	61165	56406	54081	50916	53394	51809	49632	47243	45111	42899	40970	38923				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	29399	31598	30394	28565	27565	26493	25855	26842	26325	25517	24554	23588	23021	21874	20848				
		Anteil in %	36,96	43,15	45,82	46,70	48,87	48,99	50,78	50,27	50,81	51,41	51,97	52,29	53,66	53,39	53,56				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[36,62; 37,29]	[42,79; 43,51]	[45,44; 46,20]	[46,31; 47,10]	[48,46; 49,28]	[48,57; 49,41]	[50,35; 51,21]	[49,85; 50,70]	[50,38; 51,24]	[50,97; 51,85]	[51,52; 52,42]	[51,83; 52,75]	[53,19; 54,14]	[52,91; 53,87]	[53,07; 54,06]				
		Anzahl	675	789	675	596	576	567	554	1949	1716	1586	1452	1326	1219	1155	1026				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,85	1,08	1,02	0,97	1,02	1,05	1,09	3,65	3,31	3,20	3,07	2,94	2,84	2,82	2,64				
		CI Anteil in %	[0,78; 0,91]	[1,00; 1,15]	[0,94; 1,09]	[0,90; 1,05]	[0,94; 1,10]	[0,96; 1,13]	[1,00; 1,18]	[3,49; 3,81]	[3,16; 3,47]	[3,04; 3,35]	[2,92; 3,23]	[2,78; 3,10]	[2,68; 3,00]	[2,66; 2,98]	[2,48; 2,80]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	28724	30809	29719	27969	26989	25926	25301	24893	24609	23931	23102	22262	21802	20719	19822				
		Anteil in %	36,11	42,08	44,80	45,73	47,85	47,94	49,69	46,62	47,50	48,22	48,90	49,35	50,82	50,57	50,93				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[35,77; 36,44]	[41,72; 42,43]	[44,42; 45,18]	[45,33; 46,12]	[47,44; 48,26]	[47,52; 48,36]	[49,26; 50,13]	[46,20; 47,04]	[47,07; 47,93]	[47,78; 48,66]	[48,45; 49,35]	[48,89; 49,81]	[50,35; 51,29]	[50,09; 51,06]	[50,43; 51,42]				
		Anzahl	50150	41624	35942	32600	28841	27588	25061	26552	25484	24115	22689	21523	19878	19096	18075				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	63,04	56,85	54,18	53,30	51,13	51,01	49,22	49,73	49,19	48,59	48,03	47,71	46,34	46,61	46,44				
		CI Anteil in %	[62,71; 63,38]	[56,49; 57,21]	[53,80; 54,56]	[52,90; 53,69]	[50,72; 51,54]	[50,59; 51,43]	[48,79; 49,65]	[49,30; 50,15]	[48,76; 49,62]	[48,15; 49,03]	[47,58; 48,48]	[47,25; 48,17]	[45,86; 46,81]	[46,13; 47,09]	[45,94; 46,93]				
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	832	702	579	521	432	416	392	1467	1331	1154	992	885	796	765	709				
		Anteil in %	1,05	0,96	0,87	0,85	0,77	0,77	0,77	2,75	2,57	2,33	2,10	1,96	1,86	1,87	1,82				
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,98; 1,12]	[0,89; 1,03]	[0,80; 0,94]	[0,78; 0,92]	[0,69; 0,84]	[0,70; 0,84]	[0,69; 0,85]	[2,61; 2,89]	[2,43; 2,71]	[2,19; 2,46]	[1,97; 2,23]	[1,83; 2,09]	[1,73; 1,98]	[1,74; 2,00]	[1,69; 1,95]				
		Anzahl	40604	34792	30431	27720	24714	23606	21536	21694	21049	19922	18810	17939	16743	16007	15095				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	51,04	47,52	45,87	45,32	43,81	43,65	42,30	40,63	40,63	40,14	39,82	39,77	39,03	39,07	38,78				
		CI Anteil in %	[50,70; 51,39]	[47,15; 47,88]	[45,49; 46,25]	[44,93; 45,71]	[43,41; 44,22]	[43,23; 44,07]	[41,87; 42,73]	[40,21; 41,05]	[40,21; 41,05]	[39,71; 40,57]	[39,37; 40,26]	[39,31; 40,22]	[38,57; 39,49]	[38,60; 39,54]	[38,30; 39,27]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	150	92	75	62	56	48	40	161	142	127	129	102	99	83	93				
		Anteil in %	0,19	0,13	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,30	0,27	0,26	0,27	0,23	0,23	0,20	0,24				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,16; 0,22]	[0,10; 0,15]	[0,09; 0,14]	[0,08; 0,13]	[0,07; 0,13]	[0,06; 0,11]	[0,05; 0,10]	[0,26; 0,35]	[0,23; 0,32]	[0,21; 0,30]	[0,23; 0,32]	[0,18; 0,27]	[0,19; 0,28]	[0,16; 0,25]	[0,19; 0,29]				
Anzahl		8564	6038	4857	4297	3639	3518	3093	3230	2962	2912	2758	2597	2240	2241	2178					
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	10,77	8,25	7,32	7,03	6,45	6,51	6,07	6,05	5,72	5,87	5,84	5,76	5,22	5,47	5,60					
	CI Anteil in %	[10,55; 10,98]	[8,05; 8,45]	[7,12; 7,52]	[6,82; 7,23]	[6,25; 6,65]	[6,30; 6,71]	[5,87; 6,28]	[5,85; 6,25]	[5,52; 5,92]	[5,66; 6,07]	[5,63; 6,05]	[5,54; 5,97]	[5,01; 5,43]	[5,25; 5,69]	[5,37; 5,82]					
weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	123470	110813	99471	89253	82572	78403	74799	71559	68310	64988	62073	59313	56688	54194	51856					

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	59477	53670	47903	43706	41081	38936	37008	35112	33222	31572	30029	28608	27250	25987				
	auswertbar	Anzahl	48482	44668	40262	36829	35057	32973	34644	33371	31752	30123	28655	27236	25936	24676				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	20144	20639	19193	18502	17498	17189	17753	17367	16676	15887	15278	14924	13977	13474				
		Anteil in %	41,55	46,21	47,67	50,24	49,91	52,13	51,24	52,04	52,52	52,74	53,32	54,80	53,89	54,60				
		CI Anteil in %	[41,11; 41,99]	[45,74; 46,67]	[47,18; 48,16]	[49,73; 50,75]	[49,39; 50,44]	[51,59; 52,67]	[50,72; 51,77]	[51,51; 52,58]	[51,97; 53,07]	[52,18; 53,30]	[52,74; 53,89]	[54,20; 55,39]	[53,28; 54,50]	[53,98; 55,22]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	566	628	566	495	475	478	1516	1360	1189	1088	1003	910	830	779				
		Anteil in %	1,17	1,41	1,41	1,34	1,35	1,45	4,38	4,08	3,74	3,61	3,50	3,34	3,20	3,16				
		CI Anteil in %	[1,07; 1,26]	[1,30; 1,52]	[1,29; 1,52]	[1,23; 1,46]	[1,23; 1,48]	[1,32; 1,58]	[4,16; 4,59]	[3,86; 4,29]	[3,54; 3,95]	[3,40; 3,82]	[3,29; 3,71]	[3,13; 3,55]	[2,99; 3,41]	[2,94; 3,38]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	19578	20011	18627	18007	17023	16711	16237	16007	15487	14799	14275	14014	13147	12695				
		Anteil in %	40,38	44,80	46,26	48,89	48,56	50,68	46,87	47,97	48,77	49,13	49,82	51,45	50,69	51,45				
		CI Anteil in %	[39,95; 40,82]	[44,34; 45,26]	[45,78; 46,75]	[48,38; 49,40]	[48,03; 49,08]	[50,14; 51,22]	[46,34; 47,39]	[47,43; 48,50]	[48,23; 49,32]	[48,56; 49,69]	[49,24; 50,40]	[50,86; 52,05]	[50,08; 51,30]	[50,82; 52,07]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	28338	24029	21069	18327	17559	15784	16891	16004	15076	14236	13377	12312	11959	11202				
		Anteil in %	58,45	53,79	52,33	49,76	50,09	47,87	48,76	47,96	47,48	47,26	46,68	45,20	46,11	45,40				
		CI Anteil in %	[58,01; 58,89]	[53,33; 54,26]	[51,84; 52,82]	[49,25; 50,27]	[49,56; 50,61]	[47,33; 48,41]	[48,23; 49,28]	[47,42; 48,49]	[46,93; 48,03]	[46,70; 47,82]	[46,11; 47,26]	[44,61; 45,80]	[45,50; 46,72]	[44,78; 46,02]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	630	497	425	346	342	307	1127	1000	873	832	703	634	592	520				
		Anteil in %	1,30	1,11	1,06	0,94	0,98	0,93	3,25	3,00	2,75	2,76	2,45	2,33	2,28	2,11				
		CI Anteil in %	[1,20; 1,40]	[1,02; 1,21]	[0,96; 1,16]	[0,84; 1,04]	[0,87; 1,08]	[0,83; 1,03]	[3,07; 3,44]	[2,81; 3,18]	[2,57; 2,93]	[2,58; 2,95]	[2,27; 2,63]	[2,15; 2,51]	[2,10; 2,46]	[1,93; 2,29]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	23067	20304	17899	15740	14911	13552	13637	13032	12356	11711	11088	10333	10000	9363				
		Anteil in %	47,58	45,46	44,46	42,74	42,53	41,10	39,36	39,05	38,91	38,88	38,69	37,94	38,56	37,94				
		CI Anteil in %	[47,13; 48,02]	[44,99; 45,92]	[43,97; 44,94]	[42,23; 43,24]	[42,02; 43,05]	[40,57; 41,63]	[38,85; 39,88]	[38,53; 39,58]	[38,38; 39,45]	[38,33; 39,43]	[38,13; 39,26]	[37,36; 38,52]	[37,96; 39,15]	[37,34; 38,55]				
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	90	62	30	32	42	38	158	125	107	83	80	75	70	54					
	Anteil in %	0,19	0,14	0,07	0,09	0,12	0,12	0,46	0,37	0,34	0,28	0,28	0,28	0,27	0,22					
	CI Anteil in %	[0,15; 0,22]	[0,10; 0,17]	[0,05; 0,10]	[0,06; 0,12]	[0,08; 0,16]	[0,08; 0,15]	[0,39; 0,53]	[0,31; 0,44]	[0,27; 0,40]	[0,22; 0,33]	[0,22; 0,34]	[0,21; 0,34]	[0,21; 0,33]	[0,16; 0,28]					
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4551	3166	2715	2209	2264	1887	1969	1847	1740	1610	1506	1270	1297	1265					
	Anteil in %	9,39	7,09	6,74	6,00	6,46	5,72	5,68	5,53	5,48	5,34	5,26	4,66	5,00	5,13					
	CI Anteil in %	[9,13; 9,65]	[6,85; 7,33]	[6,50; 6,99]	[5,76; 6,24]	[6,20; 6,72]	[5,47; 5,97]	[5,44; 5,93]	[5,29; 5,78]	[5,23; 5,73]	[5,09; 5,60]	[5,00; 5,51]	[4,41; 4,91]	[4,74; 5,27]	[4,85; 5,40]					
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	74289	67608	60694	55673	52599	49980	47650	45357	42930	40884	38858	37017	35313	33743					
	auswertbar	Anzahl	60920	56542	51113	46995	44720	42173	44716	43150	41084	39127	37153	35355	33647	32082					
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	24090	25218	23526	22824	21578	21192	22060	21799	20945	20240	19388	18802	17722	17213					
		Anteil in %	39,54	44,60	46,03	48,57	48,25	50,25	49,33	50,52	50,98	51,73	52,18	53,18	52,67	53,65					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[39,16; 39,93]	[44,19; 45,01]	[45,60; 46,46]	[48,11; 49,02]	[47,79; 48,71]	[49,77; 50,73]	[48,87; 49,80]	[50,05; 50,99]	[50,50; 51,46]	[51,23; 52,22]	[51,68; 52,69]	[52,66; 53,70]	[52,14; 53,20]	[53,11; 54,20]					
		Anzahl	507	595	558	511	443	451	1822	1652	1488	1363	1268	1157	1035	1009					
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,83	1,05	1,09	1,09	0,99	1,07	4,07	3,83	3,62	3,48	3,41	3,27	3,08	3,15					
		CI Anteil in %	[0,76; 0,90]	[0,97; 1,14]	[1,00; 1,18]	[0,99; 1,18]	[0,90; 1,08]	[0,97; 1,17]	[3,89; 4,26]	[3,65; 4,01]	[3,44; 3,80]	[3,30; 3,67]	[3,23; 3,60]	[3,09; 3,46]	[2,89; 3,26]	[2,95; 3,34]					
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	23583	24623	22968	22313	21135	20741	20238	20147	19457	18877	18120	17645	16687	16204					
		Anteil in %	38,71	43,55	44,94	47,48	47,26	49,18	45,26	46,69	47,36	48,25	48,77	49,91	49,59	50,51					
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[38,32; 39,10]	[43,14; 43,96]	[44,50; 45,37]	[47,03; 47,93]	[46,80; 47,72]	[48,70; 49,66]	[44,80; 45,72]	[46,22; 47,16]	[46,88; 47,84]	[47,75; 48,74]	[48,26; 49,28]	[49,39; 50,43]	[49,06; 50,13]	[49,96; 51,06]					
		Anzahl	36830	31324	27587	24171	23142	20981	22656	21351	20139	18887	17765	16553	15925	14869					
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	60,46	55,40	53,97	51,43	51,75	49,75	50,67	49,48	49,02	48,27	47,82	46,82	47,33	46,35					
		CI Anteil in %	[60,07; 60,84]	[54,99; 55,81]	[53,54; 54,40]	[50,98; 51,89]	[51,29; 52,21]	[49,27; 50,23]	[50,20; 51,13]	[49,01; 49,95]	[48,54; 49,50]	[47,78; 48,77]	[47,31; 48,32]	[46,30; 47,34]	[46,80; 47,86]	[45,80; 46,89]					
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	668	514	433	358	371	303	1356	1116	1061	992	861	737	731	620					
		Anteil in %	1,10	0,91	0,85	0,76	0,83	0,72	3,03	2,59	2,58	2,54	2,32	2,08	2,17	1,93					
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[1,01; 1,18]	[0,83; 0,99]	[0,77; 0,93]	[0,68; 0,84]	[0,75; 0,91]	[0,64; 0,80]	[2,87; 3,19]	[2,44; 2,74]	[2,43; 2,74]	[2,38; 2,69]	[2,16; 2,47]	[1,94; 2,23]	[2,02; 2,33]	[1,78; 2,08]					
		Anzahl	29883	26245	23197	20629	19614	17935	18319	17446	16487	15506	14673	13778	13134	12347					
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	49,05	46,42	45,38	43,90	43,86	42,53	40,97	40,43	40,13	39,63	39,49	38,97	39,03	38,49					
		CI Anteil in %	[48,66; 49,45]	[46,01; 46,83]	[44,95; 45,82]	[43,45; 44,34]	[43,40; 44,32]	[42,06; 43,00]	[40,51; 41,42]	[39,97; 40,89]	[39,66; 40,60]	[39,15; 40,11]	[39,00; 39,99]	[38,46; 39,48]	[38,51; 39,56]	[37,95; 39,02]					
		Anzahl	113	64	54	42	34	38	141	141	116	101	82	89	76	86					
		Anteil in %	0,19	0,11	0,11	0,09	0,08	0,09	0,32	0,33	0,28	0,26	0,22	0,25	0,23	0,27					
		CI Anteil in %	[0,15; 0,22]	[0,09; 0,14]	[0,08; 0,13]	[0,06; 0,12]	[0,05; 0,10]	[0,06; 0,12]	[0,26; 0,37]	[0,27; 0,38]	[0,23; 0,33]	[0,21; 0,31]	[0,17; 0,27]	[0,20; 0,30]	[0,18; 0,28]	[0,21; 0,32]					
Anzahl		6166	4501	3903	3142	3123	2705	2840	2648	2475	2288	2149	1949	1984	1816						
	Anteil in %	10,12	7,96	7,64	6,69	6,98	6,41	6,35	6,14	6,02	5,85	5,78	5,51	5,90	5,66						
	CI Anteil in %	[9,88; 10,36]	[7,74; 8,18]	[7,41; 7,87]	[6,46; 6,91]	[6,75; 7,22]	[6,18; 6,65]	[6,13; 6,58]	[5,91; 6,36]	[5,79; 6,25]	[5,62; 6,08]	[5,55; 6,02]	[5,27; 5,75]	[5,64; 6,15]	[5,41; 5,91]						
	Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	71578	64607	58677	54508	51433	48783	46321	43657	41398	39334	37477	35681	34125							
	auswertbar	Anzahl	58546	53959	48038	45433	42680	45163	43691	41289	39167	37254	35326	33616	31990							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	24453	25764	23992	22850	22269	22839	22469	21494	20680	19838	19294	18098	17549							
		Anteil in %	41,77	47,75	49,94	50,29	52,18	50,57	51,43	52,06	52,80	53,25	54,62	53,84	54,86							
		CI Anteil in %	[41,37; 42,17]	[47,33; 48,17]	[49,50; 50,39]	[49,83; 50,75]	[51,70; 52,65]	[50,11; 51,03]	[50,96; 51,90]	[51,58; 52,54]	[52,31; 53,29]	[52,74; 53,76]	[54,10; 55,14]	[53,30; 54,37]	[54,31; 55,40]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	663	787	708	665	626	1942	1774	1592	1473	1327	1187	1104	1019							
		Anteil in %	1,13	1,46	1,47	1,46	1,47	4,30	4,06	3,86	3,76	3,56	3,36	3,28	3,19							
		CI Anteil in %	[1,05; 1,22]	[1,36; 1,56]	[1,37; 1,58]	[1,35; 1,57]	[1,35; 1,58]	[4,11; 4,49]	[3,88; 4,25]	[3,67; 4,04]	[3,57; 3,95]	[3,37; 3,75]	[3,17; 3,55]	[3,09; 3,47]	[2,99; 3,38]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	23790	24977	23284	22185	21643	20897	20695	19902	19207	18511	18107	16994	16530							
		Anteil in %	40,63	46,29	48,47	48,83	50,71	46,27	47,37	48,20	49,04	49,69	51,26	50,55	51,67							
		CI Anteil in %	[40,24; 41,03]	[45,87; 46,71]	[48,02; 48,92]	[48,37; 49,29]	[50,24; 51,18]	[45,81; 46,73]	[46,90; 47,83]	[47,72; 48,68]	[48,54; 49,53]	[49,18; 50,20]	[50,74; 51,78]	[50,02; 51,09]	[51,12; 52,22]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	34093	28195	24046	22583	20411	22324	21222	19795	18487	17416	16032	15518	14441							
		Anteil in %	58,23	52,25	50,06	49,71	47,82	49,43	48,57	47,94	47,20	46,75	45,38	46,16	45,14							
		CI Anteil in %	[57,83; 58,63]	[51,83; 52,67]	[49,61; 50,50]	[49,25; 50,17]	[47,35; 48,30]	[48,97; 49,89]	[48,10; 49,04]	[47,46; 48,42]	[46,71; 47,69]	[46,24; 47,26]	[44,86; 45,90]	[45,63; 46,70]	[44,60; 45,69]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	753	676	519	487	433	1607	1401	1202	1087	966	888	771	710							
		Anteil in %	1,29	1,25	1,08	1,07	1,01	3,56	3,21	2,91	2,78	2,59	2,51	2,29	2,22							
		CI Anteil in %	[1,19; 1,38]	[1,16; 1,35]	[0,99; 1,17]	[0,98; 1,17]	[0,92; 1,11]	[3,39; 3,73]	[3,04; 3,37]	[2,75; 3,07]	[2,61; 2,94]	[2,43; 2,75]	[2,35; 2,68]	[2,13; 2,45]	[2,06; 2,38]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	27818	23781	20560	19196	17593	18120	17362	16305	15310	14476	13310	12924	12104							
		Anteil in %	47,51	44,07	42,80	42,25	41,22	40,12	39,74	39,49	39,09	38,86	37,68	38,45	37,84							
		CI Anteil in %	[47,11; 47,92]	[43,65; 44,49]	[42,36; 43,24]	[41,80; 42,71]	[40,75; 41,69]	[39,67; 40,57]	[39,28; 40,20]	[39,02; 39,96]	[38,61; 39,57]	[38,36; 39,35]	[37,17; 38,18]	[37,93; 38,97]	[37,31; 38,37]							
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	129	59	56	52	53	172	160	148	132	118	96	89	78							
Anteil in %		0,22	0,11	0,12	0,11	0,12	0,38	0,37	0,36	0,34	0,32	0,27	0,26	0,24								
CI Anteil in %		[0,18; 0,26]	[0,08; 0,14]	[0,09; 0,15]	[0,08; 0,15]	[0,09; 0,16]	[0,32; 0,44]	[0,31; 0,42]	[0,30; 0,42]	[0,28; 0,39]	[0,26; 0,37]	[0,22; 0,33]	[0,21; 0,32]	[0,19; 0,30]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5393	3679	2911	2848	2332	2425	2299	2140	1958	1856	1738	1734	1549								
	Anteil in %	9,21	6,82	6,06	6,27	5,46	5,37	5,26	5,18	5,00	4,98	4,92	5,16	4,84								
	CI Anteil in %	[8,98; 9,45]	[6,61; 7,03]	[5,85; 6,27]	[6,05; 6,49]	[5,25; 5,68]	[5,16; 5,58]	[5,05; 5,47]	[4,97; 5,40]	[4,78; 5,21]	[4,76; 5,20]	[4,69; 5,15]	[4,92; 5,39]	[4,61; 5,08]								
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	87996	79911	72978	68162	64447	61311	58326	55105	52256	49648	47162	44854	42803						
	auswertbar	Anzahl	72608	67218	59903	57033	53560	56890	55144	52241	49579	47061	44548	42413	40219						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	29293	31025	28707	27764	27059	28375	27735	26633	25714	24516	23779	22566	21503						
		Anteil in %	40,34	46,16	47,92	48,68	50,52	49,88	50,30	50,98	51,86	52,09	53,38	53,21	53,46						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[39,99; 40,70]	[45,78; 46,53]	[47,52; 48,32]	[48,27; 49,09]	[50,10; 50,94]	[49,47; 50,29]	[49,88; 50,71]	[50,55; 51,41]	[51,42; 52,30]	[51,64; 52,55]	[52,92; 53,84]	[52,73; 53,68]	[52,98; 53,95]						
		Anzahl	654	784	721	724	658	2444	2129	1894	1784	1581	1436	1302	1189						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,90	1,17	1,20	1,27	1,23	4,30	3,86	3,63	3,60	3,36	3,22	3,07	2,96						
		CI Anteil in %	[0,83; 0,97]	[1,09; 1,25]	[1,12; 1,29]	[1,18; 1,36]	[1,14; 1,32]	[4,13; 4,46]	[3,70; 4,02]	[3,47; 3,79]	[3,43; 3,76]	[3,20; 3,52]	[3,06; 3,39]	[2,91; 3,23]	[2,79; 3,12]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	28639	30241	27986	27040	26401	25931	25606	24739	23930	22935	22343	21264	20314						
		Anteil in %	39,44	44,99	46,72	47,41	49,29	45,58	46,43	47,36	48,27	48,73	50,15	50,14	50,51						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[39,09; 39,80]	[44,61; 45,37]	[46,32; 47,12]	[47,00; 47,82]	[48,87; 49,72]	[45,17; 45,99]	[46,02; 46,85]	[46,93; 47,78]	[47,83; 48,71]	[48,28; 49,19]	[49,69; 50,62]	[49,66; 50,61]	[50,02; 51,00]						
		Anzahl	43315	36193	31196	29269	26501	28515	27409	25608	23865	22545	20769	19847	18716						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	59,66	53,84	52,08	51,32	49,48	50,12	49,70	49,02	48,14	47,91	46,62	46,79	46,54						
		CI Anteil in %	[59,30; 60,01]	[53,47; 54,22]	[51,68; 52,48]	[50,91; 51,73]	[49,06; 49,90]	[49,71; 50,53]	[49,29; 50,12]	[48,59; 49,45]	[47,70; 48,58]	[47,45; 48,36]	[46,16; 47,08]	[46,32; 47,27]	[46,05; 47,02]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	784	646	522	490	461	1790	1576	1397	1171	1069	963	890	839						
		Anteil in %	1,08	0,96	0,87	0,86	0,86	3,15	2,86	2,67	2,36	2,27	2,16	2,10	2,09						
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[1,00; 1,15]	[0,89; 1,03]	[0,80; 0,95]	[0,78; 0,93]	[0,78; 0,94]	[3,00; 3,29]	[2,72; 3,00]	[2,54; 2,81]	[2,23; 2,50]	[2,14; 2,41]	[2,03; 2,30]	[1,96; 2,23]	[1,95; 2,23]						
		Anzahl	35204	30336	26426	24832	22544	23043	22209	20914	19486	18582	17257	16388	15499						
	Kategorie 7 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	48,49	45,13	44,11	43,54	42,09	40,50	40,27	40,03	39,30	39,48	38,74	38,64	38,54						
		CI Anteil in %	[48,12; 48,85]	[44,75; 45,51]	[43,72; 44,51]	[43,13; 43,95]	[41,67; 42,51]	[40,10; 40,91]	[39,87; 40,68]	[39,61; 40,45]	[38,87; 39,73]	[39,04; 39,93]	[38,29; 39,19]	[38,18; 39,10]	[38,06; 39,01]						
	Kategorie 8 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	120	91	64	52	62	216	208	162	156	147	150	137	99						
Anteil in %		0,17	0,14	0,11	0,09	0,12	0,38	0,38	0,31	0,31	0,31	0,34	0,32	0,25							
Kategorie 9 "mäßig erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,14; 0,19]	[0,11; 0,16]	[0,08; 0,13]	[0,07; 0,12]	[0,09; 0,14]	[0,33; 0,43]	[0,33; 0,43]	[0,26; 0,36]	[0,27; 0,36]	[0,26; 0,36]	[0,28; 0,39]	[0,27; 0,38]	[0,20; 0,29]							
	Anzahl	7207	5120	4184	3895	3434	3466	3416	3135	3052	2747	2399	2432	2279							
weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	9,93	7,62	6,98	6,83	6,41	6,09	6,19	6,00	6,16	5,84	5,39	5,73	5,67							
	CI Anteil in %	[9,71; 10,14]	[7,42; 7,82]	[6,78; 7,19]	[6,62; 7,04]	[6,20; 6,62]	[5,90; 6,29]	[5,99; 6,40]	[5,80; 6,20]	[5,94; 6,37]	[5,63; 6,05]	[5,18; 5,59]	[5,51; 5,96]	[5,44; 5,89]							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	68029	62435	57160	53461	50417	47592	44727	42387	40134	38117	36276								
	auswertbar	Anzahl	55898	51735	47483	44042	46769	44773	42399	40003	37945	35946	34180	32317							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	25038	25663	23618	22899	23633	23125	21938	21075	20097	19677	18455	17464							
		Anteil in %	44,79	49,60	49,74	51,99	50,53	51,65	51,74	52,68	52,96	54,74	53,99	54,04							
		CI Anteil in %	[44,38; 45,20]	[49,17; 50,04]	[49,29; 50,19]	[51,53; 52,46]	[50,08; 50,98]	[51,19; 52,11]	[51,27; 52,22]	[52,19; 53,17]	[52,46; 53,47]	[54,23; 55,26]	[53,47; 54,52]	[53,50; 54,58]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	641	708	710	651	2127	1880	1691	1556	1421	1377	1260	1129							
		Anteil in %	1,15	1,37	1,50	1,48	4,55	4,20	3,99	3,89	3,74	3,83	3,69	3,49							
		CI Anteil in %	[1,06; 1,23]	[1,27; 1,47]	[1,39; 1,60]	[1,37; 1,59]	[4,36; 4,74]	[4,01; 4,38]	[3,80; 4,17]	[3,70; 4,08]	[3,55; 3,94]	[3,63; 4,03]	[3,49; 3,89]	[3,29; 3,69]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	24397	24955	22908	22248	21506	21245	20247	19519	18676	18300	17195	16335							
		Anteil in %	43,65	48,24	48,24	50,52	45,98	47,45	47,75	48,79	49,22	50,91	50,31	50,55							
		CI Anteil in %	[43,23; 44,06]	[47,81; 48,67]	[47,80; 48,69]	[50,05; 50,98]	[45,53; 46,44]	[46,99; 47,91]	[47,28; 48,23]	[48,30; 49,28]	[48,72; 49,72]	[50,39; 51,43]	[49,78; 50,84]	[50,00; 51,09]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	30860	26072	23865	21143	23136	21648	20461	18928	17848	16269	15725	14853							
		Anteil in %	55,21	50,40	50,26	48,01	49,47	48,35	48,26	47,32	47,04	45,26	46,01	45,96							
		CI Anteil in %	[54,80; 55,62]	[49,96; 50,83]	[49,81; 50,71]	[47,54; 48,47]	[49,02; 49,92]	[47,89; 48,81]	[47,78; 48,73]	[46,83; 47,81]	[46,53; 47,54]	[44,74; 45,77]	[45,48; 46,53]	[45,42; 46,50]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	664	613	513	459	1695	1494	1336	1117	994	860	794	754							
		Anteil in %	1,19	1,18	1,08	1,04	3,62	3,34	3,15	2,79	2,62	2,39	2,32	2,33							
		CI Anteil in %	[1,10; 1,28]	[1,09; 1,28]	[0,99; 1,17]	[0,95; 1,14]	[3,45; 3,79]	[3,17; 3,50]	[2,98; 3,32]	[2,63; 2,95]	[2,46; 2,78]	[2,23; 2,55]	[2,16; 2,48]	[2,17; 2,50]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	25381	22067	20284	18080	18528	17477	16666	15651	14780	13631	13101	12428							
		Anteil in %	45,41	42,65	42,72	41,05	39,62	39,03	39,31	39,12	38,95	37,92	38,33	38,46							
		CI Anteil in %	[44,99; 45,82]	[42,23; 43,08]	[42,27; 43,16]	[40,59; 41,51]	[39,17; 40,06]	[38,58; 39,49]	[38,84; 39,77]	[38,65; 39,60]	[38,46; 39,44]	[37,42; 38,42]	[37,81; 38,84]	[37,93; 38,99]							
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	92	66	57	59	191	192	150	133	132	112	109	105							
Anteil in %		0,16	0,13	0,12	0,13	0,41	0,43	0,35	0,33	0,35	0,31	0,32	0,32								
CI Anteil in %		[0,13; 0,20]	[0,10; 0,16]	[0,09; 0,15]	[0,10; 0,17]	[0,35; 0,47]	[0,37; 0,49]	[0,30; 0,41]	[0,28; 0,39]	[0,29; 0,41]	[0,25; 0,37]	[0,26; 0,38]	[0,26; 0,39]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4723	3326	3011	2545	2722	2485	2309	2027	1942	1666	1721	1566								
	Anteil in %	8,45	6,43	6,34	5,78	5,82	5,55	5,45	5,07	5,12	4,63	5,04	4,85								
	CI Anteil in %	[8,22; 8,68]	[6,22; 6,64]	[6,12; 6,56]	[5,56; 6,00]	[5,61; 6,03]	[5,34; 5,76]	[5,23; 5,66]	[4,85; 5,28]	[4,90; 5,34]	[4,42; 4,85]	[4,80; 5,27]	[4,61; 5,08]								
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	83223	76860	70854	66382	62791	59486	55990	53055	50304	47849	45589	43518								
	auswertbar	Anzahl	68773	64026	58932	54769	58243	55885	53035	50076	47483	45072	42975	40735								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	29698	30242	28073	27256	28710	28017	26762	25524	24536	23897	22534	21687								
		Anteil in %	43,18	47,23	47,64	49,77	49,29	50,13	50,46	50,97	51,67	53,02	52,44	53,24								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[42,81; 43,55]	[46,85; 47,62]	[47,23; 48,04]	[49,35; 50,18]	[48,89; 49,70]	[49,72; 50,55]	[50,04; 50,89]	[50,53; 51,41]	[51,22; 52,12]	[52,56; 53,48]	[51,96; 52,91]	[52,75; 53,72]								
		Anzahl	624	667	648	624	2410	2092	1902	1720	1560	1473	1348	1291								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,91	1,04	1,10	1,14	4,14	3,74	3,59	3,43	3,29	3,27	3,14	3,17								
		CI Anteil in %	[0,84; 0,98]	[0,96; 1,12]	[1,02; 1,18]	[1,05; 1,23]	[3,98; 4,30]	[3,59; 3,90]	[3,43; 3,74]	[3,28; 3,59]	[3,13; 3,45]	[3,10; 3,43]	[2,97; 3,30]	[3,00; 3,34]								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	29074	29575	27425	26632	26300	25925	24860	23804	22976	22424	21186	20396								
		Anteil in %	42,28	46,19	46,54	48,63	45,16	46,39	46,87	47,54	48,39	49,75	49,30	50,07								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[41,91; 42,64]	[45,81; 46,58]	[46,13; 46,94]	[48,21; 49,04]	[44,75; 45,56]	[45,98; 46,80]	[46,45; 47,30]	[47,10; 47,97]	[47,94; 48,84]	[49,29; 50,21]	[48,83; 49,77]	[49,58; 50,56]								
		Anzahl	39075	33784	30859	27513	29533	27868	26273	24552	22947	21175	20441	19048								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	56,82	52,77	52,36	50,23	50,71	49,87	49,54	49,03	48,33	46,98	47,56	46,76								
		CI Anteil in %	[56,45; 57,19]	[52,38; 53,15]	[51,96; 52,77]	[49,82; 50,65]	[50,30; 51,11]	[49,45; 50,28]	[49,11; 49,96]	[48,59; 49,47]	[47,88; 48,78]	[46,52; 47,44]	[47,09; 48,04]	[46,28; 47,25]								
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	618	575	482	473	1875	1594	1373	1226	1091	982	926	844								
		Anteil in %	0,90	0,90	0,82	0,86	3,22	2,85	2,59	2,45	2,30	2,18	2,15	2,07								
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,83; 0,97]	[0,82; 0,97]	[0,75; 0,89]	[0,79; 0,94]	[3,08; 3,36]	[2,71; 2,99]	[2,45; 2,72]	[2,31; 2,58]	[2,16; 2,43]	[2,04; 2,31]	[2,02; 2,29]	[1,93; 2,21]								
		Anzahl	32255	28479	26198	23328	23706	22688	21467	20244	18988	17594	16919	15823								
	Kategorie 7 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	46,90	44,48	44,45	42,59	40,70	40,60	40,48	40,43	39,99	39,04	39,37	38,84								
		CI Anteil in %	[46,53; 47,27]	[44,10; 44,87]	[44,05; 44,86]	[42,18; 43,01]	[40,30; 41,10]	[40,19; 41,00]	[40,06; 40,89]	[40,00; 40,86]	[39,55; 40,43]	[38,58; 39,49]	[38,91; 39,83]	[38,37; 39,32]								
	Kategorie 8 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	100	85	68	64	255	185	173	166	137	140	116	112								
		Anteil in %	0,15	0,13	0,12	0,12	0,44	0,33	0,33	0,33	0,29	0,31	0,27	0,27								
	Kategorie 9 "mäßig erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,12; 0,17]	[0,10; 0,16]	[0,09; 0,14]	[0,09; 0,15]	[0,38; 0,49]	[0,28; 0,38]	[0,28; 0,37]	[0,28; 0,38]	[0,24; 0,34]	[0,26; 0,36]	[0,22; 0,32]	[0,22; 0,33]								
Anzahl		6102	4645	4111	3648	3697	3401	3260	2916	2731	2459	2480	2269									
weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	8,87	7,25	6,98	6,66	6,35	6,09	6,15	5,82	5,75	5,46	5,77	5,57									
	CI Anteil in %	[8,66; 9,09]	[7,05; 7,46]	[6,77; 7,18]	[6,45; 6,87]	[6,15; 6,55]	[5,89; 6,28]	[5,94; 6,35]	[5,62; 6,03]	[5,54; 5,96]	[5,25; 5,67]	[5,55; 5,99]	[5,35; 5,79]									

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2007-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	72264	66158	61181	57311	53995	50423	47522	44825	42494	40414	38456											
	auswertbar	Anzahl	59171	55042	49861	53224	50868	47867	45068	42646	40298	38348	36327											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	25874	26742	25194	26716	26083	24551	23491	22418	21897	20511	19617											
		Anteil in %	43,73	48,58	50,53	50,20	51,28	51,29	52,12	52,57	54,34	53,49	54,00											
		CI Anteil in %	[43,33; 44,13]	[48,17; 49,00]	[50,09; 50,97]	[49,77; 50,62]	[50,84; 51,71]	[50,84; 51,74]	[51,66; 52,58]	[52,09; 53,04]	[53,85; 54,82]	[52,99; 53,99]	[53,49; 54,51]											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	690	749	737	2536	2293	1968	1735	1621	1485	1374	1230											
		Anteil in %	1,17	1,36	1,48	4,76	4,51	4,11	3,85	3,80	3,69	3,58	3,39											
		CI Anteil in %	[1,08; 1,25]	[1,26; 1,46]	[1,37; 1,58]	[4,58; 4,95]	[4,33; 4,69]	[3,93; 4,29]	[3,67; 4,03]	[3,62; 3,98]	[3,50; 3,87]	[3,40; 3,77]	[3,20; 3,57]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	25184	25993	24457	24180	23790	22583	21756	20797	20412	19137	18387											
		Anteil in %	42,56	47,22	49,05	45,43	46,77	47,18	48,27	48,77	50,65	49,90	50,62											
		CI Anteil in %	[42,16; 42,96]	[46,81; 47,64]	[48,61; 49,49]	[45,01; 45,85]	[46,33; 47,20]	[46,73; 47,63]	[47,81; 48,74]	[48,29; 49,24]	[50,16; 51,14]	[49,40; 50,40]	[50,10; 51,13]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	33297	28300	24667	26508	24785	23316	21577	20228	18401	17837	16710											
		Anteil in %	56,27	51,42	49,47	49,80	48,72	48,71	47,88	47,43	45,66	46,51	46,00											
		CI Anteil in %	[55,87; 56,67]	[51,00; 51,83]	[49,03; 49,91]	[49,38; 50,23]	[48,29; 49,16]	[48,26; 49,16]	[47,42; 48,34]	[46,96; 47,91]	[45,18; 46,15]	[46,01; 47,01]	[45,49; 46,51]											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	721	639	520	2018	1726	1537	1348	1220	1069	958	889											
		Anteil in %	1,22	1,16	1,04	3,79	3,39	3,21	2,99	2,86	2,65	2,50	2,45											
		CI Anteil in %	[1,13; 1,31]	[1,07; 1,25]	[0,95; 1,13]	[3,63; 3,95]	[3,24; 3,55]	[3,05; 3,37]	[2,83; 3,15]	[2,70; 3,02]	[2,50; 2,81]	[2,34; 2,65]	[2,29; 2,61]											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	27111	23842	21096	21162	20118	18999	17708	16627	15271	14814	13902											
		Anteil in %	45,82	43,32	42,31	39,76	39,55	39,69	39,29	38,99	37,90	38,63	38,27											
		CI Anteil in %	[45,42; 46,22]	[42,90; 43,73]	[41,88; 42,74]	[39,34; 40,18]	[39,12; 39,97]	[39,25; 40,13]	[38,84; 39,74]	[38,53; 39,45]	[37,42; 38,37]	[38,14; 39,12]	[37,77; 38,77]											
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	131	74	56	214	173	170	150	111	108	98	97											
		Anteil in %	0,22	0,13	0,11	0,40	0,34	0,36	0,33	0,26	0,27	0,26	0,27											
		CI Anteil in %	[0,18; 0,26]	[0,10; 0,17]	[0,08; 0,14]	[0,35; 0,46]	[0,29; 0,39]	[0,30; 0,41]	[0,28; 0,39]	[0,21; 0,31]	[0,22; 0,32]	[0,21; 0,31]	[0,21; 0,32]											
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5334	3745	2995	3114	2768	2610	2371	2270	1953	1967	1822												
	Anteil in %	9,01	6,80	6,01	5,85	5,44	5,45	5,26	5,32	4,85	5,13	5,02												
	CI Anteil in %	[8,78; 9,25]	[6,59; 7,01]	[5,80; 6,22]	[5,65; 6,05]	[5,24; 5,64]	[5,25; 5,66]	[5,05; 5,47]	[5,11; 5,54]	[4,64; 5,06]	[4,91; 5,35]	[4,79; 5,24]												
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740											

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	87967	81297	75494	70805	66776	62602	59138	55935	52950	50318	48045							
	auswertbar	Anzahl	72937	68131	61947	65983	63050	59525	56261	53206	50287	47815	45432							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	30596	32092	30664	32553	31543	30134	28780	27224	26569	24919	24003							
		Anteil in %	41,95	47,10	49,50	49,34	50,03	50,62	51,15	51,17	52,83	52,12	52,83							
		CI Anteil in %	[41,59; 42,31]	[46,73; 47,48]	[49,11; 49,89]	[48,95; 49,72]	[49,64; 50,42]	[50,22; 51,03]	[50,74; 51,57]	[50,74; 51,59]	[52,40; 53,27]	[51,67; 52,56]	[52,37; 53,29]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	666	793	715	2849	2519	2270	1977	1816	1756	1573	1449							
		Anteil in %	0,91	1,16	1,15	4,32	4,00	3,81	3,51	3,41	3,49	3,29	3,19							
		CI Anteil in %	[0,84; 0,98]	[1,08; 1,24]	[1,07; 1,24]	[4,16; 4,47]	[3,84; 4,15]	[3,66; 3,97]	[3,36; 3,67]	[3,26; 3,57]	[3,33; 3,65]	[3,13; 3,45]	[3,03; 3,35]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	29930	31299	29949	29704	29024	27864	26803	25408	24813	23346	22554							
		Anteil in %	41,04	45,94	48,35	45,02	46,03	46,81	47,64	47,75	49,34	48,83	49,64							
		CI Anteil in %	[40,68; 41,39]	[45,57; 46,31]	[47,95; 48,74]	[44,64; 45,40]	[45,64; 46,42]	[46,41; 47,21]	[47,23; 48,05]	[47,33; 48,18]	[48,91; 49,78]	[48,38; 49,27]	[49,18; 50,10]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	42341	36039	31283	33430	31507	29391	27481	25982	23718	22896	21429							
		Anteil in %	58,05	52,90	50,50	50,66	49,97	49,38	48,85	48,83	47,17	47,88	47,17							
		CI Anteil in %	[57,69; 58,41]	[52,52; 53,27]	[50,11; 50,89]	[50,28; 51,05]	[49,58; 50,36]	[48,97; 49,78]	[48,43; 49,26]	[48,41; 49,26]	[46,73; 47,60]	[47,44; 48,33]	[46,71; 47,63]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	700	594	548	2163	1887	1628	1502	1328	1142	1079	981							
		Anteil in %	0,96	0,87	0,88	3,28	2,99	2,73	2,67	2,50	2,27	2,26	2,16							
		CI Anteil in %	[0,89; 1,03]	[0,80; 0,94]	[0,81; 0,96]	[3,14; 3,41]	[2,86; 3,13]	[2,60; 2,87]	[2,54; 2,80]	[2,36; 2,63]	[2,14; 2,40]	[2,12; 2,39]	[2,03; 2,29]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	34425	30418	26450	26895	25588	24036	22474	21440	19620	18961	17812							
		Anteil in %	47,20	44,65	42,70	40,76	40,58	40,38	39,95	40,30	39,02	39,65	39,21							
		CI Anteil in %	[46,84; 47,56]	[44,27; 45,02]	[42,31; 43,09]	[40,39; 41,14]	[40,20; 40,97]	[39,99; 40,77]	[39,54; 40,35]	[39,88; 40,71]	[38,59; 39,44]	[39,22; 40,09]	[38,76; 39,65]							
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	122	72	71	271	224	210	183	162	137	146	133							
Anteil in %		0,17	0,11	0,11	0,41	0,36	0,35	0,33	0,30	0,27	0,31	0,29								
CI Anteil in %		[0,14; 0,20]	[0,08; 0,13]	[0,09; 0,14]	[0,36; 0,46]	[0,31; 0,40]	[0,31; 0,40]	[0,28; 0,37]	[0,26; 0,35]	[0,23; 0,32]	[0,26; 0,35]	[0,24; 0,34]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	7094	4955	4214	4101	3808	3517	3322	3052	2819	2710	2503								
	Anteil in %	9,73	7,27	6,80	6,22	6,04	5,91	5,90	5,74	5,61	5,67	5,51								
	CI Anteil in %	[9,51; 9,94]	[7,08; 7,47]	[6,60; 7,00]	[6,03; 6,40]	[5,85; 6,23]	[5,72; 6,10]	[5,71; 6,10]	[5,54; 5,93]	[5,40; 5,81]	[5,46; 5,87]	[5,30; 5,72]								
weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660								

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	66415	60998	56620	52778	48864	45904	43203	40833	38765	36928									
	auswertbar	Anzahl	54399	49661	52093	49289	46110	43329	40806	38491	36587	34594									
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	24946	25246	26169	25198	23789	22831	21407	20911	19533	18774									
		Anteil in %	45,86	50,84	50,24	51,12	51,59	52,69	52,46	52,46	54,33	53,39	54,27								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[45,44; 46,28]	[50,40; 51,28]	[49,81; 50,66]	[50,68; 51,56]	[51,14; 52,05]	[52,22; 53,16]	[51,98; 52,94]	[53,83; 54,82]	[52,88; 53,90]	[53,74; 54,79]									
		Anzahl	684	716	2581	2176	1990	1810	1611	1503	1394	1276									
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,26	1,44	4,95	4,41	4,32	4,18	3,95	3,90	3,81	3,69									
		CI Anteil in %	[1,16; 1,35]	[1,34; 1,55]	[4,77; 5,14]	[4,23; 4,60]	[4,13; 4,50]	[3,99; 4,37]	[3,76; 4,14]	[3,71; 4,10]	[3,61; 4,01]	[3,49; 3,89]									
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	24262	24530	23588	23022	21799	21021	19796	19408	18139	17498									
		Anteil in %	44,60	49,39	45,28	46,71	47,28	48,51	48,51	50,42	49,58	50,58									
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[44,18; 45,02]	[48,96; 49,83]	[44,85; 45,71]	[46,27; 47,15]	[46,82; 47,73]	[48,04; 48,99]	[48,03; 49,00]	[49,92; 50,92]	[49,07; 50,09]	[50,05; 51,11]									
		Anzahl	29453	24415	25924	24091	22321	20498	19399	17580	17054	15820									
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	54,14	49,16	49,76	48,88	48,41	47,31	47,54	45,67	46,61	45,73									
		CI Anteil in %	[53,72; 54,56]	[48,72; 49,60]	[49,34; 50,19]	[48,44; 49,32]	[47,95; 48,86]	[46,84; 47,78]	[47,06; 48,02]	[45,18; 46,17]	[46,10; 47,12]	[45,21; 46,26]									
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	632	553	2093	1829	1549	1331	1228	1038	936	902									
		Anteil in %	1,16	1,11	4,02	3,71	3,36	3,07	3,01	2,70	2,56	2,61									
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[1,07; 1,25]	[1,02; 1,21]	[3,85; 4,19]	[3,54; 3,88]	[3,19; 3,52]	[2,91; 3,23]	[2,84; 3,18]	[2,53; 2,86]	[2,40; 2,72]	[2,44; 2,78]									
		Anzahl	24250	20663	20451	19433	18020	16762	15929	14574	14137	13133									
	Kategorie 7 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	44,58	41,61	39,26	39,43	39,08	38,69	39,04	37,86	38,64	37,96									
		CI Anteil in %	[44,16; 45,00]	[41,17; 42,04]	[38,84; 39,68]	[39,00; 39,86]	[38,64; 39,53]	[38,23; 39,14]	[38,56; 39,51]	[37,38; 38,35]	[38,14; 39,14]	[37,45; 38,47]									
Kategorie 8 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	89	57	267	213	192	163	132	133	125	117										
	Anteil in %	0,16	0,11	0,51	0,43	0,42	0,38	0,32	0,35	0,34	0,34										
Kategorie 9 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,13; 0,20]	[0,08; 0,14]	[0,45; 0,57]	[0,37; 0,49]	[0,36; 0,48]	[0,32; 0,43]	[0,27; 0,38]	[0,29; 0,40]	[0,28; 0,40]	[0,28; 0,40]										
	Anzahl	4482	3142	3113	2616	2560	2242	2110	1835	1856	1668										
männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	8,24	6,33	5,98	5,31	5,55	5,17	5,17	4,77	5,07	4,82										
	CI Anteil in %	[8,01; 8,47]	[6,11; 6,54]	[5,77; 6,18]	[5,11; 5,51]	[5,34; 5,76]	[4,97; 5,38]	[4,96; 5,39]	[4,55; 4,98]	[4,85; 5,30]	[4,60; 5,05]										

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	80172	74154	69241	64792	60289	56739	53521	50578	48117	45839								
	auswertbar	Anzahl	65913	60418	63588	60507	56841	53531	50442	47685	45347	42873								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	29343	29897	31506	30607	29102	27688	26249	25656	24034	22941								
		Anteil in %	44,52	49,48	49,55	50,58	51,20	51,72	52,04	53,80	53,00	53,51								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[44,14; 44,90]	[49,08; 49,88]	[49,16; 49,94]	[50,19; 50,98]	[50,79; 51,61]	[51,30; 52,15]	[51,60; 52,47]	[53,36; 54,25]	[52,54; 53,46]	[53,04; 53,98]								
		Anzahl	652	771	2942	2596	2251	2029	1868	1754	1626	1490								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,99	1,28	4,63	4,29	3,96	3,79	3,70	3,68	3,59	3,48								
		CI Anteil in %	[0,91; 1,06]	[1,19; 1,37]	[4,46; 4,79]	[4,13; 4,45]	[3,80; 4,12]	[3,63; 3,95]	[3,54; 3,87]	[3,51; 3,85]	[3,41; 3,76]	[3,30; 3,65]								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	28691	29126	28564	28011	26851	25659	24381	23902	22408	21451								
		Anteil in %	43,53	48,21	44,92	46,29	47,24	47,93	48,33	50,12	49,41	50,03								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[43,15; 43,91]	[47,81; 48,61]	[44,53; 45,31]	[45,90; 46,69]	[46,83; 47,65]	[47,51; 48,36]	[47,90; 48,77]	[49,68; 50,57]	[48,95; 49,87]	[49,56; 50,51]								
		Anzahl	36570	30521	32082	29900	27739	25843	24193	22029	21313	19932								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	55,48	50,52	50,45	49,42	48,80	48,28	47,96	46,20	47,00	46,49								
		CI Anteil in %	[55,10; 55,86]	[50,12; 50,92]	[50,06; 50,84]	[49,02; 49,81]	[48,39; 49,21]	[47,85; 48,70]	[47,53; 48,40]	[45,75; 46,64]	[46,54; 47,46]	[46,02; 46,96]								
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	635	539	2204	1862	1631	1471	1349	1207	1059	979								
		Anteil in %	0,96	0,89	3,47	3,08	2,87	2,75	2,67	2,53	2,34	2,28								
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,89; 1,04]	[0,82; 0,97]	[3,32; 3,61]	[2,94; 3,21]	[2,73; 3,01]	[2,61; 2,89]	[2,53; 2,82]	[2,39; 2,67]	[2,20; 2,47]	[2,14; 2,42]								
		Anzahl	29851	25792	25521	24119	22554	21066	19780	18032	17612	16469								
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	45,29	42,69	40,13	39,86	39,68	39,35	39,21	37,81	38,84	38,41								
		CI Anteil in %	[44,91; 45,67]	[42,29; 43,08]	[39,75; 40,52]	[39,47; 40,25]	[39,28; 40,08]	[38,94; 39,77]	[38,79; 39,64]	[37,38; 38,25]	[38,39; 39,29]	[37,95; 38,87]								
		Anzahl	117	61	278	248	227	197	151	148	139	147								
Anteil in %		0,18	0,10	0,44	0,41	0,40	0,37	0,30	0,31	0,31	0,34									
	CI Anteil in %	[0,15; 0,21]	[0,08; 0,13]	[0,39; 0,49]	[0,36; 0,46]	[0,35; 0,45]	[0,32; 0,42]	[0,25; 0,35]	[0,26; 0,36]	[0,26; 0,36]	[0,29; 0,40]									
	Anzahl	5967	4129	4079	3671	3327	3109	2913	2642	2503	2337									
	Anteil in %	9,05	6,83	6,41	6,07	5,85	5,81	5,77	5,54	5,52	5,45									
	CI Anteil in %	[8,83; 9,27]	[6,63; 7,04]	[6,22; 6,61]	[5,88; 6,26]	[5,66; 6,05]	[5,61; 6,01]	[5,57; 5,98]	[5,34; 5,75]	[5,31; 5,73]	[5,24; 5,67]									

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2008-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	71638	66110	61175	55705	51776	48519	45710	43230	40995												
	auswertbar	Anzahl	58111	61850	57689	53340	49706	46719	44029	41658	39282												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	26454	30487	29222	27292	25939	24493	23974	22177	21159												
		Anteil in %	45,52	49,29	50,65	51,17	52,18	52,43	54,45	53,24	53,86												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[45,12; 45,93]	[48,90; 49,69]	[50,25; 51,06]	[50,74; 51,59]	[51,75; 52,62]	[51,97; 52,88]	[53,99; 54,92]	[52,76; 53,72]	[53,37; 54,36]												
		Anzahl	717	3110	2724	2377	2097	1876	1700	1564	1426												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,23	5,03	4,72	4,46	4,22	4,02	3,86	3,75	3,63												
		CI Anteil in %	[1,14; 1,32]	[4,86; 5,20]	[4,55; 4,89]	[4,28; 4,63]	[4,04; 4,40]	[3,84; 4,19]	[3,68; 4,04]	[3,57; 3,94]	[3,45; 3,82]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	25737	27377	26498	24915	23842	22617	22274	20613	19733												
		Anteil in %	44,29	44,26	45,93	46,71	47,97	48,41	50,59	49,48	50,23												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[43,89; 44,69]	[43,87; 44,65]	[45,53; 46,34]	[46,29; 47,13]	[47,53; 48,41]	[47,96; 48,86]	[50,12; 51,06]	[49,00; 49,96]	[49,74; 50,73]												
		Anzahl	31657	31363	28467	26048	23767	22226	20055	19481	18123												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	54,48	50,71	49,35	48,83	47,82	47,57	45,55	46,76	46,14												
		CI Anteil in %	[54,07; 54,88]	[50,31; 51,10]	[48,94; 49,75]	[48,41; 49,26]	[47,38; 48,25]	[47,12; 48,03]	[45,08; 46,01]	[46,28; 47,24]	[45,64; 46,63]												
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	667	2754	2314	1903	1657	1442	1244	1141	1050												
		Anteil in %	1,15	4,45	4,01	3,57	3,33	3,09	2,83	2,74	2,67												
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[1,06; 1,23]	[4,29; 4,62]	[3,85; 4,17]	[3,41; 3,73]	[3,18; 3,49]	[2,93; 3,24]	[2,67; 2,98]	[2,58; 2,90]	[2,51; 2,83]												
		Anzahl	25657	24256	22464	20885	19193	18076	16505	15951	14942												
	männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	44,15	39,22	38,94	39,15	38,61	38,69	37,49	38,29	38,04												
		CI Anteil in %	[43,75; 44,56]	[38,83; 39,60]	[38,54; 39,34]	[38,74; 39,57]	[38,19; 39,04]	[38,25; 39,13]	[37,03; 37,94]	[37,82; 38,76]	[37,56; 38,52]												
männliche Patienten insgesamt	Anzahl	114	386	312	251	192	173	169	159	152													
	Anteil in %	0,20	0,62	0,54	0,47	0,39	0,37	0,38	0,38	0,39													
männliche Patienten insgesamt	CI Anteil in %	[0,16; 0,23]	[0,56; 0,69]	[0,48; 0,60]	[0,41; 0,53]	[0,33; 0,44]	[0,32; 0,43]	[0,33; 0,44]	[0,32; 0,44]	[0,33; 0,45]													
	Anzahl	5219	3967	3377	3009	2725	2535	2137	2230	1979													
männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	8,98	6,41	5,85	5,64	5,48	5,43	4,85	5,35	5,04													
	CI Anteil in %	[8,75; 9,21]	[6,22; 6,61]	[5,66; 6,05]	[5,45; 5,84]	[5,28; 5,68]	[5,22; 5,63]	[4,65; 5,05]	[5,14; 5,57]	[4,82; 5,25]													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	85149	79230	73595	67347	63049	59219	55996	53089	50458													
	auswertbar	Anzahl	69497	74298	69669	64635	60666	57166	53971	51251	48478													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	30829	36255	34880	32818	31296	29652	28934	27307	25962													
		Anteil in %	44,36	48,80	50,07	50,77	51,59	51,87	51,87	53,61	53,28	53,55												
		CI Anteil in %	[43,99; 44,73]	[48,44; 49,16]	[49,69; 50,44]	[50,39; 51,16]	[51,19; 51,99]	[51,46; 52,28]	[53,19; 54,03]	[52,85; 53,71]	[53,11; 54,00]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	668	3389	2991	2629	2347	2124	1973	1825	1624													
		Anteil in %	0,96	4,56	4,29	4,07	3,87	3,72	3,66	3,56	3,35													
		CI Anteil in %	[0,89; 1,03]	[4,41; 4,71]	[4,14; 4,44]	[3,92; 4,22]	[3,72; 4,02]	[3,56; 3,87]	[3,50; 3,81]	[3,40; 3,72]	[3,19; 3,51]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	30161	32866	31889	30189	28949	27528	26961	25482	24338													
		Anteil in %	43,40	44,24	45,77	46,71	47,72	48,15	49,95	49,72	50,20													
		CI Anteil in %	[43,03; 43,77]	[43,88; 44,59]	[45,40; 46,14]	[46,32; 47,09]	[47,32; 48,12]	[47,74; 48,56]	[49,53; 50,38]	[49,29; 50,15]	[49,76; 50,65]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	38668	38043	34789	31817	29370	27514	25037	23944	22516													
		Anteil in %	55,64	51,20	49,93	49,23	48,41	48,13	46,39	46,72	46,45													
		CI Anteil in %	[55,27; 56,01]	[50,84; 51,56]	[49,56; 50,31]	[48,84; 49,61]	[48,01; 48,81]	[47,72; 48,54]	[45,97; 46,81]	[46,29; 47,15]	[46,00; 46,89]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	625	2624	2290	1876	1651	1441	1265	1170	1126													
		Anteil in %	0,90	3,53	3,29	2,90	2,72	2,52	2,34	2,28	2,32													
		CI Anteil in %	[0,83; 0,97]	[3,40; 3,66]	[3,15; 3,42]	[2,77; 3,03]	[2,59; 2,85]	[2,39; 2,65]	[2,22; 2,47]	[2,15; 2,41]	[2,19; 2,46]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	31343	29924	27716	25631	23877	22559	20666	19755	18532													
		Anteil in %	45,10	40,28	39,78	39,65	39,36	39,46	38,29	38,55	38,23													
		CI Anteil in %	[44,73; 45,47]	[39,92; 40,63]	[39,42; 40,15]	[39,28; 40,03]	[38,97; 39,75]	[39,06; 39,86]	[37,88; 38,70]	[38,12; 38,97]	[37,80; 38,66]													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	129	401	296	241	237	203	163	166	149													
		Anteil in %	0,19	0,54	0,42	0,37	0,39	0,36	0,30	0,32	0,31													
		CI Anteil in %	[0,15; 0,22]	[0,49; 0,59]	[0,38; 0,47]	[0,33; 0,42]	[0,34; 0,44]	[0,31; 0,40]	[0,26; 0,35]	[0,27; 0,37]	[0,26; 0,36]													
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	6571	5094	4487	4069	3605	3311	2943	2853	2709														
	Anteil in %	9,46	6,86	6,44	6,30	5,94	5,79	5,45	5,57	5,59														
	CI Anteil in %	[9,24; 9,67]	[6,67; 7,04]	[6,26; 6,62]	[6,11; 6,48]	[5,75; 6,13]	[5,60; 5,98]	[5,26; 5,64]	[5,37; 5,77]	[5,38; 5,79]														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2008-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48050	43995	39959	36872	34514	32435	30721	29134													
	auswertbar	Anzahl	48034	42340	38578	35743	33551	31518	29872	28180													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	22031	21136	19397	18317	17556	16805	15779	15133													
		Anteil in %	45,87	49,92	50,28	51,25	52,33	53,32	52,82	53,70													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[45,42; 46,31]	[49,44; 50,40]	[49,78; 50,78]	[50,73; 51,76]	[51,79; 52,86]	[52,77; 53,87]	[52,26; 53,39]	[53,12; 54,28]													
		Anzahl	1874	1713	1540	1349	1245	1118	1095	984													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	3,90	4,05	3,99	3,77	3,71	3,55	3,67	3,49													
		CI Anteil in %	[3,73; 4,07]	[3,86; 4,23]	[3,80; 4,19]	[3,58; 3,97]	[3,51; 3,91]	[3,34; 3,75]	[3,45; 3,88]	[3,28; 3,71]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	20157	19423	17857	16968	16311	15687	14684	14149													
		Anteil in %	41,96	45,87	46,29	47,47	48,62	49,77	49,16	50,21													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[41,52; 42,41]	[45,40; 46,35]	[45,79; 46,79]	[46,95; 47,99]	[48,08; 49,15]	[49,22; 50,32]	[48,59; 49,72]	[49,63; 50,79]													
		Anzahl	26003	21204	19181	17426	15995	14713	14093	13047													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	54,13	50,08	49,72	48,75	47,67	46,68	47,18	46,30													
		CI Anteil in %	[53,69; 54,58]	[49,60; 50,56]	[49,22; 50,22]	[48,24; 49,27]	[47,14; 48,21]	[46,13; 47,23]	[46,61; 47,74]	[45,72; 46,88]													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2326	1640	1361	1132	1026	893	770	709													
		Anteil in %	4,84	3,87	3,53	3,17	3,06	2,83	2,58	2,52													
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[4,65; 5,03]	[3,69; 4,06]	[3,34; 3,71]	[2,99; 3,35]	[2,87; 3,24]	[2,65; 3,02]	[2,40; 2,76]	[2,33; 2,70]													
		Anzahl	19452	16716	15302	14051	12904	12034	11612	10820													
	männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	40,50	39,48	39,67	39,31	38,46	38,18	38,87	38,40													
		CI Anteil in %	[40,06; 40,94]	[39,01; 39,95]	[39,18; 40,15]	[38,80; 39,82]	[37,94; 38,98]	[37,64; 38,72]	[38,32; 39,43]	[37,83; 38,96]													
	Anzahl	462	249	172	151	128	113	100	102														
	Anteil in %	0,96	0,59	0,45	0,42	0,38	0,36	0,33	0,36														
	CI Anteil in %	[0,87; 1,05]	[0,52; 0,66]	[0,38; 0,51]	[0,36; 0,49]	[0,32; 0,45]	[0,29; 0,42]	[0,27; 0,40]	[0,29; 0,43]														
	Anzahl	3763	2599	2346	2092	1937	1673	1611	1416														
	Anteil in %	7,83	6,14	6,08	5,85	5,77	5,31	5,39	5,02														
	CI Anteil in %	[7,59; 8,07]	[5,91; 6,37]	[5,84; 6,32]	[5,61; 6,10]	[5,52; 6,02]	[5,06; 5,56]	[5,14; 5,65]	[4,77; 5,28]														
	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	56535	52204	47783	44329	41619	39143	37175	35352														
	auswertbar	Anzahl	56507	50334	46253	43007	40523	38077	36209	34328														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	25909	24725	23311	21852	20829	20053	18962	18121														
		Anteil in %	45,85	49,12	50,40	50,81	51,40	52,66	52,37	52,79														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[45,44; 46,26]	[48,69; 49,56]	[49,94; 50,85]	[50,34; 51,28]	[50,91; 51,89]	[52,16; 53,17]	[51,85; 52,88]	[52,26; 53,32]														
		Anzahl	1977	1819	1588	1409	1308	1208	1097	1048														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	3,50	3,61	3,43	3,28	3,23	3,17	3,03	3,05														
		CI Anteil in %	[3,35; 3,65]	[3,45; 3,78]	[3,27; 3,60]	[3,11; 3,44]	[3,06; 3,40]	[3,00; 3,35]	[2,85; 3,21]	[2,87; 3,23]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	23932	22906	21723	20443	19521	18845	17865	17073														
		Anteil in %	42,35	45,51	46,97	47,53	48,17	49,49	49,34	49,73														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[41,94; 42,76]	[45,07; 45,94]	[46,51; 47,42]	[47,06; 48,01]	[47,69; 48,66]	[48,99; 49,99]	[48,82; 49,85]	[49,21; 50,26]														
		Anzahl	30598	25609	22942	21155	19694	18024	17247	16207														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	54,15	50,88	49,60	49,19	48,60	47,34	47,63	47,21														
		CI Anteil in %	[53,74; 54,56]	[50,44; 51,31]	[49,15; 50,06]	[48,72; 49,66]	[48,11; 49,09]	[46,83; 47,84]	[47,12; 48,15]	[46,68; 47,74]														
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2062	1492	1178	1067	933	842	819	727														
		Anteil in %	3,65	2,96	2,55	2,48	2,30	2,21	2,26	2,12														
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[3,49; 3,80]	[2,82; 3,11]	[2,40; 2,69]	[2,33; 2,63]	[2,16; 2,45]	[2,06; 2,36]	[2,11; 2,42]	[1,97; 2,27]														
		Anzahl	23497	20447	18583	17259	16150	14858	14121	13411														
	Kategorie 7 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	41,58	40,62	40,18	40,13	39,85	39,02	39,00	39,07														
		CI Anteil in %	[41,18; 41,99]	[40,19; 41,05]	[39,73; 40,62]	[39,67; 40,59]	[39,38; 40,33]	[38,53; 39,51]	[38,50; 39,50]	[38,55; 39,58]														
	Kategorie 8 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	427	243	193	154	134	120	118	120														
Anteil in %		0,76	0,48	0,42	0,36	0,33	0,32	0,33	0,35															
Kategorie 9 "mäßig erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,68; 0,83]	[0,42; 0,54]	[0,36; 0,48]	[0,30; 0,41]	[0,27; 0,39]	[0,26; 0,37]	[0,27; 0,38]	[0,29; 0,41]															
	Anzahl	4612	3427	2988	2675	2477	2204	2189	1949															
weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	8,16	6,81	6,46	6,22	6,11	5,79	6,05	5,68															
	CI Anteil in %	[7,94; 8,39]	[6,59; 7,03]	[6,24; 6,68]	[5,99; 6,45]	[5,88; 6,35]	[5,55; 6,02]	[5,80; 6,29]	[5,43; 5,92]															

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	50900	45958	41903	38786	36287	34131	32301													
	auswertbar	Anzahl	50881	44536	40631	37751	35325	33230	31369													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	22919	22714	21158	19746	19151	17817	16979													
		Anteil in %	45,04	51,00	52,07	52,31	54,21	53,62	54,13													
		CI Anteil in %	[44,61; 45,48]	[50,54; 51,47]	[51,59; 52,56]	[51,80; 52,81]	[53,69; 54,73]	[53,08; 54,15]	[53,58; 54,68]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1971	1975	1758	1551	1472	1296	1153													
		Anteil in %	3,87	4,43	4,33	4,11	4,17	3,90	3,68													
		CI Anteil in %	[3,71; 4,04]	[4,24; 4,63]	[4,13; 4,52]	[3,91; 4,31]	[3,96; 4,38]	[3,69; 4,11]	[3,47; 3,88]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	20948	20739	19400	18195	17679	16521	15826													
		Anteil in %	41,17	46,57	47,75	48,20	50,05	49,72	50,45													
		CI Anteil in %	[40,74; 41,60]	[46,10; 47,03]	[47,26; 48,23]	[47,69; 48,70]	[49,53; 50,57]	[49,18; 50,25]	[49,90; 51,00]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	27962	21822	19473	18005	16174	15413	14390													
		Anteil in %	54,96	49,00	47,93	47,69	45,79	46,38	45,87													
		CI Anteil in %	[54,52; 55,39]	[48,53; 49,46]	[47,44; 48,41]	[47,19; 48,20]	[45,27; 46,31]	[45,85; 46,92]	[45,32; 46,42]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2521	1706	1465	1201	1064	954	889													
		Anteil in %	4,95	3,83	3,61	3,18	3,01	2,87	2,83													
		CI Anteil in %	[4,77; 5,14]	[3,65; 4,01]	[3,42; 3,79]	[3,00; 3,36]	[2,83; 3,19]	[2,69; 3,05]	[2,65; 3,02]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	20847	17219	15523	14597	13268	12641	11829													
		Anteil in %	40,97	38,66	38,20	38,67	37,56	38,04	37,71													
		CI Anteil in %	[40,54; 41,40]	[38,21; 39,12]	[37,73; 38,68]	[38,18; 39,16]	[37,05; 38,06]	[37,52; 38,56]	[37,17; 38,25]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	518	246	192	173	122	126	109														
	Anteil in %	1,02	0,55	0,47	0,46	0,35	0,38	0,35														
	CI Anteil in %	[0,93; 1,11]	[0,48; 0,62]	[0,41; 0,54]	[0,39; 0,53]	[0,28; 0,41]	[0,31; 0,45]	[0,28; 0,41]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4076	2651	2293	2034	1720	1692	1563														
	Anteil in %	8,01	5,95	5,64	5,39	4,87	5,09	4,98														
	CI Anteil in %	[7,77; 8,25]	[5,73; 6,17]	[5,42; 5,87]	[5,16; 5,62]	[4,64; 5,09]	[4,86; 5,33]	[4,74; 5,22]														
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	58167	52896	48559	45054	42202	39864	37889											
	auswertbar	Anzahl	58144	51278	47164	43795	41121	38972	36914											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	26335	26072	24386	22954	22216	20945	19888											
		Anteil in %	45,29	50,84	51,70	52,41	54,03	53,74	53,88											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	CI Anteil in %	[44,89; 45,70]	[50,41; 51,28]	[51,25; 52,16]	[51,94; 52,88]	[53,54; 54,51]	[53,25; 54,24]	[53,37; 54,39]											
		Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2037	2034	1815	1610	1415	1301	1209										
	Anteil in %		3,50	3,97	3,85	3,68	3,44	3,34	3,28											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[3,35; 3,65]	[3,80; 4,14]	[3,67; 4,02]	[3,50; 3,85]	[3,26; 3,62]	[3,16; 3,52]	[3,09; 3,46]											
		Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	24298	24038	22571	21344	20801	19644	18679										
	Anteil in %		41,79	46,88	47,86	48,74	50,58	50,41	50,60											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[41,39; 42,19]	[46,45; 47,31]	[47,41; 48,31]	[48,27; 49,20]	[50,10; 51,07]	[49,91; 50,90]	[50,09; 51,11]											
		Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	31809	25206	22778	20841	18905	18027	17026										
	Anteil in %		54,71	49,16	48,30	47,59	45,97	46,26	46,12											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	CI Anteil in %	[54,30; 55,11]	[48,72; 49,59]	[47,84; 48,75]	[47,12; 48,06]	[45,49; 46,46]	[45,76; 46,75]	[45,61; 46,63]											
		Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2211	1535	1271	1085	960	894	788										
	Anteil in %		3,80	2,99	2,69	2,48	2,33	2,29	2,13											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[3,65; 3,96]	[2,85; 3,14]	[2,55; 2,84]	[2,33; 2,62]	[2,19; 2,48]	[2,15; 2,44]	[1,99; 2,28]											
		Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	24175	20017	18378	16994	15567	14788	14039										
	Anteil in %		41,58	39,04	38,97	38,80	37,86	37,95	38,03											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[41,18; 41,98]	[38,61; 39,46]	[38,53; 39,41]	[38,35; 39,26]	[37,39; 38,33]	[37,46; 38,43]	[37,54; 38,53]											
		Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	435	214	209	156	127	123	106										
	Anteil in %		0,75	0,42	0,44	0,36	0,31	0,32	0,29											
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,68; 0,82]	[0,36; 0,47]	[0,38; 0,50]	[0,30; 0,41]	[0,26; 0,36]	[0,26; 0,37]	[0,23; 0,34]											
		Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4988	3440	2920	2606	2251	2222	2093										
	Anteil in %		8,58	6,71	6,19	5,95	5,47	5,70	5,67											
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[8,35; 8,81]	[6,49; 6,93]	[5,97; 6,41]	[5,73; 6,17]	[5,25; 5,69]	[5,47; 5,93]	[5,43; 5,91]											
		weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078										

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2009-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	46818	42376	38526	35601	33394	31494													
	auswertbar	Anzahl	46799	41123	37340	34567	32518	30557													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	22043	21297	19283	18904	17438	16628													
		Anteil in %	47,10	51,79	51,64	54,69	53,63	54,42													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[46,65; 47,55]	[51,31; 52,27]	[51,13; 52,15]	[54,16; 55,21]	[53,08; 54,17]	[53,86; 54,97]													
		Anzahl	1901	1842	1591	1426	1275	1146													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	4,06	4,48	4,26	4,13	3,92	3,75													
		CI Anteil in %	[3,88; 4,24]	[4,28; 4,68]	[4,06; 4,47]	[3,92; 4,33]	[3,71; 4,13]	[3,54; 3,96]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	20142	19455	17692	17478	16163	15482													
		Anteil in %	43,04	47,31	47,38	50,56	49,70	50,67													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[42,59; 43,49]	[46,83; 47,79]	[46,87; 47,89]	[50,04; 51,09]	[49,16; 50,25]	[50,11; 51,23]													
		Anzahl	24756	19826	18057	15663	15080	13929													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	52,90	48,21	48,36	45,31	46,37	45,58													
		CI Anteil in %	[52,45; 53,35]	[47,73; 48,69]	[47,85; 48,87]	[44,79; 45,84]	[45,83; 46,92]	[45,03; 46,14]													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2183	1504	1244	1059	940	861													
		Anteil in %	4,66	3,66	3,33	3,06	2,89	2,82													
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[4,47; 4,86]	[3,48; 3,84]	[3,15; 3,51]	[2,88; 3,25]	[2,71; 3,07]	[2,63; 3,00]													
		Anzahl	18697	15644	14486	12701	12320	11462													
	männliche Patienten insgesamt	Anteil in %	39,95	38,04	38,79	36,74	37,89	37,51													
		CI Anteil in %	[39,51; 40,40]	[37,57; 38,51]	[38,30; 39,29]	[36,23; 37,25]	[37,36; 38,41]	[36,97; 38,05]													
	Anzahl	417	216	148	136	112	112														
	Anteil in %	0,89	0,53	0,40	0,39	0,34	0,37														
	CI Anteil in %	[0,81; 0,98]	[0,46; 0,60]	[0,33; 0,46]	[0,33; 0,46]	[0,28; 0,41]	[0,30; 0,43]														
	Anzahl	3459	2462	2179	1767	1708	1494														
	Anteil in %	7,39	5,99	5,84	5,11	5,25	4,89														
	CI Anteil in %	[7,15; 7,63]	[5,76; 6,22]	[5,60; 6,07]	[4,88; 5,34]	[5,01; 5,49]	[4,65; 5,13]														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54032	49322	45210	41958	39330	37129													
	auswertbar	Anzahl	54011	48086	43880	40803	38371	36191													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	25689	24743	22818	22096	20738	19702													
		Anteil in %	47,56	51,46	52,00	54,15	54,05	54,44													
		CI Anteil in %	[47,14; 47,98]	[51,01; 51,90]	[51,53; 52,47]	[53,67; 54,64]	[53,55; 54,54]	[53,93; 54,95]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1975	1879	1664	1520	1391	1248													
		Anteil in %	3,66	3,91	3,79	3,73	3,63	3,45													
		CI Anteil in %	[3,50; 3,81]	[3,73; 4,08]	[3,61; 3,97]	[3,54; 3,91]	[3,44; 3,81]	[3,26; 3,64]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	23714	22864	21154	20576	19347	18454													
		Anteil in %	43,91	47,55	48,21	50,43	50,42	50,99													
		CI Anteil in %	[43,49; 44,32]	[47,10; 47,99]	[47,74; 48,68]	[49,94; 50,91]	[49,92; 50,92]	[50,48; 51,51]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	28322	23343	21062	18707	17633	16489													
		Anteil in %	52,44	48,54	48,00	45,85	45,95	45,56													
		CI Anteil in %	[52,02; 52,86]	[48,10; 48,99]	[47,53; 48,47]	[45,36; 46,33]	[45,46; 46,45]	[45,05; 46,07]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1967	1442	1190	996	922	831													
		Anteil in %	3,64	3,00	2,71	2,44	2,40	2,30													
		CI Anteil in %	[3,48; 3,80]	[2,85; 3,15]	[2,56; 2,86]	[2,29; 2,59]	[2,25; 2,56]	[2,14; 2,45]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	21759	18555	16949	15291	14399	13611													
		Anteil in %	40,29	38,59	38,63	37,48	37,53	37,61													
		CI Anteil in %	[39,87; 40,70]	[38,15; 39,02]	[38,17; 39,08]	[37,01; 37,94]	[37,04; 38,01]	[37,11; 38,11]													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	426	200	165	147	114	116													
Anteil in %		0,79	0,42	0,38	0,36	0,30	0,32														
CI Anteil in %		[0,71; 0,86]	[0,36; 0,47]	[0,32; 0,43]	[0,30; 0,42]	[0,24; 0,35]	[0,26; 0,38]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4170	3146	2758	2273	2198	1931														
	Anteil in %	7,72	6,54	6,29	5,57	5,73	5,34														
	CI Anteil in %	[7,50; 7,95]	[6,32; 6,76]	[6,06; 6,51]	[5,35; 5,79]	[5,50; 5,96]	[5,10; 5,57]														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54004	49071	44877	41585	39034															
	auswertbar	Anzahl	53989	47801	43579	40478	37959															
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	24957	24691	23286	21393	20407															
		Anteil in %	46,23	51,65	53,43	52,85	53,76															
		CI Anteil in %	[45,81; 46,65]	[51,21; 52,10]	[52,97; 53,90]	[52,36; 53,34]	[53,26; 54,26]															
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2141	2089	1903	1618	1484															
		Anteil in %	3,97	4,37	4,37	4,00	3,91															
		CI Anteil in %	[3,80; 4,13]	[4,19; 4,55]	[4,17; 4,56]	[3,81; 4,19]	[3,71; 4,10]															
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	22816	22602	21383	19775	18923															
		Anteil in %	42,26	47,28	49,07	48,85	49,85															
		CI Anteil in %	[41,84; 42,68]	[46,84; 47,73]	[48,60; 49,54]	[48,37; 49,34]	[49,35; 50,35]															
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	29032	23110	20293	19085	17552															
		Anteil in %	53,77	48,35	46,57	47,15	46,24															
		CI Anteil in %	[53,35; 54,19]	[47,90; 48,79]	[46,10; 47,03]	[46,66; 47,64]	[45,74; 46,74]															
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2452	1665	1325	1239	1077															
		Anteil in %	4,54	3,48	3,04	3,06	2,84															
		CI Anteil in %	[4,37; 4,72]	[3,32; 3,65]	[2,88; 3,20]	[2,89; 3,23]	[2,67; 3,00]															
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	21697	18347	16450	15479	14342															
		Anteil in %	40,19	38,38	37,75	38,24	37,78															
		CI Anteil in %	[39,77; 40,60]	[37,95; 38,82]	[37,29; 38,20]	[37,77; 38,71]	[37,30; 38,27]															
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	552	249	204	181	155																
	Anteil in %	1,02	0,52	0,47	0,45	0,41																
	CI Anteil in %	[0,94; 1,11]	[0,46; 0,59]	[0,40; 0,53]	[0,38; 0,51]	[0,34; 0,47]																
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4331	2849	2314	2186	1978																
	Anteil in %	8,02	5,96	5,31	5,40	5,21																
	CI Anteil in %	[7,79; 8,25]	[5,75; 6,17]	[5,10; 5,52]	[5,18; 5,62]	[4,99; 5,43]																
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460															

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	60464	55606	51192	47736	44993													
	auswertbar	Anzahl	60451	54212	49828	46611	43810													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	28328	28233	26898	24884	23590													
		Anteil in %	46,86	52,08	53,98	53,39	53,85													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	CI Anteil in %	[46,46; 47,26]	[51,66; 52,50]	[53,54; 54,42]	[52,93; 53,84]	[53,38; 54,31]													
		Anteil in %	2078	2096	1871	1645	1475													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	3,44	3,87	3,75	3,53	3,37													
		CI Anteil in %	[3,29; 3,58]	[3,70; 4,03]	[3,59; 3,92]	[3,36; 3,70]	[3,20; 3,54]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	26250	26137	25027	23239	22115													
		Anteil in %	43,42	48,21	50,23	49,86	50,48													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[43,03; 43,82]	[47,79; 48,63]	[49,79; 50,67]	[49,40; 50,31]	[50,01; 50,95]													
		Anteil in %	32123	25979	22930	21727	20220													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	53,14	47,92	46,02	46,61	46,15													
		CI Anteil in %	[52,74; 53,54]	[47,50; 48,34]	[45,58; 46,46]	[46,16; 47,07]	[45,69; 46,62]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2138	1512	1257	1132	1053													
		Anteil in %	3,54	2,79	2,52	2,43	2,40													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[3,39; 3,68]	[2,65; 2,93]	[2,38; 2,66]	[2,29; 2,57]	[2,26; 2,55]													
		Anteil in %	24667	20881	18676	17798	16572													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	40,80	38,52	37,48	38,18	37,83													
		CI Anteil in %	[40,41; 41,20]	[38,11; 38,93]	[37,06; 37,91]	[37,74; 38,63]	[37,37; 38,28]													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	471	225	204	160	136													
		Anteil in %	0,78	0,42	0,41	0,34	0,31													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,71; 0,85]	[0,36; 0,47]	[0,35; 0,47]	[0,29; 0,40]	[0,26; 0,36]													
		Anteil in %	4847	3361	2793	2637	2459													
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	8,02	6,20	5,61	5,66	5,61													
		CI Anteil in %	[7,80; 8,23]	[6,00; 6,40]	[5,40; 5,81]	[5,45; 5,87]	[5,40; 5,83]													
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48515	44245	40462	37615																
	auswertbar	Anzahl	48492	43198	39407	36517																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	23354	23043	20742	19536																
		Anteil in %	48,16	53,34	52,64	53,50																
		CI Anteil in %	[47,72; 48,61]	[52,87; 53,81]	[52,14; 53,13]	[52,99; 54,01]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2041	1929	1654	1491																
		Anteil in %	4,21	4,47	4,20	4,08																
		CI Anteil in %	[4,03; 4,39]	[4,27; 4,66]	[4,00; 4,40]	[3,88; 4,29]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	21313	21114	19088	18045																
		Anteil in %	43,95	48,88	48,44	49,42																
		CI Anteil in %	[43,51; 44,39]	[48,41; 49,35]	[47,94; 48,93]	[48,90; 49,93]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	25138	20155	18665	16981																
		Anteil in %	51,84	46,66	47,36	46,50																
		CI Anteil in %	[51,39; 52,28]	[46,19; 47,13]	[46,87; 47,86]	[45,99; 47,01]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2124	1500	1286	1134																
		Anteil in %	4,38	3,47	3,26	3,11																
		CI Anteil in %	[4,20; 4,56]	[3,30; 3,65]	[3,09; 3,44]	[2,93; 3,28]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	19123	16118	15019	13827																
		Anteil in %	39,44	37,31	38,11	37,86																
		CI Anteil in %	[39,00; 39,87]	[36,86; 37,77]	[37,63; 38,59]	[37,37; 38,36]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	435	220	174	129																	
	Anteil in %	0,90	0,51	0,44	0,35																	
	CI Anteil in %	[0,81; 0,98]	[0,44; 0,58]	[0,38; 0,51]	[0,29; 0,41]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3456	2317	2186	1891																	
	Anteil in %	7,13	5,36	5,55	5,18																	
	CI Anteil in %	[6,90; 7,36]	[5,15; 5,58]	[5,32; 5,77]	[4,95; 5,41]																	
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	61608	55900	51784																

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54966	50525	46506	43332																
	auswertbar	Anzahl	54937	49456	45340	42197																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	26651	26275	23878	22531																
		Anteil in %	48,51	53,13	52,66	53,39																
		CI Anteil in %	[48,09; 48,93]	[52,69; 53,57]	[52,20; 53,12]	[52,92; 53,87]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1995	1861	1655	1532																
		Anteil in %	3,63	3,76	3,65	3,63																
		CI Anteil in %	[3,47; 3,79]	[3,60; 3,93]	[3,48; 3,82]	[3,45; 3,81]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	24656	24414	22223	20999																
		Anteil in %	44,88	49,37	49,01	49,76																
		CI Anteil in %	[44,46; 45,30]	[48,92; 49,81]	[48,55; 49,47]	[49,29; 50,24]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	28286	23181	21462	19666																
		Anteil in %	51,49	46,87	47,34	46,61																
		CI Anteil in %	[51,07; 51,91]	[46,43; 47,31]	[46,88; 47,80]	[46,13; 47,08]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1845	1289	1150	980																
		Anteil in %	3,36	2,61	2,54	2,32																
		CI Anteil in %	[3,21; 3,51]	[2,47; 2,75]	[2,39; 2,68]	[2,18; 2,47]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	21946	18810	17407	16118																
		Anteil in %	39,95	38,03	38,39	38,20																
		CI Anteil in %	[39,54; 40,36]	[37,61; 38,46]	[37,94; 38,84]	[37,73; 38,66]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	351	200	157	133																	
	Anteil in %	0,64	0,40	0,35	0,32																	
	CI Anteil in %	[0,57; 0,71]	[0,35; 0,46]	[0,29; 0,40]	[0,26; 0,37]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4144	2882	2748	2435																	
	Anteil in %	7,54	5,83	6,06	5,77																	
	CI Anteil in %	[7,32; 7,76]	[5,62; 6,03]	[5,84; 6,28]	[5,55; 5,99]																	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	66943	61246	56909																

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52242	47560	43570																	
	auswertbar	Anzahl	52218	46454	42176																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	24813	24217	22406																	
		Anteil in %	47,52	52,13	53,13																	
		CI Anteil in %	[47,09; 47,95]	[51,68; 52,59]	[52,65; 53,60]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2183	2105	1851																	
		Anteil in %	4,18	4,53	4,39																	
		CI Anteil in %	[4,01; 4,35]	[4,34; 4,72]	[4,19; 4,58]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	22630	22112	20555																	
		Anteil in %	43,34	47,60	48,74																	
		CI Anteil in %	[42,91; 43,76]	[47,15; 48,05]	[48,26; 49,21]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	27405	22237	19770																	
		Anteil in %	52,48	47,87	46,88																	
		CI Anteil in %	[52,05; 52,91]	[47,41; 48,32]	[46,40; 47,35]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2397	1664	1383																	
		Anteil in %	4,59	3,58	3,28																	
		CI Anteil in %	[4,41; 4,77]	[3,41; 3,75]	[3,11; 3,45]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	20570	17606	15787																	
		Anteil in %	39,39	37,90	37,43																	
		CI Anteil in %	[38,97; 39,81]	[37,46; 38,34]	[36,97; 37,89]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	556	265	189																		
	Anteil in %	1,06	0,57	0,45																		
	CI Anteil in %	[0,98; 1,15]	[0,50; 0,64]	[0,38; 0,51]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3882	2702	2411																		
	Anteil in %	7,43	5,82	5,72																		
	CI Anteil in %	[7,21; 7,66]	[5,60; 6,03]	[5,49; 5,94]																		
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	66585	60521																	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	59886	55120	50864																		
	auswertbar	Anzahl	59865	53922	49384																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	28871	28634	26690																		
		Anteil in %	48,23	53,10	54,05																		
		CI Anteil in %	[47,83; 48,63]	[52,68; 53,52]	[53,61; 54,49]																		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2220	2115	1905																		
		Anteil in %	3,71	3,92	3,86																		
		CI Anteil in %	[3,56; 3,86]	[3,76; 4,09]	[3,69; 4,03]																		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	26651	26519	24785																		
		Anteil in %	44,52	49,18	50,19																		
		CI Anteil in %	[44,12; 44,92]	[48,76; 49,60]	[49,75; 50,63]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	30994	25288	22694																		
		Anteil in %	51,77	46,90	45,95																		
		CI Anteil in %	[51,37; 52,17]	[46,48; 47,32]	[45,51; 46,39]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2071	1493	1262																		
		Anteil in %	3,46	2,77	2,56																		
		CI Anteil in %	[3,31; 3,61]	[2,63; 2,91]	[2,42; 2,69]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	23928	20233	18318																		
		Anteil in %	39,97	37,52	37,09																		
		CI Anteil in %	[39,58; 40,36]	[37,11; 37,93]	[36,67; 37,52]																		
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	466	220	186																		
Anteil in %		0,78	0,41	0,38																			
CI Anteil in %		[0,71; 0,85]	[0,35; 0,46]	[0,32; 0,43]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4529	3342	2928																			
	Anteil in %	7,57	6,20	5,93																			
	CI Anteil in %	[7,35; 7,78]	[5,99; 6,40]	[5,72; 6,14]																			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	72558	66610																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	47681	43542																		
	auswertbar	Anzahl	47657	42355																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	23225	22243																		
		Anteil in %	48,73	52,52																		
		CI Anteil in %	[48,28; 49,18]	[52,04; 52,99]																		
	Kategorie 1 " <i>normal ohne Therapie</i> ": sys<140 und dia<90	Anzahl	2032	1834																		
		Anteil in %	4,26	4,33																		
		CI Anteil in %	[4,08; 4,45]	[4,14; 4,52]																		
	Kategorie 2 " <i>normal mit Therapie</i> ": sys<140 und dia<90	Anzahl	21193	20409																		
		Anteil in %	44,47	48,19																		
		CI Anteil in %	[44,02; 44,92]	[47,71; 48,66]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	24432	20112																		
		Anteil in %	51,27	47,48																		
		CI Anteil in %	[50,82; 51,72]	[47,01; 47,96]																		
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2140	1538																		
		Anteil in %	4,49	3,63																		
		CI Anteil in %	[4,30; 4,68]	[3,45; 3,81]																		
	Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	18293	15834																		
		Anteil in %	38,38	37,38																		
		CI Anteil in %	[37,95; 38,82]	[36,92; 37,84]																		
Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	440	244																			
	Anteil in %	0,92	0,58																			
	CI Anteil in %	[0,84; 1,01]	[0,50; 0,65]																			
Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3559	2496																			
	Anteil in %	7,47	5,89																			
	CI Anteil in %	[7,23; 7,70]	[5,67; 6,12]																			
<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54060	50996																
	auswertbar	Anzahl	54034	48782																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	26935	25933																
		Anteil in %	49,85	53,16																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[49,43; 50,27]	[52,72; 53,60]																
		Anzahl	1955	1873																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	3,62	3,84																
		CI Anteil in %	[3,46; 3,78]	[3,67; 4,01]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	24980	24060																
		Anteil in %	46,23	49,32																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[45,81; 46,65]	[48,88; 49,77]																
		Anzahl	27099	22849																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	50,15	46,84																
		CI Anteil in %	[49,73; 50,57]	[46,40; 47,28]																
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1824	1312																
		Anteil in %	3,38	2,69																
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[3,22; 3,53]	[2,55; 2,83]																
		Anzahl	20829	18291																
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	38,55	37,50																
		CI Anteil in %	[38,14; 38,96]	[37,07; 37,92]																
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	363	225																
		Anteil in %	0,67	0,46																
	weibliche Patienten insgesamt	CI Anteil in %	[0,60; 0,74]	[0,40; 0,52]																
		Anzahl	4083	3021																
	weibliche Patienten insgesamt	Anteil in %	7,56	6,19																
		CI Anteil in %	[7,33; 7,78]	[5,98; 6,41]																
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465	66497																

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2012-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52377																		
	auswertbar	Anzahl	52358																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	24676																		
		Anteil in %	47,13																		
		CI Anteil in %	[46,70; 47,56]																		
	Kategorie 1 " <i>normal ohne Therapie</i> ": sys<140 und dia<90	Anzahl	2108																		
		Anteil in %	4,03																		
		CI Anteil in %	[3,86; 4,19]																		
	Kategorie 2 " <i>normal mit Therapie</i> ": sys<140 und dia<90	Anzahl	22568																		
		Anteil in %	43,10																		
		CI Anteil in %	[42,68; 43,53]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	27682																		
		Anteil in %	52,87																		
		CI Anteil in %	[52,44; 53,30]																		
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2309																		
		Anteil in %	4,41																		
		CI Anteil in %	[4,23; 4,59]																		
Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	20679																			
	Anteil in %	39,50																			
	CI Anteil in %	[39,08; 39,91]																			
Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	481																			
	Anteil in %	0,92																			
	CI Anteil in %	[0,84; 1,00]																			
Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4213																			
	Anteil in %	8,05																			
	CI Anteil in %	[7,81; 8,28]																			
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	57825																	
	auswertbar	Anzahl	57794																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	27870																	
		Anteil in %	48,22																	
		CI Anteil in %	[47,82; 48,63]																	
	Kategorie 1 " <i>normal ohne Therapie</i> ": sys<140 und dia<90	Anzahl	2135																	
		Anteil in %	3,69																	
		CI Anteil in %	[3,54; 3,85]																	
	Kategorie 2 " <i>normal mit Therapie</i> ": sys<140 und dia<90	Anzahl	25735																	
		Anteil in %	44,53																	
		CI Anteil in %	[44,12; 44,93]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	29924																	
		Anteil in %	51,78																	
		CI Anteil in %	[51,37; 52,18]																	
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1964																	
		Anteil in %	3,40																	
		CI Anteil in %	[3,25; 3,55]																	
	Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit Therapie</i> ": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	22906																	
		Anteil in %	39,63																	
		CI Anteil in %	[39,24; 40,03]																	
	Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	464																	
		Anteil in %	0,80																	
		CI Anteil in %	[0,73; 0,88]																	
	Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4590																	
		Anteil in %	7,94																	
		CI Anteil in %	[7,72; 8,16]																	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879																	

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2008-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48050	43995	39959	36872	34514	32435	30721	29134												
	auswertbar	Anzahl	48050	42352	38593	35758	33565	31534	29888	28194												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,51	136,82	136,68	136,41	136,24	135,61	135,89	135,69												
		CI Mean	[138,35; 138,66]	[136,66; 136,97]	[136,52; 136,84]	[136,24; 136,57]	[136,07; 136,41]	[135,44; 135,78]	[135,71; 136,07]	[135,51; 135,87]												
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	56535	52204	47783	44329	41619	39143	37175	35352												
	auswertbar	Anzahl	56535	50345	46264	43020	40542	38091	36223	34340												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,90	137,37	137,02	136,82	136,61	136,14	136,39	136,16												
		CI Mean	[138,76; 139,05]	[137,23; 137,52]	[136,87; 137,17]	[136,67; 136,97]	[136,45; 136,77]	[135,98; 136,30]	[136,22; 136,55]	[135,99; 136,33]												
Median		140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>													
2009-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	50900	45958	41903	38786	36287	34131	32301													
	auswertbar	Anzahl	50900	44553	40645	37762	35334	33242	31378													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,83	136,47	136,08	136,01	135,34	135,68	135,49													
		CI Mean	[138,68; 138,98]	[136,32; 136,62]	[135,93; 136,23]	[135,85; 136,16]	[135,18; 135,50]	[135,52; 135,85]	[135,32; 135,66]													
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	134,00	135,00	135,00													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	58167	52896	48559	45054	42202	39864	37889													
	auswertbar	Anzahl	58167	51302	47187	43817	41141	38990	36931													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,17	136,93	136,50	136,31	135,67	135,96	135,84													
		CI Mean	[139,03; 139,32]	[136,79; 137,07]	[136,36; 136,65]	[136,16; 136,46]	[135,52; 135,83]	[135,81; 136,12]	[135,68; 136,00]													
Median		140,00	135,00	135,00	135,00	134,00	135,00	135,00														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>														
2009-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	46818	42376	38526	35601	33394	31494														
	auswertbar	Anzahl	46818	41137	37354	34578	32528	30569														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,94	136,28	136,20	135,36	135,65	135,32														
		CI Mean	[137,78; 138,09]	[136,12; 136,43]	[136,04; 136,36]	[135,20; 135,52]	[135,49; 135,82]	[135,15; 135,49]														
		Median	138,00	135,00	135,00	134,00	135,00	134,00														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54032	49322	45210	41958	39330	37129														
	auswertbar	Anzahl	54032	48106	43900	40824	38393	36210														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,24	136,72	136,52	135,74	135,84	135,61														
		CI Mean	[138,10; 138,39]	[136,57; 136,87]	[136,37; 136,67]	[135,58; 135,89]	[135,68; 136,00]	[135,45; 135,78]														
Median		138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,00															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>															
2010-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54004	49071	44877	41585	39034															
	auswertbar	Anzahl	54004	47814	43589	40486	37969															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,52	136,31	135,64	135,93	135,63															
		CI Mean	[138,38; 138,67]	[136,17; 136,45]	[135,50; 135,79]	[135,78; 136,08]	[135,47; 135,78]															
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	60464	55606	51192	47736	44993															
	auswertbar	Anzahl	60464	54225	49842	46629	43826															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,56	136,52	135,78	135,95	135,73															
		CI Mean	[138,42; 138,69]	[136,38; 136,65]	[135,64; 135,92]	[135,81; 136,10]	[135,58; 135,88]															
Median		139,00	135,00	135,00	135,00	135,00																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>																

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2010-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48515	44245	40462	37615																		
	auswertbar	Anzahl	48515	43216	39423	36531																		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		137,65	135,71	135,96	135,59																	
		CI Mean		[137,50; 137,80]	[135,56; 135,85]	[135,81; 136,12]	[135,43; 135,75]																	
		Median		135,00	135,00	135,00	135,00																	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54966	50525	46506	43332																		
	auswertbar	Anzahl	54966	49477	45358	42214																		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		137,78	136,03	136,20	135,90																	
		CI Mean		[137,64; 137,92]	[135,89; 136,17]	[136,06; 136,35]	[135,75; 136,05]																	
		Median		135,00	135,00	135,00	135,00																	
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																		
2011-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52242	47560	43570																			
	auswertbar	Anzahl	52242	46471	42195																			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		138,02	136,22	135,85																		
		CI Mean		[137,87; 138,16]	[136,08; 136,37]	[135,70; 136,00]																		
		Median		138,00	135,00	135,00																		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																			
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	59886	55120	50864																			
	auswertbar	Anzahl	59886	53935	49401																			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		138,07	136,22	135,87																		
		CI Mean		[137,93; 138,20]	[136,08; 136,36]	[135,73; 136,01]																		
		Median		136,00	135,00	135,00																		
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																			
2011-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	47681	43542																				
	auswertbar	Anzahl	47681	42377																				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		137,61	136,02																			
		CI Mean		[137,45; 137,76]	[135,87; 136,18]																			
		Median		135,00	135,00																			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																				
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54060	50096																				
	auswertbar	Anzahl	54060	48801																				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		137,52	136,09																			
		CI Mean		[137,38; 137,67]	[135,94; 136,23]																			
		Median		135,00	135,00																			
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																				
2012-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52377																					
	auswertbar	Anzahl	52377																					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		138,30																				
		CI Mean		[138,15; 138,44]																				
		Median		138,00																				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																					
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	57825																					
	auswertbar	Anzahl	57825																					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		138,03																				
		CI Mean		[137,89; 138,17]																				
		Median		136,00																				
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																					

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	71275	63235	55388	49379	44552	41443	39520	37719	36115	34582	32916	31368	29986	28575	27325	26102		
	auswertbar	Anzahl	71275	59897	52735	47504	42939	39175	37520	35172	33280	32058	30687	29166	27851	26458	25269	23955		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,56	80,44	80,12	79,68	79,44	79,00	79,12	78,76	78,85	78,58	78,49	78,27	78,26	77,96	78,03	77,79		
		CI Mean	[81,49; 81,63]	[80,37; 80,51]	[80,05; 80,20]	[79,60; 79,76]	[79,35; 79,52]	[78,91; 79,08]	[79,03; 79,21]	[78,67; 78,85]	[78,75; 78,94]	[78,48; 78,67]	[78,40; 78,59]	[78,17; 78,37]	[78,15; 78,36]	[77,85; 78,07]	[77,92; 78,13]	[77,67; 77,90]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98842</i>	<i>87165</i>	<i>76003</i>	<i>67529</i>	<i>60776</i>	<i>56404</i>	<i>53744</i>	<i>51331</i>	<i>49147</i>	<i>47087</i>	<i>44843</i>	<i>42838</i>	<i>41044</i>	<i>39180</i>	<i>37515</i>	<i>35933</i>		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	91550	81594	71862	64255	58236	54325	51854	49561	47477	45477	43244	41271	39403	37604	35999	34392		
	auswertbar	Anzahl	91550	77281	68364	62009	56246	51546	49348	46193	43697	42128	40274	38319	36557	34772	33266	31574		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,37	80,36	80,04	79,63	79,45	79,12	79,16	78,87	78,94	78,75	78,75	78,66	78,54	78,25	78,28	78,19		
		CI Mean	[81,31; 81,44]	[80,29; 80,42]	[79,97; 80,11]	[79,56; 79,69]	[79,38; 79,52]	[79,05; 79,20]	[79,08; 79,24]	[78,79; 78,95]	[78,86; 79,02]	[78,67; 78,84]	[78,67; 78,84]	[78,57; 78,74]	[78,45; 78,63]	[78,16; 78,34]	[78,19; 78,38]	[78,10; 78,29]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>115970</i>	<i>103008</i>	<i>90548</i>	<i>80776</i>	<i>73117</i>	<i>68112</i>	<i>65025</i>	<i>62178</i>	<i>59615</i>	<i>57124</i>	<i>54381</i>	<i>51939</i>	<i>49656</i>	<i>47443</i>	<i>45482</i>	<i>43521</i>		
2005-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	76627	68516	61280	54855	50781	48057	45753	43721	41623	39529	37733	36016	34356	32810	31332			
	auswertbar	Anzahl	76627	65666	58756	53256	48557	46048	43241	40582	39386	37628	35854	34188	32540	31000	29508			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,58	80,32	79,91	79,57	79,19	79,11	78,81	78,86	78,66	78,66	78,45	78,42	78,03	78,09	78,00			
		CI Mean	[81,52; 81,65]	[80,25; 80,39]	[79,84; 79,98]	[79,50; 79,65]	[79,11; 79,26]	[79,03; 79,20]	[78,73; 78,89]	[78,77; 78,94]	[78,58; 78,75]	[78,57; 78,75]	[78,36; 78,54]	[78,33; 78,51]	[77,94; 78,13]	[77,99; 78,18]	[77,90; 78,10]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>105631</i>	<i>93726</i>	<i>83366</i>	<i>74241</i>	<i>68487</i>	<i>64764</i>	<i>61675</i>	<i>58977</i>	<i>56190</i>	<i>53398</i>	<i>50980</i>	<i>48671</i>	<i>46510</i>	<i>44483</i>	<i>42590</i>			
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	97537	87960	79278	71451	66251	62938	60029	57403	54796	52081	49683	47413	45271	43259	41327			
	auswertbar	Anzahl	97536	84261	76055	69358	63447	60467	56779	53405	51817	49646	47258	45126	42917	40984	38935			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,43	80,31	79,83	79,63	79,23	79,25	78,99	79,06	78,87	78,87	78,69	78,58	78,32	78,36	78,28			
		CI Mean	[81,38; 81,49]	[80,25; 80,37]	[79,76; 79,89]	[79,56; 79,69]	[79,17; 79,30]	[79,18; 79,32]	[78,92; 79,06]	[78,98; 79,13]	[78,79; 78,94]	[78,79; 78,95]	[78,61; 78,76]	[78,50; 78,66]	[78,23; 78,40]	[78,28; 78,45]	[78,19; 78,36]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>123470</i>	<i>110813</i>	<i>99471</i>	<i>89253</i>	<i>82572</i>	<i>78403</i>	<i>74799</i>	<i>71559</i>	<i>68310</i>	<i>64988</i>	<i>62073</i>	<i>59313</i>	<i>56688</i>	<i>54194</i>	<i>51856</i>			
2005-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	59477	53670	47903	43706	41081	38936	37008	35112	33222	31572	30029	28608	27250	25987				
	auswertbar	Anzahl	59477	51501	46175	41762	39415	36920	34651	33381	31764	30133	28665	27245	25943	24685				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,32	80,21	80,02	79,53	79,52	79,14	79,09	78,96	78,87	78,67	78,55	78,21	78,32	78,14				
		CI Mean	[81,24; 81,39]	[80,13; 80,28]	[79,94; 80,10]	[79,45; 79,62]	[79,44; 79,61]	[79,05; 79,23]	[78,99; 79,18]	[78,87; 79,06]	[78,77; 78,96]	[78,57; 78,77]	[78,45; 78,65]	[78,10; 78,31]	[78,21; 78,42]	[78,03; 78,26]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>82253</i>	<i>73718</i>	<i>65422</i>	<i>59436</i>	<i>55776</i>	<i>52856</i>	<i>50253</i>	<i>47742</i>	<i>45177</i>	<i>42958</i>	<i>40893</i>	<i>39008</i>	<i>37209</i>	<i>35545</i>				
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	74289	67608	60694	55673	52599	49980	47650	45357	42930	40884	38858	37017	35313	33743				
	auswertbar	Anzahl	74289	65104	58695	53398	50528	47426	44732	43163	41093	39139	37163	35367	33659	32093				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,06	80,12	79,90	79,44	79,49	79,16	79,21	78,99	78,94	78,79	78,75	78,40	78,57	78,37				
		CI Mean	[80,99; 81,13]	[80,05; 80,19]	[79,83; 79,98]	[79,36; 79,51]	[79,41; 79,57]	[79,09; 79,24]	[79,13; 79,29]	[78,91; 79,08]	[78,85; 79,02]	[78,70; 78,88]	[78,66; 78,84]	[78,31; 78,49]	[78,48; 78,67]	[78,27; 78,46]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>95017</i>	<i>86040</i>	<i>76949</i>	<i>70289</i>	<i>66335</i>	<i>62988</i>	<i>60040</i>	<i>57162</i>	<i>54131</i>	<i>51560</i>	<i>49016</i>	<i>46705</i>	<i>44599</i>	<i>42683</i>				

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	71578	64607	58677	54508	51433	48783	46321	43657	41398	39334	37477	35681	34125							
	auswertbar	Anzahl	71578	62462	55615	52117	48566	45175	43704	41300	39180	37266	35337	33623	31998							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,35	80,13	79,67	79,57	79,21	79,24	79,08	78,96	78,75	78,65	78,30	78,40	78,22							
		CI Mean	[81,28; 81,42]	[80,05; 80,20]	[79,60; 79,74]	[79,49; 79,64]	[79,13; 79,29]	[79,16; 79,32]	[79,00; 79,17]	[78,87; 79,04]	[78,66; 78,83]	[78,56; 78,74]	[78,21; 78,39]	[78,31; 78,50]	[78,12; 78,31]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98603</i>	<i>88202</i>	<i>79739</i>	<i>73830</i>	<i>69513</i>	<i>65875</i>	<i>62516</i>	<i>58915</i>	<i>55879</i>	<i>53125</i>	<i>50627</i>	<i>48227</i>	<i>46133</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	87996	79911	72978	68162	64447	61311	58326	55105	52256	49648	47162	44854	42803							
	auswertbar	Anzahl	87996	77451	69153	65340	60898	56906	55156	52254	49594	47073	44561	42424	40231							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,12	79,94	79,60	79,50	79,26	79,29	79,11	79,10	78,80	78,81	78,54	78,62	78,43							
		CI Mean	[81,06; 81,19]	[79,87; 80,00]	[79,53; 79,66]	[79,43; 79,56]	[79,19; 79,33]	[79,21; 79,36]	[79,04; 79,19]	[79,02; 79,17]	[78,72; 78,88]	[78,73; 78,89]	[78,46; 78,62]	[78,54; 78,70]	[78,34; 78,51]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112511</i>	<i>101744</i>	<i>92563</i>	<i>86309</i>	<i>81576</i>	<i>77574</i>	<i>73783</i>	<i>69703</i>	<i>66080</i>	<i>62828</i>	<i>59695</i>	<i>56874</i>	<i>54383</i>							
2006-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	68029	62435	57160	53461	50417	47592	44727	42387	40134	38117	36276	34563								
	auswertbar	Anzahl	68029	59685	54596	50336	46784	44784	42410	40010	37950	35951	34188	32323								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,97	79,89	79,77	79,39	79,47	79,19	79,17	78,87	78,82	78,34	78,55	78,38								
		CI Mean	[80,90; 81,04]	[79,82; 79,96]	[79,69; 79,84]	[79,32; 79,47]	[79,39; 79,56]	[79,10; 79,27]	[79,08; 79,25]	[78,79; 78,96]	[78,73; 78,91]	[78,25; 78,43]	[78,45; 78,64]	[78,28; 78,47]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>94020</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	83223	76860	70854	66382	62791	59486	55990	53055	50304	47849	45589	43518								
	auswertbar	Anzahl	83223	73692	67659	62537	58261	55897	53047	50094	47498	45088	42993	40750								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,79	79,87	79,73	79,39	79,42	79,27	79,21	79,06	78,93	78,62	78,78	78,52								
		CI Mean	[80,72; 80,85]	[79,80; 79,93]	[79,67; 79,80]	[79,32; 79,46]	[79,35; 79,49]	[79,20; 79,34]	[79,14; 79,29]	[78,98; 79,14]	[78,85; 79,01]	[78,53; 78,70]	[78,70; 78,86]	[78,43; 78,60]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>106368</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>								
2007-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	72264	66158	61181	57311	53995	50423	47522	44825	42494	40414	38456									
	auswertbar	Anzahl	72264	63757	57672	53242	50881	47882	45086	42661	40311	38367	36345									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,27	80,14	79,75	79,71	79,45	79,38	79,14	79,05	78,68	78,80	78,55									
		CI Mean	[81,20; 81,34]	[80,07; 80,21]	[79,68; 79,83]	[79,64; 79,79]	[79,38; 79,53]	[79,30; 79,46]	[79,05; 79,22]	[78,96; 79,13]	[78,59; 78,77]	[78,71; 78,89]	[78,46; 78,64]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	87967	81297	75494	70805	66776	62602	59138	55935	52950	50318	48045									
	auswertbar	Anzahl	87967	78429	71358	65996	63066	59542	56276	53227	50310	47836	45455									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,05	80,01	79,60	79,61	79,43	79,32	79,14	79,10	78,79	78,95	78,72									
		CI Mean	[80,99; 81,11]	[79,95; 80,08]	[79,53; 79,66]	[79,54; 79,68]	[79,37; 79,50]	[79,25; 79,39]	[79,07; 79,21]	[79,02; 79,17]	[78,71; 78,86]	[78,87; 79,02]	[78,64; 78,80]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>									

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2007-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	66415	60998	56620	52778	48864	45904	43203	40833	38765	36928									
	auswertbar	Anzahl	66414	57648	52103	49304	46131	43351	40828	38511	36604	34611									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,01	79,89	79,84	79,52	79,51	79,16	79,10	78,68	78,84	78,60									
		CI Mean	[80,93; 81,08]	[79,81; 79,96]	[79,76; 79,92]	[79,45; 79,60]	[79,43; 79,59]	[79,07; 79,24]	[79,01; 79,18]	[78,59; 78,77]	[78,75; 78,93]	[78,51; 78,70]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	80172	74154	69241	64792	60289	56739	53521	50578	48117	45839									
	auswertbar	Anzahl	80171	70246	63604	60524	56858	53544	50457	47699	45366	42891									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,82	79,80	79,77	79,53	79,43	79,26	79,26	78,87	78,97	78,80									
		CI Mean	[80,75; 80,88]	[79,74; 79,87]	[79,70; 79,84]	[79,46; 79,60]	[79,35; 79,50]	[79,18; 79,33]	[79,18; 79,34]	[78,80; 78,95]	[78,89; 79,06]	[78,72; 78,89]									
Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>										
2008-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	71638	66110	61175	55705	51776	48519	45710	43230	40995										
	auswertbar	Anzahl	71638	62153	57700	53354	49725	46736	44050	41678	39299										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,24	80,15	79,86	79,76	79,42	79,36	78,94	79,11	78,84										
		CI Mean	[81,17; 81,31]	[80,08; 80,22]	[79,79; 79,94]	[79,68; 79,83]	[79,34; 79,50]	[79,28; 79,44]	[78,85; 79,02]	[79,02; 79,19]	[78,75; 78,93]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	85149	79230	73595	67347	63049	59219	55996	53089	50458										
	auswertbar	Anzahl	85149	74626	69686	64647	60680	57180	53990	51268	48496										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,00	80,04	79,71	79,71	79,42	79,35	78,98	79,07	78,90										
		CI Mean	[80,94; 81,07]	[79,98; 80,11]	[79,64; 79,78]	[79,64; 79,78]	[79,35; 79,49]	[79,28; 79,42]	[78,90; 79,05]	[79,00; 79,15]	[78,82; 78,98]										
Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>											
2008-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48050	43995	39959	36872	34514	32435	30721	29134											
	auswertbar	Anzahl	48050	42352	38593	35758	33565	31534	29888	28194											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,09	80,14	80,05	79,74	79,57	79,12	79,25	79,05											
		CI Mean	[81,01; 81,18]	[80,05; 80,22]	[79,96; 80,14]	[79,65; 79,84]	[79,48; 79,67]	[79,02; 79,22]	[79,15; 79,35]	[78,95; 79,16]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>											
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	56535	52204	47783	44329	41619	39143	37175	35352											
	auswertbar	Anzahl	56535	50345	46264	43020	40542	38091	36223	34340											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,79	79,98	79,91	79,70	79,56	79,10	79,30	79,15											
		CI Mean	[80,71; 80,86]	[79,90; 80,06]	[79,82; 79,99]	[79,62; 79,79]	[79,47; 79,64]	[79,01; 79,19]	[79,21; 79,40]	[79,05; 79,24]											
Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>												

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2009-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	50900	45958	41903	38786	36287	34131	32301													
	auswertbar	Anzahl	50900	44553	40645	37762	35334	33242	31378													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,32	80,12	79,86	79,70	79,29	79,32	79,18													
		CI Mean	[81,24; 81,41]	[80,04; 80,21]	[79,78; 79,95]	[79,61; 79,79]	[79,19; 79,38]	[79,22; 79,42]	[79,08; 79,27]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	58167	52896	48559	45054	42202	39864	37889													
	auswertbar	Anzahl	58167	51302	47187	43817	41141	38990	36931													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,02	80,01	79,73	79,61	79,25	79,32	79,15													
		CI Mean	[80,94; 81,10]	[79,93; 80,09]	[79,65; 79,81]	[79,53; 79,70]	[79,16; 79,33]	[79,23; 79,41]	[79,06; 79,24]													
Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>														
2009-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	46818	42376	38526	35601	33394	31494														
	auswertbar	Anzahl	46818	41137	37354	34578	32528	30569														
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,10	80,07	79,91	79,38	79,51	79,30														
		CI Mean	[81,01; 81,19]	[79,98; 80,16]	[79,82; 80,00]	[79,29; 79,48]	[79,41; 79,60]	[79,20; 79,40]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54032	49322	45210	41958	39330	37129														
	auswertbar	Anzahl	54032	48106	43900	40824	38393	36210														
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,72	79,84	79,75	79,22	79,33	79,17														
		CI Mean	[80,64; 80,80]	[79,76; 79,92]	[79,66; 79,83]	[79,14; 79,31]	[79,24; 79,42]	[79,08; 79,26]														
Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>															
2010-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54004	49071	44877	41585	39034															
	auswertbar	Anzahl	54004	47814	43589	40486	37969															
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,27	80,09	79,65	79,71	79,50															
		CI Mean	[81,19; 81,36]	[80,01; 80,17]	[79,56; 79,73]	[79,62; 79,80]	[79,41; 79,60]															
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	60464	55606	51192	47736	44993															
	auswertbar	Anzahl	60464	54225	49842	46629	43826															
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,85	79,87	79,39	79,52	79,31															
		CI Mean	[80,77; 80,93]	[79,79; 79,95]	[79,31; 79,47]	[79,43; 79,60]	[79,22; 79,39]															
Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>																

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2010-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	48515	44245	40462	37615																
	auswertbar	Anzahl	48515	43216	39423	36531																
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,94	79,71	79,79	79,52																
		CI Mean	[80,85; 81,03]	[79,62; 79,80]	[79,70; 79,88]	[79,43; 79,61]																
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54966	50525	46506	43332																
	auswertbar	Anzahl	54966	49477	45358	42214																
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,62	79,67	79,69	79,43																
		CI Mean	[80,54; 80,70]	[79,59; 79,75]	[79,61; 79,78]	[79,35; 79,52]																
Median		80,00	80,00	80,00	80,00																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																	
2011-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52242	47560	43570																	
	auswertbar	Anzahl	52242	46471	42195																	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,01	80,03	79,78																	
		CI Mean	[80,92; 81,09]	[79,94; 80,11]	[79,69; 79,87]																	
		Median	80,00	80,00	80,00																	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																	
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	59886	55120	50864																	
	auswertbar	Anzahl	59886	53935	49401																	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,67	79,70	79,54																	
		CI Mean	[80,59; 80,74]	[79,63; 79,78]	[79,46; 79,62]																	
Median		80,00	80,00	80,00																		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																		
2011-2	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	47681	43542																		
	auswertbar	Anzahl	47681	42377																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,99	79,94																		
		CI Mean	[80,90; 81,07]	[79,85; 80,03]																		
		Median	80,00	80,00																		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54060	50096																		
	auswertbar	Anzahl	54060	48801																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,49	79,69																		
		CI Mean	[80,41; 80,57]	[79,61; 79,77]																		
Median		80,00	80,00																			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																			

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2012-1	männliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52377																		
	auswertbar	Anzahl	52377																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,32																		
		CI Mean	[81,24; 81,41]																		
		Median	80,00																		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	57825																		
	auswertbar	Anzahl	57825																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,77																		
		CI Mean	[80,69; 80,85]																		
Median		80,00																			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																			

3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensiviertere Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

Eine etwaige Beeinträchtigung der Filter- bzw. Klärfunktion der Nieren kann durch die so genannte Kreatinin-Clearance beurteilt werden. Für deren Berechnung wird der Kreatininwert im Blut (Serum) des Patienten ermittelt. Ein erhöhter Kreatininwert kann eine Funktionsverschlechterung der Nieren anzeigen.

In Tabelle 3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte werden dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

Tabelle 3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910	
	auswertbar	Anzahl	16872	11948	11399	10378	9315	8484	7747	6935	6362	6044	5741	5458	5234	4965	4682	4441	4156	3981	3758	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,00	6,76	6,85	6,78	6,92	6,89	7,00	6,91	6,97	6,94	7,00	6,96	7,05	7,04	7,11	7,05	7,10	7,01	7,11	
		CI Mean	[6,98; 7,02]	[6,74; 6,78]	[6,83; 6,87]	[6,76; 6,80]	[6,89; 6,94]	[6,87; 6,91]	[6,98; 7,03]	[6,88; 6,93]	[6,94; 6,99]	[6,91; 6,96]	[6,97; 7,03]	[6,93; 6,98]	[7,02; 7,08]	[7,01; 7,07]	[7,08; 7,15]	[7,02; 7,09]	[7,06; 7,13]	[6,98; 7,05]	[7,07; 7,14]	
		Median	6,80	6,60	6,70	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,80	6,90
		Fallbasis mittlere Differenz		11928	11378	10358	9297	8467	7733	6922	6352	6033	5730	5450	5225	4955	4672	4432	4148	3973	3752	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,22	-0,11	-0,15	-0,01	-0,02	0,09	0,00	0,07	0,05	0,12	0,09	0,17	0,19	0,27	0,22	0,27	0,19	0,28	
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,20]	[-0,12; -0,09]	[-0,17; -0,13]	[-0,03; 0,02]	[-0,05; 0,00]	[0,06; 0,11]	[-0,03; 0,03]	[0,04; 0,10]	[0,02; 0,08]	[0,09; 0,15]	[0,05; 0,12]	[0,14; 0,21]	[0,15; 0,22]	[0,23; 0,30]	[0,18; 0,26]	[0,24; 0,31]	[0,15; 0,23]	[0,25; 0,32]	
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695	
	auswertbar	Anzahl	23392	16849	16210	14916	13467	12461	11397	10204	9347	8927	8411	7957	7617	7202	6810	6469	6079	5807	5510	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,04	6,83	6,92	6,86	6,97	6,95	7,03	6,95	7,01	6,99	7,06	6,98	7,07	7,06	7,15	7,10	7,15	7,08	7,17	
		CI Mean	[7,03; 7,06]	[6,82; 6,85]	[6,90; 6,94]	[6,84; 6,88]	[6,95; 6,99]	[6,93; 6,97]	[7,01; 7,05]	[6,93; 6,97]	[6,99; 7,04]	[6,97; 7,01]	[7,03; 7,08]	[6,96; 7,01]	[7,04; 7,09]	[7,04; 7,09]	[7,12; 7,18]	[7,07; 7,13]	[7,13; 7,18]	[7,06; 7,11]	[7,14; 7,20]	
		Median	6,80	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00
Fallbasis mittlere Differenz			16823	16183	14890	13442	12440	11375	10185	9328	8913	8396	7943	7602	7189	6796	6455	6067	5794	5498		
Mittlere Differenz zur ED			-0,18	-0,08	-0,13	-0,01	-0,02	0,07	-0,01	0,07	0,05	0,12	0,06	0,14	0,14	0,24	0,19	0,25	0,19	0,28		
CI mittlere Differenz			[-0,19; -0,16]	[-0,10; -0,07]	[-0,15; -0,11]	[-0,03; 0,01]	[-0,04; 0,00]	[0,04; 0,09]	[-0,03; 0,02]	[0,05; 0,09]	[0,02; 0,07]	[0,09; 0,14]	[0,03; 0,08]	[0,12; 0,17]	[0,12; 0,17]	[0,21; 0,27]	[0,16; 0,22]	[0,22; 0,28]	[0,16; 0,22]	[0,24; 0,31]		
Median mittlere Differenz			-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30		
2003-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736		
	auswertbar	Anzahl	113208	79684	70611	61132	53748	48258	43826	40359	38515	36367	34396	33473	32006	30520	29119	27689	26425	25134		
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,00	6,89	6,85	6,94	6,95	7,04	6,97	7,03	7,02	7,05	7,02	7,09	7,08	7,18	7,13	7,20	7,16	7,23		
		CI Mean	[6,99; 7,01]	[6,89; 6,90]	[6,85; 6,86]	[6,93; 6,95]	[6,94; 6,96]	[7,03; 7,04]	[6,96; 6,98]	[7,02; 7,04]	[7,00; 7,03]	[7,04; 7,07]	[7,01; 7,03]	[7,08; 7,10]	[7,07; 7,09]	[7,17; 7,19]	[7,11; 7,14]	[7,19; 7,21]	[7,15; 7,18]	[7,21; 7,24]		
		Median	6,80	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00		
		Fallbasis mittlere Differenz		79579	70515	61055	53684	48199	43770	40307	38466	36320	34352	33431	31972	30487	29086	27659	26394	25104		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,07	-0,09	0,02	0,04	0,14	0,08	0,15	0,14	0,18	0,15	0,23	0,22	0,32	0,27	0,35	0,32	0,39		
		CI mittlere Differenz		[-0,08; -0,07]	[-0,10; -0,08]	[0,01; 0,02]	[0,03; 0,05]	[0,13; 0,15]	[0,07; 0,10]	[0,14; 0,16]	[0,13; 0,15]	[0,17; 0,20]	[0,13; 0,16]	[0,21; 0,24]	[0,20; 0,23]	[0,31; 0,34]	[0,25; 0,28]	[0,33; 0,36]	[0,30; 0,34]	[0,37; 0,40]		
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,40	0,30	0,40		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	142866	112069	93979	81049	71389	64294	58333	54388	51899	49824	47865	45920	43703	41770	39917	38116	36445	34887		
	auswertbar	Anzahl	142692	102210	90616	78667	69699	62668	56910	52222	50130	47359	44768	43480	41586	39657	37938	36137	34487	32809		
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,03	6,95	6,91	7,00	7,02	7,08	7,03	7,09	7,07	7,09	7,05	7,12	7,11	7,19	7,15	7,24	7,20	7,25		
		CI Mean	[7,03; 7,04]	[6,95; 6,96]	[6,90; 6,91]	[6,99; 7,01]	[7,01; 7,03]	[7,07; 7,09]	[7,02; 7,04]	[7,08; 7,10]	[7,06; 7,08]	[7,08; 7,10]	[7,04; 7,06]	[7,11; 7,13]	[7,10; 7,12]	[7,18; 7,20]	[7,14; 7,16]	[7,23; 7,25]	[7,18; 7,21]	[7,23; 7,26]		
		Median	6,80	6,80	6,70	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10		
Fallbasis mittlere Differenz			102070	90481	78557	69601	62577	56827	52144	50055	47285	44697	43409	41520	39595	37877	36078	34433	32759			
Mittlere Differenz zur ED			-0,06	-0,09	0,02	0,05	0,12	0,08	0,14	0,13	0,14	0,11	0,18	0,18	0,26	0,22	0,31	0,27	0,33			
CI mittlere Differenz			[-0,06; -0,05]	[-0,09; -0,08]	[0,02; 0,03]	[0,05; 0,06]	[0,11; 0,13]	[0,07; 0,09]	[0,13; 0,15]	[0,12; 0,14]	[0,13; 0,16]	[0,10; 0,12]	[0,17; 0,19]	[0,17; 0,19]	[0,25; 0,27]	[0,21; 0,24]	[0,30; 0,32]	[0,26; 0,29]	[0,32; 0,34]			
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30			

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232		
	auswertbar	Anzahl	134935	112041	100190	86648	80457	74055	68207	65484	61903	58876	57115	54735	52250	49960	47439	45460	43244		
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,16	6,86	6,94	6,95	7,02	6,97	7,02	7,02	7,02	7,04	7,01	7,11	7,10	7,17	7,13	7,22	7,17	7,24	
		CI Mean	[7,15; 7,16]	[6,85; 6,87]	[6,93; 6,94]	[6,94; 6,95]	[7,02; 7,03]	[6,96; 6,97]	[7,02; 7,03]	[7,01; 7,03]	[7,03; 7,05]	[7,00; 7,01]	[7,10; 7,12]	[7,09; 7,11]	[7,16; 7,18]	[7,13; 7,14]	[7,21; 7,23]	[7,16; 7,18]	[7,23; 7,25]		
		Median	6,90	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	
		Fallbasis mittlere Differenz		111910	100068	86544	80362	73968	68123	65409	61832	58804	57046	54670	52193	49906	47387	45408	43194		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,26	-0,15	-0,13	-0,03	-0,07	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,10	0,10	0,17	0,15	0,24	0,19	0,26		
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,25]	[-0,16; -0,14]	[-0,13; -0,12]	[-0,04; -0,02]	[-0,08; -0,06]	[-0,01; 0,01]	[-0,01; 0,01]	[0,01; 0,04]	[-0,02; 0,00]	[0,09; 0,11]	[0,09; 0,11]	[0,16; 0,19]	[0,13; 0,16]	[0,23; 0,25]	[0,18; 0,20]	[0,25; 0,28]		
	Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	163432	142749	126918	112329	102494	94300	88366	84645	81247	78247	75048	71529	68399	65504	62532	59887	57490		
	auswertbar	Anzahl	163225	136674	122550	106690	99181	91555	84364	81092	76858	73226	70703	67707	64569	61815	58789	56231	53711		
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,13	6,92	7,00	7,00	7,07	7,02	7,07	7,06	7,07	7,03	7,12	7,11	7,20	7,16	7,26	7,19	7,27		
		CI Mean	[7,12; 7,13]	[6,91; 6,92]	[6,99; 7,00]	[7,00; 7,01]	[7,07; 7,08]	[7,01; 7,02]	[7,06; 7,08]	[7,05; 7,07]	[7,06; 7,08]	[7,03; 7,04]	[7,11; 7,13]	[7,11; 7,12]	[7,19; 7,21]	[7,15; 7,17]	[7,25; 7,27]	[7,18; 7,20]	[7,26; 7,28]		
		Median	6,90	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10		
		Fallbasis mittlere Differenz		136522	122405	106575	99072	91454	84270	81005	76775	73148	70632	67641	64506	61755	58732	56177	53660		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,18	-0,08	-0,06	0,02	-0,03	0,04	0,03	0,05	0,01	0,10	0,11	0,19	0,16	0,26	0,20	0,28		
CI mittlere Differenz			[-0,19; -0,18]	[-0,09; -0,08]	[-0,07; -0,06]	[0,01; 0,03]	[-0,04; -0,02]	[0,03; 0,04]	[0,02; 0,04]	[0,04; 0,06]	[0,00; 0,02]	[0,10; 0,11]	[0,10; 0,11]	[0,18; 0,20]	[0,15; 0,17]	[0,25; 0,27]	[0,19; 0,21]	[0,27; 0,29]			
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30			
2004-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933			
	auswertbar	Anzahl	98680	82433	72202	64893	58533	53333	50977	47748	45113	43566	41678	39727	38035	36156	34614	32892			
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,10	6,93	6,92	6,99	6,93	6,99	6,98	7,02	6,97	7,07	7,05	7,14	7,10	7,19	7,14	7,20			
		CI Mean	[7,09; 7,11]	[6,93; 6,94]	[6,91; 6,93]	[6,98; 7,00]	[6,92; 6,94]	[6,98; 7,00]	[6,97; 6,99]	[7,01; 7,03]	[6,96; 6,98]	[7,06; 7,08]	[7,04; 7,06]	[7,13; 7,15]	[7,09; 7,11]	[7,18; 7,20]	[7,12; 7,15]	[7,18; 7,21]			
		Median	6,80	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00			
		Fallbasis mittlere Differenz		82306	72085	64785	58431	53238	50884	47663	45035	43491	41608	39664	37974	36099	34560	32841			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,13	-0,11	-0,02	-0,05	0,01	0,01	0,06	0,02	0,12	0,11	0,20	0,17	0,26	0,21	0,28			
		CI mittlere Differenz		[-0,14; -0,12]	[-0,12; -0,10]	[-0,03; -0,01]	[-0,07; -0,04]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,03]	[0,04; 0,07]	[0,00; 0,03]	[0,11; 0,13]	[0,10; 0,12]	[0,19; 0,22]	[0,15; 0,18]	[0,25; 0,28]	[0,20; 0,23]	[0,26; 0,29]			
	Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521			
	auswertbar	Anzahl	115751	97556	86091	77910	70544	64588	61813	57837	54691	52820	50531	48104	45967	43743	41931	39865			
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,07	6,98	6,96	7,02	6,97	7,02	7,01	7,02	6,99	7,06	7,06	7,14	7,11	7,20	7,14	7,19			
		CI Mean	[7,07; 7,08]	[6,97; 6,98]	[6,96; 6,97]	[7,02; 7,03]	[6,96; 6,97]	[7,01; 7,03]	[7,00; 7,02]	[7,01; 7,03]	[6,98; 7,00]	[7,05; 7,07]	[7,05; 7,07]	[7,13; 7,15]	[7,10; 7,12]	[7,18; 7,21]	[7,13; 7,15]	[7,18; 7,21]			
		Median	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		97395	85955	77786	70433	64481	61709	57741	54601	52735	50447	48027	45894	43680	41870	39808			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,07	-0,06	0,02	-0,02	0,04	0,03	0,05	0,02	0,10	0,10	0,18	0,16	0,25	0,20	0,26			
CI mittlere Differenz			[-0,07; -0,06]	[-0,06; -0,05]	[0,01; 0,02]	[-0,03; -0,02]	[0,03; 0,04]	[0,02; 0,04]	[0,04; 0,06]	[0,01; 0,03]	[0,09; 0,11]	[0,09; 0,11]	[0,17; 0,19]	[0,15; 0,17]	[0,24; 0,26]	[0,19; 0,22]	[0,25; 0,28]				
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30					

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	105631	93726	83366	74241	68487	64764	61675	58977	56190	53398	50980	48671	46510	44483	42590				
	auswertbar	Anzahl	105465	89625	79897	71982	65460	62043	58187	54652	53098	50749	48356	46131	43969	41983	40051				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,22	6,92	7,00	6,93	6,99	6,97	7,01	6,98	7,07	7,05	7,15	7,10	7,18	7,13	7,20				
		CI Mean	[7,21; 7,23]	[6,92; 6,93]	[6,99; 7,01]	[6,93; 6,94]	[6,98; 6,99]	[6,96; 6,98]	[7,01; 7,02]	[6,97; 6,99]	[7,06; 7,08]	[7,04; 7,06]	[7,14; 7,16]	[7,09; 7,11]	[7,17; 7,19]	[7,12; 7,14]	[7,19; 7,21]				
		Median	6,90	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		89499	79773	71871	65352	61940	58094	54567	53010	50666	48278	46056	43896	41914	39987				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,26	-0,16	-0,20	-0,14	-0,14	-0,09	-0,13	-0,03	-0,04	0,05	0,01	0,10	0,06	0,13				
		CI mittlere Differenz		[-0,27; -0,25]	[-0,17; -0,15]	[-0,21; -0,19]	[-0,15; -0,13]	[-0,15; -0,13]	[-0,10; -0,08]	[-0,14; -0,12]	[-0,04; -0,02]	[-0,05; -0,03]	[0,04; 0,07]	[0,00; 0,02]	[0,09; 0,12]	[0,05; 0,07]	[0,11; 0,14]				
	Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	123470	110813	99471	89253	82572	78403	74799	71559	68310	64988	62073	59313	56688	54194	51856				
	auswertbar	Anzahl	123273	106004	95342	86567	79022	75256	70673	66377	64472	61782	58926	56329	53630	51243	48747				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14	6,96	7,01	6,96	7,00	6,99	7,02	6,98	7,05	7,04	7,13	7,09	7,18	7,13	7,18				
		CI Mean	[7,14; 7,15]	[6,95; 6,97]	[7,00; 7,02]	[6,95; 6,96]	[7,00; 7,01]	[6,98; 6,99]	[7,01; 7,02]	[6,97; 6,99]	[7,04; 7,06]	[7,04; 7,05]	[7,12; 7,14]	[7,08; 7,09]	[7,17; 7,19]	[7,12; 7,14]	[7,17; 7,19]				
		Median	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		105851	95199	86439	78902	75140	70564	66271	64374	61684	58835	56244	53551	51167	48674				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,09	-0,12	-0,07	-0,08	-0,04	-0,08	0,00	0,00	0,09	0,05	0,15	0,10	0,16				
CI mittlere Differenz			[-0,16; -0,15]	[-0,10; -0,08]	[-0,13; -0,12]	[-0,08; -0,06]	[-0,09; -0,07]	[-0,05; -0,04]	[-0,09; -0,07]	[-0,01; -0,01]	[-0,01; -0,01]	[0,08; 0,10]	[0,04; 0,06]	[0,14; 0,16]	[0,09; 0,11]	[0,14; 0,17]					
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20						
2005-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545					
	auswertbar	Anzahl	82140	70605	63009	56714	53433	50039	47018	45361	43131	40967	38986	37104	35405	33739					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,21	7,01	6,94	6,99	6,97	7,01	6,98	7,07	7,06	7,14	7,10	7,19	7,13	7,20					
		CI Mean	[7,20; 7,23]	[7,00; 7,02]	[6,93; 6,95]	[6,98; 7,00]	[6,96; 6,98]	[7,00; 7,02]	[6,97; 6,99]	[7,06; 7,08]	[7,05; 7,07]	[7,13; 7,15]	[7,09; 7,12]	[7,18; 7,20]	[7,12; 7,14]	[7,18; 7,21]					
		Median	6,80	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		70512	62935	56639	53368	49977	46961	45304	43078	40914	38938	37058	35365	33701					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,21	-0,15	-0,15	-0,11	-0,13	-0,04	-0,04	0,05	0,02	0,11	0,06	0,13					
		CI mittlere Differenz		[-0,18; -0,16]	[-0,22; -0,20]	[-0,16; -0,14]	[-0,16; -0,14]	[-0,12; -0,09]	[-0,14; -0,12]	[-0,06; -0,03]	[-0,06; -0,03]	[0,03; 0,06]	[0,00; 0,03]	[0,09; 0,12]	[0,04; 0,07]	[0,11; 0,14]					
	Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683					
	auswertbar	Anzahl	94896	82726	74322	67361	63636	59708	56299	54366	51788	49320	46845	44587	42508	40565					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,16	7,02	6,96	7,00	6,98	7,01	6,98	7,04	7,04	7,12	7,08	7,17	7,12	7,17					
		CI Mean	[7,15; 7,17]	[7,01; 7,03]	[6,95; 6,97]	[6,99; 7,01]	[6,97; 6,99]	[7,00; 7,01]	[6,97; 6,99]	[7,04; 7,05]	[7,03; 7,05]	[7,11; 7,13]	[7,07; 7,09]	[7,16; 7,18]	[7,11; 7,14]	[7,16; 7,19]					
		Median	6,80	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90					
		Fallbasis mittlere Differenz		82629	74236	67282	63562	59638	56230	54304	51727	49261	46788	44534	42456	40514					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,16	-0,10	-0,11	-0,08	-0,10	-0,04	-0,03	0,05	0,02	0,12	0,08	0,14					
CI mittlere Differenz			[-0,12; -0,11]	[-0,16; -0,15]	[-0,11; -0,09]	[-0,12; -0,10]	[-0,09; -0,07]	[-0,11; -0,09]	[-0,05; -0,02]	[-0,04; -0,02]	[0,04; 0,06]	[0,01; 0,03]	[0,11; 0,13]	[0,07; 0,09]	[0,12; 0,15]						
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20							

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133							
	auswertbar	Anzahl	98463	85133	75452	70468	65548	60837	58914	55654	52791	50242	47659	45382	43184							
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,30	6,94	6,97	6,95	6,99	6,96	7,04	7,03	7,11	7,07	7,15	7,10	7,16							
		CI Mean	[7,29; 7,31]	[6,93; 6,94]	[6,96; 6,97]	[6,94; 6,96]	[6,98; 7,00]	[6,95; 6,97]	[7,03; 7,05]	[7,02; 7,03]	[7,10; 7,12]	[7,06; 7,08]	[7,13; 7,16]	[7,09; 7,11]	[7,15; 7,17]							
		Median	6,90	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90							
		Fallbasis mittlere Differenz		85027	75362	70390	65473	60766	58845	55590	52729	50188	47606	45330	43133							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,33	-0,28	-0,28	-0,24	-0,27	-0,17	-0,18	-0,08	-0,11	-0,03	-0,07	0,00							
		CI mittlere Differenz		[-0,34; -0,32]	[-0,29; -0,27]	[-0,29; -0,27]	[-0,25; -0,23]	[-0,28; -0,25]	[-0,18; -0,16]	[-0,19; -0,17]	[-0,10; -0,07]	[-0,12; -0,10]	[-0,05; -0,02]	[-0,08; -0,05]	[-0,02; -0,01]							
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383							
	auswertbar	Anzahl	112371	98558	87708	82655	77022	71797	69659	65989	62592	59479	56338	53710	51045							
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,20	6,96	6,99	6,98	6,99	6,96	7,03	7,03	7,10	7,07	7,15	7,10	7,15							
		CI Mean	[7,19; 7,21]	[6,96; 6,97]	[6,98; 7,00]	[6,97; 6,98]	[6,98; 7,00]	[6,95; 6,97]	[7,02; 7,04]	[7,02; 7,04]	[7,09; 7,11]	[7,06; 7,08]	[7,14; 7,16]	[7,09; 7,11]	[7,14; 7,16]							
		Median	6,90	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90							
		Fallbasis mittlere Differenz		98451	87609	82559	76932	71710	69580	65915	62522	59412	56276	53651	50990							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,22	-0,17	-0,18	-0,15	-0,18	-0,10	-0,10	-0,02	-0,04	0,04	0,00	0,06							
CI mittlere Differenz			[-0,22; -0,21]	[-0,18; -0,17]	[-0,19; -0,17]	[-0,16; -0,15]	[-0,19; -0,17]	[-0,11; -0,09]	[-0,11; -0,09]	[-0,03; -0,01]	[-0,05; -0,03]	[0,03; 0,05]	[-0,01; -0,01]	[0,05; 0,07]								
Median mittlere Differenz			-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10								
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138								
	auswertbar	Anzahl	93890	81896	74472	68451	63522	60826	57576	54282	51514	48814	46443	44023								
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,21	7,00	6,97	7,00	6,96	7,05	7,04	7,13	7,08	7,17	7,12	7,18								
		CI Mean	[7,20; 7,22]	[7,00; 7,01]	[6,96; 6,98]	[6,99; 7,01]	[6,95; 6,97]	[7,04; 7,06]	[7,03; 7,05]	[7,12; 7,14]	[7,07; 7,09]	[7,16; 7,18]	[7,11; 7,13]	[7,17; 7,19]								
		Median	6,80	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90								
		Fallbasis mittlere Differenz		81799	74380	68368	63439	60748	57502	54215	51450	48752	46384	43969								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,18	-0,19	-0,15	-0,18	-0,08	-0,08	0,02	-0,02	0,07	0,03	0,10								
		CI mittlere Differenz		[-0,19; -0,17]	[-0,20; -0,18]	[-0,16; -0,14]	[-0,19; -0,17]	[-0,09; -0,07]	[-0,09; -0,07]	[0,01; 0,03]	[-0,03; -0,01]	[0,06; 0,09]	[0,02; 0,04]	[0,08; 0,11]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20								
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	106368	97818	89965	84145	79567	75344	70865	67146	63673	60566	57735	55201								
	auswertbar	Anzahl	106225	93722	85800	79089	73611	70671	67007	63279	60051	56954	54363	51611								
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14	7,00	6,96	6,97	6,94	7,01	7,01	7,09	7,05	7,14	7,09	7,13								
		CI Mean	[7,13; 7,15]	[6,99; 7,01]	[6,96; 6,97]	[6,96; 6,98]	[6,93; 6,95]	[7,00; 7,02]	[7,00; 7,01]	[7,08; 7,09]	[7,04; 7,06]	[7,13; 7,15]	[7,08; 7,10]	[7,12; 7,14]								
		Median	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90								
		Fallbasis mittlere Differenz		93613	85702	78999	73525	70596	66935	63212	59986	56892	54303	51553								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,13	-0,14	-0,12	-0,15	-0,07	-0,07	0,01	-0,01	0,08	0,04	0,09								
CI mittlere Differenz			[-0,13; -0,12]	[-0,15; -0,13]	[-0,13; -0,11]	[-0,16; -0,14]	[-0,08; -0,06]	[-0,08; -0,06]	[0,00; 0,02]	[-0,02; -0,00]	[0,07; 0,09]	[0,03; 0,05]	[0,07; 0,10]									
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10									

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740											
	auswertbar	Anzahl	98869	86412	77816	71556	68342	64278	60475	57155	54030	51458	48846											
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,29	6,94	6,96	6,92	7,01	6,99	7,08	7,04	7,13	7,09	7,15											
		CI Mean	[7,28; 7,30]	[6,93; 6,95]	[6,95; 6,97]	[6,91; 6,93]	[7,00; 7,02]	[6,99; 7,00]	[7,07; 7,09]	[7,03; 7,05]	[7,12; 7,14]	[7,07; 7,10]	[7,14; 7,16]											
		Median	6,90	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90											
		Fallbasis mittlere Differenz		86294	77714	71463	68248	64191	60392	57080	53959	51392	48787											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,32	-0,28	-0,30	-0,21	-0,21	-0,12	-0,15	-0,05	-0,09	-0,02											
		CI mittlere Differenz		[-0,33; -0,31]	[-0,29; -0,27]	[-0,31; -0,29]	[-0,22; -0,20]	[-0,23; -0,20]	[-0,13; -0,11]	[-0,16; -0,14]	[-0,06; -0,04]	[-0,10; -0,07]	[-0,03; -0,00]											
	Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10												
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660											
	auswertbar	Anzahl	112039	99284	90072	83132	79409	74961	70818	66977	63337	60274	57251											
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,17	6,94	6,94	6,90	6,97	6,97	7,04	7,01	7,10	7,05	7,10											
		CI Mean	[7,16; 7,18]	[6,93; 6,94]	[6,93; 6,95]	[6,89; 6,91]	[6,96; 6,98]	[6,96; 6,98]	[7,04; 7,05]	[7,00; 7,02]	[7,09; 7,11]	[7,04; 7,06]	[7,09; 7,11]											
		Median	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,80											
		Fallbasis mittlere Differenz		99138	89936	83003	79290	74846	70711	66871	63235	60182	57159											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,19	-0,22	-0,14	-0,13	-0,05	-0,08	0,01	-0,02	0,03											
CI mittlere Differenz			[-0,22; -0,20]	[-0,20; -0,18]	[-0,22; -0,21]	[-0,15; -0,14]	[-0,14; -0,13]	[-0,06; -0,04]	[-0,08; -0,07]	[0,00; 0,02]	[-0,03; -0,01]	[0,02; 0,04]												
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10													
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931												
	auswertbar	Anzahl	91460	78816	70736	66952	62474	58634	55130	51926	49420	46733												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,23	6,95	6,90	6,98	6,97	7,05	7,01	7,10	7,05	7,12												
		CI Mean	[7,22; 7,24]	[6,94; 6,96]	[6,89; 6,91]	[6,97; 6,99]	[6,96; 6,97]	[7,04; 7,06]	[7,00; 7,02]	[7,09; 7,11]	[7,04; 7,07]	[7,11; 7,13]												
		Median	6,80	6,70	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90												
		Fallbasis mittlere Differenz		78713	70646	66868	62389	58562	55062	51862	49360	46672												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,25	-0,27	-0,18	-0,18	-0,09	-0,12	-0,03	-0,06	0,01												
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,24]	[-0,28; -0,26]	[-0,19; -0,17]	[-0,20; -0,17]	[-0,10; -0,08]	[-0,13; -0,11]	[-0,04; -0,01]	[-0,07; -0,05]	[0,00; 0,02]												
	Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10													
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214												
	auswertbar	Anzahl	103004	89846	80914	76975	72246	67906	63969	60443	57493	54403												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,12	6,90	6,86	6,91	6,92	6,98	6,95	7,04	7,00	7,04												
		CI Mean	[7,11; 7,13]	[6,89; 6,91]	[6,85; 6,86]	[6,91; 6,92]	[6,91; 6,92]	[6,97; 6,99]	[6,95; 6,96]	[7,03; 7,04]	[6,99; 7,00]	[7,03; 7,05]												
		Median	6,80	6,60	6,60	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80												
		Fallbasis mittlere Differenz		89740	80816	76883	72158	67823	63889	60369	57423	54334												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,19	-0,22	-0,15	-0,14	-0,06	-0,08	0,01	-0,02	0,03												
CI mittlere Differenz			[-0,20; -0,19]	[-0,23; -0,21]	[-0,16; -0,14]	[-0,15; -0,13]	[-0,07; -0,05]	[-0,09; -0,07]	[0,00; 0,02]	[-0,03; -0,01]	[0,02; 0,04]													
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10														

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783													
	auswertbar	Anzahl	99391	85456	78996	72781	67724	63521	59809	56580	53450													
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,28	6,87	6,94	6,91	6,99	6,95	7,04	6,99	7,06													
		CI Mean	[7,27; 7,29]	[6,87; 6,88]	[6,93; 6,95]	[6,90; 6,92]	[6,99; 7,00]	[6,94; 6,96]	[7,03; 7,05]	[6,98; 7,00]	[7,05; 7,07]													
		Median	6,80	6,60	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80													
		Fallbasis mittlere Differenz		85284	78835	72625	67574	63383	59674	56454	53329													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,37	-0,29	-0,30	-0,20	-0,23	-0,13	-0,17	-0,10													
		CI mittlere Differenz		[-0,38; -0,36]	[-0,30; -0,28]	[-0,31; -0,29]	[-0,21; -0,19]	[-0,24; -0,22]	[-0,14; -0,12]	[-0,18; -0,16]	[-0,11; -0,09]													
	Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228													
	auswertbar	Anzahl	109652	95716	89056	82432	77177	72673	68606	65133	61675													
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,10	6,83	6,87	6,86	6,93	6,90	6,98	6,94	6,99													
		CI Mean	[7,09; 7,11]	[6,82; 6,84]	[6,86; 6,88]	[6,85; 6,87]	[6,92; 6,93]	[6,89; 6,90]	[6,98; 6,99]	[6,93; 6,95]	[6,98; 6,99]													
		Median	6,70	6,60	6,60	6,60	6,70	6,60	6,70	6,70	6,70													
		Fallbasis mittlere Differenz		95508	88860	82249	77016	72523	68466	65001	61550													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,24	-0,18	-0,18	-0,10	-0,12	-0,02	-0,06	-0,01													
CI mittlere Differenz			[-0,25; -0,24]	[-0,19; -0,18]	[-0,19; -0,17]	[-0,11; -0,09]	[-0,13; -0,11]	[-0,03; -0,01]	[-0,07; -0,05]	[-0,02; -0,00]														
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10															
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871														
	auswertbar	Anzahl	67466	58974	53319	49185	46007	43152	40831	38594														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,16	6,90	6,86	6,93	6,90	6,98	6,94	7,00														
		CI Mean	[7,15; 7,18]	[6,89; 6,91]	[6,85; 6,87]	[6,92; 6,94]	[6,89; 6,91]	[6,97; 6,99]	[6,93; 6,95]	[6,99; 7,01]														
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,60	6,70	6,70	6,70														
		Fallbasis mittlere Differenz		58871	53226	49099	45923	43073	40751	38525														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,23	-0,24	-0,16	-0,18	-0,08	-0,11	-0,05														
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,22]	[-0,25; -0,23]	[-0,17; -0,14]	[-0,19; -0,16]	[-0,09; -0,07]	[-0,13; -0,10]	[-0,06; -0,04]														
	Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10															
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527														
	auswertbar	Anzahl	74018	65441	59852	55551	52235	49051	46614	44161														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,01	6,83	6,81	6,87	6,85	6,93	6,88	6,93														
		CI Mean	[7,00; 7,02]	[6,82; 6,84]	[6,80; 6,81]	[6,86; 6,88]	[6,84; 6,86]	[6,92; 6,94]	[6,87; 6,89]	[6,92; 6,94]														
		Median	6,60	6,60	6,50	6,60	6,60	6,70	6,60	6,70														
		Fallbasis mittlere Differenz		65330	59745	55453	52138	48962	46529	44071														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,16	-0,09	-0,09	0,00	-0,05	0,00														
CI mittlere Differenz			[-0,17; -0,15]	[-0,17; -0,15]	[-0,09; -0,08]	[-0,10; -0,08]	[-0,01; -0,01]	[-0,06; -0,04]	[-0,01; -0,02]															
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10																

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446															
	auswertbar	Anzahl	72143	62456	56477	52140	48646	45707	43129															
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,29	6,83	6,88	6,83	6,92	6,87	6,95															
		CI Mean	[7,28; 7,30]	[6,82; 6,84]	[6,87; 6,89]	[6,82; 6,84]	[6,91; 6,93]	[6,86; 6,88]	[6,94; 6,96]															
		Median	6,80	6,50	6,60	6,60	6,70	6,60	6,70															
		Fallbasis mittlere Differenz		62348	56373	52056	48562	45630	43056															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,43	-0,35	-0,38	-0,28	-0,32	-0,24															
		CI mittlere Differenz		[-0,44; -0,42]	[-0,36; -0,34]	[-0,39; -0,36]	[-0,29; -0,27]	[-0,33; -0,30]	[-0,25; -0,22]															
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00															
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078															
	auswertbar	Anzahl	76828	67358	61579	57009	53376	50479	47774															
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,06	6,78	6,82	6,79	6,87	6,82	6,87															
		CI Mean	[7,05; 7,07]	[6,77; 6,78]	[6,81; 6,83]	[6,78; 6,80]	[6,86; 6,88]	[6,81; 6,83]	[6,86; 6,88]															
		Median	6,60	6,50	6,60	6,50	6,60	6,60	6,60															
		Fallbasis mittlere Differenz		67254	61485	56928	53301	50403	47704															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,26	-0,19	-0,21	-0,13	-0,16	-0,11															
CI mittlere Differenz			[-0,27; -0,25]	[-0,20; -0,18]	[-0,22; -0,20]	[-0,14; -0,12]	[-0,17; -0,15]	[-0,12; -0,10]																
Median mittlere Differenz			-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00																
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280																
	auswertbar	Anzahl	66176	57603	51807	47624	44727	41966																
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,22	6,93	6,86	6,95	6,90	6,96																
		CI Mean	[7,21; 7,23]	[6,92; 6,94]	[6,85; 6,87]	[6,94; 6,96]	[6,89; 6,91]	[6,95; 6,97]																
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,60	6,70																
		Fallbasis mittlere Differenz		57502	51722	47542	44646	41888																
		Mittlere Differenz zur ED		-0,26	-0,29	-0,19	-0,23	-0,16																
		CI mittlere Differenz		[-0,27; -0,25]	[-0,31; -0,28]	[-0,20; -0,18]	[-0,24; -0,22]	[-0,18; -0,15]																
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00																
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447																
	auswertbar	Anzahl	71759	63477	57543	53342	50116	47184																
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,03	6,85	6,81	6,88	6,83	6,88																
		CI Mean	[7,02; 7,04]	[6,84; 6,86]	[6,80; 6,82]	[6,87; 6,89]	[6,82; 6,84]	[6,87; 6,89]																
		Median	6,60	6,60	6,50	6,60	6,60	6,60																
		Fallbasis mittlere Differenz		63368	57440	53244	50032	47101																
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,18	-0,10	-0,14	-0,08																
CI mittlere Differenz			[-0,17; -0,15]	[-0,19; -0,17]	[-0,11; -0,09]	[-0,15; -0,13]	[-0,09; -0,07]																	
Median mittlere Differenz			0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00																	

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460														
	auswertbar	Anzahl	75856	66392	60057	55542	51955														
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,32	6,85	6,91	6,86	6,91														
		CI Mean	[7,31; 7,33]	[6,84; 6,86]	[6,90; 6,92]	[6,85; 6,86]	[6,90; 6,92]														
		Median	6,80	6,50	6,60	6,60	6,60														
		Fallbasis mittlere Differenz		66272	59946	55445	51867														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,43	-0,34	-0,38	-0,31														
		CI mittlere Differenz		[-0,44; -0,42]	[-0,35; -0,33]	[-0,39; -0,37]	[-0,32; -0,30]														
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10														
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365														
	auswertbar	Anzahl	79867	71081	65001	60608	56828														
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,08	6,79	6,85	6,80	6,83														
		CI Mean	[7,07; 7,09]	[6,78; 6,80]	[6,84; 6,86]	[6,79; 6,81]	[6,83; 6,84]														
		Median	6,70	6,50	6,60	6,50	6,60														
		Fallbasis mittlere Differenz		70943	64876	60495	56722														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,26	-0,19	-0,22	-0,18														
CI mittlere Differenz			[-0,27; -0,26]	[-0,20; -0,18]	[-0,23; -0,21]	[-0,19; -0,17]															
Median mittlere Differenz			-0,10	0,00	-0,10	-0,10															
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	61608	55900	51784															
	auswertbar	Anzahl	68224	60084	54397	50235															
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,24	6,94	6,87	6,93															
		CI Mean	[7,23; 7,26]	[6,93; 6,95]	[6,86; 6,88]	[6,92; 6,94]															
		Median	6,80	6,60	6,60	6,60															
		Fallbasis mittlere Differenz		59989	54310	50145															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,27	-0,31	-0,24															
		CI mittlere Differenz		[-0,28; -0,26]	[-0,32; -0,30]	[-0,25; -0,23]															
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10															
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	66943	61246	56909															
	auswertbar	Anzahl	73269	65460	59709	55387															
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,06	6,87	6,80	6,83															
		CI Mean	[7,05; 7,07]	[6,86; 6,88]	[6,79; 6,81]	[6,82; 6,84]															
		Median	6,60	6,60	6,50	6,60															
		Fallbasis mittlere Differenz		65345	59610	55294															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,21	-0,16															
CI mittlere Differenz			[-0,17; -0,15]	[-0,22; -0,20]	[-0,17; -0,15]																
Median mittlere Differenz			0,00	-0,10	0,00																

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr					
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	66585	60521																					
	auswertbar	Anzahl	74007	64892	58552																					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,34	6,84	6,88																					
		CI Mean	[7,32; 7,35]	[6,83; 6,85]	[6,87; 6,89]																					
		Median	6,80	6,50	6,60																					
		Fallbasis mittlere Differenz		64788	58459																					
		Mittlere Differenz zur ED			-0,45	-0,39																				
		CI mittlere Differenz			[-0,46; -0,44]	[-0,40; -0,38]																				
		Median mittlere Differenz			-0,20	-0,20																				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	72558	66610																					
	auswertbar	Anzahl	79337	70903	64623																					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,11	6,78	6,79																					
		CI Mean	[7,10; 7,12]	[6,77; 6,78]	[6,78; 6,80]																					
		Median	6,70	6,50	6,50																					
Fallbasis mittlere Differenz			70758	64491																						
Mittlere Differenz zur ED				-0,30	-0,26																					
CI mittlere Differenz				[-0,31; -0,29]	[-0,27; -0,26]																					
Median mittlere Differenz				-0,10	-0,10																					
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67230	60721																						
	auswertbar	Anzahl	67079	58992																						
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,28	6,92																						
		CI Mean	[7,26; 7,29]	[6,91; 6,93]																						
		Median	6,80	6,60																						
		Fallbasis mittlere Differenz		58867																						
		Mittlere Differenz zur ED			-0,32																					
		CI mittlere Differenz			[-0,33; -0,31]																					
		Median mittlere Differenz			-0,10																					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465	66497																						
	auswertbar	Anzahl	72339	64710																						
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,08	6,83																						
		CI Mean	[7,07; 7,09]	[6,82; 6,84]																						
		Median	6,60	6,50																						
Fallbasis mittlere Differenz			64606																							
Mittlere Differenz zur ED				-0,22																						
CI mittlere Differenz				[-0,23; -0,22]																						
Median mittlere Differenz				-0,10																						

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714																				
	auswertbar	Anzahl	74584																				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,35																				
		CI Mean	[7,34; 7,37]																				
		Median	6,80																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
	Median mittlere Differenz																						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879																				
	auswertbar	Anzahl	77737																				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,09																				
		CI Mean	[7,08; 7,10]																				
		Median	6,60																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
Median mittlere Differenz																							

In Tabelle 3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte werden dazu unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten

ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalbjahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

Tabelle 3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr		2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
		Anzahl	Anzahl																			
2003-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910	
	auswertbar	Anzahl	16872	11948	11399	10378	9315	8484	7747	6935	6362	6044	5741	5458	5234	4965	4682	4441	4156	3981	3758	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	3550	3358	2843	2758	2093	1867	1535	1472	1211	1177	1006	1045	872	829	677	675	595	628	533	
		Anteil in %	21,04	28,11	24,94	26,58	22,47	22,01	19,81	21,23	19,03	19,47	17,52	19,15	16,66	16,70	14,46	15,20	14,32	15,77	14,18	
		CI Anteil in %	[20,43; 21,66]	[27,30; 28,91]	[24,15; 25,74]	[25,73; 27,43]	[21,62; 23,32]	[21,12; 22,89]	[18,93; 20,70]	[20,26; 22,19]	[18,07; 20,00]	[18,48; 20,47]	[16,54; 18,51]	[18,10; 20,19]	[15,65; 17,67]	[15,66; 17,73]	[13,45; 15,47]	[14,14; 16,26]	[13,25; 15,38]	[14,64; 16,91]	[13,07; 15,30]	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	8910	6231	6019	5538	5063	4742	4271	3903	3624	3484	3311	3112	2979	2845	2659	2598	2407	2378	2178	
		Anteil in %	52,81	52,15	52,80	53,36	54,35	55,89	55,13	56,28	56,96	57,64	57,67	57,02	56,92	57,30	56,79	58,50	57,92	59,73	57,96	
		CI Anteil in %	[52,06; 53,56]	[51,26; 53,05]	[51,89; 53,72]	[52,40; 54,32]	[53,34; 55,36]	[54,84; 56,95]	[54,02; 56,24]	[55,11; 57,45]	[55,75; 58,18]	[56,40; 58,89]	[56,39; 58,95]	[55,70; 58,33]	[55,57; 58,26]	[55,93; 58,68]	[55,37; 58,21]	[57,05; 59,95]	[56,42; 59,42]	[58,21; 61,26]	[56,38; 59,53]	
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	2705	1545	1637	1377	1389	1251	1215	1052	981	904	939	874	904	846	904	789	777	651	687	
		Anteil in %	16,03	12,93	14,36	13,27	14,91	14,75	15,68	15,17	15,42	14,96	16,36	16,01	17,27	17,04	19,31	17,77	18,70	16,35	18,28	
		CI Anteil in %	[15,48; 16,59]	[12,33; 13,53]	[13,72; 15,00]	[12,62; 13,92]	[14,19; 15,63]	[13,99; 15,50]	[14,87; 16,49]	[14,33; 16,01]	[14,53; 16,31]	[14,06; 15,86]	[15,40; 17,31]	[15,04; 16,99]	[16,25; 18,30]	[15,99; 18,09]	[18,18; 20,44]	[16,64; 18,89]	[17,51; 19,88]	[15,20; 17,50]	[17,05; 19,52]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1291	643	721	578	608	500	589	407	440	375	384	345	386	351	358	308	300	260	291	
		Anteil in %	7,65	5,38	6,33	5,57	6,53	5,89	7,60	5,87	6,92	6,20	6,69	6,32	7,37	7,07	7,65	6,94	7,22	6,53	7,74	
		CI Anteil in %	[7,25; 8,05]	[4,98; 5,79]	[5,88; 6,77]	[5,13; 6,01]	[6,03; 7,03]	[5,39; 6,39]	[7,01; 8,19]	[5,32; 6,42]	[6,29; 7,54]	[5,60; 6,81]	[6,04; 7,34]	[5,68; 6,97]	[6,67; 8,08]	[6,36; 7,78]	[6,89; 8,41]	[6,19; 7,68]	[6,43; 8,01]	[5,76; 7,30]	[6,89; 8,60]	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	416	171	179	127	162	124	137	101	106	104	101	82	93	94	84	71	77	64	69	
		Anteil in %	2,47	1,43	1,57	1,22	1,74	1,46	1,77	1,46	1,67	1,72	1,76	1,50	1,78	1,89	1,79	1,60	1,85	1,61	1,84	
		CI Anteil in %	[2,23; 2,70]	[1,22; 1,64]	[1,34; 1,80]	[1,01; 1,44]	[1,47; 2,00]	[1,21; 1,72]	[1,47; 2,06]	[1,17; 1,74]	[1,35; 1,98]	[1,39; 2,05]	[1,42; 2,10]	[1,18; 1,83]	[1,42; 2,13]	[1,51; 2,27]	[1,41; 2,17]	[1,23; 1,97]	[1,44; 2,26]	[1,22; 2,00]	[1,41; 2,27]	
		weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695
		auswertbar	Anzahl	23392	16849	16210	14916	13467	12461	11397	10204	9347	8927	8411	7957	7617	7202	6810	6469	6079	5807	5510
		normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	4488	4216	3702	3526	2674	2430	2068	1923	1634	1596	1324	1367	1152	1080	950	934	772	874	677
			Anteil in %	19,19	25,02	22,84	23,64	19,86	19,50	18,15	18,85	17,48	17,88	15,74	17,18	15,12	15,00	13,95	14,44	12,70	15,05	12,29
		CI Anteil in %	[18,68; 19,69]	[24,37; 25,68]	[22,19; 23,48]	[22,96; 24,32]	[19,18; 20,53]	[18,81; 20,20]	[17,44; 18,85]	[18,09; 19,60]	[16,71; 18,25]	[17,08; 18,67]	[14,96; 16,52]	[16,35; 18,01]	[14,32; 15,93]	[14,17; 15,82]	[13,13; 14,77]	[13,58; 15,29]	[11,86; 13,54]	[14,13; 15,97]	[11,42; 13,15]	
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5		Anzahl	12568	8967	8628	8119	7461	7129	6416	5943	5381	5195	4841	4705	4442	4223	3847	3748	3493	3343	3195	
		Anteil in %	53,73	53,22	53,23	54,43	55,40	57,21	56,30	58,24	57,57	58,19	57,56	59,13	58,32	58,64	56,49	57,94	57,46	57,57	57,99	
		CI Anteil in %	[53,09; 54,37]	[52,47; 53,97]	[52,46; 53,99]	[53,63; 55,23]	[54,56; 56,24]	[56,34; 58,08]	[55,38; 57,21]	[57,28; 59,20]	[56,57; 58,57]	[57,17; 59,22]	[56,50; 58,61]	[58,05; 60,21]	[57,21; 59,42]	[57,50; 59,77]	[55,31; 57,67]	[56,73; 59,14]	[56,22; 58,70]	[56,30; 58,84]	[56,68; 59,29]	
erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5		Anzahl	3847	2364	2499	2124	2131	1840	1856	1562	1477	1400	1445	1260	1318	1253	1313	1155	1197	1039	1027	
		Anteil in %	16,45	14,03	15,42	14,24	15,82	14,77	16,28	15,31	15,80	15,68	17,18	15,84	17,30	17,40	19,28	17,85	19,69	17,89	18,64	
		CI Anteil in %	[15,97; 16,92]	[13,51; 14,55]	[14,86; 15,97]	[13,68; 14,80]	[15,21; 16,44]	[14,14; 15,39]	[15,61; 16,96]	[14,61; 16,01]	[15,06; 16,54]	[14,93; 16,44]	[16,37; 17,99]	[15,03; 16,64]	[16,45; 18,15]	[16,52; 18,27]	[18,34; 20,22]	[16,92; 18,79]	[18,69; 20,69]	[16,91; 18,88]	[17,61; 19,67]	
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0		Anzahl	1871	1040	1085	917	963	848	825	598	671	559	634	508	550	509	546	504	495	421	480	
		Anteil in %	8,00	6,17	6,69	6,15	7,15	6,81	7,24	5,86	7,18	6,26	7,54	6,38	7,22	7,07	8,02	7,79	8,14	7,25	8,71	
		CI Anteil in %	[7,65; 8,35]	[5,81; 6,54]	[6,31; 7,08]	[5,76; 6,53]	[6,72; 7,59]	[6,36; 7,25]	[6,76; 7,71]	[5,40; 6,32]	[6,66; 7,70]	[5,76; 6,76]	[6,97; 8,10]	[5,85; 6,92]	[6,64; 7,80]	[6,48; 7,66]	[7,37; 8,66]	[7,14; 8,44]	[7,46; 8,83]	[6,58; 7,92]	[7,97; 9,46]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0		Anzahl	618	262	296	230	238	214	232	178	184	177	167	117	155	137	154	128	122	130	131	
		Anteil in %	2,64	1,55	1,83	1,54	1,77	1,72	2,04	1,74	1,97	1,98	1,99	1,47	2,03	1,90	2,26	1,98	2,01	2,24	2,38	
		CI Anteil in %	[2,44; 2,85]	[1,37; 1,74]	[1,62; 2,03]	[1,34; 1,74]	[1,54; 1,99]	[1,49; 1,95]	[1,78; 2,29]	[1,49; 2,00]	[1,69; 2,25]	[1,69; 2,27]	[1,69; 2,28]	[1,21; 1,73]	[1,72; 2,35]	[1,59; 2,22]	[1,91; 2,61]	[1,64; 2,32]	[1,65; 2,36]	[1,86; 2,62]	[1,98; 2,78]	

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736
	auswertbar	Anzahl	113208	79684	70611	61132	53748	48258	43826	40359	38515	36367	34396	33473	32006	30520	29119	27689	26425	25134
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	25255	18792	16673	12360	10100	7964	7631	6493	6204	5376	5369	4649	4268	3657	3677	3012	3107	2819
		Anteil in %	22,31	23,58	23,61	20,22	18,79	16,50	17,41	16,09	16,11	14,78	15,61	13,89	13,33	11,98	12,63	10,88	11,76	11,22
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[22,07; 22,55]	[23,29; 23,88]	[23,30; 23,93]	[19,90; 20,54]	[18,46; 19,12]	[16,17; 16,83]	[17,06; 17,77]	[15,73; 16,45]	[15,74; 16,48]	[14,42; 15,15]	[15,23; 15,99]	[13,52; 14,26]	[12,96; 13,71]	[11,62; 12,35]	[12,25; 13,01]	[10,51; 11,24]	[11,37; 12,15]	[10,83; 11,61]
		Anzahl	58389	42377	38660	34173	31105	27825	25909	23647	22838	21613	20570	19747	19251	17779	17412	16342	15716	14344
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	51,58	53,18	54,75	55,90	57,87	57,66	59,12	58,59	59,30	59,43	59,80	58,99	60,15	58,25	59,80	59,02	59,47	57,07
		CI Anteil in %	[51,29; 51,87]	[52,83; 53,53]	[54,38; 55,12]	[55,51; 56,29]	[57,45; 58,29]	[57,22; 58,10]	[58,66; 59,58]	[58,11; 59,07]	[58,81; 59,79]	[58,93; 59,93]	[59,29; 60,32]	[58,47; 59,52]	[59,61; 60,68]	[57,70; 58,81]	[59,23; 60,36]	[58,44; 59,60]	[58,88; 60,07]	[56,46; 57,68]
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	17088	11608	9957	9546	8286	8143	6842	6712	6254	6157	5595	5964	5613	5865	5232	5375	4893	5134
		Anteil in %	15,09	14,57	14,10	15,62	15,42	16,87	15,61	16,63	16,24	16,93	16,27	17,82	17,54	19,22	17,97	19,41	18,52	20,43
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[14,89; 15,30]	[14,32; 14,81]	[13,84; 14,36]	[15,33; 15,90]	[15,11; 15,72]	[16,54; 17,21]	[15,27; 15,95]	[16,27; 16,99]	[15,87; 16,61]	[16,54; 17,32]	[15,88; 16,66]	[17,41; 18,23]	[17,12; 17,95]	[18,77; 19,66]	[17,53; 18,41]	[18,95; 19,88]	[18,05; 18,98]	[19,93; 20,92]
		Anzahl	8978	5469	4212	4004	3426	3420	2741	2765	2531	2566	2289	2493	2317	2542	2216	2345	2151	2218
		Anteil in %	7,93	6,86	5,97	6,55	6,37	7,09	6,25	6,85	6,57	7,06	6,65	7,45	7,24	8,33	7,61	8,47	8,14	8,82
		CI Anteil in %	[7,77; 8,09]	[6,69; 7,04]	[5,79; 6,14]	[6,35; 6,75]	[6,17; 6,58]	[6,86; 7,32]	[6,03; 6,48]	[6,60; 7,10]	[6,32; 6,82]	[6,79; 7,32]	[6,39; 6,92]	[7,17; 7,73]	[6,96; 7,52]	[8,02; 8,64]	[7,31; 7,91]	[8,14; 8,80]	[7,81; 8,47]	[8,47; 9,18]
	2004-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232
		auswertbar	Anzahl	134935	112041	100190	86648	80457	74055	68207	65484	61903	58876	57115	54735	52250	49960	47439	45460	43244
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	27057	27684	21468	17425	13773	13299	11104	10736	9646	9437	7807	7261	6375	6409	5040	5473	4821	
		Anteil in %	20,05	24,71	21,43	20,11	17,12	17,96	16,28	16,39	15,58	16,03	13,67	13,27	12,20	12,83	10,62	12,04	11,15	
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5		CI Anteil in %	[19,84; 20,27]	[24,46; 24,96]	[21,17; 21,68]	[19,84; 20,38]	[16,86; 17,38]	[17,68; 18,23]	[16,00; 16,56]	[16,11; 16,68]	[15,30; 15,87]	[15,73; 16,32]	[13,39; 13,95]	[12,98; 13,55]	[11,92; 12,48]	[12,54; 13,12]	[10,35; 10,90]	[11,74; 12,34]	[10,85; 11,45]	
		Anzahl	67344	59799	54928	49067	46464	43699	40209	38727	36721	35413	33918	32940	30695	29563	28120	26961	24907	
erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5		Anteil in %	49,91	53,37	54,82	56,63	57,75	59,01	58,95	59,14	59,32	60,15	59,39	60,18	58,75	59,17	59,28	59,31	57,60	
		CI Anteil in %	[49,64; 50,18]	[53,08; 53,66]	[54,52; 55,13]	[56,30; 56,96]	[57,41; 58,09]	[58,65; 59,36]	[58,58; 59,32]	[58,76; 59,52]	[58,93; 59,71]	[59,75; 60,54]	[58,98; 59,79]	[59,77; 60,59]	[58,32; 59,17]	[58,74; 59,60]	[58,83; 59,72]	[58,86; 59,76]	[57,13; 58,06]	
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0		Anzahl	21558	15191	14902	12766	12688	10882	10623	10132	9874	9035	9698	9189	9554	8866	8957	8119	8442	
		Anteil in %	15,98	13,56	14,87	14,73	15,77	14,69	15,57	15,47	15,95	15,35	16,98	16,79	18,29	17,75	18,88	17,86	19,52	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0		CI Anteil in %	[15,78; 16,17]	[13,36; 13,76]	[14,65; 15,09]	[14,50; 14,97]	[15,52; 16,02]	[14,44; 14,95]	[15,30; 15,85]	[15,20; 15,75]	[15,66; 16,24]	[15,05; 15,64]	[16,67; 17,29]	[16,48; 17,10]	[17,95; 18,62]	[17,41; 18,08]	[18,53; 19,23]	[17,51; 18,21]	[19,15; 19,90]	
		Anzahl	12934	7184	6942	5719	5792	4791	4847	4475	4380	3857	4366	4175	4324	3994	4049	3752	3901	
		Anteil in %	9,59	6,41	6,93	6,60	7,20	6,47	7,11	6,83	7,08	6,55	7,64	7,63	8,28	7,99	8,54	8,25	9,02	
		CI Anteil in %	[9,43; 9,74]	[6,27; 6,56]	[6,77; 7,09]	[6,43; 6,77]	[7,02; 7,38]	[6,29; 6,65]	[6,91; 7,30]	[6,64; 7,03]	[6,87; 7,28]	[6,35; 6,75]	[7,43; 7,86]	[7,41; 7,85]	[8,04; 8,51]	[7,76; 8,23]	[8,28; 8,79]	[8,00; 8,51]	[8,75; 9,29]	
		Anzahl	6042	2183	1950	1671	1740	1384	1424	1414	1282	1134	1326	1170	1302	1128	1273	1155	1173	
		Anteil in %	4,48	1,95	1,95	1,93	2,16	1,87	2,09	2,16	2,07	1,93	2,32	2,14	2,49	2,26	2,68	2,54	2,71	
	CI Anteil in %	[4,37; 4,59]	[1,87; 2,03]	[1,86; 2,03]	[1,84; 2,02]	[2,06; 2,26]	[1,77; 1,97]	[1,98; 2,20]	[2,05; 2,27]	[1,96; 2,18]	[1,82; 2,04]	[2,20; 2,45]	[2,02; 2,26]	[2,36; 2,63]	[2,13; 2,39]	[2,54; 2,83]	[2,40; 2,69]	[2,56; 2,87]		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	105631	93726	83366	74241	68487	64764	61675	58977	56190	53398	50980	48671	46510	44483	42590				
	auswertbar	Anzahl	105465	89625	79897	71982	65460	62043	58187	54652	53098	50749	48356	46131	43969	41983	40051				
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	19732	19665	15402	14255	11925	11292	9889	9467	8122	7571	6310	6326	5138	5480	4835				
		Anteil in %	18,71	21,94	19,28	19,80	18,22	18,20	17,00	17,32	15,30	14,92	13,05	13,71	11,69	13,05	12,07				
	CI Anteil in %	[18,47; 18,94]	[21,67; 22,21]	[19,00; 19,55]	[19,51; 20,09]	[17,92; 18,51]	[17,90; 18,50]	[16,69; 17,30]	[17,01; 17,64]	[14,99; 15,60]	[14,61; 15,23]	[12,75; 13,35]	[13,40; 14,03]	[11,39; 11,99]	[12,73; 13,38]	[11,75; 12,39]					
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	53412	49312	44798	41640	37959	36302	33963	32510	31156	30393	28374	27530	26066	24922	23196				
		Anteil in %	50,64	55,02	56,07	57,85	57,99	58,51	58,37	59,49	58,68	59,89	58,68	59,68	59,28	59,36	57,92				
	CI Anteil in %	[50,34; 50,95]	[54,69; 55,35]	[55,73; 56,41]	[57,49; 58,21]	[57,61; 58,37]	[58,12; 58,90]	[57,97; 58,77]	[59,07; 59,90]	[58,26; 59,10]	[59,46; 60,32]	[58,24; 59,12]	[59,23; 60,13]	[58,82; 59,74]	[58,89; 59,83]	[57,43; 58,40]					
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	16269	12686	11856	9993	9617	9006	9015	8035	8582	8053	8523	7750	7973	7190	7298				
		Anteil in %	15,43	14,15	14,84	13,88	14,69	14,52	15,49	14,70	16,16	15,87	17,63	16,80	18,13	17,13	18,22				
	CI Anteil in %	[15,21; 15,64]	[13,93; 14,38]	[14,59; 15,09]	[13,63; 14,14]	[14,42; 14,96]	[14,24; 14,79]	[15,20; 15,79]	[14,41; 15,00]	[15,85; 16,48]	[15,55; 16,19]	[17,29; 17,97]	[16,46; 17,14]	[17,77; 18,49]	[16,77; 17,49]	[17,84; 18,60]					
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	10207	6022	5876	4563	4506	4078	4056	3549	4002	3615	3886	3451	3592	3355	3619				
		Anteil in %	9,68	6,72	7,35	6,34	6,88	6,57	6,97	6,49	7,54	7,12	8,04	7,48	8,17	7,99	9,04				
	CI Anteil in %	[9,50; 9,86]	[6,56; 6,88]	[7,17; 7,54]	[6,16; 6,52]	[6,69; 7,08]	[6,38; 6,77]	[6,76; 7,18]	[6,29; 6,70]	[7,31; 7,76]	[6,90; 7,35]	[7,79; 8,28]	[7,24; 7,72]	[7,91; 8,43]	[7,73; 8,25]	[8,76; 9,32]					
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	5845	1940	1965	1531	1453	1365	1264	1091	1236	1117	1263	1074	1200	1036	1103					
	Anteil in %	5,54	2,16	2,46	2,13	2,22	2,20	2,17	2,00	2,33	2,20	2,61	2,33	2,73	2,47	2,75					
CI Anteil in %	[5,40; 5,68]	[2,07; 2,26]	[2,35; 2,57]	[2,02; 2,23]	[2,11; 2,33]	[2,08; 2,32]	[2,05; 2,29]	[1,88; 2,11]	[2,20; 2,46]	[2,07; 2,33]	[2,47; 2,75]	[2,19; 2,47]	[2,58; 2,88]	[2,32; 2,62]	[2,59; 2,91]						
2005-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545					
	auswertbar	Anzahl	82140	70605	63009	56714	53433	50039	47018	45361	43131	40967	38986	37104	35405	33739					
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	14900	13961	12965	10659	10240	8912	8298	7111	6594	5636	5570	4391	4733	4278					
		Anteil in %	18,14	19,77	20,58	18,79	19,16	17,81	17,65	15,68	15,29	13,76	14,29	11,83	13,37	12,68					
	CI Anteil in %	[17,88; 18,40]	[19,48; 20,07]	[20,26; 20,89]	[18,47; 19,12]	[18,83; 19,50]	[17,47; 18,15]	[17,30; 17,99]	[15,34; 16,01]	[14,95; 15,63]	[13,42; 14,09]	[13,94; 14,63]	[11,51; 12,16]	[13,01; 13,72]	[12,32; 13,03]						
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	42673	38814	35645	32420	30577	28799	27559	26371	25548	23743	22839	21791	20817	19379					
		Anteil in %	51,95	54,97	56,57	57,16	57,22	57,55	58,61	58,14	59,23	57,96	58,58	58,73	58,80	57,44					
	CI Anteil in %	[51,61; 52,29]	[54,61; 55,34]	[56,18; 56,96]	[56,76; 57,57]	[56,81; 57,64]	[57,12; 57,99]	[58,17; 59,06]	[57,68; 58,59]	[58,77; 59,70]	[57,48; 58,43]	[58,09; 59,07]	[58,23; 59,23]	[58,28; 59,31]	[56,91; 57,97]						
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	12402	10454	8818	8271	7727	7491	6980	7312	6766	7109	6592	6639	6095	6046					
		Anteil in %	15,10	14,81	13,99	14,58	14,46	14,97	14,85	16,12	15,69	17,35	16,91	17,89	17,22	17,92					
	CI Anteil in %	[14,85; 15,34]	[14,54; 15,07]	[13,72; 14,27]	[14,29; 14,87]	[14,16; 14,76]	[14,66; 15,28]	[14,52; 15,17]	[15,78; 16,46]	[15,34; 16,03]	[16,99; 17,72]	[16,54; 17,28]	[17,50; 18,28]	[16,82; 17,61]	[17,51; 18,33]						
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	7544	5443	4185	4000	3658	3663	3170	3424	3230	3362	3034	3196	2851	3051					
		Anteil in %	9,18	7,71	6,64	7,05	6,85	7,32	6,74	7,55	7,49	8,21	7,78	8,61	8,05	9,04					
	CI Anteil in %	[8,99; 9,38]	[7,51; 7,91]	[6,45; 6,84]	[6,84; 7,26]	[6,63; 7,06]	[7,09; 7,55]	[6,52; 6,97]	[7,31; 7,79]	[7,24; 7,74]	[7,94; 8,47]	[7,52; 8,05]	[8,33; 8,90]	[7,77; 8,34]	[8,74; 9,35]						
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	4621	1933	1396	1364	1231	1174	1011	1143	993	1117	951	1087	909	985						
	Anteil in %	5,63	2,74	2,22	2,41	2,30	2,35	2,15	2,52	2,30	2,73	2,44	2,93	2,57	2,92						
CI Anteil in %	[5,47; 5,78]	[2,62; 2,86]	[2,10; 2,33]	[2,28; 2,53]	[2,18; 2,43]	[2,21; 2,48]	[2,02; 2,28]	[2,38; 2,66]	[2,16; 2,44]	[2,57; 2,88]	[2,29; 2,59]	[2,76; 3,10]	[2,40; 2,73]	[2,74; 3,10]							

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138						
	auswertbar	Anzahl	93890	81896	74472	68451	63522	60826	57576	54282	51514	48814	46443	44023						
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	15746	15779	14502	12542	11807	9846	9186	7628	7569	6082	6405	5708						
		Anteil in %	16,77	19,27	19,47	18,32	18,59	16,19	15,95	14,05	14,69	12,46	13,79	12,97						
	CI Anteil in %	[16,53; 17,01]	[19,00; 19,54]	[19,19; 19,76]	[18,03; 18,61]	[18,28; 18,89]	[15,66; 16,25]	[13,76; 14,34]	[14,39; 15,00]	[12,17; 12,75]	[13,48; 14,10]	[12,65; 13,28]								
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	50830	45969	42462	39296	37167	35666	34091	31548	30610	28937	27491	25442						
		Anteil in %	54,14	56,13	57,02	57,41	58,51	58,64	59,21	58,12	59,42	59,28	59,19	57,79						
	CI Anteil in %	[53,82; 54,46]	[55,79; 56,47]	[56,66; 57,37]	[57,04; 57,78]	[58,13; 58,89]	[58,24; 59,03]	[58,81; 59,61]	[57,70; 58,53]	[59,00; 59,84]	[58,84; 59,72]	[58,75; 59,64]	[57,33; 58,25]							
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	13890	11726	10414	9960	8937	9221	8693	8987	8081	8258	7506	7664						
		Anteil in %	14,79	14,32	13,98	14,55	14,07	15,16	15,10	16,56	15,69	16,92	16,16	17,41						
	CI Anteil in %	[14,57; 15,02]	[14,08; 14,56]	[13,73; 14,23]	[14,29; 14,81]	[13,80; 14,34]	[14,87; 15,44]	[14,81; 15,39]	[16,24; 16,87]	[15,37; 16,00]	[16,58; 17,25]	[15,83; 16,50]	[17,05; 17,76]							
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	8282	6115	5171	4881	4181	4491	4193	4543	3846	4065	3712	3858						
		Anteil in %	8,82	7,47	6,94	7,13	6,58	7,38	7,28	8,37	7,47	8,33	7,99	8,76						
	CI Anteil in %	[8,64; 9,00]	[7,29; 7,65]	[6,76; 7,13]	[6,94; 7,32]	[6,39; 6,77]	[7,18; 7,59]	[7,07; 7,49]	[8,14; 8,60]	[7,24; 7,69]	[8,08; 8,57]	[7,75; 8,24]	[8,50; 9,03]							
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	5142	2307	1923	1772	1430	1602	1413	1576	1408	1472	1329	1351							
	Anteil in %	5,48	2,82	2,58	2,59	2,25	2,63	2,45	2,90	2,73	3,02	2,86	3,07							
CI Anteil in %	[5,33; 5,62]	[2,70; 2,93]	[2,47; 2,70]	[2,47; 2,71]	[2,14; 2,37]	[2,51; 2,76]	[2,33; 2,58]	[2,76; 3,04]	[2,59; 2,87]	[2,86; 3,17]	[2,71; 3,01]	[2,91; 3,23]								
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740							
	auswertbar	Anzahl	98869	86412	77816	71556	68342	64278	60475	57155	54030	51458	48846							
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	16038	18327	15589	14557	12071	11163	9334	9205	7355	7732	6825							
		Anteil in %	16,22	21,21	20,03	20,34	17,66	17,37	15,43	16,11	13,61	15,03	13,97							
	CI Anteil in %	[15,99; 16,45]	[20,94; 21,48]	[19,75; 20,31]	[20,05; 20,64]	[17,38; 17,95]	[17,07; 17,66]	[15,15; 15,72]	[15,80; 16,41]	[13,32; 13,90]	[14,72; 15,33]	[13,67; 14,28]								
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	52105	48327	44117	41316	39770	37950	35249	33808	32040	30438	28206							
		Anteil in %	52,70	55,93	56,69	57,74	58,19	59,04	58,29	59,15	59,30	59,15	57,74							
	CI Anteil in %	[52,39; 53,01]	[55,60; 56,26]	[56,35; 57,04]	[57,38; 58,10]	[57,82; 58,56]	[58,66; 59,42]	[57,89; 58,68]	[58,75; 59,55]	[58,89; 59,71]	[58,73; 59,58]	[57,31; 58,18]								
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	14558	11383	10606	9353	9703	9087	9451	8550	8636	7930	8151							
		Anteil in %	14,72	13,17	13,63	13,07	14,20	14,14	15,63	14,96	15,98	15,41	16,69							
	CI Anteil in %	[14,50; 14,95]	[12,95; 13,40]	[13,39; 13,87]	[12,82; 13,32]	[13,94; 14,46]	[13,87; 14,41]	[15,34; 15,92]	[14,67; 15,25]	[15,67; 16,29]	[15,10; 15,72]	[16,36; 17,02]								
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	9657	6066	5507	4637	5014	4526	4838	4151	4387	3943	4148							
		Anteil in %	9,77	7,02	7,08	6,48	7,34	7,04	8,00	7,26	8,12	7,66	8,49							
	CI Anteil in %	[9,58; 9,95]	[6,85; 7,19]	[6,90; 7,26]	[6,30; 6,66]	[7,14; 7,53]	[6,84; 7,24]	[7,78; 8,22]	[7,05; 7,48]	[7,89; 8,35]	[7,43; 7,89]	[8,24; 8,74]								
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	6511	2309	1997	1693	1784	1552	1603	1441	1612	1415	1516								
	Anteil in %	6,59	2,67	2,57	2,37	2,61	2,41	2,65	2,52	2,98	2,75	3,10								
CI Anteil in %	[6,43; 6,74]	[2,56; 2,78]	[2,46; 2,68]	[2,25; 2,48]	[2,49; 2,73]	[2,30; 2,53]	[2,52; 2,78]	[2,39; 2,65]	[2,84; 3,13]	[2,61; 2,89]	[2,95; 3,26]									

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783										
	auswertbar	Anzahl	99391	85456	78996	72781	67724	63521	59809	56580	53450										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	16398	19227	16082	14311	11959	11570	9344	9567	8441										
		Anteil in %	16,50	22,50	20,36	19,66	17,66	18,21	15,62	16,91	15,79										
	CI Anteil in %	[16,27; 16,73]	[22,22; 22,78]	[20,08; 20,64]	[19,37; 19,95]	[17,37; 17,95]	[17,37; 17,95]	[17,91; 18,51]	[15,33; 15,91]	[16,60; 17,22]	[15,48; 16,10]										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	53029	48565	45339	43105	39874	37981	35947	34014	31533										
		Anteil in %	53,35	56,83	57,39	59,23	58,88	59,79	60,10	60,12	59,00										
	CI Anteil in %	[53,04; 53,66]	[56,50; 57,16]	[57,05; 57,74]	[58,87; 59,58]	[58,51; 59,25]	[59,41; 60,17]	[59,71; 60,50]	[59,71; 60,52]	[58,58; 59,41]											
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	13758	10111	10299	9161	9321	8333	8618	7693	7933										
		Anteil in %	13,84	11,83	13,04	12,59	13,76	13,12	14,41	13,60	14,84										
	CI Anteil in %	[13,63; 14,06]	[11,62; 12,05]	[12,80; 13,27]	[12,35; 12,83]	[13,50; 14,02]	[12,86; 13,38]	[14,13; 14,69]	[13,31; 13,88]	[14,54; 15,14]											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	9367	5390	5211	4653	4838	4183	4238	3888	4000										
		Anteil in %	9,42	6,31	6,60	6,39	7,14	6,59	7,09	6,87	7,48										
	CI Anteil in %	[9,24; 9,61]	[6,14; 6,47]	[6,42; 6,77]	[6,22; 6,57]	[6,95; 7,34]	[6,39; 6,78]	[6,88; 7,29]	[6,66; 7,08]	[7,26; 7,71]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	6839	2163	2065	1551	1732	1454	1662	1418	1543											
	Anteil in %	6,88	2,53	2,61	2,13	2,56	2,29	2,78	2,51	2,89											
CI Anteil in %	[6,72; 7,04]	[2,43; 2,64]	[2,50; 2,73]	[2,03; 2,24]	[2,44; 2,68]	[2,17; 2,41]	[2,65; 2,91]	[2,38; 2,63]	[2,74; 3,03]												
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871											
	auswertbar	Anzahl	67466	58974	53319	49185	46007	43152	40831	38594											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	12301	12669	11247	9399	9115	7126	7422	6550											
		Anteil in %	18,23	21,48	21,09	19,11	19,81	16,51	18,18	16,97											
	CI Anteil in %	[17,94; 18,52]	[21,15; 21,81]	[20,75; 21,44]	[18,76; 19,46]	[19,45; 20,18]	[16,16; 16,86]	[17,80; 18,55]	[16,60; 17,35]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	37181	33855	31613	29155	27445	26405	24654	23111											
		Anteil in %	55,11	57,41	59,29	59,28	59,65	61,19	60,38	59,88											
	CI Anteil in %	[54,74; 55,49]	[57,01; 57,81]	[58,87; 59,71]	[58,84; 59,71]	[59,21; 60,10]	[60,73; 61,65]	[59,91; 60,86]	[59,39; 60,37]												
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	8388	7081	6167	6332	5641	5741	5227	5253											
		Anteil in %	12,43	12,01	11,57	12,87	12,26	13,30	12,80	13,61											
	CI Anteil in %	[12,18; 12,68]	[11,74; 12,27]	[11,29; 11,84]	[12,58; 13,17]	[11,96; 12,56]	[12,98; 13,62]	[12,48; 13,13]	[13,27; 13,95]												
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	5436	3803	3178	3097	2764	2798	2523	2672											
		Anteil in %	8,06	6,45	5,96	6,30	6,01	6,48	6,18	6,92											
	CI Anteil in %	[7,85; 8,26]	[6,25; 6,65]	[5,76; 6,16]	[6,08; 6,51]	[5,79; 6,22]	[6,25; 6,72]	[5,95; 6,41]	[6,67; 7,18]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	4160	1566	1114	1202	1042	1082	1005	1008												
	Anteil in %	6,17	2,66	2,09	2,44	2,26	2,51	2,46	2,61												
CI Anteil in %	[5,98; 6,35]	[2,53; 2,79]	[1,97; 2,21]	[2,31; 2,58]	[2,13; 2,40]	[2,36; 2,65]	[2,31; 2,61]	[2,45; 2,77]													

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2009-1	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527													
	auswertbar	Anzahl	74018	65441	59852	55551	52235	49051	46614	44161													
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	13354	13873	12438	10555	10108	7866	8392	7622													
		Anteil in %	18,04	21,20	20,78	19,00	19,35	16,04	18,00	17,26													
		CI Anteil in %	[17,76; 18,32]	[20,89; 21,51]	[20,46; 21,11]	[18,67; 19,33]	[19,01; 19,69]	[15,71; 16,36]	[17,65; 18,35]	[16,91; 17,61]													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	44096	39526	36884	34323	32526	31153	29287	27351													
		Anteil in %	59,57	60,40	61,63	61,79	62,27	63,51	62,83	61,93													
		CI Anteil in %	[59,22; 59,93]	[60,02; 60,77]	[61,24; 62,01]	[61,38; 62,19]	[61,85; 62,68]	[63,09; 63,94]	[62,39; 63,27]	[61,48; 62,39]													
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	8667	7272	6569	6497	5898	6166	5537	5616													
		Anteil in %	11,71	11,11	10,98	11,70	11,29	12,57	11,88	12,72													
		CI Anteil in %	[11,48; 11,94]	[10,87; 11,35]	[10,72; 11,23]	[11,43; 11,96]	[11,02; 11,56]	[12,28; 12,86]	[11,58; 12,17]	[12,41; 13,03]													
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	4732	3444	2920	3124	2738	2830	2526	2617													
		Anteil in %	6,39	5,26	4,88	5,62	5,24	5,77	5,42	5,93													
		CI Anteil in %	[6,22; 6,57]	[5,09; 5,43]	[4,71; 5,05]	[5,43; 5,82]	[5,05; 5,43]	[5,56; 5,98]	[5,21; 5,62]	[5,71; 6,15]													
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	3169	1326	1041	1052	965	1036	872	955													
		Anteil in %	4,28	2,03	1,74	1,89	1,85	2,11	1,87	2,16													
		CI Anteil in %	[4,14; 4,43]	[1,92; 2,13]	[1,63; 1,84]	[1,78; 2,01]	[1,73; 1,96]	[1,98; 2,24]	[1,75; 1,99]	[2,03; 2,30]													
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446														
	auswertbar	Anzahl	72143	62456	56477	52140	48646	45707	43129														
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	11762	14368	12039	11410	9052	9381	8067														
		Anteil in %	16,30	23,00	21,32	21,88	18,61	20,52	18,70														
		CI Anteil in %	[16,03; 16,57]	[22,67; 23,34]	[20,98; 21,65]	[21,53; 22,24]	[18,26; 18,95]	[20,15; 20,89]	[18,34; 19,07]														
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	39049	36244	32980	30930	29627	27351	25533														
		Anteil in %	54,13	58,03	58,40	59,32	60,90	59,84	59,20														
		CI Anteil in %	[53,76; 54,49]	[57,64; 58,42]	[57,99; 58,80]	[58,90; 59,74]	[60,47; 61,34]	[59,39; 60,29]	[58,74; 59,67]														
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	9316	6840	6686	5863	5832	5336	5707														
		Anteil in %	12,91	10,95	11,84	11,24	11,99	11,67	13,23														
		CI Anteil in %	[12,67; 13,16]	[10,71; 11,20]	[11,57; 12,10]	[10,97; 11,52]	[11,70; 12,28]	[11,38; 11,97]	[12,91; 13,55]														
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	6489	3530	3420	2877	2973	2635	2735															
	Anteil in %	8,99	5,65	6,06	5,52	6,11	5,76	6,34															
	CI Anteil in %	[8,79; 9,20]	[5,47; 5,83]	[5,86; 6,25]	[5,32; 5,71]	[5,90; 6,32]	[5,55; 5,98]	[6,11; 6,57]															
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	5527	1474	1352	1060	1162	1004	1087															
	Anteil in %	7,66	2,36	2,39	2,03	2,39	2,20	2,52															
	CI Anteil in %	[7,47; 7,86]	[2,24; 2,48]	[2,27; 2,52]	[1,91; 2,15]	[2,25; 2,52]	[2,06; 2,33]	[2,37; 2,67]															
weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078															
auswertbar	Anzahl	76828	67358	61579	57009	53376	50479	47774															
normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	12870	14924	12727	11984	9525	9991	8958															
	Anteil in %	16,75	22,16	20,67	21,02	17,85	19,79	18,75															
	CI Anteil in %	[16,49; 17,02]	[21,84; 22,47]	[20,35; 20,99]	[20,69; 21,36]	[17,52; 18,17]	[19,44; 20,14]	[18,40; 19,10]															
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	45946	41054	37727	35438	33959	31660	29732															
	Anteil in %	59,80	60,95	61,27	62,16	63,62	62,72	62,23															
	CI Anteil in %	[59,46; 60,15]	[60,58; 61,32]	[60,88; 61,65]	[61,76; 62,56]	[63,21; 64,03]	[62,30; 63,14]	[61,80; 62,67]															
erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	9168	6974	6726	5930	6107	5451	5535															
	Anteil in %	11,93	10,35	10,92	10,40	11,44	10,80	11,59															
	CI Anteil in %	[11,70; 12,16]	[10,12; 10,58]	[10,68; 11,17]	[10,15; 10,65]	[11,17; 11,71]	[10,53; 11,07]	[11,30; 11,87]															
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	5256	3216	3220	2636	2715	2434	2606															
	Anteil in %	6,84	4,77	5,23	4,62	5,09	4,82	5,45															
	CI Anteil in %	[6,66; 7,02]	[4,61; 4,94]	[5,05; 5,40]	[4,45; 4,80]	[4,90; 5,27]	[4,63; 5,01]	[5,25; 5,66]															
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	3588	1190	1179	1021	1070	943	943															
	Anteil in %	4,67	1,77	1,91	1,79	2,00	1,87	1,97															
	CI Anteil in %	[4,52; 4,82]	[1,67; 1,87]	[1,81; 2,02]	[1,68; 1,90]	[1,89; 2,12]	[1,75; 1,99]	[1,85; 2,10]															

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280														
	auswertbar	Anzahl	66176	57603	51807	47624	44727	41966														
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	10846	11845	11084	8557	8899	7827														
		Anteil in %	16,39	20,56	21,39	17,97	19,90	18,65														
	CI Anteil in %	[16,11; 16,67]	[20,23; 20,89]	[21,04; 21,75]	[17,62; 18,31]	[19,53; 20,27]	[18,28; 19,02]															
		CI Anteil in %																				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	36946	33354	30514	28792	26696	24781														
		Anteil in %	55,83	57,90	58,90	60,46	59,69	59,05														
	CI Anteil in %	[55,45; 56,21]	[57,50; 58,31]	[58,48; 59,32]	[60,02; 60,90]	[59,23; 60,14]	[58,58; 59,52]															
		CI Anteil in %																				
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	8397	6976	5890	5897	5259	5394														
		Anteil in %	12,69	12,11	11,37	12,38	11,76	12,85														
	CI Anteil in %	[12,44; 12,94]	[11,84; 12,38]	[11,10; 11,64]	[12,09; 12,68]	[11,46; 12,06]	[12,53; 13,17]															
		CI Anteil in %																				
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	5558	3853	3168	3090	2818	2797														
		Anteil in %	8,40	6,69	6,12	6,49	6,30	6,66														
	CI Anteil in %	[8,19; 8,61]	[6,48; 6,89]	[5,91; 6,32]	[6,27; 6,71]	[6,08; 6,53]	[6,43; 6,90]															
		CI Anteil in %																				
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	4429	1575	1151	1288	1055	1167															
	Anteil in %	6,69	2,73	2,22	2,70	2,36	2,78															
CI Anteil in %	[6,50; 6,88]	[2,60; 2,87]	[2,09; 2,35]	[2,56; 2,85]	[2,22; 2,50]	[2,62; 2,94]																
	CI Anteil in %																					
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460															
	auswertbar	Anzahl	75856	66392	60057	55542	51955															
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	11060	14904	11595	11841	10409															
		Anteil in %	14,58	22,45	19,31	21,32	20,03															
	CI Anteil in %	[14,33; 14,83]	[22,13; 22,77]	[18,99; 19,62]	[20,98; 21,66]	[19,69; 20,38]																
		CI Anteil in %																				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	42086	38646	36281	33156	30775															
		Anteil in %	55,48	58,21	60,41	59,70	59,23															
	CI Anteil in %	[55,13; 55,84]	[57,83; 58,58]	[60,02; 60,80]	[59,29; 60,10]	[58,81; 59,66]																
		CI Anteil in %																				
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	9879	7272	6912	6144	6242															
		Anteil in %	13,02	10,95	11,51	11,06	12,01															
	CI Anteil in %	[12,78; 13,26]	[10,72; 11,19]	[11,25; 11,76]	[10,80; 11,32]	[11,73; 12,29]																
		CI Anteil in %																				
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	7012	3983	3708	3066	3242															
		Anteil in %	9,24	6,00	6,17	5,52	6,24															
	CI Anteil in %	[9,04; 9,45]	[5,82; 6,18]	[5,98; 6,37]	[5,33; 5,71]	[6,03; 6,45]																
		CI Anteil in %																				
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	5819	1587	1561	1335	1287																
	Anteil in %	7,67	2,39	2,60	2,40	2,48																
CI Anteil in %	[7,48; 7,86]	[2,27; 2,51]	[2,47; 2,73]	[2,28; 2,53]	[2,34; 2,61]																	
	CI Anteil in %																					

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365															
	auswertbar	Anzahl	79867	71081	65001	60608	56828															
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	12244	15307	12110	12459	11164															
		Anteil in %	15,33	21,53	18,63	20,56	19,65															
	CI Anteil in %	[15,08; 15,58]	[21,23; 21,84]	[18,33; 18,93]	[20,23; 20,88]	[19,32; 19,97]																
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	48670	43516	41060	37756	35355															
		Anteil in %	60,94	61,22	63,17	62,30	62,21															
	CI Anteil in %	[60,60; 61,28]	[60,86; 61,58]	[62,80; 63,54]	[61,91; 62,68]	[61,82; 62,61]																
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	9556	7355	7229	6381	6252															
		Anteil in %	11,96	10,35	11,12	10,53	11,00															
	CI Anteil in %	[11,74; 12,19]	[10,12; 10,57]	[10,88; 11,36]	[10,28; 10,77]	[10,74; 11,26]																
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	5632	3551	3299	2909	2946															
		Anteil in %	7,05	5,00	5,08	4,80	5,18															
	CI Anteil in %	[6,87; 7,23]	[4,84; 5,16]	[4,91; 5,24]	[4,63; 4,97]	[5,00; 5,37]																
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	3765	1352	1303	1103	1111															
		Anteil in %	4,71	1,90	2,00	1,82	1,96															
	CI Anteil in %	[4,57; 4,86]	[1,80; 2,00]	[1,90; 2,11]	[1,71; 1,93]	[1,84; 2,07]																
	2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	61608	55900	51784															
		auswertbar	Anzahl	68224	60084	54397	50235															
		normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	10479	11221	11512	9988															
			Anteil in %	15,36	18,68	21,16	19,88															
		CI Anteil in %	[15,09; 15,63]	[18,36; 18,99]	[20,82; 21,51]	[19,53; 20,23]																
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5		Anzahl	38551	35987	32244	29635																
		Anteil in %	56,51	59,89	59,28	58,99																
CI Anteil in %		[56,13; 56,88]	[59,50; 60,29]	[58,86; 59,69]	[58,56; 59,42]																	
erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5		Anzahl	8765	7267	6130	6025																
		Anteil in %	12,85	12,09	11,27	11,99																
CI Anteil in %		[12,60; 13,10]	[11,83; 12,36]	[11,00; 11,53]	[11,71; 12,28]																	
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0		Anzahl	5831	3892	3195	3255																
		Anteil in %	8,55	6,48	5,87	6,48																
CI Anteil in %		[8,34; 8,76]	[6,28; 6,67]	[5,68; 6,07]	[6,26; 6,69]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0		Anzahl	4598	1717	1316	1332																
		Anteil in %	6,74	2,86	2,42	2,65																
CI Anteil in %		[6,55; 6,93]	[2,72; 2,99]	[2,29; 2,55]	[2,51; 2,79]																	
2010-2		weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	66943	61246	56909															
		auswertbar	Anzahl	73269	65460	59709	55387															
		normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	11468	11774	12273	11038															
			Anteil in %	15,65	17,99	20,55	19,93															
		CI Anteil in %	[15,39; 15,92]	[17,69; 18,28]	[20,23; 20,88]	[19,60; 20,26]																
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	44839	41328	37182	34296																
		Anteil in %	61,20	63,13	62,27	61,92																
	CI Anteil in %	[60,84; 61,55]	[62,77; 63,50]	[61,88; 62,66]	[61,52; 62,33]																	
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	8601	7307	6192	6212																
		Anteil in %	11,74	11,16	10,37	11,22																
	CI Anteil in %	[11,51; 11,97]	[10,92; 11,40]	[10,13; 10,61]	[10,95; 11,48]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	5114	3636	2989	2793																
		Anteil in %	6,98	5,55	5,01	5,04																
	CI Anteil in %	[6,80; 7,16]	[5,38; 5,73]	[4,83; 5,18]	[4,86; 5,22]																	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	3247	1415	1073	1048																
		Anteil in %	4,43	2,16	1,80	1,89																
	CI Anteil in %	[4,28; 4,58]	[2,05; 2,27]	[1,69; 1,90]	[1,78; 2,01]																	

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	66585	60521																			
	auswertbar	Anzahl	74007	64892	58552																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	9700	14760	12673																			
		Anteil in %		13,11	22,75	21,64																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %		[12,86; 13,35]	[22,42; 23,07]	[21,31; 21,98]																		
		Anzahl	42408	37704	34111																			
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %		57,30	58,10	58,26																		
		CI Anteil in %		[56,95; 57,66]	[57,72; 58,48]	[57,86; 58,66]																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	9521	7034	6676																			
		Anteil in %		12,86	10,84	11,40																		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %		[12,62; 13,11]	[10,60; 11,08]	[11,14; 11,66]																		
		Anzahl	6586	3740	3559																			
		Anteil in %		8,90	5,76	6,08																		
		CI Anteil in %		[8,69; 9,10]	[5,58; 5,94]	[5,88; 6,27]																		
	2011-2	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	72558	66610																		
auswertbar		Anzahl	79337	70903	64623																			
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	11054	15689	14027																			
		Anteil in %		13,93	22,13	21,71																		
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5		CI Anteil in %		[13,69; 14,17]	[21,82; 22,43]	[21,39; 22,02]																		
		Anzahl	49520	43415	39584																			
erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5		Anteil in %		62,42	61,23	61,25																		
		CI Anteil in %		[62,08; 62,75]	[60,87; 61,59]	[60,88; 61,63]																		
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0		Anzahl	9333	6943	6564																			
		Anteil in %		11,76	9,79	10,16																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0		CI Anteil in %		[11,54; 11,99]	[9,57; 10,01]	[9,92; 10,39]																		
		Anzahl	5401	3484	3171																			
		Anteil in %		6,81	4,91	4,91																		
		CI Anteil in %		[6,63; 6,98]	[4,75; 5,07]	[4,74; 5,07]																		
2011-2		männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67230	60721																			
	auswertbar	Anzahl	67079	58992																				
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	9916	12387																				
		Anteil in %		14,78	21,00																			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %		[14,51; 15,05]	[20,67; 21,33]																			
		Anzahl	38196	33986																				
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %		56,94	57,61																			
		CI Anteil in %		[56,57; 57,32]	[57,21; 58,01]																			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	8256	6931																				
		Anteil in %		12,31	11,75																			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %		[12,06; 12,56]	[11,49; 12,01]																			
		Anzahl	5887	3956																				
		Anteil in %		8,78	6,71																			
		CI Anteil in %		[8,56; 8,99]	[6,50; 6,91]																			
		Anzahl	4824	1732																				
Anteil in %			7,19	2,94																				
	CI Anteil in %		[7,00; 7,39]	[2,80; 3,07]																				

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465	66497																		
	auswertbar	Anzahl	72339	64710																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	10877	13509																		
		Anteil in %		15,04	20,88																	
		CI Anteil in %		[14,78; 15,30]	[20,56; 21,19]																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	44635	39325																		
		Anteil in %		61,70	60,77																	
		CI Anteil in %		[61,35; 62,06]	[60,39; 61,15]																	
	erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	8440	6936																		
		Anteil in %		11,67	10,72																	
		CI Anteil in %		[11,43; 11,90]	[10,48; 10,96]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	4896	3505																		
		Anteil in %		6,77	5,42																	
		CI Anteil in %		[6,59; 6,95]	[5,24; 5,59]																	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	3491	1435																		
		Anteil in %		4,83	2,22																	
		CI Anteil in %		[4,67; 4,98]	[2,10; 2,33]																	
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714																			
	auswertbar	Anzahl	74584																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	10960																			
Anteil in %			14,69																			
CI Anteil in %			[14,44; 14,95]																			
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	41040																				
	Anteil in %		55,03																			
	CI Anteil in %		[54,67; 55,38]																			
erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	9416																				
	Anteil in %		12,62																			
	CI Anteil in %		[12,39; 12,86]																			
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	6789																				
	Anteil in %		9,10																			
	CI Anteil in %		[8,90; 9,31]																			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	6379																				
	Anteil in %		8,55																			
	CI Anteil in %		[8,35; 8,75]																			
weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879																				
auswertbar	Anzahl	77737																				
normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	12188																				
	Anteil in %		15,68																			
	CI Anteil in %		[15,42; 15,93]																			
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	47197																				
	Anteil in %		60,71																			
	CI Anteil in %		[60,37; 61,06]																			
erhöhtes Risiko 1 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	8853																				
	Anteil in %		11,39																			
	CI Anteil in %		[11,17; 11,61]																			
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	5530																				
	Anteil in %		7,11																			
	CI Anteil in %		[6,93; 7,29]																			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	3969																				
	Anteil in %		5,11																			
	CI Anteil in %		[4,95; 5,26]																			

In der folgenden Tabelle 3.2.3 ist die Entwicklung der **Serum-Kreatinin-Werte** ausgewiesen. Zu beachten ist dabei, dass diese Werte erst im neuen Dokumentationsbogen nach der 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung erhoben wurden. Für jede Kohorte können die entsprechenden Werte daher erst ab dem Berichtshalbjahr 2004-2 ausgewiesen werden. Die ersten Zeilen beziehen sich auf die Unterteilung der Patienten in zwei spezifische Untergruppen. Zunächst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zur Serum-Kreatinin-Untersuchung vorliegen (erhobener und plausibler Wert gemäß Tabelle 0.1.2 bzw. die Angabe, dass keine Untersuchung erfolgte).

Diese „auswertbaren“ Patienten werden wiederum in zwei Gruppen unterteilt: Zunächst wird ausgewiesen, wie viele Patienten nicht auf Serum-Kreatinin untersucht wurden und welchen Anteil an den „auswertbaren“ Patienten diese Personengruppe ausmacht. Anschließend wird ausgewiesen, bei wie vielen Patienten die Serum-Kreatinin-Werte erhoben wurden und plausible Ergebnisse dokumentiert sind („untersuchte Patienten“). Diese Anzahl entspricht der Fallbasis für Berechnung von arithmetischem Mittel und Median. Die patientenbezogenen mittlere Differenz zwischen dem Serum-Kreatinin-Wert im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr kann dabei erst für Kohorten ab dem Beitrittsjahr 2004-2 dargestellt werden und beträgt im Beitrittsjahr selbst definitionsgemäß Null. Zudem ist für diese Größe die Fallbasis gesondert angegeben: Da für diese Differenz Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen müssen, kann die Fallzahl geringer ausfallen als die Anzahl der untersuchten Patienten.

Tabelle 3.2.3 Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	männl. Patienten insges.	Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933		
	auswertbar	Anzahl	96729	81953	71835	64629	58330	53182	50863	47636	44961	43450	41537	39650	37958	36100	34552	32833		
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11275	8666	9576	7444	7781	6113	7005	5539	5384	4861	5445	4190	4635	3528	4097	2923		
		Anteil in %	11,66	10,57	13,33	11,52	13,34	11,49	13,77	11,63	11,97	11,19	13,11	10,57	12,21	9,77	11,86	8,90		
		CI Anteil in %	[11,45; 11,86]	[10,36; 10,78]	[13,08; 13,58]	[11,27; 11,76]	[13,06; 13,62]	[11,22; 11,77]	[13,47; 14,07]	[11,34; 11,92]	[11,67; 12,27]	[10,89; 11,48]	[12,78; 13,43]	[10,26; 10,87]	[11,88; 12,54]	[9,47; 10,08]	[11,52; 12,20]	[8,59; 9,21]		
	untersuchte Patienten	Anzahl	85454	73287	62259	57185	50549	47069	43858	42097	39577	38589	36092	35460	33323	32572	30455	29910		
		Mean	108,82	104,34	100,96	100,65	99,35	100,39	99,77	100,38	99,47	100,38	101,13	101,37	102,25	102,79	103,35	103,52		
		CI Mean	[108,11; 109,54]	[103,71; 104,98]	[100,39; 101,53]	[100,09; 101,22]	[98,78; 99,91]	[99,81; 100,98]	[99,18; 100,36]	[99,78; 100,98]	[98,94; 100,00]	[99,84; 100,92]	[100,54; 101,73]	[100,80; 101,95]	[101,63; 102,86]	[102,16; 103,42]	[102,68; 104,02]	[102,83; 104,20]		
	Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Median	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00		
		Fallbasis mittlere Differenz		65731	56445	51304	45690	42175	39546	37714	35491	34419	32344	31539	29774	28896	27117	26508		
		Mittlere Differenz zur ED		-4,34	-6,87	-6,80	-7,98	-5,94	-6,36	-5,45	-6,02	-4,64	-3,53	-2,92	-2,14	-1,83	-0,44	-0,44		
		CI mittlere Differenz		[-5,20; -3,48]	[-7,77; -5,97]	[-7,74; -5,86]	[-8,97; -6,98]	[-6,96; -4,92]	[-7,43; -5,30]	[-6,56; -4,34]	[-7,13; -4,91]	[-5,77; -3,50]	[-4,70; -2,36]	[-4,12; -1,72]	[-3,39; -0,89]	[-3,12; -0,54]	[-1,77; -0,89]	[-1,79; -0,92]		
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00		
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521		
	auswertbar	Anzahl	113381	97063	85713	77670	70351	64431	61692	57728	54526	52665	50374	47992	45880	43674	41860	39797		
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	13580	10379	11493	9084	9570	7371	8447	6647	6831	6132	6868	5114	5882	4521	5115	3718		
		Anteil in %	11,98	10,69	13,41	11,70	13,60	11,44	13,69	11,51	12,53	11,64	13,63	10,66	12,82	10,35	12,22	9,34		
		CI Anteil in %	[11,79; 12,17]	[10,50; 10,89]	[13,18; 13,64]	[11,47; 11,92]	[13,35; 13,86]	[11,19; 11,69]	[13,42; 13,96]	[11,25; 11,77]	[12,25; 12,81]	[11,37; 11,92]	[13,33; 13,93]	[10,38; 10,93]	[12,51; 13,13]	[10,07; 10,64]	[11,91; 12,53]	[9,06; 9,63]		
	untersuchte Patienten	Anzahl	99801	86684	74220	68586	60781	57060	53245	51081	47695	46533	43506	42878	39998	39153	36745	36079		
		Mean	100,06	93,44	88,99	87,98	86,53	87,33	87,10	87,59	86,40	86,91	87,15	87,73	88,50	88,86	89,65	89,14		
		CI Mean	[99,37; 100,75]	[92,85; 94,03]	[88,49; 89,50]	[87,49; 88,46]	[86,07; 86,99]	[86,84; 87,82]	[86,60; 87,59]	[87,08; 88,11]	[85,96; 86,84]	[86,47; 87,34]	[86,69; 87,60]	[87,26; 88,19]	[88,01; 88,99]	[88,35; 89,36]	[89,12; 90,18]	[88,61; 89,67]		
	Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	78,00	79,00	79,00	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
		Fallbasis mittlere Differenz		77240	67011	61361	54762	51004	47855	45609	42730	41455	38910	38049	35659	34716	32700	31910		
		Mittlere Differenz zur ED		-5,95	-9,80	-9,58	-11,05	-9,40	-9,81	-8,75	-9,61	-8,84	-8,23	-7,00	-6,46	-5,64	-4,98	-5,31		
		CI mittlere Differenz		[-6,78; -5,12]	[-10,67; -8,93]	[-10,46; -8,69]	[-11,99; -10,12]	[-10,36; -8,43]	[-10,82; -8,80]	[-9,79; -7,71]	[-10,67; -8,55]	[-9,91; -7,76]	[-9,34; -7,12]	[-8,12; -5,88]	[-7,64; -5,28]	[-6,83; -4,45]	[-6,21; -3,75]	[-6,55; -4,07]		
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	4,00		

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-1	männl. Patienten insges.	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133							
	auswertbar	Anzahl	97840	84901	75218	70291	65361	60666	58836	55598	52733	50196	47633	45355	43137							
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	13011	11793	10192	11636	8545	8912	7627	8688	6382	7637	5361	6473	4618							
		Anteil in %	13,30	13,89	13,55	16,55	13,07	14,69	12,96	15,63	12,10	15,21	11,25	14,27	10,71							
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[13,09; 13,51]	[13,66; 14,12]	[13,31; 13,79]	[16,28; 16,83]	[12,82; 13,33]	[14,41; 14,97]	[12,69; 13,23]	[15,32; 15,93]	[11,82; 12,38]	[14,90; 15,53]	[10,97; 11,54]	[13,95; 14,59]	[10,41; 11,00]							
		Anzahl	84829	73108	65026	58655	56816	51754	51209	46910	46351	42559	42272	38882	38519							
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	100,29	99,29	99,25	98,81	99,53	98,14	98,83	99,28	99,44	100,26	100,35	100,82	100,48							
		CI Mean	[99,79; 100,78]	[98,80; 99,79]	[98,76; 99,75]	[98,32; 99,30]	[99,01; 100,04]	[97,69; 98,58]	[98,38; 99,28]	[98,79; 99,76]	[98,96; 99,91]	[99,75; 100,77]	[99,83; 100,86]	[100,27; 101,36]	[99,94; 101,02]							
		Median	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		66014	59357	53429	51513	46527	45879	41972	41286	37963	37470	34521	34090							
		Mittlere Differenz zur ED		-1,11	-0,47	-0,75	0,70	-0,19	1,07	1,74	1,98	2,89	3,16	4,22	4,30							
		CI mittlere Differenz		[-1,64; 0,58]	[-1,04; 0,09]	[-1,35; 0,14]	[0,07; 1,33]	[-0,85; 0,47]	[0,41; 1,74]	[1,04; 2,43]	[1,25; 2,71]	[2,12; 3,65]	[2,38; 3,94]	[3,41; 5,02]	[3,50; 5,11]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00							
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383							
	auswertbar	Anzahl	111771	98312	87474	82458	76826	71587	69540	65900	62515	59410	56310	53672	50998							
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	15239	13555	12077	13800	10446	10957	9484	10746	8027	9210	6665	7762	5729							
		Anteil in %	13,63	13,79	13,81	16,74	13,60	15,31	13,64	16,31	12,84	15,50	11,84	14,46	11,23							
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[13,43; 13,84]	[13,57; 14,00]	[13,58; 14,03]	[16,48; 16,99]	[13,35; 13,84]	[15,04; 15,57]	[13,38; 13,89]	[16,02; 16,59]	[12,58; 13,10]	[15,21; 15,79]	[11,57; 12,10]	[14,16; 14,76]	[10,96; 11,51]							
		Anzahl	96532	84757	75397	68658	66380	60630	60056	55154	54488	50200	49645	45910	45269							
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	89,31	87,37	86,60	86,92	86,71	85,39	85,36	85,92	86,09	86,83	86,52	87,12	86,76							
		CI Mean	[88,84; 89,79]	[86,92; 87,81]	[86,17; 87,03]	[86,46; 87,38]	[86,26; 87,16]	[85,02; 85,77]	[85,00; 85,73]	[85,52; 86,31]	[85,70; 86,49]	[86,40; 87,25]	[86,11; 86,94]	[86,68; 87,55]	[86,32; 87,20]							
		Median	80,00	79,00	80,00	80,00	80,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	77,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		76427	68642	62433	59933	54336	53641	49249	48484	44684	43914	40736	39906							
		Mittlere Differenz zur ED		-1,78	-1,52	-1,28	-0,67	-1,72	-1,20	-0,32	0,24	1,11	1,20	1,98	1,96							
		CI mittlere Differenz		[-2,30; -1,25]	[-2,06; 0,97]	[-1,87; 0,69]	[-1,28; 0,07]	[-2,35; 1,09]	[-1,83; 0,57]	[-0,98; 0,34]	[-0,43; 0,91]	[0,41; 1,82]	[0,48; 1,91]	[1,24; 2,72]	[1,20; 2,73]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00							
	2006-2	männl. Patienten insges.	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138							
auswertbar		Anzahl	93362	81635	74223	68227	63368	60744	57499	54218	51467	48794	46406	43982								
nicht untersuchte Patienten		Anzahl	12042	10237	11310	9234	8916	8074	8712	6816	7351	5553	6307	4727								
		Anteil in %	12,90	12,54	15,24	13,53	14,07	13,29	15,15	12,57	14,28	11,38	13,59	10,75								
untersuchte Patienten		CI Anteil in %	[12,68; 13,11]	[12,31; 12,77]	[14,98; 15,50]	[13,28; 13,79]	[13,80; 14,34]	[13,02; 13,56]	[14,86; 15,44]	[12,29; 12,85]	[13,98; 14,59]	[11,10; 11,66]	[13,28; 13,90]	[10,46; 11,04]								
		Anzahl	81320	71398	62913	58993	54452	52670	48787	47402	44116	43241	40099	39255								
Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l		Mean	99,22	98,90	98,31	99,15	97,84	98,22	98,49	98,98	99,52	100,16	100,38	100,07								
		CI Mean	[98,72; 99,71]	[98,41; 99,38]	[97,82; 98,80]	[98,62; 99,67]	[97,38; 98,29]	[97,76; 98,67]	[98,01; 98,96]	[98,50; 99,47]	[99,01; 100,03]	[99,63; 100,70]	[99,83; 100,93]	[99,52; 100,62]								
		Median	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		64790	57887	53538	49336	47243	43996	42311	39613	38467	35885	34834								
		Mittlere Differenz zur ED		0,14	-0,03	1,23	0,06	1,34	2,23	3,04	3,69	4,75	5,17	5,36								
		CI mittlere Differenz		[-0,36; 0,64]	[-0,59; 0,54]	[0,61; 1,84]	[-0,56; 0,69]	[0,72; 1,96]	[1,59; 2,88]	[2,37; 3,70]	[2,99; 4,39]	[4,02; 5,48]	[4,41; 5,93]	[4,58; 6,13]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00								
weibl. Patienten insges.		Anzahl	106368	97818	89965	84145	79567	75344	70865	67146	63673	60566	57735	55201								
auswertbar		Anzahl	105660	93411	85556	78870	73404	70515	66899	63191	59988	56918	54316	51562								
nicht untersuchte Patienten		Anzahl	13676	11594	13261	10778	10429	9523	10301	7891	8690	6548	7481	5537								
		Anteil in %	12,94	12,41	15,50	13,67	14,21	13,50	15,40	12,49	14,49	11,50	13,77	10,74								
untersuchte Patienten		CI Anteil in %	[12,74; 13,15]	[12,20; 12,62]	[15,26; 15,74]	[13,43; 13,91]	[13,96; 14,46]	[13,25; 13,76]	[15,12; 15,67]	[12,23; 12,75]	[14,20; 14,77]	[11,24; 11,77]	[13,48; 14,06]	[10,47; 11,01]								
		Anzahl	91984	81817	72295	68092	62975	60992	56598	55300	51298	50370	46835	46025								
Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l		Mean	87,97	86,58	86,14	86,11	84,60	85,05	85,41	85,35	86,36	86,24	86,61	86,42								
		CI Mean	[87,51; 88,42]	[86,15; 87,02]	[85,70; 86,58]	[85,67; 86,55]	[84,24; 84,96]	[84,68; 85,43]	[85,02; 85,80]	[84,96; 85,73]	[85,95; 86,77]	[85,82; 86,66]	[86,18; 87,03]	[85,98; 86,85]								
		Median	79,00	78,00	78,00	79,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		74162	66629	61845	57163	54761	51157	49444	46182	44840	41963	40852								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,93	-1,22	-0,57	-1,82	-0,75	-0,25	0,44	1,49	1,78	2,41	2,56								
		CI mittlere Differenz		[-1,42; 0,44]	[-1,76; 0,68]	[-1,12; 0,01]	[-2,40; 1,24]	[-1,35; 0,15]	[-0,87; 0,37]	[-0,19; 1,07]	[0,82; 2,15]	[1,11; 2,45]	[1,71; 3,10]	[1,85; 3,27]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00								

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2007-1	männl. Patienten insges.	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740									
	auswertbar	Anzahl	98223	86080	77506	71362	68241	64172	60367	57070	53981	51395	48787									
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	12065	12010	10044	10137	8719	9932	7438	8404	5989	7042	4977									
		Anteil in %	12,28	13,95	12,96	14,21	12,78	15,48	12,32	14,73	11,09	13,70	10,20									
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[12,08; 12,49]	[13,72; 14,18]	[12,72; 13,20]	[13,95; 14,46]	[12,53; 13,03]	[15,20; 15,76]	[12,06; 12,58]	[14,44; 15,02]	[10,83; 11,36]	[13,40; 14,00]	[9,93; 10,47]									
		Anzahl	86158	74070	67462	61225	59522	54240	52929	48666	47992	44353	43810									
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	97,84	97,40	97,53	96,68	97,41	97,37	97,76	98,51	98,57	99,28	99,09									
		CI Mean	[97,39; 98,28]	[96,96; 97,84]	[97,08; 97,98]	[96,28; 97,09]	[96,99; 97,83]	[96,94; 97,80]	[97,33; 98,18]	[98,04; 98,98]	[98,11; 99,04]	[98,78; 99,78]	[98,58; 99,59]									
		Median	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		67713	62061	55730	53999	49226	47856	44086	43220	40070	39281									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,39	0,51	0,12	1,27	1,58	2,40	3,19	3,89	4,77	5,22									
		CI mittlere Differenz		[-0,86; 0,08]	[0,00; 1,01]	[-0,38; 0,63]	[0,74; 1,79]	[1,03; 2,13]	[1,83; 2,96]	[2,57; 3,80]	[3,27; 4,52]	[4,11; 5,42]	[4,56; 5,88]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00									
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660									
	auswertbar	Anzahl	111327	98971	89744	82818	79245	74839	70720	66858	63275	60209	57164									
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	13957	13855	11854	12121	10442	11894	8732	9881	7110	8422	5840									
		Anteil in %	12,54	14,00	13,21	14,64	13,18	15,89	12,35	14,78	11,24	13,99	10,22									
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[12,34; 12,73]	[13,78; 14,22]	[12,99; 13,43]	[14,39; 14,88]	[12,94; 13,41]	[15,63; 16,15]	[12,10; 12,59]	[14,51; 15,05]	[10,99; 11,48]	[13,71; 14,27]	[9,97; 10,46]									
		Anzahl	97370	85116	77890	70697	68803	62945	61988	56977	56165	51787	51324									
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	86,15	85,52	85,27	84,16	84,16	84,39	84,49	84,96	84,99	85,56	85,03									
		CI Mean	[85,74; 86,56]	[85,11; 85,92]	[84,86; 85,69]	[83,80; 84,51]	[83,81; 84,52]	[84,02; 84,75]	[84,13; 84,85]	[84,58; 85,34]	[84,60; 85,37]	[85,16; 85,96]	[84,64; 85,43]									
		Median	76,00	76,00	77,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	77,00	76,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		77666	71311	64098	62167	56950	55748	51305	50307	46454	45813									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,60	-0,02	-1,04	-0,19	0,14	0,81	1,44	2,20	2,87	2,82									
		CI mittlere Differenz		[-1,07; -0,13]	[-0,52; 0,48]	[-1,54; -0,53]	[-0,71; 0,32]	[-0,39; 0,68]	[0,26; 1,36]	[0,87; 2,01]	[1,61; 2,78]	[2,26; 3,48]	[2,20; 3,45]									
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00										
2007-2	männl. Patienten insges.	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931										
	auswertbar	Anzahl	90911	78589	70567	66846	62401	58583	55068	51882	49392	46693										
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11312	9376	9454	8477	9078	6890	7402	5463	6348	4629										
		Anteil in %	12,44	11,93	13,40	12,68	14,55	11,76	13,44	10,53	12,85	9,91										
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[12,23; 12,66]	[11,70; 12,16]	[13,15; 13,65]	[12,43; 12,93]	[14,27; 14,82]	[11,50; 12,02]	[13,16; 13,73]	[10,27; 10,79]	[12,56; 13,15]	[9,64; 10,18]										
		Anzahl	79599	69213	61113	58369	53323	51693	47666	46419	43044	42064										
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	98,43	97,82	96,36	97,02	96,88	97,07	97,67	97,79	98,36	98,37										
		CI Mean	[97,94; 98,92]	[97,34; 98,30]	[95,94; 96,79]	[96,59; 97,46]	[96,43; 97,32]	[96,64; 97,51]	[97,20; 98,14]	[97,32; 98,26]	[97,87; 98,86]	[97,86; 98,88]										
		Median	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00										
		Fallbasis mittlere Differenz		63089	55767	52750	48592	46622	43229	41730	38874	37693										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,04	-1,15	0,24	0,52	1,12	1,73	1,97	2,80	3,27										
		CI mittlere Differenz		[-0,58; 0,50]	[-1,70; -0,60]	[-0,33; 0,82]	[-0,08; 1,12]	[0,50; 1,74]	[1,07; 2,40]	[1,29; 2,66]	[2,09; 3,51]	[2,53; 4,01]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00										
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214										
	auswertbar	Anzahl	102389	89602	80683	76835	72146	67824	63891	60395	57448	54370										
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	12982	10857	11149	10216	10689	8441	9051	6772	7465	5678										
		Anteil in %	12,68	12,12	13,82	13,30	14,82	12,45	14,17	11,21	12,99	10,44										
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[12,48; 12,88]	[11,90; 12,33]	[13,58; 14,06]	[13,06; 13,54]	[14,56; 15,08]	[12,20; 12,69]	[13,90; 14,44]	[10,96; 11,46]	[12,72; 13,27]	[10,19; 10,70]										
		Anzahl	89407	78745	69534	66619	61457	59383	54840	53623	49983	48692										
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	86,72	85,55	83,86	83,88	83,97	83,77	84,39	84,13	85,02	84,28										
		CI Mean	[86,27; 87,17]	[85,12; 85,98]	[83,50; 84,22]	[83,53; 84,24]	[83,60; 84,34]	[83,41; 84,14]	[84,00; 84,78]	[83,74; 84,52]	[84,60; 85,43]	[83,88; 84,68]										
		Median	76,00	75,00	76,00	76,00	75,00	75,00	75,00	75,00	76,00	75,00										
		Fallbasis mittlere Differenz		71597	63409	60075	55804	53352	49600	48015	44870	43415										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,58	-1,46	-0,86	-0,27	-0,33	0,52	0,77	1,77	1,66										
		CI mittlere Differenz		[-1,09; -0,07]	[-1,98; -0,94]	[-1,38; -0,33]	[-0,81; 0,27]	[-0,90; 0,24]	[-0,08; 1,12]	[0,16; 1,39]	[1,13; 2,40]	[1,02; 2,30]										
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00											

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2008-1	männl. Patienten insges.	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783												
	auswertbar	Anzahl	98804	85321	78873	72728	67661	63465	59760	56549	53406												
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11699	10367	9707	10885	7626	9028	6366	7538	5177												
		Anteil in %	11,84	12,15	12,31	14,97	11,27	14,23	10,65	13,33	9,69												
		CI Anteil in %	[11,64; 12,04]	[11,93; 12,37]	[12,08; 12,54]	[14,71; 15,23]	[11,03; 11,51]	[13,95; 14,50]	[10,41; 10,90]	[13,05; 13,61]	[9,44; 9,94]												
	untersuchte Patienten	Anzahl	87105	74954	69166	61843	60035	54437	53394	49011	48229												
		Mean	97,13	94,83	95,46	95,86	96,30	96,82	96,86	97,20	97,08												
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	CI Mean	[96,68; 97,58]	[94,47; 95,19]	[95,09; 95,83]	[95,46; 96,26]	[95,90; 96,70]	[96,38; 97,26]	[96,43; 97,29]	[96,75; 97,65]	[96,63; 97,54]												
		Median	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00												
		Fallbasis mittlere Differenz		68236	63075	56330	54477	49469	48287	44351	43434												
		Mittlere Differenz zur ED		-2,17	-1,06	-0,36	0,34	1,19	1,72	2,32	2,66												
		CI mittlere Differenz		[-2,65; - 1,69]	[-1,58; - 0,54]	[-0,91; 0,18]	[-0,22; 0,89]	[0,58; 1,79]	[1,11; 2,32]	[1,69; 2,95]	[2,01; 3,30]												
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00												
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228												
	auswertbar	Anzahl	109072	95501	88873	82321	77076	72581	68561	65053	61615												
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	12630	11606	11054	12397	8825	10263	7075	8530	6049												
		Anteil in %	11,58	12,15	12,44	15,06	11,45	14,14	10,32	13,11	9,82												
		CI Anteil in %	[11,39; 11,77]	[11,95; 12,36]	[12,22; 12,65]	[14,82; 15,30]	[11,22; 11,67]	[13,89; 14,39]	[10,09; 10,55]	[12,85; 13,37]	[9,58; 10,05]												
	untersuchte Patienten	Anzahl	96442	83895	77819	69924	68251	62318	61486	56523	55566												
		Mean	85,20	82,40	82,69	82,65	82,64	82,85	82,98	83,27	82,91												
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	CI Mean	[84,80; 85,61]	[82,09; 82,70]	[82,36; 83,01]	[82,32; 82,98]	[82,31; 82,98]	[82,52; 83,19]	[82,63; 83,34]	[82,91; 83,63]	[82,56; 83,27]												
		Median	73,00	75,00	75,00	75,00	74,00	75,00	74,00	75,00	74,00												
Fallbasis mittlere Differenz			76578	71092	63810	62084	56689	55709	51272	50272													
Mittlere Differenz zur ED			-2,35	-1,40	-1,06	-0,57	-0,18	0,29	0,77	0,92													
CI mittlere Differenz			[-2,79; - 1,91]	[-1,86; - 0,93]	[-1,55; - 0,57]	[-1,06; - 0,07]	[-0,70; 0,33]	[-0,25; 0,82]	[0,21; 1,33]	[0,36; 1,49]													
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00													
2008-2	männl. Patienten insges.	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871													
	auswertbar	Anzahl	67133	58860	53237	49109	45953	43115	40790	38565													
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	9604	7102	7601	5960	6043	4743	5175	3926													
		Anteil in %	14,31	12,07	14,28	12,14	13,15	11,00	12,69	10,18													
		CI Anteil in %	[14,04; 14,57]	[11,80; 12,33]	[13,98; 14,57]	[11,85; 12,43]	[12,84; 13,46]	[10,71; 11,30]	[12,36; 13,01]	[9,88; 10,48]													
	untersuchte Patienten	Anzahl	57529	51758	45636	43149	39910	38372	35615	34639													
		Mean	94,09	95,10	95,15	95,32	95,94	96,14	96,83	96,46													
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	CI Mean	[93,69; 94,49]	[94,67; 95,53]	[94,69; 95,61]	[94,86; 95,78]	[95,45; 96,43]	[95,65; 96,64]	[96,29; 97,37]	[95,92; 96,99]													
		Median	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00													
		Fallbasis mittlere Differenz		46190	41129	38422	35745	34000	31762	30661													
		Mittlere Differenz zur ED		1,26	1,71	2,44	3,24	3,95	4,63	4,88													
		CI mittlere Differenz		[0,85; 1,67]	[1,28; 2,13]	[2,00; 2,88]	[2,77; 3,72]	[3,45; 4,45]	[4,08; 5,17]	[4,33; 5,42]													
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00													
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527													
	auswertbar	Anzahl	73607	65318	59744	55429	52160	48991	46573	44113													
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10358	7638	8450	6436	6861	5188	5761	4264													
		Anteil in %	14,07	11,69	14,14	11,61	13,15	10,59	12,37	9,67													
		CI Anteil in %	[13,82; 14,32]	[11,45; 11,94]	[13,86; 14,42]	[11,34; 11,88]	[12,86; 13,44]	[10,32; 10,86]	[12,07; 12,67]	[9,39; 9,94]													
	untersuchte Patienten	Anzahl	63249	57680	51294	48993	45299	43803	40812	39849													
		Mean	82,23	82,50	82,03	82,33	82,64	82,43	83,18	82,76													
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	CI Mean	[81,86; 82,60]	[82,12; 82,88]	[81,66; 82,40]	[81,92; 82,73]	[82,22; 83,05]	[82,02; 82,84]	[82,74; 83,61]	[82,32; 83,20]													
		Median	74,00	74,00	74,00	73,00	74,00	74,00	74,00	74,00													
Fallbasis mittlere Differenz			51393	46256	43605	40698	38844	36439	35205														
Mittlere Differenz zur ED			0,62	0,54	1,49	2,11	2,40	3,25	3,20														
CI mittlere Differenz			[0,24; 1,00]	[0,16; 0,92]	[1,07; 1,92]	[1,67; 2,55]	[1,96; 2,85]	[2,76; 3,73]	[2,71; 3,70]														
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00														

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2009-1	männl. Patienten insges.	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446													
	auswertbar	Anzahl	71917	62364	56400	52098	48603	45661	43089													
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10908	8786	6912	7843	5391	6456	4414													
		Anteil in %	15,17	14,09	12,26	15,05	11,09	14,14	10,24													
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[14,91; 15,43]	[13,82; 14,36]	[11,98; 12,53]	[14,75; 15,36]	[10,81; 11,37]	[13,82; 14,46]	[9,96; 10,53]													
		Anzahl	61009	53578	49488	44255	43212	39205	38675													
	Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Mean	93,39	94,01	94,37	94,82	95,11	95,50	95,18													
		CI Mean	[93,02; 93,77]	[93,59; 94,42]	[93,96; 94,78]	[94,39; 95,26]	[94,65; 95,57]	[95,02; 95,98]	[94,71; 95,66]													
		Median	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	88,00	87,00													
		Fallbasis mittlere Differenz		47603	44040	39411	38286	34765	34013													
		Mittlere Differenz zur ED		0,65	1,63	2,24	3,10	3,52	3,86													
		CI mittlere Differenz		[0,28; 1,03]	[1,24; 2,03]	[1,82; 2,67]	[2,64; 3,56]	[3,04; 3,99]	[3,40; 4,33]													
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		weibl. Patienten insges.	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078												
	auswertbar	Anzahl	76497	67238	61465	56908	53284	50428	47709													
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11622	9536	7490	8512	5856	6969	4966													
		Anteil in %	15,19	14,18	12,19	14,96	10,99	13,82	10,41													
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[14,94; 15,45]	[13,92; 14,45]	[11,93; 12,44]	[14,66; 15,25]	[10,72; 11,26]	[13,52; 14,12]	[10,13; 10,68]													
		Anzahl	64875	57702	53975	48396	47428	43459	42743													
	Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Mean	81,19	81,51	81,36	81,99	81,87	82,44	81,60													
		CI Mean	[80,85; 81,53]	[81,14; 81,88]	[80,99; 81,72]	[81,60; 82,38]	[81,47; 82,27]	[82,01; 82,87]	[81,19; 82,00]													
		Median	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	72,00													
		Fallbasis mittlere Differenz		51394	48084	43120	41980	38485	37651													
		Mittlere Differenz zur ED		0,62	1,11	1,97	2,44	3,19	2,96													
		CI mittlere Differenz		[0,26; 0,97]	[0,74; 1,48]	[1,57; 2,36]	[2,04; 2,84]	[2,75; 3,63]	[2,54; 3,38]													
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
männl. Patienten insges.		Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280														
auswertbar	Anzahl	65996	57563	51757	47591	44696	41925															
nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10097	6528	7353	5474	5869	4481															
	Anteil in %	15,30	11,34	14,21	11,50	13,13	10,69															
untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[15,02; 15,57]	[11,08; 11,60]	[13,91; 14,51]	[11,22; 11,79]	[12,82; 13,44]	[10,39; 10,98]															
	Anzahl	55899	51035	44404	42117	38827	37444															
Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Mean	93,69	94,56	94,49	94,91	95,32	94,97															
	CI Mean	[93,29; 94,10]	[94,12; 95,01]	[94,04; 94,93]	[94,45; 95,38]	[94,83; 95,81]	[94,48; 95,45]															
	Median	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00															
	Fallbasis mittlere Differenz		45044	39835	37158	34602	32831															
	Mittlere Differenz zur ED		1,24	1,57	2,44	2,96	3,18															
	CI mittlere Differenz		[0,83; 1,64]	[1,16; 1,99]	[2,00; 2,87]	[2,48; 3,45]	[2,70; 3,66]															
	Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447														
auswertbar	Anzahl	71512	63370	57453	53291	50073	47138															
nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11193	7218	8038	6087	6520	4981															
	Anteil in %	15,65	11,39	13,99	11,42	13,02	10,57															
untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[15,39; 15,92]	[11,14; 11,64]	[13,71; 14,27]	[11,15; 11,69]	[12,73; 13,32]	[10,29; 10,84]															
	Anzahl	60319	56152	49415	47204	43553	42157															
Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Mean	81,28	81,01	81,49	81,57	81,85	81,57															
	CI Mean	[80,93; 81,63]	[80,66; 81,37]	[81,10; 81,87]	[81,17; 81,98]	[81,44; 82,26]	[81,14; 81,99]															
	Median	73,00	72,00	73,00	72,00	73,00	72,00															
	Fallbasis mittlere Differenz		49415	44142	41380	38631	36790															
	Mittlere Differenz zur ED		0,19	0,90	1,64	2,18	2,26															
	CI mittlere Differenz		[-0,18; 0,55]	[0,50; 1,31]	[1,20; 2,08]	[1,74; 2,63]	[1,80; 2,72]															
	Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	männl. Patienten insges.	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460														
	auswertbar	Anzahl	75694	66308	59995	55488	51919														
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11175	8996	6934	7966	5204														
		Anteil in %	14,76	13,57	11,56	14,36	10,02														
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[14,51; 15,02]	[13,31; 13,83]	[11,30; 11,81]	[14,06; 14,65]	[9,76; 10,28]														
		Anzahl	64519	57312	53061	47522	46715														
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	92,98	93,84	94,08	94,39	94,13														
		CI Mean	[92,62; 93,34]	[93,45; 94,23]	[93,68; 94,48]	[93,98; 94,81]	[93,73; 94,54]														
		Median	86,00	86,00	86,00	87,00	87,00														
		Fallbasis mittlere Differenz		51188	47401	42528	41475														
		Mittlere Differenz zur ED		0,54	1,47	2,08	2,30														
		CI mittlere Differenz		[0,19; 0,90]	[1,10; 1,84]	[1,70; 2,47]	[1,92; 2,68]														
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00														
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365														
	auswertbar	Anzahl	79676	70974	64912	60540	56776														
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11611	9501	7319	8501	5708														
		Anteil in %	14,57	13,39	11,28	14,04	10,05														
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[14,33; 14,82]	[13,14; 13,64]	[11,03; 11,52]	[13,77; 14,32]	[9,81; 10,30]														
		Anzahl	68065	61473	57593	52039	51068														
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	80,47	81,28	81,18	81,51	80,77														
		CI Mean	[80,14; 80,79]	[80,93; 81,63]	[80,81; 81,54]	[81,14; 81,89]	[80,41; 81,13]														
		Median	72,00	72,00	72,00	73,00	72,00														
		Fallbasis mittlere Differenz		54907	51527	46603	45397														
		Mittlere Differenz zur ED		0,81	1,43	1,95	1,91														
CI mittlere Differenz			[0,46; 1,15]	[1,06; 1,80]	[1,57; 2,33]	[1,53; 2,28]															
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00															
2010-2	männl. Patienten insges.	Anzahl	68337	61608	55900	51784															
	auswertbar	Anzahl	68081	60037	54349	50200															
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10135	6757	7430	5543															
		Anteil in %	14,89	11,25	13,67	11,04															
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[14,62; 15,15]	[11,00; 11,51]	[13,38; 13,96]	[10,77; 11,32]															
		Anzahl	57946	53280	46919	44657															
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	93,29	93,79	94,57	94,21															
		CI Mean	[92,90; 93,68]	[93,38; 94,20]	[94,12; 95,03]	[93,76; 94,66]															
		Median	86,00	86,00	86,00	86,00															
		Fallbasis mittlere Differenz		47325	42357	39608															
		Mittlere Differenz zur ED		0,71	1,68	1,94															
		CI mittlere Differenz		[0,35; 1,07]	[1,28; 2,09]	[1,51; 2,37]															
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00															
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	73408	66943	61246	56909															
	auswertbar	Anzahl	73073	65386	59646	55330															
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10978	7118	7965	6047															
		Anteil in %	15,02	10,89	13,35	10,93															
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[14,76; 15,28]	[10,65; 11,12]	[13,08; 13,63]	[10,67; 11,19]															
		Anzahl	62095	58268	51681	49283															
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	80,92	80,47	80,73	80,43															
		CI Mean	[80,57; 81,28]	[80,11; 80,83]	[80,35; 81,10]	[80,05; 80,82]															
		Median	72,00	72,00	72,00	72,00															
		Fallbasis mittlere Differenz		51588	46489	43509															
		Mittlere Differenz zur ED		0,22	0,82	0,88															
CI mittlere Differenz			[-0,13; 0,58]	[0,45; 1,19]	[0,48; 1,28]																
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00																

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2011-1	männl. Patienten insges.	Anzahl	74139	66585	60521																
	auswertbar	Anzahl	73860	64782	58479																
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10460	8255	6367																
		Anteil in %	14,16	12,74	10,89																
		CI Anteil in %	[13,91; 14,41]	[12,49; 13,00]	[10,64; 11,14]																
	untersuchte Patienten	Anzahl	63400	56527	52112																
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	92,71	93,56	93,42																
		CI Mean	[92,35; 93,07]	[93,17; 93,96]	[93,02; 93,83]																
		Median	85,00	86,00	86,00																
		Fallbasis mittlere Differenz		50758	46854																
		Mittlere Differenz zur ED		0,83	1,36																
		CI mittlere Differenz		[0,50; 1,17]	[1,00; 1,73]																
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00																
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	79514	72558	66610																
	auswertbar	Anzahl	79210	70809	64554																
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	11242	8915	6813																
		Anteil in %	14,19	12,59	10,55																
		CI Anteil in %	[13,95; 14,44]	[12,35; 12,83]	[10,32; 10,79]																
untersuchte Patienten	Anzahl	67968	61894	57741																	
Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	79,72	80,34	79,57																	
	CI Mean	[79,40; 80,04]	[80,00; 80,68]	[79,24; 79,91]																	
	Median	71,00	72,00	71,00																	
	Fallbasis mittlere Differenz		55396	51877																	
	Mittlere Differenz zur ED		0,82	0,59																	
	CI mittlere Differenz		[0,49; 1,15]	[0,25; 0,93]																	
	Median mittlere Differenz		0,00	0,00																	
2011-2	männl. Patienten insges.	Anzahl	67230	60721																	
	auswertbar	Anzahl	66963	58925																	
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	9638	6226																	
		Anteil in %	14,39	10,57																	
		CI Anteil in %	[14,13; 14,66]	[10,32; 10,81]																	
	untersuchte Patienten	Anzahl	57325	52699																	
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	93,12	93,28																	
		CI Mean	[92,74; 93,51]	[92,88; 93,69]																	
		Median	86,00	85,00																	
		Fallbasis mittlere Differenz		46966																	
		Mittlere Differenz zur ED		0,16																	
		CI mittlere Differenz		[-0,22; 0,55]																	
		Median mittlere Differenz		0,00																	
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	72465	66497																	
	auswertbar	Anzahl	72149	64627																	
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10350	6789																	
		Anteil in %	14,35	10,50																	
		CI Anteil in %	[14,09; 14,60]	[10,27; 10,74]																	
untersuchte Patienten	Anzahl	61799	57838																		
Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	80,39	79,66																		
	CI Mean	[80,04; 80,73]	[79,32; 80,00]																		
	Median	72,00	71,00																		
	Fallbasis mittlere Differenz		51624																		
	Mittlere Differenz zur ED		-0,49																		
	CI mittlere Differenz		[-0,83; 0,14]																		
	Median mittlere Differenz		0,00																		

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2012-1	männl. Patienten insges.	Anzahl	74714																				
	auswertbar	Anzahl	74493																				
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10075																				
		Anteil in %	13,52																				
		CI Anteil in %	[13,28; 13,77]																				
		untersuchte Patienten	Anzahl	64418																			
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	91,73																				
		CI Mean	[91,39; 92,08]																				
		Median	84,00																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
		Median mittlere Differenz																					
	weibl. Patienten insges.	Anzahl	77879																				
	auswertbar	Anzahl	77605																				
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	10366																				
		Anteil in %	13,36																				
		CI Anteil in %	[13,12; 13,60]																				
		untersuchte Patienten	Anzahl	67239																			
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	78,95																				
		CI Mean	[78,62; 79,27]																				
Median		71,00																					
Fallbasis mittlere Differenz																							
Mittlere Differenz zur ED																							
CI mittlere Differenz																							
Median mittlere Differenz																							

3.3 Medikation

Neben Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung sowie ausreichender Bewegung - wodurch ein Teil der Patienten potenziell keine Arzneimitteltherapie mehr benötigt - besteht die Therapie des Diabetes mellitus in der Anwendung von den Blutzuckerspiegel senkenden Arzneimitteln. Bei insulinpflichtigen Diabetikern muss der Insulinmangel mit Hilfe von subkutan zu spritzendem Insulin (Human- oder Schweineinsulin) oder mit gegenüber dem menschlichen oder tierischen Hormon leicht verändertem Insulin (Insulinanaloga) ausgeglichen werden. Weiterhin gibt es Medikamente, die die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse anregen (Sulfonylharnstoffe, Glinide), die Verteilung von Glukose im Organismus (Biguanide) beeinflussen, die Wirkung von Insulin verstärken (Glitazone) oder den Kohlenhydratabbau im Darmtrakt (Glucosidasehemmer) verzögern bzw. verhindern. Diese Medikamentengruppen können in Tablettenform eingenommen werden und werden allesamt als orale Antidiabetika (OAD) bezeichnet. Metformin (Biguanid) ist dabei das Mittel der ersten Wahl bei übergewichtigen Diabetikern, bei normalgewichtigen Diabetikern sind dies die Sulfonylharnstoffe (z.B. Glibenclamid). Diese beiden Präparategruppen sind in diesem Bericht als "vorrangig empfohlene " OAD ausgewiesen. Neben der Verwendung einzelner Arzneimittel aus diesen Medikamentengruppen (Monotherapie) ist auch eine Kombinationstherapie aus zwei „vorrangig empfohlenen“ Präparaten oder die Kombination von „vorrangig empfohlenen“ mit Arzneimitteln aus „nachrangig empfohlenen“ Gruppen (Glinide, Glitazone, Glucosidasehemmer) als Kombinationstherapie möglich. Bei einem Teil der Patienten ist auch eine Kombinationstherapie sowohl mit dem ebenfalls vorrangig empfohlenen Insulin als auch mit OAD indiziert.

In der Tabelle 3.3.1 ist die Entwicklung der **Medikation** der Patienten ausgewiesen. Für jede Kohorte werden dazu zunächst unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird - z.T. differenziert nach dem BMI der Patienten - ausgewiesen, bei wie vielen Patienten welche Medikation erfolgte und welchem Anteil an den „auswertbaren“ Patienten dies entspricht. Die solchermaßen gebildeten Kategorien sind nicht erschöpfend.

Zu beachten ist dabei, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam. Anstelle der medikamentösen Therapie mit „Metformin“ (ab 2004-2) wurden bis 2004-1 „Biguanide“ erhoben; in der Auswertung ist jedoch in beiden Fällen die Kategorie „Metformin“ zu verwenden. Da aus der Gruppe der Biguanide seit langer Zeit nur noch Metformin angewandt wird, verursacht diese Umformulierung jedoch keine Änderungen bei den Häufigkeiten bzw. bei der Vollständigkeit der Erfassung.

Tabelle 3.3.1 Patienten und ihre Medikation

EZ	Patienten und ihre Medikation		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	männliche Patienten insgesamt		Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910
	auswertbar		Anzahl	16845	11957	11395	10381	9318	8486	7747	6935	6363	6046	5742	5456	5232	4962	4679	4438	4155	3981	3757
	keine diabetes-spezifische Medikation		Anzahl	3323	2729	2667	2185	1913	1708	1537	1359	1219	1168	1041	978	883	819	767	722	655	612	569
			Anteil in %	19,73	22,82	23,41	21,05	20,53	20,13	19,84	19,60	19,16	19,32	18,13	17,93	16,88	16,51	16,39	16,27	15,76	15,37	15,15
			CI Anteil in %	[19,13; 20,33]	[22,07; 23,58]	[22,63; 24,18]	[20,26; 21,83]	[19,71; 21,35]	[19,27; 20,98]	[18,95; 20,73]	[18,66; 20,53]	[18,19; 20,12]	[18,32; 20,31]	[17,13; 19,13]	[16,91; 18,94]	[15,86; 17,89]	[15,47; 17,54]	[15,33; 17,45]	[15,18; 17,35]	[14,66; 16,87]	[14,25; 16,49]	[14,00; 16,29]
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga		Anzahl	3407	2443	2357	2275	2053	1877	1701	1494	1420	1335	1323	1309	1257	1194	1138	1076	1010	965	914
			Anteil in %	20,23	20,43	20,68	21,92	22,03	22,12	21,96	21,54	22,32	22,08	23,04	23,99	24,03	24,06	24,32	24,25	24,31	24,24	24,33
			CI Anteil in %	[19,62; 20,83]	[19,71; 21,15]	[19,94; 21,43]	[21,12; 22,71]	[21,19; 22,87]	[21,24; 23,00]	[21,04; 22,88]	[20,58; 22,51]	[21,29; 23,34]	[21,04; 23,13]	[21,95; 24,13]	[22,86; 25,13]	[22,87; 25,18]	[22,87; 25,25]	[23,09; 25,55]	[22,98; 25,51]	[23,00; 25,61]	[22,91; 25,57]	[22,96; 25,70]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29		Anzahl	901	629	554	478	388	345	289	270	209	187	158	172	176	156	135	122	110	97	94
			Anteil in %	5,35	5,26	4,86	4,60	4,16	4,07	3,73	3,89	3,28	3,09	2,75	3,15	3,36	3,14	2,89	2,75	2,65	2,44	2,50
			CI Anteil in %	[5,01; 5,69]	[4,86; 5,66]	[4,47; 5,26]	[4,20; 5,01]	[3,76; 4,57]	[3,65; 4,49]	[3,31; 4,15]	[3,44; 4,35]	[2,85; 3,72]	[2,66; 3,53]	[2,33; 3,17]	[2,69; 3,62]	[2,88; 3,85]	[2,66; 3,63]	[2,41; 3,36]	[2,27; 3,23]	[2,16; 3,14]	[1,96; 2,92]	[2,00; 3,00]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29		Anzahl	643	415	369	313	275	230	211	167	154	148	127	112	89	80	81	73	56	59	47
			Anteil in %	3,82	3,47	3,24	3,02	2,95	2,71	2,72	2,41	2,42	2,45	2,21	2,05	1,70	1,61	1,73	1,64	1,35	1,48	1,25
			CI Anteil in %	[3,53; 4,11]	[3,14; 3,80]	[2,91; 3,56]	[2,69; 3,34]	[2,61; 3,29]	[2,36; 3,06]	[2,36; 3,09]	[2,05; 2,77]	[2,04; 2,80]	[2,06; 2,84]	[1,83; 2,59]	[1,68; 2,43]	[1,35; 2,05]	[1,26; 1,96]	[1,36; 2,10]	[1,27; 2,02]	[1,00; 1,70]	[1,11; 1,86]	[0,90; 1,61]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29		Anzahl	781	566	515	479	441	423	367	364	327	296	305	299	284	268	245	236	243	231	225
			Anteil in %	4,64	4,73	4,52	4,61	4,73	4,98	4,74	5,25	5,14	4,90	5,31	5,48	5,43	5,40	5,24	5,32	5,85	5,80	5,99
			CI Anteil in %	[4,32; 4,95]	[4,35; 5,11]	[4,14; 4,90]	[4,21; 5,02]	[4,30; 5,16]	[4,52; 5,45]	[4,26; 5,21]	[4,72; 5,77]	[4,60; 5,68]	[4,35; 5,44]	[4,73; 5,89]	[4,88; 6,08]	[4,81; 6,04]	[4,77; 6,03]	[4,60; 5,87]	[4,66; 5,98]	[5,13; 6,56]	[5,08; 6,53]	[5,23; 6,75]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29		Anzahl	1131	777	696	651	603	557	507	431	403	378	356	342	328	317	297	280	264	256	238
			Anteil in %	6,71	6,50	6,11	6,27	6,47	6,56	6,54	6,21	6,33	6,25	6,20	6,27	6,27	6,39	6,35	6,31	6,35	6,43	6,33
			CI Anteil in %	[6,34; 7,09]	[6,06; 6,94]	[5,67; 6,55]	[5,80; 6,74]	[5,97; 6,97]	[6,04; 7,09]	[5,99; 7,10]	[5,65; 6,78]	[5,73; 6,93]	[5,64; 6,86]	[5,58; 6,82]	[5,63; 6,91]	[5,61; 6,93]	[5,71; 7,07]	[5,65; 7,05]	[5,59; 7,02]	[5,61; 7,10]	[5,67; 7,19]	[5,56; 7,11]
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Metformin)		Anzahl	1020	687	645	618	549	508	460	400	356	332	303	320	318	295	272	253	212	197	165	
		Anteil in %	6,06	5,75	5,66	5,95	5,89	5,99	5,94	5,77	5,59	5,49	5,28	5,87	6,08	5,95	5,81	5,70	5,10	4,95	4,39	
		CI Anteil in %	[5,70; 6,42]	[5,33; 6,16]	[5,24; 6,08]	[5,50; 6,41]	[5,41; 6,37]	[5,48; 6,49]	[5,41; 6,46]	[5,22; 6,32]	[5,03; 6,16]	[4,92; 6,07]	[4,70; 5,86]	[5,24; 6,49]	[5,43; 6,73]	[5,29; 6,60]	[5,14; 6,48]	[5,02; 6,38]	[4,43; 5,77]	[4,27; 5,62]	[3,74; 5,05]	
Kombination aus einem „vorrangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD		Anzahl	1461	993	978	888	823	757	710	663	618	596	580	482	471	456	431	425	392	390	366	
		Anteil in %	8,67	8,30	8,58	8,55	8,83	8,92	9,16	9,56	9,71	9,86	10,10	8,83	9,00	9,19	9,21	9,58	9,43	9,80	9,74	
		CI Anteil in %	[8,25; 9,10]	[7,81; 8,80]	[8,07; 9,10]	[8,02; 9,09]	[8,26; 9,41]	[8,31; 9,53]	[8,52; 9,81]	[8,87; 10,25]	[8,98; 10,44]	[9,11; 10,61]	[9,32; 10,88]	[8,08; 9,59]	[8,23; 9,78]	[8,39; 9,99]	[8,38; 10,04]	[8,71; 10,44]	[8,55; 10,32]	[8,87; 10,72]	[8,79; 10,69]	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)		Anzahl	2071	1497	1487	1448	1386	1299	1252	1141	1066	1064	1054	1018	1022	1001	965	948	931	916	894	
		Anteil in %	12,29	12,52	13,05	13,95	14,87	15,31	16,16	16,45	16,75	17,60	18,36	18,66	19,53	20,17	20,62	21,36	22,41	23,01	23,80	
		CI Anteil in %	[11,80; 12,79]	[11,93; 13,11]	[12,43; 13,67]	[13,28; 14,62]	[14,15; 15,60]	[14,54; 16,07]	[15,34; 16,98]	[15,58; 17,33]	[15,84; 17,67]	[16,64; 18,56]	[17,35; 19,36]	[17,62; 19,69]	[18,46; 20,61]	[19,06; 21,29]	[19,46; 21,78]	[20,15; 22,57]	[21,14; 23,67]	[21,70; 24,32]	[22,43; 25,16]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695
	auswertbar	Anzahl	23330	16837	16204	14918	13473	12462	11399	10204	9348	8929	8412	7956	7617	7203	6808	6466	6074	5802	5507
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	5170	4267	4133	3436	3035	2758	2492	2263	2038	1883	1694	1599	1466	1353	1212	1119	1028	963	889
		CI Anteil in %	[21,63; 22,69]	[24,69; 26,00]	[24,83; 26,18]	[22,36; 23,71]	[21,82; 23,23]	[21,40; 22,86]	[21,10; 22,62]	[21,37; 22,98]	[20,96; 22,64]	[20,24; 21,93]	[19,28; 20,99]	[19,22; 20,98]	[18,36; 20,13]	[17,88; 19,69]	[16,89; 18,71]	[16,38; 18,23]	[15,98; 17,87]	[15,64; 17,56]	[15,17; 17,11]
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	4478	3135	3072	3038	2800	2605	2405	2123	1910	1860	1782	1740	1643	1547	1465	1374	1284	1236	1178
		CI Anteil in %	[18,69; 19,70]	[18,03; 19,21]	[18,35; 19,56]	[19,72; 21,01]	[20,10; 21,47]	[20,19; 21,62]	[20,35; 21,85]	[20,02; 21,59]	[19,61; 21,25]	[19,99; 21,67]	[20,31; 22,06]	[20,96; 22,78]	[20,65; 22,49]	[20,53; 22,43]	[20,54; 22,50]	[20,25; 22,25]	[20,11; 22,17]	[20,25; 22,36]	[20,31; 22,47]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1241	861	744	664	560	512	436	385	344	294	280	272	250	224	203	194	184	167	158
		CI Anteil in %	[5,03; 5,61]	[4,78; 5,45]	[4,27; 4,91]	[4,12; 4,78]	[3,82; 4,49]	[3,76; 4,46]	[3,47; 4,18]	[3,40; 4,14]	[3,30; 4,06]	[2,92; 3,66]	[2,95; 3,71]	[3,02; 3,82]	[2,88; 3,68]	[2,71; 3,51]	[2,58; 3,39]	[2,58; 3,42]	[2,60; 3,46]	[2,45; 3,31]	[2,43; 3,31]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	920	555	514	458	396	338	295	240	212	199	167	181	175	151	141	129	112	101	98
		CI Anteil in %	[3,69; 4,19]	[3,03; 3,57]	[2,90; 3,44]	[2,79; 3,35]	[2,65; 3,22]	[2,43; 3,00]	[2,30; 2,88]	[2,06; 2,65]	[1,97; 2,57]	[1,92; 2,53]	[1,69; 2,28]	[1,95; 2,60]	[1,96; 2,63]	[1,77; 2,43]	[1,73; 2,41]	[1,65; 2,34]	[1,51; 2,18]	[1,40; 2,08]	[1,43; 2,13]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	915	667	624	594	518	503	471	413	372	375	379	406	400	377	347	350	343	341	320
		CI Anteil in %	[3,67; 4,17]	[3,67; 4,26]	[3,55; 4,15]	[3,67; 4,30]	[3,52; 4,17]	[3,69; 4,38]	[3,77; 4,50]	[3,67; 4,43]	[3,58; 4,38]	[3,78; 4,62]	[4,06; 4,95]	[4,62; 5,59]	[4,75; 5,75]	[4,72; 5,75]	[4,57; 5,62]	[4,86; 5,96]	[5,07; 6,23]	[5,27; 6,48]	[5,19; 6,43]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1480	1045	974	938	889	809	731	660	618	590	565	541	492	486	488	456	425	385	362
		CI Anteil in %	[6,03; 6,66]	[5,84; 6,57]	[5,64; 6,38]	[5,90; 6,68]	[6,18; 7,02]	[6,06; 6,92]	[5,96; 6,86]	[5,99; 6,95]	[6,11; 7,11]	[6,09; 7,12]	[6,18; 7,25]	[6,25; 7,35]	[5,91; 7,01]	[6,17; 7,33]	[6,56; 7,78]	[6,43; 7,68]	[6,36; 7,64]	[6,00; 7,28]	[5,92; 7,23]
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	1308	919	877	842	757	692	627	523	490	459	423	448	421	399	377	353	316	290	272
		CI Anteil in %	[5,31; 5,90]	[5,12; 5,80]	[5,06; 5,76]	[5,27; 6,01]	[5,23; 6,01]	[5,15; 5,95]	[5,08; 5,92]	[4,70; 5,55]	[4,79; 5,69]	[4,68; 5,60]	[4,56; 5,50]	[5,12; 6,14]	[5,01; 6,04]	[5,01; 6,07]	[4,99; 6,08]	[4,91; 6,01]	[4,64; 5,76]	[4,44; 5,56]	[4,37; 5,51]
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	1700	1164	1171	1067	977	904	846	784	760	761	701	632	631	614	575	556	538	531	494
		CI Anteil in %	[6,95; 7,62]	[6,53; 7,30]	[6,83; 7,63]	[6,74; 7,57]	[6,81; 7,69]	[6,80; 7,71]	[6,94; 7,90]	[7,17; 8,20]	[7,58; 8,68]	[7,94; 9,10]	[7,74; 8,92]	[7,35; 8,54]	[7,67; 8,90]	[7,88; 9,17]	[7,79; 9,11]	[7,92; 9,28]	[8,14; 9,57]	[8,41; 9,89]	[8,22; 9,73]
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	3381	2502	2521	2388	2256	2144	1973	1780	1701	1642	1611	1505	1521	1479	1445	1420	1390	1353	1315
		CI Anteil in %	[14,04; 14,94]	[14,32; 15,40]	[15,00; 16,12]	[15,42; 16,60]	[16,11; 17,38]	[16,54; 17,87]	[16,61; 18,00]	[16,71; 18,18]	[17,41; 18,98]	[17,59; 19,19]	[18,31; 19,99]	[18,06; 19,78]	[19,07; 20,87]	[19,60; 21,47]	[20,25; 22,20]	[20,95; 22,97]	[21,83; 23,94]	[22,23; 24,41]	[22,75; 25,00]

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736
	auswertbar	Anzahl	112963	77530	70632	61146	53756	48265	43834	40367	38524	36399	34388	33456	31987	30494	29101	27670	26411	25112
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	21692	13643	11888	9903	8442	7285	6473	5813	5372	4988	4516	4259	3950	3640	3421	3198	3040	2854
		Anteil in %	19,20	17,60	16,83	16,20	15,70	15,09	14,77	14,40	13,94	13,70	13,13	12,73	12,35	11,94	11,76	11,56	11,51	11,37
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[18,97; 19,43]	[17,33; 17,87]	[16,55; 17,11]	[15,90; 16,49]	[15,40; 16,01]	[14,77; 15,41]	[14,43; 15,10]	[14,06; 14,74]	[13,60; 14,29]	[13,35; 14,06]	[12,78; 13,49]	[12,37; 13,09]	[11,99; 12,71]	[11,57; 12,30]	[11,39; 12,13]	[11,18; 11,93]	[11,13; 11,90]	[10,97; 11,76]
		Anzahl	22301	16009	15002	13206	11744	10690	9842	9061	8695	8247	7861	7603	7235	6860	6494	6140	5799	5483
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	19,74	20,65	21,24	21,60	21,85	22,15	22,45	22,45	22,57	22,66	22,86	22,73	22,62	22,50	22,32	22,19	21,96	21,83
		CI Anteil in %	[19,51; 19,97]	[20,36; 20,93]	[20,94; 21,54]	[21,27; 21,92]	[21,50; 22,20]	[21,78; 22,52]	[22,06; 22,84]	[22,04; 22,85]	[22,15; 22,99]	[22,23; 23,09]	[22,42; 23,30]	[22,28; 23,17]	[22,16; 23,08]	[22,03; 22,96]	[21,84; 22,79]	[21,70; 22,68]	[21,46; 22,46]	[21,32; 22,35]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	5295	3295	2970	2488	2101	1836	1607	1395	1231	1135	1090	960	872	775	699	611	553	511
		Anteil in %	4,69	4,25	4,20	4,07	3,91	3,80	3,67	3,46	3,20	3,12	3,17	2,87	2,73	2,54	2,40	2,21	2,09	2,03
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[4,56; 4,81]	[4,11; 4,39]	[4,06; 4,35]	[3,91; 4,23]	[3,74; 4,07]	[3,63; 3,97]	[3,49; 3,84]	[3,28; 3,63]	[3,02; 3,37]	[2,94; 3,30]	[2,98; 3,35]	[2,69; 3,05]	[2,55; 2,90]	[2,36; 2,72]	[2,23; 2,58]	[2,04; 2,38]	[1,92; 2,27]	[1,86; 2,21]
		Anzahl	3850	2481	2111	1737	1378	1142	989	834	717	617	645	592	556	480	408	375	344	306
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	3,41	3,20	2,99	2,84	2,56	2,37	2,26	2,07	1,86	1,70	1,88	1,77	1,74	1,57	1,40	1,36	1,30	1,22
		CI Anteil in %	[3,30; 3,51]	[3,08; 3,32]	[2,86; 3,11]	[2,71; 2,97]	[2,43; 2,70]	[2,23; 2,50]	[2,12; 2,40]	[1,93; 2,20]	[1,73; 2,00]	[1,56; 1,83]	[1,73; 2,02]	[1,63; 1,91]	[1,59; 1,88]	[1,43; 1,71]	[1,27; 1,54]	[1,22; 1,49]	[1,17; 1,44]	[1,08; 1,35]
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	7430	5318	4906	4208	3836	3372	3178	2893	2816	2608	2564	2531	2397	2324	2247	2124	2057	1948
		Anteil in %	6,58	6,86	6,95	6,88	7,14	6,99	7,25	7,17	7,31	7,17	7,46	7,57	7,49	7,62	7,72	7,68	7,79	7,76
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[6,43; 6,72]	[6,68; 7,04]	[6,76; 7,13]	[6,68; 7,08]	[6,92; 7,35]	[6,76; 7,21]	[7,01; 7,49]	[6,92; 7,42]	[7,05; 7,57]	[6,90; 7,43]	[7,18; 7,73]	[7,28; 7,85]	[7,21; 7,78]	[7,32; 7,92]	[7,41; 8,03]	[7,36; 7,99]	[7,47; 8,11]	[7,43; 8,09]
		Anzahl	10148	7252	6390	5565	4705	4210	3613	3328	3163	3005	2812	2655	2514	2372	2161	2051	1936	1788
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	8,98	9,35	9,05	9,10	8,75	8,72	8,24	8,24	8,21	8,26	8,18	7,94	7,86	7,78	7,43	7,41	7,33	7,12
		CI Anteil in %	[8,82; 9,15]	[9,15; 9,56]	[8,84; 9,26]	[8,87; 9,33]	[8,51; 8,99]	[8,47; 8,97]	[7,99; 8,50]	[7,98; 8,51]	[7,94; 8,48]	[7,97; 8,54]	[7,89; 8,47]	[7,65; 8,23]	[7,56; 8,15]	[7,48; 8,08]	[7,12; 7,73]	[7,10; 7,72]	[7,02; 7,64]	[6,80; 7,44]
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	7859	5602	5155	4446	3989	3566	3182	2902	2716	2530	2650	2506	2317	2157	2033	1901	1762	1623	
	Anteil in %	6,96	7,23	7,30	7,27	7,42	7,39	7,26	7,19	7,05	6,95	7,71	7,49	7,24	7,07	6,99	6,87	6,67	6,46	
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[6,81; 7,11]	[7,04; 7,41]	[7,11; 7,49]	[7,07; 7,48]	[7,20; 7,64]	[7,16; 7,62]	[7,02; 7,50]	[6,94; 7,44]	[6,79; 7,31]	[6,69; 7,21]	[7,42; 7,99]	[7,21; 7,77]	[6,96; 7,53]	[6,79; 7,36]	[6,69; 7,28]	[6,57; 7,17]	[6,37; 6,97]	[6,16; 6,77]	
	Anzahl	9636	6860	6194	5505	4963	4623	4327	4058	4006	3821	3400	3411	3401	3294	3195	3078	2948	2792	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	8,53	8,85	8,77	9,00	9,23	9,58	9,87	10,05	10,40	10,50	9,89	10,20	10,63	10,80	10,98	11,12	11,16	11,12	
	CI Anteil in %	[8,37; 8,69]	[8,65; 9,05]	[8,56; 8,98]	[8,78; 9,23]	[8,99; 9,48]	[9,32; 9,84]	[9,59; 10,15]	[9,76; 10,35]	[10,09; 10,70]	[10,18; 10,81]	[9,57; 10,20]	[9,87; 10,52]	[10,29; 10,97]	[10,45; 11,15]	[10,62; 11,34]	[10,75; 11,49]	[10,78; 11,54]	[10,73; 11,51]	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	12373	9539	9388	8606	7920	7449	6975	6736	6692	6542	6351	6463	6422	6385	6312	6220	6114	6028	
	Anteil in %	10,95	12,30	13,29	14,07	14,73	15,43	15,91	16,69	17,37	17,97	18,47	19,32	20,08	20,94	21,69	22,48	23,15	24,00	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[10,77; 11,14]	[12,07; 12,53]	[13,04; 13,54]	[13,80; 14,35]	[14,43; 15,03]	[15,11; 15,76]	[15,57; 16,25]	[16,32; 17,05]	[16,99; 17,75]	[17,58; 18,37]	[18,06; 18,88]	[18,89; 19,74]	[19,64; 20,52]	[20,48; 21,40]	[21,22; 22,16]	[21,99; 22,97]	[22,64; 23,66]	[23,48; 24,53]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	142866	112069	93979	81049	71389	64294	58333	54388	51899	49824	47865	45920	43703	41770	39917	38116	36445	34887
	auswertbar	Anzahl	142342	99147	90637	78693	69719	62672	56920	52238	50135	47415	44748	43458	41570	39632	37913	36110	34466	32775
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	28827	18570	16622	13891	11954	10400	9174	8124	7622	6960	6378	6057	5654	5262	4911	4537	4263	3984
		Anteil in %	20,25	18,73	18,34	17,65	17,15	16,59	16,12	15,55	15,20	14,68	14,25	13,94	13,60	13,28	12,95	12,56	12,37	12,16
		CI Anteil in %	[20,04; 20,46]	[18,49; 18,97]	[18,09; 18,59]	[17,39; 17,92]	[16,87; 17,43]	[16,30; 16,89]	[15,82; 16,42]	[15,24; 15,86]	[14,89; 15,52]	[14,36; 15,00]	[13,93; 14,58]	[13,61; 14,26]	[13,27; 13,93]	[12,94; 13,61]	[12,62; 13,29]	[12,22; 12,91]	[12,02; 12,72]	[11,80; 12,51]
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	28771	20744	19315	16780	14939	13449	12366	11433	10891	10403	9810	9484	9022	8564	8194	7832	7482	7060
		Anteil in %	20,21	20,92	21,31	21,32	21,43	21,46	21,73	21,89	21,72	21,94	21,92	21,82	21,70	21,61	21,61	21,69	21,71	21,54
		CI Anteil in %	[20,00; 20,42]	[20,67; 21,18]	[21,04; 21,58]	[21,04; 21,61]	[21,12; 21,73]	[21,14; 21,78]	[21,39; 22,06]	[21,53; 22,24]	[21,36; 22,08]	[21,57; 22,31]	[21,54; 22,31]	[21,44; 22,21]	[21,31; 22,10]	[21,20; 22,01]	[21,20; 22,03]	[21,26; 22,11]	[21,27; 22,14]	[21,10; 21,99]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	6411	4263	3679	3072	2582	2197	1940	1646	1602	1418	1326	1235	1134	993	911	822	759	658
		Anteil in %	4,50	4,30	4,06	3,90	3,70	3,51	3,41	3,15	3,20	2,99	2,96	2,84	2,73	2,51	2,40	2,28	2,20	2,01
		CI Anteil in %	[4,40; 4,61]	[4,17; 4,43]	[3,93; 4,19]	[3,77; 4,04]	[3,56; 3,84]	[3,36; 3,65]	[3,26; 3,56]	[3,00; 3,30]	[3,04; 3,35]	[2,84; 3,14]	[2,81; 3,12]	[2,69; 3,00]	[2,57; 2,88]	[2,35; 2,66]	[2,25; 2,56]	[2,12; 2,43]	[2,05; 2,36]	[1,86; 2,16]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	5181	3476	2983	2458	1971	1647	1395	1272	1138	1018	974	895	839	758	675	612	551	501
		Anteil in %	3,64	3,51	3,29	3,12	2,83	2,63	2,45	2,44	2,27	2,15	2,18	2,06	2,02	1,91	1,78	1,69	1,60	1,53
		CI Anteil in %	[3,54; 3,74]	[3,39; 3,62]	[3,18; 3,41]	[3,00; 3,25]	[2,70; 2,95]	[2,50; 2,75]	[2,32; 2,58]	[2,30; 2,57]	[2,14; 2,40]	[2,02; 2,28]	[2,04; 2,31]	[1,93; 2,19]	[1,88; 2,15]	[1,78; 2,05]	[1,65; 1,91]	[1,56; 1,83]	[1,47; 1,73]	[1,40; 1,66]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8130	5872	5485	4856	4385	3911	3671	3383	3361	3194	3152	3035	2995	2813	2755	2660	2626	2556
		Anteil in %	5,71	5,92	6,05	6,17	6,29	6,24	6,45	6,48	6,70	6,74	7,04	6,98	7,20	7,10	7,27	7,37	7,62	7,80
		CI Anteil in %	[5,59; 5,83]	[5,78; 6,07]	[5,90; 6,21]	[6,00; 6,34]	[6,11; 6,47]	[6,05; 6,43]	[6,25; 6,65]	[6,27; 6,69]	[6,48; 6,92]	[6,51; 6,96]	[6,81; 7,28]	[6,74; 7,22]	[6,96; 7,45]	[6,84; 7,35]	[7,01; 7,53]	[7,10; 7,64]	[7,34; 7,90]	[7,51; 8,09]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	12961	9426	8434	7375	6445	5740	5132	4775	4537	4350	4095	3930	3619	3485	3312	3140	2903	2730
		Anteil in %	9,11	9,51	9,31	9,37	9,24	9,16	9,02	9,14	9,05	9,17	9,15	9,04	8,71	8,79	8,74	8,70	8,42	8,33
		CI Anteil in %	[8,96; 9,25]	[9,32; 9,69]	[9,12; 9,49]	[9,17; 9,58]	[9,03; 9,46]	[8,93; 9,38]	[8,78; 9,25]	[8,89; 9,39]	[8,80; 9,30]	[8,91; 9,43]	[8,88; 9,42]	[8,77; 9,31]	[8,43; 8,98]	[8,51; 9,07]	[8,45; 9,02]	[8,41; 8,99]	[8,13; 8,72]	[8,03; 8,63]
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	9109	6608	6139	5501	4923	4377	3911	3489	3289	3055	3191	3036	2850	2665	2470	2257	2094	1891
Anteil in %		6,40	6,66	6,77	6,99	7,06	6,98	6,87	6,68	6,56	6,44	7,13	6,99	6,86	6,72	6,51	6,25	6,08	5,77	
	CI Anteil in %	[6,27; 6,53]	[6,51; 6,82]	[6,61; 6,94]	[6,81; 7,17]	[6,87; 7,25]	[6,78; 7,18]	[6,66; 7,08]	[6,46; 6,89]	[6,34; 6,78]	[6,22; 6,66]	[6,89; 7,37]	[6,75; 7,23]	[6,61; 7,10]	[6,48; 6,97]	[6,27; 6,76]	[6,00; 6,50]	[5,82; 6,33]	[5,52; 6,02]	
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	10539	7650	6999	6205	5660	5329	4987	4658	4532	4368	3832	3849	3827	3775	3670	3512	3369	3287	
	Anteil in %	7,40	7,72	7,72	7,89	8,12	8,50	8,76	8,92	9,04	9,21	8,56	8,86	9,21	9,53	9,68	9,73	9,77	10,03	
	CI Anteil in %	[7,27; 7,54]	[7,55; 7,88]	[7,55; 7,90]	[7,70; 8,07]	[7,92; 8,32]	[8,28; 8,72]	[8,53; 8,99]	[8,67; 9,16]	[8,79; 9,29]	[8,95; 9,47]	[8,30; 8,82]	[8,59; 9,12]	[8,93; 9,48]	[9,24; 9,81]	[9,38; 9,98]	[9,42; 10,03]	[9,46; 10,09]	[9,70; 10,35]	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	17645	13514	13144	12025	11156	10595	9819	9384	9343	9121	8853	8913	8735	8548	8399	8271	8068	7892	
	Anteil in %	12,40	13,63	14,50	15,28	16,00	16,91	17,25	17,96	18,64	19,24	19,78	20,51	21,01	21,57	22,15	22,91	23,41	24,08	
	CI Anteil in %	[12,23; 12,57]	[13,42; 13,84]	[14,27; 14,73]	[15,03; 15,53]	[15,73; 16,27]	[16,61; 17,20]	[16,94; 17,56]	[17,63; 18,29]	[18,29; 18,98]	[18,88; 19,59]	[19,42; 20,15]	[20,13; 20,89]	[20,62; 21,40]	[21,16; 21,97]	[21,74; 22,57]	[22,47; 23,34]	[22,96; 23,86]	[23,62; 24,54]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	135113	117334	103812	91303	83101	76292	71451	68330	65532	62899	60399	57709	55309	52910	50489	48328	46232	
	auswertbar	Anzahl	134838	112088	100237	86678	80488	74073	68228	65509	61946	58862	57091	54717	52224	49925	47380	45405	43190	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	21595	17974	15570	13047	11893	10791	9619	9078	8378	7645	7182	6725	6170	5826	5377	5069	4751	
		Anteil in %	16,02	16,04	15,53	15,05	14,78	14,57	14,10	13,86	13,52	12,99	12,58	12,29	11,81	11,67	11,35	11,16	11,00	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[15,82; 16,21]	[15,82; 16,25]	[15,31; 15,76]	[14,81; 15,29]	[14,53; 15,02]	[14,31; 14,82]	[13,84; 14,36]	[13,59; 14,12]	[13,26; 13,79]	[12,72; 13,26]	[12,31; 12,85]	[12,02; 12,57]	[11,54; 12,09]	[11,39; 11,95]	[11,06; 11,63]	[10,87; 11,45]	[10,71; 11,30]	
		Anzahl	26356	22519	20041	17668	16412	15173	13944	13345	12637	11940	11542	10903	10222	9744	9204	8813	8321	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	19,55	20,09	19,99	20,38	20,39	20,48	20,44	20,37	20,40	20,28	20,22	19,93	19,57	19,52	19,43	19,41	19,27	
		CI Anteil in %	[19,33; 19,76]	[19,86; 20,33]	[19,75; 20,24]	[20,12; 20,65]	[20,11; 20,67]	[20,19; 20,77]	[20,13; 20,74]	[20,06; 20,68]	[20,08; 20,72]	[19,96; 20,61]	[19,89; 20,55]	[19,59; 20,26]	[19,23; 19,91]	[19,17; 19,86]	[19,07; 19,78]	[19,05; 19,77]	[18,89; 19,64]	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	5686	4276	3489	2960	2572	2270	1975	1807	1599	1499	1416	1272	1165	1068	941	848	748	
		Anteil in %	4,22	3,81	3,48	3,41	3,20	3,06	2,89	2,76	2,58	2,55	2,48	2,32	2,23	2,14	1,99	1,87	1,73	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[4,11; 4,32]	[3,70; 3,93]	[3,37; 3,59]	[3,29; 3,54]	[3,07; 3,32]	[2,94; 3,19]	[2,77; 3,02]	[2,63; 2,88]	[2,46; 2,71]	[2,42; 2,67]	[2,35; 2,61]	[2,20; 2,45]	[2,10; 2,36]	[2,01; 2,27]	[1,86; 2,11]	[1,74; 1,99]	[1,61; 1,85]	
		Anzahl	4367	3218	2646	2071	1805	1495	1282	1127	1023	946	857	776	667	619	558	521	444	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	3,24	2,87	2,64	2,39	2,24	2,02	1,88	1,72	1,65	1,61	1,50	1,42	1,28	1,24	1,18	1,15	1,03	
		CI Anteil in %	[3,14; 3,33]	[2,77; 2,97]	[2,54; 2,74]	[2,29; 2,49]	[2,14; 2,34]	[1,92; 2,12]	[1,78; 1,98]	[1,62; 1,82]	[1,55; 1,75]	[1,51; 1,71]	[1,40; 1,60]	[1,32; 1,52]	[1,18; 1,37]	[1,14; 1,34]	[1,08; 1,27]	[1,05; 1,25]	[0,93; 1,12]	
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	9304	8166	7511	6429	5979	5662	5210	5089	4771	4620	4503	4360	4182	4038	3798	3723	3528	
		Anteil in %	6,90	7,29	7,49	7,42	7,43	7,64	7,64	7,77	7,70	7,85	7,89	7,97	8,01	8,09	8,02	8,20	8,17	
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[6,76; 7,04]	[7,13; 7,44]	[7,33; 7,66]	[7,24; 7,59]	[7,25; 7,61]	[7,45; 7,84]	[7,44; 7,84]	[7,56; 7,97]	[7,49; 7,91]	[7,63; 8,07]	[7,67; 8,11]	[7,74; 8,20]	[7,78; 8,24]	[7,85; 8,33]	[7,77; 8,26]	[7,95; 8,45]	[7,91; 8,43]	
		Anzahl	13321	10989	9837	8433	7839	7023	6379	6037	5736	5490	5190	4847	4610	4322	4093	3825	3552	
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	9,88	9,80	9,81	9,73	9,74	9,48	9,35	9,22	9,26	9,33	9,09	8,86	8,83	8,66	8,64	8,42	8,22	
		CI Anteil in %	[9,72; 10,04]	[9,63; 9,98]	[9,63; 10,00]	[9,53; 9,93]	[9,53; 9,94]	[9,27; 9,69]	[9,13; 9,57]	[8,99; 9,44]	[9,03; 9,49]	[9,09; 9,56]	[8,85; 9,33]	[8,62; 9,10]	[8,58; 9,07]	[8,41; 8,90]	[8,39; 8,89]	[8,17; 8,68]	[7,97; 8,48]	
Kombination aus „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	8679	7223	6578	5703	5138	4635	4236	3957	3598	4006	3832	3580	3324	3101	2856	2645	2479		
	Anteil in %	6,44	6,44	6,56	6,58	6,38	6,26	6,21	6,04	5,81	6,81	6,71	6,54	6,36	6,21	6,03	5,83	5,74		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[6,31; 6,57]	[6,30; 6,59]	[6,41; 6,72]	[6,41; 6,74]	[6,21; 6,55]	[6,08; 6,43]	[6,03; 6,39]	[5,86; 6,22]	[5,62; 5,99]	[6,60; 7,01]	[6,51; 6,92]	[6,34; 6,75]	[6,16; 6,57]	[6,00; 6,42]	[5,81; 6,24]	[5,61; 6,04]	[5,52; 5,96]		
	Anzahl	13850	11337	10650	9333	8985	8494	8087	8015	7787	7005	6912	6857	6735	6491	6334	6106	5849		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	10,27	10,11	10,62	10,77	11,16	11,47	11,85	12,23	12,57	11,90	12,11	12,53	12,90	13,00	13,37	13,45	13,54		
	CI Anteil in %	[10,11; 10,43]	[9,94; 10,29]	[10,43; 10,82]	[10,56; 10,97]	[10,95; 11,38]	[11,24; 11,70]	[11,61; 12,10]	[11,98; 12,49]	[12,31; 12,83]	[11,64; 12,16]	[11,84; 12,37]	[12,25; 12,81]	[12,61; 13,18]	[12,71; 13,30]	[13,06; 13,67]	[13,13; 13,76]	[13,22; 13,87]		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	15113	14026	13348	12203	11787	11226	10923	10889	10686	10690	10827	10817	10753	10586	10398	10230	10104		
	Anteil in %	11,21	12,51	13,32	14,08	14,64	15,16	16,01	16,62	17,25	18,16	18,96	19,77	20,59	21,20	21,95	22,53	23,39		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[11,04; 11,38]	[12,32; 12,71]	[13,11; 13,53]	[13,85; 14,31]	[14,40; 14,89]	[14,90; 15,41]	[15,73; 16,28]	[16,34; 16,91]	[16,95; 17,55]	[17,85; 18,47]	[18,64; 19,29]	[19,44; 20,10]	[20,24; 20,94]	[20,85; 21,56]	[21,57; 22,32]	[22,15; 22,91]	[23,00; 23,79]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	163432	142749	126918	112329	102494	94300	88366	84645	81247	78247	75048	71529	68399	65504	62532	59887	57490	
	auswertbar	Anzahl	163112	136711	122588	106739	99206	91579	84387	81128	76911	73194	70684	67679	64533	61759	58729	56166	53645	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	27246	23007	20100	16925	15432	14112	12753	12021	11169	10302	9714	9055	8350	7902	7360	6954	6576	
		CI Anteil in %	[16,52; 16,88]	[16,63; 17,03]	[16,19; 16,60]	[15,64; 16,08]	[15,33; 15,78]	[15,18; 15,64]	[14,87; 15,35]	[14,57; 15,06]	[14,27; 14,77]	[13,82; 14,33]	[13,49; 14,00]	[13,12; 13,64]	[12,68; 13,20]	[12,53; 13,06]	[12,26; 12,80]	[12,11; 12,65]	[11,98; 12,54]	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	31849	27304	24116	21248	19584	18142	16659	15910	15097	14384	13809	13032	12282	11674	11015	10503	10047	
		CI Anteil in %	[19,33; 19,72]	[19,76; 20,18]	[19,45; 19,89]	[19,67; 20,15]	[19,49; 19,99]	[19,55; 20,07]	[19,47; 20,01]	[19,34; 19,88]	[19,35; 19,91]	[19,36; 19,94]	[19,24; 19,83]	[18,96; 19,55]	[18,73; 19,34]	[18,59; 19,21]	[18,44; 19,07]	[18,38; 19,02]	[18,40; 19,06]	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	6954	5320	4420	3660	3165	2838	2449	2212	2002	1903	1737	1578	1423	1278	1120	1027	888	
		CI Anteil in %	[4,17; 4,36]	[3,79; 3,99]	[3,50; 3,71]	[3,32; 3,54]	[3,08; 3,30]	[2,99; 3,21]	[2,79; 3,02]	[2,61; 2,84]	[2,49; 2,72]	[2,48; 2,72]	[2,34; 2,57]	[2,22; 2,45]	[2,09; 2,32]	[1,96; 2,18]	[1,80; 2,02]	[1,72; 1,94]	[1,55; 1,76]	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	5777	4257	3577	2841	2467	2134	1836	1646	1447	1372	1220	1142	1016	877	813	740	663	
		CI Anteil in %	[3,45; 3,63]	[3,02; 3,21]	[2,82; 3,01]	[2,57; 2,76]	[2,39; 2,58]	[2,23; 2,43]	[2,08; 2,27]	[1,93; 2,13]	[1,79; 1,98]	[1,78; 1,97]	[1,63; 1,82]	[1,59; 1,78]	[1,48; 1,67]	[1,33; 1,51]	[1,29; 1,48]	[1,22; 1,41]	[1,14; 1,33]	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	9882	8886	8161	7217	6802	6379	5917	5865	5642	5625	5408	5242	5013	4855	4736	4630	4398	
		CI Anteil in %	[5,94; 6,17]	[6,37; 6,63]	[6,52; 6,80]	[6,61; 6,91]	[6,70; 7,01]	[6,80; 7,13]	[6,84; 7,18]	[7,05; 7,41]	[7,15; 7,52]	[7,49; 7,88]	[7,45; 7,85]	[7,54; 7,95]	[7,56; 7,97]	[7,65; 8,07]	[7,84; 8,28]	[8,02; 8,47]	[7,97; 8,43]	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	16487	13791	12545	10815	10018	9046	8325	8051	7620	7296	6891	6480	6174	5841	5487	5186	4839	
		CI Anteil in %	[9,96; 10,25]	[9,93; 10,25]	[10,06; 10,40]	[9,95; 10,31]	[9,91; 10,29]	[9,93; 10,07]	[9,66; 10,07]	[9,72; 10,13]	[9,70; 10,12]	[9,75; 10,19]	[9,53; 9,97]	[9,35; 9,80]	[9,34; 9,79]	[9,23; 9,69]	[9,11; 9,58]	[8,99; 9,47]	[8,78; 9,26]	
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	9933	8402	7716	6671	6040	5478	4908	4619	4289	4686	4486	4230	3815	3591	3325	3113	2875	
		CI Anteil in %	[5,97; 6,21]	[6,02; 6,27]	[6,16; 6,43]	[6,10; 6,40]	[5,94; 6,24]	[5,83; 6,14]	[5,66; 5,97]	[5,53; 5,85]	[5,41; 5,74]	[6,22; 6,58]	[6,17; 6,53]	[6,07; 6,43]	[5,73; 6,09]	[5,63; 6,00]	[5,47; 5,85]	[5,35; 5,73]	[5,17; 5,55]	
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	14682	12245	11521	10385	10050	9560	9145	8995	8692	7873	7892	7747	7662	7385	7135	6814	6619	
		CI Anteil in %	[8,86; 9,14]	[8,81; 9,11]	[9,23; 9,56]	[9,55; 9,91]	[9,94; 10,32]	[10,24; 10,64]	[10,63; 11,05]	[10,87; 11,30]	[11,08; 11,53]	[10,53; 10,98]	[10,93; 11,40]	[11,21; 11,69]	[11,62; 12,12]	[11,70; 12,21]	[11,88; 12,41]	[11,86; 12,40]	[12,06; 12,62]	
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	21208	19158	18156	16507	15947	15172	14492	14438	14106	13815	13882	13736	13601	13361	13095	12809	12599	
		CI Anteil in %	[12,84; 13,17]	[13,83; 14,20]	[14,61; 15,01]	[15,25; 15,68]	[15,85; 16,30]	[16,33; 16,81]	[16,92; 17,43]	[17,53; 18,06]	[18,07; 18,61]	[18,59; 19,16]	[19,35; 19,93]	[19,99; 20,60]	[20,76; 21,39]	[21,31; 21,96]	[21,96; 22,63]	[22,46; 23,15]	[23,13; 23,84]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98842	87165	76003	67529	60776	56404	53744	51331	49147	47087	44843	42838	41044	39180	37515	35933		
	auswertbar	Anzahl	98841	82457	72232	64913	58549	53348	50999	47776	45101	43557	41653	39706	38014	36135	34587	32863		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	19781	15933	13420	11909	10522	9256	8625	7853	6984	6539	6101	5607	5240	4847	4508	4162		
		Anteil in %	20,01	19,32	18,58	18,35	17,97	17,35	16,91	16,44	15,49	15,01	14,65	14,12	13,78	13,41	13,03	12,66		
		CI Anteil in %	[19,76; 20,26]	[19,05; 19,59]	[18,30; 18,86]	[18,05; 18,64]	[17,66; 18,28]	[17,03; 17,67]	[16,59; 17,24]	[16,10; 16,77]	[15,15; 15,82]	[14,68; 15,35]	[14,31; 14,99]	[13,78; 14,46]	[13,44; 14,13]	[13,06; 13,76]	[12,68; 13,39]	[12,31; 13,02]		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	17736	14803	12963	11639	10364	9628	9170	8642	8168	7848	7427	6995	6674	6268	5989	5715		
		Anteil in %	17,94	17,95	17,95	17,93	17,70	18,05	17,98	18,09	18,11	18,02	17,83	17,62	17,56	17,35	17,32	17,39		
		CI Anteil in %	[17,70; 18,18]	[17,69; 18,21]	[17,67; 18,23]	[17,64; 18,23]	[17,39; 18,01]	[17,72; 18,37]	[17,65; 18,31]	[17,74; 18,43]	[17,76; 18,47]	[17,66; 18,38]	[17,46; 18,20]	[17,24; 17,99]	[17,17; 17,94]	[16,96; 17,74]	[16,92; 17,71]	[16,98; 17,80]		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	3712	2970	2519	2083	1798	1569	1420	1251	1242	1136	1034	921	825	728	645	563		
		Anteil in %	3,76	3,60	3,49	3,21	3,07	2,94	2,78	2,62	2,75	2,61	2,48	2,32	2,17	2,01	1,86	1,71		
		CI Anteil in %	[3,64; 3,87]	[3,47; 3,73]	[3,35; 3,62]	[3,07; 3,34]	[2,93; 3,21]	[2,80; 3,08]	[2,64; 2,93]	[2,48; 2,76]	[2,60; 2,90]	[2,46; 2,76]	[2,33; 2,63]	[2,17; 2,47]	[2,02; 2,32]	[1,87; 2,16]	[1,72; 2,01]	[1,57; 1,85]		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	3065	2362	1905	1596	1350	1155	1043	900	863	787	699	624	577	497	454	419		
		Anteil in %	3,10	2,86	2,64	2,46	2,31	2,17	2,05	1,88	1,91	1,81	1,68	1,57	1,52	1,38	1,31	1,27		
		CI Anteil in %	[2,99; 3,21]	[2,75; 2,98]	[2,52; 2,75]	[2,34; 2,58]	[2,18; 2,43]	[2,04; 2,29]	[1,92; 2,17]	[1,76; 2,01]	[1,79; 2,04]	[1,68; 1,93]	[1,55; 1,80]	[1,45; 1,69]	[1,39; 1,64]	[1,26; 1,50]	[1,19; 1,43]	[1,15; 1,40]		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7313	6342	5634	5046	4653	4287	4133	3914	3803	3634	3528	3363	3232	3112	3022	2846		
		Anteil in %	7,40	7,69	7,80	7,77	7,95	8,04	8,10	8,19	8,43	8,34	8,47	8,47	8,50	8,61	8,74	8,66		
		CI Anteil in %	[7,24; 7,56]	[7,51; 7,87]	[7,60; 8,00]	[7,57; 7,98]	[7,73; 8,17]	[7,81; 8,27]	[7,87; 8,34]	[7,95; 8,44]	[8,18; 8,69]	[8,08; 8,60]	[8,20; 8,74]	[8,20; 8,74]	[8,22; 8,78]	[8,32; 8,90]	[8,44; 9,03]	[8,36; 8,96]		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	10862	9067	7855	6984	6224	5554	5332	4972	4706	4458	4160	3948	3681	3468	3260	3092		
		Anteil in %	10,99	11,00	10,87	10,76	10,63	10,41	10,46	10,41	10,43	10,23	9,99	9,94	9,68	9,60	9,43	9,41		
		CI Anteil in %	[10,79; 11,18]	[10,78; 11,21]	[10,65; 11,10]	[10,52; 11,00]	[10,38; 10,88]	[10,15; 10,67]	[10,19; 10,72]	[10,13; 10,68]	[10,15; 10,72]	[9,95; 10,52]	[9,70; 10,28]	[9,65; 10,24]	[9,39; 9,98]	[9,29; 9,90]	[9,12; 9,73]	[9,09; 9,72]		
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	6157	5432	4735	4202	3803	3374	3136	2874	3207	3037	2831	2643	2466	2253	2124	1955			
	Anteil in %	6,23	6,59	6,56	6,47	6,50	6,32	6,15	6,02	7,11	6,97	6,80	6,66	6,49	6,23	6,14	5,95			
	CI Anteil in %	[6,08; 6,38]	[6,42; 6,76]	[6,37; 6,74]	[6,28; 6,66]	[6,30; 6,70]	[6,12; 6,53]	[5,94; 6,36]	[5,80; 6,23]	[6,87; 7,35]	[6,73; 7,21]	[6,55; 7,04]	[6,41; 6,90]	[6,24; 6,73]	[5,99; 6,48]	[5,89; 6,39]	[5,69; 6,20]			
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	8946	7876	7142	6724	6222	5863	5826	5598	5057	5074	5039	4934	4897	4774	4570	4371			
	Anteil in %	9,05	9,55	9,89	10,36	10,63	10,99	11,42	11,72	11,21	11,65	12,10	12,43	12,88	13,21	13,21	13,30			
	CI Anteil in %	[8,87; 9,23]	[9,35; 9,75]	[9,67; 10,11]	[10,12; 10,59]	[10,38; 10,88]	[10,72; 11,26]	[11,15; 11,70]	[11,43; 12,01]	[10,92; 11,50]	[11,35; 11,95]	[11,78; 12,41]	[12,10; 12,75]	[12,55; 13,22]	[12,86; 13,56]	[12,86; 13,57]	[12,93; 13,67]			
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	10642	9690	9046	8568	8005	7603	7602	7468	7329	7500	7483	7453	7360	7306	7284	7142			
	Anteil in %	10,77	11,75	12,52	13,20	13,67	14,25	14,91	15,63	16,25	17,22	17,97	18,77	19,36	20,22	21,06	21,73			
	CI Anteil in %	[10,57; 10,96]	[11,53; 11,97]	[12,28; 12,76]	[12,94; 13,46]	[13,39; 13,95]	[13,96; 14,55]	[14,60; 15,22]	[15,31; 15,96]	[15,91; 16,59]	[16,86; 17,57]	[17,60; 18,33]	[18,39; 19,15]	[18,96; 19,76]	[19,80; 20,63]	[20,63; 21,49]	[21,29; 22,18]			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	115970	103008	90548	80776	73117	68112	65025	62178	59615	57124	54381	51939	49656	47443	45482	43521		
	auswertbar	Anzahl	115967	97604	86133	77941	70573	64614	61838	57874	54672	52791	50513	48086	45938	43716	41896	39832		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	24836	20415	17301	15394	13778	12276	11387	10364	9382	8763	8148	7539	7067	6610	6245	5881		
		CI Anteil in %	[21,18; 21,65]	[20,66; 21,17]	[19,82; 20,35]	[19,47; 20,03]	[19,23; 19,82]	[18,70; 19,30]	[18,11; 18,72]	[17,60; 18,22]	[16,84; 17,48]	[16,28; 16,92]	[15,81; 16,45]	[15,35; 16,00]	[15,05; 15,71]	[14,78; 15,46]	[14,56; 15,25]	[14,42; 15,11]		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	20366	16790	14821	13384	11972	10986	10508	9858	9351	9017	8577	8088	7638	7229	6911	6525		
		CI Anteil in %	[17,34; 17,78]	[16,97; 17,44]	[16,96; 17,46]	[16,91; 17,44]	[16,69; 17,24]	[16,71; 17,29]	[16,70; 17,29]	[16,73; 17,34]	[16,79; 17,42]	[16,76; 17,40]	[16,65; 17,31]	[16,49; 17,15]	[16,29; 16,97]	[16,19; 16,88]	[16,14; 16,85]	[16,02; 16,74]		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	4323	3434	2917	2513	2181	1846	1668	1483	1461	1328	1201	1067	965	877	794	706		
		CI Anteil in %	[3,62; 3,84]	[3,40; 3,63]	[3,27; 3,51]	[3,10; 3,35]	[2,96; 3,22]	[2,73; 2,99]	[2,57; 2,83]	[2,43; 2,69]	[2,54; 2,81]	[2,38; 2,65]	[2,24; 2,51]	[2,09; 2,35]	[1,97; 2,23]	[1,87; 2,14]	[1,76; 2,03]	[1,64; 1,90]		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	3627	2912	2405	2002	1678	1450	1323	1173	1216	1143	1030	922	837	736	677	603		
		CI Anteil in %	[3,03; 3,23]	[2,88; 3,09]	[2,68; 2,90]	[2,46; 2,68]	[2,27; 2,49]	[2,13; 2,36]	[2,03; 2,25]	[1,91; 2,14]	[2,10; 2,35]	[2,04; 2,29]	[1,92; 2,16]	[1,79; 2,04]	[1,70; 1,94]	[1,56; 1,80]	[1,50; 1,74]	[1,39; 1,63]		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7460	6619	6146	5568	5240	4841	4805	4640	4456	4409	4269	4123	4089	3898	3745	3596		
		CI Anteil in %	[6,29; 6,57]	[6,62; 6,94]	[6,96; 7,31]	[6,96; 7,32]	[7,23; 7,62]	[7,29; 7,70]	[7,56; 7,98]	[7,80; 8,24]	[7,92; 8,38]	[8,12; 8,59]	[8,21; 8,69]	[8,32; 8,82]	[8,64; 9,16]	[8,65; 9,18]	[8,67; 9,21]	[8,75; 9,31]		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13103	11174	9790	8835	7942	7373	7054	6620	6202	5895	5564	5302	4954	4683	4451	4198		
		CI Anteil in %	[11,12; 11,48]	[11,25; 11,65]	[11,15; 11,58]	[11,11; 11,56]	[11,02; 11,49]	[11,17; 11,66]	[11,16; 11,66]	[11,18; 11,70]	[11,08; 11,61]	[10,90; 11,44]	[10,74; 11,29]	[10,75; 11,31]	[10,50; 11,07]	[10,42; 11,00]	[10,33; 10,92]	[10,24; 10,84]		
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	6806	5987	5237	4721	4255	3816	3542	3245	3581	3355	3176	2918	2756	2561	2409	2193		
		CI Anteil in %	[5,73; 6,00]	[5,98; 6,28]	[5,92; 6,24]	[5,89; 6,22]	[5,85; 6,20]	[5,72; 6,09]	[5,54; 5,91]	[5,42; 5,79]	[6,34; 6,76]	[6,15; 6,56]	[6,08; 6,50]	[5,85; 6,28]	[5,78; 6,22]	[5,64; 6,08]	[5,53; 5,97]	[5,28; 5,73]		
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	9183	8147	7503	7009	6599	6241	6159	5989	5501	5481	5384	5300	5115	4972	4792	4648		
		CI Anteil in %	[7,76; 8,07]	[8,17; 8,52]	[8,52; 8,90]	[8,79; 9,19]	[9,14; 9,57]	[9,43; 9,89]	[9,72; 10,20]	[10,10; 10,60]	[9,81; 10,31]	[10,12; 10,64]	[10,39; 10,93]	[10,74; 11,30]	[10,85; 11,42]	[11,08; 11,67]	[11,13; 11,74]	[11,35; 11,98]		
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	14369	13075	12144	11329	10447	9973	9861	9502	9178	9166	9112	9002	8896	8779	8651	8419		
		CI Anteil in %	[12,20; 12,58]	[13,18; 13,61]	[13,87; 14,33]	[14,29; 14,78]	[14,54; 15,07]	[15,16; 15,71]	[15,66; 16,24]	[16,12; 16,72]	[16,47; 17,10]	[17,04; 17,69]	[17,70; 18,37]	[18,37; 19,07]	[19,00; 19,73]	[19,71; 20,46]	[20,26; 21,04]	[20,74; 21,54]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	105631	93726	83366	74241	68487	64764	61675	58977	56190	53398	50980	48671	46510	44483	42590				
	auswertbar	Anzahl	105631	89682	79928	72012	65489	62074	58220	54645	53096	50739	48338	46106	43948	41958	40025				
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	22877	18249	15734	13899	12099	11224	10132	9047	8499	7881	7252	6769	6280	5896	5477				
		Anteil in %	21,66	20,35	19,69	19,30	18,47	18,08	17,40	16,56	16,01	15,53	15,00	14,68	14,29	14,05	13,68				
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[21,41; 21,91]	[20,09; 20,61]	[19,41; 19,96]	[19,01; 19,59]	[18,18; 18,77]	[17,78; 18,38]	[17,09; 17,71]	[16,24; 16,87]	[15,69; 16,32]	[15,22; 15,85]	[14,68; 15,32]	[14,36; 15,00]	[13,96; 14,62]	[13,72; 14,38]	[13,35; 14,02]				
		Anzahl	18777	16022	14297	12950	11825	11159	10489	9825	9553	9115	8653	8145	7708	7267	6882				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	17,78	17,87	17,89	17,98	18,06	17,98	18,02	17,98	17,99	17,96	17,90	17,67	17,54	17,32	17,19				
		CI Anteil in %	[17,55; 18,01]	[17,61; 18,12]	[17,62; 18,15]	[17,70; 18,26]	[17,76; 18,35]	[17,67; 18,28]	[17,70; 18,33]	[17,66; 18,30]	[17,67; 18,32]	[17,63; 18,30]	[17,56; 18,24]	[17,32; 18,01]	[17,18; 17,89]	[16,96; 17,68]	[16,82; 17,56]				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	3719	3012	2553	2196	1917	1711	1503	1525	1365	1245	1094	995	894	808	738				
		Anteil in %	3,52	3,36	3,19	3,05	2,93	2,76	2,58	2,79	2,57	2,45	2,26	2,16	2,03	1,93	1,84				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[3,41; 3,63]	[3,24; 3,48]	[3,07; 3,32]	[2,92; 3,18]	[2,80; 3,06]	[2,63; 2,89]	[2,45; 2,71]	[2,65; 2,93]	[2,44; 2,71]	[2,32; 2,59]	[2,13; 2,40]	[2,03; 2,29]	[1,90; 2,17]	[1,79; 2,06]	[1,71; 1,98]				
		Anzahl	3042	2446	1993	1686	1448	1295	1103	1063	964	856	782	688	618	576	507				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	2,88	2,73	2,49	2,34	2,21	2,09	1,89	1,95	1,82	1,69	1,62	1,49	1,41	1,37	1,27				
		CI Anteil in %	[2,78; 2,98]	[2,62; 2,83]	[2,39; 2,60]	[2,23; 2,45]	[2,10; 2,32]	[1,97; 2,20]	[1,78; 2,01]	[1,83; 2,06]	[1,70; 1,93]	[1,58; 1,80]	[1,51; 1,73]	[1,38; 1,60]	[1,30; 1,52]	[1,26; 1,48]	[1,16; 1,38]				
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	7943	7275	6492	5893	5337	5193	4861	4732	4603	4407	4168	4060	3909	3811	3629				
		Anteil in %	7,52	8,11	8,12	8,18	8,15	8,37	8,35	8,66	8,67	8,69	8,62	8,81	8,89	9,08	9,07				
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[7,36; 7,68]	[7,93; 8,29]	[7,93; 8,31]	[7,98; 8,38]	[7,94; 8,36]	[8,15; 8,58]	[8,12; 8,57]	[8,42; 8,90]	[8,43; 8,91]	[8,44; 8,93]	[8,37; 8,87]	[8,55; 9,06]	[8,63; 9,16]	[8,81; 9,36]	[8,79; 9,35]				
		Anzahl	12479	10277	9111	7977	7298	6802	6373	5992	5707	5363	5063	4751	4512	4221	4000				
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	11,81	11,46	11,40	11,08	11,14	10,96	10,95	10,97	10,75	10,57	10,47	10,30	10,27	10,06	9,99				
		CI Anteil in %	[11,62; 12,01]	[11,25; 11,67]	[11,18; 11,62]	[10,85; 11,31]	[10,90; 11,38]	[10,71; 11,20]	[10,69; 11,20]	[10,70; 11,23]	[10,48; 11,01]	[10,30; 10,84]	[10,20; 10,75]	[10,03; 10,58]	[9,98; 10,55]	[9,77; 10,35]	[9,70; 10,29]				
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	6084	5537	4860	4332	3902	3693	3447	3738	3533	3304	3107	2897	2680	2493	2297					
	Anteil in %	5,76	6,17	6,08	6,02	5,96	5,95	5,92	6,84	6,65	6,51	6,43	6,28	6,10	5,94	5,74					
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[5,62; 5,90]	[6,02; 6,33]	[5,91; 6,25]	[5,84; 6,19]	[5,78; 6,14]	[5,76; 6,14]	[5,73; 6,11]	[6,63; 7,05]	[6,44; 6,87]	[6,30; 6,73]	[6,21; 6,65]	[6,06; 6,50]	[5,87; 6,32]	[5,72; 6,17]	[5,51; 5,97]					
	Anzahl	9076	8123	7545	7094	6709	6556	6433	5729	5772	5800	5744	5625	5398	5265	5058					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	8,59	9,06	9,44	9,85	10,24	10,56	11,05	10,48	10,87	11,43	11,88	12,20	12,28	12,55	12,64					
	CI Anteil in %	[8,42; 8,76]	[8,87; 9,25]	[9,24; 9,64]	[9,63; 10,07]	[10,01; 10,48]	[10,32; 10,80]	[10,79; 11,30]	[10,23; 10,74]	[10,61; 11,14]	[11,15; 11,71]	[11,59; 12,17]	[11,90; 12,50]	[11,98; 12,59]	[12,23; 12,87]	[12,31; 12,96]					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	11183	10572	10066	9473	9106	8981	8851	8670	8872	8712	8662	8521	8484	8383	8382					
	Anteil in %	10,59	11,79	12,59	13,15	13,90	14,47	15,20	15,87	16,71	17,17	17,92	18,48	19,30	19,98	20,94					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[10,40; 10,77]	[11,58; 12,00]	[12,36; 12,82]	[12,91; 13,40]	[13,64; 14,17]	[14,19; 14,74]	[14,91; 15,49]	[15,56; 16,17]	[16,39; 17,03]	[16,84; 17,50]	[17,58; 18,26]	[18,13; 18,84]	[18,94; 19,67]	[19,60; 20,36]	[20,54; 21,34]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	123470	110813	99471	89253	82572	78403	74799	71559	68310	64988	62073	59313	56688	54194	51856				
	auswertbar	Anzahl	123470	106065	95394	86605	79053	75295	70717	66359	64471	61767	58908	56307	53611	51210	48710				
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	28701	23359	20315	18105	15952	14854	13500	11966	11292	10529	9750	9225	8569	8083	7545				
		Anteil in %	23,25	22,02	21,30	20,91	20,18	19,73	19,09	18,03	17,51	17,05	16,55	16,38	15,98	15,78	15,49				
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[23,01; 23,48]	[21,77; 22,27]	[21,04; 21,56]	[20,63; 21,18]	[19,90; 20,46]	[19,44; 20,01]	[18,80; 19,38]	[17,74; 18,32]	[17,22; 17,81]	[16,75; 17,34]	[16,25; 16,85]	[16,08; 16,69]	[15,67; 16,29]	[15,47; 16,10]	[15,17; 15,81]				
		Anzahl	21590	18434	16564	15035	13752	12979	12144	11614	11124	10565	9989	9409	8911	8414	7929				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	17,49	17,38	17,36	17,36	17,40	17,24	17,17	17,50	17,25	17,10	16,96	16,71	16,62	16,43	16,28				
		CI Anteil in %	[17,27; 17,70]	[17,15; 17,61]	[17,12; 17,60]	[17,11; 17,61]	[17,13; 17,66]	[16,97; 17,51]	[16,89; 17,45]	[17,21; 17,79]	[16,96; 17,55]	[16,81; 17,40]	[16,65; 17,26]	[16,40; 17,02]	[16,31; 16,94]	[16,11; 16,75]	[15,95; 16,61]				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	4331	3614	3028	2626	2305	2065	1864	1772	1580	1441	1297	1188	1077	983	873				
		Anteil in %	3,51	3,41	3,17	3,03	2,92	2,74	2,64	2,67	2,45	2,33	2,20	2,11	2,01	1,92	1,79				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[3,41; 3,61]	[3,30; 3,52]	[3,06; 3,29]	[2,92; 3,15]	[2,80; 3,03]	[2,63; 2,86]	[2,52; 2,75]	[2,55; 2,79]	[2,33; 2,57]	[2,21; 2,45]	[2,08; 2,32]	[1,99; 2,23]	[1,89; 2,13]	[1,80; 2,04]	[1,67; 1,91]				
		Anzahl	3909	3093	2637	2232	1859	1631	1432	1423	1316	1165	1058	962	817	747	676				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	3,17	2,92	2,76	2,58	2,35	2,17	2,02	2,14	2,04	1,89	1,80	1,71	1,52	1,46	1,39				
		CI Anteil in %	[3,07; 3,26]	[2,81; 3,02]	[2,66; 2,87]	[2,47; 2,68]	[2,25; 2,46]	[2,06; 2,27]	[1,92; 2,13]	[2,03; 2,25]	[1,93; 2,15]	[1,78; 1,99]	[1,69; 1,90]	[1,60; 1,82]	[1,42; 1,63]	[1,35; 1,56]	[1,28; 1,49]				
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	7987	7430	6904	6434	5955	5780	5562	5518	5397	5215	4976	4881	4717	4571	4371				
		Anteil in %	6,47	7,01	7,24	7,43	7,53	7,68	7,87	8,32	8,37	8,44	8,45	8,67	8,80	8,93	8,97				
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[6,33; 6,61]	[6,85; 7,16]	[7,07; 7,40]	[7,25; 7,60]	[7,35; 7,72]	[7,49; 7,87]	[7,67; 8,06]	[8,11; 8,53]	[8,16; 8,58]	[8,22; 8,66]	[8,22; 8,67]	[8,44; 8,90]	[8,56; 9,04]	[8,68; 9,17]	[8,72; 9,23]				
		Anzahl	14795	12732	11373	10146	9316	8911	8455	7867	7507	7112	6793	6380	6061	5742	5435				
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	11,98	12,00	11,92	11,72	11,78	11,83	11,96	11,86	11,64	11,51	11,53	11,33	11,31	11,21	11,16				
		CI Anteil in %	[11,80; 12,16]	[11,81; 12,20]	[11,72; 12,13]	[11,50; 11,93]	[11,56; 12,01]	[11,60; 12,07]	[11,72; 12,20]	[11,61; 12,10]	[11,40; 11,89]	[11,26; 11,77]	[11,27; 11,79]	[11,07; 11,59]	[11,07; 11,57]	[11,04; 11,49]	[10,94; 11,44]				
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6821	6101	5528	5020	4511	4266	3906	4229	3970	3791	3456	3244	3081	2844	2574					
	Anteil in %	5,52	5,75	5,79	5,80	5,71	5,67	5,52	6,37	6,16	6,14	5,87	5,76	5,75	5,55	5,28					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[5,40; 5,65]	[5,61; 5,89]	[5,65; 5,94]	[5,64; 5,95]	[5,54; 5,87]	[5,50; 5,83]	[5,36; 5,69]	[6,19; 6,56]	[5,97; 6,34]	[5,95; 6,33]	[5,68; 6,06]	[5,57; 5,95]	[5,55; 5,94]	[5,36; 5,75]	[5,09; 5,48]					
	Anzahl	9089	8186	7735	7376	7099	6942	6742	6100	6241	6244	6194	6059	5873	5658	5445					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	7,36	7,72	8,11	8,52	8,98	9,22	9,53	9,19	9,68	10,11	10,51	10,76	10,95	11,05	11,18					
	CI Anteil in %	[7,22; 7,51]	[7,56; 7,88]	[7,94; 8,28]	[8,33; 8,70]	[8,78; 9,18]	[9,01; 9,43]	[9,32; 9,75]	[8,97; 9,41]	[9,45; 9,91]	[9,87; 10,35]	[10,27; 10,76]	[10,50; 11,02]	[10,69; 11,22]	[10,78; 11,32]	[10,90; 11,46]					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	14571	13683	12818	12037	11443	11387	11183	10625	10915	10801	10730	10542	10409	10350	10163					
	Anteil in %	11,80	12,90	13,44	13,90	14,48	15,12	15,81	16,01	16,93	17,49	18,21	18,72	19,42	20,21	20,86					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[11,62; 11,98]	[12,70; 13,10]	[13,22; 13,65]	[13,67; 14,13]	[14,23; 14,72]	[14,87; 15,38]	[15,54; 16,08]	[15,73; 16,29]	[16,64; 17,22]	[17,19; 17,79]	[17,90; 18,53]	[18,40; 19,04]	[19,08; 19,75]	[19,86; 20,56]	[20,50; 21,23]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545				
	auswertbar	Anzahl	82252	70630	63035	56750	53462	50081	46996	45344	43109	40945	38959	37086	35372	33712				
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	18609	14876	12815	11131	10112	9210	8098	7558	6984	6443	5951	5483	5128	4791				
		Anteil in %	22,62	21,06	20,33	19,61	18,91	18,39	17,23	16,67	16,20	15,74	15,28	14,78	14,50	14,21				
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[22,34; 22,91]	[20,76; 21,36]	[20,02; 20,64]	[19,29; 19,94]	[18,58; 19,25]	[18,05; 18,73]	[16,89; 17,57]	[16,33; 17,01]	[15,85; 16,55]	[15,38; 16,09]	[14,92; 15,63]	[14,42; 15,15]	[14,13; 14,86]	[13,84; 14,58]				
		Anzahl	14443	12420	10987	9863	9205	8550	7994	7694	7242	6818	6415	6121	5805	5501				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	17,56	17,58	17,43	17,38	17,22	17,07	17,01	16,97	16,80	16,65	16,47	16,50	16,41	16,32				
		CI Anteil in %	[17,30; 17,82]	[17,30; 17,87]	[17,13; 17,73]	[17,07; 17,69]	[16,90; 17,54]	[16,74; 17,40]	[16,67; 17,35]	[16,62; 17,31]	[16,45; 17,15]	[16,29; 17,01]	[16,10; 16,83]	[16,13; 16,88]	[16,03; 16,80]	[15,92; 16,71]				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2688	2189	1854	1579	1454	1291	1276	1141	1046	919	851	767	686	605				
		Anteil in %	3,27	3,10	2,94	2,78	2,72	2,58	2,72	2,52	2,43	2,24	2,18	2,07	1,94	1,79				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[3,15; 3,39]	[2,97; 3,23]	[2,81; 3,07]	[2,65; 2,92]	[2,58; 2,86]	[2,44; 2,72]	[2,57; 2,86]	[2,37; 2,66]	[2,28; 2,57]	[2,10; 2,39]	[2,04; 2,33]	[1,92; 2,21]	[1,80; 2,08]	[1,65; 1,94]				
		Anzahl	2117	1660	1390	1170	1075	932	920	835	749	691	615	556	493	450				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	2,57	2,35	2,21	2,06	2,01	1,86	1,96	1,84	1,74	1,69	1,58	1,50	1,39	1,33				
		CI Anteil in %	[2,47; 2,68]	[2,24; 2,46]	[2,09; 2,32]	[1,94; 2,18]	[1,89; 2,13]	[1,74; 1,98]	[1,83; 2,08]	[1,72; 1,97]	[1,61; 1,86]	[1,56; 1,81]	[1,45; 1,70]	[1,38; 1,62]	[1,27; 1,52]	[1,21; 1,46]				
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	6458	5808	5361	4790	4605	4357	4360	4136	3989	3763	3671	3532	3395	3192				
		Anteil in %	7,85	8,22	8,50	8,44	8,61	8,70	9,28	9,12	9,25	9,19	9,42	9,52	9,60	9,47				
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[7,67; 8,04]	[8,02; 8,43]	[8,29; 8,72]	[8,21; 8,67]	[8,38; 8,85]	[8,45; 8,95]	[9,02; 9,54]	[8,86; 9,39]	[8,98; 9,53]	[8,91; 9,47]	[9,13; 9,71]	[9,23; 9,82]	[9,29; 9,90]	[9,16; 9,78]				
		Anzahl	10125	8685	7578	6817	6387	5996	5592	5277	4922	4673	4407	4165	3877	3662				
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	12,31	12,30	12,02	12,01	11,95	11,97	11,90	11,64	11,42	11,41	11,31	11,23	10,96	10,86				
		CI Anteil in %	[12,09; 12,53]	[12,05; 12,54]	[11,77; 12,28]	[11,74; 12,28]	[11,67; 12,22]	[11,69; 12,26]	[11,61; 12,19]	[11,34; 11,93]	[11,12; 11,72]	[11,10; 11,72]	[11,00; 11,63]	[10,91; 11,55]	[10,64; 11,29]	[10,53; 11,19]				
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	4698	4021	3624	3265	3006	2737	3145	2993	2810	2587	2377	2213	2045	1873					
	Anteil in %	5,71	5,69	5,75	5,75	5,62	5,47	6,69	6,60	6,52	6,32	6,10	5,97	5,78	5,56					
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[5,55; 5,87]	[5,52; 5,86]	[5,57; 5,93]	[5,56; 5,94]	[5,43; 5,82]	[5,27; 5,66]	[6,47; 6,92]	[6,37; 6,83]	[6,29; 6,75]	[6,08; 6,55]	[5,86; 6,34]	[5,73; 6,21]	[5,54; 6,02]	[5,31; 5,80]					
	Anzahl	6852	6489	6118	5758	5695	5470	4804	4969	4846	4816	4702	4528	4427	4313					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	8,33	9,19	9,71	10,15	10,65	10,92	10,22	10,96	11,24	11,76	12,07	12,21	12,52	12,79					
	CI Anteil in %	[8,14; 8,52]	[8,97; 9,40]	[9,47; 9,94]	[9,90; 10,39]	[10,39; 10,91]	[10,65; 11,20]	[9,95; 10,50]	[10,67; 11,25]	[10,94; 11,54]	[11,45; 12,07]	[11,75; 12,39]	[11,88; 12,54]	[12,17; 12,86]	[12,44; 13,15]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683				
	auswertbar	Anzahl	95017	82760	74363	67395	63672	59759	56287	54368	51783	49318	46838	44578	42480	40529				
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	22843	18970	16630	14561	13362	12127	10723	10101	9411	8717	8135	7546	7096	6647				
		Anteil in %	24,04	22,92	22,36	21,61	20,99	20,29	19,05	18,58	18,17	17,68	17,37	16,93	16,70	16,40				
		CI Anteil in %	[23,77; 24,31]	[22,64; 23,21]	[22,06; 22,66]	[21,29; 21,92]	[20,67; 21,30]	[19,97; 20,62]	[18,73; 19,38]	[18,25; 18,91]	[17,84; 18,51]	[17,34; 18,01]	[17,03; 17,71]	[16,58; 17,28]	[16,35; 17,06]	[16,04; 16,76]				
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	16445	14179	12563	11383	10631	9972	9450	8989	8500	7966	7497	7034	6675	6305				
		Anteil in %	17,31	17,13	16,89	16,89	16,70	16,69	16,79	16,53	16,41	16,15	16,01	15,78	15,71	15,56				
		CI Anteil in %	[17,07; 17,55]	[16,88; 17,39]	[16,62; 17,16]	[16,61; 17,17]	[16,41; 16,99]	[16,39; 16,99]	[16,48; 17,10]	[16,22; 16,85]	[16,10; 16,73]	[15,83; 16,48]	[15,67; 16,34]	[15,44; 16,12]	[15,37; 16,06]	[15,20; 15,91]				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	3128	2491	2157	1901	1694	1487	1460	1347	1245	1136	1026	929	832	752				
		Anteil in %	3,29	3,01	2,90	2,82	2,66	2,49	2,59	2,48	2,40	2,30	2,19	2,08	1,96	1,86				
		CI Anteil in %	[3,18; 3,41]	[2,89; 3,13]	[2,78; 3,02]	[2,70; 2,95]	[2,54; 2,79]	[2,36; 2,61]	[2,46; 2,73]	[2,35; 2,61]	[2,27; 2,54]	[2,17; 2,44]	[2,06; 2,32]	[1,95; 2,22]	[1,83; 2,09]	[1,72; 1,99]				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2834	2224	1846	1541	1406	1225	1236	1122	1018	915	827	720	662	595				
		Anteil in %	2,98	2,69	2,48	2,29	2,21	2,05	2,20	2,06	1,97	1,86	1,77	1,62	1,56	1,47				
		CI Anteil in %	[2,87; 3,09]	[2,58; 2,80]	[2,37; 2,59]	[2,17; 2,40]	[2,09; 2,32]	[1,94; 2,16]	[2,07; 2,32]	[1,94; 2,18]	[1,85; 2,09]	[1,74; 1,97]	[1,65; 1,88]	[1,50; 1,73]	[1,44; 1,68]	[1,35; 1,59]				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	6414	5828	5535	5145	4947	4760	4682	4527	4445	4248	4145	3988	3848	3711				
		Anteil in %	6,75	7,04	7,44	7,63	7,77	7,97	8,32	8,33	8,58	8,61	8,85	8,95	9,06	9,16				
		CI Anteil in %	[6,59; 6,91]	[6,87; 7,22]	[7,25; 7,63]	[7,43; 7,83]	[7,56; 7,98]	[7,75; 8,18]	[8,09; 8,55]	[8,09; 8,56]	[8,34; 8,83]	[8,37; 8,86]	[8,59; 9,11]	[8,68; 9,21]	[8,79; 9,33]	[8,88; 9,44]				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	11925	10429	9271	8496	8088	7667	7205	6894	6489	6200	5871	5575	5256	4944				
		Anteil in %	12,55	12,60	12,47	12,61	12,70	12,83	12,80	12,68	12,53	12,57	12,53	12,51	12,37	12,20				
		CI Anteil in %	[12,34; 12,76]	[12,38; 12,83]	[12,23; 12,70]	[12,36; 12,86]	[12,44; 12,96]	[12,56; 13,10]	[12,52; 13,08]	[12,40; 12,96]	[12,25; 12,82]	[12,28; 12,86]	[12,23; 12,83]	[12,20; 12,81]	[12,06; 12,69]	[11,88; 12,52]				
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	5112	4528	3949	3513	3285	3061	3430	3269	3068	2815	2608	2468	2284	2113					
	Anteil in %	5,38	5,47	5,31	5,21	5,16	5,12	6,09	6,01	5,92	5,71	5,57	5,54	5,38	5,21					
	CI Anteil in %	[5,24; 5,52]	[5,32; 5,63]	[5,15; 5,47]	[5,04; 5,38]	[4,99; 5,33]	[4,95; 5,30]	[5,90; 6,29]	[5,81; 6,21]	[5,72; 6,13]	[5,50; 5,91]	[5,36; 5,78]	[5,32; 5,75]	[5,16; 5,59]	[5,00; 5,43]					
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	6651	6393	6024	5760	5650	5531	4963	5039	4964	4977	4827	4743	4588	4458					
	Anteil in %	7,00	7,72	8,10	8,55	8,87	9,26	8,82	9,27	9,59	10,09	10,31	10,64	10,80	11,00					
	CI Anteil in %	[6,84; 7,16]	[7,54; 7,91]	[7,90; 8,30]	[8,34; 8,76]	[8,65; 9,09]	[9,02; 9,49]	[8,58; 9,05]	[9,02; 9,51]	[9,33; 9,84]	[9,83; 10,36]	[10,03; 10,58]	[10,35; 10,93]	[10,51; 11,10]	[10,69; 11,30]					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	11080	10547	9889	9348	9219	8949	8769	8835	8661	8572	8344	8201	8045	7992					
	Anteil in %	11,66	12,74	13,30	13,87	14,48	14,98	15,58	16,25	16,73	17,38	17,81	18,40	18,94	19,72					
	CI Anteil in %	[11,46; 11,87]	[12,52; 12,97]	[13,05; 13,54]	[13,61; 14,13]	[14,21; 14,75]	[14,69; 15,26]	[15,28; 15,88]	[15,94; 16,56]	[16,40; 17,05]	[17,05; 17,72]	[17,47; 18,16]	[18,04; 18,76]	[18,57; 19,31]	[19,33; 20,11]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133					
	auswertbar	Anzahl	98602	85172	75481	70503	65582	60824	58910	55654	52765	50222	47642	45361	43140					
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	22533	18634	15998	14460	12957	11109	10398	9568	8847	8276	7670	7152	6687					
		Anteil in %	22,85	21,88	21,19	20,51	19,76	18,26	17,65	17,19	16,77	16,48	16,10	15,77	15,50					
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[22,59; 23,11]	[21,60; 22,16]	[20,90; 21,49]	[20,21; 20,81]	[19,45; 20,06]	[17,96; 18,57]	[17,34; 17,96]	[16,88; 17,51]	[16,45; 17,09]	[16,15; 16,80]	[15,77; 16,43]	[15,43; 16,10]	[15,16; 15,84]					
		Anzahl	17423	15083	13092	12236	11270	10258	9834	9240	8580	8146	7657	7190	6792					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	17,67	17,71	17,34	17,36	17,18	16,87	16,69	16,60	16,26	16,22	16,07	15,85	15,74					
		CI Anteil in %	[17,43; 17,91]	[17,45; 17,97]	[17,07; 17,61]	[17,08; 17,63]	[16,90; 17,47]	[16,57; 17,16]	[16,39; 16,99]	[16,29; 16,91]	[15,95; 16,58]	[15,90; 16,54]	[15,74; 16,40]	[15,51; 16,19]	[15,40; 16,09]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	3163	2472	2075	1815	1549	1566	1398	1247	1107	1026	937	836	727					
		Anteil in %	3,21	2,90	2,75	2,57	2,36	2,57	2,37	2,24	2,10	2,04	1,97	1,84	1,69					
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[3,10; 3,32]	[2,79; 3,02]	[2,63; 2,87]	[2,46; 2,69]	[2,25; 2,48]	[2,45; 2,70]	[2,25; 2,50]	[2,12; 2,36]	[1,98; 2,22]	[1,92; 2,17]	[1,84; 2,09]	[1,72; 1,97]	[1,56; 1,81]					
		Anzahl	2380	1819	1529	1337	1206	1151	1053	956	875	788	704	634	560					
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	2,41	2,14	2,03	1,90	1,84	1,89	1,79	1,72	1,66	1,57	1,48	1,40	1,30					
		CI Anteil in %	[2,32; 2,51]	[2,04; 2,23]	[1,93; 2,13]	[1,80; 2,00]	[1,74; 1,94]	[1,78; 2,00]	[1,68; 1,89]	[1,61; 1,83]	[1,55; 1,77]	[1,46; 1,68]	[1,37; 1,59]	[1,29; 1,51]	[1,19; 1,40]					
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	7520	6920	6212	5981	5637	5440	5309	5122	4857	4649	4480	4257	4063					
		Anteil in %	7,63	8,12	8,23	8,48	8,60	8,94	9,01	9,20	9,20	9,26	9,40	9,38	9,42					
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[7,46; 7,79]	[7,94; 8,31]	[8,03; 8,43]	[8,28; 8,69]	[8,38; 8,81]	[8,72; 9,17]	[8,78; 9,24]	[8,96; 9,44]	[8,96; 9,45]	[9,00; 9,51]	[9,14; 9,67]	[9,12; 9,65]	[9,14; 9,69]					
		Anzahl	11784	9974	8891	8256	7725	7217	6860	6360	5929	5548	5190	4915	4599					
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	11,95	11,71	11,78	11,71	11,78	11,87	11,64	11,43	11,24	11,05	10,89	10,84	10,66					
		CI Anteil in %	[11,75; 12,15]	[11,49; 11,93]	[11,55; 12,01]	[11,47; 11,95]	[11,53; 12,03]	[11,61; 12,12]	[11,39; 11,90]	[11,16; 11,69]	[10,97; 11,51]	[10,77; 11,32]	[10,61; 11,17]	[10,55; 11,12]	[10,37; 10,95]					
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	5305	4503	4000	3659	3385	3833	3727	3424	3217	3007	2765	2603	2393						
	Anteil in %	5,38	5,29	5,30	5,19	5,16	6,30	6,33	6,15	6,10	5,99	5,80	5,74	5,55						
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[5,24; 5,52]	[5,14; 5,44]	[5,14; 5,46]	[5,03; 5,35]	[4,99; 5,33]	[6,11; 6,49]	[6,13; 6,52]	[5,95; 6,35]	[5,89; 6,30]	[5,78; 6,19]	[5,59; 6,01]	[5,52; 5,95]	[5,33; 5,76]						
	Anzahl	8446	7936	7373	7216	6961	6258	6330	6126	6126	6022	5859	5702	5458						
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	8,57	9,32	9,77	10,24	10,61	10,29	10,75	11,01	11,61	11,99	12,30	12,57	12,65						
	CI Anteil in %	[8,39; 8,74]	[9,12; 9,51]	[9,56; 9,98]	[10,01; 10,46]	[10,38; 10,85]	[10,05; 10,53]	[10,50; 11,00]	[10,75; 11,27]	[11,34; 11,88]	[11,71; 12,27]	[12,00; 12,59]	[12,27; 12,88]	[12,34; 12,97]						
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	10919	10253	9688	9404	9243	9143	9268	9079	9015	8834	8757	8642	8551						
	Anteil in %	11,07	12,04	12,84	13,34	14,09	15,03	15,73	16,31	17,09	17,59	18,38	19,05	19,82						
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[10,88; 11,27]	[11,82; 12,26]	[12,60; 13,07]	[13,09; 13,59]	[13,83; 14,36]	[14,75; 15,32]	[15,44; 16,03]	[16,01; 16,62]	[16,76; 17,41]	[17,26; 17,92]	[18,03; 18,73]	[18,69; 19,41]	[19,45; 20,20]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383					
	auswertbar	Anzahl	112508	98598	87757	82690	77071	71804	69655	65973	62577	59444	56308	53673	50993					
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	27614	23411	20074	18441	16666	14487	13645	12707	11739	10914	10135	9518	8940					
		Anteil in %	24,54	23,74	22,87	22,30	21,62	20,18	19,59	19,26	18,76	18,36	18,00	17,73	17,53					
		CI Anteil in %	[24,29; 24,80]	[23,48; 24,01]	[22,60; 23,15]	[22,02; 22,59]	[21,33; 21,91]	[19,88; 20,47]	[19,29; 19,88]	[18,96; 19,56]	[18,45; 19,07]	[18,05; 18,67]	[17,68; 18,32]	[17,41; 18,06]	[17,20; 17,86]					
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	19569	16926	14905	13891	12849	11845	11395	10628	10049	9503	8870	8481	8016					
		Anteil in %	17,39	17,17	16,98	16,80	16,67	16,50	16,36	16,11	16,06	15,99	15,75	15,80	15,72					
		CI Anteil in %	[17,17; 17,61]	[16,93; 17,40]	[16,74; 17,23]	[16,54; 17,05]	[16,41; 16,93]	[16,22; 16,77]	[16,08; 16,63]	[15,83; 16,39]	[15,77; 16,35]	[15,69; 16,28]	[15,45; 16,05]	[15,49; 16,11]	[15,40; 16,04]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	3489	2828	2389	2169	1924	1873	1695	1515	1336	1229	1110	997	901					
		Anteil in %	3,10	2,87	2,72	2,62	2,50	2,61	2,43	2,30	2,13	2,07	1,97	1,86	1,77					
		CI Anteil in %	[3,00; 3,20]	[2,76; 2,97]	[2,61; 2,83]	[2,51; 2,73]	[2,39; 2,61]	[2,49; 2,73]	[2,32; 2,55]	[2,18; 2,41]	[2,02; 2,25]	[1,95; 2,18]	[1,86; 2,09]	[1,74; 1,97]	[1,65; 1,88]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	3099	2458	2114	1862	1618	1581	1421	1346	1188	1066	959	882	807					
		Anteil in %	2,75	2,49	2,41	2,25	2,10	2,20	2,04	2,04	1,90	1,79	1,70	1,64	1,58					
		CI Anteil in %	[2,66; 2,85]	[2,40; 2,59]	[2,31; 2,51]	[2,15; 2,35]	[2,00; 2,20]	[2,09; 2,31]	[1,94; 2,15]	[1,93; 2,15]	[1,79; 2,01]	[1,69; 1,90]	[1,60; 1,81]	[1,54; 1,75]	[1,47; 1,69]					
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7378	6993	6293	6170	5846	5792	5691	5516	5219	5076	4859	4678	4458					
		Anteil in %	6,56	7,09	7,17	7,46	7,59	8,07	8,17	8,36	8,34	8,54	8,63	8,72	8,74					
		CI Anteil in %	[6,41; 6,70]	[6,93; 7,25]	[7,00; 7,34]	[7,28; 7,64]	[7,40; 7,77]	[7,87; 8,27]	[7,97; 8,37]	[8,15; 8,57]	[8,12; 8,56]	[8,31; 8,76]	[8,40; 8,86]	[8,48; 8,95]	[8,50; 8,99]					
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13690	11858	10816	10202	9761	9110	8708	8183	7733	7295	6916	6572	6162					
		Anteil in %	12,17	12,03	12,32	12,34	12,66	12,69	12,50	12,40	12,36	12,27	12,28	12,24	12,08					
		CI Anteil in %	[11,98; 12,36]	[11,82; 12,23]	[12,11; 12,54]	[12,11; 12,56]	[12,43; 12,90]	[12,44; 12,93]	[12,26; 12,75]	[12,15; 12,66]	[12,10; 12,62]	[12,01; 12,54]	[12,01; 12,55]	[11,97; 12,52]	[11,80; 12,37]					
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	5513	4752	4199	3877	3589	4004	3887	3601	3340	3068	2861	2644	2438						
	Anteil in %	4,90	4,82	4,78	4,69	4,66	5,58	5,58	5,46	5,34	5,16	5,08	4,93	4,78						
	CI Anteil in %	[4,77; 5,03]	[4,69; 4,95]	[4,64; 4,93]	[4,54; 4,83]	[4,51; 4,81]	[5,41; 5,74]	[5,41; 5,75]	[5,28; 5,63]	[5,16; 5,51]	[4,98; 5,34]	[4,90; 5,26]	[4,74; 5,11]	[4,60; 4,97]						
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	8293	7756	7345	7231	6939	6444	6584	6449	6378	6234	6009	5864	5603						
	Anteil in %	7,37	7,87	8,37	8,74	9,00	8,97	9,45	9,78	10,19	10,49	10,67	10,93	10,99						
	CI Anteil in %	[7,22; 7,52]	[7,70; 8,03]	[8,19; 8,55]	[8,55; 8,94]	[8,80; 9,21]	[8,77; 9,18]	[9,24; 9,67]	[9,55; 10,00]	[9,96; 10,43]	[10,24; 10,73]	[10,42; 10,93]	[10,66; 11,19]	[10,72; 11,26]						
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	14086	13199	12148	11895	11511	11155	11290	11066	10819	10538	10375	10091	9953						
	Anteil in %	12,52	13,39	13,84	14,39	14,94	15,54	16,21	16,77	17,29	17,73	18,43	18,80	19,52						
	CI Anteil in %	[12,33; 12,71]	[13,17; 13,60]	[13,61; 14,07]	[14,15; 14,62]	[14,68; 15,19]	[15,27; 15,80]	[15,93; 16,48]	[16,49; 17,06]	[16,99; 17,59]	[17,42; 18,03]	[18,11; 18,75]	[18,47; 19,13]	[19,17; 19,86]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138								
	auswertbar	Anzahl	94020	81930	74513	68508	63502	60804	57546	54239	51478	48787	46400	43989								
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	20947	17225	15073	13430	11610	10747	9954	9121	8436	7790	7259	6703								
		Anteil in %	22,28	21,02	20,23	19,60	18,28	17,67	17,30	16,82	16,39	15,97	15,64	15,24								
	CI Anteil in %		[22,01; 22,55]	[20,75; 21,30]	[19,94; 20,52]	[19,31; 19,90]	[17,98; 18,58]	[17,37; 17,98]	[16,99; 17,61]	[16,50; 17,13]	[16,07; 16,71]	[15,64; 16,29]	[15,31; 15,97]	[14,90; 15,57]								
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	16078	13730	12299	11166	10144	9564	8890	8197	7732	7263	6860	6493								
		Anteil in %	17,10	16,76	16,51	16,30	15,97	15,73	15,45	15,11	15,02	14,89	14,78	14,76								
	CI Anteil in %		[16,86; 17,34]	[16,50; 17,01]	[16,24; 16,77]	[16,02; 16,58]	[15,69; 16,26]	[15,44; 16,02]	[15,15; 15,74]	[14,81; 15,41]	[14,71; 15,33]	[14,57; 15,20]	[14,46; 15,11]	[14,43; 15,09]								
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	2881	2295	2042	1755	1724	1529	1392	1163	1100	987	905	827								
		Anteil in %	3,06	2,80	2,74	2,56	2,71	2,51	2,42	2,14	2,14	2,02	1,95	1,88								
	CI Anteil in %		[2,95; 3,17]	[2,69; 2,91]	[2,62; 2,86]	[2,44; 2,68]	[2,59; 2,84]	[2,39; 2,64]	[2,29; 2,54]	[2,02; 2,27]	[2,01; 2,26]	[1,90; 2,15]	[1,82; 2,08]	[1,75; 2,01]								
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2328	1897	1558	1335	1234	1155	1005	919	819	709	638	543								
		Anteil in %	2,48	2,32	2,09	1,95	1,94	1,90	1,75	1,69	1,59	1,45	1,38	1,23								
	CI Anteil in %		[2,38; 2,58]	[2,21; 2,42]	[1,99; 2,19]	[1,85; 2,05]	[1,84; 2,05]	[1,79; 2,01]	[1,64; 1,85]	[1,59; 1,80]	[1,48; 1,70]	[1,35; 1,56]	[1,27; 1,48]	[1,13; 1,34]								
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8040	7201	6687	6237	6029	5685	5471	5152	4973	4745	4514	4330								
		Anteil in %	8,55	8,79	8,97	9,10	9,49	9,35	9,51	9,50	9,66	9,73	9,73	9,84								
CI Anteil in %		[8,37; 8,73]	[8,60; 8,98]	[8,77; 9,18]	[8,89; 9,32]	[9,27; 9,72]	[9,12; 9,58]	[9,27; 9,75]	[9,25; 9,75]	[9,41; 9,92]	[9,46; 9,99]	[9,46; 10,00]	[9,56; 10,12]									
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	11690	10244	9377	8642	7956	7586	7080	6631	6226	5856	5483	5100									
	Anteil in %	12,43	12,50	12,58	12,61	12,53	12,48	12,30	12,23	12,09	12,00	11,82	11,59									
CI Anteil in %		[12,22; 12,64]	[12,28; 12,73]	[12,35; 12,82]	[12,37; 12,86]	[12,27; 12,79]	[12,21; 12,74]	[12,03; 12,57]	[11,95; 12,50]	[11,81; 12,38]	[11,71; 12,29]	[11,52; 12,11]	[11,29; 11,89]									
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	5147	4489	4086	3701	4143	3904	3594	3309	3100	2837	2652	2453									
	Anteil in %	5,47	5,48	5,48	5,40	6,52	6,42	6,25	6,10	6,02	5,82	5,72	5,58									
CI Anteil in %		[5,33; 5,62]	[5,32; 5,63]	[5,32; 5,65]	[5,23; 5,57]	[6,33; 6,72]	[6,23; 6,62]	[6,05; 6,44]	[5,90; 6,30]	[5,82; 6,23]	[5,61; 6,02]	[5,50; 5,93]	[5,36; 5,79]									
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	8176	7840	7477	7164	6542	6586	6532	6391	6290	6091	5880	5739									
	Anteil in %	8,70	9,57	10,03	10,46	10,30	10,83	11,35	11,78	12,22	12,48	12,67	13,05									
CI Anteil in %		[8,52; 8,88]	[9,37; 9,77]	[9,82; 10,25]	[10,23; 10,69]	[10,07; 10,54]	[10,58; 11,08]	[11,09; 11,61]	[11,51; 12,05]	[11,94; 12,50]	[12,19; 12,78]	[12,37; 12,98]	[12,73; 13,36]									
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	10018	9633	9331	9117	9006	9129	8999	8969	8753	8679	8543	8371									
	Anteil in %	10,66	11,76	12,52	13,31	14,18	15,01	15,64	16,54	17,00	17,79	18,41	19,03									
CI Anteil in %		[10,46; 10,85]	[11,54; 11,98]	[12,28; 12,76]	[13,05; 13,56]	[13,91; 14,45]	[14,73; 15,30]	[15,34; 15,93]	[16,22; 16,85]	[16,68; 17,33]	[17,45; 18,13]	[18,06; 18,76]	[18,66; 19,40]									

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	106368	97818	89965	84145	79567	75344	70865	67146	63673	60566	57735	55201						
	auswertbar	Anzahl	106368	93772	85863	79179	73611	70669	67001	63256	60015	56920	54310	51563						
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	25963	21939	19364	17359	15203	14214	13165	12126	11325	10528	9910	9276						
		Anteil in %	24,41	23,40	22,55	21,92	20,65	20,11	19,65	19,17	18,87	18,50	18,25	17,99						
		CI Anteil in %	[24,15; 24,67]	[23,13; 23,67]	[22,27; 22,83]	[21,64; 22,21]	[20,36; 20,95]	[19,82; 20,41]	[19,35; 19,95]	[18,86; 19,48]	[18,56; 19,18]	[18,18; 18,82]	[17,92; 18,57]	[17,66; 18,32]						
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	17413	15093	13517	12326	11233	10714	9932	9227	8629	8036	7639	7204						
		Anteil in %	16,37	16,10	15,74	15,57	15,26	15,16	14,82	14,59	14,38	14,12	14,07	13,97						
		CI Anteil in %	[16,15; 16,59]	[15,86; 16,33]	[15,50; 15,99]	[15,31; 15,82]	[15,00; 15,52]	[14,90; 15,43]	[14,55; 15,09]	[14,31; 14,86]	[14,10; 14,66]	[13,83; 14,40]	[13,77; 14,36]	[13,67; 14,27]						
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	3173	2540	2212	1907	1868	1669	1551	1355	1254	1113	1004	936						
		Anteil in %	2,98	2,71	2,58	2,41	2,54	2,36	2,31	2,14	2,09	1,96	1,85	1,82						
		CI Anteil in %	[2,88; 3,09]	[2,60; 2,81]	[2,47; 2,68]	[2,30; 2,52]	[2,42; 2,65]	[2,25; 2,47]	[2,20; 2,43]	[2,03; 2,25]	[1,98; 2,20]	[1,84; 2,07]	[1,74; 1,96]	[1,70; 1,93]						
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2892	2316	1947	1694	1672	1570	1390	1260	1099	1005	903	817						
		Anteil in %	2,72	2,47	2,27	2,14	2,27	2,22	2,07	1,99	1,83	1,77	1,66	1,58						
		CI Anteil in %	[2,62; 2,82]	[2,37; 2,57]	[2,17; 2,37]	[2,04; 2,24]	[2,16; 2,38]	[2,11; 2,33]	[1,97; 2,18]	[1,88; 2,10]	[1,72; 1,94]	[1,66; 1,87]	[1,56; 1,77]	[1,48; 1,69]						
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7697	7115	6785	6522	6254	6061	5854	5591	5413	5225	5050	4788						
		Anteil in %	7,24	7,59	7,90	8,24	8,50	8,58	8,74	8,84	9,02	9,18	9,30	9,29						
		CI Anteil in %	[7,08; 7,39]	[7,42; 7,76]	[7,72; 8,08]	[8,05; 8,43]	[8,29; 8,70]	[8,37; 8,78]	[8,52; 8,95]	[8,62; 9,06]	[8,79; 9,25]	[8,94; 9,42]	[9,05; 9,54]	[9,04; 9,54]						
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	14033	12558	11530	10647	9920	9374	8846	8378	7878	7487	7066	6682						
		Anteil in %	13,19	13,39	13,43	13,45	13,48	13,26	13,20	13,24	13,13	13,15	13,01	12,96						
		CI Anteil in %	[12,99; 13,40]	[13,17; 13,61]	[13,20; 13,66]	[13,21; 13,68]	[13,23; 13,72]	[13,01; 13,51]	[12,95; 13,46]	[12,98; 13,51]	[12,86; 13,40]	[12,88; 13,43]	[12,73; 13,29]	[12,67; 13,25]						
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	5499	4822	4396	4017	4421	4205	3928	3624	3368	3104	2885	2663							
	Anteil in %	5,17	5,14	5,12	5,07	6,01	5,95	5,86	5,73	5,61	5,45	5,31	5,16							
	CI Anteil in %	[5,04; 5,30]	[5,00; 5,28]	[4,97; 5,27]	[4,92; 5,23]	[5,83; 6,18]	[5,78; 6,12]	[5,68; 6,04]	[5,55; 5,91]	[5,43; 5,80]	[5,27; 5,64]	[5,12; 5,50]	[4,97; 5,36]							
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	7862	7593	7350	7048	6480	6525	6462	6409	6286	6145	5951	5728							
	Anteil in %	7,39	8,10	8,56	8,90	8,80	9,23	9,64	10,13	10,47	10,80	10,96	11,11							
	CI Anteil in %	[7,23; 7,55]	[7,92; 8,27]	[8,37; 8,75]	[8,70; 9,10]	[8,60; 9,01]	[9,02; 9,45]	[9,42; 9,87]	[9,90; 10,37]	[10,23; 10,72]	[10,54; 11,05]	[10,69; 11,22]	[10,84; 11,38]							
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	12444	11761	11374	10852	10641	10655	10473	10211	9979	9775	9664	9461							
	Anteil in %	11,70	12,54	13,25	13,71	14,46	15,08	15,63	16,14	16,63	17,17	17,79	18,35							
	CI Anteil in %	[11,51; 11,89]	[12,33; 12,75]	[13,02; 13,47]	[13,47; 13,95]	[14,20; 14,71]	[14,81; 15,34]	[15,36; 15,91]	[15,86; 16,43]	[16,33; 16,93]	[16,86; 17,48]	[17,47; 18,12]	[18,01; 18,68]							

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740											
	auswertbar	Anzahl	99014	86444	77868	71532	68339	64236	60422	57103	53996	51409	48811											
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	24406	19866	17308	14756	13516	12398	11285	10472	9648	9040	8398											
		Anteil in %	24,65	22,98	22,23	20,63	19,78	19,30	18,68	18,34	17,87	17,58	17,21											
		CI Anteil in %	[24,38; 24,92]	[22,70; 23,26]	[21,94; 22,52]	[20,33; 20,93]	[19,48; 20,08]	[19,00; 19,61]	[18,37; 18,99]	[18,02; 18,66]	[17,54; 18,19]	[17,26; 17,91]	[16,87; 17,54]											
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	15426	13179	11617	10445	9868	9171	8526	7961	7432	7058	6631											
		Anteil in %	15,58	15,25	14,92	14,60	14,44	14,28	14,11	13,94	13,76	13,73	13,59											
		CI Anteil in %	[15,35; 15,81]	[15,01; 15,49]	[14,67; 15,17]	[14,34; 14,86]	[14,18; 14,70]	[14,01; 14,55]	[13,83; 14,39]	[13,66; 14,23]	[13,47; 14,05]	[13,43; 14,03]	[13,28; 13,89]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	2808	2321	1959	1894	1720	1539	1346	1228	1097	984	899											
		Anteil in %	2,84	2,68	2,52	2,65	2,52	2,40	2,23	2,15	2,03	1,91	1,84											
		CI Anteil in %	[2,73; 2,94]	[2,58; 2,79]	[2,41; 2,63]	[2,53; 2,77]	[2,40; 2,63]	[2,28; 2,51]	[2,11; 2,35]	[2,03; 2,27]	[1,91; 2,15]	[1,80; 2,03]	[1,72; 1,96]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2306	1802	1533	1419	1303	1150	1028	892	843	730	648											
		Anteil in %	2,33	2,08	1,97	1,98	1,91	1,79	1,70	1,56	1,56	1,42	1,33											
		CI Anteil in %	[2,24; 2,42]	[1,99; 2,18]	[1,87; 2,07]	[1,88; 2,09]	[1,80; 2,01]	[1,69; 1,89]	[1,60; 1,80]	[1,46; 1,66]	[1,46; 1,67]	[1,32; 1,52]	[1,23; 1,43]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8394	8028	7274	6980	6612	6253	5956	5694	5452	5178	4913											
		Anteil in %	8,48	9,29	9,34	9,76	9,68	9,73	9,86	9,97	10,10	10,07	10,07											
		CI Anteil in %	[8,30; 8,65]	[9,09; 9,48]	[9,14; 9,55]	[9,54; 9,98]	[9,45; 9,90]	[9,51; 9,96]	[9,62; 10,10]	[9,73; 10,22]	[9,84; 10,35]	[9,81; 10,33]	[9,80; 10,33]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13698	11965	10890	10052	9542	8880	8313	7785	7282	6831	6426											
		Anteil in %	13,83	13,84	13,99	14,05	13,96	13,82	13,76	13,63	13,49	13,29	13,17											
		CI Anteil in %	[13,62; 14,05]	[13,61; 14,07]	[13,74; 14,23]	[13,80; 14,31]	[13,70; 14,22]	[13,56; 14,09]	[13,48; 14,03]	[13,35; 13,91]	[13,20; 13,77]	[12,99; 13,58]	[12,87; 13,47]											
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	5074	4292	3863	4232	4021	3741	3456	3213	2988	2778	2533												
	Anteil in %	5,12	4,97	4,96	5,92	5,88	5,82	5,72	5,63	5,53	5,40	5,19												
	CI Anteil in %	[4,99; 5,26]	[4,82; 5,11]	[4,81; 5,11]	[5,74; 6,09]	[5,71; 6,06]	[5,64; 6,00]	[5,53; 5,90]	[5,44; 5,82]	[5,34; 5,73]	[5,21; 5,60]	[4,99; 5,39]												
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	8271	7893	7476	6928	6998	6894	6792	6606	6337	6240	6032												
	Anteil in %	8,35	9,13	9,60	9,69	10,24	10,73	11,24	11,57	11,74	12,14	12,36												
	CI Anteil in %	[8,18; 8,53]	[8,94; 9,32]	[9,39; 9,81]	[9,47; 9,90]	[10,01; 10,47]	[10,49; 10,97]	[10,99; 11,49]	[11,31; 11,83]	[11,46; 12,01]	[11,86; 12,42]	[12,07; 12,65]												
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	9914	9552	9188	9010	9156	8953	8870	8693	8649	8503	8497												
	Anteil in %	10,01	11,05	11,80	12,60	13,40	13,94	14,68	15,22	16,02	16,54	17,41												
	CI Anteil in %	[9,83; 10,20]	[10,84; 11,26]	[11,57; 12,03]	[12,35; 12,84]	[13,14; 13,65]	[13,67; 14,21]	[14,40; 14,96]	[14,93; 15,52]	[15,71; 16,33]	[16,22; 16,86]	[17,07; 17,74]												

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660									
	auswertbar	Anzahl	112214	99334	90145	83116	79428	74954	70789	66924	63295	60219	57197									
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	30030	25068	22014	19178	17709	16425	15205	14109	13073	12243	11433									
		Anteil in %	26,76	25,24	24,42	23,07	22,30	21,91	21,48	21,08	20,65	20,33	19,99									
		CI Anteil in %	[26,50; 27,02]	[24,97; 25,51]	[24,14; 24,70]	[22,79; 23,36]	[22,01; 22,59]	[21,62; 22,21]	[21,18; 21,78]	[20,77; 21,39]	[20,34; 20,97]	[20,01; 20,65]	[19,66; 20,32]									
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	16614	14283	12700	11372	10797	10030	9292	8684	8101	7665	7184									
		Anteil in %	14,81	14,38	14,09	13,68	13,59	13,38	13,13	12,98	12,80	12,73	12,56									
		CI Anteil in %	[14,60; 15,01]	[14,16; 14,60]	[13,86; 14,32]	[13,45; 13,92]	[13,36; 13,83]	[13,14; 13,63]	[12,88; 13,38]	[12,72; 13,23]	[12,54; 13,06]	[12,46; 12,99]	[12,29; 12,83]									
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	2993	2515	2125	2013	1854	1705	1535	1396	1212	1094	992									
		Anteil in %	2,67	2,53	2,36	2,42	2,33	2,27	2,17	2,09	1,91	1,82	1,73									
		CI Anteil in %	[2,57; 2,76]	[2,43; 2,63]	[2,26; 2,46]	[2,32; 2,53]	[2,23; 2,44]	[2,17; 2,38]	[2,06; 2,28]	[1,98; 2,19]	[1,81; 2,02]	[1,71; 1,92]	[1,63; 1,84]									
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2938	2312	1991	1925	1759	1562	1411	1261	1128	1036	921									
		Anteil in %	2,62	2,33	2,21	2,32	2,21	2,08	1,99	1,88	1,78	1,72	1,61									
		CI Anteil in %	[2,52; 2,71]	[2,23; 2,42]	[2,11; 2,30]	[2,21; 2,42]	[2,11; 2,32]	[1,98; 2,19]	[1,89; 2,10]	[1,78; 1,99]	[1,68; 1,89]	[1,62; 1,82]	[1,51; 1,71]									
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8210	7975	7502	7354	7046	6782	6465	6284	6049	5768	5577									
		Anteil in %	7,32	8,03	8,32	8,85	8,87	9,05	9,13	9,39	9,56	9,58	9,75									
		CI Anteil in %	[7,16; 7,47]	[7,86; 8,20]	[8,14; 8,50]	[8,65; 9,04]	[8,67; 9,07]	[8,84; 9,25]	[8,92; 9,34]	[9,17; 9,61]	[9,33; 9,79]	[9,34; 9,81]	[9,51; 9,99]									
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	16000	14450	13420	12225	11666	10972	10382	9770	9247	8773	8235									
		Anteil in %	14,26	14,55	14,89	14,71	14,69	14,64	14,67	14,60	14,61	14,57	14,40									
		CI Anteil in %	[14,05; 14,46]	[14,33; 14,77]	[14,65; 15,12]	[14,47; 14,95]	[14,44; 14,93]	[14,39; 14,89]	[14,41; 14,93]	[14,33; 14,87]	[14,33; 14,88]	[14,29; 14,85]	[14,11; 14,69]									
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	5514	4765	4341	4583	4348	4024	3672	3411	3170	2953	2712									
Anteil in %		4,91	4,80	4,82	5,51	5,47	5,37	5,19	5,10	5,01	4,90	4,74										
CI Anteil in %		[4,79; 5,04]	[4,66; 4,93]	[4,68; 4,96]	[5,36; 5,67]	[5,32; 5,63]	[5,21; 5,53]	[5,02; 5,35]	[4,93; 5,26]	[4,84; 5,18]	[4,73; 5,08]	[4,57; 4,92]										
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	8093	7865	7434	7012	7077	6957	6954	6751	6525	6403	6212										
	Anteil in %	7,21	7,92	8,25	8,44	8,91	9,28	9,82	10,09	10,31	10,63	10,86										
	CI Anteil in %	[7,06; 7,36]	[7,75; 8,09]	[8,07; 8,43]	[8,25; 8,63]	[8,71; 9,11]	[9,07; 9,49]	[9,60; 10,04]	[9,86; 10,32]	[10,07; 10,55]	[10,39; 10,88]	[10,61; 11,12]										
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	12173	11668	11014	10766	10757	10442	10210	9968	9800	9624	9464										
	Anteil in %	10,85	11,75	12,22	12,95	13,54	13,93	14,42	14,89	15,48	15,98	16,55										
	CI Anteil in %	[10,67; 11,03]	[11,55; 11,95]	[12,00; 12,43]	[12,72; 13,18]	[13,31; 13,78]	[13,68; 14,18]	[14,16; 14,68]	[14,62; 15,16]	[15,20; 15,76]	[15,69; 16,27]	[16,24; 16,85]										

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931										
	auswertbar	Anzahl	91590	78886	70742	66937	62454	58634	55113	51894	49378	46685										
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	24622	19527	16096	14614	13385	12159	11178	10208	9500	8752										
		Anteil in %	26,88	24,75	22,75	21,83	21,43	20,74	20,28	19,67	19,24	18,75										
		CI Anteil in %	[26,60; 27,17]	[24,45; 25,05]	[22,44; 23,06]	[21,52; 22,15]	[21,11; 21,75]	[20,41; 21,07]	[19,95; 20,62]	[19,33; 20,01]	[18,89; 19,59]	[18,39; 19,10]										
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	13004	11076	9418	8806	8033	7481	6943	6444	6109	5736										
		Anteil in %	14,20	14,04	13,31	13,16	12,86	12,76	12,60	12,42	12,37	12,29										
		CI Anteil in %	[13,97; 14,42]	[13,80; 14,28]	[13,06; 13,56]	[12,90; 13,41]	[12,60; 13,12]	[12,49; 13,03]	[12,32; 12,87]	[12,13; 12,70]	[12,08; 12,66]	[11,99; 12,58]										
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	2311	1766	1701	1545	1347	1179	1082	964	858	779										
		Anteil in %	2,52	2,24	2,40	2,31	2,16	2,01	1,96	1,86	1,74	1,67										
		CI Anteil in %	[2,42; 2,62]	[2,14; 2,34]	[2,29; 2,52]	[2,19; 2,42]	[2,04; 2,27]	[1,90; 2,12]	[1,85; 2,08]	[1,74; 1,97]	[1,62; 1,85]	[1,55; 1,78]										
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1750	1378	1301	1174	1052	920	811	723	664	603										
		Anteil in %	1,91	1,75	1,84	1,75	1,68	1,57	1,47	1,39	1,34	1,29										
		CI Anteil in %	[1,82; 2,00]	[1,66; 1,84]	[1,74; 1,94]	[1,65; 1,85]	[1,58; 1,79]	[1,47; 1,67]	[1,37; 1,57]	[1,29; 1,49]	[1,24; 1,45]	[1,19; 1,39]										
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8507	7901	7341	7014	6551	6198	5915	5618	5443	5131										
		Anteil in %	9,29	10,02	10,38	10,48	10,49	10,57	10,73	10,83	11,02	10,99										
		CI Anteil in %	[9,10; 9,48]	[9,81; 10,23]	[10,15; 10,60]	[10,25; 10,71]	[10,25; 10,73]	[10,32; 10,82]	[10,47; 10,99]	[10,56; 11,09]	[10,75; 11,30]	[10,71; 11,27]										
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13207	11859	10522	9863	9119	8510	7908	7495	7036	6619										
		Anteil in %	14,42	15,03	14,87	14,73	14,60	14,51	14,35	14,44	14,25	14,18										
		CI Anteil in %	[14,19; 14,65]	[14,78; 15,28]	[14,61; 15,14]	[14,47; 15,00]	[14,32; 14,88]	[14,23; 14,80]	[14,06; 14,64]	[14,14; 14,75]	[13,94; 14,56]	[13,86; 14,49]										
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	4310	3696	4062	3851	3496	3172	2927	2719	2557	2334											
	Anteil in %	4,71	4,69	5,74	5,75	5,60	5,41	5,31	5,24	5,18	5,00											
	CI Anteil in %	[4,57; 4,84]	[4,54; 4,83]	[5,57; 5,91]	[5,58; 5,93]	[5,42; 5,78]	[5,23; 5,59]	[5,12; 5,50]	[5,05; 5,43]	[4,98; 5,37]	[4,80; 5,20]											
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	7636	7230	6782	6824	6703	6674	6484	6257	6066	5854											
	Anteil in %	8,34	9,17	9,59	10,19	10,73	11,38	11,76	12,06	12,28	12,54											
	CI Anteil in %	[8,16; 8,52]	[8,96; 9,37]	[9,37; 9,80]	[9,97; 10,42]	[10,49; 10,98]	[11,13; 11,64]	[11,50; 12,03]	[11,78; 12,34]	[12,00; 12,57]	[12,24; 12,84]											
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	8710	8166	7973	7974	7793	7663	7467	7420	7297	7225											
	Anteil in %	9,51	10,35	11,27	11,91	12,48	13,07	13,55	14,30	14,78	15,48											
	CI Anteil in %	[9,32; 9,70]	[10,14; 10,56]	[11,04; 11,50]	[11,67; 12,16]	[12,22; 12,74]	[12,80; 13,34]	[13,26; 13,83]	[14,00; 14,60]	[14,46; 15,09]	[15,15; 15,80]											

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214											
	auswertbar	Anzahl	103134	89890	80888	76963	72219	67880	63920	60389	57416	54330											
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	30575	25281	20955	19364	17816	16402	15136	13955	13057	12278											
		Anteil in %	29,65	28,12	25,91	25,16	24,67	24,16	23,68	23,11	22,74	22,60											
	CI Anteil in %		[29,37; 29,92]	[27,83; 28,42]	[25,60; 26,21]	[24,85; 25,47]	[24,35; 24,98]	[23,84; 24,49]	[23,35; 24,01]	[22,77; 23,44]	[22,40; 23,08]	[22,25; 22,95]											
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	13859	11753	10167	9478	8606	7940	7342	6840	6426	6021											
		Anteil in %	13,44	13,07	12,57	12,32	11,92	11,70	11,49	11,33	11,19	11,08											
	CI Anteil in %		[13,23; 13,65]	[12,85; 13,30]	[12,34; 12,80]	[12,08; 12,55]	[11,68; 12,15]	[11,46; 11,94]	[11,24; 11,73]	[11,07; 11,58]	[10,93; 11,45]	[10,82; 11,35]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	2670	2129	1934	1687	1546	1363	1200	1082	992	900											
		Anteil in %	2,59	2,37	2,39	2,19	2,14	2,01	1,88	1,79	1,73	1,66											
	CI Anteil in %		[2,49; 2,69]	[2,27; 2,47]	[2,29; 2,50]	[2,09; 2,30]	[2,04; 2,25]	[1,90; 2,11]	[1,77; 1,98]	[1,69; 1,90]	[1,62; 1,83]	[1,55; 1,76]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2328	1911	1760	1577	1406	1258	1102	976	879	781											
		Anteil in %	2,26	2,13	2,18	2,05	1,95	1,85	1,72	1,62	1,53	1,44											
	CI Anteil in %		[2,17; 2,35]	[2,03; 2,22]	[2,08; 2,28]	[1,95; 2,15]	[1,85; 2,05]	[1,75; 1,95]	[1,62; 1,82]	[1,52; 1,72]	[1,43; 1,63]	[1,34; 1,54]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8220	7764	7376	7074	6835	6499	6286	6127	5923	5587											
		Anteil in %	7,97	8,64	9,12	9,19	9,46	9,57	9,83	10,15	10,32	10,28											
	CI Anteil in %		[7,80; 8,14]	[8,45; 8,82]	[8,92; 9,32]	[8,99; 9,40]	[9,25; 9,68]	[9,35; 9,80]	[9,60; 10,07]	[9,91; 10,39]	[10,07; 10,56]	[10,03; 10,54]											
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	15476	13773	12417	11962	11177	10623	10037	9475	8934	8459												
	Anteil in %	15,01	15,32	15,35	15,54	15,48	15,65	15,70	15,69	15,56	15,57												
CI Anteil in %		[14,79; 15,22]	[15,09; 15,56]	[15,10; 15,60]	[15,29; 15,80]	[15,21; 15,74]	[15,38; 15,92]	[15,42; 15,98]	[15,40; 15,98]	[15,26; 15,86]	[15,26; 15,87]												
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	4498	3875	4242	3960	3561	3306	3108	2871	2683	2512												
	Anteil in %	4,36	4,31	5,24	5,15	4,93	4,87	4,86	4,75	4,67	4,62												
CI Anteil in %		[4,24; 4,49]	[4,18; 4,44]	[5,09; 5,40]	[4,99; 5,30]	[4,77; 5,09]	[4,71; 5,03]	[4,70; 5,03]	[4,58; 4,92]	[4,50; 4,85]	[4,45; 4,80]												
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	7094	6795	6513	6677	6657	6517	6420	6230	6077	5845												
	Anteil in %	6,88	7,56	8,05	8,68	9,22	9,60	10,04	10,32	10,58	10,76												
CI Anteil in %		[6,72; 7,03]	[7,39; 7,73]	[7,86; 8,24]	[8,48; 8,87]	[9,01; 9,43]	[9,38; 9,82]	[9,81; 10,28]	[10,07; 10,56]	[10,33; 10,84]	[10,50; 11,02]												
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	10216	9569	9111	9084	8866	8641	8335	8184	8052	7762												
	Anteil in %	9,91	10,65	11,26	11,80	12,28	12,73	13,04	13,55	14,02	14,29												
CI Anteil in %		[9,72; 10,09]	[10,44; 10,85]	[11,05; 11,48]	[11,58; 12,03]	[12,04; 12,52]	[12,48; 12,98]	[12,78; 13,30]	[13,28; 13,83]	[13,74; 14,31]	[13,99; 14,58]												

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr						
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783															
	auswertbar	Anzahl	99597	85012	78980	72759	67690	63498	59764	56535	53394															
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	29508	21432	19668	17702	15879	14554	13323	12364	11383															
		Anteil in %	29,63	25,21	24,90	24,33	23,46	22,92	22,29	21,87	21,32															
		CI Anteil in %	[29,34; 29,91]	[24,92; 25,50]	[24,60; 25,20]	[24,02; 24,64]	[23,14; 23,78]	[22,59; 23,25]	[21,96; 22,63]	[21,53; 22,21]	[20,97; 21,67]															
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	12427	9843	9061	8124	7318	6760	6252	5834	5487															
		Anteil in %	12,48	11,58	11,47	11,17	10,81	10,65	10,46	10,32	10,28															
		CI Anteil in %	[12,27; 12,68]	[11,36; 11,79]	[11,25; 11,69]	[10,94; 11,39]	[10,58; 11,04]	[10,41; 10,89]	[10,22; 10,71]	[10,07; 10,57]	[10,02; 10,53]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	2419	1958	1827	1576	1370	1225	1090	970	884															
		Anteil in %	2,43	2,30	2,31	2,17	2,02	1,93	1,82	1,72	1,66															
		CI Anteil in %	[2,33; 2,52]	[2,20; 2,40]	[2,21; 2,42]	[2,06; 2,27]	[1,92; 2,13]	[1,82; 2,04]	[1,72; 1,93]	[1,61; 1,82]	[1,55; 1,76]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1829	1444	1332	1197	1099	985	858	748	659															
		Anteil in %	1,84	1,70	1,69	1,65	1,62	1,55	1,44	1,32	1,23															
		CI Anteil in %	[1,75; 1,92]	[1,61; 1,79]	[1,60; 1,78]	[1,55; 1,74]	[1,53; 1,72]	[1,46; 1,65]	[1,34; 1,53]	[1,23; 1,42]	[1,14; 1,33]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	9443	8825	8335	7881	7367	7097	6774	6480	6088															
		Anteil in %	9,48	10,38	10,55	10,83	10,88	11,18	11,33	11,46	11,40															
		CI Anteil in %	[9,30; 9,66]	[10,18; 10,59]	[10,34; 10,77]	[10,61; 11,06]	[10,65; 11,12]	[10,93; 11,42]	[11,08; 11,59]	[11,20; 11,72]	[11,13; 11,67]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	15804	13195	12630	11533	10816	9976	9420	8877	8379															
		Anteil in %	15,87	15,52	15,99	15,85	15,98	15,71	15,76	15,70	15,69															
		CI Anteil in %	[15,64; 16,09]	[15,28; 15,76]	[15,74; 16,25]	[15,59; 16,12]	[15,70; 16,25]	[15,43; 15,99]	[15,47; 16,05]	[15,40; 16,00]	[15,38; 16,00]															
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	4449	4150	4155	3834	3471	3286	3048	2864	2685															
		Anteil in %	4,47	4,88	5,26	5,27	5,13	5,17	5,10	5,07	5,03															
		CI Anteil in %	[4,34; 4,60]	[4,74; 5,03]	[5,11; 5,42]	[5,11; 5,43]	[4,96; 5,29]	[5,00; 5,35]	[4,92; 5,28]	[4,89; 5,25]	[4,84; 5,21]															
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	7773	8710	7829	7505	7462	7240	7029	6826	6563															
Anteil in %		7,80	10,25	9,91	10,31	11,02	11,40	11,76	12,07	12,29																
	CI Anteil in %	[7,64; 7,97]	[10,04; 10,45]	[9,70; 10,12]	[10,09; 10,54]	[10,79; 11,26]	[11,15; 11,65]	[11,50; 12,02]	[11,81; 12,34]	[12,01; 12,57]																
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	8352	8505	8130	7808	7729	7488	7372	7254	7180																
	Anteil in %	8,39	10,00	10,29	10,73	11,42	11,79	12,34	12,83	13,45																
	CI Anteil in %	[8,21; 8,56]	[9,80; 10,21]	[10,08; 10,51]	[10,51; 10,96]	[11,18; 11,66]	[11,54; 12,04]	[12,07; 12,60]	[12,56; 13,11]	[13,16; 13,74]																

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228										
	auswertbar	Anzahl	109902	95198	89038	82396	77136	72606	68547	65045	61594										
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	35747	27036	25042	22870	20947	19378	17795	16588	15481										
		Anteil in %	32,53	28,40	28,13	27,76	27,16	26,69	25,96	25,50	25,13										
		CI Anteil in %	[32,25; 32,80]	[28,11; 28,69]	[27,83; 28,42]	[27,45; 28,06]	[26,84; 27,47]	[26,37; 27,01]	[25,63; 26,29]	[25,17; 25,84]	[24,79; 25,48]										
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	13039	10477	9592	8597	7916	7359	6776	6366	5874										
		Anteil in %	11,86	11,01	10,77	10,43	10,26	10,14	9,89	9,79	9,54										
		CI Anteil in %	[11,67; 12,06]	[10,81; 11,20]	[10,57; 10,98]	[10,23; 10,64]	[10,05; 10,48]	[9,92; 10,36]	[9,66; 10,11]	[9,56; 10,02]	[9,30; 9,77]										
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	2495	2057	1957	1672	1488	1344	1206	1081	955										
		Anteil in %	2,27	2,16	2,20	2,03	1,93	1,85	1,76	1,66	1,55										
		CI Anteil in %	[2,18; 2,36]	[2,07; 2,25]	[2,10; 2,29]	[1,93; 2,13]	[1,83; 2,03]	[1,75; 1,95]	[1,66; 1,86]	[1,56; 1,76]	[1,45; 1,65]										
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2331	1881	1754	1562	1366	1206	1085	995	916										
		Anteil in %	2,12	1,98	1,97	1,90	1,77	1,66	1,58	1,53	1,49										
		CI Anteil in %	[2,04; 2,21]	[1,89; 2,06]	[1,88; 2,06]	[1,80; 1,99]	[1,68; 1,86]	[1,57; 1,75]	[1,49; 1,68]	[1,44; 1,62]	[1,39; 1,58]										
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	9162	8634	8462	8030	7688	7436	7168	6922	6649										
		Anteil in %	8,34	9,07	9,50	9,75	9,97	10,24	10,46	10,64	10,79										
		CI Anteil in %	[8,17; 8,50]	[8,89; 9,25]	[9,31; 9,70]	[9,54; 9,95]	[9,76; 10,18]	[10,02; 10,46]	[10,23; 10,69]	[10,40; 10,88]	[10,55; 11,04]										
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	17634	15354	14755	13592	12906	12148	11641	10960	10391										
		Anteil in %	16,05	16,13	16,57	16,50	16,73	16,73	16,98	16,85	16,87										
		CI Anteil in %	[15,83; 16,26]	[15,89; 16,36]	[16,33; 16,82]	[16,24; 16,75]	[16,47; 16,99]	[16,46; 17,00]	[16,70; 17,26]	[16,56; 17,14]	[16,57; 17,17]										
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	4512	4281	4354	3971	3630	3265	3065	2842	2590										
Anteil in %		4,11	4,50	4,89	4,82	4,71	4,50	4,47	4,37	4,20											
CI Anteil in %		[3,99; 4,22]	[4,37; 4,63]	[4,75; 5,03]	[4,67; 4,97]	[4,56; 4,86]	[4,35; 4,65]	[4,32; 4,63]	[4,21; 4,53]	[4,05; 4,36]											
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	6998	7876	6992	6910	6815	6753	6514	6376	6157											
	Anteil in %	6,37	8,27	7,85	8,39	8,84	9,30	9,50	9,80	10,00											
	CI Anteil in %	[6,22; 6,51]	[8,10; 8,45]	[7,68; 8,03]	[8,20; 8,58]	[8,63; 9,04]	[9,09; 9,51]	[9,28; 9,72]	[9,57; 10,03]	[9,76; 10,23]											
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	9756	9763	9303	8848	8482	8188	8066	7977	7883											
	Anteil in %	8,88	10,26	10,45	10,74	11,00	11,28	11,77	12,26	12,80											
	CI Anteil in %	[8,71; 9,05]	[10,06; 10,45]	[10,25; 10,65]	[10,53; 10,95]	[10,78; 11,22]	[11,05; 11,51]	[11,53; 12,01]	[12,01; 12,52]	[12,53; 13,06]											

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871												
	auswertbar	Anzahl	67491	58942	53277	49138	45948	43098	40759	38529												
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	20512	16637	14619	12966	11855	10817	10026	9191												
		Anteil in %	30,39	28,23	27,44	26,39	25,80	25,10	24,60	23,85												
		CI Anteil in %	[30,05; 30,74]	[27,86; 28,59]	[27,06; 27,82]	[26,00; 26,78]	[25,40; 26,20]	[24,69; 25,51]	[24,18; 25,02]	[23,43; 24,28]												
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	7382	6326	5507	4938	4550	4196	3877	3625												
		Anteil in %	10,94	10,73	10,34	10,05	9,90	9,74	9,51	9,41												
		CI Anteil in %	[10,70; 11,17]	[10,48; 10,98]	[10,08; 10,60]	[9,78; 10,32]	[9,63; 10,18]	[9,46; 10,02]	[9,23; 9,80]	[9,12; 9,70]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1494	1192	1016	879	774	694	611	561												
		Anteil in %	2,21	2,02	1,91	1,79	1,68	1,61	1,50	1,46												
		CI Anteil in %	[2,10; 2,32]	[1,91; 2,14]	[1,79; 2,02]	[1,67; 1,91]	[1,57; 1,80]	[1,49; 1,73]	[1,38; 1,62]	[1,34; 1,58]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1095	925	808	709	622	535	481	448												
		Anteil in %	1,62	1,57	1,52	1,44	1,35	1,24	1,18	1,16												
		CI Anteil in %	[1,53; 1,72]	[1,47; 1,67]	[1,41; 1,62]	[1,34; 1,55]	[1,25; 1,46]	[1,14; 1,35]	[1,08; 1,28]	[1,06; 1,27]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	6804	6311	5939	5517	5262	4986	4819	4581												
		Anteil in %	10,08	10,71	11,15	11,23	11,45	11,57	11,82	11,89												
		CI Anteil in %	[9,85; 10,31]	[10,46; 10,96]	[10,88; 11,41]	[10,95; 11,51]	[11,16; 11,74]	[11,27; 11,87]	[11,51; 12,14]	[11,57; 12,21]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	11006	9684	8703	8122	7548	7094	6681	6286												
		Anteil in %	16,31	16,43	16,34	16,53	16,43	16,46	16,39	16,31												
		CI Anteil in %	[16,03; 16,59]	[16,13; 16,73]	[16,02; 16,65]	[16,20; 16,86]	[16,09; 16,77]	[16,11; 16,81]	[16,03; 16,75]	[15,95; 16,68]												
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	3174	2799	2485	2339	2162	1989	1859	1728													
	Anteil in %	4,70	4,75	4,66	4,76	4,71	4,62	4,56	4,48													
	CI Anteil in %	[4,54; 4,86]	[4,58; 4,92]	[4,49; 4,84]	[4,57; 4,95]	[4,51; 4,90]	[4,42; 4,81]	[4,36; 4,76]	[4,28; 4,69]													
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	5338	5185	5026	5007	4916	4758	4646	4500													
	Anteil in %	7,91	8,80	9,43	10,19	10,70	11,04	11,40	11,68													
	CI Anteil in %	[7,71; 8,11]	[8,57; 9,03]	[9,19; 9,68]	[9,92; 10,46]	[10,42; 10,98]	[10,74; 11,34]	[11,09; 11,71]	[11,36; 12,00]													
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	5704	5441	5090	4949	4790	4761	4701	4745													
	Anteil in %	8,45	9,23	9,55	10,07	10,42	11,05	11,53	12,32													
	CI Anteil in %	[8,24; 8,66]	[9,00; 9,46]	[9,30; 9,80]	[9,81; 10,34]	[10,15; 10,70]	[10,75; 11,34]	[11,22; 11,84]	[11,99; 12,64]													

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527												
	auswertbar	Anzahl	74071	65410	59827	55518	52192	49005	46559	44092												
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	24811	20694	18516	16674	15388	14138	13149	12307												
		Anteil in %	33,50	31,64	30,95	30,03	29,48	28,85	28,24	27,91												
		CI Anteil in %	[33,16; 33,84]	[31,28; 31,99]	[30,58; 31,32]	[29,65; 30,41]	[29,09; 29,87]	[28,45; 29,25]	[27,83; 28,65]	[27,49; 28,33]												
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	7597	6590	5765	5265	4814	4381	4072	3789												
		Anteil in %	10,26	10,07	9,64	9,48	9,22	8,94	8,75	8,59												
		CI Anteil in %	[10,04; 10,47]	[9,84; 10,31]	[9,40; 9,87]	[9,24; 9,73]	[8,98; 9,47]	[8,69; 9,19]	[8,49; 9,00]	[8,33; 8,86]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1569	1313	1181	1026	890	788	736	630												
		Anteil in %	2,12	2,01	1,97	1,85	1,71	1,61	1,58	1,43												
		CI Anteil in %	[2,01; 2,22]	[1,90; 2,11]	[1,86; 2,09]	[1,74; 1,96]	[1,59; 1,82]	[1,50; 1,72]	[1,47; 1,69]	[1,32; 1,54]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1485	1238	1087	959	834	734	673	593												
		Anteil in %	2,00	1,89	1,82	1,73	1,60	1,50	1,45	1,34												
		CI Anteil in %	[1,90; 2,11]	[1,79; 2,00]	[1,71; 1,92]	[1,62; 1,84]	[1,49; 1,71]	[1,39; 1,61]	[1,34; 1,55]	[1,24; 1,45]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	6524	6143	5810	5579	5396	5112	4997	4760												
		Anteil in %	8,81	9,39	9,71	10,05	10,34	10,43	10,73	10,80												
		CI Anteil in %	[8,60; 9,01]	[9,17; 9,62]	[9,47; 9,95]	[9,80; 10,30]	[10,08; 10,60]	[10,16; 10,70]	[10,45; 11,01]	[10,51; 11,09]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	12302	11129	10226	9632	9073	8591	8095	7694												
		Anteil in %	16,61	17,01	17,09	17,35	17,38	17,53	17,39	17,45												
		CI Anteil in %	[16,34; 16,88]	[16,73; 17,30]	[16,79; 17,39]	[17,03; 17,66]	[17,06; 17,71]	[17,19; 17,87]	[17,04; 17,73]	[17,10; 17,80]												
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	3130	2816	2569	2363	2212	2053	1934	1753												
Anteil in %		4,23	4,31	4,29	4,26	4,24	4,19	4,15	3,98													
CI Anteil in %		[4,08; 4,37]	[4,15; 4,46]	[4,13; 4,46]	[4,09; 4,42]	[4,07; 4,41]	[4,01; 4,37]	[3,97; 4,34]	[3,79; 4,16]													
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	4857	4786	4669	4587	4553	4505	4386	4311													
	Anteil in %	6,56	7,32	7,80	8,26	8,72	9,19	9,42	9,78													
	CI Anteil in %	[6,38; 6,74]	[7,12; 7,52]	[7,59; 8,02]	[8,03; 8,49]	[8,48; 8,97]	[8,94; 9,45]	[9,15; 9,69]	[9,50; 10,05]													
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6342	5912	5600	5300	5160	5069	5038	4965													
	Anteil in %	8,56	9,04	9,36	9,55	9,89	10,34	10,82	11,26													
	CI Anteil in %	[8,36; 8,76]	[8,82; 9,26]	[9,13; 9,59]	[9,30; 9,79]	[9,63; 10,14]	[10,07; 10,61]	[10,54; 11,10]	[10,97; 11,56]													

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	64562	58326	53655	50049	46993	44446													
	auswertbar	Anzahl	72174	62413	56427	52085	48600	45631	43063													
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	23492	19064	16669	15106	13669	12603	11529													
		Anteil in %	32,55	30,54	29,54	29,00	28,13	27,62	26,77													
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[32,21; 32,89]	[30,18; 30,91]	[29,16; 29,92]	[28,61; 29,39]	[27,73; 28,53]	[27,21; 28,03]	[26,35; 27,19]													
		Anzahl	7578	6331	5512	4885	4471	4118	3781													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	10,50	10,14	9,77	9,38	9,20	9,02	8,78													
		CI Anteil in %	[10,28; 10,72]	[9,91; 10,38]	[9,52; 10,01]	[9,13; 9,63]	[8,94; 9,46]	[8,76; 9,29]	[8,51; 9,05]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1326	1073	888	769	682	600	539													
		Anteil in %	1,84	1,72	1,57	1,48	1,40	1,31	1,25													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[1,74; 1,94]	[1,62; 1,82]	[1,47; 1,68]	[1,37; 1,58]	[1,30; 1,51]	[1,21; 1,42]	[1,15; 1,36]													
		Anzahl	997	825	721	615	568	523	470													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	1,38	1,32	1,28	1,18	1,17	1,15	1,09													
		CI Anteil in %	[1,30; 1,47]	[1,23; 1,41]	[1,19; 1,37]	[1,09; 1,27]	[1,07; 1,26]	[1,05; 1,24]	[0,99; 1,19]													
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	7402	6950	6384	6003	5621	5327	5138													
		Anteil in %	10,26	11,14	11,31	11,53	11,57	11,67	11,93													
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[10,03; 10,48]	[10,89; 11,38]	[11,05; 11,58]	[11,25; 11,80]	[11,28; 11,85]	[11,38; 11,97]	[11,63; 12,24]													
		Anzahl	12091	10343	9506	8825	8326	7804	7360													
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	16,75	16,57	16,85	16,94	17,13	17,10	17,09													
		CI Anteil in %	[16,48; 17,03]	[16,28; 16,86]	[16,54; 17,16]	[16,62; 17,27]	[16,80; 17,47]	[16,76; 17,45]	[16,74; 17,45]													
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	3002	2630	2335	2115	1944	1776	1650														
	Anteil in %	4,16	4,21	4,14	4,06	4,00	3,89	3,83														
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[4,01; 4,31]	[4,06; 4,37]	[3,97; 4,30]	[3,89; 4,23]	[3,83; 4,17]	[3,71; 4,07]	[3,65; 4,01]														
	Anzahl	5303	5170	5041	4902	4772	4711	4601														
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	7,35	8,28	8,93	9,41	9,82	10,32	10,68														
	CI Anteil in %	[7,16; 7,54]	[8,07; 8,50]	[8,70; 9,17]	[9,16; 9,66]	[9,55; 10,08]	[10,04; 10,60]	[10,39; 10,98]														
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6231	5802	5522	5346	5248	5114	5133														
	Anteil in %	8,63	9,30	9,79	10,26	10,80	11,21	11,92														
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[8,43; 8,84]	[9,07; 9,52]	[9,54; 10,03]	[10,00; 10,52]	[10,52; 11,07]	[10,92; 11,50]	[11,61; 12,23]														

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	76956	69537	63438	58654	54793	51664	49078												
	auswertbar	Anzahl	76832	67298	61498	56910	53284	50392	47682												
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	27843	23241	20703	18859	17227	15927	14816												
		Anteil in %	36,24	34,53	33,66	33,14	32,33	31,61	31,07												
	CI Anteil in %	[35,90; 36,58]	[34,18; 34,89]	[33,29; 34,04]	[32,75; 33,53]	[31,93; 32,73]	[31,20; 32,01]	[30,66; 31,49]													
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	7651	6452	5550	4987	4583	4258	3944												
		Anteil in %	9,96	9,59	9,02	8,76	8,60	8,45	8,27												
	CI Anteil in %	[9,75; 10,17]	[9,36; 9,81]	[8,80; 9,25]	[8,53; 9,00]	[8,36; 8,84]	[8,21; 8,69]	[8,02; 8,52]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1351	1149	965	870	731	668	609												
		Anteil in %	1,76	1,71	1,57	1,53	1,37	1,33	1,28												
	CI Anteil in %	[1,67; 1,85]	[1,61; 1,81]	[1,47; 1,67]	[1,43; 1,63]	[1,27; 1,47]	[1,23; 1,43]	[1,18; 1,38]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1248	1042	905	782	714	663	576												
		Anteil in %	1,62	1,55	1,47	1,37	1,34	1,32	1,21												
	CI Anteil in %	[1,53; 1,71]	[1,46; 1,64]	[1,38; 1,57]	[1,28; 1,47]	[1,24; 1,44]	[1,22; 1,42]	[1,11; 1,31]													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	6602	6372	5982	5739	5405	5318	5068												
		Anteil in %	8,59	9,47	9,73	10,08	10,14	10,55	10,63												
	CI Anteil in %	[8,39; 8,79]	[9,25; 9,69]	[9,49; 9,96]	[9,84; 10,33]	[9,89; 10,40]	[10,29; 10,82]	[10,35; 10,91]													
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	12933	11444	10690	9855	9468	8928	8508													
	Anteil in %	16,83	17,00	17,38	17,32	17,77	17,72	17,84													
CI Anteil in %	[16,57; 17,10]	[16,72; 17,29]	[17,08; 17,68]	[17,01; 17,63]	[17,44; 18,09]	[17,38; 18,05]	[17,50; 18,19]														
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2758	2351	2087	1921	1796	1714	1594													
	Anteil in %	3,59	3,49	3,39	3,38	3,37	3,40	3,34													
CI Anteil in %	[3,46; 3,72]	[3,35; 3,63]	[3,25; 3,54]	[3,23; 3,52]	[3,22; 3,52]	[3,24; 3,56]	[3,18; 3,50]														
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	4826	4790	4709	4572	4525	4432	4317													
	Anteil in %	6,28	7,12	7,66	8,03	8,49	8,80	9,05													
CI Anteil in %	[6,11; 6,45]	[6,92; 7,31]	[7,45; 7,87]	[7,81; 8,26]	[8,26; 8,73]	[8,55; 9,04]	[8,80; 9,31]														
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6324	5846	5580	5297	5167	5012	4938													
	Anteil in %	8,23	8,69	9,07	9,31	9,70	9,95	10,36													
CI Anteil in %	[8,04; 8,43]	[8,47; 8,90]	[8,85; 9,30]	[9,07; 9,55]	[9,45; 9,95]	[9,68; 10,21]	[10,08; 10,63]														

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	66301	59407	53502	49122	45947	43280														
	auswertbar	Anzahl	66185	57559	51747	47552	44652	41884														
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	20812	16777	14617	12970	11905	10931														
		Anteil in %	31,45	29,15	28,25	27,28	26,66	26,10														
		CI Anteil in %	[31,09; 31,80]	[28,78; 29,52]	[27,86; 28,63]	[26,88; 27,68]	[26,25; 27,07]	[25,68; 26,52]														
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6863	5734	4893	4361	4027	3726														
		Anteil in %	10,37	9,96	9,46	9,17	9,02	8,90														
		CI Anteil in %	[10,14; 10,60]	[9,72; 10,21]	[9,20; 9,71]	[8,91; 9,43]	[8,75; 9,28]	[8,62; 9,17]														
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1143	899	758	675	591	538														
		Anteil in %	1,73	1,56	1,46	1,42	1,32	1,28														
		CI Anteil in %	[1,63; 1,83]	[1,46; 1,66]	[1,36; 1,57]	[1,31; 1,53]	[1,22; 1,43]	[1,18; 1,39]														
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	826	690	584	510	459	402														
		Anteil in %	1,25	1,20	1,13	1,07	1,03	0,96														
		CI Anteil in %	[1,16; 1,33]	[1,11; 1,29]	[1,04; 1,22]	[0,98; 1,17]	[0,93; 1,12]	[0,87; 1,05]														
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7039	6504	6039	5646	5343	5028														
		Anteil in %	10,64	11,30	11,67	11,87	11,97	12,00														
		CI Anteil in %	[10,40; 10,87]	[11,04; 11,56]	[11,39; 11,95]	[11,58; 12,16]	[11,66; 12,27]	[11,69; 12,32]														
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	11194	9875	8982	8251	7692	7125														
		Anteil in %	16,91	17,16	17,36	17,35	17,23	17,01														
		CI Anteil in %	[16,63; 17,20]	[16,85; 17,46]	[17,03; 17,68]	[17,01; 17,69]	[16,88; 17,58]	[16,65; 17,37]														
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2749	2430	2161	1936	1781	1645														
		Anteil in %	4,15	4,22	4,18	4,07	3,99	3,93														
		CI Anteil in %	[4,00; 4,31]	[4,06; 4,39]	[4,00; 4,35]	[3,89; 4,25]	[3,81; 4,17]	[3,74; 4,11]														
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	5407	5285	5026	4891	4838	4713															
	Anteil in %	8,17	9,18	9,71	10,29	10,83	11,25															
	CI Anteil in %	[7,96; 8,38]	[8,95; 9,42]	[9,46; 9,97]	[10,01; 10,56]	[10,55; 11,12]	[10,95; 11,56]															
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	5790	5571	5198	5077	4977	4916															
	Anteil in %	8,75	9,68	10,05	10,68	11,15	11,74															
	CI Anteil in %	[8,53; 8,96]	[9,44; 9,92]	[9,79; 10,30]	[10,40; 10,95]	[10,85; 11,44]	[11,43; 12,05]															

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	71902	65176	59348	54926	51404	48447														
	auswertbar	Anzahl	71787	63414	57490	53287	50047	47106														
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	25161	20981	18577	16887	15656	14475														
		Anteil in %	35,05	33,09	32,31	31,69	31,28	30,73														
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[34,70; 35,40]	[32,72; 33,45]	[31,93; 32,70]	[31,30; 32,09]	[30,88; 31,69]	[30,31; 31,15]														
		Anzahl	7107	6004	5194	4676	4313	3991														
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	9,90	9,47	9,03	8,78	8,62	8,47														
		CI Anteil in %	[9,68; 10,12]	[9,24; 9,70]	[8,80; 9,27]	[8,53; 9,02]	[8,37; 8,86]	[8,22; 8,72]														
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1145	952	837	744	685	609														
		Anteil in %	1,59	1,50	1,46	1,40	1,37	1,29														
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[1,50; 1,69]	[1,41; 1,60]	[1,36; 1,55]	[1,30; 1,50]	[1,27; 1,47]	[1,19; 1,39]														
		Anzahl	1053	854	716	666	585	529														
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	1,47	1,35	1,25	1,25	1,17	1,12														
		CI Anteil in %	[1,38; 1,55]	[1,26; 1,44]	[1,15; 1,34]	[1,16; 1,34]	[1,07; 1,26]	[1,03; 1,22]														
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	6484	6175	5843	5585	5358	5066														
		Anteil in %	9,03	9,74	10,16	10,48	10,71	10,75														
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[8,82; 9,24]	[9,51; 9,97]	[9,92; 10,41]	[10,22; 10,74]	[10,44; 10,98]	[10,47; 11,03]														
		Anzahl	12603	11298	10275	9585	8971	8476														
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	17,56	17,82	17,87	17,99	17,93	17,99														
		CI Anteil in %	[17,28; 17,83]	[17,52; 18,11]	[17,56; 18,19]	[17,66; 18,31]	[17,59; 18,26]	[17,65; 18,34]														
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2548	2254	2032	1795	1691	1576														
Anteil in %		3,55	3,55	3,53	3,37	3,38	3,35															
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[3,41; 3,68]	[3,41; 3,70]	[3,38; 3,69]	[3,22; 3,52]	[3,22; 3,54]	[3,18; 3,51]															
	Anzahl	4724	4764	4609	4450	4358	4235															
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	6,58	7,51	8,02	8,35	8,71	8,99															
	CI Anteil in %	[6,40; 6,76]	[7,31; 7,72]	[7,80; 8,24]	[8,12; 8,59]	[8,46; 8,95]	[8,73; 9,25]															
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6132	5764	5370	5226	5014	4892															
	Anteil in %	8,54	9,09	9,34	9,81	10,02	10,39															
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[8,34; 8,75]	[8,87; 9,31]	[9,10; 9,58]	[9,55; 10,06]	[9,76; 10,28]	[10,11; 10,66]															

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	68288	61928	57110	53460															
	auswertbar	Anzahl	75882	66318	59995	55448	51878															
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	24133	19836	17525	15973	14622															
		Anteil in %	31,80	29,91	29,21	28,81	28,19															
		CI Anteil in %	[31,47; 32,13]	[29,56; 30,26]	[28,85; 29,57]	[28,43; 29,18]	[27,80; 28,57]															
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	7201	6034	5276	4735	4344															
		Anteil in %	9,49	9,10	8,79	8,54	8,37															
		CI Anteil in %	[9,28; 9,70]	[8,88; 9,32]	[8,57; 9,02]	[8,31; 8,77]	[8,14; 8,61]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1052	854	727	657	568															
		Anteil in %	1,39	1,29	1,21	1,18	1,09															
		CI Anteil in %	[1,30; 1,47]	[1,20; 1,37]	[1,12; 1,30]	[1,09; 1,27]	[1,01; 1,18]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	874	694	606	517	479															
		Anteil in %	1,15	1,05	1,01	0,93	0,92															
		CI Anteil in %	[1,08; 1,23]	[0,97; 1,12]	[0,93; 1,09]	[0,85; 1,01]	[0,84; 1,01]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8266	7839	7190	6743	6370															
		Anteil in %	10,89	11,82	11,98	12,16	12,28															
		CI Anteil in %	[10,67; 11,11]	[11,57; 12,07]	[11,72; 12,24]	[11,89; 12,43]	[12,00; 12,56]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13554	11861	10777	10004	9343															
		Anteil in %	17,86	17,89	17,96	18,04	18,01															
		CI Anteil in %	[17,59; 18,13]	[17,59; 18,18]	[17,66; 18,27]	[17,72; 18,36]	[17,68; 18,34]															
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2819	2420	2154	1929	1712																
	Anteil in %	3,71	3,65	3,59	3,48	3,30																
	CI Anteil in %	[3,58; 3,85]	[3,51; 3,79]	[3,44; 3,74]	[3,33; 3,63]	[3,15; 3,45]																
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	6271	6094	5791	5535	5382																
	Anteil in %	8,26	9,19	9,65	9,98	10,37																
	CI Anteil in %	[8,07; 8,46]	[8,97; 9,41]	[9,42; 9,89]	[9,73; 10,23]	[10,11; 10,64]																
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6740	6285	6007	5729	5618																
	Anteil in %	8,88	9,48	10,01	10,33	10,83																
	CI Anteil in %	[8,68; 9,08]	[9,25; 9,70]	[9,77; 10,25]	[10,08; 10,59]	[10,56; 11,10]																

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	72956	66813	62100	58365																	
	auswertbar	Anzahl	79921	71000	64917	60501	56710																	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	28233	23952	21462	19706	18210																	
		Anteil in %	35,33	33,74	33,06	32,57	32,11																	
		CI Anteil in %	[34,99; 35,66]	[33,39; 34,08]	[32,70; 33,42]	[32,20; 32,94]	[31,73; 32,50]																	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	7293	6204	5396	4897	4460																	
		Anteil in %	9,13	8,74	8,31	8,09	7,86																	
		CI Anteil in %	[8,93; 9,32]	[8,53; 8,95]	[8,10; 8,52]	[7,88; 8,31]	[7,64; 8,09]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1131	955	824	722	645																	
		Anteil in %	1,42	1,35	1,27	1,19	1,14																	
		CI Anteil in %	[1,33; 1,50]	[1,26; 1,43]	[1,18; 1,36]	[1,11; 1,28]	[1,05; 1,22]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1052	879	775	678	617																	
		Anteil in %	1,32	1,24	1,19	1,12	1,09																	
		CI Anteil in %	[1,24; 1,40]	[1,16; 1,32]	[1,11; 1,28]	[1,04; 1,20]	[1,00; 1,17]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7341	7188	6778	6487	6187																	
		Anteil in %	9,19	10,12	10,44	10,72	10,91																	
		CI Anteil in %	[8,99; 9,39]	[9,90; 10,35]	[10,21; 10,68]	[10,48; 10,97]	[10,65; 11,17]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	14543	13057	12041	11272	10580																	
		Anteil in %	18,20	18,39	18,55	18,63	18,66																	
		CI Anteil in %	[17,93; 18,46]	[18,11; 18,68]	[18,25; 18,85]	[18,32; 18,94]	[18,34; 18,98]																	
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2678	2363	2101	1894	1727																	
		Anteil in %	3,35	3,33	3,24	3,13	3,05																	
		CI Anteil in %	[3,23; 3,48]	[3,20; 3,46]	[3,10; 3,37]	[2,99; 3,27]	[2,90; 3,19]																	
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	5349	5185	5017	4859	4722																		
	Anteil in %	6,69	7,30	7,73	8,03	8,33																		
	CI Anteil in %	[6,52; 6,87]	[7,11; 7,49]	[7,52; 7,93]	[7,81; 8,25]	[8,10; 8,55]																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6983	6517	6225	5932	5736																		
	Anteil in %	8,74	9,18	9,59	9,80	10,11																		
	CI Anteil in %	[8,54; 8,93]	[8,97; 9,39]	[9,36; 9,82]	[9,57; 10,04]	[9,87; 10,36]																		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	61608	55900	51784																	
	auswertbar	Anzahl	68191	59984	54314	50157																	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	20942	17094	15177	13679																	
		Anteil in %	30,71	28,50	27,94	27,27																	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[30,36; 31,06]	[28,14; 28,86]	[27,57; 28,32]	[26,88; 27,66]																	
		Anzahl	6435	5566	4891	4401																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	9,44	9,28	9,01	8,77																	
		CI Anteil in %	[9,22; 9,66]	[9,05; 9,51]	[8,76; 9,25]	[8,53; 9,02]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	896	725	626	555																	
		Anteil in %	1,31	1,21	1,15	1,11																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[1,23; 1,40]	[1,12; 1,30]	[1,06; 1,24]	[1,01; 1,20]																	
		Anzahl	710	589	502	440																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	1,04	0,98	0,92	0,88																	
		CI Anteil in %	[0,97; 1,12]	[0,90; 1,06]	[0,84; 1,00]	[0,80; 0,96]																	
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Metformin)	Anzahl	7901	7376	6677	6145																	
		Anteil in %	11,59	12,30	12,29	12,25																	
	Kombination aus einem „vorrangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[11,35; 11,83]	[12,03; 12,56]	[12,02; 12,57]	[11,96; 12,54]																	
		Anzahl	12432	10997	10013	9277																	
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	18,23	18,33	18,44	18,50																	
		CI Anteil in %	[17,94; 18,52]	[18,02; 18,64]	[18,11; 18,76]	[18,16; 18,84]																	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	2497	2174	1914	1723																		
	Anteil in %	3,66	3,62	3,52	3,44																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[3,52; 3,80]	[3,47; 3,77]	[3,37; 3,68]	[3,28; 3,59]																		
	Anzahl	5867	5724	5464	5270																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	8,60	9,54	10,06	10,51																		
	CI Anteil in %	[8,39; 8,81]	[9,31; 9,78]	[9,81; 10,31]	[10,24; 10,78]																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6271	6021	5662	5511																		
	Anteil in %	9,20	10,04	10,42	10,99																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[8,98; 9,41]	[9,80; 10,28]	[10,17; 10,68]	[10,71; 11,26]																		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	66943	61246	56909																
	auswertbar	Anzahl	73258	65380	59619	55297																
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	25454	21483	19292	17727																
		Anteil in %	34,75	32,86	32,36	32,06																
		CI Anteil in %	[34,40; 35,09]	[32,50; 33,22]	[31,98; 32,73]	[31,67; 32,45]																
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6612	5717	4949	4482																
		Anteil in %	9,03	8,74	8,30	8,11																
		CI Anteil in %	[8,82; 9,23]	[8,53; 8,96]	[8,08; 8,52]	[7,88; 8,33]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	996	846	756	644																
		Anteil in %	1,36	1,29	1,27	1,16																
		CI Anteil in %	[1,28; 1,44]	[1,21; 1,38]	[1,18; 1,36]	[1,08; 1,25]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	922	775	678	589																
		Anteil in %	1,26	1,19	1,14	1,07																
		CI Anteil in %	[1,18; 1,34]	[1,10; 1,27]	[1,05; 1,22]	[0,98; 1,15]																
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7258	6973	6599	6163																
		Anteil in %	9,91	10,67	11,07	11,15																
		CI Anteil in %	[9,69; 10,12]	[10,43; 10,90]	[10,82; 11,32]	[10,88; 11,41]																
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13611	12352	11245	10411																
		Anteil in %	18,58	18,89	18,86	18,83																
		CI Anteil in %	[18,30; 18,86]	[18,59; 19,19]	[18,55; 19,18]	[18,50; 19,15]																
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2391	2104	1870	1698																
Anteil in %		3,26	3,22	3,14	3,07																	
CI Anteil in %		[3,14; 3,39]	[3,08; 3,35]	[3,00; 3,28]	[2,93; 3,21]																	
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	5063	4921	4685	4523																	
	Anteil in %	6,91	7,53	7,86	8,18																	
	CI Anteil in %	[6,73; 7,09]	[7,32; 7,73]	[7,64; 8,07]	[7,95; 8,41]																	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6293	6029	5722	5455																	
	Anteil in %	8,59	9,22	9,60	9,86																	
	CI Anteil in %	[8,39; 8,79]	[9,00; 9,44]	[9,36; 9,83]	[9,62; 10,11]																	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	66585	60521																		
	auswertbar	Anzahl	73993	64806	58474																		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	23754	19790	17417																		
		Anteil in %	32,10	30,54	29,79																		
		CI Anteil in %	[31,77; 32,44]	[30,18; 30,89]	[29,42; 30,16]																		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6712	5697	4897																		
		Anteil in %	9,07	8,79	8,37																		
		CI Anteil in %	[8,86; 9,28]	[8,57; 9,01]	[8,15; 8,60]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	880	733	628																		
		Anteil in %	1,19	1,13	1,07																		
		CI Anteil in %	[1,11; 1,27]	[1,05; 1,21]	[0,99; 1,16]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	694	562	496																		
		Anteil in %	0,94	0,87	0,85																		
		CI Anteil in %	[0,87; 1,01]	[0,80; 0,94]	[0,77; 0,92]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8722	8147	7349																		
		Anteil in %	11,79	12,57	12,57																		
		CI Anteil in %	[11,56; 12,02]	[12,32; 12,83]	[12,30; 12,84]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13607	11886	10761																		
		Anteil in %	18,39	18,34	18,40																		
		CI Anteil in %	[18,11; 18,67]	[18,04; 18,64]	[18,09; 18,72]																		
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2512	2122	1872																			
	Anteil in %	3,39	3,27	3,20																			
	CI Anteil in %	[3,26; 3,53]	[3,14; 3,41]	[3,06; 3,34]																			
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	6153	5913	5646																			
	Anteil in %	8,32	9,12	9,66																			
	CI Anteil in %	[8,12; 8,51]	[8,90; 9,35]	[9,42; 9,89]																			
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6575	6190	5937																			
	Anteil in %	8,89	9,55	10,15																			
	CI Anteil in %	[8,68; 9,09]	[9,33; 9,78]	[9,91; 10,40]																			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	72558	66610															
	auswertbar	Anzahl	79353	70781	64503															
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	29007	24736	22265															
		Anteil in %	36,55	34,95	34,52															
		CI Anteil in %	[36,22; 36,89]	[34,60; 35,30]	[34,15; 34,88]															
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6725	5806	5022															
		Anteil in %	8,47	8,20	7,79															
		CI Anteil in %	[8,28; 8,67]	[8,00; 8,40]	[7,58; 7,99]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	920	794	679															
		Anteil in %	1,16	1,12	1,05															
		CI Anteil in %	[1,08; 1,23]	[1,04; 1,20]	[0,97; 1,13]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	887	713	624															
		Anteil in %	1,12	1,01	0,97															
		CI Anteil in %	[1,04; 1,19]	[0,93; 1,08]	[0,89; 1,04]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7714	7498	6990															
		Anteil in %	9,72	10,59	10,84															
		CI Anteil in %	[9,51; 9,93]	[10,37; 10,82]	[10,60; 11,08]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	15133	13547	12394															
		Anteil in %	19,07	19,14	19,21															
		CI Anteil in %	[18,80; 19,34]	[18,85; 19,43]	[18,91; 19,52]															
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Metformin)	Anzahl	2355	2021	1837															
		Anteil in %	2,97	2,86	2,85															
		CI Anteil in %	[2,85; 3,09]	[2,73; 2,98]	[2,72; 2,98]															
	Kombination aus einem „vorrangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	5211	5108	4833															
		Anteil in %	6,57	7,22	7,49															
		CI Anteil in %	[6,39; 6,74]	[7,03; 7,41]	[7,29; 7,70]															
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6607	6339	5915															
		Anteil in %	8,33	8,96	9,17															
		CI Anteil in %	[8,13; 8,52]	[8,75; 9,17]	[8,95; 9,39]															

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67230	60721																		
	auswertbar	Anzahl	67081	58915																		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	21037	17372																		
		Anteil in %	31,36	29,49																		
		CI Anteil in %	[31,01; 31,71]	[29,12; 29,85]																		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6232	5267																		
		Anteil in %	9,29	8,94																		
		CI Anteil in %	[9,07; 9,51]	[8,71; 9,17]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	714	587																		
		Anteil in %	1,06	1,00																		
		CI Anteil in %	[0,99; 1,14]	[0,92; 1,08]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	549	429																		
		Anteil in %	0,82	0,73																		
		CI Anteil in %	[0,75; 0,89]	[0,66; 0,80]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7869	7227																		
		Anteil in %	11,73	12,27																		
		CI Anteil in %	[11,49; 11,97]	[12,00; 12,53]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	12295	10792																		
		Anteil in %	18,33	18,32																		
		CI Anteil in %	[18,04; 18,62]	[18,01; 18,63]																		
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2251	1975																			
	Anteil in %	3,36	3,35																			
	CI Anteil in %	[3,22; 3,49]	[3,21; 3,50]																			
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	5670	5419																			
	Anteil in %	8,45	9,20																			
	CI Anteil in %	[8,24; 8,66]	[8,96; 9,43]																			
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6590	6343																			
	Anteil in %	9,82	10,77																			
	CI Anteil in %	[9,60; 10,05]	[10,52; 11,02]																			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465	66497																
	auswertbar	Anzahl	72274	64576																
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	26016	22246																
		Anteil in %	36,00	34,45																
		CI Anteil in %	[35,65; 36,35]	[34,08; 34,82]																
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6261	5348																
		Anteil in %	8,66	8,28																
		CI Anteil in %	[8,46; 8,87]	[8,07; 8,49]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	724	579																
		Anteil in %	1,00	0,90																
		CI Anteil in %	[0,93; 1,07]	[0,82; 0,97]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	760	669																
		Anteil in %	1,05	1,04																
		CI Anteil in %	[0,98; 1,13]	[0,96; 1,11]																
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7104	6797																
		Anteil in %	9,83	10,53																
		CI Anteil in %	[9,61; 10,05]	[10,29; 10,76]																
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	13849	12389																
		Anteil in %	19,16	19,19																
		CI Anteil in %	[18,87; 19,45]	[18,88; 19,49]																
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Metformin)	Anzahl	2044	1836																
		Anteil in %	2,83	2,84																
		CI Anteil in %	[2,71; 2,95]	[2,71; 2,97]																
	Kombination aus einem „vorrangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	4814	4679																
		Anteil in %	6,66	7,25																
		CI Anteil in %	[6,48; 6,84]	[7,05; 7,45]																
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6420	6225																
		Anteil in %	8,88	9,64																
		CI Anteil in %	[8,68; 9,09]	[9,41; 9,87]																

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714																			
	auswertbar	Anzahl	74564																			
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	24253																			
		Anteil in %	32,53																			
		CI Anteil in %	[32,19; 32,86]																			
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6456																			
		Anteil in %	8,66																			
		CI Anteil in %	[8,46; 8,86]																			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	699																			
		Anteil in %	0,94																			
		CI Anteil in %	[0,87; 1,01]																			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	597																			
		Anteil in %	0,80																			
		CI Anteil in %	[0,74; 0,86]																			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	8684																			
		Anteil in %	11,65																			
		CI Anteil in %	[11,42; 11,88]																			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	14054																			
Anteil in %		18,85																				
	CI Anteil in %	[18,57; 19,13]																				
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	2239																				
	Anteil in %	3,00																				
	CI Anteil in %	[2,88; 3,13]																				
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	6315																				
	Anteil in %	8,47																				
	CI Anteil in %	[8,27; 8,67]																				
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	7000																				
	Anteil in %	9,39																				
	CI Anteil in %	[9,18; 9,60]																				

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879																		
	auswertbar	Anzahl	77670																		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	28605																		
		Anteil in %	36,83																		
		CI Anteil in %	[36,49; 37,17]																		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	6406																		
		Anteil in %	8,25																		
		CI Anteil in %	[8,05; 8,44]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	682																		
		Anteil in %	0,88																		
		CI Anteil in %	[0,81; 0,94]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	768																		
		Anteil in %	0,99																		
		CI Anteil in %	[0,92; 1,06]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	7629																		
		Anteil in %	9,82																		
		CI Anteil in %	[9,61; 10,03]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	15022																		
		Anteil in %	19,34																		
		CI Anteil in %	[19,06; 19,62]																		
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	1977																		
		Anteil in %	2,55																		
		CI Anteil in %	[2,43; 2,66]																		
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	5266																		
		Anteil in %	6,78																		
		CI Anteil in %	[6,60; 6,96]																		
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	6958																		
		Anteil in %	8,96																		
		CI Anteil in %	[8,76; 9,16]																		

3.4 Prozessparameter

Zur Erhöhung der Lebensqualität der Patienten sowie zur Erhaltung ihrer Autonomie ist eine Schulung über die Ursachen, Auswirkungen und Therapiemodalitäten eines Diabetes mellitus empfehlenswert. Zum einen, weil hierdurch oftmals bei den Diabetikern dauerhafte Verhaltens- und Verhältnisänderungen in den Bereichen Ernährung und Bewegung eingeleitet werden können, die positive Effekte auf den Krankheitsverlauf ausüben. Zum anderen aber auch, weil vor allem bei der Insulintherapie eine kontinuierliche Kontrolle der verzehrten Lebensmittel (Broteinheiten) sowie der zu injizierenden Insulinmenge durch wiederholte Blutzuckerselbstmessungen erfolgen muss. Hierzu ist ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit der Betroffenen erforderlich, welches u.a. in den Schulungen intensiv erlernt wird.

Gefürchtete Langzeitkomplikationen des Diabetes bestehen in der Schädigung von kleinen Gefäßen (sog. Mikroangiopathien). Betroffen sind grundsätzlich alle Gefäße, besonders gravierend sind jedoch Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retina) des Auges mit der Gefahr der Erblindung, der Nieren mit der Gefahr des Nierenversagens sowie des Herzens mit der Gefahr des Herzinfarktes.

In der Tabelle 3.4.1 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlenen Diabetes-Schulung** teilgenommen haben, aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten*- also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zu beachten ist bei dieser Auswertung, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Schulungsdaten aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeilen „Schulung wahrgenommen“, „Schulung aktuell nicht möglich“ und „Schulung nicht wahrgenommen“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit über die Berichtshalbjahre gegeben.⁴

Zunächst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar)“ die auswertbaren Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Diabeteserschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Diabeteserschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

⁴ Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung, d.h. Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1, ist auszuweisen, ob eine Schulung durchgeführt wurde oder aus plausiblen Grund aktuell nicht möglich war oder aus plausiblen Grund nicht wahrgenommen wurde ("Compliance") oder ob sie ohne Begründung abgelehnt wurde. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren veranlasste und nicht erforderliche Schulungen. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung, d.h. ab dem Berichtshalbjahr 2004-2, ist auszuweisen, ob eine empfohlene Schulung wahrgenommen wurde oder die Wahrnehmung aktuell nicht möglich war ("Compliance") oder ob keine Teilnahme an der Schulung erfolgte. Eine weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeit war, dass bei der letzten Dokumentation keine Schulung empfohlen wurde.

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2005-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	33436	16435	11008	8496	7293	6693	8834	7344	6278	5759	5411	5226	4663	4518					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	18306	8068	5367	4336	3726	3461	3671	3145	2825	2732	2605	2600	2315	2225					
		Anteil in %	54,75	49,09	48,76	51,04	51,09	51,71	41,56	42,82	45,00	47,44	48,14	49,75	49,65	49,25					
		CI Anteil in %	[54,22; 55,28]	[48,33; 49,85]	[47,82; 49,69]	[49,97; 52,10]	[49,94; 52,24]	[50,51; 52,91]	[40,53; 42,58]	[41,69; 43,96]	[43,77; 46,23]	[46,15; 48,73]	[46,81; 49,47]	[48,40; 51,11]	[48,21; 51,08]	[47,79; 50,71]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	8274	4208	2732	1952	1561	1374	1824	1787	1521	1379	1315	1274	1170	1185					
		Anteil in %	24,75	25,60	24,82	22,98	21,40	20,53	20,65	24,33	24,23	23,95	24,30	24,38	25,09	26,23					
		CI Anteil in %	[24,28; 25,21]	[24,94; 26,27]	[24,01; 25,63]	[22,08; 23,87]	[20,46; 22,35]	[19,56; 21,50]	[19,80; 21,49]	[23,35; 25,31]	[23,17; 25,29]	[22,84; 25,05]	[23,16; 25,45]	[23,21; 25,54]	[23,85; 26,34]	[24,95; 27,51]					
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	6856	4159	2909	2208	2006	1858	3339	2412	1932	1648	1491	1352	1178	1108					
		Anteil in %	20,50	25,31	26,43	25,99	27,51	27,76	37,80	32,84	30,77	28,62	27,55	25,87	25,26	24,52					
		CI Anteil in %	[20,07; 20,94]	[24,64; 25,97]	[25,60; 27,25]	[25,06; 26,92]	[26,48; 28,53]	[26,69; 28,83]	[36,79; 38,81]	[31,77; 33,92]	[29,63; 31,92]	[27,45; 29,78]	[26,36; 28,75]	[24,68; 27,06]	[24,02; 26,51]	[23,27; 25,78]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>105631</i>	<i>93726</i>	<i>83366</i>	<i>74241</i>	<i>68487</i>	<i>64764</i>	<i>61675</i>	<i>58977</i>	<i>56190</i>	<i>53398</i>	<i>50980</i>	<i>48671</i>	<i>46510</i>	<i>44483</i>	<i>42590</i>				
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	38560	19270	13063	10148	8876	7806	10751	8694	7526	6784	6446	6065	5573	5274					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	20595	9411	6290	4982	4480	3910	4343	3478	3298	3116	3059	2908	2672	2581					
		Anteil in %	53,41	48,84	48,15	49,09	50,47	50,09	40,40	40,00	43,82	45,93	47,46	47,95	47,95	48,94					
		CI Anteil in %	[52,91; 53,91]	[48,13; 49,54]	[47,29; 49,01]	[48,12; 50,07]	[49,43; 51,51]	[48,98; 51,20]	[39,47; 41,32]	[38,97; 41,03]	[42,70; 44,94]	[44,75; 47,12]	[46,24; 48,67]	[46,69; 49,20]	[46,63; 49,26]	[47,59; 50,29]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	9916	4970	3352	2417	1881	1594	2364	2258	1935	1784	1636	1597	1468	1421					
		Anteil in %	25,72	25,79	25,66	23,82	21,19	20,42	21,99	25,97	25,71	26,30	25,38	26,33	26,34	26,94					
CI Anteil in %		[25,28; 26,15]	[25,17; 26,41]	[24,91; 26,41]	[22,99; 24,65]	[20,34; 22,04]	[19,53; 21,31]	[21,21; 22,77]	[25,05; 26,89]	[24,72; 27,34]	[25,25; 27,34]	[24,32; 26,44]	[25,22; 27,44]	[25,18; 27,50]	[25,75; 28,14]						
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	8049	4889	3421	2749	2515	2302	4044	2958	2293	1884	1751	1560	1433	1272						
	Anteil in %	20,87	25,37	26,19	27,09	28,33	29,49	37,62	34,02	30,47	27,77	27,16	25,72	25,71	24,12						
	CI Anteil in %	[20,47; 21,28]	[24,76; 25,99]	[25,43; 26,94]	[26,22; 27,95]	[27,40; 29,27]	[28,48; 30,50]	[36,70; 38,53]	[33,03; 35,02]	[29,43; 31,51]	[26,71; 28,84]	[26,08; 28,25]	[24,62; 26,82]	[24,57; 26,86]	[22,96; 25,27]						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>123470</i>	<i>110813</i>	<i>99471</i>	<i>89253</i>	<i>82572</i>	<i>78403</i>	<i>74799</i>	<i>71559</i>	<i>68310</i>	<i>64988</i>	<i>62073</i>	<i>59313</i>	<i>56688</i>	<i>54194</i>	<i>51856</i>					
2005-2	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	24344	11886	8402	6936	6058	8307	6584	5771	5296	5019	4680	4320	4159						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	13704	5772	4110	3461	3041	3373	2714	2507	2397	2308	2162	2071	2023						
		Anteil in %	56,29	48,56	48,92	49,90	50,20	40,60	41,22	43,44	45,26	45,99	46,20	47,94	48,64						
		CI Anteil in %	[55,67; 56,92]	[47,66; 49,46]	[47,85; 49,99]	[48,72; 51,08]	[48,94; 51,46]	[39,55; 41,66]	[40,03; 42,41]	[42,16; 44,72]	[43,92; 46,60]	[44,61; 47,36]	[44,77; 47,63]	[46,45; 49,43]	[47,12; 50,16]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5702	3032	2150	1690	1424	1931	1778	1580	1456	1369	1334	1189	1139						
		Anteil in %	23,42	25,51	25,59	24,37	23,51	23,25	27,00	27,38	27,49	27,28	28,50	27,52	27,39						
		CI Anteil in %	[22,89; 23,95]	[24,73; 26,29]	[24,66; 26,52]	[23,36; 25,38]	[22,44; 24,57]	[22,34; 24,15]	[25,93; 28,08]	[26,23; 28,53]	[26,29; 28,70]	[26,04; 28,51]	[27,21; 29,80]	[26,19; 28,86]	[26,03; 28,74]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4938	3082	2142	1785	1593	3003	2092	1684	1443	1342	1184	1060	997						
		Anteil in %	20,28	25,93	25,49	25,74	26,30	36,15	31,77	29,18	27,25	26,74	25,30	24,54	23,97						
		CI Anteil in %	[19,78; 20,79]	[25,14; 26,72]	[24,56; 26,43]	[24,71; 26,76]	[25,19; 27,40]	[35,12; 37,18]	[30,65; 32,90]	[28,01; 30,35]	[26,05; 28,45]	[25,51; 27,96]	[24,05; 26,54]	[23,25; 25,82]	[22,67; 25,27]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>82253</i>	<i>73718</i>	<i>65422</i>	<i>59436</i>	<i>55776</i>	<i>52856</i>	<i>50253</i>	<i>47742</i>	<i>45177</i>	<i>42958</i>	<i>40893</i>	<i>39008</i>	<i>37209</i>	<i>35545</i>					
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	27951	13779	10044	8255	7213	9927	7763	6770	6313	6022	5608	5223	4917						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	15667	6723	4921	4133	3552	3940	3141	2845	2717	2703	2569	2433	2296						
		Anteil in %	56,05	48,79	48,99	50,07	49,24	39,69	40,46	42,02	43,04	44,89	45,81	46,58	46,70						
		CI Anteil in %	[55,47; 56,63]	[47,96; 49,63]	[48,02; 49,97]	[48,99; 51,15]	[48,09; 50,40]	[38,73; 40,65]	[39,37; 41,55]	[40,85; 43,20]	[41,82; 44,26]	[43,63; 46,14]	[44,51; 47,11]	[45,23; 47,94]	[45,30; 48,09]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	6569	3474	2517	1959	1688	2366	2128	1917	1829	1695	1590	1485	1421						
		Anteil in %	23,50	25,21	25,06	23,73	23,40	23,83	27,41	28,32	28,97	28,15	28,35	28,43	28,90						
CI Anteil in %		[23,00; 24,00]	[24,49; 25,94]	[24,21; 25,91]	[22,81; 24,65]	[22,43; 24,38]	[23,00; 24,67]	[26,42; 28,40]	[27,24; 29,39]	[27,85; 30,09]	[27,01; 29,28]	[27,17; 29,53]	[27,21; 29,66]	[27,63; 30,17]							
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	5715	3582	2606	2163	1973	3621	2494	2008	1767	1624	1449	1305	1200							
	Anteil in %	20,45	26,00	25,95	26,20	27,35	36,48	32,13	29,66	27,99	26,97	25,84	24,99	24,41							
	CI Anteil in %	[19,97; 20,92]	[25,26; 26,73]	[25,09; 26,80]	[25,25; 27,15]	[26,32; 28,38]	[35,53; 37,42]	[31,09; 33,17]	[28,57; 30,75]	[26,88; 29,10]	[25,85; 28,09]	[24,69; 26,98]	[23,81; 26,16]	[23,20; 25,61]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>95017</i>	<i>86040</i>	<i>76949</i>	<i>70289</i>	<i>66335</i>	<i>62988</i>	<i>60040</i>	<i>57162</i>	<i>54131</i>	<i>51560</i>	<i>49016</i>	<i>46705</i>	<i>44599</i>	<i>42683</i>						

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	25442	12694	9639	8119	10853	8840	7545	7116	6747	6388	5640	5435							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	14747	6600	4941	4187	4433	3804	3359	3340	3244	3116	2774	2764							
		Anteil in %	57,96	51,99	51,26	51,57	40,85	43,03	44,52	46,94	48,08	48,78	49,18	50,86							
		CI Anteil in %	[57,36; 58,57]	[51,12; 52,86]	[50,26; 52,26]	[50,48; 52,66]	[39,92; 41,77]	[42,00; 44,06]	[43,40; 45,64]	[45,78; 48,10]	[46,89; 49,27]	[47,55; 50,00]	[47,88; 50,49]	[49,53; 52,18]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5943	3147	2328	1846	2440	2256	2019	1828	1748	1705	1502	1419							
		Anteil in %	23,36	24,79	24,15	22,74	22,48	25,52	26,76	25,69	25,91	26,69	26,63	26,11							
		CI Anteil in %	[22,84; 23,88]	[24,04; 25,54]	[23,30; 25,01]	[21,83; 23,65]	[21,70; 23,27]	[24,61; 26,43]	[25,76; 27,76]	[24,67; 26,70]	[24,86; 26,95]	[25,61; 27,78]	[25,48; 27,78]	[24,94; 27,28]							
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4752	2947	2370	2086	3980	2167	1948	1755	1567	1364	1252								
		Anteil in %	18,68	23,22	24,59	25,69	36,67	31,45	28,72	27,37	26,01	24,53	24,18	23,04							
		CI Anteil in %	[18,20; 19,16]	[22,48; 23,95]	[23,73; 25,45]	[24,74; 26,64]	[35,77; 37,58]	[30,48; 32,42]	[27,70; 29,74]	[26,34; 28,41]	[24,96; 27,06]	[23,48; 25,59]	[23,07; 25,30]	[21,92; 24,16]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98603</i>	<i>88202</i>	<i>79739</i>	<i>73830</i>	<i>69513</i>	<i>65875</i>	<i>62516</i>	<i>58915</i>	<i>55879</i>	<i>53125</i>	<i>50627</i>	<i>48227</i>	<i>46133</i>						
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	28570	14343	11106	9428	12797	10236	8946	7991	7712	7315	6732	6364							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	16414	7315	5626	4763	5145	4185	3814	3542	3602	3402	3212	3084							
		Anteil in %	57,45	51,00	50,66	50,52	40,20	40,89	42,63	44,32	46,71	46,51	47,71	48,46							
		CI Anteil in %	[56,88; 58,03]	[50,18; 51,82]	[49,73; 51,59]	[49,51; 51,53]	[39,36; 41,05]	[39,93; 41,84]	[41,61; 43,66]	[43,24; 45,41]	[45,59; 47,82]	[45,36; 47,65]	[46,52; 48,91]	[47,23; 49,69]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	6788	3651	2724	2195	2937	2711	2428	2193	2100	2043	1853	1766							
		Anteil in %	23,76	25,45	24,53	23,28	22,95	26,48	27,14	27,44	27,23	27,93	27,53	27,75							
		CI Anteil in %	[23,27; 24,25]	[24,74; 26,17]	[23,73; 25,33]	[22,43; 24,13]	[22,22; 23,68]	[25,63; 27,34]	[26,22; 28,06]	[26,46; 28,42]	[26,24; 28,96]	[26,90; 28,96]	[26,46; 28,59]	[26,65; 28,85]							
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	5368	3377	2756	2470	4715	3340	2704	2256	2010	1870	1667	1514								
	Anteil in %	18,79	23,54	24,82	26,20	36,84	32,63	30,23	28,23	26,06	25,56	24,76	23,79								
	CI Anteil in %	[18,34; 19,24]	[22,85; 24,24]	[24,01; 25,62]	[25,31; 27,09]	[36,01; 37,68]	[31,72; 33,54]	[29,27; 31,18]	[27,24; 29,22]	[25,08; 27,04]	[24,56; 26,56]	[23,73; 25,79]	[22,74; 24,84]								
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112511</i>	<i>101744</i>	<i>92563</i>	<i>86309</i>	<i>81576</i>	<i>77574</i>	<i>73783</i>	<i>69703</i>	<i>66080</i>	<i>62828</i>	<i>59695</i>	<i>56874</i>	<i>54383</i>							
2006-2	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	22694	11990	9270	11774	9529	8005	7223	6542	6140	5735	5396								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	13019	6080	4499	4609	3801	3343	3197	3011	2831	2708	2565								
		Anteil in %	57,37	50,71	48,53	39,15	39,89	41,76	44,26	46,03	46,11	47,22	47,54								
		CI Anteil in %	[56,72; 58,01]	[49,81; 51,60]	[47,52; 49,55]	[38,26; 40,03]	[38,91; 40,87]	[40,68; 42,84]	[43,12; 45,41]	[44,82; 47,23]	[44,86; 47,35]	[45,93; 48,51]	[46,20; 48,87]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5191	2941	2265	2745	2536	2222	1967	1733	1647	1511	1464								
		Anteil in %	22,87	24,53	24,43	23,31	26,61	27,76	27,23	26,49	26,82	26,35	27,13								
		CI Anteil in %	[22,33; 23,42]	[23,76; 25,30]	[23,56; 25,31]	[22,55; 24,08]	[25,73; 27,50]	[26,78; 28,74]	[26,21; 28,26]	[25,42; 27,56]	[25,72; 27,93]	[25,21; 27,49]	[25,94; 28,32]								
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4484	2969	2506	4420	3192	2440	2059	1798	1662	1516	1367								
		Anteil in %	19,76	24,76	27,03	37,54	33,50	30,48	28,51	27,48	27,07	26,43	25,33								
		CI Anteil in %	[19,24; 20,28]	[23,99; 25,53]	[26,13; 27,94]	[36,67; 38,42]	[32,55; 34,45]	[29,47; 31,49]	[27,46; 29,55]	[26,40; 28,57]	[25,96; 28,18]	[25,29; 27,58]	[24,17; 26,49]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>94020</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>							
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	25255	13385	10210	13614	10935	9323	8387	7763	7261	6655	6269								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	14302	6738	4942	5179	4276	3945	3630	3405	3199	2966	2748								
		Anteil in %	56,63	50,34	48,40	38,04	39,10	42,31	43,28	43,86	44,06	44,57	43,83								
		CI Anteil in %	[56,02; 57,24]	[49,49; 51,19]	[47,43; 49,37]	[37,23; 38,86]	[38,19; 40,02]	[41,31; 43,32]	[42,22; 44,34]	[42,76; 44,97]	[42,92; 45,20]	[43,37; 45,76]	[42,61; 45,06]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5938	3356	2498	3210	3006	2584	2316	2212	2096	1936	1913								
		Anteil in %	23,51	25,07	24,47	23,58	27,49	27,72	27,61	28,49	28,87	29,09	30,52								
		CI Anteil in %	[22,99; 24,04]	[24,34; 25,81]	[23,63; 25,30]	[22,87; 24,29]	[26,65; 28,33]	[26,81; 28,63]	[26,66; 28,57]	[27,49; 29,50]	[27,82; 29,91]	[28,00; 30,18]	[29,38; 31,66]								
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	5015	3291	2770	5225	3653	2794	2441	2146	1966	1753	1608									
	Anteil in %	19,86	24,59	27,13	38,38	33,41	29,97	29,10	27,64	27,08	26,34	25,65									
	CI Anteil in %	[19,37; 20,35]	[23,86; 25,32]	[26,27; 27,99]	[37,56; 39,20]	[32,52; 34,29]	[29,04; 30,90]	[28,13; 30,08]	[26,65; 28,64]	[26,05; 28,10]	[25,28; 27,40]	[24,57; 26,73]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>106368</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>								

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2007-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	23344	12120	13788	10955	9192	8188	7608	7008	6480	6078									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	13534	6008	5339	4325	3757	3475	3475	3359	3138	2862	2736								
		Anteil in %	57,98	49,57	38,72	39,48	40,87	42,44	44,15	44,78	44,17	45,01	45,01								
		CI Anteil in %	[57,34; 58,61]	[48,68; 50,46]	[37,91; 39,54]	[38,56; 40,40]	[39,87; 41,88]	[41,37; 43,51]	[43,03; 45,27]	[43,61; 45,94]	[42,96; 45,38]	[43,76; 46,27]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5209	2867	3200	2872	2541	2243	2082	1955	1781	1709	1709								
		Anteil in %	22,31	23,66	23,21	26,22	27,64	27,39	27,37	27,37	27,90	27,48	28,12								
		CI Anteil in %	[21,78; 22,85]	[22,90; 24,41]	[22,50; 23,91]	[25,39; 27,04]	[26,73; 28,56]	[26,43; 28,36]	[26,36; 28,37]	[26,85; 28,95]	[26,40; 28,57]	[26,99; 29,25]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4601	3245	5249	3758	2894	2470	2167	1915	1837	1633	1633								
		Anteil in %	19,71	26,77	38,07	34,30	31,48	30,17	28,48	27,33	28,35	28,35	26,87								
		CI Anteil in %	[19,20; 20,22]	[25,99; 27,56]	[37,26; 38,88]	[33,41; 35,19]	[30,53; 32,43]	[29,17; 31,16]	[27,47; 29,50]	[26,28; 28,37]	[27,25; 29,45]	[25,75; 27,98]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>								
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	25694	13556	15684	12164	10380	9388	8706	8055	7323	6948	6948								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	14514	6544	5983	4700	4292	3887	3800	3508	3231	3088	3088								
		Anteil in %	56,49	48,27	38,15	38,64	41,35	41,40	43,65	43,55	44,12	44,44	44,44								
		CI Anteil in %	[55,88; 57,09]	[47,43; 49,12]	[37,39; 38,91]	[37,77; 39,50]	[40,40; 42,30]	[40,41; 42,40]	[42,61; 44,69]	[42,47; 44,63]	[42,98; 45,26]	[43,28; 45,61]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5908	3307	3779	3273	2826	2632	2414	2267	2032	1967	1967								
		Anteil in %	22,99	24,40	24,09	26,91	27,23	28,04	27,73	28,14	27,75	28,31	28,31								
CI Anteil in %		[22,48; 23,51]	[23,67; 25,12]	[23,43; 24,76]	[26,12; 27,70]	[26,37; 28,08]	[27,13; 28,94]	[26,79; 28,67]	[27,16; 29,13]	[26,72; 28,77]	[27,25; 29,37]										
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	5272	3705	5922	4191	3262	2869	2492	2280	2060	1893	1893									
	Anteil in %	20,52	27,33	37,76	34,45	31,43	30,56	28,62	28,31	28,13	27,25	27,25									
	CI Anteil in %	[20,02; 21,01]	[26,58; 28,08]	[37,00; 38,52]	[33,61; 35,30]	[30,53; 32,32]	[29,63; 31,49]	[27,67; 29,57]	[27,32; 29,29]	[27,10; 29,16]	[26,20; 28,29]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>									
2007-2	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	20569	14984	11323	9386	8462	7725	7165	6543	6045	6045									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	11868	6001	4427	3834	3611	3435	3200	2889	2760	2760									
		Anteil in %	57,70	40,05	39,10	40,85	42,67	44,47	44,66	44,15	45,66	45,66									
		CI Anteil in %	[57,02; 58,37]	[39,26; 40,83]	[38,20; 40,00]	[39,85; 41,84]	[41,62; 43,73]	[43,36; 45,57]	[43,51; 45,81]	[42,95; 45,36]	[44,40; 46,91]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4564	3710	3066	2608	2325	2122	1971	1829	1703	1703									
		Anteil in %	22,19	24,76	27,08	27,79	27,48	27,47	27,51	27,95	28,17	28,17									
		CI Anteil in %	[21,62; 22,76]	[24,07; 25,45]	[26,26; 27,90]	[26,88; 28,69]	[26,52; 28,43]	[26,47; 28,46]	[26,47; 28,54]	[26,87; 29,04]	[27,04; 29,31]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4137	5273	3830	2944	2526	2168	1994	1825	1582	1582									
		Anteil in %	20,11	35,19	33,82	31,37	29,85	28,06	27,83	27,89	26,17	26,17									
		CI Anteil in %	[19,56; 20,66]	[34,43; 35,96]	[32,95; 34,70]	[30,43; 32,30]	[28,88; 30,83]	[27,06; 29,07]	[26,79; 28,87]	[26,81; 28,98]	[25,06; 27,28]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>									
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	22673	16777	12810	10678	9467	8731	8164	7393	6862	6862	6862								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	12765	6606	4913	4234	3892	3789	3529	3248	3028	3028									
		Anteil in %	56,30	39,38	38,35	39,65	41,11	43,40	43,23	43,93	44,13	44,13									
		CI Anteil in %	[55,65; 56,95]	[38,64; 40,11]	[37,51; 39,19]	[38,72; 40,58]	[40,12; 42,10]	[42,36; 44,44]	[42,15; 44,30]	[42,80; 45,06]	[42,95; 45,30]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5086	4182	3566	3057	2700	2433	2281	2032	1965	1965									
		Anteil in %	22,43	24,93	27,84	28,63	28,52	27,87	27,94	27,94	28,64	28,64									
CI Anteil in %		[21,89; 22,97]	[24,27; 25,58]	[27,06; 28,61]	[27,77; 29,49]	[27,61; 29,43]	[26,93; 28,81]	[26,97; 28,91]	[26,47; 28,50]	[27,57; 29,71]											
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4822	5989	4331	3387	2875	2509	2354	2113	1869	1869										
	Anteil in %	21,27	35,70	33,81	31,72	30,37	28,74	28,83	28,58	27,24	27,24										
	CI Anteil in %	[20,73; 21,80]	[34,97; 36,42]	[32,99; 34,63]	[30,84; 32,60]	[29,44; 31,30]	[27,79; 29,69]	[27,85; 29,82]	[27,55; 29,61]	[26,18; 28,29]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>										

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2008-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	26648	14738	11437	9834	8944	8092	7388	6986											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	13158	6050	4774	4253	4014	3645	3361	3261											
		Anteil in %	49,38	41,05	41,74	43,25	44,88	45,04	45,49	46,68											
		CI Anteil in %	[48,78; 49,98]	[40,26; 41,84]	[40,84; 42,65]	[42,27; 44,23]	[43,85; 45,91]	[43,96; 46,13]	[44,36; 46,63]	[45,51; 47,85]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	6248	4084	3275	2707	2389	2162	1986	1875											
		Anteil in %	23,45	27,71	28,64	27,53	26,71	26,72	26,88	26,84											
		CI Anteil in %	[22,94; 23,96]	[26,99; 28,43]	[27,81; 29,46]	[26,64; 28,41]	[25,79; 27,63]	[25,75; 27,68]	[25,87; 27,89]	[25,80; 27,88]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	7242	4604	3388	2874	2541	2285	2041	1850											
		Anteil in %	27,18	31,24	29,62	29,23	28,41	28,24	27,63	26,48											
		CI Anteil in %	[26,64; 27,71]	[30,49; 31,99]	[28,79; 30,46]	[28,33; 30,12]	[27,48; 29,34]	[27,26; 29,22]	[26,61; 28,65]	[25,45; 27,52]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>										
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	29234	16334	12771	10947	9993	9229	8435	7835											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	14191	6448	5180	4574	4331	4041	3673	3450											
		Anteil in %	48,54	39,48	40,56	41,78	43,34	43,79	43,54	44,03											
		CI Anteil in %	[47,97; 49,12]	[38,73; 40,23]	[39,71; 41,41]	[40,86; 42,71]	[42,37; 44,31]	[42,77; 44,80]	[42,49; 44,60]	[42,93; 45,13]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	6892	4664	3717	3158	2798	2540	2359	2241											
		Anteil in %	23,58	28,55	29,11	28,85	28,00	27,52	27,97	28,60											
CI Anteil in %		[23,09; 24,06]	[27,86; 29,25]	[28,32; 29,89]	[28,00; 29,70]	[27,12; 28,88]	[26,61; 28,43]	[27,01; 28,92]	[27,60; 29,60]												
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	8151	5222	3874	3215	2864	2648	2403	2144												
	Anteil in %	27,88	31,97	30,33	29,37	28,66	28,69	28,49	27,36												
	CI Anteil in %	[27,37; 28,40]	[31,25; 32,69]	[29,54; 31,13]	[28,52; 30,22]	[27,77; 29,55]	[27,77; 29,62]	[27,53; 29,45]	[26,38; 28,35]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>											
2008-2	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	16838	9356	7607	6711	6137	5580	5209												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	8067	3910	3181	2890	2703	2418	2319												
		Anteil in %	47,91	41,79	41,82	43,06	44,04	43,33	44,52												
		CI Anteil in %	[47,15; 48,66]	[40,79; 42,79]	[40,71; 42,93]	[41,88; 44,25]	[42,80; 45,29]	[42,03; 44,63]	[43,17; 45,87]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4470	2701	2235	1943	1730	1615	1539												
		Anteil in %	26,55	28,87	29,38	28,95	28,19	28,94	29,55												
		CI Anteil in %	[25,88; 27,21]	[27,95; 29,79]	[28,36; 30,40]	[27,87; 30,04]	[27,06; 29,32]	[27,75; 30,13]	[28,31; 30,78]												
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4301	2745	2191	1878	1704	1547	1351												
		Anteil in %	25,54	29,34	28,80	27,98	27,77	27,72	25,94												
		CI Anteil in %	[24,88; 26,20]	[28,42; 30,26]	[27,78; 29,82]	[26,91; 29,06]	[26,65; 28,89]	[26,55; 28,90]	[24,75; 27,13]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>											
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	18396	10469	8514	7526	6655	6080	5640												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	8649	4288	3558	3191	2881	2612	2386												
		Anteil in %	47,02	40,96	41,79	42,40	43,29	42,96	42,30												
		CI Anteil in %	[46,29; 47,74]	[40,02; 41,90]	[40,74; 42,84]	[41,28; 43,52]	[42,10; 44,48]	[41,72; 44,20]	[41,02; 43,59]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5016	3138	2540	2253	1946	1825	1774												
		Anteil in %	27,27	29,97	29,83	29,94	29,24	30,02	31,45												
CI Anteil in %		[26,62; 27,91]	[29,10; 30,85]	[28,86; 30,81]	[28,90; 30,97]	[28,15; 30,33]	[28,86; 31,17]	[30,24; 32,67]													
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4731	3043	2416	2082	1828	1643	1480													
	Anteil in %	25,72	29,07	28,38	27,66	27,47	27,02	26,24													
	CI Anteil in %	[25,09; 26,35]	[28,20; 29,94]	[27,42; 29,33]	[26,65; 28,67]	[26,40; 28,54]	[25,91; 28,14]	[25,09; 27,39]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>												

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2009-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	17282	9804	8032	7079	6247	5803													
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	8973	4307	3498	3103	2723	2525													
		Anteil in %	51,92	43,93	43,55	43,83	43,59	43,51													
		CI Anteil in %	[51,18; 52,67]	[42,95; 44,91]	[42,47; 44,64]	[42,68; 44,99]	[42,36; 44,82]	[42,24; 44,79]													
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4662	2928	2418	2137	1864	1816													
		Anteil in %	26,98	29,87	30,10	30,19	29,84	31,29													
		CI Anteil in %	[26,31; 27,64]	[28,96; 30,77]	[29,10; 31,11]	[29,12; 31,26]	[28,70; 30,97]	[30,10; 32,49]													
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3647	2569	2116	1839	1660	1462													
		Anteil in %	21,10	26,20	26,34	25,98	26,57	25,19													
		CI Anteil in %	[20,49; 21,71]	[25,33; 27,07]	[25,38; 27,31]	[24,96; 27,00]	[25,48; 27,67]	[24,08; 26,31]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>												
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	18236	10269	8488	7605	6788	6261													
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	9303	4414	3591	3269	2862	2742													
		Anteil in %	51,01	42,98	42,31	42,98	42,16	43,79													
		CI Anteil in %	[50,29; 51,74]	[42,03; 43,94]	[41,26; 43,36]	[41,87; 44,10]	[40,99; 43,34]	[42,57; 45,02]													
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4997	3112	2605	2247	2006	1884													
		Anteil in %	27,40	30,30	30,69	29,55	29,55	30,09													
CI Anteil in %		[26,75; 28,05]	[29,42; 31,19]	[29,71; 31,67]	[28,52; 30,57]	[28,47; 30,64]	[28,95; 31,23]														
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3936	2743	2292	2089	1920	1635														
	Anteil in %	21,58	26,71	27,00	27,47	28,29	26,11														
	CI Anteil in %	[20,99; 22,18]	[25,86; 27,57]	[26,06; 27,95]	[26,47; 28,47]	[27,21; 29,36]	[25,03; 27,20]														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>													
2009-2	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	15053	8662	7210	6297	5795														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	7841	3844	3115	2721	2568														
		Anteil in %	52,09	44,38	43,20	43,21	44,31														
		CI Anteil in %	[51,29; 52,89]	[43,33; 45,42]	[42,06; 44,35]	[41,99; 44,43]	[43,03; 45,59]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3997	2534	2113	1859	1710														
		Anteil in %	26,55	29,25	29,31	29,52	29,51														
		CI Anteil in %	[25,85; 27,26]	[28,30; 30,21]	[28,26; 30,36]	[28,40; 30,65]	[28,33; 30,68]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3215	2284	1982	1717	1517														
		Anteil in %	21,36	26,37	27,49	27,27	26,18														
		CI Anteil in %	[20,70; 22,01]	[25,44; 27,30]	[26,46; 28,52]	[26,17; 28,37]	[25,05; 27,31]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>													
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	16469	9591	8004	7022	6416														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	8518	4139	3365	2923	2713														
		Anteil in %	51,72	43,16	42,04	41,63	42,28														
		CI Anteil in %	[50,96; 52,48]	[42,16; 44,15]	[40,96; 43,12]	[40,47; 42,78]	[41,08; 43,49]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4404	2826	2345	2052	1930														
		Anteil in %	26,74	29,47	29,30	29,22	30,08														
CI Anteil in %		[26,07; 27,42]	[28,55; 30,38]	[28,30; 30,30]	[28,16; 30,29]	[28,96; 31,20]															
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3547	2626	2294	2047	1773															
	Anteil in %	21,54	27,38	28,66	29,15	27,63															
	CI Anteil in %	[20,91; 22,17]	[26,49; 28,27]	[27,67; 29,65]	[28,09; 30,21]	[26,54; 28,73]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>														

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	17689	9973	8124	7300															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	9637	4606	3575	3274															
		Anteil in %		54,48	46,18	44,01	44,85														
		CI Anteil in %		[53,75; 55,21]	[45,21; 47,16]	[42,93; 45,08]	[43,71; 45,99]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4656	2930	2476	2276															
		Anteil in %		26,32	29,38	30,48	31,18														
		CI Anteil in %		[25,67; 26,97]	[28,49; 30,27]	[29,48; 31,48]	[30,12; 32,24]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3396	2437	2073	1750															
		Anteil in %		19,20	24,44	25,52	23,97														
		CI Anteil in %		[18,62; 19,78]	[23,59; 25,28]	[24,57; 26,47]	[22,99; 24,95]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>														
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	18098	10686	8973	7967															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	9701	4807	4023	3539															
		Anteil in %		53,60	44,98	44,83	44,42														
		CI Anteil in %		[52,88; 54,33]	[44,04; 45,93]	[43,81; 45,86]	[43,33; 45,51]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4817	3141	2623	2477															
Anteil in %			26,62	29,39	29,23	31,09															
CI Anteil in %			[25,97; 27,26]	[28,53; 30,26]	[28,29; 30,17]	[30,07; 32,11]															
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3580	2738	2327	1951																
	Anteil in %		19,78	25,62	25,93	24,49															
	CI Anteil in %		[19,20; 20,36]	[24,79; 26,45]	[25,03; 26,84]	[23,54; 25,43]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>															
2010-2	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	15154	8593	7351																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	8167	3919	3345																
		Anteil in %		53,89	45,61	45,50															
		CI Anteil in %		[53,10; 54,69]	[44,55; 46,66]	[44,37; 46,64]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3978	2566	2253																
		Anteil in %		26,25	29,86	30,65															
		CI Anteil in %		[25,55; 26,95]	[28,89; 30,83]	[29,59; 31,70]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3009	2108	1753																
		Anteil in %		19,86	24,53	23,85															
		CI Anteil in %		[19,22; 20,49]	[23,62; 25,44]	[22,87; 24,82]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>															
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	15954	9192	7762																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	8597	4188	3536																
		Anteil in %		53,89	45,56	45,56															
		CI Anteil in %		[53,11; 54,66]	[44,54; 46,58]	[44,45; 46,66]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4169	2677	2376																
Anteil in %			26,13	29,12	30,61																
CI Anteil in %			[25,45; 26,81]	[28,19; 30,05]	[29,59; 31,64]																
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3188	2327	1850																	
	Anteil in %		19,98	25,32	23,83																
	CI Anteil in %		[19,36; 20,60]	[24,43; 26,20]	[22,89; 24,78]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2011-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		16544	9415																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		9108	4384																	
		Anteil in %			55,05	46,56																
		CI Anteil in %			[54,30; 55,81]	[45,56; 47,57]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		4309	2815																	
		Anteil in %			26,05	29,90																
		CI Anteil in %			[25,38; 26,71]	[28,97; 30,82]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		3127	2216																	
		Anteil in %			18,90	23,54																
		CI Anteil in %			[18,30; 19,50]	[22,68; 24,39]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																	
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		17599	10140																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		9589	4700																	
		Anteil in %			54,49	46,35																
		CI Anteil in %			[53,75; 55,22]	[45,38; 47,32]																
Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		4544	3039																		
	Anteil in %			25,82	29,97																	
	CI Anteil in %			[25,17; 26,47]	[29,08; 30,86]																	
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		3466	2401																		
	Anteil in %			19,69	23,68																	
	CI Anteil in %			[19,11; 20,28]	[22,85; 24,51]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																		
2011-2	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		14476																		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		7840																		
		Anteil in %			54,16																	
		CI Anteil in %			[53,35; 54,97]																	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		3837																		
		Anteil in %			26,51																	
		CI Anteil in %			[25,79; 27,22]																	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		2799																		
		Anteil in %			19,34																	
		CI Anteil in %			[18,69; 19,98]																	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																		
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		15548																		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		8404																		
		Anteil in %			54,05																	
		CI Anteil in %			[53,27; 54,84]																	
Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		4161																			
	Anteil in %			26,76																		
	CI Anteil in %			[26,07; 27,46]																		
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		2983																			
	Anteil in %			19,19																		
	CI Anteil in %			[18,57; 19,80]																		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																			

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	männliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl																				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																			
	weibliche Pat. mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl																				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																				
		Anteil in %																				
CI Anteil in %																						
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																					
	Anteil in %																					
	CI Anteil in %																					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																				

In der Tabelle 3.4.2 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlener Hypertonie-Schulung** teilgenommen haben (oder aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten) oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten* - also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zu beachten ist bei dieser Auswertung, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Schulungsdaten aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeilen „Schulung wahrgenommen“, „Schulung aktuell nicht möglich“ und „Schulung nicht wahrgenommen“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit über die Berichtshalbjahre gegeben.⁵

Zunächst werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar)“ die auswertbaren Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Hypertonieschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Hypertonieschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

⁵ Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung, d.h. Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1, ist auszuweisen, ob eine Schulung durchgeführt wurde oder aus plausiblen Grund aktuell nicht möglich war oder aus plausiblen Grund nicht wahrgenommen wurde ("Compliance") oder ob sie ohne Begründung abgelehnt wurde. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren veranlasste und nicht erforderliche Schulungen. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung, d.h. ab dem Berichtshalbjahr 2004-2, ist auszuweisen, ob eine empfohlene Schulung wahrgenommen wurde oder die Wahrnehmung aktuell nicht möglich war ("Compliance") oder ob keine Teilnahme an der Schulung erfolgte. Eine weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeit war, dass bei der letzten Dokumentation keine Schulung empfohlen wurde.

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-1	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	17444	9158	6946	5753	8845	6920	5785	5308	4947	4674	4163	3950						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3678	1907	1543	1314	1622	1509	1337	1337	1293	1212	1123	1121						
		Anteil in %	21,08	20,82	22,21	22,84	18,34	21,81	23,11	25,19	26,14	25,93	26,98	28,38						
		CI Anteil in %	[20,48; 21,69]	[19,99; 21,65]	[21,24; 23,19]	[21,76; 23,93]	[17,53; 19,14]	[20,83; 22,78]	[22,03; 24,20]	[24,02; 26,36]	[24,91; 27,36]	[24,67; 27,19]	[25,63; 28,32]	[26,97; 29,79]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4793	2539	1835	1458	2219	2029	1789	1613	1518	1489	1340	1273						
		Anteil in %	27,48	27,72	26,42	25,34	25,09	29,32	30,92	30,39	30,69	31,86	32,19	32,23						
		CI Anteil in %	[26,81; 28,14]	[26,81; 28,64]	[25,38; 27,46]	[24,22; 26,47]	[24,18; 25,99]	[28,25; 30,39]	[29,73; 32,12]	[29,15; 31,63]	[29,40; 31,97]	[30,52; 33,19]	[30,77; 33,61]	[30,77; 33,69]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	8973	4712	3568	2981	5004	3382	2659	2358	2136	1973	1700	1556						
		Anteil in %	51,44	51,45	51,37	51,82	56,57	48,87	45,96	44,42	43,18	42,21	40,84	39,39						
		CI Anteil in %	[50,70; 52,18]	[50,43; 52,48]	[50,19; 52,54]	[50,53; 53,11]	[55,54; 57,61]	[47,69; 50,05]	[44,68; 47,25]	[43,09; 45,76]	[41,80; 44,56]	[40,80; 43,63]	[39,34; 42,33]	[37,87; 40,92]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98603</i>	<i>88202</i>	<i>79739</i>	<i>73830</i>	<i>69513</i>	<i>65875</i>	<i>62516</i>	<i>58915</i>	<i>55879</i>	<i>53125</i>	<i>50627</i>	<i>48227</i>	<i>46133</i>					
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	19706	10502	8071	6866	10556	8231	7002	6102	5724	5395	4969	4688						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3901	2171	1673	1510	1758	1641	1525	1401	1407	1279	1228	1190						
		Anteil in %	19,80	20,67	20,73	21,99	16,65	19,94	21,78	22,96	24,58	23,71	24,71	25,38						
		CI Anteil in %	[19,24; 20,35]	[19,90; 21,45]	[19,84; 21,61]	[21,01; 22,97]	[15,94; 17,36]	[19,07; 20,80]	[20,81; 22,75]	[21,90; 24,02]	[23,47; 25,70]	[22,57; 24,84]	[23,51; 25,91]	[24,14; 26,63]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5840	2990	2264	1854	2802	2423	2129	1879	1782	1779	1635	1558						
		Anteil in %	29,64	28,47	28,05	27,00	26,54	29,44	30,41	30,79	31,13	32,97	32,90	33,23						
		CI Anteil in %	[29,00; 30,27]	[27,61; 29,33]	[27,07; 29,03]	[25,95; 28,05]	[25,70; 27,39]	[28,45; 30,42]	[29,33; 31,48]	[29,63; 31,95]	[29,93; 32,33]	[31,72; 34,23]	[31,60; 34,21]	[31,89; 34,58]						
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	9965	5341	4134	3502	5996	4167	3348	2822	2535	2337	2106	1940							
	Anteil in %	50,57	50,86	51,22	51,00	56,80	50,63	47,81	46,25	44,29	43,32	42,38	41,38							
	CI Anteil in %	[49,87; 51,27]	[49,90; 51,81]	[50,13; 52,31]	[49,82; 52,19]	[55,86; 57,75]	[49,55; 51,71]	[46,64; 48,99]	[45,00; 47,50]	[43,00; 45,57]	[42,00; 44,64]	[41,01; 43,76]	[39,97; 42,79]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112511</i>	<i>101744</i>	<i>92563</i>	<i>86309</i>	<i>81576</i>	<i>77574</i>	<i>73783</i>	<i>69703</i>	<i>66080</i>	<i>62828</i>	<i>59695</i>	<i>56874</i>	<i>54383</i>						
2006-2	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	14497	8129	6386	9609	7505	6124	5348	4832	4512	4186	3937							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3013	1612	1218	1539	1388	1186	1149	1107	1087	1020	976							
		Anteil in %	20,78	19,83	19,07	16,02	18,49	19,37	21,48	22,91	24,09	24,37	24,79							
		CI Anteil in %	[20,12; 21,44]	[18,96; 20,70]	[18,11; 20,04]	[15,28; 16,75]	[17,62; 19,37]	[18,38; 20,36]	[20,38; 22,59]	[21,72; 24,09]	[22,84; 25,34]	[23,07; 25,67]	[23,44; 26,14]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3759	2114	1687	2529	2254	1971	1723	1535	1432	1345	1303							
		Anteil in %	25,93	26,01	26,42	26,32	30,03	32,18	32,22	31,77	31,74	32,13	33,10							
		CI Anteil in %	[25,22; 26,64]	[25,05; 26,96]	[25,34; 27,50]	[25,44; 27,20]	[29,00; 31,07]	[31,01; 33,36]	[30,97; 33,47]	[30,45; 33,08]	[30,38; 33,10]	[30,72; 33,55]	[31,63; 34,57]							
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	7725	4403	3481	5541	3863	2967	2476	2190	1993	1821	1658							
		Anteil in %	53,29	54,16	54,51	57,66	51,47	48,45	46,30	45,32	44,17	43,50	42,11							
		CI Anteil in %	[52,47; 54,10]	[53,08; 55,25]	[53,29; 55,73]	[56,68; 58,65]	[50,34; 52,60]	[47,20; 49,70]	[44,96; 47,63]	[43,92; 46,73]	[42,72; 45,62]	[42,00; 45,00]	[40,57; 43,66]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>94020</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>						
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	16382	9230	7156	11296	8650	7201	6375	5836	5410	4957	4706							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3258	1732	1371	1754	1543	1404	1311	1267	1216	1142	1081							
		Anteil in %	19,89	18,76	19,16	15,53	17,84	19,50	20,56	21,71	22,48	23,04	22,97							
		CI Anteil in %	[19,28; 20,50]	[17,97; 19,56]	[18,25; 20,07]	[14,86; 16,20]	[17,03; 18,64]	[18,58; 20,41]	[19,57; 21,56]	[20,65; 22,77]	[21,36; 23,59]	[21,87; 24,21]	[21,77; 24,17]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4455	2512	1910	2980	2617	2306	2087	1897	1821	1672	1667							
		Anteil in %	27,19	27,22	26,69	26,38	30,25	32,02	32,74	32,51	33,66	33,73	35,42							
		CI Anteil in %	[26,51; 27,88]	[26,31; 28,12]	[25,67; 27,72]	[25,57; 27,19]	[29,29; 31,22]	[30,95; 33,10]	[31,59; 33,89]	[31,30; 33,71]	[32,40; 34,92]	[32,41; 35,05]	[34,06; 36,79]							
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	8669	4986	3875	6562	4490	3491	2977	2672	2373	2143	1958								
	Anteil in %	52,92	54,02	54,15	58,09	51,91	48,48	46,70	45,78	43,86	43,23	41,61								
	CI Anteil in %	[52,15; 53,68]	[53,00; 55,04]	[53,00; 55,30]	[57,18; 59,00]	[50,85; 52,96]	[47,32; 49,63]	[45,47; 47,92]	[44,51; 47,06]	[42,54; 45,19]	[41,85; 44,61]	[40,20; 43,01]								
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>106368</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>							

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-1	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	14287	8295	11090	8477	7042	6123	5689	5233	4805	4434									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2859	1617	1677	1436	1342	1240	1247	1209	1087	1027									
		Anteil in %	20,01	19,49	15,12	16,94	19,06	20,25	21,92	23,10	22,62	23,16									
		CI Anteil in %	[19,36; 20,67]	[18,64; 20,35]	[14,45; 15,79]	[16,14; 17,74]	[18,14; 19,97]	[19,24; 21,26]	[20,84; 22,99]	[21,96; 24,25]	[21,44; 23,81]	[21,92; 24,40]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3451	2003	2802	2464	2161	1908	1822	1707	1545	1447									
		Anteil in %	24,15	24,15	25,27	29,07	30,69	31,16	32,03	32,62	32,15	32,63									
		CI Anteil in %	[23,45; 24,86]	[23,23; 25,07]	[24,46; 26,07]	[28,10; 30,03]	[29,61; 31,76]	[30,00; 32,32]	[30,81; 33,24]	[31,35; 33,89]	[30,83; 33,47]	[31,25; 34,01]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	7977	4675	6611	4577	3539	2975	2620	2317	2173	1960									
		Anteil in %	55,83	56,36	59,61	53,99	50,26	48,59	46,05	44,28	45,22	44,20									
		CI Anteil in %	[55,02; 56,65]	[55,29; 57,43]	[58,70; 60,53]	[52,93; 55,05]	[49,09; 51,42]	[47,34; 49,84]	[44,76; 47,35]	[42,93; 45,62]	[43,82; 46,63]	[42,74; 45,67]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>								
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	15802	9262	12522	9551	7956	7058	6482	5940	5406	5060									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3039	1625	1832	1585	1529	1347	1377	1287	1203	1153									
		Anteil in %	19,23	17,54	14,63	16,60	19,22	19,08	21,24	21,67	22,25	22,79									
		CI Anteil in %	[18,62; 19,85]	[16,77; 18,32]	[14,01; 15,25]	[15,85; 17,34]	[18,35; 20,08]	[18,17; 20,00]	[20,25; 22,24]	[20,62; 22,71]	[21,14; 23,36]	[21,63; 23,94]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3935	2326	3224	2805	2438	2217	2041	1904	1747	1639									
		Anteil in %	24,90	25,11	25,75	29,37	30,64	31,41	31,49	32,05	32,32	32,39									
		CI Anteil in %	[24,23; 25,58]	[24,23; 26,00]	[24,98; 26,51]	[28,46; 30,28]	[29,63; 31,66]	[30,33; 32,49]	[30,36; 32,62]	[30,87; 33,24]	[31,07; 33,56]	[31,10; 33,68]									
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	8828	5311	7466	5161	3989	3494	3064	2749	2456	2268										
	Anteil in %	55,87	57,34	59,62	54,04	50,14	49,50	47,27	46,28	45,43	44,82										
	CI Anteil in %	[55,09; 56,64]	[56,33; 58,35]	[58,76; 60,48]	[53,04; 55,04]	[49,04; 51,24]	[48,34; 50,67]	[46,05; 48,48]	[45,01; 47,55]	[44,10; 46,76]	[43,45; 46,19]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>									
2007-2	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	12345	11640	8724	7195	6306	5746	5286	4854	4475										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2532	1836	1509	1327	1260	1250	1180	1099	1045										
		Anteil in %	20,51	15,77	17,30	18,44	19,98	21,75	22,32	22,64	23,35										
		CI Anteil in %	[19,80; 21,22]	[15,11; 16,44]	[16,50; 18,09]	[17,55; 19,34]	[18,99; 20,97]	[20,69; 22,82]	[21,20; 23,45]	[21,46; 23,82]	[22,11; 24,59]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2963	3028	2489	2213	1953	1784	1665	1568	1478										
		Anteil in %	24,00	26,01	28,53	30,76	30,97	31,05	31,50	32,30	33,03										
		CI Anteil in %	[23,25; 24,76]	[25,22; 26,81]	[27,58; 29,48]	[29,69; 31,82]	[29,83; 32,11]	[29,85; 32,24]	[30,25; 32,75]	[30,99; 33,62]	[31,65; 34,41]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	6850	6776	4726	3655	3093	2712	2441	2187	1952										
		Anteil in %	55,49	58,21	54,17	50,80	49,05	47,20	46,18	45,06	43,62										
		CI Anteil in %	[54,61; 56,36]	[57,32; 59,11]	[53,13; 55,22]	[49,64; 51,95]	[47,81; 50,28]	[45,91; 48,49]	[44,83; 47,52]	[43,66; 46,46]	[42,17; 45,07]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>									
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	13968	13210	10004	8260	7213	6520	6066	5520	5165										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2722	1962	1659	1459	1383	1369	1308	1192	1167										
		Anteil in %	19,49	14,85	16,58	17,66	19,17	21,00	21,56	21,59	22,59										
		CI Anteil in %	[18,83; 20,14]	[14,25; 15,46]	[15,85; 17,31]	[16,84; 18,49]	[18,27; 20,08]	[20,01; 21,99]	[20,53; 22,60]	[20,51; 22,68]	[21,45; 23,74]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3403	3537	3025	2621	2309	2052	1929	1779	1730										
		Anteil in %	24,36	26,78	30,24	31,73	32,01	31,47	31,80	32,23	33,49										
		CI Anteil in %	[23,65; 25,07]	[26,02; 27,53]	[29,34; 31,14]	[30,73; 32,74]	[30,93; 33,09]	[30,35; 32,60]	[30,63; 32,97]	[31,00; 33,46]	[32,21; 34,78]										
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	7843	7711	5320	4180	3521	3099	2829	2549	2268											
	Anteil in %	56,15	58,37	53,18	50,61	48,81	47,53	46,64	46,18	43,91											
	CI Anteil in %	[55,33; 56,97]	[57,53; 59,21]	[52,20; 54,16]	[49,53; 51,68]	[47,66; 49,97]	[46,32; 48,74]	[45,38; 47,89]	[44,86; 47,49]	[42,56; 45,26]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>										

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-1	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	17744	10755	8484	7219	6510	5947	5390	5055											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3136	1918	1569	1461	1462	1324	1248	1216											
		Anteil in %	17,67	17,83	18,49	20,24	22,46	22,26	23,15	24,06											
		CI Anteil in %	[17,11; 18,23]	[17,11; 18,56]	[17,67; 19,32]	[19,31; 21,17]	[21,44; 23,47]	[21,21; 23,32]	[22,03; 24,28]	[22,88; 25,23]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	4464	3146	2666	2225	1974	1838	1687	1593											
		Anteil in %	25,16	29,25	31,42	30,82	30,32	30,91	31,30	31,51											
		CI Anteil in %	[24,52; 25,80]	[28,39; 30,11]	[30,44; 32,41]	[29,76; 31,89]	[29,21; 31,44]	[29,73; 32,08]	[30,06; 32,54]	[30,23; 32,79]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	10144	5691	4249	3533	3074	2785	2455	2246											
		Anteil in %	57,17	52,91	50,08	48,94	47,22	46,83	45,55	44,43											
		CI Anteil in %	[56,44; 57,90]	[51,97; 53,86]	[49,02; 51,15]	[47,79; 50,09]	[46,01; 48,43]	[45,56; 48,10]	[44,22; 46,88]	[43,06; 45,80]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>										
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	19746	12171	9653	8120	7411	6881	6304	5794											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	3194	1992	1768	1579	1523	1500	1376	1300											
		Anteil in %	16,18	16,37	18,32	19,45	20,55	21,80	21,83	22,44											
		CI Anteil in %	[15,66; 16,69]	[15,71; 17,02]	[17,54; 19,09]	[18,58; 20,31]	[19,63; 21,47]	[20,82; 22,77]	[20,81; 22,85]	[21,36; 23,51]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	5112	3752	3062	2627	2366	2168	2038	1941											
		Anteil in %	25,89	30,83	31,72	32,35	31,93	31,51	32,33	33,50											
		CI Anteil in %	[25,28; 26,50]	[30,01; 31,65]	[30,79; 32,65]	[31,33; 33,37]	[30,86; 32,99]	[30,41; 32,60]	[31,17; 33,48]	[32,28; 34,72]											
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	11440	6427	4823	3914	3522	3213	2890	2553												
	Anteil in %	57,94	52,81	49,96	48,20	47,52	46,69	45,84	44,06												
	CI Anteil in %	[57,25; 58,62]	[51,92; 53,69]	[48,97; 50,96]	[47,12; 49,29]	[46,39; 48,66]	[45,51; 47,87]	[44,61; 47,07]	[42,78; 45,34]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>											
2008-2	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	10709	6656	5508	4924	4503	4154	3842												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1994	1221	1039	1042	1011	930	899												
		Anteil in %	18,62	18,34	18,86	21,16	22,45	22,39	23,40												
		CI Anteil in %	[17,88; 19,36]	[17,41; 19,27]	[17,83; 19,90]	[20,02; 22,30]	[21,23; 23,67]	[21,12; 23,66]	[22,06; 24,74]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3272	2091	1799	1636	1454	1368	1287												
		Anteil in %	30,55	31,42	32,66	33,23	32,29	32,93	33,50												
		CI Anteil in %	[29,68; 31,43]	[30,30; 32,53]	[31,42; 33,90]	[31,91; 34,54]	[30,92; 33,66]	[31,50; 34,36]	[32,01; 34,99]												
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	5443	3344	2670	2246	2038	1856	1656												
		Anteil in %	50,83	50,24	48,47	45,61	45,26	44,68	43,10												
		CI Anteil in %	[49,88; 51,77]	[49,04; 51,44]	[47,15; 49,79]	[44,22; 47,00]	[43,80; 46,71]	[43,17; 46,19]	[41,54; 44,67]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>											
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	11923	7629	6286	5522	4953	4491	4210												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2095	1318	1195	1070	1029	984	903												
		Anteil in %	17,57	17,28	19,01	19,38	20,78	21,91	21,45												
		CI Anteil in %	[16,89; 18,25]	[16,43; 18,12]	[18,04; 19,98]	[18,33; 20,42]	[19,65; 21,91]	[20,70; 23,12]	[20,21; 22,69]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3762	2572	2098	1884	1674	1543	1521												
		Anteil in %	31,55	33,71	33,38	34,12	33,80	34,36	36,13												
		CI Anteil in %	[30,72; 32,39]	[32,65; 34,77]	[32,21; 34,54]	[32,87; 35,37]	[32,48; 35,12]	[32,97; 35,75]	[34,68; 37,58]												
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	6066	3739	2993	2568	2250	1964	1786													
	Anteil in %	50,88	49,01	47,61	46,50	45,43	43,73	42,42													
	CI Anteil in %	[49,98; 51,77]	[47,89; 50,13]	[46,38; 48,85]	[45,19; 47,82]	[44,04; 46,81]	[42,28; 45,18]	[40,93; 43,92]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>												

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	9933	6723	5767	5132	4622	4269														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2169	1331	1220	1145	1002	972														
		Anteil in %	21,84	19,80	21,15	22,31	21,68	22,77														
		CI Anteil in %	[21,02; 22,65]	[18,85; 20,75]	[20,10; 22,21]	[21,17; 23,45]	[20,49; 22,87]	[21,51; 24,03]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3256	2291	1980	1753	1602	1529														
		Anteil in %	32,78	34,08	34,33	34,16	34,66	35,82														
		CI Anteil in %	[31,86; 33,70]	[32,94; 35,21]	[33,11; 35,56]	[32,86; 35,46]	[33,29; 36,03]	[34,38; 37,25]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4508	3101	2567	2234	2018	1768														
		Anteil in %	45,38	46,13	44,51	43,53	43,66	41,41														
		CI Anteil in %	[44,40; 46,36]	[44,93; 47,32]	[43,23; 45,79]	[42,17; 44,89]	[42,23; 45,09]	[39,94; 42,89]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>													
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	10872	7379	6277	5672	5111	4657														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2238	1386	1282	1178	1069	1061														
		Anteil in %	20,58	18,78	20,42	20,77	20,92	22,78														
		CI Anteil in %	[19,82; 21,35]	[17,89; 19,67]	[19,43; 21,42]	[19,71; 21,82]	[19,80; 22,03]	[21,58; 23,99]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3710	2616	2207	1963	1748	1653														
		Anteil in %	34,12	35,45	35,16	34,61	34,20	35,49														
		CI Anteil in %	[33,23; 35,02]	[34,36; 36,54]	[33,98; 36,34]	[33,37; 35,85]	[32,90; 35,50]	[34,12; 36,87]														
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4924	3377	2788	2531	2294	1943															
	Anteil in %	45,29	45,77	44,42	44,62	44,88	41,72															
	CI Anteil in %	[44,35; 46,23]	[44,63; 46,90]	[43,19; 45,65]	[43,33; 45,92]	[43,52; 46,25]	[40,31; 43,14]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>														
2009-2	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	8664	5960	5199	4594	4271															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1903	1237	1071	953	957															
		Anteil in %	21,96	20,76	20,60	20,74	22,41															
		CI Anteil in %	[21,09; 22,84]	[19,73; 21,78]	[19,50; 21,70]	[19,57; 21,92]	[21,16; 23,66]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2842	1978	1770	1596	1500															
		Anteil in %	32,80	33,19	34,05	34,74	35,12															
		CI Anteil in %	[31,81; 33,79]	[31,99; 34,38]	[32,76; 35,33]	[33,36; 36,12]	[33,69; 36,55]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3919	2745	2358	2045	1814															
		Anteil in %	45,23	46,06	45,35	44,51	42,47															
		CI Anteil in %	[44,19; 46,28]	[44,79; 47,32]	[44,00; 46,71]	[43,08; 45,95]	[40,99; 43,96]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>														
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	9583	6717	5898	5205	4745															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2055	1374	1209	1084	1030															
		Anteil in %	21,44	20,46	20,50	20,83	21,71															
		CI Anteil in %	[20,62; 22,27]	[19,49; 21,42]	[19,47; 21,53]	[19,72; 21,93]	[20,53; 22,88]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3139	2213	1963	1734	1670															
		Anteil in %	32,76	32,95	33,28	33,31	35,19															
		CI Anteil in %	[31,82; 33,70]	[31,82; 34,07]	[32,08; 34,49]	[32,03; 34,59]	[33,84; 36,55]															
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4389	3130	2726	2387	2045																
	Anteil in %	45,80	46,60	46,22	45,86	43,10																
	CI Anteil in %	[44,80; 46,80]	[45,41; 47,79]	[44,95; 47,49]	[44,51; 47,21]	[41,69; 44,51]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>															

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	9770	6740	5752	5199																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2430	1502	1236	1189																
		Anteil in %	24,87	22,28	21,49	22,87																
		CI Anteil in %	[24,01; 25,73]	[21,29; 23,28]	[20,43; 22,55]	[21,73; 24,01]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3203	2260	1992	1868																
		Anteil in %	32,78	33,53	34,63	35,93																
		CI Anteil in %	[31,85; 33,71]	[32,40; 34,66]	[33,40; 35,86]	[34,63; 37,23]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4137	2978	2524	2142																
		Anteil in %	42,34	44,18	43,88	41,20																
		CI Anteil in %	[41,36; 43,32]	[43,00; 45,37]	[42,60; 45,16]	[39,86; 42,54]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>															
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	10186	7365	6328	5688																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2385	1545	1341	1266																
		Anteil in %	23,41	20,98	21,19	22,26																
		CI Anteil in %	[22,59; 24,24]	[20,05; 21,91]	[20,18; 22,20]	[21,18; 23,34]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3397	2517	2172	2087																
		Anteil in %	33,35	34,18	34,32	36,69																
CI Anteil in %		[32,43; 34,27]	[33,09; 35,26]	[33,15; 35,49]	[35,44; 37,94]																	
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	4404	3303	2815	2335																	
	Anteil in %	43,24	44,85	44,48	41,05																	
	CI Anteil in %	[42,27; 44,20]	[43,71; 45,98]	[43,26; 45,71]	[39,77; 42,33]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>																
2010-2	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	8311	5877	5176																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1968	1288	1216																	
		Anteil in %	23,68	21,92	23,49																	
		CI Anteil in %	[22,77; 24,59]	[20,86; 22,97]	[22,34; 24,65]																	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2735	2040	1857																	
		Anteil in %	32,91	34,71	35,88																	
		CI Anteil in %	[31,90; 33,92]	[33,49; 35,93]	[34,57; 37,18]																	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3608	2549	2103																	
		Anteil in %	43,41	43,37	40,63																	
		CI Anteil in %	[42,35; 44,48]	[42,11; 44,64]	[39,29; 41,97]																	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>																
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	8824	6175	5448																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1999	1251	1227																	
		Anteil in %	22,65	20,26	22,52																	
		CI Anteil in %	[21,78; 23,53]	[19,26; 21,26]	[21,41; 23,63]																	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2923	2042	1955																	
		Anteil in %	33,13	33,07	35,88																	
CI Anteil in %		[32,14; 34,11]	[31,90; 34,24]	[34,61; 37,16]																		
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	3902	2882	2266																		
	Anteil in %	44,22	46,67	41,59																		
	CI Anteil in %	[43,18; 45,26]	[45,43; 47,92]	[40,28; 42,90]																		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																	

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2011-1	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		9012	6419																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		2211	1458																
		Anteil in %			24,53	22,71															
		CI Anteil in %			[23,65; 25,42]	[21,69; 23,74]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		2979	2256																
		Anteil in %			33,06	35,15															
		CI Anteil in %			[32,08; 34,03]	[33,98; 36,31]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		3822	2705																
		Anteil in %			42,41	42,14															
		CI Anteil in %			[41,39; 43,43]	[40,93; 43,35]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		9758	7037																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		2288	1624																
		Anteil in %			23,45	23,08															
		CI Anteil in %			[22,61; 24,29]	[22,09; 24,06]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		3293	2487																
		Anteil in %			33,75	35,34															
CI Anteil in %				[32,81; 34,68]	[34,22; 36,46]																
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		4177	2926																	
	Anteil in %			42,81	41,58																
	CI Anteil in %			[41,82; 43,79]	[40,43; 42,73]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																	
2011-2	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		8153																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		2083																	
		Anteil in %			25,55																
		CI Anteil in %			[24,60; 26,50]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		2748																	
		Anteil in %			33,71																
		CI Anteil in %			[32,68; 34,73]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		3322																	
		Anteil in %			40,75																
		CI Anteil in %			[39,68; 41,81]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																	
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		8723																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		2063																	
		Anteil in %			23,65																
		CI Anteil in %			[22,76; 24,54]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		3109																	
		Anteil in %			35,64																
CI Anteil in %				[34,64; 36,65]																	
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		3551																		
	Anteil in %			40,71																	
	CI Anteil in %			[39,68; 41,74]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																		

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	männliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl																				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																			
	weibliche Pat. mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl																				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																				
		Anteil in %																				
CI Anteil in %																						
Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																					
	Anteil in %																					
	CI Anteil in %																					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																				

In Tabelle 3.4.3 wird untersucht, bei wie vielen Patienten bzw. welchem Anteil eine **jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung** erfolgte. Die Auswertungen erfolgen also nicht im üblichen Halbjahresbezug. Da die Angaben aus der Erstdokumentation sich über einen unbekanntem Zeitraum erstrecken, können die Angaben des Beitrittsjahres nicht für die jährliche Betrachtungsweise verwendet werden. Der Jahresbezug wird folgendermaßen definiert: Eine jährliche Untersuchung gilt als gegeben, wenn eine Untersuchung im zweiten und/oder dritten Halbjahr dokumentiert ist bzw. im vierten und/oder fünften Halbjahr, etc. Betrachtet werden dabei alle Versicherten, die jeweils in beiden Halbjahren Programmteilnehmer waren.

In Tabelle 3.4.3. werden unter „männliche bzw. weibliche Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahlen der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr bzw. im Untersuchungsjahr (noch) Programmteilnehmer waren. Da eine **jährliche** Auswertung vorgenommen werden soll, wird ausgewiesen, wie viele Patienten in der zweiten Hälfte des untersuchten Jahreszeitraumes (zweites/drittes Halbjahr, viertes/fünftes Halbjahr, etc.) noch Programmteilnehmer waren. Patienten, die lediglich in der ersten Jahreshälfte im Programm waren, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird dargestellt, wie viele der „auswertbaren“ Patienten bzw. welcher Anteil im interessierenden Jahreszeitraum (= aktuelles Halbjahrespaar) eine augenärztliche Untersuchung erfolgte.

Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Daten zu augenärztlichen Untersuchungen aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeile „mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit im Zeitverlauf gegeben.

Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung (Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1) ist die Dokumentation „veranlasste Funduskopien“ als neue ophthalmologische Netzhautuntersuchungen auszuweisen. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren der Funduskopie-Status sowie die Einschätzung „Funduskopie nicht erforderlich“. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung (Berichtshalbjahre ab 2004-2) sind in der entsprechenden Tabellenzeile dokumentierte „durchgeführte ophthalmologische Netzhautuntersuchungen“ auszuweisen. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten zur Netzhautuntersuchung waren „nicht durchgeführt“ und „veranlasst“.

Tabelle 3.4.3 Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersuchungs-jahr	Im 2. Untersuchungs-jahr	Im 3. Untersuchungs-jahr	Im 4. Untersuchungs-jahr	Im 5. Untersuchungs-jahr	Im 6. Untersuchungs-jahr	Im 7. Untersuchungs-jahr	Im 8. Untersuchungs-jahr	Im 9. Untersuchungs-jahr	
2003-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	12153	9557	7996	6687	5968	5409	4851	4306	3910
	auswertbar	Anzahl		11427	9545	7981	6673	5924	5360	4800	4252	3851
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		8788	7596	6285	5274	4698	4277	3724	3339	3066
		Anteil in %		76,91	79,58	78,75	79,03	79,30	79,79	77,58	78,53	79,62
		CI Anteil in %		[76,13; 77,68]	[78,77; 80,39]	[77,85; 79,65]	[78,06; 80,01]	[78,27; 80,34]	[78,72; 80,87]	[76,40; 78,76]	[77,29; 79,76]	[78,34; 80,89]
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	17225	13824	11761	9791	8775	7877	7023	6268	5695
	auswertbar	Anzahl		16159	13806	11745	9776	8706	7805	6957	6210	5620
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		12250	11026	9207	7784	6899	6179	5309	4821	4451
		Anteil in %		75,81	79,86	78,39	79,62	79,24	79,17	76,31	77,63	79,20
		CI Anteil in %		[75,15; 76,47]	[79,19; 80,53]	[77,65; 79,14]	[78,83; 80,42]	[78,39; 80,10]	[78,27; 80,07]	[75,31; 77,31]	[76,60; 78,67]	[78,14; 80,26]
2003-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	73383	55111	44958	40030	36843	33628	30707	27932	
	auswertbar	Anzahl		72741	54856	44779	39591	36234	32659	29742	26938	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		63383	43296	36340	32242	29742	26436	23958	21793	
		Anteil in %		87,14	78,93	81,15	81,44	82,08	80,95	80,55	80,90	
		CI Anteil in %		[86,89; 87,38]	[78,59; 79,27]	[80,79; 81,52]	[81,05; 81,82]	[81,69; 82,48]	[80,52; 81,37]	[80,10; 81,00]	[80,43; 81,37]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	142866	93979	71389	58333	51899	47865	43703	39917	36445	
	auswertbar	Anzahl		93250	71119	58141	51400	47087	42410	38643	35152	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		81618	56152	47088	41769	38440	34089	30890	28056	
		Anteil in %		87,53	78,95	80,99	81,26	81,64	80,38	79,94	79,81	
		CI Anteil in %		[87,31; 87,74]	[78,66; 79,25]	[80,67; 81,31]	[80,93; 81,60]	[81,29; 81,99]	[80,00; 80,76]	[79,54; 80,34]	[79,39; 80,23]	
2004-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	135113	103812	83101	71451	65532	60399	55309	50489	46232	
	auswertbar	Anzahl		103405	82792	70560	64307	58323	53348	48474	44159	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		80063	61367	54027	48968	45500	41653	37944	34533	
		Anteil in %		77,43	74,12	76,57	76,15	78,01	78,08	78,28	78,20	
		CI Anteil in %		[77,17; 77,68]	[73,82; 74,42]	[76,26; 76,88]	[75,82; 76,48]	[77,68; 78,35]	[77,73; 78,43]	[77,91; 78,64]	[77,82; 78,59]	
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	163432	126918	102494	88366	81247	75048	68399	62532	57490	
	auswertbar	Anzahl		126483	102093	87266	79687	72343	65864	59940	54850	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		98034	75542	66400	60352	55835	50946	46451	42428	
		Anteil in %		77,51	73,99	76,09	75,74	77,18	77,35	77,50	77,35	
		CI Anteil in %		[77,28; 77,74]	[73,72; 74,26]	[75,81; 76,37]	[75,44; 76,03]	[76,88; 77,49]	[77,03; 77,67]	[77,16; 77,83]	[77,00; 77,70]	
2004-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98842	76003	60776	53744	49147	44843	41044	37515		
	auswertbar	Anzahl		75580	60302	52581	47569	42583	38793	35271		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		55099	44833	39470	36411	32428	29577	27023		
		Anteil in %		72,90	74,35	75,07	76,54	76,15	76,24	76,62		
		CI Anteil in %		[72,58; 73,22]	[74,00; 74,70]	[74,70; 75,43]	[76,16; 76,92]	[75,75; 76,56]	[75,82; 76,67]	[76,17; 77,06]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	115970	90548	73117	65025	59615	54381	49656	45482		
	auswertbar	Anzahl		90114	72608	63769	57728	51552	46864	42690		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		66479	54650	48198	44219	39204	35636	32294		
		Anteil in %		73,77	75,27	75,58	76,60	76,05	76,04	75,65		
		CI Anteil in %		[73,48; 74,06]	[74,95; 75,58]	[75,25; 75,92]	[76,25; 76,94]	[75,68; 76,42]	[75,65; 76,43]	[75,24; 76,05]		
2005-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	105631	83366	68487	61675	56190	50980	46510	42590		
	auswertbar	Anzahl		82929	68073	60751	54495	49443	44904	40937		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		61017	50383	45190	40932	36997	33959	30814		
		Anteil in %		73,58	74,01	74,39	75,11	74,83	75,63	75,27		
		CI Anteil in %		[73,28; 73,88]	[73,68; 74,34]	[74,04; 74,73]	[74,75; 75,47]	[74,45; 75,21]	[75,23; 76,02]	[74,85; 75,69]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	123470	99471	82572	74799	68310	62073	56688	51856		
	auswertbar	Anzahl		98978	82050	73666	66207	60175	54758	49862		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		73055	60975	54999	49941	45015	41201	37211		
		Anteil in %		73,81	74,31	74,66	75,43	74,81	75,24	74,63		
		CI Anteil in %		[73,54; 74,08]	[74,02; 74,61]	[74,35; 74,97]	[75,10; 75,76]	[74,46; 75,15]	[74,88; 75,60]	[74,25; 75,01]		

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersu-chungs-jahr	Im 2. Untersu-chungs-jahr	Im 3. Untersu-chungs-jahr	Im 4. Untersu-chungs-jahr	Im 5. Untersu-chungs-jahr	Im 6. Untersu-chungs-jahr	Im 7. Untersu-chungs-jahr	Im 8. Untersu-chungs-jahr	Im 9. Untersu-chungs-jahr
2005-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	82253	65422	55776	50253	45177	40893	37209		
	auswertbar	Anzahl		65129	55290	49594	44151	39861	36164		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		47412	40031	36864	32469	29306	26583		
		Anteil in %		72,80	72,40	74,33	73,54	73,52	73,51		
		CI Anteil in %		[72,46; 73,14]	[72,03; 72,77]	[73,95; 74,72]	[73,13; 73,95]	[73,09; 73,95]	[73,05; 73,96]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	95017	76949	66335	60040	54131	49016	44599		
	auswertbar	Anzahl		76632	65765	59250	52909	47831	43391		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		56610	47916	44141	39105	35347	32197		
		Anteil in %		73,87	72,86	74,50	73,91	73,90	74,20		
		CI Anteil in %		[73,56; 74,18]	[72,52; 73,20]	[74,15; 74,85]	[73,54; 74,28]	[73,51; 74,29]	[73,79; 74,61]		
2006-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	98603	79739	69513	62516	55879	50627	46133		
	auswertbar	Anzahl		79341	68561	60567	54138	48823	44263		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		57433	48952	44187	39542	36077	32516		
		Anteil in %		72,39	71,40	72,96	73,04	73,89	73,46		
		CI Anteil in %		[72,08; 72,70]	[71,06; 71,74]	[72,60; 73,31]	[72,67; 73,41]	[73,50; 74,28]	[73,05; 73,87]		
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112511	92563	81576	73783	66080	59695	54383		
	auswertbar	Anzahl		92169	80439	71571	64076	57594	52227		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		67388	57723	52457	47009	42632	38601		
		Anteil in %		73,11	71,76	73,29	73,36	74,02	73,91		
		CI Anteil in %		[72,83; 73,40]	[71,45; 72,07]	[72,97; 73,62]	[73,02; 73,71]	[73,66; 74,38]	[73,53; 74,29]		
2006-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	94020	78144	68692	60857	54569	49384			
	auswertbar	Anzahl		77628	67491	59000	52711	47451			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		54799	48231	41910	37708	34125			
		Anteil in %		70,59	71,46	71,03	71,54	71,92			
		CI Anteil in %		[70,27; 70,91]	[71,12; 71,80]	[70,67; 71,40]	[71,15; 71,92]	[71,51; 72,32]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	106368	89965	79567	70865	63673	57735			
	auswertbar	Anzahl		89387	78192	68623	61440	55454			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		64166	56401	49056	44435	40275			
		Anteil in %		71,78	72,13	71,49	72,32	72,63			
		CI Anteil in %		[71,49; 72,08]	[71,82; 72,45]	[71,15; 71,82]	[71,97; 72,68]	[72,26; 73,00]			
2007-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99014	82685	72667	63825	57039	51740			
	auswertbar	Anzahl		82029	70577	62104	55339	50020			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		56665	49547	43929	39601	35767			
		Anteil in %		69,08	70,20	70,73	71,56	71,51			
		CI Anteil in %		[68,76; 69,40]	[69,87; 70,54]	[70,38; 71,09]	[71,18; 71,94]	[71,11; 71,90]			
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	112214	95513	84285	74566	66810	60660			
	auswertbar	Anzahl		94792	81824	72576	64790	58654			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		66302	58166	51597	46593	42200			
		Anteil in %		69,94	71,09	71,09	71,91	71,95			
		CI Anteil in %		[69,65; 70,24]	[70,78; 71,40]	[70,76; 71,42]	[71,57; 72,26]	[71,58; 72,31]			
2007-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	91596	77239	66295	58456	52404				
	auswertbar	Anzahl		76003	64281	56526	50459				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		52935	44095	39375	35766				
		Anteil in %		69,65	68,60	69,66	70,88				
		CI Anteil in %		[69,32; 69,98]	[68,24; 68,96]	[69,28; 70,04]	[70,48; 71,28]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	103138	88402	76730	67962	61071				
	auswertbar	Anzahl		86895	74218	65533	58658				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		61379	51600	45974	41837				
		Anteil in %		70,64	69,52	70,15	71,32				
		CI Anteil in %		[70,33; 70,94]	[69,19; 69,86]	[69,80; 70,50]	[70,96; 71,69]				

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersu-chungs-jahr	Im 2. Untersu-chungs-jahr	Im 3. Untersu-chungs-jahr	Im 4. Untersu-chungs-jahr	Im 5. Untersu-chungs-jahr	Im 6. Untersu-chungs-jahr	Im 7. Untersu-chungs-jahr	Im 8. Untersu-chungs-jahr	Im 9. Untersu-chungs-jahr
2008-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	99599	84016	70582	62158	55783				
	auswertbar	Anzahl		82317	69619	61194	54818				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		56105	47552	42864	38732				
		Anteil in %		68,16	68,30	70,05	70,66				
		CI Anteil in %		[67,84; 68,48]	[67,96; 68,65]	[69,68; 70,41]	[70,27; 71,04]				
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	109903	94292	80277	71223	64228				
	auswertbar	Anzahl		92452	79239	70180	63181				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		64240	54937	49479	44866				
		Anteil in %		69,48	69,33	70,50	71,01				
		CI Anteil in %		[69,19; 69,78]	[69,01; 69,65]	[70,17; 70,84]	[70,66; 71,37]				
2008-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67596	55310	47417	42019					
	auswertbar	Anzahl		55026	47133	41729					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		37044	31938	28739					
		Anteil in %		67,32	67,76	68,87					
		CI Anteil in %		[66,93; 67,71]	[67,34; 68,18]	[68,43; 69,31]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	74164	61957	53698	47896					
	auswertbar	Anzahl		61634	53393	47584					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		42450	36535	33099					
		Anteil in %		68,87	68,43	69,56					
		CI Anteil in %		[68,51; 69,24]	[68,03; 68,82]	[69,15; 69,97]					
2009-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	72280	58326	50049	44446					
	auswertbar	Anzahl		58087	49809	44176					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		38641	33565	30290					
		Anteil in %		66,52	67,39	68,57					
		CI Anteil in %		[66,14; 66,91]	[66,98; 67,80]	[68,13; 69,00]					
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	76956	63438	54793	49078					
	auswertbar	Anzahl		63217	54561	48862					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		42617	37452	33921					
		Anteil in %		67,41	68,64	69,42					
		CI Anteil in %		[67,05; 67,78]	[68,25; 69,03]	[69,01; 69,83]					
2009-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	66301	53502	45947						
	auswertbar	Anzahl		53312	45718						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		35538	30740						
		Anteil in %		66,66	67,24						
		CI Anteil in %		[66,26; 67,06]	[66,81; 67,67]						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	71902	59348	51404						
	auswertbar	Anzahl		59137	51160						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		40362	35132						
		Anteil in %		68,25	68,67						
		CI Anteil in %		[67,88; 68,63]	[68,27; 69,07]						
2010-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	76010	61928	53460						
	auswertbar	Anzahl		61751	53266						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		41231	35748						
		Anteil in %		66,77	67,11						
		CI Anteil in %		[66,40; 67,14]	[66,71; 67,51]						
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	80044	66813	58365						
	auswertbar	Anzahl		66639	58177						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		45018	39718						
		Anteil in %		67,56	68,27						
		CI Anteil in %		[67,20; 67,91]	[67,89; 68,65]						

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersuchungs-jahr	Im 2. Untersuchungs-jahr	Im 3. Untersuchungs-jahr	Im 4. Untersuchungs-jahr	Im 5. Untersuchungs-jahr	Im 6. Untersuchungs-jahr	Im 7. Untersuchungs-jahr	Im 8. Untersuchungs-jahr	Im 9. Untersuchungs-jahr
2010-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	68337	55900							
	auswertbar	Anzahl		55771							
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		37129							
		Anteil in %		66,57							
		CI Anteil in %		[66,18; 66,97]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	73408	61246							
	auswertbar	Anzahl		61111							
2011-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74139	60521							
	auswertbar	Anzahl		60318							
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		39480							
		Anteil in %		65,45							
		CI Anteil in %		[65,07; 65,83]							
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	79514	66610							
	auswertbar	Anzahl		66417							
2011-2	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	67230								
	auswertbar	Anzahl									
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl									
		Anteil in %									
		CI Anteil in %									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	72465								
	auswertbar	Anzahl									
2012-1	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	74714								
	auswertbar	Anzahl									
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl									
		Anteil in %									
		CI Anteil in %									
	weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	77879								
	auswertbar	Anzahl									
mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl										
	Anteil in %										
	CI Anteil in %										

3.5 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten

Die durch langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachten Begleit- oder Folgeerkrankungen des Diabetes sind durch Makro- und Mikroangiopathie sowie Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven, bedingt und können zu schweren Organschädigungen bzw. Organversagen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Therapie kann die Progredienz deutlich verlangsamen. Eine gefürchtete Folge des Diabetes mellitus besteht in der Schädigung der Nieren durch Veränderung der Nierengefäße in Form der diabetischen Nephropathie, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Eine weitere Schädigung besteht in Form des diabetischen Fußes, bei dessen fortgeschrittenen Stadien Amputationen von Zehen, des Vorfußes oder gar des Unterschenkels notwendig werden können. Ein weiteres von Gefäßveränderungen betroffenes Organ ist das Herz, bei dem es in ausgeprägten Stadien zu so genannten (durch die gleichzeitige Schädigung der Nerven) „stummen Infarkten“, bei denen die Patienten keine oder kaum Schmerzen verspüren, kommen kann. Durch ausgeprägte Schädigung der Gefäße des Zentralnervensystems können weiterhin Schlaganfälle verursacht werden. In den folgenden Tabellen wird das neue Auftreten von Endpunkten dokumentiert; d.h. es werden erstmalig auftretende Endpunkte ausgewiesen. Folgeerkrankungen an den Augen und Nieren sind typische Schäden, die sich mit zunehmender Erkrankungsdauer ausbilden können. Das frühzeitige Erkennen und eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist ein wichtiges Ziel.

Die folgenden Tabellen beinhalten **Ereigniszeitanalysen** zum Erstauftreten der eben beschriebenen Ereignisse sowie die Angaben zur kumulierten „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier**. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit in Prozent wieder, mit der für Patienten des Basiskollektivs ohne Ereignis zur ED im jeweiligen Halbjahr (noch) keines der im Einzelnen betrachteten Ereignisse eingetreten ist. Bezugsgröße im Halbjahr ist das Restkollektiv und entspricht dem Basiskollektiv, reduziert um ausgeschriebene Patienten sowie Patienten, bei denen im Verlauf bereits ein Ereignis eingetreten ist. Pro Halbjahr fließen also die verbleibenden Patienten unter Risiko in die Auswertung ein.

Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit wird in jeder der folgenden Tabellen in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

In Tabelle 3.5.1 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren vom **Erstaufreten einer Erblindungen** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Erblindung vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier** dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Erblindung dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene Erblindung dokumentiert ist.

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	91381	83371	77047	71620	66101	61997	58273	55003	52233	49761								
	auswertbar	Anzahl		78711	70616	66810	62331	58501	54991	51789	49277	46593								
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		21	34	14	16	10	9	7	13	8								
		Anteil in %		0,03	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02								
		CI Anteil in %		[0,02; 0,04]	[0,03; 0,06]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,04]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,02]	[0,01; 0,04]	[0,01; 0,03]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,93	99,91	99,88	99,87	99,85	99,84	99,81	99,79								
		CI		[99,96; 99,98]	[99,91; 99,95]	[99,89; 99,93]	[99,85; 99,91]	[99,84; 99,90]	[99,82; 99,88]	[99,81; 99,87]	[99,78; 99,84]	[99,75; 99,83]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	102774	94649	88096	82295	76451	71831	67699	63958	60832	57986								
	auswertbar	Anzahl		89587	80689	76773	72036	67696	63760	60245	57294	54219								
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		18	37	23	13	17	11	10	9	6								
		Anteil in %		0,02	0,05	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01								
CI Anteil in %			[0,01; 0,03]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,04]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,04]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,02]								
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,94	99,91	99,89	99,86	99,85	99,83	99,82	99,80									
	CI		[99,97; 99,99]	[99,92; 99,96]	[99,89; 99,93]	[99,87; 99,91]	[99,83; 99,89]	[99,82; 99,88]	[99,80; 99,86]	[99,79; 99,85]	[99,77; 99,83]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214									
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	99368	91105	83778	75855	70358	65838	61948	58608	55589									
	auswertbar	Anzahl		85313	78833	72621	67556	63365	59641	56429	53297									
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		47	19	15	9	12	9	10	8									
		Anteil in %		0,06	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02								
		CI Anteil in %		[0,04; 0,07]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,02]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,02]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,03]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,92	99,90	99,89	99,87	99,86	99,84	99,82									
		CI		[99,93; 99,97]	[99,90; 99,94]	[99,88; 99,92]	[99,87; 99,91]	[99,84; 99,90]	[99,83; 99,89]	[99,81; 99,87]	[99,79; 99,85]	[99,78; 99,84]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	109548	101534	93940	85665	79976	75046	70952	67252	63994									
	auswertbar	Anzahl		95466	88799	82184	76951	72447	68415	64922	61486									
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		63	30	15	19	12	10	7	7									
		Anteil in %		0,07	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01								
CI Anteil in %			[0,05; 0,08]	[0,02; 0,05]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,04]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,02]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]									
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,90	99,89	99,86	99,84	99,83	99,82	99,81										
	CI		[99,92; 99,96]	[99,88; 99,92]	[99,87; 99,91]	[99,84; 99,88]	[99,81; 99,87]	[99,80; 99,86]	[99,79; 99,85]	[99,78; 99,84]	[99,77; 99,83]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228										
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	67495	61326	55211	50755	47317	44343	41916	39771										
	auswertbar	Anzahl		58931	53273	49124	45940	43085	40746	38522										
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		21	13	13	14	6	2	7										
		Anteil in %		0,04	0,02	0,03	0,03	0,01	0,00	0,02										
		CI Anteil in %		[0,02; 0,05]	[0,01; 0,04]	[0,01; 0,04]	[0,01; 0,05]	[0,00; 0,03]	[0,00; 0,01]	[0,00; 0,03]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,94	99,91	99,88	99,87	99,87	99,85										
		CI		[99,96; 99,98]	[99,92; 99,96]	[99,89; 99,93]	[99,85; 99,91]	[99,84; 99,90]	[99,84; 99,90]	[99,84; 99,88]	[99,82; 99,88]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	67596	61420	55310	50854	47417	44450	42019	39871										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74007	67891	61823	57190	53579	50350	47785	45416										
	auswertbar	Anzahl		65347	59772	55474	52162	48981	46534	44075										
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		19	13	10	10	9	7	3										
		Anteil in %		0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01										
CI Anteil in %			[0,02; 0,04]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,03]	[0,00; 0,01]										
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,95	99,93	99,91	99,90	99,88	99,87											
	CI		[99,96; 99,98]	[99,93; 99,97]	[99,91; 99,95]	[99,89; 99,93]	[99,87; 99,93]	[99,85; 99,91]	[99,84; 99,90]	[99,84; 99,90]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	74164	68029	61957	57312	53698	50467	47896	45527											

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72171	64464	58235	53568	49965	46910	44366												
	auswertbar	Anzahl		62395	56430	52098	48607	45650	43080												
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		6	7	11	8	2	5												
		Anteil in %		0,01	0,01	0,02	0,02	0,00	0,01												
		CI Anteil in %		[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]	[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,01]	[0,00; 0,02]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,99	99,98	99,96	99,94	99,94	99,93												
		CI		[99,98; 100,00]	[99,97; 99,99]	[99,94; 99,98]	[99,92; 99,96]	[99,92; 99,96]	[99,91; 99,95]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	76819	69413	63309	58530	54672	51558	48972												
	auswertbar	Anzahl		67289	61498	56926	53297	50414	47708												
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		19	12	8	7	6	10												
		Anteil in %		0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02												
		CI Anteil in %		[0,02; 0,04]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]	[0,01; 0,03]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,95	99,94	99,93	99,91	99,89												
CI			[99,96; 99,98]	[99,93; 99,97]	[99,92; 99,96]	[99,91; 99,95]	[99,89; 99,93]	[99,86; 99,92]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>													
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	66204	59322	53415	49035	45865	43203													
	auswertbar	Anzahl		57566	51767	47578	44675	41905													
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		14	12	7	6	7													
		Anteil in %		0,02	0,02	0,01	0,01	0,02													
		CI Anteil in %		[0,01; 0,04]	[0,01; 0,04]	[0,00; 0,03]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,03]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,95	99,94	99,93	99,91													
		CI		[99,97; 99,99]	[99,93; 99,97]	[99,92; 99,96]	[99,91; 99,95]	[99,88; 99,94]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71792	65077	59254	54831	51307	48356													
	auswertbar	Anzahl		63415	57503	53297	50067	47122													
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		16	8	9	6	5													
		Anteil in %		0,03	0,01	0,02	0,01	0,01													
		CI Anteil in %		[0,01; 0,04]	[0,00; 0,02]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,96	99,94	99,93	99,92													
CI			[99,97; 99,99]	[99,94; 99,98]	[99,92; 99,96]	[99,91; 99,95]	[99,90; 99,94]														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>														
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	75906	68198	61841	57028	53382														
	auswertbar	Anzahl		66345	60029	55499	51916														
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		13	6	9	4														
		Anteil in %		0,02	0,01	0,02	0,01														
		CI Anteil in %		[0,01; 0,03]	[0,00; 0,02]	[0,01; 0,03]	[0,00; 0,02]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,97	99,95	99,95														
		CI		[99,97; 99,99]	[99,96; 99,98]	[99,93; 99,97]	[99,93; 99,97]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79933	72864	66712	62002	58270														
	auswertbar	Anzahl		71043	64961	60558	56765														
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		22	10	7	6														
		Anteil in %		0,03	0,02	0,01	0,01														
		CI Anteil in %		[0,02; 0,04]	[0,01; 0,02]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,95	99,94	99,93														
CI			[99,96; 99,98]	[99,93; 99,97]	[99,92; 99,96]	[99,91; 99,95]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>															

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68261	61542	55830	51718															
	auswertbar	Anzahl		60050	54374	50207															
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		15	6	6															
		Anteil in %		0,02	0,01	0,01															
		CI Anteil in %		[0,01; 0,04]	[0,00; 0,02]	[0,00; 0,02]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,96	99,95															
		CI		[99,97; 99,99]	[99,94; 99,98]	[99,93; 99,97]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73313	66860	61157	56811															
	auswertbar	Anzahl		65423	59663	55339															
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		18	15	13															
		Anteil in %		0,03	0,03	0,02															
		CI Anteil in %		[0,01; 0,04]	[0,01; 0,04]	[0,01; 0,04]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,95	99,92															
CI			[99,96; 99,98]	[99,93; 99,97]	[99,90; 99,94]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74071	66524	60454																
	auswertbar	Anzahl		64859	58532																
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		14	11																
		Anteil in %		0,02	0,02																
		CI Anteil in %		[0,01; 0,03]	[0,01; 0,03]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,96																
		CI		[99,97; 99,99]	[99,94; 99,98]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79426	72479	66526																
	auswertbar	Anzahl		70863	64575																
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		21	8																
		Anteil in %		0,03	0,01																
		CI Anteil in %		[0,02; 0,04]	[0,00; 0,02]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,96																
CI			[99,96; 99,98]	[99,94; 99,98]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																	
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	67158	60662																	
	auswertbar	Anzahl		58980																	
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		12																	
		Anteil in %		0,02																	
		CI Anteil in %		[0,01; 0,03]																	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98																	
		CI		[99,97; 99,99]																	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72397	66437																	
	auswertbar	Anzahl		64681																	
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		12																	
		Anteil in %		0,02																	
		CI Anteil in %		[0,01; 0,03]																	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98																	
CI			[99,97; 99,99]																		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																		

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74654																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																			
		CI																			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	77800																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																			
	CI																				
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																			

Das Endstadium einer diabetischen Nephropathie führt zum lebensbedrohenden Ausfall der Filterfunktion der Nieren, dem Nierenversagen (terminale Niereninsuffizienz) und damit zur Notwendigkeit der Dialyse oder gar einer Nierentransplantation.

In Tabelle 3.5.2 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einer **erstmalig aufgetretenen diabetischen Nephropathie** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Nephropathie vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine diabetische Nephropathie dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie dokumentiert ist.

Tabelle 3.5.2 Ereigniszeitanalyse: Erstaufreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation

EZ	Erstaufreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	15730	13105	11240	9799	8679	7815	7156	6331	5938	5500	5245	4962	4472	4143	3855	3540	3276	3051	2889
	auswertbar	Anzahl		11161	10550	9545	8459	7648	6938	6184	5655	5347	5046	4779	4325	4017	3713	3429	3167	2966	2784
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		106	90	126	72	54	49	39	40	36	39	289	108	82	122	63	83	53	59
		Anteil in %		0,95	0,85	1,32	0,85	0,71	0,71	0,63	0,71	0,67	0,77	6,05	2,50	2,04	3,29	1,84	2,62	1,79	2,12
		CI Anteil in %		[0,77; 1,13]	[0,68; 1,03]	[1,09; 1,55]	[0,66; 1,05]	[0,52; 0,89]	[0,51; 0,90]	[0,43; 0,83]	[0,49; 0,93]	[0,45; 0,89]	[0,53; 1,01]	[5,37; 6,72]	[2,03; 2,96]	[1,60; 2,48]	[2,71; 3,86]	[1,39; 2,29]	[2,06; 3,18]	[1,31; 2,26]	[1,58; 2,65]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,16	98,35	97,08	96,26	95,58	94,91	94,32	93,67	93,04	92,33	86,81	84,66	82,94	80,24	78,77	76,72	75,35	73,75
		CI		[99,00; 99,32]	[98,12; 98,58]	[96,76; 97,40]	[95,89; 96,63]	[95,17; 95,99]	[94,47; 95,35]	[93,84; 94,80]	[93,15; 94,19]	[92,49; 93,59]	[91,74; 92,92]	[85,98; 87,64]	[83,76; 85,56]	[81,98; 83,90]	[79,20; 81,28]	[77,69; 79,85]	[75,58; 77,86]	[74,17; 76,53]	[72,53; 74,97]
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	16899	14082	12153	10652	9557	8669	7996	7104	6687	6220	5968	5677	5409	5125	4851	4591	4306	4096	3910
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	22110	18662	16206	14287	12824	11685	10793	9558	8929	8331	7935	7461	6789	6314	5873	5399	4992	4668	4408
	auswertbar	Anzahl		15932	15240	13982	12499	11479	10478	9334	8525	8114	7608	7183	6573	6129	5697	5252	4842	4546	4266
erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		103	91	162	90	60	69	57	46	51	50	338	113	115	186	110	107	68	66	
	Anteil in %		0,65	0,60	1,16	0,72	0,52	0,66	0,61	0,54	0,63	0,66	4,71	1,72	1,88	3,26	2,09	2,21	1,50	1,55	
	CI Anteil in %		[0,52; 0,77]	[0,47; 0,72]	[0,98; 1,34]	[0,57; 0,87]	[0,39; 0,65]	[0,50; 0,81]	[0,45; 0,77]	[0,38; 0,70]	[0,46; 0,80]	[0,48; 0,84]	[4,22; 5,20]	[1,40; 2,03]	[1,54; 2,22]	[2,80; 3,73]	[1,71; 2,48]	[1,80; 2,62]	[1,14; 1,85]	[1,18; 1,92]	
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,43	98,86	97,73	97,04	96,53	95,90	95,32	94,82	94,23	93,61	89,25	87,73	86,10	83,30	81,56	79,77	78,58	77,37	
	CI		[99,32; 99,54]	[98,70; 99,02]	[97,50; 97,96]	[96,77; 97,31]	[96,23; 96,83]	[95,57; 96,23]	[94,96; 95,68]	[94,43; 95,21]	[93,81; 94,65]	[93,16; 94,06]	[88,63; 89,87]	[87,06; 88,40]	[85,38; 86,82]	[82,50; 84,10]	[80,71; 82,41]	[78,87; 80,67]	[77,65; 79,51]	[76,41; 78,33]	
weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	23425	19774	17225	15242	13824	12682	11761	10454	9791	9172	8775	8282	7877	7432	7023	6650	6268	5980	5695	
2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	106509	82697	68391	58233	50567	45313	40857	38070	36116	34526	33107	30136	28049	26446	24930	23549	22172	21008	
	auswertbar	Anzahl		74878	65849	56491	49332	44078	39853	36563	34758	32780	30931	28533	26671	25098	23606	22223	20914	19688	
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		696	710	445	322	248	222	195	157	130	1779	726	475	478	368	411	304	299	
		Anteil in %		0,93	1,08	0,79	0,65	0,56	0,56	0,53	0,45	0,40	5,75	2,54	1,78	1,90	1,56	1,85	1,45	1,52	
		CI Anteil in %		[0,86; 1,00]	[1,00; 1,16]	[0,71; 0,86]	[0,58; 0,72]	[0,49; 0,63]	[0,48; 0,63]	[0,46; 0,61]	[0,38; 0,52]	[0,33; 0,46]	[5,49; 6,01]	[2,36; 2,73]	[1,62; 1,94]	[1,74; 2,07]	[1,40; 1,72]	[1,67; 2,03]	[1,29; 1,62]	[1,35; 1,69]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,13	98,09	97,33	96,70	96,16	95,63	95,13	94,70	94,34	89,06	86,82	85,28	83,67	82,38	80,86	79,69	78,48	
		CI		[99,07; 99,19]	[97,99; 98,19]	[97,21; 97,45]	[96,56; 96,84]	[96,01; 96,31]	[95,46; 95,80]	[94,95; 95,31]	[94,51; 94,89]	[94,14; 94,54]	[88,76; 89,36]	[86,48; 87,16]	[84,92; 85,64]	[83,29; 84,05]	[81,98; 82,78]	[80,44; 81,28]	[79,26; 80,12]	[78,04; 78,92]	
	männliche Patienten insgesamt	Anzahl	113351	88040	73383	63050	55111	49635	44958	42030	40030	38378	36843	35375	33628	32116	30707	29278	27932	26736	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	135902	106668	88824	76055	66610	59789	54072	50296	47921	45906	43997	40464	37812	35672	33680	31797	30052	28510	
	auswertbar	Anzahl		97356	85675	73873	65083	58301	52785	48332	46308	43690	41189	38315	35979	33858	31953	30096	28384	26755	
erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		830	764	497	354	258	223	188	187	172	1925	838	639	548	511	493	402	398		
	Anteil in %		0,85	0,89	0,67	0,54	0,44	0,42	0,39	0,40	0,39	4,67	2,19	1,78	1,62	1,60	1,64	1,42	1,49		
	CI Anteil in %		[0,79; 0,91]	[0,83; 0,95]	[0,61; 0,73]	[0,49; 0,60]	[0,39; 0,50]	[0,37; 0,48]	[0,33; 0,44]	[0,35; 0,46]	[0,33; 0,45]	[4,47; 4,88]	[2,04; 2,33]	[1,64; 1,91]	[1,48; 1,75]	[1,46; 1,74]	[1,49; 1,78]	[1,28; 1,55]	[1,34; 1,63]		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,20	98,33	97,68	97,16	96,73	96,33	95,96	95,58	95,21	90,88	88,91	87,35	85,94	84,58	83,20	82,03	80,81		
	CI		[99,15; 99,25]	[98,25; 98,41]	[97,58; 97,78]	[97,05; 97,27]	[96,61; 96,85]	[96,20; 96,46]	[95,82; 96,10]	[95,43; 95,73]	[95,05; 95,37]	[90,64; 91,12]	[88,64; 89,18]	[87,06; 87,64]	[85,63; 86,25]	[84,25; 84,91]	[82,86; 83,54]	[81,67; 82,39]	[80,44; 81,18]		
weibliche Patienten insgesamt	Anzahl	142866	112069	93979	81049	71389	64294	58333	54388	51899	49824	47865	45920	43703	41770	39917	38116	36445	34887		

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	92465	83963	76832	71579	65044	59624	55467	51738	48570	45727	43186									
	auswertbar	Anzahl		80770	72425	66369	61254	56548	52575	49137	46003	43282	40721									
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		579	375	2548	1325	900	804	710	670	600	525									
		Anteil in %		0,72	0,52	3,84	2,16	1,59	1,53	1,44	1,46	1,39	1,29									
		CI Anteil in %		[0,66; 0,78]	[0,47; 0,57]	[3,69; 3,99]	[2,05; 2,28]	[1,49; 1,69]	[1,42; 1,63]	[1,34; 1,55]	[1,35; 1,57]	[1,28; 1,50]	[1,18; 1,40]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,30	98,80	95,14	93,12	91,66	90,27	88,98	87,70	86,50	85,38									
		CI		[99,24; 99,36]	[98,72; 98,88]	[94,98; 95,30]	[92,93; 93,31]	[91,45; 91,87]	[90,04; 90,50]	[88,74; 89,22]	[87,44; 87,96]	[86,23; 86,77]	[85,10; 85,66]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	99014	89881	82685	77270	72667	67791	63825	60171	57039	54287	51740									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	105512	97013	89512	83703	76711	70726	66103	61925	58127	54770	51869									
	auswertbar	Anzahl		93506	84568	77867	72419	67188	62804	58824	55121	51903	48907									
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		556	351	2416	1375	915	820	766	764	635	589									
		Anteil in %		0,59	0,42	3,10	1,90	1,36	1,31	1,30	1,39	1,22	1,20									
		CI Anteil in %		[0,55; 0,64]	[0,37; 0,46]	[2,98; 3,22]	[1,80; 2,00]	[1,27; 1,45]	[1,22; 1,39]	[1,21; 1,39]	[1,29; 1,48]	[1,13; 1,32]	[1,11; 1,30]									
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,42	99,02	96,05	94,25	92,98	91,78	90,60	89,36	88,28	87,21										
	CI		[99,37; 99,47]	[98,96; 99,08]	[95,92; 96,18]	[94,09; 94,41]	[92,80; 93,16]	[91,59; 91,97]	[90,39; 90,81]	[89,14; 89,58]	[88,04; 88,52]	[86,96; 87,46]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	112214	103094	95513	89490	84285	78956	74566	70528	66810	63554	60660										
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	85464	78006	71701	64530	58443	54139	50319	47054	44207	41787										
	auswertbar	Anzahl		73710	65784	60215	55088	51063	47448	44234	41601	39030										
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		582	2426	1358	874	779	663	640	486	510										
		Anteil in %		0,79	3,69	2,26	1,59	1,53	1,40	1,45	1,17	1,31										
		CI Anteil in %		[0,73; 0,85]	[3,54; 3,83]	[2,14; 2,37]	[1,48; 1,69]	[1,42; 1,63]	[1,29; 1,50]	[1,34; 1,56]	[1,06; 1,27]	[1,19; 1,42]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,23	95,71	93,59	92,12	90,74	89,49	88,21	87,18	86,05										
		CI		[99,17; 99,29]	[95,56; 95,86]	[93,41; 93,77]	[91,91; 92,33]	[90,52; 90,96]	[89,25; 89,73]	[87,95; 88,47]	[86,91; 87,45]	[85,77; 86,33]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	91596	83563	77239	71824	66295	62188	58456	55185	52404	49931										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	96920	89339	82848	75511	69142	64304	60077	56301	53126	50281										
	auswertbar	Anzahl		84644	75923	70446	65117	60566	56551	52971	49941	46928										
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		507	2259	1222	890	783	700	669	570	480										
		Anteil in %		0,60	2,98	1,73	1,37	1,29	1,24	1,26	1,14	1,02										
		CI Anteil in %		[0,55; 0,65]	[2,85; 3,10]	[1,64; 1,83]	[1,28; 1,46]	[1,20; 1,38]	[1,15; 1,33]	[1,17; 1,36]	[1,05; 1,23]	[0,93; 1,11]										
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,42	96,57	94,92	93,64	92,45	91,32	90,18	89,16	88,25											
	CI		[99,37; 99,47]	[96,44; 96,70]	[94,77; 95,07]	[93,47; 93,81]	[92,26; 92,64]	[91,11; 91,53]	[89,96; 90,40]	[88,93; 89,39]	[88,01; 88,49]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	103138	94970	88402	82599	76730	72106	67962	64210	61071	58214											
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	93443	85709	76497	68005	62290	57570	53666	50165	47235											
	auswertbar	Anzahl		80291	72000	65110	59786	55444	51652	48292	45258											
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		2673	1509	977	917	730	776	542	561											
		Anteil in %		3,33	2,10	1,50	1,53	1,32	1,50	1,12	1,24											
		CI Anteil in %		[3,21; 3,45]	[1,99; 2,20]	[1,41; 1,59]	[1,44; 1,63]	[1,22; 1,41]	[1,40; 1,61]	[1,03; 1,22]	[1,14; 1,34]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,79	94,80	93,39	91,98	90,79	89,44	88,44	87,35											
		CI		[96,67; 96,91]	[94,65; 94,95]	[93,22; 93,56]	[91,79; 92,17]	[90,58; 91,00]	[89,21; 89,67]	[88,20; 88,68]	[87,10; 87,60]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	99599	91318	84016	76089	70582	66047	62158	58808	55783											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	103897	96372	87005	78076	72181	67108	62858	58990	55768											
	auswertbar	Anzahl		90662	82284	74930	69487	64784	60601	56950	53585											
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		2578	1526	944	895	758	792	578	643											
		Anteil in %		2,84	1,85	1,26	1,29	1,17	1,31	1,01	1,20											
		CI Anteil in %		[2,74; 2,95]	[1,76; 1,95]	[1,18; 1,34]	[1,20; 1,37]	[1,09; 1,25]	[1,22; 1,40]	[0,93; 1,10]	[1,11; 1,29]											
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,25	95,48	94,29	93,09	92,02	90,83	89,91	88,84												
	CI		[97,15; 97,35]	[95,34; 95,62]	[94,14; 94,44]	[92,92; 93,26]	[91,84; 92,20]	[90,63; 91,03]	[89,70; 90,12]	[88,62; 89,06]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	109903	101860	94292	85992	80277	75337	71223	67501	64228												

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	64489	58605	51130	46310	42539	39403	36759	34548												
	auswertbar	Anzahl		56329	49385	44816	41313	38291	35747	33465												
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1860	858	736	585	621	443	412												
		Anteil in %		3,30	1,74	1,64	1,42	1,62	1,24	1,23												
		CI Anteil in %		[3,15; 3,45]	[1,62; 1,85]	[1,52; 1,76]	[1,30; 1,53]	[1,50; 1,75]	[1,12; 1,35]	[1,11; 1,35]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,76	95,10	93,56	92,25	90,77	89,66	88,55												
		CI		[96,62; 96,90]	[94,92; 95,28]	[93,35; 93,77]	[92,02; 92,48]	[90,51; 91,03]	[89,39; 89,93]	[88,26; 88,84]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71314	65439	58058	52998	49110	45665	42833	40400												
	auswertbar	Anzahl		62998	56162	51432	47839	44446	41731	39194												
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1732	856	731	644	621	477	466												
		Anteil in %		2,75	1,52	1,42	1,35	1,40	1,14	1,19												
		CI Anteil in %		[2,62; 2,88]	[1,42; 1,63]	[1,32; 1,52]	[1,24; 1,45]	[1,29; 1,51]	[1,04; 1,25]	[1,08; 1,30]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,30	95,84	94,49	93,24	91,95	90,91	89,82												
		CI		[97,17; 97,43]	[95,68; 96,00]	[94,31; 94,67]	[93,04; 93,44]	[91,72; 92,18]	[90,67; 91,15]	[89,56; 90,08]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>													
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	69052	61682	54315	49164	45320	42048	39385													
	auswertbar	Anzahl		59715	52663	47840	44124	40934	38272													
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1602	931	665	634	511	479													
		Anteil in %		2,68	1,77	1,39	1,44	1,25	1,25													
		CI Anteil in %		[2,55; 2,81]	[1,66; 1,88]	[1,29; 1,49]	[1,33; 1,55]	[1,14; 1,36]	[1,14; 1,36]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,36	95,66	94,35	93,01	91,86	90,71													
		CI		[97,23; 97,49]	[95,49; 95,83]	[94,16; 94,54]	[92,79; 93,23]	[91,63; 92,09]	[90,46; 90,96]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74038	66957	59781	54565	50481	47058	44340													
	auswertbar	Anzahl		64935	58103	53120	49220	46053	43228													
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1501	865	670	679	504	504													
		Anteil in %		2,31	1,49	1,26	1,38	1,09	1,17													
		CI Anteil in %		[2,20; 2,43]	[1,39; 1,59]	[1,17; 1,36]	[1,28; 1,48]	[1,00; 1,19]	[1,06; 1,27]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,72	96,29	95,09	93,79	92,77	91,69													
		CI		[97,61; 97,83]	[96,14; 96,44]	[94,92; 95,26]	[93,60; 93,98]	[92,56; 92,98]	[91,46; 91,92]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>														
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63263	56734	49832	45103	41620	38828														
	auswertbar	Anzahl		55064	48337	43790	40576	37687														
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1460	768	691	485	498														
		Anteil in %		2,65	1,59	1,58	1,20	1,32														
		CI Anteil in %		[2,52; 2,79]	[1,48; 1,70]	[1,46; 1,69]	[1,09; 1,30]	[1,21; 1,44]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,39	95,86	94,37	93,25	92,02														
		CI		[97,26; 97,52]	[95,69; 96,03]	[94,17; 94,57]	[93,03; 93,47]	[91,78; 92,26]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68936	62522	55791	50959	47072	43974														
	auswertbar	Anzahl		60937	54170	49553	45946	42867														
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1355	805	743	501	496														
		Anteil in %		2,22	1,49	1,50	1,09	1,16														
		CI Anteil in %		[2,11; 2,34]	[1,38; 1,59]	[1,39; 1,61]	[1,00; 1,19]	[1,06; 1,26]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,81	96,37	94,94	93,92	92,83														
		CI		[97,69; 97,93]	[96,22; 96,52]	[94,76; 95,12]	[93,72; 94,12]	[92,61; 93,05]														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>															

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72427	65091	57654	52381	48467														
	auswertbar	Anzahl		63335	55996	51010	47167														
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1554	948	715	637														
		Anteil in %			2,45	1,69	1,40	1,35													
		CI Anteil in %			[2,33; 2,57]	[1,59; 1,80]	[1,30; 1,50]	[1,25; 1,45]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,58	95,95	94,62	93,34														
		CI			[97,46; 97,70]	[95,79; 96,11]	[94,44; 94,80]	[93,14; 93,54]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	76783	70019	62930	57709	53743														
	auswertbar	Anzahl		68284	61319	56404	52411														
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1435	937	641	678														
		Anteil in %			2,10	1,53	1,14	1,29													
		CI Anteil in %			[1,99; 2,21]	[1,43; 1,63]	[1,05; 1,22]	[1,20; 1,39]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,93	96,45	95,36	94,13														
CI				[97,82; 98,04]	[96,31; 96,59]	[95,20; 95,52]	[93,95; 94,31]														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>															
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	65049	58634	51935	47456															
	auswertbar	Anzahl		57229	50597	46086															
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1453	769	663															
		Anteil in %			2,54	1,52	1,44														
		CI Anteil in %			[2,41; 2,67]	[1,41; 1,63]	[1,33; 1,55]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,49	96,03	94,64															
		CI			[97,36; 97,62]	[95,87; 96,19]	[94,45; 94,83]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	70166	64019	57360	52674															
	auswertbar	Anzahl		62655	55979	51348															
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1416	790	668															
		Anteil in %			2,26	1,41	1,30														
		CI Anteil in %			[2,14; 2,38]	[1,31; 1,51]	[1,20; 1,40]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,76	96,40	95,14															
CI				[97,64; 97,88]	[96,25; 96,55]	[94,97; 95,31]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	70475	63314	56309																
	auswertbar	Anzahl		61739	54570																
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1467	874																
		Anteil in %			2,38	1,60															
		CI Anteil in %			[2,26; 2,50]	[1,50; 1,71]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,65	96,09																
		CI			[97,53; 97,77]	[95,93; 96,25]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	76131	69497	62641																
	auswertbar	Anzahl		67961	60839																
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1384	837																
		Anteil in %			2,04	1,38															
		CI Anteil in %			[1,93; 2,14]	[1,28; 1,47]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,98	96,64																
CI				[97,87; 98,09]	[96,50; 96,78]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																	

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63697	57566																			
	auswertbar	Anzahl		55972																			
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1312																			
		Anteil in %			2,34																		
		CI Anteil in %			[2,22; 2,47]																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			97,66																		
		CI			[97,53; 97,79]																		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>67230</i>	<i>60721</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	69367	63727																			
	auswertbar	Anzahl		62065																			
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		1291																			
		Anteil in %			2,08																		
		CI Anteil in %			[1,97; 2,19]																		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			97,92																			
	CI			[97,81; 98,03]																			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>72465</i>	<i>66497</i>																			
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71008																				
	auswertbar	Anzahl																					
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																					
		CI																					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>74714</i>																			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74595																				
	auswertbar	Anzahl																					
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																						
	CI																						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>77879</i>																				

In Tabelle 3.5.3 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **ein erheblich auffälliger Fußstatus** (definiert als erstmalig vermerkte Wagner-Stadien 2 bis 5 oder Armstrong-Stadien C bis D) dokumentiert war. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation kein auffälliger oder ein leicht auffälliger Fußstatus vorlag. Dieser Status ist wie folgt definiert: Keine Amputationen und unauffälliger Fußstatus und keine Angaben zu Wagner-oder Armstrong-Stadien oder Wagner-Stadien 0 bis 1 oder Armstrong-Stadien A bis B. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ **nach Kaplan-Meier**“ dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. bei welchem Anteil im Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert ist (Wagner-Stadium 2 bis 5 oder Armstrong-Stadium C bis D).

Tabelle 3.5.3 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	16481	13729	11830	10369	9285	8417	7746	6868	6458	6014	5763	5489	5223	4949	4680	4436	4159	3956	3762	
	auswertbar	Anzahl		11681	11110	8558	7877	7221	6577	5759	5322	4908	4768	4433	4180	3854	3637	3434	3253	3054	2893	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		48	42	37	18	30	20	16	8	12	9	14	10	9	10	8	13	15	10	
		Anteil in %		0,41	0,38	0,43	0,23	0,42	0,30	0,28	0,15	0,24	0,19	0,32	0,24	0,23	0,27	0,23	0,40	0,49	0,35	
		CI Anteil in %		[0,29; 0,53]	[0,26; 0,49]	[0,29; 0,57]	[0,12; 0,33]	[0,27; 0,56]	[0,17; 0,44]	[0,14; 0,41]	[0,05; 0,25]	[0,11; 0,38]	[0,07; 0,31]	[0,15; 0,48]	[0,09; 0,39]	[0,08; 0,39]	[0,10; 0,45]	[0,07; 0,39]	[0,18; 0,62]	[0,24; 0,74]	[0,13; 0,56]	
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		48	42	29	16	26	20	13	8	11	9	10	7	8	6	8	12	14	7	
		Anteil in %		100,00	100,00	78,38	88,89	86,67	100,00	81,25	100,00	91,67	100,00	71,43	70,00	88,89	60,00	100,00	92,31	93,33	70,00	
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[64,93; 91,83]	[73,95; 100,00]	[74,29; 99,04]	[100,00; 100,00]	[61,50; 100,00]	[100,00; 100,00]	[75,33; 100,00]	[100,00; 100,00]	[46,87; 95,99]	[40,06; 99,94]	[67,11; 100,00]	[27,99; 92,01]	[100,00; 100,00]	[77,23; 100,00]	[80,27; 100,00]	[40,06; 99,94]	
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		0	0	13	9	12	8	8	2	7	4	8	4	4	5	0	4	5	5	
		Anteil in %		0,00	0,00	35,14	50,00	40,00	50,00	25,00	58,33	44,44	57,14	40,00	44,44	50,00	0,00	30,77	33,33	50,00		
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[19,54; 50,73]	[26,23; 73,77]	[22,17; 57,83]	[17,97; 62,03]	[24,70; 75,30]	[0,00; 57,08]	[29,20; 87,47]	[10,01; 78,88]	[30,24; 84,04]	[7,99; 72,01]	[10,01; 78,88]	[17,33; 82,67]	[0,00; 0,00]	[4,66; 56,88]	[8,64; 58,03]	[17,33; 82,67]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,64	99,28	98,90	98,70	98,34	98,07	97,83	97,70	97,49	97,33	97,06	96,86	96,67	96,44	96,25	95,91	95,49	95,16	
		CI		[99,54; 99,74]	[99,13; 99,43]	[98,71; 99,09]	[98,49; 98,91]	[98,09; 98,59]	[97,80; 98,34]	[97,53; 98,13]	[97,39; 98,01]	[97,16; 97,82]	[96,98; 97,68]	[96,69; 97,43]	[96,47; 97,25]	[96,26; 97,08]	[96,01; 96,87]	[95,80; 96,70]	[95,42; 96,40]	[94,96; 96,02]	[94,59; 95,73]	
		<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	40324	33856	29378	25894	23381	21351	19757	17558	16478	15392	14743	13959	13286	12557	11874	11241	10574	10076	9605
		weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	23160	19569	17035	15062	13650	12514	11593	10299	9647	9031	8633	8153	7752	7311	6912	6541	6166	5876	5593
		auswertbar	Anzahl		16711	16036	12530	11517	10643	9689	8654	7928	7368	7054	6487	6200	5752	5406	5078	4777	4520	4265
		erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		40	29	32	18	14	18	10	11	7	8	9	7	3	11	6	10	5	7
			Anteil in %		0,24	0,18	0,26	0,16	0,13	0,19	0,12	0,14	0,10	0,11	0,14	0,11	0,05	0,20	0,12	0,21	0,11	0,16
			CI Anteil in %		[0,17; 0,31]	[0,12; 0,25]	[0,17; 0,34]	[0,08; 0,23]	[0,06; 0,20]	[0,10; 0,27]	[0,04; 0,19]	[0,06; 0,22]	[0,02; 0,17]	[0,03; 0,19]	[0,05; 0,23]	[0,03; 0,20]	[0,00; 0,11]	[0,08; 0,32]	[0,02; 0,21]	[0,08; 0,34]	[0,01; 0,21]	[0,04; 0,29]
		davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		40	29	27	12	14	15	10	10	6	7	7	5	3	11	3	8	2	6
			Anteil in %		100,00	100,00	84,38	66,67	100,00	83,33	100,00	90,91	85,71	87,50	77,78	71,43	100,00	100,00	50,00	80,00	40,00	85,71
			CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[71,59; 97,16]	[44,26; 89,08]	[100,00; 100,00]	[65,62; 100,00]	[100,00; 100,00]	[73,09; 100,00]	[57,71; 100,00]	[63,00; 100,00]	[48,97; 100,00]	[35,28; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[6,17; 93,83]	[53,87; 100,00]	[0,00; 88,01]	[57,71; 100,00]
		davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		0	0	12	8	1	7	3	4	2	3	4	5	1	2	3	5	3	3
	Anteil in %			0,00	0,00	37,50	44,44	7,14	38,89	30,00	36,36	28,57	37,50	44,44	71,43	33,33	18,18	50,00	50,00	60,00	42,86	
	CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[20,46; 54,54]	[20,82; 68,07]	[0,00; 21,14]	[15,71; 62,06]	[0,06; 59,94]	[6,55; 66,18]	[0,00; 64,72]	[1,64; 73,36]	[10,01; 78,88]	[35,28; 100,00]	[0,00; 98,67]	[0,00; 42,09]	[6,17; 93,83]	[17,33; 82,67]	[11,99; 100,00]	[3,26; 82,46]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,79	99,61	99,39	99,26	99,14	98,98	98,88	98,76	98,68	98,58	98,46	98,36	98,32	98,15	98,05	97,87	97,77	97,61	
		CI		[99,72; 99,86]	[99,52; 99,70]	[99,27; 99,51]	[99,13; 99,39]	[98,99; 99,29]	[98,81; 99,15]	[98,70; 99,06]	[98,57; 98,95]	[98,48; 98,88]	[98,37; 98,79]	[98,24; 98,68]	[98,13; 98,59]	[98,08; 98,56]	[97,89; 98,41]	[97,78; 98,32]	[97,58; 98,16]	[97,47; 98,07]	[97,28; 97,94]	
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	40324	33856	29378	25894	23381	21351	19757	17558	16478	15392	14743	13959	13286	12557	11874	11241	10574	10076	9605	

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	110223	85784	71305	61097	53302	47952	43398	40559	38575	36929	35420	33931	32221	30771	29396	28004	26701	25524
	auswertbar	Anzahl		77714	60936	52698	45935	41249	36980	34206	32090	30341	28444	27479	25828	24819	23387	22285	21073	20142
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		427	363	192	146	114	81	99	97	79	114	101	50	67	75	65	67	67
		Anteil in %		0,55	0,60	0,36	0,32	0,28	0,22	0,29	0,30	0,26	0,40	0,37	0,19	0,27	0,32	0,29	0,32	0,33
		CI Anteil in %		[0,50; 0,60]	[0,53; 0,66]	[0,31; 0,42]	[0,27; 0,37]	[0,23; 0,33]	[0,17; 0,27]	[0,23; 0,35]	[0,24; 0,36]	[0,20; 0,32]	[0,33; 0,47]	[0,30; 0,44]	[0,14; 0,25]	[0,21; 0,33]	[0,25; 0,39]	[0,22; 0,36]	[0,24; 0,39]	[0,25; 0,41]
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		420	245	143	114	93	68	77	76	61	84	76	40	53	62	53	54	48
		Anteil in %		98,36	67,49	74,48	78,08	81,58	83,95	77,78	78,35	77,22	73,68	75,25	80,00	79,10	82,67	81,54	80,60	71,64
		CI Anteil in %		[97,15; 99,57]	[62,67; 72,32]	[68,30; 80,66]	[71,35; 84,82]	[74,43; 88,73]	[75,91; 91,99]	[69,55; 86,01]	[70,11; 86,59]	[67,91; 86,52]	[65,57; 81,80]	[66,79; 83,71]	[68,80; 91,20]	[69,30; 88,91]	[74,04; 91,29]	[72,03; 91,04]	[71,06; 90,14]	[60,77; 82,52]
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		8	168	82	67	56	32	48	39	41	62	48	29	32	32	27	33	37
		Anteil in %		1,87	46,28	42,71	45,89	49,12	39,51	48,48	40,21	51,90	54,39	47,52	58,00	47,76	42,67	41,54	49,25	55,22
		CI Anteil in %		[0,59; 3,16]	[41,14; 51,42]	[35,69; 49,72]	[37,78; 54,00]	[39,91; 58,34]	[28,79; 50,22]	[38,59; 58,38]	[30,40; 50,01]	[40,81; 62,99]	[45,20; 63,57]	[37,74; 57,31]	[44,18; 71,82]	[35,71; 59,81]	[31,40; 53,94]	[29,47; 53,61]	[37,19; 61,32]	[43,23; 67,22]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,48	98,95	98,63	98,35	98,10	97,91	97,66	97,41	97,18	96,85	96,53	96,37	96,14	95,87	95,61	95,33	95,02
		CI		[99,43; 99,53]	[98,88; 99,02]	[98,54; 98,72]	[98,25; 98,45]	[97,99; 98,21]	[97,80; 98,02]	[97,54; 97,78]	[97,28; 97,54]	[97,04; 97,32]	[96,70; 97,00]	[96,36; 96,70]	[96,20; 96,54]	[95,96; 96,32]	[95,68; 96,06]	[95,41; 95,81]	[95,12; 95,54]	[94,80; 95,24]
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>256217</i>	<i>200109</i>	<i>167362</i>	<i>144099</i>	<i>126500</i>	<i>113929</i>	<i>103291</i>	<i>96418</i>	<i>91929</i>	<i>88202</i>	<i>84708</i>	<i>81295</i>	<i>77331</i>	<i>73886</i>	<i>70624</i>	<i>67394</i>	<i>64377</i>	<i>61623</i>
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	140966	110762	92675	79719	70136	63107	57212	53333	50851	48765	46845	44904	42701	40826	38990	37227	35587	34032
	auswertbar	Anzahl		101032	79011	68710	60428	54293	48702	44971	42340	40160	37586	36234	34253	32719	31083	29700	28042	26615
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		363	354	174	118	112	89	74	92	64	81	58	45	50	41	47	56	36
		Anteil in %		0,36	0,45	0,25	0,20	0,21	0,18	0,16	0,22	0,16	0,22	0,16	0,13	0,15	0,13	0,16	0,20	0,14
		CI Anteil in %		[0,32; 0,40]	[0,40; 0,49]	[0,22; 0,29]	[0,16; 0,23]	[0,17; 0,24]	[0,14; 0,22]	[0,13; 0,20]	[0,17; 0,26]	[0,12; 0,20]	[0,17; 0,26]	[0,12; 0,20]	[0,09; 0,17]	[0,11; 0,20]	[0,09; 0,17]	[0,11; 0,20]	[0,15; 0,25]	[0,09; 0,18]
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		359	235	124	85	92	69	69	73	49	60	39	30	36	29	26	40	20
		Anteil in %		98,90	66,38	71,26	72,03	82,14	77,53	93,24	79,35	76,56	74,07	67,24	66,67	72,00	70,73	55,32	71,43	55,56
		CI Anteil in %		[97,82; 99,97]	[61,46; 71,31]	[64,52; 78,01]	[63,90; 80,17]	[75,02; 89,27]	[68,81; 86,25]	[87,49; 99,00]	[71,03; 87,67]	[66,10; 87,02]	[64,47; 83,68]	[55,06; 79,43]	[52,74; 80,60]	[59,43; 84,57]	[56,63; 84,83]	[40,95; 69,69]	[59,49; 83,37]	[39,09; 72,02]
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		5	164	71	51	43	40	15	34	31	38	27	25	25	23	29	30	24
		Anteil in %		1,38	46,33	40,80	43,22	38,39	44,94	20,27	36,96	48,44	46,91	46,55	55,56	50,00	56,10	61,70	53,57	66,67
		CI Anteil in %		[0,18; 2,58]	[41,13; 51,53]	[33,48; 48,13]	[34,24; 52,20]	[29,35; 47,44]	[34,55; 55,34]	[11,05; 29,49]	[27,04; 46,87]	[36,10; 60,78]	[35,98; 57,85]	[33,60; 59,50]	[40,87; 70,24]	[36,00; 64,00]	[40,72; 71,48]	[47,65; 75,75]	[40,39; 66,75]	[51,05; 82,28]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,66	99,26	99,04	98,86	98,68	98,52	98,38	98,19	98,06	97,87	97,73	97,62	97,49	97,38	97,24	97,06	96,93
		CI		[99,63; 99,69]	[99,21; 99,31]	[98,98; 99,10]	[98,79; 98,93]	[98,60; 98,76]	[98,44; 98,60]	[98,29; 98,47]	[98,09; 98,29]	[97,96; 98,16]	[97,76; 97,98]	[97,61; 97,85]	[97,50; 97,74]	[97,36; 97,62]	[97,25; 97,51]	[97,10; 97,38]	[96,92; 97,20]	[96,78; 97,08]
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>256217</i>	<i>200109</i>	<i>167362</i>	<i>144099</i>	<i>126500</i>	<i>113929</i>	<i>103291</i>	<i>96418</i>	<i>91929</i>	<i>88202</i>	<i>84708</i>	<i>81295</i>	<i>77331</i>	<i>73886</i>	<i>70624</i>	<i>67394</i>	<i>64377</i>	<i>61623</i>	

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	130539	113490	99913	87663	79688	73103	68399	65352	62591	60055	57576	54941	52611	50303	48028	45955	43924	
	auswertbar	Anzahl		99942	85643	73151	68187	61975	57105	54152	51037	48223	46595	44061	42367	39945	38192	36789	35095	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		819	432	313	228	210	165	185	135	212	178	148	139	86	134	116	98	
		Anteil in %		0,82	0,50	0,43	0,33	0,34	0,29	0,34	0,26	0,44	0,38	0,34	0,33	0,22	0,35	0,32	0,28	
		CI Anteil in %		[0,76; 0,88]	[0,46; 0,55]	[0,38; 0,48]	[0,29; 0,38]	[0,29; 0,38]	[0,24; 0,33]	[0,29; 0,39]	[0,22; 0,31]	[0,38; 0,50]	[0,33; 0,44]	[0,28; 0,39]	[0,27; 0,38]	[0,17; 0,26]	[0,29; 0,41]	[0,26; 0,37]	[0,22; 0,33]	
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		661	336	240	180	174	133	148	111	159	131	119	112	63	100	82	76	
		Anteil in %		80,71	77,78	76,68	78,95	82,86	80,61	80,00	82,22	75,00	73,60	80,41	80,58	73,26	74,63	70,69	77,55	
		CI Anteil in %		[78,00; 83,41]	[73,85; 81,70]	[71,98; 81,37]	[73,64; 84,25]	[77,75; 87,97]	[74,55; 86,66]	[74,22; 85,78]	[75,75; 88,70]	[69,16; 80,84]	[67,10; 80,09]	[73,99; 86,82]	[73,97; 87,18]	[63,85; 82,67]	[67,23; 82,02]	[62,37; 79,01]	[69,25; 85,85]	
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		320	180	139	104	87	74	80	56	111	92	75	75	46	79	66	55	
		Anteil in %		39,07	41,67	44,41	45,61	41,43	44,85	43,24	41,48	52,36	51,69	50,68	53,96	53,49	58,96	56,90	56,12	
		CI Anteil in %		[35,73; 42,42]	[37,01; 46,32]	[38,90; 49,92]	[39,13; 52,09]	[34,75; 48,11]	[37,24; 52,46]	[36,08; 50,40]	[33,14; 49,82]	[45,62; 59,10]	[44,32; 59,05]	[42,59; 58,76]	[45,64; 62,27]	[42,88; 64,09]	[50,59; 67,32]	[47,85; 65,95]	[46,25; 66,00]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,25	98,80	98,43	98,13	97,84	97,59	97,30	97,08	96,70	96,38	96,09	95,82	95,63	95,33	95,05	94,79	
		CI		[99,20; 99,30]	[98,73; 98,87]	[98,35; 98,51]	[98,04; 98,22]	[97,75; 97,93]	[97,49; 97,69]	[97,19; 97,41]	[96,96; 97,20]	[96,57; 96,83]	[96,25; 96,51]	[95,95; 96,23]	[95,67; 95,97]	[95,48; 95,78]	[95,17; 95,49]	[94,88; 95,22]	[94,61; 94,97]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>298545</i>	<i>260083</i>	<i>230730</i>	<i>203632</i>	<i>185595</i>	<i>170592</i>	<i>159817</i>	<i>152975</i>	<i>146779</i>	<i>141146</i>	<i>135447</i>	<i>129238</i>	<i>123708</i>	<i>118414</i>	<i>113021</i>	<i>108215</i>	<i>103722</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	160532	140367	124313	109899	100160	92090	86258	82599	79234	76257	73037	69575	66491	63640	60774	58187	55837	
	auswertbar	Anzahl		123776	106331	91491	85612	77961	71789	68173	64562	60987	58588	55423	53208	50188	48069	46470	44275	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		741	362	267	218	174	151	147	138	206	149	105	119	78	89	102	82	
		Anteil in %		0,60	0,34	0,29	0,25	0,22	0,21	0,22	0,21	0,34	0,25	0,19	0,22	0,16	0,19	0,22	0,19	
		CI Anteil in %		[0,56; 0,64]	[0,31; 0,38]	[0,26; 0,33]	[0,22; 0,29]	[0,19; 0,26]	[0,18; 0,24]	[0,18; 0,25]	[0,18; 0,25]	[0,29; 0,38]	[0,21; 0,30]	[0,15; 0,23]	[0,18; 0,26]	[0,12; 0,19]	[0,15; 0,22]	[0,18; 0,26]	[0,15; 0,23]	
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		579	264	204	163	138	119	113	108	156	104	77	90	56	60	63	54	
		Anteil in %		78,14	72,93	76,40	74,77	79,31	78,81	76,87	78,26	75,73	69,80	73,33	75,63	71,79	67,42	61,76	65,85	
		CI Anteil in %		[75,16; 81,12]	[68,34; 77,51]	[71,30; 81,51]	[68,99; 80,55]	[73,27; 85,35]	[72,27; 85,35]	[70,03; 83,71]	[71,35; 85,17]	[69,86; 81,60]	[62,40; 77,20]	[64,83; 81,83]	[67,88; 83,38]	[61,74; 81,85]	[57,62; 77,21]	[52,29; 71,24]	[55,53; 76,18]	
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		283	151	114	90	75	64	61	55	104	75	55	62	38	46	54	48	
		Anteil in %		38,19	41,71	42,70	41,28	43,10	42,38	41,50	39,86	50,49	50,34	52,38	52,10	48,72	51,69	52,94	58,54	
		CI Anteil in %		[34,69; 41,69]	[36,63; 46,80]	[36,75; 48,64]	[34,73; 47,84]	[35,72; 50,48]	[34,48; 50,29]	[33,50; 49,49]	[31,66; 48,05]	[43,64; 57,33]	[42,28; 58,39]	[42,78; 61,98]	[43,09; 61,11]	[37,55; 59,88]	[41,24; 62,13]	[43,21; 62,68]	[47,81; 69,27]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,45	99,15	98,89	98,67	98,47	98,29	98,11	97,92	97,64	97,42	97,26	97,07	96,93	96,77	96,57	96,40	
		CI		[99,41; 99,49]	[99,10; 99,20]	[98,83; 98,95]	[98,60; 98,74]	[98,40; 98,54]	[98,21; 98,37]	[98,03; 98,19]	[97,83; 98,01]	[97,54; 97,74]	[97,32; 97,52]	[97,15; 97,37]	[96,96; 97,18]	[96,81; 97,05]	[96,65; 96,89]	[96,44; 96,70]	[96,27; 96,53]	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>298545</i>	<i>260083</i>	<i>230730</i>	<i>203632</i>	<i>185595</i>	<i>170592</i>	<i>159817</i>	<i>152975</i>	<i>146779</i>	<i>141146</i>	<i>135447</i>	<i>129238</i>	<i>123708</i>	<i>118414</i>	<i>113021</i>	<i>108215</i>	<i>103722</i>		

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2004-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	87413	77247	67171	59595	53599	49667	47317	45205	43294	41429	39433	37638	36076	34426	32942	31525				
	auswertbar	Anzahl		67196	58034	51478	46375	41875	39755	36756	34713	33129	31480	30017	28546	27145	25986	24470				
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		423	226	169	131	108	93	93	130	96	96	73	77	91	61	62				
		Anteil in %		0,63	0,39	0,33	0,28	0,26	0,23	0,25	0,37	0,29	0,30	0,24	0,27	0,34	0,23	0,25				
		CI Anteil in %		[0,57; 0,69]	[0,34; 0,44]	[0,28; 0,38]	[0,23; 0,33]	[0,21; 0,31]	[0,19; 0,28]	[0,20; 0,30]	[0,31; 0,44]	[0,23; 0,35]	[0,24; 0,37]	[0,19; 0,30]	[0,21; 0,33]	[0,27; 0,40]	[0,18; 0,29]	[0,19; 0,32]				
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		347	192	140	114	86	81	77	107	69	73	57	59	70	49	45				
		Anteil in %		82,03	84,96	82,84	87,02	79,63	87,10	82,80	82,31	71,88	76,04	78,08	76,62	76,92	80,33	72,58				
		CI Anteil in %		[78,37; 85,70]	[80,28; 89,63]	[77,14; 88,54]	[81,25; 92,80]	[72,00; 87,26]	[80,25; 93,95]	[75,08; 90,51]	[75,72; 88,89]	[62,83; 80,92]	[67,46; 84,62]	[68,53; 87,64]	[67,11; 86,14]	[68,22; 85,63]	[70,27; 90,39]	[61,39; 83,78]				
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		163	99	78	51	50	37	42	55	53	46	38	40	49	31	37				
		Anteil in %		38,53	43,81	46,15	38,93	46,30	39,78	45,16	42,31	55,21	47,92	52,05	51,95	53,85	50,82	59,68				
		CI Anteil in %		[33,89; 43,18]	[37,32; 50,29]	[38,62; 53,69]	[30,55; 47,31]	[36,85; 55,74]	[29,78; 49,79]	[34,99; 55,33]	[33,78; 50,83]	[45,21; 65,21]	[37,87; 57,96]	[40,52; 63,59]	[40,72; 63,18]	[43,55; 64,15]	[38,17; 63,47]	[47,37; 71,99]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,43	99,08	98,78	98,53	98,30	98,10	97,88	97,56	97,31	97,05	96,83	96,60	96,31	96,10	95,85				
		CI		[99,38; 99,48]	[99,01; 99,15]	[98,70; 98,86]	[98,44; 98,62]	[98,20; 98,40]	[97,99; 98,21]	[97,76; 98,00]	[97,43; 97,69]	[97,17; 97,45]	[96,90; 97,20]	[96,67; 96,99]	[96,44; 96,76]	[96,14; 96,48]	[95,92; 96,28]	[95,66; 96,04]				
		<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>214812</i>	<i>190173</i>	<i>166551</i>	<i>148305</i>	<i>133893</i>	<i>124516</i>	<i>118769</i>	<i>113509</i>	<i>108762</i>	<i>104211</i>	<i>99224</i>	<i>94777</i>	<i>90700</i>	<i>86623</i>	<i>82997</i>	<i>79454</i>			
		weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	103884	92438	81098	72300	65362	60853	58086	55533	53242	50944	48464	46333	44325	42355	40595	38846			
		auswertbar	Anzahl		80539	70301	62683	56590	51433	48893	45238	42725	40707	38729	36755	34981	33230	31949	30066			
		erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		330	168	133	100	81	91	84	122	94	57	55	62	71	53	50			
			Anteil in %		0,41	0,24	0,21	0,18	0,16	0,19	0,19	0,29	0,23	0,15	0,15	0,18	0,21	0,17	0,17			
			CI Anteil in %		[0,37; 0,45]	[0,20; 0,28]	[0,18; 0,25]	[0,14; 0,21]	[0,12; 0,19]	[0,15; 0,22]	[0,15; 0,23]	[0,23; 0,34]	[0,18; 0,28]	[0,11; 0,19]	[0,11; 0,19]	[0,13; 0,22]	[0,16; 0,26]	[0,12; 0,21]	[0,12; 0,21]			
		davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		282	142	108	86	69	70	74	98	66	42	42	45	51	44	36			
			Anteil in %		85,45	84,52	81,20	86,00	85,19	76,92	88,10	80,33	70,21	73,68	76,36	72,58	71,83	83,02	72,00			
			CI Anteil in %		[81,64; 89,26]	[79,04; 90,01]	[74,54; 87,87]	[79,16; 92,84]	[77,40; 92,97]	[68,22; 85,63]	[81,13; 95,06]	[73,24; 87,41]	[60,92; 79,51]	[62,15; 85,22]	[65,03; 87,70]	[61,39; 83,78]	[61,29; 82,37]	[72,81; 93,22]	[59,43; 84,57]			
		davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		108	59	61	39	29	43	31	61	54	31	26	34	35	25	25			
			Anteil in %		32,73	35,12	45,86	39,00	35,80	47,25	36,90	50,00	57,45	54,39	47,27	54,84	49,30	47,17	50,00			
			CI Anteil in %		[27,66; 37,80]	[27,88; 42,36]	[37,36; 54,37]	[29,39; 48,61]	[25,30; 46,31]	[36,94; 57,57]	[26,52; 47,29]	[41,09; 58,91]	[47,40; 67,50]	[41,34; 67,43]	[33,96; 60,59]	[42,35; 67,33]	[37,58; 61,01]	[33,60; 60,74]	[36,00; 64,00]			
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,63	99,41	99,22	99,06	98,92	98,76	98,60	98,35	98,15	98,02	97,89	97,73	97,54	97,39	97,23			
			CI		[99,59; 99,67]	[99,36; 99,46]	[99,16; 99,28]	[98,99; 99,13]	[98,85; 98,99]	[98,68; 98,84]	[98,51; 98,69]	[98,25; 98,45]	[98,04; 98,26]	[97,91; 98,13]	[97,77; 98,01]	[97,61; 97,85]	[97,41; 97,67]	[97,25; 97,53]	[97,09; 97,37]			
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>214812</i>	<i>190173</i>	<i>166551</i>	<i>148305</i>	<i>133893</i>	<i>124516</i>	<i>118769</i>	<i>113509</i>	<i>108762</i>	<i>104211</i>	<i>99224</i>	<i>94777</i>	<i>90700</i>	<i>86623</i>	<i>82997</i>	<i>79454</i>				

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	91762	81600	72324	64338	59270	55993	53285	50913	48429	45984	43902	41909	40066	38277	36631				
	auswertbar	Anzahl		71455	63342	55958	51098	47339	44508	41054	39696	37425	35768	33600	32292	30510	29077				
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		363	219	193	145	107	116	155	97	90	94	72	76	84	71				
		Anteil in %		0,51	0,35	0,34	0,28	0,23	0,26	0,38	0,24	0,24	0,26	0,21	0,24	0,28	0,24				
		CI Anteil in %		[0,46; 0,56]	[0,30; 0,39]	[0,30; 0,39]	[0,24; 0,33]	[0,18; 0,27]	[0,21; 0,31]	[0,32; 0,44]	[0,20; 0,29]	[0,19; 0,29]	[0,21; 0,32]	[0,16; 0,26]	[0,18; 0,29]	[0,22; 0,33]	[0,19; 0,30]				
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		299	176	153	125	85	104	128	76	79	70	56	58	65	54				
		Anteil in %		82,37	80,37	79,27	86,21	79,44	89,66	82,58	78,35	87,78	74,47	77,78	76,32	77,38	76,06				
		CI Anteil in %		[78,44; 86,29]	[75,09; 85,64]	[73,54; 85,01]	[80,57; 91,84]	[71,75; 87,13]	[84,09; 95,22]	[76,59; 88,57]	[70,11; 86,59]	[80,97; 94,58]	[65,61; 83,33]	[68,11; 87,45]	[66,69; 85,94]	[68,38; 86,38]	[66,06; 86,05]				
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		133	94	77	50	41	47	79	46	39	50	32	32	49	41				
		Anteil in %		36,64	42,92	39,90	34,48	38,32	40,52	50,97	47,42	43,33	53,19	44,44	42,11	58,33	57,75				
		CI Anteil in %		[31,68; 41,60]	[36,35; 49,49]	[32,97; 46,82]	[26,72; 42,25]	[29,06; 47,57]	[31,54; 49,49]	[43,07; 58,86]	[37,43; 57,41]	[33,04; 53,63]	[43,05; 63,33]	[32,89; 56,00]	[30,93; 53,28]	[47,73; 68,94]	[46,17; 69,32]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,54	99,22	98,92	98,66	98,47	98,24	97,92	97,70	97,49	97,26	97,08	96,87	96,62	96,39				
		CI		[99,49; 99,59]	[99,16; 99,28]	[98,84; 99,00]	[98,57; 98,75]	[98,38; 98,56]	[98,14; 98,34]	[97,81; 98,03]	[97,58; 97,82]	[97,36; 97,62]	[97,12; 97,40]	[96,94; 97,22]	[96,72; 97,02]	[96,46; 96,78]	[96,22; 96,56]				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>229101</i>	<i>204539</i>	<i>182837</i>	<i>163494</i>	<i>151059</i>	<i>143167</i>	<i>136474</i>	<i>130536</i>	<i>124500</i>	<i>118386</i>	<i>113053</i>	<i>107984</i>	<i>103198</i>	<i>98677</i>	<i>94446</i>				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	107981	97049	86952	77923	71988	68341	65185	62375	59508	56597	54083	51691	49429	47264	45234				
	auswertbar	Anzahl		85245	76118	67719	62047	57928	54380	50199	48644	45958	43818	41463	39624	37654	35907				
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		272	179	144	98	90	121	95	43	60	63	61	50	59					
		Anteil in %		0,32	0,24	0,21	0,16	0,16	0,15	0,24	0,20	0,09	0,14	0,15	0,16	0,13	0,16				
		CI Anteil in %		[0,28; 0,36]	[0,20; 0,27]	[0,18; 0,25]	[0,13; 0,19]	[0,12; 0,19]	[0,12; 0,18]	[0,20; 0,28]	[0,16; 0,23]	[0,07; 0,12]	[0,10; 0,17]	[0,11; 0,18]	[0,12; 0,20]	[0,10; 0,17]	[0,12; 0,21]				
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		223	147	116	79	72	71	88	76	33	48	42	48	34	41				
		Anteil in %		81,99	82,12	80,56	80,61	80,00	86,59	72,73	80,00	76,74	80,00	68,85	76,19	68,00	69,49				
		CI Anteil in %		[77,41; 86,56]	[76,49; 87,75]	[74,07; 87,04]	[72,74; 88,48]	[71,69; 88,31]	[79,16; 94,01]	[64,76; 80,70]	[71,91; 88,09]	[63,97; 89,52]	[69,79; 90,21]	[57,13; 80,57]	[65,59; 86,79]	[54,94; 81,06]	[57,64; 81,34]				
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		105	73	61	38	37	31	59	41	16	30	30	28	30	33				
		Anteil in %		38,60	40,78	42,36	38,78	41,11	37,80	48,76	43,16	37,21	50,00	49,18	44,44	60,00	55,93				
		CI Anteil in %		[32,81; 44,40]	[33,56; 48,00]	[34,26; 50,46]	[29,08; 48,47]	[30,89; 51,33]	[27,24; 48,36]	[39,82; 57,70]	[33,15; 53,17]	[22,59; 51,83]	[37,24; 62,76]	[36,53; 61,83]	[32,08; 56,81]	[46,28; 73,72]	[43,16; 68,71]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,71	99,50	99,30	99,16	99,03	98,90	98,69	98,52	98,43	98,31	98,19	98,04	97,92	97,76				
		CI		[99,68; 99,74]	[99,45; 99,55]	[99,24; 99,36]	[99,10; 99,22]	[98,96; 99,10]	[98,83; 98,97]	[98,61; 98,77]	[98,43; 98,61]	[98,34; 98,52]	[98,21; 98,41]	[98,09; 98,29]	[97,93; 98,15]	[97,81; 98,03]	[97,64; 97,88]				
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>229101</i>	<i>204539</i>	<i>182837</i>	<i>163494</i>	<i>151059</i>	<i>143167</i>	<i>136474</i>	<i>130536</i>	<i>124500</i>	<i>118386</i>	<i>113053</i>	<i>107984</i>	<i>103198</i>	<i>98677</i>	<i>94446</i>				

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	70368	63177	55922	50710	47576	45088	42855	40657	38439	36526	34756	33137	31625	30228					
	auswertbar	Anzahl		55627	49124	43608	40811	37955	35240	33620	31625	29912	28271	26942	25605	24406					
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		239	176	138	102	99	126	101	82	76	82	70	47	71					
		Anteil in %		0,43	0,36	0,32	0,25	0,26	0,36	0,30	0,26	0,25	0,29	0,26	0,18	0,29					
		CI Anteil in %		[0,38; 0,48]	[0,31; 0,41]	[0,26; 0,37]	[0,20; 0,30]	[0,21; 0,31]	[0,30; 0,42]	[0,24; 0,36]	[0,20; 0,32]	[0,20; 0,31]	[0,23; 0,35]	[0,20; 0,32]	[0,13; 0,24]	[0,22; 0,36]					
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		201	146	116	85	82	96	82	68	60	60	45	36	56					
		Anteil in %		84,10	82,95	84,06	83,33	82,83	76,19	81,19	82,93	78,95	73,17	64,29	76,60	78,87					
		CI Anteil in %		[79,45; 88,75]	[77,38; 88,53]	[77,93; 90,19]	[76,07; 90,60]	[75,36; 90,30]	[68,72; 83,66]	[73,53; 88,85]	[74,73; 91,12]	[69,72; 88,17]	[63,52; 82,82]	[52,98; 75,59]	[64,36; 88,83]	[69,31; 88,44]					
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		88	75	48	45	46	65	41	37	38	41	45	25	35					
		Anteil in %		36,82	42,61	34,78	44,12	46,46	51,59	40,59	45,12	50,00	50,00	64,29	53,19	49,30					
		CI Anteil in %		[30,69; 42,95]	[35,29; 49,94]	[26,81; 42,76]	[34,43; 53,80]	[36,59; 56,34]	[42,83; 60,35]	[30,97; 50,22]	[34,29; 55,96]	[38,68; 61,32]	[39,11; 60,89]	[52,98; 75,59]	[38,77; 67,61]	[37,58; 61,01]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,61	99,28	99,00	98,78	98,55	98,24	97,98	97,75	97,53	97,27	97,04	96,88	96,60					
		CI		[99,56; 99,66]	[99,21; 99,35]	[98,92; 99,08]	[98,69; 98,87]	[98,45; 98,65]	[98,12; 98,36]	[97,85; 98,11]	[97,61; 97,89]	[97,39; 97,67]	[97,12; 97,42]	[96,88; 97,20]	[96,71; 97,05]	[96,42; 96,78]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>177270</i>	<i>159758</i>	<i>142371</i>	<i>129725</i>	<i>122111</i>	<i>115844</i>	<i>110293</i>	<i>104904</i>	<i>99308</i>	<i>94518</i>	<i>89909</i>	<i>85713</i>	<i>81808</i>	<i>78228</i>					
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	82538	74834	66860	61028	57585	54651	52084	49574	46894	44689	42492	40482	38663	36985					
	auswertbar	Anzahl		66270	59043	52731	49467	45987	42764	40762	38497	36562	34389	32894	31227	29690					
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		189	131	93	84	82	105	81	53	62	51	45	49	42					
		Anteil in %		0,29	0,22	0,18	0,17	0,18	0,25	0,20	0,14	0,17	0,15	0,14	0,16	0,14					
		CI Anteil in %		[0,24; 0,33]	[0,18; 0,26]	[0,14; 0,21]	[0,13; 0,21]	[0,14; 0,22]	[0,20; 0,29]	[0,16; 0,24]	[0,10; 0,17]	[0,13; 0,21]	[0,11; 0,19]	[0,10; 0,18]	[0,11; 0,20]	[0,10; 0,18]					
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		156	107	77	68	69	80	66	43	44	35	27	32	32					
		Anteil in %		82,54	81,68	82,80	80,95	84,15	76,19	81,48	81,13	70,97	68,63	60,00	65,31	76,19					
		CI Anteil in %		[77,11; 87,97]	[75,03; 88,33]	[75,08; 90,51]	[72,50; 89,40]	[76,19; 92,10]	[68,00; 84,38]	[72,97; 89,99]	[70,50; 91,77]	[59,58; 82,36]	[55,77; 81,49]	[45,52; 74,48]	[51,84; 78,77]	[63,15; 89,23]					
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		69	46	40	37	25	54	30	23	30	26	28	21	25					
		Anteil in %		36,51	35,11	43,01	44,05	30,49	51,43	37,04	43,40	48,39	50,98	62,22	42,86	59,52					
		CI Anteil in %		[29,63; 43,39]	[26,91; 43,32]	[32,89; 53,13]	[33,37; 54,73]	[20,46; 40,51]	[41,82; 61,03]	[26,45; 47,62]	[29,93; 56,87]	[35,85; 60,93]	[37,12; 64,84]	[47,90; 76,55]	[28,86; 56,86]	[44,50; 74,55]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,74	99,54	99,38	99,23	99,07	98,86	98,68	98,56	98,41	98,28	98,16	98,02	97,88					
		CI		[99,70; 99,78]	[99,49; 99,59]	[99,32; 99,44]	[99,16; 99,30]	[98,99; 99,15]	[98,77; 98,95]	[98,59; 98,77]	[98,46; 98,66]	[98,30; 98,52]	[98,17; 98,39]	[98,04; 98,28]	[97,90; 98,14]	[97,75; 98,01]					
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>177270</i>	<i>159758</i>	<i>142371</i>	<i>129725</i>	<i>122111</i>	<i>115844</i>	<i>110293</i>	<i>104904</i>	<i>99308</i>	<i>94518</i>	<i>89909</i>	<i>85713</i>	<i>81808</i>	<i>78228</i>					

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	82934	74301	67072	62030	58336	55250	52378	49341	46795	44455	42342	40338	38626							
	auswertbar	Anzahl		65922	57821	52670	49265	44557	43158	39973	38131	35827	34240	32325	30911							
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		345	173	154	132	173	146	108	109	89	84	71	72							
		Anteil in %		0,52	0,30	0,29	0,27	0,39	0,34	0,27	0,29	0,25	0,25	0,22	0,23							
		CI Anteil in %		[0,47; 0,58]	[0,25; 0,34]	[0,25; 0,34]	[0,22; 0,31]	[0,33; 0,45]	[0,28; 0,39]	[0,22; 0,32]	[0,23; 0,34]	[0,20; 0,30]	[0,19; 0,30]	[0,17; 0,27]	[0,18; 0,29]							
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		291	143	132	109	131	113	83	86	59	60	52	53							
		Anteil in %		84,35	82,66	85,71	82,58	75,72	77,40	76,85	78,90	66,29	71,43	73,24	73,61							
		CI Anteil in %		[80,51; 88,19]	[77,00; 88,32]	[80,17; 91,26]	[76,08; 89,07]	[69,31; 82,13]	[70,59; 84,21]	[68,86; 84,84]	[71,20; 86,59]	[56,42; 76,17]	[61,71; 81,15]	[62,87; 83,61]	[63,36; 83,86]							
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		138	66	59	55	94	82	61	57	54	50	40	42							
		Anteil in %		40,00	38,15	38,31	41,67	54,34	56,16	56,48	52,29	60,67	59,52	56,34	58,33							
		CI Anteil in %		[34,82; 45,18]	[30,89; 45,41]	[30,61; 46,01]	[33,22; 50,11]	[46,89; 61,78]	[48,09; 64,24]	[47,09; 65,88]	[42,87; 61,71]	[50,47; 70,88]	[48,96; 70,08]	[44,72; 67,96]	[46,87; 69,80]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,52	99,25	98,99	98,76	98,42	98,13	97,89	97,64	97,42	97,21	97,01	96,78							
		CI		[99,47; 99,57]	[99,19; 99,31]	[98,91; 99,07]	[98,67; 98,85]	[98,32; 98,52]	[98,02; 98,24]	[97,77; 98,01]	[97,51; 97,77]	[97,29; 97,55]	[97,07; 97,35]	[96,86; 97,16]	[96,62; 96,94]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>211114</i>	<i>189946</i>	<i>172302</i>	<i>160139</i>	<i>151089</i>	<i>143449</i>	<i>136299</i>	<i>128618</i>	<i>121959</i>	<i>115953</i>	<i>110322</i>	<i>105101</i>	<i>100516</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	95683	86631	78713	73330	69316	65914	62700	59221	56143	53334	50677	48280	46149							
	auswertbar	Anzahl		77348	68166	62553	58516	53224	51542	48005	45792	42998	41029	38700	36741							
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		241	137	108	104	132	90	68	65	72	64	66	53							
		Anteil in %		0,31	0,20	0,17	0,18	0,25	0,17	0,14	0,14	0,17	0,16	0,17	0,14							
		CI Anteil in %		[0,27; 0,35]	[0,17; 0,23]	[0,14; 0,21]	[0,14; 0,21]	[0,21; 0,29]	[0,14; 0,21]	[0,11; 0,18]	[0,11; 0,18]	[0,13; 0,21]	[0,12; 0,19]	[0,13; 0,21]	[0,11; 0,18]							
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		195	112	91	81	100	72	49	53	49	42	46	39							
		Anteil in %		80,91	81,75	84,26	77,88	75,76	80,00	72,06	81,54	68,06	65,63	69,70	73,58							
		CI Anteil in %		[75,94; 85,88]	[75,26; 88,24]	[77,36; 91,16]	[69,87; 85,90]	[68,42; 83,10]	[71,69; 88,31]	[61,31; 82,80]	[72,03; 91,04]	[57,21; 78,90]	[53,90; 77,35]	[58,52; 80,87]	[61,60; 85,57]							
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		92	52	34	47	54	43	36	28	39	37	36	25							
		Anteil in %		38,17	37,96	31,48	45,19	40,91	47,78	52,94	43,08	54,17	57,81	54,55	47,17							
		CI Anteil in %		[32,03; 44,32]	[29,80; 46,11]	[22,68; 40,28]	[35,58; 54,80]	[32,49; 49,33]	[37,40; 58,16]	[40,99; 64,89]	[30,94; 55,21]	[42,58; 65,76]	[45,62; 70,01]	[42,44; 66,65]	[33,60; 60,74]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,71	99,53	99,38	99,22	99,01	98,85	98,73	98,60	98,46	98,32	98,16	98,02							
		CI		[99,67; 99,75]	[99,48; 99,58]	[99,32; 99,44]	[99,16; 99,28]	[98,94; 99,08]	[98,77; 98,93]	[98,65; 98,81]	[98,51; 98,69]	[98,36; 98,56]	[98,22; 98,42]	[98,05; 98,27]	[97,91; 98,13]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>211114</i>	<i>189946</i>	<i>172302</i>	<i>160139</i>	<i>151089</i>	<i>143449</i>	<i>136299</i>	<i>128618</i>	<i>121959</i>	<i>115953</i>	<i>110322</i>	<i>105101</i>	<i>100516</i>								

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	78525	71675	65244	60717	57230	53941	50625	47877	45306	43028	40983	39089						
	auswertbar	Anzahl		62911	56353	51016	46770	44206	41499	38935	36695	34654	32900	31059						
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		271	181	124	175	134	111	105	94	88	94	71						
		Anteil in %		0,43	0,32	0,24	0,37	0,30	0,27	0,27	0,26	0,25	0,29	0,23						
		CI Anteil in %		[0,38; 0,48]	[0,27; 0,37]	[0,20; 0,29]	[0,32; 0,43]	[0,25; 0,35]	[0,22; 0,32]	[0,22; 0,32]	[0,20; 0,31]	[0,20; 0,31]	[0,23; 0,34]	[0,18; 0,28]						
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		227	153	106	125	113	87	79	72	72	82	53						
		Anteil in %		83,76	84,53	85,48	71,43	84,33	78,38	75,24	76,60	81,82	87,23	74,65						
		CI Anteil in %		[79,36; 88,16]	[79,25; 89,81]	[79,26; 91,71]	[64,72; 78,14]	[78,15; 90,51]	[70,69; 86,07]	[66,94; 83,53]	[67,99; 85,20]	[73,71; 89,92]	[80,45; 94,02]	[64,46; 84,84]						
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		107	67	44	89	65	52	56	52	49	45	35						
		Anteil in %		39,48	37,02	35,48	50,86	48,51	46,85	53,33	55,32	55,68	47,87	49,30						
		CI Anteil in %		[33,65; 45,31]	[29,96; 44,07]	[27,03; 43,94]	[43,43; 58,29]	[40,01; 57,00]	[37,52; 56,17]	[43,75; 62,92]	[45,21; 65,42]	[45,24; 66,12]	[37,72; 58,03]	[37,58; 61,01]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,61	99,32	99,10	98,78	98,51	98,27	98,04	97,81	97,59	97,33	97,10						
		CI		[99,56; 99,66]	[99,26; 99,38]	[99,03; 99,17]	[98,69; 98,87]	[98,41; 98,61]	[98,16; 98,38]	[97,92; 98,16]	[97,69; 97,93]	[97,46; 97,72]	[97,19; 97,47]	[96,95; 97,25]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>200388</i>	<i>183534</i>	<i>168109</i>	<i>157005</i>	<i>148259</i>	<i>140163</i>	<i>131722</i>	<i>124772</i>	<i>118242</i>	<i>112411</i>	<i>107119</i>	<i>102339</i>						
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	90200	83031	76307	71363	67518	63890	60065	56938	53979	51345	48941	46814						
	auswertbar	Anzahl		73302	66186	60199	55372	52347	49275	46263	43657	41221	39227	37059						
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		202	120	98	153	96	75	58	71	57	55	48						
		Anteil in %		0,28	0,18	0,16	0,28	0,18	0,15	0,13	0,16	0,14	0,14	0,13						
		CI Anteil in %		[0,24; 0,31]	[0,15; 0,21]	[0,13; 0,19]	[0,23; 0,32]	[0,15; 0,22]	[0,12; 0,19]	[0,09; 0,16]	[0,12; 0,20]	[0,10; 0,17]	[0,10; 0,18]	[0,09; 0,17]						
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		168	96	76	110	76	57	43	56	46	39	31						
		Anteil in %		83,17	80,00	77,55	71,90	79,17	76,00	74,14	78,87	80,70	70,91	64,58						
		CI Anteil in %		[78,00; 88,34]	[72,81; 87,19]	[69,25; 85,85]	[64,75; 79,04]	[71,00; 87,33]	[66,27; 85,73]	[62,77; 85,51]	[69,31; 88,44]	[70,37; 91,04]	[58,80; 83,02]	[50,91; 78,26]						
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		77	49	46	76	51	40	27	38	23	24	26						
		Anteil in %		38,12	40,83	46,94	49,67	53,13	53,33	46,55	53,52	40,35	43,64	54,17						
		CI Anteil in %		[31,40; 44,83]	[32,00; 49,66]	[37,01; 56,87]	[41,72; 57,62]	[43,09; 63,16]	[41,97; 64,70]	[33,60; 59,50]	[41,84; 65,21]	[27,50; 53,20]	[30,41; 56,86]	[39,92; 68,41]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,75	99,58	99,44	99,20	99,04	98,90	98,79	98,64	98,52	98,39	98,26						
		CI		[99,72; 99,78]	[99,53; 99,63]	[99,39; 99,49]	[99,13; 99,27]	[98,97; 99,11]	[98,82; 98,98]	[98,71; 98,87]	[98,55; 98,73]	[98,42; 98,62]	[98,29; 98,49]	[98,15; 98,37]						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>200388</i>	<i>183534</i>	<i>168109</i>	<i>157005</i>	<i>148259</i>	<i>140163</i>	<i>131722</i>	<i>124772</i>	<i>118242</i>	<i>112411</i>	<i>107119</i>	<i>102339</i>							

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	81793	74324	68249	63749	59845	55764	52554	49618	47058	44750	42612							
	auswertbar	Anzahl		65304	58524	52021	49702	45860	43337	40579	38556	36248	34502							
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		272	164	197	125	93	108	75	90	79	86							
		Anteil in %		0,42	0,28	0,38	0,25	0,20	0,25	0,18	0,23	0,22	0,25							
		CI Anteil in %		[0,37; 0,47]	[0,24; 0,32]	[0,33; 0,43]	[0,21; 0,30]	[0,16; 0,24]	[0,20; 0,30]	[0,14; 0,23]	[0,19; 0,28]	[0,17; 0,27]	[0,20; 0,30]							
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		222	142	148	95	75	85	58	66	64	66							
		Anteil in %		81,62	86,59	75,13	76,00	80,65	78,70	77,33	73,33	81,01	76,74							
		CI Anteil in %		[77,01; 86,23]	[81,35; 91,82]	[69,08; 81,18]	[68,48; 83,52]	[72,57; 88,72]	[70,95; 86,46]	[67,79; 86,87]	[64,15; 82,52]	[72,31; 89,72]	[67,76; 85,73]							
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		124	63	93	62	44	57	42	48	33	36							
		Anteil in %		45,59	38,41	47,21	49,60	47,31	52,78	56,00	53,33	41,77	41,86							
		CI Anteil in %		[39,66; 51,52]	[30,95; 45,88]	[40,22; 54,20]	[40,80; 58,40]	[37,11; 57,51]	[43,32; 62,24]	[44,69; 67,31]	[42,97; 63,70]	[30,83; 52,72]	[31,37; 52,35]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,62	99,37	99,04	98,81	98,63	98,41	98,25	98,04	97,84	97,60							
		CI		[99,58; 99,66]	[99,31; 99,43]	[98,97; 99,11]	[98,73; 98,89]	[98,54; 98,72]	[98,31; 98,51]	[98,14; 98,36]	[97,92; 98,16]	[97,72; 97,96]	[97,47; 97,73]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>211228</i>	<i>192975</i>	<i>178198</i>	<i>166760</i>	<i>156952</i>	<i>146747</i>	<i>138391</i>	<i>130699</i>	<i>123849</i>	<i>117841</i>	<i>112400</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	93745	86179	79802	74747	70355	65895	62205	58865	55768	53092	50706							
	auswertbar	Anzahl		75828	68483	61199	58428	54112	51204	47830	45615	42894	40783							
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		185	104	127	91	96	73	67	59	56	60							
		Anteil in %		0,24	0,15	0,21	0,16	0,18	0,14	0,14	0,13	0,13	0,15							
		CI Anteil in %		[0,21; 0,28]	[0,12; 0,18]	[0,17; 0,24]	[0,12; 0,19]	[0,14; 0,21]	[0,11; 0,18]	[0,11; 0,17]	[0,10; 0,16]	[0,10; 0,16]	[0,11; 0,18]							
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		158	80	100	71	73	55	54	37	37	49							
		Anteil in %		85,41	76,92	78,74	78,02	76,04	75,34	80,60	62,71	66,07	81,67							
		CI Anteil in %		[80,30; 90,51]	[68,79; 85,06]	[71,60; 85,88]	[69,47; 86,58]	[67,46; 84,62]	[65,39; 85,30]	[71,06; 90,14]	[50,27; 75,16]	[53,56; 78,58]	[71,79; 91,54]							
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		70	45	58	40	42	40	34	32	36	29							
		Anteil in %		37,84	43,27	45,67	43,96	43,75	54,79	50,75	54,24	64,29	48,33							
		CI Anteil in %		[30,83; 44,85]	[33,70; 52,84]	[36,97; 54,37]	[33,70; 54,21]	[33,77; 53,73]	[43,30; 66,29]	[38,68; 62,81]	[41,42; 67,06]	[51,62; 76,95]	[35,58; 61,08]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,78	99,64	99,46	99,32	99,16	99,03	98,91	98,79	98,67	98,53							
		CI		[99,75; 99,81]	[99,60; 99,68]	[99,41; 99,51]	[99,26; 99,38]	[99,09; 99,23]	[98,96; 99,10]	[98,83; 98,99]	[98,71; 98,87]	[98,58; 98,76]	[98,43; 98,63]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>211228</i>	<i>192975</i>	<i>178198</i>	<i>166760</i>	<i>156952</i>	<i>146747</i>	<i>138391</i>	<i>130699</i>	<i>123849</i>	<i>117841</i>	<i>112400</i>								

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74928	68430	63233	58690	54192	50849	47822	45164	42877	40851								
	auswertbar	Anzahl		59334	52090	48383	45068	41946	39438	36865	35008	32854								
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		251	190	144	104	84	101	88	86	75								
		Anteil in %		0,42	0,36	0,30	0,23	0,20	0,26	0,24	0,25	0,23								
		CI Anteil in %		[0,37; 0,48]	[0,31; 0,42]	[0,25; 0,35]	[0,19; 0,28]	[0,16; 0,24]	[0,21; 0,31]	[0,19; 0,29]	[0,19; 0,30]	[0,18; 0,28]								
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		216	140	114	85	66	75	64	68	60								
		Anteil in %		86,06	73,68	79,17	81,73	78,57	74,26	72,73	79,07	80,00								
		CI Anteil in %		[81,76; 90,35]	[67,41; 79,96]	[72,51; 85,82]	[74,27; 89,19]	[69,74; 87,40]	[65,69; 82,83]	[63,37; 82,09]	[70,42; 87,72]	[70,89; 89,11]								
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		99	104	74	49	34	55	49	42	41								
		Anteil in %		39,44	54,74	51,39	47,12	40,48	54,46	55,68	48,84	54,67								
		CI Anteil in %		[33,38; 45,50]	[47,64; 61,83]	[43,20; 59,58]	[37,48; 56,76]	[29,92; 51,04]	[44,69; 64,22]	[45,24; 66,12]	[38,21; 59,46]	[43,32; 66,01]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,62	99,29	99,03	98,82	98,64	98,41	98,20	97,97	97,75								
		CI		[99,57; 99,67]	[99,22; 99,36]	[98,95; 99,11]	[98,73; 98,91]	[98,54; 98,74]	[98,30; 98,52]	[98,09; 98,31]	[97,85; 98,09]	[97,62; 97,88]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>194734</i>	<i>178533</i>	<i>165641</i>	<i>154423</i>	<i>143025</i>	<i>134294</i>	<i>126418</i>	<i>119395</i>	<i>113475</i>	<i>108145</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	85319	78623	73185	68323	63447	59619	56224	53186	50554	48161								
	auswertbar	Anzahl		68188	60055	56228	52592	49008	46054	43178	41122	38528								
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		166	141	107	79	74	55	57	58	56								
		Anteil in %		0,24	0,23	0,19	0,15	0,15	0,12	0,13	0,14	0,15								
		CI Anteil in %		[0,21; 0,28]	[0,20; 0,27]	[0,15; 0,23]	[0,12; 0,18]	[0,12; 0,19]	[0,09; 0,15]	[0,10; 0,17]	[0,10; 0,18]	[0,11; 0,18]								
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		143	111	87	57	61	44	38	41	40								
		Anteil in %		86,14	78,72	81,31	72,15	82,43	80,00	66,67	70,69	71,43								
		CI Anteil in %		[80,87; 91,42]	[71,94; 85,50]	[73,89; 88,73]	[62,20; 82,10]	[73,70; 91,16]	[69,33; 90,67]	[54,32; 79,01]	[58,87; 82,51]	[59,49; 83,37]								
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		58	61	51	39	32	22	36	29	28								
		Anteil in %		34,94	43,26	47,66	49,37	43,24	40,00	63,16	50,00	50,00								
		CI Anteil in %		[27,66; 42,21]	[35,06; 51,47]	[38,16; 57,17]	[38,27; 60,46]	[31,88; 54,61]	[26,93; 53,07]	[50,52; 75,79]	[37,02; 62,98]	[36,79; 63,21]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,78	99,57	99,40	99,27	99,13	99,02	98,90	98,77	98,63								
CI			[99,75; 99,81]	[99,52; 99,62]	[99,34; 99,46]	[99,21; 99,33]	[99,06; 99,20]	[98,94; 99,10]	[98,82; 98,98]	[98,68; 98,86]	[98,53; 98,73]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>194734</i>	<i>178533</i>	<i>165641</i>	<i>154423</i>	<i>143025</i>	<i>134294</i>	<i>126418</i>	<i>119395</i>	<i>113475</i>	<i>108145</i>									

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	80905	74211	68215	61750	57320	53592	50443	47767	45311												
	auswertbar	Anzahl		63473	57567	52040	48762	44967	42512	39834	37690												
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		298	141	127	127	89	100	78	66												
		Anteil in %		0,47	0,24	0,24	0,26	0,20	0,24	0,20	0,18												
		CI Anteil in %		[0,42; 0,52]	[0,20; 0,29]	[0,20; 0,29]	[0,22; 0,31]	[0,16; 0,24]	[0,19; 0,28]	[0,15; 0,24]	[0,13; 0,22]												
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		237	107	98	97	68	87	63	50												
		Anteil in %		79,53	75,89	77,17	76,38	76,40	87,00	80,77	75,76												
		CI Anteil in %		[74,94; 84,12]	[68,80; 82,97]	[69,84; 84,49]	[68,96; 83,79]	[67,53; 85,28]	[80,38; 93,62]	[71,97; 89,57]	[65,34; 86,18]												
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		139	67	66	61	47	38	37	34												
		Anteil in %		46,64	47,52	51,97	48,03	52,81	38,00	47,44	51,52												
		CI Anteil in %		[40,97; 52,32]	[39,25; 55,79]	[43,24; 60,69]	[39,31; 56,76]	[42,38; 63,24]	[28,44; 47,56]	[36,28; 58,59]	[39,37; 63,66]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,58	99,35	99,13	98,90	98,72	98,51	98,33	98,15												
		CI		[99,53; 99,63]	[99,29; 99,41]	[99,06; 99,20]	[98,82; 98,98]	[98,63; 98,81]	[98,41; 98,61]	[98,22; 98,44]	[98,04; 98,26]												
		<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>209502</i>	<i>193178</i>	<i>178308</i>	<i>162081</i>	<i>150859</i>	<i>141384</i>	<i>133381</i>	<i>126309</i>	<i>120011</i>											
		weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	89949	83491	77261	70466	65807	61760	58400	55353	52699											
		auswertbar	Anzahl		71831	65505	59606	56076	51974	49251	46260	43924											
		erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		182	133	98	70	71	56	71	50											
			Anteil in %		0,25	0,20	0,16	0,12	0,14	0,11	0,15	0,11											
			CI Anteil in %		[0,22; 0,29]	[0,17; 0,24]	[0,13; 0,20]	[0,10; 0,15]	[0,10; 0,17]	[0,08; 0,14]	[0,12; 0,19]	[0,08; 0,15]											
		davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		136	93	72	53	50	38	46	38											
			Anteil in %		74,73	69,92	73,47	75,71	70,42	67,86	64,79	76,00											
			CI Anteil in %		[68,39; 81,06]	[62,10; 77,75]	[64,68; 82,26]	[65,60; 85,83]	[59,73; 81,11]	[55,51; 80,20]	[53,60; 75,98]	[64,04; 87,96]											
		davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		80	67	42	32	41	25	36	21											
			Anteil in %		43,96	50,38	42,86	45,71	57,75	44,64	50,70	42,00											
			CI Anteil in %		[36,73; 51,19]	[41,85; 58,91]	[33,01; 52,71]	[33,96; 57,47]	[46,17; 69,32]	[31,50; 57,78]	[38,99; 62,42]	[28,18; 55,82]											
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,77	99,59	99,44	99,32	99,20	99,10	98,96	98,84											
	CI			[99,74; 99,80]	[99,54; 99,64]	[99,39; 99,49]	[99,26; 99,38]	[99,13; 99,27]	[99,03; 99,17]	[98,88; 99,04]	[98,76; 98,92]												
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>209502</i>	<i>193178</i>	<i>178308</i>	<i>162081</i>	<i>150859</i>	<i>141384</i>	<i>133381</i>	<i>126309</i>	<i>120011</i>												

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	54814	49874	44848	41195	38384	36034	34047	32305											
	auswertbar	Anzahl		44075	39218	35688	33289	31018	29221	27380											
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		172	100	82	65	64	61	50											
		Anteil in %		0,39	0,25	0,23	0,20	0,21	0,21	0,18											
		CI Anteil in %		[0,33; 0,45]	[0,21; 0,30]	[0,18; 0,28]	[0,15; 0,24]	[0,16; 0,26]	[0,16; 0,26]	[0,13; 0,23]											
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		129	78	62	45	46	44	40											
		Anteil in %		75,00	78,00	75,61	69,23	71,88	72,13	80,00											
		CI Anteil in %		[68,51; 81,49]	[69,84; 86,16]	[66,26; 84,96]	[57,92; 80,54]	[60,77; 82,98]	[60,79; 83,48]	[68,80; 91,20]											
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		96	50	45	30	32	36	22											
		Anteil in %		55,81	50,00	54,88	46,15	50,00	59,02	44,00											
		CI Anteil in %		[48,37; 63,26]	[40,15; 59,85]	[44,04; 65,71]	[33,94; 58,37]	[37,65; 62,35]	[46,57; 71,46]	[30,10; 57,90]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,64	99,41	99,20	99,02	98,83	98,64	98,46											
		CI		[99,59; 99,69]	[99,34; 99,48]	[99,12; 99,28]	[98,93; 99,11]	[98,73; 98,93]	[98,52; 98,76]	[98,33; 98,59]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>141760</i>	<i>129449</i>	<i>117267</i>	<i>108166</i>	<i>101115</i>	<i>94917</i>	<i>89915</i>	<i>85398</i>											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	60863	55887	50900	47097	44145	41510	39399	37476											
	auswertbar	Anzahl		49583	44563	40943	38424	35807	33894	31933											
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		107	68	73	49	48	29	28											
		Anteil in %		0,22	0,15	0,18	0,13	0,13	0,09	0,09											
		CI Anteil in %		[0,17; 0,26]	[0,12; 0,19]	[0,14; 0,22]	[0,09; 0,16]	[0,10; 0,17]	[0,05; 0,12]	[0,06; 0,12]											
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		88	50	54	32	34	17	14											
		Anteil in %		82,24	73,53	73,97	65,31	70,83	58,62	50,00											
		CI Anteil in %		[74,97; 89,52]	[62,97; 84,09]	[63,84; 84,11]	[51,84; 78,77]	[57,84; 83,83]	[40,38; 76,86]	[31,14; 68,86]											
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		43	35	37	25	27	13	17											
		Anteil in %		40,19	51,47	50,68	51,02	56,25	44,83	60,71											
		CI Anteil in %		[30,85; 49,52]	[39,50; 63,44]	[39,14; 62,23]	[36,88; 65,16]	[42,07; 70,43]	[26,41; 63,25]	[42,29; 79,14]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,80	99,66	99,50	99,38	99,26	99,18	99,09											
CI			[99,76; 99,84]	[99,61; 99,71]	[99,44; 99,56]	[99,31; 99,45]	[99,18; 99,34]	[99,10; 99,26]	[99,00; 99,18]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>141760</i>	<i>129449</i>	<i>117267</i>	<i>108166</i>	<i>101115</i>	<i>94917</i>	<i>89915</i>	<i>85398</i>												

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	58017	51826	46744	43031	40155	37728	35655												
	auswertbar	Anzahl		45993	41361	37332	35162	32427	30724												
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		144	92	82	79	69	57												
		Anteil in %		0,31	0,22	0,22	0,22	0,21	0,19												
		CI Anteil in %		[0,26; 0,36]	[0,18; 0,27]	[0,17; 0,27]	[0,18; 0,27]	[0,16; 0,26]	[0,14; 0,23]												
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		114	66	60	58	46	41												
		Anteil in %		79,17	71,74	73,17	73,42	66,67	71,93												
		CI Anteil in %		[72,51; 85,82]	[62,49; 80,99]	[63,52; 82,82]	[63,61; 83,22]	[55,46; 77,87]	[60,16; 83,70]												
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		70	49	45	42	38	36												
		Anteil in %		48,61	53,26	54,88	53,16	55,07	63,16												
		CI Anteil in %		[40,42; 56,80]	[43,01; 63,51]	[44,04; 65,71]	[42,09; 64,24]	[43,25; 66,90]	[50,52; 75,79]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,71	99,50	99,30	99,10	98,90	98,72												
		CI		[99,66; 99,76]	[99,44; 99,56]	[99,22; 99,38]	[99,01; 99,19]	[98,80; 99,00]	[98,61; 98,83]												
		<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>149236</i>	<i>134099</i>	<i>121764</i>	<i>112309</i>	<i>104842</i>	<i>98657</i>	<i>93524</i>											
		weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	62123	56202	51263	47474	44375	41898	39820											
		auswertbar	Anzahl		50023	45425	41216	38889	36202	34400											
		erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		90	56	49	54	46												
			Anteil in %		0,18	0,12	0,12	0,14	0,12	0,13											
			CI Anteil in %		[0,14; 0,22]	[0,09; 0,16]	[0,09; 0,15]	[0,10; 0,18]	[0,08; 0,15]	[0,10; 0,17]											
		davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		72	41	36	35	28												
			Anteil in %		80,00	73,21	73,47	64,81	72,09	60,87											
			CI Anteil in %		[71,69; 88,31]	[61,51; 84,92]	[60,98; 85,96]	[51,96; 77,67]	[58,53; 85,66]	[46,61; 75,13]											
		davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		47	27	25	34	30												
			Anteil in %		52,22	48,21	51,02	62,96	48,84	65,22											
			CI Anteil in %		[41,84; 62,60]	[35,01; 61,42]	[36,88; 65,16]	[49,96; 75,96]	[33,72; 63,95]	[51,30; 79,13]											
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,83	99,72	99,61	99,48	99,37	99,24											
			CI		[99,80; 99,86]	[99,67; 99,77]	[99,56; 99,66]	[99,42; 99,54]	[99,30; 99,44]	[99,16; 99,32]											
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>149236</i>	<i>134099</i>	<i>121764</i>	<i>112309</i>	<i>104842</i>	<i>98657</i>	<i>93524</i>												

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	53077	47609	42889	39325	36762	34626													
	auswertbar	Anzahl		42698	37695	34231	32045	29799													
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		139	91	76	51	66													
		Anteil in %		0,33	0,24	0,22	0,16	0,22													
		CI Anteil in %		[0,27; 0,38]	[0,19; 0,29]	[0,17; 0,27]	[0,12; 0,20]	[0,17; 0,27]													
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		111	65	57	39	45													
		Anteil in %		79,86	71,43	75,00	76,47	68,18													
		CI Anteil in %		[73,16; 86,55]	[62,10; 80,76]	[65,20; 84,80]	[64,71; 88,23]	[56,86; 79,51]													
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		71	49	39	27	32													
		Anteil in %		51,08	53,85	51,32	52,94	48,48													
		CI Anteil in %		[42,74; 59,42]	[43,55; 64,15]	[40,00; 62,63]	[39,11; 66,78]	[36,34; 60,63]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,70	99,47	99,27	99,12	98,90													
		CI		[99,65; 99,75]	[99,40; 99,54]	[99,19; 99,35]	[99,03; 99,21]	[98,79; 99,01]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>138203</i>	<i>124583</i>	<i>112850</i>	<i>104048</i>	<i>97351</i>	<i>91727</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	58269	52851	48222	44690	41833	39428													
	auswertbar	Anzahl		47568	42537	39015	36571	34040													
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		90	52	55	42	46													
		Anteil in %		0,19	0,12	0,14	0,11	0,14													
		CI Anteil in %		[0,15; 0,23]	[0,09; 0,16]	[0,10; 0,18]	[0,08; 0,15]	[0,10; 0,17]													
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		71	42	41	30	29													
		Anteil in %		78,89	80,77	74,55	71,43	63,04													
		CI Anteil in %		[70,41; 87,37]	[69,95; 91,59]	[62,93; 86,16]	[57,60; 85,26]	[48,94; 77,15]													
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		46	18	26	22	29													
		Anteil in %		51,11	34,62	47,27	52,38	63,04													
		CI Anteil in %		[40,73; 61,50]	[21,56; 47,67]	[33,96; 60,59]	[37,09; 67,67]	[48,94; 77,15]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,82	99,71	99,58	99,47	99,34													
		CI		[99,78; 99,86]	[99,66; 99,76]	[99,52; 99,64]	[99,40; 99,54]	[99,26; 99,42]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>138203</i>	<i>124583</i>	<i>112850</i>	<i>104048</i>	<i>97351</i>	<i>91727</i>														

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	60290	54222	49161	45322	42427															
	auswertbar	Anzahl		48402	43641	39263	37044															
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		152	103	73	65															
		Anteil in %		0,31	0,24	0,19	0,18															
		CI Anteil in %		[0,26; 0,36]	[0,19; 0,28]	[0,14; 0,23]	[0,13; 0,22]															
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		124	75	55	49															
		Anteil in %		81,58	72,82	75,34	75,38															
		CI Anteil in %		[75,40; 87,76]	[64,18; 81,45]	[65,39; 85,30]	[64,83; 85,94]															
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		70	57	40	28															
		Anteil in %		46,05	55,34	54,79	43,08															
		CI Anteil in %		[38,10; 54,00]	[45,69; 64,99]	[43,30; 66,29]	[30,94; 55,21]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,71	99,49	99,31	99,14															
		CI		[99,66; 99,76]	[99,43; 99,55]	[99,24; 99,38]	[99,05; 99,23]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>156054</i>	<i>141244</i>	<i>128741</i>	<i>119210</i>	<i>111825</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63928	58318	53378	49620	46702															
	auswertbar	Anzahl		52236	47591	43295	40961															
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		105	63	37	47															
		Anteil in %		0,20	0,13	0,09	0,11															
		CI Anteil in %		[0,16; 0,24]	[0,10; 0,17]	[0,06; 0,11]	[0,08; 0,15]															
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		72	40	24	29															
		Anteil in %		68,57	63,49	64,86	61,70															
		CI Anteil in %		[59,65; 77,49]	[51,51; 75,48]	[49,27; 80,46]	[47,65; 75,75]															
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		52	39	23	26															
		Anteil in %		49,52	61,90	62,16	55,32															
		CI Anteil in %		[39,91; 59,13]	[49,82; 73,99]	[46,32; 78,00]	[40,95; 69,69]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,69	99,61	99,49															
		CI		[99,77; 99,85]	[99,64; 99,74]	[99,56; 99,66]	[99,43; 99,55]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>156054</i>	<i>141244</i>	<i>128741</i>	<i>119210</i>	<i>111825</i>																

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	54126	48877	44315	41001															
	auswertbar	Anzahl		43844	39210	35515															
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		119	88	57															
		Anteil in %		0,27	0,22	0,16															
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	CI Anteil in %		[0,22; 0,32]	[0,18; 0,27]	[0,12; 0,20]															
		Anzahl		91	63	45															
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anteil in %		76,47	71,59	78,95															
		CI Anteil in %		[68,82; 84,12]	[62,11; 81,07]	[68,27; 89,63]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,75	99,53	99,37															
		CI		[99,70; 99,80]	[99,47; 99,59]	[99,29; 99,45]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>141745</i>	<i>128551</i>	<i>117146</i>	<i>108693</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	58303	53204	48663	45277															
	auswertbar	Anzahl		47988	43090	39354															
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		82	39	49															
		Anteil in %		0,17	0,09	0,12															
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	CI Anteil in %		[0,13; 0,21]	[0,06; 0,12]	[0,09; 0,16]															
		Anzahl		59	27	32															
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anteil in %		71,95	69,23	65,31															
		CI Anteil in %		[62,17; 81,73]	[54,56; 83,91]	[51,84; 78,77]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,84	99,75	99,63															
		CI		[99,81; 99,87]	[99,71; 99,79]	[99,57; 99,69]															
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>141745</i>	<i>128551</i>	<i>117146</i>	<i>108693</i>															

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	58266	52340	47558																
	auswertbar	Anzahl		46619	41964																
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl			143	84															
		Anteil in %				0,31	0,20														
		CI Anteil in %				[0,26; 0,36]	[0,16; 0,24]														
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl			95	56															
		Anteil in %				66,43	66,67														
		CI Anteil in %				[58,67; 74,20]	[56,52; 76,81]														
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl			76	49															
		Anteil in %				53,15	58,33														
		CI Anteil in %				[44,94; 61,35]	[47,73; 68,94]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,71	99,51															
		CI				[99,66; 99,76]	[99,45; 99,57]														
		<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>153653</i>	<i>139143</i>	<i>127131</i>															
		weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	62417	57007	52374															
		auswertbar	Anzahl		50959	46312															
		erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl			85	54														
			Anteil in %				0,17	0,12													
			CI Anteil in %				[0,13; 0,20]	[0,09; 0,15]													
		davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl			57	36														
			Anteil in %				67,06	66,67													
			CI Anteil in %				[57,01; 77,11]	[53,98; 79,36]													
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl			43	27															
		Anteil in %				50,59	50,00														
		CI Anteil in %				[39,90; 61,28]	[36,54; 63,46]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,84	99,73															
		CI				[99,81; 99,87]	[99,68; 99,78]														
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>153653</i>	<i>139143</i>	<i>127131</i>																

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	52313	47309																	
	auswertbar	Anzahl		42248																	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		140																	
		Anteil in %			0,33																
		CI Anteil in %			[0,28; 0,39]																
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		100																	
		Anteil in %			71,43																
		CI Anteil in %			[63,92; 78,94]																
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		81																	
		Anteil in %			57,86																
		CI Anteil in %			[49,65; 66,07]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,67																	
		CI		[99,62; 99,72]																	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>139695</i>	<i>127218</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	56678	52115																	
	auswertbar	Anzahl		46556																	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		82																	
		Anteil in %			0,18																
		CI Anteil in %			[0,14; 0,21]																
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		50																	
		Anteil in %			60,98																
		CI Anteil in %			[50,35; 71,60]																
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		46																	
Anteil in %				56,10																	
CI Anteil in %				[45,29; 66,91]																	
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,82																		
	CI		[99,78; 99,86]																		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>139695</i>	<i>127218</i>																	

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	58201																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmals aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																			
		CI																			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>152593</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	60868																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmals aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl																			
Anteil in %																					
CI Anteil in %																					
davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl																				
	Anteil in %																				
	CI Anteil in %																				
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																				
	CI																				
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>152593</i>																			

In Tabelle 3.5.4 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Amputation** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Amputation erfolgt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Ampu-

tation durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig vorgenommene Amputation dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierten „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

Tabelle 3.5.4 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	16617	13843	11941	10459	9379	8504	7838	6958	6550	6092	5838	5551	5281	4997	4731	4483	4203	3999	3815
	auswertbar	Anzahl		11769	11211	10193	9144	8326	7595	6792	6232	5920	5620	5336	5109	4841	4564	4337	4061	3886	3666
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		26	33	11	17	16	9	6	9	8	8	13	8	4	5	6	8	4	4
		Anteil in %		0,22	0,29	0,11	0,19	0,19	0,12	0,09	0,14	0,14	0,14	0,24	0,16	0,08	0,11	0,14	0,20	0,10	0,11
		CI Anteil in %		[0,14; 0,31]	[0,19; 0,39]	[0,04; 0,17]	[0,10; 0,27]	[0,10; 0,29]	[0,04; 0,20]	[0,02; 0,16]	[0,05; 0,24]	[0,04; 0,23]	[0,04; 0,24]	[0,11; 0,38]	[0,05; 0,27]	[0,00; 0,16]	[0,01; 0,21]	[0,03; 0,25]	[0,06; 0,33]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,22]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,80	99,52	99,42	99,24	99,05	98,93	98,84	98,70	98,57	98,43	98,20	98,04	97,96	97,86	97,72	97,53	97,43	97,32
		CI		[99,72; 99,88]	[99,40; 99,64]	[99,28; 99,56]	[99,08; 99,40]	[98,86; 99,24]	[98,73; 99,13]	[98,63; 99,05]	[98,47; 98,93]	[98,32; 98,82]	[98,16; 98,70]	[97,91; 98,49]	[97,73; 98,35]	[97,64; 98,28]	[97,53; 98,19]	[97,37; 98,07]	[97,16; 97,90]	[97,04; 97,82]	[96,92; 97,72]
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16899</i>	<i>14082</i>	<i>12153</i>	<i>10652</i>	<i>9557</i>	<i>8669</i>	<i>7996</i>	<i>7104</i>	<i>6687</i>	<i>6220</i>	<i>5968</i>	<i>5677</i>	<i>5409</i>	<i>5125</i>	<i>4851</i>	<i>4591</i>	<i>4306</i>	<i>4096</i>	<i>3910</i>
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	23302	19678	17136	15148	13736	12598	11681	10381	9721	9104	8703	8222	7818	7374	6972	6603	6222	5935	5651
	auswertbar	Anzahl		16791	16129	14827	13387	12380	11324	10136	9279	8863	8346	7901	7561	7148	6761	6424	6034	5763	5467
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		17	33	8	5	7	7	5	3	6	4	5	7	3	3	4	4	2	3
		Anteil in %		0,10	0,20	0,05	0,04	0,06	0,06	0,05	0,03	0,07	0,05	0,06	0,09	0,04	0,04	0,06	0,07	0,03	0,05
		CI Anteil in %		[0,05; 0,15]	[0,13; 0,27]	[0,02; 0,09]	[0,00; 0,07]	[0,01; 0,10]	[0,02; 0,11]	[0,01; 0,09]	[0,00; 0,07]	[0,01; 0,12]	[0,00; 0,09]	[0,01; 0,12]	[0,02; 0,16]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,12]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,71	99,66	99,63	99,57	99,51	99,46	99,43	99,36	99,31	99,25	99,16	99,12	99,08	99,01	98,95	98,91	98,86
CI			[99,87; 99,95]	[99,63; 99,79]	[99,57; 99,75]	[99,54; 99,72]	[99,47; 99,67]	[99,40; 99,62]	[99,34; 99,58]	[99,31; 99,55]	[99,22; 99,50]	[99,17; 99,45]	[99,10; 99,40]	[98,99; 99,33]	[98,95; 99,29]	[98,90; 99,26]	[98,82; 99,20]	[98,75; 99,15]	[98,70; 99,12]	[98,65; 99,07]	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23425</i>	<i>19774</i>	<i>17225</i>	<i>15242</i>	<i>13824</i>	<i>12682</i>	<i>11761</i>	<i>10454</i>	<i>9791</i>	<i>9172</i>	<i>8775</i>	<i>8282</i>	<i>7877</i>	<i>7432</i>	<i>7023</i>	<i>6650</i>	<i>6268</i>	<i>5980</i>	<i>5695</i>	
2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	111339	86541	72048	61914	54118	48721	44122	41221	39254	37611	36098	34603	32885	31410	30006	28598	27282	26094	
	auswertbar	Anzahl		78435	69371	60056	52795	47387	43027	39601	37781	35683	33730	32761	31314	29858	28470	27060	25825	24543	
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		204	98	46	70	48	56	36	46	30	86	53	30	48	46	40	39	41	
		Anteil in %		0,26	0,14	0,08	0,13	0,10	0,13	0,09	0,12	0,08	0,25	0,16	0,10	0,16	0,16	0,15	0,15	0,17	
		CI Anteil in %		[0,22; 0,30]	[0,11; 0,17]	[0,05; 0,10]	[0,10; 0,16]	[0,07; 0,13]	[0,10; 0,16]	[0,06; 0,12]	[0,09; 0,16]	[0,05; 0,11]	[0,20; 0,31]	[0,12; 0,21]	[0,06; 0,13]	[0,12; 0,21]	[0,11; 0,21]	[0,10; 0,19]	[0,10; 0,20]	[0,12; 0,22]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,76	99,62	99,54	99,41	99,31	99,19	99,10	98,98	98,90	98,65	98,49	98,40	98,24	98,09	97,94	97,80	97,63	
		CI		[99,73; 99,79]	[99,58; 99,66]	[99,49; 99,59]	[99,35; 99,47]	[99,25; 99,37]	[99,12; 99,26]	[99,02; 99,18]	[98,90; 99,06]	[98,81; 98,99]	[98,55; 98,75]	[98,38; 98,60]	[98,28; 98,52]	[98,12; 98,36]	[97,96; 98,22]	[97,80; 98,08]	[97,65; 97,95]	[97,48; 97,78]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>113351</i>	<i>88040</i>	<i>73383</i>	<i>63050</i>	<i>55111</i>	<i>49635</i>	<i>44958</i>	<i>42030</i>	<i>40030</i>	<i>38378</i>	<i>36843</i>	<i>35375</i>	<i>33628</i>	<i>32116</i>	<i>30707</i>	<i>29278</i>	<i>27932</i>	<i>26736</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	141972	111425	93323	80485	70894	63841	57912	53993	51511	49441	47494	45524	43310	41397	39551	37772	36116	34564	
	auswertbar	Anzahl		101678	90005	78152	69233	62239	56516	51861	49762	47053	44442	43130	41245	39333	37615	35833	34208	32531	
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		178	47	27	34	33	25	24	22	14	63	25	21	27	16	18	22	14	
		Anteil in %		0,18	0,05	0,03	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03	0,14	0,06	0,05	0,07	0,04	0,05	0,06	0,04	
		CI Anteil in %		[0,15; 0,20]	[0,04; 0,07]	[0,02; 0,05]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,01; 0,05]	[0,11; 0,18]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,09]	[0,02; 0,06]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,09]	[0,02; 0,07]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,84	99,78	99,75	99,70	99,65	99,61	99,56	99,52	99,49	99,35	99,29	99,24	99,18	99,13	99,09	99,02	98,98	
CI			[99,82; 99,86]	[99,75; 99,81]	[99,72; 99,78]	[99,67; 99,73]	[99,61; 99,69]	[99,57; 99,65]	[99,51; 99,61]	[99,47; 99,57]	[99,44; 99,54]	[99,29; 99,41]	[99,22; 99,36]	[99,17; 99,31]	[99,11; 99,25]	[99,05; 99,21]	[99,01; 99,17]	[98,94; 99,10]	[98,89; 99,07]		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>142866</i>	<i>112069</i>	<i>93979</i>	<i>81049</i>	<i>71389</i>	<i>64294</i>	<i>58333</i>	<i>54388</i>	<i>51899</i>	<i>49824</i>	<i>47865</i>	<i>45920</i>	<i>43703</i>	<i>41770</i>	<i>39917</i>	<i>38116</i>	<i>36445</i>	<i>34887</i>		

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	80957	72583	64375	58463	54864	52003	49435	46903	44380	42200	40163	38297	36536	34895					
	auswertbar	Anzahl		69553	62049	55834	52617	49297	46287	44617	42420	40285	38328	36485	34803	33152					
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		96	68	44	48	44	103	49	55	33	55	34	41	37					
		Anteil in %		0,14	0,11	0,08	0,09	0,09	0,22	0,11	0,13	0,08	0,14	0,09	0,12	0,11					
		CI Anteil in %		[0,11; 0,17]	[0,08; 0,14]	[0,06; 0,10]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,12]	[0,18; 0,27]	[0,08; 0,14]	[0,10; 0,16]	[0,05; 0,11]	[0,11; 0,18]	[0,06; 0,12]	[0,08; 0,15]	[0,08; 0,15]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,87	99,76	99,68	99,59	99,51	99,29	99,18	99,06	98,98	98,84	98,74	98,63	98,52					
		CI		[99,84; 99,90]	[99,72; 99,80]	[99,64; 99,72]	[99,54; 99,64]	[99,45; 99,57]	[99,22; 99,36]	[99,10; 99,26]	[98,98; 99,14]	[98,89; 99,07]	[98,75; 98,93]	[98,64; 98,84]	[98,52; 98,74]	[98,41; 98,63]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	82253	73718	65422	59436	55776	52856	50253	47742	45177	42958	40893	39008	37209	35545					
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	94504	85597	76535	69919	65974	62628	59697	56801	53788	51227	48698	46407	44306	42396					
	auswertbar	Anzahl		82338	73968	67046	63325	59425	56012	54067	51494	49035	46580	44339	42251	40313					
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		46	30	35	28	28	59	30	30	20	14	26	20	23					
		Anteil in %		0,06	0,04	0,05	0,04	0,05	0,11	0,06	0,06	0,04	0,03	0,06	0,05	0,06					
		CI Anteil in %		[0,04; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,08; 0,13]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,08]	[0,02; 0,06]	[0,01; 0,05]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,08]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,91	99,85	99,81	99,77	99,66	99,61	99,55	99,51	99,48	99,42	99,38	99,32					
		CI		[99,93; 99,97]	[99,89; 99,93]	[99,82; 99,88]	[99,78; 99,84]	[99,73; 99,81]	[99,62; 99,70]	[99,56; 99,66]	[99,50; 99,60]	[99,45; 99,57]	[99,42; 99,54]	[99,36; 99,48]	[99,32; 99,44]	[99,25; 99,39]					
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	95017	86040	76949	70289	66335	62988	60040	57162	54131	51560	49016	46705	44599	42683					
	2006-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	97150	86928	78537	72689	68421	64838	61451	57890	54885	52142	49670	47315	45266					
auswertbar		Anzahl		83944	74364	69432	64589	59935	57987	54743	51895	49359	46808	44574	42415						
erstmalig durchgeführte Amputation		Anzahl		127	78	67	65	140	86	77	75	57	65	50	47						
		Anteil in %		0,15	0,10	0,10	0,10	0,23	0,15	0,14	0,14	0,12	0,14	0,11	0,11						
		CI Anteil in %		[0,12; 0,18]	[0,08; 0,13]	[0,07; 0,12]	[0,08; 0,13]	[0,19; 0,27]	[0,12; 0,18]	[0,11; 0,17]	[0,11; 0,18]	[0,09; 0,15]	[0,11; 0,17]	[0,08; 0,14]	[0,08; 0,14]						
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit		Rate		99,85	99,75	99,66	99,56	99,33	99,19	99,05	98,91	98,80	98,66	98,55	98,44						
		CI		[99,82; 99,88]	[99,72; 99,78]	[99,62; 99,70]	[99,51; 99,61]	[99,27; 99,39]	[99,12; 99,26]	[98,98; 99,12]	[98,83; 98,99]	[98,71; 98,89]	[98,57; 98,75]	[98,45; 98,65]	[98,34; 98,54]						
<i>männliche Patienten insgesamt</i>		Anzahl	98603	88202	79739	73830	69513	65875	62516	58915	55879	53125	50627	48227	46133						
weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko		Anzahl	111918	101220	92068	85828	81116	77131	73325	69255	65654	62406	59300	56496	54015						
auswertbar		Anzahl		98106	87302	82245	76648	71439	69289	65617	62241	59126	56019	53398	50729						
erstmalig durchgeführte Amputation		Anzahl		56	39	37	41	71	47	25	34	29	33	35	28						
		Anteil in %		0,06	0,04	0,04	0,05	0,10	0,07	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06						
		CI Anteil in %		[0,04; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,04; 0,07]	[0,08; 0,12]	[0,05; 0,09]	[0,02; 0,05]	[0,04; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,09]	[0,03; 0,08]						
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit		Rate		99,94	99,90	99,86	99,80	99,71	99,64	99,61	99,55	99,50	99,44	99,38	99,33						
		CI		[99,93; 99,95]	[99,88; 99,92]	[99,84; 99,88]	[99,77; 99,83]	[99,67; 99,75]	[99,60; 99,68]	[99,57; 99,65]	[99,50; 99,60]	[99,45; 99,55]	[99,39; 99,49]	[99,32; 99,44]	[99,27; 99,39]						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>		Anzahl	112511	101744	92563	86309	81576	77574	73783	69703	66080	62828	59695	56874	54383						
2006-2		männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	92535	84384	76879	71640	67526	63657	59717	56526	53514	50839	48419	46194						
	auswertbar	Anzahl		80697	73323	67411	62502	59813	56548	53297	50578	47910	45577	43184							
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		117	85	80	146	102	68	62	75	60	65	56							
		Anteil in %		0,14	0,12	0,12	0,23	0,17	0,12	0,12	0,15	0,13	0,14	0,13							
		CI Anteil in %		[0,12; 0,17]	[0,09; 0,14]	[0,09; 0,14]	[0,20; 0,27]	[0,14; 0,20]	[0,09; 0,15]	[0,09; 0,15]	[0,11; 0,18]	[0,09; 0,16]	[0,11; 0,18]	[0,10; 0,16]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,86	99,75	99,63	99,41	99,24	99,12	99,01	98,86	98,74	98,60	98,47							
		CI		[99,83; 99,89]	[99,71; 99,79]	[99,59; 99,67]	[99,35; 99,47]	[99,18; 99,30]	[99,05; 99,19]	[98,93; 99,09]	[98,78; 98,94]	[98,65; 98,83]	[98,51; 98,69]	[98,37; 98,57]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	94020	85716	78144	72860	68692	64819	60857	57626	54569	51845	49384	47138							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	105784	97312	89474	83662	79102	74844	70374	66662	63213	60127	57312	54796							
	auswertbar	Anzahl		93291	85405	78740	73232	70260	66586	62863	59668	56587	53991	51272							
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		61	47	43	93	46	42	26	36	29	22	26							
		Anteil in %		0,07	0,06	0,05	0,13	0,07	0,06	0,04	0,06	0,05	0,04	0,05							
		CI Anteil in %		[0,05; 0,08]	[0,04; 0,07]	[0,04; 0,07]	[0,10; 0,15]	[0,05; 0,08]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,06]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,02; 0,06]	[0,03; 0,07]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,88	99,83	99,71	99,64	99,58	99,54	99,48	99,43	99,39	99,34							
		CI		[99,92; 99,96]	[99,86; 99,90]	[99,80; 99,86]	[99,67; 99,75]	[99,60; 99,68]	[99,53; 99,63]	[99,49; 99,59]	[99,43; 99,53]	[99,38; 99,48]	[99,33; 99,45]	[99,28; 99,40]							
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	Anzahl	106368	97818	89965	84145	79567	75344	70865	67146	63673	60566	57735	55201							

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	97616	88610	81459	76109	71493	66630	62734	59148	56070	53339	50836								
	auswertbar	Anzahl		85223	76745	70535	67313	63210	59466	56206	53153	50591	48033								
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		108	89	144	112	71	68	57	65	46	50								
		Anteil in %		0,13	0,12	0,20	0,17	0,11	0,11	0,10	0,12	0,09	0,10								
		CI Anteil in %		[0,10; 0,15]	[0,09; 0,14]	[0,17; 0,24]	[0,14; 0,20]	[0,09; 0,14]	[0,09; 0,14]	[0,08; 0,13]	[0,09; 0,15]	[0,06; 0,12]	[0,08; 0,13]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,88	99,76	99,57	99,40	99,29	99,18	99,08	98,96	98,87	98,77								
		CI		[99,86; 99,90]	[99,73; 99,79]	[99,52; 99,62]	[99,35; 99,45]	[99,23; 99,35]	[99,11; 99,25]	[99,01; 99,15]	[98,88; 99,04]	[98,79; 98,95]	[98,68; 98,86]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	111651	102582	95012	89022	83802	78498	74121	70100	66406	63170	60296								
	auswertbar	Anzahl		98851	89686	82751	79051	74595	70457	66610	63016	59959	56940								
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		66	40	80	41	37	37	28	35	31	35								
		Anteil in %		0,07	0,04	0,10	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	0,05	0,06								
		CI Anteil in %		[0,05; 0,08]	[0,03; 0,06]	[0,08; 0,12]	[0,04; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,04; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,08]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,89	99,80	99,75	99,70	99,65	99,61	99,55	99,50	99,44								
CI			[99,91; 99,95]	[99,87; 99,91]	[99,72; 99,83]	[99,72; 99,78]	[99,66; 99,74]	[99,61; 99,69]	[99,57; 99,65]	[99,50; 99,60]	[99,45; 99,55]	[99,39; 99,49]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>									
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	90365	82451	76176	70757	65307	61244	57548	54318	51574	49138									
	auswertbar	Anzahl		77850	69833	66040	61606	57799	54329	51165	48673	46029									
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		106	152	91	69	68	68	60	48	41									
		Anteil in %		0,14	0,22	0,14	0,11	0,12	0,13	0,12	0,10	0,09									
		CI Anteil in %		[0,11; 0,16]	[0,18; 0,25]	[0,11; 0,17]	[0,09; 0,14]	[0,09; 0,15]	[0,10; 0,15]	[0,09; 0,15]	[0,07; 0,13]	[0,06; 0,12]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,87	99,66	99,52	99,41	99,30	99,18	99,06	98,96	98,88									
		CI		[99,84; 99,90]	[99,62; 99,70]	[99,47; 99,57]	[99,35; 99,47]	[99,24; 99,36]	[99,11; 99,25]	[98,99; 99,13]	[98,88; 99,04]	[98,80; 98,96]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	102603	94499	87946	82139	76322	71721	67601	63873	60750	57906									
	auswertbar	Anzahl		89449	80562	76642	71922	67594	63681	60177	57224	54151									
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		41	69	32	31	25	32	35	26	25									
		Anteil in %		0,05	0,09	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05									
		CI Anteil in %		[0,03; 0,06]	[0,07; 0,11]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,05]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,96	99,87	99,83	99,79	99,75	99,70	99,65	99,60	99,56									
CI			[99,95; 99,97]	[99,85; 99,89]	[99,80; 99,86]	[99,76; 99,82]	[99,72; 99,78]	[99,66; 99,74]	[99,61; 99,69]	[99,55; 99,65]	[99,51; 99,61]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>										
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	98413	90241	82882	75045	69606	65118	61252	57934	54958										
	auswertbar	Anzahl		84510	78008	71866	66836	62677	58992	55801	52698										
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		198	94	73	64	81	75	53	49										
		Anteil in %		0,23	0,12	0,10	0,10	0,13	0,13	0,09	0,09										
		CI Anteil in %		[0,20; 0,27]	[0,10; 0,14]	[0,08; 0,12]	[0,07; 0,12]	[0,10; 0,16]	[0,10; 0,16]	[0,07; 0,12]	[0,07; 0,12]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,77	99,66	99,56	99,46	99,33	99,21	99,12	99,02										
		CI		[99,74; 99,80]	[99,62; 99,70]	[99,51; 99,61]	[99,41; 99,51]	[99,27; 99,39]	[99,15; 99,27]	[99,05; 99,19]	[98,95; 99,09]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	109400	101405	93828	85549	79861	74953	70865	67163	63909										
	auswertbar	Anzahl		95366	88709	82085	76844	72350	68327	64833	61410										
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		85	62	29	33	24	27	24	21										
		Anteil in %		0,09	0,07	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03										
		CI Anteil in %		[0,07; 0,11]	[0,05; 0,09]	[0,02; 0,05]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,05]	[0,02; 0,05]	[0,02; 0,05]	[0,02; 0,05]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,85	99,81	99,77	99,74	99,70	99,66	99,63										
CI			[99,89; 99,93]	[99,82; 99,88]	[99,78; 99,84]	[99,74; 99,80]	[99,71; 99,77]	[99,66; 99,74]	[99,62; 99,70]	[99,59; 99,67]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>											

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	66809	60719	54616	50179	46777	43835	41423	39282										
	auswertbar	Anzahl		58351	52719	48578	45424	42608	40282	38060										
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		110	75	53	52	48	46	36										
		Anteil in %		0,19	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09										
		CI Anteil in %		[0,15; 0,22]	[0,11; 0,17]	[0,08; 0,14]	[0,08; 0,15]	[0,08; 0,14]	[0,08; 0,15]	[0,06; 0,13]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,67	99,57	99,45	99,34	99,23	99,14										
		CI		[99,78; 99,84]	[99,62; 99,72]	[99,52; 99,62]	[99,39; 99,51]	[99,27; 99,41]	[99,15; 99,31]	[99,06; 99,22]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73845	67748	61674	57048	53436	50231	47672	45309										
	auswertbar	Anzahl		65208	59630	55339	52028	48863	46429	43978										
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		44	32	33	12	25	18	19										
		Anteil in %		0,07	0,05	0,06	0,02	0,05	0,04	0,04										
		CI Anteil in %		[0,05; 0,09]	[0,04; 0,07]	[0,04; 0,08]	[0,01; 0,04]	[0,03; 0,07]	[0,02; 0,06]	[0,02; 0,06]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,88	99,82	99,80	99,75	99,71	99,67										
CI			[99,91; 99,95]	[99,85; 99,91]	[99,79; 99,85]	[99,76; 99,84]	[99,71; 99,79]	[99,67; 99,75]	[99,62; 99,72]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>											
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71640	63990	57747	53097	49530	46482	43940											
	auswertbar	Anzahl		61938	55969	51655	48193	45239	42678											
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		85	64	41	52	36	37											
		Anteil in %		0,14	0,11	0,08	0,11	0,08	0,09											
		CI Anteil in %		[0,11; 0,17]	[0,09; 0,14]	[0,06; 0,10]	[0,08; 0,14]	[0,05; 0,11]	[0,06; 0,11]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,87	99,75	99,67	99,57	99,49	99,40											
		CI		[99,84; 99,90]	[99,71; 99,79]	[99,62; 99,72]	[99,52; 99,62]	[99,43; 99,55]	[99,33; 99,47]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	76679	69285	63178	58409	54564	51454	48870											
	auswertbar	Anzahl		67164	61376	56815	53190	50320	47610											
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		39	28	25	15	21	19											
		Anteil in %		0,06	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04											
		CI Anteil in %		[0,04; 0,08]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,01; 0,04]	[0,02; 0,06]	[0,02; 0,06]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,90	99,85	99,83	99,79	99,75											
CI			[99,92; 99,96]	[99,88; 99,92]	[99,82; 99,88]	[99,80; 99,86]	[99,75; 99,83]	[99,71; 99,79]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>												
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	65643	58831	52920	48575	45441	42792												
	auswertbar	Anzahl		57091	51286	47150	44260	41514												
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		108	48	43	39	30												
		Anteil in %		0,19	0,09	0,09	0,09	0,07												
		CI Anteil in %		[0,15; 0,22]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,12]	[0,06; 0,12]	[0,05; 0,10]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,72	99,63	99,54	99,47												
		CI		[99,77; 99,85]	[99,68; 99,76]	[99,58; 99,68]	[99,48; 99,60]	[99,41; 99,53]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71661	64960	59126	54721	51206	48262												
	auswertbar	Anzahl		63299	57389	53197	49968	47040												
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		44	26	23	16	23												
		Anteil in %		0,07	0,05	0,04	0,03	0,05												
		CI Anteil in %		[0,05; 0,09]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,05]	[0,03; 0,07]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,89	99,84	99,81	99,76												
CI			[99,91; 99,95]	[99,86; 99,92]	[99,81; 99,87]	[99,77; 99,85]	[99,72; 99,80]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>													

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	75433	67782	61436	56633	52988														
	auswertbar	Anzahl		65945	59643	55119	51539														
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		87	62	52	46														
		Anteil in %		0,13	0,10	0,09	0,09														
		CI Anteil in %		[0,10; 0,16]	[0,08; 0,13]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,12]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,87	99,77	99,67	99,59														
		CI		[99,84; 99,90]	[99,73; 99,81]	[99,62; 99,72]	[99,54; 99,64]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79789	72723	66592	61883	58157														
	auswertbar	Anzahl		70903	64849	60448	56659														
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		39	27	28	18														
		Anteil in %		0,06	0,04	0,05	0,03														
		CI Anteil in %		[0,04; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,05]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,90	99,86	99,83														
CI			[99,93; 99,97]	[99,88; 99,92]	[99,83; 99,89]	[99,80; 99,86]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>															
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	67757	61099	55394	51300															
	auswertbar	Anzahl		59620	53952	49804															
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		87	46	50															
		Anteil in %		0,15	0,09	0,10															
		CI Anteil in %		[0,12; 0,18]	[0,06; 0,11]	[0,07; 0,13]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,86	99,77	99,67															
		CI		[99,83; 99,89]	[99,73; 99,81]	[99,62; 99,72]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73179	66744	61051	56721															
	auswertbar	Anzahl		65310	59563	55256															
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		32	21	28															
		Anteil in %		0,05	0,04	0,05															
		CI Anteil in %		[0,03; 0,07]	[0,02; 0,05]	[0,03; 0,07]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,92	99,87															
CI			[99,93; 99,97]	[99,90; 99,94]	[99,84; 99,90]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73601	66107	60028																
	auswertbar	Anzahl		64460	58128																
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		91	58																
		Anteil in %		0,14	0,10																
		CI Anteil in %		[0,11; 0,17]	[0,07; 0,13]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,86	99,76																
		CI		[99,83; 99,89]	[99,72; 99,80]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79315	72378	66431																
	auswertbar	Anzahl		70770	64485																
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		33	27																
		Anteil in %		0,05	0,04																
		CI Anteil in %		[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,91																
CI			[99,93; 99,97]	[99,89; 99,93]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																	

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	66701	60255																		
	auswertbar	Anzahl		58592																		
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		89																		
		Anteil in %		0,15																		
		CI Anteil in %		[0,12; 0,18]																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,85																		
		CI		[99,82; 99,88]																		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72241	66286																		
	auswertbar	Anzahl		64539																		
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		36																		
		Anteil in %		0,06																		
CI Anteil in %			[0,04; 0,07]																			
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94																			
	CI		[99,92; 99,96]																			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																			
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74175																			
	auswertbar	Anzahl																				
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																				
		CI																				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	77669																			
	auswertbar	Anzahl																				
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl																				
		Anteil in %																				
CI Anteil in %																						
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																					
	CI																					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																				

In Tabelle 3.5.5 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Herzinfarkt** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Herzinfarkt hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Herzin-

farkt dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein erstmalig aufgetretener Herzinfarkt dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier** dargestellt.

Tabelle 3.5.5 Ereigniszeitanalyse: Erstauffreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation

EZ	Erstauffreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14938	12431	10683	9339	8339	7535	6941	6152	5784	5397	5174	4924	4703	4468	4224	3993	3751	3565	3412
	auswertbar	Anzahl		10551	10016	9096	8143	7382	6728	6003	5515	5253	4982	4741	4550	4334	4081	3862	3626	3473	3282
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		46	36	45	29	15	18	10	13	13	7	14	8	8	8	6	12	6	5
		Anteil in %		0,44	0,36	0,49	0,36	0,20	0,27	0,17	0,24	0,25	0,14	0,30	0,18	0,18	0,20	0,16	0,33	0,17	0,15
		CI Anteil in %		[0,31; 0,56]	[0,24; 0,48]	[0,35; 0,64]	[0,23; 0,49]	[0,10; 0,31]	[0,14; 0,39]	[0,06; 0,27]	[0,11; 0,36]	[0,11; 0,38]	[0,04; 0,24]	[0,14; 0,45]	[0,05; 0,30]	[0,06; 0,31]	[0,06; 0,33]	[0,03; 0,28]	[0,14; 0,52]	[0,03; 0,31]	[0,02; 0,29]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,61	99,27	98,79	98,44	98,24	97,98	97,82	97,60	97,36	97,22	96,94	96,77	96,59	96,40	96,25	95,94	95,77	95,63
		CI		[99,50; 99,72]	[99,11; 99,43]	[98,58; 99,00]	[98,20; 98,68]	[97,98; 98,50]	[97,69; 98,27]	[97,51; 98,13]	[97,27; 97,93]	[97,01; 97,71]	[96,85; 97,59]	[96,55; 97,33]	[96,36; 97,18]	[96,16; 97,02]	[95,95; 96,85]	[95,79; 96,71]	[95,45; 96,43]	[95,26; 96,28]	[95,11; 96,15]
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16899</i>	<i>14082</i>	<i>12153</i>	<i>10652</i>	<i>9557</i>	<i>8669</i>	<i>7996</i>	<i>7104</i>	<i>6687</i>	<i>6220</i>	<i>5968</i>	<i>5677</i>	<i>5409</i>	<i>5125</i>	<i>4851</i>	<i>4591</i>	<i>4306</i>	<i>4096</i>	<i>3910</i>
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	22101	18651	16227	14334	12986	11904	11040	9812	9189	8606	8237	7788	7394	6985	6586	6238	5884	5608	5341
	auswertbar	Anzahl		15885	15270	14035	12663	11692	10703	9576	8778	8388	7911	7488	7161	6775	6392	6067	5711	5451	5170
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		34	43	32	29	18	13	13	8	9	12	26	7	11	8	5	5	2	5
		Anteil in %		0,21	0,28	0,23	0,23	0,15	0,12	0,14	0,09	0,11	0,15	0,35	0,10	0,16	0,13	0,08	0,09	0,04	0,10
		CI Anteil in %		[0,14; 0,29]	[0,20; 0,37]	[0,15; 0,31]	[0,15; 0,31]	[0,08; 0,23]	[0,06; 0,19]	[0,06; 0,21]	[0,03; 0,15]	[0,04; 0,18]	[0,07; 0,24]	[0,21; 0,48]	[0,03; 0,17]	[0,07; 0,26]	[0,04; 0,21]	[0,01; 0,15]	[0,01; 0,16]	[0,00; 0,09]	[0,01; 0,18]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,54	99,32	99,09	98,94	98,82	98,69	98,60	98,50	98,35	98,01	97,92	97,76	97,64	97,56	97,47	97,44	97,34
CI			[99,75; 99,87]	[99,44; 99,64]	[99,19; 99,45]	[98,94; 99,24]	[98,77; 99,11]	[98,64; 99,00]	[98,50; 98,88]	[98,40; 98,80]	[98,29; 98,71]	[98,12; 98,58]	[97,75; 98,27]	[97,65; 98,19]	[97,47; 98,05]	[97,34; 97,94]	[97,25; 97,87]	[97,16; 97,78]	[97,12; 97,76]	[97,01; 97,67]	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23425</i>	<i>19774</i>	<i>17225</i>	<i>15242</i>	<i>13824</i>	<i>12682</i>	<i>11761</i>	<i>10454</i>	<i>9791</i>	<i>9172</i>	<i>8775</i>	<i>8282</i>	<i>7877</i>	<i>7432</i>	<i>7023</i>	<i>6650</i>	<i>6268</i>	<i>5980</i>	<i>5695</i>	
2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	98693	76680	63683	54596	47665	42921	38838	36347	34572	33158	31837	30484	28985	27682	26461	25232	24083	23060	
	auswertbar	Anzahl		69422	61280	52952	46513	41760	37895	34927	33290	31477	29775	28864	27615	26320	25121	23900	22830	21710	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		413	213	174	149	111	77	89	56	71	153	68	65	59	43	36	46	37	
		Anteil in %		0,59	0,35	0,33	0,32	0,27	0,20	0,25	0,17	0,23	0,51	0,24	0,24	0,22	0,17	0,15	0,20	0,17	
		CI Anteil in %		[0,54; 0,65]	[0,30; 0,39]	[0,28; 0,38]	[0,27; 0,37]	[0,22; 0,32]	[0,16; 0,25]	[0,20; 0,31]	[0,12; 0,21]	[0,17; 0,28]	[0,43; 0,60]	[0,18; 0,29]	[0,18; 0,29]	[0,17; 0,28]	[0,12; 0,22]	[0,10; 0,20]	[0,14; 0,26]	[0,12; 0,23]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,44	99,11	98,78	98,47	98,21	98,01	97,77	97,61	97,39	96,91	96,68	96,45	96,24	96,08	95,93	95,74	95,58	
		CI		[99,39; 99,49]	[99,04; 99,18]	[98,70; 98,86]	[98,37; 98,57]	[98,10; 98,32]	[97,89; 98,13]	[97,64; 97,90]	[97,48; 97,74]	[97,25; 97,53]	[96,75; 97,07]	[96,51; 96,85]	[96,27; 96,63]	[96,05; 96,43]	[95,89; 96,27]	[95,73; 96,13]	[95,54; 95,94]	[95,37; 95,79]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>113351</i>	<i>88040</i>	<i>73383</i>	<i>63050</i>	<i>55111</i>	<i>49635</i>	<i>44958</i>	<i>42030</i>	<i>40030</i>	<i>38378</i>	<i>36843</i>	<i>35375</i>	<i>33628</i>	<i>32116</i>	<i>30707</i>	<i>29278</i>	<i>27932</i>	<i>26736</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	134017	105201	88064	75832	66748	60081	54484	50791	48468	46506	44675	42792	40701	38913	37207	35552	34002	32566	
	auswertbar	Anzahl		95966	84957	73654	65179	58584	53176	48793	46838	44260	41811	40539	38770	36982	35395	33734	32205	30673	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		363	210	139	112	111	65	71	71	63	126	77	52	53	45	33	40	45	
		Anteil in %		0,38	0,25	0,19	0,17	0,19	0,12	0,15	0,15	0,14	0,30	0,19	0,13	0,14	0,13	0,10	0,12	0,15	
		CI Anteil in %		[0,34; 0,42]	[0,21; 0,28]	[0,16; 0,22]	[0,14; 0,20]	[0,15; 0,22]	[0,09; 0,15]	[0,11; 0,18]	[0,12; 0,19]	[0,11; 0,18]	[0,25; 0,35]	[0,15; 0,23]	[0,10; 0,17]	[0,10; 0,18]	[0,09; 0,16]	[0,06; 0,13]	[0,09; 0,16]	[0,10; 0,19]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,64	99,40	99,22	99,05	98,86	98,75	98,60	98,46	98,32	98,03	97,85	97,72	97,58	97,46	97,36	97,24	97,10	
CI			[99,60; 99,68]	[99,35; 99,45]	[99,16; 99,28]	[98,98; 99,12]	[98,79; 98,93]	[98,67; 98,83]	[98,51; 98,69]	[98,37; 98,55]	[98,22; 98,42]	[97,92; 98,14]	[97,73; 97,97]	[97,60; 97,84]	[97,45; 97,71]	[97,33; 97,59]	[97,22; 97,50]	[97,10; 97,38]	[96,95; 97,25]		
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>142866</i>	<i>112069</i>	<i>93979</i>	<i>81049</i>	<i>71389</i>	<i>64294</i>	<i>58333</i>	<i>54388</i>	<i>51899</i>	<i>49824</i>	<i>47865</i>	<i>45920</i>	<i>43703</i>	<i>41770</i>	<i>39917</i>	<i>38116</i>	<i>36445</i>	<i>34887</i>		

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74460	66715	58989	53522	50145	47504	45132	42767	40457	38477	36582	34894	33267	31818					
	auswertbar	Anzahl		63935	56872	51128	48099	45045	42293	40696	38685	36737	34934	33235	31689	30228					
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		311	150	142	110	86	194	97	80	93	75	72	52	59					
		Anteil in %		0,49	0,26	0,28	0,23	0,19	0,46	0,24	0,21	0,25	0,21	0,22	0,16	0,20					
		CI Anteil in %		[0,43; 0,54]	[0,22; 0,31]	[0,23; 0,32]	[0,19; 0,27]	[0,15; 0,23]	[0,39; 0,52]	[0,19; 0,29]	[0,16; 0,25]	[0,20; 0,30]	[0,17; 0,26]	[0,17; 0,27]	[0,12; 0,21]	[0,15; 0,24]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,53	99,27	99,00	98,78	98,59	98,16	97,93	97,73	97,48	97,27	97,06	96,91	96,72					
		CI		[99,48; 99,58]	[99,20; 99,34]	[98,92; 99,08]	[98,69; 98,87]	[98,49; 98,69]	[98,04; 98,28]	[97,81; 98,05]	[97,60; 97,86]	[97,34; 97,62]	[97,12; 97,42]	[96,91; 97,21]	[96,75; 97,07]	[96,55; 96,89]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>82253</i>	<i>73718</i>	<i>65422</i>	<i>59436</i>	<i>55776</i>	<i>52856</i>	<i>50253</i>	<i>47742</i>	<i>45177</i>	<i>42958</i>	<i>40893</i>	<i>39008</i>	<i>37209</i>	<i>35545</i>					
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	90933	82402	73545	67131	63335	60104	57286	54455	51575	49137	46696	44487	42472	40655					
	auswertbar	Anzahl		79266	71096	64375	60810	57051	53752	51839	49365	47039	44649	42499	40506	38668					
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		210	121	85	90	84	146	88	74	62	49	61	45	45					
		Anteil in %		0,26	0,17	0,13	0,15	0,15	0,27	0,17	0,15	0,13	0,11	0,14	0,11	0,12					
		CI Anteil in %		[0,23; 0,30]	[0,14; 0,20]	[0,10; 0,16]	[0,12; 0,18]	[0,12; 0,18]	[0,23; 0,32]	[0,13; 0,21]	[0,12; 0,18]	[0,10; 0,16]	[0,08; 0,14]	[0,11; 0,18]	[0,08; 0,14]	[0,08; 0,15]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,74	99,57	99,45	99,30	99,16	98,90	98,73	98,59	98,46	98,35	98,21	98,10	97,99					
		CI		[99,71; 99,77]	[99,52; 99,62]	[99,40; 99,50]	[99,24; 99,36]	[99,09; 99,23]	[98,82; 98,98]	[98,64; 98,82]	[98,50; 98,68]	[98,36; 98,56]	[98,25; 98,45]	[98,10; 98,32]	[97,99; 98,21]	[97,87; 98,11]					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>95017</i>	<i>86040</i>	<i>76949</i>	<i>70289</i>	<i>66335</i>	<i>62988</i>	<i>60040</i>	<i>57162</i>	<i>54131</i>	<i>51560</i>	<i>49016</i>	<i>46705</i>	<i>44599</i>	<i>42683</i>						
2006-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	89624	80085	72154	66695	62739	59424	56161	52861	50097	47585	45320	43165	41257						
	auswertbar	Anzahl		77324	68316	63711	59197	54922	52951	49987	47348	45054	42708	40657	38664						
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		337	188	136	123	290	144	99	111	101	79	103	76						
		Anteil in %		0,44	0,28	0,21	0,21	0,53	0,27	0,20	0,23	0,22	0,18	0,25	0,20						
		CI Anteil in %		[0,39; 0,48]	[0,24; 0,31]	[0,18; 0,25]	[0,17; 0,24]	[0,47; 0,59]	[0,23; 0,32]	[0,16; 0,24]	[0,19; 0,28]	[0,18; 0,27]	[0,14; 0,23]	[0,20; 0,30]	[0,15; 0,24]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,57	99,31	99,10	98,90	98,40	98,13	97,94	97,72	97,50	97,32	97,08	96,88						
		CI		[99,52; 99,62]	[99,25; 99,37]	[99,03; 99,17]	[98,82; 98,98]	[98,30; 98,50]	[98,03; 98,23]	[97,83; 98,05]	[97,60; 97,84]	[97,37; 97,63]	[97,19; 97,45]	[96,94; 97,22]	[96,73; 97,03]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98603</i>	<i>88202</i>	<i>79739</i>	<i>73830</i>	<i>69513</i>	<i>65875</i>	<i>62516</i>	<i>58915</i>	<i>55879</i>	<i>53125</i>	<i>50627</i>	<i>48227</i>	<i>46133</i>						
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	107776	97484	88553	82503	77969	74113	70377	66439	62976	59864	56861	54167	51780						
	auswertbar	Anzahl		94477	83981	79061	73700	68671	66512	62955	59703	56716	53712	51193	48623						
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		253	141	99	96	217	126	71	66	71	77	59	53						
		Anteil in %		0,27	0,17	0,13	0,13	0,32	0,19	0,11	0,11	0,13	0,14	0,12	0,11						
		CI Anteil in %		[0,23; 0,30]	[0,14; 0,20]	[0,10; 0,15]	[0,10; 0,16]	[0,27; 0,36]	[0,16; 0,22]	[0,09; 0,14]	[0,08; 0,14]	[0,10; 0,15]	[0,11; 0,18]	[0,09; 0,14]	[0,08; 0,14]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,74	99,58	99,45	99,33	99,02	98,84	98,73	98,62	98,50	98,36	98,25	98,14						
		CI		[99,71; 99,77]	[99,54; 99,62]	[99,40; 99,50]	[99,28; 99,38]	[98,95; 99,09]	[98,77; 98,91]	[98,65; 98,81]	[98,54; 98,70]	[98,41; 98,59]	[98,27; 98,45]	[98,15; 98,35]	[98,04; 98,24]						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112511</i>	<i>101744</i>	<i>92563</i>	<i>86309</i>	<i>81576</i>	<i>77574</i>	<i>73783</i>	<i>69703</i>	<i>66080</i>	<i>62828</i>	<i>59695</i>	<i>56874</i>	<i>54383</i>							
2006-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	85494	77927	70804	65921	62083	58404	54770	51829	49093	46620	44358	42327							
	auswertbar	Anzahl		74485	67552	62017	57480	54855	51860	48873	46425	43952	41765	39595							
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		337	176	136	288	151	94	110	104	104	82	92							
		Anteil in %		0,45	0,26	0,22	0,50	0,28	0,18	0,23	0,22	0,24	0,20	0,23							
		CI Anteil in %		[0,40; 0,50]	[0,22; 0,30]	[0,18; 0,26]	[0,44; 0,56]	[0,23; 0,32]	[0,14; 0,22]	[0,18; 0,27]	[0,18; 0,27]	[0,19; 0,28]	[0,15; 0,24]	[0,18; 0,28]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,56	99,31	99,10	98,62	98,35	98,17	97,96	97,74	97,51	97,32	97,09							
		CI		[99,51; 99,61]	[99,25; 99,37]	[99,03; 99,17]	[98,53; 98,71]	[98,25; 98,45]	[98,07; 98,27]	[97,85; 98,07]	[97,62; 97,86]	[97,38; 97,64]	[97,19; 97,45]	[96,95; 97,23]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>94020</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	101874	93726	86076	80468	76044	71879	67590	64027	60678	57710	55007	52600							
	auswertbar	Anzahl		89869	82176	75722	70420	67476	63970	60395	57289	54329	51844	49229							
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		199	112	85	210	124	94	83	73	60	69	47							
		Anteil in %		0,22	0,14	0,11	0,30	0,18	0,15	0,14	0,13	0,11	0,13	0,10							
		CI Anteil in %		[0,19; 0,25]	[0,11; 0,16]	[0,09; 0,14]	[0,26; 0,34]	[0,15; 0,22]	[0,12; 0,18]	[0,11; 0,17]	[0,10; 0,16]	[0,08; 0,14]	[0,10; 0,16]	[0,07; 0,12]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,78	99,65	99,54	99,26	99,08	98,93	98,80	98,67	98,57	98,44	98,34							
		CI		[99,75; 99,81]	[99,61; 99,69]	[99,50; 99,58]	[99,20; 99,32]	[99,01; 99,15]	[98,86; 99,00]	[98,72; 98,88]	[98,59; 98,75]	[98,48; 98,66]	[98,35; 98,53]	[98,24; 98,44]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>106368</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>								

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	90518	82120	75286	70242	65843	61362	57673	54306	51454	48940	46644								
	auswertbar	Anzahl		78960	70949	65109	61980	58208	54674	51616	48800	46396	44066								
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		317	188	340	185	140	118	93	89	82	96								
		Anteil in %		0,40	0,26	0,52	0,30	0,24	0,22	0,18	0,18	0,18	0,22								
		CI Anteil in %		[0,36; 0,45]	[0,23; 0,30]	[0,47; 0,58]	[0,26; 0,34]	[0,20; 0,28]	[0,18; 0,25]	[0,14; 0,22]	[0,14; 0,22]	[0,14; 0,21]	[0,17; 0,26]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,61	99,35	98,85	98,56	98,33	98,12	97,94	97,77	97,59	97,38								
		CI		[99,57; 99,65]	[99,29; 99,41]	[98,77; 98,93]	[98,47; 98,65]	[98,23; 98,43]	[98,02; 98,22]	[97,83; 98,05]	[97,66; 97,88]	[97,47; 97,71]	[97,25; 97,51]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	107835	99131	91744	85859	80701	75571	71348	67488	63917	60771	58006								
	auswertbar	Anzahl		95519	86571	79786	76132	71794	67822	64113	60650	57674	54787								
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		196	143	238	124	90	84	65	85	64	72								
		Anteil in %		0,21	0,17	0,30	0,16	0,13	0,12	0,10	0,14	0,11	0,13								
		CI Anteil in %		[0,18; 0,23]	[0,14; 0,19]	[0,26; 0,34]	[0,13; 0,19]	[0,10; 0,15]	[0,10; 0,15]	[0,08; 0,13]	[0,11; 0,17]	[0,08; 0,14]	[0,10; 0,16]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,80	99,64	99,35	99,19	99,07	98,95	98,85	98,71	98,60	98,47								
CI			[99,77; 99,83]	[99,60; 99,68]	[99,30; 99,40]	[99,13; 99,25]	[99,01; 99,13]	[98,88; 99,02]	[98,78; 98,92]	[98,63; 98,79]	[98,52; 98,68]	[98,38; 98,56]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>									
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	83577	76248	70276	65117	60035	56262	52828	49849	47285	45029									
	auswertbar	Anzahl		71955	64379	60723	56627	53092	49881	46935	44614	42154									
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		263	317	161	146	128	99	92	86	83									
		Anteil in %		0,37	0,49	0,27	0,26	0,24	0,20	0,20	0,19	0,20									
		CI Anteil in %		[0,32; 0,41]	[0,44; 0,55]	[0,22; 0,31]	[0,22; 0,30]	[0,20; 0,28]	[0,16; 0,24]	[0,16; 0,24]	[0,15; 0,23]	[0,15; 0,24]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,65	99,17	98,91	98,66	98,43	98,24	98,05	97,86	97,67									
		CI		[99,61; 99,69]	[99,10; 99,24]	[98,83; 98,99]	[98,57; 98,75]	[98,33; 98,53]	[98,14; 98,34]	[97,94; 98,16]	[97,74; 97,98]	[97,55; 97,79]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	98909	91133	84760	79083	73454	69007	65049	61471	58467	55711									
	auswertbar	Anzahl		86250	77637	73773	69216	65027	61273	57907	55058	52106									
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		171	228	122	94	70	65	63	66	51									
		Anteil in %		0,20	0,29	0,17	0,14	0,11	0,11	0,11	0,12	0,10									
		CI Anteil in %		[0,17; 0,23]	[0,26; 0,33]	[0,14; 0,19]	[0,11; 0,16]	[0,08; 0,13]	[0,08; 0,13]	[0,08; 0,14]	[0,09; 0,15]	[0,07; 0,12]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,53	99,36	99,23	99,12	99,02	98,91	98,80	98,70									
CI			[99,78; 99,84]	[99,48; 99,58]	[99,31; 99,41]	[99,17; 99,29]	[99,05; 99,19]	[98,95; 99,09]	[98,84; 98,98]	[98,72; 98,88]	[98,62; 98,78]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>										
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	91309	83727	76593	69259	64195	60047	56493	53449	50729										
	auswertbar	Anzahl		78380	72075	66324	61644	57817	54427	51479	48647										
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		504	213	140	107	125	98	83	94										
		Anteil in %		0,64	0,30	0,21	0,17	0,22	0,18	0,16	0,19										
		CI Anteil in %		[0,59; 0,70]	[0,26; 0,34]	[0,18; 0,25]	[0,14; 0,21]	[0,18; 0,25]	[0,14; 0,22]	[0,13; 0,20]	[0,15; 0,23]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,38	99,09	98,89	98,72	98,50	98,33	98,17	97,98										
		CI		[99,33; 99,43]	[99,02; 99,16]	[98,82; 98,96]	[98,64; 98,80]	[98,41; 98,59]	[98,23; 98,43]	[98,07; 98,27]	[97,87; 98,09]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	105664	97959	90477	82491	76979	72234	68277	64714	61552										
	auswertbar	Anzahl		92124	85548	79158	74082	69732	65844	62482	59158										
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		299	125	98	87	85	62	73	63										
		Anteil in %		0,32	0,15	0,12	0,12	0,12	0,09	0,12	0,11										
		CI Anteil in %		[0,29; 0,36]	[0,12; 0,17]	[0,10; 0,15]	[0,09; 0,14]	[0,10; 0,15]	[0,07; 0,12]	[0,09; 0,14]	[0,08; 0,13]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,69	99,54	99,42	99,31	99,19	99,09	98,98	98,87										
CI			[99,65; 99,73]	[99,50; 99,58]	[99,37; 99,47]	[99,25; 99,37]	[99,13; 99,25]	[99,03; 99,15]	[98,91; 99,05]	[98,80; 98,94]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>											

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	64408	58526	52469	48171	44849	42000	39655	37583										
	auswertbar	Anzahl		56256	50655	46628	43542	40811	38552	36403										
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		272	140	112	88	83	70	71										
		Anteil in %		0,48	0,28	0,24	0,20	0,20	0,18	0,20										
		CI Anteil in %		[0,43; 0,54]	[0,23; 0,32]	[0,20; 0,28]	[0,16; 0,24]	[0,16; 0,25]	[0,14; 0,22]	[0,15; 0,24]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,53	99,25	99,02	98,82	98,62	98,44	98,25										
		CI		[99,47; 99,59]	[99,18; 99,32]	[98,94; 99,10]	[98,73; 98,91]	[98,52; 98,72]	[98,33; 98,55]	[98,13; 98,37]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72633	66639	60585	56004	52429	49245	46700	44374										
	auswertbar	Anzahl		64138	58574	54330	51045	47903	45484	43072										
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		148	85	77	58	55	46	66										
		Anteil in %		0,23	0,15	0,14	0,11	0,11	0,10	0,15										
		CI Anteil in %		[0,19; 0,27]	[0,11; 0,18]	[0,11; 0,17]	[0,08; 0,14]	[0,08; 0,15]	[0,07; 0,13]	[0,12; 0,19]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,77	99,63	99,49	99,38	99,27	99,17	99,02										
CI			[99,73; 99,81]	[99,58; 99,68]	[99,43; 99,55]	[99,32; 99,44]	[99,20; 99,34]	[99,09; 99,25]	[98,94; 99,10]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>											
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	69375	61956	55767	51203	47693	44730	42270											
	auswertbar	Anzahl		59966	54034	49804	46410	43539	41055											
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		225	134	104	91	77	77											
		Anteil in %		0,38	0,25	0,21	0,20	0,18	0,19											
		CI Anteil in %		[0,33; 0,42]	[0,21; 0,29]	[0,17; 0,25]	[0,16; 0,24]	[0,14; 0,22]	[0,15; 0,23]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,63	99,39	99,18	98,99	98,82	98,63											
		CI		[99,58; 99,68]	[99,33; 99,45]	[99,11; 99,25]	[98,91; 99,07]	[98,73; 98,91]	[98,53; 98,73]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	75559	68298	62212	57498	53661	50572	48019											
	auswertbar	Anzahl		66226	60435	55932	52309	49461	46787											
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		126	63	75	56	50	50											
		Anteil in %		0,19	0,10	0,13	0,11	0,10	0,11											
		CI Anteil in %		[0,16; 0,22]	[0,08; 0,13]	[0,10; 0,16]	[0,08; 0,14]	[0,07; 0,13]	[0,08; 0,14]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,71	99,58	99,47	99,37	99,27											
CI			[99,78; 99,84]	[99,67; 99,75]	[99,53; 99,63]	[99,41; 99,53]	[99,31; 99,43]	[99,20; 99,34]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>												
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63746	57128	51227	46914	43813	41216												
	auswertbar	Anzahl		55443	49631	45527	42678	39984												
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		214	120	94	71	74												
		Anteil in %		0,39	0,24	0,21	0,17	0,19												
		CI Anteil in %		[0,33; 0,44]	[0,20; 0,28]	[0,16; 0,25]	[0,13; 0,21]	[0,14; 0,23]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,62	99,38	99,18	99,02	98,83												
		CI		[99,57; 99,67]	[99,31; 99,45]	[99,10; 99,26]	[98,93; 99,11]	[98,73; 98,93]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	70660	64049	58228	53834	50343	47433												
	auswertbar	Anzahl		62424	56515	52342	49135	46223												
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		124	73	58	42	48												
		Anteil in %		0,20	0,13	0,11	0,09	0,10												
		CI Anteil in %		[0,16; 0,23]	[0,10; 0,16]	[0,08; 0,14]	[0,06; 0,11]	[0,07; 0,13]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,80	99,68	99,57	99,48	99,38												
CI			[99,77; 99,83]	[99,63; 99,73]	[99,52; 99,62]	[99,42; 99,54]	[99,31; 99,45]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>													

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73286	65825	59498	54767	51186															
	auswertbar	Anzahl		64036	57747	53320	49776															
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		211	126	109	108															
		Anteil in %			0,33	0,22	0,20	0,22														
		CI Anteil in %			[0,29; 0,37]	[0,18; 0,26]	[0,17; 0,24]	[0,18; 0,26]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,67	99,46	99,26	99,04														
		CI			[99,63; 99,71]	[99,40; 99,52]	[99,19; 99,33]	[98,96; 99,12]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	78865	71896	65779	61084	57367															
	auswertbar	Anzahl		70107	64060	59670	55896															
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		111	88	80	54															
		Anteil in %			0,16	0,14	0,13	0,10														
		CI Anteil in %			[0,13; 0,19]	[0,11; 0,17]	[0,10; 0,16]	[0,07; 0,12]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,84	99,71	99,58	99,48														
CI				[99,81; 99,87]	[99,67; 99,75]	[99,53; 99,63]	[99,42; 99,54]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>																
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	66050	59518	53860	49800																
	auswertbar	Anzahl		58085	52450	48349																
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		186	106	108																
		Anteil in %			0,32	0,20	0,22															
		CI Anteil in %			[0,27; 0,37]	[0,16; 0,24]	[0,18; 0,27]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,68	99,48	99,26															
		CI			[99,63; 99,73]	[99,42; 99,54]	[99,19; 99,33]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72280	65925	60224	55917																
	auswertbar	Anzahl		64513	58745	54476																
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		126	69	67																
		Anteil in %			0,20	0,12	0,12															
		CI Anteil in %			[0,16; 0,23]	[0,09; 0,15]	[0,09; 0,15]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,81	99,69	99,57															
CI				[99,78; 99,84]	[99,65; 99,73]	[99,52; 99,62]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																	
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71659	64355	58331																	
	auswertbar	Anzahl		62740	56488																	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		198	98																	
		Anteil in %			0,32	0,17																
		CI Anteil in %			[0,27; 0,36]	[0,14; 0,21]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,69	99,51																
		CI			[99,65; 99,73]	[99,45; 99,57]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	78402	71565	65585																	
	auswertbar	Anzahl		69961	63656																	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		131	83																	
		Anteil in %			0,19	0,13																
		CI Anteil in %			[0,16; 0,22]	[0,10; 0,16]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			99,81	99,68																
CI				[99,78; 99,84]	[99,64; 99,72]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																		

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	65039	58743																		
	auswertbar	Anzahl		57106																		
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		177																		
		Anteil in %		0,31																		
		CI Anteil in %		[0,26; 0,36]																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,69																		
		CI		[99,64; 99,74]																		
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71426	65547																		
	auswertbar	Anzahl		63828																		
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		101																		
		Anteil in %		0,16																		
CI Anteil in %			[0,13; 0,19]																			
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,84																			
	CI		[99,81; 99,87]																			
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																			
2012-1	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	72293																			
	auswertbar	Anzahl																				
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																				
		CI																				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	76771																			
	auswertbar	Anzahl																				
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl																				
		Anteil in %																				
CI Anteil in %																						
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																					
	CI																					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																				

In Tabelle 3.5.6 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Schlaganfall** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Schlaganfall hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein Schlag-

anfall dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein erstmalig aufgetretener Schlaganfall dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier** dargestellt.

Tabelle 3.5.6 Ereigniszeitanalyse: Erstaufreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation

EZ	Erstaufreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	15764	13139	11340	9907	8870	8029	7405	6584	6189	5759	5514	5246	4896	4628	4362	4117	3869	3682	3515
	auswertbar	Anzahl		11178	10637	9658	8654	7869	7190	6425	5892	5597	5309	5046	4741	4481	4214	3996	3736	3581	3382
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		43	43	43	39	23	21	21	16	21	11	121	30	25	22	12	15	11	11
		Anteil in %		0,38	0,40	0,45	0,45	0,29	0,29	0,33	0,27	0,38	0,21	2,40	0,63	0,56	0,52	0,30	0,40	0,31	0,33
		CI Anteil in %		[0,27; 0,50]	[0,28; 0,52]	[0,31; 0,58]	[0,31; 0,59]	[0,17; 0,41]	[0,17; 0,42]	[0,19; 0,47]	[0,14; 0,40]	[0,22; 0,54]	[0,08; 0,33]	[1,98; 2,82]	[0,41; 0,86]	[0,34; 0,78]	[0,30; 0,74]	[0,13; 0,47]	[0,20; 0,60]	[0,13; 0,49]	[0,13; 0,52]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,66	99,28	98,84	98,40	98,11	97,83	97,51	97,25	96,89	96,69	94,40	93,81	93,29	92,81	92,53	92,16	91,88	91,58
		CI		[99,56; 99,76]	[99,13; 99,43]	[98,64; 99,04]	[98,16; 98,64]	[97,84; 98,38]	[97,54; 98,12]	[97,19; 97,83]	[96,90; 97,60]	[96,51; 97,27]	[96,30; 97,08]	[93,84; 94,96]	[93,22; 94,40]	[92,67; 93,91]	[92,16; 93,46]	[91,86; 93,20]	[91,47; 92,85]	[91,17; 92,59]	[90,85; 92,31]
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>16899</i>	<i>14082</i>	<i>12153</i>	<i>10652</i>	<i>9557</i>	<i>8669</i>	<i>7996</i>	<i>7104</i>	<i>6687</i>	<i>6220</i>	<i>5968</i>	<i>5677</i>	<i>5409</i>	<i>5125</i>	<i>4851</i>	<i>4591</i>	<i>4306</i>	<i>4096</i>	<i>3910</i>
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	22191	18779	16339	14426	13032	11923	11042	9816	9195	8610	8229	7763	7250	6836	6452	6116	5766	5500	5230
	auswertbar	Anzahl		16039	15369	14126	12705	11719	10711	9591	8778	8391	7898	7464	7013	6634	6262	5954	5597	5344	5061
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		85	69	88	59	54	35	31	31	24	28	154	35	34	23	13	12	17	14
		Anteil in %		0,53	0,45	0,62	0,46	0,46	0,33	0,32	0,35	0,29	0,35	2,06	0,50	0,51	0,37	0,22	0,21	0,32	0,28
		CI Anteil in %		[0,42; 0,64]	[0,34; 0,55]	[0,49; 0,75]	[0,35; 0,58]	[0,34; 0,58]	[0,22; 0,43]	[0,21; 0,44]	[0,23; 0,48]	[0,17; 0,40]	[0,22; 0,49]	[1,74; 2,39]	[0,33; 0,66]	[0,34; 0,68]	[0,22; 0,52]	[0,10; 0,34]	[0,09; 0,34]	[0,17; 0,47]	[0,13; 0,42]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,53	99,10	98,49	98,04	97,59	97,28	96,97	96,63	96,36	96,02	94,06	93,59	93,12	92,78	92,58	92,38	92,08	91,83
		CI		[99,43; 99,63]	[98,96; 99,24]	[98,30; 98,68]	[97,82; 98,26]	[97,34; 97,84]	[97,01; 97,55]	[96,68; 97,26]	[96,32; 96,94]	[96,03; 96,69]	[95,67; 96,37]	[93,60; 94,52]	[93,11; 94,07]	[92,61; 93,63]	[92,26; 93,30]	[92,05; 93,11]	[91,83; 92,93]	[91,52; 92,64]	[91,26; 92,40]
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>23425</i>	<i>19774</i>	<i>17225</i>	<i>15242</i>	<i>13824</i>	<i>12682</i>	<i>11761</i>	<i>10454</i>	<i>9791</i>	<i>9172</i>	<i>8775</i>	<i>8282</i>	<i>7877</i>	<i>7432</i>	<i>7023</i>	<i>6650</i>	<i>6268</i>	<i>5980</i>	<i>5695</i>
2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	105950	82331	68428	58567	50982	45819	41421	38661	36776	35225	33790	31853	30152	28759	27460	26146	24917	23807	
	auswertbar	Anzahl		74561	65886	56806	49737	44569	40394	37136	35406	33437	31586	30165	28713	27349	26046	24735	23593	22393	
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		369	338	292	188	152	134	118	112	106	692	218	125	112	94	92	100	68	
		Anteil in %		0,49	0,51	0,51	0,38	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	2,19	0,72	0,44	0,41	0,36	0,37	0,42	0,30	
		CI Anteil in %		[0,44; 0,55]	[0,46; 0,57]	[0,46; 0,57]	[0,32; 0,43]	[0,29; 0,40]	[0,28; 0,39]	[0,26; 0,37]	[0,26; 0,37]	[0,26; 0,38]	[2,03; 2,35]	[0,63; 0,82]	[0,36; 0,51]	[0,33; 0,49]	[0,29; 0,43]	[0,30; 0,45]	[0,34; 0,51]	[0,23; 0,38]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,54	99,04	98,54	98,17	97,84	97,52	97,21	96,91	96,61	94,55	93,88	93,47	93,09	92,76	92,41	92,02	91,74	
		CI		[99,49; 99,59]	[98,97; 99,11]	[98,45; 98,63]	[98,07; 98,27]	[97,72; 97,96]	[97,39; 97,65]	[97,07; 97,35]	[96,76; 97,06]	[96,45; 96,77]	[94,33; 94,77]	[93,65; 94,11]	[93,23; 93,71]	[92,84; 93,34]	[92,50; 93,02]	[92,14; 92,68]	[91,74; 92,30]	[91,45; 92,03]	
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>113351</i>	<i>88040</i>	<i>73383</i>	<i>63050</i>	<i>55111</i>	<i>49635</i>	<i>44958</i>	<i>42030</i>	<i>40030</i>	<i>38378</i>	<i>36843</i>	<i>35375</i>	<i>33628</i>	<i>32116</i>	<i>30707</i>	<i>29278</i>	<i>27932</i>	<i>26736</i>	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	135349	106397	89001	76524	67268	60498	54835	51023	48609	46623	44770	42198	40055	38226	36467	34844	33317	31893	
	auswertbar	Anzahl		97127	85883	74341	65698	59003	53515	49015	46987	44389	41920	39970	38136	36290	34671	33055	31549	30030	
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		456	452	278	224	181	181	151	141	116	893	236	153	138	95	101	98	99	
		Anteil in %		0,47	0,53	0,37	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	0,26	2,13	0,59	0,40	0,38	0,27	0,31	0,31	0,33	
		CI Anteil in %		[0,43; 0,51]	[0,48; 0,57]	[0,33; 0,42]	[0,30; 0,39]	[0,26; 0,35]	[0,29; 0,39]	[0,26; 0,36]	[0,25; 0,35]	[0,21; 0,31]	[1,99; 2,27]	[0,52; 0,67]	[0,34; 0,46]	[0,32; 0,44]	[0,22; 0,33]	[0,25; 0,37]	[0,25; 0,37]	[0,26; 0,39]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,56	99,05	98,68	98,35	98,05	97,72	97,43	97,14	96,89	94,88	94,32	93,95	93,59	93,34	93,06	92,77	92,46	
		CI		[99,52; 99,60]	[98,99; 99,11]	[98,60; 98,76]	[98,26; 98,44]	[97,95; 98,15]	[97,61; 97,83]	[97,31; 97,55]	[97,01; 97,27]	[96,76; 97,02]	[94,70; 95,06]	[94,12; 94,52]	[93,75; 94,15]	[93,38; 93,80]	[93,12; 93,56]	[92,84; 93,28]	[92,54; 93,00]	[92,22; 92,70]	
	<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>142866</i>	<i>112069</i>	<i>93979</i>	<i>81049</i>	<i>71389</i>	<i>64294</i>	<i>58333</i>	<i>54388</i>	<i>51899</i>	<i>49824</i>	<i>47865</i>	<i>45920</i>	<i>43703</i>	<i>41770</i>	<i>39917</i>	<i>38116</i>	<i>36445</i>	<i>34887</i>	

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	93269	84612	77533	72343	66957	62207	58411	54965	52052	49488	47137							
	auswertbar	Anzahl		81383	73059	67032	63050	59014	55387	52252	49352	46943	44529							
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		370	218	1233	379	282	219	188	155	163	155							
		Anteil in %		0,45	0,30	1,84	0,60	0,48	0,40	0,36	0,31	0,35	0,35							
		CI Anteil in %		[0,41; 0,50]	[0,26; 0,34]	[1,74; 1,94]	[0,54; 0,66]	[0,42; 0,53]	[0,34; 0,45]	[0,31; 0,41]	[0,26; 0,36]	[0,29; 0,40]	[0,29; 0,40]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,56	99,27	97,51	96,93	96,47	96,10	95,75	95,46	95,13	94,80							
		CI		[99,51; 99,61]	[99,21; 99,33]	[97,40; 97,62]	[96,80; 97,06]	[96,33; 96,61]	[95,95; 96,25]	[95,60; 95,90]	[95,30; 95,62]	[94,96; 95,30]	[94,63; 94,97]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	106714	98074	90648	84838	78833	73632	69446	65602	62073	59003	56294							
	auswertbar	Anzahl		94543	85623	78871	74404	69969	66017	62332	58925	56008	53189							
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		369	233	1293	432	273	256	199	170	162	159							
		Anteil in %		0,39	0,27	1,64	0,58	0,39	0,39	0,32	0,29	0,29	0,30							
CI Anteil in %			[0,35; 0,43]	[0,24; 0,31]	[1,55; 1,73]	[0,53; 0,64]	[0,34; 0,44]	[0,34; 0,44]	[0,27; 0,36]	[0,25; 0,33]	[0,24; 0,33]	[0,25; 0,35]								
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,62	99,35	97,78	97,22	96,85	96,48	96,17	95,90	95,62	95,34								
	CI		[99,58; 99,66]	[99,30; 99,40]	[97,68; 97,88]	[97,11; 97,33]	[96,73; 96,97]	[96,35; 96,61]	[96,04; 96,30]	[95,76; 96,04]	[95,47; 95,77]	[95,19; 95,49]								
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>								
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	86063	78525	72355	66204	60868	56974	53458	50408	47830	45506								
	auswertbar	Anzahl		74165	66335	61780	57389	53765	50438	47467	45095	42597								
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		321	1246	371	226	208	163	159	152	145								
		Anteil in %		0,43	1,88	0,60	0,39	0,39	0,32	0,33	0,34	0,34								
		CI Anteil in %		[0,39; 0,48]	[1,78; 1,98]	[0,54; 0,66]	[0,34; 0,45]	[0,33; 0,44]	[0,27; 0,37]	[0,28; 0,39]	[0,28; 0,39]	[0,29; 0,40]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,58	97,78	97,20	96,82	96,45	96,15	95,83	95,51	95,18								
		CI		[99,53; 99,63]	[97,67; 97,89]	[97,08; 97,32]	[96,69; 96,95]	[96,31; 96,59]	[96,00; 96,30]	[95,67; 95,99]	[95,35; 95,67]	[95,01; 95,35]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	97996	90293	83876	77288	71601	67184	63324	59781	56828	54136								
	auswertbar	Anzahl		85504	76825	72147	67470	63323	59641	56323	53524	50636								
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		307	1298	404	264	206	186	173	171	119								
		Anteil in %		0,36	1,69	0,56	0,39	0,33	0,31	0,31	0,32	0,24								
CI Anteil in %			[0,32; 0,40]	[1,60; 1,78]	[0,51; 0,61]	[0,34; 0,44]	[0,28; 0,37]	[0,27; 0,36]	[0,26; 0,35]	[0,27; 0,37]	[0,19; 0,28]									
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,65	98,03	97,49	97,12	96,80	96,50	96,21	95,91	95,68									
	CI		[99,61; 99,69]	[97,93; 98,13]	[97,38; 97,60]	[97,00; 97,24]	[96,68; 96,92]	[96,37; 96,63]	[96,07; 96,35]	[95,77; 96,05]	[95,53; 95,83]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>									
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	93933	86125	77987	70306	65044	60726	57038	53902	51106									
	auswertbar	Anzahl		80673	73424	67320	62483	58471	54947	51919	49006									
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		1399	452	271	237	201	187	157	140									
		Anteil in %		1,73	0,62	0,40	0,38	0,34	0,34	0,30	0,29									
		CI Anteil in %		[1,64; 1,82]	[0,56; 0,67]	[0,35; 0,45]	[0,33; 0,43]	[0,30; 0,39]	[0,29; 0,39]	[0,26; 0,35]	[0,24; 0,33]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,33	97,73	97,34	96,98	96,65	96,33	96,04	95,76									
		CI		[98,24; 98,42]	[97,63; 97,83]	[97,23; 97,45]	[96,86; 97,10]	[96,52; 96,78]	[96,19; 96,47]	[95,90; 96,18]	[95,61; 95,91]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	104688	97042	88703	80630	75212	70482	66577	63051	60002									
	auswertbar	Anzahl		91264	83879	77376	72402	68048	64213	60886	57687									
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		1379	445	254	248	196	181	146	142									
		Anteil in %		1,51	0,53	0,33	0,34	0,29	0,28	0,24	0,25									
CI Anteil in %			[1,43; 1,59]	[0,48; 0,58]	[0,29; 0,37]	[0,30; 0,39]	[0,25; 0,33]	[0,24; 0,32]	[0,20; 0,28]	[0,21; 0,29]										
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,54	98,03	97,71	97,38	97,10	96,83	96,60	96,36										
	CI		[98,46; 98,62]	[97,94; 98,12]	[97,61; 97,81]	[97,27; 97,49]	[96,99; 97,21]	[96,71; 96,95]	[96,48; 96,72]	[96,23; 96,49]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>										

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	64139	58276	51997	47619	44271	41403	39063	37014										
	auswertbar	Anzahl		56018	50176	46103	43012	40245	37990	35876										
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		562	234	182	154	162	106	108										
		Anteil in %		1,00	0,47	0,39	0,36	0,40	0,28	0,30										
		CI Anteil in %		[0,92; 1,09]	[0,41; 0,53]	[0,34; 0,45]	[0,30; 0,41]	[0,34; 0,46]	[0,23; 0,33]	[0,24; 0,36]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,01	98,56	98,18	97,83	97,44	97,17	96,88										
		CI		[98,93; 99,09]	[98,46; 98,66]	[98,07; 98,29]	[97,70; 97,96]	[97,30; 97,58]	[97,02; 97,32]	[96,72; 97,04]										
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	70894	65046	58785	54236	50748	47603	45109	42846										
	auswertbar	Anzahl		62623	56831	52625	49436	46325	43947	41597										
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		564	230	173	174	151	122	123										
		Anteil in %		0,90	0,40	0,33	0,35	0,33	0,28	0,30										
		CI Anteil in %		[0,83; 0,97]	[0,35; 0,46]	[0,28; 0,38]	[0,30; 0,40]	[0,27; 0,38]	[0,23; 0,33]	[0,24; 0,35]										
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,12	98,72	98,40	98,06	97,74	97,47	97,18											
	CI		[99,05; 99,19]	[98,63; 98,81]	[98,30; 98,50]	[97,95; 98,17]	[97,62; 97,86]	[97,34; 97,60]	[97,04; 97,32]											
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>											
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68908	61517	55165	50553	47038	44093	41642											
	auswertbar	Anzahl		59537	53477	49178	45796	42931	40442											
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		491	248	175	141	136	126											
		Anteil in %		0,82	0,46	0,36	0,31	0,32	0,31											
		CI Anteil in %		[0,75; 0,90]	[0,41; 0,52]	[0,30; 0,41]	[0,26; 0,36]	[0,26; 0,37]	[0,26; 0,37]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,19	98,73	98,39	98,09	97,78	97,48											
		CI		[99,12; 99,26]	[98,64; 98,82]	[98,29; 98,49]	[97,98; 98,20]	[97,65; 97,91]	[97,34; 97,62]											
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73936	66858	60658	55932	52144	49071	46582											
	auswertbar	Anzahl		64827	58948	54433	50840	47994	45398											
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		437	251	178	160	109	123											
		Anteil in %		0,67	0,43	0,33	0,31	0,23	0,27											
		CI Anteil in %		[0,61; 0,74]	[0,37; 0,48]	[0,28; 0,37]	[0,27; 0,36]	[0,18; 0,27]	[0,22; 0,32]											
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,34	98,92	98,60	98,29	98,07	97,80												
	CI		[99,28; 99,40]	[98,84; 99,00]	[98,51; 98,69]	[98,19; 98,39]	[97,96; 98,18]	[97,68; 97,92]												
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>												
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63105	56541	50543	46251	43186	40641												
	auswertbar	Anzahl		54859	49001	44914	42089	39442												
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		423	197	160	109	128												
		Anteil in %		0,77	0,40	0,36	0,26	0,32												
		CI Anteil in %		[0,70; 0,84]	[0,35; 0,46]	[0,30; 0,41]	[0,21; 0,31]	[0,27; 0,38]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,24	98,85	98,50	98,25	97,93												
		CI		[99,17; 99,31]	[98,76; 98,94]	[98,40; 98,60]	[98,14; 98,36]	[97,80; 98,06]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	69160	62713	56785	52434	48988	46131												
	auswertbar	Anzahl		61118	55125	50980	47816	44971												
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		406	211	174	128	116												
		Anteil in %		0,66	0,38	0,34	0,27	0,26												
		CI Anteil in %		[0,60; 0,73]	[0,33; 0,43]	[0,29; 0,39]	[0,22; 0,31]	[0,21; 0,30]												
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,34	98,97	98,63	98,37	98,12													
	CI		[99,28; 99,40]	[98,89; 99,05]	[98,54; 98,72]	[98,27; 98,47]	[98,01; 98,23]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>													

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72559	65153	58720	53997	50478														
	auswertbar	Anzahl		63388	57013	52572	49112														
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		445	222	150	152														
		Anteil in %		0,70	0,39	0,29	0,31														
		CI Anteil in %		[0,64; 0,77]	[0,34; 0,44]	[0,24; 0,33]	[0,26; 0,36]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,31	98,93	98,65	98,34														
		CI		[99,25; 99,37]	[98,85; 99,01]	[98,56; 98,74]	[98,24; 98,44]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	77068	70251	64073	59403	55750														
	auswertbar	Anzahl		68502	62413	58035	54312														
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		384	222	163	126														
		Anteil in %		0,56	0,36	0,28	0,23														
		CI Anteil in %		[0,50; 0,62]	[0,31; 0,40]	[0,24; 0,32]	[0,19; 0,27]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,45	99,10	98,82	98,59														
CI			[99,39; 99,51]	[99,03; 99,17]	[98,74; 98,90]	[98,50; 98,68]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>															
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	65293	58878	53068	49044															
	auswertbar	Anzahl		57459	51697	47627															
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		403	186	150															
		Anteil in %		0,70	0,36	0,31															
		CI Anteil in %		[0,63; 0,77]	[0,31; 0,41]	[0,26; 0,37]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,31	98,95	98,64															
		CI		[99,24; 99,38]	[98,87; 99,03]	[98,54; 98,74]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	70625	64429	58678	54450															
	auswertbar	Anzahl		63039	57260	53055															
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		354	182	152															
		Anteil in %		0,56	0,32	0,29															
		CI Anteil in %		[0,50; 0,62]	[0,27; 0,36]	[0,24; 0,33]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,44	99,13	98,85															
CI			[99,38; 99,50]	[99,06; 99,20]	[98,76; 98,94]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	70842	63612	57493																
	auswertbar	Anzahl		62021	55673																
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		387	190																
		Anteil in %		0,62	0,34																
		CI Anteil in %		[0,56; 0,69]	[0,29; 0,39]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,38	99,04																
		CI		[99,32; 99,44]	[98,96; 99,12]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	76734	70036	64036																
	auswertbar	Anzahl		68480	62192																
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		350	187																
		Anteil in %		0,51	0,30																
		CI Anteil in %		[0,46; 0,56]	[0,26; 0,34]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,49	99,20																
CI			[99,44; 99,54]	[99,13; 99,27]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																	

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	64202	57960																			
	auswertbar	Anzahl		56357																			
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		345																			
		Anteil in %		0,61																			
		CI Anteil in %		[0,55; 0,68]																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,39																			
		CI		[99,33; 99,45]																			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	69774	64052																			
	auswertbar	Anzahl		62381																			
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		328																			
		Anteil in %		0,53																			
		CI Anteil in %		[0,47; 0,58]																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,47																			
CI			[99,41; 99,53]																				
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																				
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71497																				
	auswertbar	Anzahl																					
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																					
		CI																					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	75073																				
	auswertbar	Anzahl																					
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																					
CI																							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																					

In der folgenden Tabelle 3.5.7 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Nierenersatztherapie** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen in der Erstdokumentation noch keine Nierenersatztherapie vermerkt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Nieren-

ersatztherapie durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil im Berichtshalbjahr eine erstmalige Nierenersatztherapie dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte **„Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** dargestellt.

Tabelle 3.5.7 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut Erstdokumentation

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2004-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	98149	86596	75478	67027	60310	55989	53327	50911	48733	46623	44377	42387	40576	38716	37062	35484			
	auswertbar	Anzahl		81931	71746	64434	58110	52957	50599	47395	44766	43160	41270	39332	37620	35747	34216	32488			
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		73	55	51	26	42	33	33	99	57	34	50	48	37	46	27			
		Anteil in %		0,09	0,08	0,08	0,04	0,08	0,07	0,07	0,22	0,13	0,08	0,13	0,13	0,10	0,13	0,08			
		CI Anteil in %		[0,07; 0,11]	[0,06; 0,10]	[0,06; 0,10]	[0,03; 0,06]	[0,06; 0,10]	[0,04; 0,09]	[0,05; 0,09]	[0,18; 0,26]	[0,10; 0,17]	[0,05; 0,11]	[0,09; 0,16]	[0,09; 0,16]	[0,07; 0,14]	[0,10; 0,17]	[0,05; 0,11]			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,84	99,76	99,72	99,64	99,58	99,51	99,29	99,17	99,08	98,96	98,83	98,73	98,60	98,52			
		CI		[99,89; 99,93]	[99,81; 99,87]	[99,73; 99,79]	[99,68; 99,76]	[99,59; 99,69]	[99,53; 99,63]	[99,45; 99,57]	[99,22; 99,36]	[99,09; 99,25]	[99,00; 99,16]	[98,87; 99,05]	[98,73; 98,93]	[98,63; 98,83]	[98,49; 98,71]	[98,41; 98,63]			
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98842</i>	<i>87165</i>	<i>76003</i>	<i>67529</i>	<i>60776</i>	<i>56404</i>	<i>53744</i>	<i>51331</i>	<i>49147</i>	<i>47087</i>	<i>44843</i>	<i>42838</i>	<i>41044</i>	<i>39180</i>	<i>37515</i>	<i>35933</i>			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	115257	102423	89984	80252	72643	67672	64603	61777	59223	56682	53939	51512	49236	47027	45080	43113			
	auswertbar	Anzahl		97058	85606	77451	70126	64212	61451	57520	54368	52454	50166	47745	45618	43391	41590	39517			
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		83	44	32	33	31	33	30	84	45	33	34	35	31	33	34			
		Anteil in %		0,09	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,15	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,09			
		CI Anteil in %		[0,07; 0,10]	[0,04; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,12; 0,19]	[0,06; 0,11]	[0,04; 0,09]	[0,05; 0,10]	[0,05; 0,10]	[0,05; 0,10]	[0,05; 0,11]	[0,06; 0,11]			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,87	99,83	99,78	99,73	99,68	99,63	99,48	99,40	99,33	99,26	99,19	99,12	99,04	98,95			
CI			[99,90; 99,94]	[99,85; 99,89]	[99,80; 99,86]	[99,75; 99,81]	[99,69; 99,77]	[99,64; 99,72]	[99,59; 99,67]	[99,43; 99,53]	[99,34; 99,46]	[99,27; 99,39]	[99,19; 99,33]	[99,12; 99,26]	[99,04; 99,20]	[98,96; 99,12]	[98,86; 99,04]				
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>115970</i>	<i>103008</i>	<i>90548</i>	<i>80776</i>	<i>73117</i>	<i>68112</i>	<i>65025</i>	<i>62178</i>	<i>59615</i>	<i>57124</i>	<i>54381</i>	<i>51939</i>	<i>49656</i>	<i>47443</i>	<i>45482</i>	<i>43521</i>				
2005-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	105246	93384	83010	73898	68140	64420	61337	58659	55799	52997	50585	48281	46118	44086	42203				
	auswertbar	Anzahl		89360	79592	71686	65163	61756	57908	54401	52763	50410	48021	45793	43630	41642	39731				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		88	54	54	44	34	30	116	62	40	43	44	51	40	36				
		Anteil in %		0,10	0,07	0,08	0,07	0,06	0,05	0,21	0,12	0,08	0,09	0,10	0,12	0,10	0,09				
		CI Anteil in %		[0,08; 0,12]	[0,05; 0,09]	[0,06; 0,10]	[0,05; 0,09]	[0,04; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,17; 0,25]	[0,09; 0,15]	[0,05; 0,10]	[0,06; 0,12]	[0,07; 0,12]	[0,08; 0,15]	[0,07; 0,13]	[0,06; 0,12]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,90	99,84	99,76	99,70	99,64	99,59	99,39	99,27	99,20	99,11	99,01	98,90	98,80	98,71				
		CI		[99,88; 99,92]	[99,81; 99,87]	[99,73; 99,79]	[99,66; 99,74]	[99,60; 99,68]	[99,54; 99,64]	[99,33; 99,45]	[99,20; 99,34]	[99,13; 99,27]	[99,04; 99,18]	[98,93; 99,09]	[98,81; 98,99]	[98,71; 98,89]	[98,62; 98,80]				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>105631</i>	<i>93726</i>	<i>83366</i>	<i>74241</i>	<i>68487</i>	<i>64764</i>	<i>61675</i>	<i>58977</i>	<i>56190</i>	<i>53398</i>	<i>50980</i>	<i>48671</i>	<i>46510</i>	<i>44483</i>	<i>42590</i>				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	123121	110509	99138	88926	82257	78084	74486	71258	67948	64629	61725	58955	56328	53843	51515				
	auswertbar	Anzahl		105787	95084	86300	78756	74989	70431	66143	64189	61493	58649	56041	53343	50956	48459				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		85	58	37	37	26	23	98	38	31	49	43	38	33	35				
		Anteil in %		0,08	0,06	0,04	0,05	0,03	0,03	0,15	0,06	0,05	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07				
		CI Anteil in %		[0,06; 0,10]	[0,05; 0,08]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,05]	[0,02; 0,05]	[0,12; 0,18]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,06; 0,11]	[0,05; 0,10]	[0,05; 0,09]	[0,04; 0,09]	[0,05; 0,10]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,86	99,82	99,77	99,74	99,71	99,57	99,51	99,46	99,38	99,30	99,23	99,17	99,09				
CI			[99,90; 99,94]	[99,84; 99,88]	[99,79; 99,85]	[99,74; 99,80]	[99,71; 99,77]	[99,67; 99,75]	[99,52; 99,62]	[99,46; 99,56]	[99,41; 99,51]	[99,32; 99,44]	[99,24; 99,36]	[99,17; 99,29]	[99,10; 99,24]	[99,02; 99,16]					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>123470</i>	<i>110813</i>	<i>99471</i>	<i>89253</i>	<i>82572</i>	<i>78403</i>	<i>74799</i>	<i>71559</i>	<i>68310</i>	<i>64988</i>	<i>62073</i>	<i>59313</i>	<i>56688</i>	<i>54194</i>	<i>51856</i>					

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	81901	73418	65123	59136	55482	52568	49985	47438	44873	42650	40576	38693	36892	35231				
	auswertbar	Anzahl		70350	62756	56473	53191	49817	46804	45111	42875	40702	38710	36848	35136	33456				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		67	49	35	30	25	87	47	49	39	31	46	37	29				
		Anteil in %		0,10	0,08	0,06	0,06	0,05	0,19	0,10	0,11	0,10	0,08	0,12	0,11	0,09				
		CI Anteil in %		[0,07; 0,12]	[0,06; 0,10]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,15; 0,22]	[0,07; 0,13]	[0,08; 0,15]	[0,07; 0,13]	[0,05; 0,11]	[0,09; 0,16]	[0,07; 0,14]	[0,06; 0,12]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,83	99,77	99,72	99,67	99,49	99,38	99,27	99,18	99,10	98,98	98,87	98,79				
		CI		[99,89; 99,93]	[99,80; 99,86]	[99,73; 99,81]	[99,68; 99,76]	[99,62; 99,72]	[99,43; 99,55]	[99,31; 99,45]	[99,20; 99,34]	[99,10; 99,26]	[99,02; 99,18]	[98,89; 99,07]	[98,77; 98,97]	[98,69; 98,89]				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>82253</i>	<i>73718</i>	<i>65422</i>	<i>59436</i>	<i>55776</i>	<i>52856</i>	<i>50253</i>	<i>47742</i>	<i>45177</i>	<i>42958</i>	<i>40893</i>	<i>39008</i>	<i>37209</i>	<i>35545</i>				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	94698	85770	76686	70030	66080	62722	59788	56844	53814	51255	48701	46402	44305	42393				
	auswertbar	Anzahl		82510	74117	67151	63429	59516	56089	54112	51524	49066	46578	44338	42257	40317				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		44	32	28	28	18	98	38	32	33	26	25	29	27				
		Anteil in %		0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,17	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07				
		CI Anteil in %		[0,04; 0,07]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,04]	[0,14; 0,21]	[0,05; 0,09]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,09]	[0,03; 0,08]	[0,03; 0,08]	[0,04; 0,09]	[0,04; 0,09]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,91	99,86	99,82	99,79	99,62	99,55	99,49	99,43	99,37	99,32	99,25	99,18				
CI			[99,93; 99,97]	[99,89; 99,93]	[99,83; 99,89]	[99,79; 99,85]	[99,76; 99,82]	[99,57; 99,67]	[99,50; 99,60]	[99,43; 99,55]	[99,37; 99,49]	[99,31; 99,43]	[99,25; 99,39]	[99,18; 99,32]	[99,10; 99,26]					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>95017</i>	<i>86040</i>	<i>76949</i>	<i>70289</i>	<i>66335</i>	<i>62988</i>	<i>60040</i>	<i>57162</i>	<i>54131</i>	<i>51560</i>	<i>49016</i>	<i>46705</i>	<i>44599</i>	<i>42683</i>					
2006-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	98198	87842	79381	73475	69174	65549	62124	58532	55500	52771	50272	47872	45774					
	auswertbar	Anzahl		84828	75151	70186	65281	60587	58599	55346	52471	49959	47364	45085	42873					
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		82	51	43	32	114	53	54	34	46	54	47	44					
		Anteil in %		0,10	0,07	0,06	0,05	0,19	0,09	0,10	0,06	0,09	0,11	0,10	0,10					
		CI Anteil in %		[0,08; 0,12]	[0,05; 0,09]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,15; 0,22]	[0,07; 0,11]	[0,07; 0,12]	[0,04; 0,09]	[0,07; 0,12]	[0,08; 0,14]	[0,07; 0,13]	[0,07; 0,13]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,84	99,78	99,73	99,55	99,46	99,37	99,30	99,21	99,10	99,00	98,90					
		CI		[99,89; 99,93]	[99,81; 99,87]	[99,75; 99,81]	[99,69; 99,77]	[99,50; 99,60]	[99,41; 99,51]	[99,31; 99,43]	[99,24; 99,36]	[99,14; 99,28]	[99,02; 99,18]	[98,92; 99,08]	[98,81; 98,99]					
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>98603</i>	<i>88202</i>	<i>79739</i>	<i>73830</i>	<i>69513</i>	<i>65875</i>	<i>62516</i>	<i>58915</i>	<i>55879</i>	<i>53125</i>	<i>50627</i>	<i>48227</i>	<i>46133</i>					
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	112100	101380	92209	85967	81250	77247	73384	69310	65705	62450	59313	56490	54000					
	auswertbar	Anzahl		98256	87436	82376	76769	71551	69342	65661	62288	59149	56023	53383	50720					
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		60	39	29	32	118	51	37	45	46	43	36	31					
		Anteil in %		0,06	0,04	0,04	0,04	0,16	0,07	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06					
		CI Anteil in %		[0,05; 0,08]	[0,03; 0,06]	[0,02; 0,05]	[0,03; 0,06]	[0,14; 0,19]	[0,05; 0,09]	[0,04; 0,07]	[0,05; 0,09]	[0,06; 0,10]	[0,05; 0,10]	[0,05; 0,09]	[0,04; 0,08]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,90	99,86	99,82	99,66	99,59	99,54	99,46	99,39	99,31	99,25	99,19					
CI			[99,92; 99,96]	[99,88; 99,92]	[99,84; 99,88]	[99,79; 99,85]	[99,62; 99,70]	[99,55; 99,63]	[99,49; 99,59]	[99,41; 99,51]	[99,33; 99,45]	[99,25; 99,37]	[99,19; 99,31]	[99,12; 99,26]						
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112511</i>	<i>101744</i>	<i>92563</i>	<i>86309</i>	<i>81576</i>	<i>77574</i>	<i>73783</i>	<i>69703</i>	<i>66080</i>	<i>62828</i>	<i>59695</i>	<i>56874</i>	<i>54383</i>						
2006-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	93607	85355	77771	72483	68316	64369	60397	57173	54123	51420	48964	46733						
	auswertbar	Anzahl		81597	74164	68173	63215	60464	57175	53882	51132	48456	46077	43675						
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		75	49	44	135	85	52	47	41	54	40	39						
		Anteil in %		0,09	0,07	0,06	0,21	0,14	0,09	0,09	0,08	0,11	0,09	0,09						
		CI Anteil in %		[0,07; 0,11]	[0,05; 0,08]	[0,05; 0,08]	[0,18; 0,25]	[0,11; 0,17]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,11]	[0,06; 0,10]	[0,08; 0,14]	[0,06; 0,11]	[0,06; 0,12]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,85	99,78	99,58	99,44	99,35	99,27	99,19	99,08	98,99	98,90						
		CI		[99,89; 99,93]	[99,82; 99,88]	[99,75; 99,81]	[99,53; 99,63]	[99,38; 99,50]	[99,29; 99,41]	[99,20; 99,34]	[99,12; 99,26]	[99,00; 99,16]	[98,91; 99,07]	[98,82; 98,98]						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>94020</i>	<i>85716</i>	<i>78144</i>	<i>72860</i>	<i>68692</i>	<i>64819</i>	<i>60857</i>	<i>57626</i>	<i>54569</i>	<i>51845</i>	<i>49384</i>	<i>47138</i>						
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	106012	97499	89621	83829	79262	74997	70517	66802	63339	60220	57385	54843						
	auswertbar	Anzahl		93481	85551	78892	73400	70409	66731	63001	59785	56675	54067	51313						
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		66	25	37	112	51	41	32	54	40	45	33						
		Anteil in %		0,07	0,03	0,05	0,15	0,07	0,06	0,05	0,09	0,07	0,08	0,06						
		CI Anteil in %		[0,05; 0,09]	[0,02; 0,04]	[0,03; 0,06]	[0,12; 0,18]	[0,05; 0,09]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,07; 0,11]	[0,05; 0,09]	[0,06; 0,11]	[0,04; 0,09]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,90	99,86	99,71	99,64	99,58	99,53	99,44	99,37	99,29	99,22						
CI			[99,91; 99,95]	[99,88; 99,92]	[99,84; 99,88]	[99,67; 99,75]	[99,60; 99,68]	[99,53; 99,63]	[99,48; 99,58]	[99,39; 99,49]	[99,31; 99,43]	[99,23; 99,35]	[99,15; 99,29]							
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>106368</i>	<i>97818</i>	<i>89965</i>	<i>84145</i>	<i>79567</i>	<i>75344</i>	<i>70865</i>	<i>67146</i>	<i>63673</i>	<i>60566</i>	<i>57735</i>	<i>55201</i>							

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	98651	89556	82353	76949	72260	67360	63403	59752	56623	53876	51347							
	auswertbar	Anzahl		86137	77572	71303	68028	63902	60103	56782	53681	51094	48503							
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		65	40	133	85	56	54	47	48	39	45							
		Anteil in %		0,08	0,05	0,19	0,12	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09							
		CI Anteil in %		[0,06; 0,09]	[0,04; 0,07]	[0,15; 0,22]	[0,10; 0,15]	[0,06; 0,11]	[0,07; 0,11]	[0,06; 0,11]	[0,06; 0,11]	[0,06; 0,11]	[0,05; 0,10]	[0,07; 0,12]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,88	99,70	99,57	99,49	99,40	99,32	99,23	99,16	99,06							
		CI		[99,91; 99,95]	[99,86; 99,90]	[99,66; 99,74]	[99,52; 99,62]	[99,44; 99,54]	[99,34; 99,46]	[99,26; 99,38]	[99,16; 99,30]	[99,09; 99,23]	[98,99; 99,13]							
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99014</i>	<i>89881</i>	<i>82685</i>	<i>77270</i>	<i>72667</i>	<i>67791</i>	<i>63825</i>	<i>60171</i>	<i>57039</i>	<i>54287</i>	<i>51740</i>							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	111861	102774	95196	89188	83914	78577	74192	70162	66458	63208	60326							
	auswertbar	Anzahl		99036	89862	82909	79155	74667	70526	66673	63068	59991	56974							
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		54	32	127	61	46	55	32	34	35	33							
		Anteil in %		0,05	0,04	0,15	0,08	0,06	0,08	0,05	0,05	0,06	0,06							
		CI Anteil in %		[0,04; 0,07]	[0,02; 0,05]	[0,13; 0,18]	[0,06; 0,10]	[0,04; 0,08]	[0,06; 0,10]	[0,03; 0,06]	[0,04; 0,07]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,08]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,91	99,76	99,69	99,63	99,55	99,50	99,45	99,39	99,34							
CI			[99,94; 99,96]	[99,89; 99,93]	[99,73; 99,79]	[99,65; 99,73]	[99,59; 99,67]	[99,50; 99,60]	[99,45; 99,55]	[99,40; 99,50]	[99,34; 99,44]	[99,28; 99,40]								
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>112214</i>	<i>103094</i>	<i>95513</i>	<i>89490</i>	<i>84285</i>	<i>78956</i>	<i>74566</i>	<i>70528</i>	<i>66810</i>	<i>63554</i>	<i>60660</i>								
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	91172	83188	76863	71414	65905	61804	58080	54802	52027	49565								
	auswertbar	Anzahl		78541	70468	66643	62157	58324	54814	51599	49084	46408								
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		58	115	65	54	36	49	38	40	42								
		Anteil in %		0,07	0,16	0,10	0,09	0,06	0,09	0,07	0,08	0,09								
		CI Anteil in %		[0,05; 0,09]	[0,13; 0,19]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,11]	[0,04; 0,08]	[0,06; 0,11]	[0,05; 0,10]	[0,06; 0,11]	[0,06; 0,12]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,77	99,68	99,59	99,53	99,44	99,37	99,29	99,20								
		CI		[99,91; 99,95]	[99,74; 99,80]	[99,64; 99,72]	[99,54; 99,64]	[99,48; 99,58]	[99,38; 99,50]	[99,31; 99,43]	[99,22; 99,36]	[99,13; 99,27]								
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>91596</i>	<i>83563</i>	<i>77239</i>	<i>71824</i>	<i>66295</i>	<i>62188</i>	<i>58456</i>	<i>55185</i>	<i>52404</i>	<i>49931</i>								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	102800	94687	88124	82258	76390	71768	67636	63898	60751	57893								
	auswertbar	Anzahl		89623	80711	76735	71983	67641	63702	60191	57216	54133								
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		42	114	59	41	41	41	39	33	34								
		Anteil in %		0,05	0,14	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06								
		CI Anteil in %		[0,03; 0,06]	[0,12; 0,17]	[0,06; 0,10]	[0,04; 0,07]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,09]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,08]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,95	99,82	99,74	99,69	99,63	99,56	99,50	99,44	99,38								
CI			[99,94; 99,96]	[99,79; 99,85]	[99,71; 99,77]	[99,65; 99,73]	[99,59; 99,67]	[99,51; 99,61]	[99,45; 99,55]	[99,39; 99,49]	[99,32; 99,44]									
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>103138</i>	<i>94970</i>	<i>88402</i>	<i>82599</i>	<i>76730</i>	<i>72106</i>	<i>67962</i>	<i>64210</i>	<i>61071</i>	<i>58214</i>									
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	99234	91006	83626	75684	70177	65657	61765	58415	55397									
	auswertbar	Anzahl		85230	78702	72459	67385	63199	59469	56252	53109									
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		149	87	61	37	61	52	42	51									
		Anteil in %		0,17	0,11	0,08	0,05	0,10	0,09	0,07	0,10									
		CI Anteil in %		[0,15; 0,20]	[0,09; 0,13]	[0,06; 0,11]	[0,04; 0,07]	[0,07; 0,12]	[0,06; 0,11]	[0,05; 0,10]	[0,07; 0,12]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,83	99,72	99,64	99,59	99,49	99,41	99,33	99,24									
		CI		[99,80; 99,86]	[99,68; 99,76]	[99,60; 99,68]	[99,55; 99,63]	[99,44; 99,54]	[99,35; 99,47]	[99,27; 99,39]	[99,17; 99,31]									
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>99599</i>	<i>91318</i>	<i>84016</i>	<i>76089</i>	<i>70582</i>	<i>66047</i>	<i>62158</i>	<i>58808</i>	<i>55783</i>									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	109579	101575	93929	85640	79939	75006	70886	67183	63908									
	auswertbar	Anzahl		95521	88794	82170	76915	72404	68345	64858	61409									
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		130	68	44	45	43	24	41	27									
		Anteil in %		0,14	0,08	0,05	0,06	0,06	0,04	0,06	0,04									
		CI Anteil in %		[0,11; 0,16]	[0,06; 0,09]	[0,04; 0,07]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,08]	[0,02; 0,05]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,06]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,87	99,79	99,74	99,68	99,62	99,59	99,53	99,48									
CI			[99,85; 99,89]	[99,76; 99,82]	[99,71; 99,77]	[99,64; 99,72]	[99,58; 99,66]	[99,55; 99,63]	[99,48; 99,58]	[99,43; 99,53]										
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>109903</i>	<i>101860</i>	<i>94292</i>	<i>85992</i>	<i>80277</i>	<i>75337</i>	<i>71223</i>	<i>67501</i>	<i>64228</i>										

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	67348	61205	55073	50622	47193	44213	41782	39626												
	auswertbar	Anzahl		58821	53155	48994	45819	42964	40620	38386												
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		75	43	25	40	35	32	27												
		Anteil in %		0,13	0,08	0,05	0,09	0,08	0,08	0,07												
		CI Anteil in %		[0,10; 0,16]	[0,06; 0,11]	[0,03; 0,07]	[0,06; 0,11]	[0,05; 0,11]	[0,05; 0,11]	[0,04; 0,10]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,87	99,80	99,74	99,66	99,58	99,50	99,43												
		CI		[99,84; 99,90]	[99,76; 99,84]	[99,70; 99,78]	[99,61; 99,71]	[99,52; 99,64]	[99,44; 99,56]	[99,36; 99,50]												
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67596</i>	<i>61420</i>	<i>55310</i>	<i>50854</i>	<i>47417</i>	<i>44450</i>	<i>42019</i>	<i>39871</i>												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73961	67850	61753	57117	53500	50270	47690	45325												
	auswertbar	Anzahl		65308	59709	55407	52086	48899	46445	43991												
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		68	28	31	35	36	23	35												
		Anteil in %		0,10	0,05	0,06	0,07	0,07	0,05	0,08												
		CI Anteil in %		[0,08; 0,13]	[0,03; 0,06]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,09]	[0,05; 0,10]	[0,03; 0,07]	[0,05; 0,11]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,90	99,85	99,80	99,73	99,66	99,61	99,53												
CI			[99,88; 99,92]	[99,82; 99,88]	[99,76; 99,84]	[99,69; 99,77]	[99,61; 99,71]	[99,56; 99,66]	[99,47; 99,59]													
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74164</i>	<i>68029</i>	<i>61957</i>	<i>57312</i>	<i>53698</i>	<i>50467</i>	<i>47896</i>	<i>45527</i>													
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72058	64375	58117	53439	49838	46795	44246													
	auswertbar	Anzahl		62310	56323	51986	48496	45544	42965													
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		57	55	32	23	28	29													
		Anteil in %		0,09	0,10	0,06	0,05	0,06	0,07													
		CI Anteil in %		[0,07; 0,12]	[0,07; 0,12]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,08]	[0,04; 0,09]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,81	99,75	99,71	99,65	99,58													
		CI		[99,89; 99,93]	[99,78; 99,84]	[99,71; 99,79]	[99,67; 99,75]	[99,60; 99,70]	[99,52; 99,64]													
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72280</i>	<i>64562</i>	<i>58326</i>	<i>53655</i>	<i>50049</i>	<i>46993</i>	<i>44446</i>													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	76768	69370	63255	58469	54611	51480	48890													
	auswertbar	Anzahl		67241	61449	56874	53234	50346	47635													
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		55	35	27	28	26	22													
		Anteil in %		0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05													
		CI Anteil in %		[0,06; 0,10]	[0,04; 0,08]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,07]	[0,03; 0,07]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,86	99,82	99,76	99,71	99,67													
CI			[99,90; 99,94]	[99,83; 99,89]	[99,79; 99,85]	[99,72; 99,80]	[99,67; 99,75]	[99,62; 99,72]														
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76956</i>	<i>69537</i>	<i>63438</i>	<i>58654</i>	<i>54793</i>	<i>51664</i>	<i>49078</i>														
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	66065	59213	53299	48916	45749	43067														
	auswertbar	Anzahl		57462	51652	47465	44561	41779														
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		56	43	23	42	30														
		Anteil in %		0,10	0,08	0,05	0,09	0,07														
		CI Anteil in %		[0,07; 0,12]	[0,06; 0,11]	[0,03; 0,07]	[0,07; 0,12]	[0,05; 0,10]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,90	99,82	99,77	99,68	99,61														
		CI		[99,87; 99,93]	[99,78; 99,86]	[99,73; 99,81]	[99,63; 99,73]	[99,55; 99,67]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66301</i>	<i>59407</i>	<i>53502</i>	<i>49122</i>	<i>45947</i>	<i>43280</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71741	65033	59169	54743	51209	48259														
	auswertbar	Anzahl		63370	57421	53218	49968	47031														
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		64	29	34	20	16														
		Anteil in %		0,10	0,05	0,06	0,04	0,03														
		CI Anteil in %		[0,08; 0,13]	[0,03; 0,07]	[0,04; 0,09]	[0,02; 0,06]	[0,02; 0,05]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,90	99,85	99,79	99,75	99,71														
CI			[99,88; 99,92]	[99,82; 99,88]	[99,75; 99,83]	[99,71; 99,79]	[99,67; 99,75]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>71902</i>	<i>65176</i>	<i>59348</i>	<i>54926</i>	<i>51404</i>	<i>48447</i>															

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	75775	68081	61716	56896	53238														
	auswertbar	Anzahl		66241	59918	55378	51778														
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		53	38	41	35														
		Anteil in %		0,08	0,06	0,07	0,07														
		CI Anteil in %		[0,06; 0,10]	[0,04; 0,08]	[0,05; 0,10]	[0,05; 0,09]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,86	99,79	99,72														
		CI		[99,90; 99,94]	[99,83; 99,89]	[99,75; 99,83]	[99,68; 99,76]														
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>76010</i>	<i>68288</i>	<i>61928</i>	<i>57110</i>	<i>53460</i>														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79833	72775	66615	61912	58181														
	auswertbar	Anzahl		70957	64881	60474	56684														
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		55	27	28	27														
		Anteil in %		0,08	0,04	0,05	0,05														
		CI Anteil in %		[0,06; 0,10]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,06]	[0,03; 0,07]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,88	99,84	99,79														
CI			[99,90; 99,94]	[99,85; 99,91]	[99,81; 99,87]	[99,75; 99,83]															
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>80044</i>	<i>72956</i>	<i>66813</i>	<i>62100</i>	<i>58365</i>															
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68115	61410	55674	51546															
	auswertbar	Anzahl		59929	54222	50043															
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		70	43	34															
		Anteil in %		0,12	0,08	0,07															
		CI Anteil in %		[0,09; 0,14]	[0,06; 0,10]	[0,05; 0,09]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,88	99,81	99,74															
		CI		[99,85; 99,91]	[99,77; 99,85]	[99,70; 99,78]															
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>68337</i>	<i>61608</i>	<i>55900</i>	<i>51784</i>															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73222	66794	61075	56740															
	auswertbar	Anzahl		65367	59589	55277															
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		50	26	16															
		Anteil in %		0,08	0,04	0,03															
		CI Anteil in %		[0,06; 0,10]	[0,03; 0,06]	[0,01; 0,04]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,88	99,85															
CI			[99,90; 99,94]	[99,85; 99,91]	[99,82; 99,88]																
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>73408</i>	<i>66943</i>	<i>61246</i>	<i>56909</i>																
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	73923	66395	60322																
	auswertbar	Anzahl		64741	58415																
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		49	51																
		Anteil in %		0,08	0,09																
		CI Anteil in %		[0,05; 0,10]	[0,06; 0,11]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,84																
		CI		[99,91; 99,95]	[99,81; 99,87]																
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74139</i>	<i>66585</i>	<i>60521</i>																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79344	72415	66452																
	auswertbar	Anzahl		70802	64504																
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		46	33																
		Anteil in %		0,06	0,05																
		CI Anteil in %		[0,05; 0,08]	[0,03; 0,07]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,88																
CI			[99,92; 99,96]	[99,85; 99,91]																	
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>79514</i>	<i>72558</i>	<i>66610</i>																	

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	67033	60560																				
	auswertbar	Anzahl		58877																				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		42																				
		Anteil in %		0,07																				
		CI Anteil in %		[0,05; 0,09]																				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93																				
		CI		[99,91; 99,95]																				
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>67230</i>	<i>60721</i>																				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	72309	66369																				
	auswertbar	Anzahl		64613																				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		52																				
		Anteil in %		0,08																				
		CI Anteil in %		[0,06; 0,10]																				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92																				
CI			[99,90; 99,94]																					
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>72465</i>	<i>66497</i>																					
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	74474																					
	auswertbar	Anzahl																						
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl																						
		Anteil in %																						
		CI Anteil in %																						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																						
		CI																						
	<i>männliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>74714</i>																					
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	77698																					
	auswertbar	Anzahl																						
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl																						
		Anteil in %																						
		CI Anteil in %																						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																						
CI																								
<i>weibliche Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>77879</i>																						

In der Tabelle 3.5.8 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten bis einschließlich des Berichtshalbjahres keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren und bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

Tabelle 3.5.8 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10108	8477	7349	6439	5774	5235	4839	4310	4063	3816	3664	3502	3290	3115	2948	2783	2630	2515	2413
	auswertbar	Anzahl		7249	6922	6284	5659	5170	4737	4235	3903	3732	3555	3402	3219	3042	2869	2721	2583	2462	2344
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		100	115	80	102	91	97	93	84	74	68	144	99	80	86	74	77	60	57
		Anteil in %		1,38	1,66	1,27	1,80	1,76	2,05	2,20	2,15	1,98	1,91	4,23	3,08	2,63	3,00	2,72	2,98	2,44	2,43
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,79	97,23	96,01	94,31	92,66	90,77	88,80	86,93	85,23	83,63	80,14	77,70	75,66	73,41	71,43	69,31	67,63	65,98
		CI		[98,55; 99,03]	[96,86; 97,60]	[95,56; 96,46]	[93,76; 94,86]	[92,02; 93,30]	[90,05; 91,49]	[87,99; 89,61]	[86,04; 87,82]	[84,28; 86,18]	[82,62; 84,64]	[79,03; 81,25]	[76,52; 78,88]	[74,43; 76,89]	[72,13; 74,69]	[70,11; 72,75]	[67,94; 70,68]	[66,23; 69,03]	[64,55; 67,41]
	2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68516	53153	44065	37792	32925	29644	26820	25127	23925	22994	22133	20946	19870	18998	18191	17400	16641	15947
		auswertbar	Anzahl		48275	42648	36827	32266	29038	26340	24313	23190	21997	20825	20053	19094	18243	17428	16662	15925	15185
		erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		888	641	599	536	503	466	519	380	385	792	595	442	424	417	419	406	368
			Anteil in %		1,84	1,50	1,63	1,66	1,73	1,77	2,13	1,64	1,75	3,80	2,97	2,31	2,32	2,39	2,51	2,55	2,42
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit		Rate		98,28	96,84	95,29	93,73	92,12	90,51	88,62	87,19	85,70	82,54	80,12	78,28	76,47	74,66	72,79	70,95	69,23	
		CI		[98,17; 98,39]	[96,68; 97,00]	[95,09; 95,49]	[93,50; 93,96]	[91,85; 92,39]	[90,21; 90,81]	[88,28; 88,96]	[86,83; 87,55]	[85,32; 86,08]	[82,11; 82,97]	[79,66; 80,58]	[77,80; 78,76]	[75,97; 76,97]	[74,15; 75,17]	[72,26; 73,32]	[70,40; 71,50]	[68,67; 69,79]	
2004-1		männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	81767	71096	62502	54830	49892	45842	43012	41146	39539	38013	35950	34320	32935	31589	30195	28961	27830	
		auswertbar	Anzahl		68102	60753	52395	48676	44798	41398	39746	37671	35931	34299	32818	31435	30084	28661	27490	26305	
		erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1422	1183	1005	842	818	858	781	795	1370	918	766	784	770	706	658	695	
			Anteil in %		2,09	1,95	1,92	1,73	1,83	2,07	1,96	2,11	3,81	2,68	2,33	2,49	2,56	2,46	2,39	2,64	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,97	96,10	94,33	92,71	91,04	89,19	87,47	85,67	82,47	80,28	78,42	76,48	74,53	72,71	70,98	69,11		
		CI		[97,87; 98,07]	[95,95; 96,25]	[94,15; 94,51]	[92,50; 92,92]	[90,81; 91,27]	[88,93; 89,45]	[87,19; 87,75]	[85,37; 85,97]	[82,14; 82,80]	[79,93; 80,63]	[78,05; 78,79]	[76,09; 76,87]	[74,13; 74,93]	[72,30; 73,12]	[70,56; 71,40]	[68,68; 69,54]		
	2004-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	112598	98806	87605	77504	70855	65405	61372	58857	56634	54658	51754	49387	47326	45392	43456	41718	40103	
		auswertbar	Anzahl		94869	85155	74071	69092	63943	59107	56847	54069	51706	49334	47188	45147	43253	41307	39571	37909	
		erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1504	1392	1127	1065	1052	1060	936	954	1806	1137	989	982	940	901	865	834	
			Anteil in %		1,59	1,63	1,52	1,54	1,65	1,79	1,65	1,76	3,49	2,30	2,10	2,18	2,17	2,18	2,19	2,20	
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit		Rate		98,46	96,88	95,46	94,01	92,48	90,85	89,38	87,84	84,83	82,90	81,17	79,42	77,71	76,02	74,37	72,74		
		CI		[98,38; 98,54]	[96,77; 96,99]	[95,32; 95,60]	[93,85; 94,17]	[92,30; 92,66]	[90,65; 91,05]	[89,16; 89,60]	[87,60; 88,08]	[84,56; 85,10]	[82,62; 83,18]	[80,87; 81,47]	[79,11; 79,73]	[77,39; 78,03]	[75,69; 76,35]	[74,03; 74,71]	[72,39; 73,09]		

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	62095	54850	47625	42359	38154	35426	33822	32399	31157	29451	28043	26821	25727	24610	23648	22710		
	auswertbar	Anzahl		52196	45621	41024	37101	33822	32398	30433	28941	27615	26361	25147	24128	23008	22074	21096		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1050	813	743	706	594	571	539	1079	710	619	563	545	495	503	499		
		Anteil in %		2,01	1,78	1,81	1,90	1,76	1,76	1,77	3,73	2,57	2,35	2,24	2,26	2,15	2,28	2,37		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,06	96,37	94,65	92,87	91,28	89,71	88,17	84,97	82,81	80,89	79,09	77,32	75,67	73,96	72,21		
		CI		[97,94; 98,18]	[96,21; 96,53]	[94,45; 94,85]	[92,63; 93,11]	[91,02; 91,54]	[89,42; 90,00]	[87,86; 88,48]	[84,62; 85,32]	[82,43; 83,19]	[80,49; 81,29]	[78,67; 79,51]	[76,89; 77,75]	[75,22; 76,12]	[73,50; 74,42]	[71,73; 72,69]		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	81215	72546	63734	56984	51691	48261	46173	44272	42563	40346	38464	36791	35218	33782	32478	31186		
	auswertbar	Anzahl		69138	61050	55373	50312	46201	44319	41611	39502	37779	36136	34485	33014	31546	30310	28978		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1138	938	849	761	763	720	697	1212	826	665	708	617	615	617	665		
		Anteil in %		1,65	1,54	1,53	1,51	1,65	1,62	1,68	3,07	2,19	1,84	2,05	1,87	1,95	2,04	2,29		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,41	96,95	95,49	94,06	92,55	91,07	89,59	86,91	85,04	83,49	81,79	80,28	78,73	77,14	75,37		
		CI		[98,32; 98,50]	[96,82; 97,08]	[95,33; 95,65]	[93,87; 94,25]	[92,34; 92,76]	[90,83; 91,31]	[89,33; 89,85]	[86,62; 87,20]	[84,73; 85,35]	[83,16; 83,82]	[81,45; 82,13]	[79,92; 80,64]	[78,36; 79,10]	[76,76; 77,52]	[74,97; 75,77]		
2005-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68729	60968	53886	47854	44086	41680	39767	38063	35804	34000	32528	31126	29809	28594	27481			
	auswertbar	Anzahl		58511	51996	46729	42557	40287	37867	35619	34195	32605	31158	29761	28471	27262	26118			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1041	912	808	834	641	657	1293	830	689	646	643	630	575	593			
		Anteil in %		1,78	1,75	1,73	1,96	1,59	1,74	3,63	2,43	2,11	2,07	2,16	2,21	2,11	2,27			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,27	96,58	94,94	93,12	91,67	90,12	86,97	84,88	83,11	81,40	79,66	77,91	76,28	74,55			
		CI		[98,17; 98,37]	[96,43; 96,73]	[94,76; 95,12]	[92,90; 93,34]	[91,43; 91,91]	[89,85; 90,39]	[86,66; 87,28]	[84,55; 85,21]	[82,76; 83,46]	[81,03; 81,77]	[79,28; 80,04]	[77,51; 78,31]	[75,87; 76,69]	[74,13; 74,97]			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	89380	80358	72003	64639	59890	56953	54468	52227	49284	46962	44884	42996	41208	39534	37905			
	auswertbar	Anzahl		77185	69485	63080	57753	55053	51897	48862	47047	44995	42979	41161	39358	37689	36008			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1092	997	846	887	739	807	1527	978	816	790	743	751	704	742			
		Anteil in %		1,41	1,43	1,34	1,54	1,34	1,56	3,13	2,08	1,81	1,84	1,81	1,91	1,87	2,06			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,63	97,24	95,96	94,52	93,28	91,87	89,10	87,27	85,70	84,15	82,64	81,08	79,57	77,93			
		CI		[98,55; 98,71]	[97,12; 97,36]	[95,82; 96,10]	[94,35; 94,69]	[93,09; 93,47]	[91,66; 92,08]	[88,85; 89,35]	[87,00; 87,54]	[85,42; 85,98]	[83,85; 84,45]	[82,33; 82,95]	[80,76; 81,40]	[79,23; 79,91]	[77,58; 78,28]			
2005-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	53991	48398	42717	38814	36372	34537	32880	30776	29117	27758	26425	25274	24139	23194				
	auswertbar	Anzahl		46548	41514	37366	35148	32992	31065	29541	28020	26711	25457	24281	23176	22245				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		888	697	718	579	602	1134	640	510	604	545	546	430	477				
		Anteil in %		1,91	1,68	1,92	1,65	1,82	3,65	2,17	1,82	2,26	2,14	2,25	1,86	2,14				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,14	96,52	94,72	93,19	91,54	88,31	86,42	84,87	82,97	81,21	79,40	77,95	76,27				
		CI		[98,02; 98,26]	[96,35; 96,69]	[94,51; 94,93]	[92,95; 93,43]	[91,27; 91,81]	[87,99; 88,63]	[86,08; 86,76]	[84,51; 85,23]	[82,58; 83,36]	[80,80; 81,62]	[78,98; 79,82]	[77,51; 78,39]	[75,82; 76,72]				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	69428	63068	56324	51448	48636	46225	44197	41616	39463	37720	35926	34337	32924	31596				
	auswertbar	Anzahl		60883	54785	49680	46990	44201	41750	39951	37992	36349	34596	33031	31592	30298				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		971	804	725	674	672	1227	798	613	662	613	584	553	609				
		Anteil in %		1,59	1,47	1,46	1,43	1,52	2,94	2,00	1,61	1,82	1,77	1,77	1,75	2,01				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,44	97,02	95,64	94,30	92,91	90,26	88,48	87,07	85,50	84,00	82,53	81,10	79,47				
		CI		[98,34; 98,54]	[96,88; 97,16]	[95,47; 95,81]	[94,11; 94,49]	[92,69; 93,13]	[90,00; 90,52]	[88,20; 88,76]	[86,77; 87,37]	[85,19; 85,81]	[83,67; 84,33]	[82,18; 82,88]	[80,74; 81,46]	[79,09; 79,85]				

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	65706	58597	52683	48681	45883	43547	40721	38348	36410	34671	33045	31568	30287							
	auswertbar	Anzahl		56788	50335	46831	43702	40593	38795	36569	34738	33116	31507	30052	28720							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1117	980	751	752	1431	918	710	727	683	664	637	589							
		Anteil in %		1,97	1,95	1,60	1,72	3,53	2,37	1,94	2,09	2,06	2,11	2,12	2,05							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,08	96,22	94,72	93,13	89,98	87,88	86,20	84,42	82,69	80,97	79,27	77,64							
		CI		[97,97; 98,19]	[96,06; 96,38]	[94,53; 94,91]	[92,91; 93,35]	[89,72; 90,24]	[87,59; 88,17]	[85,89; 86,51]	[84,09; 84,75]	[82,34; 83,04]	[80,61; 81,33]	[78,89; 79,65]	[77,25; 78,03]							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	82478	74700	68025	63543	60190	57347	53898	50919	48415	46101	43947	42022	40331							
	auswertbar	Anzahl		72711	65097	61292	57391	53510	51420	48641	46285	44051	41909	40021	38260							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1195	1010	900	893	1657	1051	838	806	797	795	707	712							
		Anteil in %		1,64	1,55	1,47	1,56	3,10	2,04	1,72	1,74	1,81	1,90	1,77	1,86							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,39	96,91	95,52	94,07	91,27	89,43	87,91	86,40	84,85	83,26	81,80	80,28							
		CI		[98,30; 98,48]	[96,78; 97,04]	[95,37; 95,67]	[93,89; 94,25]	[91,05; 91,49]	[89,19; 89,67]	[87,65; 88,17]	[86,13; 86,67]	[84,56; 85,14]	[82,96; 83,56]	[81,48; 82,12]	[79,95; 80,61]							
2006-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63134	57560	52248	48695	45948	42821	40142	38015	36063	34308	32723	31292								
	auswertbar	Anzahl		55374	50231	46277	43015	40714	38403	36260	34481	32721	31182	29692								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1196	880	792	1455	948	774	732	736	705	682	718								
		Anteil in %		2,16	1,75	1,71	3,38	2,33	2,02	2,02	2,13	2,15	2,19	2,42								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,90	96,23	94,63	91,54	89,45	87,67	85,92	84,11	82,31	80,53	78,58								
		CI		[97,78; 98,02]	[96,07; 96,39]	[94,44; 94,82]	[91,30; 91,78]	[89,18; 89,72]	[87,38; 87,96]	[85,61; 86,23]	[83,78; 84,44]	[81,96; 82,66]	[80,16; 80,90]	[78,19; 78,97]								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	78693	72514	66714	62506	59238	55546	52277	49581	47093	44928	42967	41197								
	auswertbar	Anzahl		69907	64136	59283	55354	52741	49898	47224	44893	42730	40875	39034								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1171	933	876	1573	1072	883	858	787	722	718	744								
		Anteil in %		1,68	1,45	1,48	2,84	2,03	1,77	1,82	1,75	1,69	1,76	1,91								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,37	96,97	95,59	92,97	91,11	89,52	87,91	86,39	84,95	83,47	81,88								
		CI		[98,28; 98,46]	[96,84; 97,10]	[95,43; 95,75]	[92,77; 93,17]	[90,89; 91,33]	[89,28; 89,76]	[87,65; 88,17]	[86,11; 86,67]	[84,66; 85,24]	[83,16; 83,78]	[81,56; 82,20]								
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68490	62088	56803	53066	49363	46014	43354	40891	38859	37003	35341									
	auswertbar	Anzahl		59926	53946	49542	46915	43981	41486	39169	37228	35381	33715									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1132	939	1554	1063	844	922	720	765	682	713									
		Anteil in %		1,89	1,74	3,14	2,27	1,92	2,22	1,84	2,05	1,93	2,11									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,15	96,50	93,58	91,50	89,77	87,80	86,21	84,45	82,84	81,09									
		CI		[98,04; 98,26]	[96,35; 96,65]	[93,38; 93,78]	[91,27; 91,73]	[89,51; 90,03]	[87,52; 88,08]	[85,91; 86,51]	[84,13; 84,77]	[82,51; 83,17]	[80,74; 81,44]									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	85534	78717	72952	68419	63848	59889	56632	53624	50928	48570	46510									
	auswertbar	Anzahl		76151	69387	64041	60816	57284	54278	51377	48748	46486	44327									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1119	1076	1743	1149	973	985	905	881	795	819									
		Anteil in %		1,47	1,55	2,72	1,89	1,70	1,81	1,76	1,81	1,71	1,85									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,56	97,08	94,53	92,77	91,22	89,58	88,02	86,45	84,98	83,41									
		CI		[98,48; 98,64]	[96,96; 97,20]	[94,36; 94,70]	[92,58; 92,96]	[91,01; 91,43]	[89,35; 89,81]	[87,77; 88,27]	[86,18; 86,72]	[84,70; 85,26]	[83,12; 83,70]									

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitrittshalbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63593	58018	53489	49127	45342	42539	40045	37841	35982	34291											
	auswertbar	Anzahl		55049	49439	46264	43108	40475	38145	35965	34220	32440											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1041	1628	987	847	782	759	713	686	682											
		Anteil in %		1,89	3,29	2,13	1,96	1,93	1,99	1,98	2,00	2,10											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,17	95,06	93,07	91,27	89,53	87,77	86,05	84,34	82,57											
		CI		[98,06; 98,28]	[94,88; 95,24]	[92,85; 93,29]	[91,03; 91,51]	[89,26; 89,80]	[87,48; 88,06]	[85,74; 86,36]	[84,01; 84,67]	[82,22; 82,92]											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79062	73015	67981	63035	58584	55170	52187	49444	47133	44990											
	auswertbar	Anzahl		69496	62779	59350	55625	52443	49558	46938	44737	42459											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1130	1733	1146	876	897	849	770	801	726											
		Anteil in %		1,63	2,76	1,93	1,57	1,71	1,71	1,64	1,79	1,71											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,42	95,81	93,99	92,53	90,97	89,43	87,98	86,42	84,94											
		CI		[98,33; 98,51]	[95,66; 95,96]	[93,81; 94,17]	[92,33; 92,73]	[90,75; 91,19]	[89,19; 89,67]	[87,72; 88,24]	[86,14; 86,70]	[84,65; 85,23]											
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71382	65468	59349	53635	49737	46562	43831	41528	39500												
	auswertbar	Anzahl		61593	56405	51735	48123	45173	42556	40297	38182												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1871	1234	938	927	852	816	744	742												
		Anteil in %		3,04	2,19	1,81	1,93	1,89	1,92	1,85	1,94												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,08	94,99	93,29	91,52	89,82	88,11	86,50	84,82												
		CI		[96,95; 97,21]	[94,82; 95,16]	[93,09; 93,49]	[91,29; 91,75]	[89,57; 90,07]	[87,84; 88,38]	[86,21; 86,79]	[84,51; 85,13]												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	86070	79918	73383	66953	62661	58913	55797	53023	50596												
	auswertbar	Anzahl		75528	70022	64695	60804	57250	54252	51580	49053												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1907	1292	973	1033	852	895	820	818												
		Anteil in %		2,52	1,85	1,50	1,70	1,49	1,65	1,59	1,67												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,56	95,79	94,38	92,79	91,43	89,94	88,52	87,04												
		CI		[97,45; 97,67]	[95,65; 95,93]	[94,21; 94,55]	[92,60; 92,98]	[91,22; 91,64]	[89,71; 90,17]	[88,28; 88,76]	[86,78; 87,30]												
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	51323	46684	41605	38182	35525	33267	31440	29810													
	auswertbar	Anzahl		45098	40465	37227	34746	32580	30795	29119													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1219	804	757	678	640	582	583													
		Anteil in %		2,70	1,99	2,03	1,95	1,96	1,89	2,00													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,35	95,44	93,53	91,72	89,94	88,26	86,49													
		CI		[97,20; 97,50]	[95,25; 95,63]	[93,30; 93,76]	[91,45; 91,99]	[89,65; 90,23]	[87,94; 88,58]	[86,15; 86,83]													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	60552	55641	50385	46595	43686	41115	39025	37132													
	auswertbar	Anzahl		53854	49060	45542	42846	40307	38284	36338													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1245	875	764	732	695	645	709													
		Anteil in %		2,31	1,78	1,68	1,71	1,72	1,68	1,95													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,73	96,01	94,42	92,83	91,24	89,72	87,97													
		CI		[97,61; 97,85]	[95,84; 96,18]	[94,22; 94,62]	[92,60; 93,06]	[90,99; 91,49]	[89,45; 89,99]	[87,67; 88,27]													

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-1	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	56082	50055	44881	41113	38280	35921	33991											
	auswertbar	Anzahl		48630	43814	40266	37541	35216	33271											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1166	922	783	704	629	612											
		Anteil in %		2,40	2,10	1,94	1,88	1,79	1,84											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,64	95,62	93,78	92,04	90,41	88,75											
		CI		[97,51; 97,77]	[95,44; 95,80]	[93,56; 94,00]	[91,79; 92,29]	[90,13; 90,69]	[88,45; 89,05]											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63593	57620	52362	48429	45249	42692	40610											
	auswertbar	Anzahl		56132	51228	47483	44428	41993	39841											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1074	897	817	736	611	655											
		Anteil in %		1,91	1,75	1,72	1,66	1,46	1,64											
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,12	96,42	94,78	93,22	91,88	90,37												
	CI		[98,01; 98,23]	[96,26; 96,58]	[94,59; 94,97]	[93,00; 93,44]	[91,64; 92,12]	[90,11; 90,63]												
2009-2	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	51162	45922	41026	37541	35109	33060												
	auswertbar	Anzahl		44734	40062	36705	34433	32330												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1078	817	655	632	613												
		Anteil in %		2,41	2,04	1,78	1,84	1,90												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,63	95,66	93,98	92,27	90,52												
		CI		[97,49; 97,77]	[95,47; 95,85]	[93,75; 94,21]	[92,01; 92,53]	[90,23; 90,81]												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	59243	53785	48817	45164	42285	39933												
	auswertbar	Anzahl		52648	47734	44252	41520	39166												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1067	838	790	650	598												
		Anteil in %		2,03	1,76	1,79	1,57	1,53												
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,00	96,30	94,60	93,13	91,71													
	CI		[97,88; 98,12]	[96,14; 96,46]	[94,40; 94,80]	[92,90; 93,36]	[91,46; 91,96]													
2010-1	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	58907	52913	47679	43905	41094													
	auswertbar	Anzahl		51706	46639	43031	40280													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1104	896	731	708													
		Anteil in %		2,14	1,92	1,70	1,76													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,89	96,04	94,42	92,76													
		CI		[97,77; 98,01]	[95,87; 96,21]	[94,22; 94,62]	[92,53; 92,99]													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	66220	60491	55331	51412	48388													
	auswertbar	Anzahl		59219	54292	50539	47438													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1025	917	775	727													
		Anteil in %		1,73	1,69	1,53	1,53													
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,29	96,65	95,18	93,72														
	CI		[98,19; 98,39]	[96,50; 96,80]	[95,00; 95,36]	[93,52; 93,92]														

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	52764	47544	42843	39673															
	auswertbar	Anzahl		46587	42021	38821															
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1018	731	749															
		Anteil in %		2,19	1,74	1,93															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,84	96,16	94,30															
		CI		[97,71; 97,97]	[95,98; 96,34]	[94,08; 94,52]															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	60278	55053	50226	46732															
	auswertbar	Anzahl		54073	49294	45850															
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1007	785	721															
		Anteil in %		1,86	1,59	1,57															
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,16	96,61	95,09																
	CI		[98,05; 98,27]	[96,46; 96,76]	[94,90; 95,28]																
2011-1	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	57470	51612	46648																
	auswertbar	Anzahl		50488	45472																
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1028	761																
		Anteil in %		2,04	1,67																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,99	96,35																
		CI		[97,87; 98,11]	[96,18; 96,52]																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	65700	60046	55030																
	auswertbar	Anzahl		58895	53790																
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		1019	833																
		Anteil in %		1,73	1,55																
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,29	96,77																	
	CI		[98,19; 98,39]	[96,62; 96,92]																	
2011-2	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	51555	46587																	
	auswertbar	Anzahl		45453																	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		931																	
		Anteil in %		2,05																	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,95																	
		CI		[97,82; 98,08]																	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	59353	54597																	
	auswertbar	Anzahl		53359																	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		955																	
		Anteil in %		1,79																	
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,21																		
	CI		[98,10; 98,32]																		
2012-1	männliche Kollektivmit- glieder unter Risiko	Anzahl	58099																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																			
		Anteil in %																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																			
		CI																			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	64281																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																			
		Anteil in %																			
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																				
	CI																				

In der Tabelle 3.5.9 wird die kumulierte **„Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten in der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären aber ein oder mehrere sekundäre Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

Tabelle 3.5.9 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3692	3021	2524	2158	1880	1668	1507	1314	1220	1120	1050	983	901	846	794	742	692	645	609
	auswertbar	Anzahl		2572	2396	2116	1853	1651	1468	1302	1181	1100	1021	958	887	836	783	731	672	633	595
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		78	77	48	65	46	51	45	48	42	35	62	38	34	38	29	26	22	21
		Anteil in %		3,03	3,21	2,27	3,51	2,79	3,47	3,46	4,06	3,82	3,43	6,47	4,28	4,07	4,85	3,97	3,87	3,48	3,53
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,31	94,31	92,19	88,99	86,51	83,52	80,64	77,45	74,51	71,98	67,38	64,51	61,90	58,91	56,58	54,40	52,51	50,66
		CI		[96,72; 97,90]	[93,44; 95,18]	[91,15; 93,23]	[87,73; 90,25]	[85,10; 87,92]	[81,93; 85,11]	[78,90; 82,38]	[75,56; 79,34]	[72,49; 76,53]	[69,86; 74,10]	[65,11; 69,65]	[62,16; 66,86]	[59,49; 64,31]	[56,43; 61,39]	[54,06; 59,10]	[51,84; 56,96]	[49,92; 55,10]	[48,04; 53,28]
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5123	4276	3612	3115	2747	2471	2245	1937	1774	1636	1546	1434	1307	1212	1141	1081	1014	950	895
	auswertbar	Anzahl		3656	3445	3062	2700	2442	2176	1910	1705	1601	1494	1393	1273	1184	1115	1054	984	922	871
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		75	95	62	72	56	64	55	46	46	62	91	55	42	38	35	34	30	48
		Anteil in %		2,05	2,76	2,02	2,67	2,29	2,94	2,88	2,70	2,87	4,15	6,53	4,32	3,55	3,41	3,32	3,46	3,25	5,51
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,18	95,57	93,66	91,19	89,10	86,50	84,01	81,80	79,47	76,20	71,26	68,21	65,81	63,59	61,49	59,38	57,45	54,29	
	CI		[97,77; 98,59]	[94,92; 96,22]	[92,87; 94,45]	[90,23; 92,15]	[88,02; 90,18]	[85,28; 87,72]	[82,66; 85,36]	[80,34; 83,26]	[77,90; 81,04]	[74,50; 77,90]	[69,39; 73,13]	[66,26; 70,16]	[63,79; 67,83]	[61,52; 65,66]	[59,38; 63,60]	[57,22; 61,54]	[55,26; 59,64]	[52,04; 56,54]	
2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	22755	17838	14679	12406	10688	9511	8547	7881	7421	7037	6667	6108	5734	5427	5131	4810	4523	4253	
	auswertbar	Anzahl		16368	14179	12109	10495	9320	8381	7653	7188	6738	6342	5855	5506	5206	4911	4583	4298	4025	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		536	403	327	274	247	232	213	204	444	226	182	179	201	184	173	159		
		Anteil in %		3,27	2,84	2,70	2,61	2,65	2,77	2,98	2,96	3,03	7,00	3,86	3,31	3,44	4,09	4,01	4,03	3,95	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,91	94,23	91,72	89,35	87,01	84,63	82,15	79,77	77,41	72,10	69,34	67,07	64,78	62,14	59,66	57,28	55,01	
		CI		[96,65; 97,17]	[93,87; 94,59]	[91,28; 92,16]	[88,84; 89,86]	[86,43; 87,59]	[83,99; 85,27]	[81,46; 82,84]	[79,03; 80,51]	[76,62; 78,20]	[71,22; 72,98]	[68,43; 70,25]	[66,13; 68,01]	[63,81; 65,75]	[61,15; 63,13]	[58,64; 60,68]	[56,24; 58,32]	[53,96; 56,06]	
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	28255	22326	18431	15626	13641	12178	10926	10043	9437	8918	8476	7821	7342	6929	6548	6207	5889	5573	
	auswertbar	Anzahl		20560	17863	15248	13404	11928	10711	9728	9140	8572	8017	7489	7043	6630	6260	5937	5604	5287	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		601	435	319	286	308	253	281	249	236	435	269	200	208	192	178	172	179	
		Anteil in %		2,92	2,44	2,09	2,13	2,58	2,36	2,89	2,72	2,75	5,43	3,59	2,84	3,14	3,07	3,00	3,07	3,39	
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,24	94,92	92,97	91,00	88,68	86,61	84,16	81,91	79,71	75,49	72,81	70,76	68,56	66,47	64,49	62,52	60,41		
	CI		[97,02; 97,46]	[94,62; 95,22]	[92,61; 93,33]	[90,58; 91,42]	[88,20; 89,16]	[86,07; 87,15]	[83,57; 84,75]	[81,27; 82,55]	[79,03; 80,39]	[74,74; 76,24]	[72,02; 73,60]	[69,94; 71,58]	[67,72; 69,40]	[65,60; 67,34]	[63,60; 65,38]	[61,61; 63,43]	[59,48; 61,34]		
2004-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	26560	23090	19830	17123	15317	13792	12740	12041	11363	10813	9956	9343	8805	8265	7761	7307	6875		
	auswertbar	Anzahl		22192	19317	16383	14957	13503	12298	11648	10869	10205	9506	8915	8379	7843	7328	6884	6433		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		840	656	545	539	425	396	396	359	675	383	343	362	290	314	293	269		
		Anteil in %		3,79	3,40	3,33	3,60	3,15	3,22	3,40	3,30	6,61	4,03	3,85	4,32	3,70	4,28	4,26	4,18		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,31	93,11	90,12	86,91	84,20	81,54	78,82	76,27	71,34	68,48	65,86	63,03	60,71	58,13	55,67	53,34		
		CI		[96,07; 96,55]	[92,77; 93,45]	[89,71; 90,53]	[86,43; 87,39]	[83,67; 84,73]	[80,97; 82,11]	[78,21; 79,43]	[75,62; 76,92]	[70,64; 72,04]	[67,75; 69,21]	[65,11; 66,61]	[62,25; 63,81]	[59,92; 61,50]	[57,32; 58,94]	[54,85; 56,49]	[52,51; 54,17]		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	30949	26840	23265	20223	18188	16488	15259	14429	13638	12971	11933	11171	10479	9868	9245	8724	8296		
	auswertbar	Anzahl		25868	22667	19392	17700	16086	14674	13859	13000	12191	11301	10582	9911	9321	8684	8174	7737		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		753	684	522	528	404	425	405	410	742	438	374	350	353	315	248	284		
		Anteil in %		2,91	3,02	2,69	2,98	2,51	2,90	2,92	3,15	6,09	3,88	3,53	3,53	3,79	3,63	3,03	3,67		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,16	94,28	91,83	89,13	86,91	84,45	82,03	79,50	74,77	71,90	69,38	66,94	64,42	62,10	60,23	58,02			
	CI		[96,96; 97,36]	[93,99; 94,57]	[91,48; 92,18]	[88,72; 89,54]	[86,46; 87,36]	[83,95; 84,95]	[81,50; 82,56]	[78,93; 80,07]	[74,14; 75,40]	[71,24; 72,56]	[68,69; 70,07]	[66,23; 67,65]	[63,69; 65,15]	[61,35; 62,85]	[59,47; 60,99]	[57,25; 58,79]			

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	19785	17415	14788	12850	11314	10341	9724	9151	8597	7896	7378	6926	6508	6116	5777	5466		
	auswertbar	Anzahl		16571	14163	12482	10944	9869	9254	8613	7957	7350	6883	6450	6045	5653	5318	4992		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		647	467	453	335	359	301	319	517	319	265	270	257	214	209	186		
		Anteil in %		3,90	3,30	3,63	3,06	3,64	3,25	3,70	6,50	4,34	3,85	4,19	4,25	3,79	3,93	3,73		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,23	93,16	89,84	87,12	84,03	81,36	78,42	73,45	70,31	67,63	64,83	62,09	59,76	57,43	55,29		
		CI		[95,95; 96,51]	[92,77; 93,55]	[89,36; 90,32]	[86,57; 87,67]	[83,42; 84,64]	[80,70; 82,02]	[77,71; 79,13]	[72,66; 74,24]	[69,48; 71,14]	[66,78; 68,48]	[63,95; 65,71]	[61,18; 63,00]	[58,84; 60,68]	[56,49; 58,37]	[54,34; 56,24]		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	22032	19365	16609	14477	12863	11754	11072	10388	9787	8998	8368	7875	7426	6971	6573	6203		
	auswertbar	Anzahl		18416	15933	14081	12458	11220	10538	9710	9010	8305	7727	7270	6814	6373	5988	5607		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		605	462	408	354	318	332	333	561	345	274	249	234	229	202	173		
		Anteil in %		3,29	2,90	2,90	2,84	2,83	3,15	3,43	6,23	4,15	3,55	3,43	3,43	3,59	3,37	3,09		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,83	94,11	91,42	88,86	86,40	83,75	80,96	76,03	72,91	70,36	67,97	65,65	63,31	61,19	59,30			
	CI		[96,58; 97,08]	[93,77; 94,45]	[91,00; 91,84]	[88,37; 89,35]	[85,86; 86,94]	[83,15; 84,35]	[80,31; 81,61]	[75,30; 76,76]	[72,14; 73,68]	[69,56; 71,16]	[67,15; 68,79]	[64,80; 66,50]	[62,44; 64,18]	[60,30; 62,08]	[58,40; 60,20]			
2005-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	19874	17635	15381	13506	12323	11434	10715	10101	9172	8538	8022	7540	7100	6681	6278			
	auswertbar	Anzahl		16965	14878	13209	11886	11007	10215	9510	8751	8186	7657	7197	6747	6333	5922			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		569	469	393	424	348	334	657	378	282	275	251	250	253	227			
		Anteil in %		3,35	3,15	2,98	3,57	3,16	3,27	6,91	4,32	3,44	3,59	3,49	3,71	3,99	3,83			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,74	93,75	91,00	87,83	85,12	82,40	76,88	73,61	71,09	68,56	66,18	63,75	61,22	58,88			
		CI		[96,48; 97,00]	[93,38; 94,12]	[90,55; 91,45]	[87,31; 88,35]	[84,54; 85,70]	[81,77; 83,03]	[76,16; 77,60]	[72,85; 74,37]	[70,30; 71,88]	[67,75; 69,37]	[65,34; 67,02]	[62,89; 64,61]	[60,34; 62,10]	[57,98; 59,78]			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	21702	19457	17063	15099	13765	12884	12109	11392	10460	9723	9123	8544	8042	7563	7158			
	auswertbar	Anzahl		18718	16462	14765	13287	12424	11532	10646	9918	9286	8705	8132	7626	7168	6738			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		547	485	408	399	340	349	622	417	324	323	261	269	231	252			
		Anteil in %		2,92	2,95	2,76	3,00	2,74	3,03	5,84	4,20	3,49	3,71	3,21	3,53	3,22	3,74			
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,16	94,36	91,79	89,10	86,71	84,16	79,42	76,13	73,50	70,79	68,54	66,15	64,03	61,63				
	CI		[96,93; 97,39]	[94,03; 94,69]	[91,38; 92,20]	[88,63; 89,57]	[86,19; 87,23]	[83,59; 84,73]	[78,77; 80,07]	[75,43; 76,83]	[72,77; 74,23]	[70,03; 71,55]	[67,76; 69,32]	[65,34; 66,96]	[63,20; 64,86]	[60,78; 62,48]				
2005-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	15136	13595	11861	10584	9803	9138	8569	7851	7296	6824	6367	5972	5631	5263				
	auswertbar	Anzahl		13110	11497	10226	9475	8787	8125	7541	7051	6580	6148	5738	5410	5046				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		503	410	337	308	286	474	290	246	264	233	195	221	193				
		Anteil in %		3,84	3,57	3,30	3,25	3,25	5,83	3,85	3,49	4,01	3,79	3,40	4,09	3,82				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,25	92,89	89,90	87,05	84,28	79,51	76,50	73,86	70,93	68,26	65,96	63,29	60,87				
		CI		[95,93; 96,57]	[92,44; 93,34]	[89,37; 90,43]	[86,45; 87,65]	[83,62; 84,94]	[78,76; 80,26]	[75,70; 77,30]	[73,02; 74,70]	[70,05; 71,81]	[67,35; 69,17]	[65,03; 66,89]	[62,33; 64,25]	[59,89; 61,85]				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	16516	14888	13024	11714	10850	10131	9483	8671	8024	7455	6960	6501	6058	5693				
	auswertbar	Anzahl		14387	12658	11292	10444	9688	8997	8346	7740	7188	6716	6272	5820	5455				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		443	373	346	310	308	502	349	261	227	221	237	210	226				
		Anteil in %		3,08	2,95	3,06	2,97	3,18	5,58	4,18	3,37	3,16	3,29	3,78	3,61	4,14				
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,99	94,19	91,38	88,74	86,00	81,36	78,01	75,41	73,06	70,68	68,03	65,60	62,88					
	CI		[96,71; 97,27]	[93,80; 94,58]	[90,90; 91,86]	[88,19; 89,29]	[85,39; 86,61]	[80,66; 82,06]	[77,26; 78,76]	[74,62; 76,20]	[72,24; 73,88]	[69,83; 71,53]	[67,14; 68,92]	[64,69; 66,51]	[61,94; 63,82]					

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17772	16008	14193	12972	11994	11205	10146	9313	8627	8015	7537	7059	6643							
	auswertbar	Anzahl		15546	13543	12477	11365	10451	9629	8857	8168	7585	7084	6629	6205							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		624	482	424	373	689	464	372	324	279	272	246	247							
		Anteil in %		4,01	3,56	3,40	3,28	6,59	4,82	4,20	3,97	3,68	3,84	3,71	3,98							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,07	92,76	89,68	86,82	81,29	77,43	74,21	71,31	68,71	66,10	63,67	61,13							
		CI		[95,77; 96,37]	[92,35; 93,17]	[89,19; 90,17]	[86,27; 87,37]	[80,63; 81,95]	[76,72; 78,14]	[73,46; 74,96]	[70,52; 72,10]	[67,89; 69,53]	[65,26; 66,94]	[62,81; 64,53]	[60,24; 62,02]							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	19259	17384	15402	14086	13074	12238	11217	10409	9668	9025	8420	7855	7359							
	auswertbar	Anzahl		16914	14670	13586	12402	11427	10675	9918	9200	8557	7958	7440	6883							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		596	456	391	395	635	406	340	316	265	301	265	251							
		Anteil in %		3,52	3,11	2,88	3,18	5,56	3,80	3,43	3,43	3,10	3,78	3,56	3,65							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,55	93,65	91,01	88,20	83,48	80,35	77,63	74,99	72,69	69,97	67,50	65,03							
		CI		[96,28; 96,82]	[93,28; 94,02]	[90,57; 91,45]	[87,69; 88,71]	[82,88; 84,08]	[79,70; 81,00]	[76,94; 78,32]	[74,27; 75,71]	[71,94; 73,44]	[69,18; 70,76]	[66,69; 68,31]	[64,19; 65,87]							
2006-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	16427	14953	13356	12198	11307	10237	9369	8735	8156	7624	7120	6695								
	auswertbar	Anzahl		14338	12824	11496	10480	9621	8835	8201	7648	7123	6627	6194								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		559	444	402	678	440	301	296	273	298	248	268								
		Anteil in %		3,90	3,46	3,50	6,47	4,57	3,41	3,61	3,57	4,18	3,74	4,33								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,22	92,97	89,83	84,23	80,44	77,74	74,97	72,32	69,33	66,76	63,87								
		CI		[95,91; 96,53]	[92,55; 93,39]	[89,32; 90,34]	[83,60; 84,86]	[79,75; 81,13]	[77,01; 78,47]	[74,20; 75,74]	[71,52; 73,12]	[68,49; 70,17]	[65,89; 67,63]	[62,97; 64,77]								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17492	16055	14398	13169	12227	11029	10086	9383	8738	8152	7605	7143								
	auswertbar	Anzahl		15467	13819	12442	11375	10363	9540	8850	8217	7632	7130	6619								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		564	442	376	722	461	314	299	279	269	254	242								
		Anteil in %		3,65	3,20	3,02	6,35	4,45	3,29	3,38	3,40	3,52	3,56	3,66								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,45	93,44	90,70	85,14	81,42	78,78	76,15	73,59	71,03	68,51	66,01								
		CI		[96,16; 96,74]	[93,05; 93,83]	[90,23; 91,17]	[84,55; 85,73]	[80,77; 82,07]	[78,08; 79,48]	[75,42; 76,88]	[72,82; 74,36]	[70,23; 71,83]	[67,68; 69,34]	[65,15; 66,87]								
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	15928	14445	13041	11984	10697	9704	8890	8215	7612	7111	6664									
	auswertbar	Anzahl		13956	12387	11220	10124	9231	8471	7823	7226	6740	6278									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		506	426	785	463	387	333	311	305	250	245									
		Anteil in %		3,63	3,44	7,00	4,57	4,19	3,93	3,98	4,22	3,71	3,90									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,46	93,24	86,93	83,03	79,59	76,50	73,49	70,42	67,83	65,19									
		CI		[96,16; 96,76]	[92,82; 93,66]	[86,35; 87,51]	[82,38; 83,68]	[78,88; 80,30]	[75,74; 77,26]	[72,69; 74,29]	[69,59; 71,25]	[66,97; 68,69]	[64,30; 66,08]									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	16580	15183	13737	12623	11332	10323	9550	8890	8209	7624	7114									
	auswertbar	Anzahl		14698	13014	11805	10743	9832	9108	8450	7813	7230	6719									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		512	413	694	452	337	312	294	292	256	249									
		Anteil in %		3,48	3,17	5,88	4,21	3,43	3,43	3,48	3,74	3,54	3,71									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,59	93,62	88,31	84,65	81,79	79,02	76,30	73,48	70,90	68,27									
		CI		[96,30; 96,88]	[93,22; 94,02]	[87,77; 88,85]	[84,04; 85,26]	[81,13; 82,45]	[78,31; 79,73]	[75,55; 77,05]	[72,69; 74,27]	[70,08; 71,72]	[67,42; 69,12]									

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14234	12996	11734	10385	9312	8552	7853	7261	6777	6365								
	auswertbar	Anzahl		12353	10877	9756	8826	8121	7429	6845	6385	5950								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		493	760	475	333	356	305	264	227	236								
		Anteil in %		3,99	6,99	4,87	3,77	4,38	4,11	3,86	3,56	3,97								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,13	89,65	85,36	82,19	78,62	75,43	72,56	70,00	67,22								
		CI		[95,79; 96,47]	[89,11; 90,19]	[84,72; 86,00]	[81,49; 82,89]	[77,86; 79,38]	[74,62; 76,24]	[71,71; 73,41]	[69,12; 70,88]	[66,30; 68,14]								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14499	13262	12085	10733	9761	8937	8244	7622	7107	6648								
	auswertbar	Anzahl		12544	11118	10050	9171	8421	7754	7146	6633	6177								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		424	705	378	336	313	283	253	206	241								
		Anteil in %		3,38	6,34	3,76	3,66	3,72	3,65	3,54	3,11	3,90								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,73	90,83	87,46	84,31	81,21	78,28	75,54	73,22	70,36								
		CI		[96,42; 97,04]	[90,32; 91,34]	[86,87; 88,05]	[83,65; 84,97]	[80,49; 81,93]	[77,51; 79,05]	[74,73; 76,35]	[72,37; 74,07]	[69,47; 71,25]								
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14115	12915	11243	9876	8952	8190	7539	7015	6533									
	auswertbar	Anzahl		12151	10670	9507	8682	7933	7321	6791	6308									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		872	508	357	352	312	256	253	240									
		Anteil in %		7,18	4,76	3,76	4,05	3,93	3,50	3,73	3,80									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		93,09	88,73	85,45	82,03	78,84	76,11	73,30	70,52									
		CI		[92,65; 93,53]	[88,17; 89,29]	[84,81; 86,09]	[81,33; 82,73]	[78,08; 79,60]	[75,31; 76,91]	[72,45; 74,15]	[69,64; 71,40]									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14186	13039	11445	10134	9214	8424	7807	7208	6702									
	auswertbar	Anzahl		12280	10860	9759	8883	8159	7526	6952	6428									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		766	469	353	342	284	293	241	210									
		Anteil in %		6,24	4,32	3,62	3,85	3,48	3,89	3,47	3,27									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		93,98	89,99	86,78	83,49	80,61	77,51	74,85	72,41									
		CI		[93,57; 94,39]	[89,46; 90,52]	[86,17; 87,39]	[82,81; 84,17]	[79,88; 81,34]	[76,72; 78,30]	[74,02; 75,68]	[71,55; 73,27]									
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9246	8367	7268	6478	5915	5429	5014	4674										
	auswertbar	Anzahl		8122	7076	6335	5792	5326	4920	4572										
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		456	330	264	221	220	172	193										
		Anteil in %		5,61	4,66	4,17	3,82	4,13	3,50	4,22										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,47	90,12	86,41	83,15	79,75	76,99	73,74										
		CI		[93,98; 94,96]	[89,46; 90,78]	[85,64; 87,18]	[82,30; 84,00]	[78,82; 80,68]	[76,01; 77,97]	[72,70; 74,78]										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8609	7839	6883	6211	5669	5166	4797	4464										
	auswertbar	Anzahl		7593	6702	6054	5536	5032	4692	4352										
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		375	258	220	200	170	161	133										
		Anteil in %		4,94	3,85	3,63	3,61	3,38	3,43	3,06										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,14	91,53	88,25	85,10	82,26	79,47	77,04										
		CI		[94,66; 95,62]	[90,90; 92,16]	[87,51; 88,99]	[84,26; 85,94]	[81,35; 83,17]	[78,49; 80,45]	[76,01; 78,07]										

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9593	8555	7444	6730	6175	5688	5259											
	auswertbar	Anzahl		8335	7264	6603	6059	5573	5130											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		414	285	247	228	216	195											
		Anteil in %			4,97	3,92	3,74	3,76	3,88	3,80										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,11	91,43	88,05	84,76	81,51	78,41										
		CI			[94,65; 95,57]	[90,82; 92,04]	[87,33; 88,77]	[83,95; 85,57]	[80,62; 82,40]	[77,46; 79,36]										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8757	7816	6889	6190	5627	5185	4803											
	auswertbar	Anzahl		7609	6734	6034	5526	5090	4695											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		349	240	215	190	161	159											
		Anteil in %			4,59	3,56	3,56	3,44	3,16	3,39										
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,49	92,13	88,89	85,86	83,17	80,36											
	CI			[95,03; 95,95]	[91,52; 92,74]	[88,16; 89,62]	[85,04; 86,68]	[82,28; 84,06]	[79,40; 81,32]											
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9070	8061	6994	6277	5732	5318												
	auswertbar	Anzahl		7894	6822	6151	5637	5202												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		421	279	249	187	190												
		Anteil in %			5,33	4,09	4,05	3,32	3,65											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			94,74	90,91	87,27	84,40	81,32											
		CI			[94,25; 95,23]	[90,27; 91,55]	[86,51; 88,03]	[83,56; 85,24]	[80,40; 82,24]											
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8549	7689	6726	6067	5533	5078												
	auswertbar	Anzahl		7517	6555	5937	5430	4969												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		352	241	212	185	176												
		Anteil in %			4,68	3,68	3,57	3,41	3,54											
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,38	91,92	88,67	85,67	82,64												
	CI			[94,91; 95,85]	[91,30; 92,54]	[87,93; 89,41]	[84,84; 86,50]	[81,72; 83,56]												
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10644	9539	8405	7550	6904													
	auswertbar	Anzahl		9323	8223	7396	6748													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		405	334	255	267													
		Anteil in %			4,34	4,06	3,45	3,96												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,72	91,88	88,75	85,24												
		CI			[95,31; 96,13]	[91,32; 92,44]	[88,09; 89,41]	[84,48; 86,00]												
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9508	8558	7566	6837	6229													
	auswertbar	Anzahl		8348	7382	6684	6095													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		333	248	223	193													
		Anteil in %			3,99	3,36	3,34	3,17												
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			96,07	92,89	89,82	86,98													
	CI			[95,66; 96,48]	[92,33; 93,45]	[89,15; 90,49]	[86,22; 87,74]													

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9941	8981	7933	7157														
	auswertbar	Anzahl		8805	7769	7019														
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		377	297	295														
		Anteil in %			4,28	3,82	4,20													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,77	92,15	88,27													
		CI			[95,35; 96,19]	[91,58; 92,72]	[87,57; 88,97]													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9090	8247	7316	6614														
	auswertbar	Anzahl		8104	7168	6458														
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		328	227	213														
		Anteil in %			4,05	3,17	3,30													
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,99	92,98	89,91														
	CI			[95,57; 96,41]	[92,42; 93,54]	[89,23; 90,59]														
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10669	9566	8451															
	auswertbar	Anzahl		9390	8242															
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		420	303															
		Anteil in %			4,47	3,68														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,57	92,06														
		CI			[95,16; 95,98]	[91,50; 92,62]														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9800	8882	7881															
	auswertbar	Anzahl		8710	7685															
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		334	281															
		Anteil in %			3,83	3,66														
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			96,20	92,69															
	CI			[95,80; 96,60]	[92,13; 93,25]															
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10182	9159																
	auswertbar	Anzahl		8963																
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		421																
		Anteil in %			4,70															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,30															
		CI			[94,86; 95,74]															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9253	8373																
	auswertbar	Anzahl		8216																
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		333																
		Anteil in %			4,05															
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			95,95																
	CI			[95,52; 96,38]																
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10723																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																		
		CI																		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9586																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																			
	CI																			

In Tabelle 3.5.10 wird die kumulierte **„Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** bezüglich primärer oder sekundärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „männliche bzw. weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre oder sekundäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

Tabelle 3.5.10 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10108	8477	7161	6100	5292	4684	4232	3717	3461	3217	3049	2887	2331	2106	1922	1735	1592	1453	1330
	auswertbar	Anzahl		7249	6747	5949	5185	4622	4141	3651	3317	3139	2956	2809	2276	2049	1860	1690	1558	1416	1286
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		316	306	263	208	176	142	129	105	101	85	512	178	120	140	91	115	102	77
		Anteil in %		4,36	4,54	4,42	4,01	3,81	3,43	3,53	3,17	3,22	2,88	18,23	7,82	5,86	7,53	5,38	7,38	7,20	5,99
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,17	92,03	88,04	84,55	81,36	78,59	75,84	73,50	71,17	69,15	56,72	52,34	49,29	45,61	43,18	40,00	37,13	34,91
		CI		[95,76; 96,58]	[91,43; 92,63]	[87,30; 88,78]	[83,70; 85,40]	[80,42; 82,30]	[77,58; 79,60]	[74,76; 76,92]	[72,36; 74,64]	[69,98; 72,36]	[67,92; 70,38]	[55,32; 58,12]	[50,90; 53,78]	[47,84; 50,74]	[44,14; 47,08]	[41,71; 44,65]	[38,53; 41,47]	[35,66; 38,60]	[33,45; 36,37]
	2003-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68516	53153	42389	35253	29978	26510	23629	21869	20541	19521	18610	15130	13616	12582	11628	10833	10028	9351
		auswertbar	Anzahl		48275	41013	34332	29363	25955	23201	21148	19881	18635	17491	14392	12972	11960	10999	10236	9441	8748
		erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2787	1843	1379	1013	826	691	733	562	511	3172	1196	747	708	561	609	510	472
			Anteil in %		5,77	4,49	4,02	3,45	3,18	2,98	3,47	2,83	2,74	18,14	8,31	5,76	5,92	5,10	5,95	5,40	5,40
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit		Rate		94,61	90,46	86,89	83,93	81,29	78,90	76,22	74,10	72,12	59,45	54,56	51,45	48,42	45,98	43,26	40,94	38,73	
		CI		[94,42; 94,80]	[90,20; 90,72]	[86,58; 87,20]	[83,58; 84,28]	[80,91; 81,67]	[78,49; 79,31]	[75,78; 76,66]	[73,64; 74,56]	[71,64; 72,60]	[58,89; 60,01]	[53,98; 55,14]	[50,86; 52,04]	[47,82; 49,02]	[45,38; 46,58]	[42,66; 43,86]	[40,34; 41,54]	[38,13; 39,33]	
2004-1		männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	81767	71096	59197	50332	44816	40497	37452	35384	33564	31902	26237	23683	22002	20437	18952	17614	16458	
		auswertbar	Anzahl		68102	57517	48087	43707	39551	36011	34132	31941	30078	24819	22429	20755	19205	17700	16405	15225	
		erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		5049	2919	1965	1501	1308	1190	1130	1062	5146	2056	1287	1223	1098	1015	892	772	
			Anteil in %		7,41	5,08	4,09	3,43	3,31	3,30	3,31	3,32	17,11	8,28	5,74	5,89	5,72	5,73	5,44	5,07	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		92,80	88,19	84,72	81,84	79,16	76,60	74,11	71,71	59,71	54,81	51,69	48,66	45,90	43,29	40,95	38,87		
		CI		[92,61; 92,99]	[87,95; 88,43]	[84,44; 85,00]	[81,54; 82,14]	[78,83; 79,49]	[76,25; 76,95]	[73,74; 74,48]	[71,33; 72,09]	[59,27; 60,15]	[54,36; 55,26]	[51,24; 52,14]	[48,20; 49,12]	[45,44; 46,36]	[42,83; 43,75]	[40,49; 41,41]	[38,41; 39,33]		
	2004-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	112598	98806	83447	71888	64495	58592	54277	51445	49000	46829	39129	35537	32955	30742	28556	26685	24965	
		auswertbar	Anzahl		94869	81105	68686	62851	57267	52218	49628	46699	44226	37031	33656	31105	28929	26739	24890	23139	
		erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		6066	3534	2393	2001	1676	1584	1346	1299	6855	2752	1864	1632	1543	1370	1281	1140	
			Anteil in %		6,39	4,36	3,48	3,18	2,93	3,03	2,71	2,78	15,50	7,43	5,54	5,25	5,33	5,12	5,15	4,93	
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit		Rate		93,78	89,78	86,77	84,04	81,60	79,18	77,07	74,97	63,60	58,92	55,68	52,78	49,99	47,45	45,02	42,80		
		CI		[93,63; 93,93]	[89,59; 89,97]	[86,55; 86,99]	[83,79; 84,29]	[81,34; 81,86]	[78,90; 79,46]	[76,77; 77,37]	[74,66; 75,28]	[63,24; 63,96]	[58,55; 59,29]	[55,30; 56,06]	[52,39; 53,17]	[49,60; 50,38]	[47,06; 47,84]	[44,63; 45,41]	[42,40; 43,20]		

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2004-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	62095	54850	45649	39763	35210	32231	30373	28786	27379	23000	20890	19267	17914	16705	15610	14622		
	auswertbar	Anzahl		52196	43720	38497	34221	30732	29071	27007	25413	21407	19443	17833	16532	15336	14279	13250		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3243	1697	1368	1127	952	832	794	3886	1583	1180	965	831	794	724	681		
		Anteil in %		6,21	3,88	3,55	3,29	3,10	2,86	2,94	15,29	7,39	6,07	5,41	5,03	5,18	5,07	5,14		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,00	90,47	87,32	84,47	81,93	79,63	77,36	65,84	61,04	57,37	54,30	51,60	48,95	46,49	44,10		
		CI		[93,80; 94,20]	[90,22; 90,72]	[87,03; 87,61]	[84,14; 84,80]	[81,57; 82,29]	[79,25; 80,01]	[76,96; 77,76]	[65,36; 66,32]	[60,54; 61,54]	[56,86; 57,88]	[53,78; 54,82]	[51,08; 52,12]	[48,42; 49,48]	[45,96; 47,02]	[43,57; 44,63]		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	81215	72546	61536	53939	48222	44494	42146	39984	38116	32434	29630	27451	25583	23905	22320	20979		
	auswertbar	Anzahl		69138	58940	52404	46942	42585	40441	37549	35343	30157	27583	25419	23642	21960	20426	19056		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3571	2084	1589	1277	1158	1098	964	4903	1993	1450	1270	1110	1122	902	922		
		Anteil in %		5,17	3,54	3,03	2,72	2,72	2,72	2,57	13,87	6,61	5,26	5,00	4,70	5,11	4,42	4,84		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,01	91,76	89,03	86,63	84,34	82,10	80,05	69,23	64,72	61,35	58,32	55,61	52,79	50,48	48,04			
	CI		[94,85; 95,17]	[91,55; 91,97]	[88,79; 89,27]	[86,36; 86,90]	[84,05; 84,63]	[81,79; 82,41]	[79,72; 80,38]	[68,83; 69,63]	[64,30; 65,14]	[60,92; 61,78]	[57,88; 58,76]	[55,16; 56,06]	[52,33; 53,25]	[50,02; 50,94]	[47,58; 48,50]			
2005-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68729	60968	52008	45264	41037	38231	36013	34103	28498	25763	23867	22174	20624	19279	18096			
	auswertbar	Anzahl		58511	50175	44187	39590	36961	34287	31880	27078	24564	22694	21017	19483	18151	16968			
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3110	1899	1459	1352	1066	981	4822	1994	1346	1160	1090	964	844	832			
		Anteil in %		5,32	3,78	3,30	3,42	2,88	2,86	15,13	7,36	5,48	5,11	5,19	4,95	4,65	4,90			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,83	91,32	88,35	85,40	82,99	80,68	68,92	63,92	60,45	57,39	54,44	51,77	49,39	46,97			
		CI		[94,65; 95,01]	[91,09; 91,55]	[88,08; 88,62]	[85,10; 85,70]	[82,66; 83,32]	[80,33; 81,03]	[68,49; 69,35]	[63,47; 64,37]	[59,99; 60,91]	[56,92; 57,86]	[53,96; 54,92]	[51,29; 52,25]	[48,90; 49,88]	[46,48; 47,46]			
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	89380	80358	69763	61551	56286	52890	50101	47561	40471	36905	34201	31846	29768	27788	26073			
	auswertbar	Anzahl		77185	67293	60039	54260	51125	47712	44451	38467	35154	32520	30227	28172	26195	24445			
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3517	2129	1605	1494	1185	1235	5942	2535	1744	1567	1357	1359	1120	1113			
		Anteil in %		4,56	3,16	2,67	2,75	2,32	2,59	13,37	6,59	4,96	4,82	4,49	4,82	4,28	4,55			
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,57	92,62	90,18	87,76	85,77	83,61	72,84	68,11	64,76	61,67	58,93	56,11	53,73	51,29				
	CI		[95,43; 95,71]	[92,43; 92,81]	[89,96; 90,40]	[87,52; 88,00]	[85,51; 86,03]	[83,33; 83,89]	[72,49; 73,19]	[67,73; 68,49]	[64,37; 65,15]	[61,27; 62,07]	[58,52; 59,34]	[55,70; 56,52]	[53,31; 54,15]	[50,87; 51,71]				
2005-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	53991	48398	41416	36935	34114	32000	30148	25052	22595	20840	19259	17932	16662	15591				
	auswertbar	Anzahl		46548	40243	35555	32963	30556	28460	23960	21646	19930	18410	17089	15861	14786				
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2320	1420	1214	941	888	4271	1664	1137	1067	913	893	734	703				
		Anteil in %		4,98	3,53	3,41	2,85	2,91	15,01	6,94	5,25	5,35	4,96	5,23	4,63	4,75				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,14	91,85	88,80	86,32	83,88	71,70	66,80	63,34	59,99	57,04	54,09	51,61	49,16				
		CI		[94,95; 95,33]	[91,60; 92,10]	[88,50; 89,10]	[85,99; 86,65]	[83,53; 84,23]	[71,25; 72,15]	[66,32; 67,28]	[62,84; 63,84]	[59,48; 60,50]	[56,52; 57,56]	[53,56; 54,62]	[51,08; 52,14]	[48,62; 49,70]				
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	69428	63068	54784	49278	46004	43236	40963	34660	31399	29105	26954	25086	23406	21882				
	auswertbar	Anzahl		60883	53294	47576	44434	41331	38668	33148	30089	27882	25777	23937	22251	20783				
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2647	1576	1309	1157	1028	5158	2181	1432	1342	1145	1100	1006	942				
		Anteil in %		4,35	2,96	2,75	2,60	2,49	13,34	6,58	4,76	4,81	4,44	4,60	4,52	4,53				
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,75	92,97	90,48	88,18	86,04	74,92	70,06	66,77	63,59	60,79	58,03	55,43	52,92					
	CI		[95,59; 95,91]	[92,77; 93,17]	[90,24; 90,72]	[87,91; 88,45]	[85,75; 86,33]	[74,54; 75,30]	[69,65; 70,47]	[66,35; 67,19]	[63,16; 64,02]	[60,35; 61,23]	[57,58; 58,48]	[54,97; 55,89]	[52,45; 53,39]					

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	65706	58597	51252	46590	43252	40557	33767	30214	27779	25674	23814	22149	20722					
	auswertbar	Anzahl		56788	48959	44799	41180	37780	32010	28618	26286	24289	22454	20822	19358					
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2674	1748	1400	1227	5626	2399	1516	1361	1202	1128	993	889					
		Anteil in %		4,71	3,57	3,13	2,98	14,89	7,49	5,30	5,18	4,95	5,02	4,77	4,59					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,40	92,09	89,28	86,70	74,29	68,81	65,22	61,89	58,86	55,94	53,29	50,85					
		CI		[95,23; 95,57]	[91,87; 92,31]	[89,02; 89,54]	[86,41; 86,99]	[73,90; 74,68]	[68,39; 69,23]	[64,79; 65,65]	[61,44; 62,34]	[58,40; 59,32]	[55,48; 56,40]	[52,82; 53,76]	[50,37; 51,33]					
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	82478	74700	66283	61042	57109	53867	45635	41134	37879	35044	32499	30201	28266					
	auswertbar	Anzahl		72711	63408	58882	54449	50229	43354	39072	35977	33214	30699	28435	26476					
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3101	1885	1614	1427	6717	2927	1970	1693	1535	1519	1247	1166					
		Anteil in %		4,26	2,97	2,74	2,62	13,37	6,75	5,04	4,71	4,62	4,95	4,39	4,40					
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,82	93,06	90,56	88,26	76,91	71,80	68,23	65,05	62,08	59,04	56,47	53,99						
	CI		[95,68; 95,96]	[92,87; 93,25]	[90,34; 90,78]	[88,02; 88,50]	[76,58; 77,24]	[71,44; 72,16]	[67,86; 68,60]	[64,67; 65,43]	[61,69; 62,47]	[58,64; 59,44]	[56,06; 56,88]	[53,57; 54,41]						
2006-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63134	57560	50895	46649	43409	36337	32373	29624	27261	25207	23359	21793						
	auswertbar	Anzahl		55374	48926	44310	40632	34415	30807	28056	25819	23802	21997	20415						
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2635	1676	1395	5625	2528	1678	1448	1314	1206	1053	985						
		Anteil in %		4,76	3,43	3,15	13,84	7,35	5,45	5,16	5,09	5,07	4,79	4,82						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,37	92,19	89,37	77,43	71,84	67,98	64,53	61,28	58,21	55,45	52,77						
		CI		[95,20; 95,54]	[91,97; 92,41]	[89,11; 89,63]	[77,06; 77,80]	[71,44; 72,24]	[67,56; 68,40]	[64,10; 64,96]	[60,83; 61,73]	[57,75; 58,67]	[54,99; 55,91]	[52,30; 53,24]						
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	78693	72514	65198	60243	56443	48018	43136	39700	36630	34100	31703	29666						
	auswertbar	Anzahl		69907	62674	57138	52734	45387	40952	37575	34638	32136	29827	27767						
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2782	1790	1531	6590	3055	2015	1810	1519	1490	1322	1256						
		Anteil in %		3,98	2,86	2,68	12,50	6,73	4,92	4,82	4,39	4,64	4,43	4,52						
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,12	93,45	91,03	80,05	74,76	71,13	67,75	64,82	61,85	59,13	56,46							
	CI		[95,98; 96,26]	[93,27; 93,63]	[90,81; 91,25]	[79,74; 80,36]	[74,42; 75,10]	[70,77; 71,49]	[67,37; 68,13]	[64,43; 65,21]	[61,45; 62,25]	[58,72; 59,54]	[56,05; 56,87]							
2007-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	68490	62088	55393	51035	42939	38213	34900	31933	29551	27329	25450							
	auswertbar	Anzahl		59926	52601	47654	40660	36330	33212	30380	28070	25871	24014							
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2634	1662	6216	2826	1848	1762	1422	1415	1201	1137							
		Anteil in %		4,40	3,16	13,04	6,95	5,09	5,31	4,68	5,04	4,64	4,73							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,71	92,77	81,12	75,59	71,80	68,05	64,90	61,66	58,83	56,05							
		CI		[95,55; 95,87]	[92,56; 92,98]	[80,79; 81,45]	[75,23; 75,95]	[71,42; 72,18]	[67,65; 68,45]	[64,49; 65,31]	[61,23; 62,09]	[58,39; 59,27]	[55,61; 56,49]							
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	85534	78717	71485	66238	56545	50890	46687	43059	39851	36971	34608							
	auswertbar	Anzahl		76151	67996	61993	53680	48459	44515	41011	37855	35080	32653							
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2680	1895	7181	3297	2333	2047	1852	1756	1480	1441							
		Anteil in %		3,52	2,79	11,58	6,14	4,81	4,60	4,52	4,64	4,22	4,41							
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,56	93,95	83,44	78,40	74,68	71,29	68,11	64,99	62,27	59,52								
	CI		[96,43; 96,69]	[93,78; 94,12]	[83,17; 83,71]	[78,09; 78,71]	[74,35; 75,01]	[70,95; 71,63]	[67,75; 68,47]	[64,62; 65,36]	[61,89; 62,65]	[59,13; 59,91]								

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63593	58018	52251	43504	38153	34585	31562	29037	26862	24971								
	auswertbar	Anzahl		55049	48272	40787	36071	32683	29814	27325	25258	23320								
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2345	6260	2906	1969	1669	1423	1351	1158	1102								
		Anteil in %		4,26	12,97	7,12	5,46	5,11	4,77	4,94	4,58	4,73								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,87	83,93	78,06	73,87	70,15	66,84	63,58	60,69	57,82								
		CI		[95,71; 96,03]	[83,62; 84,24]	[77,70; 78,42]	[73,49; 74,25]	[69,75; 70,55]	[66,42; 67,26]	[63,15; 64,01]	[60,25; 61,13]	[57,37; 58,27]								
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	79062	73015	66715	56918	50606	46210	42598	39368	36640	34164								
	auswertbar	Anzahl		69496	61579	53363	47788	43641	40150	37017	34396	31835								
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		2460	6871	3436	2263	1957	1739	1546	1503	1262								
		Anteil in %		3,54	11,16	6,44	4,74	4,48	4,33	4,18	4,37	3,96								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,56	86,21	80,76	76,99	73,58	70,44	67,53	64,61	62,04								
		CI		[96,43; 96,69]	[85,95; 86,47]	[80,46; 81,06]	[76,67; 77,31]	[73,24; 73,92]	[70,08; 70,80]	[67,16; 67,90]	[64,23; 64,99]	[61,65; 62,43]								
2008-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	71382	65468	54037	46364	41514	37607	34432	31734	29463									
	auswertbar	Anzahl		61593	51218	44611	40042	36355	33301	30647	28334									
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		7521	3651	2365	2104	1698	1578	1318	1240									
		Anteil in %		12,21	7,13	5,30	5,25	4,67	4,74	4,30	4,38									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		88,24	82,07	77,79	73,76	70,36	67,06	64,21	61,40									
		CI		[87,99; 88,49]	[81,77; 82,37]	[77,46; 78,12]	[73,40; 74,12]	[69,99; 70,73]	[66,67; 67,45]	[63,81; 64,61]	[60,98; 61,82]									
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	86070	79918	67593	58908	53417	48873	45105	41695	38883									
	auswertbar	Anzahl		75528	64356	56827	51720	47364	43700	40417	37523									
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		8021	4058	2629	2323	1945	1916	1557	1579									
		Anteil in %		10,62	6,31	4,63	4,49	4,11	4,38	3,85	4,21									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		89,75	84,19	80,36	76,80	73,68	70,49	67,80	64,94									
		CI		[89,54; 89,96]	[83,93; 84,45]	[80,07; 80,65]	[76,49; 77,11]	[73,36; 74,00]	[70,15; 70,83]	[67,45; 68,15]	[64,57; 65,31]									
2008-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	51323	46684	38386	33785	30354	27563	25230	23277										
	auswertbar	Anzahl		45098	37306	32910	29660	26968	24694	22705										
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4650	2257	1803	1493	1374	1120	1069										
		Anteil in %		10,31	6,05	5,48	5,03	5,09	4,54	4,71										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		89,88	84,53	79,96	75,99	72,16	68,92	65,68										
		CI		[89,60; 90,16]	[84,19; 84,87]	[79,58; 80,34]	[75,58; 76,40]	[71,72; 72,60]	[68,46; 69,38]	[65,21; 66,15]										
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	60552	55641	46858	41734	37918	34643	31934	29646										
	auswertbar	Anzahl		53854	45595	40760	37155	33928	31300	28983										
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4971	2489	1953	1735	1563	1319	1287										
		Anteil in %		9,23	5,46	4,79	4,67	4,61	4,21	4,44										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		90,95	86,05	81,98	78,20	74,64	71,52	68,35										
		CI		[90,71; 91,19]	[85,76; 86,34]	[81,65; 82,31]	[77,84; 78,56]	[74,26; 75,02]	[71,12; 71,92]	[67,93; 68,77]										

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2009-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	56082	50055	41811	36734	33106	30099	27687													
	auswertbar	Anzahl		48630	40808	35939	32436	29478	27060													
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4452	2497	1838	1594	1354	1209													
		Anteil in %		9,15	6,12	5,11	4,91	4,59	4,47													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,00	85,51	81,18	77,24	73,73	70,44													
		CI		[90,75; 91,25]	[85,19; 85,83]	[80,82; 81,54]	[76,85; 77,63]	[73,32; 74,14]	[70,01; 70,87]													
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	63593	57620	49209	43926	39900	36487	33873													
	auswertbar	Anzahl		56132	48130	43057	39150	35873	33212													
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4454	2521	1965	1874	1415	1417													
		Anteil in %		7,93	5,24	4,56	4,79	3,94	4,27													
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		92,19	87,42	83,47	79,52	76,41	73,15														
	CI		[91,97; 92,41]	[87,14; 87,70]	[83,16; 83,78]	[79,17; 79,87]	[76,04; 76,78]	[72,76; 73,54]														
2009-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	51162	45922	38459	33833	30503	27889														
	auswertbar	Anzahl		44734	37547	33077	29896	27252														
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3829	2171	1753	1397	1331														
		Anteil in %		8,56	5,78	5,30	4,67	4,88														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,58	86,35	81,83	78,05	74,24														
		CI		[91,32; 91,84]	[86,03; 86,67]	[81,46; 82,20]	[77,65; 78,45]	[73,81; 74,67]														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	59243	53785	45976	41033	37156	34167														
	auswertbar	Anzahl		52648	44944	40189	36474	33484														
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4113	2366	2043	1555	1411														
		Anteil in %		7,81	5,26	5,08	4,26	4,21														
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		92,29	87,49	83,10	79,59	76,23															
	CI		[92,06; 92,52]	[87,20; 87,78]	[82,77; 83,43]	[79,23; 79,95]	[75,85; 76,61]															
2010-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	58907	52913	44632	39504	35854															
	auswertbar	Anzahl		51706	43634	38701	35130															
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4342	2508	1835	1684															
		Anteil in %		8,40	5,75	4,74	4,79															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,72	86,51	82,46	78,51															
		CI		[91,48; 91,96]	[86,21; 86,81]	[82,12; 82,80]	[78,14; 78,88]															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	66220	60491	52259	46767	42760															
	auswertbar	Anzahl		59219	51263	45959	41913															
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4281	2744	2034	1802															
		Anteil in %		7,23	5,35	4,43	4,30															
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		92,87	87,95	84,10	80,48																
	CI		[92,66; 93,08]	[87,69; 88,21]	[83,80; 84,40]	[80,15; 80,81]																

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	52764	47544	40139	35731														
	auswertbar	Anzahl		46587	39354	34944														
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3908	2181	1819														
		Anteil in %		8,39	5,54	5,21														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,72	86,69	82,18														
		CI		[91,47; 91,97]	[86,38; 87,00]	[81,82; 82,54]														
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	60278	55053	47159	42430														
	auswertbar	Anzahl		54073	46269	41628														
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4239	2251	1887														
		Anteil in %		7,84	4,87	4,53														
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		92,25	87,80	83,82															
	CI		[92,03; 92,47]	[87,52; 88,08]	[83,50; 84,14]															
2011-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	57470	51612	43726															
	auswertbar	Anzahl		50488	42616															
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4150	2292															
		Anteil in %		8,22	5,38															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,87	86,93															
		CI		[91,63; 92,11]	[86,63; 87,23]															
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	65700	60046	52081															
	auswertbar	Anzahl		58895	50892															
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		4154	2507															
		Anteil in %		7,05	4,93															
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		93,02	88,44																
	CI		[92,82; 93,22]	[88,18; 88,70]																
2011-2	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	51555	46587																
	auswertbar	Anzahl		45453																
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3723																
		Anteil in %		8,19																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,81																
		CI		[91,56; 92,06]																
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	59353	54597																
	auswertbar	Anzahl		53359																
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		3903																
		Anteil in %		7,31																
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		92,69																	
	CI		[92,47; 92,91]																	
2012-1	männliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	58099																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																		
		CI																		
	weibliche Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	64281																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																			
	CI																			

Anhang A: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Evaluationsbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um drei Arten von Datensätzen, die jeweils für einen Patienten erhoben wurden:


- Patientenmerkmale
- Medizinische Daten
- Ökonomische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung A.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Diabetes mellitus Typ 2 von AOK, Seekrankenkasse und Knappschaft.

A.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung eines Patienten in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten. Zu beachten ist, dass es durch die 9. RSA-ÄndV zu einer Änderung in der Dokumentation kam.

Abb. A.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP DM2 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP



* Seit der Einführung von eDMP zum 01.07.2008 erhalten die Krankenkassen alle Datensätze, einschließlich der medizinischen Daten. Eine getrennte Übermittlung der Datensätze galt bis zum 30.06.2008.

Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) ab Juli 2008 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen **medizinischen Behandlungsdaten** sowie die **personenbezogenen Merkmale** enthält.⁶ Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Diabetes mellitus Typ 2 finden die Satzartbeschreibungen SA100EA/FA und SA100ED/FD⁷ Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA100ED/SA100FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 100EA/FA übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2008-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA100ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jedem Patienten vorhandenen **Patientenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patienten fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 100 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass ein Patient in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für ihn eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt. Sobald dem Evaluator die Patientenmerkmale vorliegen, zieht er eine Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit der Programmteilnehmer für die **Evaluation** der ökonomischen Daten. Der Stichprobenumfang beträgt dabei jeweils 10 Prozent der Ist-Größe einer Kohorte, jedoch mindestens 100 und höchstens 500 Patienten. Falls an einem Programm zwischen 10 und 100 Patienten teilnahmen, wird eine Vollerhebung durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als 10 Teilnehmer umfasst, da in diesem Fall aus Gründen der Wahrung der Anonymität auf eine Auswertung verzichtet wird. Der Evaluator übermittelt der Krankenkasse eine Liste mit den Pseudonymen der Stichprobe. Die Kasse spielt diesen Pseudonymen die mit der medizinischen Behandlung verbundenen Leistungsausgaben zu und erstellt daraus einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 100 OD. Ferner liefert sie Angaben zu den Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. („**ökonomische Daten**“).

Der damit beschriebene Datenfluss ist schematisch in Abbildung A.1.1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Ab der Kohorte 2008-2 wurden die Auswertungen darüber hinaus um die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung zur Veränderung der subjektiven Lebensqualität ergänzt. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen.

Befragt wird grundsätzlich die bereits oben beschriebene Stichprobe von Patienten. Die Kasse ermittelt dazu, für die vom Evaluator übermittelte Pseudonymliste, die zugehörigen Adressdaten und versendet an diese Patienten den Fragebogen. Die Patienten senden die ausgefüllten Fragebögen direkt an den Evaluator zurück, wo sie ausgewertet werden.

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmern“ und „Patienten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientenbezogenen Auswertung würde hingegen der Patient weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Der Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschrieben werden mussten und sich in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP ein Teilnehmer der Kohorte 2006-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit Sicherheit geschlossen werden, dass er sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat der betreffende Patient „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patienten dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergibt sich eine Besonderheit. Die Patienten werden verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen.

⁶ Bis zum 30.06.2008 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patienten bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

⁷ Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „A“ (alt) und „D“ wird unterschieden, ob sich die Dokumentation auf die Zeit vor oder nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen bezieht.

A.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung der Datenverarbeitung kam es zu Abweichungen bei der erwarteten Datenqualität. Diese Abweichungen traten insbesondere zu Beginn der Programmlaufzeit, z.B. aufgrund der allgemeinen Anlaufschwierigkeiten, auf. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Rücklaufkontrolle (OD-Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf (PM-Datensätze)

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.⁸ Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln und den medizinischen Plausibilitätskriterien des BVA (siehe Tabelle 0.1.2) folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen kein Regelverstoß vorlag und die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen Regelverstöße vorlagen oder die gemäß Rechenregeln nicht auswertbar waren, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden **„Komplett-Dubletten“** aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden **„Auswertungsdubletten“** aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze, Ökonomische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung (**„Matching“**) von Personenmerkmalen, medizinischen Daten und ökonomischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patienten ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei den ökonomischen Datensätzen war eine Überprüfung auf Verknüpfbarkeit entbehrlich. Da sie durch das Zuspielen der Leistungsausgaben zu denjenigen Pseudonymnummern generiert wurden, die in einer Stichprobe aus den PM-Datensätzen gezogen worden waren, war für die zugespielten Leistungsausgaben eine Verknüpfbarkeit mit den PM-Datensätzen in jedem Fall gegeben. Dennoch konnten auch hier drei Arten von Problemfällen auftreten:

- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen keine Leistungsausgaben zugespielt worden waren
- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen die Leistungsausgaben doppelt und mit teils unterschiedlichen Werten zugespielt worden waren
- In der Stichprobe nicht gezogene Pseudonymnummern, die dennoch um Leistungsausgaben ergänzt geliefert wurden

Im Rahmen einer **Rücklaufkontrolle** wurde daher ein Abgleich vorgenommen zwischen denjenigen Pseudonymnummern, die der Evaluator in der Stichprobe gezogen hatte, und denjenigen Pseudonymnummern, für welche die Krankenkasse die zugehörigen Leistungsausgaben zugespielt hatte. Damit wurden – differenziert nach Kassen, Eintrittskohorte und Antragsregion – die Problemfälle identifiziert. Da es sich bei der letztgenannten Art von Problemfällen um nicht auswertungsrelevante Informationen handelt, wurden die entsprechenden Datensätze bei der Auswertung ignoriert. Analog wurde vorgegangen, wenn den Pseudonymnummern Leistungsausgaben für Halbjahre zugespielt wurden, in denen die entsprechenden Patienten nicht mehr Programmteilnehmer waren.

Dass die Krankenkassen nicht allen gezogenen Pseudonymnummern die Leistungsausgaben für die erwarteten Berichtshalbjahre zuspielten, lag zum Teil daran, dass die entsprechenden Patienten rückwirkend aus dem Programm ausgeschrieben worden waren, diese Information zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung aber noch nicht vorlag. Lagen andere Gründe dafür vor, wurden die Daten ggf. von Kassen ergänzt und eine Neulieferung der überarbeiteten ökonomischen Datensätze an den Evaluator vorgenommen. Lagen in einer Datenlieferung für eine Pseudonymnummer zwei oder mehr ökonomische Datensätze mit unterschiedlichen Leistungsausgaben vor, floss der ökonomisch ungünstigste Wert in die Evaluation ein.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis waren die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (je nach Antragsregion bis zum Berichtshalbjahr 2012-1)
- Sie wurden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung werden auch dann berücksichtigt, wenn sie sich auf bereits veröffentlichte Kohorten bzw. Halbjahre beziehen.

Der letzte Punkt stellt eine Änderung gegenüber den bisherigen Berichten dar, die gemäß der Abstimmung mit dem BVA zum 30.09.2013 sowohl für die medizinischen als auch für die stichprobenbasierten Auswertungen umzusetzen war. Im Kern wird dabei zugunsten einer aktuelleren Datenbasis die Reproduzierbarkeit der Berichte aufgehoben. Durch die rückwirkende Bereinigung der Datenbasis kann es im Vergleich zu den bisherigen Berichten insbesondere zu folgenden Änderungen kommen: Die Restkohorte kann durch die rückwirkende Bereinigung im Zeitverlauf stärker absinken als in bisherigen Berichten. Da diese Bereinigung im Wesentlichen Patienten ohne medizinische Dokumentation betrifft, ist in der Regel jedoch mit keinen oder nur geringen Auswirkungen auf die **Anzahl der auswertbaren Patienten und ihre Auswertungsergebnisse** (Durchschnittswerte, Patientenanteile) zu rechnen. Dagegen ist davon auszugehen, dass der **Anteil** der auswertbaren Patienten an allen Patienten steigt, wenn die Restkohorte als Bezugsgröße kleiner ausfällt als in bisherigen Berichten. Analog ist in diesem Fall auch ein Anstieg der Anteilswerte aus anderen Auswertungen zu erwarten, deren Bezugsgröße die Restkohorte darstellt.

⁸ Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

A.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für einen DMP-Teilnehmer für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kam es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu Abweichungen von diesem Schema. Im Folgenden wird beschrieben, wie bei diesen Sonderfällen in der Auswertung vorgegangen wurde:

- **1. Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**
Liegen für das Beitrittsjahr eines Patienten eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führt dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugerechnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle A.3.1.
- **2. Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **3. Mehrere Folgedokumentationen in einem Halbjahr**
Lagen für ein Halbjahr mehrere Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle A.3.1 Anwendung.
- **4. Mehrere Erstdokumentationen im Beitrittsjahr**
Lagen für das Beitrittsjahr zwei oder mehr Erstdokumentationen vor, wurde grundsätzlich diejenige mit dem frühesten Unterschriftsdatum des Arztes herangezogen. Sofern zwei oder mehr Erstdokumentationen mit diesem Datum vorliegen, werden die auszuwertenden medizinischen Werte gemäß Tabelle A.3.1 festgelegt.
- **5. Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später**
Lagen Erstdokumentationen für Halbjahre nach dem Beitrittsjahr vor, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die beiden letztgenannten Punkte wurden im Herbst 2010 neu in die Berechnungsvorschriften aufgenommen.⁹ In den Fällen, in denen die Datenlage widersprüchlich ist, kann es dadurch zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen. Da in einer chronologisch ersten Erstdokumentation nicht zwangsläufig alle Parameter gleich dokumentiert sind, wie in etwaigen weiteren Erstdokumentationen im Beitrittsjahr, kann es aufgrund der Neuregelung in Punkt 4 zu einer Änderung medizinischer Parameter im *Beitrittsjahr* und infolgedessen auch zu Änderungen der Basis von kollektivbasierten Auswertungen kommen. Die Neuregelung unter Punkt 5 kann zu einer Änderung medizinischer Parameter in den *Folgehalbjahren* führen.¹⁰ Darüber hinaus wurden die Berechnungsvorschriften bezüglich Tabelle A.3.1 dahingehend geändert, dass bei den Laborparametern/Messwerten nicht mehr der letzte chronologisch verfügbare, sondern der letzte *plausible* Wert zu verwenden ist. Dadurch kann es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen.

⁹ Zuvor war in den Berechnungsvorschriften des BVA nur definiert, wie bei Sonderfällen bezüglich der Folgedokumentationen zu verfahren ist (mehrerer Folgedokumentationen in einem Halbjahr, Folgedokumentationen im „falschen“ Halbjahr). Die Handhabung von Sonderfällen bei den Erstdokumentationen war nicht geregelt. Sie wurden bislang weitestgehend analog zu den Sonderfällen bei den Folgedokumentationen in die Auswertung einbezogen.

¹⁰ Da medizinische Informationen aus Erstdokumentationen in den Folgehalbjahren explizit zu ignorieren sind, entfällt nun in den betroffenen Fällen und Halbjahren ein medizinischer Wert. Sofern im betroffenen Halbjahr aus einer oder mehreren Folgedokumentationen abweichende Werte vorliegen, kann es – je nach Auswahl gemäß Tabelle A.3.1 – zu veränderten medizinischen Parametern führen. Sofern im betroffenen Halbjahr keine Folgedokumentationen vorliegen, kommt es durch die Neuregelung zu fehlenden Angaben.

Tabelle A.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr

Parameter	Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr
BMI	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres
Definition „Raucher“	Für das betreffende Halbjahr als „Raucher“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Hypertonus	Jeweils letztes vorliegendes plausibles Blutdruck-Wert-Paar des Auswertungshalbjahres*
HbA1c	Jeweils letzter vorliegender plausibler HbA1c-Wert des Auswertungshalbjahres*
Serum-Kreatinin	Jeweils letzter vorliegender plausibler Kreatinin-Wert des Auswertungshalbjahres*
Medikation	Jeweils letzter vorliegender Wert des Auswertungshalbjahres**
Empfohlene Diabetes-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“).
Empfohlene Hypertonie-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“).
Herzinfarkt	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Schlaganfall	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Amputation	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Erblindung	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Nierenersatztherapie (ab 2004-2)	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Nephropathie	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Diabetische Retinopathie	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Diabetischer Fuß (Wagner/Armstrong)	Jeweils die höchste (pathologischste) dokumentierte Kategorie für Wagner und Armstrong ist zu werten (s.u.)***
Ophthalmologische Netzhautuntersuchung	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde****

* Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit plausiblen Angaben vorliegen, wird der ungünstigste (höchste) Wert verwendet.

** Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit Angaben zur Medikation vorliegen, sind alle Informationen zu verwenden. Bei Widersprüchen (z.B. Medikament X ja und nein) ist von der Anwendung des Medikamentes auszugehen.

*** DFS (Wagner/Armstrong): Beim Vorliegen mehrerer FD ist aus allen vorliegenden FD das Maximum für das Wagner-Stadium UND das Maximum für das Armstrong-Stadium zu werten, unabhängig davon, aus welcher FD die beiden höchsten Angaben entstammen. Dadurch wird sichergestellt, dass für beide Angaben (Wagner und Armstrong) in einem Halbjahr die jeweils höchste dokumentierte Kategorie in die Auswertung einfließt. Laut Ausfüllanleitungen zu SA100EA/FA und SA100ED/FD sind KEINE Angaben zum DFS für Kinder unter 18 Jahren zu machen. Sofern dennoch in den Daten der Datenstellen Angaben bei Kindern enthalten sein sollten, werden diese Angaben für die Evaluation nicht berücksichtigt (auf „missing“ gesetzt).

**** Diese Parameter können halbjährlich pro Folgedokumentation dokumentiert werden, sie werden aber nicht halbjährlich sondern jährlich ausgewertet, so dass immer zwei aufeinanderfolgende Halbjahre ein Berichtsjahr ergeben. Berichtsjahre sind dabei nicht gleichzusetzen mit Kalenderjahren.

Anhang B: Glossar

ACE-Hemmer sind Hemmstoffe (Inhibitoren) des Angiotensin-konvertierenden Enzyms (Angiotensin Converting Enzyme = ACE)

Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung) – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

Antragsregion – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

arithmetisches Mittel – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

Armstrong-Klassen – Die Armstrong-Klassen werden in der Beschreibung des diabetischen Fußsyndroms ergänzend zu den Wagner-Stadien verwendet. Armstrong-Stadium A: Keine zusätzliche Komplikation; Stadium B: Mit Infektion (Besiedlung mit Krankheitserregern); Stadium C: Mit Ischämie (Minderdurchblutung); Stadium D: mit Ischämie und Infektion.

auswertbare Patienten – Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

Auswertungs(halb)jahr – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmer erfolgen.

Beitritts(halb)jahr – Kalenderhalbjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

Bluthochdruck – Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

BMI (Body-Mass-Index) – Verhältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts, berechnet durch Körpergewicht in kg dividiert durch Körpergröße in m zum Quadrat.

Body-Mass-Index – siehe BMI

CI (confidence interval) – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

diastolischer Blutdruck – Der sich während der Erschlaffung der Herzkammer (Diastole) ergebende niedrigste Punkt der Blutdruckkurve (auch als unterer Blutdruckwert bezeichnet). Da dieser Druck während des größten Teils des Herzzyklus auf den Gefäßwänden lastet, ist er für die Langzeitprognose bedeutend.

Diabetes mellitus – Diabetes mellitus - Zuckerkrankheit, die häufigste endokrine Störung. Es wird vor allem zwischen den beiden wichtigsten Gruppen, dem Typ 1 und dem Typ 2 unterschieden. Allen Typen ist ein absoluter oder relativer Mangel an Insulin gemeinsam. Gefürchtet sind vor allem die Spätfolgen des Diabetes, die Makro- und Mikroangiopathie sowie die Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven.

DMP (Disease-Management-Programm[e]) – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

ED – siehe Erstdokumentation

Erstdokumentation – Mit der Einschreibung des Patienten in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

Erstmanifestation – Erstmaliges Erkennbarwerden z.B. einer Erkrankung oder einer Erbanlage.

EZ – Eintrittszeitpunkt bzw. Halbjahr, in das der Programmeintritt fiel.

FD – siehe Folgedokumentation

Folgedokumentation – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

Fußstatus, auffälliger – Unter einem „auffälligen Fußstatus“ werden gefäß- (angiologische), nerven- (neurologische) und/oder knochen- bzw. gelenkbedingte (osteoarthropathische) Auffälligkeiten verstanden. Die Spätkomplikation diabetischer Fuß kann sich in Form schmerzloser Geschwüre (Ulzera) oder sogar Gewebstod (Nekrose, diabetische Gangrän) manifestieren. Liegt eine Polyneuropathie vor, so sind die Füße durch unbemerkte Verletzungen besonders gefährdet. Bereits kleine Verletzungen, bei der Fußpflege oder durch Druck der Schuhe zugezogen, können sich entzünden und damit den Fuß gefährden. Veränderungen können mittels der Klassifikation nach Wagner/Armstrong klassifiziert werden.

Fußsyndrom – Das diabetische Fußsyndrom oder umgangssprachlich auch der "diabetische Fuß" steht für einen Komplex von nervlich (neuropathischen) und/oder gefäßbedingten (angio-pathischen) Symptomen wie Infektionen, Geschwürbildungen (Ulzerationen) und/oder Destruktionen tiefen Gewebes (Knochen, Knorpel, Sehnen) der unteren Extremitäten als Folge eines Diabetes mellitus. Die Schädigungen werden u.a. anhand der Klassifikation nach Wagner klassifiziert.

Glomeruläre Filtrationsrate - Die über eine Million Nierenkörperchen oder Glomeruli sind die kleinsten Funktionseinheiten der Niere mit einer wichtigen Filterfunktion. Die Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) gibt das Gesamtvolumen des Primärharns an, das von allen Glomeruli beider Nieren gefiltert wird. Dies sind bei einem Menschen etwa 120 Milliliter pro Minute bzw. etwa 180 Liter pro Tag.

Glibenclamid – Arzneimittel zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus, das zur Gruppe der Sulfonylharnstoffe gehört. Glibenclamid fördert die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. B-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

Glukosidase – Die Kohlenhydratspaltung erfolgt durch eine Reihe von Enzymen (Glucosidasen) im Magen-Darm-Trakt. Diese Enzyme werden durch eine Gruppe von oralen Antidiabetika, sog. Glukosidase-Hemmer gehemmt, wodurch sich die Resorption von Kohlenhydraten verlangsamt und dadurch der Blutzuckeranstieg nach Nahrungsaufnahme (postprandial) geglättet wird.

Häusliche Krankenpflege – In der Wohnung der Patienten erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungspflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

Hemmer – siehe Inhibitoren

HbA1c – Ein Derivat aus der Gruppe des sog. Glykohämoglobins. In roten Blutkörperchen binden sich Zuckermoleküle (Glukose) an die Moleküle des Blutfarbstoffs (Hämoglobin). Der Anteil des HbA1c am Gesamthämoglobin bei Gesunden beträgt 4-6. Mit steigendem Blutzuckerspiegel steigt sein Anteil und bleibt bis zu acht Wochen lang erhöht, auch wenn der Blutzucker zeitweise wieder auf normale Werte absinkt. Die Bestimmung von HbA1c dient als Qualitätskontrolle der Blutzuckereinstellung (sog. Blutzuckergedächtnis).

Heilmittel – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen oder einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) und Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

Herzinfarkt – Der Herzinfarkt oder Myokardinfarkt ist eine akute und lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens. Es handelt sich dabei um Absterben oder Gewebsuntergang von Teilen des Herzmuskels auf Grund einer Minderversorgung des Gewebes mit Sauerstoff bedingt durch den Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße. Im Laufe der diabetesbedingten Gefäßschädigungen und gleichzeitiger Nervenschädigungen kann es zu sog. „stummen Infarkten“ ohne jegliche Schmerzsymptome kommen.

Hilfsmittel – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

Hypertoniker – Patienten mit dauerhaft erhöhten Blutdruckwerten.

Hypertonus (Hypertonie) – Bluthochdruck, Hochdruckkrankheit. Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

Inhibitoren – Es handelt sich um Substanzen, die chemische Reaktionen beeinflussen. Inhibitoren sind Zusatzstoffe, die Reaktionen verschiedenster Art zu verlangsamen oder zu verhindern suchen. Die gegenteilige Eigenschaft zeichnet einen Katalysator aus - dieser beschleunigt chemische Reaktionen.

Insulin – Blutzuckersenkendes Hormon, das in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gebildet wird. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Blutzuckers und der Therapie des Diabetes mellitus. Bei der Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus kommt v.a. dem Humaninsulin, das gentechnisch hergestellt wird, eine herausragende Bedeutung zu. Insuline werden zumeist in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme oder den Blutzuckermesswerten mittels (Selbst-)Injektion ins Unterhautfettgewebe (subkutan) oder halbautomatisch mittels Insulinpumpe verabreicht. Es stehen verschiedene Darreichungsformen mit langer und kurzer Wirkdauer zur Verfügung. Insulinanaloga sind Insuline mit veränderter Wirkungsweise (insbes. Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung im Organismus und damit auch der Wirkdauer aufgrund einer gentechnisch gegenüber dem Humaninsulin veränderten Aminosäurezusammensetzung).

Kohorte bzw. Halbjahreskohorte – Gesamtheit der Teilnehmer eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patienten, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

Kollektiv – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Konfidenzintervall – siehe CI

Koronare Herzkrankheit (KHK) – Die KHK ist die Manifestation einer Arteriosklerose an den Herzkranzgefäßen. Bei höhergradigen Einengungen resultiert ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot in der Herzmuskulatur. Die Koronare Herzkrankheit ist in den Industrieländern die häufigste Todesursache

Krankengeld – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstaufschlag ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

Lasertherapie – Bei der Laser-Therapie - auch Laser-Koagulation oder Photo-Koagulation genannt - werden gezielte Lichtstrahlen auf die geschädigte Netzhaut gerichtet, die diabetesbedingte Blutgefäß-Wucherungen zerstören. Dadurch wird auch die Bildung weiterer Gefäßveränderungen unterdrückt.

Makroangiopathie – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die großen Gefäße (Arterien) durch Arteriosklerose geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie koronare Herzkrankheit (KHK), Herzinfarkt, Schlaganfall und arterielle Verschlusskrankheit (AVK) auftreten können.

Mean – siehe arithmetisches Mittel

Median – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

Medizinische Datensätze – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 100 EA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 EN sowie für die Folgedokumentationen die SA 100 FA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 FN.

Metformin – Der einzige heute noch in Deutschland zugelassene Wirkstoff aus der Gruppe der Biguanide ist das Metformin. Diese Substanzklasse der oralen Antidiabetika, entsteht aus zwei Molekülen Guanidin unter Abspaltung von Ammoniak. Der blutzuckersenkende Effekt ist auf mehrere, zum Teil noch unklare, Mechanismen zurückzuführen. Es wird die körpereigene Glucoseproduktion (Gluconeogenese), die Glucosefreisetzung (Glykogenolyse) aus der Leber und auch die Aufnahme (Resorption) der Kohlenhydrate aus dem Darm gehemmt. Durch den letztgenannten Wirkmechanismus ist Metformin auch besonders gut für die Therapie übergewichtiger Diabetiker geeignet. Eine verbesserte Glucoseaufnahme in den Muskel führt zu einer Zunahme der Glykogenkonzentration und trägt dadurch ebenfalls zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei.

Mikroangiopathie – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die die kleinen und kleinsten Gefäße (Kapillaren) geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie Netzhautschädigung (Retinopathie) oder Nierenschädigung (Nephropathie) mit den Endstadien Erblindung und Nierenversagen auftreten können.

Monotherapie – Unter einer Monotherapie versteht man die Behandlung mit einem Medikament, das nur eine Wirksubstanz enthält. Eine Kombinationstherapie arbeitet dagegen mit Medikamenten mit zwei oder mehr Wirksubstanzen.

Nephropathie, diabetische – Eine durch Diabetes mellitus verursachte Veränderung der Nierengefäße, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Erstes Anzeichen für eine diabetische Nephropathie ist die Ausscheidung von kleinsten Eiweißmengen mit dem Urin (Mikroalbuminurie). Nimmt die Nierenfunktion weiter ab, können bestimmte Stoffwechselprodukte nicht mehr in ausreichendem Maße über die Niere ausgeschieden werden. Man spricht dann von einer Niereninsuffizienz, die in ihrem Endstadium eine Blutwäsche (Dialyse) notwendig macht.

Neuropathie (Polyneuropathie) – Nervenerkrankung, die zu den diabetischen Folgeerkrankungen zählt. Man unterscheidet zwischen der häufigeren peripheren Neuropathie und der selteneren autonomen Neuropathie. Die periphere Neuropathie (z.B. nervenbedingte Störungen des Temperatur- und Schmerzempfindens an den Extremitäten) tritt meist als Empfindungsstörung an beiden Füßen auf. Der Gefühlsverlust wird von einem Fehlen der Sehnenreflexe begleitet. Häufig ist auch eine motorische Störung festzustellen, die sich in einer Schwäche und Rückbildung der kleinen Fußmuskulatur zeigt. Dadurch kommt es zu Veränderungen des Fußes mit Fehlstellungen. Unangenehm ist die schmerzhaft Polyneuropathie, die sich vornehmlich in der Nacht mit einem Gefühl von Pelzigkeit, Spannung, Fußsohlenbrennen oder starkem Kribbeln äußert. Die autonome Polyneuropathie gehört ebenso zu den Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus und äußert sich in Funktionsstörungen der inneren Organe. Von den häufig unspezifischen Symptomen können alle Organsysteme betroffen sein, wie z.B. Magen-Darm-Trakt (Magenentleerungsstörungen, Übelkeit), Herz (Verringerung der Herzfrequenzvariabilität), Sexualorgane (erektile Dysfunktion), Blase (Entleerungsstörungen). An den Füßen kann es als Folge einer verminderten Schweißbildung zu erhöhter Austrocknungsgefahr der Fußhaut, starker Hornhautbildung und Rissen kommen. Außerdem gibt es vermehrt Veränderungen in der Haut (Pergamenthaut) und den Nägeln (eingerissene, brüchige Nägel).

Nierenersatztherapie – Verlieren als Folge des Diabetes die Nieren ihre Ausscheidungs- und Filterfunktion, muss mittels Blutwäsche (Dialyse) oder gar Nierentransplantation eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

Niereninsuffizienz – Sind die Nieren durch eine Erkrankung derart geschädigt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die bei normaler Ernährung anfallenden Stoffwechselprodukte vollständig auszuschleiden bzw. ihre Filterfunktion auszuüben, so spricht man von Nierenversagen oder Niereninsuffizienz. Im Endstadium der terminalen Niereninsuffizienz muss eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

OAD – Unter dem Begriff orale Antidiabetika werden Tabletten aus verschiedenen Substanzklassen zusammengefasst. Dazu zählen Glucosidase-Hemmer, Biguanide, Sulfonylharnstoffe bzw. deren Derivate und Repaglinide. In der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 sind sowohl Kombinationen zwischen oralen Antidiabetika untereinander als auch zwischen dem nicht oral applizierbaren Insulin und oralen Antidiabetika möglich. Die Therapie ist in jedem Fall an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anzupassen.

OD-Daten – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmer verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmer vor. Diese Daten werden als Satzart 100 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patient und Jahr vor.

ophthalmologische Netzhautuntersuchung – Vom Augenarzt zur frühzeitigen Erkennung und Therapie von Mikroangiopathien (Erweiterungen, Neubildungen, Blutungen etc.) der Netzhaut (Retina) durchgeführte Untersuchung des Augenhintergrunds.

orale Antidiabetika – siehe OAD

Osteoarthropathie – Das Absterben von Knochengewebe (Knochennekrosen) kann bei Diabetes-Patienten z.B. im Vor- und Rückfuß zu schmerzlosen Destruktionen, Statikverlust und Geschwürbildungen (Ulzerationen) mit nachfolgenden schwerwiegenden Infektverläufen und Schädigung der Gewölbefunktion des Fußes führen.

periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) – Durch verengende (stenosierende) bzw. verschließende (obliterierende) Veränderungen an Arterien verursachte Erkrankung, die zu Störungen der arteriellen Durchblutung an den Extremitäten durch Einengung der Gefäßlichtung führt. Verschlüsse peripherer Arterien sind oft multipel und langstreckig und betreffen zumeist Arterien der unteren Extremität (Beine). Beschwerden an den Beinen, die zum Stehenbleiben zwingen, werden als Schaufensterkrankheit bezeichnet.

PM-Daten – Patientenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientenmerkmale wie Geschlecht und Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

Programtteilnehmer – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

Restkohorte – Gesamtheit der Patienten einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programtteilnehmer sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

Retinopathie – Die diabetische Retinopathie ist eine durch Diabetes mellitus hervorgerufene Erkrankung der Netzhaut des Auges. Die Schädigung kleiner Blutgefäße (Mikroangiopathie) verursacht eine Minderung der Sehschärfe sowie Einschränkung des Gesichtsfelds und kann im Verlauf zur Erblindung führen. Eine schlechte Diätführung bzw. Blutzuckereinstellung begünstigt die Entstehung des Krankheitsbilds. 30% aller Erblindungen in Europa sind auf die diabetische Retinopathie zurückzuführen

Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV) – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidität) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

Schlaganfall – Als Schlaganfall (medizinisch auch Apoplex oder Insult), wird eine plötzlich oder innerhalb kurzer Zeit auftretende Erkrankung des Gehirns bezeichnet, die zu einem anhaltenden Ausfall von Funktionen des Zentralen Nervensystems führt und durch kritische Störungen der Blutversorgung des Gehirns (Gefäßverschluss oder Einblutung) verursacht wird.

Serum-Kreatinin – Kreatinin ist ein Produkt des Muskelstoffwechsels. Ein Anstieg seiner Konzentration im Blut (Serum-Kreatinin) kann ein Hinweis auf eine Nierenschädigung (Nephropathie) sein.

Subkohorte – Untergruppe der Patienten einer Kohorte. Alle Patienten werden zum Zeitpunkt der Erstdokumentation nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen in drei Subkohorten unterteilt. Diese Einteilung bleibt über den gesamten Berichtszeitraum bestehen, auch wenn sich der Schweregrad der Begleit- oder Folgeerkrankungen im Zeitverlauf ändert.

subkutan – bedeutet "unter der Haut" oder "unter die Haut verabreicht". Die subkutane Verabreichung von Medikamenten ist einfach zu handhaben. Dadurch eignet sich dieses Verfahren gut, um vom Patienten selbst angewandt zu werden.

Sulfonylharnstoffe – Arzneimittelgruppe zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus (z.B. Glibenclamid) Sie fördern die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. Beta-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

systolischer Blutdruck – Der sich während des Zusammenziehens bzw. der Kontraktion der Herzkammer (Systole) ergebende höchste Punkt der Blutdruckkurve (auch als oberer Blutdruckwert bezeichnet).

Statin ist im allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch ein Arzneistoff, der der pharmakologischen Substanzklasse der 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase-(HMG-CoA-Reduktase-)Inhibitoren angehört. Da HMG-CoA ein Zwischenprodukt der menschlichen Cholesterinsynthese ist, werden Statine bislang hauptsächlich bei Fettstoffwechselstörungen als Cholesterinsenker eingesetzt

Thrombozyten-Aggregationshemmer – Diese Arzneimittel, wie z.B. Acetylsalicylsäure, verhindern das Zusammenkleben von Blutplättchen (Thrombozyten) und senken dadurch die Blutgerinnungsneigung, wodurch in den Blutgefäßen seltener Blutgerinnsel (Thrombosen) entstehen.

Urin-Albumin – Albumin ist das häufigste Eiweiß im Blutplasma. Während die Filterfunktion gesunder Nieren nur geringe Albuminmengen im Primärharn zulässt, die außerdem fast vollständig rückgewonnen (resorbiert) werden, erhöht sich bei zunehmender Nierenfunktionsstörung die Menge von Albumin im Primärharn. Dieses Albumin wird bei Überschreitung der Rückresorptionskapazität zunächst in geringen Mengen (Mikroalbuminurie), dann auch in größeren Mengen (Makroalbuminurie, Eiweissverlustniere) mit dem Urin/Harn ausgeschieden.

Wagner-Stadien – Zur klinischen Einteilung des Schweregrads des diabetischen Fußsyndroms hat sich die Einteilung nach Wagner in 5 Stadien bewährt (Stadium 0: Risikofuß ohne Läsion [ggf. Fußdeformation], 1: oberflächliches Geschwür (Ulcus) [mit potentieller Infektion oder mit Infektion nur im Wundbereich], 2: tiefes, gelenknah infiziertes Ulcus, 3: penetrierende Infektion mit Knochenbeteiligung, Knochenmarksentzündung (Osteomyelitis) oder Abszess, 4: Begrenzte Vorfuß- oder Fersennekrose, 5: Nekrose (Zelltod) des Fußes.