

# AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2 der AOK Hessen - Die Gesundheitskasse

**Berichtstyp:** Evaluationsbericht

**Auswertungshalbjahre:** 2003-1 bis 2012-1

**Abgabedatum:** 30. September 2013

**Evaluatoren:**

**infas**

infas Institut für angewandte  
Sozialwissenschaft GmbH  
Friedrich-Wilhelm-Str. 18  
53113 Bonn

**prognos**

Prognos AG  
Schwanenmarkt 21  
40231 Düsseldorf

**WIAD**  
Wissenschaftliches Institut der  
Ärzte Deutschlands gem. e.V.

Wissenschaftliches Institut der Ärzte  
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.  
Uhierstr. 78  
53175 Bonn

<b>Zusammenfassung</b> .....	<b>7</b>
<b>0. Einleitung</b> .....	<b>9</b>
Tabelle 0.1    Inhalte des Evaluationsberichtes .....	10
<b>0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten</b> .....	<b>13</b>
Tabelle 0.1.1    Tabellenstandard .....	14
Tabelle 0.1.2    Plausible Wertebereiche .....	16
<b>0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung</b> .....	<b>17</b>
Tabelle 0.2.1    Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration .....	18
<b>0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Subkohorten und Kollektive</b> .....	<b>19</b>
<b>Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte</b> .....	<b>20</b>
<b>Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale</b> .....	<b>20</b>
Tabelle 1.1    Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung .....	20
Tabelle 1.2    Patientenzahlen zur Stichprobenziehung .....	22
Tabelle 1.3    Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) .....	23
Tabelle 1.4    Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres .....	28
Tabelle 1.5    Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres .....	30
Tabelle 1.6    Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten .....	33
Tabelle 1.7    Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte .....	34
Tabelle 1.8    Patienten ohne medizinische Dokumentation .....	36
<b>Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer</b> .....	<b>38</b>
Tabelle 2.1    Leistungserbringer* .....	39
<b>Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung</b> .....	<b>40</b>
3.1 Risikofaktoren .....	41
Tabelle 3.1.1    Patienten und ihr Body-Mass-Index .....	42
Tabelle 3.1.2    Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation .....	52
Tabelle 3.1.3    Raucherquote bei allen Patienten .....	55
Tabelle 3.1.4    Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation .....	58
Tabelle 3.1.5    Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation .....	73
Tabelle 3.1.6    Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation .....	76
3.2 Laborwerte .....	79
Tabelle 3.2.1    Patienten und ihre HbA1c-Konzentration .....	80
Tabelle 3.2.2    Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen .....	84
Tabelle 3.2.3    Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte .....	91
3.3 Medikation .....	96
Tabelle 3.3.1    Patienten und ihre Medikation .....	97
3.4 Prozessparameter .....	116
Tabelle 3.4.1    Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen .....	117
Tabelle 3.4.2    Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen .....	123
Tabelle 3.4.3    Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung .....	129
3.5 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten .....	131
Tabelle 3.5.1    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation .....	132
Tabelle 3.5.2    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation .....	135
Tabelle 3.5.3    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation .....	140
Tabelle 3.5.4    Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation .....	147
Tabelle 3.5.5    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation .....	151
Tabelle 3.5.6    Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation .....	154
Tabelle 3.5.7    Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie .....	

	laut Erstdokumentation .....	157
Tabelle 3.5.8	Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation. ....	161
Tabelle 3.5.9	Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation .....	165
Tabelle 3.5.10	Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation .....	169
<b>Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte .....</b>		<b>172</b>
<b>Auswertungskapitel 4: Patientenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben .....</b>		<b>173</b>
Tabelle 4.1	Patienten in der Stichprobe (Anzahl) .....	173
<b>Auswertungskapitel 5: Leistungsausgaben .....</b>		<b>175</b>
Tabelle 5.1	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe) .....	175
Tabelle 5.2	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe) .....	178
Tabelle 5.3	Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Halbjahr .....	181
Tabelle 5.4	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe) .....	183
Tabelle 5.5	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe) .....	186
Tabelle 5.6	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe) .....	189
Tabelle 5.7	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe) .....	192
Tabelle 5.8	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe) .....	195
Tabelle 5.9	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe) .....	198
Tabelle 5.10	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe) .....	201
Tabelle 5.11	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe) .....	205
<b>Auswertungskapitel 6: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung .....</b>		<b>208</b>
Tabelle 6.1	Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmer und Jahr und Versichertenjahre .....	208
<b>Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität .....</b>		<b>209</b>
Abb. III.1	Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex .....	210
<b>Auswertungskapitel 7: Rücklaufstatistik .....</b>		<b>211</b>
Tabelle 7.1	Patienten in der Stichprobe (Anzahl) .....	211
<b>Auswertungskapitel 8: Auswertungen zur Lebensqualität .....</b>		<b>213</b>
Tabelle 8.1	Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	213
Tabelle 8.2	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	216
Tabelle 8.3	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	220
Tabelle 8.4	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	224
Tabelle 8.5	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	228
Tabelle 8.6	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	232
Tabelle 8.7	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	236
Tabelle 8.8	SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	240
Tabelle 8.9	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	244
Tabelle 8.10	Körperliche Summenskala .....	248
Tabelle 8.11	Psychische Summenskala .....	252
Tabelle 8.12	SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse .....	256
<b>Anhang A: Auswertung für Patienten ohne Endpunkte .....</b>		<b>261</b>
<b>Auswertungskapitel A.1: Patientenzahlen und -merkmale .....</b>		<b>262</b>
Tabelle A.1.1	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte .....	262
Tabelle A.1.3	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte .....	264
Tabelle A.1.4	Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte .....	269
Tabelle A.1.5	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte .....	271
Tabelle A.1.8	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte .....	274

<b>Auswertungskapitel A.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung</b> .....	<b>276</b>
A.3.1 Risikofaktoren .....	277
Tabelle A.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte .....	278
Tabelle A.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte .....	281
Tabelle A.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte .....	284
Tabelle A.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte .....	300
Tabelle A.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte .....	303
A.3.2 Laborwerte .....	306
Tabelle A.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte .....	307
Tabelle A.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte .....	311
<b>Anhang B: Auswertung für Patienten mit primären Endpunkten</b> .....	<b>318</b>
<b>Auswertungskapitel B.1: Patientenzahlen und -merkmale</b> .....	<b>319</b>
Tabelle B.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	319
Tabelle B.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten .....	321
Tabelle B.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	326
Tabelle B.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	328
Tabelle B.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	331
<b>Auswertungskapitel B.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung</b> .....	<b>333</b>
B.3.1 Risikofaktoren .....	334
Tabelle B.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	335
Tabelle B.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	338
Tabelle B.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	341
Tabelle B.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	356
Tabelle B.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	359
B.3.2 Laborwerte .....	362
Tabelle B.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	363
Tabelle B.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten .....	367
<b>Anhang C: Auswertung für Patienten nur mit sekundären Endpunkten</b> .....	<b>374</b>
<b>Auswertungskapitel C.1: Patientenzahlen und -merkmale</b> .....	<b>375</b>
Tabelle C.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	375
Tabelle C.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	377
Tabelle C.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	382
Tabelle C.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	384
Tabelle C.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	387
<b>Auswertungskapitel C.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung</b> .....	<b>389</b>
C.3.1 Risikofaktoren .....	390
Tabelle C.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	391
Tabelle C.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	394
Tabelle C.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	397
Tabelle C.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	416
Tabelle C.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	419
C.3.2 Laborwerte .....	422
Tabelle C.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	423
Tabelle C.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten .....	427

<b>Anhang D: Risikoadjustierter Berichtsteil</b>	<b>435</b>
Tabelle D.1 Übersicht über die Zielwerte, Kollektivabgrenzung und die zugehörigen Gesamtmittelwerte	436
<b>D.3 Krankheitsverlauf nach Einschreibung</b>	<b>437</b>
D.3.1 Risikofaktoren	438
Tabelle D.3.1.1 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	438
Tabelle D.3.1.2 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	438
Tabelle D.3.1.3 Risikofaktoren: Rauchen 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	439
Tabelle D.3.1.4 Risikofaktoren: Rauchen 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	439
Tabelle D.3.1.5 Risikofaktoren: Hypertonie - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	439
D.3.2 Laborwerte	440
Tabelle D.3.2.1 Laborwerte: HbA1c 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	440
Tabelle D.3.2.2 Laborwerte: HbA1c 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	440
Tabelle D.3.2.3 Laborwerte: Serum-Kreatinin - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	440
D.3.4 Prozessparameter: Durchgeführte Schulungen und Untersuchungen	441
Tabelle D.3.4.1 Prozessparameter: Diabeteschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	441
Tabelle D.3.4.2 Prozessparameter: Diabeteschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	441
Tabelle D.3.4.3 Prozessparameter: Hypertonieschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	441
Tabelle D.3.4.4 Prozessparameter: Hypertonieschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	441
Tabelle D.3.4.5 Prozessparameter: Ophthalmologische Netzhautuntersuchung - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	442
D.3.5 Begleit- und Folgeerkrankungen	443
Tabelle D.3.5.1 Begleit- und Folgeerkrankungen: Herzinfarkt - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	443
Tabelle D.3.5.2 Begleit- und Folgeerkrankungen: Schlaganfall - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	443
Tabelle D.3.5.3 Begleit- und Folgeerkrankungen: Erheblich auffälliger Fußstatus- Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	443
Tabelle D.3.5.4 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Nephropathie - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	443
Tabelle D.3.5.5 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Retinopathie - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	443
D.3.6 Therapien	444
Tabelle D.3.6.1 Therapien: Nierenersatztherapie - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	444
D.3.7 Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier	445
Tabelle D.3.7.1 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=4, Tod t=5): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	445
Tabelle D.3.7.2 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=5, Tod t=6): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	445
Tabelle D.3.7.3 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=6, Tod t=7): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	445
Tabelle D.3.7.4 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=7, Tod t=8): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	446
Tabelle D.3.7.5 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=8, Tod t=9): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	446
Tabelle D.3.7.6 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=9, Tod t=10): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	446
Tabelle D.3.7.7 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=10, Tod t=11): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	446
Tabelle D.3.7.8 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=11, Tod t=12): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	447
Tabelle D.3.7.9 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=12, Tod t=13): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	447
Tabelle D.3.7.10 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=13, Tod t=14): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	447
Tabelle D.3.7.11 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=14, Tod t=15): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	447
D.3.8 Endpunktfreiheit	448
Tabelle D.3.8.1 Endpunktfreiheit	448
<b>D.5 Leistungsausgaben</b>	<b>449</b>
Tabelle D.5.1 Leistungsausgaben: Ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	449
Tabelle D.5.2 Leistungsausgaben: Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	449
Tabelle D.5.3 Leistungsausgaben: Arzneimittel - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	449
Tabelle D.5.4 Leistungsausgaben: Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	449
Tabelle D.5.5 Leistungsausgaben: Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	450
Tabelle D.5.6 Leistungsausgaben: Insgesamt - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	450

<b>Anhang E: Methodik und Datengrundlage</b> .....	<b>451</b>
<b>E.1 Datengrundlage</b> .....	<b>451</b>
Abb. E.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP DM2 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP .....	452
<b>E.2 Qualitätssicherung</b> .....	<b>454</b>
<b>E.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen</b> .....	<b>455</b>
Tabelle E.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr .....	456
<b>E.4 Modellbildung für die Risikoadjustierung</b> .....	<b>457</b>
Tabelle E.4.1 Medizinische Zielwerte .....	458
Tabelle E.4.2 Ökonomische Zielwerte .....	458
Tabelle E.4.3 Gemessene Ereigniszeiten und Zahl der Bindungen bei primären Endpunkten, sekundären Endpunkten und Tod .....	459
Tabelle E.4.4 Übersicht über den gemeinsamen Kovariatenatz für die Modellierung .....	462
<b>Anhang F: Glossar</b> .....	<b>465</b>

## Zusammenfassung

### Ausgeschiedene Patienten/-innen

Patienten/-innen können im Zeitverlauf aus dem Programm ausscheiden. Gründe für das Ausscheiden sind: Beendigung durch den Patienten/die Patientin, Ausschluss des Patienten/der Patientin durch die Krankenkasse auf Grund der Nichterfüllung vorgegebener Kriterien oder Tod des Patienten/der Patientin.

Im zweiten Teil der Tabelle werden die wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen für die ausgewählten sieben medizinischen Indikatoren (Body-Mass-Index, Raucheranteil, diastolische und systolische Blutdruckwerte, HbA1c-Laborwerte, Patienten/-innen mit spezifischer Medikation, Diabetes-Schulungen und Auftreten von Folgeschäden/Endpunkten) zusammenfassend dargestellt.

### Body-Mass-Index (BMI)

.Der BMI ist eine Maßzahl zur Bewertung des Körpergewichts, in die auch die Körpergröße mit einbezogen wird.

Er wird berechnet aus dem Körpergewicht in kg und der Körpergröße in m im Quadrat ( $BMI = \frac{kg}{m^2}$ ). BMI-Werte unter  $25 \frac{kg}{m^2}$  sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen  $25$  und  $30 \frac{kg}{m^2}$  als leicht übergewichtig und BMI-Werte über  $30 \frac{kg}{m^2}$  als übergewichtig (adipös) anzusehen.

### Raucheranteil

Zigarettenrauch hat zahlreiche negative Einflüsse auf den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System, die die diabetesbedingten Folgeerkrankungen teilweise potenzieren können. In DMP sind Veränderungen im Rauchverhalten der Patienten/-innen, die letztlich zur Reduktion des Raucheranteils im Patientenkollektiv führen, daher bedeutende Therapieziele.

### Blutdruck (systolisch/diastolisch)

Ein erhöhter Blutdruck (Hypertonus) hat ebenfalls zahlreiche negative Einflüsse auf das Herz-Kreislauf-System, die die diabetesbedingten Folgeerkrankungen an den Gefäßen potenzieren können. Eine (medikamentöse) Einstellung der erhöhten Blutdruckwerte in den Normalbereich ist daher ein wichtiges Therapieziel in DMP. Die Entwicklung des mittleren diastolischen sowie des mittleren systolischen Blutdruckwertes ist für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert, d.h. für diejenigen Diabetes-Patienten/-innen, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden. Dazu zählen ausschließlich Patienten/-innen für welche die Hypertonie über den entsprechenden Anamnesebefund dokumentiert ist. Die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation gemessenen Blutdruckwerte werden nicht berücksichtigt.

Dem unteren Druckwert der Blutdruckkurve, dem so genannten diastolischen Wert, kommt eine besondere diagnostische Bedeutung zu, da er permanent auf den Gefäßwänden lastet. Der obere Druckwert der Blutdruckkurve, der so genannte systolische Wert, lastet hingegen nur kurzzeitig auf den Gefäßwänden.

### Laborwert HbA1c

.Langfristig erhöhte Blutzuckerwerte führen zu einem Einbau von Zuckerresten in den Blutfarbstoff Hämoglobin (Hb). Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. Bei Stoffwechsellgesunden liegt der Anteil unter 6,5%.

### Antidiabetische Medikation

Neben Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung sowie ausreichender Bewegung - wodurch ein Teil der Patienten/-innen potenziell keine Arzneimitteltherapie mehr benötigt - besteht die Therapie des Diabetes mellitus in der Anwendung von Blutzuckerspiegel-senkenden Arzneimitteln. In der tabellarischen Ergebnisdarstellung des Berichts sind die Anteile der mit speziellen Arzneimittelgruppen (Insulin, Metformin, etc.) behandelten Patienten/-innen detailliert aufgeführt. An dieser Stelle wird lediglich die Gesamtheit der Patienten/-innen mit antidiabetischer Medikation betrachtet.

### Diabetes-Schulungen

Da bei der Erkrankung Diabetes sowohl eine Reihe von Verhaltensänderungen (Ernährung, Gewichtseinstellung, Bewegung, Tabakkonsum) als auch Therapietreue und Selbstmanagement der Patienten/-innen sich positiv auf den Arzneimittelbedarf und das Risiko diabetesbedingter Folgeerkrankungen (Mikro- und Makroangiopathie und Neuropathie) auswirken, sind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, aber auch im weiteren Verlauf der Erkrankung, Schulungsmaßnahmen unverzichtbar.

Zu beachten ist, dass die durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung bedingte Modifizierung der Dokumentationsbögen an dieser Stelle die Vergleichbarkeit einschränkt.

### Folgeschäden/Endpunkte

Das wichtigste Ziel in der Behandlung eines Diabetes besteht in der Verhinderung bzw. Verzögerung des Auftretens von diabetesbedingten Folgeerkrankungen. Ergebnisse hierzu sind jedoch erst mittel- bis langfristig zu erwarten. Der Berichtsteil enthält eine detaillierte Übersicht über das Auftreten einzelner Folgeerkrankungen (z.B. an Gefäßen, Nerven, Niere und Netzhaut). An dieser Stelle wird für die Gesamtheit der Patienten/-innen mit Folgeerkrankungen nur nach primären und sekundären Endpunkten unterschieden. Als primäre, d.h. gravierende Endpunkte gelten Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation und Blindheit. Sekundäre, d.h. weniger gravierende Endpunkte sind diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, ein auffälliger Fußstatus, periphere arterielle Verschlusskrankheit und diabetische Retinopathie.

**Tabellarische Zusammenfassung**

Im ersten Teil der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie viele Patienten/-innen in das Programm starteten, wie viele von Ihnen im Auswertungszeitraum ausschieden und welche Altersstruktur die Programmteilnehmer/-innen aufweisen. Sollten in der tabellarischen Zusammenfassung einzelne Zellen nicht befüllt sein, liegt der Grund in zu geringen Patientenzahlen, aufgrund derer die jeweilige Auswertung nicht durchgeführt werden konnte.

Disease-Management-Programm AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2 der AOK Hessen - Die Gesundheitskasse							
Variablen			Messzeitpunkt			Tabellen-Nr. im Bericht	
Allgemeine Programm- und Patientendaten	Programmlaufzeit	Starthalbjahr			2003-1	1.1	
		letztes Berichtshalbjahr			2012-1	1.1	
		Gesamtlaufzeit bis letztes Berichtshalbjahr (in Jahren)			9.5	1.1	
	Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl im letzten Berichtshalbjahr				94947	1.1.
		insgesamt seit dem Start eingeschriebene Patientinnen und Patienten				182900	1.1.
		Anteil Männer (in%)				48.9	1.1
		Anteil Frauen (in%)				51.1	1.1
		Anteil der ausgeschiedenen Patientinnen und Patienten				51.4	1.3
Mittleres Alter der Patientinnen und Patienten (gewichtet, in Jahren)		Beitritts- halbjahr			64.5	1.4	
Medizinische Inhalte	Body Mass Index	durchschnittlicher BMI der erwachsenen Patientinnen und Patienten (in kg/m <sup>2</sup> )	Beitritts- halbjahr	Max:	31.2	3.1.1	
			zehntes Folge- halbjahr*	Max:	30.7		
	Raucheranteil	Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Gruppe der Raucherinnen und Raucher (laut Erstdokumentation) (in%)	zehntes Folge- halbjahr*	Max:	61.7	3.1.2	
	Blutdruck	Mittlerer systolischer Blutdruck im Kollektiv der Hypertoniker (gewichtet, in mmHg)	zehntes Folge- halbjahr*		137.3	3.1.5	
		Mittlerer diastolischer Blutdruck im Kollektiv der Hypertoniker (gewichtet, in mmHg)	zehntes Folge- halbjahr*		78.8	3.1.6	
	Laborwert HbA1c	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	Max:	7.5	3.2.1	
			zehntes Folge- halbjahr*	Max:	7.9		
	Medikation	Anteil der Patientinnen und Patienten, die mit diabetesspezifischer Medikation behandelt werden	Beitritts- halbjahr	Max:	92.9	3.3.1	
			zehntes Folge- halbjahr*	Max:	100.0		
	Patientenschulungen	Anteil der Patientinnen und Patienten, die an einer Diabetesschulung teilgenommen haben, an denjenigen, denen eine Schulung empfohlen worden ist	zehntes Folge- halbjahr*	Max:	44.5	3.4.1	
		Anteil der Patientinnen und Patienten, die an einer Hypertonieschulung teilgenommen haben, an denjenigen, denen eine Schulung empfohlen worden ist	zehntes Folge- halbjahr*	Max:	21.9	3.4.2	
	Begleit- und Folgeerkrankungen: primäre und sekundäre Endpunkte	Anteil der Patientinnen und Patienten mit primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation	alle Kohorten, alle Halbjahre**	Max:	4.0	3.5.8	
Anteil der Patientinnen und Patienten mit primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation		alle Kohorten, alle Halbjahre**	Max:	19.2	3.5.10		

\* gilt nur für Kohorten mit zehn oder mehr Folgehalbjahren

\*\* mit Ausnahme des Beitritts-  
halbjahres



## 0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patienten wird über den gesamten Verlauf einer chronischen Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patienten sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es, zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen, sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patienten durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrunde liegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 2 sind sämtliche DMP zum 30.09.2009 zu evaluieren. Anschließend erfolgt alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 30.09.2011, zum 30.09.2013, etc.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welchen Inhalt der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Die in den Evaluationskriterien vorgesehenen geschlechtsspezifischen Zusatzauswertungen sind darin nicht enthalten. Sie werden in einem gesonderten Genderbericht ausgewiesen, für den bundesweite und kassenarten übergreifende (AOK, Knappschaft) Auswertungen vorgenommen werden.

**Tabelle 0.1**     **Inhalte des Evaluationsberichtes**

Auswertungskapitel	Inhalte
<b>Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte</b>	
1. Patientenzahlen und -merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung</li> <li>- Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)</li> <li>- Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres</li> <li>- Alter - Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres</li> <li>- Patienten und ihre Beobachtungszeit</li> <li>- Patienten ohne medizinische Dokumentation</li> </ul>
2. Leistungserbringer	Ärzte und stationäre Einrichtungen
3. Krankheitsverlauf nach Einschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewichtsentwicklung (BMI)</li> <li>- Raucherstatus</li> <li>- Hypertonus</li> <li>- HbA1c-Werte</li> <li>- Serum-Kreatinin-Werte</li> <li>- Medikation</li> <li>- Wahrnehmung von Schulungen</li> <li>- Augenärztliche Untersuchung</li> </ul> <p>Ereigniszeitanalysen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erblindung</li> <li>- Nephropathie</li> <li>- erheblich auffälliger Fußstatus</li> <li>- Amputation</li> <li>- Herzinfarkt</li> <li>- Schlaganfall</li> <li>- Nierenersatztherapie</li> <li>- primäre und sekundäre Endpunkte</li> </ul>
<b>Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte</b>	
4. Patientenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenzahlen</li> <li>- Ausscheiden aus dem Programm</li> </ul>
5. Leistungsausgaben (Stichprobe)	<p>Leistungsausgaben für die nachfolgenden Bereiche insgesamt und einzeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ambulante ärztliche Behandlung</li> <li>- Krankenhausbehandlung</li> <li>- Arzneimittel</li> <li>- Heilmittel</li> <li>- Hilfsmittel</li> <li>- Anschlussrehabilitation</li> <li>- Häusliche Krankenpflege</li> <li>- Krankengeld für Patienten mit Krankengeldanspruch</li> <li>- Dialyse-Sachkosten</li> <li>- Leistungsausgaben der Patienten insgesamt</li> </ul> <p>Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt                      Patienten mit Krankengeldanspruch und Krankengeldbezug: Patienten mit Krankengeldbezug</p>
6. Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung	Durchschnittliche Kosten pro Patientenjahr

Auswertungskapitel	Inhalte
<b>Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität*</b>	
7. Patientenzahlen der Stichprobe für den SF36	Patientenzahlen und Rücklaufquote
8. Veränderung der subjektiven Lebensqualität (Stichprobe)	Gesundheitszustand im Vergleich zum Vorjahr - Körperliche Funktionsfähigkeit - Körperliche Rollenfunktion - Körperliche Schmerzen - Allgemeine Gesundheitswahrnehmung - Vitalität - Soziale Funktionsfähigkeit - Emotionale Rollenfunktion - Psychisches Wohlbefinden - Körperliche Summenskala - Psychische Summenskala - SF-6D-Gesamtindex
<b>Anhang A: Auswertung für Patienten ohne Endpunkte</b>	
<b>Anhang B: Auswertung für Patienten mit primären Endpunkten</b>	
<b>Anhang C: Auswertung für Patienten mit sekundären Endpunkten</b>	
<b>Anhang D: Risikoadjustierte Auswertungsergebnisse</b>	
<b>Anhang E: Methodik und Datengrundlage</b>	
<b>Anhang F: Glossar</b>	

\*Die Lebensqualitätsbefragung wird vom BVA erstmalig ab der 2. Halbjahreskohorte 2006 gefordert

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme in der Version 5.4 vom 04. Dezember 2012 veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbeurteilung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Evaluationsberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen. Um eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf die Patientenpopulation herzustellen, erfolgt dazu eine risikoadjustierte Schätzung der interessierenden Parameter.

Der vorliegende Bericht evaluiert das Disease-Management-Programm „AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2“ der AOK zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 in der Antragsregion Hessen. Die Akkreditierung für das Programm wurde am 02.06.2003, also im Halbjahr 2003-1 erteilt. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmer des Programms vom Zeitpunkt Ihres Beitritts bis einschließlich des Halbjahres 2012-1 beobachtet. Am AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2 nehmen die Versicherten der AOK Hessen und gegebenenfalls länderübergreifend betreute AOK-Versicherte anderer Regionen teil.

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.<sup>1</sup> Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs der Knappschaft teil.<sup>2</sup> Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden DM2-Berichten Daten aus eDMP enthalten sind. Ab dem Halbjahr 2008-2 kann daher - je nach Auswertungsinhalt - die Vergleichbarkeit der Auswertungsinhalte eingeschränkt sein. Zum einen werden seit eDMP einige Parameter auf geänderte Art und Weise erfasst. Zum anderen besteht - je nach Praxissoftware - seit eDMP die Möglichkeit, auf ergänzende Patienteninformationen zuzugreifen, so dass ggf. ein bisher möglicherweise unterrepräsentierter Parameter korrigiert dargestellt wird.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

Zur Vereinfachung wird im folgenden von „Patienten“, „Teilnehmern“ und „Personen“ usw. gesprochen. Damit sind jedoch stets männliche und weibliche Personen gemeint.

<sup>1</sup> Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

<sup>2</sup> Eine Ausnahme bilden die DMPs zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 und 2 in der Antragsregion Mecklenburg-Vorpommern. In diesen beiden Fällen hatte die Knappschaft bis zum Fusionszeitpunkt keine eigenen Programme angeboten.

### 0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patienten in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patienten mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patienten und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patienten halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2003-1“, Kohorte „2003-2“, „Kohorte 2004-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt des einzelnen Teilnehmers in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1. verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2003-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc.. Zu beachten ist dabei, dass die Spaltenüberschriften sich auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patienten beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche Kalenderhalbjahre.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

Eintrittszeitpunkt	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	20. Halbjahr
2003-1	Wert für 2003-1	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...
2003-2	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...	
2004-1	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...		
2004-2	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...			
2005-1	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...				
2005-2	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...					
2006-1	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...						
2006-2	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...							
2007-1	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...								
2007-2	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...									
2008-1	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...										
2008-2	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...											
2009-1	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...												
2009-2	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...													
2010-1	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...														
2010-2	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...															
2011-1	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...																
2011-2	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...																	
2012-1	Wert für 2012-1	...																		
...	...																			

Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patienten zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte der Patient zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2004 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2004-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2004 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2004-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patienten keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patienten bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet.

Ab dem zweiten Halbjahr ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patienten aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen zu einem Ausschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patienten, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patienten in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patienten.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patienten der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“ (vgl. Tabelle 0.1.2.).

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind.

Zu beachten ist weiterhin, dass im Sommer 2010 in Abstimmung mit dem BVA erstmals Regelungen getroffen wurden, die festlegen welcher Wert beim Vorliegen mehrerer Erstdokumentationen pro Halbjahr zu verwenden ist. Zudem wurden auf Basis aktualisierter BVA-Vorgaben seit Herbst 2013 – also erstmalig im vorliegenden Bericht – Anpassungen bei der Aufbereitung der Patientendaten vorgenommen (siehe Kapitel E.3 bzw. E.2).

**Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche**

Parameter	definierter medizinischer Bereich*
Größe (m)	1,20 bis 2,50
Gewicht (kg)	40,00 bis 300,00
RR systolisch (mmHg)	50 bis 300
RR diastolisch (mmHg)	10 bis 200
HbA1c-Werte (%)	2 bis 40
Serum-Kreatinin-Werte (µmol/l)	20 bis 999

\* Basis: Expertenmeinungen nach Kenntnisstand September 2006. Wertebereiche sind vom BVA als Evaluationsgrundlage abgenommen und werden aufgrund der jeweils aktuellen Evaluationsergebnisse regelmäßig aktualisiert (mindestens einmal jährlich).

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind. Diejenigen Patienten, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare**“ Patienten bezeichnet und in der Regel in den Tabellen gesondert ausgewiesen.<sup>3</sup> Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patienten zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

<sup>3</sup>Die „nicht auswertbaren“ Patienten ergeben sich als Differenz zwischen den „Patienten insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patienten.



## 0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der Entwicklung der **HbA1c-Konzentration** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2.1). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, ist in diesem Bericht jede Tabelle mit einem entsprechenden Erläuterungstext und Lesebeispiel versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patienten in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 eine Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ **Tabelle zur Entwicklung der HbA1c-Konzentration** mit der zweiten Spalte. Für jede Kohorte werden dort zunächst Angaben zu den Patienten gemacht. Zuerst wird unter „Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch als Programmteilnehmer definiert werden. Die „auswertbaren“ Patienten, also diejenigen, für die im betrachteten Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorlagen, bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der mittleren patientenbezogenen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus beiden Halbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtsjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Das Konfidenzintervall wird ausgewiesen, indem die untere und obere Grenze durch ein Semikolon getrennt in eckigen Klammern dargestellt werden.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr 14 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 14 Patienten lagen auswertbare Angaben vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,49 %; der Median lag bei 7,05 %. Im letz-

ten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - - %; der Median lag bei - - %, der dafür auswertbaren Patienten.

**Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration**

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
Kohorte	Patienten insgesamt	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,49	7,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[6,40; 8,57]	[5,29; 9,01]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	7,05	7,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Fallbasis mittlere Differenz		2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Mittlere Differenz zur ED		-0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI mittlere Differenz		[-0,35; -0,15]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Median mittlere Differenz		-0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

### 0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Subkohorten und Kollektive

Bei der tabellarischen Darstellung wird nicht nur danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patienten dem DMP beigetreten sind, sondern – in den Tabellen zu Patientenmerkmalen und -zahlen – auch nach Frauen und Männern sowie nach Altersgruppen. Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach

- Subkohorten und
- Patientenkollektiven.

Für einen großen Teil der Auswertungen werden die Patienten jeder Kohorte zunächst nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei „**Subkohorten**“ unterteilt. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachte, letztlich durch Mikrogefäßerkrankungen bedingte, schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien<sup>4</sup>:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation<sup>5</sup>
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden, Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden, Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus, periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht. Eine nach Subkohorten differenzierte Auswertung wird für die Darstellung der Patientenzahlen und -merkmale, des Raucherstatus, des Hypertonus und der HbA1c-Werte vorgenommen. Die entsprechenden Tabellen sind in diesem Bericht im Anhang enthalten.

Für einige weitere Aspekte wird zusätzlich nach „**Kollektiven**“ unterschieden. Die sich hierdurch ergebenden Gruppierungen unterliegen entweder besonderen Risiken (z.B. Raucherstatus) oder weisen bestimmte Begleiterkrankungen auf, die spezifische Therapien erfordern (z.B. Hypertoniker). Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei der zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt wiederum unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. So wird beispielsweise ein Patient dem Kollektiv der Raucher zugeordnet, wenn in der Erstdokumentation der entsprechende Raucherstatus vermerkt ist. Der Patient bleibt dann – sofern er nicht aus dem DMP ausscheidet – über den gesamten Berichtszeitraum hinweg Mitglied des Raucherkollektivs, selbst wenn er noch innerhalb dieses Zeitraums mit dem Rauchen aufhört.

Wenn die Patientenzahl bzw. die Gruppe der auswertbaren Patienten oder ein Kollektiv in einer Kohorte im jeweiligen Berichtshalbjahr kleiner als 10 ist, wird aus Datenschutzgründen auf den Ausweis von Ergebnissen verzichtet. Die entsprechenden Tabellen bzw. Halbjahre sind dann leer bzw. gestrichelt. Die Anzahl der insgesamt eingeschriebenen Patienten wird jedoch in jedem Fall in der tabellarischen Zusammenfassung ausgewiesen.

<sup>4</sup> Datenbedingt kann bei der Evaluation des Krankheitsbildes Diabetes mellitus Typ 2 bezüglich der Endpunkte eine differenziertere Erfassung erfolgen als bei der Evaluation des Krankheitsbildes Diabetes mellitus Typ 1.

<sup>5</sup> Unter diese Kategorie fallen alle Patienten ohne bekannte Begleit- und Folgeerkrankungen laut Erstdokumentation, welche als primäre oder sekundäre Endpunkte zu klassifizieren sind. Die Patienten „ohne Endpunkte“ umfassen demnach alle Patienten, die weder der Subkohorte mit primären noch der Subkohorte mit sekundären Endpunkten zuzuordnen sind.

**Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte**

**Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale**

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt 14 Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren 8 Männer und 6 Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch -- Teilnehmer im Programm, -- Männer und -- Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende „Restkohorte“ des letzten Berichtshalbjahres.

**Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung**

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	männlich	Anzahl	8	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	57,14	40,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	weiblich	Anzahl	6	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		42,86	60,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225		
	männlich	Anzahl	2318	1891	1614	1373	1173	1060	964	881	836	801	780	752	716	686	661	640	619	594		
		Anteil in %	47,45	47,19	47,22	47,00	46,90	47,58	47,82	47,91	47,50	47,23	47,59	47,59	47,48	47,84	47,69	48,05	48,13	48,49		
	weiblich	Anzahl	2567	2116	1804	1548	1328	1168	1052	958	924	895	859	828	792	748	725	692	667	631		
Anteil in %		52,55	52,81	52,78	53,00	53,10	52,42	52,18	52,09	52,50	52,77	52,41	52,41	52,52	52,16	52,31	51,95	51,87	51,51			
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293			
	männlich	Anzahl	5684	4787	3963	3338	3003	2673	2418	2300	2211	2112	2032	1926	1855	1780	1698	1626	1550			
		Anteil in %	46,94	47,09	47,09	46,87	46,88	46,85	46,78	46,95	46,94	46,56	46,83	46,82	47,02	46,85	46,93	47,13	47,07			
	weiblich	Anzahl	6424	5378	4452	3784	3403	3032	2751	2599	2499	2424	2307	2188	2090	2019	1920	1824	1743			
Anteil in %		53,06	52,91	52,91	53,13	53,12	53,15	53,22	53,05	53,06	53,44	53,17	53,18	52,98	53,15	53,07	52,87	52,93				
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409				
	männlich	Anzahl	7207	6040	4994	4299	3756	3384	3234	3075	2895	2757	2601	2460	2356	2246	2148	2057				
		Anteil in %	47,83	47,70	47,22	46,98	46,96	46,62	46,65	46,75	46,47	46,52	46,57	46,50	46,58	46,40	46,37	46,65				
	weiblich	Anzahl	7862	6623	5581	4851	4242	3874	3699	3502	3335	3169	2984	2830	2702	2594	2484	2352				
Anteil in %		52,17	52,30	52,78	53,02	53,04	53,38	53,35	53,25	53,53	53,48	53,43	53,50	53,42	53,60	53,63	53,35					
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053					
	männlich	Anzahl	5610	4749	4101	3507	3155	2940	2786	2642	2492	2338	2231	2137	2021	1934	1843					
		Anteil in %	47,99	47,48	47,32	46,97	46,94	46,68	46,65	46,45	46,19	45,98	46,01	45,98	45,54	45,62	45,47					
	weiblich	Anzahl	6081	5254	4566	3960	3566	3358	3186	3046	2903	2747	2618	2511	2417	2305	2210					
Anteil in %		52,01	52,52	52,68	53,03	53,06	53,32	53,35	53,55	53,81	54,02	53,99	54,02	54,46	54,38	54,53						
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422						
	männlich	Anzahl	6985	6123	5220	4576	4244	3971	3734	3499	3255	3090	2944	2812	2686	2547						
		Anteil in %	48,87	48,70	48,24	47,98	47,61	47,32	47,21	46,93	46,79	46,83	46,99	47,07	47,02	46,98						
	weiblich	Anzahl	7309	6450	5602	4961	4670	4420	4176	3957	3702	3508	3321	3162	3027	2875						
Anteil in %		51,13	51,30	51,76	52,02	52,39	52,68	52,79	53,07	53,21	53,17	53,01	52,93	52,98	53,02							
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459							
	männlich	Anzahl	6382	5418	4715	4317	4037	3777	3560	3285	3085	2931	2776	2628	2508							
		Anteil in %	48,04	47,75	47,64	47,36	47,23	47,02	46,93	46,58	46,29	46,12	46,04	45,95	45,94							
	weiblich	Anzahl	6902	5928	5183	4798	4510	4255	4025	3767	3580	3424	3253	3091	2951							
Anteil in %		51,96	52,25	52,36	52,64	52,77	52,98	53,07	53,42	53,71	53,88	53,96	54,05	54,06								
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487								
	männlich	Anzahl	5853	5172	4647	4297	4016	3734	3456	3258	3085	2922	2787	2648								
		Anteil in %	49,74	49,64	49,48	49,39	49,12	48,78	48,76	48,61	48,61	48,47	48,30	48,26								
	weiblich	Anzahl	5915	5247	4744	4404	4160	3920	3632	3445	3261	3107	2983	2839								
Anteil in %		50,26	50,36	50,52	50,61	50,88	51,22	51,24	51,39	51,39	51,53	51,70	51,74									

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533									
	männlich	Anzahl	6401	5735	5226	4800	4460	4107	3845	3637	3464	3284	3102									
		Anteil in %	48,84	48,79	48,55	48,18	47,96	47,88	47,74	47,72	47,65	47,59	47,48									
	weiblich	Anzahl	6704	6020	5538	5163	4840	4470	4209	3985	3805	3617	3431									
Anteil in %		51,16	51,21	51,45	51,82	52,04	52,12	52,26	52,28	52,35	52,41	52,52										
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873										
	männlich	Anzahl	5502	4957	4523	4135	3755	3532	3317	3132	2965	2795										
		Anteil in %	48,55	48,26	48,10	47,86	47,67	47,74	47,66	47,68	47,69	47,59										
	weiblich	Anzahl	5830	5315	4880	4505	4122	3866	3643	3437	3252	3078										
Anteil in %		51,45	51,74	51,90	52,14	52,33	52,26	52,34	52,32	52,31	52,41											
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839											
	männlich	Anzahl	5322	4715	4298	3834	3544	3319	3122	2956	2790											
		Anteil in %	49,78	49,40	49,23	48,97	48,67	48,36	48,14	47,99	47,78											
	weiblich	Anzahl	5370	4829	4432	3996	3737	3544	3363	3204	3049											
Anteil in %		50,22	50,60	50,77	51,03	51,33	51,64	51,86	52,01	52,22												
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928												
	männlich	Anzahl	3357	2975	2631	2399	2259	2126	2013	1909												
		Anteil in %	48,89	48,64	48,51	48,35	48,47	48,56	48,53	48,60												
	weiblich	Anzahl	3510	3141	2793	2563	2402	2252	2135	2019												
Anteil in %		51,11	51,36	51,49	51,65	51,53	51,44	51,47	51,40													
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474													
	männlich	Anzahl	4829	4145	3684	3369	3125	2919	2749													
		Anteil in %	51,43	51,08	50,60	50,55	50,39	50,15	50,22													
	weiblich	Anzahl	4561	3970	3597	3296	3077	2902	2725													
Anteil in %		48,57	48,92	49,40	49,45	49,61	49,85	49,78														
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747														
	männlich	Anzahl	3662	3218	2884	2646	2446	2287														
		Anteil in %	48,89	48,48	48,11	48,10	48,13	48,18														
	weiblich	Anzahl	3828	3420	3111	2855	2636	2460														
Anteil in %		51,11	51,52	51,89	51,90	51,87	51,82															
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942															
	männlich	Anzahl	4385	3842	3467	3135	2899															
		Anteil in %	50,19	49,64	49,30	48,89	48,79															
	weiblich	Anzahl	4352	3898	3565	3278	3043															
Anteil in %		49,81	50,36	50,70	51,11	51,21																
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929																
	männlich	Anzahl	3986	3529	3139	2842																
		Anteil in %	49,19	48,82	48,42	47,93																
	weiblich	Anzahl	4117	3700	3344	3087																
Anteil in %		50,81	51,18	51,58	52,07																	
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845																	
	männlich	Anzahl	4280	3763	3360																	
		Anteil in %	49,61	49,38	49,09																	
	weiblich	Anzahl	4347	3858	3485																	
Anteil in %		50,39	50,62	50,91																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																		
	männlich	Anzahl	3737	3230																		
		Anteil in %	49,12	48,55																		
	weiblich	Anzahl	3871	3423																		
Anteil in %		50,88	51,45																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																			
	männlich	Anzahl	3950																			
		Anteil in %	50,41																			
	weiblich	Anzahl	3886																			
Anteil in %		49,59																				

In Tabelle 1.2 werden die **Patientenzahlen**, welche die **Basis der Stichprobenziehungen** für die ökonomischen Auswertungen in Berichtsteil II sowie die Durchführung der Lebensqualitätsbefragung in Berichtsteil III darstellen, ausgewiesen.<sup>6</sup> Zudem wird in der Zeile „Stichprobengröße“ ausgewiesen, wie viele Patienten die daraus gezogene Stichprobe umfasst.

Dargestellt werden die Angaben ab Kohorte 2009-1.

In der Kohorte 2009-1 umfasst die Stichprobe im Beitritts-halbjahr 500 Patienten. Basis für die Ziehung dieser Stichprobe waren 9029 Patienten.

**Tabelle 1.2 Patientenzahlen zur Stichprobenziehung**

EZ	Patientenzahlen zur Stichprobenziehung (Anzahl)		Beitritts-halbjahr
2009-1	Stichprobenbasis	Anzahl	9029
	Stichprobengröße	Anzahl	<b>500</b>
2009-2	Stichprobenbasis	Anzahl	7146
	Stichprobengröße	Anzahl	<b>500</b>
2010-1	Stichprobenbasis	Anzahl	8411
	Stichprobengröße	Anzahl	<b>500</b>
2010-2	Stichprobenbasis	Anzahl	7911
	Stichprobengröße	Anzahl	<b>500</b>
2011-1	Stichprobenbasis	Anzahl	8394
	Stichprobengröße	Anzahl	<b>500</b>
2011-2	Stichprobenbasis	Anzahl	7431
	Stichprobengröße	Anzahl	<b>500</b>
2012-1	Stichprobenbasis	Anzahl	7987
	Stichprobengröße	Anzahl	<b>500</b>

<sup>6</sup>Die Angaben zur Stichprobenbasis beziehen sich auf den Datenbestand zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung. Sie können daher von den Fallzahlen in Tabelle 1.1. abweichen, die auf dem ggf. aktualisierten Datenbestand zum Zeitpunkt der Berichtsproduktion beruht.

Tabelle 1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Kranken-

kasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit 14 Teilnehmern. - - von ihnen bzw. - - Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

**Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)**

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	4	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	28,57	35,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[4,01; 53,13]	[9,67; 61,76]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	7,14	7,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	3	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	21,43	28,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	10	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	878	1467	1964	2384	2657	2869	3046	3125	3189	3246	3305	3377	3451	3499	3553	3599	3660	3730	
		Anteil in %	17,97	30,03	40,20	48,80	54,39	58,73	62,35	63,97	65,28	66,45	67,66	69,13	70,64	71,63	72,73	73,67	74,92	76,36	
		CI Anteil in %	[16,90; 19,05]	[28,75; 31,32]	[38,83; 41,58]	[47,40; 50,20]	[52,99; 55,79]	[57,35; 60,11]	[61,00; 63,71]	[62,62; 65,32]	[63,95; 66,62]	[65,12; 67,77]	[66,34; 68,97]	[67,83; 70,43]	[69,37; 71,92]	[70,36; 72,89]	[71,48; 73,98]	[72,44; 74,91]	[73,71; 76,14]	[75,16; 77,55]	
	davon wegen Tod	Anzahl	14	65	115	163	202	233	255	282	316	342	374	409	443	472	499	524	556	601	
		Anteil in %	0,29	1,33	2,35	3,34	4,14	4,77	5,22	5,77	6,47	7,00	7,66	8,37	9,07	9,66	10,21	10,73	11,38	12,30	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	816	1326	1741	2096	2303	2477	2620	2662	2679	2703	2728	2761	2799	2814	2837	2855	2882	2903	
		Anteil in %	16,70	27,14	35,64	42,91	47,14	50,71	53,63	54,49	54,84	55,33	55,84	56,52	57,30	57,60	58,08	58,44	59,00	59,43	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	7	12	21	32	44	51	63	70	78	84	85	88	90	92	95	96	98	100	
		Anteil in %	0,14	0,25	0,43	0,66	0,90	1,04	1,29	1,43	1,60	1,72	1,74	1,80	1,84	1,88	1,94	1,97	2,01	2,05	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	41	64	87	93	108	108	108	111	116	117	118	119	119	121	122	124	124	126	
Anteil in %		0,84	1,31	1,78	1,90	2,21	2,21	2,21	2,27	2,37	2,40	2,42	2,44	2,44	2,48	2,50	2,54	2,54	2,58		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225	1155	
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1943	3693	4986	5702	6403	6939	7209	7398	7572	7769	7994	8163	8309	8490	8658	8815	8970		
		Anteil in %	16,05	30,50	41,18	47,09	52,88	57,31	59,54	61,10	62,54	64,16	66,02	67,42	68,62	70,12	71,51	72,80	74,08		
		CI Anteil in %	[15,39; 16,70]	[29,68; 31,32]	[40,30; 42,06]	[46,20; 47,98]	[51,99; 53,77]	[56,43; 58,19]	[58,66; 60,41]	[60,23; 61,97]	[61,67; 63,40]	[63,31; 65,02]	[65,18; 66,87]	[66,58; 68,25]	[67,80; 69,45]	[69,30; 70,93]	[70,70; 72,31]	[72,01; 73,60]	[73,30; 74,86]		
	davon wegen Tod	Anzahl	43	153	270	342	449	532	618	684	758	842	946	1015	1094	1181	1265	1343	1431		
		Anteil in %	0,36	1,26	2,23	2,82	3,71	4,39	5,10	5,65	6,26	6,95	7,81	8,38	9,04	9,75	10,45	11,09	11,82		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1814	3362	4484	5086	5631	6052	6192	6288	6377	6474	6584	6673	6735	6821	6900	6968	7025		
		Anteil in %	14,98	27,77	37,03	42,01	46,51	49,98	51,14	51,93	52,67	53,47	54,38	55,11	55,62	56,33	56,99	57,55	58,02		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	13	46	67	86	132	163	204	227	236	247	256	265	269	276	279	283	289		
		Anteil in %	0,11	0,38	0,55	0,71	1,09	1,35	1,68	1,87	1,95	2,04	2,11	2,19	2,22	2,28	2,30	2,34	2,39		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	73	132	165	188	191	192	195	199	201	206	208	210	211	212	214	221	225		
Anteil in %		0,60	1,09	1,36	1,55	1,58	1,59	1,61	1,64	1,66	1,70	1,72	1,73	1,74	1,75	1,77	1,83	1,86			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293	3138		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	2406	4494	5919	7071	7811	8136	8492	8839	9143	9484	9779	10011	10229	10437	10660	10862		
		Anteil in %	15,97	29,82	39,28	46,92	51,83	53,99	56,35	58,66	60,67	62,94	64,89	66,43	67,88	69,26	70,74	72,08		
		CI Anteil in %	[15,38; 16,55]	[29,09; 30,55]	[38,50; 40,06]	[46,13; 47,72]	[51,04; 52,63]	[53,20; 54,79]	[55,56; 57,15]	[57,87; 59,44]	[59,89; 61,45]	[62,17; 63,71]	[64,13; 65,66]	[65,68; 67,19]	[67,14; 68,63]	[68,52; 70,00]	[70,01; 71,47]	[71,37; 72,80]		
	davon wegen Tod	Anzahl	63	223	364	502	624	725	853	978	1080	1190	1292	1402	1498	1602	1708	1800		
		Anteil in %	0,42	1,48	2,42	3,33	4,14	4,81	5,66	6,49	7,17	7,90	8,57	9,30	9,94	10,63	11,33	11,95		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	2269	4084	5268	6216	6782	6967	7154	7341	7512	7722	7900	8014	8122	8216	8320	8423		
		Anteil in %	15,06	27,10	34,96	41,25	45,01	46,23	47,47	48,72	49,85	51,24	52,43	53,18	53,90	54,52	55,21	55,90		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	38	94	130	190	237	270	303	328	354	370	383	391	398	406	415	421		
		Anteil in %	0,25	0,62	0,86	1,26	1,57	1,79	2,01	2,18	2,35	2,46	2,54	2,59	2,64	2,69	2,75	2,79		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	36	93	157	163	168	174	182	192	197	202	204	204	211	213	217	218		
Anteil in %		0,24	0,62	1,04	1,08	1,11	1,15	1,21	1,27	1,31	1,34	1,35	1,35	1,40	1,41	1,44	1,45			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409	4207		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1688	3024	4224	4970	5393	5719	6003	6296	6606	6842	7043	7253	7452	7638	7831			
		Anteil in %	14,44	25,87	36,13	42,51	46,13	48,92	51,35	53,85	56,51	58,52	60,24	62,04	63,74	65,33	66,98			
		CI Anteil in %	[13,80; 15,08]	[25,07; 26,66]	[35,26; 37,00]	[41,62; 43,41]	[45,23; 47,03]	[48,01; 49,82]	[50,44; 52,25]	[52,95; 54,76]	[55,61; 57,40]	[57,63; 59,42]	[59,36; 61,13]	[61,16; 62,92]	[62,87; 64,61]	[64,47; 66,20]	[66,13; 67,84]			
	davon wegen Tod	Anzahl	43	146	255	338	448	549	625	726	824	923	1009	1102	1174	1252	1343			
		Anteil in %	0,37	1,25	2,18	2,89	3,83	4,70	5,35	6,21	7,05	7,89	8,63	9,43	10,04	10,71	11,49			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1594	2745	3763	4378	4630	4810	4993	5158	5357	5478	5584	5687	5806	5907	5999			
		Anteil in %	13,63	23,48	32,19	37,45	39,60	41,14	42,71	44,12	45,82	46,86	47,76	48,64	49,66	50,53	51,31			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	25	64	133	175	232	272	294	319	328	336	341	349	355	360	366			
		Anteil in %	0,21	0,55	1,14	1,50	1,98	2,33	2,51	2,73	2,81	2,87	2,92	2,99	3,04	3,08	3,13			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	26	69	73	79	83	88	91	93	97	105	109	115	117	119	123			
Anteil in %		0,22	0,59	0,62	0,68	0,71	0,75	0,78	0,80	0,83	0,90	0,93	0,98	1,00	1,02	1,05				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053	3860			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1721	3472	4757	5380	5903	6384	6838	7337	7696	8029	8320	8581	8872	9132				
		Anteil in %	12,04	24,29	33,28	37,64	41,30	44,66	47,84	51,33	53,84	56,17	58,21	60,03	62,07	63,89				
		CI Anteil in %	[11,51; 12,57]	[23,59; 24,99]	[32,51; 34,05]	[36,84; 38,43]	[40,49; 42,10]	[43,85; 45,48]	[47,02; 48,66]	[50,51; 52,15]	[53,02; 54,66]	[55,36; 56,98]	[57,40; 59,01]	[59,23; 60,84]	[61,27; 62,86]	[63,10; 64,67]				
	davon wegen Tod	Anzahl	68	272	446	587	744	891	1030	1178	1284	1408	1521	1625	1739	1859				
		Anteil in %	0,48	1,90	3,12	4,11	5,20	6,23	7,21	8,24	8,98	9,85	10,64	11,37	12,17	13,01				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1608	3028	4068	4465	4764	5055	5327	5650	5875	6065	6233	6374	6541	6675				
		Anteil in %	11,25	21,18	28,46	31,24	33,33	35,36	37,27	39,53	41,10	42,43	43,61	44,59	45,76	46,70				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	30	143	209	281	340	375	410	429	450	464	471	483	486	490				
		Anteil in %	0,21	1,00	1,46	1,97	2,38	2,62	2,87	3,00	3,15	3,25	3,30	3,38	3,40	3,43				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	15	29	34	47	55	63	71	80	87	92	95	99	106	108				
Anteil in %		0,10	0,20	0,24	0,33	0,38	0,44	0,50	0,56	0,61	0,64	0,66	0,69	0,74	0,76					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422	5162				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1938	3386	4169	4737	5252	5699	6232	6619	6929	7255	7565	7825	8087					
		Anteil in %	14,59	25,49	31,38	35,66	39,54	42,90	46,91	49,83	52,16	54,61	56,95	58,91	60,88					
		CI Anteil in %	[13,99; 15,19]	[24,75; 26,23]	[30,59; 32,17]	[34,84; 36,47]	[38,70; 40,37]	[42,06; 43,74]	[46,06; 47,76]	[48,98; 50,68]	[51,31; 53,01]	[53,77; 55,46]	[56,11; 57,79]	[58,07; 59,74]	[60,05; 61,71]					
	davon wegen Tod	Anzahl	62	215	368	530	676	794	934	1059	1183	1300	1410	1511	1618					
		Anteil in %	0,47	1,62	2,77	3,99	5,09	5,98	7,03	7,97	8,91	9,79	10,61	11,37	12,18					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1807	2976	3518	3860	4182	4476	4833	5076	5247	5442	5631	5777	5919					
		Anteil in %	13,60	22,40	26,48	29,06	31,48	33,69	36,38	38,21	39,50	40,97	42,39	43,49	44,56					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	64	179	253	310	349	376	404	417	427	437	447	455	462					
		Anteil in %	0,48	1,35	1,90	2,33	2,63	2,83	3,04	3,14	3,21	3,29	3,36	3,43	3,48					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	16	30	37	45	53	61	67	72	76	77	82	88					
Anteil in %		0,04	0,12	0,23	0,28	0,34	0,40	0,46	0,50	0,54	0,57	0,58	0,62	0,66						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459	5197					



EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1349	2377	3067	3592	4114	4680	5065	5422	5739	5998	6281	6546								
		Anteil in %	11,46	20,20	26,06	30,52	34,96	39,77	43,04	46,07	48,77	50,97	53,37	55,63								
		CI Anteil in %	[10,89; 12,04]	[19,47; 20,92]	[25,27; 26,86]	[29,69; 31,36]	[34,10; 35,82]	[38,88; 40,65]	[42,15; 43,94]	[45,17; 46,97]	[47,86; 49,67]	[50,07; 51,87]	[52,47; 54,27]	[54,73; 56,52]								
	davon wegen Tod	Anzahl	52	215	391	521	649	799	901	1046	1156	1232	1330	1446								
		Anteil in %	0,44	1,83	3,32	4,43	5,51	6,79	7,66	8,89	9,82	10,47	11,30	12,29								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1249	2020	2465	2817	3186	3581	3828	4015	4209	4379	4552	4688								
		Anteil in %	10,61	17,17	20,95	23,94	27,07	30,43	32,53	34,12	35,77	37,21	38,68	39,84								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	46	122	182	218	239	257	288	305	315	326	333	342								
		Anteil in %	0,39	1,04	1,55	1,85	2,03	2,18	2,45	2,59	2,68	2,77	2,83	2,91								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	20	29	36	40	43	48	56	59	61	66	70								
Anteil in %		0,02	0,17	0,25	0,31	0,34	0,37	0,41	0,48	0,50	0,52	0,56	0,59									
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487	5222								
2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1350	2341	3142	3805	4528	5051	5483	5836	6204	6572	6852									
		Anteil in %	10,30	17,86	23,98	29,03	34,55	38,54	41,84	44,53	47,34	50,15	52,29									
		CI Anteil in %	[9,78; 10,82]	[17,21; 18,52]	[23,24; 24,71]	[28,26; 29,81]	[33,74; 35,37]	[37,71; 39,38]	[40,99; 42,68]	[43,68; 45,38]	[46,49; 48,20]	[49,29; 51,00]	[51,43; 53,14]									
	davon wegen Tod	Anzahl	56	222	388	534	683	816	966	1078	1208	1332	1439									
		Anteil in %	0,43	1,69	2,96	4,07	5,21	6,23	7,37	8,23	9,22	10,16	10,98									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1224	1947	2505	2966	3504	3863	4120	4344	4565	4790	4949									
		Anteil in %	9,34	14,86	19,11	22,63	26,74	29,48	31,44	33,15	34,83	36,55	37,76									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	65	150	213	258	287	312	330	339	352	366	373									
		Anteil in %	0,50	1,14	1,63	1,97	2,19	2,38	2,52	2,59	2,69	2,79	2,85									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	22	36	47	54	60	67	75	79	84	91									
Anteil in %		0,04	0,17	0,27	0,36	0,41	0,46	0,51	0,57	0,60	0,64	0,69										
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533	6253								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533	6253									
2007-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1060	1929	2692	3455	3934	4372	4763	5115	5459	5737										
		Anteil in %	9,35	17,02	23,76	30,49	34,72	38,58	42,03	45,14	48,17	50,63										
		CI Anteil in %	[8,82; 9,89]	[16,33; 17,71]	[22,97; 24,54]	[29,64; 31,34]	[33,84; 35,59]	[37,68; 39,48]	[41,12; 42,94]	[44,22; 46,05]	[47,25; 49,09]	[49,71; 51,55]										
	davon wegen Tod	Anzahl	59	205	342	496	591	720	849	963	1055	1173										
		Anteil in %	0,52	1,81	3,02	4,38	5,22	6,35	7,49	8,50	9,31	10,35										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	950	1575	2145	2714	3069	3348	3592	3813	4046	4195										
		Anteil in %	8,38	13,90	18,93	23,95	27,08	29,54	31,70	33,65	35,70	37,02										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	45	128	170	206	229	249	261	273	283	289										
		Anteil in %	0,40	1,13	1,50	1,82	2,02	2,20	2,30	2,41	2,50	2,55										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	21	35	39	45	55	61	66	75	80										
Anteil in %		0,05	0,19	0,31	0,34	0,40	0,49	0,54	0,58	0,66	0,71											
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873	5595										
2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1148	1962	2862	3411	3829	4207	4532	4853	5131											
		Anteil in %	10,74	18,35	26,77	31,90	35,81	39,35	42,39	45,39	47,99											
		CI Anteil in %	[10,15; 11,32]	[17,62; 19,08]	[25,93; 27,61]	[31,02; 32,79]	[34,90; 36,72]	[38,42; 40,27]	[41,45; 43,32]	[44,45; 46,33]	[47,04; 48,94]											
	davon wegen Tod	Anzahl	56	164	327	429	551	636	732	824	921											
		Anteil in %	0,52	1,53	3,06	4,01	5,15	5,95	6,85	7,71	8,61											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1037	1671	2355	2758	3025	3298	3507	3718	3878											
		Anteil in %	9,70	15,63	22,03	25,79	28,29	30,85	32,80	34,77	36,27											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	52	113	155	190	212	228	247	259	272											
		Anteil in %	0,49	1,06	1,45	1,78	1,98	2,13	2,31	2,42	2,54											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	14	25	34	41	45	46	52	60											
Anteil in %		0,03	0,13	0,23	0,32	0,38	0,42	0,43	0,49	0,56												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839	5561											

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	751	1443	1905	2206	2489	2719	2939	3175											
		Anteil in %	10,94	21,01	27,74	32,12	36,25	39,60	42,80	46,24											
		CI Anteil in %	[10,20; 11,67]	[20,05; 21,98]	[26,68; 28,80]	[31,02; 33,23]	[35,11; 37,38]	[38,44; 40,75]	[41,63; 43,97]	[45,06; 47,41]											
	davon wegen Tod	Anzahl	24	138	230	292	350	403	456	532											
		Anteil in %	0,35	2,01	3,35	4,25	5,10	5,87	6,64	7,75											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	699	1228	1559	1779	1981	2145	2292	2442											
		Anteil in %	10,18	17,88	22,70	25,91	28,85	31,24	33,38	35,56											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	25	62	93	106	120	127	142	148											
		Anteil in %	0,36	0,90	1,35	1,54	1,75	1,85	2,07	2,16											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	15	23	29	38	44	49	53											
Anteil in %		0,04	0,22	0,33	0,42	0,55	0,64	0,71	0,77												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928	3692											
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1275	2109	2725	3188	3569	3916	4250												
		Anteil in %	13,58	22,46	29,02	33,95	38,01	41,70	45,26												
		CI Anteil in %	[12,89; 14,27]	[21,62; 23,30]	[28,10; 29,94]	[32,99; 34,91]	[37,03; 38,99]	[40,71; 42,70]	[44,25; 46,27]												
	davon wegen Tod	Anzahl	46	168	280	373	456	536	616												
		Anteil in %	0,49	1,79	2,98	3,97	4,86	5,71	6,56												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1199	1853	2314	2661	2937	3181	3413												
		Anteil in %	12,77	19,73	24,64	28,34	31,28	33,88	36,35												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	25	70	101	119	135	151	168												
		Anteil in %	0,27	0,75	1,08	1,27	1,44	1,61	1,79												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	18	30	35	41	48	53												
Anteil in %		0,05	0,19	0,32	0,37	0,44	0,51	0,56													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	8115	7281	6665	6202	5821	5474	5140												
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	852	1495	1989	2408	2743	3053													
		Anteil in %	11,38	19,96	26,56	32,15	36,62	40,76													
		CI Anteil in %	[10,66; 12,09]	[19,05; 20,87]	[25,56; 27,56]	[31,09; 33,21]	[35,53; 37,71]	[39,65; 41,87]													
	davon wegen Tod	Anzahl	28	118	212	294	362	437													
		Anteil in %	0,37	1,58	2,83	3,93	4,83	5,83													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	786	1300	1672	1983	2231	2448													
		Anteil in %	10,49	17,36	22,32	26,48	29,79	32,68													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	33	65	86	107	123	136													
		Anteil in %	0,44	0,87	1,15	1,43	1,64	1,82													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	12	19	24	27	32													
Anteil in %		0,07	0,16	0,25	0,32	0,36	0,43														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6638	5995	5501	5082	4747	4437													
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	997	1705	2324	2795	3154														
		Anteil in %	11,41	19,51	26,60	31,99	36,10														
		CI Anteil in %	[10,74; 12,08]	[18,68; 20,35]	[25,67; 27,53]	[31,01; 32,97]	[35,09; 37,11]														
	davon wegen Tod	Anzahl	24	110	209	302	371														
		Anteil in %	0,27	1,26	2,39	3,46	4,25														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	937	1501	1992	2336	2605														
		Anteil in %	10,72	17,18	22,80	26,74	29,82														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	33	81	98	120	134														
		Anteil in %	0,38	0,93	1,12	1,37	1,53														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	13	25	37	44														
Anteil in %		0,03	0,15	0,29	0,42	0,50															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7740	7032	6413	5942	5583														

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	<b>ausgeschiedene Patienten insgesamt</b>	Anzahl	874	1620	2174	2627															
		Anteil in %	10,79	19,99	26,83	32,42															
		CI Anteil in %	[10,11; 11,46]	[19,12; 20,86]	[25,86; 27,79]	[31,40; 33,44]															
	davon wegen Tod	Anzahl	33	119	203	298															
		Anteil in %	0,41	1,47	2,51	3,68															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	808	1411	1859	2182															
		Anteil in %	9,97	17,41	22,94	26,93															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	29	71	89	115															
		Anteil in %	0,36	0,88	1,10	1,42															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	19	23	32															
Anteil %		0,05	0,23	0,28	0,39																
<i>Patienten</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>															
<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>	<i>5476</i>															
2011-1	<b>ausgeschiedene Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1006	1782	2344																
		Anteil in %	11,66	20,66	27,17																
		CI Anteil in %	[10,98; 12,34]	[19,80; 21,51]	[26,23; 28,11]																
	davon wegen Tod	Anzahl	29	104	184																
		Anteil in %	0,34	1,21	2,13																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	946	1588	2036																
		Anteil in %	10,97	18,41	23,60																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	26	74	101																
		Anteil in %	0,30	0,86	1,17																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	16	23																
Anteil %		0,06	0,19	0,27																	
<i>Patienten</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																
<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>	<i>6283</i>																
2011-2	<b>ausgeschiedene Patienten insgesamt</b>	Anzahl	955	1641																	
		Anteil in %	12,55	21,57																	
		CI Anteil in %	[11,81; 13,30]	[20,65; 22,49]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	33	112																	
		Anteil in %	0,43	1,47																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	879	1431																	
		Anteil in %	11,55	18,81																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	37	82																	
		Anteil in %	0,49	1,08																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	16																	
Anteil %		0,08	0,21																		
<i>Patienten</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																	
<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6653</i>	<i>5967</i>																	
2012-1	<b>ausgeschiedene Patienten insgesamt</b>	Anzahl	877																		
		Anteil in %	11,19																		
		CI Anteil in %	[10,49; 11,89]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	31																		
		Anteil in %	0,40																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	816																		
		Anteil in %	10,41																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	26																		
		Anteil in %	0,33																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4																		
Anteil %		0,05																			
<i>Patienten</i>	<i>zu Beginn des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																		
<i>insgesamt:</i>	<i>am Ende des Halbjahres</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6959</i>																		

In Tabelle 1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebens-

jahren zum 1.1 des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten 14 Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr 67,29 Jahre, der Median lag bei 70,50 Jahren.

**Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres**

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	67,29
	CI Mean	[62,10; 72,47]
	Median	70,50
	<i>Fallbasis</i>	14
2003-2	Mean	66,37
	CI Mean	[66,10; 66,65]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	4885
2004-1	Mean	66,60
	CI Mean	[66,41; 66,78]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	12108
2004-2	Mean	65,54
	CI Mean	[65,36; 65,72]
	Median	66,00
	<i>Fallbasis</i>	15069
2005-1	Mean	65,01
	CI Mean	[64,81; 65,21]
	Median	66,00
	<i>Fallbasis</i>	11691
2005-2	Mean	65,38
	CI Mean	[65,20; 65,57]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	14294
2006-1	Mean	65,75
	CI Mean	[65,55; 65,94]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	13284
2006-2	Mean	65,04
	CI Mean	[64,83; 65,25]
	Median	66,00
	<i>Fallbasis</i>	11768
2007-1	Mean	65,44
	CI Mean	[65,24; 65,64]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	13105
2007-2	Mean	64,93
	CI Mean	[64,71; 65,15]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	11332

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	64,84
	CI Mean	[64,61; 65,07]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>10692</i>
2008-2	Mean	64,06
	CI Mean	[63,77; 64,35]
	Median	66,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>6867</i>
2009-1	Mean	63,13
	CI Mean	[62,88; 63,39]
	Median	65,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>9390</i>
2009-2	Mean	62,60
	CI Mean	[62,31; 62,89]
	Median	64,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>7490</i>
2010-1	Mean	63,22
	CI Mean	[62,96; 63,49]
	Median	65,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>8737</i>
2010-2	Mean	62,69
	CI Mean	[62,41; 62,97]
	Median	64,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>8103</i>
2011-1	Mean	62,60
	CI Mean	[62,33; 62,87]
	Median	63,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>8627</i>
2011-2	Mean	62,01
	CI Mean	[61,72; 62,31]
	Median	63,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>7608</i>
2012-1	Mean	62,05
	CI Mean	[61,75; 62,34]
	Median	62,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>7836</i>

In Tabelle 1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitritts halbjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter

in vollendeten Lebensjahren zum 1.1 des Beitritts halbjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitritts halbjahr 2 Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

**Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitritts halbjahres**

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitritts halbjahres	Beitritts halbjahr
2003-1	bis 50	0
	51 bis 60	5
	61 bis 70	2
	71 bis 80	6
	81 und älter	1
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>14</i>
2003-2	bis 50	354
	51 bis 60	811
	61 bis 70	2039
	71 bis 80	1365
	81 und älter	316
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4885</i>
2004-1	bis 50	939
	51 bis 60	2068
	61 bis 70	4615
	71 bis 80	3524
	81 und älter	962
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>12108</i>
2004-2	bis 50	1464
	51 bis 60	2907
	61 bis 70	5557
	71 bis 80	4041
	81 und älter	1098
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>15067</i>
2005-1	bis 50	1264
	51 bis 60	2343
	61 bis 70	4346
	71 bis 80	2959
	81 und älter	779
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>11691</i>
2005-2	bis 50	1520
	51 bis 60	2793
	61 bis 70	5134
	71 bis 80	3780
	81 und älter	1065
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>14292</i>
2006-1	bis 50	1399
	51 bis 60	2496
	61 bis 70	4633
	71 bis 80	3650
	81 und älter	1105
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>13283</i>
2006-2	bis 50	1401
	51 bis 60	2323
	61 bis 70	4088
	71 bis 80	3077
	81 und älter	878
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>11767</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebens- jahren zum 1.1. des Beitritts- halbjahres	Beitritts- halbjahr
2007-1	bis 50	1527
	51 bis 60	2663
	61 bis 70	4144
	71 bis 80	3641
	81 und älter	1129
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>13104</i>
2007-2	bis 50	1430
	51 bis 60	2372
	61 bis 70	3576
	71 bis 80	3032
	81 und älter	921
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>11331</i>
2008-1	bis 50	1458
	51 bis 60	2216
	61 bis 70	3188
	71 bis 80	2901
	81 und älter	929
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>10692</i>
2008-2	bis 50	1038
	51 bis 60	1520
	61 bis 70	2038
	71 bis 80	1739
	81 und älter	531
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6866</i>
2009-1	bis 50	1608
	51 bis 60	2133
	61 bis 70	2742
	71 bis 80	2281
	81 und älter	624
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>9388</i>
2009-2	bis 50	1401
	51 bis 60	1763
	61 bis 70	2050
	71 bis 80	1775
	81 und älter	496
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7485</i>
2010-1	bis 50	1510
	51 bis 60	1964
	61 bis 70	2412
	71 bis 80	2248
	81 und älter	601
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>8735</i>
2010-2	bis 50	1493
	51 bis 60	1881
	61 bis 70	2225
	71 bis 80	1963
	81 und älter	539
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>8101</i>
2011-1	bis 50	1609
	51 bis 60	2016
	61 bis 70	2332
	71 bis 80	2095
	81 und älter	572
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>8624</i>
2011-2	bis 50	1557
	51 bis 60	1830
	61 bis 70	1878
	71 bis 80	1841
	81 und älter	500
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7606</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebens- jahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr
2012-1	bis 50	1641
	51 bis 60	1863
	61 bis 70	1896
	71 bis 80	1863
	81 und älter	568
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7831</i>



In Tabelle 1.6 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **über alle Kohorten und alle Folgehalbjahre**. In diese Auswertung fließen alle Patienten unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet

zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patienten sind im Durchschnitt 5,27 Folgehalbjahre als Teilnehmer in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 4,00 Folgehalbjahren.

**Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten**

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten		Folgehalbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	5,27
		Median	4,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>963970</i>

In Tabelle 1.7 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **pro Kohorte und über alle Folgehalbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patienten der Kohorte 2003-1 sind im Durchschnitt 4,29 Folgehalbjahre als Teilnehmer in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 3,00 Folgehalbjahren.

**Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte**

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
2003-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,29
		Median	3,00
		Halbjahressumme	60
2003-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,91
		Median	4,00
		Halbjahressumme	33776
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,91
		Median	4,00
		Halbjahressumme	83685
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,84
		Median	4,00
		Halbjahressumme	103124
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,14
		Median	6,00
		Halbjahressumme	83523
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,17
		Median	7,00
		Halbjahressumme	102532
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,91
		Median	8,00
		Halbjahressumme	91802
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,95
		Median	9,00
		Halbjahressumme	81764
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,62
		Median	9,00
		Halbjahressumme	86738
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,11
		Median	9,00
		Halbjahressumme	69209
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,49
		Median	8,00
		Halbjahressumme	58732
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,90
		Median	7,00
		Halbjahressumme	33617
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,21
		Median	6,00
		Halbjahressumme	39558
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,73
		Median	5,00
		Halbjahressumme	27963
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,10
		Median	4,00
		Halbjahressumme	27127
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,42
		Median	3,00
		Halbjahressumme	19641
2011-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,68
		Median	2,00
		Halbjahressumme	14466

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
	2011-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	
Median			1,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>6653</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr -- Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei -- von Ihnen bzw. -- Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

**Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation**

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %		80,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %		[53,87; 100,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		345	101	77	39	39	28	70	69	72	38	36	27	25	21	19	21	38		
		Anteil in %		8,61	2,95	2,64	1,56	1,75	1,39	3,81	3,92	4,25	2,32	2,28	1,79	1,74	1,52	1,43	1,63	3,10		
		CI Anteil in %		[7,74; 9,48]	[2,39; 3,52]	[2,06; 3,22]	[1,07; 2,05]	[1,21; 2,30]	[0,88; 1,90]	[2,93; 4,68]	[3,01; 4,83]	[3,29; 5,21]	[1,59; 3,05]	[1,54; 3,01]	[1,12; 2,46]	[1,07; 2,42]	[0,87; 2,16]	[0,79; 2,06]	[0,94; 2,33]	[2,13; 4,07]		
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1132	425	186	151	114	281	274	236	122	93	58	71	61	67	60	100			
		Anteil in %		11,14	5,05	2,61	2,36	2,00	5,44	5,59	5,01	2,69	2,14	1,41	1,80	1,61	1,85	1,74	3,04			
		CI Anteil in %		[10,52; 11,75]	[4,58; 5,52]	[2,24; 2,98]	[1,99; 2,73]	[1,64; 2,36]	[4,82; 6,05]	[4,95; 6,24]	[4,39; 5,63]	[2,22; 3,16]	[1,71; 2,57]	[1,05; 1,77]	[1,38; 2,21]	[1,21; 2,01]	[1,41; 2,29]	[1,30; 2,18]	[2,45; 3,62]			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		931	347	285	223	340	317	309	196	152	111	100	102	101	89	93				
		Anteil in %		7,35	3,28	3,11	2,79	4,68	4,57	4,70	3,15	2,57	1,99	1,89	2,02	2,09	1,92	2,11				
		CI Anteil in %		[6,90; 7,81]	[2,94; 3,62]	[2,76; 3,47]	[2,43; 3,15]	[4,20; 5,17]	[4,08; 5,06]	[4,19; 5,21]	[2,71; 3,58]	[2,16; 2,97]	[1,62; 2,35]	[1,52; 2,26]	[1,63; 2,40]	[1,68; 2,49]	[1,53; 2,32]	[1,69; 2,53]				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		496	365	222	328	315	290	193	148	116	119	92	95	90	118					
		Anteil in %		4,96	4,21	2,97	4,88	5,00	4,86	3,39	2,74	2,28	2,45	1,98	2,14	2,12	2,91					
		CI Anteil in %		[4,53; 5,38]	[3,79; 4,63]	[2,59; 3,36]	[4,37; 5,40]	[4,46; 5,54]	[4,31; 5,40]	[2,92; 3,86]	[2,31; 3,18]	[1,87; 2,69]	[2,02; 2,89]	[1,58; 2,38]	[1,71; 2,57]	[1,69; 2,56]	[2,39; 3,43]					
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		776	464	544	512	476	308	215	165	160	135	145	140	129						
		Anteil in %		6,17	4,29	5,70	5,74	5,67	3,89	2,88	2,37	2,43	2,15	2,43	2,45	2,38						
		CI Anteil in %		[5,75; 6,59]	[3,91; 4,67]	[5,24; 6,17]	[5,26; 6,23]	[5,18; 6,17]	[3,47; 4,32]	[2,50; 3,26]	[2,01; 2,73]	[2,05; 2,80]	[1,80; 2,51]	[2,04; 2,82]	[2,05; 2,85]	[1,97; 2,78]						
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		464	657	527	491	321	212	226	178	155	163	136	188							
		Anteil in %		4,09	6,64	5,78	5,74	4,00	2,80	3,20	2,67	2,44	2,70	2,38	3,44							
		CI Anteil in %		[3,73; 4,45]	[6,15; 7,13]	[5,30; 6,26]	[5,25; 6,24]	[3,57; 4,42]	[2,42; 3,17]	[2,79; 3,62]	[2,28; 3,06]	[2,06; 2,82]	[2,29; 3,11]	[1,98; 2,77]	[2,96; 3,93]							
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		572	547	461	400	241	198	216	172	167	168	186								
		Anteil in %		5,49	5,82	5,30	4,89	3,15	2,79	3,22	2,71	2,77	2,91	3,39								
		CI Anteil in %		[5,05; 5,93]	[5,35; 6,30]	[4,83; 5,77]	[4,42; 5,36]	[2,76; 3,54]	[2,41; 3,18]	[2,80; 3,65]	[2,31; 3,11]	[2,36; 3,18]	[2,48; 3,35]	[2,91; 3,87]								
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		364	389	568	392	355	336	300	326	328	351									
		Anteil in %		3,10	3,61	5,70	4,22	4,14	4,17	3,94	4,48	4,75	5,37									
		CI Anteil in %		[2,78; 3,41]	[3,26; 3,97]	[5,25; 6,16]	[3,81; 4,62]	[3,72; 4,56]	[3,74; 4,61]	[3,50; 4,37]	[4,01; 4,96]	[4,25; 5,25]	[4,83; 5,92]									
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		257	474	275	191	206	196	209	171	217										
		Anteil in %		2,50	5,04	3,18	2,42	2,78	2,82	3,18	2,75	3,69										
		CI Anteil in %		[2,20; 2,80]	[4,60; 5,48]	[2,81; 3,55]	[2,09; 2,76]	[2,41; 3,16]	[2,43; 3,20]	[2,76; 3,61]	[2,34; 3,16]	[3,21; 4,18]										
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		449	295	201	204	168	186	163	223											
		Anteil in %		4,70	3,38	2,57	2,80	2,45	2,87	2,65	3,82											
		CI Anteil in %		[4,28; 5,13]	[3,00; 3,76]	[2,22; 2,92]	[2,42; 3,18]	[2,08; 2,81]	[2,46; 3,27]	[2,25; 3,05]	[3,33; 4,31]											
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		145	116	107	83	93	102	134												
		Anteil in %		2,37	2,14	2,16	1,78	2,12	2,46	3,41												
		CI Anteil in %		[1,99; 2,75]	[1,75; 2,52]	[1,75; 2,56]	[1,40; 2,16]	[1,70; 2,55]	[1,99; 2,93]	[2,84; 3,98]												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		189	155	127	138	119	144													
		Anteil in %		2,33	2,13	1,91	2,23	2,04	2,63													
		CI Anteil in %		[2,00; 2,66]	[1,80; 2,46]	[1,58; 2,23]	[1,86; 2,59]	[1,68; 2,41]	[2,21; 3,05]													

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		112	104	111	94	99												
		Anteil in %		1,69	1,73	2,02	1,85	2,09												
		CI Anteil in %		[1,38; 2,00]	[1,40; 2,07]	[1,65; 2,39]	[1,48; 2,22]	[1,68; 2,49]												
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		114	142	132	143													
		Anteil in %		1,47	2,02	2,06	2,41													
		CI Anteil in %		[1,20; 1,74]	[1,69; 2,35]	[1,71; 2,41]	[2,02; 2,80]													
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		100	98	140														
		Anteil in %		1,38	1,51	2,36														
		CI Anteil in %		[1,11; 1,65]	[1,21; 1,81]	[1,97; 2,75]														
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		146	170															
		Anteil in %		1,92	2,48															
		CI Anteil in %		[1,61; 2,22]	[2,11; 2,85]															
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		146																
		Anteil in %		2,19																
		CI Anteil in %		[1,84; 2,55]																
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		

## Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer

In Tabelle 2.1. ist dargestellt, wie viele **Leistungserbringer**, d.h. Ärzte bzw. stationäre Einrichtungen sich jeweils zum Stichtag 30.6. und 31.12. eines Jahres an der Behandlung der DMP-Teilnehmer in Hessen beteiligten und wie viele eingeschriebene Versicherte rechnerisch auf einen Leistungserbringer entfielen. Diese Angaben werden von den Krankenkassen gesondert zur Verfügung gestellt und gelten kassenartenübergreifend.

Gemäß den Evaluationskriterien des BVA sollten folgende Leistungserbringer ausgewiesen werden:

- Hausärzte
- diabetologische Schwerpunktpraxen (Diabetologisch qualifizierte Fachärzte)
- Koordinierende diabetologisch qualifizierte Fachärzte
- Diabetologisch qualifizierte Krankenhäuser
- Diabetologisch qualifizierte Rehabilitationseinrichtungen

Die Evaluationskriterien des BVA sehen zusätzlich vor, dass für alle ausgewiesenen Leistungserbringer ergänzend dargestellt wird, wie viele Versicherte rechnerisch auf einen Leistungserbringer entfielen. Vor dem 31.12.2003 lagen keine Daten vor.

**Tabelle 2.1 Leistungserbringer \***

EZ		zum Stich- tag 30.06.2003	zum Stich- tag 31.12.2003	zum Stich- tag 30.06.2004	zum Stich- tag 31.12.2004	zum Stich- tag 30.06.2005	zum Stich- tag 31.12.2005	zum Stich- tag 30.06.2006	zum Stich- tag 31.12.2006	zum Stich- tag 30.06.2007	zum Stich- tag 31.12.2007	zum Stich- tag 30.06.2008	zum Stich- tag 31.12.2008	zum Stich- tag 30.06.2009	zum Stich- tag 31.12.2009	zum Stich- tag 30.06.2010	zum Stich- tag 31.12.2010	zum Stich- tag 30.06.2011	zum Stich- tag 31.12.2011	zum Stich- tag 30.06.2012
Hausärzte	Anzahl Leistungserbringer	--	1792	2165	2725	2914	3034	3117	3198	3271	3231	3375	3615	3459	3509	3526	3735	3366	3366	3398
	Veränderung**, absolut	--		373	560	189	120	83	81	73	-40	144	240	-156	50	17	209	-369	0	32
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--	5,26	11,30	16,76	23,62	28,98	34,40	36,64	39,87	45,48	49,13	45,02	47,91	55,15	55,51	54,53	62,44	64,51	64,76
diabetologische Schwerpunktpraxen*** (diabetologisch qualifizierte Fachärzte)	Anzahl Leistungserbringer	--	66	90	104	106	106	110	100	106	107	111	145	40	41	41	51	69	70	72
	Veränderung**, absolut	--		24	14	2	0	4	-10	6	1	4	34	-105	1	0	10	18	1	2
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--	142,86	271,82	439,07	649,30	829,41	974,70	1171,68	1230,41	1373,33	1493,94	1122,35	4143,43	4719,68	4773,85	3993,76	3045,77	3102,01	3056,44
davon koordinierende diabetologisch qualifizierte Fachärzte	Anzahl Leistungserbringer	--	65	89	104	106	106	110	100	106	106	111	145	40	41	41	48	66	70	72
	Veränderung**, absolut	--		24	15	2	0	4	-10	6	0	5	34	-105	1	0	7	18	4	2
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--	145,06	274,88	439,07	649,30	829,41	974,70	1171,68	1230,41	1386,28	1493,94	1122,35	4143,43	4719,68	4773,85	4243,38	3184,21	3102,01	3056,44
diabetologisch qualifizierte Krankenhäuser	Anzahl Leistungserbringer	--	0	21	28	32	33	33	33	34	30	30	30	30	30	30	30	14	14	14
	Veränderung**, absolut	--		21	7	4	1	0	0	1	-4	0	0	0	0	0	0	-16	0	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--	0,00	1164,95	1630,82	2150,81	2664,15	3249,00	3550,55	3835,97	4898,20	5527,57	5424,70	5524,57	6450,23	6524,27	6789,40	15011,29	15510,07	15718,86
diabetologisch qualifizierte Rehabilitationseinrichtungen	Anzahl Leistungserbringer	--	0	1	3	3	4	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Veränderung**, absolut	--		1	2	0	1	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	--	0,00	24464,00	15221,00	22942,00	21979,25	26804,25	16738,29	32605,75	36736,50	41456,75	40685,25	41434,25	48376,75	48932,00	50920,50	52539,50	54285,25	55016,00
zum Vergleich: eingeschriebene Versicherte lt. KM 6/2		--	9429	24464	45663	68826	87917	107217	117168	130423	146946	165827	162741	165737	193507	195728	203682	210158	217141	220064

\* Die Daten zu den Leistungserbringern werden von der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV), bzw. vom Vertragspartner geliefert. Sollten Leistungserbringerzahlen dieses Berichtes geringfügig von den Zahlen vorhergehender Berichte abweichen, so ist dies in unterschiedlichen Zugriffszeitpunkten auf die KV Daten begründet.

\*\* Veränderung gegenüber dem vorangegangenen Stichtag.

\*\*\* Die Anzahl der diabetologischen Schwerpunktpraxen entspricht der vom vdek übermittelten Anzahl der diabetologisch qualifizierten Fachärzte.

### **Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung**

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

#### **Risikofaktoren**

- Gewichtsentwicklung (BMI)
- Raucherstatus
- Hypertonus

#### **Laborwerte**

- HbA1c-Werte
- Serum-Kreatinin-Werte

#### **Medikation**

- Medikation nach Medikamentengruppen

#### **Prozessparameter**

- Diabetes-Schulungen
- Hypertonie-Schulung
- Ophthalmologische Netzhautuntersuchung

#### **Ereigniszeitanalysen: Neu auftretende Begleit- und Folgeerkrankungen, Endpunktfreiheit**

- Erblindung
- Diabetische Nephropathie
- Erheblich auffälliger Fußstatus
- Amputation
- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Nierenersatztherapie
- Überlebensraten bei primären und sekundären Endpunkten



### 3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu drei Variablen dargestellt. Zunächst werden Angaben zur Gewichtsentwicklung anhand des Body-Mass-Index (BMI) dargestellt. Der BMI wird durch den Quotienten aus Körpergewicht in kg und Körpergröße in m im Quadrat errechnet ( $\text{kg}/\text{m}^2$ ). BMI-Werte unter  $25 \text{ kg}/\text{m}^2$  sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und  $30 \text{ kg}/\text{m}^2$  als leicht übergewichtig und BMI-Werte über  $30 \text{ kg}/\text{m}^2$  als übergewichtig (adipös) zu werten.

Anschließend werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortality ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle 3.1.1 ist die Entwicklung des **Body-Mass-Index** ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnung, Differenzbildung und Kategorienbildung. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen BMI im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei nicht um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen (plausible) Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtsjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Abschließend werden die Patientenzahlen in den BMI-Kategorien (normalgewichtig, leicht übergewichtig, übergewichtig) dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 14 Patienten in das Programm eingeschrieben. In die folgenden Auswertungen konnten 14 Patienten einbezogen werden. Im Beitrittsjahr waren 2 Prozent der Patienten aus der Kohorte 2003-1 normal- oder untergewichtig, 7 Prozent leicht übergewichtig und 5 Prozent übergewichtig. Im letzten Berichtshalbjahr sind in dieser Kohorte von - - Patienten mit Angaben zum BMI - - Prozent normal- oder untergewichtig, - - Prozent leicht übergewichtig und - - Prozent übergewichtig.

**Tabelle 3.1.1 Patienten und ihr Body-Mass-Index**

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
	auswertbar	Anzahl	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	29,03	22,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		CI Mean	[26,59; 31,48]	[14,24; 30,48]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Median	29,41	22,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Fallbasis mittlere Differenz		2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI mittlere Differenz		[-0,41; - 0,36]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median mittlere Differenz		-0,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	14,29	50,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	[0,00; 33,31]	[0,00; 100,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	50,00	50,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		CI Anteil in %	[22,82; 77,18]	[0,00; 100,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	5	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	35,71	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
CI Anteil in %		[9,67; 61,76]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225					
	auswertbar	Anzahl	4843	3629	3284	2816	2437	2167	1968	1751	1673	1608	1585	1528	1466	1395	1349	1299	1251	1174					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,15	30,26	30,32	30,37	30,26	30,32	30,24	30,31	30,19	30,27	30,20	30,25	30,05	30,11	30,15	30,09	29,99	30,02					
		CI Mean	[29,99; 30,30]	[30,09; 30,44]	[30,14; 30,51]	[30,17; 30,57]	[30,04; 30,47]	[30,10; 30,55]	[30,01; 30,47]	[30,06; 30,56]	[29,94; 30,44]	[30,01; 30,53]	[29,94; 30,47]	[29,99; 30,50]	[29,79; 30,32]	[29,83; 30,38]	[29,86; 30,43]	[29,80; 30,38]	[29,70; 30,29]	[29,71; 30,33]					
		Median	29,38	29,67	29,64	29,73	29,41	29,67	29,68	29,69	29,43	29,59	29,41	29,48	29,38	29,37	29,38	29,30	29,09	29,28					
		Fallbasis mittlere Differenz		3628	3283	2815	2436	2166	1967	1750	1672	1607	1584	1527	1465	1394	1348	1298	1250	1173					
		Mittlere Differenz zur ED		0,04	0,08	0,09	-0,02	0,09	-0,01	0,03	-0,10	-0,04	-0,09	-0,07	-0,20	-0,15	-0,07	-0,14	-0,21	-0,20					
		CI mittlere Differenz		[-0,01; 0,09]	[0,01; 0,16]	[0,00; 0,17]	[-0,11; 0,07]	[-0,01; 0,19]	[-0,11; 0,10]	[-0,10; 0,16]	[-0,23; 0,03]	[-0,18; 0,10]	[-0,24; 0,07]	[-0,22; 0,07]	[-0,36; - 0,04]	[-0,31; 0,02]	[-0,24; 0,09]	[-0,31; 0,03]	[-0,39; - 0,04]	[-0,39; 0,00]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	718	523	453	393	333	286	258	238	230	221	222	211	222	201	202	199	202	184					
		Anteil in %	14,83	14,41	13,79	13,96	13,66	13,20	13,11	13,59	13,75	13,74	14,01	13,81	15,14	14,41	14,97	15,32	16,15	15,67					
		CI Anteil in %	[13,82; 15,83]	[13,27; 15,55]	[12,61; 14,97]	[12,68; 15,24]	[12,30; 15,03]	[11,77; 14,62]	[11,62; 14,60]	[11,99; 15,20]	[12,10; 15,40]	[12,06; 15,43]	[12,30; 15,72]	[12,08; 15,54]	[13,31; 16,98]	[12,57; 16,25]	[13,07; 16,88]	[13,36; 17,28]	[14,11; 18,19]	[13,59; 17,75]					
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	1933	1412	1290	1086	983	849	792	686	675	637	639	614	600	572	548	515	498	481					
		Anteil in %	39,91	38,91	39,28	38,57	40,34	39,18	40,24	39,18	40,35	39,61	40,32	40,18	40,93	41,00	40,62	39,65	39,81	40,97					
		CI Anteil in %	[38,53; 41,29]	[37,32; 40,50]	[37,61; 40,95]	[36,77; 40,36]	[38,39; 42,28]	[37,12; 41,23]	[38,08; 42,41]	[36,89; 41,46]	[38,00; 42,70]	[37,22; 42,01]	[37,90; 42,73]	[37,72; 42,64]	[38,41; 43,45]	[38,42; 43,59]	[38,00; 43,24]	[36,98; 42,31]	[37,09; 42,52]	[38,16; 43,79]					
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	2192	1694	1541	1337	1121	1032	918	827	768	750	724	703	644	622	599	585	551	509					
		Anteil in %	45,26	46,68	46,92	47,48	46,00	47,62	46,65	47,23	45,91	46,64	45,68	46,01	43,93	44,59	44,40	45,03	44,04	43,36					
CI Anteil in %		[43,86; 46,66]	[45,06; 48,30]	[45,22; 48,63]	[45,63; 49,32]	[44,02; 47,98]	[45,52; 49,73]	[44,44; 48,85]	[44,89; 49,57]	[43,52; 48,29]	[44,20; 49,08]	[43,23; 48,13]	[43,51; 48,51]	[41,39; 46,47]	[41,98; 47,20]	[41,75; 47,06]	[42,33; 47,74]	[41,29; 46,80]	[40,52; 46,19]						

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293			
	auswertbar	Anzahl	12018	8985	7953	6905	6224	5561	4862	4601	4451	4388	4217	4025	3846	3714	3527	3364	3171			
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,25	30,29	30,31	30,21	30,28	30,23	30,25	30,28	30,30	30,26	30,26	30,25	30,30	30,26	30,27	30,21	30,22		
		CI Mean		[30,15; 30,35]	[30,17; 30,40]	[30,19; 30,43]	[30,08; 30,34]	[30,14; 30,42]	[30,08; 30,38]	[30,10; 30,41]	[30,12; 30,44]	[30,13; 30,46]	[30,10; 30,43]	[30,09; 30,43]	[30,08; 30,43]	[30,12; 30,48]	[30,08; 30,44]	[30,09; 30,46]	[30,02; 30,39]	[30,02; 30,42]		
		Median		29,40	29,40	29,41	29,39	29,41	29,39	29,40	29,38	29,39	29,40	29,41	29,40	29,41	29,40	29,39	29,40	29,38	29,38	
		Fallbasis mittlere Differenz			8971	7938	6892	6213	5551	4853	4593	4443	4380	4209	4019	3840	3708	3521	3359	3166		
		Mittlere Differenz zur ED			-0,02	-0,03	-0,12	-0,07	-0,14	-0,16	-0,18	-0,19	-0,25	-0,25	-0,29	-0,25	-0,32	-0,33	-0,39	-0,35		
		CI mittlere Differenz			[-0,07; 0,02]	[-0,08; 0,02]	[-0,17; - 0,06]	[-0,12; - 0,01]	[-0,20; - 0,07]	[-0,23; - 0,10]	[-0,26; - 0,10]	[-0,27; - 0,12]	[-0,34; - 0,17]	[-0,34; - 0,16]	[-0,38; - 0,19]	[-0,35; - 0,16]	[-0,42; - 0,22]	[-0,44; - 0,23]	[-0,49; - 0,28]	[-0,46; - 0,23]		
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,33	-0,35	-0,35		
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1754	1319	1106	993	898	828	728	690	670	667	637	624	573	566	533	516	504		
		Anteil in %		14,59	14,68	13,91	14,38	14,43	14,89	14,97	15,00	15,05	15,20	15,11	15,50	14,90	15,24	15,11	15,34	15,89		
		CI Anteil in %		[13,96; 15,23]	[13,95; 15,41]	[13,15; 14,67]	[13,55; 15,21]	[13,55; 15,30]	[13,95; 15,83]	[13,97; 15,98]	[13,96; 16,03]	[14,00; 16,10]	[14,14; 16,26]	[14,02; 16,19]	[14,38; 16,62]	[13,77; 16,02]	[14,08; 16,40]	[13,93; 16,29]	[14,12; 16,56]	[14,62; 17,17]		
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		4752	3548	3156	2801	2498	2219	1899	1811	1743	1711	1653	1562	1501	1458	1379	1323	1232		
		Anteil in %		39,54	39,49	39,68	40,56	40,13	39,90	39,06	39,36	39,16	38,99	39,20	38,81	39,03	39,26	39,10	39,33	38,85		
		CI Anteil in %		[38,67; 40,41]	[38,48; 40,50]	[38,61; 40,76]	[39,41; 41,72]	[38,92; 41,35]	[38,62; 41,19]	[37,69; 40,43]	[37,95; 40,77]	[37,73; 40,59]	[37,55; 40,44]	[37,72; 40,67]	[37,30; 40,31]	[37,49; 40,57]	[37,69; 40,83]	[37,49; 40,71]	[37,68; 40,98]	[37,16; 40,55]		
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		5512	4118	3691	3111	2828	2514	2235	2100	2038	2010	1927	1839	1772	1690	1615	1525	1435		
		Anteil in %		45,86	45,83	46,41	45,05	45,44	45,21	45,97	45,64	45,79	45,81	45,70	45,69	46,07	45,50	45,79	45,33	45,25		
		CI Anteil in %		[44,97; 46,76]	[44,80; 46,86]	[45,31; 47,51]	[43,88; 46,23]	[44,20; 46,67]	[43,90; 46,52]	[44,57; 47,37]	[44,20; 47,08]	[44,32; 47,25]	[44,33; 47,28]	[44,19; 47,20]	[44,15; 47,23]	[44,50; 47,65]	[43,90; 47,11]	[44,15; 47,43]	[43,65; 47,02]	[43,52; 46,99]		
	2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409			
		auswertbar	Anzahl	15029	11704	10206	8850	7765	6907	6609	6258	6021	5761	5459	5178	4941	4727	4532	4307			
		Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,44	30,48	30,37	30,41	30,32	30,37	30,33	30,36	30,33	30,31	30,28	30,30	30,29	30,28	30,27	30,22		
			CI Mean		[30,35; 30,53]	[30,38; 30,58]	[30,26; 30,48]	[30,29; 30,53]	[30,20; 30,45]	[30,24; 30,50]	[30,19; 30,46]	[30,22; 30,50]	[30,18; 30,47]	[30,16; 30,45]	[30,13; 30,43]	[30,14; 30,45]	[30,13; 30,45]	[30,11; 30,44]	[30,10; 30,43]	[30,05; 30,38]		
			Median		29,71	29,74	29,69	29,71	29,65	29,64	29,59	29,64	29,43	29,41	29,41	29,41	29,41	29,40	29,41	29,41		
			Fallbasis mittlere Differenz			11699	10201	8843	7760	6904	6606	6256	6019	5759	5458	5177	4940	4726	4531	4306		
Mittlere Differenz zur ED					0,03	-0,05	-0,03	-0,16	-0,13	-0,16	-0,19	-0,23	-0,26	-0,29	-0,30	-0,28	-0,33	-0,37	-0,41			
CI mittlere Differenz					[-0,01; 0,08]	[-0,10; 0,00]	[-0,08; 0,02]	[-0,21; - 0,10]	[-0,19; - 0,07]	[-0,22; - 0,09]	[-0,26; - 0,12]	[-0,30; - 0,16]	[-0,33; - 0,18]	[-0,37; - 0,21]	[-0,38; - 0,22]	[-0,37; - 0,19]	[-0,42; - 0,24]	[-0,46; - 0,28]	[-0,50; - 0,32]			
Median mittlere Differenz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,32	-0,34			
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		2121	1672	1473	1275	1125	971	944	927	895	846	817	762	718	696	657	641			
		Anteil in %		14,11	14,29	14,43	14,41	14,49	14,06	14,28	14,81	14,86	14,68	14,97	14,72	14,53	14,72	14,50	14,88			
		CI Anteil in %		[13,56; 14,67]	[13,65; 14,92]	[13,75; 15,11]	[13,68; 15,14]	[13,71; 15,27]	[13,24; 14,88]	[13,44; 15,13]	[13,93; 15,69]	[13,97; 15,76]	[13,77; 15,60]	[14,02; 15,91]	[13,75; 15,68]	[13,55; 15,51]	[13,71; 15,73]	[13,47; 15,52]	[13,82; 15,95]			
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		5726	4401	3875	3341	2986	2684	2578	2371	2313	2238	2091	2009	1942	1845	1781	1676			
		Anteil in %		38,10	37,60	37,97	37,75	38,45	38,86	39,01	37,89	38,42	38,85	38,30	38,80	39,30	39,03	39,30	38,91			
		CI Anteil in %		[37,32; 38,88]	[36,72; 38,48]	[37,03; 38,91]	[36,74; 38,76]	[37,37; 39,54]	[37,71; 40,01]	[37,83; 40,18]	[36,69; 39,09]	[37,19; 39,64]	[37,59; 40,11]	[37,01; 39,59]	[37,47; 40,13]	[37,94; 40,67]	[37,64; 40,42]	[37,88; 40,72]	[37,46; 40,37]			
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		7182	5631	4858	4234	3654	3252	3087	2960	2813	2677	2551	2407	2281	2186	2094	1990			
		Anteil in %		47,79	48,11	47,60	47,84	47,06	47,08	46,71	47,30	46,72	46,47	46,73	46,49	46,16	46,24	46,20	46,20			
		CI Anteil in %		[46,99; 48,59]	[47,21; 49,02]	[46,63; 48,57]	[46,80; 48,88]	[45,95; 48,17]	[45,91; 48,26]	[45,51; 47,91]	[46,06; 48,54]	[45,46; 47,98]	[45,18; 47,76]	[45,41; 48,05]	[45,13; 47,84]	[44,77; 47,55]	[44,82; 47,67]	[44,75; 47,66]	[44,71; 47,69]			

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053					
	auswertbar	Anzahl	11622	9457	8264	7209	6365	5956	5656	5459	5211	4932	4693	4519	4309	4118	3908					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,55	30,42	30,44	30,33	30,41	30,40	30,37	30,33	30,34	30,32	30,39	30,35	30,35	30,37	30,36				
		CI Mean		[30,45; 30,65]	[30,31; 30,53]	[30,32; 30,55]	[30,21; 30,46]	[30,27; 30,54]	[30,26; 30,53]	[30,23; 30,52]	[30,18; 30,47]	[30,19; 30,49]	[30,16; 30,47]	[30,23; 30,54]	[30,18; 30,51]	[30,19; 30,52]	[30,20; 30,54]	[30,19; 30,54]				
		Median		29,75	29,71	29,71	29,64	29,64	29,69	29,64	29,41	29,41	29,41	29,54	29,41	29,59	29,41	29,41				
		Fallbasis mittlere Differenz			9446	8254	7202	6359	5950	5651	5454	5206	4927	4688	4514	4304	4114	3904				
		Mittlere Differenz zur ED			-0,11	-0,10	-0,17	-0,13	-0,16	-0,20	-0,30	-0,29	-0,31	-0,28	-0,35	-0,38	-0,42	-0,44				
		CI mittlere Differenz			[-0,15; - 0,07]	[-0,15; - 0,05]	[-0,23; - 0,12]	[-0,19; - 0,07]	[-0,22; - 0,10]	[-0,27; - 0,13]	[-0,37; - 0,22]	[-0,36; - 0,22]	[-0,38; - 0,24]	[-0,35; - 0,20]	[-0,43; - 0,27]	[-0,46; - 0,30]	[-0,51; - 0,33]	[-0,52; - 0,35]				
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,31	-0,33	-0,34	-0,34				
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1514	1313	1129	1043	911	860	821	803	776	721	688	681	653	620	580				
		Anteil in %		13,03	13,88	13,66	14,47	14,31	14,44	14,52	14,71	14,89	14,62	14,66	15,07	15,15	15,06	14,84				
		CI Anteil in %		[12,42; 13,64]	[13,19; 14,58]	[12,92; 14,40]	[13,66; 15,28]	[13,45; 15,17]	[13,55; 15,33]	[13,60; 15,43]	[13,77; 15,65]	[13,92; 15,86]	[13,63; 15,60]	[13,65; 15,67]	[14,03; 16,11]	[14,08; 16,23]	[13,96; 16,15]	[13,73; 15,96]				
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		4436	3617	3167	2751	2436	2277	2157	2095	1989	1925	1802	1711	1611	1554	1492				
		Anteil in %		38,17	38,25	38,32	38,16	38,27	38,23	38,14	38,38	38,17	39,03	38,40	37,86	37,39	37,74	38,18				
		CI Anteil in %		[37,29; 39,05]	[37,27; 39,23]	[37,27; 39,37]	[37,04; 39,28]	[37,08; 39,47]	[37,00; 39,46]	[36,87; 39,40]	[37,09; 39,67]	[36,85; 39,49]	[37,67; 40,39]	[37,01; 39,79]	[36,45; 39,28]	[35,94; 38,83]	[36,26; 39,22]	[36,65; 39,70]				
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		5672	4527	3968	3415	3018	2819	2678	2561	2446	2286	2203	2127	2045	1944	1836				
		Anteil in %		48,80	47,87	48,02	47,37	47,42	47,33	47,35	46,91	46,94	46,35	46,94	47,07	47,46	47,21	46,98				
		CI Anteil in %		[47,90; 49,71]	[46,86; 48,88]	[46,94; 49,09]	[46,22; 48,52]	[46,19; 48,64]	[46,06; 48,60]	[46,05; 48,65]	[45,59; 48,24]	[45,58; 48,29]	[44,96; 47,74]	[45,51; 48,37]	[45,61; 48,52]	[45,97; 48,95]	[45,68; 48,73]	[45,42; 48,55]				
	2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422					
		auswertbar	Anzahl	14196	11730	10297	8943	8355	7873	7556	7194	6748	6395	6086	5786	5529	5253					
		Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,47	30,58	30,46	30,52	30,50	30,52	30,48	30,54	30,49	30,50	30,49	30,49	30,44	30,42				
CI Mean				[30,37; 30,56]	[30,48; 30,69]	[30,35; 30,57]	[30,40; 30,64]	[30,38; 30,63]	[30,39; 30,64]	[30,35; 30,61]	[30,40; 30,67]	[30,35; 30,63]	[30,36; 30,64]	[30,34; 30,63]	[30,35; 30,64]	[30,29; 30,59]	[30,27; 30,58]					
Median				29,69	29,74	29,67	29,73	29,72	29,71	29,69	29,69	29,62	29,65	29,64	29,64	29,59	29,55					
Fallbasis mittlere Differenz					11717	10284	8935	8347	7865	7547	7185	6739	6386	6078	5778	5523	5248					
Mittlere Differenz zur ED					0,06	-0,04	-0,04	-0,10	-0,07	-0,14	-0,10	-0,15	-0,16	-0,19	-0,20	-0,25	-0,28					
CI mittlere Differenz					[0,02; 0,11]	[-0,09; 0,00]	[-0,09; 0,01]	[-0,15; - 0,04]	[-0,13; - 0,01]	[-0,20; - 0,08]	[-0,16; - 0,04]	[-0,22; - 0,09]	[-0,23; - 0,09]	[-0,26; - 0,12]	[-0,28; - 0,13]	[-0,33; - 0,18]	[-0,37; - 0,20]					
Median mittlere Differenz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29					
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		2012	1639	1490	1284	1193	1144	1071	1009	951	898	853	848	791	767					
		Anteil in %		14,17	13,97	14,47	14,36	14,28	14,53	14,17	14,03	14,09	14,04	14,02	14,66	14,31	14,60					
		CI Anteil in %		[13,60; 14,75]	[13,35; 14,60]	[13,79; 15,15]	[13,63; 15,08]	[13,53; 15,03]	[13,75; 15,31]	[13,39; 14,96]	[13,22; 14,83]	[13,26; 14,92]	[13,19; 14,89]	[13,14; 14,89]	[13,74; 15,57]	[13,38; 15,23]	[13,65; 15,56]					
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		5398	4436	3934	3345	3155	2965	2886	2748	2600	2461	2349	2183	2121	1995					
		Anteil in %		38,02	37,82	38,21	37,40	37,76	37,66	38,19	38,20	38,53	38,48	38,60	37,73	38,36	37,98					
		CI Anteil in %		[37,23; 38,82]	[36,94; 38,70]	[37,27; 39,14]	[36,40; 38,41]	[36,72; 38,80]	[36,59; 38,73]	[37,10; 39,29]	[37,08; 39,32]	[37,37; 39,69]	[37,29; 39,68]	[37,37; 39,82]	[36,48; 38,98]	[37,08; 39,64]	[36,67; 39,29]					
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		6786	5655	4873	4314	4007	3764	3599	3437	3197	3036	2884	2755	2617	2491					
		Anteil in %		47,80	48,21	47,32	48,24	47,96	47,81	47,63	47,78	47,38	47,47	47,39	47,61	47,33	47,42					
		CI Anteil in %		[46,98; 48,62]	[47,31; 49,11]	[46,36; 48,29]	[47,20; 49,27]	[46,89; 49,03]	[46,71; 48,91]	[46,50; 48,76]	[46,62; 48,93]	[46,19; 48,57]	[46,25; 48,70]	[46,13; 48,64]	[46,33; 48,90]	[46,02; 48,65]	[46,07; 48,77]					

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459						
	auswertbar	Anzahl	13188	10819	9183	8527	7996	7654	7315	6756	6419	6131	5798	5515	5213						
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,73	30,60	30,64	30,59	30,61	30,59	30,62	30,58	30,61	30,55	30,59	30,59	30,60					
		CI Mean		[30,63; 30,83]	[30,49; 30,71]	[30,52; 30,76]	[30,47; 30,72]	[30,49; 30,74]	[30,46; 30,72]	[30,49; 30,75]	[30,45; 30,72]	[30,46; 30,75]	[30,40; 30,69]	[30,44; 30,74]	[30,44; 30,75]	[30,44; 30,76]					
		Median		29,80	29,74	29,75	29,74	29,73	29,73	29,74	29,73	29,73	29,72	29,74	29,75	29,74					
		Fallbasis mittlere Differenz			10802	9175	8519	7988	7647	7309	6749	6413	6126	5792	5511	5208					
		Mittlere Differenz zur ED			-0,13	-0,15	-0,22	-0,22	-0,26	-0,24	-0,29	-0,30	-0,35	-0,36	-0,38	-0,38					
		CI mittlere Differenz			[-0,18; - 0,09]	[-0,20; - 0,10]	[-0,28; - 0,16]	[-0,28; - 0,16]	[-0,32; - 0,20]	[-0,30; - 0,17]	[-0,36; - 0,22]	[-0,37; - 0,23]	[-0,43; - 0,28]	[-0,44; - 0,28]	[-0,46; - 0,29]	[-0,47; - 0,30]					
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,34					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1714	1492	1262	1185	1099	1029	992	937	886	878	847	781	766					
		Anteil in %		13,00	13,79	13,74	13,90	13,74	13,44	13,56	13,87	13,80	14,32	14,61	14,16	14,69					
		CI Anteil in %		[12,42; 13,57]	[13,14; 14,44]	[13,04; 14,45]	[13,16; 14,63]	[12,99; 14,50]	[12,68; 14,21]	[12,78; 14,35]	[13,04; 14,69]	[12,96; 14,65]	[13,44; 15,20]	[13,70; 15,52]	[13,24; 15,08]	[13,73; 15,66]					
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		4957	4098	3452	3206	3032	2931	2793	2569	2432	2318	2140	2060	1919					
		Anteil in %		37,59	37,88	37,59	37,60	37,92	38,29	38,18	38,03	37,89	37,81	36,91	37,35	36,81					
		CI Anteil in %		[36,76; 38,41]	[36,96; 38,79]	[36,60; 38,58]	[36,57; 38,63]	[36,86; 38,98]	[37,20; 39,38]	[37,07; 39,30]	[36,87; 39,18]	[36,70; 39,07]	[36,59; 39,02]	[35,67; 38,15]	[36,08; 38,63]	[35,50; 38,12]					
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		6517	5229	4469	4136	3865	3694	3530	3250	3101	2935	2811	2674	2528					
		Anteil in %		49,42	48,33	48,67	48,50	48,34	48,26	48,26	48,11	48,31	47,87	48,48	48,49	48,49					
		CI Anteil in %		[48,56; 50,27]	[47,39; 49,27]	[47,64; 49,69]	[47,44; 49,57]	[47,24; 49,43]	[47,14; 49,38]	[47,11; 49,40]	[46,91; 49,30]	[47,09; 49,53]	[46,62; 49,12]	[47,20; 49,77]	[47,17; 49,81]	[47,14; 49,85]					
	2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487						
		auswertbar	Anzahl	11688	9784	8788	8188	7711	7335	6804	6408	6097	5789	5529	5237						
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		30,59	30,63	30,56	30,58	30,53	30,53	30,58	30,63	30,59	30,58	30,60	30,56						
		CI Mean		[30,49; 30,70]	[30,51; 30,75]	[30,43; 30,68]	[30,45; 30,70]	[30,40; 30,66]	[30,40; 30,67]	[30,44; 30,72]	[30,49; 30,77]	[30,44; 30,74]	[30,43; 30,73]	[30,44; 30,75]	[30,40; 30,72]						
		Median		29,70	29,73	29,72	29,73	29,64	29,71	29,73	29,74	29,74	29,73	29,71	29,67						
		Fallbasis mittlere Differenz			9776	8781	8182	7706	7329	6799	6403	6092	5784	5524	5232						
		Mittlere Differenz zur ED			0,00	-0,04	-0,05	-0,12	-0,13	-0,18	-0,17	-0,21	-0,22	-0,25	-0,28						
		CI mittlere Differenz			[-0,05; 0,05]	[-0,09; 0,00]	[-0,10; 0,00]	[-0,18; - 0,06]	[-0,20; - 0,07]	[-0,25; - 0,12]	[-0,24; - 0,10]	[-0,28; - 0,14]	[-0,30; - 0,15]	[-0,32; - 0,17]	[-0,36; - 0,20]						
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		1627	1369	1251	1204	1145	1087	999	910	889	844	814	766						
		Anteil in %		13,92	13,99	14,24	14,70	14,85	14,82	14,68	14,20	14,58	14,58	14,72	14,63						
		CI Anteil in %		[13,29; 14,55]	[13,30; 14,68]	[13,50; 14,97]	[13,94; 15,47]	[14,06; 15,64]	[14,01; 15,63]	[13,84; 15,52]	[13,35; 15,06]	[13,70; 15,47]	[13,67; 15,49]	[13,79; 15,66]	[13,67; 15,58]						
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		4465	3704	3314	3024	2916	2720	2516	2405	2265	2153	2053	1970						
		Anteil in %		38,20	37,86	37,71	36,93	37,82	37,08	36,98	37,53	37,15	37,19	37,13	37,62						
		CI Anteil in %		[37,32; 39,08]	[36,90; 38,82]	[36,70; 38,72]	[35,89; 37,98]	[36,73; 38,90]	[35,98; 38,19]	[35,83; 38,13]	[36,35; 38,72]	[35,94; 38,36]	[35,95; 38,44]	[35,86; 38,41]	[36,30; 38,93]						
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		5596	4711	4223	3960	3650	3528	3289	3093	2943	2792	2662	2501						
		Anteil in %		47,88	48,15	48,05	48,36	47,33	48,10	48,34	48,27	48,27	48,23	48,15	47,76						
		CI Anteil in %		[46,97; 48,78]	[47,16; 49,14]	[47,01; 49,10]	[47,28; 49,45]	[46,22; 48,45]	[46,95; 49,24]	[47,15; 49,53]	[47,04; 49,49]	[47,02; 49,52]	[46,94; 49,52]	[46,83; 49,46]	[46,40; 49,11]						

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533								
	auswertbar	Anzahl	12990	11292	10283	9303	8816	8121	7632	7233	6856	6487	6108								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,74	30,61	30,66	30,63	30,67	30,69	30,75	30,69	30,67	30,66	30,71							
		CI Mean		[30,64; 30,84]	[30,50; 30,72]	[30,55; 30,77]	[30,51; 30,74]	[30,55; 30,79]	[30,56; 30,81]	[30,62; 30,88]	[30,56; 30,82]	[30,54; 30,81]	[30,52; 30,80]	[30,56; 30,85]							
		Median		29,90	29,75	29,76	29,76	29,86	29,96	30,04	30,00	29,97	29,90	30,04							
		Fallbasis mittlere Differenz			11279	10272	9293	8807	8112	7624	7226	6850	6481	6102							
		Mittlere Differenz zur ED			-0,13	-0,12	-0,22	-0,20	-0,22	-0,18	-0,28	-0,28	-0,32	-0,33							
		CI mittlere Differenz			[-0,18; - 0,09]	[-0,17; - 0,07]	[-0,27; - 0,17]	[-0,26; - 0,15]	[-0,28; - 0,16]	[-0,24; - 0,12]	[-0,34; - 0,21]	[-0,35; - 0,21]	[-0,39; - 0,25]	[-0,40; - 0,26]							
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1729	1597	1395	1295	1187	1089	1013	966	928	863	798							
		Anteil in %		13,31	14,14	13,57	13,92	13,46	13,41	13,27	13,36	13,54	13,30	13,06							
		CI Anteil in %		[12,73; 13,89]	[13,50; 14,79]	[12,90; 14,23]	[13,22; 14,62]	[12,75; 14,18]	[12,67; 14,15]	[12,51; 14,03]	[12,57; 14,14]	[12,73; 14,35]	[12,48; 14,13]	[12,22; 13,91]							
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		4835	4215	3866	3458	3273	2992	2782	2651	2515	2416	2244							
		Anteil in %		37,22	37,33	37,60	37,17	37,13	36,84	36,45	36,65	36,68	37,24	36,74							
		CI Anteil in %		[36,39; 38,05]	[36,44; 38,22]	[36,66; 38,53]	[36,19; 38,15]	[36,12; 38,13]	[35,79; 37,89]	[35,37; 37,53]	[35,54; 37,76]	[35,54; 37,82]	[36,07; 38,42]	[35,53; 37,95]							
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		6426	5480	5022	4550	4356	4040	3837	3616	3413	3208	3066							
		Anteil in %		49,47	48,53	48,84	48,91	49,41	49,75	50,28	49,99	49,78	49,45	50,20							
		CI Anteil in %		[48,61; 50,33]	[47,61; 49,45]	[47,87; 49,80]	[47,89; 49,92]	[48,37; 50,45]	[48,66; 50,84]	[49,15; 51,40]	[48,84; 51,15]	[48,60; 50,96]	[48,24; 50,67]	[48,94; 51,45]							
	2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873								
		auswertbar	Anzahl	11244	9942	8855	8290	7613	7125	6701	6294	5982	5599								
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		30,70	30,69	30,64	30,64	30,70	30,71	30,67	30,69	30,64	30,61								
		CI Mean		[30,59; 30,81]	[30,58; 30,81]	[30,52; 30,76]	[30,52; 30,77]	[30,57; 30,83]	[30,57; 30,84]	[30,54; 30,81]	[30,55; 30,84]	[30,49; 30,78]	[30,46; 30,76]								
		Median		29,76	29,76	29,75	29,75	29,80	29,94	29,90	29,94	29,76	29,76								
		Fallbasis mittlere Differenz			9935	8849	8284	7608	7122	6698	6292	5980	5597								
		Mittlere Differenz zur ED			-0,05	-0,17	-0,14	-0,16	-0,16	-0,21	-0,21	-0,28	-0,31								
		CI mittlere Differenz			[-0,09; 0,00]	[-0,22; - 0,12]	[-0,20; - 0,09]	[-0,22; - 0,10]	[-0,22; - 0,10]	[-0,28; - 0,15]	[-0,28; - 0,14]	[-0,35; - 0,22]	[-0,39; - 0,24]								
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		1508	1349	1230	1138	1038	957	913	853	828	763								
		Anteil in %		13,41	13,57	13,89	13,73	13,63	13,43	13,62	13,55	13,84	13,63								
		CI Anteil in %		[12,78; 14,04]	[12,90; 14,24]	[13,17; 14,61]	[12,99; 14,47]	[12,86; 14,41]	[12,64; 14,22]	[12,80; 14,45]	[12,71; 14,40]	[12,97; 14,72]	[12,73; 14,53]								
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		4205	3716	3310	3103	2815	2630	2477	2316	2219	2105								
		Anteil in %		37,40	37,38	37,38	37,43	36,98	36,91	36,96	36,80	37,09	37,60								
		CI Anteil in %		[36,50; 38,29]	[36,43; 38,33]	[36,37; 38,39]	[36,39; 38,47]	[35,89; 38,06]	[35,79; 38,03]	[35,81; 38,12]	[35,61; 37,99]	[35,87; 38,32]	[36,33; 38,86]								
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		5531	4877	4315	4049	3760	3538	3311	3125	2935	2731								
		Anteil in %		49,19	49,05	48,73	48,84	49,39	49,66	49,41	49,65	49,06	48,78								
		CI Anteil in %		[48,27; 50,11]	[48,07; 50,04]	[47,69; 49,77]	[47,77; 49,92]	[48,27; 50,51]	[48,50; 50,82]	[48,21; 50,61]	[48,42; 50,89]	[47,80; 50,33]	[47,47; 50,09]								

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839										
	auswertbar	Anzahl	10590	9004	8328	7531	6991	6609	6221	5924	5551										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	30,82	30,72	30,76	30,79	30,83	30,81	30,81	30,79	30,82										
		CI Mean	[30,71; 30,94]	[30,60; 30,84]	[30,64; 30,89]	[30,66; 30,93]	[30,69; 30,97]	[30,66; 30,95]	[30,66; 30,96]	[30,64; 30,94]	[30,67; 30,98]										
		Median	29,98	29,76	29,83	29,86	30,00	29,90	29,90	29,90	30,02										
		Fallbasis mittlere Differenz		8998	8322	7526	6986	6604	6215	5918	5545										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,15	-0,17	-0,16	-0,21	-0,21	-0,25	-0,25										
		CI mittlere Differenz		[-0,22; - 0,13]	[-0,20; - 0,10]	[-0,23; - 0,12]	[-0,22; - 0,10]	[-0,28; - 0,15]	[-0,28; - 0,15]	[-0,31; - 0,18]	[-0,32; - 0,18]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	1421	1271	1163	1031	945	905	860	808	750										
		Anteil in %	13,42	14,12	13,96	13,69	13,52	13,69	13,82	13,64	13,51										
		CI Anteil in %	[12,77; 14,07]	[13,40; 14,84]	[13,22; 14,71]	[12,91; 14,47]	[12,72; 14,32]	[12,86; 14,52]	[12,97; 14,68]	[12,77; 14,51]	[12,61; 14,41]										
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	3889	3334	3053	2778	2552	2422	2272	2175	2018										
		Anteil in %	36,72	37,03	36,66	36,89	36,50	36,65	36,52	36,72	36,35										
		CI Anteil in %	[35,81; 37,64]	[36,03; 38,03]	[35,62; 37,69]	[35,80; 37,98]	[35,38; 37,63]	[35,49; 37,81]	[35,32; 37,72]	[35,49; 37,94]	[35,09; 37,62]										
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	5280	4399	4112	3722	3494	3282	3089	2941	2783										
		Anteil in %	49,86	48,86	49,38	49,42	49,98	49,66	49,65	49,65	50,14										
		CI Anteil in %	[48,91; 50,81]	[47,82; 49,89]	[48,30; 50,45]	[48,29; 50,55]	[48,81; 51,15]	[48,45; 50,87]	[48,41; 50,90]	[48,37; 50,92]	[48,82; 51,45]										
	2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928										
		auswertbar	Anzahl	6818	5913	5258	4813	4535	4250	4010	3763										
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean	30,64	30,63	30,71	30,74	30,70	30,76	30,71	30,77											
		CI Mean	[30,50; 30,77]	[30,48; 30,77]	[30,55; 30,87]	[30,58; 30,90]	[30,53; 30,87]	[30,59; 30,93]	[30,54; 30,89]	[30,58; 30,95]											
		Median	29,74	29,74	29,75	29,76	29,75	29,77	29,76	29,94											
		Fallbasis mittlere Differenz		5912	5257	4811	4534	4249	4009	3762											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,06	-0,07	-0,04	-0,08	-0,10	-0,15	-0,12											
		CI mittlere Differenz		[-0,10; - 0,02]	[-0,12; - 0,02]	[-0,10; - 0,02]	[-0,15; - 0,02]	[-0,17; - 0,03]	[-0,22; - 0,08]	[-0,20; - 0,04]											
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl	936	807	716	608	585	537	503	459											
		Anteil in %	13,73	13,65	13,62	12,63	12,90	12,64	12,54	12,20											
		CI Anteil in %	[12,91; 14,55]	[12,77; 14,52]	[12,69; 14,54]	[11,69; 13,57]	[11,92; 13,88]	[11,64; 13,63]	[11,52; 13,57]	[11,15; 13,24]											
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	2571	2247	1976	1842	1737	1612	1527	1432											
		Anteil in %	37,71	38,00	37,58	38,27	38,30	37,93	38,08	38,05											
		CI Anteil in %	[36,56; 38,86]	[36,76; 39,24]	[36,27; 38,89]	[36,90; 39,64]	[36,89; 39,72]	[36,47; 39,39]	[36,58; 39,58]	[36,50; 39,61]											
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl	3311	2859	2566	2363	2213	2101	1980	1872											
		Anteil in %	48,56	48,35	48,80	49,10	48,80	49,44	49,38	49,75											
		CI Anteil in %	[47,38; 49,75]	[47,08; 49,62]	[47,45; 50,15]	[47,68; 50,51]	[47,34; 50,25]	[47,93; 50,94]	[47,83; 50,92]	[48,15; 51,35]											

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474														
	auswertbar	Anzahl	9310	7866	7074	6490	6018	5659	5287														
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,99	30,93	30,96	30,93	31,00	31,00	30,95													
		CI Mean		[30,86; 31,11]	[30,80; 31,07]	[30,82; 31,10]	[30,79; 31,08]	[30,85; 31,15]	[30,85; 31,16]	[30,80; 31,11]													
		Median		30,11	30,10	30,10	30,11	30,11	30,10	30,10													
		Fallbasis mittlere Differenz			7860	7068	6484	6014	5655	5283													
		Mittlere Differenz zur ED			-0,15	-0,18	-0,22	-0,19	-0,19	-0,19													
		CI mittlere Differenz			[-0,19; - 0,11]	[-0,22; - 0,13]	[-0,27; - 0,16]	[-0,24; - 0,13]	[-0,25; - 0,12]	[-0,26; - 0,12]													
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1232	1083	948	857	776	719	671													
		Anteil in %		13,23	13,77	13,40	13,20	12,89	12,71	12,69													
		CI Anteil in %		[12,54; 13,92]	[13,01; 14,53]	[12,61; 14,20]	[12,38; 14,03]	[12,05; 13,74]	[11,84; 13,57]	[11,79; 13,59]													
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		3309	2775	2519	2318	2166	2052	1911													
		Anteil in %		35,54	35,28	35,61	35,72	35,99	36,26	36,15													
		CI Anteil in %		[34,57; 36,51]	[34,22; 36,33]	[34,49; 36,73]	[34,55; 36,88]	[34,78; 37,20]	[35,01; 37,51]	[34,85; 37,44]													
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		4769	4008	3607	3315	3076	2888	2705													
		Anteil in %		51,22	50,95	50,99	51,08	51,11	51,03	51,16													
		CI Anteil in %		[50,21; 52,24]	[49,85; 52,06]	[49,82; 52,15]	[49,86; 52,29]	[49,85; 52,38]	[49,73; 52,34]	[49,82; 52,51]													
	2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747														
		auswertbar	Anzahl	7418	6467	5829	5333	4937	4602														
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		30,95	30,88	30,86	30,97	30,98	31,00														
		CI Mean		[30,81; 31,09]	[30,73; 31,02]	[30,71; 31,01]	[30,81; 31,13]	[30,82; 31,15]	[30,82; 31,17]														
		Median		30,07	30,07	30,04	30,11	30,09	30,09														
		Fallbasis mittlere Differenz			6463	5825	5329	4933	4599														
		Mittlere Differenz zur ED			-0,10	-0,10	-0,08	-0,06	-0,06														
		CI mittlere Differenz			[-0,14; - 0,06]	[-0,15; - 0,05]	[-0,13; - 0,02]	[-0,12; 0,01]	[-0,13; 0,01]														
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		1050	946	852	760	688	646														
		Anteil in %		14,15	14,63	14,62	14,25	13,94	14,04														
		CI Anteil in %		[13,36; 14,95]	[13,77; 15,49]	[13,71; 15,52]	[13,31; 15,19]	[12,97; 14,90]	[13,03; 15,04]														
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		2608	2254	2049	1835	1721	1613														
		Anteil in %		35,16	34,85	35,15	34,41	34,86	35,05														
		CI Anteil in %		[34,07; 36,24]	[33,69; 36,02]	[33,93; 36,38]	[33,13; 35,68]	[33,53; 36,19]	[33,67; 36,43]														
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		3760	3267	2928	2738	2528	2343														
		Anteil in %		50,69	50,52	50,23	51,34	51,21	50,91														
		CI Anteil in %		[49,55; 51,83]	[49,30; 51,74]	[48,95; 51,52]	[50,00; 52,68]	[49,81; 52,60]	[49,47; 52,36]														



EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942																		
	auswertbar	Anzahl	8631	7547	6815	6216	5740																		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,09	30,98	30,97	30,99	30,97																	
		CI Mean		[30,97; 31,22]	[30,85; 31,12]	[30,83; 31,11]	[30,84; 31,13]	[30,82; 31,12]																	
		Median		30,25	30,09	30,11	30,12	30,12																	
		Fallbasis mittlere Differenz			7540	6807	6209	5733																	
		Mittlere Differenz zur ED			-0,16	-0,18	-0,21	-0,21																	
		CI mittlere Differenz			[-0,20; - 0,12]	[-0,23; - 0,13]	[-0,26; - 0,15]	[-0,27; - 0,15]																	
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00																	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1064	962	854	738	688																	
		Anteil in %		12,33	12,75	12,53	11,87	11,99																	
		CI Anteil in %		[11,63; 13,02]	[11,99; 13,50]	[11,75; 13,32]	[11,07; 12,68]	[11,15; 12,83]																	
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		3056	2729	2460	2268	2079																	
		Anteil in %		35,41	36,16	36,10	36,49	36,22																	
		CI Anteil in %		[34,40; 36,42]	[35,08; 37,24]	[34,96; 37,24]	[35,29; 37,68]	[34,98; 37,46]																	
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		4511	3856	3501	3210	2973																	
		Anteil in %		52,27	51,09	51,37	51,64	51,79																	
		CI Anteil in %		[51,21; 53,32]	[49,97; 52,22]	[50,19; 52,56]	[50,40; 52,88]	[50,50; 53,09]																	
	2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929																		
		auswertbar	Anzahl	8039	7072	6333	5744																		
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		31,13	31,05	30,98	30,97																		
		CI Mean		[30,99; 31,27]	[30,90; 31,19]	[30,83; 31,13]	[30,81; 31,13]																		
		Median		30,08	30,09	30,08	30,08																		
		Fallbasis mittlere Differenz			7072	6333	5743																		
		Mittlere Differenz zur ED			-0,10	-0,15	-0,13																		
		CI mittlere Differenz			[-0,14; - 0,06]	[-0,20; - 0,09]	[-0,19; - 0,08]																		
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00																		
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		1058	959	861	765																		
		Anteil in %		13,16	13,56	13,60	13,32																		
		CI Anteil in %		[12,42; 13,90]	[12,76; 14,36]	[12,75; 14,44]	[12,44; 14,20]																		
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		2894	2502	2260	2061																		
		Anteil in %		36,00	35,38	35,69	35,88																		
		CI Anteil in %		[34,95; 37,05]	[34,26; 36,49]	[34,51; 36,87]	[34,64; 37,12]																		
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		4087	3611	3212	2918																		
		Anteil in %		50,84	51,06	50,72	50,80																		
		CI Anteil in %		[49,75; 51,93]	[49,90; 52,23]	[49,49; 51,95]	[49,51; 52,09]																		

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845																			
	auswertbar	Anzahl	8551	7413	6622																			
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,08	30,92	30,93																		
		CI Mean		[30,95; 31,20]	[30,78; 31,05]	[30,79; 31,07]																		
		Median		30,12	30,10	30,11																		
		Fallbasis mittlere Differenz			7410	6618																		
		Mittlere Differenz zur ED				-0,15	-0,16																	
		CI mittlere Differenz				[-0,19; - 0,11]	[-0,21; - 0,11]																	
		Median mittlere Differenz				0,00	0,00																	
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1045	977	863																		
		Anteil in %		12,22	13,18	13,03																		
		CI Anteil in %		[11,53; 12,92]	[12,41; 13,95]	[12,22; 13,84]																		
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		3079	2658	2346																		
		Anteil in %		36,01	35,86	35,43																		
		CI Anteil in %		[34,99; 37,02]	[34,76; 36,95]	[34,28; 36,58]																		
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		4427	3778	3413																		
		Anteil in %		51,77	50,96	51,54																		
		CI Anteil in %		[50,71; 52,83]	[49,83; 52,10]	[50,34; 52,74]																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																				
	auswertbar	Anzahl	7546	6459																				
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,14	31,06																			
		CI Mean		[30,99; 31,28]	[30,90; 31,21]																			
		Median		30,12	30,08																			
		Fallbasis mittlere Differenz			6454																			
		Mittlere Differenz zur ED				-0,11																		
		CI mittlere Differenz				[-0,15; - 0,06]																		
		Median mittlere Differenz				0,00																		
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1007	847																			
		Anteil in %		13,34	13,11																			
		CI Anteil in %		[12,58; 14,11]	[12,29; 13,94]																			
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		2660	2332																			
		Anteil in %		35,25	36,10																			
		CI Anteil in %		[34,17; 36,33]	[34,93; 37,28]																			
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		3879	3280																			
		Anteil in %		51,40	50,78																			
		CI Anteil in %		[50,28; 52,53]	[49,56; 52,00]																			

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																				
	auswertbar	Anzahl	7788																				
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,23																			
		CI Mean		[31,09; 31,36]																			
		Median		30,35																			
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
		Median mittlere Differenz																					
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		993																			
		Anteil in %		12,75																			
		CI Anteil in %		[12,01; 13,49]																			
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		2717																			
		Anteil in %		34,89																			
		CI Anteil in %		[33,83; 35,95]																			
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		4078																			
		Anteil in %		52,36																			
CI Anteil in %			[51,25; 53,47]																				

In Tabelle 3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil

an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitritts-halbjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation - - Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch - - Prozent Raucher.

**Tabelle 3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation**

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Raucher	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	562	433	365	310	250	221	197	172	161	152	148	140	137	129	123	117	117	108	
	auswertbar	Anzahl		389	356	305	249	219	194	165	152	144	142	139	134	125	119	117	115	102	
	Raucher	Anzahl		340	245	208	164	137	117	90	82	81	73	70	65	62	60	57	51	44	
		Anteil in %		87,40	68,82	68,20	65,86	62,56	60,31	54,55	53,95	56,25	51,41	50,36	48,51	49,60	50,42	48,72	44,35	43,14	
		CI Anteil in %		[84,10; 90,71]	[64,00; 73,64]	[62,96; 73,43]	[59,96; 71,76]	[56,13; 68,98]	[53,41; 67,21]	[46,92; 62,17]	[46,00; 61,90]	[48,12; 64,38]	[43,16; 59,66]	[42,02; 58,70]	[40,01; 57,00]	[40,80; 58,40]	[41,40; 59,44]	[39,62; 57,81]	[35,23; 53,47]	[33,48; 52,80]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1443	1192	950	789	696	611	554	520	501	477	459	433	412	395	375	353	341		
	auswertbar	Anzahl		1052	886	763	678	603	520	483	474	464	445	425	405	388	366	348	329		
	Raucher	Anzahl		874	648	520	440	359	296	263	245	239	222	210	200	189	169	159	148		
		Anteil in %		83,08	73,14	68,15	64,90	59,54	56,92	54,45	51,69	51,51	49,89	49,41	49,38	48,71	46,17	45,69	44,98		
		CI Anteil in %		[80,81; 85,35]	[70,22; 76,06]	[64,84; 71,46]	[61,30; 68,49]	[55,61; 63,46]	[52,66; 61,18]	[50,01; 58,90]	[47,18; 56,19]	[46,96; 56,06]	[45,24; 54,54]	[44,65; 54,17]	[43,73; 53,69]	[41,06; 51,29]	[40,45; 50,93]	[39,60; 50,37]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2043	1676	1351	1155	986	873	833	782	732	702	667	634	608	575	548	522			
	auswertbar	Anzahl		1541	1307	1122	952	836	788	745	708	685	660	624	597	563	538	510			
	Raucher	Anzahl		1283	985	789	623	532	489	432	410	393	360	343	326	304	287	272			
		Anteil in %		83,26	75,36	70,32	65,44	63,64	62,06	57,99	57,91	57,37	54,55	54,97	54,61	54,00	53,35	53,33			
		CI Anteil in %		[81,39; 85,12]	[73,03; 77,70]	[67,65; 73,00]	[62,42; 68,46]	[60,37; 66,90]	[58,67; 65,45]	[54,44; 61,53]	[54,27; 61,08]	[53,67; 61,08]	[50,74; 58,35]	[51,06; 58,87]	[50,61; 58,60]	[49,88; 58,12]	[49,13; 57,57]	[49,00; 57,67]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>				
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1634	1344	1131	954	843	780	742	692	655	621	590	562	527	502	477				
	auswertbar	Anzahl		1251	1089	915	798	736	692	660	636	609	567	546	510	487	460				
	Raucher	Anzahl		1077	824	654	542	491	457	424	388	368	335	321	293	283	252				
		Anteil in %		86,09	75,67	71,48	67,92	66,71	66,04	64,24	61,01	60,43	59,08	58,79	57,45	58,11	54,78				
		CI Anteil in %		[84,17; 88,01]	[73,12; 78,22]	[68,55; 74,40]	[64,68; 71,16]	[63,31; 70,12]	[62,51; 69,57]	[60,58; 67,90]	[57,21; 64,80]	[56,54; 64,31]	[55,03; 63,13]	[54,66; 62,92]	[53,16; 61,75]	[53,72; 62,50]	[50,23; 59,34]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>					
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1874	1641	1388	1195	1102	1037	966	910	844	789	751	713	670	631					
	auswertbar	Anzahl		1518	1318	1118	1021	972	925	881	829	774	739	698	658	615					
	Raucher	Anzahl		1283	1031	795	700	632	581	542	505	466	438	408	380	353					
		Anteil in %		84,52	78,22	71,11	68,56	65,02	62,81	61,52	60,92	60,21	59,27	58,45	57,75	57,40					
		CI Anteil in %		[82,70; 86,34]	[76,00; 80,45]	[68,45; 73,77]	[65,71; 71,41]	[62,02; 68,02]	[59,69; 65,93]	[58,31; 64,74]	[57,59; 64,24]	[56,76; 63,66]	[55,72; 62,81]	[54,79; 62,11]	[53,97; 61,53]	[53,49; 61,31]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>						
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1679	1369	1158	1050	987	902	847	777	720	684	637	601	575						
	auswertbar	Anzahl		1305	1080	996	931	858	821	748	701	666	618	584	555						
	Raucher	Anzahl		1117	797	712	655	572	529	473	434	413	381	357	343						
		Anteil in %		85,59	73,80	71,49	70,35	66,67	64,43	63,24	61,91	62,01	61,65	61,13	61,80						
		CI Anteil in %		[83,69; 87,50]	[71,17; 76,42]	[68,68; 74,29]	[67,42; 73,29]	[63,51; 69,82]	[61,16; 67,71]	[59,78; 66,69]	[58,31; 65,51]	[58,32; 65,70]	[57,81; 65,49]	[57,17; 65,09]	[57,76; 65,85]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>							

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1518	1306	1135	1028	951	894	842	799	753	703	669	623						
	auswertbar	Anzahl		1220	1053	974	906	860	819	771	731	683	650	604						
	Raucher	Anzahl		1033	819	717	623	572	532	503	462	411	383	354						
		Anteil in %			84,67	77,78	73,61	68,76	66,51	64,96	65,24	63,20	60,18	58,92	58,61					
		CI Anteil in %			[82,65; 86,69]	[75,27; 80,29]	[70,84; 76,38]	[65,74; 71,78]	[63,36; 69,67]	[61,69; 68,23]	[61,88; 68,60]	[59,70; 66,70]	[56,50; 63,85]	[55,14; 62,71]	[54,68; 62,54]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>							
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1635	1436	1285	1171	1064	970	906	857	816	777	722							
	auswertbar	Anzahl		1381	1240	1102	1018	932	867	821	778	739	683							
	Raucher	Anzahl		1172	963	768	690	610	566	526	481	445	409							
		Anteil in %			84,87	77,66	69,69	67,78	65,45	65,28	64,07	61,83	60,22	59,88						
		CI Anteil in %			[82,98; 86,76]	[75,34; 79,98]	[66,98; 72,41]	[64,91; 70,65]	[62,40; 68,51]	[62,11; 68,45]	[60,78; 67,35]	[58,41; 65,24]	[56,69; 63,75]	[56,20; 63,56]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>								
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1453	1289	1158	1048	920	858	793	737	707	672								
	auswertbar	Anzahl		1240	1099	1012	907	840	780	712	696	645								
	Raucher	Anzahl		1073	826	718	649	584	543	490	466	421								
		Anteil in %			86,53	75,16	70,95	71,55	69,52	69,62	68,82	66,95	65,27							
		CI Anteil in %			[84,63; 88,43]	[72,60; 77,72]	[68,15; 73,75]	[68,62; 74,49]	[66,41; 72,64]	[66,39; 72,85]	[65,42; 72,23]	[63,46; 70,45]	[61,59; 68,95]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>									
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1438	1254	1135	1008	920	851	801	744	698									
	auswertbar	Anzahl		1195	1085	977	898	836	779	728	667									
	Raucher	Anzahl		1028	828	716	652	591	553	516	470									
		Anteil in %			86,03	76,31	73,29	72,61	70,69	70,99	70,88	70,46								
		CI Anteil in %			[84,06; 87,99]	[73,78; 78,84]	[70,51; 76,06]	[69,69; 75,52]	[67,61; 73,78]	[67,80; 74,18]	[67,58; 74,18]	[67,00; 73,93]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>										
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	919	808	706	639	596	554	520	489										
	auswertbar	Anzahl		790	692	627	591	538	509	475										
	Raucher	Anzahl		730	606	532	492	439	409	379										
		Anteil in %			92,41	87,57	84,85	83,25	81,60	80,35	79,79									
		CI Anteil in %			[90,56; 94,25]	[85,11; 90,03]	[82,04; 87,66]	[80,24; 86,26]	[78,32; 84,88]	[76,90; 83,81]	[76,17; 83,40]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>											
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1281	1095	954	866	783	718	676											
	auswertbar	Anzahl		1065	931	849	767	705	659											
	Raucher	Anzahl		993	833	739	656	581	537											
		Anteil in %			93,24	89,47	87,04	85,53	82,41	81,49										
		CI Anteil in %			[91,73; 94,75]	[87,50; 91,45]	[84,78; 89,30]	[83,04; 88,02]	[79,60; 85,22]	[78,52; 84,45]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1053	901	805	717	652	604												
	auswertbar	Anzahl		890	792	706	636	599												
	Raucher	Anzahl		842	717	616	550	502												
		Anteil in %			94,61	90,53	87,25	86,48	83,81											
		CI Anteil in %			[93,12; 96,09]	[88,49; 92,57]	[84,79; 89,71]	[83,82; 89,14]	[80,85; 86,76]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1236	1042	924	822	745													
	auswertbar	Anzahl		1030	901	804	734													
	Raucher	Anzahl		974	802	708	619													
		Anteil in %			94,56	89,01	88,06	84,33												
		CI Anteil in %			[93,18; 95,95]	[86,97; 91,06]	[85,82; 90,30]	[81,70; 86,96]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>														
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1170	1012	897	799														
	auswertbar	Anzahl		999	881	783														
	Raucher	Anzahl		943	799	690														
		Anteil in %			94,39	90,69	88,12													
		CI Anteil in %			[92,97; 95,82]	[88,77; 92,61]	[85,86; 90,39]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>															

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1257	1072	932																
	auswertbar	Anzahl		1053	909																
	Raucher	Anzahl		1017	831																
		Anteil in %			96,58	91,42															
		CI Anteil in %			[95,48; 97,68]	[89,60; 93,24]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																	
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1175	1004																	
	auswertbar	Anzahl		990																	
	Raucher	Anzahl		950																	
		Anteil in %			95,96																
		CI Anteil in %			[94,73; 97,19]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																		
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1184																		
	auswertbar	Anzahl																			
	Raucher	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																			

In Tabelle 3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 14 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 14 der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 0,00 Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch - - Patienten eingeschrieben. Für - - dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren - - Prozent Raucher.

**Tabelle 3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten**

EZ	Raucherquote bei allen Patienten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Raucher	Anzahl	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225		
	auswertbar	Anzahl	4885	3662	3317	2844	2462	2189	1988	1769	1691	1624	1601	1544	1481	1409	1365	1313	1265	1187		
	Raucher	Anzahl	562	382	288	236	188	160	132	105	98	93	85	85	79	78	78	74	68	59		
		Anteil in %	11,50	10,43	8,68	8,30	7,64	7,31	6,64	5,94	5,80	5,73	5,31	5,51	5,33	5,54	5,71	5,64	5,38	4,97		
	CI Anteil in %	[10,61; 12,40]	[9,44; 11,42]	[7,72; 9,64]	[7,28; 9,31]	[6,59; 8,69]	[6,22; 8,40]	[5,55; 7,73]	[4,83; 7,04]	[4,68; 6,91]	[4,60; 6,86]	[4,21; 6,41]	[4,37; 6,64]	[4,19; 6,48]	[4,34; 6,73]	[4,48; 6,95]	[4,39; 6,88]	[4,13; 6,62]	[3,73; 6,21]			
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293			
	auswertbar	Anzahl	12108	9033	7990	6936	6255	5591	4888	4625	4474	4414	4246	4056	3874	3738	3551	3390	3193			
	Raucher	Anzahl	1443	998	762	634	523	428	354	322	302	314	296	280	269	265	232	216	200			
		Anteil in %	11,92	11,05	9,54	9,14	8,36	7,66	7,24	6,96	6,75	7,11	6,97	6,90	6,94	7,09	6,53	6,37	6,26			
	CI Anteil in %	[11,34; 12,49]	[10,40; 11,69]	[8,89; 10,18]	[8,46; 9,82]	[7,68; 9,05]	[6,96; 8,35]	[6,52; 7,97]	[6,23; 7,70]	[6,01; 7,49]	[6,36; 7,87]	[6,21; 7,74]	[6,12; 7,68]	[6,14; 7,74]	[6,27; 7,91]	[5,72; 7,35]	[5,55; 7,19]	[5,42; 7,10]				
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409				
	auswertbar	Anzahl	15069	11732	10228	8865	7775	6918	6616	6268	6034	5774	5474	5190	4956	4739	4543	4316				
	Raucher	Anzahl	2043	1430	1115	919	735	626	583	522	510	489	448	428	407	379	363	342				
		Anteil in %	13,56	12,19	10,90	10,37	9,45	9,05	8,81	8,33	8,45	8,47	8,18	8,25	8,21	8,00	7,99	7,92				
	CI Anteil in %	[13,01; 14,10]	[11,60; 12,78]	[10,30; 11,51]	[9,73; 11,00]	[8,80; 10,10]	[8,37; 9,72]	[8,13; 9,50]	[7,64; 9,01]	[7,75; 9,15]	[7,75; 9,19]	[7,46; 8,91]	[7,50; 9,00]	[7,45; 8,98]	[7,23; 8,77]	[7,20; 8,78]	[7,12; 8,73]					
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053					
	auswertbar	Anzahl	11691	9507	8302	7245	6393	5983	5682	5495	5247	4969	4730	4556	4343	4149	3935					
	Raucher	Anzahl	1634	1258	970	794	649	593	552	539	488	456	428	408	374	367	331					
		Anteil in %	13,98	13,23	11,68	10,96	10,15	9,91	9,71	9,81	9,30	9,18	9,05	8,96	8,61	8,85	8,41					
	CI Anteil in %	[13,35; 14,61]	[12,55; 13,91]	[10,99; 12,37]	[10,24; 11,68]	[9,41; 10,89]	[9,15; 10,67]	[8,94; 10,49]	[9,02; 10,60]	[8,51; 10,09]	[8,37; 9,98]	[8,23; 9,87]	[8,13; 9,78]	[7,78; 9,45]	[7,98; 9,71]	[7,54; 9,28]						
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422						
	auswertbar	Anzahl	14294	11797	10358	8993	8402	7915	7602	7241	6792	6438	6130	5829	5573	5293						
	Raucher	Anzahl	1874	1514	1209	942	838	768	764	709	650	606	567	533	494	458						
		Anteil in %	13,11	12,83	11,67	10,47	9,97	9,70	10,05	9,79	9,57	9,41	9,25	9,14	8,86	8,65						
	CI Anteil in %	[12,56; 13,66]	[12,23; 13,44]	[11,05; 12,29]	[9,84; 11,11]	[9,33; 10,61]	[9,05; 10,36]	[9,37; 10,73]	[9,11; 10,48]	[8,87; 10,27]	[8,70; 10,13]	[8,52; 9,97]	[8,40; 9,88]	[8,12; 9,61]	[7,90; 9,41]							
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459							
	auswertbar	Anzahl	13284	10882	9241	8588	8056	7711	7373	6826	6487	6200	5866	5583	5271							
	Raucher	Anzahl	1679	1304	930	844	774	740	677	604	557	535	495	467	448							
		Anteil in %	12,64	11,98	10,06	9,83	9,61	9,60	9,18	8,85	8,59	8,63	8,44	8,36	8,50							
	CI Anteil in %	[12,07; 13,20]	[11,37; 12,59]	[9,45; 10,68]	[9,20; 10,46]	[8,96; 10,25]	[8,94; 10,25]	[8,52; 9,84]	[8,17; 9,52]	[7,90; 9,27]	[7,93; 9,33]	[7,73; 9,15]	[7,64; 9,09]	[7,75; 9,25]								
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487								
	auswertbar	Anzahl	11768	9847	8844	8240	7776	7413	6890	6487	6174	5862	5602	5301								
	Raucher	Anzahl	1518	1214	995	892	839	774	728	692	641	579	543	498								
		Anteil in %	12,90	12,33	11,25	10,83	10,79	10,44	10,57	10,67	10,38	9,88	9,69	9,39								
	CI Anteil in %	[12,29; 13,51]	[11,68; 12,98]	[10,59; 11,91]	[10,15; 11,50]	[10,10; 11,48]	[9,74; 11,14]	[9,84; 11,29]	[9,92; 11,42]	[9,62; 11,14]	[9,11; 10,64]	[8,92; 10,47]	[8,61; 10,18]									
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533									
	auswertbar	Anzahl	13105	11391	10375	9395	8908	8222	7718	7322	6943	6573	6182									
	Raucher	Anzahl	1635	1408	1147	1043	967	870	807	761	692	651	604									
		Anteil in %	12,48	12,36	11,06	11,10	10,86	10,58	10,46	10,39	9,97	9,90	9,77									
	CI Anteil in %	[11,91; 13,04]	[11,76; 12,97]	[10,45; 11,66]	[10,47; 11,74]	[10,21; 11,50]	[9,92; 11,25]	[9,77; 11,14]	[9,69; 11,09]	[9,26; 10,67]	[9,18; 10,63]	[9,03; 10,51]										

EZ	Raucherquote bei allen Patienten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873									
	auswertbar	Anzahl	11332	10015	8929	8365	7686	7192	6764	6360	6046	5656									
	Raucher	Anzahl	1453	1263	1083	967	881	802	740	674	639	582									
		Anteil in %	12,82	12,61	12,13	11,56	11,46	11,15	10,94	10,60	10,57	10,29									
	CI Anteil in %	[12,21; 13,44]	[11,96; 13,26]	[11,45; 12,81]	[10,87; 12,25]	[10,75; 12,17]	[10,42; 11,88]	[10,20; 11,68]	[9,84; 11,35]	[9,79; 11,34]	[9,50; 11,08]										
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839										
	auswertbar	Anzahl	10692	9095	8435	7629	7077	6695	6299	5997	5616										
	Raucher	Anzahl	1438	1306	1079	945	861	785	736	689	618										
		Anteil in %	13,45	14,36	12,79	12,39	12,17	11,73	11,68	11,49	11,00										
	CI Anteil in %	[12,80; 14,10]	[13,64; 15,08]	[12,08; 13,50]	[11,65; 13,13]	[11,40; 12,93]	[10,95; 12,50]	[10,89; 12,48]	[10,68; 12,30]	[10,19; 11,82]											
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928											
	auswertbar	Anzahl	6867	5971	5308	4855	4578	4285	4046	3794											
	Raucher	Anzahl	919	847	702	637	607	537	498	467											
		Anteil in %	13,38	14,19	13,23	13,12	13,26	12,53	12,31	12,31											
	CI Anteil in %	[12,58; 14,19]	[13,30; 15,07]	[12,31; 14,14]	[12,17; 14,07]	[12,28; 14,24]	[11,54; 13,52]	[11,30; 13,32]	[11,26; 13,35]												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474												
	auswertbar	Anzahl	9390	7926	7126	6538	6064	5702	5330												
	Raucher	Anzahl	1281	1099	941	847	779	702	653												
		Anteil in %	13,64	13,87	13,21	12,96	12,85	12,31	12,25												
	CI Anteil in %	[12,95; 14,34]	[13,10; 14,63]	[12,42; 13,99]	[12,14; 13,77]	[12,00; 13,69]	[11,46; 13,16]	[11,37; 13,13]													
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747													
	auswertbar	Anzahl	7490	6526	5891	5390	4988	4648													
	Raucher	Anzahl	1053	966	829	736	655	603													
		Anteil in %	14,06	14,80	14,07	13,65	13,13	12,97													
	CI Anteil in %	[13,27; 14,85]	[13,94; 15,66]	[13,18; 14,96]	[12,74; 14,57]	[12,19; 14,07]	[12,01; 13,94]														
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942														
	auswertbar	Anzahl	8737	7626	6890	6281	5799														
	Raucher	Anzahl	1236	1075	911	822	736														
		Anteil in %	14,15	14,10	13,22	13,09	12,69														
	CI Anteil in %	[13,42; 14,88]	[13,32; 14,88]	[12,42; 14,02]	[12,25; 13,92]	[11,83; 13,55]															
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929															
	auswertbar	Anzahl	8103	7129	6385	5789															
	Raucher	Anzahl	1170	1038	899	792															
		Anteil in %	14,44	14,56	14,08	13,68															
	CI Anteil in %	[13,67; 15,20]	[13,74; 15,38]	[13,23; 14,93]	[12,80; 14,57]																
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845																
	auswertbar	Anzahl	8627	7475	6675																
	Raucher	Anzahl	1257	1117	925																
		Anteil in %	14,57	14,94	13,86																
	CI Anteil in %	[13,83; 15,32]	[14,13; 15,75]	[13,03; 14,69]																	
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																	
	auswertbar	Anzahl	7608	6507																	
	Raucher	Anzahl	1175	1027																	
		Anteil in %	15,44	15,78																	
	CI Anteil in %	[14,63; 16,26]	[14,90; 16,67]																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																		
	auswertbar	Anzahl	7836																		
	Raucher	Anzahl	1184																		
		Anteil in %	15,11																		
	CI Anteil in %	[14,32; 15,90]																			



In Tabelle 3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren.

Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den 14 anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation 10 Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch - - Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Patienten verbes-

sern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende Anteilswert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei - - Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

**Tabelle 3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation**

\* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also mit „6. Patienten mit Blutdruck systolisch > 160 oder diastolisch > 100 und antihypertensive Therapie“. Die dort eingestufteten Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc..

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	60,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[27,99; 92,01]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	60,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[27,99; 92,01]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	40,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[7,99; 72,01]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	30,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,06; 59,94]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	10,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	[0,00; 29,60]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>14</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3760	3086	2634	2256	1946	1737	1575	1436	1370	1322	1272	1229	1172	1111	1075	1028	987	939
	auswertbar	Anzahl	3759	2832	2281	1981	1784	1603	1447	1280	1226	1177	1240	1199	1151	1091	1058	1015	970	913
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1256	1201	937	877	877	783	723	662	630	630	641	634	620	571	556	548	482	477
		Anteil in %	33,41	42,41	41,08	44,27	49,16	48,85	49,97	51,72	51,39	53,53	51,69	52,88	53,87	52,34	52,55	53,99	49,69	52,25
		CI Anteil in %	[31,91; 34,92]	[40,59; 44,23]	[39,06; 43,10]	[42,08; 46,46]	[46,84; 51,48]	[46,40; 51,29]	[47,39; 52,54]	[48,98; 54,46]	[48,59; 54,19]	[50,68; 56,38]	[48,91; 54,48]	[50,05; 55,70]	[50,98; 56,75]	[49,37; 55,30]	[49,54; 55,56]	[50,92; 57,06]	[46,54; 52,84]	[49,00; 55,49]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	77	120	20	19	11	14	7	7	7	9	31	32	40	38	30	20	22	21
		Anteil in %	2,05	4,24	0,88	0,96	0,62	0,87	0,48	0,55	0,57	0,76	2,50	2,67	3,48	3,48	2,84	1,97	2,27	2,30
		CI Anteil in %	[1,60; 2,50]	[3,50; 4,98]	[0,49; 1,26]	[0,53; 1,39]	[0,25; 0,98]	[0,42; 1,33]	[0,13; 0,84]	[0,14; 0,95]	[0,15; 0,99]	[0,27; 1,26]	[1,63; 3,37]	[1,76; 3,58]	[2,42; 4,53]	[2,39; 4,57]	[1,83; 3,84]	[1,11; 2,83]	[1,33; 3,21]	[1,33; 3,27]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1179	1081	917	858	866	769	716	655	623	621	610	602	580	533	526	528	460	456
		Anteil in %	31,36	38,17	40,20	43,31	48,54	47,97	49,48	51,17	50,82	52,76	49,19	50,21	50,39	48,85	49,72	52,02	47,42	49,95
		CI Anteil in %	[29,88; 32,85]	[36,38; 39,96]	[38,19; 42,21]	[41,13; 45,49]	[46,22; 50,86]	[45,53; 50,42]	[46,90; 52,06]	[48,43; 53,91]	[48,02; 53,62]	[49,91; 55,61]	[46,41; 51,98]	[47,38; 53,04]	[47,50; 53,28]	[45,89; 51,82]	[46,70; 52,73]	[48,94; 55,09]	[44,28; 50,57]	[46,70; 53,19]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2503	1631	1344	1104	907	820	724	618	596	547	599	565	531	520	502	467	488	436
		Anteil in %	66,59	57,59	58,92	55,73	50,84	51,15	50,03	48,28	48,61	46,47	48,31	47,12	46,13	47,66	47,45	46,01	50,31	47,75
		CI Anteil in %	[65,08; 68,09]	[55,77; 59,41]	[56,90; 60,94]	[53,54; 57,92]	[48,52; 53,16]	[48,71; 53,60]	[47,46; 52,61]	[45,54; 51,02]	[45,81; 51,41]	[43,62; 49,32]	[45,52; 51,09]	[44,30; 49,95]	[43,25; 49,02]	[44,70; 50,63]	[44,44; 50,46]	[42,94; 49,08]	[47,16; 53,46]	[44,51; 51,00]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	108	137	20	12	8	6	12	8	8	8	33	30	19	22	18	17	15	10
		Anteil in %	2,87	4,84	0,88	0,61	0,45	0,37	0,83	0,63	0,65	0,68	2,66	2,50	1,65	2,02	1,70	1,67	1,55	1,10
		CI Anteil in %	[2,34; 3,41]	[4,05; 5,63]	[0,49; 1,26]	[0,26; 0,95]	[0,14; 0,76]	[0,08; 0,67]	[0,36; 1,30]	[0,19; 1,06]	[0,20; 1,10]	[0,21; 1,15]	[1,77; 3,56]	[1,62; 3,39]	[0,91; 2,39]	[1,18; 2,85]	[0,92; 2,48]	[0,88; 2,46]	[0,77; 2,32]	[0,42; 1,77]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1924	1258	1135	901	767	708	623	536	515	492	490	466	455	437	417	398	400	370
		Anteil in %	51,18	44,42	49,76	45,48	42,99	44,17	43,05	41,88	42,01	41,80	39,52	38,87	39,53	40,05	39,41	39,21	41,24	40,53
		CI Anteil in %	[49,59; 52,78]	[42,59; 46,25]	[47,71; 51,81]	[43,29; 47,68]	[40,70; 45,29]	[41,74; 46,60]	[40,50; 45,61]	[39,17; 44,58]	[39,24; 44,77]	[38,98; 44,62]	[36,79; 42,24]	[36,11; 41,63]	[36,71; 42,36]	[37,15; 42,96]	[36,47; 42,36]	[36,21; 42,22]	[38,14; 44,34]	[37,34; 43,71]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	27	20	8	1	0	0	0	0	0	0	8	5	4	2	4	5	5	2	
	Anteil in %	0,72	0,71	0,35	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,42	0,35	0,18	0,38	0,49	0,52	0,22	
	CI Anteil in %	[0,45; 0,99]	[0,40; 1,01]	[0,11; 0,59]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,20; 1,09]	[0,05; 0,78]	[0,01; 0,69]	[0,00; 0,44]	[0,01; 0,75]	[0,06; 0,92]	[0,06; 0,97]	[0,00; 0,52]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	444	216	181	190	132	106	89	74	73	47	68	64	53	59	63	47	68	54	
	Anteil in %	11,81	7,63	7,94	9,59	7,40	6,61	6,15	5,78	5,95	3,99	5,48	5,34	4,60	5,41	5,95	4,63	7,01	5,91	
	CI Anteil in %	[10,78; 12,84]	[6,65; 8,60]	[6,83; 9,04]	[8,29; 10,89]	[6,18; 8,61]	[5,40; 7,83]	[4,91; 7,39]	[4,50; 7,06]	[4,63; 7,28]	[2,87; 5,11]	[4,22; 6,75]	[4,06; 6,61]	[3,39; 5,82]	[4,07; 6,75]	[4,53; 7,38]	[3,34; 5,92]	[5,40; 8,62]	[4,38; 7,45]	
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>4885</b>	<b>4007</b>	<b>3418</b>	<b>2921</b>	<b>2501</b>	<b>2228</b>	<b>2016</b>	<b>1839</b>	<b>1760</b>	<b>1696</b>	<b>1639</b>	<b>1580</b>	<b>1508</b>	<b>1434</b>	<b>1386</b>	<b>1332</b>	<b>1286</b>	<b>1225</b>	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8837	7459	6169	5255	4727	4223	3831	3623	3476	3353	3194	3034	2899	2784	2653	2524	2402	
	auswertbar	Anzahl	8833	5863	5181	4608	4184	3775	3313	3144	3054	3262	3131	2984	2845	2740	2600	2478	2328	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2922	2354	2269	2072	1926	1748	1626	1524	1508	1596	1577	1506	1458	1435	1375	1260	1217	
		Anteil in %	33,08	40,15	43,79	44,97	46,03	46,30	49,08	48,47	49,38	48,93	50,37	50,47	51,25	52,37	52,88	50,85	52,28	
		CI Anteil in %	[32,10; 34,06]	[38,90; 41,40]	[42,44; 45,15]	[43,53; 46,40]	[44,52; 47,54]	[44,71; 47,90]	[47,38; 50,78]	[46,73; 50,22]	[47,60; 51,15]	[47,21; 50,64]	[48,62; 52,12]	[48,67; 52,26]	[49,41; 53,08]	[50,50; 54,24]	[50,97; 54,80]	[48,88; 52,82]	[50,25; 54,31]	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	168	82	58	41	42	39	34	36	32	107	91	79	72	77	63	64	59	
		Anteil in %	1,90	1,40	1,12	0,89	1,00	1,03	1,03	1,15	1,05	3,28	2,91	2,65	2,53	2,81	2,42	2,58	2,53	
		CI Anteil in %	[1,62; 2,19]	[1,10; 1,70]	[0,83; 1,41]	[0,62; 1,16]	[0,70; 1,31]	[0,71; 1,36]	[0,68; 1,37]	[0,77; 1,52]	[0,69; 1,41]	[2,67; 3,89]	[2,32; 3,49]	[2,07; 3,22]	[1,95; 3,11]	[2,19; 3,43]	[1,83; 3,01]	[1,96; 3,21]	[1,90; 3,17]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2754	2272	2211	2031	1884	1709	1592	1488	1476	1489	1486	1427	1386	1358	1312	1196	1158	
		Anteil in %	31,18	38,75	42,68	44,08	45,03	45,27	48,05	47,33	48,33	45,65	47,46	47,82	48,72	49,56	50,46	48,26	49,74	
		CI Anteil in %	[30,21; 32,14]	[37,50; 40,00]	[41,33; 44,02]	[42,64; 45,51]	[43,52; 46,54]	[43,68; 46,86]	[46,35; 49,75]	[45,58; 49,07]	[46,56; 50,10]	[43,94; 47,36]	[45,71; 49,61]	[46,03; 49,61]	[46,88; 50,55]	[47,69; 51,43]	[48,54; 52,38]	[46,30; 50,23]	[47,71; 51,77]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	5911	3509	2912	2536	2258	2027	1687	1620	1546	1666	1554	1478	1387	1305	1225	1218	1111	
		Anteil in %	66,92	59,85	56,21	55,03	53,97	53,70	50,92	51,53	50,62	51,07	49,63	49,53	48,75	47,63	47,12	49,15	47,72	
		CI Anteil in %	[65,94; 67,90]	[58,60; 61,10]	[54,85; 57,56]	[53,60; 56,47]	[52,46; 55,48]	[52,10; 55,29]	[49,22; 52,62]	[49,78; 53,27]	[48,85; 52,40]	[49,36; 52,79]	[47,88; 51,38]	[47,74; 51,33]	[46,92; 50,59]	[45,76; 49,50]	[45,20; 49,03]	[47,18; 51,12]	[45,69; 49,75]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	250	79	40	36	38	29	27	30	22	84	83	65	59	48	59	53	46	
		Anteil in %	2,83	1,35	0,77	0,78	0,91	0,77	0,81	0,95	0,72	2,58	2,65	2,18	2,07	1,75	2,27	2,14	1,98	
		CI Anteil in %	[2,48; 3,18]	[1,05; 1,64]	[0,53; 1,01]	[0,53; 1,04]	[0,62; 1,20]	[0,49; 1,05]	[0,51; 1,12]	[0,61; 1,29]	[0,42; 1,02]	[2,03; 3,12]	[2,09; 3,21]	[1,65; 2,70]	[1,55; 2,60]	[1,26; 2,24]	[1,70; 2,84]	[1,57; 2,71]	[1,41; 2,54]	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4450	2826	2408	2134	1890	1686	1445	1375	1335	1386	1257	1244	1164	1067	999	994	906	
		Anteil in %	50,38	48,20	46,48	46,31	45,17	44,66	43,62	43,73	43,71	42,49	40,15	41,69	40,91	38,94	38,42	40,11	38,92	
		CI Anteil in %	[49,34; 51,42]	[46,92; 49,48]	[45,12; 47,84]	[44,87; 47,75]	[43,66; 46,68]	[43,08; 46,25]	[41,93; 45,30]	[42,00; 45,47]	[41,95; 45,47]	[40,79; 44,19]	[38,43; 41,86]	[39,92; 43,46]	[39,11; 42,72]	[37,12; 40,77]	[36,55; 40,29]	[38,18; 42,04]	[36,94; 40,90]	
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	68	14	4	3	3	5	0	2	1	14	5	8	7	10	6	11	9	
		Anteil in %	0,77	0,24	0,08	0,07	0,07	0,13	0,00	0,06	0,03	0,43	0,16	0,27	0,25	0,36	0,23	0,44	0,39	
		CI Anteil in %	[0,59; 0,95]	[0,11; 0,36]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]	[0,02; 0,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,10]	[0,20; 0,65]	[0,02; 0,30]	[0,08; 0,45]	[0,06; 0,43]	[0,14; 0,59]	[0,05; 0,42]	[0,18; 0,71]	[0,13; 0,64]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1143	590	460	363	327	307	215	213	188	182	209	161	157	180	161	160	150		
	Anteil in %	12,94	10,06	8,88	7,88	7,82	8,13	6,49	6,77	6,16	5,58	6,68	5,40	5,52	6,57	6,19	6,46	6,44		
	CI Anteil in %	[12,24; 13,64]	[9,29; 10,83]	[8,10; 9,65]	[7,10; 8,66]	[7,00; 8,63]	[7,26; 9,00]	[5,65; 7,33]	[5,90; 7,65]	[5,30; 7,01]	[4,79; 6,37]	[5,80; 7,55]	[4,58; 6,21]	[4,68; 6,36]	[5,64; 7,50]	[5,27; 7,12]	[5,49; 7,42]	[5,45; 7,44]		
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	11485	9702	8128	7032	6171	5608	5375	5093	4832	4594	4331	4082	3890	3716	3544	3366			
	auswertbar	Anzahl	9243	7746	6904	6060	5347	4813	4669	4448	4690	4471	4232	4000	3808	3634	3471	3292			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3118	3037	2831	2593	2346	2251	2155	2217	2201	2134	1991	1928	1805	1817	1687	1670			
		Anteil in %	33,73	39,21	41,01	42,79	43,88	46,77	46,16	49,84	46,93	47,73	47,05	48,20	47,40	50,00	48,60	50,73			
		CI Anteil in %	[32,77; 34,70]	[38,12; 40,29]	[39,84; 42,17]	[41,54; 44,03]	[42,54; 45,21]	[45,36; 48,18]	[44,73; 47,59]	[48,37; 51,31]	[45,50; 48,36]	[46,27; 49,19]	[45,54; 48,55]	[46,65; 49,75]	[45,81; 48,99]	[48,37; 51,63]	[46,94; 50,27]	[49,02; 52,44]			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	91	89	95	69	63	53	53	54	188	146	127	124	122	121	97	116			
		Anteil in %	0,98	1,15	1,38	1,14	1,18	1,10	1,14	1,21	4,01	3,27	3,00	3,10	3,20	3,33	2,79	3,52			
		CI Anteil in %	[0,78; 1,19]	[0,91; 1,39]	[1,10; 1,65]	[0,87; 1,41]	[0,89; 1,47]	[0,81; 1,40]	[0,83; 1,44]	[0,89; 1,54]	[3,45; 4,57]	[2,74; 3,79]	[2,49; 3,52]	[2,56; 3,64]	[2,64; 3,76]	[2,75; 3,91]	[2,25; 3,34]	[2,89; 4,15]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	3027	2948	2736	2524	2283	2198	2102	2163	2013	1988	1864	1804	1683	1696	1590	1554			
		Anteil in %	32,75	38,06	39,63	41,65	42,70	45,67	45,02	48,63	42,92	44,46	44,05	45,10	44,20	46,67	45,81	47,21			
		CI Anteil in %	[31,79; 33,71]	[36,98; 39,14]	[38,48; 40,78]	[40,41; 42,89]	[41,37; 44,02]	[44,26; 47,08]	[43,59; 46,45]	[47,16; 50,10]	[41,50; 44,34]	[43,01; 45,92]	[42,55; 45,54]	[43,56; 46,64]	[42,62; 45,77]	[45,05; 48,29]	[44,15; 47,47]	[45,50; 48,91]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	6125	4709	4073	3467	3001	2562	2514	2231	2489	2337	2241	2072	2003	1817	1784	1622			
		Anteil in %	66,27	60,79	58,99	57,21	56,12	53,23	53,84	50,16	53,07	52,27	52,95	51,80	52,60	50,00	51,40	49,27			
		CI Anteil in %	[65,30; 67,23]	[59,71; 61,88]	[57,83; 60,16]	[55,97; 58,46]	[54,79; 57,46]	[51,82; 54,64]	[52,41; 55,27]	[48,69; 51,63]	[51,64; 54,50]	[50,81; 53,73]	[51,45; 54,46]	[50,25; 53,35]	[51,01; 54,19]	[48,37; 51,63]	[49,73; 53,06]	[47,56; 50,98]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	140	131	95	82	51	48	38	36	124	111	113	93	87	74	87	62			
		Anteil in %	1,51	1,69	1,38	1,35	0,95	1,00	0,81	0,81	2,64	2,48	2,67	2,33	2,28	2,04	2,51	1,88			
		CI Anteil in %	[1,27; 1,76]	[1,40; 1,98]	[1,10; 1,65]	[1,06; 1,64]	[0,69; 1,21]	[0,72; 1,28]	[0,56; 1,07]	[0,55; 1,07]	[2,18; 3,10]	[2,03; 2,94]	[2,18; 3,16]	[1,86; 2,79]	[1,81; 2,76]	[1,58; 2,50]	[1,99; 3,03]	[1,42; 2,35]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4758	3790	3343	2906	2524	2197	2120	1923	2043	1928	1818	1734	1645	1503	1490	1353			
		Anteil in %	51,48	48,93	48,42	47,95	47,20	45,65	45,41	43,23	43,56	43,12	42,96	43,35	43,20	41,36	42,93	41,10			
		CI Anteil in %	[50,46; 52,50]	[47,82; 50,04]	[47,24; 49,60]	[46,70; 49,21]	[45,87; 48,54]	[44,24; 47,05]	[43,98; 46,83]	[41,78; 44,69]	[42,14; 44,98]	[41,67; 44,57]	[41,47; 44,45]	[41,81; 44,89]	[41,62; 44,77]	[39,76; 42,96]	[41,28; 44,57]	[39,42; 42,78]			
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	32	13	7	9	9	2	5	3	10	15	11	11	11	11	6	6			
		Anteil in %	0,35	0,17	0,10	0,15	0,17	0,04	0,11	0,07	0,21	0,34	0,26	0,28	0,29	0,30	0,17	0,18			
		CI Anteil in %	[0,23; 0,47]	[0,08; 0,26]	[0,03; 0,18]	[0,05; 0,25]	[0,06; 0,28]	[0,00; 0,10]	[0,01; 0,20]	[0,00; 0,14]	[0,08; 0,35]	[0,17; 0,51]	[0,11; 0,41]	[0,11; 0,44]	[0,12; 0,46]	[0,12; 0,48]	[0,03; 0,31]	[0,04; 0,33]			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1195	775	628	470	417	315	351	269	312	283	299	234	260	229	201	201				
	Anteil in %	12,93	10,01	9,10	7,76	7,80	6,54	7,52	6,05	6,65	6,33	7,07	5,85	6,83	6,30	5,79	6,11				
	CI Anteil in %	[12,24; 13,61]	[9,34; 10,67]	[8,42; 9,77]	[7,08; 8,43]	[7,08; 8,52]	[5,85; 7,24]	[6,76; 8,27]	[5,35; 6,75]	[5,94; 7,37]	[5,62; 7,04]	[6,29; 7,84]	[5,12; 6,58]	[6,03; 7,63]	[5,51; 7,09]	[5,01; 6,57]	[5,29; 6,92]				
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8791	7582	6576	5708	5153	4846	4598	4386	4159	3920	3744	3587	3421	3276	3119				
	auswertbar	Anzahl	7160	6258	5472	4883	4332	4107	3960	4238	4046	3832	3653	3517	3351	3204	3030				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2533	2624	2382	2144	1961	1905	1954	1992	1928	1853	1808	1742	1733	1565	1572				
		Anteil in %	35,38	41,93	43,53	43,91	45,27	46,38	49,34	47,00	47,65	48,36	49,49	49,53	51,72	48,85	51,88				
		CI Anteil in %	[34,27; 36,48]	[40,71; 43,15]	[42,22; 44,84]	[42,52; 45,30]	[43,79; 46,75]	[44,86; 47,91]	[47,79; 50,90]	[45,50; 48,51]	[46,11; 49,19]	[46,77; 49,94]	[47,87; 51,12]	[47,88; 51,18]	[50,02; 53,41]	[47,11; 50,58]	[50,10; 53,66]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	77	124	100	74	67	59	63	172	153	136	128	122	108	102	105				
		Anteil in %	1,08	1,98	1,83	1,52	1,55	1,44	1,59	4,06	3,78	3,55	3,50	3,47	3,22	3,18	3,47				
		CI Anteil in %	[0,84; 1,31]	[1,64; 2,33]	[1,47; 2,18]	[1,17; 1,86]	[1,18; 1,91]	[1,07; 1,80]	[1,20; 1,98]	[3,46; 4,65]	[3,19; 4,37]	[2,96; 4,13]	[2,91; 4,10]	[2,86; 4,07]	[2,62; 3,82]	[2,58; 3,79]	[2,81; 4,12]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2456	2500	2282	2070	1894	1846	1891	1820	1775	1717	1680	1620	1625	1463	1467				
		Anteil in %	34,30	39,95	41,70	42,39	43,72	44,95	47,75	42,94	43,87	44,81	45,99	46,06	48,49	45,66	48,42				
		CI Anteil in %	[33,20; 35,40]	[38,74; 41,16]	[40,40; 43,01]	[41,01; 43,78]	[42,24; 45,20]	[43,43; 46,47]	[46,20; 49,31]	[41,45; 44,44]	[42,34; 45,40]	[43,23; 46,38]	[44,37; 47,61]	[44,41; 47,71]	[46,80; 50,19]	[43,94; 47,39]	[46,64; 50,20]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	4627	3634	3090	2739	2371	2202	2006	2246	2118	1979	1845	1775	1618	1639	1458				
		Anteil in %	64,62	58,07	56,47	56,09	54,73	53,62	50,66	53,00	52,35	51,64	50,51	50,47	48,28	51,15	48,12				
		CI Anteil in %	[63,52; 65,73]	[56,85; 59,29]	[55,16; 57,78]	[54,70; 57,48]	[53,25; 56,21]	[52,09; 55,14]	[49,10; 52,21]	[51,49; 54,50]	[50,81; 53,89]	[50,06; 53,23]	[48,88; 52,13]	[48,82; 52,12]	[46,59; 49,98]	[49,42; 52,89]	[46,34; 49,90]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	108	77	69	65	53	45	43	133	116	113	87	78	76	73	70				
		Anteil in %	1,51	1,23	1,26	1,33	1,22	1,10	1,09	3,14	2,87	2,95	2,38	2,22	2,27	2,28	2,31				
		CI Anteil in %	[1,23; 1,79]	[0,96; 1,50]	[0,97; 1,56]	[1,01; 1,65]	[0,90; 1,55]	[0,78; 1,41]	[0,76; 1,41]	[2,61; 3,66]	[2,35; 3,38]	[2,41; 3,48]	[1,89; 2,88]	[1,73; 2,70]	[1,76; 2,77]	[1,76; 2,80]	[1,78; 2,85]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	3586	2974	2580	2308	1973	1843	1712	1831	1725	1605	1503	1425	1340	1330	1172				
		Anteil in %	50,08	47,52	47,15	47,27	45,54	44,87	43,23	43,20	42,63	41,88	41,14	40,52	39,99	41,51	38,68				
		CI Anteil in %	[48,93; 51,24]	[46,29; 48,76]	[45,83; 48,47]	[45,87; 48,67]	[44,06; 47,03]	[43,35; 46,40]	[41,69; 44,78]	[41,71; 44,70]	[41,11; 44,16]	[40,32; 43,45]	[39,55; 42,74]	[38,89; 42,14]	[38,33; 41,65]	[39,80; 43,22]	[36,95; 40,41]				
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	16	7	10	9	7	2	2	14	11	13	16	12	14	14	13					
	Anteil in %	0,22	0,11	0,18	0,18	0,16	0,05	0,05	0,33	0,27	0,34	0,44	0,34	0,42	0,44	0,43					
	CI Anteil in %	[0,11; 0,33]	[0,03; 0,19]	[0,07; 0,30]	[0,06; 0,30]	[0,04; 0,28]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,12]	[0,16; 0,50]	[0,11; 0,43]	[0,16; 0,52]	[0,22; 0,65]	[0,15; 0,53]	[0,20; 0,64]	[0,21; 0,67]	[0,20; 0,66]					
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	917	576	431	357	338	312	249	268	266	248	239	260	188	222	203					
	Anteil in %	12,81	9,20	7,88	7,31	7,80	7,60	6,29	6,32	6,57	6,47	6,54	7,39	5,61	6,93	6,70					
	CI Anteil in %	[12,03; 13,58]	[8,49; 9,92]	[7,16; 8,59]	[6,58; 8,04]	[7,00; 8,60]	[6,79; 8,41]	[5,53; 7,04]	[5,59; 7,06]	[5,81; 7,34]	[5,69; 7,25]	[5,74; 7,34]	[6,53; 8,26]	[4,83; 6,39]	[6,05; 7,81]	[5,81; 7,59]					
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10827	9560	8254	7321	6829	6431	6068	5717	5326	5042	4784	4558	4352	4125						
	auswertbar	Anzahl	8999	7846	6991	6170	5817	5504	5827	5547	5194	4916	4675	4439	4241	4028						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3355	3340	3026	2817	2668	2673	2660	2711	2510	2409	2366	2227	2088	2029						
		Anteil in %	37,28	42,57	43,28	45,66	45,87	48,56	45,65	48,87	48,32	49,00	50,61	50,17	49,23	50,37						
		CI Anteil in %	[36,28; 38,28]	[41,48; 43,66]	[42,12; 44,45]	[44,41; 46,90]	[44,58; 47,15]	[47,24; 49,89]	[44,37; 46,93]	[47,56; 50,19]	[46,97; 49,68]	[47,61; 50,40]	[49,18; 52,04]	[48,70; 51,64]	[47,73; 50,74]	[48,83; 51,92]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	91	91	81	61	75	71	237	236	215	183	162	132	138	128						
		Anteil in %	1,01	1,16	1,16	0,99	1,29	1,29	4,07	4,25	4,14	3,72	3,47	2,97	3,25	3,18						
		CI Anteil in %	[0,80; 1,22]	[0,92; 1,40]	[0,91; 1,41]	[0,74; 1,24]	[1,00; 1,58]	[0,99; 1,59]	[3,56; 4,57]	[3,72; 4,79]	[3,60; 4,68]	[3,19; 4,25]	[2,94; 3,99]	[2,47; 3,47]	[2,72; 3,79]	[2,64; 3,72]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	3264	3249	2945	2756	2593	2602	2423	2475	2295	2226	2204	2095	1950	1901						
		Anteil in %	36,27	41,41	42,13	44,67	44,58	47,27	41,58	44,62	44,19	45,28	47,14	47,20	45,98	47,19						
		CI Anteil in %	[35,28; 37,26]	[40,32; 42,50]	[40,97; 43,28]	[43,43; 45,91]	[43,30; 45,85]	[45,96; 48,59]	[40,32; 42,85]	[43,31; 45,54]	[42,83; 46,67]	[43,89; 46,67]	[45,71; 48,58]	[45,73; 48,66]	[44,48; 47,48]	[45,65; 48,74]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	5644	4506	3965	3353	3149	2831	3167	2836	2684	2507	2309	2212	2153	1999						
		Anteil in %	62,72	57,43	56,72	54,34	54,13	51,44	54,35	51,13	51,68	51,00	49,39	49,83	50,77	49,63						
		CI Anteil in %	[61,72; 63,72]	[56,34; 58,52]	[55,55; 57,88]	[53,10; 55,59]	[52,85; 55,42]	[50,11; 52,76]	[53,07; 55,63]	[49,81; 52,44]	[50,32; 53,03]	[49,60; 52,39]	[47,96; 50,82]	[48,36; 51,30]	[49,26; 52,27]	[48,08; 51,17]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	123	95	66	62	51	55	197	165	138	136	116	113	96	78						
		Anteil in %	1,37	1,21	0,94	1,00	0,88	1,00	3,38	2,97	2,66	2,77	2,48	2,55	2,26	1,94						
		CI Anteil in %	[1,13; 1,61]	[0,97; 1,45]	[0,72; 1,17]	[0,76; 1,25]	[0,64; 1,12]	[0,74; 1,26]	[2,92; 3,84]	[2,53; 3,42]	[2,22; 3,09]	[2,31; 3,23]	[2,04; 2,93]	[2,08; 3,01]	[1,82; 2,71]	[1,51; 2,36]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4494	3739	3335	2847	2660	2397	2519	2277	2171	2041	1862	1794	1751	1616						
		Anteil in %	49,94	47,65	47,70	46,14	45,73	43,55	43,23	41,05	41,80	41,52	39,83	40,41	41,29	40,12						
		CI Anteil in %	[48,91; 50,97]	[46,55; 48,76]	[46,53; 48,88]	[44,90; 47,39]	[44,45; 47,01]	[42,24; 44,86]	[41,96; 44,50]	[39,75; 42,34]	[40,46; 43,14]	[40,14; 42,90]	[38,43; 41,23]	[38,97; 41,86]	[39,81; 42,77]	[38,61; 41,63]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	17	9	7	7	7	7	24	22	19	15	10	13	7	16						
		Anteil in %	0,19	0,11	0,10	0,11	0,12	0,13	0,41	0,40	0,37	0,31	0,21	0,29	0,17	0,40						
		CI Anteil in %	[0,10; 0,28]	[0,04; 0,19]	[0,03; 0,17]	[0,03; 0,20]	[0,03; 0,21]	[0,03; 0,22]	[0,25; 0,58]	[0,23; 0,56]	[0,20; 0,53]	[0,15; 0,46]	[0,08; 0,35]	[0,13; 0,45]	[0,04; 0,29]	[0,20; 0,59]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1010	663	557	437	431	372	427	372	356	315	321	292	299	289							
	Anteil in %	11,22	8,45	7,97	7,08	7,41	6,76	7,33	6,71	6,85	6,41	6,87	6,58	7,05	7,17							
	CI Anteil in %	[10,57; 11,88]	[7,83; 9,07]	[7,33; 8,60]	[6,44; 7,72]	[6,74; 8,08]	[6,10; 7,42]	[6,66; 8,00]	[6,05; 7,36]	[6,17; 7,54]	[5,72; 7,09]	[6,14; 7,59]	[5,85; 7,31]	[6,28; 7,82]	[6,38; 7,97]							
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10041	8670	7619	7042	6617	6225	5878	5460	5161	4912	4662	4412	4201						
	auswertbar	Anzahl	8192	7204	6158	5856	5558	5973	5704	5280	5015	4794	4529	4305	4063						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3005	3037	2795	2645	2717	2775	2763	2537	2439	2319	2241	2072	2067						
		Anteil in %	36,68	42,16	45,39	45,17	48,88	46,46	48,44	48,05	48,63	48,37	49,48	48,13	50,87						
		CI Anteil in %	[35,64; 37,73]	[41,02; 43,30]	[44,14; 46,63]	[43,89; 46,44]	[47,57; 50,20]	[45,19; 47,72]	[47,14; 49,74]	[46,70; 49,40]	[47,25; 50,02]	[46,96; 49,79]	[48,02; 50,94]	[46,64; 49,62]	[49,34; 52,41]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	100	91	78	93	85	263	231	187	191	172	164	141	137						
		Anteil in %	1,22	1,26	1,27	1,59	1,53	4,40	4,05	3,54	3,81	3,59	3,62	3,28	3,37						
		CI Anteil in %	[0,98; 1,46]	[1,01; 1,52]	[0,99; 1,55]	[1,27; 1,91]	[1,21; 1,85]	[3,88; 4,92]	[3,54; 4,56]	[3,04; 4,04]	[3,28; 4,34]	[3,06; 4,11]	[3,08; 4,17]	[2,74; 3,81]	[2,82; 3,93]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2905	2946	2717	2552	2632	2512	2532	2350	2248	2147	2077	1931	1930						
		Anteil in %	35,46	40,89	44,12	43,58	47,36	42,06	44,39	44,51	44,83	44,79	45,86	44,85	47,50						
		CI Anteil in %	[34,43; 36,50]	[39,76; 42,03]	[42,88; 45,36]	[42,31; 44,85]	[46,04; 48,67]	[40,80; 43,31]	[43,10; 45,68]	[43,17; 45,85]	[43,45; 46,20]	[43,38; 46,19]	[44,41; 47,31]	[43,37; 46,34]	[45,97; 49,04]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	5187	4167	3363	3211	2841	3198	2941	2743	2576	2475	2288	2233	1996						
		Anteil in %	63,32	57,84	54,61	54,83	51,12	53,54	51,56	51,95	51,37	51,63	50,52	51,87	49,13						
		CI Anteil in %	[62,27; 64,36]	[56,70; 58,98]	[53,37; 55,86]	[53,56; 56,11]	[49,80; 52,43]	[52,28; 54,81]	[50,26; 52,86]	[50,60; 53,30]	[49,98; 52,75]	[50,21; 53,04]	[49,06; 51,98]	[50,38; 53,36]	[47,59; 50,66]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	105	104	68	74	63	212	188	170	143	130	115	117	100						
		Anteil in %	1,28	1,44	1,10	1,26	1,13	3,55	3,30	3,22	2,85	2,71	2,54	2,72	2,46						
		CI Anteil in %	[1,04; 1,53]	[1,17; 1,72]	[0,84; 1,37]	[0,98; 1,55]	[0,86; 1,41]	[3,08; 4,02]	[2,83; 3,76]	[2,74; 3,70]	[2,39; 3,31]	[2,25; 3,17]	[2,08; 3,00]	[2,23; 3,20]	[1,98; 2,94]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4120	3382	2812	2674	2412	2507	2329	2197	2076	1979	1863	1816	1617						
		Anteil in %	50,29	46,95	45,66	45,66	43,40	41,97	40,83	41,61	41,40	41,28	41,13	42,18	39,80						
		CI Anteil in %	[49,21; 51,38]	[45,79; 48,10]	[44,42; 46,91]	[44,39; 46,94]	[42,09; 44,70]	[40,72; 43,22]	[39,56; 42,11]	[40,28; 42,94]	[40,03; 42,76]	[39,89; 42,67]	[39,70; 42,57]	[40,71; 43,66]	[38,29; 41,30]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	24	13	15	5	7	26	18	17	22	23	12	10	15						
		Anteil in %	0,29	0,18	0,24	0,09	0,13	0,44	0,32	0,32	0,44	0,48	0,26	0,23	0,37						
		CI Anteil in %	[0,18; 0,41]	[0,08; 0,28]	[0,12; 0,37]	[0,01; 0,16]	[0,03; 0,22]	[0,27; 0,60]	[0,17; 0,46]	[0,17; 0,47]	[0,26; 0,62]	[0,28; 0,68]	[0,12; 0,41]	[0,09; 0,38]	[0,18; 0,56]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	938	668	468	458	359	453	406	359	335	343	298	290	264							
	Anteil in %	11,45	9,27	7,60	7,82	6,46	7,58	7,12	6,80	6,68	7,15	6,58	6,74	6,50							
	CI Anteil in %	[10,76; 12,14]	[8,60; 9,94]	[6,94; 8,26]	[7,13; 8,51]	[5,81; 7,11]	[6,91; 8,26]	[6,45; 7,79]	[6,12; 7,48]	[5,99; 7,37]	[6,43; 7,88]	[5,86; 7,30]	[5,99; 7,49]	[5,74; 7,26]							
<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459							



EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8717	7786	7045	6555	6183	5801	5368	5077	4807	4572	4383	4170						
	auswertbar	Anzahl	7109	6509	5898	5576	5894	5624	5215	4911	4669	4457	4262	4031						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2902	2907	2696	2745	2760	2805	2533	2476	2284	2253	2111	2038						
		Anteil in %	40,82	44,66	45,71	49,23	46,83	49,88	48,57	50,42	48,92	50,55	49,53	50,56						
		CI Anteil in %	[39,68; 41,96]	[43,45; 45,87]	[44,44; 46,98]	[47,92; 50,54]	[45,55; 48,10]	[48,57; 51,18]	[47,21; 49,93]	[49,02; 51,82]	[47,48; 50,35]	[49,08; 52,02]	[48,03; 51,03]	[49,01; 52,10]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	68	86	69	86	251	226	217	186	174	175	145	160						
		Anteil in %	0,96	1,32	1,17	1,54	4,26	4,02	4,16	3,79	3,73	3,93	3,40	3,97						
		CI Anteil in %	[0,73; 1,18]	[1,04; 1,60]	[0,90; 1,44]	[1,22; 1,87]	[3,74; 4,77]	[3,51; 4,53]	[3,62; 4,70]	[3,25; 4,32]	[3,18; 4,27]	[3,36; 4,50]	[2,86; 3,95]	[3,37; 4,57]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2834	2821	2627	2659	2509	2579	2316	2290	2110	2078	1966	1878						
		Anteil in %	39,86	43,34	44,54	47,69	42,57	45,86	44,41	46,63	45,19	46,62	46,13	46,59						
		CI Anteil in %	[38,73; 41,00]	[42,14; 44,54]	[43,27; 45,81]	[46,38; 49,00]	[41,31; 43,83]	[44,55; 47,16]	[43,06; 45,76]	[45,23; 48,03]	[43,76; 46,62]	[45,16; 48,09]	[44,63; 47,63]	[45,05; 48,13]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	4207	3602	3202	2831	3134	2819	2682	2435	2385	2204	2151	1993						
		Anteil in %	59,18	55,34	54,29	50,77	53,17	50,12	51,43	49,58	51,08	49,45	50,47	49,44						
		CI Anteil in %	[58,04; 60,32]	[54,13; 56,55]	[53,02; 55,56]	[49,46; 52,08]	[51,90; 54,45]	[48,82; 51,43]	[50,07; 52,79]	[48,18; 50,98]	[49,65; 52,52]	[47,98; 50,92]	[48,97; 51,97]	[47,90; 50,99]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	90	75	60	46	215	198	168	165	141	116	124	116						
		Anteil in %	1,27	1,15	1,02	0,82	3,65	3,52	3,22	3,36	3,02	2,60	2,91	2,88						
		CI Anteil in %	[1,01; 1,53]	[0,89; 1,41]	[0,76; 1,27]	[0,59; 1,06]	[3,17; 4,13]	[3,04; 4,00]	[2,74; 3,70]	[2,86; 3,86]	[2,53; 3,51]	[2,14; 3,07]	[2,40; 3,41]	[2,36; 3,39]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	3393	3025	2682	2397	2489	2266	2147	1943	1903	1821	1743	1627						
		Anteil in %	47,73	46,47	45,47	42,99	42,23	40,29	41,17	39,56	40,76	40,86	40,90	40,36						
		CI Anteil in %	[46,57; 48,89]	[45,26; 47,69]	[44,20; 46,74]	[41,69; 44,29]	[40,97; 43,49]	[39,01; 41,57]	[39,83; 42,51]	[38,20; 40,93]	[39,35; 42,17]	[39,41; 42,30]	[39,42; 42,37]	[38,85; 41,88]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	20	11	12	7	28	24	20	16	22	19	17	10						
Anteil in %		0,28	0,17	0,20	0,13	0,48	0,43	0,38	0,33	0,47	0,43	0,40	0,25							
CI Anteil in %		[0,16; 0,40]	[0,07; 0,27]	[0,09; 0,32]	[0,03; 0,22]	[0,30; 0,65]	[0,26; 0,60]	[0,22; 0,55]	[0,17; 0,49]	[0,27; 0,67]	[0,23; 0,62]	[0,21; 0,59]	[0,09; 0,40]							
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	704	491	448	381	402	331	347	311	319	248	267	240							
	Anteil in %	9,90	7,54	7,60	6,83	6,82	5,89	6,65	6,33	6,83	5,56	6,26	5,95							
	CI Anteil in %	[9,21; 10,60]	[6,90; 8,19]	[6,92; 8,27]	[6,17; 7,50]	[6,18; 7,46]	[5,27; 6,50]	[5,98; 7,33]	[5,65; 7,01]	[6,11; 7,56]	[4,89; 6,24]	[5,54; 6,99]	[5,22; 6,68]							
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	9740	8822	8119	7553	7067	6516	6101	5750	5470	5187	4892										
	auswertbar	Anzahl	8129	7613	6956	7155	6787	6256	5856	5532	5237	4954	4648										
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3305	3452	3405	3427	3336	3155	2969	2780	2698	2461	2346										
		Anteil in %	40,66	45,34	48,95	47,90	49,15	50,43	50,70	50,25	51,52	49,68	50,47										
		CI Anteil in %	[39,59; 41,72]	[44,23; 46,46]	[47,78; 50,13]	[46,74; 49,05]	[47,96; 50,34]	[49,19; 51,67]	[49,42; 51,98]	[48,94; 51,57]	[50,16; 52,87]	[48,28; 51,07]	[49,04; 51,91]										
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	90	93	102	352	315	282	256	237	221	201	193										
		Anteil in %	1,11	1,22	1,47	4,92	4,64	4,51	4,37	4,28	4,22	4,06	4,15										
		CI Anteil in %	[0,88; 1,33]	[0,97; 1,47]	[1,18; 1,75]	[4,42; 5,42]	[4,14; 5,14]	[3,99; 5,02]	[3,85; 4,90]	[3,75; 4,82]	[3,68; 4,76]	[3,51; 4,61]	[3,58; 4,73]										
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	3215	3359	3303	3075	3021	2873	2713	2543	2477	2260	2153										
		Anteil in %	39,55	44,12	47,48	42,98	44,51	45,92	46,33	45,97	47,30	45,62	46,32										
		CI Anteil in %	[38,49; 40,61]	[43,01; 45,24]	[46,31; 48,66]	[41,83; 44,12]	[43,33; 45,69]	[44,69; 47,16]	[45,05; 47,61]	[44,66; 47,28]	[45,95; 48,65]	[44,23; 47,01]	[44,89; 47,75]										
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	4824	4161	3551	3728	3451	3101	2887	2752	2539	2493	2302										
		Anteil in %	59,34	54,66	51,05	52,10	50,85	49,57	49,30	49,75	48,48	50,32	49,53										
		CI Anteil in %	[58,28; 60,41]	[53,54; 55,77]	[49,87; 52,22]	[50,95; 53,26]	[49,66; 52,04]	[48,33; 50,81]	[48,02; 50,58]	[48,43; 51,06]	[47,13; 49,84]	[48,93; 51,72]	[48,09; 50,96]										
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	90	88	76	288	232	197	190	182	173	150	143										
		Anteil in %	1,11	1,16	1,09	4,03	3,42	3,15	3,24	3,29	3,30	3,03	3,08										
		CI Anteil in %	[0,88; 1,33]	[0,92; 1,40]	[0,85; 1,34]	[3,57; 4,48]	[2,99; 3,85]	[2,72; 3,58]	[2,79; 3,70]	[2,82; 3,76]	[2,82; 3,79]	[2,55; 3,51]	[2,58; 3,57]										
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	3868	3432	2996	2940	2766	2503	2330	2211	2063	2002	1843										
		Anteil in %	47,58	45,08	43,07	41,09	40,75	40,01	39,79	39,97	39,39	40,41	39,65										
		CI Anteil in %	[46,50; 48,67]	[43,96; 46,20]	[41,91; 44,23]	[39,95; 42,23]	[39,59; 41,92]	[38,80; 41,22]	[38,53; 41,04]	[38,68; 41,26]	[38,07; 40,72]	[39,05; 41,78]	[38,24; 41,06]										
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	15	15	8	28	34	29	21	23	18	16	15										
		Anteil in %	0,18	0,20	0,12	0,39	0,50	0,46	0,36	0,42	0,34	0,32	0,32										
		CI Anteil in %	[0,09; 0,28]	[0,10; 0,30]	[0,04; 0,19]	[0,25; 0,54]	[0,33; 0,67]	[0,30; 0,63]	[0,21; 0,51]	[0,25; 0,59]	[0,19; 0,50]	[0,16; 0,48]	[0,16; 0,49]										
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	851	626	471	472	419	372	346	336	285	325	301											
	Anteil in %	10,47	8,22	6,77	6,60	6,17	5,95	5,91	6,07	5,44	6,56	6,48											
	CI Anteil in %	[9,80; 11,13]	[7,61; 8,84]	[6,18; 7,36]	[6,02; 7,17]	[5,60; 6,75]	[5,36; 6,53]	[5,30; 6,51]	[5,44; 6,70]	[4,83; 6,06]	[5,87; 7,25]	[5,77; 7,18]											
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533										

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8319	7598	6997	6448	5878	5524	5198	4917	4652	4394										
	auswertbar	Anzahl	6938	6517	6676	6247	5738	5373	5053	4769	4525	4238										
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2956	3219	3185	3041	2860	2745	2504	2477	2263	2118										
		Anteil in %	42,61	49,39	47,71	48,68	49,84	51,09	49,55	51,94	50,01	49,98										
		CI Anteil in %	[41,44; 43,77]	[48,18; 50,61]	[46,51; 48,91]	[47,44; 49,92]	[48,55; 51,14]	[49,75; 52,43]	[48,18; 50,93]	[50,52; 53,36]	[48,55; 51,47]	[48,47; 51,48]										
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	80	82	330	289	259	221	206	218	202	166										
		Anteil in %	1,15	1,26	4,94	4,63	4,51	4,11	4,08	4,57	4,46	3,92										
		CI Anteil in %	[0,90; 1,40]	[0,99; 1,53]	[4,42; 5,46]	[4,11; 5,15]	[3,98; 5,05]	[3,58; 4,64]	[3,53; 4,62]	[3,98; 5,16]	[3,86; 5,07]	[3,33; 4,50]										
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2876	3137	2855	2752	2601	2524	2298	2259	2061	1952										
		Anteil in %	41,45	48,14	42,77	44,05	45,33	46,98	45,48	47,37	45,55	46,06										
		CI Anteil in %	[40,29; 42,61]	[46,92; 49,35]	[41,58; 43,95]	[42,82; 45,28]	[44,04; 46,62]	[45,64; 48,31]	[44,10; 46,85]	[45,95; 48,79]	[44,10; 47,00]	[44,56; 47,56]										
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3982	3298	3491	3206	2878	2628	2549	2292	2262	2120										
		Anteil in %	57,39	50,61	52,29	51,32	50,16	48,91	50,45	48,06	49,99	50,02										
		CI Anteil in %	[56,23; 58,56]	[49,39; 51,82]	[51,09; 53,49]	[50,08; 52,56]	[48,86; 51,45]	[47,57; 50,25]	[49,07; 51,82]	[46,64; 49,48]	[48,53; 51,45]	[48,52; 51,53]										
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	74	63	276	214	185	182	171	143	129	143										
		Anteil in %	1,07	0,97	4,13	3,43	3,22	3,39	3,38	3,00	2,85	3,37										
		CI Anteil in %	[0,82; 1,31]	[0,73; 1,20]	[3,66; 4,61]	[2,97; 3,88]	[2,77; 3,68]	[2,90; 3,87]	[2,89; 3,88]	[2,51; 3,48]	[2,37; 3,34]	[2,83; 3,92]										
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	3200	2768	2715	2583	2324	2108	2010	1838	1815	1694										
		Anteil in %	46,12	42,47	40,67	41,35	40,50	39,23	39,78	38,54	40,11	39,97										
		CI Anteil in %	[44,95; 47,30]	[41,27; 43,67]	[39,49; 41,85]	[40,13; 42,57]	[39,23; 41,77]	[37,93; 40,54]	[38,43; 41,13]	[37,16; 39,92]	[38,68; 41,54]	[38,50; 41,45]										
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	13	5	34	29	28	21	16	18	13	16										
		Anteil in %	0,19	0,08	0,51	0,46	0,49	0,39	0,32	0,38	0,29	0,38										
		CI Anteil in %	[0,09; 0,29]	[0,01; 0,14]	[0,34; 0,68]	[0,30; 0,63]	[0,31; 0,67]	[0,22; 0,56]	[0,16; 0,47]	[0,20; 0,55]	[0,13; 0,44]	[0,19; 0,56]										
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	695	462	466	380	341	317	352	293	305	267											
	Anteil in %	10,02	7,09	6,98	6,08	5,94	5,90	6,97	6,14	6,74	6,30											
	CI Anteil in %	[9,31; 10,72]	[6,47; 7,71]	[6,37; 7,59]	[5,49; 6,68]	[5,33; 6,55]	[5,27; 6,53]	[6,26; 7,67]	[5,46; 6,83]	[6,01; 7,47]	[5,57; 7,03]											
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873										

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	7726	6975	6404	5759	5373	5068	4783	4543	4295										
	auswertbar	Anzahl	6374	6645	6197	5626	5222	4944	4649	4427	4133										
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2723	3061	3037	2727	2646	2427	2386	2241	2151										
		Anteil in %	42,72	46,06	49,01	48,47	50,67	49,09	51,32	50,62	52,04										
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[41,51; 43,93]	[44,87; 47,26]	[47,76; 50,25]	[47,17; 49,78]	[49,31; 52,03]	[47,70; 50,48]	[49,89; 52,76]	[49,15; 52,09]	[50,52; 53,57]										
		Anzahl	56	330	303	256	236	221	211	205	163										
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,88	4,97	4,89	4,55	4,52	4,47	4,54	4,63	3,94										
		CI Anteil in %	[0,65; 1,11]	[4,44; 5,49]	[4,35; 5,43]	[4,01; 5,09]	[3,96; 5,08]	[3,89; 5,05]	[3,94; 5,14]	[4,01; 5,25]	[3,35; 4,54]										
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2667	2731	2734	2471	2410	2206	2175	2036	1988										
		Anteil in %	41,84	41,10	44,12	43,92	46,15	44,62	46,78	45,99	48,10										
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[40,63; 43,05]	[39,92; 42,28]	[42,88; 45,35]	[42,62; 45,22]	[44,80; 47,50]	[43,23; 46,01]	[45,35; 48,22]	[44,52; 47,46]	[46,58; 49,62]										
		Anzahl	3651	3584	3160	2899	2576	2517	2263	2186	1982										
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	57,28	53,94	50,99	51,53	49,33	50,91	48,68	49,38	47,96										
		CI Anteil in %	[56,07; 58,49]	[52,74; 55,13]	[49,75; 52,24]	[50,22; 52,83]	[47,97; 50,69]	[49,52; 52,30]	[47,24; 50,11]	[47,91; 50,85]	[46,43; 49,48]										
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	63	309	255	209	180	189	136	131	127										
		Anteil in %	0,99	4,65	4,11	3,71	3,45	3,82	2,93	2,96	3,07										
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,75; 1,23]	[4,14; 5,16]	[3,62; 4,61]	[3,22; 4,21]	[2,95; 3,94]	[3,29; 4,36]	[2,44; 3,41]	[2,46; 3,46]	[2,55; 3,60]										
		Anzahl	2936	2730	2479	2281	2040	1974	1799	1728	1594										
	Kategorie 1 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	46,06	41,08	40,00	40,54	39,07	39,93	38,70	39,03	38,57										
		CI Anteil in %	[44,84; 47,29]	[39,90; 42,27]	[38,78; 41,22]	[39,26; 41,83]	[37,74; 40,39]	[38,56; 41,29]	[37,30; 40,10]	[37,60; 40,47]	[37,08; 40,05]										
Kategorie 2 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	12	44	35	42	28	20	28	21	23											
	Anteil in %	0,19	0,66	0,56	0,75	0,54	0,40	0,60	0,47	0,56											
Kategorie 3 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,08; 0,29]	[0,47; 0,86]	[0,38; 0,75]	[0,52; 0,97]	[0,34; 0,73]	[0,23; 0,58]	[0,38; 0,82]	[0,27; 0,68]	[0,33; 0,78]											
	Anzahl	640	501	391	367	328	334	300	306	238											
Patienten insgesamt	Anteil in %	10,04	7,54	6,31	6,52	6,28	6,76	6,45	6,91	5,76											
	CI Anteil in %	[9,30; 10,78]	[6,90; 8,17]	[5,70; 6,91]	[5,88; 7,17]	[5,62; 6,94]	[6,06; 7,46]	[5,75; 7,16]	[6,16; 7,66]	[5,05; 6,47]											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839										
	auswertbar	Anzahl	4950	4473	3980	3644	3438	3242	3083	2934											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	4946	4371	3904	3566	3380	3170	3006	2823											
		Anteil in %	2237	2069	1901	1758	1690	1632	1521	1452											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	45,23	47,33	48,69	49,30	50,00	51,48	50,60	51,43											
		CI Anteil in %	[43,84; 46,62]	[45,85; 48,82]	[47,13; 50,26]	[47,66; 50,94]	[48,31; 51,69]	[49,74; 53,22]	[48,81; 52,39]	[49,59; 53,28]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	198	189	167	132	118	105	93	94											
		Anteil in %	4,00	4,32	4,28	3,70	3,49	3,31	3,09	3,33											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[3,46; 4,55]	[3,72; 4,93]	[3,64; 4,91]	[3,08; 4,32]	[2,87; 4,11]	[2,69; 3,94]	[2,47; 3,71]	[2,67; 3,99]											
		Anzahl	2039	1880	1734	1626	1572	1527	1428	1358											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	41,23	43,01	44,42	45,60	46,51	48,17	47,50	48,10											
		CI Anteil in %	[39,85; 42,60]	[41,54; 44,48]	[42,86; 45,97]	[43,96; 47,23]	[44,83; 48,19]	[46,43; 49,91]	[45,72; 49,29]	[46,26; 49,95]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2709	2302	2003	1808	1690	1538	1485	1371											
		Anteil in %	54,77	52,67	51,31	50,70	50,00	48,52	49,40	48,57											
	Kategorie 5 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[53,38; 56,16]	[51,18; 54,15]	[49,74; 52,87]	[49,06; 52,34]	[48,31; 51,69]	[46,78; 50,26]	[47,61; 51,19]	[46,72; 50,41]											
		Anzahl	216	157	122	124	117	95	87	73											
	Kategorie 6 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	4,37	3,59	3,13	3,48	3,46	3,00	2,89	2,59											
		CI Anteil in %	[3,80; 4,94]	[3,04; 4,14]	[2,58; 3,67]	[2,88; 4,08]	[2,85; 4,08]	[2,40; 3,59]	[2,29; 3,49]	[2,00; 3,17]											
	Kategorie 1 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2029	1822	1595	1433	1325	1227	1182	1129											
		Anteil in %	41,02	41,68	40,86	40,19	39,20	38,71	39,32	39,99											
Kategorie 2 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[39,65; 42,39]	[40,22; 43,15]	[39,31; 42,40]	[38,58; 41,79]	[37,56; 40,85]	[37,01; 40,40]	[37,57; 41,07]	[38,19; 41,80]												
	Anzahl	36	26	26	18	20	16	18	13												
Kategorie 3 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	0,73	0,59	0,67	0,50	0,59	0,50	0,60	0,46												
	CI Anteil in %	[0,49; 0,96]	[0,37; 0,82]	[0,41; 0,92]	[0,27; 0,74]	[0,33; 0,85]	[0,26; 0,75]	[0,32; 0,87]	[0,21; 0,71]												
Patienten insgesamt	Anzahl	428	297	260	233	228	200	198	156												
	Anteil in %	8,65	6,79	6,66	6,53	6,75	6,31	6,59	5,53												
Patienten insgesamt	CI Anteil in %	[7,87; 9,44]	[6,05; 7,54]	[5,88; 7,44]	[5,72; 7,35]	[5,90; 7,59]	[5,46; 7,16]	[5,70; 7,47]	[4,68; 6,37]												

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6503	5681	5147	4733	4419	4144	3907												
	auswertbar	Anzahl	6500	5543	5031	4644	4325	4066	3807												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2828	2720	2527	2275	2250	2012	1948												
		Anteil in %	43,51	49,07	50,23	48,99	52,02	49,48	51,17												
		CI Anteil in %	[42,30; 44,71]	[47,75; 50,39]	[48,85; 51,61]	[47,55; 50,43]	[50,53; 53,51]	[47,95; 51,02]	[49,58; 52,76]												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	279	273	224	178	161	140	131												
		Anteil in %	4,29	4,93	4,45	3,83	3,72	3,44	3,44												
		CI Anteil in %	[3,80; 4,79]	[4,36; 5,49]	[3,88; 5,02]	[3,28; 4,39]	[3,16; 4,29]	[2,88; 4,00]	[2,86; 4,02]												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2549	2447	2303	2097	2089	1872	1817												
		Anteil in %	39,22	44,15	45,78	45,16	48,30	46,04	47,73												
		CI Anteil in %	[38,03; 40,40]	[42,84; 45,45]	[44,40; 47,15]	[43,72; 46,59]	[46,81; 49,79]	[44,51; 47,57]	[46,14; 49,31]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3672	2823	2504	2369	2075	2054	1859												
		Anteil in %	56,49	50,93	49,77	51,01	47,98	50,52	48,83												
		CI Anteil in %	[55,29; 57,70]	[49,61; 52,25]	[48,39; 51,15]	[49,57; 52,45]	[46,49; 49,47]	[48,98; 52,05]	[47,24; 50,42]												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	309	222	199	158	139	129	112												
		Anteil in %	4,75	4,01	3,96	3,40	3,21	3,17	2,94												
		CI Anteil in %	[4,24; 5,27]	[3,49; 4,52]	[3,42; 4,49]	[2,88; 3,92]	[2,69; 3,74]	[2,63; 3,71]	[2,41; 3,48]												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2703	2186	1962	1878	1673	1672	1494												
		Anteil in %	41,58	39,44	39,00	40,44	38,68	41,12	39,24												
		CI Anteil in %	[40,39; 42,78]	[38,15; 40,72]	[37,65; 40,35]	[39,03; 41,85]	[37,23; 40,13]	[39,61; 42,63]	[37,69; 40,79]												
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	67	25	22	23	14	10	15													
	Anteil in %	1,03	0,45	0,44	0,50	0,32	0,25	0,39													
	CI Anteil in %	[0,79; 1,28]	[0,27; 0,63]	[0,25; 0,62]	[0,29; 0,70]	[0,15; 0,49]	[0,09; 0,40]	[0,19; 0,59]													
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	593	390	321	310	249	243	238													
	Anteil in %	9,12	7,04	6,38	6,68	5,76	5,98	6,25													
	CI Anteil in %	[8,42; 9,82]	[6,36; 7,71]	[5,71; 7,06]	[5,96; 7,39]	[5,06; 6,45]	[5,25; 6,71]	[5,48; 7,02]													
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>9390</b>	<b>8115</b>	<b>7281</b>	<b>6665</b>	<b>6202</b>	<b>5821</b>	<b>5474</b>													
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5189	4653	4232	3899	3622	3399													
	auswertbar	Anzahl	5187	4570	4157	3828	3559	3332													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2218	2230	1994	1967	1750	1699													
		Anteil in %	42,76	48,80	47,97	51,38	49,17	50,99													
		CI Anteil in %	[41,41; 44,11]	[47,35; 50,25]	[46,45; 49,49]	[49,80; 52,97]	[47,53; 50,81]	[49,29; 52,69]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	220	213	177	179	138	128													
		Anteil in %	4,24	4,66	4,26	4,68	3,88	3,84													
		CI Anteil in %	[3,69; 4,79]	[4,05; 5,27]	[3,64; 4,87]	[4,01; 5,34]	[3,24; 4,51]	[3,19; 4,49]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1998	2017	1817	1788	1612	1571													
		Anteil in %	38,52	44,14	43,71	46,71	45,29	47,15													
		CI Anteil in %	[37,19; 39,84]	[42,70; 45,58]	[42,20; 45,22]	[45,13; 48,29]	[43,66; 46,93]	[45,45; 48,84]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2969	2340	2163	1861	1809	1633													
		Anteil in %	57,24	51,20	52,03	48,62	50,83	49,01													
		CI Anteil in %	[55,89; 58,59]	[49,75; 52,65]	[50,51; 53,55]	[47,03; 50,20]	[49,19; 52,47]	[47,31; 50,71]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	256	188	181	124	145	119													
		Anteil in %	4,94	4,11	4,35	3,24	4,07	3,57													
		CI Anteil in %	[4,35; 5,52]	[3,54; 4,69]	[3,73; 4,97]	[2,68; 3,80]	[3,42; 4,72]	[2,94; 4,20]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2154	1782	1663	1452	1412	1262													
		Anteil in %	41,53	38,99	40,00	37,93	39,67	37,88													
		CI Anteil in %	[40,19; 42,87]	[37,58; 40,41]	[38,52; 41,49]	[36,39; 39,47]	[38,07; 41,28]	[36,23; 39,52]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	59	28	18	28	17	25														
	Anteil in %	1,14	0,61	0,43	0,73	0,48	0,75														
	CI Anteil in %	[0,85; 1,43]	[0,39; 0,84]	[0,23; 0,63]	[0,46; 1,00]	[0,25; 0,70]	[0,46; 1,04]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	500	342	301	257	235	227														
	Anteil in %	9,64	7,48	7,24	6,71	6,60	6,81														
	CI Anteil in %	[8,84; 10,44]	[6,72; 8,25]	[6,45; 8,03]	[5,92; 7,51]	[5,79; 7,42]	[5,96; 7,67]														
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>7490</b>	<b>6638</b>	<b>5995</b>	<b>5501</b>	<b>5082</b>	<b>4747</b>														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6107	5481	5009	4588	4264																
	auswertbar	Anzahl	6106	5398	4911	4484	4159																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2661	2653	2525	2196	2147																
		Anteil in %	43,58	49,15	51,42	48,97	51,62																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	CI Anteil in %	[42,34; 44,82]	[47,81; 50,48]	[50,02; 52,81]	[47,51; 50,44]	[50,10; 53,14]																
		Anteil in %	253	249	236	209	174																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	4,14	4,61	4,81	4,66	4,18																
		CI Anteil in %	[3,64; 4,64]	[4,05; 5,17]	[4,21; 5,40]	[4,04; 5,28]	[3,58; 4,79]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2408	2404	2289	1987	1973																
		Anteil in %	39,44	44,54	46,61	44,31	47,44																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[38,21; 40,66]	[43,21; 45,86]	[45,21; 48,01]	[42,86; 45,77]	[45,92; 48,96]																
		Anteil in %	3445	2745	2386	2288	2012																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	56,42	50,85	48,58	51,03	48,38																
		CI Anteil in %	[55,18; 57,66]	[49,52; 52,19]	[47,19; 49,98]	[49,56; 52,49]	[46,86; 49,90]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	291	209	177	151	139																
		Anteil in %	4,77	3,87	3,60	3,37	3,34																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[4,23; 5,30]	[3,36; 4,39]	[3,08; 4,13]	[2,84; 3,90]	[2,80; 3,89]																
		Anzahl	2500	2110	1887	1799	1602																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	40,94	39,09	38,42	40,12	38,52																
		CI Anteil in %	[39,71; 42,18]	[37,79; 40,39]	[37,06; 39,78]	[38,69; 41,56]	[37,04; 40,00]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	72	41	29	17	18																	
	Anteil in %	1,18	0,76	0,59	0,38	0,43																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,91; 1,45]	[0,53; 0,99]	[0,38; 0,80]	[0,20; 0,56]	[0,23; 0,63]																	
	Anzahl	582	385	293	321	253																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	9,53	7,13	5,97	7,16	6,08																	
	CI Anteil in %	[8,79; 10,27]	[6,45; 7,82]	[5,30; 6,63]	[6,40; 7,91]	[5,36; 6,81]																	
Patienten insgesamt	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942																	
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5624	5095	4610	4225																	
	auswertbar	Anzahl	5622	5024	4536	4127																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2530	2568	2260	2053																	
		Anteil in %	45,00	51,11	49,82	49,75																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	CI Anteil in %	[43,70; 46,30]	[49,73; 52,50]	[48,37; 51,28]	[48,22; 51,27]																	
		Anzahl	265	265	228	208																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	4,71	5,27	5,03	5,04																	
		CI Anteil in %	[4,16; 5,27]	[4,66; 5,89]	[4,39; 5,66]	[4,37; 5,71]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2265	2303	2032	1845																	
		Anteil in %	40,29	45,84	44,80	44,71																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[39,01; 41,57]	[44,46; 47,22]	[43,35; 46,24]	[43,19; 46,22]																	
		Anteil in %	3092	2456	2276	2074																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	55,00	48,89	50,18	50,25																	
		CI Anteil in %	[53,70; 56,30]	[47,50; 50,27]	[48,72; 51,63]	[48,73; 51,78]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	257	173	152	140																	
		Anteil in %	4,57	3,44	3,35	3,39																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[4,03; 5,12]	[2,94; 3,95]	[2,83; 3,87]	[2,84; 3,94]																	
		Anzahl	2274	1906	1742	1658																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	40,45	37,94	38,40	40,17																	
		CI Anteil in %	[39,17; 41,73]	[36,60; 39,28]	[36,99; 39,82]	[38,68; 41,67]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	66	36	30	17																		
	Anteil in %	1,17	0,72	0,66	0,41																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,89; 1,46]	[0,48; 0,95]	[0,43; 0,90]	[0,22; 0,61]																		
	Anzahl	495	341	352	259																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	8,80	6,79	7,76	6,28																		
	CI Anteil in %	[8,06; 9,55]	[6,09; 7,48]	[6,98; 8,54]	[5,54; 7,02]																		
Patienten insgesamt	Anzahl	8103	7229	6483	5929																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6040	5396	4884																	
	auswertbar	Anzahl	6038	5295	4758																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2659	2632	2409																	
		Anteil in %	44,04	49,71	50,63																	
		CI Anteil in %	[42,79; 45,29]	[48,36; 51,05]	[49,21; 52,05]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	256	260	232																	
		Anteil in %	4,24	4,91	4,88																	
		CI Anteil in %	[3,73; 4,75]	[4,33; 5,49]	[4,26; 5,49]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2403	2372	2177																	
		Anteil in %	39,80	44,80	45,75																	
		CI Anteil in %	[38,56; 41,03]	[43,46; 46,14]	[44,34; 47,17]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3379	2663	2349																	
		Anteil in %	55,96	50,29	49,37																	
		CI Anteil in %	[54,71; 57,21]	[48,95; 51,64]	[47,95; 50,79]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	302	221	180																	
		Anteil in %	5,00	4,17	3,78																	
		CI Anteil in %	[4,45; 5,55]	[3,64; 4,71]	[3,24; 4,33]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2487	2029	1858																	
		Anteil in %	41,19	38,32	39,05																	
		CI Anteil in %	[39,95; 42,43]	[37,01; 39,63]	[37,66; 40,44]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	75	37	31																		
	Anteil in %	1,24	0,70	0,65																		
	CI Anteil in %	[0,96; 1,52]	[0,47; 0,92]	[0,42; 0,88]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	515	376	280																		
	Anteil in %	8,53	7,10	5,88																		
	CI Anteil in %	[7,82; 9,23]	[6,41; 7,79]	[5,22; 6,55]																		
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>8627</b>	<b>7621</b>	<b>6845</b>																		
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5189	4596																		
	auswertbar	Anzahl	5187	4499																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2339	2250																		
		Anteil in %	45,09	50,01																		
		CI Anteil in %	[43,74; 46,45]	[48,55; 51,47]																		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	262	224																		
		Anteil in %	5,05	4,98																		
		CI Anteil in %	[4,46; 5,65]	[4,34; 5,61]																		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2077	2026																		
		Anteil in %	40,04	45,03																		
		CI Anteil in %	[38,71; 41,38]	[43,58; 46,49]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2848	2249																		
		Anteil in %	54,91	49,99																		
		CI Anteil in %	[53,55; 56,26]	[48,53; 51,45]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	236	185																		
		Anteil in %	4,55	4,11																		
		CI Anteil in %	[3,98; 5,12]	[3,53; 4,69]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2074	1720																		
		Anteil in %	39,98	38,23																		
		CI Anteil in %	[38,65; 41,32]	[36,81; 39,65]																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	60	26																			
	Anteil in %	1,16	0,58																			
	CI Anteil in %	[0,87; 1,45]	[0,36; 0,80]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	478	318																			
	Anteil in %	9,22	7,07																			
	CI Anteil in %	[8,43; 10,00]	[6,32; 7,82]																			
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>7608</b>	<b>6653</b>																			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5376																	
	auswertbar	Anzahl	5373																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2350																	
		Anteil in %	43,74																	
	Kategorie 1 " <i>normal ohne</i> Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[42,41; 45,06]																	
		Anzahl	216																	
	Kategorie 2 " <i>normal mit</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	4,02																	
		CI Anteil in %	[3,49; 4,55]																	
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2134																	
		Anteil in %	39,72																	
	Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[38,41; 41,03]																	
		Anzahl	3023																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anteil in %	56,26																	
		CI Anteil in %	[54,94; 57,59]																	
	Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	258																	
		Anteil in %	4,80																	
	Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[4,23; 5,37]																	
		Anzahl	2198																	
	Kategorie 1 " <i>mäßig erhöht mit</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	40,91																	
		CI Anteil in %	[39,59; 42,22]																	
Kategorie 2 " <i>deutlich erhöht ohne</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	51																		
	Anteil in %	0,95																		
Kategorie 3 " <i>deutlich erhöht mit</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,69; 1,21]																		
	Anzahl	516																		
Kategorie 4 " <i>deutlich erhöht mit</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	9,60																		
	CI Anteil in %	[8,82; 10,39]																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																		



In Tabelle 3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 10 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 138,00 mmHg, der Median bei 134,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtsjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei - - und der Median bei - -.

**Tabelle 3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation**

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[127,19; 148,81]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	134,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>		
2003-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3760	3086	2634	2256	1946	1737	1575	1436	1370	1322	1272	1229	1172	1111	1075	1028	987	939	
	auswertbar	Anzahl	3760	2832	2556	2198	1916	1710	1552	1383	1319	1264	1240	1199	1151	1091	1058	1015	970	913	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	143,42	139,73	140,30	139,59	138,35	138,53	137,96	137,00	137,10	136,09	136,84	136,20	135,33	136,04	136,29	135,80	137,50	136,26	
		CI Mean	[142,85; 143,99]	[139,11; 140,35]	[139,66; 140,94]	[138,89; 140,29]	[137,62; 139,08]	[137,75; 139,31]	[137,18; 138,74]	[136,15; 137,84]	[136,25; 137,96]	[135,27; 136,91]	[135,94; 137,74]	[135,31; 137,09]	[134,40; 136,26]	[135,09; 136,99]	[135,30; 137,28]	[134,83; 136,76]	[136,43; 138,57]	[135,18; 137,33]	
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	138,00	138,00	136,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	138,00	135,00
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8837	7459	6169	5255	4727	4223	3831	3623	3476	3353	3194	3034	2899	2784	2653	2524	2402		
	auswertbar	Anzahl	8837	6672	5867	5123	4626	4137	3602	3404	3289	3264	3132	2985	2846	2741	2601	2479	2329		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	144,15	141,17	139,99	139,43	138,68	138,81	137,78	137,92	137,20	137,35	137,23	137,00	136,59	136,79	136,21	137,20	136,88		
		CI Mean	[143,77; 144,53]	[140,76; 141,59]	[139,54; 140,43]	[138,97; 139,88]	[138,19; 139,17]	[138,29; 139,33]	[137,24; 138,31]	[137,36; 138,48]	[136,64; 137,76]	[136,79; 137,90]	[136,65; 137,80]	[136,43; 137,58]	[136,00; 137,18]	[136,17; 137,40]	[135,58; 136,84]	[136,54; 137,86]	[136,21; 137,54]		
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	138,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			
2004-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	11485	9702	8128	7032	6171	5608	5375	5093	4832	4594	4331	4082	3890	3716	3544	3366			
	auswertbar	Anzahl	11485	9025	7865	6812	5994	5342	5132	4850	4690	4473	4234	4003	3810	3635	3472	3293			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	143,51	141,17	140,36	139,32	139,18	138,32	138,73	137,26	138,03	137,59	137,99	137,17	137,84	137,02	137,46	137,08			
		CI Mean	[143,18; 143,84]	[140,81; 141,53]	[139,99; 140,74]	[138,92; 139,71]	[138,75; 139,61]	[137,88; 138,76]	[138,27; 139,19]	[136,80; 137,73]	[137,56; 138,50]	[137,10; 138,08]	[137,49; 138,50]	[136,66; 137,69]	[137,32; 138,37]	[136,47; 137,56]	[136,93; 138,00]	[136,51; 137,64]			
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	136,00	140,00	139,00	140,00	140,00	140,00	135,00	138,00	135,00	135,00		
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>				
2005-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8791	7582	6576	5708	5153	4846	4598	4386	4159	3920	3744	3587	3421	3276	3119				
	auswertbar	Anzahl	8791	7224	6314	5549	4902	4592	4378	4238	4046	3834	3655	3519	3353	3205	3031				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	143,40	140,39	139,60	139,10	138,45	138,49	137,07	137,93	137,85	137,53	137,42	137,43	136,49	137,62	136,89				
		CI Mean	[143,02; 143,78]	[140,00; 140,79]	[139,19; 140,02]	[138,66; 139,55]	[137,97; 138,93]	[138,01; 138,97]	[136,59; 137,55]	[137,44; 138,43]	[137,34; 138,35]	[137,02; 138,05]	[136,88; 137,96]	[136,88; 137,98]	[135,95; 137,03]	[137,06; 138,19]	[136,30; 137,48]				
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	136,00	140,00	140,00	137,00	135,00	135,00	135,00	138,00	135,00				
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>					
2005-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10827	9560	8254	7321	6829	6431	6068	5717	5326	5042	4784	4558	4352	4125					
	auswertbar	Anzahl	10827	8984	7924	6898	6427	6057	5832	5550	5199	4919	4679	4444	4244	4031					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	142,17	139,84	139,31	138,49	138,60	137,65	138,40	137,54	137,71	137,12	137,18	137,22	137,60	137,31					
		CI Mean	[141,83; 142,51]	[139,49; 140,20]	[138,93; 139,68]	[138,10; 138,89]	[138,19; 139,01]	[137,23; 138,06]	[137,97; 138,83]	[137,10; 137,98]	[137,26; 138,17]	[136,66; 137,59]	[136,69; 137,66]	[136,73; 137,70]	[137,09; 138,10]	[136,79; 137,83]					
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	137,00	137,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00					
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>						

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10041	8670	7619	7042	6617	6225	5878	5460	5161	4912	4662	4412	4201						
	auswertbar	Anzahl	10041	8332	7115	6634	6237	5975	5706	5283	5018	4796	4532	4306	4063						
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	142,56	140,01	138,78	139,01	137,77	138,44	137,78	137,75	137,40	137,75	137,27	137,52	137,17						
		CI Mean	[142,20; 142,91]	[139,63; 140,38]	[138,39; 139,18]	[138,60; 139,41]	[137,36; 138,18]	[138,01; 138,88]	[137,35; 138,22]	[137,30; 138,20]	[136,94; 137,86]	[137,27; 138,23]	[136,79; 137,75]	[137,01; 138,02]	[136,65; 137,68]						
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	138,00	138,00	136,00	138,00	135,00	138,00	135,00						
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>							
2006-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8717	7786	7045	6555	6183	5801	5368	5077	4807	4572	4383	4170							
	auswertbar	Anzahl	8717	7357	6624	6205	5894	5624	5215	4913	4671	4458	4263	4032							
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,78	138,84	138,58	137,63	137,92	137,26	137,80	136,86	137,53	136,69	137,37	136,79							
		CI Mean	[140,41; 141,15]	[138,45; 139,22]	[138,17; 138,98]	[137,22; 138,04]	[137,50; 138,34]	[136,84; 137,68]	[137,36; 138,25]	[136,40; 137,32]	[137,05; 138,00]	[136,23; 137,16]	[136,88; 137,86]	[136,30; 137,28]							
		Median	140,00	140,00	140,00	137,00	140,00	135,00	137,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00							
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>								
2007-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	9740	8822	8119	7553	7067	6516	6101	5750	5470	5187	4892								
	auswertbar	Anzahl	9740	8587	7836	7157	6791	6260	5859	5535	5239	4955	4649								
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,93	138,73	137,44	137,90	137,34	137,29	136,80	137,22	136,42	137,46	136,99								
		CI Mean	[140,57; 141,28]	[138,38; 139,08]	[137,07; 137,80]	[137,53; 138,28]	[136,95; 137,72]	[136,89; 137,69]	[136,38; 137,21]	[136,80; 137,64]	[135,99; 136,85]	[137,01; 137,91]	[136,53; 137,46]								
		Median	140,00	140,00	136,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00								
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>									
2007-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8319	7598	6997	6448	5878	5524	5198	4917	4652	4394									
	auswertbar	Anzahl	8319	7419	6676	6247	5742	5376	5056	4771	4525	4238									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,49	137,67	137,93	137,26	137,29	136,77	137,28	136,44	137,22	136,83									
		CI Mean	[140,10; 140,87]	[137,29; 138,05]	[137,53; 138,34]	[136,86; 137,66]	[136,87; 137,71]	[136,33; 137,20]	[136,82; 137,74]	[135,98; 136,90]	[136,74; 137,71]	[136,33; 137,34]									
		Median	140,00	137,00	139,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00									
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>										
2008-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	7726	6975	6404	5759	5373	5068	4783	4543	4295										
	auswertbar	Anzahl	7726	6677	6199	5630	5226	4948	4653	4434	4137										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,43	138,18	137,18	137,28	136,64	137,35	136,78	137,06	136,48										
		CI Mean	[140,03; 140,83]	[137,78; 138,59]	[136,77; 137,59]	[136,85; 137,70]	[136,19; 137,09]	[136,90; 137,81]	[136,31; 137,25]	[136,58; 137,54]	[136,00; 136,97]										
		Median	140,00	140,00	135,00	136,50	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00										
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>											
2008-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4950	4473	3980	3644	3438	3242	3083	2934											
	auswertbar	Anzahl	4950	4372	3905	3567	3382	3172	3008	2825											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,01	137,66	137,29	137,14	137,29	136,44	137,08	136,46											
		CI Mean	[138,52; 139,50]	[137,16; 138,16]	[136,77; 137,81]	[136,59; 137,68]	[136,73; 137,85]	[135,86; 137,02]	[136,49; 137,68]	[135,86; 137,06]											
		Median	140,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00											
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>												
2009-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6503	5681	5147	4733	4419	4144	3907												
	auswertbar	Anzahl	6503	5546	5033	4645	4326	4067	3808												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,54	137,27	136,52	137,05	136,00	136,70	136,66												
		CI Mean	[139,10; 139,97]	[136,82; 137,71]	[136,07; 136,98]	[136,57; 137,52]	[135,51; 136,48]	[136,21; 137,20]	[136,13; 137,19]												
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00												
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>													

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5189	4653	4232	3899	3622	3399														
	auswertbar	Anzahl	5189	4572	4159	3830	3561	3334														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,76	137,37	137,52	136,89	137,35	136,71														
		CI Mean	[139,28; 140,25]	[136,87; 137,87]	[137,01; 138,03]	[136,36; 137,42]	[136,81; 137,89]	[136,15; 137,26]														
		Median	140,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00														
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>															
2010-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6107	5481	5009	4588	4264															
	auswertbar	Anzahl	6107	5398	4911	4484	4159															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,77	137,58	136,48	137,25	136,58															
		CI Mean	[139,31; 140,22]	[137,14; 138,03]	[136,03; 136,93]	[136,77; 137,74]	[136,09; 137,08]															
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00															
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>																
2010-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5624	5095	4610	4225																
	auswertbar	Anzahl	5624	5025	4537	4128																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,20	136,80	137,39	137,00																
		CI Mean	[138,73; 139,67]	[136,33; 137,26]	[136,89; 137,88]	[136,50; 137,50]																
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00																
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>																	
2011-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6040	5396	4884																	
	auswertbar	Anzahl	6040	5297	4760																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,42	137,40	136,66																	
		CI Mean	[138,98; 139,87]	[136,93; 137,86]	[136,20; 137,12]																	
		Median	140,00	135,00	135,00																	
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																		
2011-2	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5189	4596																		
	auswertbar	Anzahl	5189	4501																		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,02	137,06																		
		CI Mean	[138,53; 139,50]	[136,56; 137,56]																		
		Median	140,00	135,00																		
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																			
2012-1	<b>erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5376																			
	auswertbar	Anzahl	5376																			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,49																			
		CI Mean	[139,01; 139,96]																			
		Median	140,00																			
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																				

In Tabelle 3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 10 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 77,30 mmHg, der Median bei 80,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei - - und der Median bei - -.

**Tabelle 3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation**

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	77,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[71,54; 83,06]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3760	3086	2634	2256	1946	1737	1575	1436	1370	1322	1272	1229	1172	1111	1075	1028	987	939
	auswertbar	Anzahl	3760	2832	2556	2198	1916	1710	1552	1383	1319	1264	1240	1199	1151	1091	1058	1015	970	913
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,72	80,19	80,26	79,47	79,10	79,26	78,76	78,60	78,47	78,25	78,36	77,92	76,99	77,44	76,92	77,20	77,15	77,04
		CI Mean	[81,42; 82,01]	[79,88; 80,50]	[79,92; 80,59]	[79,11; 79,84]	[78,70; 79,49]	[78,86; 79,65]	[78,36; 79,16]	[78,18; 79,02]	[78,03; 78,91]	[77,78; 78,71]	[77,88; 78,85]	[77,42; 78,42]	[76,46; 77,51]	[76,94; 77,93]	[76,39; 77,45]	[76,67; 77,73]	[76,57; 77,74]	[76,46; 77,62]
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8837	7459	6169	5255	4727	4223	3831	3623	3476	3353	3194	3034	2899	2784	2653	2524	2402	
	auswertbar	Anzahl	8837	6672	5867	5123	4626	4137	3602	3404	3289	3264	3132	2985	2846	2741	2601	2479	2329	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,47	80,24	79,82	79,72	79,25	79,24	78,55	78,68	78,46	78,51	78,41	78,50	78,07	78,03	77,74	77,99	77,56	
		CI Mean	[81,27; 81,66]	[80,02; 80,46]	[79,59; 80,05]	[79,47; 79,96]	[78,99; 79,51]	[78,97; 79,52]	[78,26; 78,84]	[78,38; 78,98]	[78,16; 78,76]	[78,20; 78,81]	[78,09; 78,72]	[78,17; 78,82]	[77,75; 78,39]	[77,70; 78,36]	[77,40; 78,09]	[77,64; 78,34]	[77,20; 77,92]	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	11485	9702	8128	7032	6171	5608	5375	5093	4832	4594	4331	4082	3890	3716	3544	3366		
	auswertbar	Anzahl	11485	9025	7865	6812	5994	5342	5132	4850	4690	4473	4234	4003	3810	3635	3472	3293		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,89	80,80	80,51	80,13	79,71	79,39	79,40	78,92	79,18	78,86	78,91	78,46	78,81	78,28	78,57	78,22		
		CI Mean	[81,71; 82,07]	[80,61; 80,99]	[80,31; 80,71]	[79,92; 80,35]	[79,49; 79,94]	[79,15; 79,63]	[79,16; 79,65]	[78,67; 79,17]	[78,93; 79,43]	[78,60; 79,11]	[78,64; 79,18]	[78,19; 78,73]	[78,52; 79,09]	[77,98; 78,58]	[78,27; 78,86]	[77,91; 78,53]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8791	7582	6576	5708	5153	4846	4598	4386	4159	3920	3744	3587	3421	3276	3119			
	auswertbar	Anzahl	8791	7224	6314	5549	4902	4592	4378	4238	4046	3834	3655	3519	3353	3205	3031			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,25	80,78	80,52	80,08	79,75	79,69	79,01	79,22	79,09	79,29	78,81	78,85	78,40	78,72	78,33			
		CI Mean	[82,04; 82,45]	[80,57; 80,98]	[80,30; 80,74]	[79,84; 80,31]	[79,50; 80,00]	[79,43; 79,95]	[78,74; 79,27]	[78,94; 79,49]	[78,81; 79,37]	[79,00; 79,58]	[78,52; 79,11]	[78,55; 79,15]	[78,09; 78,71]	[78,40; 79,04]	[78,01; 78,66]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10827	9560	8254	7321	6829	6431	6068	5717	5326	5042	4784	4558	4352	4125				
	auswertbar	Anzahl	10827	8984	7924	6898	6427	6057	5832	5550	5199	4919	4679	4444	4244	4031				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,62	80,49	80,32	79,81	79,77	79,11	79,56	79,21	79,19	78,99	78,83	78,58	78,76	78,78				
		CI Mean	[81,44; 81,80]	[80,30; 80,67]	[80,13; 80,52]	[79,61; 80,02]	[79,56; 79,98]	[78,89; 79,33]	[79,32; 79,79]	[78,97; 79,44]	[78,95; 79,43]	[78,74; 79,24]	[78,58; 79,08]	[78,32; 78,84]	[78,49; 79,03]	[78,49; 79,06]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	10041	8670	7619	7042	6617	6225	5878	5460	5161	4912	4662	4412	4201					
	auswertbar	Anzahl	10041	8332	7115	6634	6237	5975	5706	5283	5018	4796	4532	4306	4063					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,90	80,72	79,97	80,01	79,56	79,63	79,27	79,38	79,20	79,06	78,72	78,77	78,49					
		CI Mean	[81,72; 82,09]	[80,52; 80,91]	[79,77; 80,18]	[79,79; 80,23]	[79,34; 79,77]	[79,40; 79,85]	[79,04; 79,50]	[79,14; 79,63]	[78,94; 79,46]	[78,81; 79,32]	[78,45; 78,98]	[78,49; 79,05]	[78,20; 78,77]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>						

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8717	7786	7045	6555	6183	5801	5368	5077	4807	4572	4383	4170								
	auswertbar	Anzahl	8717	7357	6624	6205	5894	5624	5215	4913	4671	4458	4263	4032								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,40	80,43	80,10	79,67	79,86	79,40	79,63	79,10	79,56	78,87	79,26	78,98								
		CI Mean	[81,20; 81,59]	[80,23; 80,64]	[79,88; 80,32]	[79,45; 79,89]	[79,63; 80,09]	[79,17; 79,63]	[79,39; 79,87]	[78,86; 79,35]	[79,30; 79,82]	[78,61; 79,13]	[78,99; 79,53]	[78,70; 79,26]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>									
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	9740	8822	8119	7553	7067	6516	6101	5750	5470	5187	4892									
	auswertbar	Anzahl	9740	8587	7836	7157	6791	6260	5859	5535	5239	4955	4649									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,50	80,37	79,74	80,16	79,73	79,67	79,38	79,44	79,02	79,63	79,00									
		CI Mean	[81,31; 81,68]	[80,18; 80,56]	[79,55; 79,94]	[79,96; 80,37]	[79,52; 79,94]	[79,45; 79,89]	[79,15; 79,60]	[79,21; 79,66]	[78,78; 79,25]	[79,38; 79,87]	[78,75; 79,26]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>										
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	8319	7598	6997	6448	5878	5524	5198	4917	4652	4394										
	auswertbar	Anzahl	8319	7419	6676	6247	5742	5376	5056	4771	4525	4238										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,25	79,87	80,07	79,87	79,79	79,51	79,49	79,04	79,33	78,99										
		CI Mean	[81,04; 81,45]	[79,66; 80,07]	[79,85; 80,28]	[79,65; 80,09]	[79,56; 80,02]	[79,27; 79,74]	[79,24; 79,75]	[78,79; 79,29]	[79,06; 79,59]	[78,71; 79,27]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>											
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	7726	6975	6404	5759	5373	5068	4783	4543	4295											
	auswertbar	Anzahl	7726	6677	6199	5630	5226	4948	4653	4434	4137											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,69	80,71	79,99	80,13	79,79	80,00	79,58	79,60	79,50											
		CI Mean	[81,47; 81,91]	[80,48; 80,94]	[79,77; 80,22]	[79,89; 80,36]	[79,53; 80,04]	[79,75; 80,26]	[79,31; 79,84]	[79,33; 79,86]	[79,23; 79,78]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>												
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4950	4473	3980	3644	3438	3242	3083	2934												
	auswertbar	Anzahl	4950	4372	3905	3567	3382	3172	3008	2825												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,26	80,30	80,38	79,91	79,98	79,36	79,50	79,34												
		CI Mean	[80,99; 81,53]	[80,03; 80,58]	[80,10; 80,66]	[79,61; 80,21]	[79,67; 80,29]	[79,04; 79,68]	[79,16; 79,84]	[79,01; 79,68]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>													
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6503	5681	5147	4733	4419	4144	3907													
	auswertbar	Anzahl	6503	5546	5033	4645	4326	4067	3808													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,45	80,34	79,89	80,12	79,30	79,81	79,52													
		CI Mean	[81,21; 81,69]	[80,09; 80,59]	[79,63; 80,15]	[79,86; 80,38]	[79,02; 79,57]	[79,52; 80,10]	[79,22; 79,82]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>														
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5189	4653	4232	3899	3622	3399														
	auswertbar	Anzahl	5189	4572	4159	3830	3561	3334														
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,94	80,66	80,51	80,12	80,27	79,78														
		CI Mean	[81,67; 82,22]	[80,38; 80,94]	[80,22; 80,80]	[79,82; 80,42]	[79,97; 80,57]	[79,47; 80,09]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>															
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6107	5481	5009	4588	4264															
	auswertbar	Anzahl	6107	5398	4911	4484	4159															
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,61	80,56	79,95	80,19	79,96															
		CI Mean	[81,35; 81,86]	[80,31; 80,82]	[79,68; 80,21]	[79,92; 80,47]	[79,68; 80,25]															
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>																
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5624	5095	4610	4225																
	auswertbar	Anzahl	5624	5025	4537	4128																
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,63	80,35	80,51	80,04																
		CI Mean	[81,37; 81,90]	[80,09; 80,61]	[80,23; 80,78]	[79,74; 80,33]																
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>																	

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6040	5396	4884																		
	auswertbar	Anzahl	6040	5297	4760																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,69	80,57	80,07																		
		CI Mean	[81,44; 81,94]	[80,32; 80,83]	[79,80; 80,34]																		
		Median	80,00	80,00	80,00																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																			
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5189	4596																			
	auswertbar	Anzahl	5189	4501																			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,61	80,42																			
		CI Mean	[81,33; 81,88]	[80,14; 80,70]																			
		Median	80,00	80,00																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																				
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5376																				
	auswertbar	Anzahl	5376																				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,95																				
		CI Mean	[81,68; 82,22]																				
		Median	80,00																				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																					

### 3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensivierete Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

Eine etwaige Beeinträchtigung der Filter- bzw. Klärfunktion der Nieren kann durch die so genannte Kreatinin-Clearance beurteilt werden. Für deren Berechnung wird der Kreatininwert im Blut (Serum) des Patienten ermittelt. Ein erhöhter Kreatininwert kann eine Funktionsverschlechterung der Nieren anzeigen.

In Tabelle 3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr 14 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 14 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,49 %; der Median lag bei 7,05 %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - %; der Median lag bei - %, der dafür auswertbaren Patienten.

**Tabelle 3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration**

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,49	7,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[6,40; 8,57]	[5,29; 9,01]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	7,05	7,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Fallbasis mittlere Differenz		2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Mittlere Differenz zur ED		-0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI mittlere Differenz		[-0,35; -0,15]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Median mittlere Differenz		-0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225
	auswertbar	Anzahl	4885	3660	3317	2844	2462	2189	1988	1769	1691	1624	1600	1544	1481	1408	1364	1313	1264	1186
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,26	7,08	7,06	7,10	7,02	7,15	7,09	7,12	7,11	7,13	7,08	7,14	7,15	7,21	7,18	7,26	7,25	7,27
		CI Mean	[7,23; 7,30]	[7,04; 7,12]	[7,02; 7,09]	[7,06; 7,13]	[6,98; 7,06]	[7,11; 7,20]	[7,05; 7,14]	[7,07; 7,16]	[7,06; 7,15]	[7,08; 7,18]	[7,03; 7,13]	[7,09; 7,19]	[7,10; 7,20]	[7,16; 7,26]	[7,13; 7,24]	[7,21; 7,32]	[7,19; 7,30]	[7,21; 7,33]
		Median	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00	6,95	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
		Fallbasis mittlere Differenz		3660	3317	2844	2462	2189	1988	1769	1691	1624	1600	1544	1481	1408	1364	1313	1264	1186
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,15	-0,10	-0,15	-0,02	-0,06	-0,02	-0,03	0,02	-0,01	0,05	0,08	0,13	0,11	0,20	0,18	0,21
		CI mittlere Differenz		[-0,17; -0,11]	[-0,19; -0,12]	[-0,14; -0,06]	[-0,20; -0,11]	[-0,07; 0,03]	[-0,11; -0,01]	[-0,08; 0,03]	[-0,09; 0,03]	[-0,04; 0,08]	[-0,07; 0,05]	[-0,01; 0,12]	[0,01; 0,14]	[0,07; 0,20]	[0,04; 0,17]	[0,13; 0,27]	[0,11; 0,25]	[0,14; 0,29]
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30		
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293	
	auswertbar	Anzahl	12098	9031	7989	6934	6254	5590	4886	4624	4472	4413	4245	4055	3871	3737	3551	3390	3193	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,27	7,06	7,13	7,03	7,13	7,09	7,12	7,10	7,13	7,08	7,16	7,16	7,20	7,17	7,24	7,21	7,28	
		CI Mean	[7,25; 7,30]	[7,04; 7,09]	[7,10; 7,15]	[7,00; 7,06]	[7,10; 7,16]	[7,06; 7,12]	[7,09; 7,15]	[7,07; 7,13]	[7,10; 7,16]	[7,05; 7,11]	[7,13; 7,19]	[7,12; 7,19]	[7,17; 7,24]	[7,13; 7,20]	[7,20; 7,27]	[7,18; 7,25]	[7,25; 7,32]	
		Median	7,00	6,90	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10	
		Fallbasis mittlere Differenz		9024	7982	6928	6249	5585	4881	4621	4469	4409	4241	4052	3868	3734	3548	3387	3190	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,08	-0,16	-0,05	-0,08	-0,04	-0,06	-0,03	-0,08	0,01	0,01	0,06	0,02	0,10	0,08	0,16	
		CI mittlere Differenz		[-0,19; -0,15]	[-0,10; -0,06]	[-0,19; -0,13]	[-0,08; -0,02]	[-0,11; -0,04]	[-0,08; -0,01]	[-0,10; -0,03]	[-0,07; 0,01]	[-0,12; -0,04]	[-0,03; 0,05]	[-0,03; 0,05]	[0,02; 0,10]	[-0,02; 0,07]	[0,06; 0,14]	[0,03; 0,12]	[0,11; 0,20]	
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409		
	auswertbar	Anzahl	15059	11730	10224	8864	7774	6915	6615	6265	6029	5771	5472	5188	4955	4734	4542	4316		
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,25	7,09	6,96	7,05	7,00	7,05	7,04	7,04	7,00	7,10	7,08	7,13	7,13	7,22	7,16	7,21		
		CI Mean	[7,23; 7,27]	[7,07; 7,11]	[6,93; 6,98]	[7,03; 7,08]	[6,98; 7,03]	[7,02; 7,08]	[7,02; 7,07]	[7,02; 7,07]	[6,97; 7,03]	[7,07; 7,13]	[7,05; 7,11]	[7,10; 7,16]	[7,10; 7,16]	[7,19; 7,25]	[7,13; 7,20]	[7,17; 7,24]		
		Median	7,00	6,90	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00		
		Fallbasis mittlere Differenz		11724	10220	8860	7771	6913	6614	6264	6027	5770	5472	5188	4955	4734	4542	4316		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,21	-0,09	-0,11	-0,06	-0,06	-0,05	-0,09	0,01	-0,01	0,04	0,05	0,14	0,09	0,14		
		CI mittlere Differenz		[-0,14; -0,10]	[-0,23; -0,18]	[-0,11; -0,06]	[-0,14; -0,08]	[-0,09; -0,03]	[-0,09; -0,03]	[-0,09; -0,02]	[-0,12; -0,06]	[-0,02; 0,04]	[-0,04; 0,02]	[0,00; 0,07]	[0,02; 0,09]	[0,10; 0,18]	[0,05; 0,13]	[0,10; 0,18]		
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053			
	auswertbar	Anzahl	11675	9505	8302	7242	6389	5979	5680	5493	5243	4964	4727	4553	4343	4147	3934			
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,34	6,95	7,03	6,98	7,01	7,00	7,02	7,00	7,08	7,06	7,13	7,11	7,21	7,16	7,20			
		CI Mean	[7,31; 7,37]	[6,93; 6,98]	[7,00; 7,05]	[6,95; 7,00]	[6,99; 7,04]	[6,97; 7,03]	[6,99; 7,04]	[6,98; 7,03]	[7,05; 7,11]	[7,03; 7,09]	[7,10; 7,16]	[7,08; 7,14]	[7,17; 7,24]	[7,12; 7,19]	[7,16; 7,23]			
		Median	7,00	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	7,00	7,00	7,00			
		Fallbasis mittlere Differenz		9492	8290	7233	6381	5970	5671	5485	5235	4958	4722	4548	4338	4142	3929			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,33	-0,22	-0,25	-0,20	-0,20	-0,18	-0,18	-0,10	-0,11	-0,04	-0,06	0,04	-0,01	0,04			
		CI mittlere Differenz		[-0,35; -0,31]	[-0,25; -0,20]	[-0,27; -0,22]	[-0,23; -0,16]	[-0,23; -0,17]	[-0,21; -0,15]	[-0,21; -0,14]	[-0,13; -0,06]	[-0,15; -0,08]	[-0,08; 0,00]	[-0,10; 0,02]	[0,00; 0,08]	[-0,05; 0,04]	[-0,01; 0,08]			
Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10					



EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422					
	auswertbar	Anzahl	14277	11787	10353	8989	8391	7913	7601	7239	6788	6436	6129	5826	5571	5292					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,23	7,11	7,04	7,07	7,04	7,07	7,06	7,14	7,11	7,18	7,17	7,24	7,22	7,26					
		CI Mean	[7,21; 7,25]	[7,09; 7,13]	[7,02; 7,06]	[7,05; 7,09]	[7,01; 7,06]	[7,04; 7,09]	[7,03; 7,08]	[7,11; 7,16]	[7,08; 7,14]	[7,16; 7,21]	[7,14; 7,20]	[7,21; 7,27]	[7,19; 7,25]	[7,23; 7,29]					
		Median	6,90	6,90	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		11777	10346	8981	8385	7907	7596	7236	6785	6433	6126	5823	5569	5290					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,10	-0,12	-0,08	-0,10	-0,05	-0,07	0,01	0,00	0,07	0,07	0,15	0,13	0,18					
		CI mittlere Differenz		[-0,12; -0,08]	[-0,15; -0,10]	[-0,10; -0,05]	[-0,12; -0,07]	[-0,08; -0,03]	[-0,10; -0,04]	[-0,02; 0,03]	[-0,03; 0,03]	[0,04; 0,10]	[0,04; 0,11]	[0,12; 0,18]	[0,10; 0,17]	[0,14; 0,21]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20					
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459						
	auswertbar	Anzahl	13259	10867	9235	8581	8053	7705	7370	6823	6484	6197	5863	5580	5269						
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,26	7,01	7,05	7,01	7,02	6,98	7,07	7,06	7,14	7,14	7,22	7,19	7,23						
		CI Mean	[7,23; 7,28]	[6,99; 7,04]	[7,02; 7,07]	[6,98; 7,03]	[6,99; 7,04]	[6,95; 7,00]	[7,04; 7,10]	[7,03; 7,09]	[7,12; 7,17]	[7,11; 7,17]	[7,20; 7,25]	[7,16; 7,22]	[7,20; 7,26]						
		Median	6,90	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		10849	9223	8571	8045	7697	7362	6818	6479	6193	5860	5577	5266						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,19	-0,14	-0,16	-0,14	-0,17	-0,07	-0,08	0,00	0,00	0,09	0,05	0,11						
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,17]	[-0,16; -0,11]	[-0,18; -0,13]	[-0,17; -0,11]	[-0,20; -0,15]	[-0,10; -0,04]	[-0,11; -0,05]	[-0,03; 0,03]	[-0,03; 0,04]	[0,06; 0,13]	[0,02; 0,09]	[0,07; 0,15]						
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20						
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487							
	auswertbar	Anzahl	11740	9841	8836	8228	7769	7408	6885	6484	6170	5858	5599	5297							
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,17	7,02	6,98	6,97	6,96	7,05	7,02	7,10	7,08	7,15	7,13	7,17							
		CI Mean	[7,14; 7,19]	[6,99; 7,04]	[6,95; 7,00]	[6,95; 7,00]	[6,93; 6,98]	[7,03; 7,08]	[6,99; 7,05]	[7,07; 7,13]	[7,05; 7,11]	[7,13; 7,18]	[7,10; 7,16]	[7,13; 7,20]							
		Median	6,80	6,80	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90							
		Fallbasis mittlere Differenz		9824	8823	8214	7757	7394	6874	6473	6160	5848	5589	5288							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,13	-0,12	-0,12	-0,02	-0,04	0,03	0,02	0,11	0,08	0,12							
		CI mittlere Differenz		[-0,14; -0,10]	[-0,15; -0,11]	[-0,15; -0,10]	[-0,15; -0,10]	[-0,05; 0,00]	[-0,07; -0,02]	[0,00; 0,06]	[-0,01; 0,05]	[0,08; 0,14]	[0,05; 0,12]	[0,09; 0,16]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533								
	auswertbar	Anzahl	13085	11388	10365	9388	8903	8219	7714	7319	6940	6571	6181								
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	6,94	6,92	6,89	6,98	6,95	7,02	7,02	7,11	7,08	7,13								
		CI Mean	[7,16; 7,21]	[6,92; 6,96]	[6,90; 6,94]	[6,86; 6,91]	[6,95; 7,00]	[6,93; 6,98]	[7,00; 7,05]	[6,99; 7,04]	[7,09; 7,14]	[7,06; 7,11]	[7,10; 7,16]								
		Median	6,80	6,70	6,70	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90								
		Fallbasis mittlere Differenz		11375	10352	9377	8893	8210	7706	7312	6933	6564	6176								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,21	-0,22	-0,13	-0,15	-0,07	-0,07	0,03	0,01	0,07								
		CI mittlere Differenz		[-0,23; -0,19]	[-0,23; -0,18]	[-0,25; -0,20]	[-0,16; -0,10]	[-0,17; -0,12]	[-0,10; -0,04]	[-0,10; -0,04]	[0,00; 0,06]	[-0,02; 0,04]	[0,04; 0,11]								
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873									
	auswertbar	Anzahl	11319	10012	8920	8360	7682	7190	6757	6355	6046	5651									
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,13	6,91	6,88	6,96	6,94	7,01	7,00	7,09	7,06	7,09									
		CI Mean	[7,11; 7,16]	[6,89; 6,93]	[6,86; 6,90]	[6,94; 6,98]	[6,91; 6,96]	[6,98; 7,04]	[6,97; 7,03]	[7,06; 7,12]	[7,03; 7,09]	[7,06; 7,12]									
		Median	6,80	6,60	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80									
		Fallbasis mittlere Differenz		10000	8911	8351	7676	7184	6751	6350	6042	5648									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,20	-0,20	-0,11	-0,12	-0,04	-0,04	0,05	0,02	0,07									
		CI mittlere Differenz		[-0,22; -0,18]	[-0,23; -0,18]	[-0,13; -0,08]	[-0,15; -0,09]	[-0,07; -0,01]	[-0,07; -0,01]	[0,02; 0,09]	[-0,01; 0,06]	[0,03; 0,10]									
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839										
	auswertbar	Anzahl	10670	9091	8431	7622	7075	6694	6295	5995	5613										
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	6,85	6,91	6,89	6,95	6,95	7,04	7,00	7,06										
		CI Mean	[7,15; 7,21]	[6,82; 6,87]	[6,89; 6,94]	[6,87; 6,92]	[6,93; 6,98]	[6,92; 6,97]	[7,01; 7,07]	[6,98; 7,03]	[7,03; 7,09]										
		Median	6,80	6,60	6,70	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80										
		Fallbasis mittlere Differenz		9076	8417	7610	7066	6686	6288	5987	5606										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,29	-0,20	-0,22	-0,14	-0,13	-0,03	-0,06	-0,01										
		CI mittlere Differenz		[-0,31; -0,26]	[-0,22; -0,17]	[-0,24; -0,19]	[-0,17; -0,11]	[-0,17; -0,10]	[-0,06; 0,00]	[-0,10; -0,03]	[-0,05; 0,02]										
		Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10										

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928										
	auswertbar	Anzahl	6837	5967	5306	4851	4578	4280	4045	3791										
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,06	6,88	6,85	6,92	6,92	7,02	6,97	6,98										
		CI Mean	[7,03; 7,10]	[6,86; 6,91]	[6,82; 6,88]	[6,89; 6,95]	[6,89; 6,96]	[6,98; 7,05]	[6,93; 7,00]	[6,95; 7,02]										
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,70	6,75	6,70	6,70										
		Fallbasis mittlere Differenz		5953	5293	4839	4566	4268	4033	3780										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,18	-0,10	-0,08	0,02	-0,01	0,01										
		CI mittlere Differenz		[-0,18; -0,12]	[-0,21; -0,14]	[-0,13; -0,06]	[-0,12; -0,04]	[-0,02; 0,06]	[-0,05; 0,03]	[-0,03; 0,05]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10										
	2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474										
auswertbar		Anzahl	9374	7923	7120	6536	6059	5702	5327											
Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c		Mean	7,28	6,92	6,96	6,95	7,05	7,01	7,06											
		CI Mean	[7,25; 7,31]	[6,90; 6,95]	[6,93; 6,99]	[6,92; 6,98]	[7,02; 7,08]	[6,98; 7,04]	[7,03; 7,10]											
		Median	6,80	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80											
		Fallbasis mittlere Differenz		7914	7112	6530	6054	5696	5322											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,32	-0,25	-0,24	-0,14	-0,16	-0,09											
		CI mittlere Differenz		[-0,34; -0,29]	[-0,28; -0,22]	[-0,27; -0,21]	[-0,18; -0,11]	[-0,20; -0,13]	[-0,13; -0,05]											
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00											
2009-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747											
	auswertbar	Anzahl	7474	6522	5885	5387	4982	4645												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,24	6,98	6,94	7,02	7,00	7,03												
		CI Mean	[7,21; 7,28]	[6,95; 7,00]	[6,91; 6,97]	[6,99; 7,06]	[6,97; 7,03]	[6,99; 7,06]												
		Median	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70												
		Fallbasis mittlere Differenz		6507	5871	5375	4971	4635												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,23	-0,24	-0,15	-0,16	-0,13												
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,20]	[-0,27; -0,21]	[-0,19; -0,12]	[-0,20; -0,12]	[-0,17; -0,09]												
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00												
	2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942												
auswertbar		Anzahl	8721	7625	6885	6279	5798													
Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c		Mean	7,30	6,93	6,98	6,95	6,95													
		CI Mean	[7,27; 7,34]	[6,90; 6,95]	[6,95; 7,01]	[6,92; 6,97]	[6,92; 6,98]													
		Median	6,80	6,60	6,70	6,60	6,70													
		Fallbasis mittlere Differenz		7613	6873	6269	5788													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,34	-0,25	-0,27	-0,24													
		CI mittlere Differenz		[-0,37; -0,31]	[-0,28; -0,22]	[-0,30; -0,24]	[-0,28; -0,21]													
		Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	-0,10													
2010-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929													
	auswertbar	Anzahl	8084	7127	6380	5785														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,25	7,00	6,92	6,95														
		CI Mean	[7,22; 7,28]	[6,98; 7,03]	[6,90; 6,95]	[6,92; 6,98]														
		Median	6,80	6,70	6,60	6,70														
		Fallbasis mittlere Differenz		7110	6366	5773														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,25	-0,21														
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,19]	[-0,29; -0,22]	[-0,25; -0,18]														
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10														
	2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845														
auswertbar		Anzahl	8604	7470	6668															
Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c		Mean	7,33	6,90	6,90															
		CI Mean	[7,30; 7,36]	[6,88; 6,93]	[6,87; 6,92]															
		Median	6,80	6,60	6,60															
		Fallbasis mittlere Differenz		7453	6652															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,39	-0,36															
		CI mittlere Differenz		[-0,42; -0,36]	[-0,39; -0,33]															
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10															

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																				
	auswertbar	Anzahl	7588	6500																				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,26	6,89																				
		CI Mean	[7,22; 7,29]	[6,86; 6,92]																				
		Median	6,80	6,60																				
		Fallbasis mittlere Differenz		6482																				
		Mittlere Differenz zur ED			-0,34																			
		CI mittlere Differenz			[-0,37; -0,31]																			
		Median mittlere Differenz			-0,10																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																					
	auswertbar	Anzahl	7817																					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,33																					
		CI Mean	[7,30; 7,37]																					
		Median	6,80																					
		Fallbasis mittlere Differenz																						
		Mittlere Differenz zur ED																						
		CI mittlere Differenz																						
		Median mittlere Differenz																						

In Tabelle 3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalbjahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 14 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 14 Patienten lagen auswertbare Daten vor. 42,86 Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalbjahr wurden dieser Kategorie - - Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

**Tabelle 3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen**

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	auswertbar	Anzahl	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	3	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	21,43	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 43,73]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	6	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	42,86	50,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[15,96; 69,76]	[0,00; 100,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	21,43	50,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 43,73]	[0,00; 100,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	7,14	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 21,14]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	1	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	7,14	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	[0,00; 21,14]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225		
	auswertbar	Anzahl	4885	3660	3317	2844	2462	2189	1988	1769	1691	1624	1600	1544	1481	1408	1364	1313	1264	1186		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	642	609	493	352	349	235	226	197	196	167	176	144	147	111	123	100	107	80		
		Anteil in %	13,14	16,64	14,86	12,38	14,18	10,74	11,37	11,14	11,59	10,28	11,00	9,33	9,93	7,88	9,02	7,62	8,47	6,75		
		CI Anteil in %	[12,19; 14,09]	[15,43; 17,85]	[13,65; 16,07]	[11,17; 13,59]	[12,80; 15,55]	[9,44; 12,03]	[9,97; 12,76]	[9,67; 12,60]	[10,06; 13,12]	[8,81; 11,76]	[9,47; 12,53]	[7,88; 10,78]	[8,40; 11,45]	[6,48; 9,29]	[7,50; 10,54]	[6,18; 9,05]	[6,93; 10,00]	[5,32; 8,17]		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	2655	2060	1973	1740	1536	1375	1265	1085	1022	1016	1022	978	920	882	858	798	763	728		
		Anteil in %	54,35	56,28	59,48	61,18	62,39	62,81	63,63	61,33	60,44	62,56	63,88	63,34	62,12	62,64	62,90	60,78	60,36	61,38		
		CI Anteil in %	[52,95; 55,75]	[54,68; 57,89]	[57,81; 61,15]	[59,39; 62,97]	[60,47; 64,30]	[60,79; 64,84]	[61,52; 65,75]	[59,06; 63,60]	[58,11; 62,77]	[60,21; 64,92]	[61,52; 66,23]	[60,94; 65,75]	[59,65; 64,59]	[60,11; 65,17]	[60,34; 65,47]	[58,13; 63,42]	[57,67; 63,06]	[58,61; 64,15]		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	929	632	571	516	390	370	338	344	342	306	292	304	292	282	270	279	262	258		
		Anteil in %	19,02	17,27	17,21	18,14	15,84	16,90	17,00	19,45	20,22	18,84	18,25	19,69	19,72	20,03	19,79	21,25	20,73	21,75		
		CI Anteil in %	[17,92; 20,12]	[16,04; 18,49]	[15,93; 18,50]	[16,73; 19,56]	[14,40; 17,28]	[15,33; 18,47]	[15,35; 18,65]	[17,60; 21,29]	[18,31; 22,14]	[16,94; 20,74]	[16,36; 20,14]	[17,70; 21,67]	[17,69; 21,74]	[17,94; 22,12]	[17,68; 21,91]	[19,04; 23,46]	[18,49; 22,96]	[19,40; 24,10]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	487	268	213	194	142	157	118	122	99	109	89	90	98	110	92	112	108	95		
		Anteil in %	9,97	7,32	6,42	6,82	5,77	7,17	5,94	6,90	5,85	6,71	5,56	5,83	6,62	7,81	6,74	8,53	8,54	8,01		
		CI Anteil in %	[9,13; 10,81]	[6,48; 8,17]	[5,59; 7,26]	[5,89; 7,75]	[4,85; 6,69]	[6,09; 8,25]	[4,90; 6,97]	[5,72; 8,08]	[4,74; 6,97]	[5,49; 7,93]	[4,44; 6,69]	[4,66; 7,00]	[5,35; 7,88]	[6,41; 9,21]	[5,41; 8,08]	[7,02; 10,04]	[7,00; 10,09]	[6,46; 9,56]		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	172	91	67	42	45	52	41	21	32	26	21	28	24	23	21	24	24	25			
	Anteil in %	3,52	2,49	2,02	1,48	1,83	2,38	2,06	1,19	1,89	1,60	1,31	1,81	1,62	1,63	1,54	1,83	1,90	2,11			
	CI Anteil in %	[3,00; 4,04]	[1,98; 2,99]	[1,54; 2,50]	[1,03; 1,92]	[1,30; 2,36]	[1,74; 3,01]	[1,44; 2,69]	[0,68; 1,69]	[1,24; 2,54]	[0,99; 2,21]	[0,75; 1,87]	[1,15; 2,48]	[0,98; 2,26]	[0,97; 2,30]	[0,89; 2,19]	[1,10; 2,55]	[1,15; 2,65]	[1,29; 2,93]			

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293	
	auswertbar	Anzahl	12098	9031	7989	6934	6254	5590	4886	4624	4472	4413	4245	4055	3871	3737	3551	3390	3193	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1782	1526	1132	1123	856	727	614	577	527	539	472	420	408	410	322	320	287	
		Anteil in %	14,73	16,90	14,17	16,20	13,69	13,01	12,57	12,48	11,78	12,21	11,12	10,36	10,54	10,97	9,07	9,44	8,99	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[14,10; 15,36]	[16,12; 17,67]	[13,40; 14,93]	[15,33; 17,06]	[12,84; 14,54]	[12,12; 13,89]	[11,64; 13,50]	[11,53; 13,43]	[10,84; 12,73]	[11,25; 13,18]	[10,17; 12,06]	[9,42; 11,30]	[9,57; 11,51]	[9,97; 11,97]	[8,12; 10,01]	[8,46; 10,42]	[8,00; 9,98]	
		Anzahl	6304	5143	4598	4066	3630	3432	2967	2814	2712	2760	2539	2486	2303	2236	2129	2053	1847	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	52,11	56,95	57,55	58,64	58,04	61,40	60,72	60,86	60,64	62,54	59,81	61,31	59,49	59,83	59,95	60,56	57,85	
		CI Anteil in %	[51,22; 53,00]	[55,93; 57,97]	[56,47; 58,64]	[57,48; 59,80]	[56,82; 59,27]	[60,12; 62,67]	[59,36; 62,09]	[59,45; 62,26]	[59,21; 62,08]	[61,11; 63,97]	[58,34; 61,29]	[59,81; 62,81]	[57,95; 61,04]	[58,26; 61,41]	[58,34; 61,57]	[58,92; 62,21]	[56,13; 59,56]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	2257	1437	1403	1115	1129	926	866	833	829	751	844	783	761	733	739	680	687	
		Anteil in %	18,66	15,91	17,56	16,08	18,05	16,57	17,72	18,01	18,54	17,02	19,88	19,31	19,66	19,61	20,81	20,06	21,52	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[17,96; 19,35]	[15,16; 16,67]	[16,73; 18,40]	[15,22; 16,94]	[17,10; 19,01]	[15,59; 17,54]	[16,65; 18,79]	[16,91; 19,12]	[17,40; 19,68]	[15,91; 18,13]	[18,68; 21,08]	[18,09; 20,52]	[18,41; 20,91]	[18,34; 20,89]	[19,48; 22,15]	[18,71; 21,41]	[20,09; 22,94]	
		Anzahl	1234	717	674	483	480	401	347	315	309	285	315	300	327	287	305	281	312	
		Anteil in %	10,20	7,94	8,44	6,97	7,68	7,17	7,10	6,81	6,91	6,46	7,42	7,40	8,45	7,68	8,59	8,29	9,77	
		CI Anteil in %	[9,66; 10,74]	[7,38; 8,50]	[7,83; 9,05]	[6,37; 7,56]	[7,02; 8,33]	[6,50; 7,85]	[6,38; 7,82]	[6,09; 7,54]	[6,17; 7,65]	[5,73; 7,18]	[6,63; 8,21]	[6,59; 8,20]	[7,57; 9,32]	[6,83; 8,53]	[7,67; 9,51]	[7,36; 9,22]	[8,74; 10,80]	
	Anzahl	521	208	182	147	159	104	92	85	95	78	75	66	72	71	56	56	60		
	Anteil in %	4,31	2,30	2,28	2,12	2,54	1,86	1,88	1,84	2,12	1,77	1,77	1,63	1,86	1,90	1,58	1,65	1,88		
	CI Anteil in %	[3,94; 4,67]	[1,99; 2,61]	[1,95; 2,61]	[1,78; 2,46]	[2,15; 2,93]	[1,51; 2,21]	[1,50; 2,26]	[1,45; 2,23]	[1,70; 2,55]	[1,38; 2,16]	[1,37; 2,16]	[1,24; 2,02]	[1,43; 2,29]	[1,46; 2,34]	[1,17; 1,99]	[1,22; 2,08]	[1,41; 2,35]		
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409		
2004-2	auswertbar	Anzahl	15059	11730	10224	8864	7774	6915	6615	6265	6029	5771	5472	5188	4955	4734	4542	4316		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	2350	1875	1919	1335	1161	994	977	903	864	716	653	592	534	423	452	428		
		Anteil in %	15,61	15,98	18,77	15,06	14,93	14,37	14,77	14,41	14,33	12,41	11,93	11,41	10,78	8,94	9,95	9,92		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[15,03; 16,18]	[15,32; 16,65]	[18,01; 19,53]	[14,32; 15,81]	[14,14; 15,73]	[13,55; 15,20]	[13,91; 15,62]	[13,54; 15,22]	[13,45; 15,22]	[11,56; 13,26]	[11,07; 12,79]	[10,55; 12,28]	[9,91; 11,64]	[8,12; 9,75]	[9,08; 10,82]	[9,02; 10,81]		
		Anzahl	7906	6622	5939	5265	4805	4158	3964	3799	3790	3531	3431	3180	3060	2918	2808	2561		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	52,50	56,45	58,09	59,40	61,81	60,13	59,92	60,64	62,86	61,19	62,70	61,30	61,76	61,64	61,82	59,34		
		CI Anteil in %	[51,70; 53,30]	[55,56; 57,35]	[57,13; 59,05]	[58,38; 60,42]	[60,73; 62,89]	[58,98; 61,28]	[58,74; 61,11]	[59,43; 61,85]	[61,64; 64,08]	[59,93; 62,44]	[61,42; 63,98]	[59,97; 62,62]	[60,40; 63,11]	[60,25; 63,02]	[60,41; 63,24]	[57,87; 60,80]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	2634	2018	1501	1410	1193	1165	1088	1021	888	1004	941	970	920	904	852	874		
		Anteil in %	17,49	17,20	14,68	15,91	15,35	16,85	16,45	16,30	14,73	17,40	17,20	18,70	18,57	19,10	18,76	20,25		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,88; 18,10]	[16,52; 17,89]	[14,00; 15,37]	[15,15; 16,67]	[14,54; 16,15]	[15,97; 17,73]	[15,55; 17,34]	[15,38; 17,21]	[13,83; 15,62]	[16,42; 18,38]	[16,20; 18,20]	[17,64; 19,76]	[17,48; 19,65]	[17,98; 20,22]	[17,62; 19,89]	[19,05; 21,45]		
		Anzahl	1486	931	667	658	462	453	454	426	383	416	346	357	356	369	353	370		
		Anteil in %	9,87	7,94	6,52	7,42	5,94	6,55	6,86	6,80	6,35	7,21	6,32	6,88	7,18	7,79	7,77	8,57		
		CI Anteil in %	[9,39; 10,34]	[7,45; 8,43]	[6,05; 7,00]	[6,88; 7,97]	[5,42; 6,47]	[5,97; 7,13]	[6,25; 7,47]	[6,18; 7,42]	[5,74; 6,97]	[6,54; 7,88]	[5,68; 6,97]	[6,19; 7,57]	[6,47; 7,90]	[7,03; 8,56]	[6,99; 8,55]	[7,74; 9,41]		
		Anzahl	683	284	198	196	153	145	132	116	104	104	101	85	120	77	83			
Anteil in %		4,54	2,42	1,94	2,21	1,97	2,10	2,00	1,85	1,72	1,80	1,85	1,72	2,53	1,70	1,92				
	CI Anteil in %	[4,20; 4,87]	[2,14; 2,70]	[1,67; 2,20]	[1,91; 2,52]	[1,66; 2,28]	[1,76; 2,43]	[1,66; 2,33]	[1,52; 2,19]	[1,40; 2,05]	[1,46; 2,15]	[1,49; 2,20]	[1,36; 2,07]	[1,35; 2,08]	[2,09; 2,98]	[1,32; 2,07]	[1,51; 2,33]			
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053			
2005-1	auswertbar	Anzahl	11675	9505	8302	7242	6389	5979	5680	5493	5243	4964	4727	4553	4343	4147	3934			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1602	1976	1406	1188	992	940	885	843	724	664	536	538	434	454	404			
		Anteil in %	13,72	20,79	16,94	16,40	15,53	15,72	15,58	15,35	13,81	13,38	11,34	11,82	9,99	10,95	10,27			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[13,10; 14,35]	[19,97; 21,60]	[16,13; 17,74]	[15,55; 17,26]	[14,64; 16,41]	[14,80; 16,64]	[14,64; 16,52]	[14,39; 16,30]	[12,87; 14,74]	[12,43; 14,32]	[10,44; 12,24]	[10,88; 12,75]	[9,10; 10,89]	[10,00; 11,90]	[9,32; 11,22]			
		Anzahl	6251	5330	4808	4403	3887	3632	3437	3341	3167	3078	2912	2812	2658	2558	2394			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	53,54	56,08	57,91	60,80	60,84	60,75	60,51	60,82	60,40	62,01	61,60	61,76	61,20	61,68	60,85			
		CI Anteil in %	[52,64; 54,45]	[55,08; 57,07]	[56,85; 58,98]	[59,67; 61,92]	[59,64; 62,04]	[59,51; 61,98]	[59,24; 61,78]	[59,53; 62,11]	[59,08; 61,73]	[60,66; 63,36]	[60,22; 62,99]	[60,35; 63,17]	[59,75; 62,65]	[60,20; 63,16]	[59,33; 62,38]			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	2002	1332	1277	1070	955	906	874	871	841	802	816	766	774	718	727			
		Anteil in %	17,15	14,01	15,38	14,77	14,95	15,15	15,39	15,86	16,04	16,16	17,26	16,82	17,82	17,31	18,48			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,46; 17,83]	[13,32; 14,71]	[14,61; 16,16]	[13,96; 15,59]	[14,07; 15,82]	[14,24; 16,06]	[14,45; 16,33]	[14,89; 16,82]	[15,05; 17,03]	[15,13; 17,18]	[16,19; 18,34]	[15,74; 17,91]	[16,68; 18,96]	[16,16; 18,47]	[17,27; 19,69]			
		Anzahl	1131	640	622	434	420	379	386	333	412	317	371	350	378	321	314			
		Anteil in %	9,69	6,73	7,49	5,99	6,57	6,34	6,80	6,06	7,86	6,39	7,85	7,69	8,70	7,74	7,98			
		CI Anteil in %	[9,15; 10,22]	[6,23; 7,24]	[6,93; 8,06]	[5,45; 6,54]	[5,97; 7,18]	[5,72; 6,96]	[6,14; 7,45]	[5,43; 6,69]	[7,13; 8,59]	[5,71; 7,07]	[7,08; 8,62]	[6,91; 8,46]	[7,87; 9,54]	[6,93; 8,55]	[7,13; 8,83]			
		Anzahl	689	227	189	147	135	122	98	105	99	103	92	87	99	96	95			
Anteil in %		5,90	2,39	2,28	2,03	2,11	2,04	1,73	1,91	1,89	2,07	1,95	1,91	2,28	2,31	2,41				
	CI Anteil in %	[5,47; 6,33]	[2,08; 2,70]	[1,96; 2,60]	[1,71; 2,35]	[1,76; 2,47]	[1,68; 2,40]	[1,39; 2,06]	[1,55; 2,27]	[1,52; 2,26]	[1,68; 2,47]	[1,55; 2,34]	[1,51; 2,31]	[1,84; 2,72]	[1,86; 2,77]	[1,94; 2,89]				



EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533										
	auswertbar	Anzahl	13085	11388	10365	9388	8903	8219	7714	7319	6940	6571	6181										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	2077	2279	2034	1855	1486	1329	1168	1111	831	834	764										
		Anteil in %	15,87	20,01	19,62	19,76	16,69	16,17	15,14	15,18	11,97	12,69	12,36										
		CI Anteil in %	[15,25; 16,50]	[19,28; 20,75]	[18,86; 20,39]	[18,95; 20,56]	[15,92; 17,47]	[15,37; 16,97]	[14,34; 15,94]	[14,36; 16,00]	[11,21; 12,74]	[11,89; 13,50]	[11,54; 13,18]										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	7327	6553	6095	5585	5369	5077	4693	4432	4298	4104	3719										
		Anteil in %	56,00	57,54	58,80	59,49	60,31	61,77	60,84	60,55	61,93	62,46	60,17										
		CI Anteil in %	[55,14; 56,85]	[56,64; 58,45]	[57,86; 59,75]	[58,50; 60,48]	[59,29; 61,32]	[60,72; 62,82]	[59,75; 61,93]	[59,43; 61,67]	[60,79; 63,07]	[61,29; 63,63]	[58,95; 61,39]										
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1909	1494	1399	1247	1276	1157	1170	1131	1126	1027	1033										
		Anteil in %	14,59	13,12	13,50	13,28	14,33	14,08	15,17	15,45	16,22	15,63	16,71										
		CI Anteil in %	[13,98; 15,19]	[12,50; 13,74]	[12,84; 14,16]	[12,60; 13,97]	[13,60; 15,06]	[13,33; 14,83]	[14,37; 15,97]	[14,62; 16,28]	[15,36; 17,09]	[14,75; 16,51]	[15,78; 17,64]										
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1138	788	590	524	586	496	521	491	515	437	500										
		Anteil in %	8,70	6,92	5,69	5,58	6,58	6,03	6,75	6,71	7,42	6,65	8,09										
		CI Anteil in %	[8,21; 9,18]	[6,45; 7,39]	[5,25; 6,14]	[5,12; 6,05]	[6,07; 7,10]	[5,52; 6,55]	[6,19; 7,31]	[6,14; 7,28]	[6,80; 8,04]	[6,05; 7,25]	[7,41; 8,77]										
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	634	274	247	177	186	160	162	154	170	169	165										
Anteil in %		4,85	2,41	2,38	1,89	2,09	1,95	2,10	2,10	2,45	2,57	2,67											
	CI Anteil in %	[4,48; 5,21]	[2,12; 2,69]	[2,09; 2,68]	[1,61; 2,16]	[1,79; 2,39]	[1,65; 2,25]	[1,78; 2,42]	[1,78; 2,43]	[2,09; 2,81]	[2,19; 2,95]	[2,27; 3,07]											
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873											
	auswertbar	Anzahl	11319	10012	8920	8360	7682	7190	6757	6355	6046	5651											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1814	2024	1780	1416	1298	1114	1030	804	785	749											
		Anteil in %	16,03	20,22	19,96	16,94	16,90	15,49	15,24	12,65	12,98	13,25											
		CI Anteil in %	[15,35; 16,70]	[19,43; 21,00]	[19,13; 20,78]	[16,13; 17,74]	[16,06; 17,73]	[14,66; 16,33]	[14,39; 16,10]	[11,83; 13,47]	[12,14; 13,83]	[12,37; 14,14]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	6541	5852	5345	5058	4760	4380	4172	3937	3744	3423											
		Anteil in %	57,79	58,45	59,92	60,50	61,96	60,92	61,74	61,95	61,93	60,57											
		CI Anteil in %	[56,88; 58,70]	[57,48; 59,42]	[58,90; 60,94]	[59,45; 61,55]	[60,88; 63,05]	[59,79; 62,05]	[60,58; 62,90]	[60,76; 63,15]	[60,70; 63,15]	[59,30; 61,85]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1529	1269	1116	1163	1034	1030	971	1005	964	888											
		Anteil in %	13,51	12,67	12,51	13,91	13,46	14,33	14,37	15,81	15,94	15,71											
		CI Anteil in %	[12,88; 14,14]	[12,02; 13,33]	[11,82; 13,20]	[13,17; 14,65]	[12,70; 14,22]	[13,52; 15,14]	[13,53; 15,21]	[14,92; 16,71]	[15,02; 16,87]	[14,77; 16,66]											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	891	652	513	551	458	509	451	445	417	448											
		Anteil in %	7,87	6,51	5,75	6,59	5,96	7,08	6,67	7,00	6,90	7,93											
		CI Anteil in %	[7,38; 8,37]	[6,03; 7,00]	[5,27; 6,23]	[6,06; 7,12]	[5,43; 6,49]	[6,49; 7,67]	[6,08; 7,27]	[6,37; 7,63]	[6,26; 7,54]	[7,22; 8,63]											
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	544	215	166	172	132	157	133	164	136	143											
Anteil in %		4,81	2,15	1,86	2,06	1,72	2,18	1,97	2,58	2,25	2,53												
	CI Anteil in %	[4,41; 5,20]	[1,86; 2,43]	[1,58; 2,14]	[1,75; 2,36]	[1,43; 2,01]	[1,85; 2,52]	[1,64; 2,30]	[2,19; 2,97]	[1,88; 2,62]	[2,12; 2,94]												
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839												
	auswertbar	Anzahl	10670	9091	8431	7622	7075	6694	6295	5995	5613												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1748	1958	1564	1425	1220	1125	884	898	808												
		Anteil in %	16,38	21,54	18,55	18,70	17,24	16,81	14,04	14,98	14,40												
		CI Anteil in %	[15,68; 17,08]	[20,69; 22,38]	[17,72; 19,38]	[17,82; 19,57]	[16,36; 18,12]	[15,91; 17,70]	[13,18; 14,90]	[14,08; 15,88]	[13,48; 15,31]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	6060	5348	5079	4662	4302	4157	3924	3729	3419												
		Anteil in %	56,79	58,83	60,24	61,17	60,81	62,10	62,34	62,20	60,91												
		CI Anteil in %	[55,85; 57,73]	[57,82; 59,84]	[59,20; 61,29]	[60,07; 62,26]	[59,67; 61,94]	[60,94; 63,26]	[61,14; 63,53]	[60,97; 63,43]	[59,64; 62,19]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1408	1064	1085	968	949	859	884	810	837												
		Anteil in %	13,20	11,70	12,87	12,70	13,41	12,83	14,04	13,51	14,91												
		CI Anteil in %	[12,55; 13,84]	[11,04; 12,36]	[12,15; 13,58]	[11,95; 13,45]	[12,62; 14,21]	[12,03; 13,63]	[13,18; 14,90]	[12,65; 14,38]	[13,98; 15,84]												
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	846	530	515	412	461	407	425	418	390												
		Anteil in %	7,93	5,83	6,11	5,41	6,52	6,08	6,75	6,97	6,95												
		CI Anteil in %	[7,42; 8,44]	[5,35; 6,31]	[5,60; 6,62]	[4,90; 5,91]	[5,94; 7,09]	[5,51; 6,65]	[6,13; 7,37]	[6,33; 7,62]	[6,28; 7,61]												
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	608	191	188	155	143	146	178	140	159												
Anteil in %		5,70	2,10	2,23	2,03	2,02	2,18	2,83	2,34	2,83													
	CI Anteil in %	[5,26; 6,14]	[1,81; 2,40]	[1,91; 2,55]	[1,72; 2,35]	[1,69; 2,35]	[1,83; 2,53]	[2,42; 3,24]	[1,95; 2,72]	[2,40; 3,27]													

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928												
	auswertbar	Anzahl	6837	5967	5306	4851	4578	4280	4045	3791												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1226	1203	1048	923	812	611	590	565												
		Anteil in %	17,93	20,16	19,75	19,03	17,74	14,28	14,59	14,90												
	CI Anteil in %	[17,02; 18,84]	[19,14; 21,18]	[18,68; 20,82]	[17,92; 20,13]	[16,63; 18,84]	[13,23; 15,32]	[13,50; 15,67]	[13,77; 16,04]													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3971	3568	3258	2914	2830	2701	2588	2386												
		Anteil in %	58,08	59,80	61,40	60,07	61,82	63,11	63,98	62,94												
	CI Anteil in %	[56,91; 59,25]	[58,55; 61,04]	[60,09; 62,71]	[58,69; 61,45]	[60,41; 63,22]	[61,66; 64,55]	[62,50; 65,46]	[61,40; 64,48]													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	853	720	620	636	571	580	551	541												
		Anteil in %	12,48	12,07	11,68	13,11	12,47	13,55	13,62	14,27												
	CI Anteil in %	[11,69; 13,26]	[11,24; 12,89]	[10,82; 12,55]	[12,16; 14,06]	[11,52; 13,43]	[12,53; 14,58]	[12,56; 14,68]	[13,16; 15,38]													
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	451	350	278	273	263	281	241	212												
		Anteil in %	6,60	5,87	5,24	5,63	5,74	6,57	5,96	5,59												
CI Anteil in %	[6,01; 7,18]	[5,27; 6,46]	[4,64; 5,84]	[4,98; 6,28]	[5,07; 6,42]	[5,82; 7,31]	[5,23; 6,69]	[4,86; 6,32]														
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	336	126	102	105	102	107	75	87													
	Anteil in %	4,91	2,11	1,92	2,16	2,23	2,50	1,85	2,29													
CI Anteil in %	[4,40; 5,43]	[1,75; 2,48]	[1,55; 2,29]	[1,75; 2,57]	[1,80; 2,66]	[2,03; 2,97]	[1,44; 2,27]	[1,82; 2,77]														
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474													
	auswertbar	Anzahl	9374	7923	7120	6536	6059	5702	5327													
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1405	1641	1384	1236	939	968	836													
		Anteil in %	14,99	20,71	19,44	18,91	15,50	16,98	15,69													
	CI Anteil in %	[14,27; 15,71]	[19,82; 21,60]	[18,52; 20,36]	[17,96; 19,86]	[14,59; 16,41]	[16,00; 17,95]	[14,72; 16,67]														
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5156	4560	4084	3786	3644	3402	3148													
		Anteil in %	55,00	57,55	57,36	57,93	60,14	59,66	59,10													
	CI Anteil in %	[54,00; 56,01]	[56,47; 58,64]	[56,21; 58,51]	[56,73; 59,12]	[58,91; 61,37]	[58,39; 60,94]	[57,77; 60,42]														
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1343	981	976	928	844	779	799													
		Anteil in %	14,33	12,38	13,71	14,20	13,93	13,66	15,00													
	CI Anteil in %	[13,62; 15,04]	[11,66; 13,11]	[12,91; 14,51]	[13,35; 15,04]	[13,06; 14,80]	[12,77; 14,55]	[14,04; 15,96]														
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	884	518	504	420	459	390	370													
		Anteil in %	9,43	6,54	7,08	6,43	7,58	6,84	6,95													
CI Anteil in %	[8,84; 10,02]	[5,99; 7,08]	[6,48; 7,67]	[5,83; 7,02]	[6,91; 8,24]	[6,18; 7,49]	[6,26; 7,63]															
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	586	223	172	166	173	163	174														
	Anteil in %	6,25	2,81	2,42	2,54	2,86	2,86	3,27														
CI Anteil in %	[5,76; 6,74]	[2,45; 3,18]	[2,06; 2,77]	[2,16; 2,92]	[2,44; 3,27]	[2,43; 3,29]	[2,79; 3,74]															
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747														
	auswertbar	Anzahl	7474	6522	5885	5387	4982	4645														
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1059	1232	1092	806	793	732														
		Anteil in %	14,17	18,89	18,56	14,96	15,92	15,76														
	CI Anteil in %	[13,38; 14,96]	[17,94; 19,84]	[17,56; 19,55]	[14,01; 15,91]	[14,90; 16,93]	[14,71; 16,81]															
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4236	3781	3494	3331	3048	2816														
		Anteil in %	56,68	57,97	59,37	61,83	61,18	60,62														
	CI Anteil in %	[55,55; 57,80]	[56,77; 59,17]	[58,12; 60,63]	[60,54; 63,13]	[59,83; 62,53]	[59,22; 62,03]															
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1036	875	788	728	681	644														
		Anteil in %	13,86	13,42	13,39	13,51	13,67	13,86														
	CI Anteil in %	[13,08; 14,64]	[12,59; 14,24]	[12,52; 14,26]	[12,60; 14,43]	[12,72; 14,62]	[12,87; 14,86]															
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	697	449	370	386	340	319														
		Anteil in %	9,33	6,88	6,29	7,17	6,82	6,87														
CI Anteil in %	[8,67; 9,98]	[6,27; 7,50]	[5,67; 6,91]	[6,48; 7,85]	[6,12; 7,52]	[6,14; 7,59]																
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	446	185	141	136	120	134															
	Anteil in %	5,97	2,84	2,40	2,52	2,41	2,88															
CI Anteil in %	[5,43; 6,50]	[2,43; 3,24]	[2,01; 2,79]	[2,11; 2,94]	[1,98; 2,83]	[2,40; 3,37]																



EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942															
	auswertbar	Anzahl	8721	7625	6885	6279	5798															
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1211	1554	1176	1111	1059															
		Anteil in %	13,89	20,38	17,08	17,69	18,26															
	CI Anteil in %	[13,16; 14,61]	[19,48; 21,28]	[16,19; 17,97]	[16,75; 18,64]	[17,27; 19,26]																
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4887	4413	4165	3798	3476															
		Anteil in %	56,04	57,88	60,49	60,49	59,95															
	CI Anteil in %	[55,00; 57,08]	[56,77; 58,98]	[59,34; 61,65]	[59,28; 61,70]	[58,69; 61,21]																
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1211	965	931	852	732															
		Anteil in %	13,89	12,66	13,52	13,57	12,63															
	CI Anteil in %	[13,16; 14,61]	[11,91; 13,40]	[12,71; 14,33]	[12,72; 14,42]	[11,77; 13,48]																
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	788	508	420	358	387															
		Anteil in %	9,04	6,66	6,10	5,70	6,67															
CI Anteil in %	[8,43; 9,64]	[6,10; 7,22]	[5,53; 6,67]	[5,13; 6,28]	[6,03; 7,32]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	624	185	193	160	144																
	Anteil in %	7,16	2,43	2,80	2,55	2,48																
CI Anteil in %	[6,61; 7,70]	[2,08; 2,77]	[2,41; 3,19]	[2,16; 2,94]	[2,08; 2,88]																	
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929																
	auswertbar	Anzahl	8084	7127	6380	5785																
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1058	1160	1114	1001																
		Anteil in %	13,09	16,28	17,46	17,30																
	CI Anteil in %	[12,35; 13,82]	[15,42; 17,13]	[16,53; 18,39]	[16,33; 18,28]																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4722	4321	3964	3542																
		Anteil in %	58,41	60,63	62,13	61,23																
	CI Anteil in %	[57,34; 59,49]	[59,49; 61,76]	[60,94; 63,32]	[59,97; 62,48]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1079	957	771	722																
		Anteil in %	13,35	13,43	12,08	12,48																
	CI Anteil in %	[12,61; 14,09]	[12,64; 14,22]	[11,28; 12,88]	[11,63; 13,33]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	732	470	378	380																
		Anteil in %	9,05	6,59	5,92	6,57																
CI Anteil in %	[8,43; 9,68]	[6,02; 7,17]	[5,35; 6,50]	[5,93; 7,21]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	493	219	153	140																	
	Anteil in %	6,10	3,07	2,40	2,42																	
CI Anteil in %	[5,58; 6,62]	[2,67; 3,47]	[2,02; 2,77]	[2,02; 2,82]																		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845																	
	auswertbar	Anzahl	8604	7470	6668																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1051	1419	1366																	
		Anteil in %	12,22	19,00	20,49																	
	CI Anteil in %	[11,52; 12,91]	[18,11; 19,89]	[19,52; 21,45]																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4976	4560	3938																	
		Anteil in %	57,83	61,04	59,06																	
	CI Anteil in %	[56,79; 58,88]	[59,94; 62,15]	[57,88; 60,24]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1186	850	803																	
		Anteil in %	13,78	11,38	12,04																	
	CI Anteil in %	[13,06; 14,51]	[10,66; 12,10]	[11,26; 12,82]																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	756	448	388																	
		Anteil in %	8,79	6,00	5,82																	
CI Anteil in %	[8,19; 9,38]	[5,46; 6,54]	[5,26; 6,38]																			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	635	193	173																		
	Anteil in %	7,38	2,58	2,59																		
CI Anteil in %	[6,83; 7,93]	[2,22; 2,94]	[2,21; 2,98]																			

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																		
	auswertbar	Anzahl	7588	6500																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	992	1307																		
		Anteil in %		13,07	20,11																	
		CI Anteil in %		[12,31; 13,83]	[19,13; 21,08]																	
		Anzahl	4477	3895																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %		59,00	59,92																	
		CI Anteil in %		[57,89; 60,11]	[58,73; 61,11]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	965	741																		
		Anteil in %		12,72	11,40																	
		CI Anteil in %		[11,97; 13,47]	[10,63; 12,17]																	
		Anzahl	650	384																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %		8,57	5,91																	
		CI Anteil in %		[7,94; 9,20]	[5,33; 6,48]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	504	173																			
	Anteil in %		6,64	2,66																		
	CI Anteil in %		[6,08; 7,20]	[2,27; 3,05]																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																			
	auswertbar	Anzahl	7817																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1116																			
		Anteil in %		14,28																		
		CI Anteil in %		[13,50; 15,05]																		
		Anzahl	4367																			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %		55,87																		
		CI Anteil in %		[54,76; 56,97]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1020																			
		Anteil in %		13,05																		
		CI Anteil in %		[12,30; 13,80]																		
		Anzahl	705																			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %		9,02																		
		CI Anteil in %		[8,38; 9,65]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	609																				
	Anteil in %		7,79																			
	CI Anteil in %		[7,20; 8,38]																			

In der folgenden Tabelle 3.2.3 ist die Entwicklung der **Serum-Kreatinin-Werte** ausgewiesen. Zu beachten ist dabei, dass diese Werte erst im neuen Dokumentationsbogen nach der 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung erhoben wurden. Für jede Kohorte können die entsprechenden Werte daher erst ab dem Berichtshalbjahr 2004-2 ausgewiesen werden. Die ersten Zeilen beziehen sich auf die Unterteilung der Patienten in zwei spezifische Untergruppen. Zunächst wird unter „Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zur Serum-Kreatinin-Untersuchung vorliegen (erhobener und plausibler Wert gemäß Tabelle 0.1.2 bzw. die Angabe, dass keine Untersuchung erfolgte).

Diese „auswertbaren“ Patienten werden wiederum in zwei Gruppen unterteilt: Zunächst wird ausgewiesen, wie viele Patienten nicht auf Serum-Kreatinin untersucht wurden und welchen Anteil an den „auswertbaren“ Patienten diese Personengruppe ausmacht. Anschließend wird ausgewiesen, bei wie vielen Patienten die Serum-Kreatinin-Werte erhoben wurden und plausible

Ergebnisse dokumentiert sind („untersuchte Patienten“). Diese Anzahl entspricht der Fallbasis für Berechnung von arithmetischem Mittel und Median. Die patientenbezogenen mittlere Differenz zwischen dem Serum-Kreatinin-Wert im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr kann dabei erst für Kohorten ab dem Beitrittsjahr 2004-2 dargestellt werden und beträgt im Beitrittsjahr selbst definitionsgemäß Null. Zudem ist für diese Größe die Fallbasis gesondert angegeben: Da für diese Differenz Werte aus zwei Berichtshälften vorliegen müssen, kann die Fallzahl geringer ausfallen als die Anzahl der untersuchten Patienten.

In der Kohorte 2004-2 waren im letzten Halbjahr 4409 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 4316 Patienten lagen auswertbare Angaben vor. Bei 4035 von diesen Patienten erfolgte eine Untersuchung auf Serum-Kreatinin und es wurden plausible Werte dokumentiert. Bei ihnen betrug der durchschnittliche Serum-Kreatinin-Wert 98,59 µmol/l; der Median lag bei 87,00 µmol/l.

**Tabelle 3.2.3 Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte**

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409			
	auswertbar	Anzahl	14718	11663	10165	8825	7746	6895	6603	6252	6027	5741	5437	5187	4956	4738	4541	4316			
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	967	920	839	584	570	443	509	381	443	375	462	339	383	309	363	281			
		Anteil in %	6,57	7,89	8,25	6,62	7,36	6,42	7,71	6,09	7,35	6,53	8,50	6,54	7,73	6,52	7,99	6,51			
		CI Anteil in %	[6,17; 6,97]	[7,40; 8,38]	[7,72; 8,79]	[6,10; 7,14]	[6,78; 7,94]	[5,85; 7,00]	[7,07; 8,35]	[5,50; 6,69]	[6,69; 8,01]	[5,89; 7,17]	[7,76; 9,24]	[5,86; 7,21]	[6,98; 8,47]	[5,82; 7,22]	[7,20; 8,78]	[5,77; 7,25]			
	untersuchte Patienten	Anzahl	13751	10743	9326	8241	7176	6452	6094	5871	5584	5366	4975	4848	4573	4429	4178	4035			
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	115,00	105,75	99,06	99,25	96,02	94,24	93,98	93,55	91,85	94,77	93,48	94,22	94,42	96,04	96,57	98,59			
		CI Mean	[112,76; 117,25]	[103,65; 107,85]	[97,28; 100,84]	[97,31; 101,19]	[94,12; 97,92]	[92,57; 95,91]	[92,20; 95,76]	[91,83; 95,26]	[90,45; 93,24]	[93,17; 96,37]	[91,92; 95,05]	[92,58; 95,86]	[92,84; 96,01]	[94,25; 97,84]	[94,74; 98,41]	[96,54; 100,64]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	83,00	82,00	82,00	82,00	84,00	85,00	87,00		
		Fallbasis mittlere Differenz		10081	8766	7703	6738	6032	5722	5497	5245	5019	4664	4526	4284	4142	3913	3771			
		Mittlere Differenz zur ED		-9,66	-15,49	-14,67	-18,90	-18,99	-18,28	-19,38	-19,25	-17,30	-19,21	-18,06	-16,20	-15,61	-15,91	-13,05			
		CI mittlere Differenz		[-12,54; - 6,78]	[-18,52; - 12,45]	[-17,86; - 11,49]	[-22,24; - 15,57]	[-22,61; - 15,37]	[-21,96; - 14,60]	[-23,14; - 15,62]	[-22,95; - 15,54]	[-21,21; - 13,40]	[-23,24; - 15,17]	[-22,21; - 13,91]	[-20,34; - 12,05]	[-19,96; - 11,27]	[-20,41; - 11,41]	[-17,68; - 8,43]			
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053				
	auswertbar	Anzahl	11570	9450	8274	7222	6367	5964	5666	5483	5229	4948	4722	4548	4334	4141	3927				
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	812	848	655	665	471	537	458	466	412	445	351	439	307	342	285				
		Anteil in %	7,02	8,97	7,92	9,21	7,40	9,00	8,08	8,50	7,88	8,99	7,43	9,65	7,08	8,26	7,26				
		CI Anteil in %	[6,55; 7,48]	[8,40; 9,55]	[7,33; 8,50]	[8,54; 9,87]	[6,75; 8,04]	[8,28; 9,73]	[7,37; 8,79]	[7,76; 9,24]	[7,15; 8,61]	[8,20; 9,79]	[6,69; 8,18]	[8,79; 10,51]	[6,32; 7,85]	[7,42; 9,10]	[6,45; 8,07]				
	untersuchte Patienten	Anzahl	10758	8602	7619	6557	5896	5427	5208	5017	4817	4503	4371	4109	4027	3799	3642				
	Mean	106,89	98,73	94,74	92,56	94,03	91,58	92,65	90,50	92,61	92,16	92,39	92,42	93,64	94,73	94,88					
	CI Mean	[104,66; 109,12]	[96,79; 100,67]	[92,96; 96,52]	[90,81; 94,31]	[92,06; 96,00]	[89,83; 93,33]	[90,75; 94,56]	[89,00; 92,00]	[90,96; 94,26]	[90,49; 93,84]	[90,71; 94,06]	[90,75; 94,09]	[91,89; 95,39]	[92,89; 96,57]	[93,03; 96,72]					
	Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	81,00	83,00	83,00					
	Fallbasis mittlere Differenz		8211	7228	6239	5564	5148	4929	4714	4506	4215	4078	3844	3765	3538	3383					
	Mittlere Differenz zur ED		-8,67	-11,21	-13,44	-10,16	-12,69	-11,90	-14,02	-13,07	-13,00	-12,80	-13,10	-11,40	-10,90	-10,54					
	CI mittlere Differenz		[-11,41; - 5,93]	[-14,06; - 8,36]	[-16,42; - 10,46]	[-13,37; - 6,94]	[-15,85; - 9,53]	[-15,21; - 8,59]	[-17,46; - 10,57]	[-16,73; - 9,41]	[-16,81; - 9,19]	[-16,69; - 8,91]	[-17,11; - 9,09]	[-15,51; - 7,29]	[-15,19; - 6,61]	[-15,02; - 6,05]					
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422					
	auswertbar	Anzahl	14101	11727	10312	8943	8363	7878	7589	7231	6779	6432	6124	5821	5568	5290					
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1014	902	884	657	701	598	599	574	553	494	538	465	465	427					
		Anteil in %	7,19	7,69	8,57	7,35	8,38	7,59	7,89	7,94	8,16	7,68	8,79	7,99	8,35	8,07					
		CI Anteil in %	[6,76; 7,62]	[7,21; 8,17]	[8,03; 9,11]	[6,81; 7,89]	[7,79; 8,98]	[7,01; 8,18]	[7,29; 8,50]	[7,31; 8,56]	[7,51; 8,81]	[7,03; 8,33]	[8,08; 9,49]	[7,29; 8,68]	[7,62; 9,08]	[7,34; 8,81]					
	untersuchte Patienten	Anzahl	13087	10825	9428	8286	7662	7280	6990	6657	6226	5938	5586	5356	5103	4863					
	Mean	107,09	100,52	95,32	95,76	94,62	94,88	91,92	92,36	92,82	92,97	93,56	94,26	94,05	94,69						
	CI Mean	[105,13; 109,05]	[98,78; 102,27]	[93,76; 96,89]	[94,17; 97,34]	[93,01; 96,23]	[93,22; 96,53]	[90,71; 93,13]	[91,16; 93,56]	[91,47; 94,18]	[91,58; 94,36]	[92,17; 94,96]	[92,87; 95,64]	[92,65; 95,45]	[93,27; 96,12]						
	Median	84,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00	81,00	80,50	83,00	84,00	83,00	84,00						
	Fallbasis mittlere Differenz		10211	8919	7789	7203	6838	6570	6234	5824	5552	5232	4999	4760	4539						
	Mittlere Differenz zur ED		-5,84	-11,55	-10,15	-10,78	-10,17	-12,38	-12,37	-11,02	-11,26	-10,54	-9,63	-9,84	-8,10						
	CI mittlere Differenz		[-8,02; - 3,66]	[-13,90; - 9,20]	[-12,71; - 7,58]	[-13,30; - 8,25]	[-12,79; - 7,55]	[-15,12; - 9,65]	[-15,26; - 9,47]	[-14,05; - 8,00]	[-14,42; - 8,09]	[-13,80; - 7,28]	[-12,96; - 6,29]	[-13,28; - 6,40]	[-11,57; - 4,63]						
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459							
	auswertbar	Anzahl	13105	10845	9191	8549	8025	7693	7352	6809	6475	6188	5860	5578	5265							
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	921	760	718	749	592	659	626	672	517	593	467	470	413							
		Anteil in %	7,03	7,01	7,81	8,76	7,38	8,57	8,51	9,87	7,98	9,58	7,97	8,43	7,84							
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[6,59; 7,47]	[6,53; 7,49]	[7,26; 8,36]	[8,16; 9,36]	[6,80; 7,95]	[7,94; 9,19]	[7,88; 9,15]	[9,16; 10,58]	[7,32; 8,64]	[8,85; 10,32]	[7,28; 8,66]	[7,70; 9,15]	[7,12; 8,57]							
		Anzahl	12184	10085	8473	7800	7433	7034	6726	6137	5958	5595	5393	5108	4852							
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	102,93	96,52	95,39	93,33	94,07	93,07	94,12	93,86	93,40	95,01	94,69	95,53	95,01							
		CI Mean	[101,10; 104,77]	[94,89; 98,14]	[93,80; 96,98]	[91,83; 94,84]	[92,43; 95,71]	[91,59; 94,55]	[92,63; 95,61]	[92,28; 95,43]	[91,83; 94,97]	[93,35; 96,67]	[93,12; 96,26]	[93,87; 97,19]	[93,44; 96,58]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	81,00	80,00	82,00	83,00	84,00	84,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		9513	8029	7382	7016	6600	6325	5776	5605	5266	5072	4787	4550							
		Mittlere Differenz zur ED		-6,53	-6,67	-8,59	-7,15	-6,90	-5,63	-5,09	-4,78	-3,55	-3,38	-2,40	-2,55							
		CI mittlere Differenz		[-8,50; -4,55]	[-8,77; -4,56]	[-10,73; -6,45]	[-9,40; -4,90]	[-9,32; -4,48]	[-8,09; -3,18]	[-7,64; -2,54]	[-7,44; -2,11]	[-6,33; -0,78]	[-6,18; -0,59]	[-5,27; -0,48]	[-5,45; -0,34]							
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487								
	auswertbar	Anzahl	11656	9783	8795	8188	7764	7397	6880	6482	6167	5858	5599	5300								
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1008	761	847	762	713	693	740	593	636	547	567	478								
		Anteil in %	8,65	7,78	9,63	9,31	9,18	9,37	10,76	9,15	10,31	9,34	10,13	9,02								
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[8,14; 9,16]	[7,25; 8,31]	[9,01; 10,25]	[8,68; 9,94]	[8,54; 9,83]	[8,70; 10,03]	[10,02; 11,49]	[8,45; 9,85]	[9,55; 11,07]	[8,59; 10,08]	[9,34; 10,92]	[8,25; 9,79]								
		Anzahl	10648	9022	7948	7426	7051	6704	6140	5889	5531	5311	5032	4822								
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	95,67	93,71	91,95	92,16	89,57	91,17	89,91	89,60	90,69	91,68	93,29	93,74								
		CI Mean	[94,11; 97,23]	[92,23; 95,19]	[90,44; 93,46]	[90,62; 93,70]	[88,39; 90,75]	[89,87; 92,47]	[88,66; 91,17]	[88,42; 90,78]	[89,41; 91,98]	[90,32; 93,05]	[91,85; 94,74]	[92,25; 95,23]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		8499	7491	6962	6583	6250	5737	5489	5168	4956	4711	4492								
		Mittlere Differenz zur ED		-1,04	-2,56	-1,92	-4,53	-1,96	-2,57	-2,76	-1,03	0,52	2,23	2,34								
		CI mittlere Differenz		[-2,73; 0,66]	[-4,26; 0,85]	[-3,76; 0,08]	[-6,49; 2,57]	[-4,07; 0,14]	[-4,70; 0,44]	[-4,92; 0,60]	[-3,27; 1,22]	[-1,80; 2,84]	[-0,22; 4,67]	[-0,12; 4,81]								
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533									
	auswertbar	Anzahl	12988	11338	10327	9378	8895	8211	7712	7318	6933	6561	6170									
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1076	933	916	859	803	892	726	760	621	689	548									
		Anteil in %	8,28	8,23	8,87	9,16	9,03	10,86	9,41	10,39	8,96	10,50	8,88									
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[7,81; 8,76]	[7,72; 8,73]	[8,32; 9,42]	[8,58; 9,74]	[8,43; 9,62]	[10,19; 11,54]	[8,76; 10,07]	[9,69; 11,08]	[8,28; 9,63]	[9,76; 11,24]	[8,17; 9,59]									
		Anzahl	11912	10405	9411	8519	8092	7319	6986	6558	6312	5872	5622									
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	93,52	91,69	90,39	89,44	89,95	89,10	90,23	91,39	91,59	91,80	92,57									
		CI Mean	[92,14; 94,90]	[90,36; 93,02]	[89,13; 91,65]	[88,32; 90,56]	[88,82; 91,08]	[88,02; 90,18]	[89,04; 91,43]	[90,01; 92,76]	[90,23; 92,96]	[90,44; 93,16]	[91,16; 93,99]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	81,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		9862	8901	7989	7574	6905	6578	6170	5943	5539	5282									
		Mittlere Differenz zur ED		-1,72	-1,87	-2,04	-1,90	-2,29	-0,65	0,43	1,18	1,52	2,77									
		CI mittlere Differenz		[-3,17; -0,27]	[-3,41; 0,34]	[-3,54; 0,53]	[-3,57; 0,22]	[-3,99; 0,58]	[-2,48; 1,17]	[-1,56; 2,41]	[-0,82; 3,18]	[-0,54; 3,58]	[0,61; 4,93]									
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873										
	auswertbar	Anzahl	11227	9976	8915	8352	7674	7179	6754	6350	6042	5652										
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	984	707	832	735	807	647	658	541	584	498										
		Anteil in %	8,76	7,09	9,33	8,80	10,52	9,01	9,74	8,52	9,67	8,81										
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[8,24; 9,29]	[6,58; 7,59]	[8,73; 9,94]	[8,19; 9,41]	[9,83; 11,20]	[8,35; 9,67]	[9,04; 10,45]	[7,83; 9,21]	[8,92; 10,41]	[8,07; 9,55]										
		Anzahl	10243	9269	8083	7617	6867	6532	6096	5809	5458	5154										
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	91,08	89,52	89,20	88,96	88,11	88,49	89,39	90,35	90,67	91,42										
		CI Mean	[89,73; 92,43]	[88,28; 90,75]	[88,03; 90,38]	[87,90; 90,01]	[87,03; 89,18]	[87,37; 89,61]	[88,16; 90,63]	[89,11; 91,60]	[89,42; 91,92]	[90,05; 92,78]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00										
		Fallbasis mittlere Differenz		8655	7530	7042	6361	6060	5642	5356	5030	4744										
		Mittlere Differenz zur ED		-1,48	-1,47	-0,72	-1,32	-0,87	0,13	1,04	1,58	3,40										
		CI mittlere Differenz		[-2,89; -0,06]	[-3,23; 0,29]	[-2,33; 0,89]	[-3,01; 0,38]	[-2,71; 0,97]	[-1,86; 2,13]	[-1,00; 3,09]	[-0,50; 3,65]	[1,16; 5,64]										
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839													
	auswertbar	Anzahl	10599	9080	8428	7619	7071	6691	6291	5994	5612													
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	997	772	757	842	647	751	567	643	500													
		Anteil in %	9,41	8,50	8,98	11,05	9,15	11,22	9,01	10,73	8,91													
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[8,85; 9,96]	[7,93; 9,08]	[8,37; 9,59]	[10,35; 11,76]	[8,48; 9,82]	[10,47; 11,98]	[8,31; 9,72]	[9,94; 11,51]	[8,16; 9,65]													
		Anzahl	9602	8308	7671	6777	6424	5940	5724	5351	5112													
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	90,14	87,54	87,64	87,17	87,87	87,87	89,06	90,16	90,06													
		CI Mean	[88,77; 91,51]	[86,48; 88,59]	[86,60; 88,67]	[86,05; 88,29]	[86,66; 89,07]	[86,70; 89,04]	[87,76; 90,36]	[88,70; 91,62]	[88,66; 91,46]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
		Fallbasis mittlere Differenz		7720	7096	6275	5940	5501	5293	4938	4701													
		Mittlere Differenz zur ED		-2,55	-2,13	-1,49	-1,62	-0,97	0,71	2,55	2,52													
		CI mittlere Differenz		[-4,12; -0,97]	[-3,83; -0,42]	[-3,22; 0,24]	[-3,50; 0,26]	[-2,92; 0,99]	[-1,35; 2,77]	[0,40; 4,71]	[0,38; 4,66]													
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928														
	auswertbar	Anzahl	6843	5968	5301	4854	4574	4282	4044	3794														
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	824	539	599	470	475	366	392	301														
		Anteil in %	12,04	9,03	11,30	9,68	10,38	8,55	9,69	7,93														
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[11,27; 12,81]	[8,30; 9,76]	[10,45; 12,15]	[8,85; 10,51]	[9,50; 11,27]	[7,71; 9,38]	[8,78; 10,61]	[7,07; 8,79]														
		Anzahl	6019	5429	4702	4384	4099	3916	3652	3493														
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	87,49	88,09	86,89	86,64	87,67	90,07	90,48	90,49														
		CI Mean	[86,17; 88,80]	[86,73; 89,45]	[85,52; 88,27]	[85,28; 88,00]	[86,28; 89,06]	[88,39; 91,76]	[88,70; 92,27]	[88,76; 92,22]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
		Fallbasis mittlere Differenz		4956	4307	3999	3754	3550	3324	3169														
		Mittlere Differenz zur ED		0,98	0,77	1,08	2,17	4,85	4,79	5,23														
		CI mittlere Differenz		[-0,40; 2,36]	[-0,58; 2,12]	[-0,24; 2,40]	[0,64; 3,69]	[3,13; 6,58]	[2,91; 6,68]	[3,39; 7,06]														
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474															
	auswertbar	Anzahl	9373	7921	7119	6530	6058	5697	5325															
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1536	1019	1006	923	730	785	629															
		Anteil in %	16,39	12,86	14,13	14,13	12,05	13,78	11,81															
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[15,64; 17,14]	[12,13; 13,60]	[13,32; 14,94]	[13,29; 14,98]	[11,23; 12,87]	[12,88; 14,67]	[10,95; 12,68]															
		Anzahl	7837	6902	6113	5607	5328	4912	4696															
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	87,34	88,15	87,73	87,89	88,68	89,00	88,31															
		CI Mean	[86,20; 88,47]	[86,85; 89,45]	[86,41; 89,04]	[86,65; 89,14]	[87,25; 90,11]	[87,55; 90,44]	[86,95; 89,67]															
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00															
		Fallbasis mittlere Differenz		6177	5483	5032	4794	4401	4209															
		Mittlere Differenz zur ED		0,96	1,19	1,67	3,63	3,84	3,83															
		CI mittlere Differenz		[-0,25; 2,17]	[-0,13; 2,51]	[0,41; 2,93]	[2,13; 5,12]	[2,25; 5,43]	[2,31; 5,35]															
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747																
	auswertbar	Anzahl	7466	6521	5888	5386	4985	4644																
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1124	656	709	589	608	489																
		Anteil in %	15,05	10,06	12,04	10,94	12,20	10,53																
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[14,24; 15,87]	[9,33; 10,79]	[11,21; 12,87]	[10,10; 11,77]	[11,29; 13,11]	[9,65; 11,41]																
		Anzahl	6342	5865	5179	4797	4377	4155																
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	86,38	87,04	86,05	87,57	87,24	87,20																
		CI Mean	[85,12; 87,65]	[85,61; 88,47]	[84,70; 87,39]	[86,03; 89,11]	[85,76; 88,72]	[85,68; 88,71]																
		Median	80,00	79,00	79,00	80,00	80,00	80,00																
		Fallbasis mittlere Differenz		5255	4685	4305	3958	3702																
		Mittlere Differenz zur ED		1,39	1,09	2,91	2,74	3,44																
		CI mittlere Differenz		[0,13; 2,66]	[-0,28; 2,46]	[1,38; 4,45]	[1,24; 4,24]	[1,84; 5,05]																
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942														
	auswertbar	Anzahl	8715	7622	6886	6277	5791														
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1182	823	817	784	598														
		Anteil in %	13,56	10,80	11,86	12,49	10,33														
		CI Anteil in %	[12,84; 14,28]	[10,10; 11,49]	[11,10; 12,63]	[11,67; 13,31]	[9,54; 11,11]														
		untersuchte Patienten	Anzahl	7533	6799	6069	5493	5193													
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	84,66	86,11	86,54	85,99	87,10														
		CI Mean	[83,62; 85,71]	[84,95; 87,28]	[85,33; 87,76]	[84,82; 87,16]	[85,79; 88,40]														
		Median	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
		Fallbasis mittlere Differenz		6218	5558	5035	4757														
		Mittlere Differenz zur ED		1,27	2,34	2,40	3,53														
		CI mittlere Differenz		[0,26; 2,29]	[1,21; 3,47]	[1,29; 3,50]	[2,28; 4,77]														
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00															
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929															
	auswertbar	Anzahl	8087	7127	6379	5786															
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1134	685	764	608															
		Anteil in %	14,02	9,61	11,98	10,51															
		CI Anteil in %	[13,27; 14,78]	[8,93; 10,30]	[11,18; 12,77]	[9,72; 11,30]															
		untersuchte Patienten	Anzahl	6953	6442	5615	5178														
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	85,59	85,72	87,34	87,29															
		CI Mean	[84,46; 86,72]	[84,55; 86,88]	[85,95; 88,74]	[85,89; 88,69]															
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00															
		Fallbasis mittlere Differenz		5837	5146	4699															
		Mittlere Differenz zur ED		0,83	2,79	3,07															
		CI mittlere Differenz		[-0,21; 1,88]	[1,48; 4,10]	[1,77; 4,38]															
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00																
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845																
	auswertbar	Anzahl	8601	7470	6668																
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1139	814	751																
		Anteil in %	13,24	10,90	11,26																
		CI Anteil in %	[12,53; 13,96]	[10,19; 11,60]	[10,50; 12,02]																
		untersuchte Patienten	Anzahl	7462	6656	5917															
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	84,08	85,74	86,16																
		CI Mean	[83,09; 85,07]	[84,53; 86,95]	[84,90; 87,41]																
		Median	79,00	79,00	80,00																
		Fallbasis mittlere Differenz		6085	5415																
		Mittlere Differenz zur ED		1,90	2,29																
		CI mittlere Differenz		[0,87; 2,93]	[1,21; 3,38]																
Median mittlere Differenz			0,00	0,00																	
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																	
	auswertbar	Anzahl	7574	6496																	
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1046	720																	
		Anteil in %	13,81	11,08																	
		CI Anteil in %	[13,03; 14,59]	[10,32; 11,85]																	
		untersuchte Patienten	Anzahl	6528	5776																
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	86,28	86,32																	
		CI Mean	[85,00; 87,57]	[85,00; 87,64]																	
		Median	80,00	79,00																	
		Fallbasis mittlere Differenz		5271																	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,13																	
		CI mittlere Differenz		[-1,70; 1,44]																	
Median mittlere Differenz			0,00																		

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																				
	auswertbar	Anzahl	7823																				
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1033																				
		Anteil in %	13,20																				
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[12,45; 13,95]																				
		Anzahl	6790																				
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	84,43																				
		CI Mean	[83,35; 85,52]																				
		Median	79,00																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
Median mittlere Differenz																							

### 3.3 Medikation

Neben Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung sowie ausreichender Bewegung - wodurch ein Teil der Patienten potenziell keine Arzneimitteltherapie mehr benötigt - besteht die Therapie des Diabetes mellitus in der Anwendung von den Blutzuckerspiegel senkenden Arzneimitteln. Bei insulinpflichtigen Diabetikern muss der Insulinmangel mit Hilfe von subkutan zu spritzendem Insulin (Human- oder Schweineinsulin) oder mit gegenüber dem menschlichen oder tierischen Hormon leicht verändertem Insulin (Insulinanaloga) ausgeglichen werden. Weiterhin gibt es Medikamente, die die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse anregen (Sulfonylharnstoffe, Glinide), die Verteilung von Glukose im Organismus (Biguanide) beeinflussen, die Wirkung von Insulin verstärken (Glitazone) oder den Kohlenhydratabbau im Darmtrakt (Glucosidasehemmer) verzögern bzw. verhindern. Diese Medikamentengruppen können in Tablettenform eingenommen werden und werden allesamt als orale Antidiabetika (OAD) bezeichnet. Metformin (Biguanid) ist dabei das Mittel der ersten Wahl bei übergewichtigen Diabetikern, bei normalgewichtigen Diabetikern sind dies die Sulfonylharnstoffe (z.B. Glibenclamid). Diese beiden Präparategruppen sind in diesem Bericht als "vorrangig empfohlene " OAD ausgewiesen. Neben der Verwendung einzelner Arzneimittel aus diesen Medikamentengruppen (Monotherapie) ist auch eine Kombinationstherapie aus zwei „vorrangig empfohlenen" Präparaten oder die Kombination von „vorrangig empfohlenen“ mit Arzneimitteln aus „nachrangig empfohlenen" Gruppen (Glinide, Glitazone, Glucosidasehemmer) als Kombinationstherapie möglich. Bei einem Teil der Patienten ist auch eine Kombinationstherapie sowohl mit dem ebenfalls vorrangig empfohlenen Insulin als auch mit OAD indiziert.

In der Tabelle 3.3.1 ist die Entwicklung der **Medikation** der Patienten ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu zunächst unter „Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird - z.T. differenziert nach dem BMI der Patienten - ausgewiesen, bei wie vielen Patienten welche Medikation erfolgte und welchem Anteil an den „auswertbaren“ Patienten dies entspricht. Die solchermaßen gebildeten Kategorien sind nicht erschöpfend.

Zu beachten ist dabei, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam. Anstelle der medikamentösen Therapie mit „Metformin" (ab 2004-2) wurden bis 2004-1 „Biguanide" erhoben; in der Auswertung ist jedoch in beiden Fällen die Kategorie „Metformin" zu verwenden. Da aus der Gruppe der Biguanide seit langer Zeit nur noch Metformin angewandt wird, verursacht diese Umformulierung jedoch keine Änderungen bei den Häufigkeiten bzw. bei der Vollständigkeit der Erfassung.



In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr 14 Patienten in das Programm eingeschrieben. Es konnten 14 Patienten in die Auswertung einbezogen werden.

Bei ihnen erfolgte in 7,14 Prozent der Fälle keine Diabetes-spezifische Medikation. Im letzten Berichtshalbjahr erfolgte in - - Prozent der Fälle keine diabetes-spezifische Medikation.

Tabelle 3.3.1 Patienten und ihre Medikation

EZ	Patienten und ihre Medikation		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>		Anzahl	14	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar		Anzahl	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	7,14	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 21,14]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	3	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	21,43	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 43,73]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Metformin)	Anzahl	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	14,29	50,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	[0,00; 33,31]	[0,00; 100,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kombination aus einem „vorrangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	2	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	14,29	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	[0,00; 33,31]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	35,71	50,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	[9,67; 61,76]	[0,00; 100,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225
	auswertbar	Anzahl	4880	3659	3317	2844	2462	2189	1988	1769	1691	1624	1601	1544	1481	1409	1364	1311	1264	1187
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	414	358	280	238	211	190	170	162	143	139	125	120	111	98	92	88	81	80
		Anteil in %	8,48	9,78	8,44	8,37	8,57	8,68	8,55	9,16	8,46	8,56	7,81	7,77	7,49	6,96	6,74	6,71	6,41	6,74
		CI Anteil in %	[7,70; 9,27]	[8,82; 10,75]	[7,50; 9,39]	[7,35; 9,39]	[7,46; 9,68]	[7,50; 9,86]	[7,32; 9,78]	[7,81; 10,50]	[7,13; 9,78]	[7,20; 9,92]	[6,49; 9,12]	[6,44; 9,11]	[6,15; 8,84]	[5,63; 8,28]	[5,41; 8,08]	[5,36; 8,07]	[5,06; 7,76]	[5,31; 8,17]
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1175	895	849	765	665	597	526	473	457	435	423	402	385	354	347	335	326	296
		Anteil in %	24,08	24,46	25,60	26,90	27,01	27,27	26,46	26,74	27,03	26,79	26,42	26,04	26,00	25,12	25,44	25,55	25,79	24,94
		CI Anteil in %	[22,88; 25,28]	[23,07; 25,85]	[24,11; 27,08]	[25,27; 28,53]	[25,26; 28,76]	[25,41; 29,14]	[24,52; 28,40]	[24,68; 28,80]	[24,91; 29,14]	[24,63; 28,94]	[24,26; 28,58]	[23,85; 28,23]	[23,76; 28,23]	[22,86; 27,39]	[23,13; 27,75]	[23,19; 27,91]	[23,38; 28,20]	[22,47; 27,40]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	306	210	159	138	101	82	78	68	70	61	54	50	49	41	41	34	40	31
		Anteil in %	6,27	5,74	4,79	4,85	4,10	3,75	3,92	3,84	4,14	3,76	3,37	3,24	3,31	2,91	3,01	2,59	3,16	2,61
		CI Anteil in %	[5,59; 6,95]	[4,99; 6,49]	[4,07; 5,52]	[4,06; 5,64]	[3,32; 4,89]	[2,95; 4,54]	[3,07; 4,78]	[2,95; 4,74]	[3,19; 5,09]	[2,83; 4,68]	[2,49; 4,26]	[2,36; 4,12]	[2,40; 4,22]	[2,03; 3,79]	[2,10; 3,91]	[1,73; 3,45]	[2,20; 4,13]	[1,70; 3,52]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	201	142	108	83	59	48	43	37	29	35	31	27	23	22	17	17	13	16
		Anteil in %	4,12	3,88	3,26	2,92	2,40	2,19	2,16	2,09	1,71	2,16	1,94	1,75	1,55	1,56	1,25	1,30	1,03	1,35
		CI Anteil in %	[3,56; 4,68]	[3,25; 4,51]	[2,65; 3,86]	[2,30; 3,54]	[1,79; 3,00]	[1,58; 2,81]	[1,52; 2,80]	[1,42; 2,76]	[1,10; 2,33]	[1,45; 2,86]	[1,26; 2,61]	[1,09; 2,40]	[0,92; 2,18]	[0,91; 2,21]	[0,66; 1,84]	[0,68; 1,91]	[0,47; 1,58]	[0,69; 2,00]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	365	268	253	199	190	159	152	127	127	120	137	126	127	120	104	115	111	102
		Anteil in %	7,48	7,32	7,63	7,00	7,72	7,26	7,65	7,18	7,51	7,39	8,56	8,16	8,58	8,52	7,62	8,77	8,78	8,59
		CI Anteil in %	[6,74; 8,22]	[6,48; 8,17]	[6,72; 8,53]	[6,06; 7,93]	[6,66; 8,77]	[6,18; 8,35]	[6,48; 8,81]	[5,98; 8,38]	[6,25; 8,77]	[6,12; 8,66]	[7,19; 9,93]	[6,79; 9,53]	[7,15; 10,00]	[7,06; 9,97]	[6,22; 9,03]	[7,24; 10,30]	[7,22; 10,34]	[7,00; 10,19]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	511	377	334	295	237	209	190	167	158	151	151	141	132	121	120	116	105	98
		Anteil in %	10,47	10,30	10,07	10,37	9,63	9,55	9,56	9,44	9,34	9,30	9,43	9,13	8,91	8,59	8,80	8,85	8,31	8,26
		CI Anteil in %	[9,61; 11,33]	[9,32; 11,29]	[9,05; 11,09]	[9,25; 11,49]	[8,46; 10,79]	[8,32; 10,78]	[8,26; 10,85]	[8,08; 10,80]	[7,96; 10,73]	[7,89; 10,71]	[8,00; 10,86]	[7,69; 10,57]	[7,46; 10,36]	[7,12; 10,05]	[7,29; 10,30]	[7,31; 10,39]	[6,78; 9,83]	[6,69; 9,82]
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	443	332	357	295	260	230	182	151	145	138	131	132	122	115	110	102	91	81	
	Anteil in %	9,08	9,07	10,76	10,37	10,56	10,51	9,15	8,54	8,57	8,50	8,18	8,55	8,24	8,16	8,06	7,78	7,20	6,82	
	CI Anteil in %	[8,27; 9,88]	[8,14; 10,00]	[9,71; 11,82]	[9,25; 11,49]	[9,35; 11,77]	[9,22; 11,79]	[7,89; 10,42]	[7,23; 9,84]	[7,24; 9,91]	[7,14; 9,85]	[6,84; 9,53]	[7,15; 9,94]	[6,84; 9,64]	[6,73; 9,59]	[6,62; 9,51]	[6,33; 9,23]	[5,77; 8,62]	[5,39; 8,26]	
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	354	255	237	197	188	166	163	143	132	120	113	104	108	105	111	99	103	88	
	Anteil in %	7,25	6,97	7,15	6,93	7,64	7,58	8,20	8,08	7,81	7,39	7,06	6,74	7,29	7,45	8,14	7,55	8,15	7,41	
	CI Anteil in %	[6,53; 7,98]	[6,14; 7,79]	[6,27; 8,02]	[5,99; 7,86]	[6,59; 8,69]	[6,47; 8,69]	[6,99; 9,41]	[6,81; 9,35]	[6,53; 9,09]	[6,12; 8,66]	[5,80; 8,31]	[5,49; 7,99]	[5,97; 8,62]	[6,08; 8,82]	[6,69; 9,59]	[6,12; 8,98]	[6,64; 9,66]	[5,92; 8,90]	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	672	559	534	467	413	390	376	345	336	330	341	351	337	348	342	333	323	322	
	Anteil in %	13,77	15,28	16,10	16,42	16,77	17,82	18,91	19,50	19,87	20,32	21,30	22,73	22,75	24,70	25,07	25,40	25,55	27,13	
	CI Anteil in %	[12,80; 14,74]	[14,11; 16,44]	[14,85; 17,35]	[15,06; 17,78]	[15,30; 18,25]	[16,21; 19,42]	[17,19; 20,64]	[17,66; 21,35]	[17,97; 21,77]	[18,36; 22,28]	[19,29; 23,31]	[20,64; 24,82]	[20,62; 24,89]	[22,45; 26,95]	[22,77; 27,37]	[23,04; 27,76]	[23,15; 27,96]	[24,60; 29,66]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293	
	auswertbar	Anzahl	12050	9032	7990	6936	6255	5591	4888	4625	4474	4413	4245	4056	3873	3737	3549	3388	3190	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1070	842	734	652	592	526	442	377	361	352	336	319	286	283	264	239	235	
		Anteil in %	8,88	9,32	9,19	9,40	9,46	9,41	9,04	8,15	8,07	7,98	7,92	7,86	7,38	7,57	7,44	7,05	7,37	
		CI Anteil in %	[8,37; 9,39]	[8,72; 9,92]	[8,55; 9,82]	[8,71; 10,09]	[8,74; 10,19]	[8,64; 10,17]	[8,24; 9,85]	[7,36; 8,94]	[7,27; 8,87]	[7,18; 8,78]	[7,10; 8,73]	[7,04; 8,69]	[6,56; 8,21]	[6,72; 8,42]	[6,58; 8,30]	[6,19; 7,92]	[6,46; 8,27]	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2604	2036	1806	1589	1428	1301	1132	1073	1049	1018	991	932	884	833	773	749	688	
		Anteil in %	21,61	22,54	22,60	22,91	22,83	23,27	23,16	23,20	23,45	23,07	23,35	22,98	22,82	22,29	21,78	22,11	21,57	
		CI Anteil in %	[20,88; 22,34]	[21,68; 23,40]	[21,69; 23,52]	[21,92; 23,90]	[21,79; 23,87]	[22,16; 24,38]	[21,98; 24,34]	[21,98; 24,42]	[22,20; 24,69]	[21,83; 24,31]	[22,07; 24,62]	[21,68; 24,27]	[21,50; 24,15]	[20,96; 23,63]	[20,42; 23,14]	[20,71; 23,50]	[20,14; 22,99]	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	678	414	346	293	256	216	188	169	159	135	128	111	93	87	82	78	65	
		Anteil in %	5,63	4,58	4,33	4,22	4,09	3,86	3,85	3,65	3,55	3,06	3,02	2,74	2,40	2,33	2,31	2,30	2,04	
		CI Anteil in %	[5,22; 6,04]	[4,15; 5,02]	[3,88; 4,78]	[3,75; 4,70]	[3,60; 4,58]	[3,36; 4,37]	[3,31; 4,39]	[3,11; 4,19]	[3,01; 4,10]	[2,55; 3,57]	[2,50; 3,53]	[2,23; 3,24]	[1,92; 2,88]	[1,84; 2,81]	[1,82; 2,80]	[1,80; 2,81]	[1,55; 2,53]	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	538	357	298	225	191	158	133	111	101	96	81	62	60	53	49	40	34	
		Anteil in %	4,46	3,95	3,73	3,24	3,05	2,83	2,72	2,40	2,26	2,18	1,91	1,53	1,55	1,42	1,38	1,18	1,07	
		CI Anteil in %	[4,10; 4,83]	[3,55; 4,35]	[3,31; 4,15]	[2,83; 3,66]	[2,63; 3,48]	[2,39; 3,26]	[2,26; 3,18]	[1,96; 2,84]	[1,82; 2,69]	[1,74; 2,61]	[1,50; 2,32]	[1,15; 1,91]	[1,16; 1,94]	[1,04; 1,80]	[1,00; 1,76]	[0,82; 1,54]	[0,71; 1,42]	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	977	800	755	643	562	499	444	439	426	409	383	352	337	339	300	314	314	
		Anteil in %	8,11	8,86	9,45	9,27	8,98	8,93	9,08	9,49	9,52	9,27	9,02	8,68	8,70	9,07	8,45	9,27	9,84	
		CI Anteil in %	[7,62; 8,60]	[8,27; 9,44]	[8,81; 10,09]	[8,59; 9,95]	[8,28; 9,69]	[8,18; 9,67]	[8,28; 9,89]	[8,65; 10,34]	[8,66; 10,38]	[8,41; 10,12]	[8,16; 9,88]	[7,81; 9,55]	[7,81; 9,59]	[8,15; 9,99]	[7,54; 9,37]	[8,29; 10,24]	[8,81; 10,88]	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1416	1087	944	792	716	617	544	518	472	452	420	393	376	340	322	307	276	
		Anteil in %	11,75	12,03	11,81	11,42	11,45	11,04	11,13	11,20	10,55	10,24	9,89	9,69	9,71	9,10	9,07	9,06	8,65	
		CI Anteil in %	[11,18; 12,33]	[11,36; 12,71]	[11,11; 12,52]	[10,67; 12,17]	[10,66; 12,24]	[10,21; 11,86]	[10,25; 12,01]	[10,29; 12,11]	[9,65; 11,45]	[9,35; 11,14]	[9,00; 10,79]	[8,78; 10,60]	[8,78; 10,64]	[8,18; 10,02]	[8,13; 10,02]	[8,09; 10,03]	[7,68; 9,63]	
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	986	746	683	607	525	467	382	360	344	363	347	328	302	282	251	237	218		
	Anteil in %	8,18	8,26	8,55	8,75	8,39	8,35	7,82	7,78	7,69	8,23	8,17	8,09	7,80	7,55	7,07	7,00	6,83		
	CI Anteil in %	[7,69; 8,67]	[7,69; 8,83]	[7,94; 9,16]	[8,09; 9,42]	[7,71; 9,08]	[7,63; 9,08]	[7,06; 8,57]	[7,01; 8,56]	[6,91; 8,47]	[7,41; 9,04]	[7,35; 9,00]	[7,25; 8,93]	[6,95; 8,64]	[6,70; 8,39]	[6,23; 7,92]	[6,14; 7,85]	[5,96; 7,71]		
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	927	725	628	549	524	486	429	409	405	401	413	399	394	387	388	361	340		
	Anteil in %	7,69	8,03	7,86	7,92	8,38	8,69	8,78	8,84	9,05	9,09	9,73	9,84	10,17	10,36	10,93	10,66	10,66		
	CI Anteil in %	[7,22; 8,17]	[7,47; 8,59]	[7,27; 8,45]	[7,28; 8,55]	[7,69; 9,06]	[7,95; 9,43]	[7,98; 9,57]	[8,02; 9,66]	[8,21; 9,89]	[8,24; 9,93]	[8,84; 10,62]	[8,92; 10,75]	[9,22; 11,13]	[9,38; 11,33]	[9,91; 11,96]	[9,62; 11,69]	[9,59; 11,73]		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1572	1249	1179	1064	992	927	851	852	863	902	886	899	886	893	908	868	834		
	Anteil in %	13,05	13,83	14,76	15,34	15,86	16,58	17,41	18,42	19,29	20,44	20,87	22,16	22,88	23,90	25,58	25,62	26,14		
	CI Anteil in %	[12,44; 13,65]	[13,12; 14,54]	[13,98; 15,53]	[14,49; 16,19]	[14,95; 16,76]	[15,61; 17,56]	[16,35; 18,47]	[17,30; 19,54]	[18,13; 20,45]	[19,25; 21,63]	[19,65; 22,09]	[20,89; 23,44]	[21,55; 24,20]	[22,53; 25,26]	[24,15; 27,02]	[24,15; 27,09]	[24,62; 27,67]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	12663	10575	9150	7998	7258	6933	6577	6230	5926	5585	5290	5058	4840	4632	4409			
	auswertbar	Anzahl	15068	11732	10228	8865	7775	6918	6616	6268	6029	5770	5472	5187	4952	4735	4539	4312			
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2161	1713	1506	1321	1125	986	897	824	731	697	634	575	544	506	482	447			
		Anteil in %	14,34	14,60	14,72	14,90	14,47	14,25	13,56	13,15	12,12	12,08	11,59	11,09	10,99	10,69	10,62	10,37			
		CI Anteil in %	[13,78; 14,90]	[13,96; 15,24]	[14,04; 15,41]	[14,16; 15,64]	[13,69; 15,25]	[13,43; 15,08]	[12,73; 14,38]	[12,31; 13,98]	[11,30; 12,95]	[11,24; 12,92]	[10,74; 12,43]	[10,23; 11,94]	[10,11; 11,86]	[9,81; 11,57]	[9,72; 11,52]	[9,46; 11,28]			
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2817	2203	1927	1680	1477	1316	1263	1174	1114	1064	1009	957	891	859	830	787			
		Anteil in %	18,70	18,78	18,84	18,95	19,00	19,02	19,09	18,73	18,48	18,44	18,44	18,45	17,99	18,14	18,29	18,25			
		CI Anteil in %	[18,07; 19,32]	[18,07; 19,48]	[18,08; 19,60]	[18,14; 19,77]	[18,12; 19,87]	[18,10; 19,95]	[18,14; 20,04]	[17,76; 19,70]	[17,50; 19,46]	[17,44; 19,44]	[17,41; 19,47]	[17,39; 19,51]	[16,92; 19,06]	[17,04; 19,24]	[17,16; 19,41]	[17,10; 19,40]			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	700	509	446	377	317	285	234	204	214	174	147	124	115	101	89	82			
		Anteil in %	4,65	4,34	4,36	4,25	4,08	4,12	3,54	3,25	3,55	3,02	2,69	2,39	2,32	2,13	1,96	1,90			
		CI Anteil in %	[4,31; 4,98]	[3,97; 4,71]	[3,96; 4,76]	[3,83; 4,67]	[3,64; 4,52]	[3,65; 4,59]	[3,09; 3,98]	[2,82; 3,69]	[3,08; 4,02]	[2,57; 3,46]	[2,26; 3,11]	[1,97; 2,81]	[1,90; 2,74]	[1,72; 2,54]	[1,56; 2,36]	[1,49; 2,31]			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	593	438	335	256	207	176	170	145	135	118	102	90	73	66	58	50			
		Anteil in %	3,94	3,73	3,28	2,89	2,66	2,54	2,57	2,31	2,24	2,05	1,86	1,74	1,47	1,39	1,28	1,16			
		CI Anteil in %	[3,63; 4,25]	[3,39; 4,08]	[2,93; 3,62]	[2,54; 3,24]	[2,30; 3,02]	[2,17; 2,92]	[2,19; 2,95]	[1,94; 2,69]	[1,87; 2,61]	[1,68; 2,41]	[1,51; 2,22]	[1,38; 2,09]	[1,14; 1,81]	[1,06; 1,73]	[0,95; 1,60]	[0,84; 1,48]			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1244	979	859	769	713	629	619	605	628	608	598	582	558	527	494	479			
		Anteil in %	8,26	8,34	8,40	8,67	9,17	9,09	9,36	9,65	10,42	10,54	10,93	11,22	11,27	11,13	10,88	11,11			
		CI Anteil in %	[7,82; 8,70]	[7,84; 8,85]	[7,86; 8,94]	[8,09; 9,26]	[8,53; 9,81]	[8,41; 9,77]	[8,65; 10,06]	[8,92; 10,38]	[9,65; 11,19]	[9,74; 11,33]	[10,10; 11,76]	[10,36; 12,08]	[10,39; 12,15]	[10,23; 12,03]	[9,98; 11,79]	[10,17; 12,05]			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1989	1530	1334	1146	1023	897	838	795	761	718	674	627	584	533	514	485			
		Anteil in %	13,20	13,04	13,04	12,93	13,16	12,97	12,67	12,68	12,62	12,44	12,32	12,09	11,79	11,26	11,32	11,25			
		CI Anteil in %	[12,66; 13,74]	[12,43; 13,65]	[12,39; 13,70]	[12,23; 13,63]	[12,41; 13,91]	[12,17; 13,76]	[11,86; 13,47]	[11,86; 13,51]	[11,78; 13,46]	[11,59; 13,30]	[11,45; 13,19]	[11,20; 12,98]	[10,89; 12,69]	[10,36; 12,16]	[10,40; 12,25]	[10,30; 12,19]			
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	1228	1010	887	757	625	558	546	516	490	471	436	400	377	341	308	277			
		Anteil in %	8,15	8,61	8,67	8,54	8,04	8,07	8,25	8,23	8,13	8,16	7,97	7,71	7,61	7,20	6,79	6,42			
		CI Anteil in %	[7,71; 8,59]	[8,10; 9,12]	[8,13; 9,22]	[7,96; 9,12]	[7,43; 8,64]	[7,42; 8,71]	[7,59; 8,92]	[7,55; 8,91]	[7,44; 8,82]	[7,46; 8,87]	[7,25; 8,69]	[6,99; 8,44]	[6,87; 8,35]	[6,47; 7,94]	[6,05; 7,52]	[5,69; 7,16]			
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	1140	959	829	730	655	603	596	587	544	552	531	542	526	539	508	493			
Anteil in %		7,57	8,17	8,11	8,23	8,42	8,72	9,01	9,37	9,02	9,57	9,70	10,45	10,62	11,38	11,19	11,43				
	CI Anteil in %	[7,14; 7,99]	[7,68; 8,67]	[7,58; 8,63]	[7,66; 8,81]	[7,81; 9,04]	[8,05; 9,38]	[8,32; 9,70]	[8,64; 10,09]	[8,30; 9,75]	[8,81; 10,33]	[8,92; 10,49]	[9,62; 11,28]	[9,76; 11,48]	[10,48; 12,29]	[10,27; 12,11]	[10,48; 12,38]				
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1888	1503	1338	1187	1058	983	1003	998	1052	1038	1028	990	995	991	994	975				
	Anteil in %	12,53	12,81	13,08	13,39	13,61	14,21	15,16	15,92	17,45	17,99	18,79	19,09	20,09	20,93	21,90	22,61				
	CI Anteil in %	[12,00; 13,06]	[12,21; 13,42]	[12,43; 13,74]	[12,68; 14,10]	[12,85; 14,37]	[13,39; 15,03]	[14,30; 16,02]	[15,02; 16,83]	[16,49; 18,41]	[17,00; 18,98]	[17,75; 19,82]	[18,02; 20,16]	[18,98; 21,21]	[19,77; 22,09]	[20,70; 23,10]	[21,36; 23,86]				

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	10003	8667	7467	6721	6298	5972	5688	5395	5085	4849	4648	4438	4239	4053			
	auswertbar	Anzahl	11691	9507	8302	7245	6393	5983	5682	5490	5243	4963	4724	4550	4337	4142	3930			
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2097	1646	1462	1238	1068	944	882	781	715	668	605	579	529	506	461			
		Anteil in %	17,94	17,31	17,61	17,09	16,71	15,78	15,52	14,23	13,64	13,46	12,81	12,73	12,20	12,22	11,73			
	CI Anteil in %		[17,24; 18,63]	[16,55; 18,07]	[16,79; 18,43]	[16,22; 17,95]	[15,79; 17,62]	[14,85; 16,70]	[14,58; 16,46]	[13,30; 15,15]	[12,71; 14,57]	[12,51; 14,41]	[11,85; 13,76]	[11,76; 13,69]	[11,22; 13,17]	[11,22; 13,21]	[10,72; 12,74]			
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1989	1575	1365	1180	1044	992	936	864	812	768	734	687	660	628	575			
		Anteil in %	17,01	16,57	16,44	16,29	16,33	16,58	16,47	15,74	15,49	15,47	15,54	15,10	15,22	15,16	14,63			
	CI Anteil in %		[16,33; 17,69]	[15,82; 17,31]	[15,64; 17,24]	[15,44; 17,14]	[15,42; 17,24]	[15,64; 17,52]	[15,51; 17,44]	[14,77; 16,70]	[14,51; 16,47]	[14,47; 16,48]	[14,50; 16,57]	[14,06; 16,14]	[14,15; 16,29]	[14,07; 16,25]	[13,53; 15,74]			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	448	349	284	234	197	186	165	164	140	129	124	108	95	84	68			
		Anteil in %	3,83	3,67	3,42	3,23	3,08	3,11	2,90	2,99	2,67	2,60	2,62	2,37	2,19	2,03	1,73			
	CI Anteil in %		[3,48; 4,18]	[3,29; 4,05]	[3,03; 3,81]	[2,82; 3,64]	[2,66; 3,51]	[2,67; 3,55]	[2,47; 3,34]	[2,54; 3,44]	[2,23; 3,11]	[2,16; 3,04]	[2,17; 3,08]	[1,93; 2,82]	[1,75; 2,63]	[1,60; 2,46]	[1,32; 2,14]			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	405	323	261	217	170	139	115	103	87	80	79	71	62	55	47			
		Anteil in %	3,46	3,40	3,14	3,00	2,66	2,32	2,02	1,88	1,66	1,61	1,67	1,56	1,43	1,33	1,20			
	CI Anteil in %		[3,13; 3,80]	[3,03; 3,76]	[2,77; 3,52]	[2,60; 3,39]	[2,26; 3,05]	[1,94; 2,70]	[1,66; 2,39]	[1,52; 2,24]	[1,31; 2,01]	[1,26; 1,96]	[1,31; 2,04]	[1,20; 1,92]	[1,08; 1,78]	[0,98; 1,68]	[0,86; 1,54]			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1034	895	806	708	630	599	602	575	553	514	477	452	439	432	409			
		Anteil in %	8,84	9,41	9,71	9,77	9,85	10,01	10,59	10,47	10,55	10,36	10,10	9,93	10,12	10,43	10,41			
CI Anteil in %		[8,33; 9,36]	[8,83; 10,00]	[9,07; 10,35]	[9,09; 10,46]	[9,12; 10,59]	[9,25; 10,77]	[9,79; 11,40]	[9,66; 11,28]	[9,72; 11,38]	[9,51; 11,20]	[9,24; 10,96]	[9,06; 10,80]	[9,22; 11,02]	[9,50; 11,36]	[9,45; 11,36]				
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1672	1357	1137	980	888	820	753	766	692	655	612	580	541	526	488				
	Anteil in %	14,30	14,27	13,70	13,53	13,89	13,71	13,25	13,95	13,20	13,20	12,96	12,75	12,47	12,70	12,42				
CI Anteil in %		[13,67; 14,94]	[13,57; 14,98]	[12,96; 14,44]	[12,74; 14,31]	[13,04; 14,74]	[12,83; 14,58]	[12,37; 14,13]	[13,04; 14,87]	[12,28; 14,11]	[12,26; 14,14]	[12,00; 13,91]	[11,78; 13,72]	[11,49; 13,46]	[11,69; 13,71]	[11,39; 13,45]				
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	840	700	617	542	472	451	424	416	400	368	357	337	298	258	234				
	Anteil in %	7,19	7,36	7,43	7,48	7,38	7,54	7,46	7,58	7,63	7,41	7,56	7,41	6,87	6,23	5,95				
CI Anteil in %		[6,72; 7,65]	[6,84; 7,89]	[6,87; 8,00]	[6,88; 8,09]	[6,74; 8,02]	[6,87; 8,21]	[6,78; 8,15]	[6,88; 8,28]	[6,91; 8,35]	[6,69; 8,14]	[6,80; 8,31]	[6,65; 8,17]	[6,12; 7,62]	[5,49; 6,96]	[5,21; 6,69]				
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	942	780	697	631	565	502	507	531	530	535	517	526	527	486	480				
	Anteil in %	8,06	8,20	8,40	8,71	8,84	8,39	8,92	9,67	10,11	10,78	10,94	11,56	12,15	11,73	12,21				
CI Anteil in %		[7,56; 8,55]	[7,65; 8,76]	[7,80; 8,99]	[8,06; 9,36]	[8,14; 9,53]	[7,69; 9,09]	[8,18; 9,66]	[8,89; 10,45]	[9,29; 10,92]	[9,92; 11,64]	[10,05; 11,83]	[10,63; 12,49]	[11,18; 13,12]	[10,75; 12,71]	[11,19; 13,24]				
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1278	1135	1031	964	886	918	903	906	938	904	902	916	908	901	920				
	Anteil in %	10,93	11,94	12,42	13,31	13,86	15,34	15,89	16,50	17,89	18,21	19,09	20,13	20,94	21,75	23,41				
CI Anteil in %		[10,37; 11,50]	[11,29; 12,59]	[11,71; 13,13]	[12,52; 14,09]	[13,01; 14,71]	[14,43; 16,26]	[14,94; 16,84]	[15,52; 17,48]	[16,85; 18,93]	[17,14; 19,29]	[17,97; 20,21]	[18,97; 21,30]	[19,73; 22,15]	[20,50; 23,01]	[22,09; 24,73]				

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	12573	10822	9537	8914	8391	7910	7456	6957	6598	6265	5974	5713	5422				
	auswertbar	Anzahl	14294	11797	10358	8993	8402	7915	7595	7234	6782	6429	6123	5820	5562	5284				
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2169	1914	1571	1303	1186	1099	996	918	805	765	719	665	623	588				
		Anteil in %	15,17	16,22	15,17	14,49	14,12	13,89	13,11	12,69	11,87	11,90	11,74	11,43	11,20	11,13				
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	CI Anteil in %	[14,59; 15,76]	[15,56; 16,89]	[14,48; 15,86]	[13,76; 15,22]	[13,37; 14,86]	[13,12; 14,65]	[12,35; 13,87]	[11,92; 13,46]	[11,10; 12,64]	[11,11; 12,69]	[10,94; 12,55]	[10,61; 12,24]	[10,37; 12,03]	[10,28; 11,98]				
		Anzahl	2818	2251	1923	1704	1562	1472	1376	1306	1225	1151	1081	1003	948	889				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anteil in %	19,71	19,08	18,57	18,95	18,59	18,60	18,12	18,05	18,06	17,90	17,65	17,23	17,04	16,82				
		CI Anteil in %	[19,06; 20,37]	[18,37; 19,79]	[17,82; 19,31]	[18,14; 19,76]	[17,76; 19,42]	[17,74; 19,45]	[17,25; 18,98]	[17,17; 18,94]	[17,15; 18,98]	[16,97; 18,84]	[16,70; 18,61]	[16,26; 18,20]	[16,06; 18,03]	[15,82; 17,83]				
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	529	403	336	270	253	222	195	185	174	158	141	128	113	103				
		Anteil in %	3,70	3,42	3,24	3,00	3,01	2,80	2,57	2,56	2,57	2,46	2,30	2,20	2,03	1,95				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	CI Anteil in %	[3,39; 4,01]	[3,09; 3,74]	[2,90; 3,59]	[2,65; 3,36]	[2,65; 3,38]	[2,44; 3,17]	[2,21; 2,92]	[2,19; 2,92]	[2,19; 2,94]	[2,08; 2,84]	[1,93; 2,68]	[1,82; 2,58]	[1,66; 2,40]	[1,58; 2,32]				
		Anzahl	464	338	277	226	189	160	165	148	128	112	104	95	94	75				
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	3,25	2,87	2,67	2,51	2,25	2,02	2,17	2,05	1,89	1,74	1,70	1,63	1,69	1,42				
		CI Anteil in %	[2,96; 3,54]	[2,56; 3,17]	[2,36; 2,98]	[2,19; 2,84]	[1,93; 2,57]	[1,71; 2,33]	[1,84; 2,50]	[1,72; 2,37]	[1,56; 2,21]	[1,42; 2,06]	[1,37; 2,02]	[1,31; 1,96]	[1,35; 2,03]	[1,10; 1,74]				
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	1215	1008	988	850	818	784	796	762	744	703	674	618	595	568				
		Anteil in %	8,50	8,54	9,54	9,45	9,74	9,91	10,48	10,53	10,97	10,93	11,01	10,62	10,70	10,75				
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[8,04; 8,96]	[8,04; 9,05]	[8,97; 10,10]	[8,85; 10,06]	[9,10; 10,37]	[9,25; 10,56]	[9,79; 11,17]	[9,83; 11,24]	[10,23; 11,71]	[10,17; 11,70]	[10,22; 11,79]	[9,83; 11,41]	[9,89; 11,51]	[9,91; 11,58]				
		Anzahl	2015	1600	1368	1257	1149	1090	1050	967	898	825	771	753	697	643				
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	14,10	13,56	13,21	13,98	13,68	13,77	13,82	13,37	13,24	12,83	12,59	12,94	12,53	12,17				
		CI Anteil in %	[13,53; 14,67]	[12,94; 14,18]	[12,56; 13,86]	[13,26; 14,69]	[12,94; 14,41]	[13,01; 14,53]	[13,05; 14,60]	[12,58; 14,15]	[12,43; 14,05]	[12,01; 13,65]	[11,76; 13,42]	[12,08; 13,80]	[11,66; 13,40]	[11,29; 13,05]				
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	1014	824	724	600	533	498	563	513	476	455	413	382	364	325					
	Anteil in %	7,09	6,98	6,99	6,67	6,34	6,29	7,41	7,09	7,02	7,08	6,75	6,56	6,54	6,15					
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	CI Anteil in %	[6,67; 7,51]	[6,52; 7,44]	[6,50; 7,48]	[6,16; 7,19]	[5,82; 6,86]	[5,76; 6,83]	[6,82; 8,00]	[6,50; 7,68]	[6,41; 7,63]	[6,45; 7,70]	[6,12; 7,37]	[5,93; 7,20]	[5,89; 7,19]	[5,50; 6,80]					
	Anzahl	1083	974	911	810	772	726	701	705	684	659	636	622	613	603					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anteil in %	7,58	8,26	8,80	9,01	9,19	9,17	9,23	9,75	10,09	10,25	10,39	10,69	11,02	11,41					
	CI Anteil in %	[7,14; 8,01]	[7,76; 8,75]	[8,25; 9,34]	[8,42; 9,60]	[8,57; 9,81]	[8,54; 9,81]	[8,58; 9,88]	[9,06; 10,43]	[9,37; 10,80]	[9,51; 10,99]	[9,62; 11,15]	[9,89; 11,48]	[10,20; 11,84]	[10,55; 12,27]					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1737	1517	1423	1272	1303	1247	1281	1288	1246	1225	1214	1204	1194	1179					
	Anteil in %	12,15	12,86	13,74	14,14	15,51	15,75	16,87	17,80	18,37	19,05	19,83	20,69	21,47	22,31					
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	CI Anteil in %	[11,62; 12,69]	[12,26; 13,46]	[13,08; 14,40]	[13,42; 14,86]	[14,73; 16,28]	[14,95; 16,56]	[16,02; 17,71]	[16,92; 18,69]	[17,45; 19,29]	[18,09; 20,01]	[18,83; 20,83]	[19,65; 21,73]	[20,39; 22,55]	[21,19; 23,44]					

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	11346	9898	9115	8547	8032	7585	7052	6665	6355	6029	5719	5459					
	auswertbar	Anzahl	13284	10882	9241	8588	8056	7708	7367	6817	6481	6195	5859	5577	5267					
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2402	1983	1645	1473	1332	1140	1081	971	902	860	780	739	675					
		Anteil in %	18,08	18,22	17,80	17,15	16,53	14,79	14,67	14,24	13,92	13,88	13,31	13,25	12,82					
	CI Anteil in %		[17,43; 18,74]	[17,50; 18,95]	[17,02; 18,58]	[16,35; 17,95]	[15,72; 17,35]	[14,00; 15,58]	[13,87; 15,48]	[13,41; 15,07]	[13,07; 14,76]	[13,02; 14,74]	[12,44; 14,18]	[12,36; 14,14]	[11,91; 13,72]					
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2457	1961	1639	1533	1410	1288	1247	1143	1081	1034	959	898	858					
		Anteil in %	18,50	18,02	17,74	17,85	17,50	16,71	16,93	16,77	16,68	16,69	16,37	16,10	16,29					
	CI Anteil in %		[17,84; 19,16]	[17,30; 18,74]	[16,96; 18,52]	[17,04; 18,66]	[16,67; 18,33]	[15,88; 17,54]	[16,07; 17,78]	[15,88; 17,65]	[15,77; 17,59]	[15,76; 17,62]	[15,42; 17,32]	[15,14; 17,07]	[15,29; 17,29]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	506	355	265	232	197	211	202	181	165	146	126	109	91					
		Anteil in %	3,81	3,26	2,87	2,70	2,45	2,74	2,74	2,66	2,55	2,36	2,15	1,95	1,73					
	CI Anteil in %		[3,48; 4,13]	[2,93; 3,60]	[2,53; 3,21]	[2,36; 3,04]	[2,11; 2,78]	[2,37; 3,10]	[2,37; 3,11]	[2,27; 3,04]	[2,16; 2,93]	[1,98; 2,73]	[1,78; 2,52]	[1,59; 2,32]	[1,38; 2,08]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	374	275	209	176	154	144	117	103	94	95	86	80	68					
		Anteil in %	2,82	2,53	2,26	2,05	1,91	1,87	1,59	1,51	1,45	1,53	1,47	1,43	1,29					
	CI Anteil in %		[2,53; 3,10]	[2,23; 2,82]	[1,96; 2,56]	[1,75; 2,35]	[1,61; 2,21]	[1,57; 2,17]	[1,30; 1,87]	[1,22; 1,80]	[1,16; 1,74]	[1,23; 1,84]	[1,16; 1,78]	[1,12; 1,75]	[0,99; 1,60]					
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1142	996	857	803	773	774	740	673	630	620	591	545	522					
		Anteil in %	8,60	9,15	9,27	9,35	9,60	10,04	10,04	9,87	9,72	10,01	10,09	9,77	9,91					
CI Anteil in %		[8,12; 9,07]	[8,61; 9,69]	[8,68; 9,87]	[8,73; 9,97]	[8,95; 10,24]	[9,37; 10,71]	[9,36; 10,73]	[9,16; 10,58]	[9,00; 10,44]	[9,26; 10,76]	[9,32; 10,86]	[8,99; 10,55]	[9,10; 10,72]						
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1805	1438	1277	1202	1127	1101	1018	927	859	772	719	693	664						
	Anteil in %	13,59	13,21	13,82	14,00	13,99	14,28	13,82	13,60	13,25	12,46	12,27	12,43	12,61						
CI Anteil in %		[13,01; 14,17]	[12,58; 13,85]	[13,12; 14,52]	[13,26; 14,73]	[13,23; 14,75]	[13,50; 15,07]	[13,03; 14,61]	[12,78; 14,41]	[12,43; 14,08]	[11,64; 13,28]	[11,43; 13,11]	[11,56; 13,29]	[11,71; 13,50]						
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	850	710	604	559	512	554	506	450	425	402	368	337	296						
	Anteil in %	6,40	6,52	6,54	6,51	6,36	7,19	6,87	6,60	6,56	6,49	6,28	6,04	5,62						
CI Anteil in %		[5,98; 6,81]	[6,06; 6,99]	[6,03; 7,04]	[5,99; 7,03]	[5,82; 6,89]	[6,61; 7,76]	[6,29; 7,45]	[6,01; 7,19]	[5,95; 7,16]	[5,88; 7,10]	[5,66; 6,90]	[5,42; 6,67]	[5,00; 6,24]						
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	984	851	746	733	704	684	694	662	664	656	638	612	581						
	Anteil in %	7,41	7,82	8,07	8,54	8,74	8,87	9,42	9,71	10,25	10,59	10,89	10,97	11,03						
CI Anteil in %		[6,96; 7,85]	[7,32; 8,32]	[7,52; 8,63]	[7,94; 9,13]	[8,12; 9,36]	[8,24; 9,51]	[8,75; 10,09]	[9,01; 10,41]	[9,51; 10,98]	[9,82; 11,36]	[10,09; 11,69]	[10,15; 11,79]	[10,18; 11,88]						
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1718	1465	1309	1247	1268	1292	1280	1266	1251	1233	1243	1228	1187						
	Anteil in %	12,93	13,46	14,17	14,52	15,74	16,76	17,37	18,57	19,30	19,90	21,22	22,02	22,54						
CI Anteil in %		[12,36; 13,50]	[12,82; 14,10]	[13,45; 14,88]	[13,78; 15,27]	[14,94; 16,54]	[15,93; 17,60]	[16,51; 18,24]	[17,65; 19,49]	[18,34; 20,26]	[18,91; 20,90]	[20,17; 22,26]	[20,93; 23,11]	[21,41; 23,67]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	10419	9391	8701	8176	7654	7088	6703	6346	6029	5770	5487								
	auswertbar	Anzahl	11768	9847	8844	8240	7768	7407	6886	6482	6170	5857	5597	5294								
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2360	1936	1669	1531	1347	1276	1149	1034	961	909	870	801								
		Anteil in %	20,05	19,66	18,87	18,58	17,34	17,23	16,69	15,95	15,58	15,52	15,54	15,13								
	CI Anteil in %		[19,33; 20,78]	[18,88; 20,45]	[18,06; 19,69]	[17,74; 19,42]	[16,50; 18,18]	[16,37; 18,09]	[15,81; 17,57]	[15,06; 16,84]	[14,67; 16,48]	[14,59; 16,45]	[14,59; 16,49]	[14,16; 16,10]								
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2076	1644	1430	1313	1193	1119	1019	936	892	833	788	729								
		Anteil in %	17,64	16,70	16,17	15,93	15,36	15,11	14,80	14,44	14,46	14,22	14,08	13,77								
	CI Anteil in %		[16,95; 18,33]	[15,96; 17,43]	[15,40; 16,94]	[15,14; 16,72]	[14,56; 16,16]	[14,29; 15,92]	[13,96; 15,64]	[13,58; 15,30]	[13,58; 15,33]	[13,33; 15,12]	[13,17; 14,99]	[12,84; 14,70]								
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	375	292	241	198	207	174	161	140	132	120	110	102								
		Anteil in %	3,19	2,97	2,73	2,40	2,66	2,35	2,34	2,16	2,14	2,05	1,97	1,93								
	CI Anteil in %		[2,87; 3,50]	[2,63; 3,30]	[2,39; 3,06]	[2,07; 2,73]	[2,31; 3,02]	[2,00; 2,69]	[1,98; 2,70]	[1,81; 2,51]	[1,78; 2,50]	[1,69; 2,41]	[1,60; 2,33]	[1,56; 2,30]								
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	331	252	195	169	169	149	127	110	111	100	82	75								
		Anteil in %	2,81	2,56	2,20	2,05	2,18	2,01	1,84	1,70	1,80	1,71	1,47	1,42								
	CI Anteil in %		[2,51; 3,11]	[2,25; 2,87]	[1,90; 2,51]	[1,74; 2,36]	[1,85; 2,50]	[1,69; 2,33]	[1,53; 2,16]	[1,38; 2,01]	[1,47; 2,13]	[1,38; 2,04]	[1,15; 1,78]	[1,10; 1,74]								
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1115	966	923	880	889	825	775	741	717	685	650	624								
		Anteil in %	9,47	9,81	10,44	10,68	11,44	11,14	11,25	11,43	11,62	11,70	11,61	11,79								
	CI Anteil in %		[8,95; 10,00]	[9,22; 10,40]	[9,80; 11,07]	[10,01; 11,35]	[10,74; 12,15]	[10,42; 11,85]	[10,51; 12,00]	[10,66; 12,21]	[10,82; 12,42]	[10,87; 12,52]	[10,77; 12,45]	[10,92; 12,66]								
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1726	1465	1341	1250	1163	1108	1050	980	933	875	822	753								
		Anteil in %	14,67	14,88	15,16	15,17	14,97	14,96	15,25	15,12	15,12	14,94	14,69	14,22								
CI Anteil in %		[14,03; 15,31]	[14,17; 15,58]	[14,42; 15,91]	[14,40; 15,94]	[14,18; 15,77]	[14,15; 15,77]	[14,40; 16,10]	[14,25; 15,99]	[14,23; 16,02]	[14,03; 15,85]	[13,76; 15,61]	[13,28; 15,16]									
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	699	578	520	455	502	468	417	369	342	318	284	269									
	Anteil in %	5,94	5,87	5,88	5,52	6,46	6,32	6,06	5,69	5,54	5,43	5,07	5,08									
CI Anteil in %		[5,51; 6,37]	[5,41; 6,33]	[5,39; 6,37]	[5,03; 6,02]	[5,92; 7,01]	[5,76; 6,87]	[5,49; 6,62]	[5,13; 6,26]	[4,97; 6,11]	[4,85; 6,01]	[4,50; 5,65]	[4,49; 5,67]									
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	843	770	728	680	617	635	608	615	601	579	595	584									
	Anteil in %	7,16	7,82	8,23	8,25	7,94	8,57	8,83	9,49	9,74	9,89	10,63	11,03									
CI Anteil in %		[6,70; 7,63]	[7,29; 8,35]	[7,66; 8,80]	[7,66; 8,85]	[7,34; 8,54]	[7,94; 9,21]	[8,16; 9,50]	[8,77; 10,20]	[9,00; 10,48]	[9,12; 10,65]	[9,82; 11,44]	[10,19; 11,88]									
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1390	1234	1191	1171	1162	1176	1142	1142	1097	1075	1050	1032									
	Anteil in %	11,81	12,53	13,47	14,21	14,96	15,88	16,58	17,62	17,78	18,35	18,76	19,49									
CI Anteil in %		[11,23; 12,39]	[11,88; 13,19]	[12,76; 14,18]	[13,46; 14,97]	[14,17; 15,75]	[15,04; 16,71]	[15,71; 17,46]	[16,69; 18,55]	[16,83; 18,73]	[17,36; 19,35]	[17,74; 19,78]	[18,43; 20,56]									



EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	11755	10764	9963	9300	8577	8054	7622	7269	6901	6533							
	auswertbar	Anzahl	13105	11391	10375	9386	8901	8214	7709	7313	6934	6563	6174							
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2957	2463	2194	1826	1672	1527	1405	1304	1215	1102	1035							
		Anteil in %	22,56	21,62	21,15	19,45	18,78	18,59	18,23	17,83	17,52	16,79	16,76							
		CI Anteil in %	[21,85; 23,28]	[20,87; 22,38]	[20,36; 21,93]	[18,65; 20,26]	[17,97; 19,60]	[17,75; 19,43]	[17,36; 19,09]	[16,95; 18,71]	[16,63; 18,42]	[15,89; 17,70]	[15,83; 17,70]							
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2072	1723	1545	1359	1258	1150	1057	996	923	874	803							
		Anteil in %	15,81	15,13	14,89	14,48	14,13	14,00	13,71	13,62	13,31	13,32	13,01							
		CI Anteil in %	[15,19; 16,44]	[14,47; 15,78]	[14,21; 15,58]	[13,77; 15,19]	[13,41; 14,86]	[13,25; 14,75]	[12,94; 14,48]	[12,83; 14,41]	[12,51; 14,11]	[12,50; 14,14]	[12,17; 13,85]							
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	345	278	212	209	181	160	145	127	116	99	93							
		Anteil in %	2,63	2,44	2,04	2,23	2,03	1,95	1,88	1,74	1,67	1,51	1,51							
		CI Anteil in %	[2,36; 2,91]	[2,16; 2,72]	[1,77; 2,32]	[1,93; 2,53]	[1,74; 2,33]	[1,65; 2,25]	[1,58; 2,18]	[1,44; 2,04]	[1,37; 1,97]	[1,21; 1,80]	[1,20; 1,81]							
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	315	239	195	184	166	152	132	112	114	96	87							
		Anteil in %	2,40	2,10	1,88	1,96	1,86	1,85	1,71	1,53	1,64	1,46	1,41							
		CI Anteil in %	[2,14; 2,67]	[1,83; 2,36]	[1,62; 2,14]	[1,68; 2,24]	[1,58; 2,15]	[1,56; 2,14]	[1,42; 2,00]	[1,25; 1,81]	[1,34; 1,94]	[1,17; 1,75]	[1,12; 1,70]							
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1260	1204	1133	1075	996	923	865	839	780	735	707							
		Anteil in %	9,61	10,57	10,92	11,45	11,19	11,24	11,22	11,47	11,25	11,20	11,45							
		CI Anteil in %	[9,11; 10,12]	[10,01; 11,13]	[10,32; 11,52]	[10,81; 12,10]	[10,53; 11,84]	[10,55; 11,92]	[10,52; 11,93]	[10,74; 12,20]	[10,51; 11,99]	[10,44; 11,96]	[10,66; 12,25]							
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	2007	1724	1592	1498	1437	1324	1251	1165	1074	1035	956							
		Anteil in %	15,31	15,13	15,34	15,96	16,14	16,12	16,23	15,93	15,49	15,77	15,48							
		CI Anteil in %	[14,70; 15,93]	[14,48; 15,79]	[14,65; 16,04]	[15,22; 16,70]	[15,38; 16,91]	[15,32; 16,91]	[15,40; 17,05]	[15,09; 16,77]	[14,64; 16,34]	[14,89; 16,65]	[14,58; 16,39]							
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	712	578	550	586	545	477	414	394	383	345	303								
	Anteil in %	5,43	5,07	5,30	6,24	6,12	5,81	5,37	5,39	5,52	5,26	4,91								
	CI Anteil in %	[5,04; 5,82]	[4,67; 5,48]	[4,87; 5,73]	[5,75; 6,73]	[5,62; 6,62]	[5,30; 6,31]	[4,87; 5,87]	[4,87; 5,91]	[4,99; 6,06]	[4,72; 5,80]	[4,37; 5,45]								
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	956	924	859	759	795	755	765	737	743	734	716								
	Anteil in %	7,29	8,11	8,28	8,09	8,93	9,19	9,92	10,08	10,72	11,18	11,60								
	CI Anteil in %	[6,85; 7,74]	[7,61; 8,61]	[7,75; 8,81]	[7,53; 8,64]	[8,34; 9,52]	[8,57; 9,82]	[9,26; 10,59]	[9,39; 10,77]	[9,99; 11,44]	[10,42; 11,95]	[10,80; 12,40]								
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1478	1405	1303	1254	1255	1192	1163	1131	1113	1086	1066								
	Anteil in %	11,28	12,33	12,56	13,36	14,10	14,51	15,09	15,47	16,05	16,55	17,27								
	CI Anteil in %	[10,74; 11,82]	[11,73; 12,94]	[11,92; 13,20]	[12,67; 14,05]	[13,38; 14,82]	[13,75; 15,27]	[14,29; 15,89]	[14,64; 16,29]	[15,19; 16,92]	[15,65; 17,45]	[16,32; 18,21]								

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	10272	9403	8640	7877	7398	6960	6569	6217	5873											
	auswertbar	Anzahl	11332	10015	8926	8358	7680	7188	6756	6350	6040	5651											
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2944	2432	2010	1845	1640	1505	1389	1271	1166	1062											
		Anteil in %	25,98	24,28	22,52	22,07	21,35	20,94	20,56	20,02	19,30	18,79											
		CI Anteil in %	[25,17; 26,79]	[23,44; 25,12]	[21,65; 23,39]	[21,19; 22,96]	[20,44; 22,27]	[20,00; 21,88]	[19,60; 21,52]	[19,03; 21,00]	[18,31; 20,30]	[17,77; 19,81]											
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1629	1398	1193	1086	961	894	825	771	724	681											
		Anteil in %	14,38	13,96	13,37	12,99	12,51	12,44	12,21	12,14	11,99	12,05											
		CI Anteil in %	[13,73; 15,02]	[13,28; 14,64]	[12,66; 14,07]	[12,27; 13,71]	[11,77; 13,25]	[11,67; 13,20]	[11,43; 12,99]	[11,34; 12,95]	[11,17; 12,81]	[11,20; 12,90]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	253	200	178	157	147	124	112	97	85	77											
		Anteil in %	2,23	2,00	1,99	1,88	1,91	1,73	1,66	1,53	1,41	1,36											
		CI Anteil in %	[1,96; 2,50]	[1,72; 2,27]	[1,70; 2,28]	[1,59; 2,17]	[1,61; 2,22]	[1,42; 2,03]	[1,35; 1,96]	[1,23; 1,83]	[1,11; 1,70]	[1,06; 1,66]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	234	199	187	154	127	113	93	84	86	77											
		Anteil in %	2,06	1,99	2,10	1,84	1,65	1,57	1,38	1,32	1,42	1,36											
		CI Anteil in %	[1,80; 2,33]	[1,71; 2,26]	[1,80; 2,39]	[1,55; 2,13]	[1,37; 1,94]	[1,28; 1,86]	[1,10; 1,65]	[1,04; 1,60]	[1,13; 1,72]	[1,06; 1,66]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1123	1078	997	944	879	848	796	750	729	689											
		Anteil in %	9,91	10,76	11,17	11,29	11,45	11,80	11,78	11,81	12,07	12,19											
		CI Anteil in %	[9,36; 10,46]	[10,16; 11,37]	[10,52; 11,82]	[10,62; 11,97]	[10,73; 12,16]	[11,05; 12,54]	[11,01; 12,55]	[11,02; 12,60]	[11,25; 12,89]	[11,34; 13,05]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1765	1603	1431	1348	1242	1165	1108	1041	985	914											
		Anteil in %	15,58	16,01	16,03	16,13	16,17	16,21	16,40	16,39	16,31	16,17											
		CI Anteil in %	[14,91; 16,24]	[15,29; 16,72]	[15,27; 16,79]	[15,34; 16,92]	[15,35; 17,00]	[15,36; 17,06]	[15,52; 17,28]	[15,48; 17,30]	[15,38; 17,24]	[15,21; 17,13]											
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	573	474	514	475	432	373	351	322	299	279											
Anteil in %		5,06	4,73	5,76	5,68	5,63	5,19	5,20	5,07	4,95	4,94												
CI Anteil in %		[4,65; 5,46]	[4,32; 5,15]	[5,28; 6,24]	[5,19; 6,18]	[5,11; 6,14]	[4,68; 5,70]	[4,67; 5,72]	[4,53; 5,61]	[4,40; 5,50]	[4,37; 5,50]												
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	812	777	726	712	701	678	655	661	665	637												
	Anteil in %	7,17	7,76	8,13	8,52	9,13	9,43	9,70	10,41	11,01	11,27												
	CI Anteil in %	[6,69; 7,64]	[7,23; 8,28]	[7,57; 8,70]	[7,92; 9,12]	[8,48; 9,77]	[8,76; 10,11]	[8,99; 10,40]	[9,66; 11,16]	[10,22; 11,80]	[10,45; 12,10]												
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1219	1167	1085	1059	1038	1012	973	921	894	861												
	Anteil in %	10,76	11,65	12,16	12,67	13,52	14,08	14,40	14,50	14,80	15,24												
	CI Anteil in %	[10,19; 11,33]	[11,02; 12,28]	[11,48; 12,83]	[11,96; 13,38]	[12,75; 14,28]	[13,27; 14,88]	[13,56; 15,24]	[13,64; 15,37]	[13,91; 15,70]	[14,30; 16,17]												

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	9544	8730	7830	7281	6863	6485	6160	5839											
	auswertbar	Anzahl	10692	9044	8425	7620	7068	6685	6286	5984	5604											
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	3031	2213	2087	1838	1633	1555	1400	1311	1206											
		Anteil in %	28,35	24,47	24,77	24,12	23,10	23,26	22,27	21,91	21,52											
		CI Anteil in %	[27,49; 29,20]	[23,58; 25,36]	[23,85; 25,69]	[23,16; 25,08]	[22,12; 24,09]	[22,25; 24,27]	[21,24; 23,30]	[20,86; 22,96]	[20,44; 22,60]											
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1410	1035	973	892	800	728	679	636	572											
		Anteil in %	13,19	11,44	11,55	11,71	11,32	10,89	10,80	10,63	10,21											
		CI Anteil in %	[12,55; 13,83]	[10,79; 12,10]	[10,87; 12,23]	[10,98; 12,43]	[10,58; 12,06]	[10,14; 11,64]	[10,03; 11,57]	[9,85; 11,41]	[9,41; 11,00]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	233	171	163	143	129	119	103	96	90											
		Anteil in %	2,18	1,89	1,93	1,88	1,83	1,78	1,64	1,60	1,61											
		CI Anteil in %	[1,90; 2,46]	[1,61; 2,17]	[1,64; 2,23]	[1,57; 2,18]	[1,51; 2,14]	[1,46; 2,10]	[1,32; 1,95]	[1,29; 1,92]	[1,28; 1,94]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	170	150	119	111	99	84	76	72	59											
		Anteil in %	1,59	1,66	1,41	1,46	1,40	1,26	1,21	1,20	1,05											
		CI Anteil in %	[1,35; 1,83]	[1,40; 1,92]	[1,16; 1,66]	[1,19; 1,73]	[1,13; 1,67]	[0,99; 1,52]	[0,94; 1,48]	[0,93; 1,48]	[0,79; 1,32]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1027	959	922	840	799	774	743	709	649											
		Anteil in %	9,61	10,60	10,94	11,02	11,30	11,58	11,82	11,85	11,58											
		CI Anteil in %	[9,05; 10,16]	[9,97; 11,24]	[10,28; 11,61]	[10,32; 11,73]	[10,57; 12,04]	[10,81; 12,35]	[11,02; 12,62]	[11,03; 12,67]	[10,74; 12,42]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1833	1526	1466	1306	1229	1136	1095	1028	966											
		Anteil in %	17,14	16,87	17,40	17,14	17,39	16,99	17,42	17,18	17,24											
		CI Anteil in %	[16,43; 17,86]	[16,10; 17,64]	[16,59; 18,21]	[16,29; 17,99]	[16,50; 18,27]	[16,09; 17,89]	[16,48; 18,36]	[16,22; 18,13]	[16,25; 18,23]											
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	515	444	427	414	358	341	323	299	281											
Anteil in %		4,82	4,91	5,07	5,43	5,07	5,10	5,14	5,00	5,01												
CI Anteil in %		[4,41; 5,22]	[4,46; 5,35]	[4,60; 5,54]	[4,92; 5,94]	[4,55; 5,58]	[4,57; 5,63]	[4,59; 5,68]	[4,44; 5,55]	[4,44; 5,59]												
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	675	814	698	662	659	629	608	600	570												
	Anteil in %	6,31	9,00	8,28	8,69	9,32	9,41	9,67	10,03	10,17												
	CI Anteil in %	[5,85; 6,77]	[8,41; 9,59]	[7,70; 8,87]	[8,06; 9,32]	[8,65; 10,00]	[8,71; 10,11]	[8,94; 10,40]	[9,27; 10,79]	[9,38; 10,96]												
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1107	1064	1009	916	889	875	851	840	841												
	Anteil in %	10,35	11,76	11,98	12,02	12,58	13,09	13,54	14,04	15,01												
	CI Anteil in %	[9,78; 10,93]	[11,10; 12,43]	[11,28; 12,67]	[11,29; 12,75]	[11,80; 13,35]	[12,28; 13,90]	[12,69; 14,38]	[13,16; 14,92]	[14,07; 15,94]												

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	6116	5424	4962	4661	4378	4148	3928												
	auswertbar	Anzahl	6860	5966	5301	4849	4572	4277	4038	3787												
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1959	1605	1384	1212	1120	1020	935	869												
		Anteil in %	28,56	26,90	26,11	24,99	24,50	23,85	23,16	22,95												
		CI Anteil in %	[27,49; 29,63]	[25,78; 28,03]	[24,93; 27,29]	[23,78; 26,21]	[23,25; 25,74]	[22,57; 25,13]	[21,85; 24,46]	[21,61; 24,29]												
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	844	705	583	536	487	435	418	394												
		Anteil in %	12,30	11,82	11,00	11,05	10,65	10,17	10,35	10,40												
		CI Anteil in %	[11,53; 13,08]	[11,00; 12,64]	[10,16; 11,84]	[10,17; 11,94]	[9,76; 11,55]	[9,26; 11,08]	[9,41; 11,29]	[9,43; 11,38]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	128	100	84	79	66	47	47	36												
		Anteil in %	1,87	1,68	1,58	1,63	1,44	1,10	1,16	0,95												
		CI Anteil in %	[1,55; 2,19]	[1,35; 2,00]	[1,25; 1,92]	[1,27; 1,99]	[1,10; 1,79]	[0,79; 1,41]	[0,83; 1,49]	[0,64; 1,26]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	101	73	64	51	51	48	49	41												
		Anteil in %	1,47	1,22	1,21	1,05	1,12	1,12	1,21	1,08												
		CI Anteil in %	[1,19; 1,76]	[0,94; 1,50]	[0,91; 1,50]	[0,76; 1,34]	[0,81; 1,42]	[0,81; 1,44]	[0,88; 1,55]	[0,75; 1,41]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	758	699	644	590	557	534	516	485												
		Anteil in %	11,05	11,72	12,15	12,17	12,18	12,49	12,78	12,81												
		CI Anteil in %	[10,31; 11,79]	[10,90; 12,53]	[11,27; 13,03]	[11,25; 13,09]	[11,23; 13,13]	[11,49; 13,48]	[11,75; 13,81]	[11,74; 13,87]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1211	1068	930	886	826	771	722	671												
		Anteil in %	17,65	17,90	17,54	18,27	18,07	18,03	17,88	17,72												
		CI Anteil in %	[16,75; 18,56]	[16,93; 18,87]	[16,52; 18,57]	[17,18; 19,36]	[16,95; 19,18]	[16,87; 19,18]	[16,70; 19,06]	[16,50; 18,93]												
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	303	290	274	227	209	184	170	145												
		Anteil in %	4,42	4,86	5,17	4,68	4,57	4,30	4,21	3,83												
		CI Anteil in %	[3,93; 4,90]	[4,32; 5,41]	[4,57; 5,76]	[4,09; 5,28]	[3,97; 5,18]	[3,69; 4,91]	[3,59; 4,83]	[3,22; 4,44]												
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	489	481	437	435	434	421	404	403												
Anteil in %		7,13	8,06	8,24	8,97	9,49	9,84	10,00	10,64													
CI Anteil in %		[6,52; 7,74]	[7,37; 8,75]	[7,50; 8,98]	[8,17; 9,78]	[8,64; 10,34]	[8,95; 10,74]	[9,08; 10,93]	[9,66; 11,62]													
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	633	579	565	536	555	562	532	515													
	Anteil in %	9,23	9,70	10,66	11,05	12,14	13,14	13,17	13,60													
	CI Anteil in %	[8,54; 9,91]	[8,95; 10,46]	[9,83; 11,49]	[10,17; 11,94]	[11,19; 13,09]	[12,13; 14,15]	[12,13; 14,22]	[12,51; 14,69]													

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	8115	7281	6665	6202	5821	5474													
	auswertbar	Anzahl	9371	7912	7112	6527	6054	5692	5321													
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2415	1922	1679	1504	1365	1230	1119													
		Anteil in %	25,77	24,29	23,61	23,04	22,55	21,61	21,03													
		CI Anteil in %	[24,89; 26,66]	[23,35; 25,24]	[22,62; 24,60]	[22,02; 24,06]	[21,49; 23,60]	[20,54; 22,68]	[19,93; 22,12]													
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1482	1186	1028	923	855	782	729													
		Anteil in %	15,81	14,99	14,45	14,14	14,12	13,74	13,70													
		CI Anteil in %	[15,08; 16,55]	[14,20; 15,78]	[13,64; 15,27]	[13,30; 14,99]	[13,25; 15,00]	[12,84; 14,63]	[12,78; 14,62]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	145	117	97	79	65	58	58													
		Anteil in %	1,55	1,48	1,36	1,21	1,07	1,02	1,09													
		CI Anteil in %	[1,30; 1,80]	[1,21; 1,74]	[1,09; 1,63]	[0,95; 1,48]	[0,81; 1,33]	[0,76; 1,28]	[0,81; 1,37]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	94	81	73	60	53	50	46													
		Anteil in %	1,00	1,02	1,03	0,92	0,88	0,88	0,86													
		CI Anteil in %	[0,80; 1,20]	[0,80; 1,25]	[0,79; 1,26]	[0,69; 1,15]	[0,64; 1,11]	[0,64; 1,12]	[0,62; 1,11]													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	886	800	751	694	640	639	600													
		Anteil in %	9,45	10,11	10,56	10,63	10,57	11,23	11,28													
		CI Anteil in %	[8,86; 10,05]	[9,45; 10,78]	[9,85; 11,27]	[9,88; 11,38]	[9,80; 11,35]	[10,41; 12,05]	[10,43; 12,13]													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1498	1265	1138	1068	983	933	865													
		Anteil in %	15,99	15,99	16,00	16,36	16,24	16,39	16,26													
		CI Anteil in %	[15,24; 16,73]	[15,18; 16,80]	[15,15; 16,85]	[15,47; 17,26]	[15,31; 17,17]	[15,43; 17,35]	[15,26; 17,25]													
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	385	312	258	235	199	189	177														
	Anteil in %	4,11	3,94	3,63	3,60	3,29	3,32	3,33														
	CI Anteil in %	[3,71; 4,51]	[3,51; 4,37]	[3,19; 4,06]	[3,15; 4,05]	[2,84; 3,74]	[2,85; 3,79]	[2,84; 3,81]														
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	609	593	586	536	527	524	516														
	Anteil in %	6,50	7,49	8,24	8,21	8,70	9,21	9,70														
	CI Anteil in %	[6,00; 7,00]	[6,91; 8,08]	[7,60; 8,88]	[7,55; 8,88]	[7,99; 9,42]	[8,45; 9,96]	[8,90; 10,49]														
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1287	1156	1083	1024	986	946	887														
	Anteil in %	13,73	14,61	15,23	15,69	16,29	16,62	16,67														
	CI Anteil in %	[13,04; 14,43]	[13,83; 15,39]	[14,39; 16,06]	[14,81; 16,57]	[15,36; 17,22]	[15,65; 17,59]	[15,67; 17,67]														

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	6638	5995	5501	5082	4747													
	auswertbar	Anzahl	7479	6514	5879	5382	4981	4642													
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1965	1602	1431	1259	1148	1066													
		Anteil in %	26,27	24,59	24,34	23,39	23,05	22,96													
		CI Anteil in %	[25,28; 27,27]	[23,55; 25,64]	[23,24; 25,44]	[22,26; 24,52]	[21,88; 24,22]	[21,75; 24,17]													
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	979	815	705	617	560	518													
		Anteil in %	13,09	12,51	11,99	11,46	11,24	11,16													
		CI Anteil in %	[12,33; 13,85]	[11,71; 13,32]	[11,16; 12,82]	[10,61; 12,32]	[10,37; 12,12]	[10,25; 12,06]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	119	110	91	77	66	60													
		Anteil in %	1,59	1,69	1,55	1,43	1,33	1,29													
		CI Anteil in %	[1,31; 1,87]	[1,38; 2,00]	[1,23; 1,86]	[1,11; 1,75]	[1,01; 1,64]	[0,97; 1,62]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	96	83	67	61	55	51													
		Anteil in %	1,28	1,27	1,14	1,13	1,10	1,10													
		CI Anteil in %	[1,03; 1,54]	[1,00; 1,55]	[0,87; 1,41]	[0,85; 1,42]	[0,81; 1,39]	[0,80; 1,40]													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	800	714	664	604	583	543													
		Anteil in %	10,70	10,96	11,29	11,22	11,70	11,70													
		CI Anteil in %	[10,00; 11,40]	[10,20; 11,72]	[10,49; 12,10]	[10,38; 12,07]	[10,81; 12,60]	[10,77; 12,62]													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1342	1149	1038	959	898	781													
		Anteil in %	17,94	17,64	17,66	17,82	18,03	16,82													
		CI Anteil in %	[17,07; 18,81]	[16,71; 18,56]	[16,68; 18,63]	[16,80; 18,84]	[16,96; 19,10]	[15,75; 17,90]													
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	335	298	239	215	187	177													
		Anteil in %	4,48	4,57	4,07	3,99	3,75	3,81													
		CI Anteil in %	[4,01; 4,95]	[4,07; 5,08]	[3,56; 4,57]	[3,47; 4,52]	[3,23; 4,28]	[3,26; 4,36]													
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	490	521	501	479	461	464													
Anteil in %		6,55	8,00	8,52	8,90	9,26	10,00														
CI Anteil in %		[5,99; 7,11]	[7,34; 8,66]	[7,81; 9,24]	[8,14; 9,66]	[8,45; 10,06]	[9,13; 10,86]														
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	956	883	823	805	743	722														
	Anteil in %	12,78	13,56	14,00	14,96	14,92	15,55														
	CI Anteil in %	[12,03; 13,54]	[12,72; 14,39]	[13,11; 14,89]	[14,00; 15,91]	[13,93; 15,91]	[14,51; 16,60]														

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7740	7032	6413	5942															
	auswertbar	Anzahl	8729	7609	6876	6270	5787															
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2408	1956	1720	1547	1387															
		Anteil in %	27,59	25,71	25,01	24,67	23,97															
		CI Anteil in %	[26,65; 28,52]	[24,72; 26,69]	[23,99; 26,04]	[23,61; 25,74]	[22,87; 25,07]															
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	987	844	733	650	573															
		Anteil in %	11,31	11,09	10,66	10,37	9,90															
		CI Anteil in %	[10,64; 11,97]	[10,39; 11,80]	[9,93; 11,39]	[9,61; 11,12]	[9,13; 10,67]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	104	90	77	67	64															
		Anteil in %	1,19	1,18	1,12	1,07	1,11															
		CI Anteil in %	[0,96; 1,42]	[0,94; 1,43]	[0,87; 1,37]	[0,81; 1,32]	[0,84; 1,38]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	102	87	67	63	59															
		Anteil in %	1,17	1,14	0,97	1,00	1,02															
		CI Anteil in %	[0,94; 1,39]	[0,90; 1,38]	[0,74; 1,21]	[0,76; 1,25]	[0,76; 1,28]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	949	860	809	768	723															
		Anteil in %	10,87	11,30	11,77	12,25	12,49															
		CI Anteil in %	[10,22; 11,52]	[10,59; 12,01]	[11,00; 12,53]	[11,44; 13,06]	[11,64; 13,35]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1659	1454	1286	1187	1098															
		Anteil in %	19,01	19,11	18,70	18,93	18,97															
		CI Anteil in %	[18,18; 19,83]	[18,23; 19,99]	[17,78; 19,62]	[17,96; 19,90]	[17,96; 19,98]															
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	346	293	250	206	173																
	Anteil in %	3,96	3,85	3,64	3,29	2,99																
	CI Anteil in %	[3,55; 4,37]	[3,42; 4,28]	[3,19; 4,08]	[2,84; 3,73]	[2,55; 3,43]																
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	676	702	655	606	581																
	Anteil in %	7,74	9,23	9,53	9,67	10,04																
	CI Anteil in %	[7,18; 8,31]	[8,58; 9,88]	[8,83; 10,22]	[8,93; 10,40]	[9,27; 10,81]																
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1016	912	889	827	785																
	Anteil in %	11,64	11,99	12,93	13,19	13,56																
	CI Anteil in %	[10,97; 12,31]	[11,26; 12,72]	[12,14; 13,72]	[12,35; 14,03]	[12,68; 14,45]																

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	7229	6483	5929																	
	auswertbar	Anzahl	8093	7116	6376	5778																	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2232	1824	1615	1438																	
		Anteil in %	27,58	25,63	25,33	24,89																	
		CI Anteil in %	[26,61; 28,55]	[24,62; 26,65]	[24,26; 26,40]	[23,77; 26,00]																	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	804	692	580	522																	
		Anteil in %	9,93	9,72	9,10	9,03																	
		CI Anteil in %	[9,28; 10,59]	[9,04; 10,41]	[8,39; 9,80]	[8,30; 9,77]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	118	95	86	70																	
		Anteil in %	1,46	1,34	1,35	1,21																	
		CI Anteil in %	[1,20; 1,72]	[1,07; 1,60]	[1,07; 1,63]	[0,93; 1,49]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	102	72	60	44																	
		Anteil in %	1,26	1,01	0,94	0,76																	
		CI Anteil in %	[1,02; 1,50]	[0,78; 1,24]	[0,70; 1,18]	[0,54; 0,99]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	975	883	811	723																	
		Anteil in %	12,05	12,41	12,72	12,51																	
		CI Anteil in %	[11,34; 12,76]	[11,64; 13,17]	[11,90; 13,54]	[11,66; 13,37]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1575	1414	1261	1152																	
		Anteil in %	19,46	19,87	19,78	19,94																	
		CI Anteil in %	[18,60; 20,32]	[18,94; 20,80]	[18,80; 20,76]	[18,91; 20,97]																	
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	252	216	196	174																		
	Anteil in %	3,11	3,04	3,07	3,01																		
	CI Anteil in %	[2,74; 3,49]	[2,64; 3,43]	[2,65; 3,50]	[2,57; 3,45]																		
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	675	653	578	529																		
	Anteil in %	8,34	9,18	9,07	9,16																		
	CI Anteil in %	[7,74; 8,94]	[8,51; 9,85]	[8,36; 9,77]	[8,41; 9,90]																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	932	866	831	790																		
	Anteil in %	11,52	12,17	13,03	13,67																		
	CI Anteil in %	[10,82; 12,21]	[11,41; 12,93]	[12,21; 13,86]	[12,79; 14,56]																		



EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	7621	6845																	
	auswertbar	Anzahl	8612	7459	6660																	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2458	2020	1750																	
		Anteil in %	28,54	27,08	26,28																	
		CI Anteil in %	[27,59; 29,50]	[26,07; 28,09]	[25,22; 27,33]																	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	764	641	541																	
		Anteil in %	8,87	8,59	8,12																	
		CI Anteil in %	[8,27; 9,47]	[7,96; 9,23]	[7,47; 8,78]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	95	80	66																	
		Anteil in %	1,10	1,07	0,99																	
		CI Anteil in %	[0,88; 1,32]	[0,84; 1,31]	[0,75; 1,23]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	75	70	63																	
		Anteil in %	0,87	0,94	0,95																	
		CI Anteil in %	[0,67; 1,07]	[0,72; 1,16]	[0,71; 1,18]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	1060	977	892																	
		Anteil in %	12,31	13,10	13,39																	
		CI Anteil in %	[11,61; 13,00]	[12,33; 13,86]	[12,58; 14,21]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1759	1528	1386																	
		Anteil in %	20,42	20,49	20,81																	
		CI Anteil in %	[19,57; 21,28]	[19,57; 21,40]	[19,84; 21,79]																	
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	284	240	222																		
	Anteil in %	3,30	3,22	3,33																		
	CI Anteil in %	[2,92; 3,67]	[2,82; 3,62]	[2,90; 3,76]																		
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	668	621	560																		
	Anteil in %	7,76	8,33	8,41																		
	CI Anteil in %	[7,19; 8,32]	[7,70; 8,95]	[7,74; 9,07]																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	942	880	812																		
	Anteil in %	10,94	11,80	12,19																		
	CI Anteil in %	[10,28; 11,60]	[11,07; 12,53]	[11,41; 12,98]																		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608	6653																		
	auswertbar	Anzahl	7593	6493																		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2234	1816																		
		Anteil in %	29,42	27,97																		
		CI Anteil in %	[28,40; 30,45]	[26,88; 29,06]																		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	663	547																		
		Anteil in %	8,73	8,42																		
		CI Anteil in %	[8,10; 9,37]	[7,75; 9,10]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	76	67																		
		Anteil in %	1,00	1,03																		
		CI Anteil in %	[0,78; 1,22]	[0,79; 1,28]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	48	41																		
		Anteil in %	0,63	0,63																		
		CI Anteil in %	[0,45; 0,81]	[0,44; 0,82]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	919	804																		
		Anteil in %	12,10	12,38																		
		CI Anteil in %	[11,37; 12,84]	[11,58; 13,18]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1593	1367																		
		Anteil in %	20,98	21,05																		
		CI Anteil in %	[20,06; 21,90]	[20,06; 22,05]																		
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	223	189																			
	Anteil in %	2,94	2,91																			
	CI Anteil in %	[2,56; 3,32]	[2,50; 3,32]																			
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	583	560																			
	Anteil in %	7,68	8,62																			
	CI Anteil in %	[7,08; 8,28]	[7,94; 9,31]																			
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	850	765																			
	Anteil in %	11,19	11,78																			
	CI Anteil in %	[10,49; 11,90]	[11,00; 12,57]																			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836																		
	auswertbar	Anzahl	7822																		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2225																		
		Anteil in %	28,45																		
		CI Anteil in %	[27,45; 29,45]																		
		Anzahl	680																		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anteil in %	8,69																		
		CI Anteil in %	[8,07; 9,32]																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	97																		
		Anteil in %	1,24																		
		CI Anteil in %	[0,99; 1,49]																		
		Anzahl	61																		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	0,78																		
		CI Anteil in %	[0,58; 0,97]																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	947																		
		Anteil in %	12,11																		
		CI Anteil in %	[11,38; 12,83]																		
		Anzahl	1655																		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	21,16																		
		CI Anteil in %	[20,25; 22,06]																		
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	195																			
	Anteil in %	2,49																			
	CI Anteil in %	[2,15; 2,84]																			
	Anzahl	643																			
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anteil in %	8,22																			
	CI Anteil in %	[7,61; 8,83]																			
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	900																			
	Anteil in %	11,51																			
	CI Anteil in %	[10,80; 12,21]																			

### 3.4 Prozessparameter

Zur Erhöhung der Lebensqualität der Patienten sowie zur Erhaltung ihrer Autonomie ist eine Schulung über die Ursachen, Auswirkungen und Therapiemodalitäten eines Diabetes mellitus empfehlenswert. Zum einen, weil hierdurch oftmals bei den Diabetikern dauerhafte Verhaltens- und Verhältnisänderungen in den Bereichen Ernährung und Bewegung eingeleitet werden können, die positive Effekte auf den Krankheitsverlauf ausüben. Zum anderen aber auch, weil vor allem bei der Insulintherapie eine kontinuierliche Kontrolle der verzehrten Lebensmittel (Broteinheiten) sowie der zu injizierenden Insulinmenge durch wiederholte Blutzuckerselbstmessungen erfolgen muss. Hierzu ist ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit der Betroffenen erforderlich, welches u.a. in den Schulungen intensiv erlernt wird.

Gefürchtete Langzeitkomplikationen des Diabetes bestehen in der Schädigung von kleinen Gefäßen (sog. Mikroangiopathien). Betroffen sind grundsätzlich alle Gefäße, besonders gravierend sind jedoch Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retina) des Auges mit der Gefahr der Erblindung, der Nieren mit der Gefahr des Nierenversagens sowie des Herzens mit der Gefahr des Herzinfarktes.

In der Tabelle 3.4.1 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlenen Diabetes-Schulung** teilgenommen haben, aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten*- also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zu beachten ist bei dieser Auswertung, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Schulungsdaten aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeilen „Schulung wahrgenommen“, „Schulung aktuell nicht möglich“ und „Schulung nicht wahrgenommen“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit über die Berichtshalbjahre gegeben.<sup>7</sup>

Zunächst wird unter „Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar)“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Diabetesschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Diabetesschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

<sup>7</sup> Für den Berichtszeitraum vor der Änderung, d.h. Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1, ist auszuweisen, ob eine Schulung durchgeführt wurde oder aus plausiblen Grund aktuell nicht möglich war oder aus plausiblen Grund nicht wahrgenommen wurde („Compliance“) oder ob sie ohne Begründung abgelehnt wurde. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren veranlasste und nicht erforderliche Schulungen. Für den Berichtszeitraum nach der Änderung, d.h. ab dem Berichtshalbjahr 2004-2, ist auszuweisen, ob eine empfohlene Schulung wahrgenommen wurde oder die Wahrnehmung aktuell nicht möglich war („Compliance“) oder ob keine Teilnahme an der Schulung erfolgte. Eine weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeit war, dass bei der letzten Dokumentation keine Schulung empfohlen wurde.

In der Kohorte 2003-1 lagen zu Beginn des zweiten Beitrittsjahres für 1 Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung auswertbare Angaben zur Wahrnehmung einer Schulung vor. 1 dieser auswertbaren Patienten nahmen die empfohlene Schulung wahr, dagegen hatten 0,00 Prozent keine Möglichkeit zur Teilnahme. 0,00 Prozent nahmen die Schulung ohne plausiblen Grund nicht wahr.

**Tabelle 3.4.1 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen**

\* Auswertbar sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1																		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1																		
		Anteil in %	100,00																		
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]																		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	0																		
		Anteil in %	0,00																		
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]																		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	0																		
		Anteil in %	0,00																		
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2003-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1917	1345	887	586	450	334	259	222	208	176	147	112	98	99	85	108	90		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1553	681	511	378	296	246	196	181	163	70	69	65	66	59	57	73	56		
		Anteil in %	81,01	50,63	57,61	64,51	65,78	73,65	75,68	81,53	78,37	39,77	46,94	58,04	67,35	59,60	67,06	67,59	62,22		
		CI Anteil in %	[79,26; 82,77]	[47,96; 53,30]	[54,36; 60,86]	[60,63; 68,38]	[61,39; 70,17]	[68,92; 78,38]	[70,44; 80,91]	[76,42; 86,65]	[72,76; 83,97]	[32,52; 47,02]	[38,84; 55,03]	[48,85; 67,22]	[58,01; 76,68]	[49,88; 69,31]	[57,01; 77,11]	[58,72; 76,46]	[52,15; 72,30]		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	328	255	177	82	53	30	20	16	16	27	29	12	13	12	6	10	14		
		Anteil in %	17,11	18,96	19,95	13,99	11,78	8,98	7,72	7,21	7,69	15,34	19,73	10,71	13,27	12,12	7,06	9,26	15,56		
		CI Anteil in %	[15,42; 18,80]	[16,86; 21,05]	[17,32; 22,59]	[11,18; 16,80]	[8,80; 14,76]	[5,91; 12,05]	[4,46; 10,98]	[3,80; 10,62]	[4,06; 11,32]	[10,00; 20,68]	[13,27; 26,18]	[4,96; 16,47]	[6,51; 20,02]	[5,66; 18,58]	[1,58; 12,54]	[3,77; 14,75]	[8,03; 23,09]		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	36	409	199	126	101	58	43	25	29	79	49	35	19	28	22	25	20		
		Anteil in %	1,88	30,41	22,44	21,50	22,44	17,37	16,60	11,26	13,94	44,89	33,33	31,25	19,39	28,28	25,88	23,15	22,22		
		CI Anteil in %	[1,27; 2,49]	[27,95; 32,87]	[19,69; 25,18]	[18,17; 24,83]	[18,59; 26,30]	[13,30; 21,43]	[12,06; 21,14]	[7,09; 15,43]	[9,22; 18,66]	[37,52; 52,26]	[25,69; 40,98]	[22,63; 39,87]	[11,52; 27,26]	[19,37; 37,20]	[16,52; 35,25]	[15,16; 31,14]	[13,58; 30,86]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	4488	2518	1533	1123	746	592	499	430	613	402	347	316	303	310	270	277			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2337	1195	763	593	436	358	290	256	238	163	149	153	146	155	129	116			
		Anteil in %	52,07	47,46	49,77	52,80	58,45	60,47	58,12	59,53	38,83	40,55	42,94	48,42	48,18	50,00	47,78	41,88			
		CI Anteil in %	[50,61; 53,53]	[45,51; 49,41]	[47,27; 52,28]	[49,88; 55,73]	[54,91; 61,98]	[56,53; 64,41]	[53,78; 62,45]	[54,89; 64,18]	[34,96; 42,69]	[35,74; 45,35]	[37,72; 48,16]	[42,90; 53,94]	[42,55; 53,82]	[44,42; 55,58]	[41,81; 53,75]	[36,06; 47,70]			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1053	615	337	210	119	115	96	85	108	89	78	65	54	49	47	61			
		Anteil in %	23,46	24,42	21,98	18,70	15,95	19,43	19,24	19,77	17,62	22,14	22,48	20,57	17,82	15,81	17,41	22,02			
		CI Anteil in %	[22,22; 24,70]	[22,75; 26,10]	[19,91; 24,06]	[16,42; 20,98]	[13,32; 18,58]	[16,24; 22,62]	[15,78; 22,70]	[16,00; 23,54]	[14,60; 20,64]	[18,08; 26,20]	[18,08; 26,88]	[16,11; 25,03]	[13,51; 22,14]	[11,74; 19,87]	[12,88; 21,94]	[17,13; 26,91]			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1098	708	433	320	191	119	113	89	267	150	120	98	103	106	94	100			
		Anteil in %	24,47	28,12	28,25	28,50	25,60	20,10	22,65	20,70	43,56	37,31	34,58	31,01	33,99	34,19	34,81	36,10			
		CI Anteil in %	[23,21; 25,72]	[26,36; 29,87]	[25,99; 30,50]	[25,85; 31,14]	[22,47; 28,74]	[16,87; 23,33]	[18,97; 26,32]	[16,86; 24,53]	[39,63; 47,48]	[32,58; 42,05]	[29,57; 39,59]	[25,90; 36,12]	[28,65; 39,34]	[28,90; 39,48]	[29,12; 40,51]	[30,43; 41,77]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2004-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	5363	2954	1717	1168	848	749	627	952	738	630	616	538	492	466	388					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2348	1291	735	541	392	359	310	319	260	235	237	204	175	162	128					
		Anteil in %	43,78	43,70	42,81	46,32	46,23	47,93	49,44	50,53	51,51	53,36	51,08	50,00	49,00	48,00	47,00	46,00				
		CI Anteil in %	[42,45; 45,11]	[41,91; 45,49]	[40,47; 45,15]	[43,46; 49,18]	[42,87; 49,58]	[44,35; 51,51]	[45,53; 53,36]	[30,51; 36,51]	[31,78; 38,68]	[33,52; 41,08]	[34,63; 42,32]	[33,81; 42,02]	[31,33; 39,80]	[30,44; 39,09]	[28,31; 37,67]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1600	739	408	277	197	145	114	198	162	136	149	134	111	108	98					
		Anteil in %	29,83	25,02	23,76	23,72	23,23	19,36	18,18	20,80	21,95	21,59	24,19	24,91	22,56	23,18	25,26					
		CI Anteil in %	[28,61; 31,06]	[23,45; 26,58]	[21,75; 25,78]	[21,28; 26,16]	[20,39; 26,08]	[16,53; 22,19]	[15,16; 21,20]	[18,22; 23,38]	[18,96; 24,94]	[18,37; 24,80]	[20,80; 27,57]	[21,25; 28,56]	[18,86; 26,26]	[19,34; 27,01]	[20,93; 29,59]					
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1415	924	574	350	259	245	203	435	316	259	200	206	196	162	128					
		Anteil in %	26,38	31,28	33,43	29,97	30,54	32,71	32,38	45,69	42,82	41,11	37,34	37,17	41,87	42,06	41,75					
		CI Anteil in %	[25,20; 27,56]	[29,61; 32,95]	[31,20; 35,66]	[27,34; 32,59]	[27,44; 33,64]	[29,35; 36,07]	[28,71; 36,04]	[42,53; 48,86]	[39,25; 46,39]	[37,27; 44,96]	[33,51; 41,16]	[33,09; 41,26]	[37,51; 46,23]	[37,57; 46,55]	[36,84; 46,67]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>					
2005-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	3866	1989	1281	898	768	645	1003	737	636	591	545	551	501	454						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1914	935	661	469	408	361	410	283	269	263	220	228	200	157						
		Anteil in %	49,51	47,01	51,60	52,23	53,13	55,97	40,88	38,40	42,30	44,50	40,37	41,38	39,92	34,58						
		CI Anteil in %	[47,93; 51,08]	[44,81; 49,20]	[48,86; 54,34]	[48,96; 55,50]	[49,59; 56,66]	[52,13; 59,80]	[37,83; 43,92]	[34,89; 41,91]	[38,45; 46,14]	[40,49; 48,51]	[36,24; 44,49]	[37,26; 45,50]	[35,63; 44,21]	[30,20; 38,96]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1035	519	326	189	169	117	186	169	151	132	118	122	119	121						
		Anteil in %	26,77	26,09	25,45	21,05	22,01	18,14	18,54	22,93	23,74	22,34	21,65	22,14	23,75	26,65						
		CI Anteil in %	[25,38; 28,17]	[24,16; 28,02]	[23,06; 27,84]	[18,38; 23,71]	[19,07; 24,94]	[15,16; 21,12]	[16,14; 20,95]	[19,89; 25,97]	[20,43; 27,05]	[18,97; 25,70]	[18,19; 25,11]	[18,67; 25,61]	[20,02; 27,48]	[22,58; 30,72]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	917	535	294	240	191	167	407	285	216	196	207	201	182	176						
		Anteil in %	23,72	26,90	22,95	26,73	24,87	25,89	40,58	38,67	33,96	33,16	37,98	36,48	36,33	38,77						
		CI Anteil in %	[22,38; 25,06]	[24,95; 28,85]	[20,65; 25,25]	[23,83; 29,62]	[21,81; 27,93]	[22,51; 29,27]	[37,54; 43,62]	[35,15; 42,19]	[30,28; 37,65]	[29,37; 36,96]	[33,90; 42,06]	[32,46; 40,50]	[32,11; 40,54]	[34,28; 43,25]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>						
2005-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	4027	2113	1413	1180	950	1306	1037	856	784	720	699	633	587							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1983	1031	681	556	472	496	385	370	351	301	281	244	223							
		Anteil in %	49,24	48,79	48,20	47,12	49,68	37,98	37,13	43,22	44,77	41,81	40,20	38,55	37,99							
		CI Anteil in %	[47,70; 50,79]	[46,66; 50,93]	[45,59; 50,80]	[44,27; 49,97]	[46,50; 52,87]	[35,35; 40,61]	[34,18; 40,07]	[39,90; 46,54]	[41,29; 48,25]	[38,20; 45,41]	[36,56; 43,84]	[34,75; 42,34]	[34,06; 41,92]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	951	472	322	264	195	296	315	253	201	188	192	168	173							
		Anteil in %	23,62	22,34	22,79	22,37	20,53	22,66	30,38	29,56	25,64	26,11	27,47	26,54	29,47							
		CI Anteil in %	[22,30; 24,93]	[20,56; 24,11]	[20,60; 24,98]	[19,99; 24,75]	[17,96; 23,10]	[20,39; 24,94]	[27,58; 33,18]	[26,50; 32,61]	[22,58; 28,70]	[22,90; 29,32]	[24,16; 30,78]	[23,10; 29,98]	[25,78; 33,16]							
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1093	610	410	360	283	514	337	233	232	231	226	221	191							
		Anteil in %	27,14	28,87	29,02	30,51	29,79	39,36	32,50	27,22	29,59	32,08	32,33	34,91	32,54							
		CI Anteil in %	[25,77; 28,52]	[26,94; 30,80]	[26,65; 31,38]	[27,88; 33,14]	[26,88; 32,70]	[36,71; 42,01]	[29,65; 35,35]	[24,24; 30,20]	[26,39; 32,79]	[28,67; 35,50]	[28,86; 35,80]	[31,20; 38,63]	[28,74; 36,33]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>							
2006-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	3373	1639	1307	1064	1470	1110	927	828	803	766	653	627								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1870	828	666	551	538	407	359	344	309	316	251	239								
		Anteil in %	55,44	50,52	50,96	51,79	36,60	36,67	38,73	41,55	38,48	41,25	38,44	38,12								
		CI Anteil in %	[53,76; 57,12]	[48,10; 52,94]	[48,25; 53,67]	[48,78; 54,79]	[34,14; 39,06]	[33,83; 39,50]	[35,59; 41,86]	[38,19; 44,90]	[35,11; 41,85]	[37,76; 44,74]	[34,70; 42,17]	[34,31; 41,92]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	732	337	275	221	331	341	300	257	240	218	215	198								
		Anteil in %	21,70	20,56	21,04	20,77	22,52	30,72	32,36	31,04	29,89	28,46	32,92	31,58								
		CI Anteil in %	[20,31; 23,09]	[18,60; 22,52]	[18,83; 23,25]	[18,33; 23,21]	[20,38; 24,65]	[28,01; 33,44]	[29,35; 35,38]	[27,89; 34,19]	[26,72; 33,06]	[25,26; 31,66]	[29,32; 36,53]	[27,94; 35,22]								
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	771	474	366	292	601	362	268	227	254	232	187	190								
		Anteil in %	22,86	28,92	28,00	27,44	40,88	32,61	28,91	27,42	31,63	30,29	28,64	30,30								
		CI Anteil in %	[21,44; 24,28]	[26,72; 31,12]	[25,57; 30,44]	[24,76; 30,13]	[38,37; 43,40]	[29,85; 35,37]	[25,99; 31,83]	[24,38; 30,46]	[28,41; 34,85]	[27,03; 33,54]	[25,17; 32,11]	[26,70; 33,90]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>								

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2924	1558	1211	1538	1257	981	856	824	762	698	666								
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1591	767	561	504	420	338	299	281	244	234	227								
		Anteil in %	54,41	49,23	46,33	32,77	33,41	34,45	34,93	34,10	32,02	33,52	34,08								
		CI Anteil in %	[52,61; 56,22]	[46,75; 51,71]	[43,52; 49,14]	[30,42; 35,12]	[30,80; 36,02]	[31,48; 37,43]	[31,73; 38,13]	[30,86; 37,34]	[28,71; 35,34]	[30,02; 37,03]	[30,48; 37,69]								
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	585	384	291	370	393	343	281	261	237	219	203								
		Anteil in %	20,01	24,65	24,03	24,06	31,26	34,96	32,83	31,67	31,10	31,38	30,48								
		CI Anteil in %	[18,56; 21,46]	[22,51; 26,79]	[21,62; 26,44]	[21,92; 26,19]	[28,70; 33,83]	[31,98; 37,95]	[29,68; 35,97]	[28,50; 34,85]	[27,81; 34,39]	[27,93; 34,82]	[26,98; 33,98]								
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	748	407	664	664	444	300	276	282	281	245	236								
		Anteil in %	25,58	26,12	29,64	43,17	35,32	30,58	32,24	34,22	36,88	35,10	35,44								
		CI Anteil in %	[24,00; 27,16]	[23,94; 28,31]	[27,07; 32,22]	[40,70; 45,65]	[32,68; 37,97]	[27,70; 33,47]	[29,11; 35,38]	[30,98; 37,46]	[33,45; 40,30]	[31,56; 38,64]	[31,80; 39,07]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>								
2007-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	3295	1836	1980	1456	1245	1074	1007	963	840	775									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1762	897	649	443	448	374	345	350	292	245									
		Anteil in %	53,47	48,86	32,78	30,43	35,98	34,82	34,26	36,34	34,76	31,61									
		CI Anteil in %	[51,77; 55,18]	[46,57; 51,14]	[30,71; 34,85]	[28,06; 32,79]	[33,32; 38,65]	[31,97; 37,67]	[31,33; 37,19]	[33,31; 39,38]	[31,54; 37,98]	[28,34; 34,89]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	720	446	495	422	376	296	292	259	263	235									
		Anteil in %	21,85	24,29	25,00	28,98	30,20	27,56	29,00	26,90	31,31	30,32									
		CI Anteil in %	[20,44; 23,26]	[22,33; 26,25]	[23,09; 26,91]	[26,65; 31,31]	[27,65; 32,75]	[24,89; 30,23]	[26,19; 31,80]	[24,09; 29,70]	[28,17; 34,45]	[27,08; 33,56]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	813	493	836	591	421	404	370	354	285	295									
		Anteil in %	24,67	26,85	42,22	40,59	33,82	37,62	36,74	36,76	33,93	38,06									
		CI Anteil in %	[23,20; 26,15]	[24,82; 28,88]	[40,05; 44,40]	[38,07; 43,11]	[31,19; 36,44]	[34,72; 40,51]	[33,76; 39,72]	[33,71; 39,81]	[30,72; 37,13]	[34,64; 41,49]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>									
2007-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2918	2044	1534	1189	1084	1029	946	844	765										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1554	680	523	470	429	401	354	309	248										
		Anteil in %	53,26	33,27	34,09	39,53	39,58	38,97	37,42	36,61	32,42										
		CI Anteil in %	[51,45; 55,07]	[31,22; 35,31]	[31,72; 36,47]	[36,75; 42,31]	[36,66; 42,49]	[35,99; 41,95]	[34,34; 40,51]	[33,36; 39,86]	[29,10; 35,74]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	639	533	428	308	285	279	240	235	244										
		Anteil in %	21,90	26,08	27,90	25,90	26,29	27,11	25,37	27,84	31,90										
		CI Anteil in %	[20,40; 23,40]	[24,17; 27,98]	[25,66; 30,15]	[23,41; 28,40]	[23,67; 28,91]	[24,40; 29,83]	[22,60; 28,14]	[24,82; 30,87]	[28,59; 35,20]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	725	831	583	411	370	349	352	300	273										
		Anteil in %	24,85	40,66	38,01	34,57	34,13	33,92	37,21	35,55	35,69										
		CI Anteil in %	[23,28; 26,41]	[38,53; 42,79]	[35,58; 40,44]	[31,86; 37,27]	[31,31; 36,96]	[31,02; 36,81]	[34,13; 40,29]	[32,31; 38,78]	[32,29; 39,08]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>										
2008-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2984	1622	1273	1106	1009	976	867	789											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1319	569	472	426	375	383	327	301											
		Anteil in %	44,20	35,08	37,08	38,52	37,17	39,24	37,72	38,15											
		CI Anteil in %	[42,42; 45,98]	[32,76; 37,40]	[34,42; 39,73]	[35,65; 41,39]	[34,18; 40,15]	[36,18; 42,31]	[34,49; 40,94]	[34,76; 41,54]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	636	457	392	314	276	265	262	237											
		Anteil in %	21,31	28,18	30,79	28,39	27,35	27,15	30,22	30,04											
		CI Anteil in %	[19,84; 22,78]	[25,99; 30,37]	[28,26; 33,33]	[25,73; 31,05]	[24,60; 30,11]	[24,36; 29,94]	[27,16; 33,28]	[26,84; 33,24]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1029	596	409	366	358	328	278	251											
		Anteil in %	34,48	36,74	32,13	33,09	35,48	33,61	32,06	31,81											
		CI Anteil in %	[32,78; 36,19]	[34,40; 39,09]	[29,56; 34,70]	[30,32; 35,87]	[32,53; 38,43]	[30,64; 36,57]	[28,96; 35,17]	[28,56; 35,06]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>											

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2008-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1855	1044	877	811	716	674	622													
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	759	420	375	320	289	264	232													
		Anteil in %	40,92	40,23	42,76	39,46	40,36	39,17	37,30													
		CI Anteil in %	[38,68; 43,15]	[37,25; 43,21]	[39,48; 46,04]	[36,09; 42,82]	[36,77; 43,96]	[35,48; 42,86]	[33,50; 41,10]													
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	488	296	220	223	198	180	177													
		Anteil in %	26,31	28,35	25,09	27,50	27,65	26,71	28,46													
		CI Anteil in %	[24,30; 28,31]	[25,62; 31,09]	[22,21; 27,96]	[24,42; 30,57]	[24,38; 30,93]	[23,36; 30,05]	[24,91; 32,01]													
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	608	328	282	268	229	230	213													
		Anteil in %	32,78	31,42	32,16	33,05	31,98	34,12	34,24													
		CI Anteil in %	[30,64; 34,91]	[28,60; 34,23]	[29,06; 35,25]	[29,81; 36,28]	[28,56; 35,40]	[30,54; 37,71]	[30,51; 37,98]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>													
2009-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2180	1293	1089	965	823	783														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1064	563	438	399	355	299														
		Anteil in %	48,81	43,54	40,22	41,35	43,13	38,19														
		CI Anteil in %	[46,71; 50,91]	[40,84; 46,25]	[37,31; 43,13]	[38,24; 44,46]	[39,75; 46,52]	[34,78; 41,59]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	594	342	294	253	210	223														
		Anteil in %	27,25	26,45	27,00	26,22	25,52	28,48														
		CI Anteil in %	[25,38; 29,12]	[24,05; 28,86]	[24,36; 29,64]	[23,44; 28,99]	[22,54; 28,50]	[25,32; 31,64]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	522	388	357	313	258	261														
		Anteil in %	23,94	30,01	32,78	32,44	31,35	33,33														
		CI Anteil in %	[22,15; 25,74]	[27,51; 32,51]	[29,99; 35,57]	[29,48; 35,39]	[28,18; 34,52]	[30,03; 36,64]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>														
2009-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1916	1202	998	866	796															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	987	481	381	327	301															
		Anteil in %	51,51	40,02	38,18	37,76	37,81															
		CI Anteil in %	[49,28; 53,75]	[37,25; 42,79]	[35,16; 41,19]	[34,53; 40,99]	[34,44; 41,18]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	426	298	276	229	224															
		Anteil in %	22,23	24,79	27,66	26,44	28,14															
		CI Anteil in %	[20,37; 24,10]	[22,35; 27,23]	[24,88; 30,43]	[23,50; 29,38]	[25,01; 31,27]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	503	423	341	310	271															
		Anteil in %	26,25	35,19	34,17	35,80	34,05															
		CI Anteil in %	[24,28; 28,22]	[32,49; 37,89]	[31,22; 37,11]	[32,60; 38,99]	[30,75; 37,34]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>															
2010-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2184	1274	1071	951																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1188	564	451	395																
		Anteil in %	54,40	44,27	42,11	41,54																
		CI Anteil in %	[52,31; 56,48]	[41,54; 47,00]	[39,15; 45,07]	[38,40; 44,67]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	545	366	303	264																
		Anteil in %	24,95	28,73	28,29	27,76																
		CI Anteil in %	[23,14; 26,77]	[26,24; 31,21]	[25,59; 30,99]	[24,91; 30,61]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	451	344	317	292																
		Anteil in %	20,65	27,00	29,60	30,70																
		CI Anteil in %	[18,95; 22,35]	[24,56; 29,44]	[26,86; 32,33]	[27,77; 33,64]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>																



EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1935	1111	967																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	983	450	383																
		Anteil in %		50,80	40,50	39,61															
		CI Anteil in %		[48,57; 53,03]	[37,62; 43,39]	[36,52; 42,69]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	522	322	274																
		Anteil in %		26,98	28,98	28,34															
		CI Anteil in %		[25,00; 28,95]	[26,31; 31,65]	[25,49; 31,18]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	430	339	310																
		Anteil in %		22,22	30,51	32,06															
		CI Anteil in %		[20,37; 24,08]	[27,80; 33,22]	[29,11; 35,00]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>																
2011-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2152	1248																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1042	462																	
		Anteil in %		48,42	37,02																
		CI Anteil in %		[46,31; 50,53]	[34,34; 39,70]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	515	340																	
		Anteil in %		23,93	27,24																
		CI Anteil in %		[22,13; 25,73]	[24,77; 29,71]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	595	446																	
		Anteil in %		27,65	35,74																
		CI Anteil in %		[25,76; 29,54]	[33,08; 38,40]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																	
2011-2	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1798																		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	896																		
		Anteil in %		49,83																	
		CI Anteil in %		[47,52; 52,14]																	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	437																		
		Anteil in %		24,30																	
		CI Anteil in %		[22,32; 26,29]																	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	465																		
		Anteil in %		25,86																	
		CI Anteil in %		[23,84; 27,89]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																		
2012-1	<b>Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl																			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																			

In der Tabelle 3.4.2 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlener Hypertonie-Schulung** teilgenommen haben (oder aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten) oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten* - also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zu beachten ist bei dieser Auswertung, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Schulungsdaten aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeilen „Schulung wahrgenommen“, „Schulung aktuell nicht möglich“ und „Schulung nicht wahrgenommen“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit über die Berichtshalbjahre gegeben.<sup>8</sup>

Zunächst wird unter „Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar)“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Hypertonieschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Hypertonieschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

---

<sup>8</sup> Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung, d.h. Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1, ist auszuweisen, ob eine Schulung durchgeführt wurde oder aus plausiblen Grund aktuell nicht möglich war oder aus plausiblen Grund nicht wahrgenommen wurde („Compliance“) oder ob sie ohne Begründung abgelehnt wurde. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren veranlasste und nicht erforderliche Schulungen. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung, d.h. ab dem Berichtshalbjahr 2004-2, ist auszuweisen, ob eine empfohlene Schulung wahrgenommen wurde oder die Wahrnehmung aktuell nicht möglich war („Compliance“) oder ob keine Teilnahme an der Schulung erfolgte. Eine weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeit war, dass bei der letzten Dokumentation keine Schulung empfohlen wurde.

In der Kohorte 2003-1 lagen zu Beginn des zweiten Beitrittsjahres für 1 Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung auswertbare Angaben zur Wahrnehmung einer Schulung vor. 0 dieser auswertbaren Patienten nahmen die empfohlene Schulung wahr, dagegen hatten 100,00 Prozent keine Möglichkeit zur Teilnahme. 0,00 Prozent nahmen die Schulung ohne plausiblen Grund nicht wahr.

**Tabelle 3.4.2 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen**

\* Auswertbar sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1																		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	0																		
		Anteil in %	0,00																		
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]																		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1																		
		Anteil in %	100,00																		
		CI Anteil in %	[100,00; 100,00]																		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	0																		
		Anteil in %	0,00																		
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2003-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	717	1281	846	518	400	296	232	192	181	132	100	78	54	59	49	48	56		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	152	215	235	229	220	195	160	143	134	22	23	23	19	19	15	17	18		
		Anteil in %	21,20	16,78	27,78	44,21	55,00	65,88	68,97	74,48	74,03	16,67	23,00	29,49	35,19	32,20	30,61	35,42	32,14		
		CI Anteil in %	[18,21; 24,19]	[14,74; 18,83]	[24,76; 30,80]	[39,93; 48,49]	[50,12; 59,88]	[60,47; 71,29]	[63,00; 74,93]	[68,30; 80,66]	[67,63; 80,44]	[10,28; 23,05]	[14,71; 31,29]	[19,30; 39,67]	[22,33; 48,04]	[20,18; 44,23]	[17,57; 43,65]	[21,74; 49,09]	[19,80; 44,49]		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	555	292	203	105	31	19	17	16	7	21	25	9	6	6	4	2	10		
		Anteil in %	77,41	22,79	24,00	20,27	7,75	6,42	7,33	8,33	3,87	15,91	25,00	11,54	11,11	10,17	8,16	4,17	17,86		
		CI Anteil in %	[74,34; 80,47]	[20,50; 25,09]	[21,12; 26,87]	[16,80; 23,74]	[5,13; 10,37]	[3,62; 9,22]	[3,97; 10,69]	[4,41; 12,25]	[1,05; 6,68]	[9,65; 22,17]	[16,47; 33,53]	[4,40; 18,67]	[2,65; 19,57]	[2,39; 17,95]	[0,42; 15,91]	[0,00; 9,88]	[7,74; 27,98]		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	10	774	408	184	149	82	55	33	40	89	52	46	29	34	30	29	28		
		Anteil in %	1,39	60,42	48,23	35,52	37,25	27,70	23,71	17,19	22,10	67,42	52,00	58,97	53,70	57,63	61,22	60,42	50,00		
		CI Anteil in %	[0,54; 2,25]	[57,74; 63,10]	[44,86; 51,60]	[31,40; 39,65]	[32,51; 41,99]	[22,60; 32,81]	[18,22; 29,19]	[11,84; 22,54]	[16,04; 28,16]	[59,40; 75,45]	[42,16; 61,84]	[47,99; 69,96]	[40,28; 67,13]	[44,91; 70,34]	[47,44; 75,01]	[46,44; 74,40]	[36,79; 63,21]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	3933	2412	1434	994	627	537	403	355	481	310	248	223	214	211	190	201			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	435	433	348	285	201	164	136	128	82	60	61	64	61	53	53	53			
		Anteil in %	11,06	17,95	24,27	28,67	32,06	30,54	33,75	36,06	17,05	19,35	24,60	28,70	28,50	25,12	27,89	26,37			
		CI Anteil in %	[10,08; 12,04]	[16,42; 19,48]	[22,05; 26,49]	[25,86; 31,48]	[28,40; 35,71]	[26,64; 34,44]	[29,12; 38,37]	[31,05; 41,06]	[13,68; 20,41]	[14,95; 23,76]	[19,23; 29,97]	[22,75; 34,65]	[22,44; 34,57]	[19,25; 30,98]	[21,50; 34,29]	[20,26; 32,47]			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1364	682	358	182	123	149	108	80	91	67	51	40	37	34	36	44			
		Anteil in %	34,68	28,28	24,97	18,31	19,62	27,75	26,80	22,54	18,92	21,61	20,56	17,94	17,29	16,11	18,95	21,89			
		CI Anteil in %	[33,19; 36,17]	[26,48; 30,07]	[22,72; 27,21]	[15,90; 20,72]	[16,51; 22,73]	[23,96; 31,54]	[22,47; 31,13]	[18,18; 26,89]	[15,42; 22,42]	[17,02; 26,20]	[15,52; 25,61]	[12,89; 22,98]	[12,21; 22,37]	[11,14; 21,09]	[13,36; 24,53]	[16,16; 27,62]			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	2134	1297	728	527	303	224	159	147	308	183	136	119	116	124	101	104			
		Anteil in %	54,26	53,77	50,77	53,02	48,33	41,71	39,45	41,41	64,03	59,03	54,84	53,36	54,21	58,77	53,16	51,74			
		CI Anteil in %	[52,70; 55,82]	[51,78; 55,76]	[48,18; 53,36]	[49,91; 56,12]	[44,41; 52,24]	[37,54; 45,89]	[34,68; 44,23]	[36,28; 46,54]	[59,74; 68,33]	[53,55; 64,52]	[48,63; 61,05]	[46,80; 59,93]	[47,51; 60,90]	[52,11; 65,43]	[46,04; 60,27]	[44,82; 58,67]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2004-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	4703	2578	1494	934	710	575	465	777	634	534	484	433	389	378	340			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	528	404	238	165	124	107	74	89	92	99	71	65	41	51	41			
		Anteil in %	11,23	15,67	15,93	17,67	17,46	18,61	15,91	11,45	14,51	18,54	14,67	15,01	10,54	13,49	12,06			
		CI Anteil in %	[10,32; 12,13]	[14,27; 17,07]	[14,07; 17,79]	[15,22; 20,11]	[14,67; 20,26]	[15,42; 21,79]	[12,59; 19,24]	[9,21; 13,70]	[11,77; 17,25]	[15,24; 21,84]	[11,51; 18,82]	[11,64; 18,38]	[7,48; 13,60]	[10,04; 16,94]	[8,59; 15,53]			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1436	708	403	259	179	116	101	161	143	133	134	122	103	100	98			
		Anteil in %	30,53	27,46	26,97	27,73	25,21	20,17	21,72	20,72	22,56	24,91	27,69	28,18	26,48	26,46	28,82			
		CI Anteil in %	[29,22; 31,85]	[25,74; 29,19]	[24,72; 29,23]	[24,86; 30,60]	[22,01; 28,41]	[16,89; 23,46]	[17,97; 25,47]	[17,87; 23,57]	[19,30; 25,81]	[21,23; 28,58]	[23,70; 31,68]	[23,93; 32,42]	[22,09; 30,87]	[22,00; 30,91]	[24,00; 33,65]			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	2739	1466	853	510	407	352	290	527	399	302	279	246	245	227	201			
		Anteil in %	58,24	56,87	57,10	54,60	57,32	61,22	62,37	67,82	62,93	56,55	57,64	56,81	62,98	60,05	59,12			
		CI Anteil in %	[56,83; 59,65]	[54,95; 58,78]	[54,58; 59,61]	[51,41; 57,80]	[53,68; 60,96]	[57,23; 65,20]	[57,96; 66,77]	[64,54; 71,11]	[59,17; 66,70]	[52,35; 60,76]	[53,24; 62,05]	[52,14; 61,48]	[58,18; 67,79]	[55,11; 65,00]	[53,88; 64,35]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>			
2005-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	3210	1672	1006	714	564	493	796	560	485	443	416	412	382	364				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	442	308	226	168	113	86	110	89	96	87	67	75	67	57				
		Anteil in %	13,77	18,42	22,47	23,53	20,04	17,44	13,82	15,89	19,79	19,64	16,11	18,20	17,54	15,66				
		CI Anteil in %	[12,58; 14,96]	[16,56; 20,28]	[19,88; 25,05]	[20,42; 26,64]	[16,73; 23,34]	[14,09; 20,80]	[11,42; 16,22]	[12,86; 18,92]	[16,24; 23,34]	[15,94; 23,34]	[12,57; 19,64]	[14,47; 21,93]	[13,72; 21,36]	[11,92; 19,40]				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	819	385	215	139	110	95	174	136	119	107	103	99	93	99				
		Anteil in %	25,51	23,03	21,37	19,47	19,50	19,27	21,86	24,29	24,54	24,15	24,76	24,03	24,35	27,20				
		CI Anteil in %	[24,01; 27,02]	[21,01; 25,04]	[18,84; 23,91]	[16,56; 22,37]	[16,23; 22,78]	[15,78; 22,75]	[18,99; 24,73]	[20,73; 27,84]	[20,70; 28,37]	[20,16; 28,14]	[20,61; 28,91]	[19,90; 28,16]	[20,04; 28,65]	[22,62; 31,78]				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1949	979	565	407	341	312	512	335	270	249	246	238	222	208				
		Anteil in %	60,72	58,55	56,16	57,00	60,46	63,29	64,32	59,82	55,67	56,21	59,13	57,77	58,12	57,14				
		CI Anteil in %	[59,03; 62,41]	[56,19; 60,91]	[53,10; 59,23]	[53,37; 60,64]	[56,42; 64,50]	[59,03; 67,55]	[60,99; 67,65]	[55,76; 63,89]	[51,24; 60,10]	[51,58; 60,83]	[54,40; 63,86]	[52,99; 62,54]	[53,16; 63,07]	[52,05; 62,23]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>				
2005-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	3208	1638	1130	921	728	1080	823	644	567	526	532	476	439					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	602	331	232	203	161	156	118	151	129	115	101	83	82					
		Anteil in %	18,77	20,21	20,53	22,04	22,12	14,44	14,34	23,45	22,75	21,86	18,98	17,44	18,68					
		CI Anteil in %	[17,41; 20,12]	[18,26; 22,15]	[18,17; 22,89]	[19,36; 24,72]	[19,10; 25,13]	[12,35; 16,54]	[11,94; 16,73]	[20,17; 26,72]	[19,30; 26,21]	[18,33; 25,40]	[15,65; 22,32]	[14,02; 20,85]	[15,03; 22,33]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	719	387	280	208	166	311	296	204	164	142	156	146	142					
		Anteil in %	22,41	23,63	24,78	22,58	22,80	28,80	35,97	31,68	28,92	27,00	29,32	30,67	32,35					
		CI Anteil in %	[20,97; 23,86]	[21,57; 25,68]	[22,26; 27,30]	[19,88; 25,29]	[19,75; 25,85]	[26,09; 31,50]	[32,69; 39,25]	[28,08; 35,27]	[25,19; 32,66]	[23,20; 30,79]	[25,45; 33,20]	[26,53; 34,82]	[27,97; 36,73]					
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1887	920	618	510	401	613	409	289	274	269	275	247	215					
		Anteil in %	58,82	56,17	54,69	55,37	55,08	56,76	49,70	44,88	48,32	51,14	51,69	51,89	48,97					
		CI Anteil in %	[57,12; 60,53]	[53,76; 58,57]	[51,79; 57,59]	[52,16; 58,59]	[51,47; 58,70]	[53,80; 59,72]	[46,28; 53,11]	[41,03; 48,72]	[44,21; 52,44]	[46,86; 55,42]	[47,44; 55,94]	[47,40; 56,38]	[44,29; 53,66]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>					
2006-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2557	1292	1004	828	1263	893	730	653	620	587	484	474						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	500	269	226	210	200	167	167	154	135	117	85	88						
		Anteil in %	19,55	20,82	22,51	25,36	15,84	18,70	22,88	23,58	21,77	19,93	17,56	18,57						
		CI Anteil in %	[18,02; 21,09]	[18,61; 23,04]	[19,93; 25,09]	[22,40; 28,33]	[13,82; 17,85]	[16,14; 21,26]	[19,83; 25,93]	[20,32; 26,84]	[18,52; 25,03]	[16,70; 23,17]	[14,17; 20,96]	[15,06; 22,07]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	594	280	225	165	344	314	255	221	196	198	188	166						
		Anteil in %	23,23	21,67	22,41	19,93	27,24	35,16	34,93	33,84	31,61	33,73	38,84	35,02						
		CI Anteil in %	[21,59; 24,87]	[19,42; 23,92]	[19,83; 24,99]	[17,21; 22,65]	[24,78; 29,69]	[32,03; 38,30]	[31,47; 38,39]	[30,21; 37,48]	[27,95; 35,28]	[29,90; 37,56]	[34,50; 43,19]	[30,72; 39,32]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1463	743	553	453	719	412	308	278	289	272	211	220						
		Anteil in %	57,22	57,51	55,08	54,71	56,93	46,14	42,19	42,57	46,61	46,34	43,60	46,41						
		CI Anteil in %	[55,30; 59,13]	[54,81; 60,20]	[52,00; 58,16]	[51,32; 58,10]	[54,20; 59,66]	[42,87; 49,41]	[38,61; 45,78]	[38,78; 46,37]	[42,68; 50,54]	[42,30; 50,37]	[39,17; 48,02]	[41,92; 50,91]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>						

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2006-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2151	1202	958	1322	1032	784	681	657	616	552	537									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	442	282	209	182	188	159	137	108	91	98	100									
		Anteil in %	20,55	23,46	21,82	13,77	18,22	20,28	17,46	17,10	13,60	14,77	17,75	18,62								
		CI Anteil in %	[18,84; 22,26]	[21,06; 25,86]	[19,20; 24,43]	[11,91; 15,63]	[15,86; 20,57]	[17,46; 23,10]	[17,10; 23,13]	[13,60; 19,27]	[11,97; 17,58]	[14,56; 20,94]	[15,33; 21,92]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	454	313	231	373	353	297	242	237	206	192	184									
		Anteil in %	21,11	26,04	24,11	28,21	34,21	37,88	35,54	36,07	33,44	34,78	34,26									
		CI Anteil in %	[19,38; 22,83]	[23,56; 28,52]	[21,40; 26,82]	[25,79; 30,64]	[31,31; 37,10]	[34,48; 41,28]	[31,94; 39,13]	[32,40; 39,75]	[29,71; 37,17]	[30,81; 38,76]	[30,25; 38,28]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1255	607	518	767	491	328	302	312	319	262	253									
		Anteil in %	58,34	50,50	54,07	58,02	47,58	41,84	44,35	47,49	51,79	47,46	47,11									
		CI Anteil in %	[56,26; 60,43]	[47,67; 53,33]	[50,91; 57,23]	[55,36; 60,68]	[44,53; 50,63]	[38,38; 45,29]	[40,61; 48,08]	[43,67; 51,31]	[47,84; 55,73]	[43,29; 51,63]	[42,89; 51,34]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>									
2007-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2215	1328	1662	1198	971	844	794	760	667	624										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	374	229	175	149	170	137	131	123	101	93										
		Anteil in %	16,88	17,24	10,53	12,44	17,51	16,23	16,50	16,18	15,14	14,90										
		CI Anteil in %	[15,32; 18,45]	[15,21; 19,28]	[9,05; 12,01]	[10,57; 14,31]	[15,12; 19,90]	[13,74; 18,72]	[13,92; 19,08]	[13,56; 18,80]	[12,42; 17,86]	[12,11; 17,70]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	547	348	466	387	321	260	255	224	232	191										
		Anteil in %	24,70	26,20	28,04	32,30	33,06	30,81	32,12	29,47	34,78	30,61										
		CI Anteil in %	[22,90; 26,49]	[23,84; 28,57]	[25,88; 30,20]	[29,65; 34,95]	[30,10; 36,02]	[27,69; 33,92]	[28,87; 35,37]	[26,23; 32,72]	[31,17; 38,40]	[26,99; 34,23]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1294	751	1021	662	480	447	408	413	334	340										
		Anteil in %	58,42	56,55	61,43	55,26	49,43	52,96	51,39	54,34	50,07	54,49										
		CI Anteil in %	[56,37; 60,47]	[53,88; 59,22]	[59,09; 63,77]	[52,44; 58,08]	[46,29; 52,58]	[49,59; 56,33]	[47,91; 54,86]	[50,80; 57,89]	[46,28; 53,87]	[50,58; 58,40]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>										
2007-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1980	1682	1213	920	832	776	732	655	604											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	337	174	178	138	125	137	111	92	80											
		Anteil in %	17,02	10,34	14,67	15,00	15,02	17,65	15,16	14,05	13,25											
		CI Anteil in %	[15,36; 18,68]	[8,89; 11,80]	[12,68; 16,67]	[12,69; 17,31]	[12,59; 17,45]	[14,97; 20,34]	[12,56; 17,76]	[11,38; 16,71]	[10,54; 15,95]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	444	421	364	278	248	238	216	218	208											
		Anteil in %	22,42	25,03	30,01	30,22	29,81	30,67	29,51	33,28	34,44											
		CI Anteil in %	[20,59; 24,26]	[22,96; 27,10]	[27,43; 32,59]	[27,25; 33,19]	[26,70; 32,92]	[27,42; 33,92]	[26,20; 32,81]	[29,67; 36,89]	[30,64; 38,23]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1199	1087	671	504	459	401	405	345	316											
		Anteil in %	60,56	64,63	55,32	54,78	55,17	51,68	55,33	52,67	52,32											
		CI Anteil in %	[58,40; 62,71]	[62,34; 66,91]	[52,52; 58,12]	[51,56; 58,00]	[51,79; 58,55]	[48,16; 55,19]	[51,72; 58,93]	[48,85; 56,50]	[48,33; 56,30]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>											
2008-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	2181	1234	973	844	782	730	666	611												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	307	180	148	136	118	106	109	104												
		Anteil in %	14,08	14,59	15,21	16,11	15,09	14,52	16,37	17,02												
		CI Anteil in %	[12,62; 15,54]	[12,62; 16,56]	[12,95; 17,47]	[13,63; 18,60]	[12,58; 17,60]	[11,96; 17,08]	[13,55; 19,18]	[14,04; 20,00]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	507	392	338	285	265	245	243	209												
		Anteil in %	23,25	31,77	34,74	33,77	33,89	33,56	36,49	34,21												
		CI Anteil in %	[21,47; 25,02]	[29,17; 34,37]	[31,74; 37,73]	[30,58; 36,96]	[30,57; 37,21]	[30,13; 36,99]	[32,83; 40,15]	[30,44; 37,97]												
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1367	662	487	423	399	379	314	298												
		Anteil in %	62,68	53,65	50,05	50,12	51,02	51,92	47,15	48,77												
		CI Anteil in %	[60,65; 64,71]	[50,86; 56,43]	[46,91; 53,19]	[46,74; 53,49]	[47,52; 54,53]	[48,29; 55,54]	[43,35; 50,94]	[44,81; 52,74]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>												

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2008-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1316	761	662	592	533	516	481													
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	189	130	119	96	80	85	76													
		Anteil in %	14,36	17,08	17,98	16,22	15,01	16,47	15,80													
		CI Anteil in %	[12,47; 16,26]	[14,41; 19,76]	[15,05; 20,90]	[13,24; 19,19]	[11,97; 18,04]	[13,27; 19,68]	[12,54; 19,06]													
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	385	226	183	198	179	166	152													
		Anteil in %	29,26	29,70	27,64	33,45	33,58	32,17	31,60													
		CI Anteil in %	[26,80; 31,71]	[26,45; 32,95]	[24,23; 31,05]	[29,64; 37,25]	[29,57; 37,60]	[28,14; 36,21]	[27,44; 35,76]													
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	742	405	360	298	274	265	253													
		Anteil in %	56,38	53,22	54,38	50,34	51,41	51,36	52,60													
		CI Anteil in %	[53,70; 59,06]	[49,67; 56,77]	[50,58; 58,18]	[46,31; 54,37]	[47,16; 55,65]	[47,04; 55,67]	[48,13; 57,07]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>													
2009-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1340	924	795	699	592	588														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	263	152	126	108	96	89														
		Anteil in %	19,63	16,45	15,85	15,45	16,22	15,14														
		CI Anteil in %	[17,50; 21,75]	[14,06; 18,84]	[13,31; 18,39]	[12,77; 18,13]	[13,24; 19,19]	[12,24; 18,04]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	390	254	221	226	181	181														
		Anteil in %	29,10	27,49	27,80	32,33	30,57	30,78														
		CI Anteil in %	[26,67; 31,54]	[24,61; 30,37]	[24,68; 30,91]	[28,86; 35,80]	[26,86; 34,29]	[27,05; 34,52]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	687	518	448	365	315	318														
		Anteil in %	51,27	56,06	56,35	52,22	53,21	54,08														
		CI Anteil in %	[48,59; 53,95]	[52,86; 59,26]	[52,90; 59,80]	[48,51; 55,92]	[49,19; 57,23]	[50,05; 58,11]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>														
2009-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1182	866	746	635	579															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	238	147	108	88	79															
		Anteil in %	20,14	16,97	14,48	13,86	13,64															
		CI Anteil in %	[17,85; 22,42]	[14,47; 19,48]	[11,95; 17,00]	[11,17; 16,55]	[10,85; 16,44]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	323	240	245	197	190															
		Anteil in %	27,33	27,71	32,84	31,02	32,82															
		CI Anteil in %	[24,78; 29,87]	[24,73; 30,70]	[29,47; 36,21]	[27,42; 34,62]	[28,99; 36,64]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	621	479	393	350	310															
		Anteil in %	52,54	55,31	52,68	55,12	53,54															
		CI Anteil in %	[49,69; 55,39]	[52,00; 58,63]	[49,10; 56,27]	[51,25; 58,99]	[49,47; 57,61]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>															
2010-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl	1277	905	765	684																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	323	163	128	105																
		Anteil in %	25,29	18,01	16,73	15,35																
		CI Anteil in %	[22,91; 27,68]	[15,51; 20,52]	[14,09; 19,38]	[12,65; 18,05]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	421	318	252	227																
		Anteil in %	32,97	35,14	32,94	33,19																
		CI Anteil in %	[30,39; 35,55]	[32,03; 38,25]	[29,61; 36,27]	[29,66; 36,72]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	533	424	385	352																
		Anteil in %	41,74	46,85	50,33	51,46																
		CI Anteil in %	[39,03; 44,44]	[43,60; 50,10]	[46,78; 53,87]	[47,71; 55,21]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>																

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl		1148	797	718															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		212	108	111															
		Anteil in %			18,47	13,55	15,46														
		CI Anteil in %			[16,22; 20,71]	[11,17; 15,93]	[12,81; 18,11]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		391	273	236															
		Anteil in %			34,06	34,25	32,87														
		CI Anteil in %			[31,32; 36,80]	[30,96; 37,55]	[29,43; 36,31]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		545	416	371															
		Anteil in %			47,47	52,20	51,67														
		CI Anteil in %			[44,58; 50,36]	[48,73; 55,67]	[48,01; 55,33]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>																
2011-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl		1284	926																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		212	110																
		Anteil in %			16,51	11,88															
		CI Anteil in %			[14,48; 18,54]	[9,79; 13,96]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		400	284																
		Anteil in %			31,15	30,67															
		CI Anteil in %			[28,62; 33,69]	[27,70; 33,64]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		672	532																
		Anteil in %			52,34	57,45															
		CI Anteil in %			[49,60; 55,07]	[54,27; 60,64]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																	
2011-2	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl		1085																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		176																	
		Anteil in %			16,22																
		CI Anteil in %			[14,03; 18,42]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		360																	
		Anteil in %			33,18																
		CI Anteil in %			[30,38; 35,98]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		549																	
		Anteil in %			50,60																
		CI Anteil in %			[47,62; 53,58]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																		
2012-1	<b>Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)</b>	Anzahl																			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																			

In Tabelle 3.4.3 wird untersucht, bei wie vielen Patienten bzw. welchem Anteil eine **jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung** erfolgte. Die Auswertungen erfolgen also nicht im üblichen Halbjahresbezug. Da die Angaben aus der Erstdokumentation sich über einen unbekanntem Zeitraum erstrecken, können die Angaben des Beitrittsjahres nicht für die jährliche Betrachtungsweise verwendet werden. Der Jahresbezug wird folgendermaßen definiert: Eine jährliche Untersuchung gilt als gegeben, wenn eine Untersuchung im zweiten und/oder dritten Halbjahr dokumentiert ist bzw. im vierten und/oder fünften Halbjahr, etc. Betrachtet werden dabei alle Versicherten, die jeweils in beiden Halbjahren Programmteilnehmer waren.

In Tabelle 3.4.3. wird unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr bzw. im Untersuchungsjahr (noch) Programmteilnehmer waren. Da eine **jährliche** Auswertung vorgenommen werden soll, wird ausgewiesen, wie viele Patienten in der zweiten Hälfte des untersuchten Jahreszeitraumes (zweites/drittes Halbjahr, viertes/fünftes Halbjahr, etc.) noch Programmteilnehmer waren. Patienten, die lediglich in der ersten Jahreshälfte im Programm waren, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird dargestellt, wie viele der „auswertbaren“ Patienten bzw. welcher Anteil im interessierenden Jahreszeitraum (= aktuelles Halbjahrespaar) eine augenärztliche Untersuchung erfolgte.

Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Daten zu augenärztlichen Untersuchungen aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeile „mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit im Zeitverlauf gegeben.

Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung (Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1) ist die Dokumentation „veranlasste Funduskopien“ als neue ophthalmologische Netzhautuntersuchungen auszuweisen. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren der Funduskopie-Status sowie die Einschätzung „Funduskopie nicht erforderlich“. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung (Berichtshalbjahre ab 2004-2) sind in der entsprechenden Tabellenzeile dokumentierte „durchgeführte ophthalmologische Netzhautuntersuchungen“ auszuweisen. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten zur Netzhautuntersuchung waren „nicht durchgeführt“ und „veranlasst“.



In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Untersuchungsjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben; sie waren damit sowohl im ersten als auch im zweiten Halbjahr dieses Untersuchungsjahres Programmteilnehmer. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei - - Prozent von ihnen erfolgte im entsprechenden Jahreszeitraum eine augenärztliche Untersuchung.

Tabelle 3.4.3 Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersuchungs-jahr	Im 2. Untersuchungs-jahr	Im 3. Untersuchungs-jahr	Im 4. Untersuchungs-jahr	Im 5. Untersuchungs-jahr	Im 6. Untersuchungs-jahr	Im 7. Untersuchungs-jahr	Im 8. Untersuchungs-jahr	Im 9. Untersuchungs-jahr
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	4885	3418	2501	2016	1760	1639	1508	1386	1286
	auswertbar	Anzahl		3402	2496	2015	1731	1637	1504	1382	1283
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3212	2003	1610	1387	1341	1191	1085	979
		Anteil in %		94,42	80,25	79,90	80,13	81,92	79,19	78,51	76,31
		CI Anteil in %		[93,64; 95,19]	[78,69; 81,81]	[78,15; 81,65]	[78,25; 82,01]	[80,05; 83,78]	[77,14; 81,24]	[76,34; 80,68]	[73,98; 78,63]
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	12108	8415	6406	5169	4710	4339	3945	3618	3293
	auswertbar	Anzahl		8322	6394	5160	4563	4320	3929	3600	3273
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		6270	4900	3976	3503	3349	2999	2668	2319
		Anteil in %		75,34	76,63	77,05	76,77	77,52	76,33	74,11	70,85
		CI Anteil in %		[74,42; 76,27]	[75,60; 77,67]	[75,91; 78,20]	[75,54; 78,00]	[76,28; 78,77]	[75,00; 77,66]	[72,68; 75,54]	[69,30; 72,41]
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	15069	10575	7998	6933	6230	5585	5058	4632	
	auswertbar	Anzahl		10510	7983	6780	6210	5557	5033	4606	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		7785	5985	4929	4728	4070	3589	3135	
		Anteil in %		74,07	74,97	72,70	76,14	73,24	71,31	68,06	
		CI Anteil in %		[73,23; 74,91]	[74,02; 75,92]	[71,64; 73,76]	[75,07; 77,20]	[72,08; 74,41]	[70,06; 72,56]	[66,72; 69,41]	
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11691	8667	6721	5972	5395	4849	4438	4053	
	auswertbar	Anzahl		8621	6709	5814	5376	4817	4408	4018	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		6289	4779	4070	3809	3380	3011	2656	
		Anteil in %		72,95	71,23	70,00	70,85	70,17	68,31	66,10	
		CI Anteil in %		[72,01; 73,89]	[70,15; 72,32]	[68,83; 71,18]	[69,64; 72,07]	[68,88; 71,46]	[66,93; 69,68]	[64,64; 67,57]	
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	14294	10822	8914	7910	6957	6265	5713		
	auswertbar	Anzahl		10778	8658	7892	6909	6222	5669		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		7738	6089	5568	4828	4312	3764		
		Anteil in %		71,79	70,33	70,55	69,88	69,30	66,40		
		CI Anteil in %		[70,94; 72,64]	[69,37; 71,29]	[69,55; 71,56]	[68,80; 70,96]	[68,16; 70,45]	[65,17; 67,63]		
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13284	9898	8547	7585	6665	6029	5459		
	auswertbar	Anzahl		9834	8271	7537	6601	5966	5395		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		6999	5659	5219	4548	4022	3536		
		Anteil in %		71,17	68,42	69,25	68,90	67,42	65,54		
		CI Anteil in %		[70,28; 72,07]	[67,42; 69,42]	[68,20; 70,29]	[67,78; 70,02]	[66,23; 68,60]	[64,27; 66,81]		
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11768	9391	8176	7088	6346	5770			
	auswertbar	Anzahl		9251	8109	7001	6259	5682			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		6357	5609	4722	4160	3676			
		Anteil in %		68,72	69,17	67,45	66,46	64,70			
		CI Anteil in %		[67,77; 69,66]	[68,16; 70,18]	[66,35; 68,55]	[65,29; 67,63]	[63,45; 65,94]			
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	13105	10764	9300	8054	7269	6533			
	auswertbar	Anzahl		10693	9099	7840	7052	6311			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		7182	6023	5146	4500	3870			
		Anteil in %		67,17	66,19	65,64	63,81	61,32			
		CI Anteil in %		[66,28; 68,06]	[65,22; 67,17]	[64,59; 66,69]	[62,69; 64,93]	[60,12; 62,52]			

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersu-chungs-jahr	Im 2. Untersu-chungs-jahr	Im 3. Untersu-chungs-jahr	Im 4. Untersu-chungs-jahr	Im 5. Untersu-chungs-jahr	Im 6. Untersu-chungs-jahr	Im 7. Untersu-chungs-jahr	Im 8. Untersu-chungs-jahr	Im 9. Untersu-chungs-jahr
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	11332	9403	7877	6960	6217				
	auswertbar	Anzahl		9347	7778	6868	6123				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		6370	4977	4385	3779				
		Anteil in %		68,15	63,99	63,85	61,72				
		CI Anteil in %		[67,21; 69,09]	[62,92; 65,06]	[62,71; 64,98]	[60,50; 62,94]				
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	10692	8730	7281	6485	5839				
	auswertbar	Anzahl		8643	7204	6408	5758				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		5674	4665	4006	3554				
		Anteil in %		65,65	64,76	62,52	61,72				
		CI Anteil in %		[64,65; 66,65]	[63,65; 65,86]	[61,33; 63,70]	[60,47; 62,98]				
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6867	5424	4661	4148					
	auswertbar	Anzahl		5408	4626	4119					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3458	2941	2511					
		Anteil in %		63,94	63,58	60,96					
		CI Anteil in %		[62,66; 65,22]	[62,19; 64,96]	[59,47; 62,45]					
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9390	7281	6202	5474					
	auswertbar	Anzahl		7252	6175	5442					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		4427	3689	3281					
		Anteil in %		61,05	59,74	60,29					
		CI Anteil in %		[59,92; 62,17]	[58,52; 60,96]	[58,99; 61,59]					
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7490	5995	5082						
	auswertbar	Anzahl		5973	5067						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3672	2977						
		Anteil in %		61,48	58,75						
		CI Anteil in %		[60,24; 62,71]	[57,40; 60,11]						
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8737	7032	5942						
	auswertbar	Anzahl		7016	5927						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		4191	3434						
		Anteil in %		59,73	57,94						
		CI Anteil in %		[58,59; 60,88]	[56,68; 59,20]						
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8103	6483							
	auswertbar	Anzahl		6480							
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3827							
		Anteil in %		59,06							
		CI Anteil in %		[57,86; 60,26]							
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8627	6845							
	auswertbar	Anzahl		6826							
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3915							
		Anteil in %		57,35							
		CI Anteil in %		[56,18; 58,53]							
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7608								
	auswertbar	Anzahl									
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl									
		Anteil in %									
		CI Anteil in %									
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7836								
	auswertbar	Anzahl									
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl									
		Anteil in %									
		CI Anteil in %									

### 3.5 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten

Die durch langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachten Begleit- oder Folgeerkrankungen des Diabetes sind durch Makro- und Mikroangiopathie sowie Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven, bedingt und können zu schweren Organschädigungen bzw. Organversagen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Therapie kann die Progredienz deutlich verlangsamen. Eine gefürchtete Folge des Diabetes mellitus besteht in der Schädigung der Nieren durch Veränderung der Nierengefäße in Form der diabetischen Nephropathie, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Eine weitere Schädigung besteht in Form des diabetischen Fußes, bei dessen fortgeschrittenen Stadien Amputationen von Zehen, des Vorfusses oder gar des Unterschenkels notwendig werden können. Ein weiteres von Gefäßveränderungen betroffenes Organ ist das Herz, bei dem es in ausgeprägten Stadien zu so genannten (durch die gleichzeitige Schädigung der Nerven) „stummen Infarkten“, bei denen die Patienten keine oder kaum Schmerzen verspüren, kommen kann. Durch ausgeprägte Schädigung der Gefäße des Zentralnervensystems können weiterhin Schlaganfälle verursacht werden. In den folgenden Tabellen wird das neue Auftreten von Endpunkten dokumentiert; d.h. es werden erstmalig auftretende Endpunkte ausgewiesen. Folgeerkrankungen an den Augen und Nieren sind typische Schäden, die sich mit zunehmender Erkrankungsdauer ausbilden können. Das frühzeitige Erkennen und eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist ein wichtiges Ziel.

Die folgenden Tabellen beinhalten **Ereigniszeitanalysen** zum Erstauftreten der eben beschriebenen Ereignisse sowie die Angaben zur kumulierten „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier**. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit in Prozent

wieder, mit der für Patienten des Basiskollektivs ohne Ereignis zur ED im jeweiligen Halbjahr (noch) keines der im Einzelnen betrachteten Ereignisse eingetreten ist. Bezugsgröße im Halbjahr ist das Restkollektiv und entspricht dem Basiskollektiv, reduziert um ausgeschriebene Patienten sowie Patienten, bei denen im Verlauf bereits ein Ereignis eingetreten ist. Pro Halbjahr fließen also die verbleibenden Patienten unter Risiko in die Auswertung ein.

Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit wird in jeder der folgenden Tabellen in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

In Tabelle 3.5.1 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren vom **Erstaufreten einer Erblindungen** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Erblindung vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier** dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Erblindung dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene Erblindung dokumentiert ist.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 14 Patienten eingeschrieben, bei 13 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Erblindung dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch - - Mitglieder. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei - - Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr eine erstmalig aufgetretene Erblindung dokumentiert.

**Tabelle 3.5.1 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	4813	3953	3365	2871	2460	2192	1983	1806	1728	1665	1610	1550	1480	1412	1365	1312	1268	1208	
	auswertbar	Anzahl		3613	3266	2795	2421	2153	1955	1737	1660	1594	1572	1514	1455	1387	1345	1294	1247	1171	
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	3	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,06	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,95</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,76</b>	<b>99,70</b>	<b>99,58</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>
		CI		[99,88; 100,00]	[99,74; 99,98]	[99,74; 99,98]	[99,67; 99,97]	[99,67; 99,97]	[99,67; 99,97]	[99,67; 99,97]	[99,67; 99,97]	[99,67; 99,97]	[99,48; 99,92]	[99,30; 99,86]	[99,21; 99,81]	[99,21; 99,81]	[99,21; 99,81]	[99,21; 99,81]	[99,21; 99,81]	[99,21; 99,81]	[99,21; 99,81]
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12010	10085	8346	7065	6354	5657	5126	4858	4670	4497	4297	4072	3902	3756	3576	3410	3253		
	auswertbar	Anzahl		8959	7923	6880	6203	5543	4848	4585	4436	4376	4205	4015	3832	3696	3509	3351	3154		
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		6	1	1	0	0	1	1	2	5	1	2	1	1	0	1	0	0	
		Anteil in %		0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,11	0,02	0,05	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,94</b>	<b>99,92</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>	<b>99,89</b>	<b>99,87</b>	<b>99,83</b>	<b>99,71</b>	<b>99,69</b>	<b>99,64</b>	<b>99,62</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>	
		CI		[99,89; 99,99]	[99,86; 99,98]	[99,85; 99,97]	[99,85; 99,97]	[99,85; 99,97]	[99,82; 99,96]	[99,79; 99,95]	[99,73; 99,93]	[99,57; 99,85]	[99,54; 99,84]	[99,48; 99,80]	[99,45; 99,79]	[99,41; 99,77]	[99,41; 99,77]	[99,37; 99,75]	[99,37; 99,75]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			
2004-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	15001	12611	10533	9117	7972	7234	6908	6555	6210	5907	5569	5274	5044	4828	4621	4399			
	auswertbar	Anzahl		11687	10191	8834	7751	6896	6594	6249	6015	5755	5459	5174	4943	4727	4532	4306			
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		4	3	0	2	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0			
		Anteil in %		0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,97</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>99,91</b>	<b>99,89</b>	<b>99,87</b>	<b>99,85</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>	<b>99,82</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>			
		CI		[99,94; 100,00]	[99,89; 99,99]	[99,89; 99,99]	[99,85; 99,97]	[99,82; 99,96]	[99,79; 99,95]	[99,77; 99,93]	[99,75; 99,93]	[99,75; 99,93]	[99,73; 99,91]	[99,70; 99,90]	[99,70; 99,90]	[99,70; 99,90]	[99,70; 99,90]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>				
2005-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11650	9972	8634	7437	6695	6273	5951	5666	5373	5062	4829	4629	4416	4217	4030				
	auswertbar	Anzahl		9477	8270	7216	6367	5961	5661	5473	5225	4946	4710	4537	4321	4127	3913				
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		5	1	1	1	1	2	2	1	0	0	3	1	1	0				
		Anteil in %		0,05	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,02	0,00	0,00	0,07	0,02	0,02	0,00				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,95</b>	<b>99,94</b>	<b>99,92</b>	<b>99,91</b>	<b>99,89</b>	<b>99,86</b>	<b>99,82</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	<b>99,74</b>	<b>99,72</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>				
		CI		[99,91; 99,99]	[99,89; 99,99]	[99,86; 99,98]	[99,85; 99,97]	[99,82; 99,96]	[99,77; 99,95]	[99,72; 99,92]	[99,69; 99,91]	[99,69; 99,91]	[99,69; 99,91]	[99,61; 99,87]	[99,58; 99,86]	[99,55; 99,83]	[99,55; 99,83]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>					
2005-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	14236	12523	10778	9498	8875	8354	7874	7422	6919	6559	6226	5942	5683	5393					
	auswertbar	Anzahl		11751	10319	8955	8365	7879	7568	7208	6755	6399	6093	5797	5544	5265					
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		1	3	2	3	1	2	5	7	1	0	0	0	1					
		Anteil in %		0,01	0,03	0,02	0,04	0,01	0,03	0,07	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02					
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,99</b>	<b>99,96</b>	<b>99,94</b>	<b>99,91</b>	<b>99,90</b>	<b>99,87</b>	<b>99,80</b>	<b>99,70</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>	<b>99,66</b>					
		CI		[99,97; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,89; 99,99]	[99,85; 99,97]	[99,83; 99,97]	[99,80; 99,94]	[99,70; 99,90]	[99,58; 99,82]	[99,55; 99,81]	[99,55; 99,81]	[99,55; 99,81]	[99,55; 99,81]	[99,53; 99,79]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>						

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13225	11299	9852	9072	8503	7992	7542	7013	6630	6323	5998	5692	5432						
	auswertbar	Anzahl		10840	9200	8546	8015	7672	7333	6791	6456	6169	5837	5557	5245						
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	1	4	2	4	1	1	0	2	0	2	1						
		Anteil in %		0,02	0,01	0,05	0,02	0,05	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,02						
		CI Anteil in %		[0,00; 0,04]	[0,00; 0,03]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,06]						
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,98</b>	<b>99,97</b>	<b>99,93</b>	<b>99,90</b>	<b>99,85</b>	<b>99,84</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>	<b>99,76</b>	<b>99,74</b>						
CI			[99,96; 100,00]	[99,94; 100,00]	[99,88; 99,98]	[99,84; 99,96]	[99,77; 99,93]	[99,76; 99,92]	[99,73; 99,91]	[99,73; 99,91]	[99,69; 99,89]	[99,69; 99,89]	[99,65; 99,87]	[99,62; 99,86]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>							
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11729	10383	9357	8668	8147	7623	7058	6674	6317	5998	5742	5459							
	auswertbar	Anzahl		9813	8812	8210	7748	7382	6861	6458	6145	5831	5574	5274							
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	4	3	5	0	1	2	3	0	0	0	0						
		Anteil in %		0,02	0,05	0,04	0,06	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CI Anteil in %		[0,00; 0,05]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,08]	[0,01; 0,12]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,98</b>	<b>99,94</b>	<b>99,90</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>	<b>99,83</b>	<b>99,79</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>						
CI			[99,95; 100,00]	[99,89; 99,99]	[99,84; 99,96]	[99,76; 99,92]	[99,76; 99,92]	[99,74; 99,92]	[99,69; 99,89]	[99,64; 99,86]	[99,64; 99,86]	[99,64; 99,86]	[99,64; 99,86]	[99,64; 99,86]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>								
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13067	11721	10734	9934	9270	8547	8026	7597	7240	6870	6504								
	auswertbar	Anzahl		11359	10345	9371	8883	8194	7691	7298	6915	6543	6157								
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	2	4	3	2	0	4	4	0	1								
		Anteil in %		0,02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,00	0,05	0,06	0,00	0,02								
		CI Anteil in %		[0,00; 0,04]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,98</b>	<b>99,96</b>	<b>99,92</b>	<b>99,89</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>	<b>99,81</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>							
CI			[99,96; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,87; 99,97]	[99,82; 99,96]	[99,79; 99,93]	[99,79; 99,93]	[99,72; 99,90]	[99,64; 99,86]	[99,64; 99,86]	[99,63; 99,85]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>									
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11293	10241	9373	8608	7847	7369	6930	6541	6192	5851									
	auswertbar	Anzahl		9987	8899	8333	7657	7163	6736	6333	6022	5636									
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		4	4	4	2	2	0	0	0	1									
		Anteil in %		0,04	0,04	0,05	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02									
		CI Anteil in %		[0,00; 0,08]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,96</b>	<b>99,92</b>	<b>99,87</b>	<b>99,84</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>								
CI			[99,92; 100,00]	[99,86; 99,98]	[99,80; 99,94]	[99,76; 99,92]	[99,73; 99,91]	[99,73; 99,91]	[99,73; 99,91]	[99,73; 99,91]	[99,70; 99,90]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>										
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10660	9516	8701	7805	7257	6839	6461	6135	5814										
	auswertbar	Anzahl		9068	8410	7607	7054	6673	6279	5973	5595										
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		4	1	0	3	1	2	0	2										
		Anteil in %		0,04	0,01	0,00	0,04	0,01	0,03	0,00	0,04										
		CI Anteil in %		[0,00; 0,09]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,96</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	<b>99,90</b>	<b>99,89</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>									
CI			[99,92; 100,00]	[99,90; 100,00]	[99,90; 100,00]	[99,83; 99,97]	[99,82; 99,96]	[99,77; 99,95]	[99,77; 99,95]	[99,72; 99,92]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6858	6107	5415	4954	4652	4366	4136	3917											
	auswertbar	Anzahl		5962	5300	4847	4569	4275	4034	3783											
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		3	1	1	3	3	0	1											
		Anteil in %		0,05	0,02	0,02	0,07	0,07	0,00	0,03											
		CI Anteil in %		[0,00; 0,11]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,95</b>	<b>99,93</b>	<b>99,91</b>	<b>99,85</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>										
CI			[99,89; 100,00]	[99,86; 100,00]	[99,83; 99,99]	[99,74; 99,96]	[99,65; 99,91]	[99,65; 99,91]	[99,61; 99,89]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>												

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9372	8101	7268	6651	6188	5808	5463											
	auswertbar	Anzahl		7913	7113	6525	6050	5689	5319											
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	1	0	0	0	0	2										
		Anteil in %		0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04										
		CI Anteil in %		[0,00; 0,06]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,98</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>99,92</b>										
CI			[99,95; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,85; 99,99]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7472	6621	5978	5481	5063	4731												
	auswertbar	Anzahl		6509	5876	5370	4972	4632												
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	4	2	0	0	0											
		Anteil in %		0,03	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00											
		CI Anteil in %		[0,00; 0,07]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,97</b>	<b>99,90</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>											
CI			[99,93; 100,00]	[99,82; 99,98]	[99,78; 99,96]	[99,78; 99,96]	[99,78; 99,96]	[99,78; 99,96]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8721	7729	7019	6399	5930													
	auswertbar	Anzahl		7615	6878	6268	5789													
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		3	2	1	2													
		Anteil in %		0,04	0,03	0,02	0,03													
		CI Anteil in %		[0,00; 0,08]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,08]													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,96</b>	<b>99,93</b>	<b>99,92</b>	<b>99,88</b>													
CI			[99,92; 100,00]	[99,87; 99,99]	[99,85; 99,99]	[99,80; 99,96]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>														
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8094	7222	6475	5921														
	auswertbar	Anzahl		7122	6379	5781														
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	1	0														
		Anteil in %		0,03	0,02	0,00														
		CI Anteil in %		[0,00; 0,07]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,97</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>														
CI			[99,93; 100,00]	[99,91; 100,00]	[99,91; 100,00]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>															
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8618	7612	6836															
	auswertbar	Anzahl		7466	6666															
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		1	1															
		Anteil in %		0,01	0,02															
		CI Anteil in %		[0,00; 0,04]	[0,00; 0,04]															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,99</b>	<b>99,97</b>															
CI			[99,96; 100,00]	[99,93; 100,00]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7600	6646																
	auswertbar	Anzahl		6500																
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		0																
		Anteil in %		0,00																
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]																
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>100,00</b>																
CI			[100,00; 100,00]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7834																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate																		
CI																				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																		

Das Endstadium einer diabetischen Nephropathie führt zum lebensbedrohenden Ausfall der Filterfunktion der Nieren, dem Nierenversagen (terminale Niereninsuffizienz) und damit zur Notwendigkeit der Dialyse oder gar einer Nierentransplantation.

In Tabelle 3.5.2 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einer **erstmalig aufgetretenen diabetischen Nephropathie** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Nephropathie vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine diabetische Nephropathie dokumentiert war.

Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie dokumentiert ist.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 14 Patienten eingeschrieben. Bei 12 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Nephropathie dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch - - Mitglieder. Bei - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei - - Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr eine erstmalig aufgetretene Nephropathie dokumentiert.

**Tabelle 3.5.2 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	4555	3751	3179	2681	2283	2023	1818	1644	1572	1513	1455	1331	1254	1184	1137	1087	1039	980
	auswertbar	Anzahl		3431	3083	2609	2246	1988	1794	1583	1511	1449	1420	1301	1233	1167	1120	1073	1022	953
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		28	36	17	14	12	14	5	5	9	77	25	15	14	9	15	13	9
		Anteil in %		0,82	1,17	0,65	0,62	0,60	0,78	0,32	0,33	0,62	5,42	1,92	1,22	1,20	0,80	1,40	1,27	0,94
		CI Anteil in %		[0,51; 1,12]	[0,79; 1,55]	[0,34; 0,96]	[0,30; 0,95]	[0,26; 0,94]	[0,37; 1,19]	[0,04; 0,59]	[0,04; 0,62]	[0,22; 1,03]	[4,24; 6,60]	[1,18; 2,67]	[0,60; 1,83]	[0,57; 1,82]	[0,28; 1,33]	[0,70; 2,10]	[0,58; 1,96]	[0,33; 1,56]
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,25</b>	<b>98,12</b>	<b>97,51</b>	<b>96,91</b>	<b>96,29</b>	<b>95,56</b>	<b>95,21</b>	<b>94,91</b>	<b>94,35</b>	<b>89,26</b>	<b>87,58</b>	<b>86,54</b>	<b>85,52</b>	<b>84,85</b>	<b>83,68</b>	<b>82,64</b>	<b>81,87</b>
CI			[98,97; 99,53]	[97,66; 98,58]	[96,97; 98,05]	[96,29; 97,53]	[95,59; 96,99]	[94,76; 96,36]	[94,37; 96,05]	[94,03; 95,79]	[93,40; 95,30]	[87,85; 90,67]	[86,05; 89,11]	[84,94; 88,14]	[83,85; 87,19]	[83,14; 86,56]	[81,89; 85,47]	[80,79; 84,49]	[79,97; 83,77]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11462	9654	7903	6645	5947	5286	4785	4524	4335	4158	3823	3554	3361	3197	2989	2823	2678	
	auswertbar	Anzahl		8575	7501	6467	5822	5183	4532	4274	4123	4049	3741	3504	3308	3143	2939	2777	2598	
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		124	60	32	34	20	15	20	22	164	78	59	53	52	47	38	41	
		Anteil in %		1,45	0,80	0,49	0,58	0,39	0,33	0,47	0,53	4,05	2,09	1,68	1,60	1,65	1,60	1,37	1,58	
		CI Anteil in %		[1,19; 1,70]	[0,60; 1,00]	[0,32; 0,67]	[0,39; 0,78]	[0,22; 0,55]	[0,16; 0,50]	[0,26; 0,67]	[0,31; 0,76]	[3,44; 4,66]	[1,63; 2,54]	[1,26; 2,11]	[1,17; 2,03]	[1,21; 2,10]	[1,15; 2,05]	[0,94; 1,80]	[1,10; 2,06]	
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>98,64</b>	<b>97,88</b>	<b>97,40</b>	<b>96,84</b>	<b>96,47</b>	<b>96,17</b>	<b>95,74</b>	<b>95,25</b>	<b>91,45</b>	<b>89,52</b>	<b>88,02</b>	<b>86,62</b>	<b>85,20</b>	<b>83,82</b>	<b>82,69</b>	<b>81,39</b>	
CI			[98,40; 98,88]	[97,58; 98,18]	[97,06; 97,74]	[96,45; 97,23]	[96,05; 96,89]	[95,72; 96,62]	[95,26; 96,22]	[94,73; 95,77]	[90,69; 92,21]	[88,67; 90,37]	[87,10; 88,94]	[85,64; 87,60]	[84,16; 86,24]	[82,73; 84,91]	[81,56; 83,82]	[80,21; 82,57]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13866	11681	9687	8362	7291	6607	6299	5942	5620	5164	4793	4478	4235	4032	3836	3623		
	auswertbar	Anzahl		10833	9376	8102	7090	6310	6017	5677	5450	5044	4704	4400	4159	3952	3768	3552		
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		116	63	39	30	21	39	24	198	101	83	62	44	42	36	37		
		Anteil in %		1,07	0,67	0,48	0,42	0,33	0,65	0,42	3,63	2,00	1,76	1,41	1,06	1,06	0,96	1,04		
		CI Anteil in %		[0,88; 1,26]	[0,51; 0,84]	[0,33; 0,63]	[0,27; 0,57]	[0,19; 0,47]	[0,45; 0,85]	[0,25; 0,59]	[3,14; 4,13]	[1,62; 2,39]	[1,39; 2,14]	[1,06; 1,76]	[0,75; 1,37]	[0,74; 1,38]	[0,64; 1,27]	[0,71; 1,38]		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>98,98</b>	<b>98,33</b>	<b>97,86</b>	<b>97,45</b>	<b>97,14</b>	<b>96,53</b>	<b>96,13</b>	<b>92,71</b>	<b>90,87</b>	<b>89,28</b>	<b>88,03</b>	<b>87,10</b>	<b>86,18</b>	<b>85,36</b>	<b>84,47</b>		
CI			[98,80; 99,16]	[98,09; 98,57]	[97,58; 98,14]	[97,13; 97,77]	[96,80; 97,48]	[96,14; 96,92]	[95,71; 96,55]	[92,09; 93,33]	[90,17; 91,57]	[88,51; 90,05]	[87,21; 88,85]	[86,24; 87,96]	[85,29; 87,07]	[84,44; 86,28]	[83,51; 85,43]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10964	9387	8085	6938	6220	5819	5497	5221	4790	4399	4137	3934	3726	3528	3345			
	auswertbar	Anzahl		8916	7754	6736	5920	5537	5235	5049	4669	4303	4041	3856	3650	3452	3258			
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		83	46	32	22	30	27	192	132	72	60	47	43	46	41			
		Anteil in %		0,93	0,59	0,48	0,37	0,54	0,52	3,80	2,83	1,67	1,48	1,22	1,18	1,33	1,26			
		CI Anteil in %		[0,73; 1,13]	[0,42; 0,76]	[0,31; 0,64]	[0,22; 0,53]	[0,35; 0,74]	[0,32; 0,71]	[3,28; 4,33]	[2,35; 3,30]	[1,29; 2,06]	[1,11; 1,86]	[0,87; 1,57]	[0,83; 1,53]	[0,95; 1,72]	[0,88; 1,64]			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,10</b>	<b>98,52</b>	<b>98,06</b>	<b>97,71</b>	<b>97,20</b>	<b>96,72</b>	<b>93,12</b>	<b>90,52</b>	<b>89,02</b>	<b>87,71</b>	<b>86,64</b>	<b>85,63</b>	<b>84,50</b>	<b>83,43</b>			
CI			[98,91; 99,29]	[98,27; 98,77]	[97,76; 98,36]	[97,38; 98,04]	[96,82; 97,58]	[96,30; 97,14]	[92,48; 93,76]	[89,76; 91,28]	[88,20; 89,84]	[86,83; 88,59]	[85,72; 87,56]	[84,68; 86,58]	[83,50; 85,50]	[82,39; 84,47]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>					

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13192	11616	9957	8763	8160	7659	7207	6563	6002	5626	5286	4988	4724	4449				
	auswertbar	Anzahl		10908	9553	8262	7689	7215	6943	6382	5863	5489	5174	4869	4614	4345				
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		86	47	47	36	34	267	160	101	76	87	70	56					
		Anteil in %		0,79	0,49	0,57	0,47	0,47	3,85	2,51	1,72	1,38	1,68	1,44	1,00	1,29				
		CI Anteil in %		[0,62; 0,95]	[0,35; 0,63]	[0,41; 0,73]	[0,32; 0,62]	[0,31; 0,63]	[3,39; 4,30]	[2,12; 2,89]	[1,39; 2,06]	[1,08; 1,69]	[1,33; 2,03]	[1,10; 1,77]	[0,71; 1,28]	[0,95; 1,62]				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,24</b>	<b>98,77</b>	<b>98,23</b>	<b>97,79</b>	<b>97,35</b>	<b>93,69</b>	<b>91,37</b>	<b>89,81</b>	<b>88,58</b>	<b>87,10</b>	<b>85,86</b>	<b>85,01</b>	<b>83,92</b>				
	CI		[99,08; 99,40]	[98,56; 98,98]	[97,97; 98,49]	[97,50; 98,08]	[97,02; 97,68]	[93,16; 94,22]	[90,74; 92,00]	[89,12; 90,50]	[87,85; 89,31]	[86,32; 87,88]	[85,04; 86,68]	[84,16; 85,86]	[83,03; 84,81]					
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>				
2006-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12389	10568	9136	8368	7844	7380	6694	6108	5706	5384	5052	4746	4494					
	auswertbar	Anzahl		10133	8539	7888	7400	7089	6509	5912	5561	5250	4913	4632	4334					
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		95	51	30	23	302	145	92	78	71	74	61	51					
		Anteil in %		0,94	0,60	0,38	0,31	4,26	2,23	1,56	1,40	1,35	1,51	1,32	1,18					
		CI Anteil in %		[0,75; 1,13]	[0,43; 0,76]	[0,24; 0,52]	[0,18; 0,44]	[3,79; 4,73]	[1,87; 2,59]	[1,24; 1,87]	[1,09; 1,71]	[1,04; 1,66]	[1,17; 1,85]	[0,99; 1,65]	[0,86; 1,50]					
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,09</b>	<b>98,52</b>	<b>98,16</b>	<b>97,87</b>	<b>93,81</b>	<b>91,74</b>	<b>90,33</b>	<b>89,07</b>	<b>87,88</b>	<b>86,56</b>	<b>85,43</b>	<b>84,43</b>					
	CI		[98,91; 99,27]	[98,28; 98,76]	[97,89; 98,43]	[97,58; 98,16]	[93,28; 94,34]	[91,12; 92,36]	[89,66; 91,00]	[88,35; 89,79]	[87,12; 88,64]	[85,76; 87,36]	[84,59; 86,27]	[83,55; 85,31]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>					
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10987	9728	8727	8067	7576	6861	6227	5816	5448	5141	4879	4603						
	auswertbar	Anzahl		9204	8224	7648	7218	6643	6050	5632	5305	5001	4737	4447						
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		71	45	26	264	149	84	72	63	59	51	48						
		Anteil in %		0,77	0,55	0,34	3,66	2,24	1,39	1,28	1,19	1,18	1,08	1,08						
		CI Anteil in %		[0,59; 0,95]	[0,39; 0,71]	[0,21; 0,47]	[3,22; 4,09]	[1,89; 2,60]	[1,09; 1,68]	[0,98; 1,57]	[0,90; 1,48]	[0,88; 1,48]	[0,78; 1,37]	[0,78; 1,38]						
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,26</b>	<b>98,74</b>	<b>98,41</b>	<b>94,93</b>	<b>92,83</b>	<b>91,56</b>	<b>90,40</b>	<b>89,33</b>	<b>88,28</b>	<b>87,34</b>	<b>86,40</b>						
	CI		[99,09; 99,43]	[98,51; 98,97]	[98,15; 98,67]	[94,45; 95,41]	[92,25; 93,41]	[90,93; 92,19]	[89,72; 91,08]	[88,61; 90,05]	[87,52; 89,04]	[86,55; 88,13]	[85,57; 87,23]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>						
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12277	11018	10055	9293	8391	7637	7102	6689	6334	5966	5578							
	auswertbar	Anzahl		10672	9711	8759	8045	7328	6811	6428	6042	5676	5264							
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		51	36	311	143	102	75	67	63	86	52							
		Anteil in %		0,48	0,37	3,55	1,78	1,39	1,10	1,04	1,04	1,52	0,99							
		CI Anteil in %		[0,35; 0,61]	[0,25; 0,49]	[3,16; 3,94]	[1,49; 2,07]	[1,12; 1,66]	[0,85; 1,35]	[0,79; 1,29]	[0,79; 1,30]	[1,20; 1,83]	[0,72; 1,26]							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,53</b>	<b>99,17</b>	<b>95,76</b>	<b>94,07</b>	<b>92,78</b>	<b>91,76</b>	<b>90,81</b>	<b>89,87</b>	<b>88,52</b>	<b>87,64</b>							
	CI		[99,40; 99,66]	[99,00; 99,34]	[95,35; 96,17]	[93,58; 94,56]	[92,24; 93,32]	[91,18; 92,34]	[90,19; 91,43]	[89,22; 90,52]	[87,82; 89,22]	[86,90; 88,38]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>							
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10651	9672	8827	7906	7106	6593	6155	5763	5408	5053								
	auswertbar	Anzahl		9439	8389	7662	6933	6421	5985	5583	5258	4869								
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		47	248	130	96	70	68	73	68	52								
		Anteil in %		0,50	2,96	1,70	1,38	1,09	1,14	1,31	1,29	1,07								
		CI Anteil in %		[0,36; 0,64]	[2,59; 3,32]	[1,41; 1,99]	[1,11; 1,66]	[0,84; 1,34]	[0,87; 1,40]	[1,01; 1,61]	[0,99; 1,60]	[0,78; 1,36]								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,51</b>	<b>96,67</b>	<b>95,04</b>	<b>93,74</b>	<b>92,72</b>	<b>91,68</b>	<b>90,49</b>	<b>89,33</b>	<b>88,37</b>								
	CI		[99,37; 99,65]	[96,30; 97,04]	[94,58; 95,50]	[93,22; 94,26]	[92,15; 93,29]	[91,07; 92,29]	[89,83; 91,15]	[88,62; 90,04]	[87,62; 89,12]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>								
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10139	9045	8031	7120	6560	6119	5730	5424	5101									
	auswertbar	Anzahl		8630	7765	6939	6374	5973	5565	5279	4908									
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		267	118	83	79	67	54	55	47									
		Anteil in %		3,09	1,52	1,20	1,24	1,12	0,97	1,04	0,96									
		CI Anteil in %		[2,73; 3,46]	[1,25; 1,79]	[0,94; 1,45]	[0,97; 1,51]	[0,85; 1,39]	[0,71; 1,23]	[0,77; 1,32]	[0,69; 1,23]									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>97,01</b>	<b>95,55</b>	<b>94,42</b>	<b>93,26</b>	<b>92,22</b>	<b>91,33</b>	<b>90,39</b>	<b>89,52</b>									
	CI		[96,66; 97,36]	[95,12; 95,98]	[93,93; 94,91]	[92,71; 93,81]	[91,62; 92,82]	[90,69; 91,97]	[89,71; 91,07]	[88,81; 90,23]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>									



EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6614	5890	5094	4608	4260	3976	3752	3527														
	auswertbar	Anzahl		5748	4988	4516	4186	3897	3659	3410														
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		165	69	79	38	36	32	24														
		Anteil in %		2,87	1,38	1,75	0,91	0,92	0,87	0,70														
		CI Anteil in %		[2,44; 3,30]	[1,06; 1,71]	[1,37; 2,13]	[0,62; 1,20]	[0,62; 1,22]	[0,57; 1,18]	[0,42; 0,98]														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>97,17</b>	<b>95,84</b>	<b>94,17</b>	<b>93,33</b>	<b>92,47</b>	<b>91,67</b>	<b>91,02</b>														
CI			[96,74; 97,60]	[95,32; 96,36]	[93,54; 94,80]	[92,65; 94,01]	[91,74; 93,20]	[90,90; 92,44]	[90,21; 91,83]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>															
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8953	7743	6801	6129	5651	5244	4898															
	auswertbar	Anzahl		7560	6660	6017	5531	5137	4764															
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		168	113	67	81	57	43															
		Anteil in %		2,22	1,70	1,11	1,46	1,11	0,90															
		CI Anteil in %		[1,89; 2,55]	[1,39; 2,01]	[0,85; 1,38]	[1,15; 1,78]	[0,82; 1,40]	[0,63; 1,17]															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>97,81</b>	<b>96,16</b>	<b>95,10</b>	<b>93,72</b>	<b>92,69</b>	<b>91,85</b>															
CI			[97,48; 98,14]	[95,72; 96,60]	[94,60; 95,60]	[93,14; 94,30]	[92,06; 93,32]	[91,18; 92,52]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>																
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7163	6349	5604	5066	4610	4270																
	auswertbar	Anzahl		6241	5513	4966	4526	4183																
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		155	93	77	49	44																
		Anteil in %		2,48	1,69	1,55	1,08	1,05																
		CI Anteil in %		[2,10; 2,87]	[1,35; 2,03]	[1,21; 1,89]	[0,78; 1,38]	[0,74; 1,36]																
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>97,54</b>	<b>95,91</b>	<b>94,43</b>	<b>93,42</b>	<b>92,44</b>																
CI			[97,16; 97,92]	[95,41; 96,41]	[93,84; 95,02]	[92,77; 94,07]	[91,74; 93,14]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>																	
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8385	7436	6576	5936	5412																	
	auswertbar	Anzahl		7331	6447	5819	5284																	
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		205	84	95	46																	
		Anteil in %		2,80	1,30	1,63	0,87																	
		CI Anteil in %		[2,42; 3,17]	[1,03; 1,58]	[1,31; 1,96]	[0,62; 1,12]																	
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>97,23</b>	<b>95,97</b>	<b>94,42</b>	<b>93,60</b>																	
CI			[96,86; 97,60]	[95,51; 96,43]	[93,88; 94,96]	[93,01; 94,19]																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>																		
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7777	6944	6086	5488																		
	auswertbar	Anzahl		6850	5995	5362																		
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		160	89	61																		
		Anteil in %		2,34	1,48	1,14																		
		CI Anteil in %		[1,98; 2,69]	[1,18; 1,79]	[0,85; 1,42]																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>97,69</b>	<b>96,25</b>	<b>95,15</b>																		
CI			[97,34; 98,04]	[95,79; 96,71]	[94,62; 95,68]																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>																			
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8321	7360	6480																			
	auswertbar	Anzahl		7217	6320																			
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		157	80																			
		Anteil in %		2,18	1,27																			
		CI Anteil in %		[1,84; 2,51]	[0,99; 1,54]																			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>97,85</b>	<b>96,61</b>																			
CI			[97,52; 98,18]	[96,19; 97,03]																				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																				

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7303	6400																
	auswertbar	Anzahl		6262																
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		115																
		Anteil in %		1,84																
		CI Anteil in %		[1,50; 2,17]																
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,16</b>																
		CI		[97,83; 98,49]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7608</i>	<i>6653</i>																
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7552																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>																		
		CI																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7836</i>																	

In Tabelle 3.5.3 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **ein erheblich auffälliger Fußstatus** (definiert als erstmalig vermerkte Wagner-Stadien 2 bis 5 oder Armstrong-Stadien C bis D) dokumentiert war. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation kein auffälliger oder ein leicht auffälliger Fußstatus vorlag. Dieser Status ist wie folgt definiert: Keine Amputationen und unauffälliger Fußstatus und keine Angaben zu Wagner-oder Armstrong-Stadien oder Wagner-Stadien 0 bis 1 oder Armstrong-Stadien A bis B. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier“ dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. bei welchem Anteil im Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert ist (Wagner-Stadium 2 bis 5 oder Armstrong-Stadium C bis D).

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 14 Patienten eingeschrieben. Bei 13 dieser Personen war laut Erstdokumentation kein auffälliger oder nur ein leicht auffälliger Fußstatus dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch - - Mitglieder. Bei - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei - - Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr ein erheblich auffälliger Fußstatus (Wagner-Stadien 2 bis 5 oder Armstrong-Stadien C bis D) dokumentiert.

**Tabelle 3.5.3 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	<i>Patienten insgesamt</i>	Anzahl	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	4690	3856	3281	2795	2386	2124	1923	1768	1689	1631	1579	1518	1447	1377	1331	1278	1232	1176	
	auswertbar	Anzahl		3552	3009	2536	2202	1966	1730	1586	1506	1475	1389	1314	1237	1175	1127	1108	1016	978	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl	11	12	10	5	6	1	6	1	1	6	2	4	0	3	4	1	1	1	
		Anteil in %	0,31	0,40	0,39	0,23	0,31	0,06	0,38	0,07	0,07	0,43	0,15	0,32	0,00	0,27	0,36	0,10	0,10		
		CI Anteil in %		[0,13; 0,49]	[0,17; 0,62]	[0,15; 0,64]	[0,03; 0,43]	[0,06; 0,55]	[0,00; 0,17]	[0,08; 0,68]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,20]	[0,09; 0,78]	[0,00; 0,36]	[0,01; 0,64]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,57]	[0,01; 0,71]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,30]	
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl	11	10	8	3	6	0	6	0	1	5	2	3		3	4	1	1		
		Anteil in %	100,00	83,33	80,00	60,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	83,33	100,00	75,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[61,31; 100,00]	[53,87; 100,00]	[11,99; 100,00]	[100,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[100,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[100,00; 100,00]	[50,67; 100,00]	[100,00; 100,00]	[26,00; 100,00]		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl	0	3	5	3	2	1	0	1	0	2	1	2		1	2	0	0		
		Anteil in %	0,00	25,00	50,00	60,00	33,33	100,00	0,00	100,00	0,00	33,33	50,00	50,00		33,33	50,00	0,00	0,00		
CI Anteil in %			[0,00; 0,00]	[0,00; 50,59]	[17,33; 82,67]	[11,99; 100,00]	[0,00; 74,65]	[100,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[100,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 74,65]	[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]		[0,00; 98,67]	[0,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	<b>99,71</b>	<b>99,33</b>	<b>98,97</b>	<b>98,75</b>	<b>98,47</b>	<b>98,42</b>	<b>98,07</b>	<b>98,01</b>	<b>97,95</b>	<b>97,56</b>	<b>97,43</b>	<b>97,14</b>	<b>97,14</b>	<b>96,91</b>	<b>96,58</b>	<b>96,49</b>	<b>96,39</b>			
	CI	[99,54; 99,88]	[99,06; 99,60]	[98,62; 99,32]	[98,35; 99,15]	[98,01; 98,93]	[97,95; 98,89]	[97,53; 98,61]	[97,46; 98,56]	[97,38; 98,52]	[96,92; 98,20]	[96,76; 98,10]	[96,42; 97,86]	[96,42; 97,86]	[96,14; 97,68]	[95,75; 97,41]	[95,64; 97,34]	[95,52; 97,26]			
	<i>Patienten insgesamt</i>	Anzahl	4885	4007	3418	2921	2501	2228	2016	1839	1760	1696	1639	1580	1508	1434	1386	1332	1286	1225	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11808	9934	8203	6921	6220	5535	5015	4744	4554	4383	4184	3960	3789	3641	3465	3302	3153		
	auswertbar	Anzahl		8118	7102	6125	5561	4872	4230	3997	3817	3750	3515	3357	3210	3034	2897	2669	2545		
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl	46	28	24	11	9	9	11	9	13	9	9	9	13	9	4	6	5		
		Anteil in %	0,57	0,39	0,39	0,20	0,18	0,21	0,28	0,24	0,35	0,26	0,27	0,40	0,30	0,14	0,22	0,20			
		CI Anteil in %		[0,40; 0,73]	[0,25; 0,54]	[0,24; 0,55]	[0,08; 0,31]	[0,06; 0,31]	[0,07; 0,35]	[0,11; 0,44]	[0,08; 0,39]	[0,16; 0,53]	[0,09; 0,42]	[0,09; 0,44]	[0,19; 0,62]	[0,10; 0,49]	[0,00; 0,27]	[0,05; 0,40]	[0,02; 0,37]		
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl	41	23	21	7	7	9	10	9	10	7	7	7	9	7	2	5	3		
		Anteil in %	89,13	82,14	87,50	63,64	77,78	100,00	90,91	100,00	76,92	77,78	77,78	69,23	77,78	50,00	83,33	60,00			
		CI Anteil in %		[80,04; 98,22]	[67,70; 96,59]	[73,98; 100,00]	[33,82; 93,45]	[48,97; 100,00]	[100,00; 100,00]	[73,09; 100,00]	[100,00; 100,00]	[53,08; 100,00]	[48,97; 100,00]	[48,97; 100,00]	[43,12; 95,34]	[48,97; 100,00]	[0,00; 100,00]	[50,67; 100,00]	[11,99; 100,00]		
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl	12	9	8	8	3	2	3	4	6	5	5	5	7	5	3	2	3		
		Anteil in %	26,09	32,14	33,33	72,73	33,33	22,22	27,27	44,44	46,15	55,56	55,56	53,85	55,56	75,00	33,33	60,00			
CI Anteil in %			[13,26; 38,92]	[14,53; 49,76]	[14,07; 52,60]	[45,12; 100,00]	[0,67; 66,00]	[0,00; 51,03]	[0,00; 54,88]	[10,01; 78,88]	[17,95; 74,36]	[21,12; 89,99]	[21,12; 89,99]	[25,64; 82,05]	[21,12; 89,99]	[26,00; 100,00]	[0,00; 74,65]	[11,99; 100,00]			
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	<b>99,49</b>	<b>99,13</b>	<b>98,78</b>	<b>98,59</b>	<b>98,43</b>	<b>98,24</b>	<b>98,00</b>	<b>97,80</b>	<b>97,49</b>	<b>97,26</b>	<b>97,02</b>	<b>96,66</b>	<b>96,39</b>	<b>96,27</b>	<b>96,07</b>	<b>95,88</b>				
	CI	[99,34; 99,64]	[98,93; 99,33]	[98,54; 99,02]	[98,33; 98,85]	[98,14; 98,72]	[97,93; 98,55]	[97,66; 98,34]	[97,44; 98,16]	[97,09; 97,89]	[96,83; 97,69]	[96,57; 97,47]	[96,17; 97,15]	[95,87; 96,91]	[95,74; 96,80]	[95,51; 96,63]	[95,30; 96,46]				
	<i>Patienten insgesamt</i>	Anzahl	12108	10165	8415	7122	6406	5705	5169	4899	4710	4536	4339	4114	3945	3799	3618	3450	3293		

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13748	11575	9653	8344	7285	6616	6312	5989	5671	5376	5070	4804	4591	4388	4194	3993		
	auswertbar	Anzahl		9958	8673	7391	6456	5713	5383	5070	4872	4615	4332	4073	3881	3713	3477	3300		
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		49	39	31	14	15	15	10	23	10	11	7	4	12	5	3		
		Anteil in %		0,49	0,45	0,42	0,22	0,26	0,28	0,20	0,47	0,22	0,25	0,17	0,10	0,32	0,14	0,09		
		CI Anteil in %		[0,35; 0,63]	[0,31; 0,59]	[0,27; 0,57]	[0,10; 0,33]	[0,13; 0,40]	[0,14; 0,42]	[0,08; 0,32]	[0,28; 0,66]	[0,08; 0,35]	[0,10; 0,40]	[0,04; 0,30]	[0,00; 0,20]	[0,14; 0,51]	[0,02; 0,27]	[0,00; 0,19]		
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		42	34	28	9	13	14	9	23	6	11	6	4	10	5	2		
		Anteil in %		85,71	87,18	90,32	64,29	86,67	93,33	90,00	100,00	60,00	100,00	85,71	100,00	83,33	100,00	66,67		
		CI Anteil in %		[75,81; 95,61]	[76,55; 97,81]	[79,74; 100,00]	[38,24; 90,33]	[68,86; 100,00]	[80,27; 100,00]	[70,40; 100,00]	[100,00; 100,00]	[27,99; 92,01]	[100,00; 100,00]	[57,71; 100,00]	[100,00; 100,00]	[61,31; 100,00]	[100,00; 100,00]	[1,33; 100,00]		
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		17	13	8	5	6	3	3	6	8	4	2	0	6	0	2		
		Anteil in %		34,69	33,33	25,81	35,71	40,00	20,00	30,00	26,09	80,00	36,36	28,57	0,00	50,00	0,00	66,67		
		CI Anteil in %		[21,23; 48,16]	[18,34; 48,32]	[10,15; 41,46]	[9,67; 61,76]	[14,34; 65,66]	[0,00; 40,95]	[0,06; 59,94]	[7,74; 44,44]	[53,87; 100,00]	[6,55; 66,18]	[0,00; 64,72]	[0,00; 0,00]	[20,45; 79,55]	[0,00; 0,00]	[1,33; 100,00]		
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,55</b>	<b>99,14</b>	<b>98,75</b>	<b>98,56</b>	<b>98,32</b>	<b>98,08</b>	<b>97,91</b>	<b>97,49</b>	<b>97,30</b>	<b>97,07</b>	<b>96,92</b>	<b>96,83</b>	<b>96,54</b>	<b>96,41</b>	<b>96,32</b>			
	CI		[99,43; 99,67]	[98,96; 99,32]	[98,53; 98,97]	[98,31; 98,81]	[98,05; 98,59]	[97,78; 98,38]	[97,59; 98,23]	[97,13; 97,85]	[96,92; 97,68]	[96,67; 97,47]	[96,51; 97,33]	[96,41; 97,25]	[96,09; 96,99]	[95,94; 96,88]	[95,84; 96,80]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10438	8965	7770	6682	6006	5625	5330	5074	4804	4518	4313	4134	3954	3773	3606			
	auswertbar	Anzahl		7895	6907	5906	5224	4782	4532	4278	4062	3817	3626	3406	3289	3075	2934			
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		25	23	15	13	9	8	15	6	7	9	6	4	11	3			
		Anteil in %		0,32	0,33	0,25	0,25	0,19	0,18	0,35	0,15	0,18	0,25	0,18	0,12	0,36	0,10			
		CI Anteil in %		[0,19; 0,44]	[0,20; 0,47]	[0,13; 0,38]	[0,11; 0,38]	[0,07; 0,31]	[0,05; 0,30]	[0,17; 0,53]	[0,03; 0,27]	[0,05; 0,32]	[0,09; 0,41]	[0,04; 0,32]	[0,00; 0,24]	[0,15; 0,57]	[0,00; 0,22]			
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		23	20	13	13	7	7	11	4	6	7	6	3	8	2			
		Anteil in %		92,00	86,96	86,67	100,00	77,78	87,50	73,33	66,67	85,71	77,78	100,00	75,00	72,73	66,67			
		CI Anteil in %		[81,15; 100,00]	[72,88; 100,00]	[68,86; 100,00]	[100,00; 100,00]	[48,97; 100,00]	[63,00; 100,00]	[50,17; 96,50]	[25,35; 100,00]	[57,71; 100,00]	[48,97; 100,00]	[100,00; 100,00]	[26,00; 100,00]	[45,12; 100,00]	[1,33; 100,00]			
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		8	6	8	2	4	3	9	2	3	4	2	2	7	3			
		Anteil in %		32,00	26,09	53,33	15,38	44,44	37,50	60,00	33,33	42,86	44,44	33,33	50,00	63,64	100,00			
		CI Anteil in %		[13,34; 50,66]	[7,74; 44,44]	[27,20; 79,47]	[0,00; 35,80]	[10,01; 78,88]	[1,64; 73,36]	[34,34; 85,66]	[0,00; 74,65]	[3,26; 82,46]	[10,01; 78,88]	[0,00; 74,65]	[0,00; 100,00]	[33,82; 93,45]	[100,00; 100,00]			
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,71</b>	<b>99,40</b>	<b>99,17</b>	<b>98,95</b>	<b>98,78</b>	<b>98,63</b>	<b>98,32</b>	<b>98,19</b>	<b>98,03</b>	<b>97,80</b>	<b>97,65</b>	<b>97,54</b>	<b>97,21</b>	<b>97,11</b>				
	CI		[99,60; 99,82]	[99,23; 99,57]	[98,96; 99,38]	[98,71; 99,19]	[98,52; 99,04]	[98,35; 98,91]	[98,00; 98,64]	[97,85; 98,53]	[97,67; 98,39]	[97,41; 98,19]	[97,25; 98,05]	[97,12; 97,96]	[96,75; 97,67]	[96,64; 97,58]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12588	11077	9508	8379	7843	7373	6945	6536	6094	5797	5491	5239	5011	4753				
	auswertbar	Anzahl		9661	8358	7229	6684	6198	5894	5527	5106	4819	4529	4300	4011	3769				
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		40	37	19	22	15	24	16	13	9	10	9	9	10				
		Anteil in %		0,41	0,44	0,26	0,33	0,24	0,41	0,29	0,25	0,19	0,22	0,21	0,22	0,27				
		CI Anteil in %		[0,29; 0,54]	[0,30; 0,59]	[0,14; 0,38]	[0,19; 0,47]	[0,12; 0,36]	[0,24; 0,57]	[0,15; 0,43]	[0,12; 0,39]	[0,06; 0,31]	[0,08; 0,36]	[0,07; 0,35]	[0,08; 0,37]	[0,10; 0,43]				
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		34	32	16	21	13	19	14	10	7	8	7	7	9				
		Anteil in %		85,00	86,49	84,21	95,45	86,67	79,17	87,50	76,92	77,78	80,00	77,78	77,78	90,00				
		CI Anteil in %		[73,79; 96,21]	[75,32; 97,65]	[67,36; 100,00]	[86,55; 100,00]	[68,86; 100,00]	[62,57; 95,76]	[70,76; 100,00]	[53,08; 100,00]	[48,97; 100,00]	[53,87; 100,00]	[48,97; 100,00]	[48,97; 100,00]	[70,40; 100,00]				
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		15	13	6	4	5	5	6	6	3	4	3	5	4				
		Anteil in %		37,50	35,14	31,58	18,18	33,33	20,83	37,50	46,15	33,33	40,00	33,33	55,56	40,00				
		CI Anteil in %		[22,31; 52,69]	[19,54; 50,73]	[10,10; 53,05]	[1,69; 34,68]	[8,64; 58,03]	[4,24; 37,43]	[13,00; 62,00]	[17,95; 74,36]	[0,67; 66,00]	[7,99; 72,01]	[0,67; 66,00]	[21,12; 89,99]	[7,99; 72,01]				
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,62</b>	<b>99,22</b>	<b>98,99</b>	<b>98,70</b>	<b>98,49</b>	<b>98,12</b>	<b>97,87</b>	<b>97,64</b>	<b>97,48</b>	<b>97,28</b>	<b>97,09</b>	<b>96,89</b>	<b>96,63</b>					
	CI		[99,50; 99,74]	[99,05; 99,39]	[98,79; 99,19]	[98,46; 98,94]	[98,23; 98,75]	[97,83; 98,41]	[97,55; 98,19]	[97,30; 97,98]	[97,12; 97,84]	[96,90; 97,66]	[96,69; 97,49]	[96,47; 97,31]	[96,18; 97,08]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>					

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11626	9937	8641	7962	7475	7028	6629	6176	5862	5576	5284	5013	4790						
	auswertbar	Anzahl		8938	7480	6808	6417	6067	5729	5235	4923	4671	4437	4129	3898						
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		42	15	12	16	26	16	6	12	6	10	9	11						
		Anteil in %		0,47	0,20	0,18	0,25	0,43	0,28	0,11	0,24	0,13	0,23	0,22	0,28						
		CI Anteil in %		[0,33; 0,61]	[0,10; 0,30]	[0,08; 0,28]	[0,13; 0,37]	[0,26; 0,59]	[0,14; 0,42]	[0,02; 0,21]	[0,11; 0,38]	[0,03; 0,23]	[0,09; 0,36]	[0,08; 0,36]	[0,12; 0,45]						
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		35	14	10	16	23	11	4	11	4	6	7	8						
		Anteil in %		83,33	93,33	83,33	100,00	88,46	68,75	66,67	91,67	66,67	60,00	77,78	72,73						
		CI Anteil in %		[71,93; 94,74]	[80,27; 100,00]	[61,31; 100,00]	[100,00; 100,00]	[75,94; 100,00]	[45,29; 92,21]	[25,35; 100,00]	[75,33; 100,00]	[25,35; 100,00]	[27,99; 92,01]	[48,97; 100,00]	[45,12; 100,00]						
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		16	6	4	4	8	14	4	4	2	6	6	6						
		Anteil in %		38,10	40,00	33,33	25,00	30,77	87,50	66,67	33,33	33,33	60,00	66,67	54,55						
		CI Anteil in %		[23,23; 52,96]	[14,34; 65,66]	[5,48; 61,19]	[3,09; 46,91]	[12,68; 48,86]	[70,76; 100,00]	[25,35; 100,00]	[5,48; 61,19]	[0,00; 74,65]	[27,99; 92,01]	[34,00; 99,33]	[23,68; 85,41]						
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,56</b>	<b>99,38</b>	<b>99,23</b>	<b>99,01</b>	<b>98,62</b>	<b>98,37</b>	<b>98,26</b>	<b>98,04</b>	<b>97,93</b>	<b>97,72</b>	<b>97,52</b>	<b>97,25</b>						
		CI		[99,43; 99,69]	[99,22; 99,54]	[99,05; 99,41]	[98,80; 99,22]	[98,36; 98,88]	[98,08; 98,66]	[97,96; 98,56]	[97,72; 98,32]	[97,60; 98,26]	[97,36; 98,08]	[97,14; 97,90]	[96,84; 97,66]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>						
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10318	9147	8226	7617	7173	6702	6192	5855	5533	5240	5021	4762							
	auswertbar	Anzahl		8145	7183	6647	6144	5772	5307	4950	4650	4378	4145	3925							
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		32	24	14	26	16	5	8	12	5	13	11							
		Anteil in %		0,39	0,33	0,21	0,42	0,28	0,09	0,16	0,26	0,11	0,31	0,28							
		CI Anteil in %		[0,26; 0,53]	[0,20; 0,47]	[0,10; 0,32]	[0,26; 0,59]	[0,14; 0,41]	[0,01; 0,18]	[0,05; 0,27]	[0,11; 0,40]	[0,01; 0,21]	[0,14; 0,48]	[0,11; 0,45]							
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		26	24	13	18	13	4	7	11	4	13	9							
		Anteil in %		81,25	100,00	92,86	69,23	81,25	80,00	87,50	91,67	80,00	100,00	81,82							
		CI Anteil in %		[67,51; 94,99]	[100,00; 100,00]	[78,86; 100,00]	[51,14; 87,32]	[61,50; 100,00]	[40,80; 100,00]	[63,00; 100,00]	[75,33; 100,00]	[40,80; 100,00]	[100,00; 100,00]	[57,91; 100,00]							
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		13	5	2	14	7	2	2	7	2	4	6							
		Anteil in %		40,63	20,83	14,29	53,85	43,75	40,00	25,00	58,33	40,00	30,77	54,55							
		CI Anteil in %		[23,34; 57,91]	[4,24; 37,43]	[0,00; 33,31]	[34,30; 73,39]	[18,64; 68,86]	[0,00; 88,01]	[0,00; 57,08]	[29,20; 87,47]	[0,00; 88,01]	[4,66; 56,88]	[23,68; 85,41]							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,64</b>	<b>99,34</b>	<b>99,15</b>	<b>98,77</b>	<b>98,51</b>	<b>98,43</b>	<b>98,28</b>	<b>98,05</b>	<b>97,95</b>	<b>97,66</b>	<b>97,38</b>							
		CI		[99,51; 99,77]	[99,17; 99,51]	[98,95; 99,35]	[98,52; 99,02]	[98,23; 98,79]	[98,15; 98,71]	[97,98; 98,58]	[97,72; 98,38]	[97,61; 98,29]	[97,29; 98,03]	[96,97; 97,79]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>							
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11430	10264	9382	8714	8129	7501	7040	6672	6353	6025	5702								
	auswertbar	Anzahl		9368	8386	7397	6953	6357	5964	5529	5288	4860	4644								
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		40	20	22	17	18	7	8	12	9	7								
		Anteil in %		0,43	0,24	0,30	0,24	0,28	0,12	0,14	0,23	0,19	0,15								
		CI Anteil in %		[0,29; 0,56]	[0,13; 0,34]	[0,17; 0,42]	[0,13; 0,36]	[0,15; 0,41]	[0,03; 0,20]	[0,04; 0,24]	[0,10; 0,36]	[0,06; 0,31]	[0,04; 0,26]								
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		38	16	17	14	15	7	8	9	7	5								
		Anteil in %		95,00	80,00	77,27	82,35	83,33	100,00	100,00	75,00	77,78	71,43								
		CI Anteil in %		[88,16; 100,00]	[62,01; 97,99]	[59,35; 95,20]	[63,67; 100,00]	[65,62; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[49,41; 100,00]	[48,97; 100,00]	[35,28; 100,00]								
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		17	8	11	6	8	2	2	8	6	2								
		Anteil in %		42,50	40,00	50,00	35,29	44,44	28,57	25,00	66,67	66,67	28,57								
		CI Anteil in %		[26,98; 58,02]	[17,97; 62,03]	[28,61; 71,39]	[11,88; 58,71]	[20,82; 68,07]	[0,00; 64,72]	[0,00; 57,08]	[38,81; 94,52]	[34,00; 99,33]	[0,00; 64,72]								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,60</b>	<b>99,38</b>	<b>99,11</b>	<b>98,89</b>	<b>98,63</b>	<b>98,52</b>	<b>98,39</b>	<b>98,18</b>	<b>98,01</b>	<b>97,87</b>								
		CI		[99,48; 99,72]	[99,22; 99,54]	[98,92; 99,30]	[98,67; 99,11]	[98,38; 98,88]	[98,26; 98,78]	[98,11; 98,67]	[97,88; 98,48]	[97,69; 98,33]	[97,53; 98,21]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>								

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9738	8826	8079	7405	6776	6370	5994	5660	5362	5057								
	auswertbar	Anzahl		7979	6928	6335	5784	5413	5070	4708	4428	4074								
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		27	33	11	9	7	11	9	9	9								
		Anteil in %		0,34	0,48	0,17	0,16	0,13	0,22	0,19	0,20	0,22								
		CI Anteil in %		[0,21; 0,47]	[0,31; 0,64]	[0,07; 0,28]	[0,05; 0,26]	[0,03; 0,23]	[0,09; 0,35]	[0,07; 0,32]	[0,07; 0,34]	[0,08; 0,37]								
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		23	25	9	8	7	9	6	7	8								
		Anteil in %		85,19	75,76	81,82	88,89	100,00	81,82	66,67	77,78	88,89								
		CI Anteil in %		[71,53; 98,84]	[60,91; 90,61]	[57,91; 100,00]	[67,11; 100,00]	[100,00; 100,00]	[57,91; 100,00]	[34,00; 99,33]	[48,97; 100,00]	[67,11; 100,00]								
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		11	18	5	3	4	4	5	3	5								
		Anteil in %		40,74	54,55	45,45	33,33	57,14	36,36	55,56	33,33	55,56								
		CI Anteil in %		[21,85; 59,63]	[37,29; 71,80]	[14,59; 76,32]	[0,67; 66,00]	[17,54; 96,74]	[6,55; 66,18]	[21,12; 89,99]	[0,67; 66,00]	[21,12; 89,99]								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,68</b>	<b>99,25</b>	<b>99,10</b>	<b>98,95</b>	<b>98,84</b>	<b>98,64</b>	<b>98,46</b>	<b>98,27</b>	<b>98,06</b>								
		CI		[99,56; 99,80]	[99,06; 99,44]	[98,89; 99,31]	[98,72; 99,18]	[98,60; 99,08]	[98,37; 98,91]	[98,17; 98,75]	[97,95; 98,59]	[97,71; 98,41]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>									
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9014	8061	7362	6626	6163	5803	5487	5211	4948									
	auswertbar	Anzahl		7158	6412	5676	5290	4925	4650	4326	4067									
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		33	14	9	12	7	12	3	7									
		Anteil in %		0,46	0,22	0,16	0,23	0,14	0,26	0,07	0,17									
		CI Anteil in %		[0,30; 0,62]	[0,10; 0,33]	[0,06; 0,26]	[0,10; 0,36]	[0,04; 0,25]	[0,11; 0,40]	[0,00; 0,15]	[0,04; 0,30]									
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		30	11	8	8	6	9	3	6									
		Anteil in %		90,91	78,57	88,89	66,67	85,71	75,00	100,00	85,71									
		CI Anteil in %		[80,95; 100,00]	[56,27; 100,00]	[67,11; 100,00]	[38,81; 94,52]	[57,71; 100,00]	[49,41; 100,00]	[100,00; 100,00]	[57,71; 100,00]									
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		13	5	2	7	4	5	2	2									
		Anteil in %		39,39	35,71	22,22	58,33	57,14	41,67	66,67	28,57									
		CI Anteil in %		[22,46; 56,32]	[9,67; 61,76]	[0,00; 51,03]	[29,20; 87,47]	[17,54; 96,74]	[12,53; 70,80]	[1,33; 100,00]	[0,00; 64,72]									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,58</b>	<b>99,37</b>	<b>99,23</b>	<b>99,02</b>	<b>98,89</b>	<b>98,65</b>	<b>98,59</b>	<b>98,42</b>									
		CI		[99,44; 99,72]	[99,19; 99,55]	[99,03; 99,43]	[98,79; 99,25]	[98,64; 99,14]	[98,37; 98,93]	[98,30; 98,88]	[98,10; 98,74]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>										
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	5727	5124	4544	4159	3921	3682	3486	3292										
	auswertbar	Anzahl		4674	4074	3704	3461	3231	3013	2834										
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		11	9	6	2	5	4	3										
		Anteil in %		0,24	0,22	0,16	0,06	0,15	0,13	0,11										
		CI Anteil in %		[0,10; 0,37]	[0,08; 0,37]	[0,03; 0,29]	[0,00; 0,14]	[0,02; 0,29]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,23]										
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		9	5	5	2	3	3	2										
		Anteil in %		81,82	55,56	83,33	100,00	60,00	75,00	66,67										
		CI Anteil in %		[57,91; 100,00]	[21,12; 89,99]	[50,67; 100,00]	[100,00; 100,00]	[11,99; 100,00]	[26,00; 100,00]	[1,33; 100,00]										
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		5	6	3	0	2	1	1										
		Anteil in %		45,45	66,67	50,00	0,00	40,00	25,00	33,33										
		CI Anteil in %		[14,59; 76,32]	[34,00; 99,33]	[6,17; 93,83]	[0,00; 0,00]	[0,00; 88,01]	[0,00; 74,00]	[0,00; 98,67]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,78</b>	<b>99,57</b>	<b>99,42</b>	<b>99,37</b>	<b>99,22</b>	<b>99,10</b>	<b>98,99</b>										
		CI		[99,65; 99,91]	[99,38; 99,76]	[99,20; 99,64]	[99,13; 99,61]	[99,95; 99,49]	[98,95; 99,39]	[98,81; 99,31]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>											

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7329	6331	5657	5212	4851	4561	4283											
	auswertbar	Anzahl		5668	5056	4507	4201	3886	3621											
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		14	8	8	10	4	2											
		Anteil in %		0,25	0,16	0,18	0,24	0,10	0,06											
		CI Anteil in %		[0,12; 0,38]	[0,05; 0,27]	[0,05; 0,30]	[0,09; 0,39]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,13]											
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		12	4	7	8	3	0											
		Anteil in %		85,71	50,00	87,50	80,00	75,00	0,00											
		CI Anteil in %		[66,69; 100,00]	[12,96; 87,04]	[63,00; 100,00]	[53,87; 100,00]	[26,00; 100,00]	[0,00; 0,00]											
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		8	4	1	5	2	2											
		Anteil in %		57,14	50,00	12,50	50,00	50,00	100,00											
		CI Anteil in %		[30,24; 84,04]	[12,96; 87,04]	[0,00; 37,00]	[17,33; 82,67]	[0,00; 100,00]	[100,00; 100,00]											
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,77</b>	<b>99,62</b>	<b>99,46</b>	<b>99,23</b>	<b>99,14</b>	<b>99,08</b>												
	CI		[99,65; 99,89]	[99,46; 99,78]	[99,27; 99,65]	[98,99; 99,47]	[98,88; 99,40]	[98,81; 99,35]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	5960	5287	4764	4380	4050	3782												
	auswertbar	Anzahl		4849	4222	3806	3470	3262												
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		19	5	5	4	6												
		Anteil in %		0,39	0,12	0,13	0,12	0,18												
		CI Anteil in %		[0,22; 0,57]	[0,01; 0,22]	[0,02; 0,25]	[0,00; 0,23]	[0,04; 0,33]												
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		15	5	3	3	4												
		Anteil in %		78,95	100,00	60,00	75,00	66,67												
		CI Anteil in %		[60,11; 97,78]	[100,00; 100,00]	[11,99; 100,00]	[26,00; 100,00]	[25,35; 100,00]												
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		12	0	2	2	4												
		Anteil in %		63,16	0,00	40,00	50,00	66,67												
		CI Anteil in %		[40,87; 85,44]	[0,00; 0,00]	[0,00; 88,01]	[0,00; 100,00]	[25,35; 100,00]												
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,63</b>	<b>99,52</b>	<b>99,40</b>	<b>99,29</b>	<b>99,11</b>													
	CI		[99,46; 99,80]	[99,33; 99,71]	[99,18; 99,62]	[99,05; 99,53]	[98,83; 99,39]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6941	6178	5647	5157	4785													
	auswertbar	Anzahl		5619	5017	4449	4183													
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		8	6	5	5													
		Anteil in %		0,14	0,12	0,11	0,12													
		CI Anteil in %		[0,04; 0,24]	[0,02; 0,22]	[0,01; 0,21]	[0,01; 0,22]													
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		5	5	3	4													
		Anteil in %		62,50	83,33	60,00	80,00													
		CI Anteil in %		[26,64; 98,36]	[50,67; 100,00]	[11,99; 100,00]	[40,80; 100,00]													
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		4	4	3	2													
		Anteil in %		50,00	66,67	60,00	40,00													
		CI Anteil in %		[12,96; 87,04]	[25,35; 100,00]	[11,99; 100,00]	[0,00; 88,01]													
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,87</b>	<b>99,75</b>	<b>99,65</b>	<b>99,53</b>														
	CI		[99,78; 99,96]	[99,62; 99,88]	[99,49; 99,81]	[99,34; 99,72]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>														



EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6364	5702	5099	4662															
	auswertbar	Anzahl		5207	4476	4008															
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		12	7	3															
		Anteil in %		0,23	0,16	0,07															
		CI Anteil in %		[0,10; 0,36]	[0,04; 0,27]	[0,00; 0,16]															
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		11	5	2															
		Anteil in %		91,67	71,43	66,67															
		CI Anteil in %		[75,33; 100,00]	[35,28; 100,00]	[1,33; 100,00]															
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		2	2	2															
		Anteil in %		16,67	28,57	66,67															
		CI Anteil in %		[0,00; 38,69]	[0,00; 64,72]	[1,33; 100,00]															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>99,78</b>	<b>99,63</b>	<b>99,56</b>															
		CI		[99,66; 99,90]	[99,46; 99,80]	[99,37; 99,75]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>															
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6848	6056	5456																
	auswertbar	Anzahl		5441	4781																
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		11	5																
		Anteil in %		0,20	0,10																
		CI Anteil in %		[0,08; 0,32]	[0,01; 0,20]																
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		9	4																
		Anteil in %		81,82	80,00																
		CI Anteil in %		[57,91; 100,00]	[40,80; 100,00]																
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		5	2																
		Anteil in %		45,45	40,00																
		CI Anteil in %		[14,59; 76,32]	[0,00; 88,01]																
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>99,81</b>	<b>99,70</b>																
		CI		[99,70; 99,92]	[99,55; 99,85]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	5846	5104																	
	auswertbar	Anzahl		4578																	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		10																	
		Anteil in %		0,22																	
		CI Anteil in %		[0,08; 0,35]																	
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		8																	
		Anteil in %		80,00																	
		CI Anteil in %		[53,87; 100,00]																	
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		3																	
		Anteil in %		30,00																	
		CI Anteil in %		[0,06; 59,94]																	
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>99,78</b>																	
		CI		[99,64; 99,92]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7608</i>	<i>6653</i>																	

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	5958																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmals aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>																			
	CI																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	7836																		

In Tabelle 3.5.4 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Amputation** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Amputation erfolgt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Amputation durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine

erstmalig vorgenommene Amputation dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierten „Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 14 Patienten eingeschrieben. Bei 13 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Amputation durchgeführt wurden. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch - - Mitglieder. Bei - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei - - Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr erstmalig eine Amputation durchgeführt.

**Tabelle 3.5.4 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation**

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	4768	3915	3339	2848	2437	2169	1961	1785	1708	1646	1592	1532	1462	1391	1346	1294	1250	1190	
	auswertbar	Anzahl		3578	3241	2772	2399	2130	1935	1716	1642	1575	1555	1497	1438	1367	1326	1276	1229	1155	
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		1	5	1	4	1	3	1	2	0	6	0	1	1	1	1	1	1	1
		Anteil in %		0,03	0,15	0,04	0,17	0,05	0,16	0,06	0,12	0,00	0,39	0,00	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,97</b>	<b>99,82</b>	<b>99,79</b>	<b>99,63</b>	<b>99,58</b>	<b>99,43</b>	<b>99,37</b>	<b>99,26</b>	<b>99,26</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>	<b>98,82</b>	<b>98,75</b>	<b>98,67</b>	<b>98,60</b>	<b>98,52</b>	<b>98,44</b>	
		CI		[99,92; 100,00]	[99,68; 99,96]	[99,63; 99,95]	[99,41; 99,85]	[99,34; 99,82]	[99,14; 99,72]	[99,06; 99,68]	[98,91; 99,61]	[98,91; 99,61]	[98,43; 99,35]	[98,43; 99,35]	[98,34; 99,30]	[98,25; 99,25]	[98,15; 99,19]	[98,06; 99,14]	[97,96; 99,08]	[97,86; 99,02]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11930	10030	8297	7019	6313	5624	5095	4825	4639	4464	4268	4041	3872	3725	3548	3385	3235		
	auswertbar	Anzahl		8908	7880	6837	6165	5513	4818	4552	4404	4345	4176	3983	3802	3664	3483	3327	3137		
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		10	4	6	1	2	4	1	4	8	6	2	5	4	1	3	3	3	
		Anteil in %		0,11	0,05	0,09	0,02	0,04	0,08	0,02	0,09	0,18	0,14	0,14	0,05	0,13	0,11	0,03	0,09	0,10	
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,89</b>	<b>99,85</b>	<b>99,76</b>	<b>99,74</b>	<b>99,71</b>	<b>99,63</b>	<b>99,61</b>	<b>99,52</b>	<b>99,34</b>	<b>99,20</b>	<b>99,15</b>	<b>99,02</b>	<b>98,91</b>	<b>98,89</b>	<b>98,80</b>	<b>98,70</b>		
		CI		[99,82; 99,96]	[99,77; 99,93]	[99,65; 99,87]	[99,63; 99,85]	[99,59; 99,83]	[99,49; 99,77]	[99,46; 99,76]	[99,35; 99,69]	[99,13; 99,55]	[98,96; 99,44]	[98,96; 99,40]	[98,75; 99,29]	[98,62; 99,20]	[98,59; 99,19]	[98,49; 99,11]	[98,37; 99,03]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			
2004-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	14875	12497	10428	9019	7879	7164	6843	6495	6151	5847	5512	5220	4986	4770	4570	4347			
	auswertbar	Anzahl		11582	10087	8740	7662	6832	6531	6198	5961	5701	5404	5122	4888	4674	4483	4257			
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		18	14	10	1	3	4	5	9	3	4	5	3	3	5	3			
		Anteil in %		0,16	0,14	0,11	0,01	0,04	0,06	0,08	0,15	0,05	0,07	0,10	0,06	0,06	0,11	0,07			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,85</b>	<b>99,72</b>	<b>99,60</b>	<b>99,59</b>	<b>99,55</b>	<b>99,49</b>	<b>99,41</b>	<b>99,26</b>	<b>99,21</b>	<b>99,14</b>	<b>99,04</b>	<b>98,98</b>	<b>98,92</b>	<b>98,81</b>	<b>98,74</b>			
		CI		[99,78; 99,92]	[99,62; 99,82]	[99,48; 99,72]	[99,47; 99,71]	[99,42; 99,68]	[99,35; 99,63]	[99,25; 99,57]	[99,07; 99,45]	[99,02; 99,40]	[98,93; 99,35]	[98,82; 99,26]	[98,75; 99,21]	[98,68; 99,16]	[98,55; 99,07]	[98,47; 99,01]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>				
2005-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11578	9908	8578	7392	6647	6229	5906	5626	5330	5026	4794	4598	4388	4195	4010				
	auswertbar	Anzahl		9422	8218	7174	6324	5918	5619	5436	5186	4915	4677	4507	4294	4105	3894				
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		9	4	5	3	5	2	8	1	2	1	7	0	3	4				
		Anteil in %		0,10	0,05	0,07	0,05	0,08	0,04	0,15	0,02	0,04	0,02	0,16	0,00	0,07	0,10				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,91</b>	<b>99,86</b>	<b>99,79</b>	<b>99,75</b>	<b>99,66</b>	<b>99,63</b>	<b>99,49</b>	<b>99,47</b>	<b>99,43</b>	<b>99,41</b>	<b>99,25</b>	<b>99,25</b>	<b>99,18</b>	<b>99,08</b>				
		CI		[99,85; 99,97]	[99,78; 99,94]	[99,69; 99,89]	[99,64; 99,86]	[99,53; 99,79]	[99,49; 99,77]	[99,32; 99,66]	[99,30; 99,64]	[99,25; 99,61]	[99,22; 99,60]	[99,22; 99,47]	[99,03; 99,47]	[98,95; 99,41]	[98,83; 99,33]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>					

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	14104	12415	10684	9420	8803	8288	7820	7366	6871	6520	6190	5908	5647	5360				
	auswertbar	Anzahl		11652	10231	8884	8306	7822	7515	7158	6708	6362	6059	5764	5511	5232				
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		16	6	7	5	3	12	9	3	4	2	4	5	5				
		Anteil in %		0,14	0,06	0,08	0,06	0,04	0,16	0,13	0,04	0,06	0,03	0,07	0,09	0,10				
		CI Anteil in %		[0,07; 0,20]	[0,01; 0,11]	[0,02; 0,14]	[0,01; 0,11]	[0,00; 0,08]	[0,07; 0,25]	[0,04; 0,21]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,14]	[0,01; 0,17]	[0,01; 0,18]				
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,87</b>	<b>99,81</b>	<b>99,74</b>	<b>99,68</b>	<b>99,64</b>	<b>99,49</b>	<b>99,36</b>	<b>99,32</b>	<b>99,26</b>	<b>99,22</b>	<b>99,16</b>	<b>99,07</b>	<b>98,97</b>					
	CI		[99,81; 99,93]	[99,73; 99,89]	[99,64; 99,84]	[99,57; 99,79]	[99,52; 99,76]	[99,34; 99,64]	[99,19; 99,53]	[99,15; 99,49]	[99,08; 99,44]	[99,03; 99,41]	[98,96; 99,36]	[98,85; 99,29]	[98,74; 99,20]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>				
2006-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13154	11239	9804	9028	8466	7960	7505	6971	6592	6280	5953	5646	5395					
	auswertbar	Anzahl		10777	9156	8508	7982	7646	7297	6750	6415	6127	5791	5516	5209					
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		9	4	3	6	24	10	2	7	7	7	1	1					
		Anteil in %		0,08	0,04	0,04	0,08	0,31	0,14	0,03	0,11	0,11	0,12	0,02	0,02					
		CI Anteil in %		[0,03; 0,14]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,08]	[0,02; 0,14]	[0,19; 0,44]	[0,05; 0,22]	[0,00; 0,07]	[0,03; 0,19]	[0,03; 0,20]	[0,03; 0,21]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,06]					
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,92</b>	<b>99,88</b>	<b>99,84</b>	<b>99,77</b>	<b>99,47</b>	<b>99,33</b>	<b>99,30</b>	<b>99,19</b>	<b>99,08</b>	<b>98,96</b>	<b>98,95</b>	<b>98,93</b>						
	CI		[99,87; 99,97]	[99,81; 99,95]	[99,76; 99,92]	[99,67; 99,87]	[99,32; 99,62]	[99,15; 99,51]	[99,12; 99,48]	[98,99; 99,39]	[98,87; 99,29]	[98,73; 99,19]	[98,72; 99,18]	[98,69; 99,17]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>					
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11657	10327	9304	8611	8091	7571	7003	6623	6261	5947	5694	5412						
	auswertbar	Anzahl		9761	8763	8159	7701	7335	6810	6411	6093	5784	5532	5233						
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		6	13	5	14	8	5	8	5	4	5	5						
		Anteil in %		0,06	0,15	0,06	0,18	0,11	0,07	0,12	0,08	0,07	0,09	0,10						
		CI Anteil in %		[0,01; 0,11]	[0,07; 0,23]	[0,01; 0,11]	[0,09; 0,28]	[0,03; 0,18]	[0,01; 0,14]	[0,04; 0,21]	[0,01; 0,15]	[0,00; 0,14]	[0,01; 0,17]	[0,01; 0,18]						
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,94</b>	<b>99,80</b>	<b>99,74</b>	<b>99,56</b>	<b>99,46</b>	<b>99,38</b>	<b>99,26</b>	<b>99,18</b>	<b>99,11</b>	<b>99,02</b>	<b>98,93</b>							
	CI		[99,89; 99,99]	[99,71; 99,89]	[99,64; 99,84]	[99,42; 99,70]	[99,30; 99,62]	[99,21; 99,55]	[99,07; 99,45]	[98,98; 99,38]	[98,90; 99,32]	[98,79; 99,25]	[98,69; 99,17]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>						
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12994	11656	10673	9880	9210	8489	7971	7547	7195	6825	6462							
	auswertbar	Anzahl		11297	10287	9319	8824	8136	7640	7248	6870	6500	6114							
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		10	8	17	7	6	3	3	6	3	4							
		Anteil in %		0,09	0,08	0,18	0,08	0,07	0,04	0,04	0,09	0,05	0,07							
		CI Anteil in %		[0,03; 0,14]	[0,02; 0,13]	[0,10; 0,27]	[0,02; 0,14]	[0,01; 0,13]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,09]	[0,02; 0,16]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,13]							
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,91</b>	<b>99,84</b>	<b>99,66</b>	<b>99,58</b>	<b>99,51</b>	<b>99,47</b>	<b>99,43</b>	<b>99,34</b>	<b>99,30</b>	<b>99,23</b>								
	CI		[99,86; 99,96]	[99,76; 99,92]	[99,55; 99,77]	[99,45; 99,71]	[99,37; 99,65]	[99,32; 99,62]	[99,28; 99,58]	[99,17; 99,51]	[99,12; 99,48]	[99,04; 99,42]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>							
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11234	10184	9318	8561	7809	7329	6893	6501	6153	5811								
	auswertbar	Anzahl		9934	8852	8291	7619	7124	6698	6294	5982	5594								
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		9	11	6	6	3	11	6	6	3								
		Anteil in %		0,09	0,12	0,07	0,08	0,04	0,16	0,10	0,10	0,05								
		CI Anteil in %		[0,03; 0,15]	[0,05; 0,20]	[0,01; 0,13]	[0,02; 0,14]	[0,00; 0,09]	[0,07; 0,26]	[0,02; 0,17]	[0,02; 0,18]	[0,00; 0,11]								
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,91</b>	<b>99,79</b>	<b>99,72</b>	<b>99,64</b>	<b>99,60</b>	<b>99,44</b>	<b>99,34</b>	<b>99,24</b>	<b>99,19</b>									
	CI		[99,85; 99,97]	[99,70; 99,88]	[99,61; 99,83]	[99,52; 99,76]	[99,47; 99,73]	[99,28; 99,60]	[99,16; 99,52]	[99,04; 99,44]	[98,98; 99,40]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>								
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10619	9477	8658	7762	7216	6801	6423	6100	5789									
	auswertbar	Anzahl		9032	8367	7563	7016	6635	6238	5942	5569									
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		14	6	2	7	6	2	3	3									
		Anteil in %		0,16	0,07	0,03	0,10	0,09	0,03	0,05	0,05									
		CI Anteil in %		[0,07; 0,24]	[0,01; 0,13]	[0,00; 0,06]	[0,03; 0,17]	[0,02; 0,16]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,11]									
<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,85</b>	<b>99,78</b>	<b>99,75</b>	<b>99,65</b>	<b>99,57</b>	<b>99,53</b>	<b>99,48</b>	<b>99,43</b>										
	CI		[99,77; 99,93]	[99,68; 99,88]	[99,65; 99,85]	[99,52; 99,78]	[99,42; 99,72]	[99,38; 99,68]	[99,32; 99,64]	[99,26; 99,60]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>									

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6825	6078	5382	4924	4625	4341	4115	3894										
	auswertbar	Anzahl		5933	5267	4820	4543	4250	4015	3762										
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		8	2	2	5	3	2	3										
		Anteil in %		0,13	0,04	0,04	0,11	0,07	0,05	0,08										
		CI Anteil in %		[0,04; 0,23]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,10]	[0,01; 0,21]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,17]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,87</b>	<b>99,83</b>	<b>99,79</b>	<b>99,68</b>	<b>99,61</b>	<b>99,56</b>	<b>99,48</b>										
	CI		[99,78; 99,96]	[99,72; 99,94]	[99,67; 99,91]	[99,53; 99,83]	[99,44; 99,78]	[99,37; 99,75]	[99,27; 99,69]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>											
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9336	8066	7230	6620	6161	5784	5438											
	auswertbar	Anzahl		7877	7076	6495	6026	5666	5297											
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		8	4	3	4	5	5											
		Anteil in %		0,10	0,06	0,05	0,07	0,09	0,09											
		CI Anteil in %		[0,03; 0,17]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,13]	[0,01; 0,17]	[0,01; 0,18]											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,90</b>	<b>99,84</b>	<b>99,80</b>	<b>99,73</b>	<b>99,64</b>	<b>99,55</b>											
	CI		[99,83; 99,97]	[99,75; 99,93]	[99,70; 99,90]	[99,61; 99,85]	[99,50; 99,78]	[99,39; 99,71]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7442	6596	5948	5458	5042	4710												
	auswertbar	Anzahl		6484	5847	5349	4949	4612												
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		14	3	3	0	2												
		Anteil in %		0,22	0,05	0,06	0,00	0,04												
		CI Anteil in %		[0,10; 0,33]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,10]												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,79</b>	<b>99,74</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>	<b>99,64</b>												
	CI		[99,68; 99,90]	[99,61; 99,87]	[99,54; 99,82]	[99,54; 99,82]	[99,49; 99,79]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8691	7698	6994	6373	5910													
	auswertbar	Anzahl		7584	6853	6244	5769													
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		5	6	5	3													
		Anteil in %		0,07	0,09	0,08	0,05													
		CI Anteil in %		[0,01; 0,12]	[0,02; 0,16]	[0,01; 0,15]	[0,00; 0,11]													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,93</b>	<b>99,85</b>	<b>99,77</b>	<b>99,72</b>													
	CI		[99,87; 99,99]	[99,76; 99,94]	[99,66; 99,88]	[99,59; 99,85]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>														
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8067	7199	6450	5895														
	auswertbar	Anzahl		7099	6352	5755														
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		8	3	1														
		Anteil in %		0,11	0,05	0,02														
		CI Anteil in %		[0,03; 0,19]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,05]														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,89</b>	<b>99,84</b>	<b>99,82</b>														
	CI		[99,81; 99,97]	[99,75; 99,93]	[99,72; 99,92]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>															
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8584	7581	6804															
	auswertbar	Anzahl		7436	6636															
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		7	5															
		Anteil in %		0,09	0,08															
		CI Anteil in %		[0,02; 0,16]	[0,01; 0,14]															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,91</b>	<b>99,83</b>															
	CI		[99,84; 99,98]	[99,73; 99,93]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7572	6622																	
	auswertbar	Anzahl		6478																	
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		5																	
		Anteil in %		0,08																	
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	CI Anteil in %		[0,01; 0,14]																	
		<b>Rate</b>		<b>99,92</b>																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																		
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7797																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl																			
		Anteil in %																			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	CI Anteil in %																			
		<b>Rate</b>																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																			

In Tabelle 3.5.5 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Herzinfarkt** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Herzinfarkt hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Herzinfarkt dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein erstmalig

aufgetretener Herzinfarkt dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 14 Patienten eingeschrieben. Bei 11 dieser Personen war laut Erstdokumentation kein Herzinfarkt dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch - - Mitglieder. Bei - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei - - Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener Herzinfarkt dokumentiert.

**Tabelle 3.5.5 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	4319	3546	3009	2567	2190	1944	1759	1617	1552	1491	1443	1393	1331	1270	1227	1178	1132	1077	
	auswertbar	Anzahl		3252	2919	2497	2156	1912	1736	1559	1491	1432	1408	1360	1309	1249	1209	1162	1114	1048	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		22	15	10	6	3	2	3	1	1	1	3	1	2	4	4	0	1	
		Anteil in %		0,68	0,51	0,40	0,28	0,16	0,12	0,19	0,07	0,07	0,07	0,22	0,08	0,16	0,33	0,34	0,00	0,10	
		CI Anteil in %		[0,39; 0,96]	[0,25; 0,77]	[0,15; 0,65]	[0,06; 0,50]	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,41]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,47]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,38]	[0,01; 0,65]	[0,01; 0,68]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,28]	
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,38</b>	<b>98,88</b>	<b>98,46</b>	<b>98,19</b>	<b>98,04</b>	<b>97,93</b>	<b>97,75</b>	<b>97,69</b>	<b>97,62</b>	<b>97,56</b>	<b>97,35</b>	<b>97,27</b>	<b>97,12</b>	<b>96,80</b>	<b>96,48</b>	<b>96,48</b>	<b>96,48</b>	<b>96,39</b>
CI			[99,12; 99,64]	[98,52; 99,24]	[98,02; 98,90]	[97,71; 98,67]	[97,53; 98,55]	[97,40; 98,46]	[97,18; 98,32]	[97,11; 98,27]	[97,02; 98,22]	[96,95; 98,17]	[96,70; 98,00]	[96,60; 97,94]	[96,42; 97,82]	[96,04; 97,56]	[95,65; 97,31]	[95,65; 97,31]	[95,55; 97,23]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10967	9235	7610	6420	5780	5157	4674	4422	4250	4102	3914	3709	3560	3431	3269	3118	2983		
	auswertbar	Anzahl		8202	7230	6251	5648	5061	4420	4178	4044	3993	3828	3660	3494	3377	3215	3066	2899		
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		52	18	11	10	8	9	8	5	14	6	6	5	4	9	7	2		
		Anteil in %		0,63	0,25	0,18	0,18	0,16	0,20	0,19	0,12	0,35	0,16	0,16	0,14	0,12	0,28	0,23	0,07		
		CI Anteil in %		[0,46; 0,81]	[0,13; 0,36]	[0,07; 0,28]	[0,07; 0,29]	[0,05; 0,27]	[0,07; 0,34]	[0,06; 0,32]	[0,02; 0,23]	[0,17; 0,53]	[0,03; 0,28]	[0,03; 0,30]	[0,02; 0,27]	[0,00; 0,23]	[0,10; 0,46]	[0,06; 0,40]	[0,00; 0,16]		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,40</b>	<b>99,16</b>	<b>98,99</b>	<b>98,82</b>	<b>98,67</b>	<b>98,47</b>	<b>98,29</b>	<b>98,18</b>	<b>97,84</b>	<b>97,69</b>	<b>97,53</b>	<b>97,39</b>	<b>97,28</b>	<b>97,01</b>	<b>96,79</b>	<b>96,72</b>		
CI			[99,24; 99,56]	[98,96; 99,36]	[98,77; 99,21]	[98,58; 99,06]	[98,40; 98,94]	[98,18; 98,76]	[97,97; 98,61]	[97,85; 98,51]	[97,46; 98,22]	[97,29; 98,09]	[97,12; 97,94]	[96,96; 97,82]	[96,83; 97,73]	[96,53; 97,49]	[96,29; 97,29]	[96,21; 97,23]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			
2004-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13891	11677	9715	8387	7310	6618	6321	5995	5670	5375	5075	4812	4595	4405	4227	4030			
	auswertbar	Anzahl		10821	9400	8134	7111	6308	6029	5708	5495	5238	4974	4723	4512	4327	4145	3947			
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		47	18	20	23	10	8	10	16	15	9	10	10	9	4	8			
		Anteil in %		0,43	0,19	0,25	0,32	0,16	0,13	0,18	0,29	0,29	0,18	0,21	0,22	0,21	0,10	0,20			
		CI Anteil in %		[0,31; 0,56]	[0,10; 0,28]	[0,14; 0,35]	[0,19; 0,46]	[0,06; 0,26]	[0,04; 0,22]	[0,07; 0,28]	[0,15; 0,43]	[0,14; 0,43]	[0,06; 0,30]	[0,08; 0,34]	[0,08; 0,36]	[0,07; 0,34]	[0,00; 0,19]	[0,06; 0,34]			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,59</b>	<b>99,40</b>	<b>99,16</b>	<b>98,84</b>	<b>98,69</b>	<b>98,56</b>	<b>98,40</b>	<b>98,12</b>	<b>97,84</b>	<b>97,66</b>	<b>97,46</b>	<b>97,24</b>	<b>97,04</b>	<b>96,95</b>	<b>96,75</b>			
CI			[99,47; 99,71]	[99,25; 99,55]	[98,98; 99,34]	[98,62; 99,06]	[98,45; 98,93]	[98,31; 98,81]	[98,13; 98,67]	[97,81; 98,43]	[97,50; 98,18]	[97,31; 98,01]	[97,08; 97,84]	[96,84; 97,64]	[96,62; 97,46]	[96,52; 97,38]	[96,30; 97,20]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>				
2005-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10755	9169	7919	6819	6134	5743	5452	5179	4902	4624	4421	4238	4051	3865	3703				
	auswertbar	Anzahl		8720	7592	6616	5845	5456	5187	5006	4773	4520	4312	4156	3963	3787	3599				
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		34	17	10	9	4	14	15	23	4	6	6	4	10	5				
		Anteil in %		0,39	0,22	0,15	0,15	0,07	0,27	0,30	0,48	0,09	0,14	0,14	0,10	0,26	0,14				
		CI Anteil in %		[0,26; 0,52]	[0,12; 0,33]	[0,06; 0,24]	[0,05; 0,25]	[0,00; 0,15]	[0,13; 0,41]	[0,15; 0,45]	[0,29; 0,68]	[0,00; 0,18]	[0,03; 0,25]	[0,03; 0,26]	[0,00; 0,20]	[0,10; 0,43]	[0,02; 0,26]				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,62</b>	<b>99,40</b>	<b>99,26</b>	<b>99,11</b>	<b>99,04</b>	<b>98,78</b>	<b>98,49</b>	<b>98,02</b>	<b>97,94</b>	<b>97,80</b>	<b>97,66</b>	<b>97,56</b>	<b>97,31</b>	<b>97,17</b>				
CI			[99,49; 99,75]	[99,24; 99,56]	[99,07; 99,45]	[98,90; 99,32]	[98,82; 99,26]	[98,52; 99,04]	[98,19; 98,79]	[97,67; 98,37]	[97,58; 98,30]	[97,42; 98,18]	[97,27; 98,05]	[97,16; 97,96]	[96,88; 97,74]	[96,72; 97,62]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>					

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13238	11638	9992	8795	8205	7719	7267	6848	6416	6103	5788	5519	5269	5000				
	auswertbar	Anzahl		10929	9561	8292	7738	7288	6996	6655	6269	5955	5661	5386	5147	4881				
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		47	23	24	17	19	23	13	9	12	10	10	7	11				
		Anteil in %		0,43	0,24	0,29	0,22	0,26	0,33	0,20	0,14	0,20	0,18	0,19	0,14	0,23				
		CI Anteil in %		[0,31; 0,55]	[0,14; 0,34]	[0,17; 0,41]	[0,12; 0,32]	[0,14; 0,38]	[0,19; 0,46]	[0,09; 0,30]	[0,05; 0,24]	[0,09; 0,32]	[0,07; 0,29]	[0,07; 0,30]	[0,04; 0,24]	[0,09; 0,36]				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,59</b>	<b>99,35</b>	<b>99,08</b>	<b>98,87</b>	<b>98,62</b>	<b>98,31</b>	<b>98,12</b>	<b>97,98</b>	<b>97,78</b>	<b>97,61</b>	<b>97,43</b>	<b>97,30</b>	<b>97,08</b>				
CI			[99,47; 99,71]	[99,20; 99,50]	[98,89; 99,27]	[98,66; 99,08]	[98,38; 98,86]	[98,04; 98,58]	[97,83; 98,41]	[97,68; 98,28]	[97,46; 98,10]	[97,27; 97,95]	[97,07; 97,79]	[96,93; 97,67]	[96,69; 97,47]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>				
2006-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12351	10536	9174	8447	7913	7435	7004	6516	6146	5853	5554	5263	5021					
	auswertbar	Anzahl		10117	8572	7963	7454	7145	6815	6311	5989	5713	5403	5139	4848					
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		42	21	14	7	32	19	15	14	5	11	11	3					
		Anteil in %		0,42	0,24	0,18	0,09	0,45	0,28	0,24	0,23	0,09	0,20	0,21	0,06					
		CI Anteil in %		[0,29; 0,54]	[0,14; 0,35]	[0,08; 0,27]	[0,02; 0,16]	[0,29; 0,60]	[0,15; 0,40]	[0,12; 0,36]	[0,11; 0,36]	[0,01; 0,16]	[0,08; 0,32]	[0,09; 0,34]	[0,00; 0,13]					
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,60</b>	<b>99,36</b>	<b>99,19</b>	<b>99,11</b>	<b>98,67</b>	<b>98,40</b>	<b>98,17</b>	<b>97,94</b>	<b>97,86</b>	<b>97,66</b>	<b>97,45</b>	<b>97,39</b>					
CI			[99,48; 99,72]	[99,20; 99,52]	[99,01; 99,37]	[98,92; 99,30]	[98,43; 98,91]	[98,13; 98,67]	[97,88; 98,46]	[97,62; 98,26]	[97,53; 98,19]	[97,32; 98,00]	[97,08; 97,82]	[97,02; 97,76]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>					
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10879	9630	8654	8011	7520	7046	6543	6189	5868	5574	5326	5068						
	auswertbar	Anzahl		9095	8167	7597	7168	6826	6366	5994	5716	5419	5171	4898						
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		39	19	15	18	14	11	11	11	9	9	8						
		Anteil in %		0,43	0,23	0,20	0,25	0,21	0,17	0,18	0,19	0,20	0,17	0,16						
		CI Anteil in %		[0,29; 0,56]	[0,13; 0,34]	[0,10; 0,30]	[0,14; 0,37]	[0,10; 0,31]	[0,07; 0,27]	[0,08; 0,29]	[0,08; 0,31]	[0,08; 0,32]	[0,06; 0,29]	[0,05; 0,28]						
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,59</b>	<b>99,37</b>	<b>99,18</b>	<b>98,94</b>	<b>98,74</b>	<b>98,57</b>	<b>98,39</b>	<b>98,20</b>	<b>98,00</b>	<b>97,83</b>	<b>97,67</b>						
CI			[99,46; 99,72]	[99,21; 99,53]	[98,99; 99,37]	[98,72; 99,16]	[98,50; 98,98]	[98,31; 98,83]	[98,11; 98,67]	[97,90; 98,50]	[97,68; 98,32]	[97,49; 98,17]	[97,31; 98,03]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>						
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12175	10921	9959	9211	8562	7915	7439	7035	6708	6371	6050							
	auswertbar	Anzahl		10583	9604	8677	8205	7585	7121	6755	6409	6067	5726							
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		35	16	42	23	16	13	9	7	3	11							
		Anteil in %		0,33	0,17	0,48	0,28	0,21	0,18	0,13	0,11	0,05	0,19							
		CI Anteil in %		[0,22; 0,44]	[0,09; 0,25]	[0,34; 0,63]	[0,17; 0,39]	[0,11; 0,31]	[0,08; 0,28]	[0,05; 0,22]	[0,03; 0,19]	[0,00; 0,11]	[0,08; 0,31]							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,68</b>	<b>99,51</b>	<b>99,05</b>	<b>98,77</b>	<b>98,57</b>	<b>98,39</b>	<b>98,26</b>	<b>98,15</b>	<b>98,10</b>	<b>97,91</b>							
CI			[99,57; 99,79]	[99,38; 99,64]	[98,86; 99,24]	[98,55; 98,99]	[98,33; 98,81]	[98,13; 98,65]	[97,98; 98,54]	[97,86; 98,44]	[97,81; 98,39]	[97,60; 98,22]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>							
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10551	9572	8764	8027	7355	6913	6509	6140	5806	5476								
	auswertbar	Anzahl		9333	8318	7774	7177	6722	6330	5950	5650	5281								
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		16	39	11	16	7	12	9	14	7								
		Anteil in %		0,17	0,47	0,14	0,22	0,10	0,19	0,15	0,25	0,13								
		CI Anteil in %		[0,09; 0,26]	[0,32; 0,62]	[0,06; 0,23]	[0,11; 0,33]	[0,03; 0,18]	[0,08; 0,30]	[0,05; 0,25]	[0,12; 0,38]	[0,03; 0,23]								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,83</b>	<b>99,38</b>	<b>99,24</b>	<b>99,02</b>	<b>98,92</b>	<b>98,73</b>	<b>98,58</b>	<b>98,34</b>	<b>98,21</b>								
CI			[99,75; 99,91]	[99,22; 99,54]	[99,06; 99,42]	[98,81; 99,23]	[98,70; 99,14]	[98,48; 98,98]	[98,31; 98,85]	[98,05; 98,63]	[97,90; 98,52]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>								
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9970	8899	8090	7278	6782	6388	6028	5725	5434									
	auswertbar	Anzahl		8488	7817	7097	6592	6236	5855	5582	5232									
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		47	10	14	10	14	11	9	10									
		Anteil in %		0,55	0,13	0,20	0,15	0,22	0,19	0,16	0,19									
		CI Anteil in %		[0,40; 0,71]	[0,05; 0,21]	[0,09; 0,30]	[0,06; 0,25]	[0,11; 0,34]	[0,08; 0,30]	[0,06; 0,27]	[0,07; 0,31]									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,47</b>	<b>99,34</b>	<b>99,15</b>	<b>99,00</b>	<b>98,78</b>	<b>98,59</b>	<b>98,43</b>	<b>98,25</b>									
CI			[99,32; 99,62]	[99,17; 99,51]	[98,95; 99,35]	[98,78; 99,22]	[98,53; 99,03]	[98,32; 98,86]	[98,14; 98,72]	[97,94; 98,56]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>									
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6615	5890	5213	4768	4465	4191	3966	3749										
	auswertbar	Anzahl		5750	5101	4667	4383	4102	3869	3620										
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		21	11	14	9	10	11	3										
		Anteil in %		0,37	0,22	0,30	0,21	0,24	0,28	0,08										
		CI Anteil in %		[0,21; 0,52]	[0,09; 0,34]	[0,14; 0,46]	[0,07; 0,34]	[0,09; 0,39]	[0,12; 0,45]	[0,00; 0,18]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,64</b>	<b>99,43</b>	<b>99,13</b>	<b>98,93</b>	<b>98,69</b>	<b>98,41</b>	<b>98,33</b>										
CI			[99,49; 99,79]	[99,23; 99,63]	[98,88; 99,38]	[98,65; 99,21]	[98,37; 99,01]	[98,05; 98,77]	[97,96; 98,70]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>										



EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9102	7868	7032	6422	5968	5593	5249											
	auswertbar	Anzahl		7690	6886	6301	5836	5479	5111											
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		34	25	13	11	11	13											
		Anteil in %		0,44	0,36	0,21	0,19	0,20	0,25											
		CI Anteil in %		[0,29; 0,59]	[0,22; 0,51]	[0,09; 0,32]	[0,08; 0,30]	[0,08; 0,32]	[0,12; 0,39]											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,56</b>	<b>99,20</b>	<b>99,00</b>	<b>98,82</b>	<b>98,62</b>	<b>98,37</b>											
		CI		[99,41; 99,71]	[99,00; 99,40]	[98,77; 99,23]	[98,57; 99,07]	[98,34; 98,90]	[98,06; 98,68]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>											
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7300	6472	5830	5337	4921	4595												
	auswertbar	Anzahl		6363	5736	5231	4831	4499												
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		24	15	13	2	5												
		Anteil in %		0,38	0,26	0,25	0,04	0,11												
		CI Anteil in %		[0,23; 0,53]	[0,13; 0,39]	[0,11; 0,38]	[0,00; 0,10]	[0,01; 0,21]												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,63</b>	<b>99,37</b>	<b>99,12</b>	<b>99,08</b>	<b>98,97</b>												
		CI		[99,48; 99,78]	[99,17; 99,57]	[98,88; 99,36]	[98,84; 99,32]	[98,71; 99,23]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>												
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8552	7578	6873	6266	5794													
	auswertbar	Anzahl		7467	6733	6136	5652													
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		12	13	9	9													
		Anteil in %		0,16	0,19	0,15	0,16													
		CI Anteil in %		[0,07; 0,25]	[0,09; 0,30]	[0,05; 0,24]	[0,06; 0,26]													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,84</b>	<b>99,65</b>	<b>99,51</b>	<b>99,35</b>													
		CI		[99,75; 99,93]	[99,51; 99,79]	[99,34; 99,68]	[99,15; 99,55]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>													
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7939	7080	6336	5788														
	auswertbar	Anzahl		6982	6243	5654														
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		22	15	8														
		Anteil in %		0,32	0,24	0,14														
		CI Anteil in %		[0,18; 0,45]	[0,12; 0,36]	[0,04; 0,24]														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,69</b>	<b>99,45</b>	<b>99,31</b>														
		CI		[99,56; 99,82]	[99,27; 99,63]	[99,11; 99,51]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>														
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8446	7466	6696															
	auswertbar	Anzahl		7325	6530															
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		21	9															
		Anteil in %		0,29	0,14															
		CI Anteil in %		[0,16; 0,41]	[0,05; 0,23]															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,72</b>	<b>99,58</b>															
		CI		[99,60; 99,84]	[99,43; 99,73]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>															
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7448	6517																
	auswertbar	Anzahl		6374																
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		15																
		Anteil in %		0,24																
		CI Anteil in %		[0,12; 0,35]																
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,76</b>																
		CI		[99,64; 99,88]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7608</i>	<i>6653</i>																
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7682																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate																		
		CI																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7836</i>																	

In Tabelle 3.5.6 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Schlaganfall** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Schlaganfall hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein Schlaganfall dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein

erstmalig aufgetretener Schlaganfall dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 14 Patienten eingeschrieben. Bei 13 dieser Personen war laut Erstdokumentation kein Schlaganfall dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch - - Mitglieder. Bei - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei - - Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener Schlaganfall dokumentiert.

**Tabelle 3.5.6 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CI		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	4478	3683	3106	2647	2258	2006	1813	1649	1578	1515	1468	1394	1329	1257	1209	1154	1112	1063	
	auswertbar	Anzahl	3364	3016	2583	2222	1973	1789	1586	1520	1455	1433	1363	1307	1236	1190	1138	1095	1037		
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl	27	12	12	10	4	3	2	6	3	26	7	8	5	6	2	2	0		
		Anteil in %	0,80	0,40	0,46	0,45	0,20	0,17	0,13	0,39	0,21	1,81	0,51	0,61	0,40	0,50	0,18	0,18	0,00		
		CI Anteil in %	[0,50; 1,10]	[0,17; 0,62]	[0,20; 0,73]	[0,17; 0,73]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,30]	[0,08; 0,71]	[0,00; 0,44]	[1,12; 2,51]	[0,13; 0,89]	[0,19; 1,04]	[0,05; 0,76]	[0,10; 0,91]	[0,00; 0,42]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,00]		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	<b>99,26</b>	<b>98,88</b>	<b>98,43</b>	<b>98,00</b>	<b>97,80</b>	<b>97,64</b>	<b>97,47</b>	<b>97,04</b>	<b>96,85</b>	<b>95,08</b>	<b>94,60</b>	<b>94,03</b>	<b>93,66</b>	<b>93,19</b>	<b>93,03</b>	<b>92,87</b>	<b>92,87</b>		
CI		[98,98; 99,54]	[98,53; 99,23]	[98,00; 98,86]	[97,49; 98,51]	[97,26; 98,34]	[97,07; 98,21]	[96,87; 98,07]	[96,36; 97,72]	[96,14; 97,56]	[94,12; 96,04]	[93,58; 95,62]	[92,94; 95,12]	[92,53; 94,79]	[92,01; 94,37]	[91,83; 94,23]	[91,65; 94,09]	[91,65; 94,09]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4885</i>	<i>4007</i>	<i>3418</i>	<i>2921</i>	<i>2501</i>	<i>2228</i>	<i>2016</i>	<i>1839</i>	<i>1760</i>	<i>1696</i>	<i>1639</i>	<i>1580</i>	<i>1508</i>	<i>1434</i>	<i>1386</i>	<i>1332</i>	<i>1286</i>	<i>1225</i>		
2004-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11264	9460	7802	6593	5910	5249	4746	4493	4309	4156	3903	3701	3534	3392	3225	3073	2929		
	auswertbar	Anzahl	8417	7408	6425	5779	5149	4495	4245	4103	4043	3826	3653	3478	3337	3168	3022	2841			
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl	44	26	23	18	16	12	16	13	87	25	16	19	17	10	11	10			
		Anteil in %	0,52	0,35	0,36	0,31	0,31	0,27	0,38	0,32	2,15	0,65	0,44	0,55	0,51	0,32	0,36	0,35			
		CI Anteil in %	[0,37; 0,68]	[0,22; 0,49]	[0,21; 0,50]	[0,17; 0,46]	[0,16; 0,46]	[0,12; 0,42]	[0,19; 0,56]	[0,14; 0,49]	[1,70; 2,60]	[0,40; 0,91]	[0,22; 0,65]	[0,30; 0,79]	[0,27; 0,75]	[0,12; 0,51]	[0,15; 0,58]	[0,13; 0,57]			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	<b>99,51</b>	<b>99,17</b>	<b>98,82</b>	<b>98,52</b>	<b>98,22</b>	<b>97,97</b>	<b>97,62</b>	<b>97,32</b>	<b>95,26</b>	<b>94,64</b>	<b>94,23</b>	<b>93,72</b>	<b>93,25</b>	<b>92,96</b>	<b>92,62</b>	<b>92,30</b>			
CI		[99,36; 99,66]	[98,98; 99,36]	[98,58; 99,06]	[98,24; 98,80]	[97,91; 98,53]	[97,63; 98,31]	[97,24; 98,00]	[96,91; 97,73]	[94,67; 95,85]	[94,01; 95,27]	[93,57; 94,89]	[93,02; 94,42]	[92,52; 93,98]	[92,21; 93,71]	[91,85; 93,39]	[91,51; 93,09]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12108</i>	<i>10165</i>	<i>8415</i>	<i>7122</i>	<i>6406</i>	<i>5705</i>	<i>5169</i>	<i>4899</i>	<i>4710</i>	<i>4536</i>	<i>4339</i>	<i>4114</i>	<i>3945</i>	<i>3799</i>	<i>3618</i>	<i>3450</i>	<i>3293</i>			
2004-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	14055	11845	9851	8510	7428	6409	6081	5751	5370	5051	4790	4581	4382	4187	3982				
	auswertbar	Anzahl	10969	9542	8253	7232	6414	6129	5807	5580	5248	4955	4705	4498	4297	4115	3902				
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl	46	39	22	26	18	14	21	114	35	14	15	14	16	16	8				
		Anteil in %	0,42	0,41	0,27	0,36	0,28	0,23	0,36	2,04	0,67	0,28	0,32	0,31	0,37	0,39	0,21				
		CI Anteil in %	[0,30; 0,54]	[0,28; 0,54]	[0,16; 0,38]	[0,22; 0,50]	[0,15; 0,41]	[0,11; 0,35]	[0,21; 0,52]	[1,67; 2,41]	[0,45; 0,89]	[0,13; 0,43]	[0,16; 0,48]	[0,15; 0,47]	[0,19; 0,55]	[0,20; 0,58]	[0,06; 0,35]				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	<b>99,60</b>	<b>99,20</b>	<b>98,94</b>	<b>98,59</b>	<b>98,32</b>	<b>98,10</b>	<b>97,76</b>	<b>95,80</b>	<b>95,17</b>	<b>94,90</b>	<b>94,60</b>	<b>94,31</b>	<b>93,96</b>	<b>93,59</b>	<b>93,40</b>				
CI		[99,48; 99,72]	[99,03; 99,37]	[98,74; 99,14]	[98,35; 98,83]	[98,05; 98,59]	[97,81; 98,39]	[97,43; 98,09]	[95,32; 96,28]	[94,65; 95,69]	[94,36; 95,44]	[94,04; 95,16]	[93,73; 94,89]	[93,36; 94,56]	[92,97; 94,21]	[92,77; 94,03]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>				
2005-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11008	9415	8131	6975	6280	5869	5557	5283	4935	4644	4418	4235	4054	3869	3699				
	auswertbar	Anzahl	8953	7783	6769	5977	5574	5282	5109	4802	4539	4313	4151	3963	3785	3588					
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl	47	29	23	23	16	19	99	25	20	14	12	7	14	9					
		Anteil in %	0,52	0,37	0,34	0,38	0,29	0,36	1,94	0,52	0,44	0,32	0,29	0,18	0,37	0,25					
		CI Anteil in %	[0,38; 0,67]	[0,24; 0,51]	[0,20; 0,48]	[0,23; 0,54]	[0,15; 0,43]	[0,20; 0,52]	[1,56; 2,32]	[0,32; 0,72]	[0,25; 0,63]	[0,15; 0,49]	[0,13; 0,45]	[0,05; 0,31]	[0,18; 0,56]	[0,09; 0,41]					
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate	<b>99,49</b>	<b>99,13</b>	<b>98,80</b>	<b>98,43</b>	<b>98,16</b>	<b>97,82</b>	<b>95,97</b>	<b>95,47</b>	<b>95,05</b>	<b>94,75</b>	<b>94,48</b>	<b>94,31</b>	<b>93,96</b>	<b>93,73</b>					
CI		[99,34; 99,64]	[98,93; 99,33]	[98,56; 99,04]	[98,15; 98,71]	[97,85; 98,47]	[97,48; 98,16]	[95,48; 96,46]	[94,94; 96,00]	[94,49; 95,61]	[94,17; 95,33]	[93,88; 95,08]	[93,70; 94,92]	[93,33; 94,59]	[93,08; 94,38]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>					

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13384	11788	10109	8903	8293	7790	7328	6803	6317	5994	5690	5426	5182	4932				
	auswertbar	Anzahl		11050	9675	8403	7826	7352	7046	6604	6171	5854	5570	5296	5063	4816				
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		49	36	39	23	25	128	35	16	23	19	14	14	15				
		Anteil in %		0,44	0,37	0,46	0,29	0,34	1,82	0,53	0,26	0,39	0,34	0,26	0,28	0,31				
		CI Anteil in %		[0,32; 0,57]	[0,25; 0,49]	[0,32; 0,61]	[0,17; 0,41]	[0,21; 0,47]	[1,50; 2,13]	[0,35; 0,71]	[0,13; 0,39]	[0,23; 0,55]	[0,19; 0,49]	[0,13; 0,40]	[0,13; 0,42]	[0,15; 0,47]				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,57</b>	<b>99,21</b>	<b>98,77</b>	<b>98,49</b>	<b>98,17</b>	<b>96,43</b>	<b>95,93</b>	<b>95,68</b>	<b>95,31</b>	<b>94,99</b>	<b>94,74</b>	<b>94,48</b>	<b>94,18</b>				
CI			[99,45; 99,69]	[99,04; 99,38]	[98,55; 98,99]	[98,25; 98,73]	[97,90; 98,44]	[96,03; 96,36]	[95,50; 96,13]	[94,84; 95,78]	[94,50; 95,48]	[94,23; 95,25]	[93,96; 95,00]	[93,64; 94,72]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>				
2006-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12497	10673	9283	8527	7982	7491	6927	6431	6056	5760	5456	5186	4950					
	auswertbar	Anzahl		10242	8672	8035	7523	7200	6746	6235	5902	5627	5319	5069	4778					
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		51	29	27	11	163	39	31	25	23	14	14	8					
		Anteil in %		0,50	0,33	0,34	0,15	2,26	0,58	0,50	0,42	0,41	0,26	0,28	0,17					
		CI Anteil in %		[0,36; 0,63]	[0,21; 0,46]	[0,21; 0,46]	[0,06; 0,23]	[1,92; 2,61]	[0,40; 0,76]	[0,32; 0,67]	[0,26; 0,59]	[0,24; 0,58]	[0,13; 0,40]	[0,13; 0,42]	[0,05; 0,28]					
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,51</b>	<b>99,20</b>	<b>98,88</b>	<b>98,74</b>	<b>96,56</b>	<b>96,01</b>	<b>95,54</b>	<b>95,13</b>	<b>94,75</b>	<b>94,50</b>	<b>94,24</b>	<b>94,08</b>					
CI			[99,38; 99,64]	[99,02; 99,38]	[98,67; 99,09]	[98,51; 98,97]	[96,16; 96,96]	[95,58; 96,44]	[95,08; 96,00]	[94,64; 95,62]	[94,24; 95,26]	[93,98; 95,02]	[93,70; 94,78]	[93,53; 94,63]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>					
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11109	9825	8848	8176	7668	7052	6507	6133	5797	5488	5251	4986						
	auswertbar	Anzahl		9271	8337	7742	7296	6838	6328	5936	5641	5336	5103	4822						
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		33	32	16	151	52	29	20	30	14	11	14						
		Anteil in %		0,36	0,38	0,21	2,07	0,76	0,46	0,34	0,53	0,26	0,22	0,29						
		CI Anteil in %		[0,23; 0,48]	[0,25; 0,52]	[0,11; 0,31]	[1,74; 2,40]	[0,55; 0,97]	[0,29; 0,62]	[0,19; 0,48]	[0,34; 0,72]	[0,13; 0,40]	[0,09; 0,34]	[0,14; 0,44]						
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,66</b>	<b>99,29</b>	<b>99,09</b>	<b>97,11</b>	<b>96,38</b>	<b>95,94</b>	<b>95,62</b>	<b>95,12</b>	<b>94,87</b>	<b>94,67</b>	<b>94,39</b>						
CI			[99,54; 99,78]	[99,12; 99,46]	[98,89; 99,29]	[96,74; 97,48]	[95,97; 96,79]	[95,50; 96,38]	[95,16; 96,08]	[94,63; 95,61]	[94,36; 95,38]	[94,15; 95,19]	[93,85; 94,93]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>						
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	12378	11095	10134	9344	8564	7872	7386	6981	6652	6304	5969							
	auswertbar	Anzahl		10756	9778	8813	8211	7555	7090	6712	6355	6009	5662							
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		47	33	173	38	26	34	20	20	16	15							
		Anteil in %		0,44	0,34	1,96	0,46	0,34	0,48	0,30	0,31	0,27	0,26							
		CI Anteil in %		[0,31; 0,56]	[0,22; 0,45]	[1,67; 2,25]	[0,32; 0,61]	[0,21; 0,48]	[0,32; 0,64]	[0,17; 0,43]	[0,18; 0,45]	[0,14; 0,40]	[0,13; 0,40]							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,57</b>	<b>99,24</b>	<b>97,35</b>	<b>96,91</b>	<b>96,58</b>	<b>96,12</b>	<b>95,83</b>	<b>95,53</b>	<b>95,28</b>	<b>95,03</b>							
CI			[99,45; 99,69]	[99,07; 99,41]	[97,03; 97,67]	[96,56; 97,26]	[96,21; 96,95]	[95,72; 96,52]	[95,41; 96,25]	[95,09; 95,97]	[94,83; 95,73]	[94,56; 95,50]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>							
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10715	9722	8868	8013	7287	6835	6421	6040	5720	5408								
	auswertbar	Anzahl		9477	8418	7767	7110	6649	6243	5850	5571	5216								
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		46	153	40	19	23	27	13	9	16								
		Anteil in %		0,49	1,82	0,51	0,27	0,35	0,43	0,22	0,16	0,31								
		CI Anteil in %		[0,35; 0,63]	[1,53; 2,10]	[0,36; 0,67]	[0,15; 0,39]	[0,20; 0,49]	[0,27; 0,60]	[0,10; 0,34]	[0,06; 0,27]	[0,16; 0,46]								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,52</b>	<b>97,77</b>	<b>97,28</b>	<b>97,02</b>	<b>96,68</b>	<b>96,27</b>	<b>96,06</b>	<b>95,90</b>	<b>95,61</b>								
CI			[99,38; 99,66]	[97,46; 98,08]	[96,94; 97,62]	[96,66; 97,38]	[96,30; 97,06]	[95,86; 96,68]	[95,63; 96,49]	[95,46; 96,34]	[95,15; 96,07]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>								
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10145	9036	8149	7268	6742	6349	5992	5681	5375									
	auswertbar	Anzahl		8615	7869	7084	6563	6193	5820	5528	5173									
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		139	58	32	20	19	21	25	11									
		Anteil in %		1,61	0,74	0,45	0,30	0,31	0,36	0,45	0,21									
		CI Anteil in %		[1,35; 1,88]	[0,55; 0,93]	[0,30; 0,61]	[0,17; 0,44]	[0,17; 0,44]	[0,21; 0,51]	[0,28; 0,63]	[0,09; 0,34]									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>98,44</b>	<b>97,73</b>	<b>97,29</b>	<b>96,99</b>	<b>96,70</b>	<b>96,35</b>	<b>95,92</b>	<b>95,72</b>									
CI			[98,18; 98,70]	[97,42; 98,04]	[96,94; 97,64]	[96,62; 97,36]	[96,31; 97,09]	[95,93; 96,77]	[95,47; 96,37]	[95,26; 96,18]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>									
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6560	5839	5138	4680	4386	4103	3884	3684										
	auswertbar	Anzahl		5703	5027	4585	4310	4019	3789	3566										
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		55	19	11	19	12	4	9										
		Anteil in %		0,96	0,38	0,24	0,44	0,30	0,11	0,25										
		CI Anteil in %		[0,71; 1,22]	[0,21; 0,55]	[0,10; 0,38]	[0,24; 0,64]	[0,13; 0,47]	[0,00; 0,21]	[0,09; 0,42]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,05</b>	<b>98,68</b>	<b>98,44</b>	<b>98,01</b>	<b>97,72</b>	<b>97,62</b>	<b>97,37</b>										
CI			[98,80; 99,30]	[98,38; 98,98]	[98,11; 98,77]	[97,63; 98,39]	[97,31; 98,13]	[97,19; 98,05]	[96,92; 97,82]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>										

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8977	7761	6915	6290	5839	5479	5138											
	auswertbar	Anzahl		7583	6772	6170	5714	5366	5002											
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		62	34	29	13	19	11											
		Anteil in %			0,82	0,50	0,47	0,23	0,35	0,22										
		CI Anteil in %			[0,61; 1,02]	[0,33; 0,67]	[0,30; 0,64]	[0,10; 0,35]	[0,20; 0,51]	[0,09; 0,35]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,19</b>	<b>98,70</b>	<b>98,24</b>	<b>98,02</b>	<b>97,67</b>	<b>97,46</b>											
		CI			[98,99; 99,39]	[98,44; 98,96]	[97,93; 98,55]	[97,69; 98,35]	[97,31; 98,03]	[97,08; 97,84]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>											
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7196	6377	5720	5229	4833	4510												
	auswertbar	Anzahl		6269	5621	5125	4745	4418												
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		45	17	16	12	15												
		Anteil in %			0,72	0,30	0,31	0,25	0,34											
		CI Anteil in %			[0,51; 0,93]	[0,16; 0,45]	[0,16; 0,46]	[0,11; 0,40]	[0,17; 0,51]											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,29</b>	<b>98,99</b>	<b>98,68</b>	<b>98,44</b>	<b>98,10</b>												
		CI			[99,08; 99,50]	[98,74; 99,24]	[98,39; 98,97]	[98,12; 98,76]	[97,74; 98,46]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>												
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8409	7443	6729	6124	5663													
	auswertbar	Anzahl		7333	6593	5999	5531													
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		38	19	19	25													
		Anteil in %			0,52	0,29	0,32	0,45												
		CI Anteil in %			[0,35; 0,68]	[0,16; 0,42]	[0,17; 0,46]	[0,28; 0,63]												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,49</b>	<b>99,20</b>	<b>98,89</b>	<b>98,44</b>													
		CI			[99,33; 99,65]	[98,99; 99,41]	[98,64; 99,14]	[98,14; 98,74]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>													
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7779	6945	6181	5647														
	auswertbar	Anzahl		6847	6088	5516														
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		44	19	11														
		Anteil in %			0,64	0,31	0,20													
		CI Anteil in %			[0,45; 0,83]	[0,17; 0,45]	[0,08; 0,32]													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,36</b>	<b>99,06</b>	<b>98,86</b>														
		CI			[99,17; 99,55]	[98,83; 99,29]	[98,60; 99,12]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>														
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8310	7343	6577															
	auswertbar	Anzahl		7204	6411															
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		32	29															
		Anteil in %			0,44	0,45														
		CI Anteil in %			[0,29; 0,60]	[0,29; 0,62]														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,56</b>	<b>99,11</b>															
		CI			[99,41; 99,71]	[98,89; 99,33]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>															
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7352	6431																
	auswertbar	Anzahl		6292																
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		36																
		Anteil in %			0,57															
		CI Anteil in %			[0,39; 0,76]															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,43</b>																
		CI			[99,24; 99,62]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7608</i>	<i>6653</i>																
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7569																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate																		
CI																				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7836</i>																	

In der folgenden Tabelle 3.5.7 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Nierenersatztherapie** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen in der Erstdokumentation noch keine Nierenersatztherapie vermerkt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Nierenersatztherapie durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem

Anteil im Berichtshalbjahr eine erstmalige Nierenersatztherapie dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2004-2 waren anfangs 15069 Patienten eingeschrieben. Bei 14930 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Nierenersatztherapie durchgeführt wurden. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 4343 Mitglieder. Bei 4251 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 0,05 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr eine erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie dokumentiert.

**Tabelle 3.5.7 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut Erstdokumentation**

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	14930	12554	10482	9068	7932	7205	6882	6517	6175	5855	5511	5225	4991	4771	4567	4343		
	auswertbar	Anzahl		11633	10140	8788	7712	6870	6567	6212	5982	5708	5402	5127	4893	4673	4478	4251		
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		5	4	5	2	5	12	4	21	11	6	5	8	1	5	2		
		Anteil in %		0,04	0,04	0,06	0,03	0,07	0,18	0,06	0,35	0,19	0,11	0,10	0,16	0,02	0,11	0,05		
		CI Anteil in %		[0,01; 0,08]	[0,00; 0,08]	[0,01; 0,11]	[0,00; 0,06]	[0,01; 0,14]	[0,08; 0,29]	[0,00; 0,13]	[0,20; 0,50]	[0,08; 0,31]	[0,02; 0,20]	[0,01; 0,18]	[0,05; 0,28]	[0,00; 0,06]	[0,01; 0,21]	[0,00; 0,11]		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,96</b>	<b>99,92</b>	<b>99,86</b>	<b>99,84</b>	<b>99,77</b>	<b>99,58</b>	<b>99,52</b>	<b>99,18</b>	<b>98,99</b>	<b>98,88</b>	<b>98,78</b>	<b>98,62</b>	<b>98,60</b>	<b>98,49</b>	<b>98,45</b>		
CI			[99,92; 100,00]	[99,87; 99,97]	[99,79; 99,93]	[99,76; 99,92]	[99,67; 99,87]	[99,44; 99,72]	[99,36; 99,68]	[98,97; 99,39]	[98,75; 99,23]	[98,62; 99,14]	[98,51; 99,05]	[98,33; 98,91]	[98,31; 98,89]	[98,18; 98,80]	[98,14; 98,76]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15069</i>	<i>12663</i>	<i>10575</i>	<i>9150</i>	<i>7998</i>	<i>7258</i>	<i>6933</i>	<i>6577</i>	<i>6230</i>	<i>5926</i>	<i>5585</i>	<i>5290</i>	<i>5058</i>	<i>4840</i>	<i>4632</i>	<i>4409</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11651	9967	8637	7434	6693	6271	5945	5660	5362	5051	4814	4615	4407	4206	4020			
	auswertbar	Anzahl		9476	8273	7215	6367	5957	5655	5468	5218	4936	4697	4523	4312	4116	3904			
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		3	8	3	5	3	3	9	4	4	7	1	4	4	2			
		Anteil in %		0,03	0,10	0,04	0,08	0,05	0,05	0,16	0,08	0,08	0,15	0,02	0,09	0,10	0,05			
		CI Anteil in %		[0,00; 0,07]	[0,03; 0,16]	[0,00; 0,09]	[0,01; 0,15]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,11]	[0,06; 0,27]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,16]	[0,04; 0,26]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,12]			
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,97</b>	<b>99,87</b>	<b>99,83</b>	<b>99,76</b>	<b>99,71</b>	<b>99,66</b>	<b>99,50</b>	<b>99,42</b>	<b>99,34</b>	<b>99,20</b>	<b>99,17</b>	<b>99,08</b>	<b>98,99</b>	<b>98,94</b>			
CI			[99,94; 100,00]	[99,80; 99,94]	[99,74; 99,94]	[99,65; 99,87]	[99,59; 99,83]	[99,52; 99,80]	[99,33; 99,67]	[99,23; 99,61]	[99,14; 99,54]	[98,97; 99,43]	[98,89; 99,40]	[98,74; 99,33]	[98,83; 99,33]	[98,72; 99,26]	[98,67; 99,21]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11691</i>	<i>10003</i>	<i>8667</i>	<i>7467</i>	<i>6721</i>	<i>6298</i>	<i>5972</i>	<i>5688</i>	<i>5395</i>	<i>5085</i>	<i>4849</i>	<i>4648</i>	<i>4438</i>	<i>4239</i>	<i>4053</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	14230	12516	10772	9491	8868	8340	7864	7399	6904	6543	6211	5922	5662	5370				
	auswertbar	Anzahl		11742	10311	8948	8359	7869	7560	7189	6742	6383	6077	5778	5526	5241				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		8	4	5	7	3	20	7	11	3	4	8	8	2				
		Anteil in %		0,07	0,04	0,06	0,08	0,04	0,26	0,10	0,16	0,05	0,07	0,14	0,14	0,04				
		CI Anteil in %		[0,02; 0,12]	[0,00; 0,08]	[0,01; 0,10]	[0,02; 0,15]	[0,00; 0,08]	[0,15; 0,38]	[0,03; 0,17]	[0,07; 0,26]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,13]	[0,04; 0,23]	[0,04; 0,25]	[0,00; 0,09]				
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,93</b>	<b>99,90</b>	<b>99,84</b>	<b>99,76</b>	<b>99,73</b>	<b>99,47</b>	<b>99,37</b>	<b>99,21</b>	<b>99,10</b>	<b>98,97</b>	<b>98,82</b>	<b>98,79</b>					
CI			[99,88; 99,98]	[99,84; 99,96]	[99,77; 99,91]	[99,66; 99,86]	[99,63; 99,83]	[99,32; 99,62]	[99,20; 99,54]	[99,02; 99,40]	[98,97; 99,37]	[98,89; 99,31]	[98,74; 99,20]	[98,57; 99,07]	[98,54; 99,04]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14294</i>	<i>12573</i>	<i>10822</i>	<i>9537</i>	<i>8914</i>	<i>8391</i>	<i>7910</i>	<i>7456</i>	<i>6957</i>	<i>6598</i>	<i>6265</i>	<i>5974</i>	<i>5713</i>	<i>5422</i>					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13221	11294	9846	9067	8503	7989	7527	7005	6621	6315	5988	5674	5410					
	auswertbar	Anzahl		10834	9201	8548	8019	7669	7317	6780	6447	6160	5826	5539	5225					
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		11	6	4	3	21	4	2	2	7	5	9	4					
		Anteil in %		0,10	0,07	0,05	0,04	0,27	0,05	0,03	0,03	0,11	0,09	0,16	0,08					
		CI Anteil in %		[0,04; 0,16]	[0,01; 0,12]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,08]	[0,16; 0,39]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,07]	[0,03; 0,20]	[0,01; 0,16]	[0,06; 0,27]	[0,00; 0,15]					
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,90</b>	<b>99,84</b>	<b>99,79</b>	<b>99,76</b>	<b>99,49</b>	<b>99,44</b>	<b>99,41</b>	<b>99,38</b>	<b>99,27</b>	<b>99,18</b>	<b>99,02</b>	<b>98,95</b>					
CI			[99,84; 99,96]	[99,76; 99,92]	[99,70; 99,88]	[99,66; 99,86]	[99,34; 99,64]	[99,28; 99,60]	[99,25; 99,57]	[99,21; 99,55]	[99,08; 99,46]	[98,98; 99,38]	[98,79; 99,25]	[98,71; 99,19]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13284</i>	<i>11346</i>	<i>9898</i>	<i>9115</i>	<i>8547</i>	<i>8032</i>	<i>7585</i>	<i>7052</i>	<i>6665</i>	<i>6355</i>	<i>6029</i>	<i>5719</i>	<i>5459</i>						
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11725	10383	9347	8659	8137	7613	7050	6660	6303	5986	5725	5442						
	auswertbar	Anzahl		9813	8805	8201	7744	7375	6852	6446	6133	5820	5558	5256						
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		14	5	5	14	5	7	6	4	6	5	5						
		Anteil in %		0,14	0,06	0,06	0,18	0,07	0,10	0,09	0,07	0,10	0,09	0,10						
		CI Anteil in %		[0,07; 0,22]	[0,01; 0,11]	[0,01; 0,11]	[0,09; 0,28]	[0,01; 0,13]	[0,03; 0,18]	[0,02; 0,17]	[0,00; 0,13]	[0,02; 0,19]	[0,01; 0,17]	[0,01; 0,18]						
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,86</b>	<b>99,81</b>	<b>99,75</b>	<b>99,58</b>	<b>99,51</b>	<b>99,41</b>	<b>99,32</b>	<b>99,25</b>	<b>99,15</b>	<b>99,06</b>	<b>98,97</b>						
CI			[99,79; 99,93]	[99,72; 99,90]	[99,65; 99,85]	[99,44; 99,72]	[99,36; 99,66]	[99,24; 99,58]	[99,14; 99,50]	[99,06; 99,44]	[98,94; 99,36]	[98,84; 99,28]	[98,73; 99,21]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>10419</i>	<i>9391</i>	<i>8701</i>	<i>8176</i>	<i>7654</i>	<i>7088</i>	<i>6703</i>	<i>6346</i>	<i>6029</i>	<i>5770</i>	<i>5487</i>							

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	13042	11705	10715	9918	9247	8526	8010	7574	7222	6853	6490							
	auswertbar	Anzahl		11344	10329	9353	8857	8177	7676	7277	6900	6530	6145							
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		7	6	15	6	4	8	3	5	4	5							
		Anteil in %		0,06	0,06	0,16	0,07	0,05	0,10	0,04	0,07	0,06	0,08							
		CI Anteil in %		[0,02; 0,11]	[0,01; 0,10]	[0,08; 0,24]	[0,01; 0,12]	[0,00; 0,10]	[0,03; 0,18]	[0,00; 0,09]	[0,01; 0,14]	[0,00; 0,12]	[0,01; 0,15]							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,94</b>	<b>99,88</b>	<b>99,73</b>	<b>99,66</b>	<b>99,61</b>	<b>99,51</b>	<b>99,47</b>	<b>99,40</b>	<b>99,34</b>	<b>99,26</b>							
CI			[99,90; 99,98]	[99,82; 99,94]	[99,63; 99,83]	[99,55; 99,77]	[99,49; 99,73]	[99,37; 99,65]	[99,32; 99,62]	[99,24; 99,56]	[99,17; 99,51]	[99,07; 99,45]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>11755</i>	<i>10764</i>	<i>9963</i>	<i>9300</i>	<i>8577</i>	<i>8054</i>	<i>7622</i>	<i>7269</i>	<i>6901</i>	<i>6533</i>								
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	11286	10234	9365	8603	7838	7359	6919	6531	6177	5837								
	auswertbar	Anzahl		9981	8894	8331	7648	7154	6725	6323	6007	5624								
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		4	10	9	8	4	6	3	2	6								
		Anteil in %		0,04	0,11	0,11	0,10	0,06	0,09	0,05	0,03	0,11								
		CI Anteil in %		[0,00; 0,08]	[0,04; 0,18]	[0,04; 0,18]	[0,03; 0,18]	[0,00; 0,11]	[0,02; 0,16]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,08]	[0,02; 0,19]								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,96</b>	<b>99,85</b>	<b>99,75</b>	<b>99,64</b>	<b>99,59</b>	<b>99,50</b>	<b>99,45</b>	<b>99,42</b>	<b>99,31</b>								
CI			[99,92; 100,00]	[99,77; 99,93]	[99,65; 99,85]	[99,51; 99,77]	[99,45; 99,73]	[99,35; 99,65]	[99,29; 99,61]	[99,25; 99,59]	[99,12; 99,50]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>10272</i>	<i>9403</i>	<i>8640</i>	<i>7877</i>	<i>7398</i>	<i>6960</i>	<i>6569</i>	<i>6217</i>	<i>5873</i>									
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	10664	9519	8702	7805	7253	6838	6451	6124	5801									
	auswertbar	Anzahl		9073	8409	7604	7050	6670	6266	5961	5581									
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		9	3	6	0	12	6	3	1									
		Anteil in %		0,10	0,04	0,08	0,00	0,18	0,10	0,05	0,02									
		CI Anteil in %		[0,03; 0,16]	[0,00; 0,08]	[0,02; 0,14]	[0,00; 0,00]	[0,08; 0,28]	[0,02; 0,17]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,05]									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,90</b>	<b>99,87</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>	<b>99,61</b>	<b>99,52</b>	<b>99,47</b>	<b>99,45</b>									
CI			[99,84; 99,96]	[99,80; 99,94]	[99,69; 99,89]	[99,69; 99,89]	[99,47; 99,75]	[99,36; 99,68]	[99,30; 99,64]	[99,28; 99,62]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>9544</i>	<i>8730</i>	<i>7830</i>	<i>7281</i>	<i>6863</i>	<i>6485</i>	<i>6160</i>	<i>5839</i>										
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6845	6096	5399	4938	4635	4353	4124	3906										
	auswertbar	Anzahl		5951	5285	4833	4553	4260	4022	3774										
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		8	1	2	2	1	1	1										
		Anteil in %		0,13	0,02	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03										
		CI Anteil in %		[0,04; 0,23]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,87</b>	<b>99,85</b>	<b>99,81</b>	<b>99,76</b>	<b>99,74</b>	<b>99,72</b>	<b>99,69</b>										
CI			[99,78; 99,96]	[99,75; 99,95]	[99,70; 99,92]	[99,63; 99,89]	[99,60; 99,88]	[99,58; 99,86]	[99,54; 99,84]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>6116</i>	<i>5424</i>	<i>4962</i>	<i>4661</i>	<i>4378</i>	<i>4148</i>	<i>3928</i>											
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9352	8080	7248	6634	6171	5790	5443											
	auswertbar	Anzahl		7891	7095	6508	6036	5672	5299											
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		5	3	3	4	4	4											
		Anteil in %		0,06	0,04	0,05	0,07	0,07	0,08											
		CI Anteil in %		[0,01; 0,12]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,94</b>	<b>99,90</b>	<b>99,85</b>	<b>99,78</b>	<b>99,71</b>	<b>99,64</b>											
CI			[99,89; 99,99]	[99,83; 99,97]	[99,76; 99,94]	[99,67; 99,89]	[99,58; 99,84]	[99,49; 99,79]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>8115</i>	<i>7281</i>	<i>6665</i>	<i>6202</i>	<i>5821</i>	<i>5474</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7464	6616	5974	5476	5053	4719												
	auswertbar	Anzahl		6505	5871	5365	4959	4621												
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		5	8	6	3	1												
		Anteil in %		0,08	0,14	0,11	0,06	0,02												
		CI Anteil in %		[0,01; 0,14]	[0,04; 0,23]	[0,02; 0,20]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,06]												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>99,92</b>	<b>99,79</b>	<b>99,68</b>	<b>99,62</b>	<b>99,60</b>												
CI			[99,85; 99,99]	[99,68; 99,90]	[99,54; 99,82]	[99,46; 99,78]	[99,43; 99,77]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>6638</i>	<i>5995</i>	<i>5501</i>	<i>5082</i>	<i>4747</i>													

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8709	7715	7005	6387	5915													
	auswertbar	Anzahl		7601	6865	6258	5772													
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		9	1	5	4													
		Anteil in %			0,12	0,01	0,08	0,07												
		CI Anteil in %			[0,04; 0,20]	[0,00; 0,04]	[0,01; 0,15]	[0,00; 0,14]												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>99,88</b>	<b>99,87</b>	<b>99,79</b>	<b>99,72</b>													
		CI		[99,80; 99,96]	[99,79; 99,95]	[99,68; 99,90]	[99,59; 99,85]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>7740</i>	<i>7032</i>	<i>6413</i>	<i>5942</i>														
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8072	7202	6456	5902														
	auswertbar	Anzahl		7102	6359	5766														
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		1	3	4														
		Anteil in %			0,01	0,05	0,07													
		CI Anteil in %			[0,00; 0,04]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,14]													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>99,99</b>	<b>99,94</b>	<b>99,87</b>														
		CI		[99,96; 100,00]	[99,88; 100,00]	[99,78; 99,96]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	<i>7229</i>	<i>6483</i>	<i>5929</i>															
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8604	7599	6818															
	auswertbar	Anzahl		7453	6649															
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		9	5															
		Anteil in %			0,12	0,08														
		CI Anteil in %			[0,04; 0,20]	[0,01; 0,14]														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>99,88</b>	<b>99,81</b>															
		CI		[99,80; 99,96]	[99,71; 99,91]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	<i>7621</i>	<i>6845</i>																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7594	6641																
	auswertbar	Anzahl		6495																
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		7																
		Anteil in %			0,11															
		CI Anteil in %			[0,03; 0,19]															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>99,89</b>																
		CI		[99,81; 99,97]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	<i>6653</i>																	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7810																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>																		
		CI																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>																		

In der Tabelle 3.5.8 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten bis einschließlich des Berichtshalbjahres keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren und bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.



In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr noch - - Personen dem Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation zuzuordnen. Für - - dieser Kollektivmitglieder lagen auswertbare Angaben vor. Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit lag bezüglich der primären Endpunkte bei - - Prozent.

**Tabelle 3.5.8 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3307	2737	2324	1982	1681	1478	1332	1229	1184	1139	1103	1051	1005	951	916	874	844	809
	auswertbar	Anzahl		2539	2273	1942	1660	1462	1316	1188	1149	1105	1090	1039	999	945	907	868	839	803
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		44	45	41	34	20	16	13	24	11	37	27	27	19	25	19	20	21
		Anteil in %		1,73	1,98	2,11	2,05	1,37	1,22	1,09	2,09	1,00	3,39	2,60	2,70	2,01	2,76	2,19	2,38	2,62
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>98,37</b>	<b>96,46</b>	<b>94,46</b>	<b>92,54</b>	<b>91,29</b>	<b>90,19</b>	<b>89,23</b>	<b>87,41</b>	<b>86,57</b>	<b>83,66</b>	<b>81,51</b>	<b>79,32</b>	<b>77,73</b>	<b>75,60</b>	<b>73,95</b>	<b>72,20</b>	<b>70,31</b>
	CI		[97,89; 98,85]	[95,74; 97,18]	[93,53; 95,39]	[91,43; 93,65]	[90,06; 92,52]	[88,86; 91,52]	[87,82; 90,64]	[85,85; 88,97]	[84,95; 88,19]	[81,84; 85,48]	[79,57; 83,45]	[77,26; 81,38]	[75,59; 79,87]	[73,36; 77,84]	[71,64; 76,26]	[69,82; 74,58]	[67,86; 72,76]	
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8312	7014	5813	4921	4429	3970	3593	3402	3276	3166	2971	2825	2708	2611	2491	2376	2273	
	auswertbar	Anzahl		6288	5570	4815	4371	3921	3436	3242	3137	3112	2933	2803	2684	2585	2470	2344	2232	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		122	83	62	66	63	63	47	46	123	71	49	55	57	59	54	52	
		Anteil in %		1,94	1,49	1,29	1,51	1,61	1,83	1,45	1,47	3,95	2,42	1,75	2,05	2,21	2,39	2,30	2,33	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>98,16</b>	<b>96,75</b>	<b>95,52</b>	<b>94,09</b>	<b>92,60</b>	<b>90,97</b>	<b>89,71</b>	<b>88,44</b>	<b>84,99</b>	<b>82,95</b>	<b>81,50</b>	<b>79,84</b>	<b>78,08</b>	<b>76,22</b>	<b>74,48</b>	<b>72,74</b>	
	CI		[97,84; 98,48]	[96,31; 97,19]	[94,99; 96,05]	[93,47; 94,71]	[91,89; 93,31]	[90,16; 91,78]	[88,84; 90,58]	[87,51; 89,37]	[83,91; 86,07]	[81,80; 84,10]	[80,30; 82,70]	[78,59; 81,09]	[76,77; 79,39]	[74,86; 77,58]	[73,07; 75,89]	[71,29; 74,19]		
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9837	8360	6988	6080	5309	4825	4609	4395	4168	3905	3695	3524	3382	3245	3119	2976		
	auswertbar	Anzahl		7810	6824	5940	5215	4630	4440	4220	4075	3853	3654	3491	3350	3209	3094	2942		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		130	99	93	73	59	73	76	135	78	59	65	58	57	75	64		
		Anteil in %		1,66	1,45	1,57	1,40	1,27	1,64	1,80	3,31	2,02	1,61	1,86	1,73	1,78	2,42	2,18		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>98,42</b>	<b>97,01</b>	<b>95,52</b>	<b>94,20</b>	<b>93,04</b>	<b>91,56</b>	<b>89,97</b>	<b>87,05</b>	<b>85,30</b>	<b>83,93</b>	<b>82,38</b>	<b>80,96</b>	<b>79,53</b>	<b>77,61</b>	<b>75,93</b>		
	CI		[98,15; 98,69]	[96,63; 97,39]	[95,04; 96,00]	[93,64; 94,76]	[92,41; 93,67]	[90,86; 92,26]	[89,19; 90,75]	[86,15; 87,95]	[84,34; 86,26]	[82,93; 84,93]	[81,33; 83,43]	[79,86; 82,06]	[78,39; 80,67]	[76,42; 78,80]	[74,70; 77,16]			
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8018	6858	5927	5080	4576	4287	4084	3872	3649	3445	3306	3182	3054	2922	2800			
	auswertbar	Anzahl		6541	5706	4939	4394	4093	3903	3771	3579	3394	3244	3135	3005	2871	2743			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		98	83	55	74	53	64	103	70	61	40	61	51	54	51			
		Anteil in %		1,50	1,45	1,11	1,68	1,29	1,64	2,73	1,96	1,80	1,23	1,95	1,70	1,88	1,86			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>98,55</b>	<b>97,15</b>	<b>96,09</b>	<b>94,53</b>	<b>93,35</b>	<b>91,88</b>	<b>89,43</b>	<b>87,70</b>	<b>86,13</b>	<b>85,08</b>	<b>83,43</b>	<b>82,03</b>	<b>80,50</b>	<b>79,00</b>			
	CI		[98,27; 98,83]	[96,74; 97,56]	[95,60; 96,58]	[93,93; 95,13]	[92,68; 94,02]	[91,13; 92,63]	[88,56; 90,30]	[86,76; 88,64]	[85,13; 87,13]	[84,04; 86,12]	[82,33; 84,53]	[80,88; 83,18]	[79,30; 81,70]	[77,76; 80,24]				
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9648	8512	7313	6447	6010	5648	5325	4973	4655	4454	4249	4069	3894	3725				
	auswertbar	Anzahl		8036	7058	6121	5717	5367	5172	4883	4577	4387	4194	3998	3836	3673				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		163	113	105	102	112	154	108	66	88	77	69	63	79				
		Anteil in %		2,03	1,60	1,72	1,78	2,09	2,98	2,21	1,44	2,01	1,84	1,73	1,64	2,15				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>98,06</b>	<b>96,53</b>	<b>94,94</b>	<b>93,32</b>	<b>91,46</b>	<b>88,80</b>	<b>86,86</b>	<b>85,62</b>	<b>83,92</b>	<b>82,38</b>	<b>80,98</b>	<b>79,66</b>	<b>77,94</b>				
	CI		[97,76; 98,36]	[96,13; 96,93]	[94,44; 95,44]	[92,74; 93,90]	[90,80; 92,12]	[88,03; 89,57]	[86,03; 87,69]	[84,75; 86,49]	[83,00; 84,84]	[81,41; 83,35]	[79,97; 81,99]	[78,62; 80,70]	[76,85; 79,03]					
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9210	7848	6820	6287	5915	5582	5179	4827	4566	4349	4142	3948	3783					
	auswertbar	Anzahl		7556	6441	5975	5615	5394	5081	4716	4491	4275	4060	3879	3675					
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		120	96	97	84	185	98	85	91	69	58	65	63					
		Anteil in %		1,59	1,49	1,62	1,50	3,43	1,93	1,80	2,03	1,61	1,43	1,68	1,71					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>98,45</b>	<b>97,05</b>	<b>95,54</b>	<b>94,18</b>	<b>91,04</b>	<b>89,30</b>	<b>87,71</b>	<b>85,94</b>	<b>84,56</b>	<b>83,37</b>	<b>81,98</b>	<b>80,57</b>					
	CI		[98,18; 98,72]	[96,66; 97,44]	[95,06; 96,02]	[93,62; 94,74]	[90,34; 91,74]	[88,53; 90,07]	[86,89; 88,53]	[85,06; 86,82]	[83,63; 85,49]	[82,41; 84,33]	[80,97; 82,99]	[79,52; 81,62]						

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8313	7352	6641	6171	5811	5389	5005	4722	4470	4250	4073	3876							
	auswertbar	Anzahl		6955	6328	5899	5579	5266	4907	4624	4386	4166	3994	3787							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		131	116	83	167	108	82	105	78	56	70	74							
		Anteil in %		1,88	1,83	1,41	2,99	2,05	1,67	2,27	1,78	1,34	1,75	1,95							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,20</b>	<b>96,47</b>	<b>95,16</b>	<b>92,41</b>	<b>90,54</b>	<b>89,04</b>	<b>87,03</b>	<b>85,50</b>	<b>84,35</b>	<b>82,89</b>	<b>81,27</b>							
CI			[97,89; 98,51]	[96,04; 96,90]	[94,65; 95,67]	[91,77; 93,05]	[89,82; 91,26]	[88,26; 89,82]	[86,18; 87,88]	[84,60; 86,40]	[83,41; 85,29]	[81,91; 83,87]	[80,24; 82,30]								
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9461	8488	7750	7154	6590	6101	5766	5464	5230	4971	4744								
	auswertbar	Anzahl		8241	7535	6787	6376	5894	5577	5291	5049	4781	4535								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		138	119	204	108	84	110	74	97	76	73								
		Anteil in %		1,67	1,58	3,01	1,69	1,43	1,97	1,40	1,92	1,59	1,61								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,37</b>	<b>96,85</b>	<b>94,03</b>	<b>92,45</b>	<b>91,15</b>	<b>89,36</b>	<b>88,12</b>	<b>86,44</b>	<b>85,07</b>	<b>83,70</b>								
CI			[98,10; 98,64]	[96,47; 97,23]	[93,50; 94,56]	[91,85; 93,05]	[90,50; 91,80]	[88,64; 90,08]	[87,36; 88,88]	[85,62; 87,26]	[84,21; 85,93]	[82,80; 84,60]									
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8389	7613	6966	6310	5781	5453	5149	4865	4619	4367									
	auswertbar	Anzahl		7455	6647	6166	5674	5350	5049	4752	4534	4254									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		114	215	123	70	84	100	75	71	74									
		Anteil in %		1,53	3,23	1,99	1,23	1,57	1,98	1,58	1,57	1,74									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,49</b>	<b>95,43</b>	<b>93,54</b>	<b>92,40</b>	<b>90,96</b>	<b>89,17</b>	<b>87,78</b>	<b>86,41</b>	<b>84,91</b>									
CI			[98,22; 98,76]	[94,95; 95,91]	[92,96; 94,12]	[91,77; 93,03]	[90,27; 91,65]	[88,41; 89,93]	[86,97; 88,59]	[85,55; 87,27]	[84,00; 85,82]										
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7991	7129	6420	5769	5375	5070	4784	4545	4314										
	auswertbar	Anzahl		6828	6262	5657	5263	4977	4688	4457	4187										
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		185	127	91	95	72	82	72	64										
		Anteil in %		2,71	2,03	1,61	1,81	1,45	1,75	1,62	1,53										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>97,39</b>	<b>95,44</b>	<b>93,91</b>	<b>92,24</b>	<b>90,91</b>	<b>89,34</b>	<b>87,90</b>	<b>86,56</b>										
CI			[97,02; 97,76]	[94,94; 95,94]	[93,33; 94,49]	[91,58; 92,90]	[90,19; 91,63]	[88,56; 90,12]	[87,06; 88,74]	[85,67; 87,45]											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	5478	4861	4277	3913	3661	3423	3246	3078											
	auswertbar	Anzahl		4772	4216	3858	3617	3376	3186	3003											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		128	78	57	55	48	39	56											
		Anteil in %		2,68	1,85	1,48	1,52	1,42	1,22	1,86											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>97,36</b>	<b>95,57</b>	<b>94,17</b>	<b>92,74</b>	<b>91,44</b>	<b>90,33</b>	<b>88,64</b>											
CI			[96,91; 97,81]	[94,98; 96,16]	[93,48; 94,86]	[91,97; 93,51]	[90,59; 92,29]	[89,43; 91,23]	[87,65; 89,63]												
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7410	6403	5689	5179	4810	4524	4242												
	auswertbar	Anzahl		6280	5613	5112	4735	4455	4159												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		143	120	90	69	77	68												
		Anteil in %		2,28	2,14	1,76	1,46	1,73	1,64												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>97,76</b>	<b>95,68</b>	<b>94,01</b>	<b>92,65</b>	<b>91,06</b>	<b>89,57</b>												
CI			[97,40; 98,12]	[95,17; 96,19]	[93,40; 94,62]	[91,97; 93,33]	[90,31; 91,81]	[88,75; 90,39]													
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6033	5345	4801	4383	4044	3785													
	auswertbar	Anzahl		5271	4752	4324	3999	3730													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		106	87	75	49	64													
		Anteil in %		2,01	1,83	1,73	1,23	1,72													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,01</b>	<b>96,23</b>	<b>94,58</b>	<b>93,43</b>	<b>91,82</b>													
CI			[97,64; 98,38]	[95,71; 96,75]	[93,95; 95,21]	[92,73; 94,13]	[91,03; 92,61]														
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7135	6329	5723	5223	4837														
	auswertbar	Anzahl		6255	5644	5153	4748														
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		87	89	83	74														
		Anteil in %		1,39	1,58	1,61	1,56														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,62</b>	<b>97,08</b>	<b>95,53</b>	<b>94,04</b>														
CI			[98,33; 98,91]	[96,65; 97,51]	[95,00; 96,06]	[93,42; 94,66]															

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6587	5883	5251	4799														
	auswertbar	Anzahl		5806	5195	4719														
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		102	75	74														
		Anteil in %			1,76	1,44	1,57													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,26</b>	<b>96,86</b>	<b>95,34</b>														
	CI		[97,93; 98,59]	[96,40; 97,32]	[94,77; 95,91]															
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7063	6259	5628															
	auswertbar	Anzahl		6149	5505															
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		82	82															
		Anteil in %			1,33	1,49														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,68</b>	<b>97,21</b>															
	CI		[98,40; 98,96]	[96,79; 97,63]																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6247	5493																
	auswertbar	Anzahl		5391																
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		99																
		Anteil in %			1,84															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>98,16</b>																
	CI		[97,80; 98,52]																	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6485																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>																		
	CI																			

In der Tabelle 3.5.9 wird die kumulierte **„Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten in der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären aber ein oder mehrere sekundäre Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr noch - - Personen dem Kollektiv der Patienten ohne primäre aber mit einem oder mehreren sekundären Endpunkten zum Zeitpunkt der Erstdokumentation zuzuordnen. Für - - dieser Kollektivmitglieder lagen auswertbare Angaben vor. Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit lag bezüglich der primären Endpunkte bei - - Prozent.

**Tabelle 3.5.9 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	741	596	485	407	350	312	280	250	235	224	217	199	186	178	174	164	152	142
	auswertbar	Anzahl		538	476	401	349	310	280	242	229	217	210	196	185	177	173	163	150	141
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		30	17	9	7	8	2	7	5	5	16	7	3	4	6	7	6	3
		Anteil in %		5,58	3,57	2,24	2,01	2,58	0,71	2,89	2,18	2,30	7,62	3,57	1,62	2,26	3,47	4,29	4,00	2,13
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>94,90</b>	<b>91,55</b>	<b>89,52</b>	<b>87,73</b>	<b>85,48</b>	<b>84,87</b>	<b>82,47</b>	<b>80,70</b>	<b>78,90</b>	<b>73,08</b>	<b>70,51</b>	<b>69,37</b>	<b>67,82</b>	<b>65,48</b>	<b>62,66</b>	<b>60,17</b>	<b>58,89</b>
	CI		[93,12; 96,68]	[89,23; 93,87]	[86,90; 92,14]	[84,84; 90,62]	[82,27; 88,69]	[81,58; 88,16]	[78,82; 86,12]	[76,82; 84,58]	[74,79; 83,01]	[68,39; 77,77]	[65,61; 75,41]	[64,39; 74,35]	[62,72; 72,92]	[60,22; 70,74]	[57,23; 68,09]	[54,60; 65,74]	[53,26; 64,52]	
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	1900	1600	1256	1042	919	799	720	673	632	604	557	515	483	456	435	412	389	
	auswertbar	Anzahl		1416	1199	1024	898	793	680	631	600	592	555	511	480	456	434	411	384	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		44	45	20	27	19	20	20	14	35	25	16	16	11	12	16	15	
		Anteil in %		3,11	3,75	1,95	3,01	2,40	2,94	3,17	2,33	5,91	4,50	3,13	3,33	2,41	2,76	3,89	3,91	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>97,05</b>	<b>93,54</b>	<b>91,74</b>	<b>89,03</b>	<b>86,90</b>	<b>84,47</b>	<b>81,95</b>	<b>80,13</b>	<b>75,48</b>	<b>72,10</b>	<b>69,86</b>	<b>67,54</b>	<b>65,91</b>	<b>64,09</b>	<b>61,60</b>	<b>59,19</b>	
	CI		[96,19; 97,91]	[92,24; 94,84]	[90,24; 93,24]	[87,26; 90,80]	[84,93; 88,87]	[82,29; 86,65]	[79,57; 84,33]	[77,62; 82,64]	[72,68; 78,28]	[69,13; 75,07]	[66,79; 72,93]	[64,36; 70,72]	[62,67; 69,15]	[60,78; 67,40]	[58,20; 65,00]	[55,71; 62,67]		
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3009	2474	1981	1653	1417	1257	1191	1118	1038	938	865	799	746	705	665	625		
	auswertbar	Anzahl		2289	1923	1618	1379	1212	1149	1090	1017	922	850	788	734	701	655	617		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		92	59	44	45	35	35	44	58	38	34	34	23	29	21	18		
		Anteil in %		4,02	3,07	2,72	3,26	2,89	3,05	4,04	5,70	4,12	4,00	4,31	3,13	4,14	3,21	2,92		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>96,18</b>	<b>93,28</b>	<b>90,78</b>	<b>87,88</b>	<b>85,42</b>	<b>82,90</b>	<b>79,63</b>	<b>75,17</b>	<b>72,10</b>	<b>69,25</b>	<b>66,29</b>	<b>64,22</b>	<b>61,57</b>	<b>59,61</b>	<b>57,87</b>		
	CI		[95,42; 96,94]	[92,24; 94,32]	[89,53; 92,03]	[86,41; 89,35]	[83,78; 87,06]	[81,11; 84,69]	[77,67; 81,59]	[73,01; 77,33]	[69,82; 74,38]	[66,86; 71,64]	[63,81; 68,77]	[61,68; 66,76]	[58,95; 64,19]	[56,95; 62,27]	[55,16; 60,58]			
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	2057	1731	1453	1251	1115	1028	954	900	810	756	702	659	622	587	556			
	auswertbar	Anzahl		1662	1397	1227	1075	987	916	877	793	744	695	651	614	578	545			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		54	35	32	32	35	28	56	30	30	28	18	17	18	20			
		Anteil in %		3,25	2,51	2,61	2,98	3,55	3,06	6,39	3,78	4,03	4,03	2,76	2,77	3,11	3,67			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>96,83</b>	<b>94,47</b>	<b>92,04</b>	<b>89,38</b>	<b>86,32</b>	<b>83,78</b>	<b>78,54</b>	<b>75,62</b>	<b>72,60</b>	<b>69,69</b>	<b>67,77</b>	<b>65,91</b>	<b>63,88</b>	<b>61,53</b>			
	CI		[96,00; 97,66]	[93,35; 95,59]	[90,67; 93,41]	[87,77; 90,99]	[84,47; 88,17]	[81,76; 85,80]	[76,23; 80,85]	[73,17; 78,07]	[70,02; 75,18]	[67,00; 72,38]	[65,01; 70,53]	[63,09; 68,73]	[60,99; 66,77]	[58,57; 64,49]				
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	2626	2293	1926	1684	1548	1446	1344	1219	1119	1042	957	898	837	775				
	auswertbar	Anzahl		2171	1853	1605	1467	1385	1299	1189	1102	1026	943	881	821	761				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		87	59	51	45	38	75	47	32	37	31	33	36	37				
		Anteil in %		4,01	3,18	3,18	3,07	2,74	5,77	3,95	2,90	3,61	3,29	3,75	4,38	4,86				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>96,13</b>	<b>93,16</b>	<b>90,32</b>	<b>87,68</b>	<b>85,37</b>	<b>80,59</b>	<b>77,46</b>	<b>75,22</b>	<b>72,52</b>	<b>70,15</b>	<b>67,56</b>	<b>64,62</b>	<b>61,48</b>				
	CI		[95,33; 96,93]	[92,09; 94,23]	[89,03; 91,61]	[86,21; 89,15]	[83,77; 86,97]	[78,75; 82,43]	[75,48; 79,44]	[73,15; 77,29]	[70,35; 74,69]	[67,90; 72,40]	[65,22; 69,90]	[62,20; 67,04]	[58,97; 63,99]					
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	2328	1992	1732	1570	1433	1316	1184	1078	994	934	862	801	751					
	auswertbar	Anzahl		1931	1626	1479	1361	1280	1163	1059	978	918	848	785	731					
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		63	60	52	50	70	54	38	34	39	39	20	23					
		Anteil in %		3,26	3,69	3,52	3,67	5,47	4,64	3,59	3,48	4,25	4,60	2,55	3,15					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>96,82</b>	<b>93,42</b>	<b>90,30</b>	<b>87,12</b>	<b>82,46</b>	<b>78,67</b>	<b>75,87</b>	<b>73,25</b>	<b>70,15</b>	<b>66,94</b>	<b>65,25</b>	<b>63,19</b>					
	CI		[96,05; 97,59]	[92,29; 94,55]	[88,93; 91,67]	[85,54; 88,70]	[80,63; 84,29]	[76,66; 80,68]	[73,74; 78,00]	[71,02; 75,48]	[67,81; 72,49]	[64,50; 69,38]	[62,76; 67,74]	[60,64; 65,74]						

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	1891	1674	1456	1300	1196	1069	969	912	859	794	749	702							
	auswertbar	Anzahl		1593	1385	1243	1144	1040	944	884	836	765	726	674							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		56	64	39	68	45	29	34	35	22	26	27							
		Anteil in %		3,52	4,62	3,14	5,94	4,33	3,07	3,85	4,19	2,88	3,58	4,01							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>96,61</b>	<b>92,33</b>	<b>89,53</b>	<b>84,39</b>	<b>80,78</b>	<b>78,32</b>	<b>75,34</b>	<b>72,20</b>	<b>70,15</b>	<b>67,65</b>	<b>64,94</b>							
	CI		[95,74; 97,48]	[91,01; 93,65]	[87,98; 91,08]	[82,51; 86,27]	[78,71; 82,85]	[76,12; 80,52]	[73,01; 77,67]	[69,75; 74,65]	[67,62; 72,68]	[65,03; 70,27]	[62,24; 67,64]								
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	2002	1786	1598	1466	1280	1152	1046	972	893	823	761								
	auswertbar	Anzahl		1751	1542	1397	1227	1100	1003	923	846	778	714								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		65	44	104	50	49	36	34	37	21	19								
		Anteil in %		3,71	2,85	7,44	4,07	4,45	3,59	3,68	4,37	2,70	2,66								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>96,35</b>	<b>93,67</b>	<b>86,88</b>	<b>83,37</b>	<b>79,71</b>	<b>76,86</b>	<b>74,06</b>	<b>70,85</b>	<b>68,95</b>	<b>67,12</b>								
	CI		[95,48; 97,22]	[92,52; 94,82]	[85,23; 88,53]	[81,52; 85,22]	[77,68; 81,74]	[74,70; 79,02]	[71,78; 76,34]	[68,45; 73,25]	[66,48; 71,42]	[64,58; 69,66]									
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	1553	1419	1270	1113	1002	911	835	759	700	649									
	auswertbar	Anzahl		1389	1223	1083	979	883	813	737	677	625									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		55	72	34	36	36	40	27	27	22	26								
		Anteil in %		3,96	5,89	3,14	3,68	4,08	4,92	3,66	3,25	4,16									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>96,10</b>	<b>90,58</b>	<b>87,77</b>	<b>84,57</b>	<b>81,16</b>	<b>77,18</b>	<b>74,38</b>	<b>71,98</b>	<b>68,99</b>									
	CI		[95,09; 97,11]	[89,02; 92,14]	[85,99; 89,55]	[82,57; 86,57]	[78,96; 83,36]	[74,76; 79,60]	[71,83; 76,93]	[69,32; 74,64]	[66,21; 71,77]										
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	1441	1266	1108	963	879	811	756	701	656										
	auswertbar	Anzahl		1207	1079	945	859	796	736	684	634										
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		66	57	30	26	24	24	20	24										
		Anteil in %		5,47	5,28	3,17	3,03	3,02	3,26	2,92	3,79										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>94,74</b>	<b>89,78</b>	<b>86,95</b>	<b>84,34</b>	<b>81,81</b>	<b>79,17</b>	<b>76,87</b>	<b>73,96</b>										
	CI		[93,50; 95,98]	[88,07; 91,49]	[85,01; 88,89]	[82,22; 86,46]	[79,52; 84,10]	[76,72; 81,62]	[74,30; 79,44]	[71,23; 76,69]											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	826	748	646	573	531	491	456	424											
	auswertbar	Anzahl		731	636	561	519	478	444	409											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		37	26	19	22	12	15	13											
		Anteil in %		5,06	4,09	3,39	4,24	2,51	3,38	3,18											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>95,01</b>	<b>91,16</b>	<b>88,11</b>	<b>84,42</b>	<b>82,32</b>	<b>79,56</b>	<b>77,03</b>											
	CI		[93,44; 96,58]	[89,07; 93,25]	[85,68; 90,54]	[81,65; 87,19]	[79,37; 85,27]	[76,40; 82,72]	[73,68; 80,38]												
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	1266	1098	962	863	792	729	676												
	auswertbar	Anzahl		1081	955	849	781	716	663												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		43	36	31	24	20	20												
		Anteil in %		3,98	3,77	3,65	3,07	2,79	3,02												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>96,08</b>	<b>92,48</b>	<b>89,14</b>	<b>86,43</b>	<b>84,03</b>	<b>81,50</b>												
	CI		[94,93; 97,23]	[90,88; 94,08]	[87,22; 91,06]	[84,28; 88,58]	[81,70; 86,36]	[78,99; 84,01]													
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	950	847	731	658	601	549													
	auswertbar	Anzahl		839	721	648	587	542													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		44	26	19	21	19													
		Anteil in %		5,24	3,61	2,93	3,58	3,51													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>94,79</b>	<b>91,39</b>	<b>88,73</b>	<b>85,61</b>	<b>82,61</b>													
	CI		[93,29; 96,29]	[89,46; 93,32]	[86,51; 90,95]	[83,10; 88,12]	[79,85; 85,37]														
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	1055	926	825	727	661														
	auswertbar	Anzahl		912	808	715	647														
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		38	30	21	19														
		Anteil in %		4,17	3,71	2,94	2,94														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>95,87</b>	<b>92,37</b>	<b>89,68</b>	<b>87,05</b>														
	CI		[94,59; 97,15]	[90,62; 94,12]	[87,64; 91,72]	[84,75; 89,35]															

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	1015	904	772	694														
	auswertbar	Anzahl		899	768	683														
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		41	29	21														
		Anteil in %			4,56	3,78	3,07													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>			<b>95,46</b>	<b>91,86</b>	<b>89,04</b>													
CI				[94,10; 96,82]	[90,03; 93,69]	[86,90; 91,18]														
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	1045	907	774															
	auswertbar	Anzahl		898	764															
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		34	24															
		Anteil in %			3,79	3,14														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>			<b>96,24</b>	<b>93,22</b>														
CI				[95,00; 97,48]	[91,53; 94,91]															
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	926	784																
	auswertbar	Anzahl		771																
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		25																
		Anteil in %			3,24															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>			<b>96,76</b>															
CI				[95,51; 98,01]																
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	920																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>																		
CI																				

In Tabelle 3.5.10 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer oder sekundärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre oder sekundäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.



In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr noch - - Personen dem Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation zuzuordnen. Für - - dieser Kollektivmitglieder lagen auswertbare

Angaben vor. Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit lag bezüglich der primären und sekundären Endpunkte bei - - Prozent.

**Tabelle 3.5.10 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation**

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3307	2737	2239	1822	1521	1319	1170	1064	1014	969	929	742	683	638	598	564	528	496
	auswertbar	Anzahl		2539	2190	1783	1501	1304	1158	1028	981	940	918	733	677	633	590	561	525	494
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		139	134	68	58	38	29	21	28	19	176	47	30	29	26	30	24	20
		Anteil in %		5,47	6,12	3,81	3,86	2,91	2,50	2,04	2,85	2,02	19,17	6,41	4,43	4,58	4,41	5,35	4,57	4,05
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>94,86</b>	<b>89,17</b>	<b>85,83</b>	<b>82,54</b>	<b>80,16</b>	<b>78,17</b>	<b>76,62</b>	<b>74,50</b>	<b>73,03</b>	<b>59,18</b>	<b>55,42</b>	<b>52,98</b>	<b>50,57</b>	<b>48,36</b>	<b>45,79</b>	<b>43,70</b>	<b>41,93</b>	
	CI		[94,03; 95,69]	[87,95; 90,39]	[84,42; 87,24]	[80,95; 84,13]	[78,45; 81,87]	[76,35; 79,99]	[74,72; 78,52]	[72,50; 76,50]	[70,96; 75,10]	[56,69; 61,67]	[52,87; 57,97]	[50,39; 55,57]	[47,96; 53,18]	[45,73; 50,99]	[43,14; 48,44]	[41,04; 46,36]	[39,27; 44,59]	
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8312	7014	5566	4571	4026	3551	3177	2974	2833	2710	2244	2034	1901	1774	1620	1517	1415	
	auswertbar	Anzahl		6288	5331	4471	3975	3510	3039	2832	2710	2662	2211	2016	1884	1755	1604	1493	1385	
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		411	230	156	120	92	90	72	66	408	151	89	98	109	77	73	62	
		Anteil in %		6,54	4,31	3,49	3,02	2,62	2,96	2,54	2,44	15,33	6,83	4,41	5,20	6,21	4,80	4,89	4,48	
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>93,82</b>	<b>89,90</b>	<b>86,82</b>	<b>84,22</b>	<b>82,03</b>	<b>79,70</b>	<b>77,76</b>	<b>75,95</b>	<b>64,44</b>	<b>60,08</b>	<b>57,43</b>	<b>54,46</b>	<b>51,08</b>	<b>48,63</b>	<b>46,27</b>	<b>44,20</b>		
	CI		[93,24; 94,40]	[89,16; 90,64]	[85,96; 87,68]	[83,27; 85,17]	[81,00; 83,06]	[78,59; 80,81]	[76,59; 78,93]	[74,73; 77,17]	[62,98; 65,90]	[58,56; 61,60]	[55,88; 58,98]	[52,89; 56,03]	[49,48; 52,68]	[47,02; 50,24]	[44,65; 47,89]	[42,57; 45,83]		
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9837	8360	6718	5729	4918	4410	4160	3903	3674	3054	2751	2528	2363	2222	2083	1943		
	auswertbar	Anzahl		7810	6561	5598	4829	4234	4007	3752	3591	3018	2719	2503	2342	2200	2068	1921		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		442	228	178	130	105	127	99	521	197	142	114	88	90	97	80		
		Anteil in %		5,66	3,48	3,18	2,69	2,48	3,17	2,64	14,51	6,53	5,22	4,55	3,76	4,09	4,69	4,16		
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>94,61</b>	<b>91,38</b>	<b>88,52</b>	<b>86,17</b>	<b>84,11</b>	<b>81,52</b>	<b>79,45</b>	<b>68,15</b>	<b>63,74</b>	<b>60,44</b>	<b>57,70</b>	<b>55,54</b>	<b>53,28</b>	<b>50,79</b>	<b>48,68</b>			
	CI		[94,12; 95,10]	[90,75; 92,01]	[87,79; 89,25]	[85,35; 86,99]	[83,22; 85,00]	[80,55; 82,49]	[78,42; 80,48]	[66,89; 69,41]	[62,42; 65,06]	[59,08; 61,80]	[56,31; 59,09]	[54,13; 56,95]	[51,86; 54,70]	[49,35; 52,23]	[47,23; 50,13]			
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8018	6858	5748	4848	4310	3993	3741	3515	2956	2641	2454	2283	2142	2009	1873			
	auswertbar	Anzahl		6541	5535	4714	4137	3808	3573	3423	2899	2602	2403	2246	2101	1970	1832			
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		300	172	113	116	107	94	458	211	127	108	94	76	87	86			
		Anteil in %		4,59	3,11	2,40	2,80	2,81	2,63	13,38	7,28	4,88	4,49	4,19	3,62	4,42	4,69			
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>95,57</b>	<b>92,66</b>	<b>90,49</b>	<b>88,03</b>	<b>85,66</b>	<b>83,49</b>	<b>72,58</b>	<b>67,36</b>	<b>64,09</b>	<b>61,24</b>	<b>58,69</b>	<b>56,59</b>	<b>54,11</b>	<b>51,57</b>				
	CI		[95,08; 96,06]	[92,02; 93,30]	[89,75; 91,23]	[87,19; 88,87]	[84,73; 86,59]	[82,48; 84,50]	[71,30; 73,86]	[65,99; 68,73]	[62,68; 65,50]	[59,79; 62,69]	[57,21; 60,17]	[55,09; 58,09]	[52,59; 55,63]	[50,03; 53,11]				
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9648	8512	7085	6144	5660	5237	4894	4068	3621	3357	3108	2915	2707	2537				
	auswertbar	Anzahl		8036	6834	5836	5381	4975	4753	3997	3564	3304	3066	2863	2667	2498				
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		420	227	175	178	153	654	286	173	167	126	143	96	105				
		Anteil in %		5,23	3,32	3,00	3,31	3,08	13,76	7,16	4,85	5,05	4,11	4,99	3,60	4,20				
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>94,99</b>	<b>91,93</b>	<b>89,28</b>	<b>86,46</b>	<b>83,91</b>	<b>72,65</b>	<b>67,51</b>	<b>64,26</b>	<b>61,05</b>	<b>58,55</b>	<b>55,66</b>	<b>53,67</b>	<b>51,42</b>					
	CI		[94,52; 95,46]	[91,33; 92,53]	[88,58; 89,98]	[85,67; 87,25]	[83,05; 84,77]	[71,55; 73,75]	[66,34; 68,68]	[63,05; 65,47]	[59,81; 62,29]	[57,28; 59,82]	[54,37; 56,95]	[52,37; 54,97]	[50,10; 52,74]					
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9210	7848	6653	6032	5598	5239	4271	3762	3418	3161	2899	2669	2488					
	auswertbar	Anzahl		7556	6282	5731	5308	5054	4187	3672	3360	3103	2836	2617	2406					
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		320	198	172	138	783	300	213	159	160	140	114	103					
		Anteil in %		4,24	3,15	3,00	2,60	15,49	7,17	5,80	4,73	5,16	4,94	4,36	4,28					
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>95,88</b>	<b>92,99</b>	<b>90,32</b>	<b>88,07</b>	<b>74,83</b>	<b>69,52</b>	<b>65,55</b>	<b>62,46</b>	<b>59,26</b>	<b>56,37</b>	<b>53,93</b>	<b>51,62</b>						
	CI		[95,44; 96,32]	[92,41; 93,57]	[89,63; 91,01]	[87,30; 88,84]	[73,75; 75,91]	[68,36; 70,68]	[64,34; 66,76]	[61,22; 63,70]	[57,99; 60,53]	[55,07; 57,67]	[52,61; 55,25]	[50,29; 52,95]						
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8313	7352	6493	5933	5539	4613	4082	3707	3395	3143	2945	2736						
	auswertbar	Anzahl		6955	6183	5667	5318	4499	3991	3618	3318	3067	2874	2664						
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		294	221	137	701	296	205	195	153	112	120	91						
		Anteil in %		4,23	3,57	2,42	13,18	6,58	5,14	5,39	4,61	3,65	4,18	3,42						
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		<b>95,95</b>	<b>92,66</b>	<b>90,50</b>	<b>78,97</b>	<b>73,85</b>	<b>70,09</b>	<b>66,35</b>	<b>63,31</b>	<b>61,02</b>	<b>58,49</b>	<b>56,49</b>							
	CI		[95,50; 96,40]	[92,05; 93,27]	[89,80; 91,20]	[77,97; 79,97]	[72,76; 74,94]	[68,94; 71,24]	[65,15; 67,55]	[62,07; 64,55]	[59,75; 62,29]	[57,20; 59,78]	[55,18; 57,80]							

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	9461	8488	7581	6917	5769	5135	4713	4356	4052	3747	3479							
	auswertbar	Anzahl		8241	7367	6559	5567	4940	4536	4193	3882	3567	3293							
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		321	205	838	326	211	216	181	174	159	115							
		Anteil in %		3,90	2,78	12,78	5,86	4,27	4,76	4,32	4,48	4,46	3,49							
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>96,20</b>	<b>93,58</b>	<b>82,02</b>	<b>77,27</b>	<b>74,00</b>	<b>70,51</b>	<b>67,48</b>	<b>64,48</b>	<b>61,62</b>	<b>59,47</b>							
		CI		[95,79; 96,61]	[93,05; 94,11]	[81,15; 82,89]	[76,31; 78,23]	[72,99; 75,01]	[69,44; 71,58]	[66,37; 68,59]	[63,33; 65,63]	[60,44; 62,80]	[58,27; 60,67]							
2007-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	8389	7613	6816	5617	4907	4506	4159	3862	3593	3316								
	auswertbar	Anzahl		7455	6505	5480	4808	4415	4066	3763	3513	3213								
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		278	802	365	182	171	152	140	146	119								
		Anteil in %		3,73	12,33	6,66	3,79	3,87	3,74	3,72	4,16	3,70								
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>96,33</b>	<b>84,89</b>	<b>79,30</b>	<b>76,32</b>	<b>73,39</b>	<b>70,67</b>	<b>68,06</b>	<b>65,25</b>	<b>62,83</b>								
		CI		[95,91; 96,75]	[84,06; 85,72]	[78,35; 80,25]	[75,31; 77,33]	[72,33; 74,45]	[69,56; 71,78]	[66,91; 69,21]	[64,06; 66,44]	[61,61; 64,05]								
2008-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7991	7129	5891	5079	4597	4228	3891	3619	3347									
	auswertbar	Anzahl		6828	5741	4977	4492	4142	3804	3533	3241									
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		751	348	222	187	158	159	141	111									
		Anteil in %		11,00	6,06	4,46	4,16	3,81	4,18	3,99	3,42									
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>89,39</b>	<b>84,04</b>	<b>80,32</b>	<b>77,01</b>	<b>74,10</b>	<b>71,03</b>	<b>68,22</b>	<b>65,88</b>									
		CI		[88,67; 90,11]	[83,17; 84,91]	[79,36; 81,28]	[75,98; 78,04]	[73,01; 75,19]	[69,89; 72,17]	[67,03; 69,41]	[64,66; 67,10]									
2008-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	5478	4861	4003	3537	3186	2925	2715	2516										
	auswertbar	Anzahl		4772	3943	3486	3147	2880	2662	2453										
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		434	209	174	116	106	86	85										
		Anteil in %		9,09	5,30	4,99	3,69	3,68	3,23	3,47										
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>91,03</b>	<b>86,25</b>	<b>81,98</b>	<b>78,98</b>	<b>76,10</b>	<b>73,66</b>	<b>71,11</b>										
		CI		[90,23; 91,83]	[85,26; 87,24]	[80,85; 83,11]	[77,77; 80,19]	[74,82; 77,38]	[72,32; 75,00]	[69,71; 72,51]										
2009-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7410	6403	5325	4644	4185	3797	3473											
	auswertbar	Anzahl		6280	5254	4579	4114	3736	3401											
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		534	319	213	201	156	125											
		Anteil in %		8,50	6,07	4,65	4,89	4,18	3,68											
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>91,62</b>	<b>86,09</b>	<b>82,12</b>	<b>78,14</b>	<b>74,90</b>	<b>72,15</b>											
		CI		[90,94; 92,30]	[85,22; 86,96]	[81,14; 83,10]	[77,07; 79,21]	[73,76; 76,04]	[70,95; 73,35]											
2009-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6033	5345	4501	3950	3528	3201												
	auswertbar	Anzahl		5271	4455	3899	3486	3154												
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		428	250	186	143	112												
		Anteil in %		8,12	5,61	4,77	4,10	3,55												
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>91,97</b>	<b>86,84</b>	<b>82,74</b>	<b>79,37</b>	<b>76,55</b>												
		CI		[91,24; 92,70]	[85,91; 87,77]	[81,69; 83,79]	[78,22; 80,52]	[75,33; 77,77]												
2010-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7135	6329	5367	4735	4234													
	auswertbar	Anzahl		6255	5293	4670	4152													
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		475	260	231	146													
		Anteil in %		7,59	4,91	4,95	3,52													
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>92,47</b>	<b>87,97</b>	<b>83,66</b>	<b>80,72</b>													
		CI		[91,82; 93,12]	[87,15; 88,79]	[82,71; 84,61]	[79,69; 81,75]													
2010-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6587	5883	4951	4355														
	auswertbar	Anzahl		5806	4900	4277														
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		428	252	173														
		Anteil in %		7,37	5,14	4,04														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	Rate		<b>92,71</b>	<b>87,98</b>	<b>84,42</b>														
		CI		[92,04; 93,38]	[87,13; 88,83]	[83,45; 85,39]														

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2011-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	7063	6259	5314															
	auswertbar	Anzahl		6149	5200															
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		422	259															
		Anteil in %			6,86	4,98														
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>93,22</b>	<b>88,58</b>															
	CI		[92,60; 93,84]	[87,77; 89,39]																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6247	5493																
	auswertbar	Anzahl		5391																
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		363																
		Anteil in %			6,73															
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>		<b>93,27</b>																
	CI		[92,60; 93,94]																	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder unter Risiko</b>	Anzahl	6485																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
	<b>kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit</b>	<b>Rate</b>																		
	CI																			

## Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte

Ein Grundziel der Evaluation ist laut Kriterien des BVA die Überprüfung der Kosten der Versorgung der DMP-Patienten. Entsprechende Auswertungen werden in diesem zweiten Teil des Evaluationsberichtes vorgenommen. Hierzu werden anhand von Zufallsstichproben die durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patient berechnet. In diese Betrachtung fließen alle Ausgaben für die betrachteten Leistungsbereiche ein, nicht nur die diabetesspezifischen Ausgaben. Differenziert wird nach folgenden Bereichen:

- Ambulante ärztliche Behandlung
- Krankenhausbehandlung
- Arzneimittel
- Heilmittel
- Hilfsmittel
- Dialyse-Sachkosten
- Anschlussrehabilitation
- Häusliche Krankenpflege
- Krankengeld

Für die Zuordnung der Kosten zu einem Halbjahreszeitraum ist in der Regel der Beginn der Maßnahme ausschlaggebend, der die Kosten zuzuordnen sind. So sind die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt dem (Halb-)Jahr zuzuordnen, in dem der Krankenhausaufenthalt begann. Allerdings ist für die Zuordnung der Heilmittelkosten relevant, in welchem Monat sie abgerechnet wurden. Bei Neueinschreibungen gilt, dass die Kosten des vollständigen Quartals, in dem die Einschreibung erfolgt, berücksichtigt werden.

In den nachfolgenden standardisierten Tabellen wird die Entwicklung der durchschnittlichen Ausgaben zunächst getrennt nach Leistungsbereichen ausgewiesen, bevor die Gesamtbetrachtung erfolgt. Die Tabellen enthalten für alle Halbjahres-Kohorten die statistischen Kennwerte arithmetisches Mittel, Konfidenzintervall (95%) und Standardabweichung.

Das arithmetische Mittel wird berechnet, indem die gesamten Ausgaben eines Leistungsbereiches, die innerhalb eines Halbjahres für eine Kohorte angefallen sind, durch die Anzahl der teilnehmenden Patienten dieser Kohorte in diesem Halbjahr dividiert werden. Patienten, die im Berichtshalbjahr versterben, sind mit 0,5 zu gewichten. Patienten, die aus anderen Gründen ausscheiden, sind ebenfalls mit 0,5 zu gewichten, sofern ihr Ausscheiden im 1. Quartal des Halbjahres erfolgt.

Würden beispielsweise im Berichtshalbjahr von zehn Patienten zwei im zweiten Quartal versterben und einer aus sonstigen Gründen im zweiten Quartal ausscheiden, wären die beiden verstorbenen Patienten halb, der aus sonstigen Gründen ausgeschiedene Patient sowie die im Programm verbliebenen Patienten voll zu gewichten. Die Bezugsgröße für die Mittelwertbildung beliefe sich rechnerisch auf neun Fälle.

Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum ohne Beitrittshalbjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden, sofern die Daten vorliegen, die Ausgaben der Patienten einer Kohorte über alle Berichtshalbjahre aufsummiert und durch die Summe der gewichteten Teilnahmejahre dividiert (jeweils ohne Beitrittshalbjahr).

Bei den Auswertungen zu Krankengeldausgaben entfällt die Gewichtung.

Einschränkend ist anzumerken, dass in allen Leistungsbereichen erstmals die mit Beginn 2004 anfallenden Abrechnungsdaten genutzt werden können, da erst ab diesem Zeitpunkt wesentliche Abrechnungsdaten (ambulante ärztliche Behandlung) verfügbar sind. Folglich sind die Ausgaben insgesamt und nach Leistungsbereichen erst ab dem 1. Halbjahr 2004 darzustellen. Für vorige Halbjahre wird daher in diesem Bericht nur die Anzahl der Patienten in der Stichprobe ausgewiesen. Für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege sind die Leistungsausgaben sogar erst ab dem 1. Halbjahr 2006 darzustellen, da eine frühere versichertenbezogene Erfassung dieser Daten bei einigen Krankenkassen sehr aufwändig wäre.

Neben den durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patient, deren Berechnung auf Zufallsstichproben basiert, werden weitere Kosten der Versorgung der DMP-Patienten dargestellt. Diese beinhalten die gesonderten Kosten der Krankenkassen für Verwaltung, Qualitätssicherung u.ä. im Rahmen der DMP. Die Verwaltungskosten und die Kosten der Qualitätssicherung werden durch die programmduchführenden Krankenkassen kalkulatorisch ermittelt und basieren nicht auf Stichproben. Eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Patienten, die nicht während des gesamten Jahres eingeschrieben waren, gehen anteilig in die Berechnung ein. Die Durchschnittskosten ergeben sich folglich als der Quotient aus den Gesamtkosten für Verwaltung und Qualitätssicherung und den Versichertenjahren (= Gesamtzahl der eingeschriebenen Versicherten gewichtet mit dem Anteil ihres Teilnahmezeitraums im betrachteten Jahr).

Als **Verwaltungskosten** der Krankenkassen für die DMPs gelten

- Personal- und Sachkosten inklusive der Raumkosten, die mit der Durchführung der DMPs zusammenhängen und
- Kosten für die Datenverarbeitung und -erfassung sowie für die Evaluation, die in erster Linie an Dritte vergeben wird.

Als **Kosten der Qualitätssicherung** der Krankenkassen gelten

- Kosten der versichertenbezogenen Qualitätssicherung, die intern oder durch die Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen anfallen, z.B. durch Beratung der Versicherten, Reminder, Broschüren;
- Kosten der arztbezogenen Qualitätssicherung, die, je nach Datenflussmodell, direkt bei den Kassen anfallen können, bei der gemeinsamen Einrichtung oder bei Dritten (z.B. Erstellung von Feedbackberichten durch Datenstellen).

Die genaue Methode zur Ermittlung der Verwaltungskosten ist in diesem Evaluationsbericht nicht darzustellen; die Kassen haben die jeweils von ihnen verwendete Methodik dem BVA jedoch auf Anfrage mitzuteilen.

Im Gegensatz zu den Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Inhalte im ersten Teil basiert die Evaluation der ökonomischen Inhalte nicht auf den Daten aller Teilnehmer des evaluierten DMP. Vielmehr werden dazu aus allen Halbjahres-Kohorten **Stichproben** gezogen. Der Stichprobenumfang beträgt in der Regel zehn Prozent der Patientenzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patienten. Bei Kohorten mit weniger als 100 Patienten werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patienten umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.

Zu beachten ist dabei, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patienten im Berichtsteile I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

Zu beachten sind bezüglich der Stichprobengröße auch Sondereffekte, die sich aus der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 ergeben. Für alle Kohorten vor der Fusion (bis einschließlich der Kohorte 2007-2) wurden die Stichproben für DMP-Teilnehmer von AOK und See-Krankenkasse gemeinsam gezogen, da auch die Versicherten der See-Krankenkasse an den DMPs der AOK teilnahmen. Nach der Fusion waren die Versicherten der See-Krankenkasse gemäß der Vorgaben des BVA mit ihrer gesamten Historie den Berichten der Knappschaft zuzuordnen. Diese nachträgliche Neuordnung der (ehemaligen) See-Versicherten führt sowohl in den Evaluationsberichten der AOK als auch in den Evaluationsberichten der Knappschaft dazu, dass häufig in den Kohorten bis einschließlich 2007-2 die Stichprobenfallzahlen nicht mehr der oben beschriebenen Stichprobenquote bzw. den oben definierten Ober- und Untergrenzen entsprechen.

**Auswertungskapitel 4: Patientenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben**

Tabelle 4.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patienten für die Ausgabenanalysen zur Verfügung standen. Dabei handelt es sich um Stichproben aus der Gesamtzahl der Patienten je Kohorte. Ihre Anzahl wird jeweils in der ersten Zeile ausgewiesen. Im Laufe der weiteren Teilnahmehalbjahre kann sich die Anzahl verringern, weil Patienten wegen Tod, Ausschluss oder eigener Beendigung aus dem Programm ausscheiden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbereichen ist jedoch nicht die Zahl der Patienten zu Beginn des Berichtshalbjahres relevant, sondern die Zahl der gewichteten Patienten (siehe einführende Anmerkungen zum Berichtsteil II), für die im Berichtshalbjahr die erforderlichen Angaben zu den Leistungsausgaben vorliegen. Zur Information wird diese Zahl in der zweiten Zeile ausgewiesen. Da die Daten zu den Leistungsausgaben erst ab dem Halbjahr 2004-1 vorliegen, können für davor liegende Halbjahre keine Auswertungen vorgenommen werden.

In der jeweils dritten Zeile wird ausgewiesen, wie viele Patienten im jeweiligen Berichtshalbjahr aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Die vierte Zeile weist den kumulierten Wert aus: Sie gibt an, wie viele Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres verstorben oder aus anderen Gründen aus der Stichprobe ausgeschieden sind.

Umfasst eine Kohorte in der Stichprobe weniger als 10 Patientinnen, werden keine Auswertungen vorgenommen. Stattdessen sind die Zahlenfelder der Auswertungstabellen in diesem Fall mit „-“ gefüllt.

In der Kohorte 2003-1 umfasst die Stichprobe im Beitrittsjahr 43 Patienten. Als Berechnungsbasis für die durchschnittlichen Leistungsausgaben dieser Kohorte und des jeweils letzten Berichtshalbjahres werden in den folgenden Tabellen diese - auswertbaren und gewichteten Patienten herangezogen.

**Tabelle 4.1 Patienten in der Stichprobe (Anzahl)**

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2003-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		auswertbar und gewichtet			15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden			7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden			33	34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124			
		auswertbar und gewichtet		391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5			
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden		80	45	37	31	18	14	5	2	5	6	8	9	1	7	5	5	7			
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden		178	223	260	291	309	323	328	330	335	341	349	358	359	366	371	376	383			
2004-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132				
		auswertbar und gewichtet	485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5				
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	82	76	62	23	31	15	12	14	8	6	10	6	9	5	4	5	5				
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	82	158	220	243	274	289	301	315	323	329	339	345	354	359	363	368	373				
2004-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170					
		auswertbar und gewichtet	488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0					
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	65	81	35	39	23	9	12	12	6	11	8	7	7	11	4	6					
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	65	146	181	220	243	252	264	276	282	293	301	308	315	326	330	336					
2005-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176						
		auswertbar und gewichtet	484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5						
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	72	65	38	29	18	14	11	10	17	5	10	11	14	10	7						
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	72	137	175	204	222	236	247	257	274	279	289	300	314	324	331						
2005-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179							
		auswertbar und gewichtet	490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5							
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	44	71	46	22	19	18	20	17	15	12	13	6	17	3							
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	44	115	161	183	202	220	240	257	272	284	297	303	320	323							
2006-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202								
		auswertbar und gewichtet	483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5								
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	69	52	40	19	14	15	27	18	6	16	14	8	10								
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	69	121	161	180	194	209	236	254	260	276	290	298	308								
2006-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247									
		auswertbar und gewichtet	489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0									
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	43	47	33	21	19	30	17	11	11	7	13	10									
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	43	90	123	144	163	193	210	221	232	239	252	262									
2007-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247										
		auswertbar und gewichtet	483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0										
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	48	34	25	25	25	34	16	14	16	16	10										
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	48	82	107	132	157	191	207	221	237	253	263										

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	499	460	425	391	360	339	320	302	284	268												
		auswertbar und gewichtet	490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0												
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	39	35	34	31	21	19	18	18	16	12												
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	39	74	108	139	160	179	197	215	231	243												
2008-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	458	424	380	350	333	312	303	288													
		auswertbar und gewichtet	485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5													
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	42	34	44	30	17	21	9	15	15													
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	42	76	120	150	167	188	197	212	227													
2008-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	454	411	379	354	329	314	300														
		auswertbar und gewichtet	490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0														
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	46	43	32	25	25	15	14	9														
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	46	89	121	146	171	186	200	209														
2009-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	433	383	345	318	308	295															
		auswertbar und gewichtet	483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0															
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	67	50	38	27	10	13	20															
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	67	117	155	182	192	205	225															
2009-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	437	393	368	340	311																
		auswertbar und gewichtet	488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5																
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	63	44	25	28	29	24																
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	63	107	132	160	189	213																
2010-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	439	393	363	336																	
		auswertbar und gewichtet	482,0	400,5	374,0	353,0	330,5																	
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	61	46	30	27	8																	
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	61	107	137	164	172																	
2010-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	499	451	405	366																		
		auswertbar und gewichtet	463,5	429,0	391,0	358,0																		
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	48	46	39	15																		
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	48	94	133	148																		
2011-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	440	402																			
		auswertbar und gewichtet	479,5	427,0	388,0																			
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	60	38	39																			
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	60	98	137																			
2011-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	434																				
		auswertbar und gewichtet	481,0	416,0																				
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	66	47																				
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	66	113																				
2012-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500																					
		auswertbar und gewichtet	483,0																					
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	58																					
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	58																					

**Auswertungskapitel 5: Leistungsausgaben**

Tabelle 5.1 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für die **ambulante ärztliche Behandlung**. Die Leistungsausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung ergeben sich dabei aus dem Produkt aus der Summe der erbrachten Punkte und einem durchschnittlichen Punktwert von 3,5 Eurocent sowie den in Euro abgerechneten Gebührenpositionen. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten

**Tabelle 5.1 Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	913,52			338,07	781,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI	[706,46;			[233,31;	[130,64;	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mean		1120,59]			442,84]	1432,75]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	914,90			207,01	1023,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	946,00		383,04	390,47	412,12	453,88	503,97	525,83	574,36	581,56	491,44	472,27	521,27	526,67	498,64	473,64	515,39	483,14	478,49	
		CI	[902,34;		[350,29;	[351,53;	[374,59;	[403,77;	[403,89;	[360,87;	[382,47;	[387,61;	[418,02;	[429,12;	[453,62;	[464,46;	[439,33;	[413,33;	[444,15;	[414,55;	[413,18;	
Mean		989,67]		415,79]	429,41]	449,65]	503,99]	604,05]	690,80]	766,26]	775,51]	564,86]	515,41]	588,91]	588,87]	557,95]	533,95]	586,62]	551,73]	543,80]		
	SD	1254,40		330,62	346,14	311,40	388,13	730,18	1144,76	1291,46	1278,78	479,70	277,16	424,81	381,49	355,47	345,38	411,20	388,10	359,67		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5		
	Leistungsausgaben	Mean	991,76	419,67	446,10	477,80	451,56	452,39	496,96	505,78	520,70	490,83	496,10	535,56	524,12	546,16	521,27	550,91	546,59	536,25		
		CI	[912,77;	[348,47;	[353,88;	[354,28;	[338,00;	[324,97;	[351,65;	[354,95;	[360,80;	[322,93;	[320,88;	[353,46;	[329,66;	[343,09;	[288,46;	[337,51;	[315,60;	[296,96;		
Mean		1070,75]	490,87]	538,33]	601,33]	565,12]	579,82]	642,27]	656,61]	680,59]	658,72]	671,31]	717,67]	718,58]	749,24]	754,09]	764,32]	777,59]	775,54]			
	SD	2292,45	800,46	934,57	1128,28	961,67	1018,65	1099,66	1107,19	1137,75	1154,04	1182,59	1200,68	1247,12	1275,28	1400,43	1288,28	1371,88	1394,68			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0			
	Leistungsausgaben	Mean	979,76	374,36	434,99	403,83	415,08	392,83	469,65	501,51	546,81	512,57	566,53	539,10	508,58	551,55	534,05	565,13	633,11			
		CI	[915,52;	[346,25;	[377,22;	[371,26;	[386,26;	[360,37;	[322,26;	[350,49;	[390,39;	[345,05;	[452,21;	[373,77;	[350,45;	[381,45;	[370,72;	[394,15;	[385,25;			
Mean		1044,00]	402,46]	492,76]	436,40]	443,89]	425,29]	617,04]	652,53]	703,24]	680,10]	680,84]	704,43]	666,71]	721,65]	697,39]	736,10]	880,98]				
	SD	1971,18	316,94	598,26	310,43	258,42	274,12	1199,68	1204,82	1216,93	1276,39	851,22	1206,27	1130,92	1169,21	1125,80	1145,71	1639,11				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5				
	Leistungsausgaben	Mean	967,41	446,75	451,24	481,95	462,22	467,83	444,17	472,81	476,06	492,59	460,93	513,67	530,75	541,64	526,48	534,80				
		CI	[903,68;	[355,58;	[400,18;	[389,56;	[359,36;	[365,57;	[329,68;	[352,64;	[352,91;	[360,91;	[323,92;	[366,93;	[376,74;	[381,59;	[352,64;	[365,27;				
Mean		1031,15]	537,91]	502,30]	574,34]	565,08]	570,10]	558,67]	592,98]	599,21]	624,27]	597,94]	660,42]	684,75]	701,69]	700,33]	704,33]					
	SD	1944,82	1023,31	528,47	882,49	933,63	886,21	964,30	987,64	991,45	1036,44	1046,22	1101,63	1105,63	1143,22	1199,86	1139,33					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5					
	Leistungsausgaben	Mean	1205,58	525,05	587,16	604,37	642,17	590,52	641,19	711,91	697,90	618,25	585,71	529,11	540,12	510,63	474,95					
		CI	[1099,10;	[417,46;	[440,63;	[424,86;	[443,77;	[413,28;	[436,62;	[478,69;	[468,66;	[414,20;	[377,49;	[359,13;	[395,37;	[335,10;	[382,30;					
Mean		1312,05]	632,64]	733,69]	783,88]	840,58]	767,77]	845,75]	945,13]	927,14]	822,30]	793,94]	699,09]	684,87]	686,16]	567,61]						
	SD	3210,57	1215,13	1555,65	1766,46	1840,25	1590,94	1775,81	1960,64	1867,71	1601,04	1588,23	1232,57	1044,43	1239,32	631,58						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5						
	Leistungsausgaben	Mean	1235,01	538,92	530,62	590,66	644,32	662,13	678,19	691,89	703,32	646,51	572,24	582,09	552,05	546,94						
		CI	[1112,96;	[432,07;	[387,31;	[421,14;	[426,94;	[435,72;	[455,35;	[447,21;	[450,31;	[410,10;	[362,23;	[375,66;	[326,52;	[375,12;						
Mean		1357,05]	645,77]	673,93]	760,17]	861,71]	888,54]	901,04]	936,58]	956,33]	882,91]	782,25]	788,51]	777,58]	718,77]							
	SD	3589,22	1198,12	1494,00	1654,58	2019,37	2048,58	1970,93	2075,87	2051,22	1862,69	1582,03	1533,50	1633,38	1219,45							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	925,51	487,89	547,32	516,71	504,36	456,08	458,35	414,80	403,96	413,69	394,52	424,54	456,47						
		CI	[870,41; 980,61]	[415,75; 560,03]	[424,45; 670,18]	[400,24; 633,17]	[382,89; 625,83]	[364,55; 547,61]	[417,70; 498,99]	[380,58; 449,02]	[372,07; 435,85]	[378,61; 448,78]	[365,34; 423,69]	[383,50; 465,58]	[401,19; 511,76]						
SD		1640,43	814,30	1314,13	1183,96	1189,67	868,62	366,89	295,80	268,36	285,56	236,30	327,39	428,71							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	1238,96	561,04	549,97	577,81	569,38	657,99	672,58	668,01	670,25	653,35	639,21	597,55							
		CI	[1116,86; 1361,07]	[436,29; 685,80]	[411,74; 688,19]	[428,70; 726,92]	[409,52; 729,24]	[473,92; 842,06]	[458,77; 886,39]	[441,49; 894,54]	[415,24; 925,26]	[405,83; 900,87]	[415,36; 863,07]	[402,08; 793,03]							
SD		3514,37	1399,55	1475,94	1530,08	1590,97	1753,18	1948,31	1973,23	2101,96	2040,21	1793,15	1519,10								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	989,12	443,29	496,24	470,24	506,37	524,80	529,24	462,58	473,98	488,46	495,15								
		CI	[917,19; 1061,05]	[389,56; 497,02]	[418,06; 574,41]	[387,40; 553,09]	[396,90; 615,83]	[399,12; 650,47]	[393,95; 664,53]	[365,16; 560,00]	[366,28; 581,68]	[365,86; 611,07]	[372,43; 617,87]								
SD		2027,44	607,09	845,14	859,46	1087,26	1198,73	1253,88	860,92	943,75	1037,34	1011,55									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	821,03	415,51	384,03	416,82	422,29	444,77	403,52	403,78	415,67	396,45									
		CI	[793,26; 848,80]	[390,40; 440,63]	[357,34; 410,71]	[384,00; 449,64]	[382,45; 462,14]	[397,05; 492,48]	[369,71; 437,34]	[351,72; 455,84]	[377,52; 453,83]	[349,07; 443,84]									
SD		739,23	282,34	287,72	335,31	387,58	446,91	301,80	460,07	332,95	401,25										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	1033,71	499,90	478,70	448,69	478,47	583,62	522,49	558,33	592,10										
		CI	[934,63; 1132,80]	[407,90; 591,90]	[399,52; 557,87]	[368,50; 528,88]	[362,53; 594,40]	[417,99; 749,25]	[376,25; 668,72]	[392,56; 724,10]	[403,62; 780,58]										
SD		2502,20	1039,03	848,32	817,76	1137,75	1518,71	1321,00	1486,74	1648,86											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	952,71	515,05	503,29	429,64	474,89	485,78	463,21	503,55											
		CI	[885,23; 1020,18]	[445,89; 584,21]	[418,33; 588,25]	[396,07; 463,20]	[406,81; 542,98]	[383,63; 587,93]	[381,51; 544,91]	[386,60; 620,50]											
SD		1534,86	775,48	878,80	328,31	625,75	906,43	722,55	1002,01												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	902,84	488,97	483,67	435,76	447,03	453,06	428,85												
		CI	[834,36; 971,31]	[399,62; 578,33]	[404,89; 562,45]	[347,83; 523,69]	[362,86; 531,21]	[391,29; 514,83]	[379,09; 478,61]												
SD		1470,11	1007,10	825,69	867,01	804,58	567,72	439,38													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	872,36	521,13	463,81	430,91	416,91	429,25													
		CI	[816,53; 928,20]	[440,81; 601,45]	[378,32; 549,30]	[394,72; 467,10]	[381,02; 452,80]	[393,08; 465,43]													
SD		1087,77	899,72	872,88	357,09	344,01	335,54														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	994,98	563,07	492,76	480,34	521,89														
		CI	[862,15; 1127,81]	[437,44; 688,70]	[390,13; 595,39]	[366,60; 594,08]	[390,46; 653,31]														
SD		2326,03	1379,94	1084,55	1147,47	1268,72															



EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	1081,95	570,63	543,40	538,30																	
		CI	[920,37;	[476,26;	[431,89;	[420,95;																	
		Mean	1243,52]	665,01]	654,92]	655,65]																	
SD	2353,44	1054,38	1175,70	1179,35																			
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	975,66	499,90	487,83																		
		CI	[888,58;	[445,90;	[444,29;																		
		Mean	1062,73]	553,90]	531,37]																		
SD	906,10	604,24	453,05																				
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																			
	Leistungsausgaben	Mean		490,33																			
		CI		[458,50;																			
		Mean		522,16]																			
SD			356,86																				

Tabelle 5.2 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für die **Krankenhausbehandlung**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.2 Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	4036,93			779,45	3041,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI	[2204,44; 5869,41]			[49,84; 1509,07]	[271,87; 5810,36]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	8096,83			1441,73	4354,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	2270,76		952,99	1084,85	1347,19	1175,33	1094,79	937,07	881,79	858,11	903,49	597,65	1257,14	1326,04	1165,87	1269,77	1810,19	1421,19	1920,98		
		CI	[2020,35; 2521,18]		[669,73; 1236,25]	[636,21; 1533,48]	[884,14; 1810,23]	[751,13; 1599,53]	[599,10; 1590,48]	[488,11; 1386,03]	[403,21; 1360,37]	[439,70; 1276,52]	[467,16; 1339,83]	[197,58; 997,72]	[675,66; 1838,63]	[779,02; 1873,07]	[195,06; 2136,67]	[631,47; 1908,07]	[1102,76; 2517,62]	[794,74; 2047,64]	[1005,82; 2836,13]		
	SD	7194,01		2859,55	3987,64	3842,20	3285,88	3616,57	3115,59	3220,86	2758,72	2850,93	2569,79	3651,64	3354,93	5818,55	3655,55	4083,50	3544,74	5039,66			
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5			
	Leistungsausgaben	Mean	2317,57	761,34	1060,87	1256,62	894,78	1218,36	1376,04	1005,28	1230,63	1240,39	1147,84	1083,30	1522,41	973,38	835,38	1390,15	1187,67	1268,97			
		CI	[1989,34; 2645,80]	[503,54; 1019,14]	[600,73; 1748,74]	[253,54; 2259,71]	[545,47; 1244,08]	[771,88; 1664,85]	[732,58; 2019,49]	[621,54; 1389,01]	[687,24; 1774,01]	[651,15; 1829,64]	[604,79; 1690,89]	[540,21; 1626,39]	[436,68; 2608,14]	[598,18; 1348,59]	[321,11; 2096,23]	[684,08; 1842,24]	[630,52; 1744,82]	[689,91; 1848,04]			
	SD	9525,65	2898,18	4662,96	9162,08	2958,09	3569,21	4869,40	2816,82	3866,43	4050,20	3665,23	3580,75	6962,96	2356,25	3093,45	4262,46	3308,91	3375,02				
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0				
	Leistungsausgaben	Mean	1991,25	655,30	1237,60	762,53	882,90	796,12	619,54	955,66	1223,43	913,01	892,25	851,00	952,44	822,77	1440,77	1360,78	1527,27				
		CI	[1759,82; 2222,67]	[449,78; 860,82]	[726,47; 1748,74]	[498,20; 1026,85]	[545,84; 1219,95]	[546,22; 1046,01]	[322,58; 916,50]	[366,81; 1544,51]	[704,43; 1742,43]	[460,87; 1365,14]	[523,90; 1260,61]	[454,16; 1247,84]	[595,47; 1309,42]	[455,28; 1190,26]	[792,62; 2088,92]	[879,32; 1842,24]	[863,60; 2190,94]				
	SD	7101,22	2317,55	5293,34	2519,41	3022,92	2110,47	2417,05	4697,72	4037,58	3444,83	2742,83	2895,41	2553,08	2525,96	4467,36	3226,25	4388,85					
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5					
	Leistungsausgaben	Mean	2109,31	803,21	942,58	720,37	824,34	1147,40	926,11	815,42	1498,62	866,76	1180,80	1190,09	1797,58	873,40	1326,91	1179,96					
		CI	[1850,59; 2368,04]	[570,81; 1035,60]	[688,80; 1196,36]	[505,12; 935,61]	[546,19; 1102,49]	[774,85; 1519,95]	[524,31; 1327,90]	[404,86; 1225,99]	[648,80; 2348,43]	[463,92; 1269,61]	[548,01; 1813,59]	[635,30; 1744,87]	[853,24; 2741,92]	[437,49; 1309,31]	[646,78; 2007,04]	[650,80; 1709,12]					
	SD	7894,94	2608,49	2626,55	2055,99	2524,67	3228,47	3384,04	3374,39	6841,77	3170,82	4832,03	4164,81	6779,59	3113,67	4694,21	3556,14						
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5						
	Leistungsausgaben	Mean	2333,91	952,82	898,77	786,93	1064,59	1297,92	1280,57	878,26	1139,94	1769,89	847,41	1412,00	1379,43	1895,39	1169,75						
		CI	[2049,55; 2618,26]	[684,86; 1220,77]	[616,93; 1180,61]	[518,68; 1055,18]	[672,98; 1456,21]	[793,16; 1802,67]	[848,59; 1712,56]	[554,59; 1201,93]	[743,99; 1535,90]	[826,95; 2712,83]	[518,48; 1176,33]	[721,04; 2102,96]	[799,84; 1959,03]	[774,61; 3016,16]	[542,14; 1797,36]						
	SD	8574,44	3026,24	2992,19	2639,69	3632,35	4530,59	3750,04	2721,01	3225,96	7398,50	2508,89	5010,40	4181,99	7913,09	4278,12							
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5							
	Leistungsausgaben	Mean	2305,17	718,21	715,69	1243,44	1098,91	1326,42	998,88	1179,53	699,16	1521,32	1840,56	1416,55	1257,04	897,13							
		CI	[2011,91; 2598,42]	[474,63; 961,80]	[474,45; 956,93]	[859,74; 1627,13]	[543,83; 1653,98]	[764,27; 1888,56]	[630,89; 1366,86]	[705,33; 1653,72]	[400,42; 997,91]	[672,38; 2370,26]	[1051,15; 2629,98]	[956,94; 1876,16]	[524,86; 1989,22]	[532,79; 1261,48]							
	SD	8624,18	2731,26	2514,96	3745,15	5156,27	5086,31	3254,63	4022,98	2421,97	6689,06	5946,69	3414,31	5302,74	2585,84								

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	2414,85	1116,52	1184,92	1270,82	1280,95	943,57	1546,13	1693,37	1049,64	935,54	1047,43	954,82	1283,77						
		CI	[2129,46; 2700,25]	[800,50; 1432,53]	[894,68; 1475,16]	[817,96; 1723,68]	[862,52; 1699,39]	[467,66; 1419,49]	[1072,73; 2019,54]	[907,34; 2479,40]	[633,32; 1465,95]	[544,30; 1326,77]	[565,65; 1529,22]	[546,92; 1362,71]	[729,86; 1837,68]						
SD		8496,62	3567,25	3104,44	4603,65	4098,19	4516,58	4273,18	6793,94	3503,07	3184,38	3902,08	3254,11	4295,23							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	1988,92	938,07	906,64	927,27	690,11	1072,63	1234,73	974,98	884,27	1452,80	1086,57	863,70							
		CI	[1712,42; 2265,42]	[494,16; 1381,98]	[625,71; 1187,57]	[560,04; 1294,50]	[418,59; 961,63]	[775,92; 1369,35]	[443,14; 2026,32]	[400,22; 1549,74]	[580,23; 1188,32]	[892,88; 2012,72]	[695,61; 1477,53]	[520,80; 1206,60]							
SD		7958,32	4980,08	2999,70	3768,23	2702,23	2826,10	7213,37	5006,70	2506,13	4615,19	3131,73	2664,73								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	1673,14	1177,26	801,70	705,82	699,85	809,71	763,24	975,82	1015,13	960,11	938,90								
		CI	[1447,02; 1899,26]	[648,91; 1705,62]	[566,48; 1036,91]	[377,73; 1033,91]	[473,73; 925,97]	[510,80; 1108,62]	[264,91; 1261,57]	[590,27; 1361,38]	[679,84; 1350,41]	[545,55; 1374,67]	[591,75; 1286,04]								
SD		6373,45	5970,19	2542,96	3403,88	2245,95	2851,11	4618,68	3407,16	2938,12	3507,47	2861,36									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	2170,05	1375,82	943,78	1076,70	916,45	1171,25	1265,91	767,20	1441,78	1209,38									
		CI	[1829,31; 2510,78]	[803,66; 1947,97]	[597,07; 1290,50]	[738,19; 1415,21]	[512,11; 1320,80]	[694,99; 1647,52]	[500,75; 2031,07]	[474,69; 1059,72]	[733,97; 2149,59]	[694,76; 1724,00]									
SD		9069,89	6432,07	3737,91	3458,47	3933,23	4460,79	6829,01	2584,95	6176,22	4358,07										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	2434,46	887,16	815,86	1520,24	995,76	1404,41	1341,75	1058,71	1514,45										
		CI	[1978,30; 2890,62]	[625,94; 1148,38]	[560,29; 1071,43]	[635,60; 2404,87]	[619,98; 1371,55]	[888,57; 1920,24]	[780,41; 1903,08]	[636,37; 1481,05]	[554,41; 2474,48]										
SD		11519,70	2950,21	2738,26	9021,27	3687,98	4729,96	5070,90	3787,77	8398,53											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	2052,02	860,98	998,68	1036,97	1225,52	965,13	947,88	970,55											
		CI	[1694,55; 2409,50]	[596,51; 1125,46]	[709,82; 1287,54]	[660,31; 1413,63]	[481,63; 1969,41]	[615,54; 1314,72]	[559,23; 1336,54]	[612,99; 1328,12]											
SD		8132,02	2965,54	2987,81	3684,01	6836,94	3102,16	3437,37	3063,58												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	1857,46	717,71	797,57	1049,01	782,55	961,61	1099,22												
		CI	[1573,06; 2141,85]	[507,68; 927,73]	[550,37; 1044,76]	[651,60; 1446,41]	[532,28; 1032,82]	[621,73; 1301,50]	[755,17; 1443,28]												
SD		6105,34	2367,10	2590,87	3918,54	2392,24	3123,80	3037,87													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	1502,99	946,36	889,07	686,19	797,80	609,22													
		CI	[1251,63; 1754,35]	[654,68; 1238,04]	[584,12; 1194,03]	[478,44; 893,95]	[538,07; 1057,54]	[412,48; 805,96]													
SD		4896,87	3267,18	3113,72	2049,89	2489,78	1824,83														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	1550,75	572,95	929,98	677,57	696,93														
		CI	[1223,50; 1878,00]	[404,76; 741,14]	[621,12; 1238,85]	[397,78; 957,36]	[452,91; 940,95]														
SD		5730,54	1847,47	3263,91	2822,68	2355,64															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	1900,75	1010,77	940,48	961,27																		
		CI	[1439,61; 2361,88]	[431,23; 1590,31]	[605,37; 1275,58]	[646,88; 1275,65]																		
		SD	6716,62	6474,70	3532,93	3159,53																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																			
	Leistungsausgaben	Mean	1971,14	698,95	985,57																			
		CI	[1414,34; 2527,94]	[512,44; 885,45]	[707,17; 1263,97]																			
		SD	5794,15	2086,89	2897,07																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																				
	Leistungsausgaben	Mean		1000,64																				
		CI		[428,81; 1572,46]																				
		SD		6411,78																				

Tabelle 5.3 gibt für alle Kohorten Auskunft über die Anzahl der **Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt** im betrachteten Halbjahr und ihren Anteil an der Gesamtzahl der Patienten. Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2003-1 umfasst die Stichprobe im letzten Berichtshalbjahr - - Patienten. Davon hatten - - auswertbare Patienten bzw. - - Prozent mindestens einen Krankenhausaufenthalt.

**Tabelle 5.3 Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Halbjahr**

EZ	Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl			5	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %			29,41	50,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %			[7,08; 51,74]	[17,33; 82,67]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124	
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		76	63	65	58	45	33	32	30	32	26	37	38	30	31	43	37	41	
		Anteil in %			18,91	19,57	23,47	24,17	21,53	17,28	18,08	17,44	18,82	15,76	23,27	25,17	21,13	21,99	32,09	28,68	33,06
		CI Anteil in %			[15,08; 22,74]	[15,23; 23,91]	[18,47; 28,47]	[18,74; 29,60]	[15,94; 27,12]	[11,90; 22,66]	[12,39; 23,77]	[11,75; 23,13]	[12,93; 24,71]	[10,18; 21,34]	[16,68; 29,86]	[18,22; 32,12]	[14,39; 27,87]	[15,13; 28,85]	[24,16; 40,02]	[20,84; 36,52]	[24,75; 41,37]
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132		
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		76	74	59	56	52	43	45	47	43	37	37	29	41	33	34	33	34	
		Anteil in %			15,20	17,70	17,25	20,00	20,23	19,03	21,33	23,62	23,24	20,90	21,64	18,01	26,45	22,60	24,11	24,09	25,76
		CI Anteil in %			[12,05; 18,35]	[14,04; 21,36]	[13,24; 21,26]	[15,31; 24,69]	[15,31; 25,15]	[13,90; 24,16]	[15,79; 26,87]	[17,70; 29,54]	[17,14; 29,34]	[14,89; 26,91]	[15,45; 27,83]	[12,06; 23,96]	[19,48; 33,42]	[15,79; 29,41]	[17,02; 31,20]	[16,90; 31,28]	[18,27; 33,25]
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170			
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		86	103	59	65	62	38	46	55	42	42	43	44	37	42	49	50		
		Anteil in %			17,20	23,68	16,67	20,38	22,14	14,79	18,55	23,31	18,75	19,27	20,77	22,11	19,27	22,70	28,16	29,41	
		CI Anteil in %			[13,89; 20,51]	[19,68; 27,68]	[12,78; 20,56]	[15,95; 24,81]	[17,27; 27,01]	[10,44; 19,14]	[13,70; 23,40]	[17,90; 28,72]	[13,63; 23,87]	[14,02; 24,52]	[15,23; 26,31]	[16,33; 27,89]	[13,68; 24,86]	[16,65; 28,75]	[21,46; 34,86]	[22,54; 36,28]	
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176				
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		87	81	69	64	62	49	46	51	41	40	47	41	36	41	40			
		Anteil in %			17,40	18,93	19,01	19,69	20,95	17,63	17,42	20,16	16,87	17,70	21,27	19,43	18,00	22,04	22,73		
		CI Anteil in %			[14,07; 20,73]	[15,21; 22,65]	[14,97; 23,05]	[15,36; 24,02]	[16,31; 25,59]	[13,14; 22,12]	[12,84; 22,00]	[15,21; 25,11]	[12,15; 21,59]	[12,71; 22,69]	[15,86; 26,68]	[14,08; 24,78]	[12,66; 23,34]	[16,07; 28,01]	[16,52; 28,94]		
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179					
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		105	89	68	74	72	62	56	55	57	46	38	44	45	38				
		Anteil in %			21,04	19,56	17,71	21,89	22,78	20,88	20,07	21,24	23,55	20,26	17,67	21,78	22,96	21,23			
		CI Anteil in %			[17,46; 24,62]	[15,91; 23,21]	[13,89; 21,53]	[17,48; 26,30]	[18,15; 27,41]	[16,25; 25,51]	[15,36; 24,78]	[16,25; 26,23]	[18,19; 28,91]	[15,02; 25,50]	[12,56; 22,78]	[16,07; 27,49]	[17,06; 28,86]	[15,22; 27,24]			
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202						
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		83	73	80	66	65	53	70	48	57	53	56	46	51					
		Anteil in %			16,60	16,94	21,11	19,47	20,31	17,32	24,05	18,18	23,17	22,08	25,00	21,90	25,25				
		CI Anteil in %			[13,34; 19,86]	[13,39; 20,49]	[17,00; 25,22]	[15,25; 23,69]	[15,90; 24,72]	[13,07; 21,57]	[19,13; 28,97]	[13,52; 22,84]	[17,89; 28,45]	[16,82; 27,34]	[19,32; 30,68]	[16,29; 27,51]	[19,24; 31,26]				
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247							
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		94	111	92	78	66	81	72	62	44	43	46	53						
		Anteil in %			18,84	24,34	22,49	20,74	18,59	24,11	23,53	21,45	15,83	16,10	17,69	21,46					
		CI Anteil in %			[15,41; 22,27]	[20,40; 28,28]	[18,44; 26,54]	[16,64; 24,84]	[14,54; 22,64]	[19,53; 28,69]	[18,77; 28,29]	[16,71; 26,19]	[11,53; 20,13]	[11,68; 20,52]	[13,04; 22,34]	[16,33; 26,59]					
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247								
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		94	79	84	63	79	71	56	52	60	58	47							
		Anteil in %			18,80	17,48	20,10	16,03	21,47	20,70	18,12	17,75	21,51	22,05	19,03						
		CI Anteil in %			[15,37; 22,23]	[13,97; 20,99]	[16,25; 23,95]	[12,40; 19,66]	[17,27; 25,67]	[16,41; 24,99]	[13,82; 22,42]	[13,37; 22,13]	[16,68; 26,34]	[17,03; 27,07]	[14,12; 23,94]						
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	460	425	391	360	339	320	302	284	268									
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		105	92	63	72	65	51	62	61	47	56								
		Anteil in %			21,04	20,00	14,82	18,41	18,06	15,04	19,38	20,20	16,55	20,90							
		CI Anteil in %			[17,46; 24,62]	[16,34; 23,66]	[11,44; 18,20]	[14,56; 22,26]	[14,08; 22,04]	[11,23; 18,85]	[15,04; 23,72]	[15,66; 24,74]	[12,22; 20,88]	[16,02; 25,78]							
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	458	424	380	350	333	312	303	288										
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		101	80	91	66	72	56	51	67	68									
		Anteil in %			20,20	17,47	21,46	17,37	20,57	16,82	16,35	22,11	23,61								
		CI Anteil in %			[16,68; 23,72]	[13,99; 20,95]	[17,55; 25,37]	[13,56; 21,18]	[16,33; 24,81]	[12,80; 20,84]	[12,24; 20,46]	[17,43; 26,79]	[18,70; 28,52]								

EZ	Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	454	411	379	354	329	314	300														
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	95	88	82	65	69	60	67	65														
		Anteil in %	19,00	19,38	19,95	17,15	19,49	18,24	21,34	21,67														
		CI Anteil in %	[15,56; 22,44]	[15,74; 23,02]	[16,08; 23,82]	[13,35; 20,95]	[15,36; 23,62]	[14,06; 22,42]	[16,80; 25,88]	[17,00; 26,34]														
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	433	383	345	318	308	295															
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	106	89	72	60	64	64	64															
		Anteil in %	21,20	20,55	18,80	17,39	20,13	20,78	21,69															
		CI Anteil in %	[17,61; 24,79]	[16,74; 24,36]	[14,88; 22,72]	[13,38; 21,40]	[15,72; 24,54]	[16,24; 25,32]	[16,98; 26,40]															
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	437	393	368	340	311																
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	97	92	84	72	64	74																
		Anteil in %	19,40	21,05	21,37	19,57	18,82	23,79																
		CI Anteil in %	[15,93; 22,87]	[17,22; 24,88]	[17,31; 25,43]	[15,51; 23,63]	[14,66; 22,98]	[19,05; 28,53]																
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	439	393	363	336																	
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	104	79	68	69	74																	
		Anteil in %	20,80	18,00	17,30	19,01	22,02																	
		CI Anteil in %	[17,24; 24,36]	[14,40; 21,60]	[13,56; 21,04]	[14,97; 23,05]	[17,58; 26,46]																	
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	451	405	366																		
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	90	87	61	69																		
		Anteil in %	18,04	19,29	15,06	18,85																		
		CI Anteil in %	[14,66; 21,42]	[15,64; 22,94]	[11,57; 18,55]	[14,84; 22,86]																		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	440	402																			
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	100	82	84																			
		Anteil in %	20,00	18,64	20,90																			
		CI Anteil in %	[16,49; 23,51]	[15,00; 22,28]	[16,92; 24,88]																			
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	434																				
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	99	99																				
		Anteil in %	19,80	22,81																				
		CI Anteil in %	[16,30; 23,30]	[18,86; 26,76]																				
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500																					
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	117																					
		Anteil in %	23,40																					
		CI Anteil in %	[19,69; 27,11]																					

Tabelle 5.4 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Arzneimittel**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.4 Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	1227,84			780,35	807,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[1017,31; 1438,36]			[477,64; 1083,07]	[503,83; 1110,94]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	930,19			598,17	477,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5	
	Leistungsausgaben	Mean	1842,86		699,39	836,15	737,82	845,99	833,61	805,73	811,97	972,98	831,23	868,05	1063,96	1117,89	1175,49	1134,17	1171,23	1375,04	1369,57	
		CI Mean	[1731,42; 1954,31]		[634,14; 764,65]	[683,60; 988,71]	[656,10; 819,53]	[733,63; 958,36]	[703,30; 963,92]	[689,24; 922,22]	[662,16; 961,77]	[710,89; 1235,06]	[699,68; 962,78]	[700,77; 1035,33]	[761,87; 1366,05]	[850,19; 1385,59]	[831,62; 1519,36]	[814,31; 1454,03]	[832,62; 1509,84]	[821,99; 1928,08]	[597,04; 2142,10]	
	SD	3201,61		658,79	1355,99	678,08	870,39	950,75	808,36	1008,18	1728,01	859,52	1074,49	1897,08	1641,82	2061,00	1831,84	1954,55	3129,36	4254,24		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5		
	Leistungsausgaben	Mean	1735,25	677,78	770,18	807,24	798,37	777,74	854,08	916,28	869,88	854,48	841,57	891,46	950,03	900,28	915,07	1000,39	1149,24	967,83		
		CI Mean	[1656,01; 1814,50]	[604,08; 751,47]	[681,66; 858,70]	[684,73; 929,75]	[675,23; 921,52]	[641,64; 913,84]	[702,15; 1006,01]	[705,48; 1127,08]	[698,31; 1041,45]	[675,62; 1033,34]	[727,01; 956,14]	[769,25; 1013,66]	[808,63; 1091,42]	[776,39; 1024,16]	[779,87; 1050,27]	[776,15; 1224,63]	[764,19; 1534,29]	[805,16; 1130,50]		
	SD	2299,86	828,45	897,04	1118,99	1042,85	1088,01	1149,72	1547,39	1220,80	1229,41	773,24	805,73	906,79	777,98	813,26	1353,71	2286,82	948,10			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0			
	Leistungsausgaben	Mean	1626,08	684,63	690,80	670,16	665,90	675,40	681,67	699,55	721,58	872,42	825,38	872,72	1045,47	1080,08	1087,75	1181,39	991,35			
		CI Mean	[1524,93; 1727,22]	[604,88; 764,37]	[626,09; 755,52]	[598,82; 741,49]	[593,39; 738,41]	[595,52; 755,28]	[601,91; 761,44]	[625,89; 773,22]	[640,92; 802,24]	[635,82; 1109,02]	[687,63; 963,13]	[738,56; 1006,87]	[693,70; 1397,24]	[698,19; 1461,98]	[645,03; 1530,48]	[672,54; 1690,24]	[753,24; 1229,45]			
	SD	3103,56	899,23	670,17	679,95	650,33	674,61	649,23	587,68	627,52	1802,64	1025,68	978,78	2515,83	2624,98	3051,48	3409,80	1574,60				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5				
	Leistungsausgaben	Mean	1717,78	629,95	750,46	736,41	770,27	976,03	985,16	879,12	802,42	780,40	790,50	841,86	865,53	970,21	1006,60	1110,89				
		CI Mean	[1608,63; 1826,93]	[575,01; 684,89]	[644,90; 856,02]	[621,75; 851,07]	[579,58; 960,96]	[707,03; 1245,03]	[683,98; 1286,34]	[658,56; 1099,68]	[692,96; 911,89]	[677,00; 883,80]	[677,45; 903,55]	[706,72; 977,00]	[735,73; 995,33]	[717,90; 1222,53]	[678,81; 1334,38]	[688,99; 1532,80]				
	SD	3330,61	616,68	1092,52	1095,22	1730,85	2331,14	2536,59	1812,74	881,29	813,87	863,27	1014,53	931,86	1802,26	2262,32	2835,36					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5					
	Leistungsausgaben	Mean	1595,22	763,97	743,86	719,69	748,92	696,64	722,90	789,01	918,77	975,57	835,41	868,44	821,04	877,94	841,08					
		CI Mean	[1518,67; 1671,77]	[636,01; 891,94]	[613,62; 874,10]	[630,12; 809,25]	[655,13; 842,71]	[608,93; 784,34]	[641,15; 804,65]	[684,97; 893,04]	[645,64; 1191,91]	[753,37; 1197,77]	[694,83; 976,00]	[758,89; 978,00]	[714,91; 927,17]	[762,70; 993,17]	[720,31; 961,84]					
	SD	2308,22	1445,24	1382,67	881,35	869,95	787,21	709,66	874,63	2225,32	1743,43	1072,30	794,42	765,77	813,62	823,19						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5						
	Leistungsausgaben	Mean	1632,21	638,90	666,08	721,46	800,25	790,85	822,99	888,69	903,37	909,21	837,34	841,87	877,05	928,34						
		CI Mean	[1551,25; 1713,17]	[565,01; 712,78]	[581,71; 750,45]	[612,32; 830,60]	[675,54; 924,97]	[656,15; 925,55]	[690,22; 955,76]	[716,38; 1061,00]	[723,16; 1083,58]	[735,94; 1082,48]	[687,11; 987,56]	[691,57; 992,18]	[720,64; 1033,45]	[765,08; 1091,59]						
	SD	2380,91	828,45	879,58	1065,29	1158,50	1218,77	1174,26	1461,86	1460,99	1365,25	1131,66	1116,58	1132,75	1158,67							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	1590,30	656,55	709,82	688,63	708,75	743,28	805,72	895,15	917,22	810,05	769,11	865,10	1011,74						
		CI Mean	[1502,34; 1678,26]	[588,73; 724,37]	[606,73; 812,91]	[620,99; 756,26]	[633,35; 784,14]	[622,34; 864,22]	[690,71; 920,72]	[738,50; 1051,80]	[750,06; 1084,38]	[675,68; 944,42]	[664,72; 873,51]	[683,07; 1047,13]	[628,06; 1395,43]						
	SD	2618,75	765,58	1102,67	687,60	738,42	1147,75	1038,11	1354,02	1406,58	1093,66	845,53	1452,24	2975,26							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	1379,60	624,02	633,27	597,88	628,35	685,21	720,08	677,00	738,53	719,21	811,10	822,13							
		CI Mean	[1320,41; 1438,80]	[561,90; 686,14]	[569,34; 697,20]	[540,08; 655,68]	[565,23; 691,46]	[606,81; 763,62]	[626,86; 813,29]	[575,56; 778,45]	[620,99; 856,06]	[599,32; 839,11]	[668,22; 953,97]	[668,59; 975,67]							
	SD	1703,80	696,90	682,61	593,12	628,13	746,78	849,43	883,67	968,79	988,26	1144,46	1193,18								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	1453,23	607,32	614,01	596,44	639,52	662,08	772,44	788,17	736,71	936,98	977,69								
		CI Mean	[1332,26; 1574,19]	[497,12; 717,51]	[527,14; 700,87]	[508,91; 683,97]	[530,17; 748,88]	[558,47; 765,70]	[591,06; 953,82]	[574,60; 1001,74]	[552,14; 921,28]	[569,48; 1304,48]	[651,08; 1304,29]								
	SD	3409,58	1245,16	939,11	908,11	1086,16	988,32	1681,08	1887,34	1617,41	3109,31	2692,06									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	1447,51	561,15	582,36	632,06	683,73	811,40	785,12	870,60	815,58	706,42									
		CI Mean	[1328,04; 1566,97]	[503,09; 619,22]	[498,96; 665,76]	[552,14; 711,97]	[572,06; 795,41]	[603,12; 1019,67]	[546,61; 1023,63]	[569,48; 1171,72]	[624,06; 1007,10]	[604,48; 808,35]									
	SD	3180,01	652,75	899,13	816,52	1086,31	1950,75	2128,71	2660,99	1671,17	863,25										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	1590,72	615,37	641,38	656,06	731,19	885,56	886,51	906,96	982,77										
		CI Mean	[1434,37; 1747,07]	[509,98; 720,77]	[494,58; 788,18]	[557,35; 754,78]	[597,19; 865,19]	[583,28; 1187,85]	[604,69; 1168,33]	[699,39; 1114,54]	[698,88; 1266,65]										
	SD	3948,44	1190,28	1572,82	1006,68	1315,08	2771,82	2545,87	1861,64	2483,46											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	1614,95	707,24	784,20	783,27	794,36	819,32	815,30	866,98											
		CI Mean	[1464,88; 1765,01]	[578,56; 835,92]	[626,16; 942,25]	[611,26; 955,28]	[604,66; 984,06]	[615,26; 1023,38]	[639,09; 991,50]	[651,86; 1082,09]											
	SD	3413,71	1442,85	1634,72	1682,38	1743,49	1810,75	1558,43	1843,07												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	1537,68	791,97	746,44	801,15	759,92	800,50	736,25												
		CI Mean	[1403,87; 1671,49]	[643,00; 940,94]	[614,14; 878,74]	[637,86; 964,45]	[624,36; 895,48]	[622,15; 978,84]	[602,38; 870,12]												
	SD	2872,61	1678,99	1386,67	1610,14	1295,81	1639,13	1182,00													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	1428,76	672,36	725,21	698,56	725,78	706,99													
		CI Mean	[1284,05; 1573,47]	[566,69; 778,04]	[562,20; 888,21]	[558,56; 838,56]	[595,23; 856,32]	[570,85; 843,12]													
	SD	2819,23	1183,72	1664,38	1381,34	1251,36	1262,69														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	1627,58	777,48	826,69	777,61	837,85														
		CI Mean	[1398,08; 1857,08]	[584,01; 970,94]	[626,21; 1027,18]	[595,94; 959,27]	[624,08; 1051,61]														
	SD	4018,78	2125,08	2118,64	1832,75	2063,61															



EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	1539,31	662,87	796,84	739,73																	
		CI Mean	[1349,06; 1729,55]	[570,59; 755,15]	[651,37; 942,31]	[620,06; 859,40]																	
	SD	2770,99	1030,98	1533,69	1202,68																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	1569,19	615,20	784,60																		
		CI Mean	[1085,92; 2052,47]	[537,83; 692,56]	[542,96; 1026,23]																		
	SD	5029,03	865,68	2514,51																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																			
	Leistungsausgaben	Mean		661,39																			
		CI Mean			[516,09; 806,70]																		
	SD		1629,27																				

Tabelle 5.5 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für Heilmittel. Zu den Heilmitteln gehören verschiedene Formen der Therapie wie z.B. physikalische Therapie, Ergotherapie, Logopädie. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.5 Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	49,62		15,85	8,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[0,00; 102,00]		[0,00; 41,94]	[0,00; 18,07]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	231,47		51,56	14,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	136,73	35,49	44,26	59,21	70,92	60,34	72,73	60,39	77,44	50,08	68,38	85,33	98,34	95,43	93,05	94,05	103,99	105,27		
		CI Mean	[121,54; 151,91]	[20,51; 50,48]	[24,01; 64,51]	[32,25; 86,17]	[41,51; 100,33]	[33,35; 87,33]	[38,84; 106,61]	[31,92; 88,87]	[46,68; 108,20]	[24,90; 75,26]	[37,55; 99,21]	[49,85; 120,82]	[54,88; 141,80]	[50,18; 140,68]	[54,48; 131,62]	[48,76; 139,34]	[51,76; 156,22]	[50,57; 159,97]		
	SD	436,27	151,25	180,00	223,69	227,80	196,93	235,14	191,66	202,81	164,52	198,03	222,83	266,54	271,18	220,90	261,43	295,54	301,22			
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5		
	Leistungsausgaben	Mean	77,44	18,71	19,34	27,59	25,18	30,07	27,03	34,93	41,68	39,10	44,34	45,38	42,08	49,41	61,41	68,47	72,08	67,05		
		CI Mean	[66,77; 88,12]	[11,91; 25,51]	[11,59; 27,10]	[16,96; 38,23]	[15,41; 34,96]	[16,44; 43,70]	[14,16; 39,89]	[18,38; 51,48]	[23,16; 60,20]	[20,12; 58,09]	[16,27; 72,41]	[22,88; 67,88]	[11,32; 72,84]	[18,59; 80,24]	[24,06; 98,77]	[30,42; 106,52]	[29,20; 114,96]	[18,65; 115,45]		
	SD	309,72	76,42	78,60	97,13	82,79	108,99	97,38	121,48	131,78	130,50	189,45	148,36	197,26	193,58	224,71	229,70	254,69	282,10			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0			
	Leistungsausgaben	Mean	109,05	40,71	44,57	43,73	41,02	40,10	43,52	49,96	43,85	53,32	71,07	76,25	76,76	73,43	63,51	70,43	69,45			
		CI Mean	[97,22; 120,87]	[26,83; 54,60]	[28,74; 60,39]	[26,89; 60,58]	[22,40; 59,64]	[21,45; 58,75]	[25,26; 61,77]	[28,30; 71,61]	[23,11; 64,59]	[30,91; 75,74]	[42,79; 99,35]	[47,56; 104,95]	[45,17; 108,35]	[41,60; 105,27]	[35,09; 91,92]	[38,99; 101,88]	[40,52; 98,38]			
	SD	362,90	156,53	163,86	160,55	167,01	157,50	148,58	172,73	161,35	170,79	210,61	209,34	225,94	218,81	195,85	210,70	191,32				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5				
	Leistungsausgaben	Mean	89,14	43,20	41,07	36,29	38,84	45,27	46,73	50,03	41,60	35,93	41,94	38,67	52,30	55,13	58,00	59,29				
		CI Mean	[77,75; 100,53]	[26,52; 59,88]	[22,84; 59,31]	[21,69; 50,90]	[22,13; 55,54]	[24,80; 65,73]	[28,71; 64,75]	[30,89; 69,17]	[13,93; 69,26]	[24,40; 47,47]	[18,31; 65,56]	[20,98; 56,36]	[23,40; 81,21]	[29,31; 80,94]	[27,36; 88,64]	[25,50; 93,09]				
	SD	347,60	187,23	188,74	139,50	151,61	177,37	151,76	157,33	222,73	90,78	180,37	132,80	207,52	184,39	211,46	227,09					
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5					
	Leistungsausgaben	Mean	121,88	64,52	40,21	47,64	45,82	46,78	58,31	55,75	78,51	87,87	77,08	79,51	73,01	79,17	68,59					
		CI Mean	[104,79; 138,97]	[32,83; 96,22]	[22,30; 58,12]	[28,39; 66,90]	[29,43; 62,21]	[27,96; 65,59]	[35,02; 81,60]	[26,23; 85,26]	[40,73; 116,30]	[42,22; 133,52]	[33,17; 121,00]	[30,77; 128,24]	[29,99; 116,02]	[37,61; 120,73]	[22,93; 114,24]					
	SD	515,31	357,96	190,12	189,47	152,04	168,89	202,20	248,12	307,84	358,18	334,97	353,40	310,37	293,44	311,23						
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5						
	Leistungsausgaben	Mean	98,49	32,65	36,64	40,08	45,74	35,05	46,05	63,63	54,86	54,24	58,35	56,00	60,69	64,22						
		CI Mean	[83,89; 113,10]	[22,70; 42,61]	[23,73; 49,55]	[26,92; 53,25]	[30,93; 60,54]	[23,48; 46,61]	[17,83; 74,27]	[23,99; 103,28]	[22,59; 87,13]	[23,44; 85,05]	[24,79; 91,91]	[25,47; 86,54]	[23,41; 97,98]	[33,49; 94,96]						
	SD	429,43	111,64	134,61	128,53	137,50	104,62	249,57	336,34	261,63	242,76	252,81	226,84	270,02	218,14							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	107,92	36,41	42,72	51,76	38,36	34,67	44,70	66,50	72,53	63,77	66,56	67,65	68,99						
		CI Mean	[93,42; 122,42]	[23,07; 49,74]	[24,09; 61,35]	[32,78; 70,73]	[22,91; 53,81]	[20,00; 49,34]	[25,87; 63,52]	[34,11; 98,89]	[41,62; 103,44]	[35,19; 92,35]	[37,16; 95,96]	[35,03; 100,26]	[34,49; 103,49]						
	SD	431,61	150,53	199,29	192,92	151,34	139,24	169,95	279,96	260,10	232,62	238,11	260,20	267,53							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	70,56	24,69	36,65	25,21	21,24	36,78	45,08	33,90	40,01	38,66	41,88	43,13							
		CI Mean	[62,91; 78,21]	[17,30; 32,08]	[25,21; 48,10]	[17,66; 32,75]	[14,88; 27,60]	[25,93; 47,64]	[30,09; 60,07]	[22,05; 45,75]	[23,88; 56,14]	[24,41; 52,91]	[27,43; 56,32]	[26,87; 59,39]							
	SD	220,15	82,94	122,19	77,44	63,30	103,40	136,61	103,24	132,99	117,46	115,69	126,37								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	90,77	30,70	41,93	38,21	38,23	42,78	51,75	47,75	43,02	58,73	54,43								
		CI Mean	[79,68; 101,86]	[20,63; 40,77]	[27,69; 56,17]	[24,34; 52,07]	[24,05; 52,40]	[27,82; 57,74]	[30,55; 72,96]	[29,51; 65,99]	[26,19; 59,85]	[39,59; 77,86]	[35,01; 73,84]								
	SD	312,71	113,79	153,96	143,83	140,76	142,67	196,52	161,21	147,49	161,91	160,02									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	80,09	28,54	24,59	34,93	46,57	41,12	41,06	44,58	55,09	40,56									
		CI Mean	[64,61; 95,57]	[18,62; 38,46]	[12,53; 36,64]	[18,69; 51,16]	[19,79; 73,35]	[18,09; 64,16]	[15,60; 66,52]	[18,37; 70,80]	[25,15; 85,03]	[24,93; 56,19]									
	SD	412,04	111,50	129,96	165,87	260,54	215,76	227,20	231,69	261,28	132,39										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	85,83	37,08	37,89	39,88	38,75	39,32	35,35	66,50	47,05										
		CI Mean	[69,25; 102,41]	[23,59; 50,58]	[24,92; 50,85]	[28,56; 51,20]	[27,76; 49,75]	[26,57; 52,08]	[23,92; 46,78]	[10,97; 122,04]	[32,38; 61,72]										
	SD	418,62	152,40	138,90	115,45	107,90	116,97	103,22	498,07	128,35											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	78,35	38,61	37,88	32,15	44,06	38,83	46,61	37,07											
		CI Mean	[66,44; 90,27]	[24,64; 52,58]	[22,81; 52,94]	[20,09; 44,22]	[27,38; 60,74]	[25,12; 52,53]	[30,61; 62,60]	[24,38; 49,75]											
	SD	271,01	156,65	155,81	118,00	153,32	121,62	141,49	108,66												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	109,83	47,64	49,83	49,45	58,89	54,22	64,98												
		CI Mean	[84,72; 134,93]	[26,66; 68,63]	[24,00; 75,66]	[22,58; 76,31]	[30,33; 87,44]	[26,53; 81,92]	[32,58; 97,38]												
	SD	539,00	236,54	270,75	264,89	272,94	254,53	286,08													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	94,95	56,17	56,07	48,28	48,76	34,78													
		CI Mean	[77,92; 111,98]	[32,09; 80,25]	[36,34; 75,79]	[32,97; 63,58]	[30,33; 67,20]	[22,43; 47,14]													
	SD	331,76	269,75	201,38	150,99	176,68	114,59														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	118,22	48,21	56,26	66,69	54,24														
		CI Mean	[94,53; 141,91]	[28,30; 68,12]	[35,93; 76,60]	[44,46; 88,92]	[35,87; 72,60]														
	SD	414,86	218,73	214,92	224,30	177,29															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	110,93	48,45	55,71	55,19																	
		CI Mean	[75,69; 146,16]	[27,42; 69,47]	[31,16; 80,25]	[29,86; 80,52]																	
	SD	513,25	234,87	258,78	254,56																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	92,84	50,52	46,42																		
		CI Mean	[52,37; 133,31]	[27,60; 73,44]	[26,19; 66,66]																		
	SD	421,15	256,42	210,57																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																			
	Leistungsausgaben	Mean		41,24																			
		CI Mean		[24,49; 58,00]																			
	SD		187,87																				

Tabelle 5.6 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Hilfsmittel**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Leistungsausgaben stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der Hilfsmittel erst ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.6 Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	171,63				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[17,37; 325,89]				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	458,91				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl						204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	227,73						66,64	80,39	99,06	110,03	86,14	52,77	126,56	170,43	132,16	130,88	167,96	192,00	130,97	
		CI Mean	[201,05; 254,40]						[38,18; 95,09]	[50,10; 110,68]	[61,68; 136,45]	[60,83; 159,23]	[51,23; 121,05]	[26,85; 78,69]	[77,57; 175,54]	[93,88; 246,98]	[69,54; 194,77]	[78,17; 183,59]	[104,92; 231,01]	[130,08; 253,93]	[72,66; 189,28]	
	SD	605,67						207,63	210,17	251,61	324,40	228,07	166,50	307,62	469,51	375,31	301,87	363,91	350,40	321,09		
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5			
	Leistungsausgaben	Mean	168,76				51,16	47,53	76,96	64,39	78,35	81,68	87,70	137,59	77,71	75,58	122,67	100,48	153,21			
		CI Mean	[143,61; 193,91]				[31,43; 70,89]	[27,78; 106,41]	[47,51; 96,94]	[31,85; 118,20]	[38,50; 132,58]	[30,79; 83,04]	[44,72; 130,67]	[69,54; 205,64]	[42,55; 112,88]	[38,60; 112,57]	[51,65; 193,68]	[59,96; 141,00]	[47,01; 259,42]			
	SD	608,06				157,72	149,42	231,57	273,91	343,50	283,34	436,42	220,86	222,47	428,69	240,66	618,99					
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0				
	Leistungsausgaben	Mean	190,62			68,52	88,96	83,32	79,65	89,58	59,09	84,71	88,79	110,78	135,80	129,37	98,96	170,68				
		CI Mean	[170,52; 210,71]			[47,54; 89,49]	[55,05; 122,86]	[58,17; 108,47]	[54,61; 104,68]	[58,17; 120,99]	[35,14; 83,04]	[55,81; 113,61]	[57,90; 119,67]	[66,99; 154,58]	[67,29; 204,31]	[81,50; 177,24]	[62,53; 135,39]	[108,85; 232,51]				
	SD	547,90			188,11	286,33	204,71	199,73	244,37	182,49	215,21	225,34	313,22	470,93	329,95	244,12	408,89					
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5				
	Leistungsausgaben	Mean	144,81			57,56	67,55	72,82	58,64	66,73	57,89	78,40	61,12	91,84	95,85	69,34	97,62	93,70				
		CI Mean	[126,16; 163,46]			[35,50; 79,62]	[40,02; 95,07]	[39,67; 105,98]	[30,68; 86,61]	[44,61; 88,86]	[28,87; 86,91]	[43,40; 113,40]	[37,88; 84,37]	[39,88; 143,79]	[49,47; 142,24]	[32,08; 106,59]	[53,38; 141,87]	[43,45; 143,95]				
	SD	535,44			210,72	249,85	287,33	235,51	181,85	233,65	275,51	177,50	390,02	333,02	266,12	305,40	337,71					
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5				
	Leistungsausgaben	Mean	159,89			58,24	65,42	68,27	63,78	115,37	69,74	56,65	87,15	98,29	121,09	118,95	83,95	76,76				
		CI Mean	[139,83; 179,95]			[36,72; 79,77]	[42,84; 88,00]	[43,62; 92,92]	[41,29; 86,27]	[75,22; 155,52]	[38,36; 101,12]	[34,03; 79,27]	[44,81; 129,49]	[56,80; 139,78]	[47,77; 194,41]	[47,72; 190,18]	[40,26; 127,64]	[44,31; 109,22]				
	SD	604,80			228,52	222,17	228,65	201,90	348,54	263,78	184,29	332,20	316,44	531,67	513,98	308,47	221,22					
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5				
	Leistungsausgaben	Mean	172,04			57,13	68,07	62,39	68,59	63,94	58,51	104,90	87,29	65,56	120,85	116,90	123,82	162,09				
		CI Mean	[148,62; 195,47]			[38,82; 75,44]	[42,56; 93,58]	[24,61; 100,17]	[46,57; 90,61]	[40,15; 87,74]	[35,25; 81,77]	[53,34; 156,46]	[52,61; 121,98]	[35,32; 95,79]	[70,01; 171,69]	[70,07; 163,73]	[57,74; 189,89]	[70,30; 253,89]				
	SD	688,89			205,34	265,91	368,79	204,58	215,30	205,74	437,43	281,20	238,23	382,99	347,89	478,55	651,50					

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	168,20	73,12	84,72	80,99	88,65	65,28	84,15	81,06	81,29	89,97	93,34	87,31	96,30						
		CI Mean	[147,62; 188,79]	[51,02; 95,22]	[44,29; 125,14]	[48,33; 113,65]	[54,25; 123,06]	[36,87; 93,69]	[56,77; 111,52]	[50,56; 111,56]	[54,84; 107,74]	[54,90; 125,05]	[55,64; 131,04]	[55,49; 119,13]	[63,46; 129,13]						
	SD	612,91	249,44	432,40	332,03	336,98	269,62	247,11	263,60	222,54	285,49	305,36	253,84	254,62							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	175,82	85,48	84,36	49,05	54,76	109,03	122,30	71,16	86,95	133,41	93,08	103,18							
		CI Mean	[151,94; 199,70]	[44,29; 126,68]	[51,18; 117,54]	[31,42; 66,67]	[18,29; 91,23]	[70,77; 147,28]	[80,17; 164,42]	[44,53; 97,79]	[51,73; 122,18]	[72,51; 194,32]	[51,75; 134,41]	[54,91; 151,44]							
	SD	687,27	462,17	354,28	180,88	362,98	364,33	383,86	231,97	290,36	502,02	331,06	375,07								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	163,51	63,40	57,51	48,90	89,62	76,00	105,45	69,17	95,10	107,63	113,95								
		CI Mean	[138,98; 188,04]	[42,32; 84,48]	[36,32; 78,70]	[23,85; 73,95]	[57,79; 121,45]	[43,92; 108,08]	[46,72; 164,17]	[38,79; 99,54]	[52,32; 137,88]	[57,03; 158,22]	[72,21; 155,70]								
	SD	691,36	238,19	229,08	259,92	316,13	305,98	544,25	268,41	374,89	428,08	344,10									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	170,86	59,26	83,55	70,88	66,60	116,37	89,10	58,99	79,97	127,12									
		CI Mean	[139,72; 201,99]	[40,28; 78,24]	[33,74; 133,36]	[36,51; 105,25]	[46,12; 87,09]	[47,52; 185,23]	[47,03; 131,18]	[34,44; 83,55]	[49,24; 110,69]	[73,74; 180,49]									
	SD	828,80	213,40	536,99	351,16	199,26	644,92	375,53	216,96	268,10	452,00										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	188,66	79,46	56,74	68,84	80,74	129,81	105,40	105,31	140,14										
		CI Mean	[148,94; 228,39]	[45,28; 113,65]	[39,54; 73,95]	[34,10; 103,57]	[49,59; 111,88]	[51,57; 208,05]	[27,72; 183,09]	[57,41; 153,21]	[61,64; 218,65]										
	SD	1003,19	386,04	184,34	354,24	305,63	717,42	701,80	429,60	686,77											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	177,08	67,31	72,48	76,77	91,30	95,19	118,71	84,85											
		CI Mean	[146,40; 207,77]	[39,12; 95,50]	[40,00; 104,95]	[50,49; 103,04]	[54,20; 128,40]	[54,78; 135,60]	[63,90; 173,52]	[50,53; 119,16]											
	SD	698,00	316,10	335,88	256,96	341,00	358,59	484,76	294,03												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	177,88	92,06	79,64	71,88	72,47	136,12	91,50												
		CI Mean	[138,52; 217,24]	[47,96; 136,17]	[54,56; 104,72]	[50,10; 93,66]	[47,99; 96,95]	[48,19; 224,06]	[50,99; 132,01]												
	SD	844,99	497,12	262,84	214,79	234,01	808,21	357,70													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	131,78	60,87	62,72	57,84	86,40	56,94													
		CI Mean	[107,56; 156,01]	[42,62; 79,13]	[41,80; 83,64]	[35,00; 80,69]	[55,49; 117,30]	[35,67; 78,21]													
	SD	471,89	204,46	213,62	225,45	296,26	197,30														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	132,63	77,47	65,28	69,04	64,59														
		CI Mean	[99,89; 165,38]	[38,00; 116,93]	[31,63; 98,93]	[45,46; 92,61]	[39,73; 89,45]														
	SD	573,44	433,47	355,63	237,85	240,00															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	227,59	68,20	116,60	110,71																	
		CI Mean	[164,13; 291,05]	[41,41; 94,99]	[73,13; 160,08]	[64,25; 157,16]																	
	SD	924,28	299,34	458,35	466,84																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	176,44	121,22	88,22																		
		CI Mean	[121,10; 231,78]	[55,50; 186,95]	[60,55; 115,89]																		
	SD	575,83	735,43	287,92																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																			
	Leistungsausgaben	Mean		76,68																			
		CI Mean		[46,52; 106,84]																			
	SD		338,16																				

Tabelle 5.7 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Dialyse-Sachkosten**. Die Dialyse-Sachkosten werden für die Evaluation der Behandlungsprogramme bei Diabetes mellitus Typ 2 gesondert ausgewiesen aufgrund der Bedeutung der Nierenersatztherapie als möglicher Folgeerkrankung. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten

Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.7 Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	0,00			0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[0,00; 0,00]			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	0,00			0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	35,59		0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	94,70	84,62	81,73	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Mean	[4,42; 66,77]		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 92,06]	[0,00; 234,85]	[0,00; 250,49]	[0,00; 241,92]	[0,00; 75,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	SD	895,63		0,00	0,00	0,00	0,00	444,76	972,57	1116,31	1056,21	325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5			
	Leistungsausgaben	Mean	150,49		38,14	62,52	75,54	50,02	56,13	62,64	66,57	71,94	75,92	78,74	81,46	87,22	98,22	102,95	94,64	105,61	105,59		
		CI Mean	[81,91; 219,08]		[0,00; 97,47]	[0,00; 141,14]	[0,00; 181,35]	[0,00; 148,06]	[0,00; 166,16]	[0,00; 185,41]	[0,00; 197,05]	[0,00; 210,82]	[0,00; 224,74]	[0,00; 233,08]	[0,00; 241,12]	[0,00; 258,17]	[0,00; 276,99]	[0,00; 304,74]	[0,00; 280,15]	[0,00; 312,61]	[0,00; 312,57]		
	SD	1990,51		666,94	796,68	966,49	830,24	879,56	929,10	957,82	988,17	1022,89	1041,67	1052,72	1096,34	1122,62	1213,82	1119,86	1229,38	1206,32			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0				
	Leistungsausgaben	Mean	100,38		0,00	21,46	0,00	0,00	6,55	64,88	66,91	70,53	72,04	27,28	71,02	71,53	75,15	73,32	100,04	160,16			
		CI Mean	[46,08; 154,68]		[0,00; 0,00]	[0,00; 63,51]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 19,39]	[0,00; 192,04]	[0,00; 198,06]	[0,00; 208,77]	[0,00; 213,24]	[0,00; 80,76]	[0,00; 210,23]	[0,00; 211,73]	[0,00; 222,45]	[0,00; 217,02]	[0,00; 260,83]	[0,00; 381,48]			
	SD	1666,23		0,00	435,55	0,00	0,00	108,46	1034,99	1046,26	1075,45	1075,79	398,18	1015,65	1002,70	1012,47	990,48	1077,48	1463,64				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5					
	Leistungsausgaben	Mean	101,25		40,37	10,28	39,32	43,54	42,25	50,57	53,10	55,34	57,90	62,35	63,65	66,92	70,31	78,20	74,33				
		CI Mean	[47,41; 155,09]		[0,00; 119,51]	[0,00; 30,43]	[0,00; 116,38]	[0,00; 128,88]	[0,00; 125,07]	[0,00; 149,69]	[0,00; 157,19]	[0,00; 163,81]	[0,00; 171,39]	[0,00; 182,93]	[0,00; 188,41]	[0,00; 198,09]	[0,00; 208,11]	[0,00; 231,47]	[0,00; 220,03]				
	SD	1642,97		888,28	208,53	736,08	774,61	717,71	834,80	855,45	873,30	893,26	920,76	936,57	941,70	984,34	1057,87	979,14					
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5						
	Leistungsausgaben	Mean	294,72		93,18	143,35	173,72	195,57	158,50	185,49	233,40	176,16	158,74	124,38	70,84	58,39	74,73	37,61					
		CI Mean	[201,12; 388,32]		[0,00; 190,25]	[12,28; 274,42]	[17,20; 330,25]	[21,07; 370,06]	[0,00; 323,83]	[2,34; 368,64]	[24,05; 442,76]	[0,00; 376,00]	[0,00; 339,48]	[0,00; 296,40]	[0,00; 209,70]	[0,00; 172,83]	[0,00; 221,20]	[0,00; 111,32]					
	SD	2822,28		1096,35	1391,51	1540,28	1618,47	1483,95	1589,92	1759,96	1628,19	1418,10	1312,08	1006,91	825,74	1034,15	502,46						
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5							
	Leistungsausgaben	Mean	452,70		88,82	126,08	174,59	223,38	648,41	227,45	255,21	253,33	196,96	134,97	128,57	141,86	115,83						
		CI Mean	[249,67; 655,73]		[0,00; 183,70]	[0,00; 254,22]	[19,98; 329,20]	[27,85; 418,91]	[0,00; 1574,23]	[28,76; 426,13]	[32,81; 477,61]	[28,20; 478,46]	[0,00; 408,18]	[0,00; 322,15]	[0,00; 306,65]	[0,00; 338,01]	[0,00; 281,12]						
	SD	5970,88		1063,85	1335,82	1509,11	1816,36	8376,87	1757,23	1886,80	1825,18	1664,30	1410,03	1322,89	1420,57	1173,11							



EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	70,43	51,80	112,82	72,90	74,92	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CI Mean	[20,95; 119,91]	[0,00; 124,34]	[0,00; 241,12]	[0,00; 177,37]	[0,00; 178,62]	[0,00; 117,89]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
	SD	1473,11	818,86	1372,27	1062,03	1015,62	740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	371,68	112,84	135,36	138,67	147,36	213,93	219,35	247,65	262,70	217,14	172,72	152,82							
		CI Mean	[261,25; 482,11]	[2,58; 223,11]	[11,60; 259,12]	[3,23; 274,11]	[3,45; 291,28]	[38,96; 388,91]	[28,17; 410,53]	[31,37; 463,93]	[34,04; 491,36]	[4,90; 429,37]	[0,00; 367,42]	[0,00; 328,49]							
	SD	3178,52	1237,07	1321,48	1389,79	1432,28	1666,56	1742,11	1884,03	1884,78	1749,38	1559,57	1365,19								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	105,35	22,32	30,69	34,61	64,33	77,34	84,05	40,04	44,92	52,06	53,47								
		CI Mean	[45,84; 164,87]	[0,00; 66,07]	[0,00; 90,85]	[0,00; 102,44]	[0,00; 153,71]	[0,00; 184,40]	[0,00; 200,37]	[0,00; 117,38]	[0,00; 132,95]	[0,00; 154,09]	[0,00; 156,96]								
	SD	1677,52	494,34	650,33	703,74	887,77	1021,15	1078,07	683,44	771,46	863,27	853,01									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54								
		CI Mean	[0,00; 8,71]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 43,05]								
	SD	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,40									
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	171,39	56,82	38,27	35,17	70,46	117,81	109,11	124,78	143,33										
		CI Mean	[88,52; 254,26]	[0,00; 135,53]	[0,00; 100,15]	[0,00; 101,55]	[0,00; 167,99]	[0,00; 251,43]	[0,00; 233,29]	[0,00; 266,22]	[0,00; 305,73]										
	SD	2092,85	888,88	663,03	676,90	957,16	1225,18	1121,77	1268,44	1420,71											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	56,34	28,53	33,96	0,00	21,78	40,30	29,98	48,87											
		CI Mean	[5,56; 107,12]	[0,00; 84,45]	[0,00; 100,52]	[0,00; 0,00]	[0,00; 64,46]	[0,00; 119,28]	[0,00; 88,75]	[0,00; 144,65]											
	SD	1155,14	627,03	688,47	0,00	392,29	700,88	519,74	820,63												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	58,27	55,39	40,61	38,31	35,74	23,41	0,00												
		CI Mean	[3,15; 113,40]	[0,00; 132,08]	[0,00; 106,45]	[0,00; 113,41]	[0,00; 105,78]	[0,00; 69,30]	[0,00; 0,00]												
	SD	1183,39	864,37	690,07	740,47	669,52	421,73	0,00													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	19,63	47,65	35,73	0,00	0,00	0,00													
		CI Mean	[0,00; 58,10]	[0,00; 113,10]	[0,00; 105,76]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]													
	SD	749,53	733,17	715,08	0,00	0,00	0,00														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	153,59	93,02	63,31	70,10	100,27														
		CI Mean	[39,93; 267,25]	[0,00; 190,63]	[0,00; 150,96]	[0,00; 167,24]	[0,00; 213,11]														
	SD	1990,34	1072,21	926,27	979,97	1089,31															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																
	Leistungsausgaben	Mean	144,37	55,02	66,61	78,32																
		CI Mean	[9,25; 279,48]	[0,00; 131,19]	[0,00; 158,83]	[0,00; 177,62]																
	SD	1968,02	851,01	972,25	998,02																	
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	19,09	0,00																	
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 56,50]	[0,00; 0,00]																	
	SD	0,00	418,60	0,00																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																		
	Leistungsausgaben	Mean		0,00																		
		CI Mean		[0,00; 0,00]																		
	SD		0,00																			

Tabelle 5.8 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Anschlussrehabilitation**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.8 Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	50,67			0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[0,00; 150,02]				[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	438,98			0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	81,96		66,38	34,25	78,56	81,63	9,68	38,58	21,72	28,41	23,05	22,90	66,26	25,27	27,95	31,43	0,00	31,33	30,33		
		CI Mean	[54,17; 109,00]		[14,29; 118,47]	[0,00; 70,82]	[0,00; 170,05]	[4,80; 158,46]	[0,00; 28,66]	[1,03; 76,13]	[0,00; 51,75]	[0,00; 68,16]	[0,00; 54,90]	[0,00; 54,61]	[0,00; 154,88]	[0,00; 60,22]	[0,00; 66,54]	[0,00; 74,82]	[0,00; 74,82]	[0,00; 74,82]	[0,00; 74,82]	[0,00; 72,54]	
	SD	798,36		525,85	325,02	759,12	595,11	138,46	260,58	202,06	262,11	208,09	203,67	556,50	214,37	231,30	248,50	0,00	244,72	232,46			
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5			
	Leistungsausgaben	Mean	73,33		54,23	24,26	25,67	40,44	36,31	24,00	38,82	57,99	94,41	53,37	10,78	47,93	12,41	13,00	40,12	52,38	30,14		
		CI Mean	[47,65; 99,00]		[7,60; 100,87]	[3,07; 45,45]	[0,62; 43,31]	[3,55; 77,33]	[4,62; 68,00]	[0,00; 51,05]	[0,84; 76,79]	[0,00; 122,85]	[0,00; 257,05]	[7,03; 99,70]	[0,00; 31,91]	[0,00; 105,30]	[0,00; 36,73]	[0,00; 38,47]	[0,00; 85,22]	[1,55; 103,21]	[0,00; 71,75]		
	SD	745,14		524,26	214,74	228,89	312,40	253,36	204,72	278,78	461,46	1117,90	312,71	139,30	367,91	152,75	153,24	272,23	301,87	242,55			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0				
	Leistungsausgaben	Mean	76,56		17,03	56,20	21,90	42,73	76,25	24,34	40,91	29,57	17,40	34,88	18,34	19,15	10,91	21,10	76,28	75,55			
		CI Mean	[51,83; 101,30]		[0,00; 35,19]	[8,14; 104,26]	[0,48; 43,31]	[0,19; 85,28]	[0,00; 162,38]	[0,00; 52,18]	[0,00; 106,67]	[0,00; 63,51]	[0,00; 41,46]	[0,92; 68,85]	[0,00; 43,69]	[0,00; 45,62]	[0,00; 32,29]	[0,00; 50,38]	[0,11; 152,46]	[15,32; 135,78]			
	SD	759,03		204,72	497,71	204,12	381,56	727,39	226,60	524,68	264,10	183,35	252,92	185,00	189,35	146,98	201,82	510,43	398,28				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5					
	Leistungsausgaben	Mean	45,93		9,67	18,30	25,31	18,27	22,44	27,47	7,32	44,78	0,00	61,87	21,17	28,98	2,02	14,70	32,82				
		CI Mean	[30,42; 61,45]		[0,00; 23,23]	[0,42; 36,18]	[0,00; 57,12]	[0,00; 38,60]	[0,00; 48,33]	[1,89; 53,05]	[0,00; 21,67]	[9,28; 80,27]	[0,00; 0,00]	[0,00; 127,07]	[0,00; 46,00]	[0,00; 61,63]	[0,00; 0,00]	[0,00; 43,51]	[0,00; 69,76]				
	SD	473,40		152,12	185,07	303,86	184,50	224,40	215,43	117,95	285,77	0,00	497,84	186,44	234,40	28,33	198,86	248,24					
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5						
	Leistungsausgaben	Mean	69,18		40,44	29,56	12,42	47,08	25,13	52,80	26,89	51,54	47,14	19,75	9,16	18,96	102,07	20,13					
		CI Mean	[43,73; 94,63]		[12,84; 68,05]	[0,00; 79,34]	[0,00; 29,85]	[13,31; 80,85]	[0,00; 53,90]	[0,00; 130,77]	[0,00; 68,62]	[13,78; 89,30]	[0,00; 98,46]	[0,00; 58,47]	[0,00; 27,11]	[0,00; 45,17]	[19,99; 184,15]	[0,00; 47,95]					
	SD	767,37		311,78	528,49	171,57	313,24	258,15	676,89	350,86	307,68	402,66	295,32	130,17	189,11	579,51	189,69						
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5							
	Leistungsausgaben	Mean	79,79		35,56	45,44	34,41	55,64	53,51	71,90	20,47	7,90	24,74	56,66	44,14	20,06	24,81						
		CI Mean	[50,14; 109,45]		[0,00; 77,03]	[0,00; 98,26]	[8,65; 60,17]	[0,00; 135,51]	[16,00; 91,03]	[0,00; 153,08]	[0,00; 43,56]	[0,00; 23,38]	[0,00; 52,64]	[0,00; 118,28]	[5,79; 82,49]	[0,00; 45,82]	[0,00; 59,86]						
	SD	872,14		464,93	550,59	251,46	741,90	339,43	717,98	195,88	125,49	219,83	464,17	284,86	186,58	248,75							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	44,46	23,15	24,60	18,39	24,72	10,53	44,56	13,44	20,59	38,89	7,67	30,81	8,95						
		CI Mean	[26,05; 62,87]	[4,69; 41,60]	[3,99; 45,21]	[0,00; 47,26]	[0,00; 56,15]	[0,00; 25,15]	[0,00; 92,42]	[0,00; 32,03]	[0,00; 60,94]	[4,70; 73,08]	[0,00; 22,70]	[0,00; 78,24]	[0,00; 24,52]						
	SD	548,20	208,31	220,47	293,53	307,80	138,79	432,03	160,71	339,56	278,28	121,75	378,40	120,78							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	60,68	13,09	28,61	14,86	12,30	46,72	29,58	22,43	65,69	35,92	30,26	30,57							
		CI Mean	[36,62; 84,73]	[0,00; 28,06]	[0,00; 69,35]	[0,00; 31,65]	[0,00; 29,59]	[1,66; 91,78]	[3,78; 55,38]	[0,00; 48,15]	[0,00; 132,72]	[0,00; 78,45]	[0,00; 77,12]	[0,00; 78,89]							
	SD	692,31	167,91	434,97	172,26	172,03	429,19	235,13	224,03	552,53	350,63	375,37	375,51								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	52,29	11,61	8,46	17,51	32,52	35,95	17,55	14,14	29,63	62,86	29,87								
		CI Mean	[33,84; 70,74]	[0,00; 24,72]	[0,00; 20,18]	[0,39; 34,63]	[0,85; 64,20]	[2,67; 69,24]	[0,00; 37,38]	[0,00; 31,53]	[0,00; 59,47]	[17,87; 107,86]	[0,00; 74,33]								
	SD	520,09	148,15	126,67	177,61	314,63	317,49	183,80	153,67	261,47	380,71	366,51									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	78,34	27,95	21,23	18,61	14,96	19,75	27,58	19,20	119,81	102,88									
		CI Mean	[41,37; 115,32]	[4,95; 50,94]	[2,67; 39,79]	[0,43; 36,80]	[0,00; 31,85]	[0,00; 42,48]	[0,26; 54,90]	[0,00; 40,86]	[0,00; 260,33]	[21,26; 184,49]									
	SD	984,19	258,50	200,09	185,79	164,29	212,95	243,84	191,37	1226,14	691,13										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	93,34	14,80	43,00	31,13	45,70	72,99	85,37	22,32	29,92										
		CI Mean	[56,17; 130,50]	[0,34; 29,27]	[0,00; 99,81]	[1,61; 60,65]	[8,40; 83,00]	[6,70; 139,27]	[15,14; 155,60]	[0,34; 44,31]	[0,00; 68,31]										
	SD	938,59	163,41	608,66	301,04	366,07	607,81	634,42	197,14	335,88											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	49,04	45,02	28,25	22,68	9,41	48,62	0,00	39,13											
		CI Mean	[19,63; 78,44]	[0,00; 104,61]	[3,05; 53,45]	[0,00; 58,51]	[0,00; 24,62]	[0,00; 120,38]	[0,00; 0,00]	[7,73; 70,54]											
	SD	668,89	668,18	260,66	350,42	139,71	636,75	0,00	269,10												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	46,25	79,25	8,77	10,03	13,25	16,29	78,68												
		CI Mean	[20,15; 72,36]	[0,00; 158,90]	[0,00; 20,91]	[0,00; 23,92]	[0,00; 31,89]	[0,00; 34,84]	[12,00; 145,37]												
	SD	560,36	897,66	127,26	136,99	178,19	170,49	588,80													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	44,81	0,00	26,17	34,94	25,84	0,00													
		CI Mean	[19,16; 70,46]	[0,00; 0,00]	[3,04; 49,29]	[0,00; 72,78]	[3,27; 48,41]	[0,00; 0,00]													
	SD	499,74	0,00	236,11	373,37	216,33	0,00														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	46,98	15,99	22,00	34,88	12,83														
		CI Mean	[20,82; 73,14]	[0,37; 31,62]	[2,80; 41,20]	[4,64; 65,13]	[0,00; 28,08]														
	SD	458,12	171,63	202,94	305,10	147,21															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	38,00	27,80	27,09	10,09																	
		CI Mean	[11,46; 64,53]	[0,07; 55,54]	[5,21; 48,98]	[0,00; 24,09]																	
	SD	386,50	309,87	230,75	140,67																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	65,41	52,69	32,71																		
		CI Mean	[16,86; 113,97]	[7,58; 97,81]	[8,43; 56,98]																		
	SD	505,27	504,84	252,63																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																			
	Leistungsausgaben	Mean		3,62																			
		CI Mean		[0,00; 10,73]																			
	SD		79,65																				

Tabelle 5.9 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **häusliche Krankenpflege**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Leistungsausgaben stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der häuslichen Krankenpflege ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.9 Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	285,65				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[0,00; 687,71]				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	1196,11				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl						204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	131,14						0,00	28,19	59,70	37,73	43,00	35,06	36,94	69,81	114,95	136,78	105,49	124,93	151,94	
		CI Mean	[94,67; 167,62]						[0,00; 0,00]	[1,41; 54,97]	[8,95; 110,44]	[0,00; 77,09]	[0,24; 85,76]	[2,74; 67,39]	[9,68; 64,20]	[9,20; 130,41]	[28,73; 201,18]	[40,27; 233,28]	[0,69; 210,29]	[0,00; 257,73]	[16,96; 286,92]	
	SD	828,19						0,00	185,86	341,52	259,53	279,37	207,64	171,17	371,71	516,79	552,70	604,92	751,40	743,32		
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5			
	Leistungsausgaben	Mean	176,92				0,00	95,27	65,84	30,32	51,94	43,54	96,03	167,42	174,32	141,50	98,71	100,93	191,59			
		CI Mean	[127,24; 226,61]				[0,00; 0,00]	[6,44; 184,10]	[1,45; 130,22]	[2,05; 58,59]	[8,42; 111,48]	[10,94; 76,15]	[10,26; 181,80]	[34,30; 300,53]	[31,68; 316,97]	[3,78; 279,21]	[0,00; 217,65]	[0,00; 205,84]	[27,80; 355,39]			
	SD	1201,16				0,00	672,24	472,62	201,15	299,12	220,06	565,50	853,69	895,79	828,38	718,00	623,04	954,67				
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0				
	Leistungsausgaben	Mean	166,15			0,00	64,75	57,63	76,58	58,13	48,30	99,03	117,64	135,22	94,59	113,76	133,47	173,65				
		CI Mean	[129,47; 202,83]			[0,00; 0,00]	[13,18; 116,33]	[10,32; 104,94]	[15,93; 137,23]	[4,78; 111,48]	[8,65; 87,95]	[22,49; 175,58]	[38,73; 196,56]	[44,24; 226,20]	[19,26; 169,92]	[34,61; 192,90]	[35,03; 231,90]	[53,37; 293,93]				
	SD	1000,14			0,00	435,57	385,06	483,89	415,03	302,08	569,97	575,76	650,68	517,81	545,50	659,60	795,41					
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5					
	Leistungsausgaben	Mean	181,17		0,00	48,15	94,02	99,58	118,10	89,80	116,38	113,73	135,08	122,17	114,22	99,58	98,13					
		CI Mean	[146,88; 215,46]			[0,00; 0,00]	[6,50; 89,80]	[25,84; 162,20]	[40,68; 158,48]	[51,85; 184,35]	[38,39; 141,22]	[42,78; 189,99]	[41,71; 185,75]	[54,25; 215,91]	[46,23; 198,11]	[35,43; 193,01]	[29,08; 170,08]	[25,84; 170,41]				
	SD	984,34		0,00	378,01	590,86	496,09	544,51	413,94	579,36	549,94	606,80	545,19	562,79	486,61	485,76						
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5						
	Leistungsausgaben	Mean	115,26		0,00	50,32	43,78	51,03	51,41	32,78	76,15	106,46	112,58	83,65	62,37	91,31	66,83					
		CI Mean	[87,27; 143,26]		[0,00; 0,00]	[12,96; 87,67]	[0,00; 91,44]	[0,00; 102,94]	[4,84; 97,99]	[0,00; 65,77]	[13,62; 138,68]	[25,20; 187,72]	[38,88; 186,28]	[22,82; 144,48]	[13,90; 110,84]	[20,64; 161,99]	[10,42; 123,25]					
	SD	844,06		0,00	367,58	442,00	465,98	404,32	277,36	509,44	637,58	562,12	441,07	349,73	499,00	384,58						
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5						
	Leistungsausgaben	Mean	175,62		0,00	19,35	38,77	45,29	57,20	56,54	62,54	89,77	94,70	149,37	239,19	197,87	174,67					
		CI Mean	[137,45; 213,78]		[0,00; 0,00]	[0,68; 38,02]	[5,78; 71,75]	[6,35; 84,22]	[14,70; 99,70]	[16,36; 96,71]	[9,94; 115,13]	[16,02; 163,52]	[21,53; 167,87]	[56,32; 242,42]	[108,04; 370,35]	[73,71; 322,02]	[46,80; 302,54]					
	SD	1122,31		0,00	194,63	321,96	361,70	384,54	355,34	446,24	597,88	576,55	700,93	974,31	899,17	907,52						

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0						
	Leistungsausgaben	Mean	122,97	36,60	41,98	61,56	65,42	53,34	47,35	57,84	57,75	52,39	63,49	79,88	120,88						
		CI Mean	[97,73; 148,22]	[10,47; 62,74]	[11,99; 71,96]	[24,67; 98,44]	[25,84; 104,99]	[22,21; 84,47]	[14,80; 79,89]	[16,98; 98,70]	[13,14; 102,36]	[7,16; 97,61]	[21,64; 105,34]	[31,70; 128,06]	[38,64; 203,12]						
	SD	751,64	295,01	320,71	374,94	387,60	295,43	293,79	353,16	375,38	368,10	338,98	384,36	637,71							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0							
	Leistungsausgaben	Mean	129,06	58,62	60,46	69,86	52,90	80,41	61,30	56,29	58,45	54,90	76,52	77,86							
		CI Mean	[101,18; 156,93]	[21,55; 95,70]	[19,89; 101,03]	[21,64; 118,08]	[16,87; 88,93]	[34,70; 126,11]	[22,34; 100,25]	[17,56; 95,03]	[17,05; 99,84]	[14,61; 95,19]	[24,43; 128,61]	[23,33; 132,39]							
	SD	802,36	415,95	433,17	494,81	358,60	435,31	355,00	337,40	341,21	332,11	417,26	423,76								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0								
	Leistungsausgaben	Mean	175,19	74,29	59,85	51,32	76,39	92,38	80,14	93,51	103,66	129,10	143,39								
		CI Mean	[135,23; 215,15]	[28,39; 120,20]	[19,44; 100,25]	[18,16; 84,49]	[27,38; 125,40]	[31,57; 153,20]	[18,34; 141,94]	[28,42; 158,60]	[32,82; 174,50]	[41,78; 216,42]	[49,92; 236,86]								
	SD	1126,28	518,74	436,80	344,12	486,79	580,08	572,82	575,19	620,79	738,76	770,46									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5									
	Leistungsausgaben	Mean	121,01	59,19	38,12	64,14	49,46	68,77	75,49	77,15	72,38	48,59									
		CI Mean	[87,81; 154,20]	[22,19; 96,18]	[11,75; 64,48]	[24,78; 103,50]	[11,66; 87,26]	[30,62; 106,92]	[13,23; 137,75]	[11,20; 143,09]	[8,15; 136,60]	[0,00; 99,35]									
	SD	883,59	415,87	284,24	402,13	367,71	357,30	555,68	582,74	560,40	429,84										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0										
	Leistungsausgaben	Mean	215,09	40,26	64,15	55,67	78,86	135,28	166,13	149,65	142,02										
		CI Mean	[167,11; 263,06]	[15,28; 65,25]	[23,39; 104,92]	[15,06; 96,27]	[34,18; 123,54]	[59,21; 211,35]	[78,73; 253,53]	[72,81; 226,50]	[54,11; 229,92]										
	SD	1211,54	282,20	436,78	414,04	438,49	697,53	789,54	689,19	769,01											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0											
	Leistungsausgaben	Mean	121,66	55,14	75,08	74,72	69,56	36,84	44,70	54,84											
		CI Mean	[82,86; 160,45]	[11,60; 98,68]	[28,24; 121,92]	[23,27; 126,16]	[13,07; 126,05]	[1,26; 72,41]	[6,18; 83,23]	[7,89; 101,78]											
	SD	882,53	488,21	484,47	503,18	519,18	315,72	340,72	402,23												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5												
	Leistungsausgaben	Mean	192,87	73,55	105,90	116,29	78,72	81,02	95,79												
		CI Mean	[138,93; 246,81]	[33,07; 114,03]	[48,36; 163,45]	[50,04; 182,55]	[24,04; 133,40]	[22,87; 139,17]	[32,69; 158,88]												
	SD	1157,96	456,24	603,14	653,32	522,66	534,43	557,10													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	439	393	363	336													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5													
	Leistungsausgaben	Mean	121,65	56,02	71,59	53,01	55,19	62,64													
		CI Mean	[75,94; 167,36]	[19,77; 92,27]	[24,04; 119,15]	[12,26; 93,76]	[12,31; 98,08]	[11,27; 114,01]													
	SD	890,50	406,06	485,57	402,05	411,09	476,45														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	451	405	366														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0														
	Leistungsausgaben	Mean	115,64	29,44	46,83	54,61	74,50														
		CI Mean	[69,18; 162,10]	[8,30; 50,57]	[17,66; 76,00]	[18,86; 90,35]	[18,80; 130,20]														
	SD	813,61	232,20	308,27	360,65	537,71															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																
	Leistungsausgaben	Mean	147,03	75,20	73,08	73,99																
		CI Mean	[77,28; 216,79]	[30,85; 119,55]	[22,64; 123,53]	[26,11; 121,88]																
	SD	1016,07	495,47	531,81	481,20																	
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	137,34	515,75	68,67																	
		CI Mean	[50,90; 223,79]	[0,00; 1146,36]	[25,45; 111,89]																	
	SD	899,58	7056,22	449,79																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																		
	Leistungsausgaben	Mean		79,16																		
		CI Mean		[35,26; 123,07]																		
	SD		492,29																			



Tabelle 5.10 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben für **Krankengeld** (ohne Kinderkrankengeld) bei Patienten mit Krankengeldanspruch. Der Krankengeldanspruch wurde dabei jeweils zum 1.1. eines Kalenderjahres erhoben, erstmalig im Jahr 2008. Fehlten die Angaben über den Krankengeldanspruch zum Jahresersten, wurden die Angaben vom Jahresersten des vorangegangenen Jahres übernommen. Die Auswertungen wurden unter der Annahme vorgenommen, dass ein zum 1.1. ermittelter Krankengeldanspruch im gesamten Vorjahr bestand. Bei Patienten, die zum 1.1. 2009 Anspruch auf Krankengeld hatten, wurde demnach ein Krankengeldanspruch für das Berichtshalbjahr 2008-1 angenommen.<sup>9</sup>

Die Angaben für diese Tabelle basieren daher nur auf einer Teilmenge der Stichprobe. Im Unterschied zu den mittleren Ausgaben in den anderen Leistungsbereichen und bei den Leistungsausgaben insgesamt werden also nicht alle Patienten der Stichprobe berücksichtigt.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren Patienten mit Krankengeldanspruch das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der - - auswertbaren Patienten mit Krankengeldanspruch in der Stichprobe die durchschnittlichen Ausgaben für Krankengeld je Anspruchsberechtigtem - - Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich - -.

**Tabelle 5.10 Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)<sup>10</sup>**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)*	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl			2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	80,52		0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[0,00; 218,65]			[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SD	233,73		0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		21	19	18	14	10	10	7	6	5	5	4	4	4	3	4	4	3		
	Leistungsausgaben	Mean	355,94	0,00	59,67	0,00	180,32	1273,80	198,03	0,00	386,35	0,00	0,00	1099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CI Mean	[38,66; 673,22]		[0,00; 0,00]	[0,00; 176,63]	[0,00; 0,00]	[0,00; 529,88]	[0,00; 3137,60]	[0,00; 586,17]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1143,61]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 3255,29]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
	SD	1922,19	0,00	260,10	0,00	667,32	3007,07	626,23	0,00	946,37	0,00	0,00	2199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		44	40	29	21	19	18	12	12	10	10	8	8	6	5	4	4	4		
	Leistungsausgaben	Mean	737,03	28,09	177,58	903,52	1056,41	254,28	260,94	885,07	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CI Mean	[318,22; 1155,84]	[0,00; 72,25]	[0,00; 458,16]	[0,00; 1882,13]	[0,00; 2292,13]	[0,00; 513,24]	[0,00; 665,79]	[0,00; 2059,28]	[0,00; 339,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
	SD	3096,50	149,46	905,39	2688,77	2889,18	575,91	876,35	2075,30	341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		61	51	38	31	26	19	18	18	17	16	13	13	11	11	10				
	Leistungsausgaben	Mean	441,85	122,05	216,49	262,73	73,56	93,47	210,04	215,11	79,91	85,92	206,35	841,61	772,57	247,40	59,87	92,02	0,00			
		CI Mean	[219,62; 664,08]	[0,00; 361,27]	[7,98; 425,00]	[0,00; 656,75]	[0,00; 217,74]	[0,00; 276,66]	[0,00; 452,53]	[0,00; 636,72]	[0,00; 236,52]	[0,00; 254,32]	[0,00; 610,79]	[0,00; 2139,11]	[0,00; 1851,67]	[0,00; 732,31]	[0,00; 177,22]	[0,00; 272,37]	[0,00; 0,00]			
	SD	1996,29	953,25	759,72	1239,22	409,57	476,59	539,28	912,62	339,01	364,52	850,79	2647,97	1985,07	892,02	198,57	305,19	0,00				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		61	50	40	38	32	32	23	22	21	20	17	16	16	10					
	Leistungsausgaben	Mean	472,17	342,76	276,85	175,14	200,77	183,23	143,96	143,99	90,92	379,29	0,00	38,65	336,38	851,70	0,00	1154,43				
		CI Mean	[254,43; 689,91]	[33,72; 651,79]	[0,00; 561,29]	[0,00; 361,50]	[0,00; 443,91]	[0,00; 466,38]	[0,00; 426,13]	[0,00; 339,61]	[0,00; 266,13]	[0,00; 1116,56]	[0,00; 0,00]	[0,00; 114,42]	[0,00; 834,04]	[0,00; 2055,30]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2799,31]				
	SD	2093,16	1231,45	1026,17	601,35	764,72	817,20	814,37	478,64	419,29	1723,76	0,00	163,99	1046,89	2456,32	0,00	2653,86					
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		70	62	51	40	40	39	37	32	31	29	27	27	22						
	Leistungsausgaben	Mean	560,08	928,70	681,66	375,40	327,83	0,00	4,20	38,01	233,81	537,37	238,98	0,00	317,47	377,50	182,38					
		CI Mean	[308,97; 811,19]	[304,75; 1552,64]	[107,60; 1255,71]	[0,00; 873,25]	[10,73; 644,93]	[0,00; 0,00]	[0,00; 12,43]	[0,00; 112,51]	[0,00; 514,11]	[0,00; 1300,98]	[0,00; 707,37]	[0,00; 0,00]	[0,00; 843,57]	[0,00; 913,24]	[0,00; 539,85]					
	SD	2759,73	2663,40	2306,18	1813,94	1023,22	0,00	26,22	231,21	808,98	2169,19	1286,92	0,00	1394,74	1420,29	855,45						

<sup>9</sup> Für die vorigen Berichtshalbjahre (bis 2007-2) wurde angenommen, dass - mangels voriger Erhebung des Krankengeldanspruchs - der Krankengeldanspruch vom 1.1. 2008 gilt.

<sup>10</sup> berechnet unter der Annahme eines Krankengeldanspruchs wie im Begleittext zu Tabelle 5.10 beschrieben

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)*	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202					
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		71	60	44	41	33	32	25	24	24	22	17	17	17					
	Leistungsausgaben	Mean	585,11	347,94	371,12	541,51	267,86	492,31	422,00	61,20	19,74	111,45	114,36	0,00	0,00	595,86					
		CI Mean	[256,23; 914,00]	[0,00; 741,61]	[0,00; 882,46]	[0,00; 1289,30]	[0,00; 599,66]	[0,00; 1022,19]	[0,00; 1130,89]	[0,00; 181,17]	[0,00; 58,42]	[0,00; 263,60]	[0,00; 269,03]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1763,74]					
	SD	3165,98	1692,44	2020,82	2530,75	1083,95	1553,02	2045,95	306,02	96,68	380,29	370,14	0,00	0,00	2456,79						
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247						
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		73	47	41	37	36	32	31	29	27	23	23	21						
	Leistungsausgaben	Mean	717,92	651,78	425,26	333,86	150,03	306,51	690,20	279,60	392,58	79,98	227,94	366,34	777,70						
		CI Mean	[409,73; 1026,11]	[102,01; 1201,54]	[0,00; 904,14]	[0,00; 761,90]	[0,00; 429,79]	[0,00; 633,22]	[0,00; 1464,16]	[0,00; 761,01]	[0,00; 950,43]	[0,00; 236,73]	[0,00; 674,72]	[0,00; 1084,36]	[0,00; 1662,47]						
	SD	2929,08	2396,53	1675,01	1398,36	868,23	1000,13	2233,76	1367,52	1532,73	415,57	1093,18	1756,90	2068,65							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247							
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		57	48	34	33	25	24	22	19	18	18	14							
	Leistungsausgaben	Mean	855,07	594,20	507,66	438,48	0,00	631,38	961,56	578,06	165,25	366,43	411,60	72,95							
		CI Mean	[434,97; 1275,17]	[76,80; 1111,60]	[0,00; 1065,31]	[0,00; 890,02]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1549,88]	[0,00; 2075,45]	[0,00; 1519,09]	[0,00; 436,97]	[0,00; 988,27]	[0,00; 1017,48]	[0,00; 193,27]							
	SD	3422,66	1993,02	1971,18	1343,34	0,00	2343,09	2784,15	2251,94	604,28	1346,03	1311,50	229,69								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268								
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		65	42	40	38	36	34	32	27	26	26								
	Leistungsausgaben	Mean	701,14	571,08	355,28	359,54	161,15	145,14	246,07	815,11	341,00	494,85	321,02								
		CI Mean	[371,22; 1031,05]	[123,59; 1018,57]	[0,00; 743,03]	[0,00; 872,83]	[0,00; 445,12]	[0,00; 381,17]	[0,00; 521,35]	[0,00; 1740,67]	[0,00; 860,35]	[0,00; 1070,51]	[0,00; 906,55]								
	SD	2920,31	1840,70	1282,11	1656,28	893,12	722,56	818,94	2671,32	1376,84	1497,61	1523,27									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288									
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		70	62	51	50	37	34	31	32	27									
	Leistungsausgaben	Mean	643,91	224,10	223,51	237,31	306,18	525,32	589,72	310,06	386,22	58,77									
		CI Mean	[308,52; 979,30]	[0,00; 451,48]	[0,00; 531,38]	[0,00; 658,01]	[13,39; 598,97]	[0,00; 1302,89]	[0,00; 1426,13]	[0,00; 687,36]	[0,00; 796,48]	[0,00; 157,30]									
	SD	3080,13	970,60	1236,82	1532,89	1056,30	2413,15	2488,31	1071,79	1184,09	261,20										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300										
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		78	63	61	50	47	42	42	39										
	Leistungsausgaben	Mean	549,15	845,10	233,04	183,09	376,50	252,48	93,48	316,78	530,27										
		CI Mean	[271,75; 826,54]	[270,96; 1419,25]	[0,00; 502,76]	[0,00; 416,98]	[0,00; 759,66]	[0,00; 533,76]	[0,00; 262,82]	[0,00; 862,75]	[0,00; 1203,74]										
	SD	2624,96	2587,10	1092,26	931,99	1382,34	983,87	559,91	1805,26	2145,84											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295											
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		86	75	55	51	49	48	41											
	Leistungsausgaben	Mean	458,85	471,90	551,18	3,93	117,73	93,77	237,46	235,01											
		CI Mean	[198,51; 719,20]	[46,46; 897,34]	[87,91; 1014,44]	[0,00; 11,63]	[0,00; 305,43]	[0,00; 258,83]	[0,00; 508,07]	[0,00; 549,34]											
	SD	2372,42	2012,94	2046,93	29,14	683,90	589,47	956,57	1026,88												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	437	393	368	340	311												
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		84	65	57	59	56	48												
	Leistungsausgaben	Mean	933,69	490,06	524,18	355,18	517,04	551,01	361,93												
		CI Mean	[531,31; 1336,08]	[88,08; 892,05]	[60,86; 987,50]	[49,93; 660,42]	[0,00; 1053,58]	[64,60; 1037,41]	[0,00; 763,89]												
	SD	3465,86	1879,73	1905,81	1175,80	2102,64	1857,09	1420,85													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	439	393	363	336													
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		83	69	61	58	53													
	Leistungsausgaben	Mean	791,57	398,02	545,46	507,01	426,48	39,31													
		CI Mean	[390,41; 1192,73]	[114,18; 681,85]	[81,79; 1009,13]	[46,55; 967,48]	[36,94; 816,02]	[0,00; 84,89]													
	SD	3177,39	1319,31	1965,05	1834,87	1513,60	169,29														

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)*	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	451	405	366																
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		96	82	74	60																
	Leistungsausgaben	Mean	1070,64	608,71	704,97	725,22	69,25																
		CI Mean	[536,22; 1605,06]	[209,80; 1007,62]	[206,78; 1203,17]	[186,44; 1264,00]	[0,00; 161,11]																
		SD	4007,34	1994,14	2301,72	2364,67	363,02																
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																	
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		86	79	66																	
	Leistungsausgaben	Mean	823,55	571,77	595,39	192,00																	
		CI Mean	[192,50; 1454,60]	[94,76; 1048,78]	[47,13; 1143,64]	[0,00; 410,08]																	
		SD	3876,94	2256,94	2486,23	903,92																	
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																		
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		87	75																		
	Leistungsausgaben	Mean	1218,67	433,52	609,33																		
		CI Mean	[351,05; 2086,28]	[179,59; 687,46]	[175,53; 1043,14]																		
		SD	3833,54	1208,44	1916,77																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																			
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		97																			
	Leistungsausgaben	Mean		210,28																			
		CI Mean		[17,88; 402,67]																			
		SD		966,77																			

Tabelle 5.11 gibt Auskunft über die **durchschnittlichen Gesamtausgaben** je Patient für alle bislang einzeln ausgewiesenen Leistungsbereiche, wobei Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006 berücksichtigt werden. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Das arithmetische Mittel der Gesamtausgaben in Tabelle 5.11 entspricht nicht der Summe der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbereichen, die in den vorangegangenen Tabellen ausgewiesen wurden. Das liegt daran, dass die Durchschnittsausgaben teils für unterschiedliche Personengruppen zu ermitteln waren. In der Regel wurden die Durchschnittsausgaben für alle auswertbaren und gewichteten Patienten der Stichprobe berechnet. Davon abweichend waren in Tabelle 5.10 die durchschnittlichen Krankengeldausgaben nicht für die gesamte Stichprobe zu ermitteln, sondern nur für die Patienten mit Krankengeldanspruch laut Stichtagsregelung wie im Begleittext beschrieben wird.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Diese Angaben beziehen sich – wie bei der Darstellung der einzelnen Leistungsbereiche – auf die Ausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr bzw. im Durchschnitt der Patientenjahre. Bei der Interpretation der Gesamtausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr ist zu beachten, dass die Ausgaben für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006-1 enthalten sind.

Zusätzlich wird in dieser Tabelle das arithmetische Mittel der kumulierten Leistungsausgaben im Zeitverlauf dargestellt. In diese Durchschnittsbildung wurden alle Patienten einbezogen, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren („Restkohorte“). Da im Berichtshalbjahr – nicht aber in den davor liegenden Halbjahren – die Gewichtungsregeln für verstorbene oder aus anderem Grund ausgeschiedene Kohortenmitglieder zu beachten sind, sind nicht einfach die Leistungsausgaben der Restkohorte bis zum aktuellen Berichtshalbjahr aufzusummieren und durch die Anzahl der Kohortenmitglieder zu teilen. Stattdessen sind Durchschnittswerte für alle betrachteten Halbjahre zu bilden und aufzusummieren. Umfasst beispielsweise eine Kohorte im Berichtshalbjahr 8.000 Patienten ungewichtet und 7.500 Patienten gewichtet und soll das kumulierte arithmetische Mittel für das dritte Halbjahr berechnet werden, ist folgendermaßen vorzugehen: Das arithmetische Mittel des ersten und zweiten Halbjahres wird jeweils gebildet, indem die jeweilige Summe der Leistungsausgaben der 8.000 Kohortenmitglieder durch ihre ungewichtete Anzahl dividiert wird. Das arithmetische Mittel des dritten Halbjahres – des Berichtshalbjahres – wird gebildet, indem die Summe der Leistungsausgaben der Kohortenmitglieder durch ihre gewichtete Anzahl geteilt wird, also durch 7.500. In der Tabelle wird dann als kumulierter Wert die Summe dieser drei Teilwerte ausgewiesen.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von - - Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient - - Euro.

Die bis einschließlich des letzten Berichtshalbjahres kumulierten Ausgaben lagen durchschnittlich bei - - Euro.

**Tabelle 5.11 Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)**

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	43	29	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			15,0	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Leistungsausgaben	Mean	6759,93		2522,82	4712,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	[4711,99; 8807,87]		[1224,35; 3821,29]	[1175,97; 8248,65]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		SD	9048,83		2565,79	5561,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leistungsausgaben kumuliert	Mean			2522,82	6414,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	402	322	277	240	209	191	177	172	170	165	159	151	142	141	134	129	124		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		391,5	303,5	264,5	230,5	204,5	185,0	174,0	167,0	164,0	158,5	151,5	144,5	138,0	126,0	128,0	123,0	116,5		
	Leistungsausgaben	Mean	5588,17		2197,74	2439,92	2678,46	2655,43	2668,50	2593,93	2593,62	2761,87	2453,85	2117,07	3186,50	3334,44	3210,49	3269,71	3864,31	3731,62	4187,55	
		CI Mean	[5261,92; 5914,41]		[1856,06; 2539,43]	[1926,21; 2953,63]	[2161,65; 3195,27]	[2134,77; 3176,08]	[1995,34; 3341,66]	[1835,09; 3352,77]	[1909,50; 3277,74]	[2050,08; 3473,67]	[1830,27; 3077,43]	[1602,04; 2632,10]	[2414,53; 3958,47]	[2548,51; 4120,37]	[2081,15; 4339,82]	[2495,12; 4044,30]	[3040,08; 4688,55]	[2788,37; 4674,87]	[2940,65; 5434,45]	
		SD	9372,48		3449,36	4566,06	4288,32	4033,01	4911,43	5265,97	4604,16	4693,09	4074,35	3308,20	4847,85	4820,15	6768,71	4436,10	4757,73	5337,33	6866,56	
Leistungsausgaben kumuliert	Mean			2197,74	4534,80	6850,87	8967,26	11055,24	13137,96	14648,42	16440,12	18759,89	20182,71	23476,55	26667,05	29174,97	33245,71	36354,90	39069,62	43575,34		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	418	342	280	257	226	211	199	185	177	171	161	155	146	141	137	132			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	394,5	320,5	275,5	245,5	220,0	207,0	194,5	181,5	175,0	167,0	158,0	151,5	139,0	140,0	135,5	130,5		
	Leistungsausgaben	Mean	5644,26	2006,31	2409,03	2787,34	2343,03	2642,52	3004,88	2767,31	2902,22	2925,43	2787,18	2831,66	3478,79	2831,91	2666,16	3366,06	3314,98	3320,65		
		CI Mean	[5241,91; 6046,60]	[1653,62; 2359,00]	[1862,55; 2955,50]	[1710,16; 3864,52]	[1870,84; 2815,22]	[2072,94; 3212,11]	[2230,83; 3778,93]	[2183,04; 3351,58]	[2189,58; 3614,86]	[2135,93; 3714,93]	[2087,66; 3486,71]	[2093,37; 3569,95]	[2227,59; 4729,99]	[2207,79; 3456,02]	[1934,38; 3397,95]	[2366,34; 4365,79]	[2362,99; 4266,98]	[2421,51; 4219,79]		
		SD	11676,52	3964,91	5537,80	9838,89	3998,70	4553,30	5857,64	4288,88	5070,77	5426,67	4721,36	4867,78	8024,15	3919,34	4401,83	6035,13	5653,88	5240,56		
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		2006,31	4266,37	6479,65	8073,87	10582,32	13077,91	15548,59	18383,05	20846,90	23101,55	25256,57	28795,09	31373,23	32785,54	35690,91	39460,80	41055,98			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	354	319	280	257	248	236	224	218	207	199	192	185	174	170				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	412,0	349,0	309,0	274,0	254,5	244,5	232,5	223,0	213,0	204,5	196,5	181,5	182,5	172,5	168,0			
	Leistungsausgaben	Mean	5211,69	1802,72	2547,74	1933,86	2123,52	2149,83	2060,22	2486,56	2789,67	2555,09	2617,60	2700,71	2974,62	2862,01	3467,23	3592,35	3801,22			
		CI Mean	[4897,14; 5526,25]	[1551,72; 2053,72]	[1991,17; 3104,32]	[1627,04; 2240,69]	[1736,80; 2510,24]	[1801,19; 2498,47]	[1528,16; 2592,29]	[1783,77; 3189,36]	[2125,96; 3453,38]	[1881,85; 3228,33]	[2060,92; 3174,28]	[2085,53; 3315,89]	[2325,89; 3623,34]	[2179,20; 3544,82]	[2564,48; 4369,98]	[2690,10; 4494,60]	[2829,73; 4772,71]			
		SD	9651,82	2830,45	5763,92	2924,47	3468,32	2944,42	4330,64	5606,76	5163,37	5129,43	4145,14	4488,39	4639,69	4693,32	6222,17	6045,98	6424,47			
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		1802,72	4320,68	5558,29	7601,54	9372,05	11319,35	13461,52	15842,69	18133,58	19828,39	22011,88	24390,07	26058,82	28753,62	32197,97	35222,14				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	428	363	325	296	278	264	253	243	226	221	211	200	186	176					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		484,0	411,5	350,5	316,5	288,5	272,5	259,5	249,0	238,0	224,0	216,5	198,0	196,0	183,0	173,5				
	Leistungsausgaben	Mean	5377,93	2025,07	2248,34	2131,39	2325,51	2888,38	2655,34	2475,40	3074,54	2461,84	2773,23	2899,24	3588,97	2765,79	3245,21	3250,46				
		CI Mean	[5041,04; 5714,81]	[1704,74; 2345,41]	[1898,47; 2598,21]	[1783,92; 2478,87]	[1905,41; 2745,61]	[2302,08; 3474,68]	[2052,54; 3258,14]	[1898,07; 3052,74]	[2142,92; 4006,17]	[1931,16; 2992,52]	[2021,36; 3525,11]	[2215,53; 3582,94]	[2536,43; 4641,51]	[2113,62; 3417,96]	[2340,84; 4149,58]	[2364,68; 4136,23]				
		SD	10279,69	3595,59	3621,06	3319,03	3813,16	5080,88	5076,93	4745,03	7500,38	4176,98	5741,35	5132,67	7556,41	4658,35	6241,87	5952,74				
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		2025,07	4034,63	5917,01	8026,41	11002,57	13343,70	15495,38	18147,63	19475,91	21239,70	24064,04	26782,17	28385,37	31440,25	31975,46					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	455	384	338	316	297	279	259	242	227	215	202	196	179						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	433,0	372,0	330,5	309,5	289,5	271,5	255,0	236,5	223,5	202,0	200,0	191,5	178,5					
	Leistungsausgaben	Mean	5987,07	2573,42	2615,30	2511,97	2895,88	2948,89	3108,61	2802,91	3259,71	3930,75	2752,01	3173,80	3115,12	3768,41	2785,06					
		CI Mean	[5578,18; 6395,97]	[2144,81; 3002,02]	[2140,02; 3090,59]	[2017,28; 3006,66]	[2247,11; 3544,65]	[2250,61; 3647,18]	[2407,61; 3809,60]	[2165,36; 3440,47]	[2526,11; 3993,32]	[2696,84; 5164,66]	[2101,28; 3402,75]	[2313,75; 4033,84]	[2325,71; 3904,54]	[2570,03; 4966,79]	[1981,62; 3588,49]					
		SD	12329,79	4840,62	5045,94	4867,96	6017,53	6267,68	6085,28	5359,75	5976,92	9681,51	4963,48	6236,49	5695,93	8461,00	5476,63					
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		2573,42	5020,98	7098,27	9591,44	11505,88	14524,77	16345,89	18318,09	22245,93	23333,20	25146,94	26975,80	30761,55	30995,42						

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr			
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	431	379	339	320	306	291	264	246	240	224	210	202								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	417,5	366,0	331,5	314,5	300,5	276,5	252,5	238,5	218,0	212,0	201,5	193,5								
	Leistungsausgaben	Mean		6262,71	2205,73	2326,59	3013,43	3045,84	3707,28	3005,45	3307,37	2800,88	3524,45	3781,88	3440,16	3279,59	2966,40							
		CI Mean		[5779,32; 6746,10]	[1807,36; 2604,10]	[1889,44; 2763,75]	[2407,55; 3619,32]	[2205,97; 3885,71]	[2364,73; 5049,83]	[2285,41; 3725,50]	[2503,26; 4111,47]	[2103,12; 3498,64]	[2503,47; 4545,42]	[2825,76; 4738,01]	[2712,82; 4167,51]	[2358,30; 4200,88]	[2271,36; 3661,44]							
		SD		14215,89	4466,89	4557,32	5913,90	7801,87	12147,42	6368,33	6821,87	5656,92	8044,56	7202,56	5403,19	6672,32	4932,81							
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2205,73</i>	<i>4474,07</i>	<i>7366,28</i>	<i>10053,52</i>	<i>13300,49</i>	<i>16210,67</i>	<i>19774,11</i>	<i>22461,10</i>	<i>24600,60</i>	<i>25466,19</i>	<i>26967,36</i>	<i>29471,21</i>	<i>32187,40</i>									
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	456	409	376	355	336	306	289	278	267	260	247									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,5	439,5	397,0	368,5	346,0	313,0	287,0	272,0	254,5	252,0	244,5	231,0									
	Leistungsausgaben	Mean		5533,97	2579,23	2815,99	2805,42	2801,19	2378,47	3101,50	3252,35	2644,84	2412,78	2495,89	2569,28	3117,80								
		CI Mean		[5180,77; 5887,17]	[2154,00; 3004,46]	[2334,01; 3297,97]	[2246,99; 3363,84]	[2246,89; 3355,50]	[1832,45; 2924,49]	[2556,30; 3646,70]	[2400,14; 4104,56]	[2133,19; 3156,48]	[1938,51; 2887,05]	[1956,20; 3035,59]	[2038,69; 3099,87]	[2341,90; 3893,70]								
		SD		10515,35	4800,01	5155,28	5676,85	5428,92	5181,93	4921,21	7365,97	4305,21	3860,21	4371,11	4232,96	6016,68								
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2579,23</i>	<i>5318,23</i>	<i>7719,68</i>	<i>9685,46</i>	<i>11239,93</i>	<i>13429,42</i>	<i>15641,06</i>	<i>17801,68</i>	<i>19972,40</i>	<i>22164,59</i>	<i>23982,97</i>	<i>25789,40</i>										
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	452	418	393	368	343	309	293	279	263	247										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,5	438,0	404,5	380,5	348,5	319,0	291,5	261,0	261,0	246,5	232,0										
	Leistungsausgaben	Mean		5498,53	2507,69	2504,95	2452,55	2177,94	2950,99	3177,33	2814,08	2818,88	3341,17	2981,39	2701,01									
		CI Mean		[5082,56; 5914,51]	[1952,85; 3062,53]	[2022,28; 2987,62]	[1926,68; 2978,42]	[1714,12; 2641,77]	[2385,25; 3516,73]	[2245,91; 4108,74]	[1990,74; 3637,42]	[2141,49; 3496,26]	[2493,91; 4188,44]	[2275,46; 3687,32]	[2064,57; 3337,45]									
		SD		11972,89	6224,58	5153,86	5396,09	4616,09	5388,41	8487,56	7172,01	5583,42	6983,67	5654,78	4945,91									
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2507,69</i>	<i>4970,26</i>	<i>6834,47</i>	<i>8896,74</i>	<i>11695,48</i>	<i>14005,37</i>	<i>16489,76</i>	<i>19207,30</i>	<i>21633,42</i>	<i>23216,50</i>	<i>25400,14</i>											
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	460	425	391	360	339	320	302	284	268											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	449,0	413,5	379,0	349,5	330,0	300,0	295,0	275,0	261,0											
	Leistungsausgaben	Mean		4776,75	2544,83	2149,78	1998,21	2163,87	2335,99	2429,21	2588,10	2573,36	2842,71	2844,11										
		CI Mean		[4447,42; 5106,07]	[1892,02; 3197,65]	[1809,51; 2490,05]	[1581,31; 2415,12]	[1790,75; 2536,98]	[1867,81; 2804,17]	[1787,63; 3070,79]	[2063,23; 3112,98]	[2087,30; 3059,42]	[2137,60; 3547,82]	[2242,40; 3445,81]										
		SD		9282,40	7376,60	3678,68	4325,31	3706,04	4465,59	5946,38	4638,33	4259,38	5965,77	4959,60										
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2544,83</i>	<i>4325,35</i>	<i>6077,65</i>	<i>8016,81</i>	<i>9868,50</i>	<i>12240,09</i>	<i>14096,34</i>	<i>15773,45</i>	<i>18337,40</i>	<i>21171,84</i>												
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	458	424	380	350	333	312	303	288												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		485,5	446,5	401,0	363,5	337,0	306,0	300,0	292,5	275,5												
	Leistungsausgaben	Mean		4983,96	2559,73	2108,69	2344,31	2242,19	2752,26	2774,49	2298,49	3042,53	2651,70											
		CI Mean		[4573,40; 5394,52]	[1964,32; 3155,14]	[1701,21; 2516,16]	[1934,74; 2753,89]	[1771,84; 2712,54]	[2120,29; 3384,22]	[1907,76; 3641,21]	[1796,43; 2800,55]	[2248,65; 3836,41]	[2018,08; 3285,32]											
		SD		10928,71	6693,48	4392,96	4184,55	4575,25	5919,02	7735,45	4436,73	6927,27	5365,77											
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2559,73</i>	<i>4326,10</i>	<i>6383,30</i>	<i>7784,16</i>	<i>10413,38</i>	<i>12586,93</i>	<i>14087,07</i>	<i>16984,22</i>	<i>19121,01</i>													
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	454	411	379	354	329	314	300													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,0	441,0	399,5	370,0	323,0	313,5	309,0	294,0													
	Leistungsausgaben	Mean		5900,50	2368,31	2223,78	2883,62	2570,81	3405,54	3264,63	3047,97	3669,88												
		CI Mean		[5303,50; 6497,49]	[1945,34; 2791,28]	[1832,87; 2614,68]	[1960,25; 3807,00]	[2016,07; 3125,54]	[2546,97; 4264,12]	[2387,20; 4142,06]	[2278,38; 3817,57]	[2506,35; 4833,41]												
		SD		15076,40	4776,93	4188,27	9416,31	5444,16	7872,67	7926,41	6902,19	10178,78												
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2368,31</i>	<i>4505,02</i>	<i>6921,58</i>	<i>9472,88</i>	<i>12411,77</i>	<i>15005,66</i>	<i>17588,55</i>	<i>21189,41</i>														
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	433	383	345	318	308	295														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0	411,0	367,5	324,5	302,5	300,5	282,0														
	Leistungsausgaben	Mean		5236,99	2454,41	2680,25	2526,91	2773,50	2559,18	2518,19	2639,99													
		CI Mean		[4760,33; 5713,65]	[2068,41; 2840,41]	[2239,91; 3120,60]	[2066,97; 2986,85]	[1936,11; 3610,89]	[1972,28; 3146,09]	[1923,52; 3112,85]	[2063,82; 3216,17]													
		SD		10843,30	4328,15	4554,65	4498,53	7696,27	5208,06	5259,40	4936,53													
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2454,41</i>	<i>5055,40</i>	<i>7052,71</i>	<i>9662,32</i>	<i>11439,51</i>	<i>13801,64</i>	<i>16528,21</i>															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	437	393	368	340	311														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	422,0	373,5	351,0	324,5	299,5														
	Leistungsausgaben	Mean	5045,14	2442,02	2414,24	2626,79	2337,92	2621,32	2654,66														
		CI Mean	[4652,50; 5437,78]	[2042,97; 2841,07]	[2044,36; 2784,12]	[2122,53; 3131,05]	[1948,91; 2726,92]	[2145,69; 3096,95]	[2198,37; 3110,94]														
		SD	8429,26	4497,62	3876,66	4972,12	3718,34	4371,43	4028,78														
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2442,02</i>	<i>4917,44</i>	<i>7101,21</i>	<i>8896,36</i>	<i>11414,75</i>	<i>13170,97</i>															
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	439	393	363	336															
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,0	400,5	374,0	353,0	330,5															
	Leistungsausgaben	Mean	4370,46	2481,03	2430,66	2103,32	2241,27	1920,65															
		CI Mean	[4000,04; 4740,88]	[2075,85; 2886,20]	[1969,44; 2891,89]	[1778,45; 2428,20]	[1884,26; 2598,29]	[1647,65; 2193,65]															
		SD	7216,34	4538,43	4709,35	3205,52	3422,30	2532,15															
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2481,03</i>	<i>4751,98</i>	<i>6400,30</i>	<i>8175,35</i>	<i>9600,90</i>																
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		499	451	405	366																
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		463,5	429,0	391,0	358,0																
	Leistungsausgaben	Mean	4966,76	2303,70	2656,26	2368,08	2402,13																
		CI Mean	[4424,23; 5509,28]	[1917,75; 2689,64]	[2181,88; 3130,65]	[1913,33; 2822,84]	[1924,94; 2879,32]																
		SD	9500,34	4239,34	5013,08	4587,88	4606,56																
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2303,70</i>	<i>4816,18</i>	<i>7191,87</i>	<i>9396,94</i>																	
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	440	402																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		479,5	427,0	388,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	5456,65	2697,46	2796,07	2653,77																	
		CI Mean	[4749,60; 6163,70]	[2052,61; 3342,30]	[2285,31; 3306,83]	[2167,94; 3139,59]																	
		SD	10298,46	7204,34	5384,85	4882,45																	
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2697,46</i>	<i>5167,64</i>	<i>7469,89</i>																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500	434																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		481,0	416,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	5320,07	2711,26	2660,03																		
		CI Mean	[4419,87; 6220,26]	[1926,87; 3495,64]	[2209,94; 3110,13]																		
		SD	9367,55	8777,00	4683,78																		
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2711,26</i>	<i>4751,96</i>																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		483,0																			
	Leistungsausgaben	Mean		2445,14																			
		CI Mean		[1726,20; 3164,08]																			
		SD		8061,34																			
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2445,14</i>																				

**Auswertungskapitel 6: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung**

In den folgenden Tabelle 6.1 werden die Kosten für Qualitätssicherung und Verwaltung des DMP-Programms pro eingeschriebenem Patienten und Kalenderjahr ausgewiesen; eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Zu beachten ist dabei, dass alle eingeschriebenen Patienten in die Berechnung eingehen; im Gegensatz zu den bisherigen Auswertungen im ökonomischen Berichtsteil wird also nicht auf eine Stichprobe zurückgegriffen. Da die Durchschnittskosten auch von der Anzahl der Programmteilnehmer abhängen, werden zur Information zudem die Versichertenjahre im Programm ausgewiesen.

Für das Jahr 2003 lagen keine Angaben vor.

**Tabelle 6.1 Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmer und Jahr und Versichertenjahre<sup>11</sup>**

EZ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verwaltungskosten in Euro	--	180,78	70,96	115,84	69,10	62,37	46,14	38,51	34,74	35,31
Qualitätssicherungskosten in Euro	--	48,83	19,17	3,06	2,33	1,98	1,41	1,70	1,04	1,11
Gesamtkosten in Euro	--	229,61	90,13	118,90	71,43	64,35	47,55	40,21	35,78	36,42
<i>zur Information: Versichertenjahre im Programm</i>	--	12531,3	29008,0	48238,1	61205,9	69158,0	67240,0	72434,0	82262,0	82247,0

<sup>11</sup> Die Kosten der Qualitätssicherung und Verwaltung ergeben sich aus den gemäß den Vorgaben des BVA gebuchten Aufwendungen und deren Verhältnis zu Versicherten in Jahren. Sollten in vorangegangenen Berichten Beträge enthalten sein, die vor Abschluss des Haushaltsjahres ermittelt wurden, oder Zahlen zu den Versichertenjahren verwendet worden seien, die vor Erstellung der amtlichen Statistiken ermittelt wurden, so können diese Zahlen u.U. von den Zahlen des aktuellen Berichtes abweichen, da sie im Nachhinein nochmals aktualisiert wurden. Zu beachten ist zudem, dass fusionsbedingt die Angaben von Versicherten der (ehemaligen) See-Krankenkasse ab 2008 nicht mehr in den AOK-, sondern in den Knappschaftsberichten berücksichtigt werden.



### Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität

Ein Bestandteil der Evaluation ist die Analyse, wie sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patienten im Laufe der Teilnahme an Disease-Management-Programmen verändert. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen. Es handelt sich um ein standardisiertes Instrument, das von Patienten selbst ausgefüllt werden kann und auf seine metrischen Eigenschaften hin mit guten Ergebnissen geprüft wurde. Der SF-36 entstand im Rahmen der Medical Outcome Study (MOS) und ist die Kurzform einer 149 Items umfassenden Fragebatterie zur Funktionsfähigkeit und Lebensqualität. Der Fragebogen umfasst insgesamt 36 Items. Erfasst werden damit 8 Dimensionen der Gesundheit mit jeweils 2-10 Items sowie die Gesundheitsveränderungen in den vergangenen 12 Monaten mittels einer Frage. Die Skalen beinhalten folgende Dimensionen des Gesundheitszustandes:

- Körperliche Funktionsfähigkeit
- Körperliche Rollenfunktion
- Körperliche Schmerzen
- Allgemeine Gesundheitswahrnehmung
- Vitalität
- Soziale Funktionsfähigkeit
- Emotionale Rollenfunktion
- Psychisches Wohlbefinden

Die Bearbeitungszeit des SF-36 wird von den Entwicklern auf 8-15 Minuten geschätzt. Der Fragebogen kann in zwei verschiedenen Versionen eingesetzt werden. Eine davon bezieht die Fragen rückblickend auf eine Woche, die andere im Rahmen der Evaluation der strukturierten Behandlungsprogramme eingesetzte Version hat ein Zeitfenster von 4 zurückliegenden Wochen (vgl. Bullinger/ Kirchberger 1998)<sup>12</sup>.

Die Veränderungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität werden mittels des SF 36 schriftlich erhoben. Der Versand der Fragebögen erfolgt durch die jeweils zuständige Krankenkasse. Dem Fragebogen ist ein standardisiertes Anschreiben, das zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und dem BVA abgestimmt wurde, beigelegt.

Analog zu den ökonomischen Auswertungen basieren auch die Auswertungen zum SF-36 nicht auf den Daten aller Patienten, sondern auf einer Stichprobe. Für den SF-36 werden genau dieselben Patienten befragt, für welche auch die ökonomischen Auswertungen vorgenommen wurden. Entsprechend beträgt der Stichprobenumfang in der Regel zehn Prozent der Patientenzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patienten. Bei Kohorten mit weniger als 100 Patienten werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patienten umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.<sup>13</sup>

Zu beachten ist weiterhin, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patienten im Berichtsteil I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wird ab der Eintrittskohorte 2006-2 erhoben. Für frühere Kohorten entfällt die Befragung zur Lebensqualität. Die Erstbefragung findet nach dem Beitrittsjahr statt; Wiederholungsbefragungen erfolgen in zweijährigen Abständen. Der vorliegende Bericht enthält somit Auswertungen zum SF-36 für die Erst-, Zweitbefragungen sowie Drittbefragungen der Kohorten 2006-2 bis 2008-1, für die Erst- und Zweitbefragungen der Kohorten 2008-2 bis 2010-1 und für die Erstbefragungen der Kohorten 2010-2 bis 2012-1.

Um die gesundheitsbezogene Lebensqualität auszuwerten und darzustellen, werden die Items des Fragebogens nach einem standardisierten Algorithmus zu Skalenwerten verdichtet, die verschiedene Dimensionen des allgemeinen Gesundheitszustandes abbilden. Durch eine Transformation der Skalenrohre Werte können alle Skalen Werte zwischen „0“ und „100“ annehmen. Der Wert „100“ stellt dabei den Bestwert dar, d.h. je höher der Wert auf einer Skala für einen Patienten ausfällt, desto besser ist sein Gesundheitszustand in dieser Dimension. Neben den acht Subskalen des SF-36 können durch die Gewichtung

von Items zwei übergeordnete Dimensionen, d.h. eine körperliche Summenskala und eine psychische Summenskala berechnet werden, in die jeweils mehrere Skalenwerte eingehen. Diese können ebenfalls Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) annehmen.

Die Ergebnisse zur Lebensqualität beinhalten eine differenzierte Darstellung der Zahl der versendeten Fragebögen und des Rücklaufes je Kohorte und Erhebungszeitpunkt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in den durch den SF-36 erfassten Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie des Items „Veränderung der Gesundheit“ je Kohorte im Zeitverlauf aufgezeigt.


Die Lebensqualität und ihre Veränderung im Zeitverlauf werden zudem anhand eines Indexwertes, dem SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) evaluiert. Der SF-6D ist ein krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität in Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand) bis 1 (bestmöglicher Gesundheitszustand). Der SF-6D kann aus Erhebungsdaten des SF-36 anhand von 11 dazu benötigten Items mit jeweils zwei bis sechs Antwortabstufungen extrahiert werden. Der SF-6D umfasst insgesamt sechs Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität: Körperliche Funktionsfähigkeit, Rollenfunktion, Soziale Funktionsfähigkeit, Schmerz, Psychisches Wohlbefinden, Vitalität.

Der SF-6D wurde mit der Zielsetzung entwickelt, einen patientennahen Ergebnisindikator wie die gesundheitsbezogene Lebensqualität in gesundheitsökonomischen Studien zur Effizienz- und Effektivitätsbeurteilung z.B. den Kosten einer Behandlungsmaßnahme entgegen zu setzen. Dazu ist es notwendig, die Lebensqualität, die physische, psychische und soziale Aspekte von Gesundheit umfasst, zu einem einzigen Indexwert zu aggregieren.

<sup>12</sup> Bullinger M., Kirchberger I: SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand, Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie 1998.

<sup>13</sup> Fusionsbedingt können die Stichproben in den AOK-Berichten kleiner und in den Knappschafts-Berichten größer ausfallen als gemäß obiger Beschreibung zu erwarten wäre. Sofern die Stichprobe Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse enthielt, mussten diese mit der evaluationsseitigen Umsetzung der Fusion von Knappschaft und ehemaliger See-Krankenkasse aus den Auswertungen der AOK-Berichte ausgeschlossen und in die Auswertungen der Knappschaftsberichte aufgenommen werden.

Abb. III.1 Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex



**Auswertungskapitel 7: Rücklaufstatistik**

Tabelle 7.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patienten für die Auswertungen zur Lebensqualität zur Verfügung standen. Grundlage ist dieselbe Stichprobe aus der Gesamtzahl der Patienten wie für die Ausgabenanalysen in dem Auswertungskapitel 5. Die Anzahl der Stichprobenmitglieder kann sich im Laufe der weiteren Teilnahmehalbjahre verringern, weil Patienten wegen Tod, Ausschluss oder eigener Beendigung aus dem Programm ausscheiden.

Anschließend wird dargestellt, wie viele Patienten den Fragebogen insgesamt zurückgesendet haben<sup>14</sup>, wie viele Patienten den Fragebogen *vollständig* ausgefüllt haben und welchem Anteil an der Brutto-Stichprobe dies jeweils entspricht.

In der Kohorte 2006-2 umfasst die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 499 Patienten. 252 von ihnen schickten den Fragebogen zurück. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 50,50 Prozent der Brutto-Stichprobe. Bei der wiederholten Befragung der Patienten dieser Kohorte 2006-2 lag die Rücklaufquote bei 59,21 Prozent.

<sup>14</sup> Die an dieser Stelle ausgewiesene Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen kann – insbesondere in den von der Fusion zwischen Knappschaft und der See-Krankenkasse betroffenen Halbjahren bis 2008-1 – von der entsprechenden Anzahl in den spezifischen Tabellen 8.1 bis 8.12 leicht abweichen. Auf die Anzahl der auswertbaren Fragebögen und damit auf die Auswertungsergebnisse zur Lebensqualität hat dies keinen Einfluss.

**Tabelle 7.1 Patienten in der Stichprobe (Anzahl)**

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	252	209	121
		Anteil an Brutto-SP in %	50,50	59,21	43,84
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	225	189	104
		Anteil an Brutto-SP in %	45,09	53,54	37,68
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>	
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	281	203	147
		Anteil an Brutto-SP in %	56,20	55,77	52,88
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	250	173	135
		Anteil an Brutto-SP in %	50,00	47,53	48,56
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>	
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	279	172	143
		Anteil an Brutto-SP in %	55,91	47,91	50,89
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	240	155	128
		Anteil an Brutto-SP in %	48,10	43,18	45,55
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>	
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	262	164	110
		Anteil an Brutto-SP in %	52,40	46,99	38,19
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	234	153	98
		Anteil an Brutto-SP in %	46,80	43,84	34,03
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>	
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	244	193	
		Anteil an Brutto-SP in %	48,90	54,83	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	216	173	
		Anteil an Brutto-SP in %	43,29	49,15	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>		
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	245	161	
		Anteil an Brutto-SP in %	49,00	50,95	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	219	137	
		Anteil an Brutto-SP in %	43,80	43,35	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>		
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	235	159	
		Anteil an Brutto-SP in %	47,00	46,90	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	211	140	
		Anteil an Brutto-SP in %	42,20	41,30	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>		

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	222	135	
		Anteil an Brutto-SP in %	44,49	40,42	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	202	121	
		Anteil an Brutto-SP in %	40,48	36,23	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>		
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	211		
		Anteil an Brutto-SP in %	42,28		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	187		
		Anteil an Brutto-SP in %	37,47		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>			
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	203		
		Anteil an Brutto-SP in %	40,60		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	180		
		Anteil an Brutto-SP in %	36,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>			
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	212		
		Anteil an Brutto-SP in %	42,40		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	176		
		Anteil an Brutto-SP in %	35,20		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>			
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	184		
		Anteil an Brutto-SP in %	36,80		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	164		
		Anteil an Brutto-SP in %	32,80		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>			

**Auswertungskapitel 8: Auswertungen zur Lebensqualität**

Tabelle 8.1 gibt Auskunft über den **Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr**. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten die vergleichende Frage zum Gesundheitszustand im vergangenen Jahr beantwortet haben. Anschließend wird für diese Personengruppe ausgewiesen, wie sich die Antworten auf einer Skala von 1 „viel besser“ bis 5 „viel schlechter“ verteilen und auf welchen Wert die Antwort im Durchschnitt fiel.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 244 Patienten hatten die Frage zum Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr beantwortet. 2,87 Prozent von ihnen ging es zum Zeitpunkt der Befragung im Vergleich zum vergangenen Jahr viel besser, 10,66 Prozent etwas besser.

Bei der ersten Wiederholungsbefragung der Kohorte 2006-2 sendeten 215 Patienten den Fragebogen zurück. Die Fragen zum Gesundheitszustand im Vergleich zum Vorjahr hatten 201 von ihnen beantwortet. Viel besser als im Vergleich zum Vorjahr ging es 1,49 Prozent, etwas besser 6,47 Prozent der Patienten.

**Tabelle 8.1 Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	244	201	116
		Anteil in %	96,83	93,49	94,31
		Anteil 2 in %	48,90	56,94	42,03
	(1) viel besser	Anzahl	2,87	1,49	3,45
	(2) etwas besser	Anzahl	10,66	6,47	12,93
	(3) etwa gleich	Anzahl	42,21	46,27	36,21
	(4) etwas schlechter	Anzahl	33,61	34,33	36,21
	(5) viel schlechter	Anzahl	10,66	11,44	11,21
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>	
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	276	197	141
		Anteil in %	98,22	89,14	92,16
		Anteil 2 in %	55,20	54,12	50,72
	(1) viel besser	Anzahl	3,26	0,51	0,00
	(2) etwas besser	Anzahl	9,78	6,09	3,55
	(3) etwa gleich	Anzahl	43,12	50,76	47,52
	(4) etwas schlechter	Anzahl	33,70	29,95	35,46
	(5) viel schlechter	Anzahl	10,14	12,69	13,48
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>	
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	271	168	139
		Anteil in %	97,13	88,89	93,29
		Anteil 2 in %	54,31	46,80	49,47
	(1) viel besser	Anzahl	3,32	0,60	2,16
	(2) etwas besser	Anzahl	11,44	7,74	5,04
	(3) etwa gleich	Anzahl	45,02	47,02	42,45
	(4) etwas schlechter	Anzahl	30,63	33,33	42,45
	(5) viel schlechter	Anzahl	9,59	11,31	7,91
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>	

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	259	160	107
		Anteil in %	98,85	88,89	95,54
		Anteil 2 in %*	51,80	45,85	37,15
	(1) viel besser	Anzahl	2,32	0,63	0,00
	(2) etwas besser	Anzahl	11,97	7,50	7,48
	(3) etwa gleich	Anzahl	46,33	48,75	41,12
	(4) etwas schlechter	Anzahl	26,25	30,63	36,45
	(5) viel schlechter	Anzahl	13,13	12,50	14,95
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>	
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	233	187	
		Anteil in %	95,49	92,57	
		Anteil 2 in %*	46,69	53,13	
	(1) viel besser	Anzahl	3,43	3,74	
	(2) etwas besser	Anzahl	13,30	6,95	
	(3) etwa gleich	Anzahl	43,35	42,25	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	30,47	36,36	
	(5) viel schlechter	Anzahl	9,44	10,70	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>		
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	236	155	
		Anteil in %	96,33	92,26	
		Anteil 2 in %*	47,20	49,05	
	(1) viel besser	Anzahl	3,39	3,23	
	(2) etwas besser	Anzahl	8,90	7,74	
	(3) etwa gleich	Anzahl	49,15	43,23	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	25,00	30,32	
	(5) viel schlechter	Anzahl	13,56	15,48	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>		
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	229	150	
		Anteil in %	97,45	89,29	
		Anteil 2 in %*	45,80	44,25	
	(1) viel besser	Anzahl	2,62	3,33	
	(2) etwas besser	Anzahl	9,17	11,33	
	(3) etwa gleich	Anzahl	46,72	37,33	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	28,38	32,00	
	(5) viel schlechter	Anzahl	13,10	16,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>		
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143	
		Anteil in %	44,49	42,81	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	219	133	
		Anteil in %	98,65	93,01	
		Anteil 2 in %*	43,89	39,82	
	(1) viel besser	Anzahl	1,37	0,75	
	(2) etwas besser	Anzahl	16,89	9,02	
	(3) etwa gleich	Anzahl	42,47	39,10	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	26,94	38,35	
	(5) viel schlechter	Anzahl	12,33	12,78	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>		

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,48	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	204	
		Anteil in %	96,23	
		Anteil 2 in %*	40,88	
	(1) viel besser	Anzahl	4,41	
	(2) etwas besser	Anzahl	11,27	
	(3) etwa gleich	Anzahl	46,57	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	27,45	
	(5) viel schlechter	Anzahl	10,29	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>		
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203	
		Anteil in %	40,60	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	196	
		Anteil in %	96,55	
		Anteil 2 in %*	39,20	
	(1) viel besser	Anzahl	5,10	
	(2) etwas besser	Anzahl	13,78	
	(3) etwa gleich	Anzahl	37,76	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	31,12	
	(5) viel schlechter	Anzahl	12,24	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>		
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,40	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	208	
		Anteil in %	98,11	
		Anteil 2 in %*	41,60	
	(1) viel besser	Anzahl	3,37	
	(2) etwas besser	Anzahl	8,17	
	(3) etwa gleich	Anzahl	34,13	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	37,50	
	(5) viel schlechter	Anzahl	16,83	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>		
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184	
		Anteil in %	36,80	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	174	
		Anteil in %	94,57	
		Anteil 2 in %*	34,80	
	(1) viel besser	Anzahl	4,02	
	(2) etwas besser	Anzahl	12,64	
	(3) etwa gleich	Anzahl	41,95	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	31,61	
	(5) viel schlechter	Anzahl	9,77	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>		

Tabelle 8.2 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 248 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 47,85.

215 Patienten sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 96,28 Prozent die Fragen zur körperlichen Funktionsfähigkeit beantwortet, so dass sie für die Skala auswertbar waren. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 46,00.

**Tabelle 8.2 SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	248	207	119
		Anteil in %	98,41	96,28	96,75
		Anteil 2 in %*	49,70	58,64	43,12
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,85	46,00	44,86
		SD	29,65	29,22	30,96
		CI	[44,16; 51,54]	[42,02; 49,98]	[39,30; 50,43]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,60	-1,68	-1,73
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	279	199	144
		Anteil in %	99,29	90,05	94,12
		Anteil 2 in %*	55,80	54,67	51,80
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,66	47,19	43,38
		SD	30,05	30,00	29,40
		CI	[45,14; 52,19]	[43,02; 51,35]	[38,58; 48,18]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,57	-1,63	-1,80
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	276	168	142
		Anteil in %	98,92	88,89	95,30
		Anteil 2 in %*	55,31	46,80	50,53
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,32	44,79	42,60
		SD	30,17	27,37	28,67
		CI	[44,76; 51,87]	[40,65; 48,93]	[37,88; 47,32]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,58	-1,74	-1,83
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>



EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	260	163	110
		Anteil in %	99,24	90,56	98,21
		Anteil 2 in %	52,00	46,70	38,19
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,88	46,73	47,83
		SD	30,02	30,70	30,69
		CI	[45,23; 52,53]	[42,02; 51,45]	[42,09; 53,56]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,56	-1,65	-1,60
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	für Skala auswertbar	Anzahl	239	190	
		Anteil in %	97,95	94,06	
		Anteil 2 in %	47,90	53,98	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,57	44,87	
		SD	29,19	28,66	
		CI	[43,87; 51,27]	[40,80; 48,95]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,61	-1,73	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	243	158	
		Anteil in %	99,18	94,05	
		Anteil 2 in %	48,60	50,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,32	50,56	
		SD	31,15	30,26	
		CI	[49,40; 57,23]	[45,84; 55,27]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,36	-1,48	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
	für Skala auswertbar	Anzahl	233	158	
		Anteil in %	99,15	94,05	
		Anteil 2 in %	46,60	46,61	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,44	45,05	
		SD	30,77	30,65	
		CI	[43,49; 51,39]	[40,27; 49,83]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,62	-1,72	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143	
		Anteil in %	44,49	42,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	221	134	
		Anteil in %	99,55	93,71	
		Anteil 2 in %	44,29	40,12	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,54	48,55	
		SD	30,18	29,96	
		CI	[44,56; 52,52]	[43,48; 53,63]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,57	-1,57	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>	
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,48		
	für Skala auswertbar	Anzahl	209		
		Anteil in %	98,58		
		Anteil 2 in %	41,88		
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,71		
		SD	31,79		
		CI	[44,40; 53,02]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,56		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>		
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203		
		Anteil in %	40,60		
	für Skala auswertbar	Anzahl	200		
		Anteil in %	98,52		
		Anteil 2 in %	40,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,63		
		SD	30,09		
		CI	[44,46; 52,80]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,57		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>		
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	207		
		Anteil in %	97,64		
		Anteil 2 in %	41,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,63		
		SD	31,27		
		CI	[39,37; 47,89]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,79		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184	
		Anteil in %	36,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	184	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	36,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,61	
		SD	29,47	
		CI	[46,35; 54,87]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,48	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>		

Tabelle 8.3 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 243 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Körperliche Rollenfunktion“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 30,66.

215 Patienten sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 93,49 Prozent alle Fragen zur körperlichen Rollenfunktion beantwortet und konnten daher für die Skala ausgewertet werden. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 32,84.

**Tabelle 8.3 SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	243	201	116
		Anteil in %	96,43	93,49	94,31
		Anteil 2 in %*	48,70	56,94	42,03
	transformierte Skalenwerte	Mean	30,66	32,84	34,48
		SD	41,49	40,59	42,05
		CI	[25,44; 35,88]	[27,22; 38,45]	[26,83; 42,13]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,50	-1,43	-1,38
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	267	192	145
		Anteil in %	95,02	86,88	94,77
		Anteil 2 in %*	53,40	52,75	52,16
	transformierte Skalenwerte	Mean	38,80	36,72	31,38
		SD	42,09	42,88	40,48
		CI	[33,75; 43,84]	[30,65; 42,78]	[24,79; 37,97]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,25	-1,32	-1,47
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	264	163	137
		Anteil in %	94,62	86,24	91,95
		Anteil 2 in %*	52,91	45,40	48,75
	transformierte Skalenwerte	Mean	34,28	26,43	27,80
		SD	42,09	37,09	39,96
		CI	[29,20; 39,36]	[20,74; 32,13]	[21,11; 34,49]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,39	-1,62	-1,58
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	253	160	108
		Anteil in %	96,56	88,89	96,43
		Anteil 2 in %	50,60	45,85	37,50
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,70	36,04	41,90
		SD	42,67	43,07	43,75
		CI	[36,44; 46,96]	[29,37; 42,72]	[33,65; 50,15]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,17	-1,34	-1,16
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	für Skala auswertbar	Anzahl	231	184	
		Anteil in %	94,67	91,09	
		Anteil 2 in %	46,29	52,27	
	transformierte Skalenwerte	Mean	33,12	35,55	
		SD	41,90	42,55	
		CI	[27,71; 38,52]	[29,41; 41,70]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,42	-1,35	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	236	150	
		Anteil in %	96,33	89,29	
		Anteil 2 in %	47,20	47,47	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,88	39,50	
		SD	44,67	42,40	
		CI	[42,18; 53,58]	[32,72; 46,29]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,99	-1,23	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
	für Skala auswertbar	Anzahl	226	153	
		Anteil in %	96,17	91,07	
		Anteil 2 in %	45,20	45,13	
	transformierte Skalenwerte	Mean	34,92	34,10	
		SD	42,20	41,11	
		CI	[29,42; 40,42]	[27,58; 40,61]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,37	-1,39	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143
		Anteil in %	44,49	42,81
	für Skala auswertbar	Anzahl	209	130
		Anteil in %	94,14	90,91
		Anteil 2 in %	41,88	38,92
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,71	36,35
		SD	43,35	41,83
		CI	[35,83; 47,58]	[29,16; 43,54]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,17	-1,33
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	206	
		Anteil in %	97,17	
		Anteil 2 in %	41,28	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,78	
		SD	44,42	
		CI	[31,72; 43,85]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,28	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203	
		Anteil in %	40,60	
	für Skala auswertbar	Anzahl	199	
		Anteil in %	98,03	
		Anteil 2 in %	39,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,59	
		SD	41,98	
		CI	[29,76; 41,43]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,35	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	195	
		Anteil in %	91,98	
		Anteil 2 in %	39,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	31,54	
		SD	40,92	
		CI	[25,80; 37,28]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,47	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184	
		Anteil in %	36,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	179	
		Anteil in %	97,28	
		Anteil 2 in %	35,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,92	
		SD	44,06	
		CI	[36,47; 49,38]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,13	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>		

Tabelle 8.4 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zu **Körperlichen Schmerzen**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 250 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Körperliche Schmerzen“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 46,05.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 96,28 Prozent alle Fragen zum Thema „Körperliche Schmerzen“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 45,64.

**Tabelle 8.4 SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	250	207	120
		Anteil in %	99,21	96,28	97,56
		Anteil 2 in %*	50,10	58,64	43,48
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,05	45,64	45,61
		SD	28,97	28,91	29,23
		CI	[42,46; 49,64]	[41,70; 49,58]	[40,38; 50,84]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,25	-1,27	-1,27
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	280	197	144
		Anteil in %	99,64	89,14	94,12
		Anteil 2 in %*	56,00	54,12	51,80
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,53	47,83	42,38
		SD	29,26	28,07	27,17
		CI	[44,10; 50,96]	[43,91; 51,75]	[37,94; 46,81]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,19	-1,17	-1,41
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	276	167	141
		Anteil in %	98,92	88,36	94,63
		Anteil 2 in %*	55,31	46,52	50,18
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,30	42,02	41,19
		SD	29,60	25,90	25,96
		CI	[42,81; 49,80]	[38,10; 45,95]	[36,91; 45,48]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,24	-1,42	-1,46
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>



EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	261	163	110
		Anteil in %	99,62	90,56	98,21
		Anteil 2 in %	52,20	46,70	38,19
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,57	44,31	45,57
		SD	29,01	27,53	28,63
		CI	[43,05; 50,09]	[40,08; 48,53]	[40,22; 50,92]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,23	-1,32	-1,27
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	für Skala auswertbar	Anzahl	239	192	
		Anteil in %	97,95	95,05	
		Anteil 2 in %	47,90	54,55	
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,89	43,16	
		SD	28,05	27,39	
		CI	[41,33; 48,44]	[39,28; 47,03]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,30	-1,37	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	243	160	
		Anteil in %	99,18	95,24	
		Anteil 2 in %	48,60	50,63	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,88	43,34	
		SD	30,13	28,33	
		CI	[45,09; 52,67]	[38,95; 47,73]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,13	-1,36	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
	für Skala auswertbar	Anzahl	234	158	
		Anteil in %	99,57	94,05	
		Anteil 2 in %	46,80	46,61	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,60	42,58	
		SD	29,45	28,96	
		CI	[41,82; 49,37]	[38,06; 47,09]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,27	-1,40	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143
		Anteil in %	44,49	42,81
	für Skala auswertbar	Anzahl	220	135
		Anteil in %	99,10	94,41
		Anteil 2 in %	44,09	40,42
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,53	42,71
		SD	27,43	26,95
		CI	[39,90; 47,15]	[38,16; 47,26]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,36	-1,39
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	211	
		Anteil in %	99,53	
		Anteil 2 in %	42,28	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,37	
		SD	29,44	
		CI	[43,40; 51,34]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,19	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203	
		Anteil in %	40,60	
	für Skala auswertbar	Anzahl	202	
		Anteil in %	99,51	
		Anteil 2 in %	40,40	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,85	
		SD	28,22	
		CI	[41,96; 49,74]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,26	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	210	
		Anteil in %	99,06	
		Anteil 2 in %	42,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	40,99	
		SD	28,60	
		CI	[37,12; 44,85]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,46	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184	
		Anteil in %	36,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	184	
		Anteil in %	100,00	
		Anteil 2 in %	36,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,86	
		SD	28,74	
		CI	[42,71; 51,01]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,22	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>		

Tabelle 8.5 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Allgemeinen Gesundheitswahrnehmung**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 243 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 43,08.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,81 Prozent alle Fragen zur allgemeinen Gesundheitswahrnehmung beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 43,00.

**Tabelle 8.5 SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-	Befragung nach	Befragung nach	
			halbjahr	5. Halbjahr	9. Halbjahr	
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123	
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57	
	für Skala auswertbar	Anzahl	243	206	115	
		Anteil in %	96,43	95,81	93,50	
		Anteil 2 in %*	48,70	58,36	41,67	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,08	43,00	44,63	
		SD	20,54	19,74	20,37	
		CI	[40,50; 45,66]	[40,30; 45,70]	[40,90; 48,35]	
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00	
		Range: Max.	93,75	97,00	96,25	
		z-Wert	-1,44	-1,45	-1,37	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153	
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04	
	für Skala auswertbar	Anzahl	271	195	144	
		Anteil in %	96,44	88,24	94,12	
		Anteil 2 in %*	54,20	53,57	51,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,90	46,83	43,18	
		SD	21,61	20,39	20,18	
		CI	[43,33; 48,48]	[43,97; 49,69]	[39,88; 46,47]	
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	92,00	92,00	
		z-Wert	-1,30	-1,26	-1,44	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149	
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02	
	für Skala auswertbar	Anzahl	267	165	139	
		Anteil in %	95,70	87,30	93,29	
		Anteil 2 in %*	53,51	45,96	49,47	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,26	44,39	43,46	
		SD	19,29	16,84	17,92	
		CI	[42,94; 47,57]	[41,82; 46,96]	[40,49; 46,44]	
		Range: Min.	5,00	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	97,00	97,00	
		z-Wert	-1,34	-1,38	-1,43	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	250	162	106
		Anteil in %	95,42	90,00	94,64
		Anteil 2 in %	50,00	46,42	36,81
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,92	44,97	44,26
		SD	20,28	20,92	20,04
		CI	[43,41; 48,44]	[41,75; 48,20]	[40,45; 48,08]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	97,00	97,00	97,00
		z-Wert	-1,30	-1,35	-1,39
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	für Skala auswertbar	Anzahl	235	188	
		Anteil in %	96,31	93,07	
		Anteil 2 in %	47,09	53,41	
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,19	42,17	
		SD	18,90	19,09	
		CI	[41,77; 46,61]	[39,44; 44,90]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	92,00	92,00	
		z-Wert	-1,39	-1,49	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	157	
		Anteil in %	98,78	93,45	
		Anteil 2 in %	48,40	49,68	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,84	45,29	
		SD	19,21	20,69	
		CI	[44,42; 49,26]	[42,05; 48,52]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	97,00	97,00	
		z-Wert	-1,26	-1,33	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
	für Skala auswertbar	Anzahl	227	156	
		Anteil in %	96,60	92,86	
		Anteil 2 in %	45,40	46,02	
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,56	46,30	
		SD	20,90	20,77	
		CI	[41,84; 47,28]	[43,04; 49,56]	
		Range: Min.	0,00	5,00	
		Range: Max.	100,00	97,00	
		z-Wert	-1,37	-1,28	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143
		Anteil in %	44,49	42,81
	für Skala auswertbar	Anzahl	217	132
		Anteil in %	97,75	92,31
		Anteil 2 in %	43,49	39,52
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,99	45,08
		SD	19,45	18,17
		CI	[42,40; 47,57]	[41,98; 48,18]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	97,00	93,75
		z-Wert	-1,35	-1,35
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	202	
		Anteil in %	95,28	
		Anteil 2 in %	40,48	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,13	
		SD	19,94	
		CI	[43,38; 48,88]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	92,00	
		z-Wert	-1,29	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203	
		Anteil in %	40,60	
	für Skala auswertbar	Anzahl	199	
		Anteil in %	98,03	
		Anteil 2 in %	39,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,06	
		SD	20,37	
		CI	[43,23; 48,89]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,30	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	209	
		Anteil in %	98,58	
		Anteil 2 in %	41,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	40,59	
		SD	20,06	
		CI	[37,87; 43,31]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	95,00	
		z-Wert	-1,57	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184	
		Anteil in %	36,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	182	
		Anteil in %	98,91	
		Anteil 2 in %	36,40	
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,57	
		SD	18,51	
		CI	[41,88; 47,26]	
		Range: Min.	5,00	
		Range: Max.	92,00	
		z-Wert	-1,37	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>	

Tabelle 8.6 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Vitalität**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 250 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Vitalität“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 40,01.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 96,28 Prozent alle Fragen zum Thema „Vitalität“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 39,34.

**Tabelle 8.6 SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
			Anzahl	Anzahl	Anzahl
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	250	207	120
		Anteil in %	99,21	96,28	97,56
		Anteil 2 in %*	50,10	58,64	43,48
	transformierte Skalenwerte	Mean	40,01	39,34	39,04
		SD	21,35	21,54	19,78
		CI	[37,36; 42,65]	[36,41; 42,27]	[35,50; 42,58]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	95,00	95,00	90,00
		z-Wert	-1,01	-1,04	-1,05
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	280	195	144
		Anteil in %	99,64	88,24	94,12
		Anteil 2 in %*	56,00	53,57	51,80
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,40	44,78	40,06
		SD	22,16	20,68	21,83
		CI	[40,81; 46,00]	[41,88; 47,68]	[36,49; 43,62]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	95,00	100,00
		z-Wert	-0,85	-0,78	-1,01
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	274	169	141
		Anteil in %	98,21	89,42	94,63
		Anteil 2 in %*	54,91	47,08	50,18
	transformierte Skalenwerte	Mean	39,98	39,03	39,75
		SD	21,58	19,30	21,15
		CI	[37,43; 42,54]	[36,12; 41,94]	[36,26; 43,24]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	90,00	100,00
		z-Wert	-1,01	-1,06	-1,02
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>



EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	257	162	110
		Anteil in %	98,09	90,00	98,21
		Anteil 2 in %	51,40	46,42	38,19
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,02	42,53	40,95
		SD	22,67	22,41	24,01
		CI	[38,25; 43,80]	[39,08; 45,98]	[36,47; 45,44]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	90,00	93,33	100,00
		z-Wert	-0,96	-0,89	-0,96
		<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>
	2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
für Skala auswertbar		Anzahl	240	191	
		Anteil in %	98,36	94,55	
		Anteil 2 in %	48,10	54,26	
transformierte Skalenwerte		Mean	39,95	40,57	
		SD	21,14	21,19	
		CI	[37,28; 42,63]	[37,56; 43,57]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,01	-0,98	
		<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>
2009-1		<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	160	
		Anteil in %	98,78	95,24	
		Anteil 2 in %	48,40	50,63	
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,73	41,69	
		SD	22,32	21,88	
		CI	[39,91; 45,54]	[38,30; 45,08]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	95,00	90,00	
		z-Wert	-0,88	-0,93	
		<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>
	2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
für Skala auswertbar		Anzahl	233	157	
		Anteil in %	99,15	93,45	
		Anteil 2 in %	46,60	46,31	
transformierte Skalenwerte		Mean	40,76	41,61	
		SD	22,76	22,56	
		CI	[37,84; 43,68]	[38,09; 45,14]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	90,00	
		z-Wert	-0,97	-0,93	
		<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143
		Anteil in %	44,49	42,81
	für Skala auswertbar	Anzahl	219	133
		Anteil in %	98,65	93,01
		Anteil 2 in %	43,89	39,82
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,93	42,89
		SD	21,65	21,58
		CI	[39,06; 44,79]	[39,23; 46,56]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,92	-0,87
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	210	
		Anteil in %	99,06	
		Anteil 2 in %	42,08	
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,38	
		SD	21,23	
		CI	[39,51; 45,25]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,89	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>	
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203	
		Anteil in %	40,60	
	für Skala auswertbar	Anzahl	200	
		Anteil in %	98,52	
		Anteil 2 in %	40,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,86	
		SD	23,54	
		CI	[38,60; 45,12]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	95,00	
		z-Wert	-0,92	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>	
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212	
		Anteil in %	42,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	209	
		Anteil in %	98,58	
		Anteil 2 in %	41,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,72	
		SD	23,27	
		CI	[34,56; 40,87]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,12	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>	

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184		
		Anteil in %	36,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	182		
		Anteil in %	98,91		
		Anteil 2 in %	36,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,39		
		SD	21,62		
		CI	[38,25; 44,53]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	90,00		
		z-Wert	-0,94		
		<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>	

Tabelle 8.7 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Sozialen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 250 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Soziale Funktionsfähigkeit“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 64,95.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 97,21 Prozent alle Fragen zur sozialen Funktionsfähigkeit beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 62,50.

**Tabelle 8.7 SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	250	209	120
		Anteil in %	99,21	97,21	97,56
		Anteil 2 in %*	50,10	59,21	43,48
	transformierte Skalenwerte	Mean	64,95	62,50	63,23
		SD	28,04	29,42	32,54
		CI	[61,47; 68,43]	[58,51; 66,49]	[57,41; 69,05]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,83	-0,94	-0,91
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	281	198	145
		Anteil in %	100,00	89,59	94,77
		Anteil 2 in %*	56,20	54,40	52,16
	transformierte Skalenwerte	Mean	67,13	68,24	58,28
		SD	29,41	28,12	29,47
		CI	[63,69; 70,56]	[64,33; 72,16]	[53,48; 63,07]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,74	-0,69	-1,13
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	275	168	141
		Anteil in %	98,57	88,89	94,63
		Anteil 2 in %*	55,11	46,80	50,18
	transformierte Skalenwerte	Mean	62,73	62,50	63,21
		SD	28,14	27,12	27,34
		CI	[59,40; 66,05]	[58,40; 66,60]	[58,70; 67,72]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,93	-0,94	-0,91
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	260	164	110
		Anteil in %	99,24	91,11	98,21
		Anteil 2 in %	52,00	46,99	38,19
	transformierte Skalenwerte	Mean	65,87	62,88	63,64
		SD	29,75	30,60	29,06
		CI	[62,25; 69,48]	[58,20; 67,56]	[58,21; 69,07]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,79	-0,93	-0,89
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
	2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
für Skala auswertbar		Anzahl	241	192	
		Anteil in %	98,77	95,05	
		Anteil 2 in %	48,30	54,55	
transformierte Skalenwerte		Mean	61,51	63,48	
		SD	28,06	28,86	
		CI	[57,97; 65,06]	[59,39; 67,56]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,99	-0,90	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1		<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	244	161	
		Anteil in %	99,59	95,83	
		Anteil 2 in %	48,80	50,95	
	transformierte Skalenwerte	Mean	65,73	62,81	
		SD	30,18	28,12	
		CI	[61,94; 69,51]	[58,47; 67,15]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,80	-0,93	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
	2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
für Skala auswertbar		Anzahl	233	158	
		Anteil in %	99,15	94,05	
		Anteil 2 in %	46,60	46,61	
transformierte Skalenwerte		Mean	61,21	61,55	
		SD	29,42	29,65	
		CI	[57,43; 64,99]	[56,93; 66,17]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,00	-0,99	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143	
		Anteil in %	44,49	42,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	221	135	
		Anteil in %	99,55	94,41	
		Anteil 2 in %	44,29	40,42	
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,24	60,83	
		SD	28,48	28,52	
		CI	[59,48; 66,99]	[56,02; 65,64]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,91	-1,02	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>	
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,48		
	für Skala auswertbar	Anzahl	211		
		Anteil in %	99,53		
		Anteil 2 in %	42,28		
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,74		
		SD	30,82		
		CI	[59,58; 67,90]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,89		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>		
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203		
		Anteil in %	40,60		
	für Skala auswertbar	Anzahl	200		
		Anteil in %	98,52		
		Anteil 2 in %	40,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,94		
		SD	27,49		
		CI	[60,13; 67,75]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,88		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>		
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	212		
		Anteil in %	100,00		
		Anteil 2 in %	42,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,49		
		SD	29,95		
		CI	[52,45; 60,52]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,21		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>		

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184	
		Anteil in %	36,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	183	
		Anteil in %	99,46	
		Anteil 2 in %	36,60	
	transformierte Skalenwerte	Mean	64,62	
		SD	29,36	
		CI	[60,36; 68,87]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,85	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>		

Tabelle 8.8 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Emotionalen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 241 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Emotionale Rollenfunktion“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 51,59.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 93,02 Prozent alle Fragen zum Thema „Emotionale Rollenfunktion“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 46,33.

**Tabelle 8.8 SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	241	200	111
		Anteil in %	95,63	93,02	90,24
		Anteil 2 in %*	48,30	56,66	40,22
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,59	46,33	42,94
		SD	47,71	46,64	45,70
		CI	[45,57; 57,61]	[39,87; 52,80]	[34,44; 51,45]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,90	-1,06	-1,16
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	264	187	144
		Anteil in %	93,95	84,62	94,12
		Anteil 2 in %*	52,80	51,37	51,80
	transformierte Skalenwerte	Mean	57,45	55,79	46,30
		SD	46,18	46,57	47,32
		CI	[51,88; 63,02]	[49,12; 62,47]	[38,57; 54,03]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,72	-0,77	-1,06
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	253	163	135
		Anteil in %	90,68	86,24	90,60
		Anteil 2 in %*	50,70	45,40	48,04
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,71	41,51	50,62
		SD	47,44	45,07	46,76
		CI	[45,87; 57,56]	[34,59; 48,43]	[42,73; 58,51]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,90	-1,20	-0,93
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>



EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	253	159	104
		Anteil in %	96,56	88,33	92,86
		Anteil 2 in %	50,60	45,56	36,11
	transformierte Skalenwerte	Mean	55,14	48,85	58,01
		SD	46,24	46,96	47,59
		CI	[49,44; 60,84]	[41,55; 56,15]	[48,87; 67,16]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,79	-0,98	-0,70
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	für Skala auswertbar	Anzahl	229	180	
		Anteil in %	93,85	89,11	
		Anteil 2 in %	45,89	51,14	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,94	50,65	
		SD	46,26	46,66	
		CI	[40,95; 52,93]	[43,83; 57,46]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,04	-0,93	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	235	147	
		Anteil in %	95,92	87,50	
		Anteil 2 in %	47,00	46,52	
	transformierte Skalenwerte	Mean	58,58	56,01	
		SD	46,49	46,49	
		CI	[52,64; 64,53]	[48,49; 63,52]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,69	-0,77	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
	für Skala auswertbar	Anzahl	223	151	
		Anteil in %	94,89	89,88	
		Anteil 2 in %	44,60	44,54	
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,66	49,45	
		SD	47,51	45,84	
		CI	[47,43; 59,90]	[42,14; 56,76]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,84	-0,96	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143	
		Anteil in %	44,49	42,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	208	126	
		Anteil in %	93,69	88,11	
		Anteil 2 in %	41,68	37,72	
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,92	52,25	
		SD	46,64	45,87	
		CI	[45,58; 58,26]	[44,24; 60,26]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,89	-0,88	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>	
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,48		
	für Skala auswertbar	Anzahl	200		
		Anteil in %	94,34		
		Anteil 2 in %	40,08		
	transformierte Skalenwerte	Mean	54,17		
		SD	46,36		
		CI	[47,74; 60,59]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,82		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>		
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203		
		Anteil in %	40,60		
	für Skala auswertbar	Anzahl	190		
		Anteil in %	93,60		
		Anteil 2 in %	38,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,33		
		SD	46,87		
		CI	[46,67; 60,00]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,85		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>		
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	185		
		Anteil in %	87,26		
		Anteil 2 in %	37,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,10		
		SD	46,49		
		CI	[42,40; 55,80]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,97		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>		

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184	
		Anteil in %	36,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	180	
		Anteil in %	97,83	
		Anteil 2 in %	36,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,15	
		SD	46,97	
		CI	[46,29; 60,01]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,85	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>		

Tabelle 8.9 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zum **psychischen Wohlbefinden**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 247 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Psychisches Wohlbefinden“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 56,93.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 96,28 Prozent alle Fragen zum psychischen Wohlbefinden beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 57,05.

**Tabelle 8.9 SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	247	207	119
		Anteil in %	98,02	96,28	96,75
		Anteil 2 in %*	49,50	58,64	43,12
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,93	57,05	57,25
		SD	23,01	23,63	21,90
		CI	[54,06; 59,80]	[53,83; 60,26]	[53,32; 61,19]
		Range: Min.	0,00	0,00	5,00
		Range: Max.	100,00	100,00	96,00
		z-Wert	-0,99	-0,99	-0,98
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	279	195	145
		Anteil in %	99,29	88,24	94,77
		Anteil 2 in %*	55,80	53,57	52,16
	transformierte Skalenwerte	Mean	59,69	61,73	55,74
		SD	21,94	21,75	23,09
		CI	[57,12; 62,27]	[58,68; 64,78]	[51,99; 59,50]
		Range: Min.	4,00	4,00	4,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,84	-0,73	-1,06
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	272	166	141
		Anteil in %	97,49	87,83	94,63
		Anteil 2 in %*	54,51	46,24	50,18
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,12	55,73	55,96
		SD	21,89	21,58	22,40
		CI	[53,52; 58,72]	[52,45; 59,02]	[52,26; 59,66]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,04	-1,06	-1,05
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	255	161	109
		Anteil in %	97,33	89,44	97,32
		Anteil 2 in %	51,00	46,13	37,85
	transformierte Skalenwerte	Mean	57,38	60,69	56,95
		SD	23,26	23,54	26,99
		CI	[54,52; 60,23]	[57,05; 64,33]	[51,89; 62,02]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,97	-0,79	-0,99
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
	2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
für Skala auswertbar		Anzahl	236	190	
		Anteil in %	96,72	94,06	
		Anteil 2 in %	47,29	53,98	
transformierte Skalenwerte		Mean	55,41	58,42	
		SD	21,69	22,81	
		CI	[52,64; 58,17]	[55,17; 61,66]	
		Range: Min.	0,00	4,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,08	-0,91	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1		<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	159	
		Anteil in %	98,78	94,64	
		Anteil 2 in %	48,40	50,32	
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,63	55,95	
		SD	22,47	22,12	
		CI	[53,80; 59,46]	[52,51; 59,39]	
		Range: Min.	0,00	5,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,01	-1,05	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
	2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
für Skala auswertbar		Anzahl	231	157	
		Anteil in %	98,30	93,45	
		Anteil 2 in %	46,20	46,31	
transformierte Skalenwerte		Mean	55,30	56,55	
		SD	23,63	22,25	
		CI	[52,25; 58,34]	[53,07; 60,03]	
		Range: Min.	0,00	8,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,09	-1,02	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143	
		Anteil in %	44,49	42,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	219	133	
		Anteil in %	98,65	93,01	
		Anteil 2 in %	43,89	39,82	
	transformierte Skalenwerte	Mean	57,98	57,26	
		SD	22,51	21,74	
		CI	[55,00; 60,96]	[53,56; 60,95]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,94	-0,98	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>	
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,48		
	für Skala auswertbar	Anzahl	208		
		Anteil in %	98,11		
		Anteil 2 in %	41,68		
	transformierte Skalenwerte	Mean	58,11		
		SD	22,56		
		CI	[55,05; 61,18]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,93		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>		
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203		
		Anteil in %	40,60		
	für Skala auswertbar	Anzahl	201		
		Anteil in %	99,01		
		Anteil 2 in %	40,20		
	transformierte Skalenwerte	Mean	58,67		
		SD	20,73		
		CI	[55,81; 61,54]		
		Range: Min.	8,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,90		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>		
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	208		
		Anteil in %	98,11		
		Anteil 2 in %	41,60		
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,46		
		SD	23,83		
		CI	[49,22; 55,70]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,24		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>		

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184		
		Anteil in %	36,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	182		
		Anteil in %	98,91		
		Anteil 2 in %	36,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,93		
		SD	22,28		
		CI	[53,69; 60,17]		
		Range: Min.	4,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,99		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>		

Tabelle 8.10 gibt Auskunft über die **körperliche Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 232 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der „Körperlichen Summenskala“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 34,07.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 92,09 Prozent alle nötigen Fragen, die „Körperliche Summenskala“ betreffend beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 34,52.

**Tabelle 8.10 Körperliche Summenskala**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
			Anzahl	Anzahl	Anzahl	
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		499	353	276	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123	
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57	
	für Skala auswertbar	Anzahl	232	198	109	
		Anteil in %	92,06	92,09	88,62	
		Anteil 2 in %*	46,49	56,09	39,49	
	transformierte Skalenwerte	Mean	34,07	34,52	35,11	
		SD	11,31	10,89	11,81	
		CI	[32,61; 35,52]	[33,00; 36,04]	[32,90; 37,33]	
		Range: Min.	6,93	12,54	16,81	
		Range: Max.	60,40	63,97	61,04	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>
	2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		500	364	278
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	281	221	153	
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04	
für Skala auswertbar		Anzahl	254	177	140	
		Anteil in %	90,39	80,09	91,50	
		Anteil 2 in %*	50,80	48,63	50,36	
transformierte Skalenwerte		Mean	35,43	34,75	33,56	
		SD	11,29	11,37	10,84	
		CI	[34,04; 36,82]	[33,07; 36,42]	[31,77; 35,36]	
		Range: Min.	14,22	11,40	8,29	
		Range: Max.	59,90	56,15	56,08	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>	
2007-2		<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149	
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02	
	für Skala auswertbar	Anzahl	246	158	132	
		Anteil in %	88,17	83,60	88,59	
		Anteil 2 in %*	49,30	44,01	46,98	
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,71	33,71	32,90	
		SD	11,76	10,28	10,95	
		CI	[34,24; 37,18]	[32,11; 35,32]	[31,04; 34,77]	
		Range: Min.	12,93	11,68	13,58	
		Range: Max.	63,45	63,20	58,69	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>



EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	237	156	101
		Anteil in %	90,46	86,67	90,18
		Anteil 2 in %	47,40	44,70	35,07
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,16	34,15	35,69
		SD	11,42	11,04	10,65
		CI	[34,70; 37,61]	[32,41; 35,88]	[33,62; 37,77]
		Range: Min.	11,80	15,20	16,79
		Range: Max.	60,63	57,36	59,88
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>
	2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
für Skala auswertbar		Anzahl	223	177	
		Anteil in %	91,39	87,62	
		Anteil 2 in %	44,69	50,28	
transformierte Skalenwerte		Mean	34,77	33,63	
		SD	11,26	11,16	
		CI	[33,29; 36,25]	[31,99; 35,28]	
		Range: Min.	10,77	12,50	
		Range: Max.	66,65	61,54	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>	
2009-1		<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	226	142	
		Anteil in %	92,24	84,52	
		Anteil 2 in %	45,20	44,94	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,85	35,81	
		SD	11,86	11,40	
		CI	[36,30; 39,39]	[33,93; 37,68]	
		Range: Min.	11,71	12,58	
		Range: Max.	62,75	60,10	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
	2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
für Skala auswertbar		Anzahl	214	146	
		Anteil in %	91,06	86,90	
		Anteil 2 in %	42,80	43,07	
transformierte Skalenwerte		Mean	34,79	34,40	
		SD	11,67	11,84	
		CI	[33,22; 36,35]	[32,48; 36,32]	
		Range: Min.	13,18	12,48	
		Range: Max.	58,31	59,68	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143	
		Anteil in %	44,49	42,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	204	124	
		Anteil in %	91,89	86,71	
		Anteil 2 in %*	40,88	37,13	
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,56	35,27	
		SD	11,09	11,44	
		CI	[34,04; 37,08]	[33,26; 37,29]	
		Range: Min.	12,63	11,60	
Range: Max.		60,93	59,67		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>		
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,48		
	für Skala auswertbar	Anzahl	192		
		Anteil in %	90,57		
		Anteil 2 in %*	38,48		
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,77		
		SD	11,66		
		CI	[34,12; 37,42]		
		Range: Min.	12,04		
Range: Max.		61,04			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>			
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203		
		Anteil in %	40,60		
	für Skala auswertbar	Anzahl	185		
		Anteil in %	91,13		
		Anteil 2 in %*	37,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,42		
		SD	11,47		
		CI	[33,76; 37,07]		
		Range: Min.	12,16		
Range: Max.		60,75			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>			
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	179		
		Anteil in %	84,43		
		Anteil 2 in %*	35,80		
	transformierte Skalenwerte	Mean	33,64		
		SD	11,32		
		CI	[31,98; 35,30]		
		Range: Min.	8,83		
Range: Max.		58,03			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>			

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184		
		Anteil in %	36,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	175		
		Anteil in %	95,11		
		Anteil 2 in %	35,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,52		
		SD	11,22		
		CI	[34,85; 38,18]		
		Range: Min.	11,83		
		Range: Max.	59,35		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>			

Tabelle 8.11 gibt Auskunft über die **psychische Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (besten Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 232 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der „Psychischen Summenskala“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 43,73.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 92,09 Prozent alle notwendigen Fragen für die Auswertung der „Psychische Summenskala“ beantwortet. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 42,82.

**Tabelle 8.11 Psychische Summenskala**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57
	für Skala auswertbar	Anzahl	232	198	109
		Anteil in %	92,06	92,09	88,62
		Anteil 2 in %*	46,49	56,09	39,49
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,73	42,82	42,92
		SD	12,22	12,82	11,63
		CI	[42,16; 45,31]	[41,03; 44,60]	[40,74; 45,10]
		Range: Min.	16,86	15,05	17,74
		Range: Max.	64,76	69,69	66,09
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11768</i>	<i>8176</i>	<i>6346</i>	
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04
	für Skala auswertbar	Anzahl	254	177	140
		Anteil in %	90,39	80,09	91,50
		Anteil 2 in %*	50,80	48,63	50,36
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,74	46,24	42,42
		SD	12,12	11,44	12,67
		CI	[44,25; 47,23]	[44,55; 47,92]	[40,33; 44,52]
		Range: Min.	13,87	19,25	12,46
		Range: Max.	69,09	77,62	69,68
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13105</i>	<i>9300</i>	<i>7269</i>	
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	246	158	132
		Anteil in %	88,17	83,60	88,59
		Anteil 2 in %*	49,30	44,01	46,98
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,21	42,44	44,16
		SD	12,30	12,03	12,55
		CI	[41,67; 44,75]	[40,57; 44,32]	[42,02; 46,30]
		Range: Min.	11,76	20,98	17,93
		Range: Max.	67,42	67,05	68,57
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>	

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	237	156	101
		Anteil in %	90,46	86,67	90,18
		Anteil 2 in %	47,40	44,70	35,07
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,23	44,45	44,39
		SD	12,89	12,52	13,81
		CI	[42,59; 45,87]	[42,49; 46,42]	[41,70; 47,08]
		Range: Min.	13,95	15,56	13,70
		Range: Max.	69,37	69,44	65,08
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>	
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	für Skala auswertbar	Anzahl	223	177	
		Anteil in %	91,39	87,62	
		Anteil 2 in %	44,69	50,28	
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,41	43,89	
		SD	12,32	12,82	
		CI	[40,79; 44,03]	[42,01; 45,78]	
		Range: Min.	10,38	15,71	
		Range: Max.	65,84	67,27	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>		
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	316	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	245	168	
		Anteil in %	49,00	53,16	
	für Skala auswertbar	Anzahl	226	142	
		Anteil in %	92,24	84,52	
		Anteil 2 in %	45,20	44,94	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,83	43,91	
		SD	12,20	12,18	
		CI	[42,24; 45,42]	[41,91; 45,91]	
		Range: Min.	6,98	19,37	
		Range: Max.	65,52	65,94	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>		
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	339	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	235	168	
		Anteil in %	47,00	49,56	
	für Skala auswertbar	Anzahl	214	146	
		Anteil in %	91,06	86,90	
		Anteil 2 in %	42,80	43,07	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,31	43,62	
		SD	12,47	11,97	
		CI	[41,64; 44,98]	[41,68; 45,56]	
		Range: Min.	17,79	18,94	
		Range: Max.	67,00	68,52	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>		

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	334	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	143	
		Anteil in %	44,49	42,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	204	124	
		Anteil in %	91,89	86,71	
		Anteil 2 in %*	40,88	37,13	
	transformierte Skalenwerte	Mean	43,78	43,48	
		SD	12,14	12,16	
		CI	[42,12; 45,45]	[41,34; 45,62]	
		Range: Min.	16,22	14,98	
Range: Max.		69,54	67,64		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>		
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,48		
	für Skala auswertbar	Anzahl	192		
		Anteil in %	90,57		
		Anteil 2 in %*	38,48		
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,52		
		SD	12,54		
		CI	[42,74; 46,29]		
		Range: Min.	13,08		
Range: Max.		67,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>			
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203		
		Anteil in %	40,60		
	für Skala auswertbar	Anzahl	185		
		Anteil in %	91,13		
		Anteil 2 in %*	37,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,36		
		SD	11,63		
		CI	[42,69; 46,04]		
		Range: Min.	16,04		
Range: Max.		69,36			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>			
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	179		
		Anteil in %	84,43		
		Anteil 2 in %*	35,80		
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,72		
		SD	12,69		
		CI	[39,86; 43,57]		
		Range: Min.	15,34		
Range: Max.		66,45			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>			

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184		
		Anteil in %	36,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	175		
		Anteil in %	95,11		
		Anteil 2 in %	35,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,91		
		SD	11,97		
		CI	[41,14; 44,69]		
		Range: Min.	17,68		
		Range: Max.	63,03		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>			

Tabelle 8.12 gibt Auskunft über den **SF-6D-Gesamtindex**. Der SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) ist ein krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität in Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand) bis „1“ (bestmöglicher Gesundheitszustand). Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung des SF-6D-Gesamtindex herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Indexwert. Darüber hinaus wird ausgewiesen, wie groß die Differenz zwischen der aktuellen Befragung und der ersten Befragung nach dem Beitrittsjahr auf patientenindividueller Ebene im Durchschnitt ist.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 499 Patienten. 252 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 231 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung des „SF-6D-Gesamtindex“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Indexwert bei 0,61.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 215 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 87,91 Prozent alle nötigen Fragen zur Ermittlung des „SF-6D-Gesamtindex“ beantwortet und wurden so für die Auswertung des Index berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 0,60.

**Tabelle 8.12 SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse**

\* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	499	353	276
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	252	215	123	
		Anteil in %	50,50	60,91	44,57	
	für Skala auswertbar	Anzahl	231	189	114	
		Anteil in %	91,67	87,91	92,68	
		Anteil 2 in %	46,29	53,54	41,30	
	Indexwert	Mean	0,61	0,60	0,61	
		SD	0,15	0,15	0,15	
		CI	[0,60; 0,63]	[0,58; 0,62]	[0,58; 0,64]	
		Range: Min.	0,30	0,30	0,32	
		Range: Max.	1,00	1,00	0,93	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,04	-0,03	
		CI		[-0,06; -0,02]	[-0,06; -0,01]	
		Fallbasis		124	75	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	11768	8176	6346	
2007-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	500	364	278
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	281	221	153	
		Anteil in %	56,20	60,71	55,04	
	für Skala auswertbar	Anzahl	262	181	139	
		Anteil in %	93,24	81,90	90,85	
		Anteil 2 in %	52,40	49,73	50,00	
	Indexwert	Mean	0,63	0,63	0,59	
		SD	0,16	0,15	0,15	
		CI	[0,61; 0,65]	[0,61; 0,65]	[0,57; 0,62]	
		Range: Min.	0,30	0,30	0,30	
		Range: Max.	1,00	0,97	0,93	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,02	-0,05	
		CI		[-0,05; 0,00]	[-0,07; -0,03]	
		Fallbasis		131	104	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	13105	9300	7269	



EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2007-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	359	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	279	189	149
		Anteil in %	55,91	52,65	53,02
	für Skala auswertbar	Anzahl	250	154	134
		Anteil in %	89,61	81,48	89,93
		Anteil 2 in %	50,10	42,90	47,69
	Indexwert	Mean	0,61	0,60	0,60
		SD	0,15	0,13	0,13
		CI	[0,59; 0,62]	[0,58; 0,62]	[0,58; 0,62]
		Range: Min.	0,30	0,32	0,30
		Range: Max.	1,00	0,97	0,95
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,03	-0,03
		CI		[-0,05; 0,00]	[-0,05; 0,00]
		Fallbasis		108	96
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11332</i>	<i>7877</i>	<i>6217</i>	
2008-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500	349	288
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	262	180	112
		Anteil in %	52,40	51,58	38,89
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	156	106
		Anteil in %	92,37	86,67	94,64
		Anteil 2 in %	48,40	44,70	36,81
	Indexwert	Mean	0,62	0,62	0,63
		SD	0,15	0,15	0,16
		CI	[0,60; 0,64]	[0,59; 0,64]	[0,60; 0,66]
		Range: Min.	0,30	0,30	0,30
		Range: Max.	1,00	1,00	0,96
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,03	-0,03
		CI		[-0,05; -0,01]	[-0,05; -0,01]
		Fallbasis		109	76
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10692</i>	<i>7281</i>	<i>5839</i>	
2008-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499	352	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	202	
		Anteil in %	48,90	57,39	
	für Skala auswertbar	Anzahl	221	177	
		Anteil in %	90,57	87,62	
		Anteil 2 in %	44,29	50,28	
	Indexwert	Mean	0,60	0,61	
		SD	0,14	0,15	
		CI	[0,59; 0,62]	[0,59; 0,63]	
		Range: Min.	0,30	0,32	
		Range: Max.	1,00	1,00	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,00	
		CI		[-0,02; 0,01]	
		Fallbasis		109	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6867</i>	<i>4661</i>		

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	500	316
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	245	168
			Anteil in %	49,00	53,16
	für Skala auswertbar		Anzahl	227	145
			Anteil in %	92,65	86,31
			Anteil 2 in %	45,40	45,89
	Indexwert		Mean	0,63	0,61
			SD	0,15	0,15
			CI	[0,61; 0,65]	[0,59; 0,63]
			Range: Min.	0,30	0,30
			Range: Max.	0,96	1,00
			Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,04
			CI		[-0,06; -0,01]
			Fallbasis		107
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>9390</i>	<i>6202</i>	
2009-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	500	339
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	235	168
			Anteil in %	47,00	49,56
	für Skala auswertbar		Anzahl	217	151
			Anteil in %	92,34	89,88
			Anteil 2 in %	43,40	44,54
	Indexwert		Mean	0,60	0,60
			SD	0,16	0,15
			CI	[0,58; 0,62]	[0,57; 0,62]
			Range: Min.	0,30	0,30
			Range: Max.	0,97	1,00
			Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,03
			CI		[-0,05; 0,00]
			Fallbasis		96
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>7490</i>	<i>5082</i>	
2010-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>		Anzahl	499	334
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	222	143
			Anteil in %	44,49	42,81
	für Skala auswertbar		Anzahl	199	128
			Anteil in %	89,64	89,51
			Anteil 2 in %	39,88	38,32
	Indexwert		Mean	0,61	0,60
			SD	0,14	0,15
			CI	[0,59; 0,63]	[0,57; 0,62]
			Range: Min.	0,30	0,30
			Range: Max.	0,97	0,97
			Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,03
			CI		[-0,05; -0,01]
			Fallbasis		88
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>8737</i>	<i>5942</i>	

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	499		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,48		
	für Skala auswertbar	Anzahl	195		
		Anteil in %	91,98		
		Anteil 2 in %	39,08		
	Indexwert	Mean	0,62		
		SD	0,15		
		CI	[0,60; 0,64]		
		Range: Min.	0,30		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8103</i>			
2011-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	203		
		Anteil in %	40,60		
	für Skala auswertbar	Anzahl	188		
		Anteil in %	92,61		
		Anteil 2 in %	37,60		
	Indexwert	Mean	0,61		
		SD	0,15		
		CI	[0,59; 0,64]		
		Range: Min.	0,32		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8627</i>			
2011-2	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	212		
		Anteil in %	42,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	184		
		Anteil in %	86,79		
		Anteil 2 in %	36,80		
	Indexwert	Mean	0,59		
		SD	0,15		
		CI	[0,56; 0,61]		
		Range: Min.	0,30		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7608</i>			

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	<b>Stichprobenmitglieder (brutto)</b>	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	184		
		Anteil in %	36,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	172		
		Anteil in %	93,48		
		Anteil 2 in %	34,40		
	Indexwert	Mean	0,62		
		SD	0,15		
		CI	[0,59; 0,64]		
		Range: Min.	0,30		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7836</i>			

## Anhang A: Auswertung für Patienten ohne Endpunkte

Im Hauptteil des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden in den Auswertungskapiteln 1 und 2 unter anderem tabellarische Auswertungen zu den Patientenzahlen und -merkmalen sowie zu Raucherstatus, Hypertonus und HbA1c-Werten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf die Gesamtheit der Patienten. Im folgenden Anhang A werden diese Auswertungen nochmals für die Subkohorte der **Patienten ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation vorgenommen. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen im Hauptteil und im Anhang zu erleichtern, wurden die Auswertungskapitel und Tabellen im Anhang analog zu zum Hauptteil nummeriert. Da das Auswertungskapitel 2 im Anhang entfällt, folgt auf das Auswertungskapitel A.1 direkt das Auswertungskapitel A.3. Vergleichbares gilt für die Tabellen; deren Nummerierung ist im Anhang daher nicht fortlaufend.

Die Subkohorten werden gebildet, indem die Patienten jeder Kohorte nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei Gruppen unterteilt werden. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen, verursacht durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage, letztlich bedingt durch Mikro-Gefäßkrankungen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, erheblich auffälliger Fußstatus (Stadium 2 bis Stadium 5 nach Wagner ODER Stadium C bis D nach Armstrong), periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten ohne Endpunkte sind Patienten, die nicht den Subkohorten 2 oder 3 zuzuordnen sind. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht.

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

**Auswertungskapitel A.1: Patientenzahlen und -merkmale**

In den folgenden vier Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle A.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt - - Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren - - Männer und - - Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch - - Teilnehmer im Programm, - - Männer und - - Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	männlich	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	weiblich	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	3307	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891		
	männlich	Anzahl	1473	1210	1039	895	758	688	617	577	560	539	527	511	487	465	449	440	427	410		
		Anteil in %	44,54	44,21	44,31	44,33	43,97	44,94	44,65	45,04	45,12	44,88	45,27	45,30	45,05	45,37	45,22	45,83	45,82	46,02		
	weiblich	Anzahl	1834	1527	1306	1124	966	843	765	704	681	662	637	617	594	560	544	520	505	481		
		Anteil in %	55,46	55,79	55,69	55,67	56,03	55,06	55,35	54,96	54,88	55,12	54,73	54,70	54,95	54,63	54,78	54,17	54,18	53,98		
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8312	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470			
	männlich	Anzahl	3653	3101	2599	2201	1983	1784	1619	1543	1490	1433	1383	1318	1276	1235	1186	1149	1105			
		Anteil in %	43,95	44,21	44,27	44,05	43,93	43,97	43,93	43,97	43,98	43,65	43,89	43,79	43,98	43,90	44,15	44,69	44,74			
	weiblich	Anzahl	4659	3913	3272	2796	2531	2273	2066	1966	1898	1850	1768	1692	1625	1578	1500	1422	1365			
		Anteil in %	56,05	55,79	55,73	55,95	56,07	56,03	56,07	56,03	56,02	56,35	56,11	56,21	56,02	56,10	55,85	55,31	55,26			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207				
	männlich	Anzahl	4441	3766	3147	2737	2399	2171	2083	2002	1900	1819	1735	1663	1605	1546	1494	1440				
		Anteil in %	45,15	45,05	44,70	44,44	44,35	43,92	43,96	44,23	44,08	44,15	44,27	44,36	44,53	44,50	44,56	44,90				
	weiblich	Anzahl	5396	4594	3894	3422	3010	2772	2655	2524	2410	2301	2184	2086	1999	1928	1859	1767				
		Anteil in %	54,85	54,95	55,30	55,56	55,65	56,08	56,04	55,77	55,92	55,85	55,73	55,64	55,47	55,50	55,44	55,10				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976					
	männlich	Anzahl	3563	3001	2596	2202	1989	1862	1782	1691	1608	1528	1464	1409	1346	1295	1247					
		Anteil in %	44,44	43,76	43,48	42,90	42,92	42,68	42,73	42,52	42,33	42,28	42,08	42,01	41,72	41,90	41,90					
	weiblich	Anzahl	4455	3857	3374	2931	2645	2501	2388	2286	2191	2086	2015	1945	1880	1796	1729					
		Anteil in %	55,56	56,24	56,52	57,10	57,08	57,32	57,27	57,48	57,67	57,72	57,92	57,99	58,28	58,10	58,10					
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9648	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980						
	männlich	Anzahl	4460	3904	3342	2948	2734	2573	2436	2302	2168	2074	1990	1911	1833	1757						
		Anteil in %	46,23	45,86	45,38	45,21	44,72	44,57	44,50	44,29	44,28	44,26	44,26	44,24	44,17	44,15						
	weiblich	Anzahl	5188	4608	4023	3573	3380	3200	3038	2895	2728	2612	2506	2409	2317	2223						
		Anteil in %	53,77	54,14	54,62	54,79	55,28	55,43	55,50	55,71	55,72	55,74	55,74	55,74	55,76	55,83	55,85					
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9210	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027							
	männlich	Anzahl	4211	3547	3085	2833	2669	2523	2392	2230	2107	2012	1917	1830	1757							
		Anteil in %	45,72	45,20	44,96	44,59	44,45	44,45	44,44	44,15	43,88	43,77	43,70	43,68	43,63							
	weiblich	Anzahl	4999	4301	3776	3520	3335	3153	2991	2821	2695	2585	2470	2360	2270							
		Anteil in %	54,28	54,80	55,04	55,41	55,55	55,55	55,56	55,85	56,12	56,23	56,30	56,32	56,37							
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8313	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114								
	männlich	Anzahl	3914	3455	3125	2912	2734	2569	2408	2269	2167	2056	1965	1881								
		Anteil in %	47,08	46,99	46,75	46,64	46,39	46,15	46,29	46,08	46,22	45,97	45,68	45,72								
	weiblich	Anzahl	4399	3897	3559	3331	3160	2998	2794	2655	2521	2416	2337	2233								
		Anteil in %	52,92	53,01	53,25	53,36	53,61	53,85	53,71	53,92	53,78	54,03	54,32	54,28								
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9461	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999									
	männlich	Anzahl	4394	3924	3584	3290	3071	2864	2709	2581	2476	2362	2254									
		Anteil in %	46,44	46,23	45,93	45,47	45,18	45,22	45,09	45,15	45,18	45,12	45,09									
	weiblich	Anzahl	5067	4564	4220	3945	3727	3470	3299	3135	3004	2873	2745									
		Anteil in %	53,56	53,77	54,07	54,53	54,82	54,78	54,91	54,85	54,82	54,88	54,91									

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr			
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8389	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562												
	männlich	Anzahl	3895	3512	3229	2963	2735	2592	2452	2330	2212	2093												
		Anteil in %	46,43	46,13	46,08	45,82	45,87	45,97	45,94	45,99	45,99	45,97	45,88											
	weiblich	Anzahl	4494	4101	3778	3504	3228	3047	2885	2736	2600	2469												
		Anteil in %	53,57	53,87	53,92	54,18	54,13	54,03	54,06	54,01	54,01	54,03	54,12											
	2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7991	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526												
männlich		Anzahl	3803	3361	3064	2761	2567	2424	2276	2158	2053													
		Anteil in %	47,59	47,15	46,91	46,68	46,33	46,13	45,70	45,44	45,36													
weiblich		Anzahl	4188	3768	3467	3154	2974	2831	2704	2591	2473													
		Anteil in %	52,41	52,85	53,09	53,32	53,67	53,87	54,30	54,56	54,64													
2008-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	5478	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184													
	männlich	Anzahl	2559	2254	2005	1830	1726	1633	1554	1476														
		Anteil in %	46,71	46,37	46,29	45,99	46,13	46,38	46,32	46,36														
	weiblich	Anzahl	2919	2607	2326	2149	2016	1888	1801	1708														
		Anteil in %	53,29	53,63	53,71	54,01	53,87	53,62	53,68	53,68	53,64													
	2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7410	6403	5754	5274	4921	4642	4377														
männlich		Anzahl	3651	3140	2795	2548	2370	2225	2100															
		Anteil in %	49,27	49,04	48,57	48,31	48,16	47,93	47,98															
weiblich		Anzahl	3759	3263	2959	2726	2551	2417	2277															
		Anteil in %	50,73	50,96	51,43	51,69	51,84	52,07	52,02															
2009-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6033	5345	4842	4441	4119	3868															
	männlich	Anzahl	2860	2500	2248	2062	1918	1803																
		Anteil in %	47,41	46,77	46,43	46,43	46,56	46,61																
	weiblich	Anzahl	3173	2845	2594	2379	2201	2065																
		Anteil in %	52,59	53,23	53,57	53,57	53,44	53,39																
	2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7135	6329	5760	5285	4909																
männlich		Anzahl	3435	3009	2717	2470	2283																	
		Anteil in %	48,14	47,54	47,17	46,74	46,51																	
weiblich		Anzahl	3700	3320	3043	2815	2626																	
		Anteil in %	51,86	52,46	52,83	53,26	53,49																	
2010-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6587	5883	5295	4850																	
	männlich	Anzahl	3114	2758	2461	2233																		
		Anteil in %	47,27	46,88	46,48	46,04																		
	weiblich	Anzahl	3473	3125	2834	2617																		
		Anteil in %	52,73	53,12	53,52	53,96																		
	2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7063	6259	5666																		
männlich		Anzahl	3361	2960	2668																			
		Anteil in %	47,59	47,29	47,09																			
weiblich		Anzahl	3702	3299	2998																			
		Anteil in %	52,41	52,71	52,91																			
2011-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6247	5493																			
	männlich	Anzahl	2953	2565																				
		Anteil in %	47,27	46,70																				
	weiblich	Anzahl	3294	2928																				
		Anteil in %	52,73	53,30																				
	2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6485																				
männlich		Anzahl	3147																					
		Anteil in %	48,53																					
weiblich		Anzahl	3338																					
		Anteil in %	51,47																					

Tabelle A.1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit -- Teilnehmern. -- von ihnen bzw. -- Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte**

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	570	962	1288	1583	1776	1925	2026	2066	2106	2143	2179	2226	2282	2314	2347	2375	2416	2462		
		Anteil in %	17,24	29,09	38,95	47,87	53,70	58,21	61,26	62,47	63,68	64,80	65,89	67,31	69,01	69,97	70,97	71,82	73,06	74,45		
		CI Anteil in %	[15,95; 18,52]	[27,54; 30,64]	[37,29; 40,61]	[46,17; 49,57]	[52,00; 55,40]	[56,53; 59,89]	[59,60; 62,92]	[60,82; 64,12]	[62,04; 65,32]	[63,17; 66,43]	[64,27; 67,51]	[65,71; 68,91]	[67,43; 70,58]	[68,41; 71,54]	[69,42; 72,52]	[70,28; 73,35]	[71,54; 74,57]	[72,96; 75,93]		
	davon wegen Tod	Anzahl	8	29	54	81	102	117	127	135	154	165	183	207	234	249	264	281	302	329		
		Anteil in %	0,24	0,88	1,63	2,45	3,08	3,54	3,84	4,08	4,66	4,99	5,53	6,26	7,08	7,53	7,98	8,50	9,13	9,95		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	535	887	1160	1416	1564	1692	1774	1798	1808	1829	1846	1865	1892	1905	1920	1929	1947	1964		
		Anteil in %	16,18	26,82	35,08	42,82	47,29	51,16	53,64	54,37	54,67	55,31	55,82	56,40	57,21	57,61	58,06	58,33	58,88	59,39		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	5	9	17	25	35	41	50	55	62	66	67	70	72	74	76	77	79	80		
		Anteil in %	0,15	0,27	0,51	0,76	1,06	1,24	1,51	1,66	1,87	2,00	2,03	2,12	2,18	2,24	2,30	2,33	2,39	2,42		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	22	37	57	61	75	75	75	78	82	83	83	84	84	86	87	88	88	89		
Anteil in %		0,67	1,12	1,72	1,84	2,27	2,27	2,27	2,36	2,48	2,51	2,51	2,54	2,54	2,60	2,63	2,66	2,66	2,69			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3307	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891	845		
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1298	2441	3315	3798	4255	4627	4803	4924	5029	5161	5302	5411	5499	5626	5741	5842	5951			
		Anteil in %	15,62	29,37	39,88	45,69	51,19	55,67	57,78	59,24	60,50	62,09	63,79	65,10	66,16	67,69	69,07	70,28	71,60			
		CI Anteil in %	[14,84; 16,40]	[28,39; 30,35]	[38,83; 40,93]	[44,62; 46,76]	[50,12; 52,27]	[54,60; 56,73]	[56,72; 58,85]	[58,18; 60,30]	[59,45; 61,55]	[61,05; 63,13]	[62,75; 64,82]	[64,07; 66,12]	[65,14; 67,17]	[66,68; 68,69]	[68,08; 70,06]	[69,30; 71,27]	[70,63; 72,56]			
	davon wegen Tod	Anzahl	24	80	132	176	229	277	320	360	398	452	513	551	595	653	707	753	808			
		Anteil in %	0,29	0,96	1,59	2,12	2,76	3,33	3,85	4,33	4,79	5,44	6,17	6,63	7,16	7,86	8,51	9,06	9,72			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1219	2243	3025	3431	3798	4097	4193	4255	4312	4376	4450	4513	4554	4615	4672	4717	4762			
		Anteil in %	14,67	26,99	36,39	41,28	45,69	49,29	50,45	51,19	51,88	52,65	53,54	54,29	54,79	55,52	56,21	56,75	57,29			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	9	36	51	66	101	126	161	179	188	197	201	208	210	217	220	224	230			
		Anteil in %	0,11	0,43	0,61	0,79	1,22	1,52	1,94	2,15	2,26	2,37	2,42	2,50	2,53	2,61	2,65	2,69	2,77			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	46	82	107	125	127	127	129	130	131	136	138	139	140	141	142	148	151			
Anteil in %		0,55	0,99	1,29	1,50	1,53	1,53	1,55	1,56	1,58	1,64	1,66	1,67	1,68	1,70	1,71	1,78	1,82				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	8312	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470	2361			



EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1477	2796	3678	4428	4894	5099	5311	5527	5717	5918	6088	6233	6363	6484	6630	6764		
		Anteil in %	15,01	28,42	37,39	45,01	49,75	51,83	53,99	56,19	58,12	60,16	61,89	63,36	64,68	65,91	67,40	68,76		
		CI Anteil in %	[14,31; 15,72]	[27,53; 29,31]	[36,43; 38,35]	[44,03; 46,00]	[48,76; 50,74]	[50,85; 52,82]	[53,01; 54,98]	[55,21; 57,17]	[57,14; 59,09]	[59,19; 61,13]	[60,93; 62,85]	[62,41; 64,32]	[63,74; 65,63]	[64,98; 66,85]	[66,47; 68,32]	[67,84; 69,68]		
	davon wegen Tod	Anzahl	24	92	158	222	269	312	377	436	491	547	594	656	703	749	819	878		
		Anteil in %	0,24	0,94	1,61	2,26	2,73	3,17	3,83	4,43	4,99	5,56	6,04	6,67	7,15	7,61	8,33	8,93		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1405	2580	3335	3974	4356	4486	4604	4733	4843	4974	5086	5161	5236	5301	5366	5436		
		Anteil in %	14,28	26,23	33,90	40,40	44,28	45,60	46,80	48,11	49,23	50,56	51,70	52,47	53,23	53,89	54,55	55,26		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	27	70	96	137	171	199	222	241	261	272	282	290	295	303	311	316		
		Anteil in %	0,27	0,71	0,98	1,39	1,74	2,02	2,26	2,45	2,65	2,77	2,87	2,95	3,00	3,08	3,16	3,21		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	21	54	89	95	98	102	108	117	122	125	126	126	129	131	134	134		
Anteil in %		0,21	0,55	0,90	0,97	1,00	1,04	1,10	1,19	1,24	1,27	1,28	1,28	1,31	1,33	1,36	1,36			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207	3073		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1160	2048	2885	3384	3655	3848	4041	4219	4404	4539	4664	4792	4927	5042	5169			
		Anteil in %	14,47	25,54	35,98	42,21	45,58	47,99	50,40	52,62	54,93	56,61	58,17	59,77	61,45	62,88	64,47			
		CI Anteil in %	[13,70; 15,24]	[24,59; 26,50]	[34,93; 37,03]	[41,12; 43,29]	[44,49; 46,68]	[46,90; 49,09]	[49,30; 51,49]	[51,53; 53,71]	[53,84; 56,02]	[55,53; 57,70]	[57,09; 59,25]	[58,69; 60,84]	[60,38; 62,51]	[61,83; 63,94]	[63,42; 65,52]			
	davon wegen Tod	Anzahl	22	71	126	163	216	257	300	349	393	442	480	538	582	625	674			
		Anteil in %	0,27	0,89	1,57	2,03	2,69	3,21	3,74	4,35	4,90	5,51	5,99	6,71	7,26	7,79	8,41			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1100	1892	2617	3040	3210	3330	3457	3566	3696	3772	3853	3914	4000	4068	4138			
		Anteil in %	13,72	23,60	32,64	37,91	40,03	41,53	43,12	44,47	46,10	47,04	48,05	48,82	49,89	50,74	51,61			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	17	46	102	135	180	209	229	248	257	262	266	272	275	278	284			
		Anteil in %	0,21	0,57	1,27	1,68	2,24	2,61	2,86	3,09	3,21	3,27	3,32	3,39	3,43	3,47	3,54			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	21	39	40	46	49	52	55	56	58	63	65	68	70	71	73			
Anteil in %		0,26	0,49	0,50	0,57	0,61	0,65	0,69	0,70	0,72	0,79	0,81	0,85	0,87	0,89	0,91				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976	2849			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1136	2283	3127	3534	3875	4174	4451	4752	4962	5152	5328	5498	5668	5831				
		Anteil in %	11,77	23,66	32,41	36,63	40,16	43,26	46,13	49,25	51,43	53,40	55,22	56,99	58,75	60,44				
		CI Anteil in %	[11,13; 12,42]	[22,81; 24,51]	[31,48; 33,34]	[35,67; 37,59]	[39,19; 41,14]	[42,27; 44,25]	[45,14; 47,13]	[48,26; 50,25]	[50,43; 52,43]	[52,40; 54,40]	[54,23; 56,22]	[56,00; 57,97]	[57,77; 59,73]	[59,46; 61,41]				
	davon wegen Tod	Anzahl	25	126	206	276	351	434	504	582	640	707	768	825	881	949				
		Anteil in %	0,26	1,31	2,14	2,86	3,64	4,50	5,22	6,03	6,63	7,33	7,96	8,55	9,13	9,84				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1075	2024	2734	3009	3219	3400	3577	3777	3908	4019	4129	4229	4340	4431				
		Anteil in %	11,14	20,98	28,34	31,19	33,36	35,24	37,08	39,15	40,51	41,66	42,80	43,83	44,98	45,93				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	26	114	166	220	269	298	321	337	353	361	365	374	375	378				
		Anteil in %	0,27	1,18	1,72	2,28	2,79	3,09	3,33	3,49	3,66	3,74	3,78	3,88	3,89	3,92				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	10	19	21	29	36	42	49	56	61	65	66	70	72	73				
Anteil in %		0,10	0,20	0,22	0,30	0,37	0,44	0,51	0,58	0,63	0,67	0,68	0,73	0,75	0,76					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9648	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980	3817				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1362	2349	2857	3206	3534	3827	4159	4408	4613	4823	5020	5183	5350					
		Anteil in %	14,79	25,50	31,02	34,81	38,37	41,55	45,16	47,86	50,09	52,37	54,51	56,28	58,09					
		CI Anteil in %	[14,06; 15,51]	[24,61; 26,40]	[30,08; 31,97]	[33,84; 35,78]	[37,38; 39,36]	[40,55; 42,56]	[44,14; 46,17]	[46,84; 48,88]	[49,07; 51,11]	[51,35; 53,39]	[53,49; 55,52]	[55,26; 57,29]	[57,08; 59,10]					
	davon wegen Tod	Anzahl	27	96	159	231	303	366	435	502	574	636	686	741	801					
		Anteil in %	0,29	1,04	1,73	2,51	3,29	3,97	4,72	5,45	6,23	6,91	7,45	8,05	8,70					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	1280	2101	2481	2711	2930	3128	3362	3531	3653	3788	3925	4023	4119					
		Anteil in %	13,90	22,81	26,94	29,44	31,81	33,96	36,50	38,34	39,66	41,13	42,62	43,68	44,72					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	51	139	193	235	267	294	317	326	333	343	352	359	365					
		Anteil in %	0,55	1,51	2,10	2,55	2,90	3,19	3,44	3,54	3,62	3,72	3,82	3,90	3,96					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	13	24	29	34	39	45	49	53	56	57	60	65					
Anteil in %		0,04	0,14	0,26	0,31	0,37	0,42	0,49	0,53	0,58	0,61	0,62	0,65	0,71						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9210	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027	3860					

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	961	1629	2070	2419	2746	3111	3389	3625	3841	4011	4199	4374								
		Anteil in %	11,56	19,60	24,90	29,10	33,03	37,42	40,77	43,61	46,20	48,25	50,51	52,62								
		CI Anteil in %	[10,87; 12,25]	[18,74; 20,45]	[23,97; 25,83]	[28,12; 30,08]	[32,02; 34,04]	[36,38; 38,46]	[39,71; 41,82]	[42,54; 44,67]	[45,13; 47,28]	[47,18; 49,32]	[49,44; 51,59]	[51,54; 53,69]								
	davon wegen Tod	Anzahl	25	109	192	258	320	397	460	543	607	650	706	775								
		Anteil in %	0,30	1,31	2,31	3,10	3,85	4,78	5,53	6,53	7,30	7,82	8,49	9,32								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	900	1417	1725	1977	2221	2490	2677	2810	2951	3068	3191	3287								
		Anteil in %	10,83	17,05	20,75	23,78	26,72	29,95	32,20	33,80	35,50	36,91	38,39	39,54								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	35	90	134	161	178	196	222	235	244	252	256	263								
		Anteil in %	0,42	1,08	1,61	1,94	2,14	2,36	2,67	2,83	2,94	3,03	3,08	3,16								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	13	19	23	27	28	30	37	39	41	46	49								
Anteil %		0,01	0,16	0,23	0,28	0,32	0,34	0,36	0,45	0,47	0,49	0,55	0,59									
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	8313	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114	3939								
2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	973	1657	2226	2663	3127	3453	3745	3981	4226	4462	4658									
		Anteil in %	10,28	17,51	23,53	28,15	33,05	36,50	39,58	42,08	44,67	47,16	49,23									
		CI Anteil in %	[9,67; 10,90]	[16,75; 18,28]	[22,67; 24,38]	[27,24; 29,05]	[32,10; 34,00]	[35,53; 37,47]	[38,60; 40,57]	[41,08; 43,07]	[43,67; 45,67]	[46,16; 48,17]	[48,23; 50,24]									
	davon wegen Tod	Anzahl	27	106	194	261	337	404	492	559	633	705	768									
		Anteil in %	0,29	1,12	2,05	2,76	3,56	4,27	5,20	5,91	6,69	7,45	8,12									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	882	1403	1822	2146	2509	2744	2930	3086	3244	3394	3514									
		Anteil in %	9,32	14,83	19,26	22,68	26,52	29,00	30,97	32,62	34,29	35,87	37,14									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	60	131	185	225	245	265	280	287	297	307	313									
		Anteil in %	0,63	1,38	1,96	2,38	2,59	2,80	2,96	3,03	3,14	3,24	3,31									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	17	25	31	36	40	43	49	52	56	63									
Anteil %		0,04	0,18	0,26	0,33	0,38	0,42	0,45	0,52	0,55	0,59	0,67										
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9461	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999									
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999	4803									
2007-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	776	1382	1922	2426	2750	3052	3323	3577	3827	4028										
		Anteil in %	9,25	16,47	22,91	28,92	32,78	36,38	39,61	42,64	45,62	48,02										
		CI Anteil in %	[8,63; 9,87]	[15,68; 17,27]	[22,01; 23,81]	[27,95; 29,89]	[31,78; 33,79]	[35,35; 37,41]	[38,56; 40,66]	[41,58; 43,70]	[44,55; 46,69]	[46,95; 49,08]										
	davon wegen Tod	Anzahl	32	104	190	277	333	404	482	554	613	679										
		Anteil in %	0,38	1,24	2,26	3,30	3,97	4,82	5,75	6,60	7,31	8,09										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	705	1164	1574	1961	2207	2413	2595	2763	2936	3063										
		Anteil in %	8,40	13,88	18,76	23,38	26,31	28,76	30,93	32,94	35,00	36,51										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	36	100	131	159	178	195	204	213	223	229										
		Anteil in %	0,43	1,19	1,56	1,90	2,12	2,32	2,43	2,54	2,66	2,73										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	14	27	29	32	40	42	47	55	57										
Anteil %		0,04	0,17	0,32	0,35	0,38	0,48	0,50	0,56	0,66	0,68											
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	8389	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562	4361										
2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	862	1460	2076	2450	2736	3011	3242	3465	3658											
		Anteil in %	10,79	18,27	25,98	30,66	34,24	37,68	40,57	43,36	45,78											
		CI Anteil in %	[10,11; 11,47]	[17,42; 19,12]	[25,02; 26,94]	[29,65; 31,67]	[33,20; 35,28]	[36,62; 38,74]	[39,49; 41,65]	[42,27; 44,45]	[44,68; 46,87]											
	davon wegen Tod	Anzahl	25	92	178	237	306	352	414	467	519											
		Anteil in %	0,31	1,15	2,23	2,97	3,83	4,40	5,18	5,84	6,49											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	793	1264	1753	2031	2228	2440	2595	2749	2871											
		Anteil in %	9,92	15,82	21,94	25,42	27,88	30,53	32,47	34,40	35,93											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	44	94	127	156	173	187	200	210	223											
		Anteil in %	0,55	1,18	1,59	1,95	2,16	2,34	2,50	2,63	2,79											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	10	18	26	29	32	33	39	45											
Anteil %		0,00	0,13	0,23	0,33	0,36	0,40	0,41	0,49	0,56												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7991	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526	4333											

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	617	1147	1499	1736	1957	2123	2294	2475											
		Anteil in %	11,26	20,94	27,36	31,69	35,72	38,76	41,88	45,18											
		CI Anteil in %	[10,43; 12,10]	[19,86; 22,02]	[26,18; 28,54]	[30,46; 32,92]	[34,46; 36,99]	[37,46; 40,05]	[40,57; 43,18]	[43,86; 46,50]											
	davon wegen Tod	Anzahl	20	87	148	187	220	252	287	337											
		Anteil in %	0,37	1,59	2,70	3,41	4,02	4,60	5,24	6,15											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	573	999	1261	1441	1606	1733	1851	1976											
		Anteil in %	10,46	18,24	23,02	26,31	29,32	31,64	33,79	36,07											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	21	50	72	84	98	102	115	120											
		Anteil in %	0,38	0,91	1,31	1,53	1,79	1,86	2,10	2,19											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	11	18	24	33	36	41	42											
Anteil %		0,05	0,20	0,33	0,44	0,60	0,66	0,75	0,77												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5478	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184	3003											
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1007	1656	2136	2489	2768	3033	3290												
		Anteil in %	13,59	22,35	28,83	33,59	37,35	40,93	44,40												
		CI Anteil in %	[12,81; 14,37]	[21,40; 23,30]	[27,79; 29,86]	[32,51; 34,67]	[36,25; 38,46]	[39,81; 42,05]	[43,27; 45,53]												
	davon wegen Tod	Anzahl	26	96	173	234	284	339	391												
		Anteil in %	0,35	1,30	2,33	3,16	3,83	4,57	5,28												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	954	1486	1854	2125	2337	2531	2717												
		Anteil in %	12,87	20,05	25,02	28,68	31,54	34,16	36,67												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	23	61	86	103	116	128	143												
		Anteil in %	0,31	0,82	1,16	1,39	1,57	1,73	1,93												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	13	23	27	31	35	39												
Anteil %		0,05	0,18	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7410	6403	5754	5274	4921	4642	4377												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6403	5754	5274	4921	4642	4377	4120												
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	688	1191	1592	1914	2165	2406													
		Anteil in %	11,40	19,74	26,39	31,73	35,89	39,88													
		CI Anteil in %	[10,60; 12,21]	[18,74; 20,75]	[25,28; 27,50]	[30,55; 32,90]	[34,68; 37,10]	[38,64; 41,12]													
	davon wegen Tod	Anzahl	16	76	139	193	231	284													
		Anteil in %	0,27	1,26	2,30	3,20	3,83	4,71													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	640	1051	1367	1614	1813	1988													
		Anteil in %	10,61	17,42	22,66	26,75	30,05	32,95													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	29	55	71	88	100	110													
		Anteil in %	0,48	0,91	1,18	1,46	1,66	1,82													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	9	15	19	21	24													
Anteil %		0,05	0,15	0,25	0,31	0,35	0,40														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6033	5345	4842	4441	4119	3868													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5345	4842	4441	4119	3868	3627													
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	806	1375	1850	2226	2504														
		Anteil in %	11,30	19,27	25,93	31,20	35,09														
		CI Anteil in %	[10,56; 12,03]	[18,36; 20,19]	[24,91; 26,95]	[30,12; 32,27]	[33,99; 36,20]														
	davon wegen Tod	Anzahl	14	61	119	183	232														
		Anteil in %	0,20	0,85	1,67	2,56	3,25														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	764	1237	1632	1912	2122														
		Anteil in %	10,71	17,34	22,87	26,80	29,74														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	26	68	83	105	117														
		Anteil in %	0,36	0,95	1,16	1,47	1,64														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	9	16	26	33														
Anteil %		0,03	0,13	0,22	0,36	0,46															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7135	6329	5760	5285	4909														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6329	5760	5285	4909	4631														

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2010-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	704	1292	1737	2086															
		Anteil in %	10,69	19,61	26,37	31,67															
		CI Anteil in %	[9,94; 11,43]	[18,66; 20,57]	[25,31; 27,43]	[30,54; 32,79]															
	davon wegen Tod	Anzahl	19	73	130	189															
		Anteil in %	0,29	1,11	1,97	2,87															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	656	1144	1512	1772															
		Anteil in %	9,96	17,37	22,95	26,90															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	26	60	77	100															
		Anteil in %	0,39	0,91	1,17	1,52															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	15	18	25															
Anteil %		0,05	0,23	0,27	0,38																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6587	5883	5295	4850															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5883	5295	4850	4501															
2011-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	804	1397	1842																
		Anteil in %	11,38	19,78	26,08																
		CI Anteil in %	[10,64; 12,12]	[18,85; 20,71]	[25,06; 27,10]																
	davon wegen Tod	Anzahl	20	64	117																
		Anteil in %	0,28	0,91	1,66																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	759	1257	1618																
		Anteil in %	10,75	17,80	22,91																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	21	61	86																
		Anteil in %	0,30	0,86	1,22																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	15	21																
Anteil %		0,06	0,21	0,30																	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7063	6259	5666																
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6259	5666	5221																
2011-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	754	1321																	
		Anteil in %	12,07	21,15																	
		CI Anteil in %	[11,26; 12,88]	[20,13; 22,16]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	24	87																	
		Anteil in %	0,38	1,39																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	696	1155																	
		Anteil in %	11,14	18,49																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	30	68																	
		Anteil in %	0,48	1,09																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	11																	
Anteil %		0,06	0,18																		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6247	5493																	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5493	4926																	
2012-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	721																		
		Anteil in %	11,12																		
		CI Anteil in %	[10,35; 11,88]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	20																		
		Anteil in %	0,31																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	677																		
		Anteil in %	10,44																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	21																		
		Anteil in %	0,32																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3																		
Anteil %		0,05																			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6485																		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5764																		

In Tabelle A.1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1 des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten - - Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	--
	CI Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2003-2	Mean	65,41
	CI Mean	[65,07; 65,76]
	Median	66,00
	Fallbasis	3307
2004-1	Mean	65,37
	CI Mean	[65,14; 65,60]
	Median	66,00
	Fallbasis	8312
2004-2	Mean	64,01
	CI Mean	[63,78; 64,23]
	Median	65,00
	Fallbasis	9837
2005-1	Mean	63,57
	CI Mean	[63,32; 63,82]
	Median	65,00
	Fallbasis	8018
2005-2	Mean	63,86
	CI Mean	[63,63; 64,10]
	Median	65,00
	Fallbasis	9648
2006-1	Mean	64,24
	CI Mean	[64,00; 64,48]
	Median	66,00
	Fallbasis	9210
2006-2	Mean	63,64
	CI Mean	[63,39; 63,89]
	Median	65,00
	Fallbasis	8313
2007-1	Mean	64,07
	CI Mean	[63,83; 64,32]
	Median	66,00
	Fallbasis	9461
2007-2	Mean	63,49
	CI Mean	[63,23; 63,76]
	Median	65,00
	Fallbasis	8389

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	63,38
	CI Mean	[63,10; 63,65]
	Median	65,00
	<i>Fallbasis</i>	7991
2008-2	Mean	62,96
	CI Mean	[62,62; 63,29]
	Median	65,00
	<i>Fallbasis</i>	5478
2009-1	Mean	62,01
	CI Mean	[61,72; 62,30]
	Median	63,00
	<i>Fallbasis</i>	7410
2009-2	Mean	61,60
	CI Mean	[61,27; 61,92]
	Median	62,00
	<i>Fallbasis</i>	6033
2010-1	Mean	62,18
	CI Mean	[61,88; 62,48]
	Median	63,00
	<i>Fallbasis</i>	7135
2010-2	Mean	61,60
	CI Mean	[61,29; 61,92]
	Median	62,00
	<i>Fallbasis</i>	6587
2011-1	Mean	61,57
	CI Mean	[61,27; 61,88]
	Median	62,00
	<i>Fallbasis</i>	7063
2011-2	Mean	61,03
	CI Mean	[60,69; 61,36]
	Median	61,00
	<i>Fallbasis</i>	6247
2012-1	Mean	60,96
	CI Mean	[60,64; 61,29]
	Median	61,00
	<i>Fallbasis</i>	6485

In Tabelle A.1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird

Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitrittsjahr - - Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2003-1	bis 50	--
	51 bis 60	--
	61 bis 70	--
	71 bis 80	--
	81 und älter	--
	<i>Patienten zusammen</i>	--
2003-2	bis 50	297
	51 bis 60	599
	61 bis 70	1390
	71 bis 80	835
	81 und älter	186
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>3307</b>
2004-1	bis 50	832
	51 bis 60	1560
	61 bis 70	3208
	71 bis 80	2154
	81 und älter	558
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>8312</b>
2004-2	bis 50	1232
	51 bis 60	2117
	61 bis 70	3604
	71 bis 80	2302
	81 und älter	580
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>9835</b>
2005-1	bis 50	1115
	51 bis 60	1766
	61 bis 70	2913
	71 bis 80	1791
	81 und älter	433
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>8018</b>
2005-2	bis 50	1341
	51 bis 60	2041
	61 bis 70	3421
	71 bis 80	2248
	81 und älter	595
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>9646</b>
2006-1	bis 50	1221
	51 bis 60	1906
	61 bis 70	3245
	71 bis 80	2222
	81 und älter	615
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>9209</b>
2006-2	bis 50	1208
	51 bis 60	1817
	61 bis 70	2867
	71 bis 80	1921
	81 und älter	499
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>8312</b>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2007-1	bis 50	1342
	51 bis 60	2112
	61 bis 70	2943
	71 bis 80	2399
	81 und älter	664
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>9460</i>
2007-2	bis 50	1278
	51 bis 60	1941
	61 bis 70	2578
	71 bis 80	2051
	81 und älter	540
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>8388</i>
2008-1	bis 50	1325
	51 bis 60	1790
	61 bis 70	2374
	71 bis 80	1939
	81 und älter	563
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7991</i>
2008-2	bis 50	963
	51 bis 60	1259
	61 bis 70	1618
	71 bis 80	1274
	81 und älter	363
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5477</i>
2009-1	bis 50	1474
	51 bis 60	1764
	61 bis 70	2065
	71 bis 80	1669
	81 und älter	436
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7408</i>
2009-2	bis 50	1264
	51 bis 60	1479
	61 bis 70	1605
	71 bis 80	1335
	81 und älter	345
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6028</i>
2010-1	bis 50	1410
	51 bis 60	1682
	61 bis 70	1914
	71 bis 80	1698
	81 und älter	429
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7133</i>
2010-2	bis 50	1368
	51 bis 60	1600
	61 bis 70	1778
	71 bis 80	1468
	81 und älter	371
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6585</i>
2011-1	bis 50	1479
	51 bis 60	1735
	61 bis 70	1857
	71 bis 80	1571
	81 und älter	418
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7060</i>
2011-2	bis 50	1416
	51 bis 60	1574
	61 bis 70	1488
	71 bis 80	1403
	81 und älter	364
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6245</i>



EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2012-1	bis 50	1523
	51 bis 60	1597
	61 bis 70	1548
	71 bis 80	1398
	81 und älter	415
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6481</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle A.1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im jeweils betrachteten Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei - - von Ihnen bzw. - - Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	3307	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		213	68	51	27	24	19	45	47	43	21	26	21	15	13	13	12	24
		CI Anteil in %		[6,78; 8,79]	[2,22; 3,58]	[1,84; 3,21]	[0,98; 2,15]	[0,95; 2,19]	[0,76; 1,99]	[2,50; 4,52]	[2,72; 4,85]	[2,53; 4,63]	[1,04; 2,57]	[1,43; 3,18]	[1,12; 2,77]	[0,73; 2,20]	[0,60; 2,02]	[0,62; 2,09]	[0,56; 2,01]	[1,63; 3,76]
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8312	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		759	278	131	84	76	177	183	159	86	64	36	48	50	48	48	71	
		CI Anteil in %		[10,09; 11,55]	[4,19; 5,28]	[2,18; 3,06]	[1,47; 2,26]	[1,46; 2,29]	[4,11; 5,49]	[4,48; 5,95]	[3,98; 5,41]	[2,07; 3,17]	[1,54; 2,52]	[0,81; 1,58]	[1,19; 2,12]	[1,29; 2,27]	[1,29; 2,29]	[1,34; 2,39]	[2,22; 3,53]	
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		587	201	178	120	214	202	207	121	89	62	56	49	56	50	61		
		CI Anteil in %		[6,47; 7,57]	[2,47; 3,24]	[2,47; 3,31]	[1,83; 2,61]	[3,76; 4,90]	[3,69; 4,84]	[3,96; 5,18]	[2,31; 3,30]	[1,72; 2,60]	[1,19; 1,97]	[1,11; 1,88]	[0,98; 1,74]	[1,19; 2,03]	[1,08; 1,90]	[1,43; 2,37]		
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		338	245	159	214	214	208	124	92	73	82	70	67	68	83			
		CI Anteil in %		[4,42; 5,44]	[3,60; 4,61]	[2,62; 3,57]	[4,01; 5,22]	[4,26; 5,55]	[4,33; 5,65]	[2,58; 3,66]	[1,93; 2,91]	[1,56; 2,48]	[1,85; 2,86]	[1,60; 2,57]	[1,58; 2,57]	[1,68; 2,72]	[2,20; 3,38]			
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9648	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		516	298	370	330	337	192	136	108	106	92	97	86	85				
		CI Anteil in %		[5,56; 6,57]	[3,60; 4,50]	[5,11; 6,24]	[4,83; 5,96]	[5,23; 6,44]	[3,02; 3,99]	[2,18; 3,05]	[1,79; 2,62]	[1,84; 2,69]	[1,63; 2,46]	[1,80; 2,69]	[1,64; 2,51]	[1,69; 2,58]				
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9210	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		316	419	345	332	216	131	147	115	104	107	85	135					
		CI Anteil in %		[3,59; 4,46]	[5,54; 6,67]	[4,87; 5,99]	[4,95; 6,11]	[3,31; 4,30]	[2,02; 2,85]	[2,45; 3,37]	[1,96; 2,83]	[1,83; 2,69]	[1,98; 2,90]	[1,60; 2,46]	[2,80; 3,91]					
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8313	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		422	354	307	261	162	123	135	111	104	104	119						
		CI Anteil in %		[5,21; 6,27]	[4,76; 5,83]	[4,38; 5,45]	[3,90; 4,95]	[2,47; 3,35]	[1,95; 2,78]	[2,29; 3,20]	[1,93; 2,80]	[1,88; 2,77]	[1,96; 2,88]	[2,38; 3,40]						
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9461	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		268	254	402	251	237	234	201	220	229	240							
		CI Anteil in %		[2,79; 3,53]	[2,86; 3,65]	[5,03; 6,08]	[3,24; 4,14]	[3,27; 4,21]	[3,41; 4,38]	[3,04; 3,99]	[3,49; 4,53]	[3,82; 4,93]	[4,21; 5,39]							
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8389	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		180	363	184	136	129	132	153	120	145								
		CI Anteil in %		[2,02; 2,71]	[4,66; 5,70]	[2,44; 3,25]	[1,90; 2,66]	[1,90; 2,68]	[2,06; 2,89]	[2,55; 3,49]	[2,05; 2,93]	[2,67; 3,69]								
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7991	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		321	204	139	138	120	132	115	157									
		CI Anteil in %		[4,02; 4,98]	[2,70; 3,55]	[1,96; 2,74]	[2,08; 2,90]	[1,88; 2,69]	[2,20; 3,10]	[1,98; 2,86]	[2,94; 4,00]									
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	5478	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		112	88	70	59	65	76	96										
		CI Anteil in %		[1,88; 2,73]	[1,61; 2,45]	[1,35; 2,17]	[1,18; 1,98]	[1,40; 2,29]	[1,76; 2,77]	[2,42; 3,61]										
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7410	6403	5754	5274	4921	4642	4377											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		145	113	95	98	92	112											
		CI Anteil in %		[1,90; 2,63]	[1,61; 2,32]	[1,44; 2,16]	[1,60; 2,38]	[1,58; 2,38]	[2,09; 3,03]											

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6033	5345	4842	4441	4119	3868												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		93	72	86	61	76												
		Anteil in %		1,74	1,49	1,94	1,48	1,96												
		CI Anteil in %		[1,39; 2,09]	[1,15; 1,83]	[1,53; 2,34]	[1,11; 1,85]	[1,53; 2,40]												
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7135	6329	5760	5285	4909													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		83	103	103	113													
		Anteil in %		1,31	1,79	1,95	2,30													
		CI Anteil in %		[1,03; 1,59]	[1,45; 2,13]	[1,58; 2,32]	[1,88; 2,72]													
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6587	5883	5295	4850														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		86	83	104														
		Anteil in %		1,46	1,57	2,14														
		CI Anteil in %		[1,16; 1,77]	[1,23; 1,90]	[1,74; 2,55]														
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7063	6259	5666															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		124	142															
		Anteil in %		1,98	2,51															
		CI Anteil in %		[1,64; 2,33]	[2,10; 2,91]															
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6247	5493																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		118																
		Anteil in %		2,15																
		CI Anteil in %		[1,76; 2,53]																
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6485																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		

### **Auswertungskapitel A.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung**

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

#### **Risikofaktoren**

- Raucherstatus
- Hypertonus

#### **Laborwerte**

- HbA1c-Werte

### A.3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu zwei Variablen dargestellt. Die Tabelle „Patienten und ihr Body-Mass-Index“ entfällt für die Auswertung nach Subkohorten. Das Kapitel A.3.1 beginnt daher mit der Tabelle A.3.1.2. Zunächst werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortalität ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle A.3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation - - Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch - - Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Raucher	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	388	304	253	217	173	156	137	122	117	113	110	108	101	96	93	93	86		
	auswertbar	Anzahl		283	246	214	172	154	135	125	117	113	110	106	98	93	93	93	81		
	Raucher	Anzahl		249	165	143	110	95	79	67	62	65	55	53	50	48	47	44	42	35	
		Anteil in %		87,99	67,07	66,82	63,95	61,69	58,52	53,60	52,99	57,52	50,00	48,62	47,17	48,98	50,54	47,31	45,16	43,21	
		CI Anteil in %		[84,19; 91,78]	[61,19; 72,96]	[60,50; 73,15]	[56,76; 71,15]	[53,99; 69,39]	[50,18; 66,86]	[44,82; 62,38]	[43,91; 62,07]	[48,37; 66,68]	[40,61; 59,39]	[39,20; 58,05]	[37,62; 56,72]	[39,03; 58,93]	[40,32; 60,75]	[37,11; 57,51]	[34,99; 55,33]	[32,35; 54,07]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3307</i>	<i>2737</i>	<i>2345</i>	<i>2019</i>	<i>1724</i>	<i>1531</i>	<i>1382</i>	<i>1281</i>	<i>1241</i>	<i>1201</i>	<i>1164</i>	<i>1128</i>	<i>1081</i>	<i>1025</i>	<i>993</i>	<i>960</i>	<i>932</i>	<i>891</i>		
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1041	858	697	580	510	454	414	392	379	361	348	331	303	288	273	266			
	auswertbar	Anzahl		761	652	564	499	450	390	364	359	349	336	325	311	297	280	268	254		
	Raucher	Anzahl		634	482	382	325	270	229	200	189	178	169	157	150	140	125	123	117		
		Anteil in %		83,31	73,93	67,73	65,13	60,00	58,72	54,95	52,65	51,00	50,30	48,31	48,23	47,14	44,64	45,90	46,06		
		CI Anteil in %		[80,66; 85,96]	[70,55; 77,30]	[63,87; 71,59]	[60,94; 69,32]	[55,47; 64,53]	[53,83; 63,61]	[49,83; 60,06]	[47,47; 57,82]	[45,75; 56,26]	[44,94; 55,65]	[42,87; 53,75]	[42,67; 53,79]	[41,45; 52,82]	[38,81; 50,48]	[39,92; 51,87]	[39,92; 52,21]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8312</i>	<i>7014</i>	<i>5871</i>	<i>4997</i>	<i>4514</i>	<i>4057</i>	<i>3685</i>	<i>3509</i>	<i>3388</i>	<i>3283</i>	<i>3151</i>	<i>3010</i>	<i>2901</i>	<i>2813</i>	<i>2686</i>	<i>2571</i>	<i>2470</i>			
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1338	1135	925	794	680	606	579	549	518	499	477	455	437	416	402	387			
	auswertbar	Anzahl		1045	895	779	661	584	552	526	500	487	473	449	430	412	396	376			
	Raucher	Anzahl		857	660	536	422	366	333	298	278	269	245	237	224	215	204	195			
		Anteil in %		82,01	73,74	68,81	63,84	62,67	60,33	56,65	55,60	55,24	51,80	52,78	52,09	52,18	51,52	51,86			
		CI Anteil in %		[79,68; 84,34]	[70,86; 76,63]	[65,55; 72,06]	[60,18; 67,51]	[58,74; 66,60]	[56,24; 64,41]	[52,41; 60,89]	[51,24; 59,96]	[50,82; 59,66]	[47,29; 56,30]	[48,16; 57,41]	[47,37; 56,82]	[47,36; 57,01]	[46,59; 56,44]	[46,80; 56,92]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9837</i>	<i>8360</i>	<i>7041</i>	<i>6159</i>	<i>5409</i>	<i>4943</i>	<i>4738</i>	<i>4526</i>	<i>4310</i>	<i>4120</i>	<i>3919</i>	<i>3749</i>	<i>3604</i>	<i>3474</i>	<i>3353</i>	<i>3207</i>				
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1135	927	786	655	588	550	526	493	470	448	426	408	384	366	350				
	auswertbar	Anzahl		864	758	628	560	514	491	471	455	438	407	397	373	353	338				
	Raucher	Anzahl		745	578	447	384	344	329	304	280	267	246	239	216	206	188				
		Anteil in %		86,23	76,25	71,18	68,57	66,93	67,01	64,54	61,54	60,96	60,44	60,20	57,91	58,36	55,62				
		CI Anteil in %		[83,93; 88,53]	[73,22; 79,28]	[67,63; 74,72]	[64,72; 72,42]	[62,85; 71,00]	[62,84; 71,17]	[60,22; 68,87]	[57,06; 66,01]	[56,38; 65,53]	[55,69; 65,20]	[55,38; 65,02]	[52,89; 62,93]	[53,21; 63,51]	[50,32; 60,93]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8018</i>	<i>6858</i>	<i>5970</i>	<i>5133</i>	<i>4634</i>	<i>4363</i>	<i>4170</i>	<i>3977</i>	<i>3799</i>	<i>3614</i>	<i>3479</i>	<i>3354</i>	<i>3226</i>	<i>3091</i>	<i>2976</i>					
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1295	1133	966	827	757	708	660	622	584	547	525	501	473	452					
	auswertbar	Anzahl		1049	918	773	704	657	634	609	574	541	517	492	464	441					
	Raucher	Anzahl		886	726	560	486	423	405	377	353	330	307	290	274	257					
		Anteil in %		84,46	79,08	72,45	69,03	64,38	63,88	61,90	61,50	61,00	59,38	58,94	59,05	58,28					
		CI Anteil in %		[82,27; 86,65]	[76,45; 81,72]	[69,29; 75,60]	[65,62; 72,45]	[60,72; 68,05]	[60,14; 67,62]	[58,04; 65,76]	[57,51; 65,48]	[56,88; 65,11]	[55,14; 63,62]	[54,59; 63,29]	[54,57; 63,53]	[53,67; 62,88]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9648</i>	<i>8512</i>	<i>7365</i>	<i>6521</i>	<i>6114</i>	<i>5773</i>	<i>5474</i>	<i>5197</i>	<i>4896</i>	<i>4686</i>	<i>4496</i>	<i>4320</i>	<i>4150</i>	<i>3980</i>						
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1178	953	799	729	692	630	593	550	511	486	457	437	420						
	auswertbar	Anzahl		905	748	694	655	600	575	530	500	476	447	426	405						
	Raucher	Anzahl		780	550	496	463	389	365	335	305	299	275	259	252						
		Anteil in %		86,19	73,53	71,47	70,69	64,83	63,48	63,21	61,00	62,82	61,52	60,80	62,22						
		CI Anteil in %		[83,94; 88,44]	[70,37; 76,69]	[68,11; 74,83]	[67,20; 74,18]	[61,01; 68,66]	[59,54; 67,42]	[59,10; 67,32]	[56,72; 65,28]	[58,47; 67,16]	[57,01; 66,04]	[56,16; 65,44]	[57,49; 66,95]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9210</i>	<i>7848</i>	<i>6861</i>	<i>6353</i>	<i>6004</i>	<i>5676</i>	<i>5383</i>	<i>5051</i>	<i>4802</i>	<i>4597</i>	<i>4387</i>	<i>4190</i>	<i>4027</i>							
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1070	918	799	727	676	637	607	574	545	513	486	464							
	auswertbar	Anzahl		849	743	692	647	613	593	558	532	499	476	452							
	Raucher	Anzahl		716	574	512	443	399	372	353	325	287	268	255							
		Anteil in %		84,33	77,25	73,99	68,47	65,09	62,73	63,26	61,09	57,52	56,30	56,42							
		CI Anteil in %		[81,89; 86,78]	[74,24; 80,27]	[70,72; 77,26]	[64,89; 72,05]	[61,31; 68,87]	[58,84; 66,63]	[59,26; 67,27]	[56,94; 65,24]	[53,17; 61,86]	[51,84; 60,76]	[51,84; 60,99]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8313</i>	<i>7352</i>	<i>6684</i>	<i>6243</i>	<i>5894</i>	<i>5567</i>	<i>5202</i>	<i>4924</i>	<i>4688</i>	<i>4472</i>	<i>4302</i>	<i>4114</i>								

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1177	1032	926	833	763	711	667	636	606	578	545							
	auswertbar	Anzahl		992	894	789	737	685	646	615	582	553	522							
	Raucher	Anzahl		837	689	539	494	451	424	395	358	331	311							
		Anteil in %		84,38	77,07	68,31	67,03	65,84	65,63	64,23	61,51	59,86	59,58							
		CI Anteil in %		[82,11; 86,64]	[74,31; 79,83]	[65,07; 71,56]	[63,63; 70,42]	[62,29; 69,39]	[61,97; 69,30]	[60,44; 68,02]	[57,56; 65,47]	[55,77; 63,94]	[55,36; 63,79]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9461</i>	<i>8488</i>	<i>7804</i>	<i>7235</i>	<i>6798</i>	<i>6334</i>	<i>6008</i>	<i>5716</i>	<i>5480</i>	<i>5235</i>	<i>4999</i>								
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1077	958	862	786	702	660	612	575	549	522								
	auswertbar	Anzahl		922	813	761	692	649	604	554	542	504								
	Raucher	Anzahl		798	601	535	492	443	418	379	362	330								
		Anteil in %		86,55	73,92	70,30	71,10	68,26	69,21	68,41	66,79	65,48								
		CI Anteil in %		[84,35; 88,75]	[70,90; 76,94]	[67,05; 73,55]	[67,72; 74,48]	[64,67; 71,84]	[65,52; 72,89]	[64,54; 72,29]	[62,82; 70,76]	[61,32; 69,63]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8389</i>	<i>7613</i>	<i>7007</i>	<i>6467</i>	<i>5963</i>	<i>5639</i>	<i>5337</i>	<i>5066</i>	<i>4812</i>	<i>4562</i>									
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1069	935	850	759	702	651	612	569	540									
	auswertbar	Anzahl		889	813	738	687	638	595	559	518									
	Raucher	Anzahl		762	613	534	493	447	418	391	364									
		Anteil in %		85,71	75,40	72,36	71,76	70,06	70,25	69,95	70,27									
		CI Anteil in %		[83,41; 88,02]	[72,44; 78,36]	[69,13; 75,59]	[68,39; 75,13]	[66,51; 73,62]	[66,58; 73,93]	[66,14; 73,75]	[66,33; 74,21]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7991</i>	<i>7129</i>	<i>6531</i>	<i>5915</i>	<i>5541</i>	<i>5255</i>	<i>4980</i>	<i>4749</i>	<i>4526</i>										
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	716	626	549	496	464	428	402	378										
	auswertbar	Anzahl		610	537	488	461	416	395	369										
	Raucher	Anzahl		565	472	414	383	341	315	292										
		Anteil in %		92,62	87,90	84,84	83,08	81,97	79,75	79,13										
		CI Anteil in %		[90,55; 94,70]	[85,13; 90,66]	[81,65; 88,02]	[79,65; 86,51]	[78,27; 85,67]	[75,78; 83,72]	[74,98; 83,28]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5478</i>	<i>4861</i>	<i>4331</i>	<i>3979</i>	<i>3742</i>	<i>3521</i>	<i>3355</i>	<i>3184</i>											
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1014	869	756	686	623	569	536											
	auswertbar	Anzahl		844	740	674	610	559	522											
	Raucher	Anzahl		789	666	587	519	460	428											
		Anteil in %		93,48	90,00	87,09	85,08	82,29	81,99											
		CI Anteil in %		[91,82; 95,15]	[87,84; 92,16]	[84,56; 89,63]	[82,25; 87,91]	[79,12; 85,46]	[78,69; 85,29]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7410</i>	<i>6403</i>	<i>5754</i>	<i>5274</i>	<i>4921</i>	<i>4642</i>	<i>4377</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	836	704	626	553	511	474												
	auswertbar	Anzahl		693	619	542	499	469												
	Raucher	Anzahl		659	564	475	437	401												
		Anteil in %		95,09	91,11	87,64	87,58	85,50												
		CI Anteil in %		[93,48; 96,70]	[88,87; 93,36]	[84,86; 90,41]	[84,68; 90,47]	[82,31; 88,69]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6033</i>	<i>5345</i>	<i>4842</i>	<i>4441</i>	<i>4119</i>	<i>3868</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1018	855	760	678	618													
	auswertbar	Anzahl		848	744	662	609													
	Raucher	Anzahl		806	664	588	521													
		Anteil in %		95,05	89,25	88,82	85,55													
		CI Anteil in %		[93,59; 96,51]	[87,02; 91,47]	[86,42; 91,22]	[82,76; 88,34]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7135</i>	<i>6329</i>	<i>5760</i>	<i>5285</i>	<i>4909</i>														
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	961	829	734	653														
	auswertbar	Anzahl		818	719	642														
	Raucher	Anzahl		769	648	564														
		Anteil in %		94,01	90,13	87,85														
		CI Anteil in %		[92,38; 95,64]	[87,94; 92,31]	[85,32; 90,38]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6587</i>	<i>5883</i>	<i>5295</i>	<i>4850</i>															

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1011	863	751																
	auswertbar	Anzahl		846	734																
	Raucher	Anzahl		820	676																
		Anteil in %		96,93	92,10																
		CI Anteil in %		[95,76; 98,09]	[90,15; 94,05]																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7063</i>	<i>6259</i>	<i>5666</i>																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	943	811																	
	auswertbar	Anzahl		800																	
	Raucher	Anzahl		767																	
		Anteil in %		95,88																	
		CI Anteil in %		[94,50; 97,25]																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6247</i>	<i>5493</i>																	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	979																		
	auswertbar	Anzahl																			
	Raucher	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6485</i>																		



In Tabelle A.3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts halbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren - - Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch - - Patienten eingeschrieben. Für - - dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren - - Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Raucher	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3307	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891	
	auswertbar	Anzahl	3307	2524	2277	1968	1697	1507	1363	1236	1194	1158	1143	1102	1060	1010	980	947	920	867	
	Raucher	Anzahl	388	281	197	167	128	111	90	78	73	73	63	64	60	58	59	56	53	45	
		Anteil in %	11,73	11,13	8,65	8,49	7,54	7,37	6,60	6,31	6,11	6,30	5,51	5,81	5,66	5,74	6,02	5,91	5,76	5,19	
		CI Anteil in %	[10,64; 12,83]	[9,91; 12,36]	[7,50; 9,81]	[7,25; 9,72]	[6,29; 8,80]	[6,05; 8,68]	[5,28; 7,92]	[4,95; 7,67]	[4,75; 7,47]	[4,90; 7,70]	[4,19; 6,84]	[4,43; 7,19]	[4,27; 7,05]	[4,31; 7,18]	[4,53; 7,51]	[4,41; 7,42]	[4,25; 7,27]	[3,71; 6,67]	
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	8312	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470		
	auswertbar	Anzahl	8312	6255	5593	4866	4430	3981	3508	3326	3229	3197	3087	2974	2853	2763	2638	2523	2399		
	Raucher	Anzahl	1041	720	561	454	379	313	261	235	218	221	212	202	195	189	164	158	150		
		Anteil in %	12,52	11,51	10,03	9,33	8,56	7,86	7,44	7,07	6,75	6,91	6,87	6,79	6,83	6,84	6,22	6,26	6,25		
		CI Anteil in %	[11,81; 13,24]	[10,72; 12,30]	[9,24; 10,82]	[8,51; 10,15]	[7,73; 9,38]	[7,03; 8,70]	[6,57; 8,31]	[6,19; 7,94]	[5,89; 7,62]	[6,03; 7,79]	[5,98; 7,76]	[5,89; 7,70]	[5,91; 7,76]	[5,90; 7,78]	[5,30; 7,14]	[5,32; 7,21]	[5,28; 7,22]		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207			
	auswertbar	Anzahl	9837	7773	6840	5981	5289	4729	4536	4319	4189	4031	3857	3693	3555	3418	3303	3146			
	Raucher	Anzahl	1338	970	749	628	504	442	405	364	355	346	313	302	284	272	260	247			
		Anteil in %	13,60	12,48	10,95	10,50	9,53	9,35	8,93	8,43	8,47	8,58	8,12	8,18	7,99	7,96	7,87	7,85			
		CI Anteil in %	[12,92; 14,28]	[11,74; 13,21]	[10,21; 11,69]	[9,72; 11,28]	[8,74; 10,32]	[8,52; 10,18]	[8,10; 9,76]	[7,60; 9,26]	[7,63; 9,32]	[7,72; 9,45]	[7,25; 8,98]	[7,29; 9,06]	[7,10; 8,88]	[7,05; 8,87]	[6,95; 8,79]	[6,91; 8,79]			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976				
	auswertbar	Anzahl	8018	6520	5725	4974	4420	4149	3962	3853	3707	3541	3397	3284	3159	3023	2893				
	Raucher	Anzahl	1135	874	679	539	453	417	397	385	350	331	313	306	275	268	246				
		Anteil in %	14,16	13,40	11,86	10,84	10,25	10,05	10,02	9,99	9,44	9,35	9,21	9,32	8,71	8,87	8,50				
		CI Anteil in %	[13,39; 14,92]	[12,58; 14,23]	[11,02; 12,70]	[9,97; 11,70]	[9,35; 11,14]	[9,14; 10,97]	[9,09; 10,96]	[9,05; 10,94]	[8,50; 10,38]	[8,39; 10,31]	[8,24; 10,19]	[8,32; 10,31]	[7,72; 9,69]	[7,85; 9,88]	[7,49; 9,52]				
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9648	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980					
	auswertbar	Anzahl	9648	7996	7067	6151	5784	5436	5282	5061	4788	4580	4404	4223	4064	3895					
	Raucher	Anzahl	1295	1047	854	660	576	510	538	496	456	426	395	378	358	331					
		Anteil in %	13,42	13,09	12,08	10,73	9,96	9,38	10,19	9,80	9,52	9,30	8,97	8,95	8,81	8,50					
		CI Anteil in %	[12,74; 14,10]	[12,35; 13,83]	[11,32; 12,84]	[9,96; 11,50]	[9,19; 10,73]	[8,61; 10,16]	[9,37; 11,00]	[8,98; 10,62]	[8,69; 10,36]	[8,46; 10,14]	[8,13; 9,81]	[8,09; 9,81]	[7,94; 9,68]	[7,62; 9,37]					
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9210	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027						
	auswertbar	Anzahl	9210	7532	6442	6008	5672	5460	5252	4904	4687	4493	4280	4105	3892						
	Raucher	Anzahl	1178	912	639	591	550	511	468	427	392	391	360	340	330						
		Anteil in %	12,79	12,11	9,92	9,84	9,70	9,36	8,91	8,71	8,36	8,70	8,41	8,28	8,48						
		CI Anteil in %	[12,11; 13,47]	[11,37; 12,85]	[9,19; 10,65]	[9,08; 10,59]	[8,93; 10,47]	[8,59; 10,13]	[8,14; 9,68]	[7,92; 9,50]	[7,57; 9,16]	[7,88; 9,53]	[7,58; 9,24]	[7,44; 9,13]	[7,60; 9,35]						
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	8313	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114							
	auswertbar	Anzahl	8313	6930	6330	5936	5633	5405	5079	4789	4577	4368	4198	3995							
	Raucher	Anzahl	1070	858	701	636	605	551	521	497	461	416	390	365							
		Anteil in %	12,87	12,38	11,07	10,71	10,74	10,19	10,26	10,38	10,07	9,52	9,29	9,14							
		CI Anteil in %	[12,15; 13,59]	[11,61; 13,16]	[10,30; 11,85]	[9,93; 11,50]	[9,93; 11,55]	[9,39; 11,00]	[9,42; 11,09]	[9,51; 11,24]	[9,20; 10,94]	[8,65; 10,39]	[8,41; 10,17]	[8,24; 10,03]							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9461	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999								
	auswertbar	Anzahl	9461	8220	7550	6833	6547	6097	5774	5515	5260	5006	4759								
	Raucher	Anzahl	1177	1022	828	761	718	664	619	591	530	499	467								
		Anteil in %	12,44	12,43	10,97	11,14	10,97	10,89	10,72	10,72	10,08	9,97	9,81								
		CI Anteil in %	[11,78; 13,11]	[11,72; 13,15]	[10,26; 11,67]	[10,39; 11,88]	[10,21; 11,72]	[10,11; 11,67]	[9,92; 11,52]	[9,90; 11,53]	[9,26; 10,89]	[9,14; 10,80]	[8,97; 10,66]								

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8389	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562								
	auswertbar	Anzahl	8389	7433	6644	6283	5827	5510	5205	4913	4692	4417								
	Raucher	Anzahl	1077	956	795	732	672	611	576	526	498	460								
		Anteil in %	12,84	12,86	11,97	11,65	11,53	11,09	11,07	10,71	10,61	10,41								
	CI Anteil in %	[12,12; 13,55]	[12,10; 13,62]	[11,19; 12,75]	[10,86; 12,44]	[10,71; 12,35]	[10,26; 11,92]	[10,21; 11,92]	[9,84; 11,57]	[9,73; 11,50]	[9,51; 11,32]									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7991	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526									
	auswertbar	Anzahl	7991	6808	6327	5776	5403	5135	4848	4634	4369									
	Raucher	Anzahl	1069	978	812	719	661	606	570	535	489									
		Anteil in %	13,38	14,37	12,83	12,45	12,23	11,80	11,76	11,55	11,19									
	CI Anteil in %	[12,63; 14,12]	[13,53; 15,20]	[12,01; 13,66]	[11,60; 13,30]	[11,36; 13,11]	[10,92; 12,68]	[10,85; 12,66]	[10,62; 12,47]	[10,26; 12,13]										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	5478	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184										
	auswertbar	Anzahl	5478	4749	4243	3909	3683	3456	3279	3088										
	Raucher	Anzahl	716	663	553	507	481	426	391	368										
		Anteil in %	13,07	13,96	13,03	12,97	13,06	12,33	11,92	11,92										
	CI Anteil in %	[12,18; 13,96]	[12,97; 14,95]	[12,02; 14,05]	[11,92; 14,02]	[11,97; 14,15]	[11,23; 13,42]	[10,81; 13,03]	[10,77; 13,06]											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7410	6403	5754	5274	4921	4642	4377											
	auswertbar	Anzahl	7410	6258	5641	5179	4823	4550	4265											
	Raucher	Anzahl	1014	875	754	670	622	558	523											
		Anteil in %	13,68	13,98	13,37	12,94	12,90	12,26	12,26											
	CI Anteil in %	[12,90; 14,47]	[13,12; 14,84]	[12,48; 14,25]	[12,02; 13,85]	[11,95; 13,84]	[11,31; 13,22]	[11,28; 13,25]												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6033	5345	4842	4441	4119	3868												
	auswertbar	Anzahl	6033	5252	4770	4355	4058	3792												
	Raucher	Anzahl	836	758	651	566	521	483												
		Anteil in %	13,86	14,43	13,65	13,00	12,84	12,74												
	CI Anteil in %	[12,99; 14,73]	[13,48; 15,38]	[12,67; 14,62]	[12,00; 14,00]	[11,81; 13,87]	[11,68; 13,80]													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7135	6329	5760	5285	4909													
	auswertbar	Anzahl	7135	6246	5657	5182	4796													
	Raucher	Anzahl	1018	886	749	678	613													
		Anteil in %	14,27	14,19	13,24	13,08	12,78													
	CI Anteil in %	[13,46; 15,08]	[13,32; 15,05]	[12,36; 14,12]	[12,17; 14,00]	[11,84; 13,73]														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6587	5883	5295	4850														
	auswertbar	Anzahl	6587	5797	5212	4746														
	Raucher	Anzahl	961	846	729	649														
		Anteil in %	14,59	14,59	13,99	13,67														
	CI Anteil in %	[13,74; 15,44]	[13,68; 15,50]	[13,05; 14,93]	[12,70; 14,65]															
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7063	6259	5666															
	auswertbar	Anzahl	7063	6135	5524															
	Raucher	Anzahl	1011	909	758															
		Anteil in %	14,31	14,82	13,72															
	CI Anteil in %	[13,50; 15,13]	[13,93; 15,71]	[12,81; 14,63]																
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6247	5493																
	auswertbar	Anzahl	6247	5375																
	Raucher	Anzahl	943	828																
		Anteil in %	15,10	15,40																
	CI Anteil in %	[14,21; 15,98]	[14,44; 16,37]																	
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6485																	
	auswertbar	Anzahl	6485																	
	Raucher	Anzahl	979																	
		Anteil in %	15,10																	
	CI Anteil in %	[14,22; 15,97]																		

In Tabelle A.3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

Ferner ist zu beachten, dass durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung eine Änderung in den Dokumentationsmöglichkeiten erfolgte. Bis einschließlich 2004-1 war bei der AHT ein „ja“ oder „nein“ zu dokumentieren. Ab 2004-2 war nur noch das Ankreuzen eines „ja“-Feldes möglich. Dadurch lässt sich in den Daten nicht mehr zwischen „nein“ und „fehlende Angabe“ unterscheiden. Um durchgehend eine einheitliche Rechenregel zu verwenden, sind daher in der Auswertung - unabhängig von den Dokumentationsmöglichkeiten - alle Fälle, in denen bei der AHT kein „ja“ dokumentiert ist, als „nein“ zu werten. In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den - - anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation - - Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch - - Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Patienten verbessern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne

Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende Anteilswert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei - - Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte**

\* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestufteten Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc.

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2442	2022	1724	1483	1278	1140	1034	956	922	894	864	837	802	758	736	709	685	657
	auswertbar	Anzahl	2441	1867	1463	1275	1152	1038	936	847	819	794	846	817	786	746	727	702	676	641
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	773	785	582	519	546	484	444	418	402	415	422	430	417	374	381	373	332	338
		Anteil in %	31,67	42,05	39,78	40,71	47,40	46,63	47,44	49,35	49,08	52,27	49,88	52,63	53,05	50,13	52,41	53,13	49,11	52,73
		CI Anteil in %	[29,82; 33,51]	[39,81; 44,29]	[37,27; 42,29]	[38,01; 43,40]	[44,51; 50,28]	[43,59; 49,66]	[44,24; 50,64]	[45,98; 52,72]	[45,66; 52,51]	[48,79; 55,74]	[46,51; 53,25]	[49,21; 56,06]	[49,56; 56,54]	[46,54; 53,72]	[48,77; 56,04]	[49,44; 56,83]	[45,34; 52,88]	[48,86; 56,60]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	58	82	10	11	6	10	5	6	6	7	21	19	25	22	21	13	15	15
		Anteil in %	2,38	4,39	0,68	0,86	0,52	0,96	0,53	0,71	0,73	0,88	2,48	2,33	3,18	2,95	2,89	1,85	2,22	2,34
		CI Anteil in %	[1,77; 2,98]	[3,46; 5,32]	[0,26; 1,11]	[0,35; 1,37]	[0,10; 0,94]	[0,37; 1,56]	[0,07; 1,00]	[0,14; 1,27]	[0,15; 1,32]	[0,23; 1,53]	[1,43; 3,53]	[1,29; 3,36]	[1,95; 4,41]	[1,73; 4,16]	[1,67; 4,11]	[0,85; 2,85]	[1,11; 3,33]	[1,17; 3,51]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	715	703	572	508	540	474	439	412	396	408	401	411	392	352	360	360	317	323
		Anteil in %	29,29	37,65	39,10	39,84	46,88	45,66	46,90	48,64	48,35	51,39	47,40	50,31	49,87	47,18	49,52	51,28	46,89	50,39
		CI Anteil in %	[27,49; 31,10]	[35,46; 39,85]	[36,60; 41,60]	[37,15; 42,53]	[43,99; 49,76]	[42,63; 48,70]	[43,70; 50,10]	[45,27; 52,01]	[44,93; 51,78]	[47,91; 54,86]	[44,03; 50,77]	[46,88; 53,74]	[46,38; 53,37]	[43,60; 50,77]	[45,88; 53,16]	[47,58; 54,98]	[43,13; 50,66]	[46,52; 54,26]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1668	1082	881	756	606	554	492	429	417	379	424	387	369	372	346	329	344	303
		Anteil in %	68,33	57,95	60,22	59,29	52,60	53,37	52,56	50,65	50,92	47,73	50,12	47,37	46,95	49,87	47,59	46,87	50,89	47,27
		CI Anteil in %	[66,49; 70,18]	[55,71; 60,19]	[57,71; 62,73]	[56,60; 61,99]	[49,72; 55,49]	[50,34; 56,41]	[49,36; 55,76]	[47,28; 54,02]	[47,49; 54,34]	[44,26; 51,21]	[46,75; 53,49]	[43,94; 50,79]	[43,46; 50,44]	[46,28; 53,46]	[43,96; 51,23]	[43,17; 50,56]	[47,12; 54,66]	[43,40; 51,14]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	84	101	15	10	5	2	7	6	6	5	23	24	13	18	13	13	10	8
		Anteil in %	3,44	5,41	1,03	0,78	0,43	0,19	0,75	0,71	0,73	0,63	2,72	2,94	1,65	2,41	1,79	1,85	1,48	1,25
		CI Anteil in %	[2,72; 4,16]	[4,38; 6,44]	[0,51; 1,54]	[0,30; 1,27]	[0,05; 0,81]	[0,00; 0,46]	[0,20; 1,30]	[0,14; 1,27]	[0,15; 1,32]	[0,08; 1,18]	[1,62; 3,82]	[1,78; 4,10]	[0,76; 2,55]	[1,31; 3,51]	[0,82; 2,75]	[0,85; 2,85]	[0,57; 2,39]	[0,39; 2,11]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1285	814	741	610	515	480	422	371	360	335	344	316	311	305	280	280	281	255
		Anteil in %	52,64	43,60	50,65	47,84	44,70	46,24	45,09	43,80	43,96	42,19	40,66	38,68	39,57	40,88	38,51	39,89	41,57	39,78
		CI Anteil in %	[50,66; 54,62]	[41,35; 45,85]	[48,09; 53,21]	[45,10; 50,59]	[41,83; 47,58]	[43,21; 49,28]	[41,90; 48,27]	[40,46; 47,14]	[40,55; 47,36]	[38,75; 45,63]	[37,35; 43,97]	[35,34; 42,02]	[36,15; 42,99]	[37,35; 44,41]	[34,97; 42,05]	[36,26; 43,51]	[37,85; 45,29]	[35,99; 43,57]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	23	13	7	1	0	0	0	0	0	0	7	3	4	2	3	5	3	2	
	Anteil in %	0,94	0,70	0,48	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,37	0,51	0,27	0,41	0,71	0,44	0,31	
	CI Anteil in %	[0,56; 1,33]	[0,32; 1,07]	[0,12; 0,83]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,22; 1,44]	[0,00; 0,78]	[0,01; 1,01]	[0,00; 0,64]	[0,00; 0,88]	[0,09; 1,33]	[0,00; 0,95]	[0,00; 0,74]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	276	154	118	135	86	72	63	52	51	39	50	44	41	47	50	31	50	38	
	Anteil in %	11,31	8,25	8,07	10,59	7,47	6,94	6,73	6,14	6,23	4,91	5,91	5,39	5,22	6,30	6,88	4,42	7,40	5,93	
	CI Anteil in %	[10,05; 12,56]	[7,00; 9,50]	[6,67; 9,46]	[8,90; 12,28]	[5,95; 8,98]	[5,39; 8,48]	[5,12; 8,34]	[4,52; 7,76]	[4,57; 7,88]	[3,41; 6,42]	[4,32; 7,50]	[3,84; 6,93]	[3,66; 6,77]	[4,56; 8,04]	[5,04; 8,72]	[2,90; 5,94]	[5,42; 9,37]	[4,10; 7,76]	
<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	3307	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5726	4870	4079	3493	3161	2861	2594	2472	2386	2318	2214	2117	2034	1963	1877	1794	1720	
	auswertbar	Anzahl	5723	3784	3385	3015	2779	2532	2236	2137	2091	2259	2175	2088	1999	1928	1839	1759	1671	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1817	1472	1438	1305	1246	1120	1076	1004	1018	1075	1063	1026	994	989	948	875	846	
		Anteil in %	31,75	38,90	42,48	43,28	44,84	44,23	48,12	46,98	48,68	47,59	48,87	49,14	49,72	51,30	51,55	49,74	50,63	
		CI Anteil in %	[30,54; 32,96]	[37,35; 40,45]	[40,82; 44,15]	[41,51; 45,05]	[42,99; 46,69]	[42,30; 46,17]	[46,05; 50,19]	[44,87; 49,10]	[46,54; 50,83]	[45,53; 49,65]	[46,77; 50,97]	[46,99; 51,28]	[47,53; 51,92]	[49,06; 53,53]	[49,26; 53,83]	[47,41; 52,08]	[48,23; 53,03]	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	119	53	40	27	30	23	22	26	22	81	72	60	58	60	50	52	46	
		Anteil in %	2,08	1,40	1,18	0,90	1,08	0,91	0,98	1,22	1,05	3,59	3,31	2,87	2,90	3,11	2,72	2,96	2,75	
		CI Anteil in %	[1,71; 2,45]	[1,03; 1,78]	[0,82; 1,55]	[0,56; 1,23]	[0,70; 1,46]	[0,54; 1,28]	[0,57; 1,39]	[0,75; 1,68]	[0,61; 1,49]	[2,82; 4,35]	[2,56; 4,06]	[2,16; 3,59]	[2,17; 3,64]	[2,34; 3,89]	[1,98; 3,46]	[2,16; 3,75]	[1,97; 3,54]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1698	1419	1398	1278	1216	1097	1054	978	996	994	991	966	936	929	898	823	800	
		Anteil in %	29,67	37,50	41,30	42,39	43,76	43,33	47,14	45,77	47,63	44,00	45,56	46,26	46,82	48,18	48,83	46,79	47,88	
		CI Anteil in %	[28,49; 30,85]	[35,96; 39,04]	[39,64; 42,96]	[40,62; 44,15]	[41,91; 45,60]	[41,39; 45,26]	[45,07; 49,21]	[43,65; 47,88]	[45,49; 49,77]	[41,95; 46,05]	[43,47; 47,66]	[44,13; 48,40]	[44,64; 49,01]	[45,95; 50,42]	[46,55; 51,12]	[44,46; 49,12]	[45,48; 50,27]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3906	2312	1947	1710	1533	1412	1160	1133	1073	1184	1112	1062	1005	939	891	884	825	
		Anteil in %	68,25	61,10	57,52	56,72	55,16	55,77	51,88	53,02	51,32	52,41	51,13	50,86	50,28	48,70	48,45	50,26	49,37	
		CI Anteil in %	[67,04; 69,46]	[59,55; 62,65]	[55,85; 59,18]	[54,95; 58,49]	[53,31; 57,01]	[53,83; 57,70]	[49,81; 53,95]	[50,90; 55,13]	[49,17; 53,46]	[50,35; 54,47]	[49,03; 53,23]	[48,72; 53,01]	[48,08; 52,47]	[46,47; 50,94]	[46,17; 50,74]	[47,92; 52,59]	[46,97; 51,77]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	188	49	27	21	26	21	18	19	14	64	60	55	47	37	45	41	39	
		Anteil in %	3,28	1,29	0,80	0,70	0,94	0,83	0,81	0,89	0,67	2,83	2,76	2,63	2,35	1,92	2,45	2,33	2,33	
		CI Anteil in %	[2,82; 3,75]	[0,93; 1,66]	[0,50; 1,10]	[0,40; 0,99]	[0,58; 1,29]	[0,48; 1,18]	[0,43; 1,18]	[0,49; 1,29]	[0,32; 1,02]	[2,15; 3,52]	[2,07; 3,45]	[1,95; 3,32]	[1,69; 3,02]	[1,31; 2,53]	[1,74; 3,15]	[1,63; 3,04]	[1,61; 3,06]	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2919	1865	1612	1433	1268	1170	998	972	930	976	899	883	846	766	734	720	675	
		Anteil in %	51,00	49,29	47,62	47,53	45,63	46,21	44,63	45,48	44,48	43,20	41,33	42,29	42,32	39,73	39,91	40,93	40,39	
		CI Anteil in %	[49,71; 52,30]	[47,69; 50,88]	[45,94; 49,30]	[45,75; 49,31]	[43,78; 47,48]	[44,27; 48,15]	[42,57; 46,69]	[43,37; 47,60]	[42,35; 46,61]	[41,16; 45,25]	[39,26; 43,40]	[40,17; 44,41]	[40,15; 44,49]	[37,55; 41,92]	[37,67; 42,15]	[38,63; 43,23]	[38,04; 42,75]	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	53	9	3	2	2	3	0	1	1	13	5	7	5	9	5	9	7		
	Anteil in %	0,93	0,24	0,09	0,07	0,07	0,12	0,00	0,05	0,05	0,58	0,23	0,34	0,25	0,47	0,27	0,51	0,42		
	CI Anteil in %	[0,68; 1,17]	[0,08; 0,39]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,14]	[0,26; 0,89]	[0,03; 0,43]	[0,09; 0,58]	[0,03; 0,47]	[0,16; 0,77]	[0,03; 0,51]	[0,18; 0,85]	[0,11; 0,73]		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	746	389	305	254	237	218	144	141	128	131	148	117	107	127	107	114	104		
	Anteil in %	13,04	10,28	9,01	8,42	8,53	8,61	6,44	6,60	6,12	5,80	6,80	5,60	5,35	6,59	5,82	6,48	6,22		
	CI Anteil in %	[12,16; 13,91]	[9,31; 11,25]	[8,05; 9,98]	[7,43; 9,42]	[7,49; 9,57]	[7,52; 9,70]	[5,42; 7,46]	[5,55; 7,65]	[5,09; 7,15]	[4,83; 6,76]	[5,75; 7,86]	[4,62; 6,59]	[4,37; 6,34]	[5,48; 7,69]	[4,75; 6,89]	[5,33; 7,63]	[5,07; 7,38]		
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8312	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	7112	6088	5145	4515	3993	3664	3522	3361	3210	3066	2916	2781	2664	2570	2475	2363			
	auswertbar	Anzahl	5512	4766	4308	3823	3422	3104	3025	2899	3127	2995	2861	2735	2629	2528	2436	2318			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1784	1762	1708	1567	1469	1420	1369	1398	1444	1423	1274	1257	1206	1225	1150	1156			
		Anteil in %	32,37	36,97	39,65	40,99	42,93	45,75	45,26	48,22	46,18	47,51	44,53	45,96	45,87	48,46	47,21	49,87			
		CI Anteil in %	[31,13; 33,60]	[35,60; 38,34]	[38,19; 41,11]	[39,43; 42,55]	[41,27; 44,59]	[43,99; 47,50]	[43,48; 47,03]	[46,40; 50,04]	[44,43; 47,93]	[45,72; 49,30]	[42,71; 46,35]	[44,09; 47,83]	[43,97; 47,78]	[46,51; 50,41]	[45,23; 49,19]	[47,83; 51,91]			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	51	51	65	46	41	36	34	30	135	110	96	92	94	97	79	92			
		Anteil in %	0,93	1,07	1,51	1,20	1,20	1,16	1,12	1,03	4,32	3,67	3,36	3,36	3,58	3,84	3,24	3,97			
		CI Anteil in %	[0,67; 1,18]	[0,78; 1,36]	[1,14; 1,87]	[0,86; 1,55]	[0,83; 1,56]	[0,78; 1,54]	[0,75; 1,50]	[0,67; 1,40]	[3,60; 5,03]	[3,00; 4,35]	[2,70; 4,02]	[2,69; 4,04]	[2,87; 4,29]	[3,09; 4,59]	[2,54; 3,95]	[3,17; 4,76]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1733	1711	1643	1521	1428	1384	1335	1368	1309	1313	1178	1165	1112	1128	1071	1064			
		Anteil in %	31,44	35,90	38,14	39,79	41,73	44,59	44,13	47,19	41,86	43,84	41,17	42,60	42,30	44,62	43,97	45,90			
		CI Anteil in %	[30,21; 32,67]	[34,54; 37,26]	[36,69; 39,59]	[38,23; 41,34]	[40,08; 43,38]	[42,84; 46,34]	[42,36; 45,90]	[45,37; 49,01]	[40,13; 43,59]	[42,06; 45,62]	[39,37; 42,98]	[40,74; 44,45]	[40,41; 44,19]	[42,68; 46,56]	[41,99; 45,94]	[43,87; 47,93]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3728	3004	2600	2256	1953	1684	1656	1501	1683	1572	1587	1478	1423	1303	1286	1162			
		Anteil in %	67,63	63,03	60,35	59,01	57,07	54,25	54,74	51,78	53,82	52,49	55,47	54,04	54,13	51,54	52,79	50,13			
		CI Anteil in %	[66,40; 68,87]	[61,66; 64,40]	[58,89; 61,81]	[57,45; 60,57]	[55,41; 58,73]	[52,50; 56,01]	[52,97; 56,52]	[49,96; 53,60]	[52,07; 55,57]	[50,70; 54,28]	[53,65; 57,29]	[52,17; 55,91]	[52,22; 56,03]	[49,59; 53,49]	[50,81; 54,77]	[48,09; 52,17]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	70	80	56	47	38	38	30	27	87	75	88	74	70	61	73	53			
		Anteil in %	1,27	1,68	1,30	1,23	1,11	1,22	0,99	0,93	2,78	2,50	3,08	2,71	2,66	2,41	3,00	2,29			
		CI Anteil in %	[0,97; 1,57]	[1,31; 2,04]	[0,96; 1,64]	[0,88; 1,58]	[0,76; 1,46]	[0,84; 1,61]	[0,64; 1,34]	[0,58; 1,28]	[2,21; 3,36]	[1,94; 3,06]	[2,44; 3,71]	[2,10; 3,31]	[2,05; 3,28]	[1,81; 3,01]	[2,32; 3,67]	[1,68; 2,90]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2903	2426	2146	1904	1645	1439	1400	1303	1362	1299	1282	1227	1161	1060	1064	955			
		Anteil in %	52,67	50,90	49,81	49,80	48,07	46,36	46,28	44,95	43,56	43,37	44,81	44,86	44,16	41,93	43,68	41,20			
		CI Anteil in %	[51,35; 53,99]	[49,48; 52,32]	[48,32; 51,31]	[48,22; 51,39]	[46,40; 49,75]	[44,60; 48,11]	[44,50; 48,06]	[43,14; 46,76]	[41,82; 45,29]	[41,60; 45,15]	[42,99; 46,63]	[43,00; 46,73]	[42,26; 46,06]	[40,01; 43,85]	[41,71; 45,65]	[39,20; 43,20]			
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	15	10	7	4	5	2	3	1	10	11	9	7	10	11	6	3			
		Anteil in %	0,27	0,21	0,16	0,10	0,15	0,06	0,10	0,03	0,32	0,37	0,31	0,26	0,38	0,44	0,25	0,13			
		CI Anteil in %	[0,13; 0,41]	[0,08; 0,34]	[0,04; 0,28]	[0,00; 0,21]	[0,02; 0,27]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,10]	[0,12; 0,52]	[0,15; 0,58]	[0,11; 0,52]	[0,07; 0,45]	[0,15; 0,62]	[0,18; 0,69]	[0,05; 0,44]	[0,00; 0,28]			
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	740	488	391	301	265	205	223	170	224	187	208	170	182	171	143	151			
Anteil in %		13,43	10,24	9,08	7,87	7,74	6,60	7,37	5,86	7,16	6,24	7,27	6,22	6,92	6,76	5,87	6,51				
CI Anteil in %		[12,53; 14,33]	[9,38; 11,10]	[8,22; 9,93]	[7,02; 8,73]	[6,85; 8,64]	[5,73; 7,48]	[6,44; 8,30]	[5,01; 6,72]	[6,26; 8,07]	[5,38; 7,11]	[6,32; 8,22]	[5,31; 7,12]	[5,95; 7,89]	[5,79; 7,74]	[4,94; 6,80]	[5,51; 7,52]				
<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5688	4915	4288	3718	3375	3194	3055	2922	2793	2662	2572	2474	2378	2283	2192				
	auswertbar	Anzahl	4471	3957	3486	3102	2789	2663	2592	2830	2731	2613	2510	2423	2330	2231	2134				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1514	1588	1458	1319	1235	1210	1241	1305	1279	1240	1215	1171	1187	1064	1086				
		Anteil in %	33,86	40,13	41,82	42,52	44,28	45,44	47,88	46,11	46,83	47,46	48,41	48,33	50,94	47,69	50,89				
		CI Anteil in %	[32,48; 35,25]	[38,60; 41,66]	[40,19; 43,46]	[40,78; 44,26]	[42,44; 46,12]	[43,55; 47,33]	[45,95; 49,80]	[44,28; 47,95]	[44,96; 48,70]	[45,54; 49,37]	[46,45; 50,36]	[46,34; 50,32]	[48,91; 52,97]	[45,62; 49,76]	[48,77; 53,01]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	49	73	65	50	47	40	40	125	115	99	94	87	78	78	76				
		Anteil in %	1,10	1,84	1,86	1,61	1,69	1,50	1,54	4,42	4,21	3,79	3,75	3,59	3,35	3,50	3,56				
		CI Anteil in %	[0,79; 1,40]	[1,43; 2,26]	[1,42; 2,31]	[1,17; 2,06]	[1,21; 2,16]	[1,04; 1,96]	[1,07; 2,02]	[3,66; 5,17]	[3,46; 4,96]	[3,06; 4,52]	[3,00; 4,49]	[2,85; 4,33]	[2,62; 4,08]	[2,73; 4,26]	[2,77; 4,35]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1465	1515	1393	1269	1188	1170	1201	1180	1164	1141	1121	1084	1109	986	1010				
		Anteil in %	32,77	38,29	39,96	40,91	42,60	43,94	46,33	41,70	42,62	43,67	44,66	44,74	47,60	44,20	47,33				
		CI Anteil in %	[31,39; 34,14]	[36,77; 39,80]	[38,33; 41,59]	[39,18; 42,64]	[40,76; 44,43]	[42,05; 45,82]	[44,41; 48,25]	[39,88; 43,51]	[40,77; 44,48]	[41,76; 45,57]	[42,72; 46,61]	[42,76; 46,72]	[45,57; 49,62]	[42,13; 46,26]	[45,21; 49,45]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2957	2369	2028	1783	1554	1453	1351	1525	1452	1373	1295	1252	1143	1167	1048				
		Anteil in %	66,14	59,87	58,18	57,48	55,72	54,56	52,12	53,89	53,17	52,54	51,59	51,67	49,06	52,31	49,11				
		CI Anteil in %	[64,75; 67,52]	[58,34; 61,40]	[56,54; 59,81]	[55,74; 59,22]	[53,88; 57,56]	[52,67; 56,45]	[50,20; 54,05]	[52,05; 55,72]	[51,30; 55,04]	[50,63; 54,46]	[49,64; 53,55]	[49,68; 53,66]	[47,03; 51,09]	[50,24; 54,38]	[46,99; 51,23]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	64	53	45	42	30	29	28	104	87	88	65	61	58	57	52				
		Anteil in %	1,43	1,34	1,29	1,35	1,08	1,09	1,08	3,67	3,19	3,37	2,59	2,52	2,49	2,55	2,44				
		CI Anteil in %	[1,08; 1,78]	[0,98; 1,70]	[0,92; 1,67]	[0,95; 1,76]	[0,69; 1,46]	[0,69; 1,48]	[0,68; 1,48]	[2,98; 4,37]	[2,53; 3,84]	[2,68; 4,06]	[1,97; 3,21]	[1,89; 3,14]	[1,86; 3,12]	[1,90; 3,21]	[1,78; 3,09]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2285	1935	1692	1506	1308	1217	1151	1235	1172	1112	1059	1012	947	850					
		Anteil in %	51,11	48,90	48,54	48,55	46,90	45,70	44,41	43,64	42,91	42,56	42,19	41,77	40,64	42,45	39,83				
		CI Anteil in %	[49,64; 52,57]	[47,34; 50,46]	[46,88; 50,20]	[46,79; 50,31]	[45,05; 48,75]	[43,81; 47,59]	[42,49; 46,32]	[41,81; 45,47]	[41,06; 44,77]	[40,66; 44,45]	[40,26; 44,12]	[39,80; 43,73]	[38,65; 42,64]	[40,40; 44,50]	[37,75; 41,91]				
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	11	4	9	4	4	1	1	12	7	8	11	9	10	8	10				
		Anteil in %	0,25	0,10	0,26	0,13	0,14	0,04	0,04	0,42	0,26	0,31	0,44	0,37	0,43	0,36	0,47				
		CI Anteil in %	[0,10; 0,39]	[0,00; 0,20]	[0,09; 0,43]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,11]	[0,18; 0,66]	[0,07; 0,45]	[0,09; 0,52]	[0,18; 0,70]	[0,13; 0,61]	[0,16; 0,69]	[0,11; 0,61]	[0,18; 0,76]				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	597	377	282	231	212	206	171	174	186	165	160	170	128	155	136					
	Anteil in %	13,35	9,53	8,09	7,45	7,60	7,74	6,60	6,15	6,81	6,31	6,37	7,02	5,49	6,95	6,37					
	CI Anteil in %	[12,36; 14,35]	[8,61; 10,44]	[7,18; 8,99]	[6,52; 8,37]	[6,62; 8,59]	[6,72; 8,75]	[5,64; 7,55]	[5,26; 7,03]	[5,87; 7,76]	[5,38; 7,25]	[5,42; 7,33]	[6,00; 8,03]	[4,57; 6,42]	[5,89; 8,00]	[5,34; 7,41]					
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976				



EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6881	6104	5326	4757	4458	4219	4008	3804	3575	3428	3291	3166	3039	2915				
	auswertbar	Anzahl	5536	4902	4425	3931	3758	3574	3863	3697	3488	3346	3217	3086	2972	2853				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1929	2012	1836	1756	1668	1693	1723	1756	1646	1569	1575	1509	1419	1371				
		Anteil in %	34,84	41,04	41,49	44,67	44,39	47,37	44,60	47,50	47,19	46,89	48,96	48,90	47,75	48,05				
		CI Anteil in %	[33,59; 36,10]	[39,67; 42,42]	[40,04; 42,94]	[43,12; 46,22]	[42,80; 45,97]	[45,73; 49,01]	[43,03; 46,17]	[45,89; 49,11]	[45,53; 48,85]	[45,20; 48,58]	[47,23; 50,69]	[47,13; 50,66]	[45,95; 49,54]	[46,22; 49,89]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	44	53	49	42	51	50	178	182	156	134	119	102	105	101				
		Anteil in %	0,79	1,08	1,11	1,07	1,36	1,40	4,61	4,92	4,47	4,00	3,70	3,31	3,53	3,54				
		CI Anteil in %	[0,56; 1,03]	[0,79; 1,37]	[0,80; 1,42]	[0,75; 1,39]	[0,99; 1,73]	[1,01; 1,78]	[3,95; 5,27]	[4,23; 5,62]	[3,79; 5,16]	[3,34; 4,67]	[3,05; 4,35]	[2,67; 3,94]	[2,87; 4,20]	[2,86; 4,22]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1885	1959	1787	1714	1617	1643	1545	1574	1490	1435	1456	1407	1314	1270				
		Anteil in %	34,05	39,96	40,38	43,60	43,03	45,97	39,99	42,58	42,72	42,89	45,26	45,59	44,21	44,51				
		CI Anteil in %	[32,80; 35,30]	[38,59; 41,33]	[38,94; 41,83]	[42,05; 45,15]	[41,44; 44,61]	[44,34; 47,61]	[38,45; 41,54]	[40,98; 44,17]	[41,08; 44,36]	[41,21; 44,56]	[43,54; 46,98]	[43,84; 47,35]	[42,43; 46,00]	[42,69; 46,34]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3607	2890	2589	2175	2090	1881	2140	1941	1842	1777	1642	1577	1553	1482				
		Anteil in %	65,16	58,96	58,51	55,33	55,61	52,63	55,40	52,50	52,81	53,11	51,04	51,10	52,25	51,95				
		CI Anteil in %	[63,90; 66,41]	[57,58; 60,33]	[57,06; 59,96]	[53,78; 56,88]	[54,03; 57,20]	[50,99; 54,27]	[53,83; 56,97]	[50,89; 54,11]	[51,15; 54,47]	[51,42; 54,80]	[49,31; 52,77]	[49,34; 52,87]	[50,46; 54,05]	[50,11; 53,78]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	82	54	41	37	33	37	143	122	111	107	88	81	72	59				
		Anteil in %	1,48	1,10	0,93	0,94	0,88	1,04	3,70	3,30	3,18	3,20	2,74	2,62	2,42	2,07				
		CI Anteil in %	[1,16; 1,80]	[0,81; 1,39]	[0,64; 1,21]	[0,64; 1,24]	[0,58; 1,18]	[0,70; 1,37]	[3,11; 4,30]	[2,72; 3,88]	[2,60; 3,76]	[2,60; 3,79]	[2,17; 3,30]	[2,06; 3,19]	[1,87; 2,98]	[1,55; 2,59]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2874	2402	2173	1843	1788	1598	1687	1558	1476	1440	1327	1285	1252	1195				
		Anteil in %	51,91	49,00	49,11	46,88	47,58	44,71	43,67	42,14	42,32	43,04	41,25	41,64	42,13	41,89				
		CI Anteil in %	[50,60; 53,23]	[47,60; 50,40]	[47,63; 50,58]	[45,32; 48,44]	[45,98; 49,18]	[43,08; 46,34]	[42,11; 45,23]	[40,55; 43,73]	[40,68; 43,96]	[41,36; 44,71]	[39,55; 42,95]	[39,90; 43,38]	[40,35; 43,90]	[40,07; 43,70]				
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	11	7	4	4	5	3	16	18	14	11	8	11	6	13					
	Anteil in %	0,20	0,14	0,09	0,10	0,13	0,08	0,41	0,49	0,40	0,33	0,25	0,36	0,20	0,46					
	CI Anteil in %	[0,08; 0,32]	[0,04; 0,25]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,20]	[0,02; 0,25]	[0,00; 0,18]	[0,21; 0,62]	[0,26; 0,71]	[0,19; 0,61]	[0,13; 0,52]	[0,08; 0,42]	[0,15; 0,57]	[0,04; 0,36]	[0,21; 0,70]					
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	640	427	371	291	264	243	294	243	241	219	219	200	223	215					
	Anteil in %	11,56	8,71	8,38	7,40	7,03	6,80	7,61	6,57	6,91	6,55	6,81	6,48	7,50	7,54					
	CI Anteil in %	[10,72; 12,40]	[7,92; 9,50]	[7,57; 9,20]	[6,58; 8,22]	[6,21; 7,84]	[5,97; 7,62]	[6,77; 8,45]	[5,77; 7,37]	[6,07; 7,75]	[5,71; 7,38]	[5,94; 7,68]	[5,61; 7,35]	[6,56; 8,45]	[6,57; 8,50]					
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9648	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6572	5677	5013	4666	4423	4190	3982	3735	3550	3399	3251	3099	2975								
	auswertbar	Anzahl	5142	4584	3978	3816	3648	4036	3881	3626	3462	3328	3171	3039	2882								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1805	1884	1757	1686	1768	1860	1827	1718	1645	1567	1551	1413	1429								
		Anteil in %	35,10	41,10	44,17	44,18	48,46	46,09	47,08	47,38	47,52	47,09	48,91	46,50	49,58								
		CI Anteil in %	[33,80; 36,41]	[39,67; 42,52]	[42,62; 45,71]	[42,61; 45,76]	[46,84; 50,09]	[44,55; 47,62]	[45,50; 48,65]	[45,75; 49,01]	[45,85; 49,18]	[45,39; 48,78]	[47,17; 50,65]	[44,72; 48,27]	[47,76; 51,41]								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	62	66	53	61	54	204	182	144	150	135	120	109	102								
		Anteil in %	1,21	1,44	1,33	1,60	1,48	5,05	4,69	3,97	4,33	4,06	3,78	3,59	3,54								
		CI Anteil in %	[0,91; 1,50]	[1,09; 1,78]	[0,98; 1,69]	[1,20; 2,00]	[1,09; 1,87]	[4,38; 5,73]	[4,02; 5,35]	[3,34; 4,61]	[3,65; 5,01]	[3,39; 4,73]	[3,12; 4,45]	[2,93; 4,25]	[2,86; 4,21]								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1743	1818	1704	1625	1714	1656	1645	1574	1495	1432	1431	1304	1327								
		Anteil in %	33,90	39,66	42,84	42,58	46,98	41,03	42,39	43,41	43,18	43,03	45,13	42,91	46,04								
		CI Anteil in %	[32,60; 35,19]	[38,24; 41,08]	[41,30; 44,37]	[41,01; 44,15]	[45,36; 48,60]	[39,51; 42,55]	[40,83; 43,94]	[41,80; 45,02]	[41,53; 44,83]	[41,35; 44,71]	[43,40; 46,86]	[41,15; 44,67]	[44,22; 47,86]								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3337	2700	2221	2130	1880	2176	2054	1908	1817	1761	1620	1626	1453								
		Anteil in %	64,90	58,90	55,83	55,82	51,54	53,91	52,92	52,62	52,48	52,91	51,09	53,50	50,42								
		CI Anteil in %	[63,59; 66,20]	[57,48; 60,33]	[54,29; 57,38]	[54,24; 57,39]	[49,91; 53,16]	[52,38; 55,45]	[51,35; 54,50]	[50,99; 54,25]	[50,82; 54,15]	[51,22; 54,61]	[49,35; 52,83]	[51,73; 55,28]	[48,59; 52,24]								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	66	72	45	48	44	164	147	136	112	104	101	95	79								
		Anteil in %	1,28	1,57	1,13	1,26	1,21	4,06	3,79	3,75	3,24	3,13	3,19	3,13	2,74								
		CI Anteil in %	[0,98; 1,59]	[1,21; 1,93]	[0,80; 1,46]	[0,90; 1,61]	[0,85; 1,56]	[3,45; 4,67]	[3,19; 4,39]	[3,13; 4,37]	[2,65; 3,82]	[2,53; 3,72]	[2,57; 3,80]	[2,51; 3,74]	[2,14; 3,34]								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2645	2195	1868	1765	1603	1700	1632	1502	1457	1409	1311	1314	1175								
		Anteil in %	51,44	47,88	46,96	46,25	43,94	42,12	42,05	41,42	42,09	42,34	41,34	43,24	40,77								
		CI Anteil in %	[50,07; 52,81]	[46,44; 49,33]	[45,41; 48,51]	[44,67; 47,83]	[42,33; 45,55]	[40,60; 43,64]	[40,50; 43,60]	[39,82; 43,03]	[40,44; 43,73]	[40,66; 44,02]	[39,63; 43,06]	[41,48; 45,00]	[38,98; 42,56]								
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	13	7	6	3	3	19	14	13	17	19	7	6	10									
	Anteil in %	0,25	0,15	0,15	0,08	0,08	0,47	0,36	0,36	0,49	0,57	0,22	0,20	0,35									
	CI Anteil in %	[0,12; 0,39]	[0,04; 0,27]	[0,03; 0,27]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,18]	[0,26; 0,68]	[0,17; 0,55]	[0,16; 0,55]	[0,26; 0,72]	[0,31; 0,83]	[0,06; 0,38]	[0,04; 0,36]	[0,13; 0,56]									
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	613	426	302	314	230	293	261	257	231	229	201	211	189									
	Anteil in %	11,92	9,29	7,59	8,23	6,30	7,26	6,73	7,09	6,67	6,88	6,34	6,94	6,56									
	CI Anteil in %	[11,04; 12,81]	[8,45; 10,13]	[6,77; 8,41]	[7,36; 9,10]	[5,52; 7,09]	[6,46; 8,06]	[5,94; 7,51]	[6,25; 7,92]	[5,84; 7,50]	[6,02; 7,74]	[5,49; 7,19]	[6,04; 7,85]	[5,65; 7,46]									
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9210	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027								

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5780	5172	4735	4457	4224	4009	3749	3548	3388	3238	3118	2986								
	auswertbar	Anzahl	4533	4216	3910	3749	4047	3899	3658	3453	3303	3171	3050	2900								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1755	1824	1705	1791	1853	1902	1739	1699	1596	1565	1496	1466								
		Anteil in %	38,72	43,26	43,61	47,77	45,79	48,78	47,54	49,20	48,32	49,35	49,05	50,55								
		CI Anteil in %	[37,30; 40,13]	[41,77; 44,76]	[42,05; 45,16]	[46,17; 49,37]	[44,25; 47,32]	[47,21; 50,35]	[45,92; 49,16]	[47,54; 50,87]	[46,62; 50,02]	[47,61; 51,09]	[47,27; 50,82]	[48,73; 52,37]								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	42	62	48	60	188	173	171	140	135	137	116	125								
		Anteil in %	0,93	1,47	1,23	1,60	4,65	4,44	4,67	4,05	4,09	4,32	3,80	4,31								
		CI Anteil in %	[0,65; 1,21]	[1,11; 1,83]	[0,88; 1,57]	[1,20; 2,00]	[4,00; 5,29]	[3,79; 5,08]	[3,99; 5,36]	[3,40; 4,71]	[3,41; 4,76]	[3,61; 5,03]	[3,12; 4,48]	[3,57; 5,05]								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1713	1762	1657	1731	1665	1729	1568	1559	1461	1428	1380	1341								
		Anteil in %	37,79	41,79	42,38	46,17	41,14	44,34	42,86	45,15	44,23	45,03	45,25	46,24								
		CI Anteil in %	[36,38; 39,20]	[40,30; 43,28]	[40,83; 43,93]	[44,58; 47,77]	[39,63; 42,66]	[42,79; 45,90]	[41,26; 44,47]	[43,49; 46,81]	[42,54; 45,93]	[43,30; 46,77]	[43,48; 47,01]	[44,43; 48,06]								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2778	2392	2205	1958	2194	1997	1919	1754	1707	1606	1554	1434								
		Anteil in %	61,28	56,74	56,39	52,23	54,21	51,22	52,46	50,80	51,68	50,65	50,95	49,45								
		CI Anteil in %	[59,87; 62,70]	[55,24; 58,23]	[54,84; 57,95]	[50,63; 53,83]	[52,68; 55,75]	[49,65; 52,79]	[50,84; 54,08]	[49,13; 52,46]	[49,98; 53,38]	[48,91; 52,39]	[49,18; 52,73]	[47,63; 51,27]								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	64	55	46	33	171	158	136	136	116	91	91	95								
		Anteil in %	1,41	1,30	1,18	0,88	4,23	4,05	3,72	3,94	3,51	2,87	2,98	3,28								
		CI Anteil in %	[1,07; 1,76]	[0,96; 1,65]	[0,84; 1,51]	[0,58; 1,18]	[3,61; 4,85]	[3,43; 4,67]	[3,10; 4,33]	[3,29; 4,59]	[2,88; 4,14]	[2,29; 3,45]	[2,38; 3,59]	[2,63; 3,92]								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2225	2002	1846	1658	1723	1591	1517	1392	1339	1318	1259	1157								
		Anteil in %	49,08	47,49	47,21	44,23	42,57	40,81	41,47	40,31	40,54	41,56	41,28	39,90								
		CI Anteil in %	[47,63; 50,54]	[45,98; 48,99]	[45,65; 48,78]	[42,64; 45,82]	[41,05; 44,10]	[39,26; 42,35]	[39,87; 43,07]	[38,68; 41,95]	[38,86; 42,21]	[39,85; 43,28]	[39,53; 43,03]	[38,11; 41,68]								
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	13	8	7	3	22	21	17	13	19	15	16	9								
		Anteil in %	0,29	0,19	0,18	0,08	0,54	0,54	0,46	0,38	0,58	0,47	0,52	0,31								
		CI Anteil in %	[0,13; 0,44]	[0,06; 0,32]	[0,05; 0,31]	[0,00; 0,17]	[0,32; 0,77]	[0,31; 0,77]	[0,24; 0,69]	[0,17; 0,58]	[0,32; 0,83]	[0,23; 0,71]	[0,27; 0,78]	[0,11; 0,51]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	476	327	306	264	278	227	249	213	233	182	188	173									
	Anteil in %	10,50	7,76	7,83	7,04	6,87	5,82	6,81	6,17	7,05	5,74	6,16	5,97									
	CI Anteil in %	[9,61; 11,39]	[6,95; 8,56]	[6,98; 8,67]	[6,22; 7,86]	[6,09; 7,65]	[5,09; 6,56]	[5,99; 7,62]	[5,37; 6,97]	[6,18; 7,93]	[4,93; 6,55]	[5,31; 7,02]	[5,10; 6,83]									
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8313	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114								

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6602	5991	5546	5178	4884	4560	4321	4096	3921	3743	3569											
	auswertbar	Anzahl	5325	5042	4672	4916	4727	4403	4164	3964	3777	3595	3419											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2061	2202	2226	2286	2232	2186	2068	1948	1898	1731	1700											
		Anteil in %	38,70	43,67	47,65	46,50	47,22	49,65	49,66	49,14	50,25	48,15	49,72											
		CI Anteil in %	[37,40; 40,01]	[42,30; 45,04]	[46,21; 49,08]	[45,11; 47,90]	[45,79; 48,64]	[48,17; 51,13]	[48,14; 51,18]	[47,59; 50,70]	[48,66; 51,85]	[46,52; 49,78]	[48,05; 51,40]											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	59	65	76	272	240	225	209	195	178	170	162											
		Anteil in %	1,11	1,29	1,63	5,53	5,08	5,11	5,02	4,92	4,71	4,73	4,74											
		CI Anteil in %	[0,83; 1,39]	[0,98; 1,60]	[1,26; 1,99]	[4,89; 6,17]	[4,45; 5,70]	[4,46; 5,76]	[4,36; 5,68]	[4,25; 5,59]	[4,04; 5,39]	[4,03; 5,42]	[4,03; 5,45]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2002	2137	2150	2014	1992	1961	1859	1753	1720	1561	1538											
		Anteil in %	37,60	42,38	46,02	40,97	42,14	44,54	44,64	44,22	45,54	43,42	44,98											
		CI Anteil in %	[36,30; 38,90]	[41,02; 43,75]	[44,59; 47,45]	[39,59; 42,34]	[40,73; 43,55]	[43,07; 46,01]	[43,13; 46,15]	[42,68; 45,77]	[43,95; 47,13]	[41,80; 45,04]	[43,32; 46,65]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3264	2840	2446	2630	2495	2217	2096	2016	1879	1864	1719											
		Anteil in %	61,30	56,33	52,35	53,50	52,78	50,35	50,34	50,86	49,75	51,85	50,28											
		CI Anteil in %	[59,99; 62,60]	[54,96; 57,70]	[50,92; 53,79]	[52,10; 54,89]	[51,36; 54,21]	[48,87; 51,83]	[48,82; 51,86]	[49,30; 52,41]	[48,15; 51,34]	[50,22; 53,48]	[48,60; 51,95]											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	69	66	56	227	192	166	153	149	149	130	120											
		Anteil in %	1,30	1,31	1,20	4,62	4,06	3,77	3,67	3,76	3,94	3,62	3,51											
		CI Anteil in %	[0,99; 1,60]	[1,00; 1,62]	[0,89; 1,51]	[4,03; 5,20]	[3,50; 4,62]	[3,21; 4,33]	[3,10; 4,25]	[3,17; 4,35]	[3,32; 4,57]	[3,01; 4,23]	[2,89; 4,13]											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2611	2309	2049	2040	1973	1763	1682	1602	1507	1477	1370											
		Anteil in %	49,03	45,80	43,86	41,50	41,74	40,04	40,39	40,41	39,90	41,08	40,07											
		CI Anteil in %	[47,69; 50,38]	[44,42; 47,17]	[42,43; 45,28]	[40,12; 42,87]	[40,33; 43,14]	[38,59; 41,49]	[38,90; 41,88]	[38,89; 41,94]	[38,34; 41,46]	[39,48; 42,69]	[38,43; 41,71]											
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	7	10	7	25	27	25	20	19	17	12	12											
		Anteil in %	0,13	0,20	0,15	0,51	0,57	0,57	0,48	0,48	0,45	0,33	0,35											
		CI Anteil in %	[0,03; 0,23]	[0,08; 0,32]	[0,04; 0,26]	[0,31; 0,71]	[0,36; 0,79]	[0,35; 0,79]	[0,27; 0,69]	[0,26; 0,69]	[0,24; 0,66]	[0,15; 0,52]	[0,15; 0,55]											
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	577	455	334	338	303	263	241	246	206	245	217												
	Anteil in %	10,84	9,02	7,15	6,88	6,41	5,97	5,79	6,21	5,45	6,82	6,35												
	CI Anteil in %	[10,00; 11,67]	[8,23; 9,82]	[6,41; 7,89]	[6,17; 7,58]	[5,71; 7,11]	[5,27; 6,67]	[5,08; 6,50]	[5,45; 6,96]	[4,73; 6,18]	[5,99; 7,64]	[5,53; 7,16]												
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9461	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999											

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5787	5301	4922	4563	4218	3994	3784	3610	3431	3255								
	auswertbar	Anzahl	4666	4474	4691	4439	4123	3906	3693	3509	3348	3155								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1924	2157	2161	2147	2043	1969	1771	1795	1647	1552								
		Anteil in %	41,23	48,21	46,07	48,37	49,55	50,41	47,96	51,15	49,19	49,19								
		CI Anteil in %	[39,82; 42,65]	[46,75; 49,68]	[44,64; 47,49]	[46,90; 49,84]	[48,02; 51,08]	[48,84; 51,98]	[46,34; 49,57]	[49,50; 52,81]	[47,50; 50,89]	[47,45; 50,94]								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	53	53	276	249	224	191	178	190	179	145								
		Anteil in %	1,14	1,18	5,88	5,61	5,43	4,89	4,82	5,41	5,35	4,60								
		CI Anteil in %	[0,83; 1,44]	[0,87; 1,50]	[5,21; 6,56]	[4,93; 6,29]	[4,74; 6,12]	[4,21; 5,57]	[4,13; 5,51]	[4,67; 6,16]	[4,58; 6,11]	[3,87; 5,33]								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1871	2104	1885	1898	1819	1778	1593	1605	1468	1407								
		Anteil in %	40,10	47,03	40,18	42,76	44,12	45,52	43,14	45,74	43,85	44,60								
		CI Anteil in %	[38,69; 41,50]	[45,56; 48,49]	[38,78; 41,59]	[41,30; 44,21]	[42,60; 45,63]	[43,96; 47,08]	[41,54; 44,73]	[44,09; 47,39]	[42,17; 45,53]	[42,86; 46,33]								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2742	2317	2530	2292	2080	1937	1922	1714	1701	1603								
		Anteil in %	58,77	51,79	53,93	51,63	50,45	49,59	52,04	48,85	50,81	50,81								
		CI Anteil in %	[57,35; 60,18]	[50,32; 53,25]	[52,51; 55,36]	[50,16; 53,10]	[48,92; 51,98]	[48,02; 51,16]	[50,43; 53,66]	[47,19; 50,50]	[49,11; 52,50]	[49,06; 52,55]								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	54	49	230	183	162	169	156	125	112	119								
		Anteil in %	1,16	1,10	4,90	4,12	3,93	4,33	4,22	3,56	3,35	3,77								
		CI Anteil in %	[0,85; 1,46]	[0,79; 1,40]	[4,29; 5,52]	[3,54; 4,71]	[3,34; 4,52]	[3,69; 4,96]	[3,58; 4,87]	[2,95; 4,18]	[2,74; 3,95]	[3,11; 4,44]								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2195	1935	1933	1826	1654	1524	1482	1370	1358	1283								
		Anteil in %	47,04	43,25	41,21	41,14	40,12	39,02	40,13	39,04	40,56	40,67								
		CI Anteil in %	[45,61; 48,47]	[41,80; 44,70]	[39,80; 42,62]	[39,69; 42,58]	[38,62; 41,61]	[37,49; 40,55]	[38,55; 41,71]	[37,43; 40,66]	[38,90; 42,23]	[38,95; 42,38]								
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	11	4	30	21	25	17	14	16	11	15								
Anteil in %		0,24	0,09	0,64	0,47	0,61	0,44	0,38	0,46	0,33	0,48									
CI Anteil in %		[0,10; 0,37]	[0,00; 0,18]	[0,41; 0,87]	[0,27; 0,67]	[0,37; 0,84]	[0,23; 0,64]	[0,18; 0,58]	[0,23; 0,68]	[0,13; 0,52]	[0,24; 0,72]									
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	482	329	337	262	239	227	270	203	220	186									
	Anteil in %	10,33	7,35	7,18	5,90	5,80	5,81	7,31	5,79	6,57	5,90									
	CI Anteil in %	[9,46; 11,20]	[6,59; 8,12]	[6,44; 7,92]	[5,21; 6,60]	[5,08; 6,51]	[5,08; 6,55]	[6,47; 8,15]	[5,01; 6,56]	[5,73; 7,41]	[5,07; 6,72]									
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8389	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562								

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5398	4882	4496	4090	3852	3664	3467	3307	3150										
	auswertbar	Anzahl	4333	4670	4369	4013	3763	3585	3383	3238	3051										
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1754	2094	2063	1908	1857	1698	1664	1607	1553										
		Anteil in %	40,48	44,84	47,22	47,55	49,35	47,36	49,19	49,63	50,90										
		CI Anteil in %	[39,02; 41,94]	[43,41; 46,27]	[45,74; 48,70]	[46,00; 49,09]	[47,75; 50,95]	[45,73; 49,00]	[47,50; 50,87]	[47,91; 51,35]	[49,13; 52,68]										
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	43	266	236	209	194	181	174	169	135										
		Anteil in %	0,99	5,70	5,40	5,21	5,16	5,05	5,14	5,22	4,42										
		CI Anteil in %	[0,70; 1,29]	[5,03; 6,36]	[4,73; 6,07]	[4,52; 5,90]	[4,45; 5,86]	[4,33; 5,77]	[4,40; 5,89]	[4,45; 5,99]	[3,69; 5,15]										
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1711	1828	1827	1699	1663	1517	1490	1438	1418										
		Anteil in %	39,49	39,14	41,82	42,34	44,19	42,32	44,04	44,41	46,48										
		CI Anteil in %	[38,03; 40,94]	[37,74; 40,54]	[40,35; 43,28]	[40,81; 43,87]	[42,61; 45,78]	[40,70; 43,93]	[42,37; 45,72]	[42,70; 46,12]	[44,71; 48,25]										
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2579	2576	2306	2105	1906	1887	1719	1631	1498										
		Anteil in %	59,52	55,16	52,78	52,45	50,65	52,64	50,81	50,37	49,10										
		CI Anteil in %	[58,06; 60,98]	[53,73; 56,59]	[51,30; 54,26]	[50,91; 54,00]	[49,05; 52,25]	[51,00; 54,27]	[49,13; 52,50]	[48,65; 52,09]	[47,32; 50,87]										
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	45	244	213	163	141	158	117	111	111										
		Anteil in %	1,04	5,22	4,88	4,06	3,75	4,41	3,46	3,43	3,64										
		CI Anteil in %	[0,74; 1,34]	[4,59; 5,86]	[4,24; 5,51]	[3,45; 4,67]	[3,14; 4,35]	[3,74; 5,08]	[2,84; 4,07]	[2,80; 4,05]	[2,97; 4,30]										
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2052	1921	1777	1642	1484	1446	1339	1269	1184										
		Anteil in %	47,36	41,13	40,67	40,92	39,44	40,33	39,58	39,19	38,81										
		CI Anteil in %	[45,87; 48,84]	[39,72; 42,55]	[39,22; 42,13]	[39,40; 42,44]	[37,87; 41,00]	[38,73; 41,94]	[37,93; 41,23]	[37,51; 40,87]	[37,08; 40,54]										
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	9	38	27	34	26	17	24	16	18											
	Anteil in %	0,21	0,81	0,62	0,85	0,69	0,47	0,71	0,49	0,59											
	CI Anteil in %	[0,07; 0,34]	[0,56; 1,07]	[0,39; 0,85]	[0,56; 1,13]	[0,43; 0,96]	[0,25; 0,70]	[0,43; 0,99]	[0,25; 0,74]	[0,32; 0,86]											
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	473	373	289	266	255	266	239	235	185											
	Anteil in %	10,92	7,99	6,61	6,63	6,78	7,42	7,06	7,26	6,06											
	CI Anteil in %	[9,99; 11,84]	[7,21; 8,76]	[5,88; 7,35]	[5,86; 7,40]	[5,97; 7,58]	[6,56; 8,28]	[6,20; 7,93]	[6,36; 8,15]	[5,22; 6,91]											
Patienten insgesamt	Anzahl	7991	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3751	3377	3024	2781	2627	2485	2382	2277											
	auswertbar	Anzahl	3747	3302	2970	2736	2590	2437	2328	2200											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1663	1543	1447	1314	1291	1236	1167	1119											
		Anteil in %	44,38	46,73	48,72	48,03	49,85	50,72	50,13	50,86											
		CI Anteil in %	[42,79; 45,97]	[45,03; 48,43]	[46,92; 50,52]	[46,15; 49,90]	[47,92; 51,77]	[48,73; 52,70]	[48,10; 52,16]	[48,77; 52,95]											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	159	155	138	106	94	83	73	76											
		Anteil in %	4,24	4,69	4,65	3,87	3,63	3,41	3,14	3,45											
		CI Anteil in %	[3,60; 4,89]	[3,97; 5,42]	[3,89; 5,40]	[3,15; 4,60]	[2,91; 4,35]	[2,69; 4,13]	[2,43; 3,84]	[2,69; 4,22]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1504	1388	1309	1208	1197	1153	1094	1043											
		Anteil in %	40,14	42,04	44,07	44,15	46,22	47,31	46,99	47,41											
		CI Anteil in %	[38,57; 41,71]	[40,35; 43,72]	[42,29; 45,86]	[42,29; 46,01]	[44,30; 48,14]	[45,33; 49,29]	[44,97; 49,02]	[45,32; 49,50]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2084	1759	1523	1422	1299	1201	1161	1081											
		Anteil in %	55,62	53,27	51,28	51,97	50,15	49,28	49,87	49,14											
		CI Anteil in %	[54,03; 57,21]	[51,57; 54,97]	[49,48; 53,08]	[50,10; 53,85]	[48,23; 52,08]	[47,30; 51,27]	[47,84; 51,90]	[47,05; 51,23]											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	178	132	105	110	103	83	77	63											
		Anteil in %	4,75	4,00	3,54	4,02	3,98	3,41	3,31	2,86											
		CI Anteil in %	[4,07; 5,43]	[3,33; 4,67]	[2,87; 4,20]	[3,28; 4,76]	[3,22; 4,73]	[2,69; 4,13]	[2,58; 4,03]	[2,17; 3,56]											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1548	1377	1191	1114	1008	955	920	877											
		Anteil in %	41,31	41,70	40,10	40,72	38,92	39,19	39,52	39,86											
		CI Anteil in %	[39,74; 42,89]	[40,02; 43,38]	[38,34; 41,86]	[38,88; 42,56]	[37,04; 40,80]	[37,25; 41,13]	[37,53; 41,51]	[37,82; 41,91]											
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	27	19	18	12	13	12	12	10												
	Anteil in %	0,72	0,58	0,61	0,44	0,50	0,49	0,52	0,45												
	CI Anteil in %	[0,45; 0,99]	[0,32; 0,83]	[0,33; 0,89]	[0,19; 0,69]	[0,23; 0,77]	[0,21; 0,77]	[0,22; 0,81]	[0,17; 0,74]												
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	331	231	209	186	175	151	152	131												
	Anteil in %	8,83	7,00	7,04	6,80	6,76	6,20	6,53	5,95												
	CI Anteil in %	[7,92; 9,74]	[6,13; 7,87]	[6,12; 7,96]	[5,85; 7,74]	[5,79; 7,72]	[5,24; 7,15]	[5,53; 7,53]	[4,97; 6,94]												
Patienten insgesamt	Anzahl	5478	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184												

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4862	4260	3879	3578	3355	3166	2998													
	auswertbar	Anzahl	4859	4163	3800	3514	3292	3108	2927													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2054	2002	1871	1683	1656	1511	1502													
		Anteil in %	42,27	48,09	49,24	47,89	50,30	48,62	51,32													
		CI Anteil in %	[40,88; 43,66]	[46,57; 49,61]	[47,65; 50,83]	[46,24; 49,55]	[48,60; 52,01]	[46,86; 50,37]	[49,50; 53,13]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	228	229	189	152	133	117	115													
		Anteil in %	4,69	5,50	4,97	4,33	4,04	3,76	3,93													
		CI Anteil in %	[4,10; 5,29]	[4,81; 6,19]	[4,28; 5,67]	[3,65; 5,00]	[3,37; 4,71]	[3,10; 4,43]	[3,22; 4,63]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1826	1773	1682	1531	1523	1394	1387													
		Anteil in %	37,58	42,59	44,26	43,57	46,26	44,85	47,39													
		CI Anteil in %	[36,22; 38,94]	[41,09; 44,09]	[42,68; 45,84]	[41,93; 45,21]	[44,56; 47,97]	[43,10; 46,60]	[45,58; 49,20]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2805	2161	1929	1831	1636	1597	1425													
		Anteil in %	57,73	51,91	50,76	52,11	49,70	51,38	48,68													
		CI Anteil in %	[56,34; 59,12]	[50,39; 53,43]	[49,17; 52,35]	[50,45; 53,76]	[47,99; 51,40]	[49,63; 53,14]	[46,87; 50,50]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	264	186	175	142	128	117	98													
		Anteil in %	5,43	4,47	4,61	4,04	3,89	3,76	3,35													
		CI Anteil in %	[4,80; 6,07]	[3,84; 5,10]	[3,94; 5,27]	[3,39; 4,69]	[3,23; 4,55]	[3,10; 4,43]	[2,70; 4,00]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2027	1665	1496	1425	1304	1286	1141													
		Anteil in %	41,72	40,00	39,37	40,55	39,61	41,38	38,98													
		CI Anteil in %	[40,33; 43,10]	[38,51; 41,48]	[37,81; 40,92]	[38,93; 42,18]	[37,94; 41,28]	[39,65; 43,11]	[37,21; 40,75]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	57	20	19	17	13	6	13														
	Anteil in %	1,17	0,48	0,50	0,48	0,39	0,19	0,44														
	CI Anteil in %	[0,87; 1,48]	[0,27; 0,69]	[0,28; 0,72]	[0,25; 0,71]	[0,18; 0,61]	[0,04; 0,35]	[0,20; 0,69]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	457	290	239	247	191	188	173														
	Anteil in %	9,41	6,97	6,29	7,03	5,80	6,05	5,91														
	CI Anteil in %	[8,58; 10,23]	[6,19; 7,74]	[5,52; 7,06]	[6,18; 7,87]	[5,00; 6,60]	[5,21; 6,89]	[5,06; 6,76]														
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7410	6403	5754	5274	4921	4642	4377													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3954	3559	3256	2998	2801	2647															
	auswertbar	Anzahl	3952	3493	3209	2946	2762	2600															
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1632	1673	1554	1518	1354	1325															
		Anteil in %	41,30	47,90	48,43	51,53	49,02	50,96															
		CI Anteil in %	[39,76; 42,83]	[46,24; 49,55]	[46,70; 50,16]	[49,72; 53,33]	[47,16; 50,89]	[49,04; 52,88]															
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	192	175	148	147	118	106															
		Anteil in %	4,86	5,01	4,61	4,99	4,27	4,08															
		CI Anteil in %	[4,19; 5,53]	[4,29; 5,73]	[3,89; 5,34]	[4,20; 5,78]	[3,52; 5,03]	[3,32; 4,84]															
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1440	1498	1406	1371	1236	1219															
		Anteil in %	36,44	42,89	43,81	46,54	44,75	46,88															
		CI Anteil in %	[34,94; 37,94]	[41,24; 44,53]	[42,10; 45,53]	[44,74; 48,34]	[42,90; 46,60]	[44,97; 48,80]															
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2320	1820	1655	1428	1408	1275															
		Anteil in %	58,70	52,10	51,57	48,47	50,98	49,04															
		CI Anteil in %	[57,17; 60,24]	[50,45; 53,76]	[49,84; 53,30]	[46,67; 50,28]	[49,11; 52,84]	[47,12; 50,96]															
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	222	164	158	104	121	102															
		Anteil in %	5,62	4,70	4,92	3,53	4,38	3,92															
		CI Anteil in %	[4,90; 6,34]	[3,99; 5,40]	[4,17; 5,67]	[2,86; 4,20]	[3,62; 5,14]	[3,18; 4,67]															
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1673	1373	1263	1113	1092	976															
		Anteil in %	42,33	39,31	39,36	37,78	39,54	37,54															
		CI Anteil in %	[40,79; 43,87]	[37,69; 40,93]	[37,67; 41,05]	[36,03; 39,53]	[37,71; 41,36]	[35,68; 39,40]															
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	49	25	16	24	15	23															
		Anteil in %	1,24	0,72	0,50	0,81	0,54	0,88															
		CI Anteil in %	[0,89; 1,58]	[0,44; 1,00]	[0,25; 0,74]	[0,49; 1,14]	[0,27; 0,82]	[0,52; 1,24]															
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	376	258	218	187	180	174																
	Anteil in %	9,51	7,39	6,79	6,35	6,52	6,69																
	CI Anteil in %	[8,60; 10,43]	[6,52; 8,25]	[5,92; 7,66]	[5,47; 7,23]	[5,60; 7,44]	[5,73; 7,65]																
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6033	5345	4842	4441	4119	3868															



EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4755	4285	3932	3628	3386																
	auswertbar	Anzahl	4754	4225	3869	3550	3304																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2014	2036	1962	1704	1677																
		Anteil in %	42,36	48,19	50,71	48,00	50,76																
		CI Anteil in %	[40,96; 43,77]	[46,68; 49,70]	[49,14; 52,29]	[46,36; 49,64]	[49,05; 52,46]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	218	220	203	185	154																
		Anteil in %	4,59	5,21	5,25	5,21	4,66																
		CI Anteil in %	[3,99; 5,18]	[4,54; 5,88]	[4,54; 5,95]	[4,48; 5,94]	[3,94; 5,38]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1796	1816	1759	1519	1523																
		Anteil in %	37,78	42,98	45,46	42,79	46,10																
		CI Anteil in %	[36,40; 39,16]	[41,49; 44,48]	[43,89; 47,03]	[41,16; 44,42]	[44,40; 47,80]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2740	2189	1907	1846	1627																
		Anteil in %	57,64	51,81	49,29	52,00	49,24																
		CI Anteil in %	[56,23; 59,04]	[50,30; 53,32]	[47,71; 50,86]	[50,36; 53,64]	[47,54; 50,95]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	257	177	156	134	121																
		Anteil in %	5,41	4,19	4,03	3,77	3,66																
		CI Anteil in %	[4,76; 6,05]	[3,59; 4,79]	[3,41; 4,65]	[3,15; 4,40]	[3,02; 4,30]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1962	1674	1500	1455	1286																
		Anteil in %	41,27	39,62	38,77	40,99	38,92																
		CI Anteil in %	[39,87; 42,67]	[38,15; 41,10]	[37,23; 40,31]	[39,37; 42,60]	[37,26; 40,59]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	61	34	25	15	16																	
	Anteil in %	1,28	0,80	0,65	0,42	0,48																	
	CI Anteil in %	[0,96; 1,60]	[0,54; 1,07]	[0,39; 0,90]	[0,21; 0,64]	[0,25; 0,72]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	460	304	226	242	204																	
	Anteil in %	9,68	7,20	5,84	6,82	6,17																	
	CI Anteil in %	[8,84; 10,52]	[6,42; 7,97]	[5,10; 6,58]	[5,99; 7,65]	[5,35; 7,00]																	
Patienten insgesamt	Anzahl	7135	6329	5760	5285	4909																	
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4365	3966	3607	3323																	
	auswertbar	Anzahl	4364	3906	3546	3255																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1934	1989	1757	1618																	
		Anteil in %	44,32	50,92	49,55	49,71																	
		CI Anteil in %	[42,84; 45,79]	[49,35; 52,49]	[47,90; 51,19]	[47,99; 51,43]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	228	231	203	188																	
		Anteil in %	5,22	5,91	5,72	5,78																	
		CI Anteil in %	[4,56; 5,88]	[5,17; 6,65]	[4,96; 6,49]	[4,97; 6,58]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1706	1758	1554	1430																	
		Anteil in %	39,09	45,01	43,82	43,93																	
		CI Anteil in %	[37,64; 40,54]	[43,45; 46,57]	[42,19; 45,46]	[42,23; 45,64]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2430	1917	1789	1637																	
		Anteil in %	55,68	49,08	50,45	50,29																	
		CI Anteil in %	[54,21; 57,16]	[47,51; 50,65]	[48,81; 52,10]	[48,57; 52,01]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	224	152	134	127																	
		Anteil in %	5,13	3,89	3,78	3,90																	
		CI Anteil in %	[4,48; 5,79]	[3,28; 4,50]	[3,15; 4,41]	[3,24; 4,57]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1769	1483	1361	1305																	
		Anteil in %	40,54	37,97	38,38	40,09																	
		CI Anteil in %	[39,08; 41,99]	[36,45; 39,49]	[36,78; 39,98]	[38,41; 41,78]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	56	27	23	13																		
	Anteil in %	1,28	0,69	0,65	0,40																		
	CI Anteil in %	[0,95; 1,62]	[0,43; 0,95]	[0,38; 0,91]	[0,18; 0,62]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	381	255	271	192																		
	Anteil in %	8,73	6,53	7,64	5,90																		
	CI Anteil in %	[7,89; 9,57]	[5,75; 7,30]	[6,77; 8,52]	[5,09; 6,71]																		
Patienten insgesamt	Anzahl	6587	5883	5295	4850																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4747	4261	3892																	
	auswertbar	Anzahl	4745	4178	3792																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2056	2050	1902																	
		Anteil in %	43,33	49,07	50,16																	
		CI Anteil in %	[41,92; 44,74]	[47,55; 50,58]	[48,57; 51,75]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	220	224	205																	
		Anteil in %	4,64	5,36	5,41																	
		CI Anteil in %	[4,04; 5,23]	[4,68; 6,04]	[4,69; 6,13]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1836	1826	1697																	
		Anteil in %	38,69	43,71	44,75																	
		CI Anteil in %	[37,31; 40,08]	[42,20; 45,21]	[43,17; 46,33]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2689	2128	1890																	
		Anteil in %	56,67	50,93	49,84																	
		CI Anteil in %	[55,26; 58,08]	[49,42; 52,45]	[48,25; 51,43]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	272	203	160																	
		Anteil in %	5,73	4,86	4,22																	
		CI Anteil in %	[5,07; 6,39]	[4,21; 5,51]	[3,58; 4,86]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1964	1608	1490																	
		Anteil in %	41,39	38,49	39,29																	
		CI Anteil in %	[39,99; 42,79]	[37,01; 39,96]	[37,74; 40,85]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	64	31	26																		
	Anteil in %	1,35	0,74	0,69																		
	CI Anteil in %	[1,02; 1,68]	[0,48; 1,00]	[0,42; 0,95]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	389	286	214																		
	Anteil in %	8,20	6,85	5,64																		
	CI Anteil in %	[7,42; 8,98]	[6,08; 7,61]	[4,91; 6,38]																		
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>7063</b>	<b>6259</b>	<b>5666</b>																		
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4078	3629																		
	auswertbar	Anzahl	4077	3557																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1845	1776																		
		Anteil in %	45,25	49,93																		
		CI Anteil in %	[43,73; 46,78]	[48,29; 51,57]																		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	231	195																		
		Anteil in %	5,67	5,48																		
		CI Anteil in %	[4,96; 6,38]	[4,73; 6,23]																		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1614	1581																		
		Anteil in %	39,59	44,45																		
		CI Anteil in %	[38,09; 41,09]	[42,81; 46,08]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2232	1781																		
		Anteil in %	54,75	50,07																		
		CI Anteil in %	[53,22; 56,27]	[48,43; 51,71]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	207	156																		
		Anteil in %	5,08	4,39																		
		CI Anteil in %	[4,40; 5,75]	[3,71; 5,06]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1603	1353																		
		Anteil in %	39,32	38,04																		
		CI Anteil in %	[37,82; 40,82]	[36,44; 39,63]																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	53	26																			
	Anteil in %	1,30	0,73																			
	CI Anteil in %	[0,95; 1,65]	[0,45; 1,01]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	369	246																			
	Anteil in %	9,05	6,92																			
	CI Anteil in %	[8,17; 9,93]	[6,08; 7,75]																			
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>6247</b>	<b>5493</b>																			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4270																		
	auswertbar	Anzahl	4269																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1845																		
		Anteil in %	43,22																		
		CI Anteil in %	[41,73; 44,70]																		
	Kategorie 1 " <i>normal ohne</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	186																		
		Anteil in %	4,36																		
		CI Anteil in %	[3,74; 4,97]																		
	Kategorie 2 " <i>normal mit</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1659																		
		Anteil in %	38,86																		
		CI Anteil in %	[37,40; 40,32]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2424																		
		Anteil in %	56,78																		
		CI Anteil in %	[55,30; 58,27]																		
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	229																		
		Anteil in %	5,36																		
		CI Anteil in %	[4,69; 6,04]																		
	Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1745																		
		Anteil in %	40,88																		
		CI Anteil in %	[39,40; 42,35]																		
Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	43																			
	Anteil in %	1,01																			
	CI Anteil in %	[0,71; 1,31]																			
Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	407																			
	Anteil in %	9,53																			
	CI Anteil in %	[8,65; 10,41]																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6485</i>																		

In Tabelle A.3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für - - Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei - - mmHg, der Median bei - - mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei - - und der Median bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2442	2022	1724	1483	1278	1140	1034	956	922	894	864	837	802	758	736	709	685	657
	auswertbar	Anzahl	2442	1867	1673	1445	1260	1121	1018	925	890	862	846	817	786	746	727	702	676	641
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	143,70	140,12	140,63	140,45	138,73	139,20	138,45	137,71	137,73	136,54	137,26	136,54	136,21	136,74	136,80	136,19	137,99	136,51
		CI Mean	[143,00; 144,40]	[139,36; 140,89]	[139,85; 141,41]	[139,58; 141,31]	[137,84; 139,62]	[138,23; 140,17]	[137,48; 139,42]	[136,69; 138,73]	[136,70; 138,77]	[135,53; 137,55]	[136,15; 138,36]	[135,47; 137,62]	[135,10; 137,32]	[135,59; 137,90]	[135,60; 137,99]	[135,04; 137,34]	[136,69; 139,28]	[135,25; 137,78]
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	139,50	140,00	140,00	138,00	138,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	138,00	138,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3307</i>	<i>2737</i>	<i>2345</i>	<i>2019</i>	<i>1724</i>	<i>1531</i>	<i>1382</i>	<i>1281</i>	<i>1241</i>	<i>1201</i>	<i>1164</i>	<i>1128</i>	<i>1081</i>	<i>1025</i>	<i>993</i>	<i>960</i>	<i>932</i>	<i>891</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5726	4870	4079	3493	3161	2861	2594	2472	2386	2318	2214	2117	2034	1963	1877	1794	1720	
	auswertbar	Anzahl	5726	4372	3894	3404	3115	2806	2460	2335	2267	2259	2176	2089	2000	1929	1840	1760	1672	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	144,54	141,54	140,34	139,98	139,27	139,42	138,21	138,31	137,55	138,00	137,70	137,34	137,04	137,18	136,73	137,43	137,32	
		CI Mean	[144,07; 145,01]	[141,03; 142,06]	[139,80; 140,88]	[139,42; 140,55]	[138,67; 139,87]	[138,79; 140,05]	[137,56; 138,85]	[137,64; 138,98]	[136,87; 138,22]	[137,33; 138,66]	[137,01; 138,40]	[136,66; 138,02]	[136,34; 137,74]	[136,44; 137,92]	[135,99; 137,46]	[136,64; 138,22]	[136,54; 138,11]	
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	138,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	136,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8312</i>	<i>7014</i>	<i>5871</i>	<i>4997</i>	<i>4514</i>	<i>4057</i>	<i>3685</i>	<i>3509</i>	<i>3388</i>	<i>3283</i>	<i>3151</i>	<i>3010</i>	<i>2901</i>	<i>2813</i>	<i>2686</i>	<i>2571</i>	<i>2470</i>		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	7112	6088	5145	4515	3993	3664	3522	3361	3210	3066	2916	2781	2664	2570	2475	2363		
	auswertbar	Anzahl	7112	5694	4999	4384	3904	3496	3367	3199	3127	2996	2863	2738	2631	2529	2437	2319		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	144,07	141,71	140,83	139,78	139,44	138,69	138,92	137,68	138,53	137,78	138,56	137,86	138,28	137,63	137,95	137,52		
		CI Mean	[143,66; 144,49]	[141,26; 142,16]	[140,37; 141,29]	[139,29; 140,26]	[138,92; 139,96]	[138,16; 139,22]	[138,37; 139,47]	[137,12; 138,24]	[137,95; 139,11]	[137,19; 138,36]	[137,95; 139,18]	[137,25; 138,46]	[137,65; 138,90]	[136,98; 138,28]	[137,31; 138,59]	[136,84; 138,21]		
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	136,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9837</i>	<i>8360</i>	<i>7041</i>	<i>6159</i>	<i>5409</i>	<i>4943</i>	<i>4738</i>	<i>4526</i>	<i>4310</i>	<i>4120</i>	<i>3919</i>	<i>3749</i>	<i>3604</i>	<i>3474</i>	<i>3353</i>	<i>3207</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5688	4915	4288	3718	3375	3194	3055	2922	2793	2662	2572	2474	2378	2283	2192			
	auswertbar	Anzahl	5688	4686	4125	3607	3222	3029	2903	2830	2731	2615	2512	2425	2332	2232	2135			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	143,99	140,96	140,14	139,60	138,64	138,63	137,36	138,25	137,95	137,73	137,71	137,63	136,71	137,88	137,18			
		CI Mean	[143,52; 144,46]	[140,47; 141,44]	[139,63; 140,65]	[139,06; 140,15]	[138,06; 139,22]	[138,05; 139,20]	[136,78; 137,94]	[137,65; 138,85]	[137,33; 138,56]	[137,12; 138,34]	[137,06; 138,35]	[136,98; 138,28]	[136,07; 137,35]	[137,22; 138,54]	[136,49; 137,87]			
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	140,00	140,00	139,00	137,50	137,00	135,00	140,00	135,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8018</i>	<i>6858</i>	<i>5970</i>	<i>5133</i>	<i>4634</i>	<i>4363</i>	<i>4170</i>	<i>3977</i>	<i>3799</i>	<i>3614</i>	<i>3479</i>	<i>3354</i>	<i>3226</i>	<i>3091</i>	<i>2976</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6881	6104	5326	4757	4458	4219	4008	3804	3575	3428	3291	3166	3039	2915				
	auswertbar	Anzahl	6881	5750	5128	4478	4204	3963	3866	3699	3492	3348	3220	3090	2974	2855				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	142,87	140,30	139,85	138,88	138,79	138,03	138,76	137,89	137,97	137,71	137,51	137,67	138,06	138,08				
		CI Mean	[142,45; 143,29]	[139,86; 140,75]	[139,39; 140,31]	[138,39; 139,37]	[138,29; 139,28]	[137,52; 138,53]	[138,23; 139,28]	[137,36; 138,42]	[137,43; 138,52]	[137,16; 138,26]	[136,93; 138,08]	[137,09; 138,24]	[137,47; 138,65]	[137,46; 138,70]				
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	136,00	138,00	139,50	137,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9648</i>	<i>8512</i>	<i>7365</i>	<i>6521</i>	<i>6114</i>	<i>5773</i>	<i>5474</i>	<i>5197</i>	<i>4896</i>	<i>4686</i>	<i>4496</i>	<i>4320</i>	<i>4150</i>	<i>3980</i>					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6572	5677	5013	4666	4423	4190	3982	3735	3550	3399	3251	3099	2975					
	auswertbar	Anzahl	6572	5463	4714	4419	4181	4037	3882	3628	3465	3330	3173	3040	2882					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	142,98	140,21	139,01	139,23	137,81	138,57	137,96	138,09	137,66	138,12	137,39	137,98	137,50					
		CI Mean	[142,54; 143,42]	[139,76; 140,66]	[138,53; 139,49]	[138,74; 139,73]	[137,33; 138,30]	[138,05; 139,09]	[137,43; 138,48]	[137,56; 138,62]	[137,11; 138,20]	[137,56; 138,69]	[136,82; 137,95]	[137,39; 138,57]	[136,89; 138,10]					
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	140,00	139,00	139,00	140,00	136,00	140,00	136,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9210</i>	<i>7848</i>	<i>6861</i>	<i>6353</i>	<i>6004</i>	<i>5676</i>	<i>5383</i>	<i>5051</i>	<i>4802</i>	<i>4597</i>	<i>4387</i>	<i>4190</i>	<i>4027</i>						

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5780	5172	4735	4457	4224	4009	3749	3548	3388	3238	3118	2986								
	auswertbar	Anzahl	5780	4869	4483	4242	4047	3899	3658	3455	3305	3172	3051	2901								
		Mean	141,43	139,29	139,10	137,91	138,26	137,50	138,21	137,10	137,64	137,03	137,61	137,00								
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[140,98; 141,89]	[138,83; 139,76]	[138,61; 139,58]	[137,42; 138,40]	[137,75; 138,76]	[137,00; 138,00]	[137,68; 138,74]	[136,55; 137,64]	[137,07; 138,21]	[136,48; 137,58]	[137,04; 138,19]	[136,42; 137,57]								
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	135,00	139,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8313</i>	<i>7352</i>	<i>6684</i>	<i>6243</i>	<i>5894</i>	<i>5567</i>	<i>5202</i>	<i>4924</i>	<i>4688</i>	<i>4472</i>	<i>4302</i>	<i>4114</i>								
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6602	5991	5546	5178	4884	4560	4321	4096	3921	3743	3569									
	auswertbar	Anzahl	6602	5837	5379	4917	4729	4405	4166	3965	3777	3595	3419									
		Mean	141,58	139,43	137,78	138,39	137,82	137,55	137,13	137,69	136,84	138,03	137,19									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[141,15; 142,01]	[139,00; 139,86]	[137,35; 138,22]	[137,93; 138,84]	[137,37; 138,28]	[137,08; 138,03]	[136,65; 137,61]	[137,20; 138,19]	[136,35; 137,34]	[137,50; 138,56]	[136,66; 137,73]									
		Median	140,00	140,00	139,00	140,00	138,00	135,00	135,00	136,00	135,00	138,00	135,00									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9461</i>	<i>8488</i>	<i>7804</i>	<i>7235</i>	<i>6798</i>	<i>6334</i>	<i>6008</i>	<i>5716</i>	<i>5480</i>	<i>5235</i>	<i>4999</i>									
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5787	5301	4922	4563	4218	3994	3784	3610	3431	3255										
	auswertbar	Anzahl	5787	5192	4691	4439	4127	3909	3696	3511	3348	3155										
		Mean	140,97	138,04	138,38	137,32	137,37	137,04	137,75	136,64	137,49	137,15										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[140,51; 141,42]	[137,59; 138,50]	[137,91; 138,86]	[136,85; 137,79]	[136,87; 137,87]	[136,53; 137,54]	[137,22; 138,28]	[136,11; 137,17]	[136,94; 138,05]	[136,58; 137,72]										
		Median	140,00	139,00	140,00	136,00	135,00	135,00	138,00	135,00	136,00	136,00										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8389</i>	<i>7613</i>	<i>7007</i>	<i>6467</i>	<i>5963</i>	<i>5639</i>	<i>5337</i>	<i>5066</i>	<i>4812</i>	<i>4562</i>										
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5398	4882	4496	4090	3852	3664	3467	3307	3150											
	auswertbar	Anzahl	5398	4695	4371	4015	3765	3587	3385	3240	3053											
		Mean	141,37	138,71	137,87	137,66	137,35	138,04	137,56	137,48	136,99											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[140,89; 141,84]	[138,23; 139,20]	[137,39; 138,36]	[137,16; 138,16]	[136,82; 137,88]	[137,51; 138,58]	[137,01; 138,12]	[136,92; 138,04]	[136,43; 137,55]											
		Median	140,00	140,00	139,00	138,00	135,00	137,00	135,00	137,00	135,00	135,00										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7991</i>	<i>7129</i>	<i>6531</i>	<i>5915</i>	<i>5541</i>	<i>5255</i>	<i>4980</i>	<i>4749</i>	<i>4526</i>											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3751	3377	3024	2781	2627	2485	2382	2277												
	auswertbar	Anzahl	3751	3303	2971	2737	2592	2439	2330	2202												
		Mean	139,27	137,78	137,40	137,38	137,36	136,41	137,39	136,71												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[138,72; 139,83]	[137,21; 138,34]	[136,81; 137,99]	[136,77; 138,00]	[136,73; 137,99]	[135,75; 137,07]	[136,73; 138,05]	[136,02; 137,39]												
		Median	140,00	138,00	135,00	137,00	135,00	135,00	135,00	135,00												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5478</i>	<i>4861</i>	<i>4331</i>	<i>3979</i>	<i>3742</i>	<i>3521</i>	<i>3355</i>	<i>3184</i>												
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4862	4260	3879	3578	3355	3166	2998													
	auswertbar	Anzahl	4862	4166	3802	3515	3293	3109	2928													
		Mean	139,87	137,43	136,78	137,38	136,33	136,95	136,56													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[139,36; 140,37]	[136,92; 137,94]	[136,26; 137,30]	[136,83; 137,92]	[135,78; 136,89]	[136,39; 137,51]	[135,97; 137,16]													
		Median	140,00	136,00	135,00	137,00	135,00	135,00	135,00													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7410</i>	<i>6403</i>	<i>5754</i>	<i>5274</i>	<i>4921</i>	<i>4642</i>	<i>4377</i>													
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3954	3559	3256	2998	2801	2647														
	auswertbar	Anzahl	3954	3495	3211	2948	2764	2602														
		Mean	140,14	137,43	137,32	136,77	137,43	136,69														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[139,59; 140,69]	[136,87; 137,99]	[136,77; 137,88]	[136,18; 137,36]	[136,83; 138,03]	[136,07; 137,31]														
		Median	140,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6033</i>	<i>5345</i>	<i>4842</i>	<i>4441</i>	<i>4119</i>	<i>3868</i>														
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4755	4285	3932	3628	3386															
	auswertbar	Anzahl	4755	4225	3869	3550	3304															
		Mean	140,22	137,82	136,75	137,48	136,94															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[139,70; 140,74]	[137,32; 138,33]	[136,24; 137,25]	[136,95; 138,01]	[136,38; 137,50]															
		Median	140,00	136,00	135,00	137,00	135,00															
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7135</i>	<i>6329</i>	<i>5760</i>	<i>5285</i>	<i>4909</i>															

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4365	3966	3607	3323														
	auswertbar	Anzahl	4365	3907	3547	3256														
		Mean	139,24	136,77	137,42	136,88														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[138,71; 139,78]	[136,25; 137,29]	[136,87; 137,97]	[136,33; 137,44]														
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6587</i>	<i>5883</i>	<i>5295</i>	<i>4850</i>														
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4747	4261	3892															
	auswertbar	Anzahl	4747	4180	3794															
		Mean	139,51	137,51	136,66															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[139,01; 140,00]	[137,00; 138,02]	[136,16; 137,16]															
		Median	140,00	135,00	135,00															
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7063</i>	<i>6259</i>	<i>5666</i>															
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4078	3629																
	auswertbar	Anzahl	4078	3558																
		Mean	139,05	137,07																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[138,51; 139,60]	[136,51; 137,62]																
		Median	140,00	135,00																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6247</i>	<i>5493</i>																
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4270																	
	auswertbar	Anzahl	4270																	
		Mean	139,60																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[139,08; 140,13]																	
		Median	140,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6485</i>																	

In Tabelle A.3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutraf:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für - - Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei - - mmHg, der Median bei - - mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei - - und der Median bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2442	2022	1724	1483	1278	1140	1034	956	922	894	864	837	802	758	736	709	685	657
	auswertbar	Anzahl	2442	1867	1673	1445	1260	1121	1018	925	890	862	846	817	786	746	727	702	676	641
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,22	80,81	80,75	79,99	79,47	79,61	79,02	78,99	79,05	78,59	79,01	78,36	77,68	78,21	77,74	77,90	78,08	77,81
		CI Mean	[81,86; 82,58]	[80,43; 81,18]	[80,35; 81,15]	[79,55; 80,44]	[79,00; 79,95]	[79,14; 80,07]	[78,53; 79,51]	[78,48; 79,50]	[78,53; 79,57]	[78,03; 79,15]	[78,44; 79,58]	[77,78; 78,93]	[77,05; 78,32]	[77,61; 78,81]	[77,11; 78,36]	[77,28; 78,53]	[77,38; 78,77]	[77,14; 78,49]
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3307</i>	<i>2737</i>	<i>2345</i>	<i>2019</i>	<i>1724</i>	<i>1531</i>	<i>1382</i>	<i>1281</i>	<i>1241</i>	<i>1201</i>	<i>1164</i>	<i>1128</i>	<i>1081</i>	<i>1025</i>	<i>993</i>	<i>960</i>	<i>932</i>	<i>891</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5726	4870	4079	3493	3161	2861	2594	2472	2386	2318	2214	2117	2034	1963	1877	1794	1720	
	auswertbar	Anzahl	5726	4372	3894	3404	3115	2806	2460	2335	2267	2259	2176	2089	2000	1929	1840	1760	1672	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,08	80,76	80,37	80,34	79,86	79,86	79,01	79,10	79,01	79,22	78,83	78,94	78,59	78,52	78,39	78,50	78,04	
		CI Mean	[81,84; 82,32]	[80,50; 81,03]	[80,09; 80,65]	[80,05; 80,64]	[79,54; 80,17]	[79,53; 80,19]	[78,67; 79,36]	[78,74; 79,46]	[78,66; 79,37]	[78,86; 79,58]	[78,45; 79,21]	[78,57; 79,31]	[78,21; 78,97]	[78,13; 78,90]	[77,98; 78,80]	[78,09; 78,91]	[77,63; 78,46]	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8312</i>	<i>7014</i>	<i>5871</i>	<i>4997</i>	<i>4514</i>	<i>4057</i>	<i>3685</i>	<i>3509</i>	<i>3388</i>	<i>3283</i>	<i>3151</i>	<i>3010</i>	<i>2901</i>	<i>2813</i>	<i>2686</i>	<i>2571</i>	<i>2470</i>		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	7112	6088	5145	4515	3993	3664	3522	3361	3210	3066	2916	2781	2664	2570	2475	2363		
	auswertbar	Anzahl	7112	5694	4999	4384	3904	3496	3367	3199	3127	2996	2863	2738	2631	2529	2437	2319		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,67	81,48	81,19	80,83	80,36	79,92	79,96	79,58	79,70	79,33	79,56	79,14	79,48	79,05	79,19	78,61		
		CI Mean	[82,45; 82,89]	[81,23; 81,72]	[80,95; 81,44]	[80,58; 81,09]	[80,09; 80,63]	[79,63; 80,21]	[79,67; 80,26]	[79,28; 79,87]	[79,40; 80,01]	[79,02; 79,64]	[79,24; 79,89]	[78,82; 79,47]	[79,14; 79,82]	[78,69; 79,40]	[78,84; 79,54]	[78,24; 78,98]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9837</i>	<i>8360</i>	<i>7041</i>	<i>6159</i>	<i>5409</i>	<i>4943</i>	<i>4738</i>	<i>4526</i>	<i>4310</i>	<i>4120</i>	<i>3919</i>	<i>3749</i>	<i>3604</i>	<i>3474</i>	<i>3353</i>	<i>3207</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5688	4915	4288	3718	3375	3194	3055	2922	2793	2662	2572	2474	2378	2283	2192			
	auswertbar	Anzahl	5688	4686	4125	3607	3222	3029	2903	2830	2731	2615	2512	2425	2332	2232	2135			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	83,02	81,61	81,37	80,76	80,55	80,30	79,75	79,78	79,64	79,86	79,32	79,40	78,92	79,42	78,79			
		CI Mean	[82,77; 83,27]	[81,36; 81,86]	[81,09; 81,64]	[80,47; 81,05]	[80,24; 80,86]	[79,98; 80,62]	[79,43; 80,08]	[79,45; 80,12]	[79,30; 79,98]	[79,51; 80,21]	[78,97; 79,67]	[79,04; 79,76]	[78,55; 79,28]	[79,04; 79,79]	[78,40; 79,17]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8018</i>	<i>6858</i>	<i>5970</i>	<i>5133</i>	<i>4634</i>	<i>4363</i>	<i>4170</i>	<i>3977</i>	<i>3799</i>	<i>3614</i>	<i>3479</i>	<i>3354</i>	<i>3226</i>	<i>3091</i>	<i>2976</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6881	6104	5326	4757	4458	4219	4008	3804	3575	3428	3291	3166	3039	2915				
	auswertbar	Anzahl	6881	5750	5128	4478	4204	3963	3866	3699	3492	3348	3220	3090	2974	2855				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,37	81,15	80,91	80,33	80,22	79,49	80,13	79,74	79,53	79,47	79,24	79,04	79,19	79,10				
		CI Mean	[82,15; 82,59]	[80,92; 81,38]	[80,67; 81,15]	[80,07; 80,60]	[79,96; 80,48]	[79,22; 79,77]	[79,85; 80,42]	[79,47; 80,02]	[79,24; 79,82]	[79,17; 79,77]	[78,94; 79,55]	[78,73; 79,35]	[78,87; 79,51]	[78,77; 79,44]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9648</i>	<i>8512</i>	<i>7365</i>	<i>6521</i>	<i>6114</i>	<i>5773</i>	<i>5474</i>	<i>5197</i>	<i>4896</i>	<i>4686</i>	<i>4496</i>	<i>4320</i>	<i>4150</i>	<i>3980</i>					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6572	5677	5013	4666	4423	4190	3982	3735	3550	3399	3251	3099	2975					
	auswertbar	Anzahl	6572	5463	4714	4419	4181	4037	3882	3628	3465	3330	3173	3040	2882					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,60	81,21	80,59	80,54	79,92	80,01	79,71	79,96	79,76	79,63	79,14	79,29	78,97					
		CI Mean	[82,37; 82,83]	[80,97; 81,45]	[80,34; 80,85]	[80,27; 80,80]	[79,66; 80,18]	[79,74; 80,29]	[79,44; 79,99]	[79,67; 80,24]	[79,46; 80,06]	[79,33; 79,94]	[78,83; 79,45]	[78,96; 79,62]	[78,64; 79,30]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9210</i>	<i>7848</i>	<i>6861</i>	<i>6353</i>	<i>6004</i>	<i>5676</i>	<i>5383</i>	<i>5051</i>	<i>4802</i>	<i>4597</i>	<i>4387</i>	<i>4190</i>	<i>4027</i>						

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5780	5172	4735	4457	4224	4009	3749	3548	3388	3238	3118	2986						
	auswertbar	Anzahl	5780	4869	4483	4242	4047	3899	3658	3455	3305	3172	3051	2901						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,17	81,11	80,87	80,29	80,42	79,85	80,26	79,72	80,10	79,40	79,74	79,45						
		CI Mean	[81,93; 82,42]	[80,86; 81,36]	[80,61; 81,13]	[80,03; 80,55]	[80,14; 80,69]	[79,58; 80,13]	[79,98; 80,54]	[79,43; 80,01]	[79,79; 80,42]	[79,09; 79,70]	[79,43; 80,06]	[79,12; 79,78]						
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8313</i>	<i>7352</i>	<i>6684</i>	<i>6243</i>	<i>5894</i>	<i>5567</i>	<i>5202</i>	<i>4924</i>	<i>4688</i>	<i>4472</i>	<i>4302</i>	<i>4114</i>							
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	6602	5991	5546	5178	4884	4560	4321	4096	3921	3743	3569							
	auswertbar	Anzahl	6602	5837	5379	4917	4729	4405	4166	3965	3777	3595	3419							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,15	81,06	80,23	80,63	80,21	80,12	79,85	79,93	79,47	80,05	79,36							
		CI Mean	[81,92; 82,38]	[80,83; 81,29]	[79,99; 80,47]	[80,39; 80,88]	[79,96; 80,47]	[79,86; 80,38]	[79,59; 80,11]	[79,67; 80,20]	[79,19; 79,74]	[79,76; 80,33]	[79,07; 79,66]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9461</i>	<i>8488</i>	<i>7804</i>	<i>7235</i>	<i>6798</i>	<i>6334</i>	<i>6008</i>	<i>5716</i>	<i>5480</i>	<i>5235</i>	<i>4999</i>								
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5787	5301	4922	4563	4218	3994	3784	3610	3431	3255								
	auswertbar	Anzahl	5787	5192	4691	4439	4127	3909	3696	3511	3348	3155								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,98	80,57	80,71	80,33	80,33	80,14	80,15	79,66	79,90	79,55								
		CI Mean	[81,74; 82,23]	[80,33; 80,81]	[80,46; 80,97]	[80,07; 80,59]	[80,07; 80,60]	[79,86; 80,41]	[79,86; 80,44]	[79,38; 79,95]	[79,60; 80,20]	[79,24; 79,87]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>8389</i>	<i>7613</i>	<i>7007</i>	<i>6467</i>	<i>5963</i>	<i>5639</i>	<i>5337</i>	<i>5066</i>	<i>4812</i>	<i>4562</i>									
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	5398	4882	4496	4090	3852	3664	3467	3307	3150									
	auswertbar	Anzahl	5398	4695	4371	4015	3765	3587	3385	3240	3053									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,59	81,44	80,78	80,81	80,58	80,71	80,35	80,30	80,13									
		CI Mean	[82,32; 82,86]	[81,17; 81,71]	[80,51; 81,05]	[80,53; 81,08]	[80,28; 80,87]	[80,41; 81,01]	[80,05; 80,66]	[79,99; 80,61]	[79,81; 80,45]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7991</i>	<i>7129</i>	<i>6531</i>	<i>5915</i>	<i>5541</i>	<i>5255</i>	<i>4980</i>	<i>4749</i>	<i>4526</i>										
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3751	3377	3024	2781	2627	2485	2382	2277										
	auswertbar	Anzahl	3751	3303	2971	2737	2592	2439	2330	2202										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,87	80,81	80,97	80,28	80,36	79,69	80,13	79,79										
		CI Mean	[81,57; 82,18]	[80,50; 81,12]	[80,65; 81,29]	[79,94; 80,62]	[80,01; 80,72]	[79,33; 80,05]	[79,75; 80,50]	[79,41; 80,16]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5478</i>	<i>4861</i>	<i>4331</i>	<i>3979</i>	<i>3742</i>	<i>3521</i>	<i>3355</i>	<i>3184</i>											
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4862	4260	3879	3578	3355	3166	2998											
	auswertbar	Anzahl	4862	4166	3802	3515	3293	3109	2928											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,08	80,79	80,40	80,61	79,72	80,22	79,89											
		CI Mean	[81,80; 82,36]	[80,50; 81,08]	[80,11; 80,70]	[80,31; 80,91]	[79,41; 80,03]	[79,90; 80,55]	[79,55; 80,23]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7410</i>	<i>6403</i>	<i>5754</i>	<i>5274</i>	<i>4921</i>	<i>4642</i>	<i>4377</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	3954	3559	3256	2998	2801	2647												
	auswertbar	Anzahl	3954	3495	3211	2948	2764	2602												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,44	80,96	80,72	80,29	80,67	80,05												
		CI Mean	[82,13; 82,75]	[80,65; 81,27]	[80,40; 81,05]	[79,96; 80,62]	[80,33; 81,01]	[79,70; 80,40]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6033</i>	<i>5345</i>	<i>4842</i>	<i>4441</i>	<i>4119</i>	<i>3868</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4755	4285	3932	3628	3386													
	auswertbar	Anzahl	4755	4225	3869	3550	3304													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,02	80,88	80,29	80,51	80,40													
		CI Mean	[81,74; 82,30]	[80,60; 81,17]	[80,00; 80,59]	[80,21; 80,82]	[80,08; 80,72]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7135</i>	<i>6329</i>	<i>5760</i>	<i>5285</i>	<i>4909</i>														



EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4365	3966	3607	3323																
	auswertbar	Anzahl	4365	3907	3547	3256																
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,08	80,71	80,90	80,39																
		CI Mean	[81,78; 82,37]	[80,42; 80,99]	[80,59; 81,21]	[80,07; 80,71]																
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6587</i>	<i>5883</i>	<i>5295</i>	<i>4850</i>																
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4747	4261	3892																	
	auswertbar	Anzahl	4747	4180	3794																	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,08	81,03	80,46																	
		CI Mean	[81,80; 82,36]	[80,75; 81,31]	[80,15; 80,76]																	
		Median	80,00	80,00	80,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7063</i>	<i>6259</i>	<i>5666</i>																	
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4078	3629																		
	auswertbar	Anzahl	4078	3558																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,96	80,82																		
		CI Mean	[81,65; 82,26]	[80,51; 81,13]																		
		Median	80,00	80,00																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6247</i>	<i>5493</i>																		
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	4270																			
	auswertbar	Anzahl	4270																			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,32																			
		CI Mean	[82,03; 82,62]																			
		Median	80,00																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6485</i>																			

### A.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensiviertere Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

In Tabelle A.3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - - %; der Median lag bei - - %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - - %; der Median lag bei - - %, der dafür auswertbaren Patienten.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Fallbasis mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Mittlere Differenz zur ED	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Median mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3307	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891	
	auswertbar	Anzahl	3307	2522	2277	1968	1697	1507	1363	1236	1194	1158	1142	1102	1060	1009	980	947	919	866	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,22	7,05	7,01	7,06	7,00	7,13	7,05	7,11	7,10	7,12	7,06	7,11	7,13	7,19	7,17	7,26	7,25	7,28	
		CI Mean	[7,17; 7,26]	[7,01; 7,10]	[6,96; 7,05]	[7,02; 7,11]	[6,95; 7,05]	[7,07; 7,18]	[7,00; 7,10]	[7,05; 7,17]	[7,04; 7,16]	[7,06; 7,18]	[7,01; 7,12]	[7,05; 7,17]	[7,07; 7,19]	[7,13; 7,25]	[7,11; 7,23]	[7,19; 7,32]	[7,18; 7,32]	[7,21; 7,35]	
		Median	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	6,90	7,00	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	
		Fallbasis mittlere Differenz		2522	2277	1968	1697	1507	1363	1236	1194	1158	1142	1102	1060	1009	980	947	919	866	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,16	-0,09	-0,13	-0,01	-0,07	-0,01	-0,03	0,01	-0,01	0,04	0,07	0,11	0,10	0,19	0,18	0,21	
		CI mittlere Differenz		[-0,18; -0,10]	[-0,21; -0,12]	[-0,14; -0,05]	[-0,18; -0,07]	[-0,07; -0,05]	[-0,13; -0,00]	[-0,07; -0,06]	[-0,10; -0,04]	[-0,06; -0,08]	[-0,04; -0,11]	[0,00; 0,14]	[0,04; 0,19]	[0,02; 0,18]	[0,11; 0,27]	[0,09; 0,26]	[0,12; 0,30]		
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20			
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	8312	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470		
	auswertbar	Anzahl	8302	6253	5592	4864	4429	3980	3507	3325	3228	3196	3086	2974	2850	2763	2638	2523	2399		
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,23	7,01	7,08	6,99	7,09	7,06	7,07	7,05	7,09	7,04	7,12	7,13	7,17	7,14	7,21	7,19	7,26		
		CI Mean	[7,20; 7,26]	[6,98; 7,04]	[7,05; 7,11]	[6,95; 7,02]	[7,06; 7,13]	[7,02; 7,09]	[7,03; 7,10]	[7,02; 7,09]	[7,05; 7,13]	[7,00; 7,07]	[7,08; 7,15]	[7,09; 7,17]	[7,13; 7,21]	[7,11; 7,18]	[7,17; 7,25]	[7,15; 7,23]	[7,22; 7,31]		
		Median	7,00	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,10		
		Fallbasis mittlere Differenz		6246	5585	4858	4424	3975	3502	3325	3192	3082	2971	2847	2760	2635	2520	2396			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,18	-0,08	-0,16	-0,04	-0,07	-0,04	-0,06	-0,02	-0,07	0,01	0,01	0,06	0,03	0,10	0,08	0,15		
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,15]	[-0,11; -0,05]	[-0,19; -0,13]	[-0,07; -0,00]	[-0,11; -0,03]	[-0,08; -0,00]	[-0,10; -0,02]	[-0,06; -0,02]	[-0,12; -0,03]	[-0,04; -0,06]	[-0,03; -0,06]	[0,01; 0,11]	[-0,02; 0,08]	[0,05; 0,15]	[0,03; 0,13]	[0,10; 0,20]		
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207			
	auswertbar	Anzahl	9829	7772	6838	5981	5289	4727	4535	4318	4187	4030	3856	3692	3554	3413	3302	3146			
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,20	7,02	6,88	7,00	6,96	7,00	7,00	7,01	6,96	7,06	7,04	7,08	7,09	7,18	7,13	7,18			
		CI Mean	[7,18; 7,23]	[6,99; 7,04]	[6,85; 6,91]	[6,97; 7,03]	[6,93; 6,99]	[6,97; 7,03]	[6,97; 7,03]	[6,98; 7,04]	[6,93; 6,99]	[7,02; 7,09]	[7,01; 7,08]	[7,05; 7,12]	[7,06; 7,12]	[7,14; 7,22]	[7,09; 7,17]	[7,14; 7,22]			
		Median	6,90	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	7,00	7,00			
		Fallbasis mittlere Differenz		7768	6836	5979	5288	4727	4535	4318	4187	4030	3856	3692	3554	3413	3302	3146			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,23	-0,09	-0,11	-0,06	-0,05	-0,05	-0,10	0,00	-0,01	0,03	0,04	0,13	0,09	0,14			
		CI mittlere Differenz		[-0,17; -0,12]	[-0,26; -0,21]	[-0,12; -0,06]	[-0,14; -0,08]	[-0,10; -0,03]	[-0,09; -0,02]	[-0,09; -0,01]	[-0,13; -0,06]	[-0,04; -0,04]	[-0,05; -0,03]	[-0,02; -0,07]	[0,00; 0,08]	[0,09; 0,18]	[0,04; 0,13]	[0,09; 0,19]			
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976				
	auswertbar	Anzahl	8007	6519	5725	4971	4417	4146	3960	3852	3704	3537	3394	3281	3159	3022	2892				
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,29	6,89	6,96	6,92	6,96	6,95	6,97	6,96	7,05	7,02	7,10	7,08	7,17	7,13	7,17				
		CI Mean	[7,26; 7,33]	[6,86; 6,91]	[6,93; 6,99]	[6,89; 6,95]	[6,93; 6,99]	[6,92; 6,98]	[6,94; 7,01]	[6,92; 6,99]	[7,01; 7,08]	[6,98; 7,05]	[7,06; 7,13]	[7,04; 7,12]	[7,13; 7,21]	[7,09; 7,17]	[7,13; 7,22]				
		Median	6,90	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		6510	5717	4965	4412	4140	3954	3846	3698	3533	3390	3277	3155	3018	2888				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,35	-0,24	-0,25	-0,21	-0,21	-0,18	-0,18	-0,09	-0,11	-0,03	-0,05	0,04	0,00	0,05				
		CI mittlere Differenz		[-0,37; -0,32]	[-0,27; -0,21]	[-0,28; -0,22]	[-0,25; -0,17]	[-0,25; -0,17]	[-0,22; -0,14]	[-0,22; -0,14]	[-0,13; -0,05]	[-0,15; -0,06]	[-0,08; -0,01]	[-0,10; -0,01]	[-0,01; 0,09]	[-0,05; 0,05]	[0,00; 0,10]				
Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10						

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9648	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980					
	auswertbar	Anzahl	9634	7991	7065	6148	5776	5434	5281	5060	4786	4578	4403	4220	4063	3894					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	7,03	6,97	7,00	6,97	6,99	6,99	6,99	7,08	7,06	7,13	7,13	7,20	7,17	7,22				
		CI Mean	[7,15; 7,21]	[7,01; 7,06]	[6,94; 7,00]	[6,97; 7,03]	[6,94; 7,00]	[6,97; 7,02]	[6,96; 7,02]	[7,05; 7,12]	[7,03; 7,10]	[7,10; 7,17]	[7,09; 7,16]	[7,16; 7,23]	[7,14; 7,21]	[7,18; 7,26]					
		Median	6,90	6,80	6,80	6,80	6,70	6,80	6,70	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		7981	7058	6140	5770	5428	5276	5057	4783	4575	4400	4217	4061	3892					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,13	-0,15	-0,10	-0,12	-0,07	-0,09	0,01	0,00	0,06	0,07	0,15	0,13	0,18					
		CI mittlere Differenz		[-0,15; -0,10]	[-0,18; -0,12]	[-0,13; -0,07]	[-0,15; -0,08]	[-0,11; -0,04]	[-0,13; -0,06]	[-0,03; 0,05]	[-0,04; 0,03]	[0,02; 0,10]	[0,03; 0,11]	[0,11; 0,19]	[0,09; 0,17]	[0,13; 0,22]					
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20							
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9210	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027						
	auswertbar	Anzahl	9193	7522	6436	6002	5669	5458	5249	4902	4685	4491	4277	4102	3890						
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,22	6,95	6,98	6,95	6,96	6,92	7,02	7,02	7,10	7,10	7,18	7,15	7,19						
		CI Mean	[7,19; 7,25]	[6,93; 6,98]	[6,95; 7,01]	[6,93; 6,98]	[6,93; 6,99]	[6,89; 6,94]	[6,99; 7,05]	[6,99; 7,05]	[7,07; 7,13]	[7,07; 7,14]	[7,15; 7,22]	[7,11; 7,18]	[7,16; 7,23]						
		Median	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		7509	6427	5994	5663	5453	5244	4899	4682	4489	4275	4100	3888						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,22	-0,16	-0,17	-0,16	-0,19	-0,08	-0,08	0,00	0,01	0,09	0,05	0,11						
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,19]	[-0,19; -0,13]	[-0,20; -0,14]	[-0,19; -0,13]	[-0,22; -0,16]	[-0,12; -0,05]	[-0,12; -0,05]	[-0,04; 0,04]	[-0,03; 0,04]	[0,05; 0,13]	[0,01; 0,09]	[0,06; 0,15]						
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20							
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8313	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114							
	auswertbar	Anzahl	8291	6925	6323	5925	5627	5401	5076	4786	4573	4365	4195	3993							
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,12	6,95	6,92	6,92	6,91	7,01	6,98	7,06	7,04	7,12	7,09	7,13							
		CI Mean	[7,09; 7,15]	[6,92; 6,98]	[6,89; 6,95]	[6,89; 6,95]	[6,88; 6,94]	[6,98; 7,04]	[6,95; 7,01]	[7,02; 7,09]	[7,01; 7,07]	[7,09; 7,16]	[7,05; 7,12]	[7,10; 7,17]							
		Median	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90							
		Fallbasis mittlere Differenz		6912	6312	5913	5617	5388	5065	4775	4563	4355	4185	3984							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,13	-0,13	-0,12	-0,12	-0,02	-0,05	0,03	0,02	0,11	0,08	0,12							
		CI mittlere Differenz		[-0,16; -0,11]	[-0,16; -0,10]	[-0,15; -0,09]	[-0,16; -0,09]	[-0,05; 0,01]	[-0,08; -0,02]	[-0,01; 0,06]	[-0,02; 0,05]	[0,07; 0,14]	[0,04; 0,11]	[0,08; 0,17]							
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10									
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9461	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999								
	auswertbar	Anzahl	9447	8219	7542	6828	6543	6094	5770	5513	5258	5005	4758								
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,13	6,87	6,86	6,82	6,92	6,90	6,97	6,98	7,08	7,05	7,10								
		CI Mean	[7,10; 7,16]	[6,85; 6,90]	[6,84; 6,89]	[6,80; 6,85]	[6,89; 6,94]	[6,88; 6,93]	[6,94; 7,00]	[6,95; 7,01]	[7,05; 7,11]	[7,02; 7,08]	[7,07; 7,13]								
		Median	6,80	6,60	6,60	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80								
		Fallbasis mittlere Differenz		8209	7531	6820	6536	6087	5764	5508	5253	5000	4755								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,23	-0,22	-0,24	-0,15	-0,16	-0,09	-0,08	0,03	0,01	0,07								
		CI mittlere Differenz		[-0,25; -0,21]	[-0,25; -0,19]	[-0,27; -0,21]	[-0,18; -0,12]	[-0,19; -0,13]	[-0,12; -0,05]	[-0,11; -0,05]	[0,00; 0,07]	[-0,03; 0,05]	[0,03; 0,11]								
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10										
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8389	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562									
	auswertbar	Anzahl	8385	7431	6637	6279	5824	5509	5200	4909	4692	4413									
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,09	6,85	6,82	6,91	6,88	6,96	6,95	7,04	7,03	7,06									
		CI Mean	[7,06; 7,12]	[6,82; 6,87]	[6,79; 6,84]	[6,88; 6,93]	[6,85; 6,90]	[6,93; 6,99]	[6,92; 6,98]	[7,01; 7,07]	[6,99; 7,06]	[7,02; 7,09]									
		Median	6,70	6,60	6,60	6,60	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80									
		Fallbasis mittlere Differenz		7428	6635	6277	5822	5507	5198	4907	4690	4411									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,22	-0,13	-0,14	-0,05	-0,06	0,04	0,02	0,06									
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,19]	[-0,25; -0,19]	[-0,16; -0,10]	[-0,17; -0,11]	[-0,09; -0,02]	[-0,09; -0,02]	[0,01; 0,08]	[-0,02; 0,06]	[0,02; 0,10]									
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10											
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7991	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526										
	auswertbar	Anzahl	7973	6804	6325	5770	5403	5134	4844	4632	4366										
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14	6,79	6,85	6,83	6,90	6,90	7,00	6,97	7,02										
		CI Mean	[7,11; 7,17]	[6,76; 6,81]	[6,82; 6,88]	[6,80; 6,86]	[6,87; 6,93]	[6,87; 6,93]	[6,97; 7,04]	[6,94; 7,00]	[6,98; 7,05]										
		Median	6,70	6,50	6,60	6,60	6,60	6,60	6,70	6,70	6,80										
		Fallbasis mittlere Differenz		6791	6312	5758	5394	5126	4837	4624	4359										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,32	-0,22	-0,23	-0,15	-0,13	-0,03	-0,06	-0,01										
		CI mittlere Differenz		[-0,34; -0,29]	[-0,25; -0,19]	[-0,27; -0,20]	[-0,18; -0,11]	[-0,17; -0,10]	[-0,06; 0,01]	[-0,10; -0,02]	[-0,05; 0,03]										
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10												

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	5478	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184												
	auswertbar	Anzahl	5454	4745	4241	3906	3683	3451	3278	3085												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,03	6,84	6,81	6,89	6,89	6,98	6,95	6,96												
		CI Mean	[6,99; 7,07]	[6,81; 6,87]	[6,78; 6,85]	[6,86; 6,92]	[6,86; 6,93]	[6,95; 7,02]	[6,91; 6,98]	[6,92; 7,00]												
		Median	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,70	6,70	6,70												
		Fallbasis mittlere Differenz		4735	4232	3897	3674	3442	3269	3077												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,18	-0,10	-0,09	0,01	-0,01	0,01												
		CI mittlere Differenz		[-0,20; -0,13]	[-0,22; -0,15]	[-0,14; -0,06]	[-0,13; -0,04]	[-0,03; 0,06]	[-0,06; 0,03]	[-0,04; 0,06]												
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7410	6403	5754	5274	4921	4642	4377													
	auswertbar	Anzahl	7396	6255	5635	5177	4818	4550	4262													
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,23	6,86	6,90	6,89	7,00	6,97	7,02													
		CI Mean	[7,19; 7,26]	[6,83; 6,89]	[6,87; 6,93]	[6,86; 6,92]	[6,96; 7,03]	[6,93; 7,00]	[6,98; 7,05]													
		Median	6,80	6,50	6,60	6,60	6,70	6,70	6,70													
		Fallbasis mittlere Differenz		6247	5628	5172	4814	4545	4258													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,33	-0,26	-0,25	-0,14	-0,14	-0,08													
		CI mittlere Differenz		[-0,36; -0,30]	[-0,30; -0,23]	[-0,29; -0,21]	[-0,17; -0,10]	[-0,18; -0,11]	[-0,13; -0,04]													
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00													
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6033	5345	4842	4441	4119	3868														
	auswertbar	Anzahl	6019	5248	4765	4352	4052	3790														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,19	6,90	6,87	6,97	6,95	6,97														
		CI Mean	[7,15; 7,22]	[6,87; 6,93]	[6,84; 6,91]	[6,93; 7,00]	[6,91; 6,98]	[6,94; 7,01]														
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,70	6,70														
		Fallbasis mittlere Differenz		5235	4753	4342	4043	3782														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,24	-0,25	-0,15	-0,15	-0,12														
		CI mittlere Differenz		[-0,27; -0,21]	[-0,28; -0,21]	[-0,19; -0,11]	[-0,20; -0,11]	[-0,17; -0,08]														
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00														
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7135	6329	5760	5285	4909															
	auswertbar	Anzahl	7123	6245	5652	5180	4795															
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,26	6,88	6,93	6,91	6,92															
		CI Mean	[7,23; 7,30]	[6,85; 6,90]	[6,90; 6,96]	[6,87; 6,94]	[6,88; 6,95]															
		Median	6,80	6,60	6,60	6,60	6,60															
		Fallbasis mittlere Differenz		6235	5642	5171	4786															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,35	-0,27	-0,27	-0,24															
		CI mittlere Differenz		[-0,38; -0,32]	[-0,30; -0,23]	[-0,31; -0,24]	[-0,28; -0,20]															
		Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	-0,10															
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6587	5883	5295	4850																
	auswertbar	Anzahl	6573	5796	5208	4742																
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,19	6,95	6,87	6,90																
		CI Mean	[7,15; 7,22]	[6,92; 6,98]	[6,84; 6,90]	[6,86; 6,93]																
		Median	6,70	6,60	6,60	6,60																
		Fallbasis mittlere Differenz		5784	5198	4734																
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,25	-0,21																
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,18]	[-0,28; -0,22]	[-0,25; -0,17]																
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10																
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7063	6259	5666																	
	auswertbar	Anzahl	7044	6131	5518																	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,27	6,84	6,84																	
		CI Mean	[7,23; 7,31]	[6,81; 6,87]	[6,81; 6,87]																	
		Median	6,80	6,50	6,50																	
		Fallbasis mittlere Differenz		6117	5504																	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,40	-0,35																	
		CI mittlere Differenz		[-0,43; -0,37]	[-0,39; -0,32]																	
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10																	

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr					
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6247	5493																					
	auswertbar	Anzahl	6229	5369																					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,20	6,82																					
		CI Mean	[7,16; 7,24]	[6,79; 6,85]																					
		Median	6,70	6,50																					
		Fallbasis mittlere Differenz		5353																					
		Mittlere Differenz zur ED			-0,35																				
		CI mittlere Differenz			[-0,38; -0,32]																				
		Median mittlere Differenz			-0,10																				
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6485																						
	auswertbar	Anzahl	6469																						
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,28																						
		CI Mean	[7,24; 7,32]																						
		Median	6,70																						
		Fallbasis mittlere Differenz																							
		Mittlere Differenz zur ED																							
		CI mittlere Differenz																							
		Median mittlere Differenz																							

In Tabelle A.3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalb-jahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalb-jahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalb-jahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halb-jahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. - - Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalb-jahr wurden dieser Kategorie - - Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle A.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte**

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3307	2737	2345	2019	1724	1531	1382	1281	1241	1201	1164	1128	1081	1025	993	960	932	891	
	auswertbar	Anzahl	3307	2522	2277	1968	1697	1507	1363	1236	1194	1158	1142	1102	1060	1009	980	947	919	866	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	448	438	363	261	242	157	153	138	136	120	125	109	102	80	90	74	78	55	
		Anteil in %	13,55	17,37	15,94	13,26	14,26	10,42	11,23	11,17	11,39	10,36	10,95	9,89	9,62	7,93	9,18	7,81	8,49	6,35	
		CI Anteil in %	[12,38; 14,71]	[15,89; 18,85]	[14,44; 17,45]	[11,76; 14,76]	[12,60; 15,92]	[8,88; 11,96]	[9,55; 12,90]	[9,41; 12,92]	[9,59; 13,19]	[8,61; 12,12]	[9,13; 12,76]	[8,13; 11,65]	[7,85; 11,40]	[6,26; 9,60]	[7,37; 10,99]	[6,10; 9,52]	[6,68; 10,29]	[4,73; 7,98]	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	1847	1430	1361	1204	1069	971	901	757	729	724	727	698	674	643	623	573	560	531	
		Anteil in %	55,85	56,70	59,77	61,18	62,99	64,43	66,10	61,25	61,06	62,52	63,66	63,34	63,58	63,73	63,57	60,51	60,94	61,32	
		CI Anteil in %	[54,16; 57,54]	[54,77; 58,64]	[57,76; 61,79]	[59,03; 63,33]	[60,70; 65,29]	[62,01; 66,85]	[63,59; 68,62]	[58,53; 63,96]	[58,29; 63,82]	[59,73; 65,31]	[60,87; 66,45]	[60,49; 66,19]	[60,69; 66,48]	[60,76; 66,69]	[60,56; 66,59]	[57,39; 63,62]	[57,78; 64,09]	[58,07; 64,56]	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	604	420	374	353	258	243	212	236	242	221	217	219	196	194	187	208	188	190	
		Anteil in %	18,26	16,65	16,43	17,94	15,20	16,12	15,55	19,09	20,27	19,08	19,00	19,87	18,49	19,23	19,08	21,96	20,46	21,94	
		CI Anteil in %	[16,95; 19,58]	[15,20; 18,11]	[14,90; 17,95]	[16,24; 19,63]	[13,49; 16,91]	[14,27; 17,98]	[13,63; 17,48]	[16,90; 21,29]	[17,99; 22,55]	[16,82; 21,35]	[16,73; 21,28]	[17,52; 22,23]	[16,15; 20,83]	[16,79; 21,66]	[16,62; 21,54]	[19,33; 24,60]	[17,85; 23,07]	[19,18; 24,70]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	290	171	144	122	101	100	69	90	65	73	59	58	72	77	63	75	74	70	
		Anteil in %	8,77	6,78	6,32	6,20	5,95	6,64	5,06	7,28	5,44	6,30	5,17	5,26	6,79	7,63	6,43	7,92	8,05	8,08	
		CI Anteil in %	[7,81; 9,73]	[5,80; 7,76]	[5,32; 7,32]	[5,13; 7,26]	[4,83; 7,08]	[5,38; 7,89]	[3,90; 6,23]	[5,83; 8,73]	[4,16; 6,73]	[4,90; 7,70]	[3,88; 6,45]	[3,94; 6,58]	[5,28; 8,31]	[5,99; 9,27]	[4,89; 7,96]	[6,20; 9,64]	[6,29; 9,81]	[6,27; 9,90]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	118	63	35	28	27	36	28	15	22	20	14	18	16	15	17	17	19	20		
	Anteil in %	3,57	2,50	1,54	1,42	1,59	2,39	2,05	1,21	1,84	1,73	1,23	1,63	1,51	1,49	1,73	1,80	2,07	2,31		
	CI Anteil in %	[2,94; 4,20]	[1,89; 3,11]	[1,03; 2,04]	[0,90; 1,95]	[1,00; 2,19]	[1,62; 3,16]	[1,30; 2,81]	[0,60; 1,82]	[1,08; 2,61]	[0,98; 2,48]	[0,59; 1,86]	[0,88; 2,38]	[0,78; 2,24]	[0,74; 2,23]	[0,92; 2,55]	[0,95; 2,64]	[1,15; 2,99]	[1,31; 3,31]		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8312	7014	5871	4997	4514	4057	3685	3509	3388	3283	3151	3010	2901	2813	2686	2571	2470	
	auswertbar	Anzahl	8302	6253	5592	4864	4429	3980	3507	3325	3228	3196	3086	2974	2850	2763	2638	2523	2399	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1296	1136	840	831	641	531	465	434	397	401	364	303	302	318	246	240	217	
		Anteil in %	15,61	18,17	15,02	17,08	14,47	13,34	13,26	13,05	12,30	12,55	11,80	10,19	10,60	11,51	9,33	9,51	9,05	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[14,83; 16,39]	[17,21; 19,12]	[14,08; 15,96]	[16,03; 18,14]	[13,44; 15,51]	[12,29; 14,40]	[12,14; 14,38]	[11,91; 14,20]	[11,17; 13,43]	[11,40; 13,70]	[10,66; 12,93]	[9,10; 11,28]	[9,47; 11,73]	[10,32; 12,70]	[8,22; 10,44]	[8,37; 10,66]	[7,90; 10,19]	
		Anzahl	4391	3587	3254	2877	2593	2475	2159	2043	1977	2037	1871	1857	1722	1650	1605	1561	1402	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	52,89	57,36	58,19	59,15	58,55	62,19	61,56	61,44	61,25	63,74	60,63	62,44	60,42	59,72	60,84	61,87	58,44	
		CI Anteil in %	[51,82; 53,96]	[56,14; 58,59]	[56,90; 59,48]	[57,77; 60,53]	[57,09; 60,00]	[60,68; 63,69]	[59,95; 63,17]	[59,79; 63,10]	[59,56; 62,93]	[62,07; 65,40]	[58,90; 62,35]	[60,70; 64,18]	[58,63; 62,22]	[57,89; 61,55]	[58,98; 62,70]	[59,98; 63,77]	[56,47; 60,41]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1470	937	934	734	769	634	589	590	579	515	593	565	547	543	531	477	514	
		Anteil in %	17,71	14,98	16,70	15,09	17,36	15,93	16,79	17,74	17,94	16,11	19,22	19,00	19,19	19,65	20,13	18,91	21,43	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,89; 18,53]	[14,10; 15,87]	[15,72; 17,68]	[14,08; 16,10]	[16,25; 18,48]	[14,79; 17,07]	[15,56; 18,03]	[16,45; 19,04]	[16,61; 19,26]	[14,84; 17,39]	[17,83; 20,61]	[17,59; 20,41]	[17,75; 20,64]	[18,17; 21,13]	[18,60; 21,66]	[17,38; 20,43]	[19,78; 23,07]	
		Anzahl	789	459	445	328	315	265	239	207	220	193	211	202	231	204	213	200	221	
		Anteil in %	9,50	7,34	7,96	6,74	7,11	6,66	6,81	6,23	6,82	6,04	6,84	6,79	8,11	7,38	8,07	7,93	9,21	
		CI Anteil in %	[8,87; 10,13]	[6,69; 7,99]	[7,25; 8,67]	[6,04; 7,45]	[6,36; 7,87]	[5,88; 7,43]	[5,98; 7,65]	[5,40; 7,05]	[5,95; 7,68]	[5,21; 6,86]	[5,95; 7,73]	[5,89; 7,70]	[7,10; 9,11]	[6,41; 8,36]	[7,03; 9,11]	[6,87; 8,98]	[8,05; 10,37]	
	Anzahl	356	134	119	94	111	75	55	51	55	50	47	47	48	48	43	45	45		
	Anteil in %	4,29	2,14	2,13	1,93	2,51	1,88	1,57	1,53	1,70	1,56	1,52	1,58	1,68	1,74	1,63	1,78	1,88		
	CI Anteil in %	[3,85; 4,72]	[1,78; 2,50]	[1,75; 2,51]	[1,55; 2,32]	[2,05; 2,97]	[1,46; 2,31]	[1,16; 1,98]	[1,12; 1,95]	[1,26; 2,15]	[1,13; 1,99]	[1,09; 1,96]	[1,13; 2,03]	[1,21; 2,16]	[1,25; 2,22]	[1,15; 2,11]	[1,27; 2,30]	[1,33; 2,42]		
	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207			
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9837	8360	7041	6159	5409	4943	4738	4526	4310	4120	3919	3749	3604	3474	3353	3207		
	auswertbar	Anzahl	9829	7772	6838	5981	5289	4727	4535	4318	4187	4030	3856	3692	3554	3413	3302	3146		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1652	1393	1404	960	842	742	698	662	643	522	474	434	401	318	336	325		
		Anteil in %	16,81	17,92	20,53	16,05	15,92	15,70	15,39	15,33	15,36	12,95	12,29	11,76	11,28	9,32	10,18	10,33		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[16,07; 17,55]	[17,07; 18,78]	[19,57; 21,49]	[15,12; 16,98]	[14,93; 16,91]	[14,66; 16,73]	[14,34; 16,44]	[14,26; 16,45]	[14,26; 16,45]	[11,92; 13,99]	[11,26; 13,33]	[10,72; 12,79]	[10,24; 12,32]	[8,34; 10,29]	[9,14; 11,21]	[9,27; 11,39]		
		Anzahl	5225	4416	4024	3602	3278	2865	2752	2649	2670	2530	2471	2318	2235	2139	2086	1889		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	53,16	56,82	58,85	60,22	61,98	60,61	60,68	61,35	63,77	62,78	64,08	62,78	62,89	62,67	63,17	60,04		
		CI Anteil in %	[52,17; 54,15]	[55,72; 57,92]	[57,68; 60,01]	[58,98; 61,46]	[60,67; 63,29]	[59,22; 62,00]	[59,26; 62,11]	[59,90; 62,80]	[62,31; 65,22]	[61,29; 64,27]	[62,57; 65,60]	[61,22; 64,34]	[61,30; 64,48]	[61,05; 64,30]	[61,53; 64,82]	[58,33; 61,76]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1602	1252	891	893	782	738	712	645	556	642	613	648	615	629	596	612		
		Anteil in %	16,30	16,11	13,03	14,93	14,79	15,61	15,70	14,94	13,28	15,93	15,90	17,55	17,30	18,43	18,05	19,45		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[15,57; 17,03]	[15,29; 16,93]	[12,23; 13,83]	[14,03; 15,83]	[13,83; 15,74]	[14,58; 16,65]	[14,64; 16,76]	[13,87; 16,00]	[12,25; 14,31]	[14,80; 17,06]	[14,74; 17,05]	[16,32; 18,78]	[16,06; 18,55]	[17,13; 19,73]	[16,74; 19,36]	[18,07; 20,84]		
		Anzahl	896	536	396	398	298	293	291	282	248	260	230	235	244	238	228	260		
		Anteil in %	9,12	6,90	5,79	6,65	5,63	6,20	6,42	6,53	5,92	6,45	5,96	6,37	6,87	6,97	6,90	8,26		
		CI Anteil in %	[8,55; 9,68]	[6,33; 7,46]	[5,24; 6,34]	[6,02; 7,29]	[5,01; 6,26]	[5,51; 6,89]	[5,70; 7,13]	[5,79; 7,27]	[5,21; 6,64]	[5,69; 7,21]	[5,22; 6,71]	[5,58; 7,15]	[6,03; 7,70]	[6,12; 7,83]	[6,04; 7,77]	[7,30; 9,23]		
	Anzahl	454	175	123	128	89	89	82	80	70	76	68	57	59	89	56	60			
	Anteil in %	4,62	2,25	1,80	2,14	1,68	1,88	1,81	1,85	1,67	1,89	1,76	1,54	1,66	2,61	1,70	1,91			
	CI Anteil in %	[4,20; 5,03]	[1,92; 2,58]	[1,48; 2,11]	[1,77; 2,51]	[1,34; 2,03]	[1,50; 2,27]	[1,42; 2,20]	[1,45; 2,25]	[1,28; 2,06]	[1,47; 2,31]	[1,35; 2,18]	[1,15; 1,94]	[1,24; 2,08]	[2,07; 3,14]	[1,26; 2,14]	[1,43; 2,39]			
	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976				
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8018	6858	5970	5133	4634	4363	4170	3977	3799	3614	3479	3354	3226	3091	2976			
	auswertbar	Anzahl	8007	6519	5725	4971	4417	4146	3960	3852	3704	3537	3394	3281	3159	3022	2892			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1183	1473	1050	868	727	701	644	628	531	489	401	394	313	340	298			
		Anteil in %	14,77	22,60	18,34	17,46	16,46	16,91	16,26	16,30	14,34	13,83	11,81	12,01	9,91	11,25	10,30			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[14,00; 15,55]	[21,58; 23,61]	[17,34; 19,34]	[16,41; 18,52]	[15,37; 17,55]	[15,77; 18,05]	[15,11; 17,41]	[15,14; 17,47]	[13,21; 15,46]	[12,69; 14,96]	[10,73; 12,90]	[10,90; 13,12]	[8,87; 10,95]	[10,12; 12,38]	[9,20; 11,41]			
		Anzahl	4351	3661	3342	3065	2712	2555	2439	2372	2270	2232	2131	2064	1990	1905	1796			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	54,34	56,16	58,38	61,66	61,40	61,63	61,59	61,58	61,29	63,10	62,79	62,91	62,99	63,04	62,10			
		CI Anteil in %	[53,25; 55,43]	[54,95; 57,36]	[57,10; 59,65]	[60,31; 63,01]	[59,96; 62,84]	[60,15; 63,11]	[60,08; 63,11]	[60,04; 63,11]	[59,72; 62,85]	[61,51; 64,69]	[61,16; 64,41]	[61,25; 64,56]	[61,31; 64,68]	[61,32; 64,76]	[60,33; 63,87]			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1291	853	821	667	633	567	572	564	556	550	544	531	534	488	513			
		Anteil in %	16,12	13,08	14,34	13,42	14,33	13,68	14,44	14,64	15,01	15,55	16,03	16,18	16,90	16,15	17,74			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[15,32; 16,93]	[12,27; 13,90]	[13,43; 15,25]	[12,47; 14,37]	[13,30; 15,36]	[12,63; 14,72]	[13,35; 15,54]	[13,53; 15,76]	[13,86; 16,16]	[14,36; 16,74]	[14,79; 17,26]	[14,92; 17,44]	[15,60; 18,21]	[14,84; 17,46]	[16,35; 19,13]			
		Anzahl	706	377	396	280	262	246	234	227	276	193	254	227	256	223	217			
		Anteil in %	8,82	5,78	6,92	5,63	5,93	5,93	5,91	5,89	7,45	5,46	7,48	6,92	8,10	7,38	7,50			
		CI Anteil in %	[8,20; 9,44]	[5,22; 6,35]	[6,26; 7,57]	[4,99; 6,27]	[5,23; 6,63]	[5,21; 6,65]	[5,17; 6,64]	[5,15; 6,64]	[6,61; 8,30]	[4,71; 6,21]	[6,60; 8,37]	[6,05; 7,79]	[7,15; 9,06]	[6,45; 8,31]	[6,54; 8,46]			
	Anzahl	476	155	116	91	83	77	71	61	71	73	64	65	66	66	68				
	Anteil in %	5,94	2,38	2,03	1,83	1,88	1,86	1,79	1,58	1,92	2,06	1,89	1,98	2,09	2,18	2,35				
	CI Anteil in %	[5,43; 6,46]	[2,01; 2,75]	[1,66; 2,39]	[1,46; 2,20]	[1,48; 2,28]	[1,45; 2,27]	[1,38; 2,21]	[1,19; 1,98]	[1,48; 2,36]	[1,60; 2,53]	[1,43; 2,34]	[1,50; 2,46]	[1,59; 2,59]	[1,66; 2,71]	[1,80; 2,90]				



EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9648	8512	7365	6521	6114	5773	5474	5197	4896	4686	4496	4320	4150	3980				
	auswertbar	Anzahl	9634	7991	7065	6148	5776	5434	5281	5060	4786	4578	4403	4220	4063	3894				
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1592	1400	1252	1033	997	854	836	706	654	560	538	430	460	444				
		Anteil in %	16,52	17,52	17,72	16,80	17,26	15,72	15,83	13,95	13,66	12,23	12,22	10,19	11,32	11,40				
	CI Anteil in %	[15,78; 17,27]	[16,69; 18,35]	[16,83; 18,61]	[15,87; 17,74]	[16,29; 18,24]	[14,75; 16,68]	[14,85; 16,81]	[13,00; 14,91]	[12,69; 14,64]	[11,28; 13,18]	[11,25; 13,19]	[9,28; 11,10]	[10,35; 12,30]	[10,40; 12,40]					
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5274	4621	4244	3688	3459	3334	3224	3069	2936	2762	2692	2555	2461	2326				
		Anteil in %	54,74	57,83	60,07	59,99	59,89	61,35	61,05	60,65	61,35	60,33	61,14	60,55	60,57	59,73				
	CI Anteil in %	[53,75; 55,74]	[56,74; 58,91]	[58,93; 61,21]	[58,76; 61,21]	[58,62; 61,15]	[60,06; 62,65]	[59,73; 62,36]	[59,31; 62,00]	[59,97; 62,73]	[58,91; 61,75]	[59,70; 62,58]	[59,07; 62,02]	[59,07; 62,07]	[58,19; 61,27]					
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1531	1167	963	895	870	784	792	837	773	790	733	787	729	646				
		Anteil in %	15,89	14,60	13,63	14,56	15,06	14,43	15,00	16,54	16,15	17,26	16,65	18,65	17,94	16,59				
	CI Anteil in %	[15,16; 16,62]	[13,83; 15,38]	[12,83; 14,43]	[13,68; 15,44]	[14,14; 15,98]	[13,49; 15,36]	[14,03; 15,96]	[15,52; 17,57]	[15,11; 17,19]	[16,16; 18,35]	[15,55; 17,75]	[17,47; 19,82]	[16,76; 19,12]	[15,42; 17,76]					
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	807	579	445	399	331	339	313	324	318	353	328	334	298	362				
		Anteil in %	8,38	7,25	6,30	6,49	5,73	6,24	5,93	6,40	6,64	7,71	7,45	7,91	7,33	9,30				
	CI Anteil in %	[7,82; 8,93]	[6,68; 7,81]	[5,73; 6,87]	[5,87; 7,11]	[5,13; 6,33]	[5,60; 6,88]	[5,29; 6,56]	[5,73; 7,08]	[5,94; 7,35]	[6,94; 8,48]	[6,67; 8,23]	[7,10; 8,73]	[6,53; 8,14]	[8,38; 10,21]					
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	430	224	161	133	119	123	116	124	105	113	112	114	115	116					
	Anteil in %	4,46	2,80	2,28	2,16	2,06	2,26	2,20	2,45	2,19	2,47	2,54	2,70	2,83	2,98					
CI Anteil in %	[4,05; 4,88]	[2,44; 3,17]	[1,93; 2,63]	[1,80; 2,53]	[1,69; 2,43]	[1,87; 2,66]	[1,80; 2,59]	[2,02; 2,88]	[1,78; 2,61]	[2,02; 2,92]	[2,08; 3,01]	[2,21; 3,19]	[2,32; 3,34]	[2,44; 3,51]						
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9210	7848	6861	6353	6004	5676	5383	5051	4802	4597	4387	4190	4027					
	auswertbar	Anzahl	9193	7522	6436	6002	5669	5458	5249	4902	4685	4491	4277	4102	3890					
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1461	1314	1081	1058	941	891	730	646	613	573	450	460	411					
		Anteil in %	15,89	17,47	16,80	17,63	16,60	16,32	13,91	13,18	13,08	12,76	10,52	11,21	10,57					
	CI Anteil in %	[15,15; 16,64]	[16,61; 18,33]	[15,88; 17,71]	[16,66; 18,59]	[15,63; 17,57]	[15,34; 17,31]	[12,97; 14,84]	[12,23; 14,13]	[12,12; 14,05]	[11,78; 13,73]	[9,60; 11,44]	[10,25; 12,18]	[9,60; 11,53]						
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5035	4591	3900	3624	3457	3432	3293	3120	2854	2713	2625	2510	2317					
		Anteil in %	54,77	61,03	60,60	60,38	60,98	62,88	62,74	63,65	60,92	60,41	61,37	61,19	59,56					
	CI Anteil in %	[53,75; 55,79]	[59,93; 62,14]	[59,40; 61,79]	[59,14; 61,62]	[59,71; 62,25]	[61,60; 64,16]	[61,43; 64,04]	[62,30; 64,99]	[59,52; 62,32]	[58,98; 61,84]	[59,92; 62,83]	[59,70; 62,68]	[58,02; 61,11]						
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1366	958	883	812	817	733	770	714	785	762	745	707	733					
		Anteil in %	14,86	12,74	13,72	13,53	14,41	13,43	14,67	14,57	16,76	16,97	17,42	17,24	18,84					
	CI Anteil in %	[14,13; 15,59]	[11,98; 13,49]	[12,88; 14,56]	[12,66; 14,39]	[13,50; 15,33]	[12,53; 14,33]	[13,71; 15,63]	[13,58; 15,55]	[15,69; 17,83]	[15,87; 18,07]	[16,28; 18,56]	[16,08; 18,39]	[17,61; 20,07]						
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	854	487	435	389	355	329	368	334	325	344	345	322	329					
		Anteil in %	9,29	6,47	6,76	6,48	6,26	6,03	7,01	6,81	6,94	7,66	8,07	7,85	8,46					
	CI Anteil in %	[8,70; 9,88]	[5,92; 7,03]	[6,15; 7,37]	[5,86; 7,10]	[5,63; 6,89]	[5,40; 6,66]	[6,32; 7,70]	[6,11; 7,52]	[6,21; 7,66]	[6,88; 8,44]	[7,25; 8,88]	[7,03; 8,67]	[7,58; 9,33]						
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	477	172	137	119	99	73	88	88	108	99	112	103	100						
	Anteil in %	5,19	2,29	2,13	1,98	1,75	1,34	1,68	1,80	2,31	2,20	2,62	2,51	2,57						
CI Anteil in %	[4,74; 5,64]	[1,95; 2,62]	[1,78; 2,48]	[1,63; 2,34]	[1,41; 2,09]	[1,03; 1,64]	[1,33; 2,02]	[1,42; 2,17]	[1,88; 2,74]	[1,77; 2,63]	[2,14; 3,10]	[2,03; 2,99]	[2,07; 3,07]							
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8313	7352	6684	6243	5894	5567	5202	4924	4688	4472	4302	4114						
	auswertbar	Anzahl	8291	6925	6323	5925	5627	5401	5076	4786	4573	4365	4195	3993						
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1312	1282	1198	1131	1044	819	776	683	626	504	547	511						
		Anteil in %	15,82	18,51	18,95	19,09	18,55	15,16	15,29	14,27	13,69	11,55	13,04	12,80						
	CI Anteil in %	[15,04; 16,61]	[17,60; 19,43]	[17,98; 19,91]	[18,09; 20,09]	[17,54; 19,57]	[14,21; 16,12]	[14,30; 16,28]	[13,28; 15,26]	[12,69; 14,69]	[10,60; 12,49]	[12,02; 14,06]	[11,76; 13,83]							
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4868	4108	3819	3533	3409	3330	3155	2917	2857	2730	2582	2407						
		Anteil in %	58,71	59,32	60,40	59,63	60,58	61,66	62,16	60,95	62,48	62,54	61,55	60,28						
	CI Anteil in %	[57,65; 59,77]	[58,16; 60,48]	[59,19; 61,60]	[58,38; 60,88]	[59,31; 61,86]	[60,36; 62,95]	[60,82; 63,49]	[59,57; 62,33]	[61,07; 63,88]	[61,11; 63,98]	[60,08; 63,02]	[58,76; 61,80]							
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1134	940	804	787	736	769	734	724	693	712	664	658						
		Anteil in %	13,68	13,57	12,72	13,28	13,08	14,24	14,46	15,13	15,15	16,31	15,83	16,48						
	CI Anteil in %	[12,94; 14,42]	[12,77; 14,38]	[11,89; 13,54]	[12,42; 14,15]	[12,20; 13,96]	[13,31; 15,17]	[13,49; 15,43]	[14,11; 16,14]	[14,11; 16,19]	[15,22; 17,41]	[14,72; 16,93]	[15,33; 17,63]							
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	598	412	354	354	324	356	322	342	287	315	296	315						
		Anteil in %	7,21	5,95	5,60	5,97	5,76	6,59	6,34	7,15	6,28	7,22	7,06	7,89						
	CI Anteil in %	[6,66; 7,77]	[5,39; 6,51]	[5,03; 6,17]	[5,37; 6,58]	[5,15; 6,37]	[5,93; 7,25]	[5,67; 7,01]	[6,42; 7,88]	[5,57; 6,98]	[6,45; 7,98]	[6,28; 7,83]	[7,05; 8,73]							
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	379	183	148	120	114	127	89	120	110	104	106	102							
	Anteil in %	4,57	2,64	2,34	2,03	2,03	2,35	1,75	2,51	2,41	2,38	2,53	2,55							
CI Anteil in %	[4,12; 5,02]	[2,26; 3,02]	[1,97; 2,71]	[1,67; 2,38]	[1,66; 2,39]	[1,95; 2,76]	[1,39; 2,11]	[2,06; 2,95]	[1,96; 2											

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	9461	8488	7804	7235	6798	6334	6008	5716	5480	5235	4999								
	auswertbar	Anzahl	9447	8219	7542	6828	6543	6094	5770	5513	5258	5005	4758								
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1587	1769	1571	1434	1159	1049	923	876	663	662	612								
		Anteil in %	16,80	21,52	20,83	21,00	17,71	17,21	16,00	15,89	12,61	13,23	12,86								
	CI Anteil in %		[16,05; 17,55]	[20,63; 22,41]	[19,91; 21,75]	[20,04; 21,97]	[16,79; 18,64]	[16,27; 18,16]	[15,05; 16,94]	[14,92; 16,85]	[11,71; 13,51]	[12,29; 14,17]	[11,91; 13,81]								
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5407	4788	4481	4117	4014	3802	3572	3382	3300	3180	2911								
		Anteil in %	57,24	58,26	59,41	60,30	61,35	62,39	61,91	61,35	62,76	63,54	61,18								
	CI Anteil in %		[56,24; 58,23]	[57,19; 59,32]	[58,31; 60,52]	[59,14; 61,46]	[60,17; 62,53]	[61,17; 63,61]	[60,65; 63,16]	[60,06; 62,63]	[61,45; 64,07]	[62,20; 64,87]	[59,80; 62,57]								
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1252	989	941	819	858	807	803	793	795	711	748								
		Anteil in %	13,25	12,03	12,48	11,99	13,11	13,24	13,92	14,38	15,12	14,21	15,72								
	CI Anteil in %		[12,57; 13,94]	[11,33; 12,74]	[11,73; 13,22]	[11,22; 12,77]	[12,30; 13,93]	[12,39; 14,09]	[13,02; 14,81]	[13,46; 15,31]	[14,15; 16,09]	[13,24; 15,17]	[14,69; 16,76]								
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	738	495	391	337	391	327	357	349	370	325	355								
Anteil in %		7,81	6,02	5,18	4,94	5,98	5,37	6,19	6,33	7,04	6,49	7,46									
CI Anteil in %		[7,27; 8,35]	[5,51; 6,54]	[4,68; 5,68]	[4,42; 5,45]	[5,40; 6,55]	[4,80; 5,93]	[5,57; 6,81]	[5,69; 6,97]	[6,35; 7,73]	[5,81; 7,18]	[6,71; 8,21]									
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	463	178	158	121	121	109	115	113	130	127	132									
	Anteil in %	4,90	2,17	2,09	1,77	1,85	1,79	1,99	2,05	2,47	2,54	2,77									
CI Anteil in %		[4,47; 5,34]	[1,85; 2,48]	[1,77; 2,42]	[1,46; 2,09]	[1,52; 2,18]	[1,46; 2,12]	[1,63; 2,35]	[1,68; 2,42]	[2,05; 2,89]	[2,10; 2,97]	[2,31; 3,24]									
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	8389	7613	7007	6467	5963	5639	5337	5066	4812	4562									
	auswertbar	Anzahl	8385	7431	6637	6279	5824	5509	5200	4909	4692	4413									
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1433	1615	1423	1132	1045	879	842	643	616	590									
		Anteil in %	17,09	21,73	21,44	18,03	17,94	15,96	16,19	13,10	13,13	13,37									
	CI Anteil in %		[16,28; 17,90]	[20,80; 22,67]	[20,45; 22,43]	[17,08; 18,98]	[16,96; 18,93]	[14,99; 16,92]	[15,19; 17,19]	[12,15; 14,04]	[12,16; 14,10]	[12,37; 14,37]									
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4883	4382	4016	3851	3670	3430	3233	3098	2955	2735									
		Anteil in %	58,23	58,97	60,51	61,33	63,02	62,26	62,17	63,11	62,98	61,98									
	CI Anteil in %		[57,18; 59,29]	[57,85; 60,09]	[59,33; 61,69]	[60,13; 62,54]	[61,78; 64,26]	[60,98; 63,54]	[60,85; 63,49]	[61,76; 64,46]	[61,60; 64,36]	[60,54; 63,41]									
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1058	861	746	808	714	730	713	742	734	662									
		Anteil in %	12,62	11,59	11,24	12,87	12,26	13,25	13,71	15,12	15,64	15,00									
	CI Anteil in %		[11,91; 13,33]	[10,86; 12,31]	[10,48; 12,00]	[12,04; 13,70]	[11,42; 13,10]	[12,36; 14,15]	[12,78; 14,65]	[14,11; 16,12]	[14,60; 16,68]	[13,95; 16,05]									
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	607	422	339	367	306	358	314	310	290	319									
Anteil in %		7,24	5,68	5,11	5,84	5,25	6,50	6,04	6,31	6,18	7,23										
CI Anteil in %		[6,68; 7,79]	[5,15; 6,21]	[4,58; 5,64]	[5,26; 6,43]	[4,68; 5,83]	[5,85; 7,15]	[5,39; 6,69]	[5,63; 7,00]	[5,49; 6,87]	[6,46; 7,99]										
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	404	151	113	121	89	112	98	116	97	107										
	Anteil in %	4,82	2,03	1,70	1,93	1,53	2,03	1,88	2,36	2,07	2,42										
CI Anteil in %		[4,36; 5,28]	[1,71; 2,35]	[1,39; 2,01]	[1,59; 2,27]	[1,21; 1,84]	[1,66; 2,41]	[1,51; 2,25]	[1,94; 2,79]	[1,66; 2,47]	[1,97; 2,88]										
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7991	7129	6531	5915	5541	5255	4980	4749	4526										
	auswertbar	Anzahl	7973	6804	6325	5770	5403	5134	4844	4632	4366										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1374	1565	1277	1155	988	903	696	712	659										
		Anteil in %	17,23	23,00	20,19	20,02	18,29	17,59	14,37	15,37	15,09										
	CI Anteil in %		[16,40; 18,06]	[22,00; 24,00]	[19,20; 21,18]	[18,98; 21,05]	[17,26; 19,32]	[16,55; 18,63]	[13,38; 15,36]	[14,33; 16,41]	[14,03; 16,16]										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4590	4052	3844	3565	3335	3221	3087	2918	2689										
		Anteil in %	57,57	59,55	60,77	61,79	61,72	62,74	63,73	63,00	61,59										
	CI Anteil in %		[56,48; 58,65]	[58,39; 60,72]	[59,57; 61,98]	[60,53; 63,04]	[60,43; 63,02]	[61,42; 64,06]	[62,37; 65,08]	[61,61; 64,39]	[60,15; 63,03]										
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	968	707	742	670	643	611	612	602	620										
		Anteil in %	12,14	10,39	11,73	11,61	11,90	11,90	12,63	13,00	14,20										
	CI Anteil in %		[11,42; 12,86]	[9,67; 11,12]	[10,94; 12,52]	[10,79; 12,44]	[11,04; 12,76]	[11,02; 12,79]	[11,70; 13,57]	[12,03; 13,97]	[13,17; 15,24]										
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	578	350	335	277	337	295	313	290	278										
Anteil in %		7,25	5,14	5,30	4,80	6,24	5,75	6,46	6,26	6,37											
CI Anteil in %		[6,68; 7,82]	[4,62; 5,67]	[4,74; 5,85]	[4,25; 5,35]	[5,59; 6,88]	[5,11; 6,38]	[5,77; 7,15]	[5,56; 6,96]	[5,64; 7,09]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	463	130	127	103	100	104	136	110	120											
	Anteil in %	5,81	1,91	2,01	1,79	1,85	2,03	2,81	2,37	2,75											
CI Anteil in %		[5,29; 6,32]	[1,59; 2,24]	[1,66; 2,35]	[1,44; 2,13]	[1,49; 2,21]	[1,64; 2,41]	[2,34; 3,27]	[1,94; 2,81]	[2,26; 3,23]											

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	5478	4861	4331	3979	3742	3521	3355	3184										
	auswertbar	Anzahl	5454	4745	4241	3906	3683	3451	3278	3085										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1021	1007	880	777	685	510	491	470										
		Anteil in %	18,72	21,22	20,75	19,89	18,60	14,78	14,98	15,24										
	CI Anteil in %	[17,68; 19,76]	[20,06; 22,39]	[19,53; 21,97]	[18,64; 21,14]	[17,34; 19,86]	[13,59; 15,96]	[13,76; 16,20]	[13,97; 16,50]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3187	2844	2607	2346	2281	2198	2119	1960										
		Anteil in %	58,43	59,94	61,47	60,06	61,93	63,69	64,64	63,53										
	CI Anteil in %	[57,13; 59,74]	[58,54; 61,33]	[60,01; 62,94]	[58,53; 61,60]	[60,36; 63,50]	[62,09; 65,30]	[63,01; 66,28]	[61,83; 65,23]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	649	539	474	493	430	443	414	418										
		Anteil in %	11,90	11,36	11,18	12,62	11,68	12,84	12,63	13,55										
	CI Anteil in %	[11,04; 12,76]	[10,46; 12,26]	[10,23; 12,13]	[11,58; 13,66]	[10,64; 12,71]	[11,72; 13,95]	[11,49; 13,77]	[12,34; 14,76]											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	332	264	198	208	211	218	191	166										
Anteil in %		6,09	5,56	4,67	5,33	5,73	6,32	5,83	5,38											
CI Anteil in %	[5,45; 6,72]	[4,91; 6,22]	[4,03; 5,30]	[4,62; 6,03]	[4,98; 6,48]	[5,51; 7,13]	[5,02; 6,63]	[4,58; 6,18]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	265	91	82	82	76	82	63	71											
	Anteil in %	4,86	1,92	1,93	2,10	2,06	2,38	1,92	2,30											
CI Anteil in %	[4,29; 5,43]	[1,53; 2,31]	[1,52; 2,35]	[1,65; 2,55]	[1,60; 2,52]	[1,87; 2,88]	[1,45; 2,39]	[1,77; 2,83]												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7410	6403	5754	5274	4921	4642	4377											
	auswertbar	Anzahl	7396	6255	5635	5177	4818	4550	4262											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1180	1402	1164	1048	778	793	687											
		Anteil in %	15,95	22,41	20,66	20,24	16,15	17,43	16,12											
	CI Anteil in %	[15,12; 16,79]	[21,38; 23,45]	[19,60; 21,71]	[19,15; 21,34]	[15,11; 17,19]	[16,33; 18,53]	[15,02; 17,22]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4142	3619	3264	3034	2951	2760	2571											
		Anteil in %	56,00	57,86	57,92	58,61	61,25	60,66	60,32											
	CI Anteil in %	[54,87; 57,13]	[56,63; 59,08]	[56,63; 59,21]	[57,26; 59,95]	[59,87; 62,63]	[59,24; 62,08]	[58,85; 61,79]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	974	705	726	663	609	574	602											
		Anteil in %	13,17	11,27	12,88	12,81	12,64	12,62	14,12											
	CI Anteil in %	[12,40; 13,94]	[10,49; 12,05]	[12,01; 13,76]	[11,90; 13,72]	[11,70; 13,58]	[11,65; 13,58]	[13,08; 15,17]												
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	641	359	356	308	348	294	267											
Anteil in %		8,67	5,74	6,32	5,95	7,22	6,46	6,26												
CI Anteil in %	[8,03; 9,31]	[5,16; 6,32]	[5,68; 6,95]	[5,30; 6,59]	[6,49; 7,95]	[5,75; 7,18]	[5,54; 6,99]													
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	459	170	125	124	132	129	135												
	Anteil in %	6,21	2,72	2,22	2,40	2,74	2,84	3,17												
CI Anteil in %	[5,66; 6,76]	[2,31; 3,12]	[1,83; 2,60]	[1,98; 2,81]	[2,28; 3,20]	[2,35; 3,32]	[2,64; 3,69]													
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6033	5345	4842	4441	4119	3868												
	auswertbar	Anzahl	6019	5248	4765	4352	4052	3790												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	911	1080	952	694	689	638												
		Anteil in %	15,14	20,58	19,98	15,95	17,00	16,83												
	CI Anteil in %	[14,23; 16,04]	[19,49; 21,67]	[18,84; 21,11]	[14,86; 17,03]	[15,85; 18,16]	[15,64; 18,03]													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3470	3064	2859	2741	2505	2327												
		Anteil in %	57,65	58,38	60,00	62,98	61,82	61,40												
	CI Anteil in %	[56,40; 58,90]	[57,05; 59,72]	[58,61; 61,39]	[61,55; 64,42]	[60,33; 63,32]	[59,85; 62,95]													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	745	647	577	523	500	470												
		Anteil in %	12,38	12,33	12,11	12,02	12,34	12,40												
	CI Anteil in %	[11,55; 13,21]	[11,44; 13,22]	[11,18; 13,04]	[11,05; 12,98]	[11,33; 13,35]	[11,35; 13,45]													
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	549	319	276	285	261	254												
Anteil in %		9,12	6,08	5,79	6,55	6,44	6,70													
CI Anteil in %	[8,39; 9,85]	[5,43; 6,73]	[5,13; 6,46]	[5,81; 7,28]	[5,69; 7,20]	[5,91; 7,50]														
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	344	138	101	109	97	101													
	Anteil in %	5,72	2,63	2,12	2,50	2,39	2,66													
CI Anteil in %	[5,13; 6,30]	[2,20; 3,06]	[1,71; 2,53]	[2,04; 2,97]	[1,92; 2,86]	[2,15; 3,18]														

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7135	6329	5760	5285	4909																
	auswertbar	Anzahl	7123	6245	5652	5180	4795																
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1022	1349	1030	959	917																
		Anteil in %	14,35	21,60	18,22	18,51	19,12																
	CI Anteil in %	[13,53; 15,16]	[20,58; 22,62]	[17,22; 19,23]	[17,46; 19,57]	[18,01; 20,24]																	
		Anzahl	4074	3634	3451	3171	2899																
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	57,20	58,19	61,06	61,22	60,46																
		CI Anteil in %	[56,05; 58,34]	[56,97; 59,41]	[59,79; 62,33]	[59,89; 62,54]	[59,07; 61,84]																
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	913	736	700	661	560																
		Anteil in %	12,82	11,79	12,38	12,76	11,68																
	CI Anteil in %	[12,04; 13,59]	[10,99; 12,59]	[11,53; 13,24]	[11,85; 13,67]	[10,77; 12,59]																	
		Anzahl	611	389	325	257	305																
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	8,58	6,23	5,75	4,96	6,36																
		CI Anteil in %	[7,93; 9,23]	[5,63; 6,83]	[5,14; 6,36]	[4,37; 5,55]	[5,67; 7,05]																
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	503	137	146	132	114																	
	Anteil in %	7,06	2,19	2,58	2,55	2,38																	
CI Anteil in %	[6,47; 7,66]	[1,83; 2,56]	[2,17; 3,00]	[2,12; 2,98]	[1,95; 2,81]																		
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6587	5883	5295	4850																	
	auswertbar	Anzahl	6573	5796	5208	4742																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	924	1003	973	871																	
		Anteil in %	14,06	17,31	18,68	18,37																	
	CI Anteil in %	[13,22; 14,90]	[16,33; 18,28]	[17,62; 19,74]	[17,27; 19,47]																		
		Anzahl	3889	3562	3253	2926																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	59,17	61,46	62,46	61,70																	
		CI Anteil in %	[57,98; 60,35]	[60,20; 62,71]	[61,15; 63,78]	[60,32; 63,09]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	836	720	594	560																	
		Anteil in %	12,72	12,42	11,41	11,81																	
	CI Anteil in %	[11,91; 13,52]	[11,57; 13,27]	[10,54; 12,27]	[10,89; 12,73]																		
		Anzahl	544	342	278	283																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	8,28	5,90	5,34	5,97																	
		CI Anteil in %	[7,61; 8,94]	[5,29; 6,51]	[4,73; 5,95]	[5,29; 6,64]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	380	169	110	102																		
	Anteil in %	5,78	2,92	2,11	2,15																		
CI Anteil in %	[5,22; 6,35]	[2,48; 3,35]	[1,72; 2,50]	[1,74; 2,56]																			
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	7063	6259	5666																		
	auswertbar	Anzahl	7044	6131	5518																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	899	1229	1191																		
		Anteil in %	12,76	20,05	21,58																		
	CI Anteil in %	[11,98; 13,54]	[19,04; 21,05]	[20,50; 22,67]																			
		Anzahl	4178	3790	3297																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	59,31	61,82	59,75																		
		CI Anteil in %	[58,17; 60,46]	[60,60; 63,03]	[58,46; 61,04]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	897	644	609																		
		Anteil in %	12,73	10,50	11,04																		
	CI Anteil in %	[11,96; 13,51]	[9,74; 11,27]	[10,21; 11,86]																			
		Anzahl	576	337	285																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	8,18	5,50	5,16																		
		CI Anteil in %	[7,54; 8,82]	[4,93; 6,07]	[4,58; 5,75]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	494	131	136																			
	Anteil in %	7,01	2,14	2,46																			
CI Anteil in %	[6,42; 7,61]	[1,77; 2,50]	[2,06; 2,87]																				

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6247	5493																		
	auswertbar	Anzahl	6229	5369																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	862	1134																		
		Anteil in %		13,84	21,12																	
		CI Anteil in %		[12,98; 14,70]	[20,03; 22,21]																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3737	3278																		
		Anteil in %		59,99	61,05																	
		CI Anteil in %		[58,78; 61,21]	[59,75; 62,36]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	759	552																		
		Anteil in %		12,18	10,28																	
		CI Anteil in %		[11,37; 13,00]	[9,47; 11,09]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	474	274																		
		Anteil in %		7,61	5,10																	
		CI Anteil in %		[6,95; 8,27]	[4,51; 5,69]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	397	131																			
	Anteil in %		6,37	2,44																		
	CI Anteil in %		[5,77; 6,98]	[2,03; 2,85]																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	6485																			
	auswertbar	Anzahl	6469																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	973																			
		Anteil in %		15,04																		
		CI Anteil in %		[14,17; 15,91]																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3680																			
		Anteil in %		56,89																		
		CI Anteil in %		[55,68; 58,09]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	778																			
		Anteil in %		12,03																		
		CI Anteil in %		[11,23; 12,82]																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	546																			
		Anteil in %		8,44																		
		CI Anteil in %		[7,76; 9,12]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	492																				
	Anteil in %		7,61																			
	CI Anteil in %		[6,96; 8,25]																			

## Anhang B: Auswertung für Patienten mit primären Endpunkten

Im Hauptteil des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden in den Auswertungskapiteln 1 und 2 unter anderem tabellarische Auswertungen zu den Patientenzahlen und -merkmalen sowie zu Raucherstatus, Hypertonus und HbA1c-Werten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf die Gesamtheit der Patienten. Im folgenden Anhang B werden diese Auswertungen nochmals für die Subkohorte der **Patienten mit primären Endpunkten** in der Erstdokumentation vorgenommen. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen im Hauptteil und im Anhang zu erleichtern, wurden die Auswertungskapitel und Tabellen im Anhang analog zu zum Hauptteil nummeriert. Da das Auswertungskapitel 2 im Anhang entfällt, folgt auf das Auswertungskapitel B.1 direkt das Auswertungskapitel B.3. Vergleichbares gilt für die Tabellen; deren Nummerierung ist im Anhang daher nicht fortlaufend.

Die Subkohorten werden gebildet, indem die Patienten jeder Kohorte nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei Gruppen unterteilt werden. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen, verursacht durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage, letztlich bedingt durch Mikro-Gefäßerkrankungen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, erheblich auffälliger Fußstatus (Stadium 2 bis Stadium 5 nach Wagner ODER Stadium C bis D nach Armstrong), periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten ohne Endpunkte sind Patienten, die nicht den Subkohorten 2 oder 3 zuzuordnen sind. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht.

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

**Auswertungskapitel B.1: Patientenzahlen und -merkmale**

In den folgenden vier Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle B.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt - - Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren - - Männer und - - Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch - - Teilnehmer im Programm, - - Männer und - - Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	männlich	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	weiblich	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	837	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171			
	männlich	Anzahl	522	423	359	298	258	231	215	183	163	156	151	144	137	130	123	118	115	111			
		Anteil in %	62,37	62,76	62,65	62,87	63,70	63,81	64,95	64,44	62,93	62,40	63,18	63,72	64,32	63,73	63,08	63,44	63,19	64,91			
	weiblich	Anzahl	315	251	214	176	147	131	116	101	96	94	88	82	76	74	72	68	67	60			
		Anteil in %	37,63	37,24	37,35	37,13	36,30	36,19	35,05	35,56	37,07	37,60	36,82	36,28	35,68	36,27	36,92	36,56	36,81	35,09			
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1896	1551	1266	1056	941	815	729	680	646	604	561	517	488	459	427	399	369				
	männlich	Anzahl	1129	929	760	633	569	497	449	419	399	371	350	329	314	295	275	256	237				
		Anteil in %	59,55	59,90	60,03	59,94	60,47	60,98	61,59	61,62	61,76	61,42	62,39	63,64	64,34	64,27	64,40	64,16	64,23				
	weiblich	Anzahl	767	622	506	423	372	318	280	261	247	233	211	188	174	164	152	143	132				
		Anteil in %	40,45	40,10	39,97	40,06	39,53	39,02	38,41	38,38	38,24	38,58	37,61	36,36	35,66	35,73	35,60	35,84	35,77				
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2223	1829	1522	1294	1121	1004	944	872	815	770	698	641	601	557	512	474					
	männlich	Anzahl	1311	1097	906	773	677	609	572	530	493	467	424	388	364	333	309	289					
		Anteil in %	58,97	59,98	59,53	59,74	60,39	60,66	60,59	60,78	60,49	60,65	60,74	60,53	60,57	59,78	60,35	60,97					
	weiblich	Anzahl	912	732	616	521	444	395	372	342	322	303	274	253	237	224	203	185					
		Anteil in %	41,03	40,02	40,47	40,26	39,61	39,34	39,41	39,22	39,51	39,35	39,26	39,47	39,43	40,22	39,65	39,03					
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1616	1414	1213	1048	932	860	798	753	702	631	586	554	509	485	444						
	männlich	Anzahl	986	867	748	640	568	523	487	461	427	383	357	339	310	296	271						
		Anteil in %	61,01	61,32	61,67	61,07	60,94	60,81	61,03	61,22	60,83	60,70	60,92	61,19	60,90	61,03	61,04						
	weiblich	Anzahl	630	547	465	408	364	337	311	292	275	248	229	215	199	189	173						
		Anteil in %	38,99	38,68	38,33	38,93	39,06	39,19	38,97	38,78	39,17	39,30	39,08	38,81	39,10	38,97	38,96						
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2020	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572							
	männlich	Anzahl	1233	1079	914	794	738	680	629	575	512	478	449	414	392	358							
		Anteil in %	61,04	61,03	60,77	61,31	61,71	61,21	61,13	60,91	60,74	61,68	62,80	62,82	62,42	62,59							
	weiblich	Anzahl	787	689	590	501	458	431	400	369	331	297	266	245	236	214							
		Anteil in %	38,96	38,97	39,23	38,69	38,29	38,79	38,87	39,09	39,26	38,32	37,20	37,18	37,58	37,41							
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1746	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585								
	männlich	Anzahl	1055	906	781	711	657	608	564	500	466	434	408	376	356								
		Anteil in %	60,42	60,16	60,83	60,98	61,06	60,86	60,58	60,68	60,52	60,19	60,36	60,26	60,85								
	weiblich	Anzahl	691	600	503	455	419	391	367	324	304	287	268	248	229								
		Anteil in %	39,58	39,84	39,17	39,02	38,94	39,14	39,42	39,32	39,48	39,81	39,64	39,74	39,15								
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1564	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597									
	männlich	Anzahl	943	840	750	690	641	574	515	481	438	414	392	367									
		Anteil in %	60,29	60,30	60,93	61,12	60,82	60,23	60,66	60,43	59,92	60,53	60,96	61,47									
	weiblich	Anzahl	621	553	481	439	413	379	334	315	293	270	251	230									
		Anteil in %	39,71	39,70	39,07	38,88	39,18	39,77	39,34	39,57	40,08	39,47	39,04	38,53									
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1642	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685										
	männlich	Anzahl	983	897	813	749	697	607	550	510	479	449	415										
		Anteil in %	59,87	60,57	60,54	60,65	60,87	60,28	60,24	60,28	59,95	60,19	60,58										
	weiblich	Anzahl	659	584	530	486	448	400	363	336	320	297	270										
		Anteil in %	40,13	39,43	39,46	39,35	39,13	39,72	39,76	39,72	40,05	39,81	39,42										

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr			
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1390	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573											
	männlich	Anzahl	848	758	676	602	506	461	429	394	372	345											
		Anteil in %	61,01	61,13	61,01	60,20	59,53	59,41	59,92	59,52	59,90	60,21											
	weiblich	Anzahl	542	482	432	398	344	315	287	268	249	228											
		Anteil in %	38,99	38,87	38,99	39,80	40,47	40,59	40,08	40,48	40,10	39,79											
	2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1260	1149	1047	897	808	747	694	653	595											
männlich		Anzahl	783	716	649	557	501	463	436	411	369												
		Anteil in %	62,14	62,32	61,99	62,10	62,00	61,98	62,82	62,94	62,02												
weiblich		Anzahl	477	433	398	340	307	284	258	242	226												
		Anteil in %	37,86	37,68	38,01	37,90	38,00	38,02	37,18	37,06	37,98												
2008-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	563	507	437	395	368	338	312	296												
	männlich	Anzahl	333	299	262	240	227	204	190	183													
		Anteil in %	59,15	58,97	59,95	60,76	61,68	60,36	60,90	61,82													
	weiblich	Anzahl	230	208	175	155	141	134	122	113													
		Anteil in %	40,85	41,03	40,05	39,24	38,32	39,64	39,10	38,18													
	2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	714	614	543	497	447	407	380													
männlich		Anzahl	452	380	331	305	271	248	237														
		Anteil in %	63,31	61,89	60,96	61,37	60,63	60,93	62,37														
weiblich		Anzahl	262	234	212	192	176	159	143														
		Anteil in %	36,69	38,11	39,04	38,63	39,37	39,07	37,63														
2009-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	507	446	395	367	323	292														
	männlich	Anzahl	306	271	241	224	197	174															
		Anteil in %	60,36	60,76	61,01	61,04	60,99	59,59															
	weiblich	Anzahl	201	175	154	143	126	118															
		Anteil in %	39,64	39,24	38,99	38,96	39,01	40,41															
	2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	547	485	437	389	357															
männlich		Anzahl	357	314	283	251	234																
		Anteil in %	65,27	64,74	64,76	64,52	65,55																
weiblich		Anzahl	190	171	154	138	123																
		Anteil in %	34,73	35,26	35,24	35,48	34,45																
2010-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	501	442	400	360																
	männlich	Anzahl	325	288	259	230																	
		Anteil in %	64,87	65,16	64,75	63,89																	
	weiblich	Anzahl	176	154	141	130																	
		Anteil in %	35,13	34,84	35,25	36,11																	
	2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	519	455	385																	
männlich		Anzahl	350	308	258																		
		Anteil in %	67,44	67,69	67,01																		
weiblich		Anzahl	169	147	127																		
		Anteil in %	32,56	32,31	32,99																		
2011-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	435	376																		
	männlich	Anzahl	277	236																			
		Anteil in %	63,68	62,77																			
	weiblich	Anzahl	158	140																			
		Anteil in %	36,32	37,23																			
	2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	431																			
männlich		Anzahl	280																				
		Anteil in %	64,97																				
weiblich		Anzahl	151																				
		Anteil in %	35,03																				



Tabelle B.1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit -- Teilnehmern. -- von ihnen bzw. -- Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten**

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	163	264	363	432	475	506	553	578	587	598	611	624	633	642	651	655	666	682		
		Anteil in %	19,47	31,54	43,37	51,61	56,75	60,45	66,07	69,06	70,13	71,45	73,00	74,55	75,63	76,70	77,78	78,26	79,57	81,48		
		CI Anteil in %	[16,79; 22,16]	[28,39; 34,69]	[40,01; 46,73]	[48,23; 55,00]	[53,39; 60,11]	[57,14; 63,77]	[62,86; 69,28]	[65,92; 72,19]	[67,03; 73,23]	[68,38; 74,51]	[69,99; 76,01]	[71,60; 77,50]	[72,72; 78,54]	[73,84; 79,57]	[74,96; 80,60]	[75,46; 81,05]	[76,84; 82,30]	[78,85; 84,11]		
	davon wegen Tod	Anzahl	4	23	40	55	67	77	88	101	109	117	123	130	134	141	146	147	154	166		
		Anteil in %	0,48	2,75	4,78	6,57	8,00	9,20	10,51	12,07	13,02	13,98	14,70	15,53	16,01	16,85	17,44	17,56	18,40	19,83		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	146	225	306	358	389	409	442	452	453	455	461	467	472	474	477	480	484	487		
		Anteil in %	17,44	26,88	36,56	42,77	46,48	48,86	52,81	54,00	54,12	54,36	55,08	55,79	56,39	56,63	56,99	57,35	57,83	58,18		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	1	1	2	5	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	10		
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,24	0,60	0,84	0,84	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,08	1,08	1,08	1,19		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	13	16	17	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19		
Anteil in %		1,55	1,91	2,03	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	837	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171	155		
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	345	630	840	955	1081	1167	1216	1250	1292	1335	1379	1408	1437	1469	1497	1527	1552			
		Anteil in %	18,20	33,23	44,30	50,37	57,01	61,55	64,14	65,93	68,14	70,41	72,73	74,26	75,79	77,48	78,96	80,54	81,86			
		CI Anteil in %	[16,46; 19,93]	[31,11; 35,35]	[42,07; 46,54]	[48,12; 52,62]	[54,79; 59,24]	[59,36; 63,74]	[61,98; 66,29]	[63,79; 68,06]	[66,05; 70,24]	[68,36; 72,47]	[70,73; 74,74]	[72,29; 76,23]	[73,86; 77,72]	[75,60; 79,36]	[77,12; 80,79]	[78,76; 82,32]	[80,12; 83,59]			
	davon wegen Tod	Anzahl	14	49	80	98	128	147	172	185	212	233	253	272	290	309	326	340	357			
		Anteil in %	0,74	2,58	4,22	5,17	6,75	7,75	9,07	9,76	11,18	12,29	13,34	14,35	15,30	16,30	17,19	17,93	18,83			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	319	555	727	820	912	978	999	1016	1031	1051	1073	1083	1094	1107	1117	1133	1140			
		Anteil in %	16,82	29,27	38,34	43,25	48,10	51,58	52,69	53,59	54,38	55,43	56,59	57,12	57,70	58,39	58,91	59,76	60,13			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	5	6	8	12	13	16	20	20	22	24	24	24	24	24	24	24			
		Anteil in %	0,11	0,26	0,32	0,42	0,63	0,69	0,84	1,05	1,05	1,16	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	10	21	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	31			
Anteil in %		0,53	1,11	1,42	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,58	1,58	1,64				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1896	1551	1266	1056	941	815	729	680	646	604	561	517	488	459	427	399	369			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1551	1266	1056	941	815	729	680	646	604	561	517	488	459	427	399	369	344			

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	394	701	929	1102	1219	1279	1351	1408	1453	1525	1582	1622	1666	1711	1749	1776		
		Anteil in %	17,72	31,53	41,79	49,57	54,84	57,53	60,77	63,34	65,36	68,60	71,17	72,96	74,94	76,97	78,68	79,89		
		CI Anteil in %	[16,14; 19,31]	[29,60; 33,47]	[39,74; 43,84]	[47,49; 51,65]	[52,77; 56,91]	[55,48; 59,59]	[58,74; 62,80]	[61,33; 65,34]	[63,38; 67,34]	[66,67; 70,53]	[69,28; 73,05]	[71,12; 74,81]	[73,14; 76,75]	[75,22; 78,72]	[76,97; 80,38]	[78,23; 81,56]		
	davon wegen Tod	Anzahl	25	62	98	139	180	210	243	275	297	322	348	370	398	428	445	460		
		Anteil in %	1,12	2,79	4,41	6,25	8,10	9,45	10,93	12,37	13,36	14,48	15,65	16,64	17,90	19,25	20,02	20,69		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	356	610	788	914	987	1014	1049	1073	1095	1141	1169	1187	1202	1217	1238	1249		
		Anteil in %	16,01	27,44	35,45	41,12	44,40	45,61	47,19	48,27	49,26	51,33	52,59	53,40	54,07	54,75	55,69	56,19		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	5	9	12	18	21	23	27	28	29	29	32	32	32	32	32	32		
		Anteil in %	0,22	0,40	0,54	0,81	0,94	1,03	1,21	1,26	1,30	1,30	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	8	20	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	34	34	34	35		
Anteil %		0,36	0,90	1,39	1,39	1,39	1,44	1,44	1,44	1,44	1,48	1,48	1,48	1,53	1,53	1,53	1,57			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2223	1829	1522	1294	1121	1004	944	872	815	770	698	641	601	557	512	474		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1829	1522	1294	1121	1004	944	872	815	770	698	641	601	557	512	474	447		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	202	403	568	684	756	818	863	914	985	1030	1062	1107	1131	1172	1201			
		Anteil in %	12,50	24,94	35,15	42,33	46,78	50,62	53,40	56,56	60,95	63,74	65,72	68,50	69,99	72,52	74,32			
		CI Anteil in %	[10,89; 14,11]	[22,83; 27,05]	[32,82; 37,48]	[39,92; 44,74]	[44,35; 49,22]	[48,18; 53,06]	[50,97; 55,84]	[54,14; 58,98]	[58,57; 63,33]	[61,39; 66,08]	[63,40; 68,03]	[66,24; 70,77]	[67,75; 72,22]	[70,35; 74,70]	[72,19; 76,45]			
	davon wegen Tod	Anzahl	11	45	74	99	132	164	179	203	229	250	270	290	298	318	338			
		Anteil in %	0,68	2,78	4,58	6,13	8,17	10,15	11,08	12,56	14,17	15,47	16,71	17,95	18,44	19,68	20,92			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	185	336	469	556	589	613	641	664	708	730	742	766	781	800	808			
		Anteil in %	11,45	20,79	29,02	34,41	36,45	37,93	39,67	41,09	43,81	45,17	45,92	47,40	48,33	49,50	50,00			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	5	7	11	17	22	24	27	27	27	27	28	29	30	30			
		Anteil in %	0,12	0,31	0,43	0,68	1,05	1,36	1,49	1,67	1,67	1,67	1,67	1,73	1,79	1,86	1,86			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	17	18	18	18	19	19	20	21	23	23	23	23	24	25			
Anteil %		0,25	1,05	1,11	1,11	1,11	1,18	1,18	1,24	1,30	1,42	1,42	1,42	1,42	1,49	1,55				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1616	1414	1213	1048	932	860	798	753	702	631	586	554	509	485	444			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1414	1213	1048	932	860	798	753	702	631	586	554	509	485	444	415			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	252	516	725	824	909	991	1076	1177	1245	1305	1361	1392	1448	1483				
		Anteil in %	12,48	25,54	35,89	40,79	45,00	49,06	53,27	58,27	61,63	64,60	67,38	68,91	71,68	73,42				
		CI Anteil in %	[11,03; 13,92]	[23,64; 27,45]	[33,80; 37,98]	[38,65; 42,94]	[42,83; 47,17]	[46,88; 51,24]	[51,09; 55,44]	[56,12; 60,42]	[59,51; 63,75]	[62,52; 66,69]	[65,33; 69,42]	[66,89; 70,93]	[69,72; 73,65]	[71,49; 75,34]				
	davon wegen Tod	Anzahl	23	73	125	166	210	243	276	309	330	357	382	400	423	442				
		Anteil in %	1,14	3,61	6,19	8,22	10,40	12,03	13,66	15,30	16,34	17,67	18,91	19,80	20,94	21,88				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	227	432	581	628	665	710	753	821	865	895	924	935	965	980				
		Anteil in %	11,24	21,39	28,76	31,09	32,92	35,15	37,28	40,64	42,82	44,31	45,74	46,29	47,77	48,51				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	7	14	23	27	30	38	38	41	44	45	47	48	49				
		Anteil in %	0,05	0,35	0,69	1,14	1,34	1,49	1,88	1,88	2,03	2,18	2,23	2,33	2,38	2,43				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	4	5	7	7	8	9	9	9	9	10	10	12	12				
Anteil %		0,05	0,20	0,25	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,59	0,59					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2020	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572	537				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	240	462	580	670	747	815	922	976	1025	1070	1122	1161	1202					
		Anteil in %	13,75	26,46	33,22	38,37	42,78	46,68	52,81	55,90	58,71	61,28	64,26	66,49	68,84					
		CI Anteil in %	[12,13; 15,36]	[24,39; 28,53]	[31,01; 35,43]	[36,09; 40,66]	[40,46; 45,10]	[44,34; 49,02]	[50,46; 55,15]	[53,57; 58,23]	[56,40; 61,02]	[59,00; 63,57]	[62,01; 66,51]	[64,28; 68,71]	[66,67; 71,02]					
	davon wegen Tod	Anzahl	16	62	101	149	181	216	250	279	304	325	352	376	397					
		Anteil in %	0,92	3,55	5,78	8,53	10,37	12,37	14,32	15,98	17,41	18,61	20,16	21,53	22,74					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	217	378	447	484	527	558	628	649	672	696	721	736	756					
		Anteil in %	12,43	21,65	25,60	27,72	30,18	31,96	35,97	37,17	38,49	39,86	41,29	42,15	43,30					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	7	20	29	34	35	35	37	39	40	40	40	40	40					
		Anteil in %	0,40	1,15	1,66	1,95	2,00	2,00	2,12	2,23	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2	3	3	4	6	7	9	9	9	9	9	9					
Anteil %		0,00	0,11	0,17	0,17	0,23	0,34	0,40	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1746	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585	544					

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	171	333	435	510	611	715	768	833	880	921	967	1010									
		Anteil in %	10,93	21,29	27,81	32,61	39,07	45,72	49,10	53,26	56,27	58,89	61,83	64,58									
		CI Anteil in %	[9,39; 12,48]	[19,26; 23,32]	[25,59; 30,03]	[30,28; 34,93]	[36,65; 41,49]	[43,25; 48,19]	[46,63; 51,58]	[50,79; 55,73]	[53,81; 58,73]	[56,45; 61,33]	[59,42; 64,24]	[62,21; 66,95]									
	davon wegen Tod	Anzahl	14	59	101	133	170	209	226	257	283	297	314	336									
		Anteil in %	0,90	3,77	6,46	8,50	10,87	13,36	14,45	16,43	18,09	18,99	20,08	21,48									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	154	264	320	358	419	483	516	545	566	593	621	639									
		Anteil in %	9,85	16,88	20,46	22,89	26,79	30,88	32,99	34,85	36,19	37,92	39,71	40,86									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	10	14	18	21	21	24	28	28	28	29	31									
		Anteil in %	0,19	0,64	0,90	1,15	1,34	1,34	1,53	1,79	1,79	1,79	1,85	1,98									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	4									
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,13	0,13	0,19	0,19	0,19	0,19	0,26										
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1564	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597									
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597	554									
2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	161	299	407	497	635	729	796	843	896	957	997										
		Anteil in %	9,81	18,21	24,79	30,27	38,67	44,40	48,48	51,34	54,57	58,28	60,72										
		CI Anteil in %	[8,37; 11,24]	[16,34; 20,08]	[22,70; 26,88]	[28,05; 32,49]	[36,32; 41,03]	[41,99; 46,80]	[46,06; 50,90]	[48,92; 53,76]	[52,16; 56,98]	[55,90; 60,67]	[58,36; 63,08]										
	davon wegen Tod	Anzahl	13	56	102	131	169	198	231	252	277	306	328										
		Anteil in %	0,79	3,41	6,21	7,98	10,29	12,06	14,07	15,35	16,87	18,64	19,98										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	146	237	294	351	446	507	541	566	591	619	636										
		Anteil in %	8,89	14,43	17,90	21,38	27,16	30,88	32,95	34,47	35,99	37,70	38,73										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	5	10	12	16	18	18	19	21	24	25										
		Anteil in %	0,12	0,30	0,61	0,73	0,97	1,10	1,10	1,16	1,28	1,46	1,52										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	1	3	4	6	6	6	7	8	8										
Anteil %		0,00	0,06	0,06	0,18	0,24	0,37	0,37	0,37	0,43	0,49	0,49											
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1642	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685	645										
2007-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	150	282	390	540	614	674	728	769	817	854											
		Anteil in %	10,79	20,29	28,06	38,85	44,17	48,49	52,37	55,32	58,78	61,44											
		CI Anteil in %	[9,16; 12,42]	[18,17; 22,40]	[25,69; 30,42]	[36,29; 41,41]	[41,56; 46,78]	[45,86; 51,12]	[49,75; 55,00]	[52,71; 57,94]	[56,19; 61,37]	[58,88; 64,00]											
	davon wegen Tod	Anzahl	15	55	77	115	136	159	185	207	225	252											
		Anteil in %	1,08	3,96	5,54	8,27	9,78	11,44	13,31	14,89	16,19	18,13											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	129	211	293	404	453	489	515	533	563	571											
		Anteil in %	9,28	15,18	21,08	29,06	32,59	35,18	37,05	38,35	40,50	41,08											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	5	14	18	19	22	23	24	25	25	25											
		Anteil in %	0,36	1,01	1,29	1,37	1,58	1,65	1,73	1,80	1,80	1,80											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	2	2	2	3	3	4	4	4	6											
Anteil %		0,07	0,14	0,14	0,14	0,22	0,22	0,29	0,29	0,29	0,43												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1390	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573	536											
2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	111	213	363	452	513	566	607	665	700												
		Anteil in %	8,81	16,90	28,81	35,87	40,71	44,92	48,17	52,78	55,56												
		CI Anteil in %	[7,24; 10,38]	[14,83; 18,98]	[26,31; 31,31]	[33,22; 38,52]	[38,00; 43,43]	[42,17; 47,67]	[45,41; 50,93]	[50,02; 55,54]	[52,81; 58,30]												
	davon wegen Tod	Anzahl	15	35	70	90	119	140	156	181	204												
		Anteil in %	1,19	2,78	5,56	7,14	9,44	11,11	12,38	14,37	16,19												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	91	167	275	340	368	399	424	457	469												
		Anteil in %	7,22	13,25	21,83	26,98	29,21	31,67	33,65	36,27	37,22												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	7	12	15	18	18	18	18	18												
		Anteil in %	0,16	0,56	0,95	1,19	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	4	6	7	8	9	9	9	9												
Anteil %		0,24	0,32	0,48	0,56	0,63	0,71	0,71	0,71	0,71													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1260	1149	1047	897	808	747	694	653	595												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1149	1047	897	808	747	694	653	595	560												

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	56	126	168	195	225	251	267	294												
		Anteil in %	9,95	22,38	29,84	34,64	39,96	44,58	47,42	52,22												
		CI Anteil in %	[7,47; 12,42]	[18,93; 25,83]	[26,06; 33,62]	[30,70; 38,57]	[35,91; 44,01]	[40,47; 48,69]	[43,30; 51,55]	[48,09; 56,35]												
	davon wegen Tod	Anzahl	3	26	37	46	58	68	75	88												
		Anteil in %	0,53	4,62	6,57	8,17	10,30	12,08	13,32	15,63												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	52	99	126	143	161	176	185	198												
		Anteil in %	9,24	17,58	22,38	25,40	28,60	31,26	32,86	35,17												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1	5	6	6	6	6	7												
		Anteil in %	0,18	0,18	0,89	1,07	1,07	1,07	1,07	1,24												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	0	0	0	1	1	1												
Anteil %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	563	507	437	395	368	338	312	296												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	507	437	395	368	338	312	296	269												
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	100	171	217	267	307	334	355													
		Anteil in %	14,01	23,95	30,39	37,39	43,00	46,78	49,72													
		CI Anteil in %	[11,46; 16,55]	[20,82; 27,08]	[27,02; 33,77]	[33,84; 40,95]	[39,36; 46,63]	[43,12; 50,44]	[46,05; 53,39]													
	davon wegen Tod	Anzahl	7	38	47	61	73	81	93													
		Anteil in %	0,98	5,32	6,58	8,54	10,22	11,34	13,03													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	93	130	162	198	225	241	250													
		Anteil in %	13,03	18,21	22,69	27,73	31,51	33,75	35,01													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	3	6	6	6	8	8													
		Anteil in %	0,00	0,42	0,84	0,84	0,84	1,12	1,12													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	2	2	3	4	4													
Anteil %		0,00	0,00	0,28	0,28	0,42	0,56	0,56														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	714	614	543	497	447	407	380													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	614	543	497	447	407	380	359													
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	61	112	140	184	215	237														
		Anteil in %	12,03	22,09	27,61	36,29	42,41	46,75														
		CI Anteil in %	[9,20; 14,87]	[18,48; 25,71]	[23,72; 31,51]	[32,10; 40,48]	[38,10; 46,71]	[42,40; 51,09]														
	davon wegen Tod	Anzahl	5	20	34	48	58	65														
		Anteil in %	0,99	3,94	6,71	9,47	11,44	12,82														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	55	91	104	132	152	166														
		Anteil in %	10,85	17,95	20,51	26,04	29,98	32,74														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	1	3	4	5														
		Anteil in %	0,00	0,00	0,20	0,59	0,79	0,99														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	1	1	1	1														
Anteil %		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	507	446	395	367	323	292														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	446	395	367	323	292	270														
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	62	110	158	190	223															
		Anteil in %	11,33	20,11	28,88	34,73	40,77															
		CI Anteil in %	[8,68; 13,99]	[16,75; 23,47]	[25,08; 32,69]	[30,74; 38,73]	[36,65; 44,89]															
	davon wegen Tod	Anzahl	4	17	34	46	51															
		Anteil in %	0,73	3,11	6,22	8,41	9,32															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	55	85	114	134	161															
		Anteil in %	10,05	15,54	20,84	24,50	29,43															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	7	7	7	8															
		Anteil in %	0,55	1,28	1,28	1,28	1,46															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	1	3	3	3															
Anteil %		0,00	0,18	0,55	0,55	0,55																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	547	485	437	389	357															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	485	437	389	357	324															

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2010-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	59	101	141	178															
		Anteil in %	11,78	20,16	28,14	35,53															
		CI Anteil in %	[8,95; 14,60]	[16,64; 23,68]	[24,20; 32,09]	[31,33; 39,72]															
	davon wegen Tod	Anzahl	5	15	25	39															
		Anteil in %	1,00	2,99	4,99	7,78															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	52	78	107	130															
		Anteil in %	10,38	15,57	21,36	25,95															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	7	7	7															
		Anteil in %	0,20	1,40	1,40	1,40															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	2	2															
Anteil %		0,20	0,20	0,40	0,40																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	501	442	400	360															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	442	400	360	323															
2011-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	64	134	181																
		Anteil in %	12,33	25,82	34,87																
		CI Anteil in %	[9,50; 15,16]	[22,05; 29,59]	[30,77; 38,98]																
	davon wegen Tod	Anzahl	2	19	31																
		Anteil in %	0,39	3,66	5,97																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	58	109	143																
		Anteil in %	11,18	21,00	27,55																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	5	6																
		Anteil in %	0,58	0,96	1,16																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	1																
Anteil %		0,19	0,19	0,19																	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	519	455	385																
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	455	385	338																
2011-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	59	96																	
		Anteil in %	13,56	22,07																	
		CI Anteil in %	[10,34; 16,78]	[18,17; 25,97]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	2	7																	
		Anteil in %	0,46	1,61																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	54	81																	
		Anteil in %	12,41	18,62																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	6																	
		Anteil in %	0,69	1,38																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	2																	
Anteil %		0,00	0,46																		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	435	376																	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	376	339																	
2012-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	36																		
		Anteil in %	8,35																		
		CI Anteil in %	[5,74; 10,97]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	3																		
		Anteil in %	0,70																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	32																		
		Anteil in %	7,42																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0																		
		Anteil in %	0,00																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1																		
Anteil %		0,23																			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	431																		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	395																		

In Tabelle B.1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten - - Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	--
	CI Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2003-2	Mean	68,62
	CI Mean	[68,04; 69,21]
	Median	69,00
	Fallbasis	837
2004-1	Mean	70,06
	CI Mean	[69,67; 70,45]
	Median	70,00
	Fallbasis	1896
2004-2	Mean	69,11
	CI Mean	[68,73; 69,50]
	Median	69,00
	Fallbasis	2223
2005-1	Mean	69,50
	CI Mean	[69,06; 69,94]
	Median	70,00
	Fallbasis	1616
2005-2	Mean	69,10
	CI Mean	[68,70; 69,49]
	Median	69,00
	Fallbasis	2020
2006-1	Mean	69,82
	CI Mean	[69,37; 70,28]
	Median	71,00
	Fallbasis	1746
2006-2	Mean	69,28
	CI Mean	[68,80; 69,76]
	Median	70,00
	Fallbasis	1564
2007-1	Mean	69,67
	CI Mean	[69,20; 70,15]
	Median	70,00
	Fallbasis	1642
2007-2	Mean	69,29
	CI Mean	[68,77; 69,81]
	Median	70,00
	Fallbasis	1390

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	69,85
	CI Mean	[69,30; 70,40]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	1260
2008-2	Mean	69,02
	CI Mean	[68,18; 69,86]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	563
2009-1	Mean	68,26
	CI Mean	[67,53; 68,99]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	714
2009-2	Mean	68,20
	CI Mean	[67,28; 69,12]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	507
2010-1	Mean	69,11
	CI Mean	[68,30; 69,92]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	547
2010-2	Mean	68,35
	CI Mean	[67,38; 69,32]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	501
2011-1	Mean	67,87
	CI Mean	[66,97; 68,77]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	519
2011-2	Mean	67,83
	CI Mean	[66,82; 68,84]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	435
2012-1	Mean	67,59
	CI Mean	[66,53; 68,64]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	431

In Tabelle B.1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird

Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitrittsjahr - - Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	bis 50	--
	51 bis 60	--
	61 bis 70	--
	71 bis 80	--
	81 und älter	--
	<i>Patienten zusammen</i>	--
2003-2	bis 50	25
	51 bis 60	106
	61 bis 70	350
	71 bis 80	291
	81 und älter	65
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>837</b>
2004-1	bis 50	26
	51 bis 60	230
	61 bis 70	700
	71 bis 80	737
	81 und älter	203
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>1896</b>
2004-2	bis 50	71
	51 bis 60	304
	61 bis 70	841
	71 bis 80	762
	81 und älter	245
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>2223</b>
2005-1	bis 50	36
	51 bis 60	214
	61 bis 70	618
	71 bis 80	570
	81 und älter	178
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>1616</b>
2005-2	bis 50	58
	51 bis 60	289
	61 bis 70	775
	71 bis 80	687
	81 und älter	211
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>2020</b>
2006-1	bis 50	53
	51 bis 60	252
	61 bis 70	563
	71 bis 80	652
	81 und älter	226
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>1746</b>
2006-2	bis 50	63
	51 bis 60	214
	61 bis 70	537
	71 bis 80	571
	81 und älter	179
	<i>Patienten zusammen</i>	<b>1564</b>



EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2007-1	bis 50	62
	51 bis 60	232
	61 bis 70	541
	71 bis 80	587
	81 und älter	220
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1642</i>
2007-2	bis 50	69
	51 bis 60	184
	61 bis 70	489
	71 bis 80	471
	81 und älter	177
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1390</i>
2008-1	bis 50	47
	51 bis 60	180
	61 bis 70	379
	71 bis 80	471
	81 und älter	183
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1260</i>
2008-2	bis 50	26
	51 bis 60	87
	61 bis 70	179
	71 bis 80	206
	81 und älter	65
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>563</i>
2009-1	bis 50	31
	51 bis 60	137
	61 bis 70	234
	71 bis 80	247
	81 und älter	65
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>714</i>
2009-2	bis 50	34
	51 bis 60	83
	61 bis 70	158
	71 bis 80	176
	81 und älter	56
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>507</i>
2010-1	bis 50	22
	51 bis 60	81
	61 bis 70	178
	71 bis 80	205
	81 und älter	61
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>547</i>
2010-2	bis 50	33
	51 bis 60	94
	61 bis 70	142
	71 bis 80	167
	81 und älter	65
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>501</i>
2011-1	bis 50	33
	51 bis 60	97
	61 bis 70	156
	71 bis 80	179
	81 und älter	54
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>519</i>
2011-2	bis 50	27
	51 bis 60	88
	61 bis 70	122
	71 bis 80	148
	81 und älter	50
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>435</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2012-1	bis 50	41
	51 bis 60	78
	61 bis 70	105
	71 bis 80	161
	81 und älter	45
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>430</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle B.1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im jeweils betrachteten Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei - - von Ihnen bzw. - - Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	837	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		68	19	17	7	9	9	16	14	19	5	6	4	6	3	2	5	11
		CI Anteil in %		[7,81; 12,36]	[1,85; 4,78]	[1,91; 5,26]	[0,46; 3,00]	[0,88; 4,09]	[0,96; 4,47]	[2,95; 8,32]	[2,65; 8,16]	[4,31; 10,89]	[0,27; 3,91]	[0,55; 4,76]	[0,05; 3,71]	[0,62; 5,27]	[0,00; 3,27]	[0,00; 2,56]	[0,37; 5,13]	[2,74; 10,12]
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1896	1551	1266	1056	941	815	729	680	646	604	561	517	488	459	427	399	369	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		180	72	30	33	26	52	41	40	21	15	14	13	8	14	7	15	
		CI Anteil in %		[10,01; 13,20]	[4,41; 6,96]	[1,84; 3,84]	[2,33; 4,68]	[1,98; 4,40]	[5,26; 9,00]	[4,24; 7,82]	[4,33; 8,05]	[2,01; 4,94]	[1,34; 4,01]	[1,31; 4,11]	[1,23; 4,09]	[0,54; 2,94]	[1,59; 4,97]	[0,46; 3,04]	[2,05; 6,08]	
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2223	1829	1522	1294	1121	1004	944	872	815	770	698	641	601	557	512	474		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		132	68	55	46	57	52	57	41	30	21	21	28	31	20	19		
		CI Anteil in %		[6,03; 8,40]	[3,43; 5,51]	[3,15; 5,35]	[2,94; 5,27]	[4,25; 7,11]	[4,05; 6,96]	[4,90; 8,18]	[3,53; 6,53]	[2,53; 5,26]	[1,74; 4,28]	[1,90; 4,66]	[2,97; 6,35]	[3,66; 7,47]	[2,23; 5,59]	[2,24; 5,78]		
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1616	1414	1213	1048	932	860	798	753	702	631	586	554	509	485	444			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		83	51	30	58	44	31	34	27	18	11	10	8	11	17			
		CI Anteil in %		[4,64; 7,10]	[3,07; 5,33]	[1,85; 3,87]	[4,67; 7,78]	[3,64; 6,59]	[2,54; 5,23]	[3,03; 6,00]	[2,42; 5,27]	[1,55; 4,15]	[0,78; 2,98]	[0,70; 2,91]	[0,49; 2,65]	[0,94; 3,59]	[2,04; 5,62]			
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2020	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		109	64	75	81	62	53	27	26	18	17	19	23	17				
		CI Anteil in %		[5,04; 7,29]	[3,23; 5,28]	[4,52; 7,06]	[5,35; 8,20]	[4,23; 6,93]	[3,80; 6,50]	[1,80; 3,92]	[1,92; 4,25]	[1,26; 3,38]	[1,26; 3,50]	[1,60; 4,16]	[2,19; 5,13]	[1,58; 4,36]				
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1746	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		78	99	76	63	58	44	42	35	23	32	22						
		CI Anteil in %		[4,06; 6,30]	[6,25; 9,17]	[5,10; 7,94]	[4,45; 7,26]	[4,35; 7,26]	[3,36; 6,09]	[3,59; 6,60]	[3,07; 6,02]	[1,91; 4,47]	[3,13; 6,34]	[2,08; 4,97]	[2,22; 5,30]					
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1564	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		59	95	77	74	40	37	37	30	25	29	31						
		CI Anteil in %		[3,18; 5,29]	[6,23; 9,21]	[5,35; 8,29]	[5,48; 8,56]	[2,92; 5,47]	[2,98; 5,73]	[3,18; 6,11]	[2,66; 5,54]	[2,25; 5,06]	[2,90; 6,12]	[3,41; 6,97]						
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1642	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		49	61	71	65	48	43	38	47	40	50							
		CI Anteil in %		[2,40; 4,22]	[3,43; 5,66]	[4,45; 7,05]	[4,34; 7,02]	[3,45; 6,08]	[3,33; 6,08]	[3,10; 5,89]	[4,25; 7,51]	[3,74; 6,98]	[5,35; 9,25]							
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1390	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		35	49	42	25	27	30	26	24	35								
		CI Anteil in %		[1,90; 3,74]	[3,21; 5,63]	[2,96; 5,44]	[1,80; 4,08]	[2,19; 4,77]	[2,72; 5,66]	[2,45; 5,41]	[2,35; 5,38]	[4,15; 8,07]								
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1260	1149	1047	897	808	747	694	653	595									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		64	39	33	34	26	26	25	34									
		CI Anteil in %		[4,24; 6,90]	[2,58; 4,87]	[2,45; 4,91]	[2,82; 5,59]	[2,17; 4,80]	[2,33; 5,16]	[2,36; 5,30]	[3,85; 7,58]									
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	563	507	437	395	368	338	312	296										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		12	8	16	7	9	6	16										
		CI Anteil in %		[1,04; 3,69]	[0,57; 3,09]	[2,10; 6,00]	[0,50; 3,30]	[0,94; 4,38]	[0,40; 3,45]	[2,82; 7,99]										
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	714	614	543	497	447	407	380											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		21	17	9	14	7	7											
		CI Anteil in %		[1,98; 4,86]	[1,66; 4,60]	[0,64; 2,98]	[1,52; 4,75]	[0,46; 2,98]	[0,49; 3,20]											

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	507	446	395	367	323	292														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		6	13	10	9	7														
		Anteil in %		1,35	3,29	2,72	2,79	2,40														
		CI Anteil in %		[0,27; 2,42]	[1,53; 5,05]	[1,06; 4,39]	[0,99; 4,58]	[0,64; 4,15]														
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	547	485	437	389	357															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		7	9	8	9															
		Anteil in %		1,44	2,06	2,06	2,52															
		CI Anteil in %		[0,38; 2,51]	[0,73; 3,39]	[0,64; 3,47]	[0,89; 4,15]															
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	501	442	400	360																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3	8	11																
		Anteil in %		0,68	2,00	3,06																
		CI Anteil in %		[0,00; 1,44]	[0,63; 3,37]	[1,28; 4,84]																
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	519	455	385																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		11	8																	
		Anteil in %		2,42	2,08																	
		CI Anteil in %		[1,00; 3,83]	[0,65; 3,50]																	
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	435	376																		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		11																		
		Anteil in %		2,93																		
		CI Anteil in %		[1,22; 4,63]																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	431																			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				

### **Auswertungskapitel B.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung**

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

#### **Risikofaktoren**

- Raucherstatus
- Hypertonus

#### **Laborwerte**

- HbA1c-Werte

### B.3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu zwei Variablen dargestellt. Die Tabelle „Patienten und ihr Body-Mass-Index“ entfällt für die Auswertung nach Subkohorten. Das Kapitel B.3.1 beginnt daher mit der Tabelle B.3.1.2. Zunächst werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortalität ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle B.3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation - - Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch - - Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Raucher	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	91	68	60	50	41	35	33	25	22	20	20	18	17	16	15	13	13	13
	auswertbar	Anzahl		57	58	49	41	35	32	24	21	18	20	18	16	15	15	13	13	13
	Raucher	Anzahl		48	40	32	25	20	18	13	11	8	10	9	7	6	5	5	3	3
		Anteil in %		84,21	68,97	65,31	60,98	57,14	56,25	54,17	52,38	44,44	50,00	50,00	43,75	40,00	33,33	38,46	23,08	23,08
	CI Anteil in %		[74,66; 93,76]	[56,96; 80,98]	[51,84; 78,77]	[45,86; 76,09]	[40,51; 73,78]	[38,79; 73,71]	[33,80; 74,53]	[30,49; 74,27]	[20,82; 68,07]	[27,52; 72,48]	[26,23; 73,77]	[18,64; 68,86]	[14,34; 65,66]	[8,64; 58,03]	[10,93; 65,99]	[0,00; 46,92]	[0,00; 46,92]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>837</i>	<i>674</i>	<i>573</i>	<i>474</i>	<i>405</i>	<i>362</i>	<i>331</i>	<i>284</i>	<i>259</i>	<i>250</i>	<i>239</i>	<i>226</i>	<i>213</i>	<i>204</i>	<i>195</i>	<i>186</i>	<i>182</i>	<i>171</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	170	139	105	86	76	63	55	49	48	45	41	39	37	34	31	28	28	28
	auswertbar	Anzahl		122	97	82	74	59	50	48	45	45	41	38	37	37	33	31	28	28
	Raucher	Anzahl		97	72	52	47	32	24	22	19	24	24	21	21	21	18	13	9	9
		Anteil in %		79,51	74,23	63,41	63,51	54,24	48,00	45,83	42,22	53,33	58,54	55,26	56,76	56,76	54,55	41,94	32,14	32,14
	CI Anteil in %		[72,32; 86,70]	[65,48; 82,98]	[52,92; 73,90]	[52,47; 74,56]	[41,42; 67,06]	[34,01; 61,99]	[31,59; 60,08]	[27,63; 56,82]	[38,59; 68,07]	[43,27; 73,80]	[39,24; 71,28]	[40,57; 72,94]	[40,57; 72,94]	[37,29; 71,80]	[24,28; 59,59]	[14,53; 49,76]	[14,53; 49,76]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1896</i>	<i>1551</i>	<i>1266</i>	<i>1056</i>	<i>941</i>	<i>815</i>	<i>729</i>	<i>680</i>	<i>646</i>	<i>604</i>	<i>561</i>	<i>517</i>	<i>488</i>	<i>459</i>	<i>427</i>	<i>399</i>	<i>369</i>	<i>369</i>	
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	270	215	173	144	123	106	99	93	85	79	71	66	64	55	49	44	44	44
	auswertbar	Anzahl		199	168	135	116	100	93	86	85	77	70	65	60	50	47	44	44	44
	Raucher	Anzahl		171	133	101	74	58	58	49	57	49	45	41	39	32	29	27	27	27
		Anteil in %		85,93	79,17	74,81	63,79	58,00	62,37	56,98	67,06	63,64	64,29	63,08	65,00	64,00	61,70	61,36	61,36	61,36
	CI Anteil in %		[81,09; 90,77]	[73,01; 85,33]	[67,47; 82,16]	[55,01; 72,58]	[48,28; 67,72]	[52,47; 72,27]	[46,45; 67,50]	[57,01; 77,11]	[52,82; 74,45]	[52,98; 75,59]	[51,25; 74,90]	[52,83; 77,17]	[50,56; 77,44]	[47,65; 75,75]	[46,81; 75,92]	[46,81; 75,92]	[46,81; 75,92]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2223</i>	<i>1829</i>	<i>1522</i>	<i>1294</i>	<i>1121</i>	<i>1004</i>	<i>944</i>	<i>872</i>	<i>815</i>	<i>770</i>	<i>698</i>	<i>641</i>	<i>601</i>	<i>557</i>	<i>512</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	177	151	127	113	92	81	76	72	69	63	58	55	48	46	41	41	41	41
	auswertbar	Anzahl		135	121	109	84	76	70	68	67	62	56	52	47	46	40	40	40	40
	Raucher	Anzahl		120	89	77	53	49	47	39	40	36	30	26	24	23	23	17	17	17
		Anteil in %		88,89	73,55	70,64	63,10	64,47	67,14	57,35	59,70	58,06	53,57	50,00	51,06	50,00	42,50	42,50	42,50	42,50
	CI Anteil in %		[83,57; 94,21]	[65,66; 81,45]	[62,05; 79,23]	[52,71; 73,48]	[53,64; 75,31]	[56,06; 78,23]	[45,51; 69,20]	[47,87; 71,54]	[45,68; 70,45]	[40,39; 66,75]	[36,28; 63,72]	[36,62; 65,51]	[35,39; 64,61]	[26,98; 58,02]	[26,98; 58,02]	[26,98; 58,02]	[26,98; 58,02]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1616</i>	<i>1414</i>	<i>1213</i>	<i>1048</i>	<i>932</i>	<i>860</i>	<i>798</i>	<i>753</i>	<i>702</i>	<i>631</i>	<i>586</i>	<i>554</i>	<i>509</i>	<i>485</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	241	208	172	148	140	134	123	117	100	92	88	80	75	66	66	66	66	66
	auswertbar	Anzahl		192	165	140	128	130	118	111	99	89	86	77	73	63	63	63	63	63
	Raucher	Anzahl		160	123	97	85	87	77	71	62	55	51	45	41	35	35	35	35	35
		Anteil in %		83,33	74,55	69,29	66,41	66,92	65,25	63,96	62,63	61,80	59,30	58,44	56,16	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56
	CI Anteil in %		[78,05; 88,62]	[67,88; 81,21]	[61,62; 76,95]	[58,19; 74,62]	[58,80; 75,04]	[56,63; 73,88]	[54,99; 72,94]	[53,05; 72,20]	[51,65; 71,95]	[48,86; 69,75]	[47,36; 69,52]	[44,70; 67,63]	[43,19; 67,92]	[43,19; 67,92]	[43,19; 67,92]	[43,19; 67,92]	[43,19; 67,92]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2020</i>	<i>1768</i>	<i>1504</i>	<i>1295</i>	<i>1196</i>	<i>1111</i>	<i>1029</i>	<i>944</i>	<i>843</i>	<i>775</i>	<i>715</i>	<i>659</i>	<i>628</i>	<i>572</i>	<i>572</i>	<i>572</i>	<i>572</i>	<i>572</i>	
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	192	164	140	128	116	109	100	84	78	71	65	58	56	56	56	56	56	56
	auswertbar	Anzahl		158	129	118	108	102	97	78	74	67	60	54	53	53	53	53	53	53
	Raucher	Anzahl		128	92	82	71	64	63	48	43	35	34	29	26	26	26	26	26	26
		Anteil in %		81,01	71,32	69,49	65,74	62,75	64,95	61,54	58,11	52,24	56,67	53,70	49,06	49,06	49,06	49,06	49,06	49,06
	CI Anteil in %		[74,88; 87,15]	[63,48; 79,15]	[61,15; 77,83]	[56,75; 74,73]	[53,32; 72,17]	[55,40; 74,49]	[50,67; 72,41]	[46,79; 69,43]	[44,02; 64,29]	[44,02; 69,31]	[40,28; 67,13]	[35,47; 62,64]	[35,47; 62,64]	[35,47; 62,64]	[35,47; 62,64]	[35,47; 62,64]	[35,47; 62,64]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1746</i>	<i>1506</i>	<i>1284</i>	<i>1166</i>	<i>1076</i>	<i>999</i>	<i>931</i>	<i>824</i>	<i>770</i>	<i>721</i>	<i>676</i>	<i>624</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	185	160	144	134	122	112	99	96	88	83	81	70	70	70	70	70	70	70
	auswertbar	Anzahl		152	127	123	114	107	94	92	84	80	77	66	66	66	66	66	66	66
	Raucher	Anzahl		126	97	85	78	73	67	63	58	52	51	43	43	43	43	43	43	43
		Anteil in %		82,89	76,38	69,11	68,42	68,22	71,28	68,48	69,05	65,00	66,23	65,15	65,15	65,15	65,15	65,15	65,15	65,15
	CI Anteil in %		[76,89; 88,90]	[68,96; 83,79]	[60,91; 77,30]	[59,85; 76,99]	[59,36; 77,09]	[62,08; 80,47]	[58,93; 78,02]	[59,10; 78,99]	[54,48; 75,52]	[55,60; 76,87]	[53,57; 76,74]	[53,57; 76,74]	[53,57; 76,74]	[53,57; 76,74]	[53,57; 76,74]	[53,57; 76,74]	[53,57; 76,74]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1564</i>	<i>1393</i>	<i>1231</i>	<i>1129</i>	<i>1054</i>	<i>953</i>	<i>849</i>	<i>796</i>	<i>731</i>	<i>684</i>	<i>643</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	195	169	148	140	126	101	92	84	81	78	67							
	auswertbar	Anzahl		161	144	131	115	97	86	79	76	73	58							
	Raucher	Anzahl		143	121	105	86	68	58	53	50	48	41							
		Anteil in %		88,82	84,03	80,15	74,78	70,10	67,44	67,09	65,79	65,75	70,69							
		CI Anteil in %		[83,94; 93,70]	[78,02; 90,03]	[73,30; 87,01]	[66,81; 82,75]	[60,95; 79,26]	[57,48; 77,40]	[56,66; 77,52]	[55,05; 76,53]	[54,79; 76,71]	[58,87; 82,51]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1642</i>	<i>1481</i>	<i>1343</i>	<i>1235</i>	<i>1145</i>	<i>1007</i>	<i>913</i>	<i>846</i>	<i>799</i>	<i>746</i>	<i>685</i>							
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	177	152	133	114	89	81	76	65	64	61								
	auswertbar	Anzahl		146	130	109	88	78	73	62	61	58								
	Raucher	Anzahl		129	105	79	65	58	51	46	42	40								
		Anteil in %		88,36	80,77	72,48	73,86	74,36	69,86	74,19	68,85	68,97								
		CI Anteil in %		[83,14; 93,58]	[73,97; 87,57]	[64,05; 80,90]	[64,63; 83,10]	[64,61; 84,11]	[59,26; 80,46]	[63,21; 85,17]	[57,13; 80,57]	[56,96; 80,98]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1390</i>	<i>1240</i>	<i>1108</i>	<i>1000</i>	<i>850</i>	<i>776</i>	<i>716</i>	<i>662</i>	<i>621</i>	<i>573</i>								
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	154	142	129	112	94	89	84	80	72									
	auswertbar	Anzahl		134	124	104	90	87	82	76	66									
	Raucher	Anzahl		113	97	78	61	55	56	53	45									
		Anteil in %		84,33	78,23	75,00	67,78	63,22	68,29	69,74	68,18									
		CI Anteil in %		[78,15; 90,51]	[70,93; 85,52]	[66,64; 83,36]	[58,07; 77,49]	[53,03; 73,41]	[58,16; 78,43]	[59,34; 80,13]	[56,86; 79,51]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1260</i>	<i>1149</i>	<i>1047</i>	<i>897</i>	<i>808</i>	<i>747</i>	<i>694</i>	<i>653</i>	<i>595</i>									
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	71	62	53	47	46	43	40	36										
	auswertbar	Anzahl		62	52	46	46	43	38	34										
	Raucher	Anzahl		56	44	36	37	32	30	26										
		Anteil in %		90,32	84,62	78,26	80,43	74,42	78,95	76,47										
		CI Anteil in %		[82,90; 97,74]	[74,71; 94,52]	[66,21; 90,31]	[68,84; 92,03]	[61,22; 87,61]	[65,81; 92,08]	[62,00; 90,94]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>563</i>	<i>507</i>	<i>437</i>	<i>395</i>	<i>368</i>	<i>338</i>	<i>312</i>	<i>296</i>										
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	101	85	79	72	60	58	53											
	auswertbar	Anzahl		80	75	70	59	56	52											
	Raucher	Anzahl		75	64	59	51	45	42											
		Anteil in %		93,75	85,33	84,29	86,44	80,36	80,77											
		CI Anteil in %		[88,41; 99,09]	[77,27; 93,39]	[75,70; 92,87]	[77,63; 95,25]	[69,86; 90,86]	[69,95; 91,59]											
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>714</i>	<i>614</i>	<i>543</i>	<i>497</i>	<i>447</i>	<i>407</i>	<i>380</i>											
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	74	66	58	54	43	40												
	auswertbar	Anzahl		66	55	54	43	40												
	Raucher	Anzahl		60	50	49	37	34												
		Anteil in %		90,91	90,91	90,74	86,05	85,00												
		CI Anteil in %		[83,92; 97,90]	[83,24; 98,58]	[82,94; 98,54]	[75,57; 96,53]	[73,79; 96,21]												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>507</i>	<i>446</i>	<i>395</i>	<i>367</i>	<i>323</i>	<i>292</i>												
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	75	62	55	46	42													
	auswertbar	Anzahl		61	54	46	41													
	Raucher	Anzahl		57	45	35	29													
		Anteil in %		93,44	83,33	76,09	70,73													
		CI Anteil in %		[87,18; 99,71]	[73,30; 93,37]	[63,62; 88,55]	[56,63; 84,83]													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>547</i>	<i>485</i>	<i>437</i>	<i>389</i>	<i>357</i>													
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	75	67	59	51														
	auswertbar	Anzahl		67	59	49														
	Raucher	Anzahl		64	58	46														
		Anteil in %		95,52	98,31	93,88														
		CI Anteil in %		[90,53; 100,00]	[94,98; 100,00]	[87,10; 100,00]														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>501</i>	<i>442</i>	<i>400</i>	<i>360</i>														



EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	94	77	62															
	auswertbar	Anzahl		75	61															
	Raucher	Anzahl			70	52														
		Anteil in %			93,33	85,25														
		CI Anteil in %			[87,65; 99,02]	[76,27; 94,22]														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>519</i>	<i>455</i>	<i>385</i>															
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	83	70																
	auswertbar	Anzahl		68																
	Raucher	Anzahl			65															
		Anteil in %			95,59															
		CI Anteil in %			[90,67; 100,00]															
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>435</i>	<i>376</i>																
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	66																	
	auswertbar	Anzahl																		
	Raucher	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>431</i>																	

In Tabelle B.3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts halbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren - - Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch - - Patienten eingeschrieben. Für - - dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren - - Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Raucher	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	837	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171	
	auswertbar	Anzahl	837	606	554	457	398	353	322	268	245	231	234	220	209	198	192	184	177	160	
	Raucher	Anzahl	91	53	46	33	28	24	20	15	13	11	13	12	10	10	9	9	8	7	
		Anteil in %	10,87	8,75	8,30	7,22	7,04	6,80	6,21	5,60	5,31	4,76	5,56	5,45	4,78	5,05	4,69	4,89	4,52	4,38	
		CI Anteil in %	[8,76; 12,98]	[6,49; 11,00]	[6,00; 10,60]	[4,85; 9,60]	[4,52; 9,55]	[4,17; 9,43]	[3,57; 8,85]	[2,84; 8,35]	[2,49; 8,12]	[2,01; 7,51]	[2,61; 8,50]	[2,45; 8,46]	[1,88; 7,69]	[1,99; 8,11]	[1,69; 7,69]	[1,77; 8,02]	[1,45; 7,59]	[1,20; 7,55]	
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1896	1551	1266	1056	941	815	729	680	646	604	561	517	488	459	427	399	369		
	auswertbar	Anzahl	1896	1371	1194	1026	908	789	677	639	606	583	546	503	475	451	413	392	354		
	Raucher	Anzahl	170	116	90	71	58	42	37	32	31	37	34	26	26	30	26	18	15		
		Anteil in %	8,97	8,46	7,54	6,92	6,39	5,32	5,47	5,01	5,12	6,35	6,23	5,17	5,47	6,65	6,30	4,59	4,24		
		CI Anteil in %	[7,68; 10,25]	[6,99; 9,93]	[6,04; 9,04]	[5,37; 8,47]	[4,80; 7,98]	[3,76; 6,89]	[3,75; 7,18]	[3,32; 6,70]	[3,36; 6,87]	[4,37; 8,33]	[4,20; 8,26]	[3,23; 7,11]	[3,43; 7,52]	[4,35; 8,95]	[3,95; 8,64]	[2,52; 6,67]	[2,14; 6,34]		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2223	1829	1522	1294	1121	1004	944	872	815	770	698	641	601	557	512	474			
	auswertbar	Anzahl	2223	1697	1454	1239	1075	947	892	815	774	740	677	620	573	526	492	455			
	Raucher	Anzahl	270	179	139	113	82	66	65	56	64	55	51	48	46	37	35	33			
		Anteil in %	12,15	10,55	9,56	9,12	7,63	6,97	7,29	6,87	8,27	7,43	7,53	7,74	8,03	7,03	7,11	7,25			
		CI Anteil in %	[10,79; 13,50]	[9,09; 12,01]	[8,05; 11,07]	[7,52; 10,72]	[6,04; 9,22]	[5,35; 8,59]	[5,58; 8,99]	[5,13; 8,61]	[6,33; 10,21]	[5,54; 9,32]	[5,54; 9,52]	[5,64; 9,85]	[5,80; 10,25]	[4,85; 9,22]	[4,84; 9,39]	[4,87; 9,64]			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1616	1414	1213	1048	932	860	798	753	702	631	586	554	509	485	444				
	auswertbar	Anzahl	1616	1331	1162	1018	874	816	767	719	675	613	575	544	501	474	427				
	Raucher	Anzahl	177	146	108	96	70	62	61	54	50	43	40	35	35	31	25				
		Anteil in %	10,95	10,97	9,29	9,43	8,01	7,60	7,95	7,51	7,41	7,01	6,96	6,43	6,99	6,54	5,85				
		CI Anteil in %	[9,43; 12,48]	[9,29; 12,65]	[7,62; 10,96]	[7,63; 11,23]	[6,21; 9,81]	[5,78; 9,42]	[6,04; 9,87]	[5,58; 9,44]	[5,43; 9,38]	[4,99; 9,04]	[4,88; 9,04]	[4,37; 8,50]	[4,75; 9,22]	[4,31; 8,77]	[3,63; 8,08]				
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2020	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572					
	auswertbar	Anzahl	2020	1659	1440	1220	1115	1049	976	917	817	757	698	640	605	555					
	Raucher	Anzahl	241	193	143	118	103	107	98	92	79	76	70	63	54	49					
		Anteil in %	11,93	11,63	9,93	9,67	9,24	10,20	10,04	10,03	9,67	10,04	10,03	9,84	8,93	8,83					
		CI Anteil in %	[10,52; 13,34]	[10,09; 13,18]	[8,39; 11,48]	[8,01; 11,33]	[7,54; 10,94]	[8,37; 12,03]	[8,15; 11,93]	[8,09; 11,98]	[7,64; 11,70]	[7,90; 12,18]	[7,53; 12,26]	[7,53; 12,15]	[6,65; 11,20]	[6,47; 11,19]					
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1746	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585						
	auswertbar	Anzahl	1746	1428	1185	1090	1013	941	887	782	735	698	644	602	563						
	Raucher	Anzahl	192	143	108	95	82	77	76	55	52	42	42	38	34						
		Anteil in %	11,00	10,01	9,11	8,72	8,09	8,18	8,57	7,03	7,07	6,02	6,52	6,31	6,04						
		CI Anteil in %	[9,53; 12,46]	[8,46; 11,57]	[7,47; 10,75]	[7,04; 10,39]	[6,41; 9,78]	[6,43; 9,94]	[6,73; 10,41]	[5,24; 8,83]	[5,22; 8,93]	[4,25; 7,78]	[4,61; 8,43]	[4,37; 8,26]	[4,07; 8,01]						
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1564	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597							
	auswertbar	Anzahl	1564	1334	1136	1052	980	913	812	759	701	659	614	566							
	Raucher	Anzahl	185	142	119	112	107	99	91	85	80	73	69	62							
		Anteil in %	11,83	10,64	10,48	10,65	10,92	10,84	11,21	11,20	11,41	11,08	11,24	10,95							
		CI Anteil in %	[10,23; 13,43]	[8,99; 12,30]	[8,69; 12,26]	[8,78; 12,51]	[8,96; 12,87]	[8,83; 12,86]	[9,04; 13,38]	[8,95; 13,44]	[9,06; 13,77]	[8,68; 13,48]	[8,74; 13,74]	[8,38; 13,53]							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1642	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685								
	auswertbar	Anzahl	1642	1432	1282	1164	1080	959	870	808	752	706	635								
	Raucher	Anzahl	195	163	143	133	112	90	82	73	69	68	60								
		Anteil in %	11,88	11,38	11,15	11,43	10,37	9,38	9,43	9,03	9,18	9,63	9,45								
		CI Anteil in %	[10,31; 13,44]	[9,74; 13,03]	[9,43; 12,88]	[9,60; 13,25]	[8,55; 12,19]	[7,54; 11,23]	[7,48; 11,37]	[7,06; 11,01]	[7,11; 11,24]	[7,45; 11,81]	[7,17; 11,73]								

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1390	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573									
	auswertbar	Anzahl	1390	1205	1059	958	825	749	686	636	597	538									
	Raucher	Anzahl	177	143	137	105	89	83	71	64	59	54									
		Anteil in %	12,73	11,87	12,94	10,96	10,79	11,08	10,35	10,06	9,88	10,04									
		CI Anteil in %	[10,98; 14,49]	[10,04; 13,69]	[10,91; 14,96]	[8,98; 12,94]	[8,67; 12,91]	[8,83; 13,33]	[8,07; 12,63]	[7,72; 12,40]	[7,49; 12,28]	[7,50; 12,58]									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1260	1149	1047	897	808	747	694	653	595										
	auswertbar	Anzahl	1260	1085	1008	864	774	721	668	628	561										
	Raucher	Anzahl	154	141	123	98	79	73	70	65	53										
		Anteil in %	12,22	13,00	12,20	11,34	10,21	10,12	10,48	10,35	9,45										
		CI Anteil in %	[10,41; 14,03]	[10,99; 15,00]	[10,18; 14,22]	[9,23; 13,46]	[8,07; 12,34]	[7,92; 12,33]	[8,15; 12,80]	[7,97; 12,73]	[7,02; 11,87]										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	563	507	437	395	368	338	312	296											
	auswertbar	Anzahl	563	495	429	379	361	329	306	280											
	Raucher	Anzahl	71	62	48	38	43	34	32	30											
		Anteil in %	12,61	12,53	11,19	10,03	11,91	10,33	10,46	10,71											
		CI Anteil in %	[9,87; 15,36]	[9,61; 15,44]	[8,20; 14,18]	[7,00; 13,05]	[8,57; 15,26]	[7,04; 13,63]	[7,02; 13,89]	[7,08; 14,34]											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	714	614	543	497	447	407	380												
	auswertbar	Anzahl	714	593	526	488	433	400	373												
	Raucher	Anzahl	101	84	72	67	57	53	52												
		Anteil in %	14,15	14,17	13,69	13,73	13,16	13,25	13,94												
		CI Anteil in %	[11,59; 16,70]	[11,36; 16,97]	[10,75; 16,63]	[10,67; 16,79]	[9,98; 16,35]	[9,92; 16,58]	[10,42; 17,46]												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	507	446	395	367	323	292													
	auswertbar	Anzahl	507	440	382	357	314	285													
	Raucher	Anzahl	74	68	57	58	44	42													
		Anteil in %	14,60	15,45	14,92	16,25	14,01	14,74													
		CI Anteil in %	[11,52; 17,67]	[12,07; 18,84]	[11,34; 18,50]	[12,41; 20,08]	[10,17; 17,86]	[10,61; 18,86]													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	547	485	437	389	357														
	auswertbar	Anzahl	547	478	428	381	348														
	Raucher	Anzahl	75	63	53	42	35														
		Anteil in %	13,71	13,18	12,38	11,02	10,06														
		CI Anteil in %	[10,83; 16,60]	[10,14; 16,22]	[9,26; 15,51]	[7,87; 14,17]	[6,89; 13,22]														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	501	442	400	360															
	auswertbar	Anzahl	501	439	392	349															
	Raucher	Anzahl	75	70	63	51															
		Anteil in %	14,97	15,95	16,07	14,61															
		CI Anteil in %	[11,84; 18,10]	[12,52; 19,37]	[12,43; 19,71]	[10,90; 18,32]															
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	519	455	385																
	auswertbar	Anzahl	519	444	377																
	Raucher	Anzahl	94	73	56																
		Anteil in %	18,11	16,44	14,85																
		CI Anteil in %	[14,80; 21,43]	[12,99; 19,89]	[11,26; 18,45]																
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	435	376																	
	auswertbar	Anzahl	435	365																	
	Raucher	Anzahl	83	69																	
		Anteil in %	19,08	18,90																	
		CI Anteil in %	[15,38; 22,78]	[14,88; 22,93]																	
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	431																		
	auswertbar	Anzahl	431																		
	Raucher	Anzahl	66																		
		Anteil in %	15,31																		
		CI Anteil in %	[11,91; 18,72]																		

In Tabelle B.3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

Ferner ist zu beachten, dass durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung eine Änderung in den Dokumentationsmöglichkeiten erfolgte. Bis einschließlich 2004-1 war bei der AHT ein „ja“ oder „nein“ zu dokumentieren. Ab 2004-2 war nur noch das Ankreuzen eines „ja“-Feldes möglich. Dadurch lässt sich in den Daten nicht mehr zwischen „nein“ und „fehlende Angabe“ unterscheiden. Um durchgehend eine einheitliche Rechenregel zu verwenden, sind daher in der Auswertung - unabhängig von den Dokumentationsmöglichkeiten - alle Fälle, in denen bei der AHT kein „ja“ dokumentiert ist, als „nein“ zu werten. In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den - - anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation - - Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch - - Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Patienten verbessern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne

Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende Anteilswert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei - - Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten**

\* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestuft Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc.

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	716	581	494	410	351	309	283	247	225	216	205	195	182	173	166	157	153	142
	auswertbar	Anzahl	716	528	439	369	333	292	267	222	203	191	200	189	179	169	163	155	148	134
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	298	244	214	207	190	163	140	133	116	111	116	102	100	100	82	87	71	68
		Anteil in %	41,62	46,21	48,75	56,10	57,06	55,82	52,43	59,91	57,14	58,12	58,00	53,97	55,87	59,17	50,31	56,13	47,97	50,75
		CI Anteil in %	[38,01; 45,23]	[41,96; 50,47]	[44,07; 53,43]	[51,03; 61,17]	[51,73; 62,38]	[50,12; 61,53]	[46,43; 58,44]	[53,45; 66,37]	[50,32; 63,97]	[51,10; 65,13]	[51,14; 64,86]	[46,84; 61,09]	[48,57; 63,16]	[51,74; 66,60]	[42,61; 58,01]	[48,29; 63,97]	[39,90; 56,05]	[42,25; 59,24]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	15	25	6	5	4	3	1	0	1	1	7	8	9	10	5	4	4	3
		Anteil in %	2,09	4,73	1,37	1,36	1,20	1,03	0,37	0,00	0,49	0,52	3,50	4,23	5,03	5,92	3,07	2,58	2,70	2,24
		CI Anteil in %	[1,05; 3,14]	[2,92; 6,55]	[0,28; 2,45]	[0,17; 2,54]	[0,03; 2,37]	[0,00; 2,19]	[0,00; 1,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,46]	[0,00; 1,55]	[0,95; 6,05]	[1,35; 7,11]	[1,82; 8,24]	[2,35; 9,49]	[0,41; 5,72]	[0,08; 5,08]	[0,08; 5,32]	[0,00; 4,75]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	283	219	208	202	186	160	139	133	115	110	109	94	91	90	77	83	67	65
		Anteil in %	39,53	41,48	47,38	54,74	55,86	54,79	52,06	59,91	56,65	57,59	54,50	49,74	50,84	53,25	47,24	53,55	45,27	48,51
		CI Anteil in %	[35,94; 43,11]	[37,27; 45,68]	[42,70; 52,06]	[49,66; 59,83]	[50,51; 61,20]	[49,08; 60,51]	[46,06; 58,06]	[53,45; 66,37]	[49,82; 63,48]	[50,56; 64,62]	[47,58; 61,42]	[42,59; 56,88]	[43,49; 58,18]	[45,71; 60,80]	[39,55; 54,93]	[45,67; 61,43]	[37,22; 53,32]	[40,01; 57,00]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	418	284	225	162	143	129	127	89	87	80	84	87	79	69	81	68	77	66
		Anteil in %	58,38	53,79	51,25	43,90	42,94	44,18	47,57	40,09	42,86	41,88	42,00	46,03	44,13	40,83	49,69	43,87	52,03	49,25
		CI Anteil in %	[54,77; 61,99]	[49,53; 58,04]	[46,57; 55,93]	[38,83; 48,97]	[37,62; 48,27]	[38,47; 49,88]	[41,56; 53,57]	[33,63; 46,55]	[36,03; 49,68]	[34,87; 48,90]	[35,14; 48,86]	[38,91; 53,16]	[36,84; 51,43]	[33,40; 48,26]	[41,99; 57,39]	[36,03; 51,71]	[43,95; 60,10]	[40,76; 57,75]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	8	21	4	2	2	3	3	1	0	2	4	3	4	3	4	3	4	0
		Anteil in %	1,12	3,98	0,91	0,54	0,60	1,03	1,12	0,45	0,00	1,05	2,00	1,59	2,23	1,78	2,45	1,94	2,70	0,00
		CI Anteil in %	[0,35; 1,89]	[2,31; 5,65]	[0,02; 1,80]	[0,00; 1,29]	[0,00; 1,43]	[0,00; 2,19]	[0,00; 2,39]	[0,00; 1,33]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,49]	[0,05; 3,95]	[0,00; 3,37]	[0,06; 4,41]	[0,00; 3,77]	[0,07; 4,84]	[0,00; 4,11]	[0,08; 5,32]	[0,00; 0,00]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	333	230	193	137	118	107	112	81	79	75	70	71	69	60	72	58	61	60
		Anteil in %	46,51	43,56	43,96	37,13	35,44	36,64	41,95	36,49	38,92	39,27	35,00	37,57	38,55	35,50	44,17	37,42	41,22	44,78
		CI Anteil in %	[42,85; 50,16]	[39,33; 47,79]	[39,32; 48,61]	[32,19; 42,06]	[30,29; 40,58]	[31,11; 42,18]	[36,02; 47,88]	[30,14; 42,83]	[32,19; 45,64]	[32,32; 46,21]	[28,37; 41,63]	[30,64; 44,49]	[31,40; 45,70]	[28,27; 42,74]	[36,52; 51,82]	[29,78; 45,06]	[33,26; 49,17]	[36,32; 53,23]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	
	Anteil in %	0,00	0,57	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,21]	[0,00; 0,67]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,52]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,00]	[0,00; 0,00]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	77	30	27	23	23	19	12	7	8	3	10	11	6	6	5	7	11	6	
	Anteil in %	10,75	5,68	6,15	6,23	6,91	6,51	4,49	3,15	3,94	1,57	5,00	5,82	3,35	3,55	3,07	4,52	7,43	4,48	
	CI Anteil in %	[8,48; 13,03]	[3,71; 7,66]	[3,90; 8,40]	[3,76; 8,70]	[4,18; 9,63]	[3,67; 9,34]	[2,00; 6,98]	[0,85; 5,46]	[1,26; 6,62]	[0,00; 3,34]	[1,97; 8,03]	[2,47; 9,17]	[0,71; 6,00]	[0,75; 6,35]	[0,41; 5,72]	[1,24; 7,80]	[3,19; 11,67]	[0,96; 7,99]	
<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	837	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1607	1317	1075	903	799	689	624	580	550	513	474	436	413	390	364	340	313	
	auswertbar	Anzahl	1607	1061	924	820	726	622	549	512	485	494	461	423	401	383	353	334	300	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	625	476	481	420	372	337	310	270	249	271	257	229	231	214	201	181	182	
		Anteil in %	38,89	44,86	52,06	51,22	51,24	54,18	56,47	52,73	51,34	54,86	55,75	54,14	57,61	55,87	56,94	54,19	60,67	
		CI Anteil in %	[36,51; 41,28]	[41,87; 47,86]	[48,83; 55,28]	[47,80; 54,64]	[47,60; 54,88]	[50,26; 58,10]	[52,32; 60,62]	[48,41; 57,06]	[46,89; 55,79]	[50,47; 59,25]	[51,21; 60,29]	[49,38; 58,89]	[52,76; 62,45]	[50,90; 60,85]	[51,77; 62,11]	[48,84; 59,54]	[55,13; 66,20]	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	23	16	9	7	4	5	6	6	5	12	8	8	4	6	5	5	6	
		Anteil in %	1,43	1,51	0,97	0,85	0,55	0,80	1,09	1,17	1,03	2,43	1,74	1,89	1,00	1,57	1,42	1,50	2,00	
		CI Anteil in %	[0,85; 2,01]	[0,77; 2,24]	[0,34; 1,61]	[0,22; 1,48]	[0,01; 1,09]	[0,10; 1,51]	[0,22; 1,96]	[0,24; 2,10]	[0,13; 1,93]	[1,07; 3,79]	[0,54; 2,93]	[0,59; 3,19]	[0,02; 1,97]	[0,32; 2,81]	[0,18; 2,65]	[0,19; 2,80]	[0,41; 3,59]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	602	460	472	413	368	332	304	264	244	259	249	221	227	208	196	176	176	
		Anteil in %	37,46	43,36	51,08	50,37	50,69	53,38	55,37	51,56	50,31	52,43	54,01	52,25	56,61	54,31	55,52	52,69	58,67	
		CI Anteil in %	[35,09; 39,83]	[40,37; 46,34]	[47,86; 54,31]	[46,94; 53,79]	[47,05; 54,33]	[49,45; 57,30]	[51,21; 59,54]	[47,23; 55,90]	[45,85; 54,76]	[48,02; 56,84]	[49,46; 58,57]	[47,48; 57,01]	[51,75; 61,47]	[49,31; 59,30]	[50,33; 60,72]	[47,33; 58,06]	[53,08; 64,25]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	982	585	443	400	354	285	239	242	236	223	204	194	170	169	152	153	118	
		Anteil in %	61,11	55,14	47,94	48,78	48,76	45,82	43,53	47,27	48,66	45,14	44,25	45,86	42,39	44,13	43,06	45,81	39,33	
		CI Anteil in %	[58,72; 63,49]	[52,14; 58,13]	[44,72; 51,17]	[45,36; 52,20]	[45,12; 52,40]	[41,90; 49,74]	[39,38; 47,68]	[42,94; 51,59]	[44,21; 53,11]	[40,75; 49,53]	[39,71; 48,79]	[41,11; 50,62]	[37,55; 47,24]	[39,15; 49,10]	[37,89; 48,23]	[40,46; 51,16]	[33,80; 44,87]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	19	13	7	8	4	6	5	6	2	6	9	4	5	3	5	5	3	
		Anteil in %	1,18	1,23	0,76	0,98	0,55	0,96	0,91	1,17	0,41	1,21	1,95	0,95	1,25	0,78	1,42	1,50	1,00	
		CI Anteil in %	[0,65; 1,71]	[0,56; 1,89]	[0,20; 1,32]	[0,30; 1,65]	[0,01; 1,09]	[0,20; 1,73]	[0,12; 1,71]	[0,24; 2,10]	[0,00; 0,98]	[0,25; 2,18]	[0,69; 3,22]	[0,02; 1,87]	[0,16; 2,33]	[0,00; 1,67]	[0,18; 2,65]	[0,19; 2,80]	[0,00; 2,13]	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	790	490	379	344	318	249	212	207	218	201	175	173	144	150	132	132	92	
		Anteil in %	49,16	46,18	41,02	41,95	43,80	40,03	38,62	40,43	44,95	40,69	37,96	40,90	35,91	39,16	35,41	39,52	30,67	
		CI Anteil in %	[46,71; 51,60]	[43,18; 49,18]	[37,84; 44,19]	[38,57; 45,33]	[40,19; 47,41]	[36,18; 43,89]	[34,54; 42,69]	[36,17; 44,68]	[40,52; 49,38]	[36,35; 45,02]	[33,53; 42,40]	[36,21; 45,59]	[31,21; 40,61]	[34,27; 44,06]	[30,41; 40,41]	[34,27; 44,77]	[25,44; 35,89]	
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Anteil in %		0,25	0,09	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,33		
	CI Anteil in %	[0,01; 0,49]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,41]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,89]	[0,00; 0,99]		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	169	81	57	48	31	30	22	28	16	16	20	17	21	16	22	15	22		
	Anteil in %	10,52	7,63	6,17	5,85	4,27	4,82	4,01	5,47	3,30	3,24	4,34	4,02	5,24	4,18	6,23	4,49	7,33		
	CI Anteil in %	[9,02; 12,02]	[6,04; 9,23]	[4,62; 7,72]	[4,25; 7,46]	[2,80; 5,74]	[3,14; 6,51]	[2,37; 5,65]	[3,50; 7,44]	[1,71; 4,89]	[1,68; 4,80]	[2,48; 6,20]	[2,15; 5,89]	[3,05; 7,42]	[2,17; 6,18]	[3,71; 8,76]	[2,27; 6,72]	[4,38; 10,29]		
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1896</b>	<b>1551</b>	<b>1266</b>	<b>1056</b>	<b>941</b>	<b>815</b>	<b>729</b>	<b>680</b>	<b>646</b>	<b>604</b>	<b>561</b>	<b>517</b>	<b>488</b>	<b>459</b>	<b>427</b>	<b>399</b>	<b>369</b>	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1921	1581	1319	1121	969	871	826	761	710	669	611	558	524	485	446	413			
	auswertbar	Anzahl	1673	1335	1163	1004	869	765	728	677	677	640	590	539	499	456	426	395			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	654	609	528	480	413	387	367	356	359	313	313	295	262	266	227	208			
		Anteil in %	39,09	45,62	45,40	47,81	47,53	50,59	50,41	52,58	53,03	48,91	53,05	54,73	52,51	58,33	53,29	52,66			
		CI Anteil in %	[36,75; 41,43]	[42,95; 48,29]	[42,54; 48,26]	[44,72; 50,90]	[44,20; 50,85]	[47,04; 54,13]	[46,78; 54,05]	[48,82; 56,35]	[49,27; 56,79]	[45,03; 52,78]	[49,02; 57,08]	[50,52; 58,94]	[48,12; 56,89]	[53,80; 62,86]	[48,54; 58,03]	[47,73; 57,59]			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	25	17	17	11	12	9	8	8	23	16	14	13	10	6	2	9			
		Anteil in %	1,49	1,27	1,46	1,10	1,38	1,18	1,10	1,18	3,40	2,50	2,37	2,41	2,00	1,32	0,47	2,28			
		CI Anteil in %	[0,91; 2,08]	[0,67; 1,88]	[0,77; 2,15]	[0,45; 1,74]	[0,60; 2,16]	[0,41; 1,94]	[0,34; 1,86]	[0,37; 2,00]	[2,03; 4,76]	[1,29; 3,71]	[1,14; 3,60]	[1,12; 3,71]	[0,77; 3,23]	[0,27; 2,36]	[0,00; 1,12]	[0,81; 3,75]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	629	592	511	469	401	378	359	348	336	297	299	282	252	260	225	199			
		Anteil in %	37,60	44,34	43,94	46,71	46,14	49,41	49,31	51,40	49,63	46,41	50,68	52,32	50,50	57,02	52,82	50,38			
		CI Anteil in %	[35,28; 39,92]	[41,68; 47,01]	[41,08; 46,79]	[43,63; 49,80]	[42,83; 49,46]	[45,87; 52,96]	[45,68; 52,95]	[47,64; 55,17]	[45,86; 53,40]	[42,54; 50,27]	[46,64; 54,72]	[48,10; 56,54]	[46,11; 54,89]	[52,47; 61,57]	[48,07; 57,56]	[45,44; 55,32]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1019	726	635	524	456	378	361	321	318	327	277	244	237	190	199	187			
		Anteil in %	60,91	54,38	54,60	52,19	52,47	49,41	49,59	47,42	46,97	51,09	46,95	45,27	47,49	41,67	46,71	47,34			
		CI Anteil in %	[58,57; 63,25]	[51,71; 57,05]	[51,74; 57,46]	[49,10; 55,28]	[49,15; 55,80]	[45,87; 52,96]	[45,95; 53,22]	[43,65; 51,18]	[43,21; 50,73]	[47,22; 54,97]	[42,92; 50,98]	[41,06; 49,48]	[43,11; 51,88]	[37,14; 46,20]	[41,97; 51,46]	[42,41; 52,27]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	31	27	17	15	7	4	2	3	15	13	7	7	4	5	4	1			
		Anteil in %	1,85	2,02	1,46	1,49	0,81	0,52	0,27	0,44	2,22	2,03	1,19	1,30	0,80	1,10	0,94	0,25			
		CI Anteil in %	[1,21; 2,50]	[1,27; 2,78]	[0,77; 2,15]	[0,74; 2,24]	[0,21; 1,40]	[0,01; 1,03]	[0,00; 0,66]	[0,00; 0,94]	[1,11; 3,33]	[0,94; 3,13]	[0,31; 2,06]	[0,34; 2,26]	[0,02; 1,58]	[0,14; 2,05]	[0,02; 1,86]	[0,00; 0,75]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	816	594	535	440	392	329	311	277	271	279	236	206	204	169	171	171			
		Anteil in %	48,77	44,49	46,00	43,82	45,11	43,01	42,72	40,92	40,03	43,59	40,00	38,22	40,88	37,06	40,14	43,29			
		CI Anteil in %	[46,38; 51,17]	[41,83; 47,16]	[43,14; 48,87]	[40,75; 46,90]	[41,80; 48,42]	[39,50; 46,52]	[39,12; 46,32]	[37,21; 44,62]	[36,34; 43,72]	[39,75; 47,44]	[36,04; 43,96]	[34,11; 42,33]	[36,56; 45,20]	[32,62; 41,50]	[35,48; 44,80]	[38,40; 48,18]			
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4	1	0	4	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0			
		Anteil in %	0,24	0,07	0,00	0,40	0,12	0,00	0,14	0,15	0,00	0,16	0,17	0,37	0,20	0,00	0,00	0,00			
		CI Anteil in %	[0,00; 0,47]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,00]	[0,01; 0,79]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,41]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,46]	[0,00; 0,50]	[0,00; 0,88]	[0,00; 0,59]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	168	104	83	65	56	45	47	40	32	34	33	29	28	16	24	15				
	Anteil in %	10,04	7,79	7,14	6,47	6,44	5,88	6,46	5,91	4,73	5,31	5,59	5,38	5,61	3,51	5,63	3,80				
	CI Anteil in %	[8,60; 11,48]	[6,35; 9,23]	[5,66; 8,62]	[4,95; 8,00]	[4,81; 8,08]	[4,21; 7,55]	[4,67; 8,24]	[4,13; 7,69]	[3,13; 6,33]	[3,57; 7,05]	[3,74; 7,45]	[3,47; 7,29]	[3,59; 7,63]	[1,82; 5,20]	[3,44; 7,83]	[1,91; 5,68]				
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>2223</b>	<b>1829</b>	<b>1522</b>	<b>1294</b>	<b>1121</b>	<b>1004</b>	<b>944</b>	<b>872</b>	<b>815</b>	<b>770</b>	<b>698</b>	<b>641</b>	<b>601</b>	<b>557</b>	<b>512</b>	<b>474</b>				



EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1428	1254	1076	939	837	776	721	679	635	572	533	505	465	442	403						
	auswertbar	Anzahl	1268	1093	953	851	731	684	649	651	609	557	524	497	459	431	388						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	530	531	475	421	383	340	361	331	322	280	287	277	257	251	232						
		Anteil in %	41,80	48,58	49,84	49,47	52,39	49,71	55,62	50,84	52,87	50,27	54,77	55,73	55,99	58,24	59,79						
		CI Anteil in %	[39,08; 44,51]	[45,62; 51,55]	[46,67; 53,02]	[46,11; 52,83]	[48,77; 56,02]	[45,96; 53,46]	[51,80; 59,45]	[47,00; 54,69]	[48,91; 56,84]	[46,11; 54,43]	[50,51; 59,04]	[51,36; 60,11]	[51,45; 60,54]	[53,58; 62,90]	[54,91; 64,68]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	13	21	17	12	7	3	8	11	11	8	6	8	7	5	5						
		Anteil in %	1,03	1,92	1,78	1,41	0,96	0,44	1,23	1,69	1,81	1,44	1,15	1,61	1,53	1,16	1,29						
		CI Anteil in %	[0,47; 1,58]	[1,11; 2,74]	[0,94; 2,62]	[0,62; 2,20]	[0,25; 1,66]	[0,00; 0,93]	[0,38; 2,08]	[0,70; 2,68]	[0,75; 2,86]	[0,45; 2,43]	[0,23; 2,06]	[0,50; 2,72]	[0,40; 2,65]	[0,15; 2,17]	[0,16; 2,41]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	517	510	458	409	376	337	353	320	311	272	281	269	250	246	227						
		Anteil in %	40,77	46,66	48,06	48,06	51,44	49,27	54,39	49,16	51,07	48,83	53,63	54,12	54,47	57,08	58,51						
		CI Anteil in %	[38,07; 43,48]	[43,70; 49,62]	[44,88; 51,23]	[44,70; 51,42]	[47,81; 55,06]	[45,52; 53,02]	[50,56; 58,23]	[45,31; 53,00]	[47,09; 55,04]	[44,68; 52,99]	[49,35; 57,90]	[49,74; 58,51]	[49,91; 59,03]	[52,40; 61,75]	[53,60; 63,41]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	738	562	478	430	348	344	288	320	287	277	237	220	202	180	156						
		Anteil in %	58,20	51,42	50,16	50,53	47,61	50,29	44,38	49,16	47,13	49,73	45,23	44,27	44,01	41,76	40,21						
		CI Anteil in %	[55,49; 60,92]	[48,45; 54,38]	[46,98; 53,33]	[47,17; 53,89]	[43,98; 51,23]	[46,54; 54,04]	[40,55; 48,20]	[45,31; 53,00]	[43,16; 51,09]	[45,57; 53,89]	[40,96; 49,49]	[39,89; 48,64]	[39,46; 48,55]	[37,10; 46,42]	[35,32; 45,09]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	13	10	9	7	8	7	3	10	7	7	9	5	3	2	6						
		Anteil in %	1,03	0,91	0,94	0,82	1,09	1,02	0,46	1,54	1,15	1,26	1,72	1,01	0,65	0,46	1,55						
		CI Anteil in %	[0,47; 1,58]	[0,35; 1,48]	[0,33; 1,56]	[0,22; 1,43]	[0,34; 1,85]	[0,27; 1,78]	[0,00; 0,98]	[0,59; 2,48]	[0,30; 2,00]	[0,33; 2,18]	[0,60; 2,83]	[0,13; 1,88]	[0,00; 1,39]	[0,00; 1,11]	[0,32; 2,78]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	597	479	409	369	284	299	260	274	251	231	192	184	173	153	125						
		Anteil in %	47,08	43,82	42,92	43,36	38,85	43,71	40,06	42,09	41,22	41,47	36,64	37,02	37,69	35,50	32,22						
		CI Anteil in %	[44,33; 49,83]	[40,88; 46,77]	[39,77; 46,06]	[40,03; 46,69]	[35,32; 42,39]	[39,99; 47,43]	[36,29; 43,83]	[38,29; 45,88]	[37,30; 45,13]	[37,38; 45,57]	[32,51; 40,77]	[32,77; 41,27]	[33,25; 42,13]	[30,98; 40,02]	[27,56; 36,87]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3	2	1	1	1	1	0	0	1	3	2	1	1	1	1						
		Anteil in %	0,24	0,18	0,10	0,12	0,14	0,15	0,00	0,00	0,16	0,54	0,38	0,20	0,22	0,23	0,26						
		CI Anteil in %	[0,00; 0,50]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,31]	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,43]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,49]	[0,00; 1,15]	[0,00; 0,91]	[0,00; 0,60]	[0,00; 0,64]	[0,00; 0,69]	[0,00; 0,76]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	125	71	59	53	55	37	25	36	28	36	34	30	25	24	24							
	Anteil in %	9,86	6,50	6,19	6,23	7,52	5,41	3,85	5,53	4,60	6,46	6,49	6,04	5,45	5,57	6,19							
	CI Anteil in %	[8,22; 11,50]	[5,03; 7,96]	[4,66; 7,72]	[4,60; 7,85]	[5,61; 9,44]	[3,71; 7,11]	[2,37; 5,33]	[3,77; 7,29]	[2,93; 6,26]	[4,42; 8,51]	[4,38; 8,60]	[3,94; 8,13]	[3,37; 7,53]	[3,40; 7,74]	[3,79; 8,59]							
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1616</b>	<b>1414</b>	<b>1213</b>	<b>1048</b>	<b>932</b>	<b>860</b>	<b>798</b>	<b>753</b>	<b>702</b>	<b>631</b>	<b>586</b>	<b>554</b>	<b>509</b>	<b>485</b>	<b>444</b>							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1783	1569	1327	1153	1067	992	919	845	755	693	638	585	558	506						
	auswertbar	Anzahl	1592	1355	1163	1017	931	876	871	824	734	678	624	569	538	493						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	724	674	591	515	499	476	443	455	398	385	363	318	297	288						
		Anteil in %	45,48	49,74	50,82	50,64	53,60	54,34	50,86	55,22	54,22	56,78	58,17	55,89	55,20	58,42						
		CI Anteil in %	[43,03; 47,92]	[47,08; 52,40]	[47,94; 53,69]	[47,56; 53,71]	[50,39; 56,80]	[51,04; 57,64]	[47,54; 54,18]	[51,82; 58,62]	[50,62; 57,83]	[53,05; 60,52]	[54,30; 62,05]	[51,80; 59,97]	[51,00; 59,41]	[54,06; 62,77]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	27	20	15	6	12	10	16	14	19	16	15	10	11	7						
		Anteil in %	1,70	1,48	1,29	0,59	1,29	1,14	1,84	1,70	2,59	2,36	2,40	1,76	2,04	1,42						
		CI Anteil in %	[1,06; 2,33]	[0,83; 2,12]	[0,64; 1,94]	[0,12; 1,06]	[0,56; 2,01]	[0,44; 1,85]	[0,94; 2,73]	[0,82; 2,58]	[1,44; 3,74]	[1,22; 3,50]	[1,20; 3,61]	[0,68; 2,84]	[0,85; 3,24]	[0,37; 2,47]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	697	654	576	509	487	466	427	441	379	369	348	308	286	281						
		Anteil in %	43,78	48,27	49,53	50,05	52,31	53,20	49,02	53,52	51,63	54,42	55,77	54,13	53,16	57,00						
		CI Anteil in %	[41,34; 46,22]	[45,60; 50,93]	[46,65; 52,40]	[46,97; 53,12]	[49,10; 55,52]	[49,89; 56,50]	[45,70; 52,35]	[50,11; 56,93]	[48,02; 55,25]	[50,67; 58,18]	[51,87; 59,67]	[50,03; 58,23]	[48,94; 57,38]	[52,62; 61,37]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	868	681	572	502	432	400	428	369	336	293	261	251	241	205						
		Anteil in %	54,52	50,26	49,18	49,36	46,40	45,66	49,14	44,78	45,78	43,22	41,83	44,11	44,80	41,58						
		CI Anteil in %	[52,08; 56,97]	[47,60; 52,92]	[46,31; 52,06]	[46,29; 52,44]	[43,20; 49,61]	[42,36; 48,96]	[45,82; 52,46]	[41,38; 48,18]	[42,17; 49,38]	[39,48; 46,95]	[37,95; 45,70]	[40,03; 48,20]	[40,59; 49,00]	[37,23; 45,94]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	16	20	10	12	6	11	15	13	5	4	4	7	7	8						
		Anteil in %	1,01	1,48	0,86	1,18	0,64	1,26	1,72	1,58	0,68	0,59	0,64	1,23	1,30	1,62						
		CI Anteil in %	[0,51; 1,50]	[0,83; 2,12]	[0,33; 1,39]	[0,52; 1,84]	[0,13; 1,16]	[0,52; 1,99]	[0,86; 2,59]	[0,73; 2,43]	[0,09; 1,28]	[0,01; 1,17]	[0,01; 1,27]	[0,32; 2,14]	[0,34; 2,26]	[0,51; 2,74]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	697	562	486	436	358	332	357	309	282	257	213	209	203	171						
		Anteil in %	43,78	41,48	41,79	42,87	38,45	37,90	40,99	37,50	38,42	37,91	34,13	36,73	37,73	34,69						
		CI Anteil in %	[41,34; 46,22]	[38,85; 44,10]	[38,95; 44,62]	[39,83; 45,91]	[35,33; 41,58]	[34,69; 41,11]	[37,72; 44,26]	[34,19; 40,81]	[34,90; 41,94]	[34,25; 41,56]	[30,41; 37,86]	[32,77; 40,70]	[33,63; 41,83]	[30,48; 38,89]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	1	0	1	1	2	1	3	3	1	1	0	0						
		Anteil in %	0,06	0,07	0,09	0,00	0,11	0,11	0,23	0,12	0,41	0,44	0,16	0,18	0,00	0,00						
		CI Anteil in %	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,55]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,87]	[0,00; 0,94]	[0,00; 0,47]	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	154	98	75	54	67	56	54	46	46	29	43	34	31	26							
	Anteil in %	9,67	7,23	6,45	5,31	7,20	6,39	6,20	5,58	6,27	4,28	6,89	5,98	5,76	5,27							
	CI Anteil in %	[8,22; 11,13]	[5,85; 8,61]	[5,04; 7,86]	[3,93; 6,69]	[5,54; 8,86]	[4,77; 8,01]	[4,60; 7,80]	[4,01; 7,15]	[4,51; 8,02]	[2,75; 5,80]	[4,90; 8,88]	[4,03; 7,92]	[3,79; 7,73]	[3,30; 7,25]							
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2020	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1532	1329	1133	1033	952	882	822	727	682	635	595	548	512					
	auswertbar	Anzahl	1346	1153	956	884	830	830	783	691	649	613	563	526	492					
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	606	561	506	444	438	419	429	369	356	329	314	268	270					
		Anteil in %	45,02	48,66	52,93	50,23	52,77	50,48	54,79	53,40	54,85	53,67	55,77	50,95	54,88					
		CI Anteil in %	[42,36; 47,68]	[45,77; 51,54]	[49,76; 56,09]	[46,93; 53,52]	[49,37; 56,17]	[47,08; 53,89]	[51,30; 58,28]	[49,68; 57,12]	[51,02; 58,69]	[49,72; 57,62]	[51,67; 59,88]	[46,67; 55,23]	[50,48; 59,28]					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	18	9	10	12	15	16	11	16	18	17	16	11	11					
		Anteil in %	1,34	0,78	1,05	1,36	1,81	1,93	1,40	2,32	2,77	2,77	2,84	2,09	2,24					
		CI Anteil in %	[0,72; 1,95]	[0,27; 1,29]	[0,40; 1,69]	[0,59; 2,12]	[0,90; 2,71]	[0,99; 2,86]	[0,58; 2,23]	[1,19; 3,44]	[1,51; 4,04]	[1,47; 4,07]	[1,47; 4,22]	[0,87; 3,32]	[0,93; 3,54]					
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	588	552	496	432	423	403	418	353	338	312	298	257	259					
		Anteil in %	43,68	47,88	51,88	48,87	50,96	48,55	53,38	51,09	52,08	50,90	52,93	48,86	52,64					
		CI Anteil in %	[41,03; 46,34]	[44,99; 50,76]	[48,71; 55,05]	[45,57; 52,17]	[47,56; 54,37]	[45,15; 51,96]	[49,89; 56,88]	[47,36; 54,82]	[48,23; 55,93]	[46,94; 54,86]	[48,80; 57,06]	[44,58; 53,14]	[48,23; 57,06]					
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	740	592	450	440	392	411	354	322	293	284	249	258	222					
		Anteil in %	54,98	51,34	47,07	49,77	47,23	49,52	45,21	46,60	45,15	46,33	44,23	49,05	45,12					
		CI Anteil in %	[52,32; 57,64]	[48,46; 54,23]	[43,91; 50,24]	[46,48; 53,07]	[43,83; 50,63]	[46,11; 52,92]	[41,72; 48,70]	[42,88; 50,32]	[41,31; 48,98]	[42,38; 50,28]	[40,12; 48,33]	[44,77; 53,33]	[40,72; 49,52]					
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	16	12	7	9	3	13	15	9	8	5	4	7	5					
		Anteil in %	1,19	1,04	0,73	1,02	0,36	1,57	1,92	1,30	1,23	0,82	0,71	1,33	1,02					
		CI Anteil in %	[0,61; 1,77]	[0,45; 1,63]	[0,19; 1,27]	[0,36; 1,68]	[0,00; 0,77]	[0,72; 2,41]	[0,95; 2,88]	[0,46; 2,15]	[0,38; 2,08]	[0,10; 1,53]	[0,02; 1,40]	[0,35; 2,31]	[0,13; 1,90]					
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	596	488	388	383	341	339	289	281	244	237	208	222	186					
		Anteil in %	44,28	42,32	40,59	43,33	41,08	40,84	36,91	40,67	37,60	38,66	36,94	42,21	37,80					
		CI Anteil in %	[41,62; 46,93]	[39,47; 45,18]	[37,47; 43,70]	[40,06; 46,59]	[37,74; 44,43]	[37,50; 44,19]	[33,53; 40,29]	[37,00; 44,33]	[33,87; 41,33]	[34,80; 42,52]	[32,95; 40,94]	[37,98; 46,43]	[33,52; 42,09]					
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	3	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0						
	Anteil in %	0,15	0,26	0,31	0,11	0,24	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,00						
	CI Anteil in %	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,55]	[0,00; 0,67]	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,46]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,53]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	126	89	52	47	46	59	50	32	40	42	36	29	31						
	Anteil in %	9,36	7,72	5,44	5,32	5,54	7,11	6,39	4,63	6,16	6,85	6,39	5,51	6,30						
	CI Anteil in %	[7,80; 10,92]	[6,18; 9,26]	[4,00; 6,88]	[3,84; 6,80]	[3,98; 7,10]	[5,36; 8,86]	[4,67; 8,10]	[3,06; 6,20]	[4,31; 8,01]	[4,85; 8,85]	[4,37; 8,42]	[3,56; 7,47]	[4,15; 8,45]						
Patienten insgesamt	Anzahl	1746	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585						
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1379	1229	1082	991	932	840	751	704	643	603	568	531						
	auswertbar	Anzahl	1222	1103	940	870	871	807	720	673	616	583	546	506						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	587	539	509	478	445	431	407	386	341	332	298	273						
		Anteil in %	48,04	48,87	54,15	54,94	51,09	53,41	56,53	57,36	55,36	56,95	54,58	53,95						
		CI Anteil in %	[45,23; 50,84]	[45,92; 51,82]	[50,96; 57,34]	[51,63; 58,25]	[47,77; 54,41]	[49,96; 56,85]	[52,90; 60,15]	[53,62; 61,09]	[51,43; 59,29]	[52,92; 60,97]	[50,40; 58,76]	[49,61; 58,30]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	8	7	10	8	20	18	16	22	16	16	12	13						
		Anteil in %	0,65	0,63	1,06	0,92	2,30	2,23	2,22	3,27	2,60	2,74	2,20	2,57						
		CI Anteil in %	[0,20; 1,11]	[0,17; 1,10]	[0,41; 1,72]	[0,28; 1,55]	[1,30; 3,29]	[1,21; 3,25]	[1,14; 3,30]	[1,92; 4,61]	[1,34; 3,85]	[1,42; 4,07]	[0,97; 3,43]	[1,19; 3,95]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	579	532	499	470	425	413	391	364	325	316	286	260						
		Anteil in %	47,38	48,23	53,09	54,02	48,79	51,18	54,31	54,09	52,76	54,20	52,38	51,38						
		CI Anteil in %	[44,58; 50,18]	[45,28; 51,18]	[49,89; 56,28]	[50,71; 57,34]	[45,47; 52,12]	[47,73; 54,63]	[50,66; 57,95]	[50,32; 57,85]	[48,81; 56,71]	[50,15; 58,25]	[48,19; 56,57]	[47,02; 55,74]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	635	564	431	392	426	376	313	287	275	251	248	233						
		Anteil in %	51,96	51,13	45,85	45,06	48,91	46,59	43,47	42,64	44,64	43,05	45,42	46,05						
		CI Anteil in %	[49,16; 54,77]	[48,18; 54,08]	[42,66; 49,04]	[41,75; 48,37]	[45,59; 52,23]	[43,15; 50,04]	[39,85; 47,10]	[38,91; 46,38]	[40,71; 48,57]	[39,03; 47,08]	[41,24; 49,60]	[41,70; 50,39]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	15	12	6	8	21	17	8	4	7	4	10	7						
		Anteil in %	1,23	1,09	0,64	0,92	2,41	2,11	1,11	0,59	1,14	0,69	1,83	1,38						
		CI Anteil in %	[0,61; 1,85]	[0,48; 1,70]	[0,13; 1,15]	[0,28; 1,55]	[1,39; 3,43]	[1,12; 3,10]	[0,34; 1,88]	[0,01; 1,18]	[0,30; 1,97]	[0,02; 1,36]	[0,71; 2,96]	[0,36; 2,40]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	529	468	363	331	348	310	254	246	232	219	205	199						
		Anteil in %	43,29	42,43	38,62	38,05	39,95	38,41	35,28	36,55	37,66	37,56	37,55	39,33						
		CI Anteil in %	[40,51; 46,07]	[39,51; 45,35]	[35,50; 41,73]	[34,82; 41,27]	[36,70; 43,21]	[35,06; 41,77]	[31,79; 38,77]	[32,91; 40,19]	[33,83; 41,49]	[33,63; 41,50]	[33,48; 41,61]	[35,07; 43,59]						
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3	0	2	2	3	1	1	1	2	2	0	1							
	Anteil in %	0,25	0,00	0,21	0,23	0,34	0,12	0,14	0,15	0,32	0,34	0,00	0,20							
	CI Anteil in %	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,51]	[0,00; 0,55]	[0,00; 0,73]	[0,00; 0,37]	[0,00; 0,41]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,82]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,58]							
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	88	84	60	51	54	48	50	36	34	26	33	26							
	Anteil in %	7,20	7,62	6,38	5,86	6,20	5,95	6,94	5,35	5,52	4,46	6,04	5,14							
	CI Anteil in %	[5,75; 8,65]	[6,05; 9,18]	[4,82; 7,95]	[4,30; 7,42]	[4,60; 7,80]	[4,32; 7,58]	[5,09; 8,80]	[3,65; 7,05]	[3,71; 7,32]	[2,78; 6,14]	[4,04; 8,04]	[3,21; 7,06]							
Patienten insgesamt	Anzahl	1564	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1463	1323	1204	1109	1032	912	827	763	721	673	615							
	auswertbar	Anzahl	1315	1209	1079	1047	973	868	787	728	677	637	571							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	646	618	577	566	547	487	444	398	377	350	304							
		Anteil in %	49,13	51,12	53,48	54,06	56,22	56,11	56,42	54,67	55,69	54,95	53,24							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[46,42; 51,83]	[48,30; 53,94]	[50,50; 56,45]	[51,04; 57,08]	[53,10; 59,34]	[52,80; 59,41]	[52,95; 59,88]	[51,05; 58,29]	[51,94; 59,43]	[51,08; 58,81]	[49,14; 57,34]							
		Anzahl	17	14	10	24	32	22	17	14	13	12	8							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,29	1,16	0,93	2,29	3,29	2,53	2,16	1,92	1,92	1,88	1,40							
		CI Anteil in %	[0,68; 1,90]	[0,55; 1,76]	[0,35; 1,50]	[1,39; 3,20]	[2,17; 4,41]	[1,49; 3,58]	[1,14; 3,18]	[0,92; 2,92]	[0,89; 2,95]	[0,83; 2,94]	[0,44; 2,37]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	629	604	567	542	515	465	427	384	364	338	296							
		Anteil in %	47,83	49,96	52,55	51,77	52,93	53,57	54,26	52,75	53,77	53,06	51,84							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[45,13; 50,53]	[47,14; 52,78]	[49,57; 55,53]	[48,74; 54,80]	[49,79; 56,07]	[50,25; 56,89]	[50,77; 57,74]	[49,12; 56,38]	[50,01; 57,53]	[49,18; 56,94]	[47,74; 55,94]							
		Anzahl	669	591	502	481	426	381	343	330	300	287	267							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	50,87	48,88	46,52	45,94	43,78	43,89	43,58	45,33	44,31	45,05	46,76							
		CI Anteil in %	[48,17; 53,58]	[46,06; 51,70]	[43,55; 49,50]	[42,92; 48,96]	[40,66; 46,90]	[40,59; 47,20]	[40,12; 47,05]	[41,71; 48,95]	[40,57; 48,06]	[41,19; 48,92]	[42,66; 50,86]							
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	9	12	10	18	10	9	7	8	3	2	7							
		Anteil in %	0,68	0,99	0,93	1,72	1,03	1,04	0,89	1,10	0,44	0,31	1,23							
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,24; 1,13]	[0,43; 1,55]	[0,35; 1,50]	[0,93; 2,51]	[0,39; 1,66]	[0,36; 1,71]	[0,23; 1,55]	[0,34; 1,86]	[0,00; 0,94]	[0,00; 0,75]	[0,32; 2,13]							
		Anzahl	545	500	436	399	365	329	295	282	260	247	224							
	Patienten insgesamt	Anteil in %	41,44	41,36	40,41	38,11	37,51	37,90	37,48	38,74	38,40	38,78	39,23							
		CI Anteil in %	[38,78; 44,11]	[38,58; 44,13]	[37,48; 43,34]	[35,17; 41,05]	[34,47; 40,56]	[34,67; 41,13]	[34,10; 40,87]	[35,20; 42,28]	[34,74; 42,07]	[34,99; 42,56]	[35,22; 43,24]							
2007-2	Anzahl	3	4	0	1	2	1	1	2	1	1	1								
	Anteil in %	0,23	0,33	0,00	0,10	0,21	0,12	0,13	0,27	0,15	0,16	0,18								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,00; 0,49]	[0,01; 0,65]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,49]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,66]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,46]	[0,00; 0,52]								
	Anzahl	112	75	56	63	49	42	40	38	36	37	35								
Kollektivmitglieder insgesamt	Anteil in %	8,52	6,20	5,19	6,02	5,04	4,84	5,08	5,22	5,32	5,81	6,13								
	CI Anteil in %	[7,01; 10,03]	[4,84; 7,56]	[3,87; 6,51]	[4,58; 7,46]	[3,66; 6,41]	[3,41; 6,27]	[3,55; 6,62]	[3,60; 6,84]	[3,63; 7,01]	[3,99; 7,63]	[4,16; 8,10]								
2007-2	Anzahl	1642	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685								
	auswertbar	Anzahl	1210	1089	979	883	751	683	629	581	545	502								
Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1096	985	934	846	730	660	603	558	523	471									
	Anteil in %	525	540	519	456	385	379	336	322	308	274									
Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	47,90	54,82	55,57	53,90	52,74	57,42	55,72	57,71	58,89	58,17									
	CI Anteil in %	[44,94; 50,86]	[51,71; 57,93]	[52,38; 58,76]	[50,54; 57,26]	[49,12; 56,36]	[53,65; 61,20]	[51,75; 59,69]	[53,60; 61,81]	[54,67; 63,11]	[53,71; 62,63]									
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	13	15	20	13	9	7	10	10	8	8									
	Anteil in %	1,19	1,52	2,14	1,54	1,23	1,06	1,66	1,79	1,53	1,70									
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,54; 1,83]	[0,76; 2,29]	[1,21; 3,07]	[0,71; 2,37]	[0,43; 2,03]	[0,28; 1,84]	[0,64; 2,68]	[0,69; 2,89]	[0,48; 2,58]	[0,53; 2,87]									
	Anzahl	512	525	499	443	376	372	326	312	300	266									
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	46,72	53,30	53,43	52,36	51,51	56,36	54,06	55,91	57,36	56,48									
	CI Anteil in %	[43,76; 49,67]	[50,18; 56,42]	[50,23; 56,63]	[49,00; 55,73]	[47,88; 55,13]	[52,58; 60,15]	[50,08; 58,04]	[51,79; 60,04]	[53,12; 61,60]	[51,99; 60,96]									
Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	571	445	415	390	345	281	267	236	215	197									
	Anteil in %	52,10	45,18	44,43	46,10	47,26	42,58	44,28	42,29	41,11	41,83									
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[49,14; 55,06]	[42,07; 48,29]	[41,24; 47,62]	[42,74; 49,46]	[43,64; 50,88]	[38,80; 46,35]	[40,31; 48,25]	[38,19; 46,40]	[36,89; 45,33]	[37,37; 46,29]									
	Anzahl	7	3	15	9	9	7	6	7	6	5									
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	0,64	0,30	1,61	1,06	1,23	1,06	1,00	1,25	1,15	1,06									
	CI Anteil in %	[0,17; 1,11]	[0,00; 0,65]	[0,80; 2,41]	[0,37; 1,76]	[0,43; 2,03]	[0,28; 1,84]	[0,20; 1,79]	[0,33; 2,18]	[0,23; 2,06]	[0,14; 1,99]									
Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	473	378	335	338	298	240	233	191	174	161									
	Anteil in %	43,16	38,38	35,87	39,95	40,82	36,36	38,64	34,23	33,27	34,18									
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[40,22; 46,09]	[35,34; 41,41]	[32,79; 38,94]	[36,65; 43,26]	[37,25; 44,39]	[32,69; 40,04]	[34,75; 42,53]	[30,29; 38,17]	[29,23; 37,31]	[29,89; 38,47]									
	Anzahl	1	0	3	5	2	4	2	1	1	1									
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	0,09	0,00	0,32	0,59	0,27	0,61	0,33	0,18	0,19	0,21									
	CI Anteil in %	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,68]	[0,07; 1,11]	[0,00; 0,65]	[0,01; 1,20]	[0,00; 0,79]	[0,00; 0,53]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,63]									
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	90	64	62	38	36	30	26	37	34	30									
	Anteil in %	8,21	6,50	6,64	4,49	4,93	4,55	4,31	6,63	6,50	6,37									
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[6,59; 9,84]	[4,96; 8,04]	[5,04; 8,24]	[3,10; 5,89]	[3,36; 6,50]	[2,96; 6,14]	[2,69; 5,93]	[4,56; 8,70]	[4,39; 8,62]	[4,16; 8,58]									
	Anzahl	1390	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573									
2007-2	auswertbar	Anzahl	1096	985	934	846	730	660	603	558	523	471								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	525	540	519	456	385	379	336	322	308	274								
Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	47,90	54,82	55,57	53,90	52,74	57,42	55,72	57,71	58,89	58,17									
	CI Anteil in %	[44,94; 50,86]	[51,71; 57,93]	[52,38; 58,76]	[50,54; 57,26]	[49,12; 56,36]	[53,65; 61,20]	[51,75; 59,69]	[53,60; 61,81]	[54,67; 63,11]	[53,71; 62,63]									
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	13	15	20	13	9	7	10	10	8	8									
	Anteil in %	1,19	1,52	2,14	1,54	1,23	1,06	1,66	1,79	1,53	1,70									
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,54; 1,83]	[0,76; 2,29]	[1,21; 3,07]	[0,71; 2,37]	[0,43; 2,03]	[0,28; 1,84]	[0,64; 2,68]	[0,69; 2,89]	[0,48; 2,58]	[0,53; 2,87]									
	Anzahl	512	525	499	443	376	372	326	312	300	266									
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	46,72	53,30	53,43	52,36	51,51	56,36	54,06	55,91	57,36	56,48									

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1138	1043	952	818	738	681	635	599	545										
	auswertbar	Anzahl	1004	978	915	786	705	654	609	571	511										
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	531	520	526	432	409	364	370	316	293										
		Anteil in %	52,89	53,17	57,49	54,96	58,01	55,66	60,76	55,34	57,34										
		CI Anteil in %	[49,80; 55,98]	[50,04; 56,30]	[54,28; 60,69]	[51,48; 58,44]	[54,37; 61,66]	[51,85; 59,47]	[56,87; 64,64]	[51,26; 59,42]	[53,05; 61,63]										
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	8	23	27	22	18	15	19	18	9										
		Anteil in %	0,80	2,35	2,95	2,80	2,55	2,29	3,12	3,15	1,76										
		CI Anteil in %	[0,25; 1,35]	[1,40; 3,30]	[1,85; 4,05]	[1,65; 3,95]	[1,39; 3,72]	[1,15; 3,44]	[1,74; 4,50]	[1,72; 4,59]	[0,62; 2,90]										
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	523	497	499	410	391	349	351	298	284										
		Anteil in %	52,09	50,82	54,54	52,16	55,46	53,36	57,64	52,19	55,58										
		CI Anteil in %	[49,00; 55,18]	[47,68; 53,95]	[51,31; 57,76]	[48,67; 55,66]	[51,79; 59,13]	[49,54; 57,19]	[53,71; 61,56]	[48,09; 56,29]	[51,26; 59,89]										
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	473	458	389	354	296	290	239	255	218										
		Anteil in %	47,11	46,83	42,51	45,04	41,99	44,34	39,24	44,66	42,66										
		CI Anteil in %	[44,02; 50,20]	[43,70; 49,96]	[39,31; 45,72]	[41,56; 48,52]	[38,34; 45,63]	[40,53; 48,15]	[35,36; 43,13]	[40,58; 48,74]	[38,37; 46,95]										
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	5	23	15	15	16	16	7	9	8										
		Anteil in %	0,50	2,35	1,64	1,91	2,27	2,45	1,15	1,58	1,57										
		CI Anteil in %	[0,06; 0,93]	[1,40; 3,30]	[0,82; 2,46]	[0,95; 2,87]	[1,17; 3,37]	[1,26; 3,63]	[0,30; 2,00]	[0,55; 2,60]	[0,49; 2,64]										
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	399	378	319	291	254	250	209	208	181										
		Anteil in %	39,74	38,65	34,86	37,02	36,03	38,23	34,32	36,43	35,42										
		CI Anteil in %	[36,71; 42,77]	[35,60; 41,70]	[31,77; 37,95]	[33,64; 40,40]	[32,48; 39,57]	[34,50; 41,95]	[30,54; 38,09]	[32,48; 40,38]	[31,27; 39,57]										
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	2	2	0	1	2	1	3											
	Anteil in %	0,10	0,10	0,22	0,25	0,00	0,15	0,33	0,18	0,59											
	CI Anteil in %	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,30]	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,45]	[0,00; 0,78]	[0,00; 0,52]	[0,00; 1,25]											
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	68	56	53	46	26	23	21	37	26											
	Anteil in %	6,77	5,73	5,79	5,85	3,69	3,52	3,45	6,48	5,09											
	CI Anteil in %	[5,22; 8,33]	[4,27; 7,18]	[4,28; 7,31]	[4,21; 7,49]	[2,30; 5,08]	[2,10; 4,93]	[2,00; 4,90]	[4,46; 8,50]	[3,18; 7,00]											
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1260</b>	<b>1149</b>	<b>1047</b>	<b>897</b>	<b>808</b>	<b>747</b>	<b>694</b>	<b>653</b>	<b>595</b>											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	507	461	396	357	333	307	285	271											
	auswertbar	Anzahl	507	450	389	342	326	298	280	256											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	261	224	200	193	181	176	157	148											
		Anteil in %	51,48	49,78	51,41	56,43	55,52	59,06	56,07	57,81											
		CI Anteil in %	[47,12; 55,83]	[45,15; 54,40]	[46,44; 56,39]	[51,17; 61,70]	[50,12; 60,92]	[53,47; 64,65]	[50,25; 61,90]	[51,75; 63,87]											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	16	9	8	7	9	6	7	7											
		Anteil in %	3,16	2,00	2,06	2,05	2,76	2,01	2,50	2,73											
		CI Anteil in %	[1,63; 4,68]	[0,71; 3,29]	[0,64; 3,47]	[0,54; 3,55]	[0,98; 4,54]	[0,42; 3,61]	[0,67; 4,33]	[0,73; 4,74]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	245	215	192	186	172	170	150	141											
		Anteil in %	48,32	47,78	49,36	54,39	52,76	57,05	53,57	55,08											
		CI Anteil in %	[43,97; 52,68]	[43,16; 52,40]	[44,38; 54,33]	[49,10; 59,67]	[47,33; 58,19]	[51,42; 62,68]	[47,72; 59,42]	[48,97; 61,18]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	246	226	189	149	145	122	123	108											
		Anteil in %	48,52	50,22	48,59	43,57	44,48	40,94	43,93	42,19											
		CI Anteil in %	[44,17; 52,88]	[45,60; 54,85]	[43,61; 53,56]	[38,30; 48,83]	[39,08; 49,88]	[35,35; 46,53]	[38,10; 49,75]	[36,13; 48,25]											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	8	8	4	6	2	4	3	3											
		Anteil in %	1,58	1,78	1,03	1,75	0,61	1,34	1,07	1,17											
		CI Anteil in %	[0,49; 2,66]	[0,56; 3,00]	[0,02; 2,03]	[0,36; 3,15]	[0,00; 1,46]	[0,03; 2,65]	[0,00; 2,28]	[0,00; 2,49]											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	204	197	166	126	125	106	104	95											
		Anteil in %	40,24	43,78	42,67	36,84	38,34	35,57	37,14	37,11											
		CI Anteil in %	[35,96; 44,51]	[39,19; 48,37]	[37,75; 47,60]	[31,72; 41,96]	[33,06; 43,63]	[30,13; 41,02]	[31,47; 42,81]	[31,18; 43,04]											
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3	1	3	1	1	1	2	0												
	Anteil in %	0,59	0,22	0,77	0,29	0,31	0,34	0,71	0,00												
	CI Anteil in %	[0,00; 1,26]	[0,00; 0,66]	[0,00; 1,64]	[0,00; 0,87]	[0,00; 0,91]	[0,00; 0,99]	[0,00; 1,70]	[0,00; 0,00]												
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	31	20	16	16	17	11	14	10												
	Anteil in %	6,11	4,44	4,11	4,68	5,21	3,69	5,00	3,91												
	CI Anteil in %	[4,03; 8,20]	[2,54; 6,35]	[2,14; 6,09]	[2,44; 6,92]	[2,80; 7,63]	[1,55; 5,84]	[2,44; 7,56]	[1,53; 6,28]												
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>563</b>	<b>507</b>	<b>437</b>	<b>395</b>	<b>368</b>	<b>338</b>	<b>312</b>	<b>296</b>												

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	628	538	471	430	386	353	331													
	auswertbar	Anzahl	628	517	455	422	375	346	324													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	316	291	254	228	217	182	177													
		Anteil in %	50,32	56,29	55,82	54,03	57,87	52,60	54,63													
		CI Anteil in %	[46,40; 54,23]	[52,01; 60,57]	[51,26; 60,39]	[49,27; 58,79]	[52,86; 62,87]	[47,33; 57,87]	[49,20; 60,06]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	18	13	14	12	13	6	6													
		Anteil in %	2,87	2,51	3,08	2,84	3,47	1,73	1,85													
		CI Anteil in %	[1,56; 4,17]	[1,16; 3,87]	[1,49; 4,67]	[1,26; 4,43]	[1,61; 5,32]	[0,36; 3,11]	[0,38; 3,32]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	298	278	240	216	204	176	171													
		Anteil in %	47,45	53,77	52,75	51,18	54,40	50,87	52,78													
		CI Anteil in %	[43,54; 51,36]	[49,47; 58,07]	[48,15; 57,34]	[46,41; 55,96]	[49,35; 59,45]	[45,59; 56,14]	[47,33; 58,22]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	312	226	201	194	158	164	147													
		Anteil in %	49,68	43,71	44,18	45,97	42,13	47,40	45,37													
		CI Anteil in %	[45,77; 53,60]	[39,43; 47,99]	[39,61; 48,74]	[41,21; 50,73]	[37,13; 47,14]	[42,13; 52,67]	[39,94; 50,80]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	11	11	7	4	5	8	6													
		Anteil in %	1,75	2,13	1,54	0,95	1,33	2,31	1,85													
		CI Anteil in %	[0,72; 2,78]	[0,88; 3,37]	[0,41; 2,67]	[0,02; 1,87]	[0,17; 2,50]	[0,73; 3,90]	[0,38; 3,32]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	259	181	166	169	135	139	121													
		Anteil in %	41,24	35,01	36,48	40,05	36,00	40,17	37,35													
		CI Anteil in %	[37,39; 45,10]	[30,89; 39,13]	[32,06; 40,91]	[35,37; 44,73]	[31,14; 40,86]	[35,00; 45,35]	[32,07; 42,62]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	2	0	2	0	1	0														
	Anteil in %	0,16	0,39	0,00	0,47	0,00	0,29	0,00														
	CI Anteil in %	[0,00; 0,47]	[0,00; 0,92]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,13]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,86]	[0,00; 0,00]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	41	32	28	19	18	16	20														
	Anteil in %	6,53	6,19	6,15	4,50	4,80	4,62	6,17														
	CI Anteil in %	[4,60; 8,46]	[4,11; 8,27]	[3,94; 8,36]	[2,52; 6,48]	[2,63; 6,97]	[2,41; 6,84]	[3,55; 8,80]														
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>714</b>	<b>614</b>	<b>543</b>	<b>497</b>	<b>447</b>	<b>407</b>	<b>380</b>														
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	441	387	344	319	282	257														
	auswertbar	Anzahl	441	382	333	312	275	252														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	233	210	165	175	148	134														
		Anteil in %	52,83	54,97	49,55	56,09	53,82	53,17														
		CI Anteil in %	[48,17; 57,50]	[49,98; 59,97]	[44,17; 54,93]	[50,57; 61,61]	[47,92; 59,72]	[47,00; 59,35]														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	9	11	11	13	8	6														
		Anteil in %	2,04	2,88	3,30	4,17	2,91	2,38														
		CI Anteil in %	[0,72; 3,36]	[1,20; 4,56]	[1,38; 5,23]	[1,95; 6,39]	[0,92; 4,90]	[0,49; 4,27]														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	224	199	154	162	140	128														
		Anteil in %	50,79	52,09	46,25	51,92	50,91	50,79														
		CI Anteil in %	[46,12; 55,47]	[47,08; 57,11]	[40,88; 51,61]	[46,37; 57,48]	[44,99; 56,83]	[44,61; 56,98]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	208	172	168	137	127	118														
		Anteil in %	47,17	45,03	50,45	43,91	46,18	46,83														
		CI Anteil in %	[42,50; 51,83]	[40,03; 50,02]	[45,07; 55,83]	[38,39; 49,43]	[40,28; 52,08]	[40,65; 53,00]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	8	7	9	6	7	3														
		Anteil in %	1,81	1,83	2,70	1,92	2,55	1,19														
		CI Anteil in %	[0,57; 3,06]	[0,49; 3,18]	[0,96; 4,45]	[0,40; 3,45]	[0,68; 4,41]	[0,00; 2,53]														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	166	137	132	112	105	105														
		Anteil in %	37,64	35,86	39,64	35,90	38,18	41,67														
		CI Anteil in %	[33,11; 42,17]	[31,05; 40,68]	[34,38; 44,90]	[30,57; 41,23]	[32,43; 43,93]	[35,57; 47,77]														
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	2	0	1	0	1															
	Anteil in %	0,45	0,52	0,00	0,32	0,00	0,40															
	CI Anteil in %	[0,00; 1,08]	[0,00; 1,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,95]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,17]															
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	32	26	27	18	15	9															
	Anteil in %	7,26	6,81	8,11	5,77	5,45	3,57															
	CI Anteil in %	[4,83; 9,68]	[4,28; 9,34]	[5,17; 11,04]	[3,18; 8,36]	[2,77; 8,14]	[1,28; 5,87]															
<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>507</b>	<b>446</b>	<b>395</b>	<b>367</b>	<b>323</b>	<b>292</b>															

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	488	433	389	347	317														
	auswertbar	Anzahl	488	429	380	339	309														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	258	252	226	194	177														
		Anteil in %	52,87	58,74	59,47	57,23	57,28														
		CI Anteil in %	[48,44; 57,30]	[54,08; 63,41]	[54,53; 64,42]	[51,95; 62,50]	[51,76; 62,81]														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	11	11	9	6	5														
		Anteil in %	2,25	2,56	2,37	1,77	1,62														
		CI Anteil in %	[0,94; 3,57]	[1,07; 4,06]	[0,84; 3,90]	[0,36; 3,18]	[0,21; 3,03]														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	247	241	217	188	172														
		Anteil in %	50,61	56,18	57,11	55,46	55,66														
		CI Anteil in %	[46,17; 55,06]	[51,48; 60,88]	[52,12; 62,09]	[50,16; 60,76]	[50,12; 61,21]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	230	177	154	145	132														
		Anteil in %	47,13	41,26	40,53	42,77	42,72														
		CI Anteil in %	[42,70; 51,56]	[36,59; 45,92]	[35,58; 45,47]	[37,50; 48,05]	[37,19; 48,24]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	8	6	4	2	4														
		Anteil in %	1,64	1,40	1,05	0,59	1,29														
		CI Anteil in %	[0,51; 2,77]	[0,29; 2,51]	[0,03; 2,08]	[0,00; 1,41]	[0,03; 2,56]														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	179	146	130	125	118														
		Anteil in %	36,68	34,03	34,21	36,87	38,19														
		CI Anteil in %	[32,40; 40,96]	[29,54; 38,52]	[29,43; 38,99]	[31,73; 42,02]	[32,76; 43,61]														
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	0	1	2															
	Anteil in %	0,20	0,23	0,00	0,29	0,65															
	CI Anteil in %	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,69]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,87]	[0,00; 1,54]															
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	42	24	20	17	8															
	Anteil in %	8,61	5,59	5,26	5,01	2,59															
	CI Anteil in %	[6,12; 11,10]	[3,42; 7,77]	[3,02; 7,51]	[2,69; 7,34]	[0,82; 4,36]															
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	547	485	437	389	357														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	425	380	347	308															
	auswertbar	Anzahl	424	377	340	301															
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	214	212	192	151															
		Anteil in %	50,47	56,23	56,47	50,17															
		CI Anteil in %	[45,71; 55,24]	[51,22; 61,25]	[51,19; 61,75]	[44,51; 55,82]															
	Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	9	8	4	4															
		Anteil in %	2,12	2,12	1,18	1,33															
		CI Anteil in %	[0,75; 3,50]	[0,67; 3,58]	[0,03; 2,32]	[0,03; 2,62]															
	Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	205	204	188	147															
		Anteil in %	48,35	54,11	55,29	48,84															
		CI Anteil in %	[43,59; 53,11]	[49,07; 59,15]	[50,00; 60,59]	[43,18; 54,49]															
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	210	165	148	150															
		Anteil in %	49,53	43,77	43,53	49,83															
		CI Anteil in %	[44,76; 54,29]	[38,75; 48,78]	[38,25; 48,81]	[44,18; 55,49]															
	Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	7	3	7	2															
		Anteil in %	1,65	0,80	2,06	0,66															
		CI Anteil in %	[0,44; 2,87]	[0,00; 1,69]	[0,55; 3,57]	[0,00; 1,58]															
	Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	169	136	122	129															
		Anteil in %	39,86	36,07	35,88	42,86															
		CI Anteil in %	[35,19; 44,52]	[31,22; 40,93]	[30,78; 40,99]	[37,26; 48,46]															
Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	3	0	1																
	Anteil in %	0,24	0,80	0,00	0,33																
	CI Anteil in %	[0,00; 0,70]	[0,00; 1,69]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,98]																
Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	33	23	19	18																
	Anteil in %	7,78	6,10	5,59	5,98																
	CI Anteil in %	[5,23; 10,34]	[3,68; 8,52]	[3,14; 8,03]	[3,30; 8,66]																
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	501	442	400	360															



EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr						
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	455	397	335																					
	auswertbar	Anzahl	455	389	327																					
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	224	216	196																					
		Anteil in %	49,23	55,53	59,94																					
		CI Anteil in %	[44,63; 53,83]	[50,58; 60,47]	[54,62; 65,26]																					
	Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	9	11	8																					
		Anteil in %	1,98	2,83	2,45																					
		CI Anteil in %	[0,70; 3,26]	[1,18; 4,48]	[0,77; 4,12]																					
	Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	215	205	188																					
		Anteil in %	47,25	52,70	57,49																					
		CI Anteil in %	[42,66; 51,85]	[47,73; 57,67]	[52,13; 62,86]																					
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	231	173	131																					
		Anteil in %	50,77	44,47	40,06																					
		CI Anteil in %	[46,17; 55,37]	[39,53; 49,42]	[34,74; 45,38]																					
	Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	9	6	5																					
		Anteil in %	1,98	1,54	1,53																					
		CI Anteil in %	[0,70; 3,26]	[0,32; 2,77]	[0,20; 2,86]																					
	Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	185	142	106																					
		Anteil in %	40,66	36,50	32,42																					
		CI Anteil in %	[36,14; 45,18]	[31,71; 41,29]	[27,33; 37,50]																					
	Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	0	0																					
		Anteil in %	0,22	0,00	0,00																					
		CI Anteil in %	[0,00; 0,65]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]																					
Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	36	25	20																						
	Anteil in %	7,91	6,43	6,12																						
	CI Anteil in %	[5,43; 10,40]	[3,99; 8,87]	[3,51; 8,72]																						
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	519	455	385																					

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	388	335																		
	auswertbar	Anzahl	388	325																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	190	180																		
		Anteil in %	48,97	55,38																		
		CI Anteil in %	[43,99; 53,95]	[49,97; 60,80]																		
	Kategorie 1 " <i>normal ohne</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	6	8																		
		Anteil in %	1,55	2,46																		
		CI Anteil in %	[0,32; 2,78]	[0,77; 4,15]																		
	Kategorie 2 " <i>normal mit</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	184	172																		
		Anteil in %	47,42	52,92																		
		CI Anteil in %	[42,45; 52,40]	[47,49; 58,36]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	198	145																		
		Anteil in %	51,03	44,62																		
		CI Anteil in %	[46,05; 56,01]	[39,20; 50,03]																		
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	6	7																		
		Anteil in %	1,55	2,15																		
		CI Anteil in %	[0,32; 2,78]	[0,57; 3,73]																		
	Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	162	121																		
		Anteil in %	41,75	37,23																		
		CI Anteil in %	[36,84; 46,67]	[31,97; 42,49]																		
Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne Therapie</i> ": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	0																			
	Anteil in %	0,00	0,00																			
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]																			
Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	30	17																			
	Anteil in %	7,73	5,23																			
	CI Anteil in %	[5,07; 10,39]	[2,81; 7,66]																			
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>435</b>	<b>376</b>																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	380																		
	auswertbar	Anzahl	379																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	188																		
		Anteil in %	49,60																		
		CI Anteil in %	[44,56; 54,64]																		
	Kategorie 1 " <i>normal ohne</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	8																		
		Anteil in %	2,11																		
		CI Anteil in %	[0,66; 3,56]																		
	Kategorie 2 " <i>normal mit</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	180																		
		Anteil in %	47,49																		
		CI Anteil in %	[42,46; 52,53]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	191																		
		Anteil in %	50,40																		
		CI Anteil in %	[45,36; 55,44]																		
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4																		
		Anteil in %	1,06																		
		CI Anteil in %	[0,03; 2,09]																		
	Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	155																		
		Anteil in %	40,90																		
		CI Anteil in %	[35,94; 45,85]																		
Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht ohne</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1																			
	Anteil in %	0,26																			
	CI Anteil in %	[0,00; 0,78]																			
Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	31																			
	Anteil in %	8,18																			
	CI Anteil in %	[5,42; 10,94]																			
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>431</b>																		

In Tabelle B.3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für - - Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei - - mmHg, der Median bei - - mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei - - und der Median bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	716	581	494	410	351	309	283	247	225	216	205	195	182	173	166	157	153	142	
	auswertbar	Anzahl	716	528	476	397	344	303	276	233	213	200	200	189	179	169	163	155	148	134	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,86	137,26	138,04	135,32	136,56	136,38	136,68	134,13	134,51	133,51	135,57	135,22	132,65	134,09	134,60	133,72	136,86	134,84	
		CI Mean	[139,54; 142,18]	[135,86; 138,65]	[136,55; 139,54]	[133,71; 136,93]	[134,79; 138,33]	[134,53; 138,23]	[135,02; 138,34]	[132,26; 136,00]	[132,36; 136,65]	[131,67; 135,34]	[133,30; 137,84]	[132,96; 137,49]	[130,39; 134,90]	[131,70; 136,48]	[132,22; 136,98]	[131,18; 136,26]	[134,02; 139,70]	[132,25; 137,42]	
		Median	140,00	140,00	140,00	135,00	135,00	135,00	138,00	135,00	135,00	134,50	130,00	130,00	130,00	130,00	135,00	130,00	140,00	140,00	132,50
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>837</i>	<i>674</i>	<i>573</i>	<i>474</i>	<i>405</i>	<i>362</i>	<i>331</i>	<i>284</i>	<i>259</i>	<i>250</i>	<i>239</i>	<i>226</i>	<i>213</i>	<i>204</i>	<i>195</i>	<i>186</i>	<i>182</i>	<i>171</i>		
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1607	1317	1075	903	799	689	624	580	550	513	474	436	413	390	364	340	313		
	auswertbar	Anzahl	1607	1168	1013	880	773	666	576	541	512	496	461	423	401	383	353	334	300		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,67	138,77	137,50	137,05	136,07	136,00	134,61	136,02	135,29	134,46	134,66	135,26	134,19	134,47	133,86	135,20	134,85		
		CI Mean	[140,78; 142,57]	[137,82; 139,71]	[136,47; 138,52]	[136,01; 138,08]	[134,98; 137,16]	[134,77; 137,22]	[133,32; 135,91]	[134,65; 137,40]	[133,98; 136,60]	[133,11; 135,80]	[133,26; 136,07]	[133,77; 136,75]	[132,65; 135,74]	[132,92; 136,03]	[132,11; 135,61]	[133,49; 136,91]	[133,01; 136,70]		
		Median	140,00	140,00	136,00	136,00	135,00	135,00	134,00	135,00	135,00	133,00	130,00	135,00	130,00	132,00	134,00	135,00	130,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1896</i>	<i>1551</i>	<i>1266</i>	<i>1056</i>	<i>941</i>	<i>815</i>	<i>729</i>	<i>680</i>	<i>646</i>	<i>604</i>	<i>561</i>	<i>517</i>	<i>488</i>	<i>459</i>	<i>427</i>	<i>399</i>	<i>369</i>			
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1921	1581	1319	1121	969	871	826	761	710	669	611	558	524	485	446	413			
	auswertbar	Anzahl	1921	1469	1261	1076	931	826	784	713	677	641	590	539	499	456	426	395			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,61	138,95	137,94	137,68	137,34	136,66	137,09	135,72	135,24	136,07	136,36	135,01	136,10	133,98	135,31	135,55			
		CI Mean	[139,81; 141,41]	[138,07; 139,83]	[137,01; 138,88]	[136,69; 138,68]	[136,24; 138,45]	[135,50; 137,82]	[135,86; 138,31]	[134,50; 136,94]	[134,04; 136,45]	[134,72; 137,42]	[135,04; 137,68]	[133,57; 136,46]	[134,66; 137,54]	[132,52; 135,43]	[133,79; 136,83]	[134,10; 137,00]			
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	135,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	130,00	135,00	135,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2223</i>	<i>1829</i>	<i>1522</i>	<i>1294</i>	<i>1121</i>	<i>1004</i>	<i>944</i>	<i>872</i>	<i>815</i>	<i>770</i>	<i>698</i>	<i>641</i>	<i>601</i>	<i>557</i>	<i>512</i>	<i>474</i>				
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1428	1254	1076	939	837	776	721	679	635	572	533	505	465	442	403				
	auswertbar	Anzahl	1428	1185	1031	913	785	734	692	651	609	557	524	497	459	431	388				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,25	137,48	137,11	136,86	136,68	136,69	134,97	135,92	135,97	136,76	135,59	135,42	134,49	134,64	134,75				
		CI Mean	[139,33; 141,18]	[136,54; 138,42]	[136,07; 138,15]	[135,79; 137,94]	[135,42; 137,94]	[135,54; 137,83]	[133,83; 136,11]	[134,72; 137,12]	[134,75; 137,19]	[135,30; 138,21]	[134,13; 137,05]	[134,03; 136,81]	[133,00; 135,98]	[133,01; 136,27]	[133,07; 136,43]				
		Median	140,00	140,00	135,00	135,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1616</i>	<i>1414</i>	<i>1213</i>	<i>1048</i>	<i>932</i>	<i>860</i>	<i>798</i>	<i>753</i>	<i>702</i>	<i>631</i>	<i>586</i>	<i>554</i>	<i>509</i>	<i>485</i>	<i>444</i>					
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1783	1569	1327	1153	1067	992	919	845	755	693	638	585	558	506					
	auswertbar	Anzahl	1783	1473	1271	1089	998	939	872	824	734	678	624	569	538	493					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,32	137,38	136,84	136,59	136,26	135,74	136,24	135,33	135,94	134,26	134,90	134,85	135,09	133,97					
		CI Mean	[138,47; 140,16]	[136,48; 138,28]	[135,91; 137,77]	[135,64; 137,55]	[135,21; 137,32]	[134,66; 136,82]	[135,12; 137,36]	[134,24; 136,42]	[134,74; 137,15]	[133,04; 135,49]	[133,51; 136,29]	[133,46; 136,23]	[133,60; 136,59]	[132,56; 135,38]					
		Median	140,00	137,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,50	130,00	130,00	130,00	130,50	130,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2020</i>	<i>1768</i>	<i>1504</i>	<i>1295</i>	<i>1196</i>	<i>1111</i>	<i>1029</i>	<i>944</i>	<i>843</i>	<i>775</i>	<i>715</i>	<i>659</i>	<i>628</i>	<i>572</i>						
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1532	1329	1133	1033	952	882	822	727	682	635	595	548	512						
	auswertbar	Anzahl	1532	1264	1049	964	895	830	783	691	649	613	563	526	492						
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,36	137,54	135,82	136,72	135,86	136,78	135,53	135,41	134,99	135,51	135,82	136,37	135,48						
		CI Mean	[138,45; 140,26]	[136,59; 138,50]	[134,80; 136,84]	[135,68; 137,77]	[134,76; 136,96]	[135,60; 137,96]	[134,36; 136,70]	[134,20; 136,62]	[133,69; 136,29]	[134,10; 136,92]	[134,43; 137,21]	[134,95; 137,80]	[133,91; 137,05]						
		Median	140,00	136,00	135,00	135,50	135,00	135,00	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1746</i>	<i>1506</i>	<i>1284</i>	<i>1166</i>	<i>1076</i>	<i>999</i>	<i>931</i>	<i>824</i>	<i>770</i>	<i>721</i>	<i>676</i>	<i>624</i>	<i>585</i>							

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1379	1229	1082	991	932	840	751	704	643	603	568	531							
	auswertbar	Anzahl	1379	1177	999	924	871	807	720	673	616	583	546	506							
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,06	137,20	136,29	135,72	136,44	136,04	135,42	134,97	135,67	134,44	136,00	134,83							
		CI Mean	[137,16; 138,95]	[136,20; 138,20]	[135,23; 137,35]	[134,65; 136,80]	[135,33; 137,54]	[134,90; 137,18]	[134,21; 136,62]	[133,73; 136,21]	[134,41; 136,93]	[133,16; 135,73]	[134,65; 137,36]	[133,49; 136,17]							
		Median	138,00	138,00	135,00	135,00	135,00	132,00	131,00	130,00	134,50	130,00	134,50	135,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1564</i>	<i>1393</i>	<i>1231</i>	<i>1129</i>	<i>1054</i>	<i>953</i>	<i>849</i>	<i>796</i>	<i>731</i>	<i>684</i>	<i>643</i>	<i>597</i>								
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1463	1323	1204	1109	1032	912	827	763	721	673	615								
	auswertbar	Anzahl	1463	1278	1150	1047	973	868	787	729	678	637	571								
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,80	136,23	135,76	136,01	135,28	135,56	135,17	135,50	135,32	135,15	135,65								
		CI Mean	[136,91; 138,69]	[135,32; 137,15]	[134,80; 136,71]	[134,99; 137,03]	[134,22; 136,34]	[134,51; 136,61]	[134,02; 136,62]	[134,31; 136,68]	[134,08; 136,55]	[133,86; 136,43]	[134,22; 137,08]								
		Median	136,00	135,00	135,00	132,00	130,00	130,00	130,00	135,00	132,00	130,00	134,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1642</i>	<i>1481</i>	<i>1343</i>	<i>1235</i>	<i>1145</i>	<i>1007</i>	<i>913</i>	<i>846</i>	<i>799</i>	<i>746</i>	<i>685</i>									
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1210	1089	979	883	751	683	629	581	545	502									
	auswertbar	Anzahl	1210	1057	934	846	730	660	603	558	523	471									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,03	136,00	135,54	135,46	135,93	134,01	134,33	134,51	134,13	134,00									
		CI Mean	[137,04; 139,03]	[134,96; 137,03]	[134,41; 136,67]	[134,34; 136,58]	[134,73; 137,13]	[132,80; 135,22]	[133,06; 135,59]	[133,16; 135,62]	[132,65; 135,62]	[132,37; 135,63]									
		Median	140,00	135,00	130,00	133,50	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1390</i>	<i>1240</i>	<i>1108</i>	<i>1000</i>	<i>850</i>	<i>776</i>	<i>716</i>	<i>662</i>	<i>621</i>	<i>573</i>										
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1138	1043	952	818	738	681	635	599	545										
	auswertbar	Anzahl	1138	982	915	787	706	656	610	575	512										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,47	135,31	134,38	134,74	133,47	134,33	133,28	135,37	134,15										
		CI Mean	[135,45; 137,50]	[134,27; 136,36]	[133,28; 135,48]	[133,65; 135,84]	[132,32; 134,62]	[133,14; 135,53]	[132,05; 134,52]	[133,99; 136,74]	[132,78; 135,53]										
		Median	135,00	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	132,00	130,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1260</i>	<i>1149</i>	<i>1047</i>	<i>897</i>	<i>808</i>	<i>747</i>	<i>694</i>	<i>653</i>	<i>595</i>											
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	507	461	396	357	333	307	285	271											
	auswertbar	Anzahl	507	450	389	342	326	298	280	256											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	135,65	135,79	135,31	134,56	135,31	134,32	135,05	133,92											
		CI Mean	[134,15; 137,15]	[134,33; 137,24]	[133,70; 136,91]	[132,78; 136,33]	[133,36; 137,26]	[132,46; 136,18]	[133,14; 136,96]	[131,94; 135,90]											
		Median	135,00	135,00	135,00	130,00	130,00	131,50	130,00	130,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>563</i>	<i>507</i>	<i>437</i>	<i>395</i>	<i>368</i>	<i>338</i>	<i>312</i>	<i>296</i>												
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	628	538	471	430	386	353	331												
	auswertbar	Anzahl	628	517	455	422	375	346	324												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,04	135,40	134,58	134,62	134,00	135,20	135,27												
		CI Mean	[135,73; 138,35]	[134,00; 136,81]	[133,01; 136,16]	[133,06; 136,17]	[132,31; 135,69]	[133,45; 136,95]	[133,39; 137,16]												
		Median	135,00	134,00	130,00	134,50	130,00	135,00	135,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>714</i>	<i>614</i>	<i>543</i>	<i>497</i>	<i>447</i>	<i>407</i>	<i>380</i>													
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	441	387	344	319	282	257													
	auswertbar	Anzahl	441	382	333	312	275	252													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	135,85	136,28	136,46	135,31	135,79	134,02													
		CI Mean	[134,22; 137,47]	[134,49; 138,07]	[134,46; 138,45]	[133,34; 137,29]	[133,95; 137,62]	[132,11; 135,94]													
		Median	132,00	134,00	135,00	130,00	135,00	131,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>507</i>	<i>446</i>	<i>395</i>	<i>367</i>	<i>323</i>	<i>292</i>														
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	488	433	389	347	317														
	auswertbar	Anzahl	488	429	380	339	309														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,51	134,94	133,54	134,78	133,79														
		CI Mean	[134,92; 138,10]	[133,32; 136,56]	[132,01; 135,08]	[133,11; 136,44]	[132,22; 135,36]														
		Median	135,00	130,00	130,00	131,00	130,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>547</i>	<i>485</i>	<i>437</i>	<i>389</i>	<i>357</i>															

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	425	380	347	308														
	auswertbar	Anzahl	425	377	340	301														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,98	135,44	135,31	136,65														
		CI Mean	[135,34; 138,62]	[133,69; 137,19]	[133,57; 137,06]	[134,70; 138,61]														
		Median	136,00	132,00	134,50	135,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>501</i>	<i>442</i>	<i>400</i>	<i>360</i>															
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	455	397	335															
	auswertbar	Anzahl	455	389	327															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,94	135,13	134,05															
		CI Mean	[135,30; 138,59]	[133,33; 136,94]	[132,27; 135,82]															
		Median	135,00	131,00	130,00															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>519</i>	<i>455</i>	<i>385</i>																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	388	335																
	auswertbar	Anzahl	388	325																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,71	134,70																
		CI Mean	[134,94; 138,49]	[132,90; 136,51]																
		Median	135,00	133,00																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>435</i>	<i>376</i>																	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	380																	
	auswertbar	Anzahl	380																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,19																	
		CI Mean	[134,46; 137,92]																	
		Median	135,00																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>431</i>																		

In Tabelle B.3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für - - Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei - - mmHg, der Median bei - - mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei - - und der Median bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	716	581	494	410	351	309	283	247	225	216	205	195	182	173	166	157	153	142
	auswertbar	Anzahl	716	528	476	397	344	303	276	233	213	200	200	189	179	169	163	155	148	134
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,30	78,97	78,87	77,88	78,19	78,66	78,66	77,82	77,26	77,85	76,97	77,97	75,08	75,88	75,18	75,32	75,60	75,33
		CI Mean	[79,64; 80,97]	[78,24; 79,71]	[78,06; 79,67]	[77,05; 78,71]	[77,16; 79,21]	[77,60; 79,72]	[77,77; 79,56]	[76,84; 78,80]	[76,05; 78,47]	[76,70; 78,99]	[75,77; 78,17]	[76,58; 79,35]	[73,81; 76,36]	[74,61; 77,16]	[73,76; 76,59]	[73,96; 76,68]	[74,18; 77,03]	[73,77; 76,89]
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>837</i>	<i>674</i>	<i>573</i>	<i>474</i>	<i>405</i>	<i>362</i>	<i>331</i>	<i>284</i>	<i>259</i>	<i>250</i>	<i>239</i>	<i>226</i>	<i>213</i>	<i>204</i>	<i>195</i>	<i>186</i>	<i>182</i>	<i>171</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1607	1317	1075	903	799	689	624	580	550	513	474	436	413	390	364	340	313	
	auswertbar	Anzahl	1607	1168	1013	880	773	666	576	541	512	496	461	423	401	383	353	334	300	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,92	78,71	78,22	77,91	77,88	78,15	77,17	77,67	76,93	76,06	77,19	76,86	77,04	76,58	75,46	76,37	76,34	
		CI Mean	[79,46; 80,38]	[78,18; 79,24]	[77,72; 78,73]	[77,34; 78,49]	[77,24; 78,53]	[77,53; 78,78]	[76,45; 77,89]	[76,94; 78,40]	[76,17; 77,68]	[75,27; 76,84]	[76,44; 77,94]	[75,99; 77,73]	[76,21; 77,86]	[75,62; 77,54]	[74,47; 76,45]	[75,40; 77,34]	[75,22; 77,46]	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1896</i>	<i>1551</i>	<i>1266</i>	<i>1056</i>	<i>941</i>	<i>815</i>	<i>729</i>	<i>680</i>	<i>646</i>	<i>604</i>	<i>561</i>	<i>517</i>	<i>488</i>	<i>459</i>	<i>427</i>	<i>399</i>	<i>369</i>		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1921	1581	1319	1121	969	871	826	761	710	669	611	558	524	485	446	413		
	auswertbar	Anzahl	1921	1469	1261	1076	931	826	784	713	677	641	590	539	499	456	426	395		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,21	79,30	79,26	79,32	78,03	78,49	78,18	77,56	77,75	77,95	77,61	76,75	77,01	76,45	77,17	77,50		
		CI Mean	[79,80; 80,62]	[78,85; 79,75]	[78,77; 79,76]	[78,80; 79,84]	[77,47; 78,60]	[77,86; 79,13]	[77,56; 78,80]	[76,89; 78,24]	[77,09; 78,41]	[77,27; 78,62]	[76,90; 78,33]	[76,01; 77,50]	[76,21; 77,82]	[75,61; 77,30]	[76,31; 78,04]	[76,62; 78,39]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2223</i>	<i>1829</i>	<i>1522</i>	<i>1294</i>	<i>1121</i>	<i>1004</i>	<i>944</i>	<i>872</i>	<i>815</i>	<i>770</i>	<i>698</i>	<i>641</i>	<i>601</i>	<i>557</i>	<i>512</i>	<i>474</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1428	1254	1076	939	837	776	721	679	635	572	533	505	465	442	403			
	auswertbar	Anzahl	1428	1185	1031	913	785	734	692	651	609	557	524	497	459	431	388			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,22	78,42	78,51	78,65	77,80	78,33	77,06	77,59	77,56	77,92	77,30	76,96	76,76	76,17	76,80			
		CI Mean	[79,71; 80,73]	[77,90; 78,94]	[77,96; 79,06]	[78,06; 79,23]	[77,18; 78,43]	[77,69; 78,98]	[76,41; 77,71]	[76,90; 78,27]	[76,89; 78,24]	[77,16; 78,68]	[76,52; 78,07]	[76,18; 77,74]	[75,89; 77,63]	[75,33; 77,01]	[75,90; 77,70]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1616</i>	<i>1414</i>	<i>1213</i>	<i>1048</i>	<i>932</i>	<i>860</i>	<i>798</i>	<i>753</i>	<i>702</i>	<i>631</i>	<i>586</i>	<i>554</i>	<i>509</i>	<i>485</i>	<i>444</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1783	1569	1327	1153	1067	992	919	845	755	693	638	585	558	506				
	auswertbar	Anzahl	1783	1473	1271	1089	998	939	872	824	734	678	624	569	538	493				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,77	78,95	78,81	78,75	78,41	78,05	78,17	78,04	78,07	77,42	77,15	77,08	77,11	77,50				
		CI Mean	[79,34; 80,21]	[78,48; 79,41]	[78,32; 79,31]	[78,26; 79,25]	[77,89; 78,94]	[77,45; 78,64]	[77,54; 78,79]	[77,44; 78,64]	[77,46; 78,69]	[76,78; 78,06]	[76,46; 77,85]	[76,33; 77,83]	[76,35; 77,87]	[76,68; 78,31]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2020</i>	<i>1768</i>	<i>1504</i>	<i>1295</i>	<i>1196</i>	<i>1111</i>	<i>1029</i>	<i>944</i>	<i>843</i>	<i>775</i>	<i>715</i>	<i>659</i>	<i>628</i>	<i>572</i>					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1532	1329	1133	1033	952	882	822	727	682	635	595	548	512					
	auswertbar	Anzahl	1532	1264	1049	964	895	830	783	691	649	613	563	526	492					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,00	79,15	78,31	78,55	77,94	78,75	78,23	78,25	77,82	77,83	77,83	77,73	77,44					
		CI Mean	[79,53; 80,47]	[78,63; 79,66]	[77,77; 78,85]	[77,96; 79,14]	[77,38; 78,51]	[78,16; 79,35]	[77,57; 78,89]	[77,58; 78,91]	[77,11; 78,53]	[77,09; 78,57]	[77,06; 78,60]	[76,98; 78,48]	[76,62; 78,26]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1746</i>	<i>1506</i>	<i>1284</i>	<i>1166</i>	<i>1076</i>	<i>999</i>	<i>931</i>	<i>824</i>	<i>770</i>	<i>721</i>	<i>676</i>	<i>624</i>	<i>585</i>						

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1379	1229	1082	991	932	840	751	704	643	603	568	531						
	auswertbar	Anzahl	1379	1177	999	924	871	807	720	673	616	583	546	506						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,52	78,80	78,26	78,24	78,70	78,43	78,20	77,78	78,12	77,84	77,97	77,78						
		CI Mean	[79,05; 79,99]	[78,31; 79,29]	[77,73; 78,80]	[77,70; 78,79]	[78,07; 79,33]	[77,82; 79,03]	[77,57; 78,83]	[77,10; 78,46]	[77,45; 78,79]	[77,11; 78,57]	[77,23; 78,71]	[77,02; 78,54]						
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1564</i>	<i>1393</i>	<i>1231</i>	<i>1129</i>	<i>1054</i>	<i>953</i>	<i>849</i>	<i>796</i>	<i>731</i>	<i>684</i>	<i>643</i>	<i>597</i>							
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1463	1323	1204	1109	1032	912	827	763	721	673	615							
	auswertbar	Anzahl	1463	1278	1150	1047	973	868	787	729	678	637	571							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,69	78,81	78,76	79,38	78,66	78,28	78,33	78,30	77,99	78,38	77,66							
		CI Mean	[79,23; 80,16]	[78,34; 79,29]	[78,27; 79,24]	[78,83; 79,93]	[78,09; 79,23]	[77,70; 78,86]	[77,67; 79,00]	[77,64; 78,95]	[77,30; 78,67]	[77,72; 79,05]	[76,88; 78,44]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1642</i>	<i>1481</i>	<i>1343</i>	<i>1235</i>	<i>1145</i>	<i>1007</i>	<i>913</i>	<i>846</i>	<i>799</i>	<i>746</i>	<i>685</i>								
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1210	1089	979	883	751	683	629	581	545	502								
	auswertbar	Anzahl	1210	1057	934	846	730	660	603	558	523	471								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,34	78,13	78,32	78,70	78,56	77,77	77,48	77,27	77,08	77,28								
		CI Mean	[78,80; 79,87]	[77,60; 78,66]	[77,73; 78,92]	[78,14; 79,26]	[77,91; 79,21]	[77,10; 78,44]	[76,75; 78,21]	[76,51; 78,03]	[76,29; 77,86]	[76,44; 78,13]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1390</i>	<i>1240</i>	<i>1108</i>	<i>1000</i>	<i>850</i>	<i>776</i>	<i>716</i>	<i>662</i>	<i>621</i>	<i>573</i>									
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1138	1043	952	818	738	681	635	599	545									
	auswertbar	Anzahl	1138	982	915	787	706	656	610	575	512									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,27	78,50	77,96	78,39	78,04	78,29	77,11	77,23	77,79									
		CI Mean	[78,74; 79,80]	[77,92; 79,08]	[77,38; 78,54]	[77,76; 79,03]	[77,38; 78,71]	[77,62; 78,97]	[76,36; 77,87]	[76,47; 77,99]	[77,00; 78,59]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1260</i>	<i>1149</i>	<i>1047</i>	<i>897</i>	<i>808</i>	<i>747</i>	<i>694</i>	<i>653</i>	<i>595</i>										
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	507	461	396	357	333	307	285	271										
	auswertbar	Anzahl	507	450	389	342	326	298	280	256										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,92	78,36	77,91	78,05	77,79	77,55	77,16	77,48										
		CI Mean	[78,08; 79,75]	[77,50; 79,22]	[77,06; 78,76]	[77,07; 79,02]	[76,82; 78,76]	[76,50; 78,60]	[76,09; 78,24]	[76,36; 78,61]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>563</i>	<i>507</i>	<i>437</i>	<i>395</i>	<i>368</i>	<i>338</i>	<i>312</i>	<i>296</i>											
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	628	538	471	430	386	353	331											
	auswertbar	Anzahl	628	517	455	422	375	346	324											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,97	78,68	78,04	78,65	78,19	78,45	77,87											
		CI Mean	[78,20; 79,74]	[77,89; 79,48]	[77,20; 78,88]	[77,82; 79,48]	[77,26; 79,12]	[77,38; 79,52]	[76,92; 78,82]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>714</i>	<i>614</i>	<i>543</i>	<i>497</i>	<i>447</i>	<i>407</i>	<i>380</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	441	387	344	319	282	257												
	auswertbar	Anzahl	441	382	333	312	275	252												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,40	79,47	79,50	78,84	79,06	78,38												
		CI Mean	[78,51; 80,29]	[78,51; 80,43]	[78,49; 80,51]	[77,78; 79,89]	[77,94; 80,18]	[77,33; 79,44]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>507</i>	<i>446</i>	<i>395</i>	<i>367</i>	<i>323</i>	<i>292</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	488	433	389	347														
	auswertbar	Anzahl	488	429	380	339	309													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,99	78,87	78,13	78,01	78,07													
		CI Mean	[78,14; 79,84]	[77,92; 79,83]	[77,23; 79,02]	[77,03; 78,99]	[77,12; 79,02]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>547</i>	<i>485</i>	<i>437</i>	<i>389</i>	<i>357</i>														



EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	425	380	347	308																
	auswertbar	Anzahl	425	377	340	301																
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,37	78,39	78,49	77,89																
		CI Mean	[78,42; 80,33]	[77,38; 79,41]	[77,48; 79,50]	[76,72; 79,05]																
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>501</i>	<i>442</i>	<i>400</i>	<i>360</i>																
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	455	397	335																	
	auswertbar	Anzahl	455	389	327																	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,76	78,60	77,62																	
		CI Mean	[78,83; 80,69]	[77,59; 79,61]	[76,62; 78,62]																	
		Median	80,00	80,00	80,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>519</i>	<i>455</i>	<i>385</i>																	
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	388	335																		
	auswertbar	Anzahl	388	325																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,62	78,59																		
		CI Mean	[78,65; 80,60]	[77,44; 79,75]																		
		Median	80,00	80,00																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>435</i>	<i>376</i>																		
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	380																			
	auswertbar	Anzahl	380																			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,63																			
		CI Mean	[78,61; 80,64]																			
		Median	80,00																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>431</i>																			

### B.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensivierete Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

In Tabelle B.3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - - %; der Median lag bei - - %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - - %; der Median lag bei - - %, der dafür auswertbaren Patienten.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Fallbasis mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Mittlere Differenz zur ED	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Median mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	837	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171	
	auswertbar	Anzahl	837	606	554	457	398	353	322	268	245	231	234	220	209	198	191	184	177	160	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,30	7,06	7,11	7,13	7,01	7,18	7,16	7,05	7,07	7,15	7,06	7,26	7,19	7,30	7,17	7,20	7,24	7,31	
		CI Mean	[7,21; 7,38]	[6,97; 7,15]	[7,02; 7,21]	[7,04; 7,23]	[6,91; 7,12]	[7,06; 7,31]	[7,04; 7,27]	[6,94; 7,16]	[6,93; 7,21]	[7,02; 7,28]	[6,93; 7,19]	[7,11; 7,41]	[7,04; 7,35]	[7,13; 7,46]	[7,03; 7,32]	[7,05; 7,36]	[7,08; 7,41]	[7,14; 7,47]	
		Median	7,10	6,90	6,90	7,00	6,90	7,10	7,00	7,00	6,90	7,00	6,90	7,10	7,00	7,20	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10
		Fallbasis mittlere Differenz		606	554	457	398	353	322	268	245	231	234	220	209	198	191	184	177	160	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,10	-0,08	-0,20	0,01	-0,02	-0,04	-0,01	0,07	0,00	0,19	0,15	0,26	0,13	0,16	0,21	0,31	
		CI mittlere Differenz		[-0,22; 0,07]	[-0,19; 0,02]	[-0,17; 0,01]	[-0,31; 0,08]	[-0,12; 0,13]	[-0,15; 0,11]	[-0,17; 0,09]	[-0,16; 0,14]	[-0,08; 0,23]	[-0,15; 0,14]	[0,04; 0,34]	[-0,01; 0,31]	[0,08; 0,45]	[-0,05; 0,30]	[-0,02; 0,34]	[0,01; 0,40]	[0,12; 0,50]	
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1896	1551	1266	1056	941	815	729	680	646	604	561	517	488	459	427	399	369		
	auswertbar	Anzahl	1896	1371	1194	1026	908	789	676	639	605	583	546	503	475	450	413	392	354		
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,30	7,14	7,17	7,09	7,18	7,13	7,21	7,23	7,23	7,19	7,26	7,19	7,25	7,22	7,26	7,24	7,31		
		CI Mean	[7,24; 7,36]	[7,07; 7,20]	[7,10; 7,24]	[7,02; 7,16]	[7,10; 7,25]	[7,05; 7,21]	[7,12; 7,29]	[7,14; 7,32]	[7,14; 7,33]	[7,10; 7,29]	[7,16; 7,35]	[7,09; 7,28]	[7,15; 7,36]	[7,12; 7,32]	[7,16; 7,36]	[7,14; 7,34]	[7,19; 7,42]		
		Median	7,10	7,00	6,95	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,20	7,10	7,20		
		Fallbasis mittlere Differenz		1371	1194	1026	908	789	676	639	605	583	546	503	475	450	413	392	354		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,09	-0,17	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02	-0,04	-0,07	0,05	0,01	0,08	0,06	0,14	0,12	0,19		
		CI mittlere Differenz		[-0,19; 0,09]	[-0,15; 0,03]	[-0,24; 0,09]	[-0,16; 0,00]	[-0,16; 0,01]	[-0,12; 0,06]	[-0,12; 0,08]	[-0,15; 0,07]	[-0,18; 0,04]	[-0,07; 0,16]	[-0,10; 0,13]	[-0,03; 0,20]	[-0,06; 0,18]	[0,01; 0,26]	[-0,01; 0,25]	[0,05; 0,34]		
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,20	0,30	0,20	0,30				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2223	1829	1522	1294	1121	1004	944	872	815	770	698	641	601	557	512	474			
	auswertbar	Anzahl	2223	1697	1454	1239	1074	947	892	815	773	739	677	619	573	526	492	455			
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,24	7,18	7,07	7,15	7,07	7,11	7,11	7,10	7,05	7,18	7,14	7,23	7,28	7,32	7,27	7,27			
		CI Mean	[7,18; 7,29]	[7,12; 7,24]	[7,01; 7,13]	[7,09; 7,21]	[7,00; 7,13]	[7,03; 7,18]	[7,03; 7,19]	[7,03; 7,18]	[6,98; 7,13]	[7,10; 7,26]	[7,06; 7,22]	[7,14; 7,31]	[7,19; 7,37]	[7,23; 7,42]	[7,16; 7,37]	[7,18; 7,36]			
		Median	7,00	7,00	6,90	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10			
		Fallbasis mittlere Differenz		1697	1454	1239	1074	947	892	815	773	739	677	619	573	526	492	455			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,01	-0,09	0,01	-0,04	0,00	0,03	0,05	0,01	0,13	0,09	0,16	0,23	0,29	0,24	0,25			
		CI mittlere Differenz		[-0,06; 0,05]	[-0,15; 0,03]	[-0,06; 0,08]	[-0,12; 0,03]	[-0,08; 0,08]	[-0,05; 0,11]	[-0,04; 0,13]	[-0,07; 0,10]	[0,04; 0,23]	[0,00; 0,19]	[0,06; 0,27]	[0,13; 0,34]	[0,18; 0,41]	[0,12; 0,36]	[0,13; 0,36]			
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1616	1414	1213	1048	932	860	798	753	702	631	586	554	509	485	444				
	auswertbar	Anzahl	1614	1331	1162	1018	873	815	767	718	674	613	575	544	501	474	427				
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,37	7,04	7,16	7,07	7,12	7,08	7,06	7,07	7,12	7,10	7,19	7,15	7,25	7,17	7,19				
		CI Mean	[7,30; 7,44]	[6,97; 7,10]	[7,09; 7,23]	[7,01; 7,14]	[7,04; 7,20]	[7,00; 7,15]	[6,99; 7,14]	[6,99; 7,15]	[7,03; 7,20]	[7,02; 7,19]	[7,10; 7,29]	[7,06; 7,24]	[7,15; 7,36]	[7,07; 7,26]	[7,09; 7,29]				
		Median	7,10	6,80	7,00	6,90	6,90	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		1329	1160	1017	872	814	766	718	674	613	575	544	501	474	427				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,28	-0,13	-0,19	-0,12	-0,16	-0,17	-0,16	-0,13	-0,13	-0,06	-0,10	0,01	-0,07	-0,03				
		CI mittlere Differenz		[-0,34; 0,22]	[-0,20; 0,06]	[-0,27; 0,12]	[-0,20; 0,03]	[-0,24; 0,07]	[-0,25; 0,08]	[-0,25; 0,07]	[-0,23; 0,03]	[-0,23; 0,03]	[-0,17; 0,05]	[-0,21; 0,02]	[-0,11; 0,14]	[-0,19; 0,06]	[-0,16; 0,10]				
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00					

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2020	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572					
	auswertbar	Anzahl	2017	1656	1439	1219	1115	1049	976	917	817	757	698	640	605	555					
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,25	7,20	7,10	7,15	7,15	7,17	7,17	7,22	7,24	7,29	7,28	7,33	7,25	7,30					
		CI Mean	[7,19; 7,31]	[7,13; 7,26]	[7,05; 7,16]	[7,09; 7,22]	[7,08; 7,22]	[7,10; 7,24]	[7,10; 7,24]	[7,15; 7,29]	[7,16; 7,33]	[7,21; 7,37]	[7,19; 7,36]	[7,24; 7,42]	[7,16; 7,35]	[7,20; 7,40]					
		Median	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10					
		Fallbasis mittlere Differenz		1656	1439	1219	1115	1049	976	917	817	757	698	640	605	555					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,03	-0,05	0,00	-0,01	0,04	0,02	0,06	0,09	0,17	0,18	0,26	0,17	0,19					
		CI mittlere Differenz		[-0,08; 0,03]	[-0,11; 0,01]	[-0,06; 0,07]	[-0,08; 0,06]	[-0,04; 0,11]	[-0,06; 0,10]	[-0,02; 0,15]	[0,00; 0,19]	[0,08; 0,26]	[0,09; 0,28]	[0,16; 0,37]	[0,06; 0,27]	[0,08; 0,31]					
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20							
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1746	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585						
	auswertbar	Anzahl	1743	1425	1185	1090	1013	941	887	782	735	697	644	602	563						
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,27	7,11	7,14	7,11	7,13	7,12	7,22	7,14	7,22	7,19	7,28	7,28	7,30						
		CI Mean	[7,21; 7,33]	[7,05; 7,17]	[7,08; 7,21]	[7,04; 7,19]	[7,06; 7,20]	[7,05; 7,19]	[7,14; 7,30]	[7,06; 7,21]	[7,14; 7,30]	[7,11; 7,27]	[7,20; 7,37]	[7,18; 7,37]	[7,20; 7,40]						
		Median	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10						
		Fallbasis mittlere Differenz		1422	1184	1089	1012	939	885	781	734	696	643	601	562						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,06	-0,10	-0,08	-0,09	0,03	-0,07	0,01	-0,02	0,11	0,11	0,15						
		CI mittlere Differenz		[-0,17; -0,06]	[-0,13; 0,00]	[-0,17; -0,03]	[-0,15; -0,01]	[-0,16; -0,01]	[-0,06; 0,11]	[-0,15; 0,02]	[-0,08; 0,10]	[-0,12; 0,08]	[0,02; 0,21]	[0,01; 0,22]	[0,05; 0,26]						
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20							
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1564	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597							
	auswertbar	Anzahl	1562	1333	1136	1051	979	912	812	759	701	659	614	565							
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	7,05	7,00	7,00	6,96	7,04	7,02	7,12	7,07	7,11	7,14	7,13							
		CI Mean	[7,11; 7,24]	[6,99; 7,11]	[6,94; 7,07]	[6,93; 7,06]	[6,90; 7,03]	[6,97; 7,11]	[6,94; 7,09]	[7,04; 7,20]	[6,99; 7,15]	[7,03; 7,20]	[7,05; 7,23]	[7,02; 7,23]							
		Median	6,90	6,90	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	7,00	6,90							
		Fallbasis mittlere Differenz		1332	1135	1050	978	912	812	759	701	659	614	565							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,10	-0,12	-0,12	-0,13	-0,04	-0,05	0,06	0,00	0,07	0,12	0,11							
		CI mittlere Differenz		[-0,15; -0,05]	[-0,19; -0,06]	[-0,19; -0,05]	[-0,21; -0,06]	[-0,11; 0,04]	[-0,14; 0,04]	[-0,04; 0,15]	[-0,09; 0,10]	[-0,02; 0,17]	[0,01; 0,22]	[-0,01; 0,22]							
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10								
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1642	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685								
	auswertbar	Anzahl	1639	1432	1282	1164	1080	959	870	807	752	706	635								
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,24	7,04	7,02	7,00	7,07	7,08	7,08	7,07	7,17	7,13	7,21								
		CI Mean	[7,17; 7,30]	[6,98; 7,11]	[6,95; 7,08]	[6,94; 7,07]	[7,01; 7,14]	[7,01; 7,15]	[7,01; 7,16]	[6,99; 7,15]	[7,09; 7,24]	[7,05; 7,21]	[7,11; 7,30]								
		Median	6,90	6,75	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90								
		Fallbasis mittlere Differenz		1431	1281	1163	1079	958	869	806	751	705	634								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,13	-0,15	-0,08	-0,06	-0,02	-0,02	0,07	0,04	0,12								
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,10]	[-0,19; -0,07]	[-0,22; -0,09]	[-0,15; -0,01]	[-0,15; 0,02]	[-0,10; 0,06]	[-0,11; 0,07]	[-0,02; 0,17]	[-0,06; 0,13]	[0,02; 0,23]								
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10										
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1390	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573									
	auswertbar	Anzahl	1384	1205	1058	958	824	749	686	636	597	537									
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,17	6,99	6,98	7,05	7,07	7,09	7,08	7,18	7,06	7,09									
		CI Mean	[7,10; 7,24]	[6,93; 7,06]	[6,92; 7,05]	[6,98; 7,12]	[6,99; 7,15]	[7,01; 7,17]	[7,00; 7,17]	[7,09; 7,27]	[6,96; 7,15]	[7,00; 7,19]									
		Median	6,80	6,70	6,70	6,80	6,75	6,80	6,80	6,90	6,80	6,80									
		Fallbasis mittlere Differenz		1199	1054	954	822	747	684	634	596	536									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,15	-0,04	-0,03	0,00	0,03	0,12	0,01	0,07									
		CI mittlere Differenz		[-0,20; -0,10]	[-0,21; -0,08]	[-0,10; 0,03]	[-0,11; 0,05]	[-0,07; 0,08]	[-0,06; 0,12]	[0,02; 0,21]	[-0,08; 0,11]	[-0,03; 0,17]									
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,15											
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1260	1149	1047	897	808	747	694	653	595										
	auswertbar	Anzahl	1257	1085	1006	863	773	721	668	628	561										
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	7,00	7,09	7,07	7,12	7,10	7,14	7,11	7,19										
		CI Mean	[7,11; 7,25]	[6,93; 7,07]	[7,02; 7,16]	[6,99; 7,15]	[7,03; 7,21]	[7,02; 7,19]	[7,05; 7,23]	[7,02; 7,20]	[7,09; 7,29]										
		Median	6,90	6,70	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	7,00										
		Fallbasis mittlere Differenz		1083	1005	863	773	721	668	628	561										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,05	-0,09	-0,01	-0,01	0,06	0,03	0,11										
		CI mittlere Differenz		[-0,20; -0,08]	[-0,12; 0,01]	[-0,17; -0,01]	[-0,09; 0,08]	[-0,10; 0,08]	[-0,04; 0,15]	[-0,06; 0,13]	[0,01; 0,22]										
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20												

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	563	507	437	395	368	338	312	296										
	auswertbar	Anzahl	561	495	429	378	361	329	306	280										
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,00	6,97	6,88	6,93	7,02	7,16	7,01	7,04										
		CI Mean	[6,89; 7,10]	[6,87; 7,07]	[6,78; 6,98]	[6,83; 7,04]	[6,91; 7,14]	[7,03; 7,30]	[6,90; 7,12]	[6,92; 7,16]										
		Median	6,70	6,70	6,60	6,80	6,80	6,90	6,85	6,80										
		Fallbasis mittlere Differenz		493	427	376	359	327	304	278										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,04	-0,15	-0,07	0,01	0,17	0,08	0,10										
		CI mittlere Differenz		[-0,13; 0,05]	[-0,26; -0,04]	[-0,18; 0,04]	[-0,11; 0,14]	[0,02; 0,31]	[-0,05; 0,21]	[-0,04; 0,25]										
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	714	614	543	497	447	407	380											
	auswertbar	Anzahl	713	593	526	488	433	400	373											
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,33	7,03	7,13	7,03	7,15	7,06	7,15											
		CI Mean	[7,22; 7,44]	[6,94; 7,12]	[7,02; 7,23]	[6,92; 7,13]	[7,03; 7,26]	[6,95; 7,18]	[7,02; 7,28]											
		Median	7,00	6,70	6,90	6,80	6,90	6,80	6,90											
		Fallbasis mittlere Differenz		593	526	488	433	400	373											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,31	-0,20	-0,26	-0,14	-0,22	-0,06											
		CI mittlere Differenz		[-0,40; -0,21]	[-0,31; -0,09]	[-0,38; -0,15]	[-0,26; -0,02]	[-0,35; -0,09]	[-0,19; 0,07]											
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	-0,10	0,00													
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	507	446	395	367	323	292												
	auswertbar	Anzahl	506	440	382	357	314	285												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,33	7,16	7,11	7,17	7,11	7,18												
		CI Mean	[7,21; 7,46]	[7,06; 7,27]	[7,00; 7,22]	[7,05; 7,29]	[6,99; 7,23]	[7,04; 7,31]												
		Median	7,00	7,00	6,90	7,00	6,90	6,90												
		Fallbasis mittlere Differenz		439	381	356	313	284												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,18	-0,13	-0,20	-0,11												
		CI mittlere Differenz		[-0,29; -0,04]	[-0,32; -0,05]	[-0,27; 0,00]	[-0,35; -0,05]	[-0,27; 0,05]												
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	547	485	437	389	357													
	auswertbar	Anzahl	546	478	428	381	348													
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,34	7,14	7,23	7,17	7,11													
		CI Mean	[7,22; 7,45]	[7,03; 7,26]	[7,11; 7,35]	[7,04; 7,30]	[6,99; 7,24]													
		Median	6,90	6,80	6,90	6,80	6,80													
		Fallbasis mittlere Differenz		477	427	380	347													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,18	-0,07	-0,13	-0,14													
		CI mittlere Differenz		[-0,27; -0,08]	[-0,18; 0,04]	[-0,25; -0,01]	[-0,28; -0,01]													
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	-0,10															
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	501	442	400	360														
	auswertbar	Anzahl	500	439	391	349														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,37	7,12	7,09	7,10														
		CI Mean	[7,24; 7,50]	[7,01; 7,23]	[6,96; 7,22]	[6,97; 7,23]														
		Median	7,00	6,90	6,80	6,90														
		Fallbasis mittlere Differenz		438	390	348														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,20	-0,17	-0,13														
		CI mittlere Differenz		[-0,31; -0,09]	[-0,28; -0,05]	[-0,25; 0,00]														
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00																
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	519	455	385															
	auswertbar	Anzahl	518	444	377															
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,53	7,17	7,12															
		CI Mean	[7,39; 7,66]	[7,05; 7,30]	[7,00; 7,25]															
		Median	7,10	6,85	6,90															
		Fallbasis mittlere Differenz		443	377															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,32	-0,30															
		CI mittlere Differenz		[-0,44; -0,21]	[-0,42; -0,19]															
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,20																	

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	435	376																			
	auswertbar	Anzahl	434	365																			
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,48	7,08																			
		CI Mean	[7,34; 7,62]	[6,97; 7,20]																			
		Median	7,10	6,90																			
		Fallbasis mittlere Differenz		364																			
		Mittlere Differenz zur ED			-0,31																		
		CI mittlere Differenz			[-0,43; -0,19]																		
		Median mittlere Differenz			-0,10																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	431																				
	auswertbar	Anzahl	431																				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,47																				
		CI Mean	[7,32; 7,62]																				
		Median	7,10																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
		Median mittlere Differenz																					

In Tabelle B.3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalb-jahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalb-jahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalb-jahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halb-jahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. - - Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalb-jahr wurden dieser Kategorie - - Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle B.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten**

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	837	674	573	474	405	362	331	284	259	250	239	226	213	204	195	186	182	171		
	auswertbar	Anzahl	837	606	554	457	398	353	322	268	245	231	234	220	209	198	191	184	177	160		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	119	108	87	53	62	45	34	29	31	21	26	19	25	14	16	17	17	11		
		Anteil in %	14,22	17,82	15,70	11,60	15,58	12,75	10,56	10,82	12,65	9,09	11,11	8,64	11,96	7,07	8,38	9,24	9,60	6,88		
		CI Anteil in %	[11,85; 16,58]	[14,77; 20,87]	[12,67; 18,74]	[8,66; 14,54]	[12,01; 19,15]	[9,26; 16,23]	[7,20; 13,92]	[7,09; 14,55]	[8,48; 16,82]	[5,38; 12,81]	[7,08; 15,15]	[4,92; 12,36]	[7,55; 16,37]	[3,49; 10,65]	[4,44; 12,32]	[5,04; 13,43]	[5,25; 13,96]	[2,94; 10,81]		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	421	330	312	284	243	211	201	174	151	148	157	133	124	125	126	116	103	101		
		Anteil in %	50,30	54,46	56,32	62,14	61,06	59,77	62,42	64,93	61,63	64,07	67,09	60,45	59,33	63,13	65,97	63,04	58,19	63,13		
		CI Anteil in %	[46,91; 53,69]	[50,49; 58,42]	[52,18; 60,45]	[57,69; 66,60]	[56,26; 65,85]	[54,65; 64,90]	[57,12; 67,72]	[59,20; 70,65]	[55,53; 67,73]	[57,87; 70,27]	[61,06; 73,13]	[53,98; 66,93]	[52,65; 66,01]	[56,39; 69,87]	[59,23; 72,71]	[56,05; 70,04]	[50,90; 65,48]	[55,63; 70,62]		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	176	113	99	72	61	62	57	47	40	39	30	42	37	37	33	32	39	34		
		Anteil in %	21,03	18,65	17,87	15,75	15,33	17,56	17,70	17,54	16,33	16,88	12,82	19,09	17,70	18,69	17,28	17,39	22,03	21,25		
		CI Anteil in %	[18,27; 23,79]	[15,54; 21,75]	[14,68; 21,06]	[12,41; 19,10]	[11,78; 18,87]	[13,59; 21,54]	[13,53; 21,88]	[12,98; 22,10]	[11,69; 20,96]	[12,04; 21,72]	[8,53; 17,11]	[13,89; 24,30]	[12,52; 22,89]	[13,24; 24,13]	[11,90; 22,65]	[11,90; 22,88]	[15,91; 28,16]	[14,89; 27,61]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	94	41	38	42	24	24	26	17	17	21	17	18	16	14	13	13	14	11		
		Anteil in %	11,23	6,77	6,86	9,19	6,03	6,80	8,07	6,34	6,94	9,09	7,26	8,18	7,66	7,07	6,81	7,07	7,91	6,88		
		CI Anteil in %	[9,09; 13,37]	[4,76; 8,77]	[4,75; 8,97]	[6,54; 11,84]	[3,69; 8,37]	[4,17; 9,43]	[5,09; 11,05]	[3,42; 9,27]	[3,75; 10,13]	[5,38; 12,81]	[3,93; 10,60]	[4,55; 11,81]	[4,04; 11,27]	[3,49; 10,65]	[3,23; 10,39]	[3,35; 10,78]	[3,92; 11,90]	[2,94; 10,81]		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	27	14	18	6	8	11	4	1	6	2	4	8	7	8	3	6	4	3			
	Anteil in %	3,23	2,31	3,25	1,31	2,01	3,12	1,24	0,37	2,45	0,87	1,71	3,64	3,35	4,04	1,57	3,26	2,26	1,88			
	CI Anteil in %	[2,03; 4,42]	[1,11; 3,51]	[1,77; 4,73]	[0,27; 2,36]	[0,63; 3,39]	[1,30; 4,93]	[0,03; 2,45]	[0,00; 1,10]	[0,51; 4,39]	[0,00; 2,06]	[0,05; 3,37]	[1,16; 6,12]	[0,90; 5,79]	[1,29; 6,79]	[0,00; 3,34]	[0,69; 5,83]	[0,06; 4,46]	[0,00; 3,98]			

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1896	1551	1266	1056	941	815	729	680	646	604	561	517	488	459	427	399	369	
	auswertbar	Anzahl	1896	1371	1194	1026	908	789	676	639	605	583	546	503	475	450	413	392	354	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	257	206	153	165	116	101	71	67	63	64	49	52	46	40	31	35	33	
		Anteil in %	13,55	15,03	12,81	16,08	12,78	12,80	10,50	10,49	10,41	10,98	8,97	10,34	9,68	8,89	7,51	8,93	9,32	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[12,01; 15,10]	[13,13; 16,92]	[10,92; 14,71]	[13,83; 18,33]	[10,60; 14,95]	[10,47; 15,13]	[8,19; 12,82]	[8,11; 12,86]	[7,98; 12,85]	[8,44; 13,52]	[6,57; 11,37]	[7,67; 13,00]	[7,02; 12,35]	[6,26; 11,52]	[4,96; 10,05]	[6,10; 11,76]	[6,29; 12,36]	
		Anzahl	990	784	686	575	524	479	402	384	365	344	312	307	276	277	244	229	199	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	52,22	57,18	57,45	56,04	57,71	60,71	59,47	60,09	60,33	59,01	57,14	61,03	58,11	61,56	59,08	58,42	56,21	
		CI Anteil in %	[49,97; 54,46]	[54,56; 59,80]	[54,65; 60,26]	[53,00; 59,08]	[54,49; 60,92]	[57,30; 64,12]	[55,76; 63,17]	[56,29; 63,89]	[56,43; 64,23]	[55,01; 63,00]	[52,99; 61,30]	[56,77; 65,30]	[53,66; 62,55]	[57,06; 66,06]	[54,33; 63,83]	[53,53; 63,30]	[51,04; 61,39]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	378	226	223	180	159	130	136	116	118	118	131	103	109	85	102	90	80	
		Anteil in %	19,94	16,48	18,68	17,54	17,51	16,48	20,12	18,15	19,50	20,24	23,99	20,48	22,95	18,89	24,70	22,96	22,60	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[18,14; 21,74]	[14,52; 18,45]	[16,47; 20,89]	[15,22; 19,87]	[15,04; 19,98]	[13,89; 19,07]	[17,09; 23,14]	[15,16; 21,14]	[16,34; 22,66]	[16,98; 23,50]	[20,41; 27,58]	[16,95; 24,01]	[19,16; 26,73]	[15,27; 22,51]	[20,53; 28,86]	[18,79; 27,13]	[18,24; 26,96]	
		Anzahl	198	121	106	86	88	63	47	50	33	41	41	32	32	36	32	34	37	
		Anteil in %	10,44	8,83	8,88	8,38	9,69	7,98	6,95	7,82	5,45	7,03	7,51	6,36	6,74	8,00	7,75	8,67	10,45	
		CI Anteil in %	[9,07; 11,82]	[7,32; 10,33]	[7,26; 10,49]	[6,69; 10,08]	[7,77; 11,62]	[6,09; 9,88]	[5,03; 8,87]	[5,74; 9,91]	[3,64; 7,27]	[4,96; 9,11]	[5,30; 9,72]	[4,23; 8,50]	[4,48; 8,99]	[5,49; 10,51]	[5,17; 10,33]	[5,88; 11,46]	[7,26; 13,64]	
	Anzahl	73	34	26	20	21	16	20	22	26	16	13	9	12	4	4	4	5		
	Anteil in %	3,85	2,48	2,18	1,95	2,31	2,03	2,96	3,44	4,30	2,74	2,38	1,79	2,53	2,67	0,97	1,02	1,41		
	CI Anteil in %	[2,98; 4,72]	[1,66; 3,30]	[1,35; 3,01]	[1,10; 2,80]	[1,33; 3,29]	[1,04; 3,01]	[1,68; 4,24]	[2,03; 4,86]	[2,68; 5,91]	[1,42; 4,07]	[1,10; 3,66]	[0,63; 2,95]	[1,11; 3,94]	[1,18; 4,16]	[0,02; 1,91]	[0,02; 2,02]	[0,18; 2,64]		
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2223	1829	1522	1294	1121	1004	944	872	815	770	698	641	601	557	512	474		
2004-2	auswertbar	Anzahl	2223	1697	1454	1239	1074	947	892	815	773	739	677	619	573	526	492	455		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	329	209	235	161	141	115	124	104	95	84	70	66	56	43	46	33		
		Anteil in %	14,80	12,32	16,16	12,99	13,13	12,14	13,90	12,76	12,29	11,37	10,34	10,66	9,77	8,17	9,35	7,25		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[13,32; 16,28]	[10,75; 13,88]	[14,27; 18,06]	[11,12; 14,87]	[11,11; 15,15]	[10,06; 14,23]	[11,63; 16,17]	[10,47; 15,05]	[9,97; 14,61]	[9,08; 13,66]	[8,04; 12,64]	[8,23; 13,10]	[7,34; 12,21]	[5,83; 10,52]	[6,77; 11,92]	[4,87; 9,64]		
		Anzahl	1184	978	827	721	675	565	535	489	479	429	420	360	328	312	285	271		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	53,26	57,63	56,88	58,19	62,85	59,66	59,98	60,00	61,97	58,05	62,04	58,16	57,24	59,32	57,93	59,56		
		CI Anteil in %	[51,19; 55,34]	[55,28; 59,98]	[54,33; 59,42]	[55,44; 60,94]	[59,96; 65,74]	[56,54; 62,79]	[56,76; 63,19]	[56,63; 63,37]	[58,54; 65,39]	[54,49; 61,61]	[58,38; 65,70]	[54,27; 62,05]	[53,19; 61,30]	[55,11; 63,52]	[53,56; 62,29]	[55,05; 64,07]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	410	316	251	216	154	178	145	150	133	156	126	131	123	97	101	97		
		Anteil in %	18,44	18,62	17,26	17,43	14,34	18,80	16,26	18,40	17,21	21,11	18,61	21,16	21,47	18,44	20,53	21,32		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,83; 20,06]	[16,77; 20,47]	[15,32; 19,21]	[15,32; 19,55]	[12,24; 16,44]	[16,31; 21,29]	[13,83; 18,68]	[15,74; 21,07]	[14,54; 19,87]	[18,17; 24,05]	[15,68; 21,55]	[17,94; 24,38]	[18,10; 24,83]	[15,12; 21,76]	[16,96; 24,10]	[17,55; 25,09]		
		Anzahl	212	150	114	110	76	68	62	55	51	54	49	47	51	58	49	48		
		Anteil in %	9,54	8,84	7,84	8,88	7,08	7,18	6,95	6,75	6,60	7,31	7,24	7,59	8,90	11,03	9,96	10,55		
		CI Anteil in %	[8,32; 10,76]	[7,49; 10,19]	[6,46; 9,22]	[7,29; 10,46]	[5,54; 8,61]	[5,54; 8,83]	[5,28; 8,62]	[5,03; 8,47]	[4,85; 8,35]	[5,43; 9,18]	[5,28; 9,19]	[5,50; 9,68]	[6,57; 11,23]	[8,35; 13,71]	[7,31; 12,61]	[7,72; 13,38]		
		Anzahl	88	44	27	31	28	21	26	17	15	16	12	15	16	11	6			
Anteil in %		3,96	2,59	1,86	2,50	2,61	2,22	2,91	2,09	1,94	2,17	1,77	2,42	2,62	3,04	2,24	1,32			
	CI Anteil in %	[3,15; 4,77]	[1,84; 3,35]	[1,16; 2,55]	[1,63; 3,37]	[1,65; 3,56]	[1,28; 3,16]	[1,81; 4,02]	[1,10; 3,07]	[0,97; 2,91]	[1,12; 3,22]	[0,78; 2,77]	[1,21; 3,64]	[1,31; 3,93]	[1,57; 4,51]	[0,93; 3,54]	[0,27; 2,37]			
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1616	1414	1213	1048	932	860	798	753	702	631	586	554	509	485	444			
2005-1	auswertbar	Anzahl	1614	1331	1162	1018	873	815	767	718	674	613	575	544	501	474	427			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	188	242	167	145	123	107	120	103	88	79	57	65	55	49	48			
		Anteil in %	11,65	18,18	14,37	14,24	14,09	13,13	15,65	14,35	13,06	12,89	9,91	11,95	10,98	10,34	11,24			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[10,08; 13,21]	[16,11; 20,25]	[12,35; 16,39]	[12,10; 16,39]	[11,78; 16,40]	[10,81; 15,45]	[13,07; 18,22]	[11,78; 16,91]	[10,51; 15,60]	[10,23; 15,54]	[7,47; 12,36]	[9,22; 14,68]	[8,24; 13,72]	[7,59; 13,08]	[8,24; 14,24]			
		Anzahl	872	747	671	608	522	486	443	421	400	368	346	321	298	288	246			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	54,03	56,12	57,75	59,72	59,79	59,63	57,76	58,64	59,35	60,03	60,17	59,01	59,48	60,76	57,61			
		CI Anteil in %	[51,60; 56,46]	[53,46; 58,79]	[54,90; 60,59]	[56,71; 62,74]	[56,54; 63,05]	[56,26; 63,00]	[54,26; 61,26]	[55,03; 62,24]	[55,64; 63,06]	[56,15; 63,91]	[56,17; 64,18]	[54,87; 63,14]	[55,18; 63,78]	[56,36; 65,16]	[52,92; 62,30]			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	307	208	195	174	138	140	128	133	118	105	112	99	90	94	87			
		Anteil in %	19,02	15,63	16,78	17,09	15,81	17,18	16,69	18,52	17,51	17,13	19,48	18,20	17,96	19,83	20,37			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[17,11; 20,94]	[13,68; 17,58]	[14,63; 18,93]	[14,78; 19,41]	[13,39; 18,23]	[14,59; 19,77]	[14,05; 19,33]	[15,68; 21,37]	[14,64; 20,38]	[14,14; 20,11]	[16,24; 22,72]	[14,95; 21,44]	[14,60; 21,33]	[16,24; 23,42]	[16,55; 24,20]			
		Anzahl	161	108	102	70	67	70	67	44	57	52	48	53	45	34	37			
		Anteil in %	9,98	8,11	8,78	6,88	7,67	8,59	8,74	6,13	8,46	8,48	8,35	9,74	8,98	7,17	8,67			
		CI Anteil in %	[8,51; 11,44]	[6,65; 9,58]	[7,15; 10,41]	[5,32; 8,43]	[5,91; 9,44]	[6,66; 10,51]	[6,74; 10,73]	[4,37; 7,88]	[6,35; 10,56]	[6,28; 10,69]	[6,08; 10,61]	[7,25; 12,24]	[6,48; 11,49]	[4,85; 9,50]	[5,99; 11,34]			
		Anzahl	86	26	27	21	23	12	9	17	11	9	12	6	13	9	9			
Anteil in %		5,33	1,95	2,32	2,06	2,63	1,47	1,17	2,37	1,63	1,47	2,09	1,10	2,59	1,90	2,11				
	CI Anteil in %	[4,23; 6,42]	[1,21; 2,70]	[1,46; 3,19]	[1,19; 2,94]	[1,57; 3,70]	[0,64; 2,30]	[0,41; 1,94]	[1,25; 3,48]	[0,67; 2,59]	[0,52; 2,42]	[0,92; 3,26]	[0,22; 1,98]	[1,20; 3,99]	[0,67; 3,13]	[0,74; 3,47]				



EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2020	1768	1504	1295	1196	1111	1029	944	843	775	715	659	628	572					
	auswertbar	Anzahl	2017	1656	1439	1219	1115	1049	976	917	817	757	698	640	605	555					
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	275	238	211	166	136	126	104	88	85	69	73	49	56	46					
		Anteil in %	13,63	14,37	14,66	13,62	12,20	12,01	10,66	9,60	10,40	9,11	10,46	7,66	9,26	8,29					
	CI Anteil in %		[12,14; 15,13]	[12,68; 16,06]	[12,83; 16,49]	[11,69; 15,54]	[10,28; 14,12]	[10,04; 13,98]	[8,72; 12,59]	[7,69; 11,50]	[8,31; 12,50]	[7,06; 11,17]	[8,19; 12,73]	[5,59; 9,72]	[6,94; 11,57]	[5,99; 10,58]					
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	1111	902	840	704	669	622	586	550	488	438	392	370	364	320					
		Anteil in %	55,08	54,47	58,37	57,75	60,00	59,29	60,04	59,98	59,73	57,86	56,16	57,81	60,17	57,66					
	CI Anteil in %		[52,91; 57,25]	[52,07; 56,87]	[55,83; 60,92]	[54,98; 60,53]	[57,12; 62,88]	[56,32; 62,27]	[56,97; 63,12]	[56,81; 63,15]	[56,37; 63,10]	[54,34; 61,38]	[52,48; 59,84]	[53,98; 61,64]	[56,26; 64,07]	[53,54; 61,77]					
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	355	289	242	210	179	185	179	178	150	158	149	136	116	123					
		Anteil in %	17,60	17,45	16,82	17,23	16,05	17,64	18,34	19,41	18,36	20,87	21,35	21,25	19,17	22,16					
	CI Anteil in %		[15,94; 19,26]	[15,62; 19,28]	[14,88; 18,75]	[15,11; 19,35]	[13,90; 18,21]	[15,33; 19,94]	[15,91; 20,77]	[16,85; 21,97]	[15,70; 21,02]	[17,97; 23,77]	[18,30; 24,39]	[18,08; 24,42]	[16,03; 22,31]	[18,70; 25,62]					
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	193	169	113	108	104	83	82	77	64	76	64	61	50	51						
	Anteil in %	9,57	10,21	7,85	8,86	9,33	7,91	8,40	8,40	7,83	10,04	9,17	9,53	8,26	9,19						
CI Anteil in %		[8,28; 10,85]	[8,75; 11,66]	[6,46; 9,24]	[7,26; 10,46]	[7,62; 11,04]	[6,28; 9,55]	[6,66; 10,14]	[6,60; 10,19]	[5,99; 9,68]	[7,90; 12,18]	[7,03; 11,31]	[7,25; 11,81]	[6,07; 10,46]	[6,78; 11,59]						
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	83	58	33	31	27	33	25	24	30	16	20	24	19	15						
	Anteil in %	4,12	3,50	2,29	2,54	2,42	3,15	2,56	2,62	3,67	2,11	2,87	3,75	3,14	2,70						
CI Anteil in %		[3,25; 4,98]	[2,62; 4,39]	[1,52; 3,07]	[1,66; 3,43]	[1,52; 3,32]	[2,09; 4,20]	[1,57; 3,55]	[1,58; 3,65]	[2,38; 4,96]	[1,09; 3,14]	[1,63; 4,10]	[2,28; 5,22]	[1,75; 4,53]	[1,35; 4,05]						
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1746	1506	1284	1166	1076	999	931	824	770	721	676	624	585						
	auswertbar	Anzahl	1743	1425	1185	1090	1013	941	887	782	735	697	644	602	563						
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	264	227	178	187	148	138	121	102	84	80	61	68	61						
		Anteil in %	15,15	15,93	15,02	17,16	14,61	14,67	13,64	13,04	11,43	11,48	9,47	11,30	10,83						
	CI Anteil in %		[13,46; 16,83]	[14,03; 17,83]	[12,99; 17,06]	[14,92; 19,40]	[12,43; 16,79]	[12,40; 16,93]	[11,38; 15,90]	[10,68; 15,41]	[9,13; 13,73]	[9,11; 13,85]	[7,21; 11,74]	[8,76; 13,83]	[8,27; 13,40]						
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	899	814	680	593	565	543	488	464	417	393	365	332	323						
		Anteil in %	51,58	57,12	57,38	54,40	55,77	57,70	55,02	59,34	56,73	56,38	56,68	55,15	57,37						
	CI Anteil in %		[49,23; 53,92]	[54,55; 59,69]	[54,57; 60,20]	[51,45; 57,36]	[52,71; 58,83]	[54,55; 60,86]	[51,74; 58,29]	[55,89; 62,78]	[53,15; 60,32]	[52,70; 60,07]	[52,85; 60,51]	[51,17; 59,13]	[53,28; 61,46]						
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	333	224	194	193	190	158	167	143	148	145	135	122	105						
		Anteil in %	19,10	15,72	16,37	17,71	18,76	16,79	18,83	18,29	20,14	20,80	20,96	20,27	18,65						
	CI Anteil in %		[17,26; 20,95]	[13,83; 17,61]	[14,26; 18,48]	[15,44; 19,97]	[16,35; 21,16]	[14,40; 19,18]	[16,25; 21,40]	[15,58; 21,00]	[17,23; 23,04]	[17,79; 23,82]	[17,82; 24,11]	[17,05; 23,48]	[15,43; 21,87]						
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	173	118	95	84	81	79	87	60	71	72	67	61	58							
	Anteil in %	9,93	8,28	8,02	7,71	8,00	8,40	9,81	7,67	9,66	10,33	10,40	10,13	10,30							
CI Anteil in %		[8,52; 11,33]	[6,85; 9,71]	[6,47; 9,56]	[6,12; 9,29]	[6,32; 9,67]	[6,62; 10,17]	[7,85; 11,77]	[5,81; 9,54]	[7,52; 11,80]	[8,07; 12,59]	[8,04; 12,76]	[7,72; 12,55]	[7,79; 12,82]							
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	74	42	38	33	29	23	24	13	15	7	16	19	16							
	Anteil in %	4,25	2,95	3,21	3,03	2,86	2,44	2,71	1,66	2,04	1,00	2,48	3,16	2,84							
CI Anteil in %		[3,30; 5,19]	[2,07; 3,83]	[2,20; 4,21]	[2,01; 4,05]	[1,84; 3,89]	[1,46; 3,43]	[1,64; 3,77]	[0,77; 2,56]	[1,02; 3,06]	[0,26; 1,75]	[1,28; 3,69]	[1,76; 4,55]	[1,47; 4,22]							
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1564	1393	1231	1129	1054	953	849	796	731	684	643	597							
	auswertbar	Anzahl	1562	1333	1136	1051	979	912	812	759	701	659	614	565							
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	236	205	184	165	153	125	118	111	99	88	78	86							
		Anteil in %	15,11	15,38	16,20	15,70	15,63	13,71	14,53	14,62	14,12	13,35	12,70	15,22							
	CI Anteil in %		[13,33; 16,89]	[13,44; 17,32]	[14,05; 18,34]	[13,50; 17,90]	[13,35; 17,90]	[11,47; 15,94]	[12,11; 16,96]	[12,11; 17,14]	[11,54; 16,70]	[10,75; 15,95]	[10,07; 15,34]	[12,26; 18,19]							
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	856	775	664	633	601	560	503	439	414	383	367	317							
		Anteil in %	54,80	58,14	58,45	60,23	61,39	61,40	61,95	57,84	59,06	58,12	59,77	56,11							
	CI Anteil in %		[52,33; 57,27]	[55,49; 60,79]	[55,58; 61,32]	[57,27; 63,19]	[58,34; 64,44]	[58,24; 64,56]	[58,60; 65,29]	[54,32; 61,35]	[55,42; 62,70]	[54,35; 61,89]	[55,89; 63,65]	[52,01; 60,20]							
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	282	222	193	162	153	151	123	125	128	129	113	105							
		Anteil in %	18,05	16,65	16,99	15,41	15,63	16,56	15,15	16,47	18,26	19,58	18,40	18,58							
	CI Anteil in %		[16,15; 19,96]	[14,65; 18,65]	[14,80; 19,17]	[13,23; 17,60]	[13,35; 17,90]	[14,14; 18,97]	[12,68; 17,62]	[13,83; 19,11]	[15,40; 21,12]	[16,54; 22,61]	[15,34; 21,47]	[15,37; 21,79]							
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	129	101	73	69	64	64	54	65	51	48	42	44								
	Anteil in %	8,26	7,58	6,43	6,57	6,54	7,02	6,65	8,56	7,28	7,28	6,84	7,79								
CI Anteil in %		[6,89; 9,62]	[6,16; 9,00]	[5,00; 7,85]	[5,07; 8,06]	[4,99; 8,09]	[5,36; 8,68]	[4,94; 8,37]	[6,57; 10,56]	[5,35; 9,20]	[5,30; 9,27]	[4,84; 8,84]	[5,58; 10,00]								
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	59	30	22	22	8	12	14	19	9	11	14	13								
	Anteil in %	3,78	2,25	1,94	2,09	0,82	1,32	1,72	2,50	1,28	1,67	2,28	2,30								
CI Anteil in %		[2,83; 4,72]	[1,45; 3,05]	[1,13; 2,74]	[1,23; 2,96]	[0,25; 1,38]	[0,58; 2,06]	[0,83; 2,62]	[1,39; 3,62]	[0,45; 2,12]	[0,69; 2										

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1642	1481	1343	1235	1145	1007	913	846	799	746	685											
	auswertbar	Anzahl	1639	1432	1282	1164	1080	959	870	807	752	706	635											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	239	251	230	191	152	112	112	104	76	78	69											
		Anteil in %	14,58	17,53	17,94	16,41	14,07	11,68	12,87	12,89	10,11	11,05	10,87											
	CI Anteil in %	[12,87; 16,29]	[15,56; 19,50]	[15,84; 20,04]	[14,28; 18,54]	[12,00; 16,15]	[9,65; 13,71]	[10,65; 15,10]	[10,57; 15,20]	[7,95; 12,26]	[8,73; 13,36]	[8,44; 13,29]												
		Anzahl	892	817	735	694	645	594	521	504	465	438	380											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	54,42	57,05	57,33	59,62	59,72	61,94	59,89	62,45	61,84	62,04	59,84											
		CI Anteil in %	[52,01; 56,84]	[54,49; 59,62]	[54,62; 60,04]	[56,80; 62,44]	[56,80; 62,65]	[58,86; 65,01]	[56,63; 63,14]	[59,11; 65,80]	[58,36; 65,31]	[58,46; 65,62]	[56,03; 63,66]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	279	197	192	184	172	152	144	122	133	125	109											
		Anteil in %	17,02	13,76	14,98	15,81	15,93	15,85	16,55	15,12	17,69	17,71	17,17											
	CI Anteil in %	[15,20; 18,84]	[11,97; 15,54]	[13,02; 16,93]	[13,71; 17,90]	[13,74; 18,11]	[13,54; 18,16]	[14,08; 19,02]	[12,64; 17,59]	[14,96; 20,42]	[14,89; 20,52]	[14,23; 20,10]												
		Anzahl	157	126	86	67	87	80	76	62	62	48	62											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	9,58	8,80	6,71	5,76	8,06	8,34	8,74	7,68	8,24	6,80	9,76											
		CI Anteil in %	[8,15; 11,00]	[7,33; 10,27]	[5,34; 8,08]	[4,42; 7,09]	[6,43; 9,68]	[6,59; 10,09]	[6,86; 10,61]	[5,84; 9,52]	[6,28; 10,21]	[4,94; 8,66]	[7,45; 12,07]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	72	41	39	28	24	21	17	15	17	15	15												
	Anteil in %	4,39	2,86	3,04	2,41	2,22	2,19	1,95	1,86	2,13	2,41	2,36												
CI Anteil in %	[3,40; 5,39]	[2,00; 3,73]	[2,10; 3,98]	[1,52; 3,29]	[1,34; 3,10]	[1,26; 3,12]	[1,03; 2,87]	[0,93; 2,79]	[1,10; 3,16]	[1,28; 3,54]	[1,18; 3,54]													
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1390	1240	1108	1000	850	776	716	662	621	573												
	auswertbar	Anzahl	1384	1205	1058	958	824	749	686	636	597	537												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	203	208	171	144	120	115	86	71	83	74												
		Anteil in %	14,67	17,26	16,16	15,03	14,56	15,35	12,54	11,16	13,90	13,78												
	CI Anteil in %	[12,80; 16,53]	[15,13; 19,40]	[13,94; 18,38]	[12,77; 17,30]	[12,15; 16,97]	[12,77; 17,94]	[10,06; 13,61]	[8,71; 16,68]	[11,13; 16,70]	[10,86; 16,70]													
		Anzahl	774	693	637	565	492	427	423	379	360	319												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	55,92	57,51	60,21	58,98	59,71	57,01	61,66	59,59	60,30	59,40												
		CI Anteil in %	[53,31; 58,54]	[54,72; 60,30]	[57,26; 63,16]	[55,86; 62,09]	[56,36; 63,06]	[53,46; 60,56]	[58,02; 65,30]	[55,77; 63,41]	[56,37; 64,23]	[55,25; 63,56]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	221	184	153	149	127	122	105	114	95	86												
		Anteil in %	15,97	15,27	14,46	15,55	15,41	16,29	15,31	17,92	15,91	16,01												
	CI Anteil in %	[14,04; 17,90]	[13,24; 17,30]	[12,34; 16,58]	[13,26; 17,85]	[12,95; 17,88]	[13,64; 18,93]	[12,61; 18,00]	[14,94; 20,91]	[12,98; 18,85]	[12,91; 19,12]													
		Anzahl	129	102	76	78	63	70	59	50	46	49												
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	9,32	8,46	7,18	8,14	7,65	9,35	8,60	7,86	7,71	9,12												
		CI Anteil in %	[7,79; 10,85]	[6,89; 10,04]	[5,63; 8,74]	[6,41; 9,87]	[5,83; 9,46]	[7,26; 11,43]	[6,50; 10,70]	[5,77; 9,96]	[5,56; 9,85]	[6,69; 11,56]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	57	18	21	22	15	13	22	13	9														
	Anteil in %	4,12	1,49	1,98	2,30	2,67	2,00	1,90	3,46	2,18	1,68													
CI Anteil in %	[3,07; 5,17]	[0,81; 2,18]	[1,14; 2,83]	[1,35; 3,25]	[1,57; 3,77]	[1,00; 3,01]	[0,87; 2,92]	[2,04; 4,88]	[1,01; 3,35]	[0,59; 2,76]														
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1260	1149	1047	897	808	747	694	653	595													
	auswertbar	Anzahl	1257	1085	1006	863	773	721	668	628	561													
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	172	189	151	129	117	102	89	88	69													
		Anteil in %	13,68	17,42	15,01	14,95	15,14	14,15	13,32	14,01	12,30													
	CI Anteil in %	[11,78; 15,58]	[15,16; 19,68]	[12,80; 17,22]	[12,57; 17,33]	[12,61; 17,66]	[11,60; 16,69]	[10,74; 15,90]	[11,30; 16,73]	[9,58; 15,02]														
		Anzahl	719	628	583	511	434	430	387	373	325													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	57,20	57,88	57,95	59,21	56,14	59,64	57,93	59,39	57,93													
		CI Anteil in %	[54,46; 59,94]	[54,94; 60,82]	[54,90; 61,00]	[55,93; 62,49]	[52,64; 59,65]	[56,06; 63,22]	[54,19; 61,68]	[55,55; 63,24]	[53,84; 62,02]													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	204	155	146	136	141	120	124	95	97													
		Anteil in %	16,23	14,29	14,51	15,76	18,24	16,64	18,56	15,13	17,29													
	CI Anteil in %	[14,19; 18,27]	[12,20; 16,37]	[12,34; 16,69]	[13,33; 18,19]	[15,52; 20,96]	[13,92; 19,36]	[15,61; 21,51]	[12,32; 17,93]	[14,16; 20,42]														
		Anzahl	110	84	95	59	55	45	48	58	52													
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	8,75	7,74	9,44	6,84	7,12	6,24	7,19	9,24	9,27													
		CI Anteil in %	[7,19; 10,31]	[6,15; 9,33]	[7,64; 11,25]	[5,15; 8,52]	[5,30; 8,93]	[4,47; 8,01]	[5,23; 9,15]	[6,97; 11,50]	[6,87; 11,67]													
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	52	29	31	28	26	24	20	14	18														
	Anteil in %	4,14	2,67	3,08	3,24	3,36	3,33	2,99	2,23	3,21														
CI Anteil in %	[3,04; 5,24]	[1,71; 3,63]	[2,01; 4,15]	[2,06; 4,43]	[2,09; 4,64]	[2,02; 4,64]	[1,70; 4,29]	[1,07; 3,38]	[1,75; 4,67]															

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	563	507	437	395	368	338	312	296										
	auswertbar	Anzahl	561	495	429	378	361	329	306	280										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	109	87	81	70	55	45	44	43										
		Anteil in %	19,43	17,58	18,88	18,52	15,24	13,68	14,38	15,36										
	CI Anteil in %	[16,15; 22,71]	[14,22; 20,93]	[15,17; 22,59]	[14,60; 22,44]	[11,52; 18,95]	[9,96; 17,40]	[10,44; 18,32]	[11,13; 19,59]											
		Anzahl	315	302	267	222	218	191	182	170										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	56,15	61,01	62,24	58,73	60,39	58,05	59,48	60,71										
		CI Anteil in %	[52,04; 60,26]	[56,71; 65,31]	[57,64; 66,83]	[53,76; 63,70]	[55,34; 65,44]	[52,71; 63,40]	[53,97; 64,99]	[54,98; 66,45]										
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	80	64	48	63	60	60	60	44										
		Anteil in %	14,26	12,93	11,19	16,67	16,62	18,24	19,61	15,71										
	CI Anteil in %	[11,36; 17,16]	[9,97; 15,89]	[8,20; 14,18]	[12,90; 20,43]	[12,77; 20,47]	[14,06; 22,42]	[15,15; 24,06]	[11,44; 19,98]											
		Anzahl	37	29	27	17	15	20	17	18										
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	6,60	5,86	6,29	4,50	4,16	6,08	5,56	6,43										
		CI Anteil in %	[4,54; 8,65]	[3,79; 7,93]	[3,99; 8,59]	[2,41; 6,59]	[2,09; 6,22]	[3,49; 8,66]	[2,98; 8,13]	[3,55; 9,31]										
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	20	13	6	6	13	13	3	5											
	Anteil in %	3,57	2,63	1,40	1,59	3,60	3,95	0,98	1,79											
CI Anteil in %	[2,03; 5,10]	[1,22; 4,04]	[0,29; 2,51]	[0,33; 2,85]	[1,68; 5,53]	[1,84; 6,06]	[0,00; 2,09]	[0,23; 3,34]												
	Anzahl	714	614	543	497	447	407	380												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	714	614	543	497	447	407	380											
	auswertbar	Anzahl	713	593	526	488	433	400	373											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	102	92	74	82	63	72	60											
		Anteil in %	14,31	15,51	14,07	16,80	14,55	18,00	16,09											
	CI Anteil in %	[11,73; 16,88]	[12,60; 18,43]	[11,09; 17,04]	[13,48; 20,12]	[11,22; 17,87]	[14,23; 21,77]	[12,35; 19,82]												
		Anzahl	371	346	314	285	247	222	207											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	52,03	58,35	59,70	58,40	57,04	55,50	55,50											
		CI Anteil in %	[48,36; 55,70]	[54,38; 62,32]	[55,50; 63,89]	[54,02; 62,78]	[52,38; 61,71]	[50,62; 60,38]	[50,45; 60,55]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	128	93	78	81	72	70	65											
		Anteil in %	17,95	15,68	14,83	16,60	16,63	17,50	17,43											
	CI Anteil in %	[15,13; 20,77]	[12,75; 18,61]	[11,79; 17,87]	[13,29; 19,90]	[13,12; 20,14]	[13,77; 21,23]	[13,57; 21,28]												
		Anzahl	73	51	44	29	37	27	29											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	10,24	8,60	8,37	5,94	8,55	6,75	7,77											
		CI Anteil in %	[8,01; 12,47]	[6,34; 10,86]	[6,00; 10,73]	[3,84; 8,04]	[5,91; 11,18]	[4,29; 9,21]	[5,05; 10,50]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	39	11	16	11	14	9	12												
	Anteil in %	5,47	1,85	3,04	2,25	3,23	2,25	3,22												
CI Anteil in %	[3,80; 7,14]	[0,77; 2,94]	[1,57; 4,51]	[0,94; 3,57]	[1,57; 4,90]	[0,79; 3,71]	[1,42; 5,01]													
	Anzahl	507	446	395	367	323	292													
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	507	446	395	367	323	292												
	auswertbar	Anzahl	506	440	382	357	314	285												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	58	56	52	40	34	31												
		Anteil in %	11,46	12,73	13,61	11,20	10,83	10,88												
	CI Anteil in %	[8,68; 14,24]	[9,61; 15,84]	[10,17; 17,06]	[7,93; 14,48]	[7,39; 14,27]	[7,26; 14,50]													
		Anzahl	281	250	228	212	198	163												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	55,53	56,82	59,69	59,38	63,06	57,19												
		CI Anteil in %	[51,20; 59,87]	[52,18; 61,45]	[54,76; 64,61]	[54,28; 64,49]	[57,71; 68,40]	[51,44; 62,95]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	90	86	65	67	47	62												
		Anteil in %	17,79	19,55	17,02	18,77	14,97	21,75												
	CI Anteil in %	[14,45; 21,12]	[15,84; 23,26]	[13,24; 20,79]	[14,71; 22,82]	[11,02; 18,92]	[16,96; 26,55]													
		Anzahl	54	39	30	31	31	23												
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	10,67	8,86	7,85	8,68	9,87	8,07												
		CI Anteil in %	[7,98; 13,36]	[6,20; 11,52]	[5,15; 10,55]	[5,76; 11,61]	[6,57; 13,18]	[4,90; 11,24]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	23	9	7	7	4	6													
	Anteil in %	4,55	2,05	1,83	1,96	1,27	2,11													
CI Anteil in %	[2,73; 6,36]	[0,72; 3,37]	[0,49; 3,18]	[0,52; 3,40]	[0,03; 2,52]	[0,44; 3,77]														

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	547	485	437	389	357													
	auswertbar	Anzahl	546	478	428	381	348													
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	75	78	50	60	44													
		Anteil in %	13,74	16,32	11,68	15,75	12,64													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[10,85; 16,63]	[13,00; 19,63]	[8,64; 14,73]	[12,09; 19,41]	[9,15; 16,14]													
		Anzahl	273	264	249	207	215													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	50,00	55,23	58,18	54,33	61,78													
		CI Anteil in %	[45,80; 54,20]	[50,77; 59,69]	[53,50; 62,86]	[49,32; 59,34]	[56,67; 66,89]													
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	105	77	76	66	50													
		Anteil in %	19,23	16,11	17,76	17,32	14,37													
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[15,92; 22,54]	[12,81; 19,41]	[14,13; 21,38]	[13,52; 21,13]	[10,68; 18,06]													
		Anzahl	62	38	32	34	26													
		Anteil in %	11,36	7,95	7,48	8,92	7,47													
		CI Anteil in %	[8,69; 14,02]	[5,52; 10,38]	[4,98; 9,97]	[6,06; 11,79]	[4,70; 10,24]													
	Anzahl	31	21	21	14	13														
	Anteil in %	5,68	4,39	4,91	3,67	3,74														
	CI Anteil in %	[3,73; 7,62]	[2,55; 6,23]	[2,86; 6,96]	[1,78; 5,57]	[1,74; 5,73]														
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	501	442	400	360														
2010-2	auswertbar	Anzahl	500	439	391	349														
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	53	52	56	47														
		Anteil in %	10,60	11,85	14,32	13,47														
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[7,90; 13,30]	[8,82; 14,87]	[10,85; 17,80]	[9,88; 17,05]														
		Anzahl	288	269	241	219														
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	57,60	61,28	61,64	62,75														
		CI Anteil in %	[53,26; 61,94]	[56,71; 65,84]	[56,81; 66,46]	[57,67; 67,83]														
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	72	76	49	44														
		Anteil in %	14,40	17,31	12,53	12,61														
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[11,32; 17,48]	[13,77; 20,86]	[9,25; 15,82]	[9,12; 16,09]														
		Anzahl	56	32	28	31														
		Anteil in %	11,20	7,29	7,16	8,88														
		CI Anteil in %	[8,43; 13,97]	[4,85; 9,72]	[4,60; 9,72]	[5,89; 11,87]														
		Anzahl	31	10	17	8														
Anteil in %		6,20	2,28	4,35	2,29															
	CI Anteil in %	[4,08; 8,32]	[0,88; 3,68]	[2,32; 6,37]	[0,72; 3,86]															
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	519	455	385															
2011-1	auswertbar	Anzahl	518	444	377															
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	53	70	52															
		Anteil in %	10,23	15,77	13,79															
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[7,62; 12,84]	[12,37; 19,16]	[10,31; 17,28]															
		Anzahl	274	244	215															
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	52,90	54,95	57,03															
		CI Anteil in %	[48,59; 57,20]	[50,32; 59,59]	[52,03; 62,03]															
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	91	80	70															
		Anteil in %	17,57	18,02	18,57															
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[14,29; 20,85]	[14,44; 21,60]	[14,64; 22,50]															
		Anzahl	54	27	33															
		Anteil in %	10,42	6,08	8,75															
		CI Anteil in %	[7,79; 13,06]	[3,86; 8,31]	[5,90; 11,61]															
		Anzahl	46	23	7															
Anteil in %		8,88	5,18	1,86																
	CI Anteil in %	[6,43; 11,33]	[3,12; 7,24]	[0,49; 3,22]																

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	435	376																				
	auswertbar	Anzahl	434	365																				
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	41	60																				
		Anteil in %	9,45	16,44																				
		CI Anteil in %	[6,69; 12,20]	[12,63; 20,25]																				
		Anzahl	244	214																				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	56,22	58,63																				
		CI Anteil in %	[51,55; 60,89]	[53,57; 63,69]																				
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	66	58																				
		Anteil in %	15,21	15,89																				
		CI Anteil in %	[11,83; 18,59]	[12,13; 19,65]																				
		Anzahl	52	23																				
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	11,98	6,30																				
		CI Anteil in %	[8,92; 15,04]	[3,81; 8,80]																				
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	31	10																					
	Anteil in %	7,14	2,74																					
	CI Anteil in %	[4,72; 9,57]	[1,06; 4,42]																					
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	431																					
	auswertbar	Anzahl	431																					
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	34																					
		Anteil in %	7,89																					
		CI Anteil in %	[5,34; 10,44]																					
		Anzahl	252																					
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	58,47																					
		CI Anteil in %	[53,81; 63,13]																					
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	77																					
		Anteil in %	17,87																					
		CI Anteil in %	[14,24; 21,49]																					
		Anzahl	34																					
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	7,89																					
		CI Anteil in %	[5,34; 10,44]																					
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	34																						
	Anteil in %	7,89																						
	CI Anteil in %	[5,34; 10,44]																						

### Anhang C: Auswertung für Patienten nur mit sekundären Endpunkten

Im Hauptteil des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden in den Auswertungskapiteln 1 und 2 unter anderem tabellarische Auswertungen zu den Patientenzahlen und -merkmalen sowie zu Raucherstatus, Hypertonus und HbA1c-Werten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf die Gesamtheit der Patienten. Im folgenden Anhang C werden diese Auswertungen nochmals für die Subkohorte der **Patienten mit sekundären Endpunkten** in der Erstdokumentation vorgenommen. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen im Hauptteil und im Anhang zu erleichtern, wurden die Auswertungskapitel und Tabellen im Anhang analog zu zum Hauptteil nummeriert. Da das Auswertungskapitel 2 im Anhang entfällt, folgt auf das Auswertungskapitel C.1 direkt das Auswertungskapitel C.3. Vergleichbares gilt für die Tabellen; deren Nummerierung ist im Anhang daher nicht fortlaufend.

Die Subkohorten werden gebildet, indem die Patienten jeder Kohorte nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei Gruppen unterteilt werden. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen, verursacht durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage, letztlich bedingt durch Mikro-Gefäßerkrankungen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, erheblich auffälliger Fußstatus (Stadium 2 bis Stadium 5 nach Wagner ODER Stadium C bis D nach Armstrong), periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten ohne Endpunkte sind Patienten, die nicht den Subkohorten 2 oder 3 zuzuordnen sind. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht.

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

**Auswertungskapitel C.1: Patientenzahlen und -merkmale**

In den folgenden vier Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle C.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt - - Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren - - Männer und - - Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch - - Teilnehmer im Programm, - - Männer und - - Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	männlich	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	weiblich	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	741	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	163	
	männlich	Anzahl	323	258	216	180	157	141	132	121	113	106	102	97	92	91	89	82	77	73	
		Anteil in %	43,59	43,29	43,20	42,06	42,20	42,09	43,56	44,16	43,46	43,27	43,22	42,92	42,99	44,39	44,95	44,09	44,77	44,79	
	weiblich	Anzahl	418	338	284	248	215	194	171	153	147	139	134	129	122	114	109	104	95	90	
		Anteil in %	56,41	56,71	56,80	57,94	57,80	57,91	56,44	55,84	56,54	56,73	56,78	57,08	57,01	55,61	55,05	55,91	55,23	55,21	
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454		
	männlich	Anzahl	902	757	604	504	451	392	350	338	322	308	299	279	265	250	237	221	208		
		Anteil in %	47,47	47,31	47,26	47,15	47,42	47,06	46,36	47,61	47,63	47,46	47,69	47,53	47,66	47,44	46,93	46,04	45,81		
	weiblich	Anzahl	998	843	674	565	500	441	405	372	354	341	328	308	291	277	268	259	246		
		Anteil in %	52,53	52,69	52,74	52,85	52,58	52,94	53,64	52,39	52,37	52,54	52,31	52,47	52,34	52,56	53,07	53,96	54,19		
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728			
	männlich	Anzahl	1455	1177	941	789	680	604	579	543	502	471	442	409	387	367	345	328			
		Anteil in %	48,35	47,57	46,77	46,49	46,32	46,07	46,28	46,06	45,43	45,46	45,66	45,44	45,37	45,36	44,98	45,05			
	weiblich	Anzahl	1554	1297	1071	908	788	707	672	636	603	565	526	491	466	442	422	400			
		Anteil in %	51,65	52,43	53,23	53,51	53,68	53,93	53,72	53,94	54,57	54,54	54,34	54,56	54,63	54,64	55,02	54,95			
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633				
	männlich	Anzahl	1061	881	757	665	598	555	517	490	457	427	410	389	365	343	325				
		Anteil in %	51,58	50,90	51,01	51,71	51,77	51,63	51,49	51,15	51,12	50,83	52,30	52,57	51,92	51,73	51,34				
	weiblich	Anzahl	996	850	727	621	557	520	487	468	437	413	374	351	338	320	308				
		Anteil in %	48,42	49,10	48,99	48,29	48,23	48,37	48,51	48,85	48,88	49,17	47,70	47,43	48,08	48,27	48,66				
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2626	2293	1953	1721	1604	1507	1407	1315	1218	1137	1054	995	935	870					
	männlich	Anzahl	1292	1140	964	834	772	718	669	622	575	538	505	487	461	432					
		Anteil in %	49,20	49,72	49,36	48,46	48,13	47,64	47,55	47,30	47,21	47,32	47,91	48,94	49,30	49,66					
	weiblich	Anzahl	1334	1153	989	887	832	789	738	693	643	599	549	508	474	438					
		Anteil in %	50,80	50,28	50,64	51,54	51,87	52,36	52,45	52,70	52,79	52,68	52,09	51,06	50,70	50,34					
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2328	1992	1753	1596	1467	1357	1271	1177	1093	1037	966	905	847						
	männlich	Anzahl	1116	965	849	773	711	646	604	555	512	485	451	422	395						
		Anteil in %	47,94	48,44	48,43	48,43	48,47	47,61	47,52	47,15	46,84	46,77	46,69	46,63	46,64						
	weiblich	Anzahl	1212	1027	904	823	756	711	667	622	581	552	515	483	452						
		Anteil in %	52,06	51,56	51,57	51,57	51,53	52,39	52,48	52,85	53,16	53,23	53,31	53,37	53,36						
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1891	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776							
	männlich	Anzahl	996	877	772	695	641	591	533	508	480	452	430	400							
		Anteil in %	52,67	52,39	52,30	52,29	52,20	52,12	51,40	51,68	51,78	51,78	52,12	51,55							
	weiblich	Anzahl	895	797	704	634	587	543	504	475	447	421	395	376							
		Anteil in %	47,33	47,61	47,70	47,71	47,80	47,88	48,60	48,32	48,22	48,22	48,22	48,45							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2002	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849								
	männlich	Anzahl	1024	914	829	761	692	636	586	546	509	473	433								
		Anteil in %	51,15	51,18	51,27	50,97	50,99	51,46	51,72	51,51	51,41	51,41	51,00								
	weiblich	Anzahl	978	872	788	732	665	600	547	514	481	447	416								
		Anteil in %	48,85	48,82	48,73	49,03	49,01	48,54	48,28	48,49	48,59	48,59	49,00								

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1553	1419	1288	1173	1064	983	907	841	784	738									
	männlich	Anzahl	759	687	618	570	514	479	436	408	381	357									
		Anteil in %	48,87	48,41	47,98	48,59	48,31	48,73	48,07	48,51	48,60	48,37									
	weiblich	Anzahl	794	732	670	603	550	504	471	433	403	381									
		Anteil in %	51,13	51,59	52,02	51,41	51,69	51,27	51,93	51,49	51,40	51,63									
	2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1441	1266	1152	1018	932	861	811	758	718									
männlich		Anzahl	736	638	585	516	476	432	410	387	368										
		Anteil in %	51,08	50,39	50,78	50,69	51,07	50,17	50,55	51,06	51,25										
weiblich		Anzahl	705	628	567	502	456	429	401	371	350										
		Anteil in %	48,92	49,61	49,22	49,31	48,93	49,83	49,45	48,94	48,75										
2008-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	826	748	656	588	551	519	481	448										
	männlich	Anzahl	465	422	364	329	306	289	269	250											
		Anteil in %	56,30	56,42	55,49	55,95	55,54	55,68	55,93	55,80											
	weiblich	Anzahl	361	326	292	259	245	230	212	198											
		Anteil in %	43,70	43,58	44,51	44,05	44,46	44,32	44,07	44,20											
	2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1266	1098	984	894	834	772	717											
männlich		Anzahl	726	625	558	516	484	446	412												
		Anteil in %	57,35	56,92	56,71	57,72	58,03	57,77	57,46												
weiblich		Anzahl	540	473	426	378	350	326	305												
		Anteil in %	42,65	43,08	43,29	42,28	41,97	42,23	42,54												
2009-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	950	847	758	693	640	587												
	männlich	Anzahl	496	447	395	360	331	310													
		Anteil in %	52,21	52,77	52,11	51,95	51,72	52,81													
	weiblich	Anzahl	454	400	363	333	309	277													
		Anteil in %	47,79	47,23	47,89	48,05	48,28	47,19													
	2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1055	926	835	739	676													
männlich		Anzahl	593	519	467	414	382														
		Anteil in %	56,21	56,05	55,93	56,02	56,51														
weiblich		Anzahl	462	407	368	325	294														
		Anteil in %	43,79	43,95	44,07	43,98	43,49														
2010-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1015	904	788	719														
	männlich	Anzahl	547	483	419	379															
		Anteil in %	53,89	53,43	53,17	52,71															
	weiblich	Anzahl	468	421	369	340															
		Anteil in %	46,11	46,57	46,83	47,29															
	2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1045	907	794															
männlich		Anzahl	569	495	434																
		Anteil in %	54,45	54,58	54,66																
weiblich		Anzahl	476	412	360																
		Anteil in %	45,55	45,42	45,34																
2011-2		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	926	784																
	männlich	Anzahl	507	429																	
		Anteil in %	54,75	54,72																	
	weiblich	Anzahl	419	355																	
		Anteil in %	45,25	45,28																	
	2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	920																	
männlich		Anzahl	523																		
		Anteil in %	56,85																		
weiblich		Anzahl	397																		
		Anteil in %	43,15																		



Tabelle C.1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit -- Teilnehmern. -- von ihnen bzw. -- Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Tod	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anteil in %		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	145	241	313	369	406	438	467	481	496	505	515	527	536	543	555	569	578	586	
		Anteil in %	19,57	32,52	42,24	49,80	54,79	59,11	63,02	64,91	66,94	68,15	69,50	71,12	72,33	73,28	74,90	76,79	78,00	79,08	
		CI Anteil in %	[16,71; 22,43]	[29,15; 35,90]	[38,68; 45,80]	[46,20; 53,40]	[51,20; 58,38]	[55,57; 62,65]	[59,54; 66,50]	[61,47; 68,35]	[63,55; 70,33]	[64,79; 71,51]	[66,18; 72,82]	[67,85; 74,39]	[69,11; 75,56]	[70,09; 76,47]	[71,77; 78,02]	[73,75; 79,83]	[75,02; 80,99]	[76,15; 82,01]	
	davon wegen Tod	Anzahl	2	13	21	27	33	39	40	46	53	60	68	72	75	82	89	96	100	106	
		Anteil in %	0,27	1,75	2,83	3,64	4,45	5,26	5,40	6,21	7,15	8,10	9,18	9,72	10,12	11,07	12,01	12,96	13,50	14,30	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	135	214	275	322	350	376	404	412	418	419	421	429	435	435	440	446	451	452	
		Anteil in %	18,22	28,88	37,11	43,45	47,23	50,74	54,52	55,60	56,41	56,55	56,82	57,89	58,70	58,70	59,38	60,19	60,86	61,00	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	3	4	6	8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Anteil in %	0,27	0,40	0,54	0,81	1,08	1,08	1,08	1,08	1,21	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	11	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	18	
Anteil in %		0,81	1,48	1,75	1,89	2,02	2,02	2,02	2,02	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,29	2,29	2,43		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	741	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	163	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	163	155	
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	300	622	831	949	1067	1145	1190	1224	1251	1273	1313	1344	1373	1395	1420	1446	1467		
		Anteil in %	15,79	32,74	43,74	49,95	56,16	60,26	62,63	64,42	65,84	67,00	69,11	70,74	72,26	73,42	74,74	76,11	77,21		
		CI Anteil in %	[14,15; 17,43]	[30,63; 34,85]	[41,51; 45,97]	[47,70; 52,20]	[53,93; 58,39]	[58,06; 62,46]	[60,46; 64,81]	[62,27; 66,57]	[63,71; 67,98]	[64,89; 69,11]	[67,03; 71,18]	[68,69; 72,78]	[70,25; 74,28]	[71,43; 75,41]	[72,78; 76,69]	[74,19; 78,02]	[75,32; 79,10]		
	davon wegen Tod	Anzahl	5	24	58	68	92	108	126	139	148	157	180	192	209	219	232	250	266		
		Anteil in %	0,26	1,26	3,05	3,58	4,84	5,68	6,63	7,32	7,79	8,26	9,47	10,11	11,00	11,53	12,21	13,16	14,00		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	276	564	732	835	921	977	1000	1017	1034	1047	1061	1077	1087	1099	1111	1118	1123		
		Anteil in %	14,53	29,68	38,53	43,95	48,47	51,42	52,63	53,53	54,42	55,11	55,84	56,68	57,21	57,84	58,47	58,84	59,11		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	5	10	12	19	24	27	28	28	28	31	33	35	35	35	35	35		
		Anteil in %	0,11	0,26	0,53	0,63	1,00	1,26	1,42	1,47	1,47	1,47	1,63	1,74	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	17	29	31	34	35	36	37	40	41	41	41	42	42	42	42	43	43		
Anteil in %		0,89	1,53	1,63	1,79	1,84	1,89	1,95	2,11	2,16	2,16	2,16	2,21	2,21	2,21	2,21	2,26	2,26			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454	433		

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	535	997	1312	1541	1698	1758	1830	1904	1973	2041	2109	2156	2200	2242	2281	2322		
		Anteil in %	17,78	33,13	43,60	51,21	56,43	58,42	60,82	63,28	65,57	67,83	70,09	71,65	73,11	74,51	75,81	77,17		
		CI Anteil in %	[16,41; 19,15]	[31,45; 34,82]	[41,83; 45,37]	[49,43; 53,00]	[54,66; 58,20]	[56,66; 60,19]	[59,07; 62,56]	[61,55; 65,00]	[63,87; 67,27]	[66,16; 69,50]	[68,45; 71,73]	[70,04; 73,26]	[71,53; 74,70]	[72,95; 76,07]	[74,28; 77,34]	[75,67; 78,67]		
	davon wegen Tod	Anzahl	14	69	108	141	175	203	233	267	292	321	350	376	397	425	444	462		
		Anteil in %	0,47	2,29	3,59	4,69	5,82	6,75	7,74	8,87	9,70	10,67	11,63	12,50	13,19	14,12	14,76	15,35		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	508	894	1145	1328	1439	1467	1501	1535	1574	1607	1645	1666	1684	1698	1716	1738		
		Anteil in %	16,88	29,71	38,05	44,13	47,82	48,75	49,88	51,01	52,31	53,41	54,67	55,37	55,97	56,43	57,03	57,76		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6	15	22	35	45	48	54	59	64	69	69	69	71	71	72	73		
		Anteil in %	0,20	0,50	0,73	1,16	1,50	1,60	1,79	1,96	2,13	2,29	2,29	2,29	2,36	2,36	2,39	2,43		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	7	19	37	37	39	40	42	43	44	45	45	45	48	48	49	49		
Anteil in %		0,23	0,63	1,23	1,23	1,30	1,33	1,40	1,43	1,43	1,46	1,50	1,50	1,60	1,60	1,63	1,63			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728	687		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	326	573	771	902	982	1053	1099	1163	1217	1273	1317	1354	1394	1424	1461			
		Anteil in %	15,85	27,86	37,48	43,85	47,74	51,19	53,43	56,54	59,16	61,89	64,03	65,82	67,77	69,23	71,03			
		CI Anteil in %	[14,27; 17,43]	[25,92; 29,79]	[35,39; 39,57]	[41,71; 46,00]	[45,58; 49,90]	[49,03; 53,35]	[51,27; 55,58]	[54,40; 58,68]	[57,04; 61,29]	[59,79; 63,99]	[61,95; 66,10]	[63,77; 67,87]	[65,75; 69,79]	[67,23; 71,22]	[69,06; 72,99]			
	davon wegen Tod	Anzahl	10	30	55	76	100	128	146	174	202	231	259	274	294	309	331			
		Anteil in %	0,49	1,46	2,67	3,69	4,86	6,22	7,10	8,46	9,82	11,23	12,59	13,32	14,29	15,02	16,09			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	309	517	677	782	831	867	895	928	953	976	989	1007	1025	1039	1053			
		Anteil in %	15,02	25,13	32,91	38,02	40,40	42,15	43,51	45,11	46,33	47,45	48,08	48,95	49,83	50,51	51,19			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6	13	24	29	35	41	41	44	44	47	48	49	51	52	52			
		Anteil in %	0,29	0,63	1,17	1,41	1,70	1,99	1,99	2,14	2,14	2,28	2,33	2,38	2,48	2,53	2,53			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	13	15	15	16	17	17	17	18	19	21	24	24	24	25			
Anteil in %		0,05	0,63	0,73	0,73	0,78	0,83	0,83	0,83	0,88	0,92	1,02	1,17	1,17	1,17	1,22				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633	633		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633	596			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	333	673	905	1022	1119	1219	1311	1408	1489	1572	1631	1691	1756	1818				
		Anteil in %	12,68	25,63	34,46	38,92	42,61	46,42	49,92	53,62	56,70	59,86	62,11	64,39	66,87	69,23				
		CI Anteil in %	[11,41; 13,95]	[23,96; 27,30]	[32,64; 36,28]	[37,05; 40,78]	[40,72; 44,50]	[44,51; 48,33]	[48,01; 51,84]	[51,71; 55,53]	[54,81; 58,60]	[57,99; 61,74]	[60,25; 63,97]	[62,56; 66,23]	[65,07; 68,67]	[67,47; 71,00]				
	davon wegen Tod	Anzahl	20	73	115	145	183	214	250	287	314	344	371	400	435	468				
		Anteil in %	0,76	2,78	4,38	5,52	6,97	8,15	9,52	10,93	11,96	13,10	14,13	15,23	16,57	17,82				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	306	572	753	828	880	945	997	1052	1102	1151	1180	1210	1236	1264				
		Anteil in %	11,65	21,78	28,67	31,53	33,51	35,99	37,97	40,06	41,96	43,83	44,94	46,08	47,07	48,13				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	22	29	38	44	47	51	54	56	59	61	62	63	63				
		Anteil in %	0,11	0,84	1,10	1,45	1,68	1,79	1,94	2,06	2,13	2,25	2,32	2,36	2,40	2,40				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	6	8	11	12	13	13	15	17	18	19	19	22	23				
Anteil in %		0,15	0,23	0,30	0,42	0,46	0,50	0,50	0,57	0,65	0,69	0,72	0,72	0,84	0,88					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2626	2293	1953	1721	1604	1507	1407	1315	1218	1137	1054	995	935	870				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	2293	1953	1721	1604	1507	1407	1315	1218	1137	1054	995	935	870	808				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	336	575	732	861	971	1057	1151	1235	1291	1362	1423	1481	1535					
		Anteil in %	14,43	24,70	31,44	36,98	41,71	45,40	49,44	53,05	55,46	58,51	61,13	63,62	65,94					
		CI Anteil in %	[13,01; 15,86]	[22,95; 26,45]	[29,56; 33,33]	[35,02; 38,95]	[39,71; 43,71]	[43,38; 47,43]	[47,41; 51,47]	[51,02; 55,08]	[53,44; 57,47]	[56,50; 60,51]	[59,14; 63,11]	[61,66; 65,57]	[64,01; 67,86]					
	davon wegen Tod	Anzahl	19	57	108	150	192	212	249	278	305	339	372	394	420					
		Anteil in %	0,82	2,45	4,64	6,44	8,25	9,11	10,70	11,94	13,10	14,56	15,98	16,92	18,04					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	310	497	590	665	725	790	843	896	922	958	985	1018	1044					
		Anteil in %	13,32	21,35	25,34	28,57	31,14	33,93	36,21	38,49	39,60	41,15	42,31	43,73	44,85					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6	20	31	41	47	47	50	52	54	54	55	56	57					
		Anteil in %	0,26	0,86	1,33	1,76	2,02	2,02	2,15	2,23	2,32	2,32	2,36	2,41	2,45					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	1	3	5	7	8	9	9	10	11	11	13	14					
Anteil in %		0,04	0,04	0,13	0,21	0,30	0,34	0,39	0,39	0,43	0,47	0,47	0,56	0,60						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2328	1992	1753	1596	1467	1357	1271	1177	1093	1037	966	905	847					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1992	1753	1596	1467	1357	1271	1177	1093	1037	966	905	847	793					

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	217	415	562	663	757	854	908	964	1018	1066	1115	1162								
		Anteil in %	11,48	21,95	29,72	35,06	40,03	45,16	48,02	50,98	53,83	56,37	58,96	61,45								
		CI Anteil in %	[10,04; 12,91]	[20,08; 23,81]	[27,66; 31,78]	[32,91; 37,21]	[37,82; 42,24]	[42,92; 47,40]	[45,76; 50,27]	[48,72; 53,23]	[51,59; 56,08]	[54,14; 58,61]	[56,75; 61,18]	[59,25; 63,64]								
	davon wegen Tod	Anzahl	13	47	98	130	159	193	215	246	266	285	310	335								
		Anteil in %	0,69	2,49	5,18	6,87	8,41	10,21	11,37	13,01	14,07	15,07	16,39	17,72								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	195	339	420	482	546	608	635	660	692	718	740	762								
		Anteil in %	10,31	17,93	22,21	25,49	28,87	32,15	33,58	34,90	36,59	37,97	39,13	40,30								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	8	22	34	39	40	40	42	42	43	46	48	48								
		Anteil in %	0,42	1,16	1,80	2,06	2,12	2,12	2,22	2,22	2,27	2,43	2,54	2,54								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	7	10	12	12	13	16	16	17	17	17	17								
Anteil %		0,05	0,37	0,53	0,63	0,63	0,69	0,85	0,85	0,90	0,90	0,90	0,90									
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1891	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776	729								
2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	216	385	509	645	766	869	942	1012	1082	1153	1197									
		Anteil in %	10,79	19,23	25,42	32,22	38,26	43,41	47,05	50,55	54,05	57,59	59,79									
		CI Anteil in %	[9,43; 12,15]	[17,50; 20,96]	[23,52; 27,33]	[30,17; 34,27]	[36,13; 40,39]	[41,23; 45,58]	[44,87; 49,24]	[48,36; 52,74]	[51,86; 56,23]	[55,43; 59,76]	[57,64; 61,94]									
	davon wegen Tod	Anzahl	16	60	92	142	177	214	243	267	298	321	343									
		Anteil in %	0,80	3,00	4,60	7,09	8,84	10,69	12,14	13,34	14,89	16,03	17,13									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	196	307	389	469	549	612	649	692	730	777	799									
		Anteil in %	9,79	15,33	19,43	23,43	27,42	30,57	32,42	34,57	36,46	38,81	39,91									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	14	18	21	26	29	32	33	34	35	35									
		Anteil in %	0,15	0,70	0,90	1,05	1,30	1,45	1,60	1,65	1,70	1,75	1,75									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	4	10	13	14	14	18	20	20	20	20									
Anteil %		0,05	0,20	0,50	0,65	0,70	0,70	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00										
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2002	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849	805								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849	805									
2007-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	134	265	380	489	570	646	712	769	815	855										
		Anteil in %	8,63	17,06	24,47	31,49	36,70	41,60	45,85	49,52	52,48	55,05										
		CI Anteil in %	[7,23; 10,03]	[15,19; 18,94]	[22,33; 26,61]	[29,18; 33,80]	[34,31; 39,10]	[39,14; 44,05]	[43,37; 48,33]	[47,03; 52,00]	[49,99; 54,96]	[52,58; 57,53]										
	davon wegen Tod	Anzahl	12	46	75	104	122	157	182	202	217	242										
		Anteil in %	0,77	2,96	4,83	6,70	7,86	10,11	11,72	13,01	13,97	15,58										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	116	200	278	349	409	446	482	517	547	561										
		Anteil in %	7,47	12,88	17,90	22,47	26,34	28,72	31,04	33,29	35,22	36,12										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	14	21	28	29	31	33	35	35	35										
		Anteil in %	0,26	0,90	1,35	1,80	1,87	2,00	2,12	2,25	2,25	2,25										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	5	6	8	10	12	15	15	16	17										
Anteil %		0,13	0,32	0,39	0,52	0,64	0,77	0,97	0,97	1,03	1,09											
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1553	1419	1288	1173	1064	983	907	841	784	738										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1419	1288	1173	1064	983	907	841	784	738	698										
2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	175	289	423	509	580	630	683	723	773											
		Anteil in %	12,14	20,06	29,35	35,32	40,25	43,72	47,40	50,17	53,64											
		CI Anteil in %	[10,46; 13,83]	[17,99; 22,12]	[27,00; 31,71]	[32,85; 37,79]	[37,72; 42,78]	[41,16; 46,28]	[44,82; 49,98]	[47,59; 52,76]	[51,07; 56,22]											
	davon wegen Tod	Anzahl	16	37	79	102	126	144	162	176	198											
		Anteil in %	1,11	2,57	5,48	7,08	8,74	9,99	11,24	12,21	13,74											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	153	240	327	387	429	459	488	512	538											
		Anteil in %	10,62	16,66	22,69	26,86	29,77	31,85	33,87	35,53	37,34											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6	12	16	19	21	23	29	31	31											
		Anteil in %	0,42	0,83	1,11	1,32	1,46	1,60	2,01	2,15	2,15											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1	1	4	4	4	4	6											
Anteil %		0,00	0,00	0,07	0,07	0,28	0,28	0,28	0,28	0,42												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1441	1266	1152	1018	932	861	811	758	718											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1266	1152	1018	932	861	811	758	718	668											

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	78	170	238	275	307	345	378	406											
		Anteil in %	9,44	20,58	28,81	33,29	37,17	41,77	45,76	49,15											
		CI Anteil in %	[7,45; 11,44]	[17,82; 23,34]	[25,72; 31,90]	[30,08; 36,51]	[33,87; 40,46]	[38,40; 45,13]	[42,36; 49,16]	[45,74; 52,56]											
	davon wegen Tod	Anzahl	1	25	45	59	72	83	94	107											
		Anteil in %	0,12	3,03	5,45	7,14	8,72	10,05	11,38	12,95											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	74	130	172	195	214	236	256	268											
		Anteil in %	8,96	15,74	20,82	23,61	25,91	28,57	30,99	32,45											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	11	16	16	16	19	21	21											
		Anteil in %	0,36	1,33	1,94	1,94	1,94	2,30	2,54	2,54											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	4	5	5	5	7	7	10											
Anteil %		0,00	0,48	0,61	0,61	0,61	0,85	0,85	1,21												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	826	748	656	588	551	519	481	448											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	748	656	588	551	519	481	448	420											
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	168	282	372	432	494	549	605												
		Anteil in %	13,27	22,27	29,38	34,12	39,02	43,36	47,79												
		CI Anteil in %	[11,40; 15,14]	[19,98; 24,57]	[26,87; 31,89]	[31,51; 36,74]	[36,33; 41,71]	[40,63; 46,10]	[45,04; 50,54]												
	davon wegen Tod	Anzahl	13	34	60	78	99	116	132												
		Anteil in %	1,03	2,69	4,74	6,16	7,82	9,16	10,43												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	152	237	298	338	375	409	446												
		Anteil in %	12,01	18,72	23,54	26,70	29,62	32,31	35,23												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	6	9	10	13	15	17												
		Anteil in %	0,16	0,47	0,71	0,79	1,03	1,18	1,34												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	5	5	6	7	9	10												
Anteil %		0,08	0,39	0,39	0,47	0,55	0,71	0,79													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1266	1098	984	894	834	772	717												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1098	984	894	834	772	717	661												
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	103	192	257	310	363	410													
		Anteil in %	10,84	20,21	27,05	32,63	38,21	43,16													
		CI Anteil in %	[8,86; 12,82]	[17,66; 22,77]	[24,23; 29,88]	[29,65; 35,61]	[35,12; 41,30]	[40,01; 46,31]													
	davon wegen Tod	Anzahl	7	22	39	53	73	88													
		Anteil in %	0,74	2,32	4,11	5,58	7,68	9,26													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	91	158	201	237	266	294													
		Anteil in %	9,58	16,63	21,16	24,95	28,00	30,95													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	10	14	16	19	21													
		Anteil in %	0,42	1,05	1,47	1,68	2,00	2,21													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	2	3	4	5	7													
Anteil %		0,11	0,21	0,32	0,42	0,53	0,74														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	950	847	758	693	640	587													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	847	758	693	640	587	540													
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	129	220	316	379	427														
		Anteil in %	12,23	20,85	29,95	35,92	40,47														
		CI Anteil in %	[10,25; 14,21]	[18,40; 23,31]	[27,19; 32,72]	[33,03; 38,82]	[37,51; 43,44]														
	davon wegen Tod	Anzahl	6	32	56	73	88														
		Anteil in %	0,57	3,03	5,31	6,92	8,34														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	118	179	246	290	322														
		Anteil in %	11,18	16,97	23,32	27,49	30,52														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	6	8	8	9														
		Anteil in %	0,38	0,57	0,76	0,76	0,85														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	3	6	8	8														
Anteil %		0,09	0,28	0,57	0,76	0,76															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1055	926	835	739	676														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	926	835	739	676	628														

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2010-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	111	227	296	363															
		Anteil in %	10,94	22,36	29,16	35,76															
		CI Anteil in %	[9,02; 12,86]	[19,80; 24,93]	[26,36; 31,96]	[32,81; 38,71]															
	davon wegen Tod	Anzahl	9	31	48	70															
		Anteil in %	0,89	3,05	4,73	6,90															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	100	189	240	280															
		Anteil in %	9,85	18,62	23,65	27,59															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	4	5	8															
		Anteil in %	0,20	0,39	0,49	0,79															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	3	3	5															
Anteil %		0,00	0,30	0,30	0,49																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1015	904	788	719															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	904	788	719	652															
2011-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	138	251	321																
		Anteil in %	13,21	24,02	30,72																
		CI Anteil in %	[11,15; 15,26]	[21,43; 26,61]	[27,92; 33,52]																
	davon wegen Tod	Anzahl	7	21	36																
		Anteil in %	0,67	2,01	3,44																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	129	222	275																
		Anteil in %	12,34	21,24	26,32																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	8	9																
		Anteil in %	0,19	0,77	0,86																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	0	1																
Anteil %		0,00	0,00	0,10																	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1045	907	794																
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	907	794	724																
2011-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	142	224																	
		Anteil in %	15,33	24,19																	
		CI Anteil in %	[13,01; 17,66]	[21,43; 26,95]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	7	18																	
		Anteil in %	0,76	1,94																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	129	195																	
		Anteil in %	13,93	21,06																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	8																	
		Anteil in %	0,43	0,86																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	3																	
Anteil %		0,22	0,32																		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	926	784																	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	784	702																	
2012-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	120																		
		Anteil in %	13,04																		
		CI Anteil in %	[10,87; 15,22]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	8																		
		Anteil in %	0,87																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	107																		
		Anteil in %	11,63																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	5																		
		Anteil in %	0,54																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0																		
Anteil %		0,00																			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	920																		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	800																		

In Tabelle C.1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1 des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten - - Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr - - Jahre, der Median lag bei - - Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	--
	CI Mean	--
	Median	--
	Fallbasis	--
2003-2	Mean	68,13
	CI Mean	[67,44; 68,81]
	Median	68,00
	Fallbasis	741
2004-1	Mean	68,52
	CI Mean	[68,07; 68,97]
	Median	69,00
	Fallbasis	1900
2004-2	Mean	67,91
	CI Mean	[67,55; 68,27]
	Median	68,00
	Fallbasis	3009
2005-1	Mean	67,10
	CI Mean	[66,67; 67,54]
	Median	67,00
	Fallbasis	2057
2005-2	Mean	68,10
	CI Mean	[67,72; 68,48]
	Median	69,00
	Fallbasis	2626
2006-1	Mean	68,65
	CI Mean	[68,24; 69,07]
	Median	69,00
	Fallbasis	2328
2006-2	Mean	67,70
	CI Mean	[67,23; 68,16]
	Median	68,00
	Fallbasis	1891
2007-1	Mean	68,43
	CI Mean	[67,96; 68,90]
	Median	69,00
	Fallbasis	2002
2007-2	Mean	68,78
	CI Mean	[68,26; 69,29]
	Median	69,00
	Fallbasis	1553

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	68,56
	CI Mean	[68,01; 69,11]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	1441
2008-2	Mean	68,00
	CI Mean	[67,27; 68,73]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	826
2009-1	Mean	66,82
	CI Mean	[66,22; 67,41]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	1266
2009-2	Mean	66,00
	CI Mean	[65,26; 66,75]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	950
2010-1	Mean	67,23
	CI Mean	[66,57; 67,89]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	1055
2010-2	Mean	66,96
	CI Mean	[66,27; 67,65]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	1015
2011-1	Mean	66,93
	CI Mean	[66,26; 67,59]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	1045
2011-2	Mean	65,93
	CI Mean	[65,18; 66,68]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	926
2012-1	Mean	67,09
	CI Mean	[66,34; 67,83]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	920

In Tabelle C.1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird

Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitrittsjahr - - Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	bis 50	--
	51 bis 60	--
	61 bis 70	--
	71 bis 80	--
	81 und älter	--
	<i>Patienten zusammen</i>	--
2003-2	bis 50	32
	51 bis 60	106
	61 bis 70	299
	71 bis 80	239
	81 und älter	65
	<i>Patienten zusammen</i>	741
2004-1	bis 50	81
	51 bis 60	278
	61 bis 70	707
	71 bis 80	633
	81 und älter	201
	<i>Patienten zusammen</i>	1900
2004-2	bis 50	161
	51 bis 60	486
	61 bis 70	1112
	71 bis 80	977
	81 und älter	273
	<i>Patienten zusammen</i>	3009
2005-1	bis 50	113
	51 bis 60	363
	61 bis 70	815
	71 bis 80	598
	81 und älter	168
	<i>Patienten zusammen</i>	2057
2005-2	bis 50	121
	51 bis 60	463
	61 bis 70	938
	71 bis 80	845
	81 und älter	259
	<i>Patienten zusammen</i>	2626
2006-1	bis 50	125
	51 bis 60	338
	61 bis 70	825
	71 bis 80	776
	81 und älter	264
	<i>Patienten zusammen</i>	2328
2006-2	bis 50	130
	51 bis 60	292
	61 bis 70	684
	71 bis 80	585
	81 und älter	200
	<i>Patienten zusammen</i>	1891



EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2007-1	bis 50	123
	51 bis 60	319
	61 bis 70	660
	71 bis 80	655
	81 und älter	245
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>2002</i>
2007-2	bis 50	83
	51 bis 60	247
	61 bis 70	509
	71 bis 80	510
	81 und älter	204
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1553</i>
2008-1	bis 50	86
	51 bis 60	246
	61 bis 70	435
	71 bis 80	491
	81 und älter	183
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1441</i>
2008-2	bis 50	49
	51 bis 60	174
	61 bis 70	241
	71 bis 80	259
	81 und älter	103
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>826</i>
2009-1	bis 50	103
	51 bis 60	232
	61 bis 70	443
	71 bis 80	365
	81 und älter	123
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1266</i>
2009-2	bis 50	103
	51 bis 60	201
	61 bis 70	287
	71 bis 80	264
	81 und älter	95
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>950</i>
2010-1	bis 50	78
	51 bis 60	201
	61 bis 70	320
	71 bis 80	345
	81 und älter	111
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1055</i>
2010-2	bis 50	92
	51 bis 60	187
	61 bis 70	305
	71 bis 80	328
	81 und älter	103
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1015</i>
2011-1	bis 50	97
	51 bis 60	184
	61 bis 70	319
	71 bis 80	345
	81 und älter	100
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1045</i>
2011-2	bis 50	114
	51 bis 60	168
	61 bis 70	268
	71 bis 80	290
	81 und älter	86
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>926</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2012-1	bis 50	77
	51 bis 60	188
	61 bis 70	243
	71 bis 80	304
	81 und älter	108
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>920</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle C.1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im jeweils betrachteten Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr -- Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei -- von Ihnen bzw. -- Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	741	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	163
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		64	14	9	5	6	0	9	8	10	12	4	2	4	5	4	4	3
		CI Anteil in %		[8,25; 13,23]	[1,35; 4,25]	[0,74; 3,46]	[0,17; 2,52]	[0,37; 3,21]	[0,00; 0,00]	[1,17; 5,40]	[0,97; 5,18]	[1,60; 6,56]	[2,28; 7,89]	[0,05; 3,49]	[0,00; 2,23]	[0,05; 3,85]	[0,33; 4,72]	[0,06; 4,24]	[0,07; 4,58]	[0,00; 3,91]
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		193	75	25	34	12	52	50	37	15	14	8	10	3	5	5	14	
		CI Anteil in %		[10,47; 13,66]	[4,58; 7,16]	[1,43; 3,24]	[2,39; 4,76]	[0,63; 2,25]	[5,08; 8,69]	[5,16; 8,93]	[3,76; 7,19]	[1,15; 3,47]	[1,08; 3,39]	[0,42; 2,30]	[0,69; 2,90]	[0,00; 1,21]	[0,13; 1,85]	[0,13; 1,95]	[1,49; 4,68]	
2004-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		212	78	52	57	69	63	45	34	33	28	23	25	14	19	13		
		CI Anteil in %		[7,47; 9,67]	[3,03; 4,72]	[2,24; 3,88]	[2,89; 4,87]	[4,05; 6,47]	[3,82; 6,25]	[2,72; 4,91]	[2,06; 4,10]	[2,12; 4,26]	[1,84; 3,95]	[1,52; 3,59]	[1,80; 4,06]	[0,83; 2,63]	[1,38; 3,58]	[0,82; 2,75]		
2005-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		75	69	33	56	57	51	35	29	25	26	12	20	11	18			
		CI Anteil in %		[3,37; 5,29]	[3,58; 5,72]	[1,70; 3,43]	[3,61; 6,09]	[3,96; 6,64]	[3,72; 6,44]	[2,46; 4,84]	[2,08; 4,41]	[1,83; 4,13]	[2,06; 4,57]	[0,71; 2,53]	[1,62; 4,07]	[0,69; 2,63]	[1,55; 4,14]			
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2626	2293	1953	1721	1604	1507	1407	1315	1218	1137	1054	995	935	870				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		151	102	99	101	77	63	52	31	36	26	29	31	27				
		CI Anteil in %		[5,57; 7,60]	[4,24; 6,21]	[4,65; 6,85]	[5,11; 7,49]	[4,00; 6,22]	[3,40; 5,56]	[2,90; 5,01]	[1,66; 3,43]	[2,15; 4,18]	[1,53; 3,40]	[1,87; 3,96]	[2,17; 4,46]	[1,95; 4,26]				
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2328	1992	1753	1596	1467	1357	1271	1177	1093	1037	966	905	847					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		70	139	106	96	47	37	37	28	28	24	29	31					
		CI Anteil in %		[2,71; 4,32]	[6,66; 9,19]	[5,42; 7,86]	[5,28; 7,81]	[2,49; 4,44]	[1,99; 3,84]	[2,15; 4,14]	[1,62; 3,50]	[1,71; 3,69]	[1,50; 3,47]	[2,06; 4,35]	[2,39; 4,93]					
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1891	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		91	98	77	65	39	38	44	31	38	35	36						
		CI Anteil in %		[4,35; 6,52]	[5,37; 7,91]	[4,54; 7,05]	[4,04; 6,55]	[2,38; 4,50]	[2,52; 4,81]	[3,18; 5,77]	[2,19; 4,50]	[3,00; 5,71]	[2,87; 5,62]	[3,16; 6,12]						
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2002	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		47	74	95	76	70	59	61	59	59	61							
		CI Anteil in %		[1,89; 3,37]	[3,56; 5,60]	[5,12; 7,60]	[4,38; 6,82]	[4,37; 6,95]	[3,91; 6,50]	[4,35; 7,16]	[4,48; 7,44]	[4,83; 8,00]	[5,45; 8,92]							
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1553	1419	1288	1173	1064	983	907	841	784	738								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		42	62	49	30	50	34	30	27	37								
		CI Anteil in %		[2,08; 3,84]	[3,64; 5,98]	[3,03; 5,32]	[1,82; 3,81]	[3,71; 6,46]	[2,51; 4,99]	[2,31; 4,82]	[2,17; 4,72]	[3,44; 6,59]								
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1441	1266	1152	1018	932	861	811	758	718									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		64	52	29	32	22	28	23	32									
		CI Anteil in %		[3,85; 6,26]	[3,31; 5,71]	[1,83; 3,87]	[2,26; 4,60]	[1,50; 3,61]	[2,20; 4,71]	[1,81; 4,26]	[2,95; 5,97]									
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	826	748	656	588	551	519	481	448										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		21	20	21	17	19	20	22										
		CI Anteil in %		[1,62; 3,99]	[1,73; 4,37]	[2,07; 5,07]	[1,64; 4,53]	[2,04; 5,28]	[2,37; 5,94]	[2,91; 6,91]										
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1266	1098	984	894	834	772	717											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		23	25	23	26	20	25											
		CI Anteil in %		[1,25; 2,94]	[1,56; 3,52]	[1,53; 3,61]	[1,94; 4,30]	[1,47; 3,71]	[2,14; 4,83]											

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	950	847	758	693	640	587															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		13	19	15	24	16															
		Anteil in %		1,53	2,51	2,16	3,75	2,73															
		CI Anteil in %		[0,71; 2,36]	[1,39; 3,62]	[1,08; 3,25]	[2,28; 5,22]	[1,41; 4,04]															
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1055	926	835	739	676																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		24	30	21	21																
		Anteil in %		2,59	3,59	2,84	3,11																
		CI Anteil in %		[1,57; 3,62]	[2,33; 4,86]	[1,64; 4,04]	[1,80; 4,42]																
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1015	904	788	719																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		11	7	25																	
		Anteil in %		1,22	0,89	3,48																	
		CI Anteil in %		[0,50; 1,93]	[0,23; 1,54]	[2,14; 4,82]																	
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1045	907	794																		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		11	20																		
		Anteil in %		1,21	2,52																		
		CI Anteil in %		[0,50; 1,93]	[1,43; 3,61]																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	926	784																			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		17																			
		Anteil in %		2,17																			
		CI Anteil in %		[1,15; 3,19]																			
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	920																				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					

### **Auswertungskapitel C.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung**

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

#### **Risikofaktoren**

- Raucherstatus
- Hypertonus

#### **Laborwerte**

- HbA1c-Werte

### C.3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu zwei Variablen dargestellt. Die Tabelle „Patienten und ihr Body-Mass-Index“ entfällt für die Auswertung nach Subkohorten. Das Kapitel C.3.1 beginnt daher mit der Tabelle C.3.1.2. Zunächst werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortalität ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle C.3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation - - Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch - - Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Raucher	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	83	61	52	43	36	30	27	19	17	15	15	12	12	12	11	11	--	--	
	auswertbar	Anzahl		49	52	42	36	30	27	16	14	13	12	12	12	11	11	9	--	--	
	Raucher	Anzahl		43	40	33	29	22	20	10	9	8	8	8	8	8	8	8	6	--	--
		Anteil in %		87,76	76,92	78,57	80,56	73,33	74,07	62,50	64,29	61,54	66,67	66,67	66,67	66,67	72,73	72,73	66,67	--	--
	CI Anteil in %		[78,48; 97,03]	[65,36; 88,49]	[66,01; 91,13]	[67,44; 93,67]	[57,24; 89,43]	[57,23; 90,92]	[38,00; 87,00]	[38,24; 90,33]	[34,01; 89,07]	[38,81; 94,52]	[38,81; 94,52]	[38,81; 94,52]	[38,81; 94,52]	[45,12; 100,00]	[45,12; 100,00]	[34,00; 99,33]	--	--	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	741	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	--	--	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	232	195	148	123	110	94	85	79	74	71	70	63	58	53	49	47	--	--	
	auswertbar	Anzahl		169	137	117	105	94	80	71	70	68	62	57	54	53	49	47	--	--	
	Raucher	Anzahl		143	94	86	68	57	43	41	37	37	29	32	29	28	26	23	22	--	--
		Anteil in %		84,62	68,61	73,50	64,76	60,64	53,75	57,75	52,86	52,86	42,65	51,61	50,88	51,85	49,06	46,94	46,81	--	--
	CI Anteil in %		[79,16; 90,07]	[60,81; 76,41]	[65,47; 81,54]	[55,58; 73,94]	[50,71; 70,57]	[42,76; 64,74]	[46,17; 69,32]	[41,08; 64,64]	[41,08; 64,64]	[30,80; 54,49]	[39,07; 64,15]	[37,78; 63,97]	[38,40; 65,30]	[35,47; 62,64]	[32,82; 61,06]	[32,39; 61,23]	--	--	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454	--	--	
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	435	326	253	217	183	161	155	140	129	124	119	113	107	104	97	91	--	--	
	auswertbar	Anzahl		297	244	208	175	152	143	133	123	121	117	110	107	101	95	90	--	--	
	Raucher	Anzahl		255	192	152	127	108	98	85	75	75	70	65	63	57	54	50	--	--	
		Anteil in %		85,86	78,69	73,08	72,57	71,05	68,53	63,91	60,98	61,98	59,83	59,09	58,88	56,44	56,84	55,56	--	--	
	CI Anteil in %		[81,89; 89,83]	[73,54; 83,84]	[67,03; 79,12]	[65,94; 79,20]	[63,82; 78,29]	[60,89; 76,17]	[55,72; 72,10]	[52,32; 69,63]	[53,30; 70,67]	[50,91; 68,75]	[49,86; 68,32]	[49,51; 68,25]	[46,72; 66,15]	[46,83; 66,85]	[45,23; 65,88]	--	--		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728	--	--		
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	322	266	218	186	163	149	140	127	116	110	106	99	95	90	86	--	--		
	auswertbar	Anzahl		252	210	178	154	146	131	121	114	109	104	97	90	88	82	--	--		
	Raucher	Anzahl		212	157	130	105	98	81	81	68	65	59	56	53	54	47	--	--		
		Anteil in %		84,13	74,76	73,03	68,18	67,12	61,83	66,94	59,65	59,63	56,73	57,73	58,89	61,36	57,32	--	--		
	CI Anteil in %		[79,61; 88,65]	[68,87; 80,65]	[66,50; 79,57]	[60,80; 75,56]	[59,48; 74,77]	[53,48; 70,18]	[58,53; 75,36]	[50,60; 68,69]	[50,38; 68,89]	[47,16; 66,30]	[47,85; 67,61]	[48,67; 69,11]	[51,13; 71,60]	[46,55; 68,09]	--	--			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633	--	--			
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	338	300	250	220	205	195	183	171	160	150	138	132	122	113	--	--			
	auswertbar	Anzahl		277	235	205	189	185	173	161	156	144	136	129	121	111	--	--			
	Raucher	Anzahl		237	182	138	129	122	99	94	90	81	80	73	65	61	--	--			
		Anteil in %		85,56	77,45	67,32	68,25	65,95	57,23	58,39	57,69	56,25	58,82	56,59	53,72	54,95	--	--			
	CI Anteil in %		[81,41; 89,71]	[72,09; 82,80]	[60,88; 73,75]	[61,60; 74,91]	[59,10; 72,79]	[49,83; 64,62]	[50,75; 66,02]	[49,91; 65,47]	[48,12; 64,38]	[50,52; 67,13]	[48,00; 65,18]	[44,80; 62,64]	[45,66; 64,25]	--	--				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	2626	2293	1953	1721	1604	1507	1407	1315	1218	1137	1054	995	935	870	--	--				
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	309	252	219	193	179	163	154	143	131	127	115	106	99	--	--				
	auswertbar	Anzahl		242	203	184	168	156	149	140	127	123	111	104	97	--	--				
	Raucher	Anzahl		209	155	134	121	119	101	90	86	79	72	69	65	--	--				
		Anteil in %		86,36	76,35	72,83	72,02	76,28	67,79	64,29	67,72	64,23	64,86	66,35	67,01	--	--				
	CI Anteil in %		[82,03; 90,70]	[70,50; 82,21]	[66,38; 79,27]	[65,22; 78,83]	[69,59; 82,98]	[60,26; 75,31]	[56,32; 72,25]	[59,55; 75,88]	[55,72; 72,73]	[55,94; 73,79]	[57,22; 75,47]	[57,60; 76,42]	--	--					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	2328	1992	1753	1596	1467	1357	1271	1177	1093	1037	966	905	847	--	--					
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	263	228	192	167	153	145	136	129	120	107	102	89	--	--					
	auswertbar	Anzahl		219	183	159	145	140	132	121	115	104	97	86	--	--					
	Raucher	Anzahl		191	148	120	102	100	93	87	79	72	64	56	--	--					
		Anteil in %		87,21	80,87	75,47	70,34	71,43	70,45	71,90	68,70	69,23	65,98	65,12	--	--					
	CI Anteil in %		[82,78; 91,65]	[75,16; 86,59]	[68,76; 82,18]	[62,88; 77,80]	[63,92; 78,94]	[62,64; 78,27]	[63,86; 79,94]	[60,18; 77,80]	[60,32; 78,14]	[56,50; 75,46]	[54,98; 75,25]	--	--						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	1891	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776	--	--						

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	263	235	211	198	175	158	147	137	129	121	110							
	auswertbar	Anzahl		228	202	182	166	150	135	127	120	113	103							
	Raucher	Anzahl		192	153	124	110	91	84	78	73	66	57							
		Anteil in %		84,21	75,74	68,13	66,27	60,67	62,22	61,42	60,83	58,41	55,34							
		CI Anteil in %		[79,47; 88,95]	[69,82; 81,67]	[61,34; 74,92]	[59,05; 73,48]	[52,82; 68,51]	[54,01; 70,43]	[52,92; 69,92]	[52,06; 69,60]	[49,28; 67,54]	[45,69; 64,99]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2002</i>	<i>1786</i>	<i>1617</i>	<i>1493</i>	<i>1357</i>	<i>1236</i>	<i>1133</i>	<i>1060</i>	<i>990</i>	<i>920</i>	<i>849</i>							
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	199	179	163	148	129	117	105	97	94	89								
	auswertbar	Anzahl		172	156	142	127	113	103	96	93	83								
	Raucher	Anzahl		146	120	104	92	83	74	65	62	51								
		Anteil in %		84,88	76,92	73,24	72,44	73,45	71,84	67,71	66,67	61,45								
		CI Anteil in %		[79,51; 90,25]	[70,29; 83,56]	[65,93; 80,55]	[64,64; 80,24]	[65,27; 81,63]	[63,12; 80,57]	[58,31; 77,11]	[57,03; 76,30]	[50,91; 71,98]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1553</i>	<i>1419</i>	<i>1288</i>	<i>1173</i>	<i>1064</i>	<i>983</i>	<i>907</i>	<i>841</i>	<i>784</i>	<i>738</i>								
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	215	177	156	137	124	111	105	95	86									
	auswertbar	Anzahl		172	148	135	121	111	102	93	83									
	Raucher	Anzahl		153	118	104	98	89	79	72	61									
		Anteil in %		88,95	79,73	77,04	80,99	80,18	77,45	77,42	73,49									
		CI Anteil in %		[84,26; 93,65]	[73,23; 86,23]	[69,92; 84,16]	[73,97; 88,01]	[72,73; 87,63]	[69,30; 85,60]	[68,88; 85,96]	[63,94; 83,05]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1441</i>	<i>1266</i>	<i>1152</i>	<i>1018</i>	<i>932</i>	<i>861</i>	<i>811</i>	<i>758</i>	<i>718</i>									
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	132	120	104	96	86	83	78	75										
	auswertbar	Anzahl		118	103	93	84	79	76	72										
	Raucher	Anzahl		109	90	82	72	66	64	61										
		Anteil in %		92,37	87,38	88,17	85,71	83,54	84,21	84,72										
		CI Anteil in %		[87,56; 97,18]	[80,93; 93,82]	[81,57; 94,77]	[78,19; 93,24]	[75,32; 91,77]	[75,96; 92,46]	[76,35; 93,09]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>826</i>	<i>748</i>	<i>656</i>	<i>588</i>	<i>551</i>	<i>519</i>	<i>481</i>	<i>448</i>										
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	166	141	119	108	100	91	87											
	auswertbar	Anzahl		141	116	105	98	90	85											
	Raucher	Anzahl		129	103	93	86	76	67											
		Anteil in %		91,49	88,79	88,57	87,76	84,44	78,82											
		CI Anteil in %		[86,87; 96,11]	[83,03; 94,56]	[82,46; 94,69]	[81,23; 94,28]	[76,91; 91,97]	[70,09; 87,56]											
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1266</i>	<i>1098</i>	<i>984</i>	<i>894</i>	<i>834</i>	<i>772</i>	<i>717</i>											
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	143	131	121	110	98	90												
	auswertbar	Anzahl		131	118	110	94	90												
	Raucher	Anzahl		123	103	92	76	67												
		Anteil in %		93,89	87,29	83,64	80,85	74,44												
		CI Anteil in %		[89,78; 98,01]	[81,25; 93,32]	[76,69; 90,58]	[72,85; 88,85]	[65,38; 83,51]												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>950</i>	<i>847</i>	<i>758</i>	<i>693</i>	<i>640</i>	<i>587</i>												
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	143	125	109	98	85													
	auswertbar	Anzahl		121	103	96	84													
	Raucher	Anzahl		111	93	85	69													
		Anteil in %		91,74	90,29	88,54	82,14													
		CI Anteil in %		[86,81; 96,66]	[84,55; 96,04]	[82,14; 94,95]	[73,90; 90,38]													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1055</i>	<i>926</i>	<i>835</i>	<i>739</i>	<i>676</i>													
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	134	116	104	95														
	auswertbar	Anzahl		114	103	92														
	Raucher	Anzahl		110	93	80														
		Anteil in %		96,49	90,29	86,96														
		CI Anteil in %		[93,10; 99,88]	[84,55; 96,04]	[80,04; 93,88]														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1015</i>	<i>904</i>	<i>788</i>	<i>719</i>														



EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	152	132	119																
	auswertbar	Anzahl		132	114																
	Raucher	Anzahl		127	103																
		Anteil in %		96,21	90,35																
		CI Anteil in %		[92,94; 99,48]	[84,91; 95,79]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1045</i>	<i>907</i>	<i>794</i>																	
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	149	123																	
	auswertbar	Anzahl		122																	
	Raucher	Anzahl		118																	
		Anteil in %		96,72																	
		CI Anteil in %		[93,55; 99,89]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>926</i>	<i>784</i>																		
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	139																		
	auswertbar	Anzahl																			
	Raucher	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>920</i>																			

In Tabelle C.3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts halbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren - - Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch - - Patienten eingeschrieben. Für - - dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren - - Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Raucher	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	741	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	163	
	auswertbar	Anzahl	741	532	486	419	367	329	303	265	252	235	224	222	212	201	193	182	168	160	
	Raucher	Anzahl	83	48	45	36	32	25	22	12	12	9	9	9	9	10	10	9	7	7	
		Anteil in %	11,20	9,02	9,26	8,59	8,72	7,60	7,26	4,53	4,76	3,83	4,02	4,05	4,25	4,98	5,18	4,95	4,17	4,38	
		CI Anteil in %	[8,93; 13,47]	[6,59; 11,46]	[6,68; 11,84]	[5,91; 11,28]	[5,83; 11,61]	[4,73; 10,47]	[4,33; 10,19]	[2,02; 7,04]	[2,13; 7,40]	[1,37; 6,29]	[1,44; 6,60]	[1,45; 6,65]	[1,52; 6,97]	[1,96; 7,99]	[2,05; 8,32]	[1,79; 8,10]	[1,14; 7,20]	[1,20; 7,55]	
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454		
	auswertbar	Anzahl	1900	1407	1203	1044	917	821	703	660	639	634	613	579	546	524	500	475	440		
	Raucher	Anzahl	232	162	111	109	86	73	56	55	53	56	50	52	48	46	42	40	35		
		Anteil in %	12,21	11,51	9,23	10,44	9,38	8,89	7,97	8,33	8,29	8,83	8,16	8,98	8,79	8,78	8,40	8,42	7,95		
		CI Anteil in %	[10,74; 13,68]	[9,85; 13,18]	[7,59; 10,86]	[8,58; 12,30]	[7,49; 11,27]	[6,94; 10,84]	[5,96; 9,97]	[6,22; 10,44]	[6,15; 10,43]	[6,62; 11,04]	[5,99; 10,33]	[6,65; 11,31]	[6,41; 11,17]	[6,35; 11,20]	[5,97; 10,83]	[5,92; 10,92]	[5,42; 10,49]		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728			
	auswertbar	Anzahl	3009	2262	1934	1645	1411	1242	1188	1134	1071	1003	940	877	828	795	748	715			
	Raucher	Anzahl	435	281	227	178	149	118	113	102	91	88	84	78	77	70	68	62			
		Anteil in %	14,46	12,42	11,74	10,82	10,56	9,50	9,51	8,99	8,50	8,77	8,94	8,89	9,30	8,81	9,09	8,67			
		CI Anteil in %	[13,20; 15,71]	[11,06; 13,78]	[10,30; 13,17]	[9,32; 12,32]	[8,96; 12,16]	[7,87; 11,13]	[7,84; 11,18]	[7,33; 10,66]	[6,83; 10,17]	[7,02; 10,53]	[7,11; 10,76]	[7,01; 10,78]	[7,32; 11,28]	[6,83; 10,78]	[7,03; 11,15]	[6,61; 10,74]			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633				
	auswertbar	Anzahl	2057	1656	1415	1253	1099	1018	953	923	865	815	758	728	683	652	615				
	Raucher	Anzahl	322	238	183	159	126	114	94	100	88	82	75	67	64	68	60				
		Anteil in %	15,65	14,37	12,93	12,69	11,46	11,20	9,86	10,83	10,17	10,06	9,89	9,20	9,37	10,43	9,76				
		CI Anteil in %	[14,08; 17,22]	[12,68; 16,06]	[11,18; 14,68]	[10,85; 14,53]	[9,58; 13,35]	[9,26; 13,14]	[7,97; 11,76]	[8,83; 12,84]	[8,16; 12,19]	[7,99; 12,13]	[7,77; 12,02]	[7,10; 11,30]	[7,18; 11,56]	[8,08; 12,78]	[7,41; 12,10]				
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2626	2293	1953	1721	1604	1507	1407	1315	1218	1137	1054	995	935	870					
	auswertbar	Anzahl	2626	2142	1851	1622	1503	1430	1344	1263	1187	1101	1028	966	904	843					
	Raucher	Anzahl	338	274	212	164	159	151	128	121	115	104	102	92	82	78					
		Anteil in %	12,87	12,79	11,45	10,11	10,58	10,56	9,52	9,58	9,69	9,45	9,92	9,52	9,07	9,25					
		CI Anteil in %	[11,59; 14,15]	[11,38; 14,21]	[10,00; 12,90]	[8,64; 11,58]	[9,02; 12,13]	[8,97; 12,15]	[7,95; 11,09]	[7,96; 11,20]	[8,00; 11,37]	[7,72; 11,17]	[8,09; 11,75]	[7,67; 11,38]	[7,20; 10,94]	[7,30; 11,21]					
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2328	1992	1753	1596	1467	1357	1271	1177	1093	1037	966	905	847						
	auswertbar	Anzahl	2328	1922	1614	1490	1371	1310	1234	1140	1065	1009	942	876	816						
	Raucher	Anzahl	309	249	183	158	142	152	133	122	113	102	93	89	84						
		Anteil in %	13,27	12,96	11,34	10,60	10,36	11,60	10,78	10,70	10,61	10,11	9,87	10,16	10,29						
		CI Anteil in %	[11,89; 14,65]	[11,45; 14,46]	[9,79; 12,89]	[9,04; 12,17]	[8,74; 11,97]	[9,87; 13,34]	[9,05; 12,51]	[8,91; 12,50]	[8,76; 12,46]	[8,25; 11,97]	[7,97; 11,78]	[8,16; 12,16]	[8,21; 12,38]						
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1891	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776							
	auswertbar	Anzahl	1891	1583	1378	1252	1163	1095	999	939	896	835	790	740							
	Raucher	Anzahl	263	214	175	144	127	124	116	110	100	90	84	71							
		Anteil in %	13,91	13,52	12,70	11,50	10,92	11,32	11,61	11,71	11,16	10,78	10,63	9,59							
		CI Anteil in %	[12,35; 15,47]	[11,83; 15,20]	[10,94; 14,46]	[9,73; 13,27]	[9,13; 12,71]	[9,45; 13,20]	[9,62; 13,60]	[9,66; 13,77]	[9,10; 13,22]	[8,67; 12,88]	[8,48; 12,78]	[7,47; 11,72]							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2002	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849								
	auswertbar	Anzahl	2002	1739	1543	1398	1281	1166	1074	999	931	861	788								
	Raucher	Anzahl	263	223	176	149	137	116	106	97	93	84	77								
		Anteil in %	13,14	12,82	11,41	10,66	10,69	9,95	9,87	9,71	9,99	9,76	9,77								
		CI Anteil in %	[11,66; 14,62]	[11,25; 14,40]	[9,82; 12,99]	[9,04; 12,28]	[9,00; 12,39]	[8,23; 11,67]	[8,09; 11,65]	[7,87; 11,55]	[8,06; 11,92]	[7,77; 11,74]	[7,70; 11,85]								

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1553	1419	1288	1173	1064	983	907	841	784	738								
	auswertbar	Anzahl	1553	1377	1226	1124	1034	933	873	811	757	701								
	Raucher	Anzahl	199	164	151	130	120	108	93	84	82	68								
		Anteil in %	12,81	11,91	12,32	11,57	11,61	11,58	10,65	10,36	10,83	9,70								
	CI Anteil in %	[11,15; 14,48]	[10,20; 13,62]	[10,48; 14,16]	[9,70; 13,44]	[9,65; 13,56]	[9,52; 13,63]	[8,61; 12,70]	[8,26; 12,46]	[8,62; 13,05]	[7,51; 11,89]									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1441	1266	1152	1018	932	861	811	758	718									
	auswertbar	Anzahl	1441	1202	1100	989	900	839	783	735	686									
	Raucher	Anzahl	215	187	144	128	121	106	96	89	76									
		Anteil in %	14,92	15,56	13,09	12,94	13,44	12,63	12,26	12,11	11,08									
	CI Anteil in %	[13,08; 16,76]	[13,51; 17,61]	[11,10; 15,09]	[10,85; 15,04]	[11,21; 15,67]	[10,38; 14,88]	[9,96; 14,56]	[9,75; 14,47]	[8,73; 13,43]										
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	826	748	656	588	551	519	481	448										
	auswertbar	Anzahl	826	727	636	567	534	500	461	426										
	Raucher	Anzahl	132	122	101	92	83	77	75	69										
		Anteil in %	15,98	16,78	15,88	16,23	15,54	15,40	16,27	16,20										
	CI Anteil in %	[13,48; 18,48]	[14,06; 19,50]	[13,04; 18,72]	[13,19; 19,26]	[12,47; 18,62]	[12,23; 18,57]	[12,90; 19,64]	[12,69; 19,70]											
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1266	1098	984	894	834	772	717											
	auswertbar	Anzahl	1266	1075	959	871	808	752	692											
	Raucher	Anzahl	166	140	115	110	100	91	78											
		Anteil in %	13,11	13,02	11,99	12,63	12,38	12,10	11,27											
	CI Anteil in %	[11,25; 14,97]	[11,01; 15,04]	[9,93; 14,05]	[10,42; 14,84]	[10,10; 14,65]	[9,77; 14,43]	[8,91; 13,63]												
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	950	847	758	693	640	587												
	auswertbar	Anzahl	950	834	739	678	616	571												
	Raucher	Anzahl	143	140	121	112	90	78												
		Anteil in %	15,05	16,79	16,37	16,52	14,61	13,66												
	CI Anteil in %	[12,78; 17,33]	[14,25; 19,32]	[13,70; 19,04]	[13,72; 19,32]	[11,82; 17,40]	[10,84; 16,48]													
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1055	926	835	739	676													
	auswertbar	Anzahl	1055	902	805	718	655													
	Raucher	Anzahl	143	126	109	102	88													
		Anteil in %	13,55	13,97	13,54	14,21	13,44													
	CI Anteil in %	[11,49; 15,62]	[11,71; 16,23]	[11,18; 15,91]	[11,65; 16,76]	[10,82; 16,05]														
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1015	904	788	719														
	auswertbar	Anzahl	1015	893	781	694														
	Raucher	Anzahl	134	122	107	92														
		Anteil in %	13,20	13,66	13,70	13,26														
	CI Anteil in %	[11,12; 15,29]	[11,41; 15,92]	[11,29; 16,11]	[10,73; 15,78]															
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1045	907	794															
	auswertbar	Anzahl	1045	896	774															
	Raucher	Anzahl	152	135	111															
		Anteil in %	14,55	15,07	14,34															
	CI Anteil in %	[12,41; 16,68]	[12,72; 17,41]	[11,87; 16,81]																
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	926	784																
	auswertbar	Anzahl	926	767																
	Raucher	Anzahl	149	130																
		Anteil in %	16,09	16,95																
	CI Anteil in %	[13,72; 18,46]	[14,29; 19,61]																	
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	920																	
	auswertbar	Anzahl	920																	
	Raucher	Anzahl	139																	
		Anteil in %	15,11																	
	CI Anteil in %	[12,79; 17,42]																		

In Tabelle C.3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

Ferner ist zu beachten, dass durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung eine Änderung in den Dokumentationsmöglichkeiten erfolgte. Bis einschließlich 2004-1 war bei der AHT ein „ja“ oder „nein“ zu dokumentieren. Ab 2004-2 war nur noch das Ankreuzen eines „ja“-Feldes möglich. Dadurch lässt sich in den Daten nicht mehr zwischen „nein“ und „fehlende Angabe“ unterscheiden. Um durchgehend eine einheitliche Rechenregel zu verwenden, sind daher in der Auswertung - unabhängig von den Dokumentationsmöglichkeiten - alle Fälle, in denen bei der AHT kein „ja“ dokumentiert ist, als „nein“ zu werten. In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den - - anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation - - Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch - - Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Patienten verbessern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne

Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende Anteilswert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei - - Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

\* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestuft Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc.

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	602	483	416	363	317	288	258	233	223	212	203	197	188	180	173	162	149	140
	auswertbar	Anzahl	602	437	379	337	299	273	244	211	204	192	194	193	186	176	168	158	146	138
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	185	172	141	151	141	136	139	111	112	104	103	102	103	97	93	88	79	71
		Anteil in %	30,73	39,36	37,20	44,81	47,16	49,82	56,97	52,61	54,90	54,17	53,09	52,85	55,38	55,11	55,36	55,70	54,11	51,45
		CI Anteil in %	[27,04; 34,42]	[34,77; 43,95]	[32,33; 42,08]	[39,49; 50,12]	[41,49; 52,82]	[43,87; 55,76]	[50,74; 63,19]	[45,85; 59,36]	[48,06; 61,75]	[47,10; 61,23]	[46,05; 60,13]	[45,79; 59,91]	[48,21; 62,54]	[47,74; 62,48]	[47,82; 62,90]	[47,93; 63,47]	[46,00; 62,22]	[43,08; 59,82]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	4	13	4	3	1	1	1	1	0	1	3	5	6	6	4	3	3	3
		Anteil in %	0,66	2,97	1,06	0,89	0,33	0,37	0,41	0,47	0,00	0,52	1,55	2,59	3,23	3,41	2,38	1,90	2,05	2,17
		CI Anteil in %	[0,01; 1,31]	[1,38; 4,57]	[0,03; 2,09]	[0,00; 1,89]	[0,00; 0,99]	[0,00; 1,08]	[0,00; 1,21]	[0,00; 1,40]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,54]	[0,00; 3,29]	[0,34; 4,84]	[0,68; 5,77]	[0,72; 6,10]	[0,07; 4,69]	[0,00; 4,03]	[0,00; 4,36]	[0,00; 4,62]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	181	159	137	148	140	135	138	110	112	103	100	97	97	91	89	85	76	68
		Anteil in %	30,07	36,38	36,15	43,92	46,82	49,45	56,56	52,13	54,90	53,65	51,55	50,26	52,15	51,70	52,98	53,80	52,05	49,28
		CI Anteil in %	[26,40; 33,73]	[31,87; 40,90]	[31,30; 40,99]	[38,61; 49,22]	[41,16; 52,49]	[43,51; 55,39]	[50,32; 62,79]	[45,38; 58,89]	[48,06; 61,75]	[46,57; 60,72]	[44,50; 58,60]	[43,19; 57,33]	[44,95; 59,35]	[44,30; 59,11]	[45,41; 60,55]	[46,00; 61,60]	[43,92; 60,19]	[40,90; 57,65]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	417	265	238	186	158	137	105	100	92	88	91	91	83	79	75	70	67	67
		Anteil in %	69,27	60,64	62,80	55,19	52,84	50,18	43,03	47,39	45,10	45,83	46,91	47,15	44,62	44,89	44,64	44,30	45,89	48,55
		CI Anteil in %	[65,58; 72,96]	[56,05; 65,23]	[57,92; 67,67]	[49,88; 60,51]	[47,18; 58,51]	[44,24; 56,13]	[36,81; 49,26]	[40,64; 54,15]	[38,25; 51,94]	[38,77; 52,90]	[39,87; 53,95]	[40,09; 54,21]	[37,46; 51,79]	[37,52; 52,26]	[37,10; 52,18]	[36,53; 52,07]	[37,78; 54,00]	[40,18; 56,92]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	16	15	1	0	1	1	2	1	2	1	6	3	2	1	1	1	1	2
		Anteil in %	2,66	3,43	0,26	0,00	0,33	0,37	0,82	0,47	0,98	0,52	3,09	1,55	1,08	0,57	0,60	0,63	0,68	1,45
		CI Anteil in %	[1,37; 3,94]	[1,72; 5,14]	[0,00; 0,78]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,99]	[0,00; 1,08]	[0,00; 1,95]	[0,00; 1,40]	[0,00; 2,34]	[0,00; 1,54]	[0,65; 5,54]	[0,00; 3,30]	[0,00; 2,56]	[0,00; 1,68]	[0,00; 1,76]	[0,00; 1,87]	[0,00; 2,03]	[0,00; 3,45]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	306	214	201	154	134	121	89	84	76	82	76	79	75	72	65	60	58	55
		Anteil in %	50,83	48,97	53,03	45,70	44,82	44,32	36,48	39,81	37,25	42,71	39,18	40,93	40,32	40,91	38,69	37,97	39,73	39,86
		CI Anteil in %	[46,83; 54,83]	[44,28; 53,66]	[48,00; 58,07]	[40,37; 51,02]	[39,17; 50,46]	[38,42; 50,23]	[30,42; 42,53]	[33,19; 46,43]	[30,60; 43,91]	[35,69; 49,72]	[32,29; 46,06]	[33,98; 47,89]	[33,25; 47,39]	[33,62; 48,19]	[31,30; 46,08]	[30,38; 45,57]	[31,76; 47,69]	[31,66; 48,05]
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
		Anteil in %	0,66	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,68	0,00
		CI Anteil in %	[0,01; 1,31]	[0,02; 1,81]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,53]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,76]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,03]	[0,00; 0,00]
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	91	32	36	32	23	15	14	15	14	5	8	9	6	6	8	9	7	10	
	Anteil in %	15,12	7,32	9,50	9,50	7,69	5,49	5,74	7,11	6,86	2,60	4,12	4,66	3,23	3,41	4,76	5,70	4,79	7,25	
	CI Anteil in %	[12,25; 17,98]	[4,88; 9,77]	[6,54; 12,45]	[6,36; 12,63]	[4,67; 10,72]	[2,79; 8,20]	[2,81; 8,66]	[3,63; 10,58]	[3,38; 10,34]	[0,35; 4,86]	[1,32; 6,93]	[1,68; 7,65]	[0,68; 5,77]	[0,72; 6,10]	[1,53; 7,99]	[2,07; 9,32]	[1,32; 8,27]	[2,91; 11,59]	
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>741</b>	<b>596</b>	<b>500</b>	<b>428</b>	<b>372</b>	<b>335</b>	<b>303</b>	<b>274</b>	<b>260</b>	<b>245</b>	<b>236</b>	<b>226</b>	<b>214</b>	<b>205</b>	<b>198</b>	<b>186</b>	<b>172</b>	<b>163</b>

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1504	1272	1015	859	767	673	613	571	540	522	506	481	452	431	412	390	369	
	auswertbar	Anzahl	1503	1018	872	773	679	621	528	495	478	509	495	473	445	429	408	385	357	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	480	406	350	347	308	291	240	250	241	250	257	251	233	232	226	204	189	
		Anteil in %	31,94	39,88	40,14	44,89	45,36	46,86	45,45	50,51	50,42	49,12	51,92	53,07	52,36	54,08	55,39	52,99	52,94	
		CI Anteil in %	[29,58; 34,29]	[36,87; 42,89]	[36,88; 43,39]	[41,38; 48,40]	[41,61; 49,11]	[42,93; 50,79]	[41,20; 49,71]	[46,10; 54,91]	[45,93; 54,91]	[44,77; 53,46]	[47,51; 56,33]	[48,56; 57,57]	[47,71; 57,01]	[49,36; 58,80]	[50,56; 60,22]	[47,99; 57,98]	[47,76; 58,13]	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	26	13	9	7	8	11	6	4	5	14	11	11	10	11	8	7	7	
		Anteil in %	1,73	1,28	1,03	0,91	1,18	1,77	1,14	0,81	1,05	2,75	2,22	2,33	2,25	2,56	1,96	1,82	1,96	
		CI Anteil in %	[1,07; 2,39]	[0,59; 1,97]	[0,36; 1,70]	[0,24; 1,57]	[0,37; 1,99]	[0,73; 2,81]	[0,23; 2,04]	[0,02; 1,60]	[0,13; 1,96]	[1,33; 4,17]	[0,92; 3,52]	[0,97; 3,69]	[0,87; 3,63]	[1,07; 4,06]	[0,61; 3,31]	[0,48; 3,15]	[0,52; 3,40]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	454	393	341	340	300	280	234	246	236	236	246	240	223	221	218	197	182	
		Anteil in %	30,21	38,61	39,11	43,98	44,18	45,09	44,32	49,70	49,37	46,37	49,70	50,74	50,11	51,52	53,43	51,17	50,98	
		CI Anteil in %	[27,88; 32,53]	[35,61; 41,60]	[35,86; 42,35]	[40,48; 47,49]	[40,44; 47,92]	[41,17; 49,01]	[40,08; 48,56]	[45,29; 54,11]	[44,89; 53,86]	[42,03; 50,70]	[45,29; 54,11]	[46,23; 55,25]	[45,46; 54,76]	[46,78; 56,25]	[48,59; 58,28]	[46,17; 56,17]	[45,79; 56,17]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1023	612	522	426	371	330	288	245	237	259	238	222	212	197	182	181	168	
		Anteil in %	68,06	60,12	59,86	55,11	54,64	53,14	54,55	49,49	49,58	50,88	48,08	46,93	47,64	45,92	44,61	47,01	47,06	
		CI Anteil in %	[65,71; 70,42]	[57,11; 63,13]	[56,61; 63,12]	[51,60; 58,62]	[50,89; 58,39]	[49,21; 57,07]	[50,29; 58,80]	[45,09; 53,90]	[45,09; 54,07]	[46,54; 55,23]	[43,67; 52,49]	[42,43; 51,44]	[42,99; 52,29]	[41,20; 50,64]	[39,78; 49,44]	[42,02; 52,01]	[41,87; 52,24]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	43	17	6	7	8	2	4	5	6	14	14	6	7	8	9	7	4	
		Anteil in %	2,86	1,67	0,69	0,91	1,18	0,32	0,76	1,01	1,26	2,75	2,83	1,27	1,57	1,86	2,21	1,82	1,12	
		CI Anteil in %	[2,02; 3,70]	[0,88; 2,46]	[0,14; 1,24]	[0,24; 1,57]	[0,37; 1,99]	[0,00; 0,77]	[0,02; 1,50]	[0,13; 1,89]	[0,26; 2,25]	[1,33; 4,17]	[1,37; 4,29]	[0,26; 2,28]	[0,42; 2,73]	[0,58; 3,15]	[0,78; 3,63]	[0,48; 3,15]	[0,03; 2,21]	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	741	471	417	357	304	267	235	196	187	209	183	188	174	151	140	142	139	
		Anteil in %	49,30	46,27	47,82	46,18	44,77	43,00	44,51	39,60	39,12	41,06	36,97	39,75	39,10	35,20	34,31	36,88	38,94	
		CI Anteil in %	[46,77; 51,83]	[43,20; 49,33]	[44,50; 51,14]	[42,67; 49,70]	[41,03; 48,51]	[39,10; 46,89]	[40,26; 48,75]	[35,28; 43,91]	[34,74; 43,50]	[36,78; 45,34]	[32,71; 41,23]	[35,33; 44,16]	[34,56; 43,64]	[30,67; 39,72]	[29,70; 38,93]	[32,06; 41,71]	[33,87; 44,00]	
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	11	4	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	
		Anteil in %	0,73	0,39	0,11	0,13	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,21	0,45	0,23	0,25	0,26	0,28	
		CI Anteil in %	[0,30; 1,16]	[0,01; 0,78]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,63]	[0,00; 1,07]	[0,00; 0,69]	[0,00; 0,73]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,83]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	228	120	98	61	59	59	49	44	44	35	41	27	29	37	32	31	24		
	Anteil in %	15,17	11,79	11,24	7,89	8,69	9,50	9,28	8,89	9,21	6,88	8,28	5,71	6,52	8,62	7,84	8,05	6,72		
	CI Anteil in %	[13,36; 16,98]	[9,81; 13,77]	[9,14; 13,34]	[5,99; 9,79]	[6,57; 10,81]	[7,19; 11,81]	[6,80; 11,76]	[6,38; 11,40]	[6,61; 11,80]	[4,68; 9,08]	[5,85; 10,71]	[3,62; 7,80]	[4,22; 8,81]	[5,97; 11,28]	[5,23; 10,46]	[5,33; 10,77]	[4,12; 9,32]		
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2452	2033	1664	1396	1209	1073	1027	971	912	859	804	743	702	661	623	590				
	auswertbar	Anzahl	2058	1645	1433	1233	1056	944	916	872	886	836	781	726	680	650	609	579				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	680	666	595	546	464	444	419	463	398	398	404	376	337	326	310	306				
		Anteil in %	33,04	40,49	41,52	44,28	43,94	47,03	45,74	53,10	44,92	47,61	51,73	51,79	49,56	50,15	50,90	52,85				
		CI Anteil in %	[31,01; 35,07]	[38,11; 42,86]	[38,97; 44,07]	[41,51; 47,06]	[40,94; 46,93]	[43,85; 50,22]	[42,51; 48,97]	[49,78; 56,41]	[41,64; 48,20]	[44,22; 51,00]	[48,22; 55,24]	[48,15; 55,43]	[45,80; 53,32]	[46,31; 54,00]	[46,93; 54,88]	[48,78; 56,92]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	15	21	13	12	10	8	11	16	30	20	17	19	18	18	16	15				
		Anteil in %	0,73	1,28	0,91	0,97	0,95	0,85	1,20	1,83	3,39	2,39	2,18	2,62	2,65	2,77	2,63	2,59				
		CI Anteil in %	[0,36; 1,10]	[0,73; 1,82]	[0,42; 1,40]	[0,43; 1,52]	[0,36; 1,53]	[0,26; 1,43]	[0,50; 1,91]	[0,94; 2,73]	[2,19; 4,58]	[1,36; 3,43]	[1,15; 3,20]	[1,45; 3,78]	[1,44; 3,85]	[1,51; 4,03]	[1,36; 3,90]	[1,30; 3,89]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	665	645	582	534	454	436	408	447	368	378	387	357	319	308	294	291				
		Anteil in %	32,31	39,21	40,61	43,31	42,99	46,19	44,54	51,26	41,53	45,22	49,55	49,17	46,91	47,38	48,28	50,26				
		CI Anteil in %	[30,29; 34,33]	[36,85; 41,57]	[38,07; 43,16]	[40,54; 46,08]	[40,01; 45,98]	[43,00; 49,37]	[41,32; 47,76]	[47,94; 54,58]	[38,29; 44,78]	[41,84; 48,59]	[46,04; 53,06]	[45,53; 52,81]	[43,16; 50,67]	[43,54; 51,23]	[44,30; 52,25]	[46,18; 54,34]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1378	979	838	687	592	500	497	409	488	438	377	350	343	324	299	273				
		Anteil in %	66,96	59,51	58,48	55,72	56,06	52,97	54,26	46,90	55,08	52,39	48,27	48,21	50,44	49,85	49,10	47,15				
		CI Anteil in %	[64,93; 68,99]	[57,14; 61,89]	[55,93; 61,03]	[52,94; 58,49]	[53,07; 59,06]	[49,78; 56,15]	[51,03; 57,49]	[43,59; 50,22]	[51,80; 58,36]	[49,00; 55,78]	[44,76; 51,78]	[44,57; 51,85]	[46,68; 54,20]	[46,00; 53,69]	[45,12; 53,07]	[43,08; 51,22]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	39	24	22	20	6	6	6	6	22	23	18	12	13	8	10	8				
		Anteil in %	1,90	1,46	1,54	1,62	0,57	0,64	0,66	0,69	2,48	2,75	2,30	1,65	1,91	1,23	1,64	1,38				
		CI Anteil in %	[1,31; 2,48]	[0,88; 2,04]	[0,90; 2,17]	[0,92; 2,33]	[0,11; 1,02]	[0,13; 1,14]	[0,13; 1,18]	[0,14; 1,24]	[1,46; 3,51]	[1,64; 3,86]	[1,25; 3,36]	[0,72; 2,58]	[0,88; 2,94]	[0,38; 2,08]	[0,63; 2,65]	[0,43; 2,33]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1039	770	662	562	487	429	409	343	410	350	300	301	280	274	255	227				
		Anteil in %	50,49	46,81	46,20	45,58	46,12	45,44	44,65	39,33	46,28	41,87	38,41	41,46	41,18	42,15	41,87	39,21				
		CI Anteil in %	[48,33; 52,65]	[44,40; 49,22]	[43,61; 48,78]	[42,80; 48,36]	[43,11; 49,13]	[42,27; 48,62]	[41,43; 47,87]	[36,09; 42,58]	[42,99; 49,56]	[38,52; 45,21]	[35,00; 41,83]	[37,87; 45,05]	[37,47; 44,88]	[38,35; 45,95]	[37,95; 45,79]	[35,23; 43,19]				
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	13	2	0	1	3	0	1	1	0	3	1	2	0	0	0	3				
		Anteil in %	0,63	0,12	0,00	0,08	0,28	0,00	0,11	0,11	0,00	0,36	0,13	0,28	0,00	0,00	0,00	0,52				
		CI Anteil in %	[0,29; 0,97]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,24]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,76]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,66]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,10]				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	287	183	154	104	96	65	81	59	56	62	58	35	50	42	34	35					
	Anteil in %	13,95	11,12	10,75	8,43	9,09	6,89	8,84	6,77	6,32	7,42	7,43	4,82	7,35	6,46	5,58	6,04					
	CI Anteil in %	[12,45; 15,44]	[9,60; 12,64]	[9,14; 12,35]	[6,88; 9,99]	[7,36; 10,83]	[5,27; 8,50]	[7,00; 10,68]	[5,10; 8,43]	[4,72; 7,92]	[5,64; 9,19]	[5,59; 9,27]	[3,26; 6,38]	[5,39; 9,32]	[4,57; 8,35]	[3,76; 7,41]	[4,10; 7,99]					
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728				



EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1675	1413	1212	1051	941	876	822	785	731	686	639	608	578	551	524				
	auswertbar	Anzahl	1421	1208	1033	930	812	760	719	757	706	662	619	597	562	542	508				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	489	505	449	404	343	355	352	356	327	333	306	294	289	250	254				
		Anteil in %	34,41	41,80	43,47	43,44	42,24	46,71	48,96	47,03	46,32	50,30	49,43	49,25	51,42	46,13	50,00				
		CI Anteil in %	[31,94; 36,88]	[39,02; 44,59]	[40,44; 46,49]	[40,25; 46,63]	[38,84; 45,64]	[43,16; 50,26]	[45,30; 52,61]	[43,47; 50,59]	[42,64; 50,00]	[46,49; 54,11]	[45,49; 53,38]	[45,23; 53,26]	[47,29; 55,56]	[41,92; 50,33]	[45,65; 54,35]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	15	30	18	12	13	16	15	36	27	29	28	27	23	19	24				
		Anteil in %	1,06	2,48	1,74	1,29	1,60	2,11	2,09	4,76	3,82	4,38	4,52	4,52	4,09	3,51	4,72				
		CI Anteil in %	[0,52; 1,59]	[1,61; 3,36]	[0,94; 2,54]	[0,56; 2,02]	[0,74; 2,46]	[1,08; 3,13]	[1,04; 3,13]	[3,24; 6,27]	[2,41; 5,24]	[2,82; 5,94]	[2,88; 6,16]	[2,85; 6,19]	[2,45; 5,73]	[1,96; 5,06]	[2,88; 6,57]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	474	475	431	392	330	339	337	320	300	304	278	267	266	231	230				
		Anteil in %	33,36	39,32	41,72	42,15	40,64	44,61	46,87	42,27	42,49	45,92	44,91	44,72	47,33	42,62	45,28				
		CI Anteil in %	[30,90; 35,81]	[36,57; 42,08]	[38,71; 44,73]	[38,98; 45,33]	[37,26; 44,02]	[41,07; 48,14]	[43,22; 50,52]	[38,75; 45,79]	[38,84; 46,14]	[42,12; 49,72]	[40,99; 48,83]	[40,73; 48,72]	[43,20; 51,46]	[38,45; 46,79]	[40,94; 49,61]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	932	703	584	526	469	405	367	401	379	329	313	303	273	292	254				
		Anteil in %	65,59	58,20	56,53	56,56	57,76	53,29	51,04	52,97	53,68	49,70	50,57	50,75	48,58	53,87	50,00				
		CI Anteil in %	[63,12; 68,06]	[55,41; 60,98]	[53,51; 59,56]	[53,37; 59,75]	[54,36; 61,16]	[49,74; 56,84]	[47,39; 54,70]	[49,41; 56,53]	[50,00; 57,36]	[45,89; 53,51]	[46,62; 54,51]	[46,74; 54,77]	[44,44; 52,71]	[49,67; 58,08]	[45,65; 54,35]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	31	14	15	16	15	9	12	19	22	18	13	12	15	14	12				
		Anteil in %	2,18	1,16	1,45	1,72	1,85	1,18	1,67	2,51	3,12	2,72	2,10	2,01	2,67	2,58	2,36				
		CI Anteil in %	[1,42; 2,94]	[0,56; 1,76]	[0,72; 2,18]	[0,88; 2,56]	[0,92; 2,77]	[0,41; 1,95]	[0,73; 2,61]	[1,39; 3,62]	[1,83; 4,40]	[1,48; 3,96]	[0,97; 3,23]	[0,88; 3,14]	[1,34; 4,00]	[1,25; 3,92]	[1,04; 3,68]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	704	560	479	433	381	327	301	322	302	262	252	229	220	230	197				
		Anteil in %	49,54	46,36	46,37	46,56	46,92	43,03	41,86	42,54	42,78	39,58	40,71	38,36	39,15	42,44	38,78				
		CI Anteil in %	[46,94; 52,14]	[43,54; 49,17]	[43,33; 49,41]	[43,35; 49,77]	[43,49; 50,36]	[39,50; 46,55]	[38,26; 45,47]	[39,01; 46,06]	[39,12; 46,43]	[35,85; 43,31]	[36,84; 44,58]	[34,45; 42,26]	[35,11; 43,18]	[38,27; 46,60]	[34,54; 43,02]				
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	1	0	4	2	0	1	2	3	2	3	2	3	5	2				
		Anteil in %	0,14	0,08	0,00	0,43	0,25	0,00	0,14	0,26	0,42	0,30	0,48	0,34	0,53	0,92	0,39				
		CI Anteil in %	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,00]	[0,01; 0,85]	[0,00; 0,59]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,41]	[0,00; 0,63]	[0,00; 0,91]	[0,00; 0,72]	[0,00; 1,03]	[0,00; 0,80]	[0,00; 1,14]	[0,12; 1,73]	[0,00; 0,94]				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	195	128	90	73	71	69	53	58	52	47	45	60	35	43	43					
	Anteil in %	13,72	10,60	8,71	7,85	8,74	9,08	7,37	7,66	7,37	7,10	7,27	10,05	6,23	7,93	8,46					
	CI Anteil in %	[11,93; 15,51]	[8,86; 12,33]	[6,99; 10,43]	[6,12; 9,58]	[6,80; 10,69]	[7,03; 11,12]	[5,46; 9,28]	[5,77; 9,56]	[5,44; 9,29]	[5,14; 9,06]	[5,22; 9,32]	[7,64; 12,46]	[4,23; 8,23]	[5,66; 10,21]	[6,04; 10,89]					
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2163	1887	1601	1411	1304	1220	1141	1068	996	921	855	807	755	704						
	auswertbar	Anzahl	1871	1589	1403	1222	1128	1054	1093	1026	972	892	834	784	731	682						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	702	654	599	546	501	504	494	500	466	455	428	400	372	370						
		Anteil in %	37,52	41,16	42,69	44,68	44,41	47,82	45,20	48,73	47,94	51,01	51,32	51,02	50,89	54,25						
		CI Anteil in %	[35,33; 39,71]	[38,74; 43,58]	[40,11; 45,28]	[41,89; 47,47]	[41,51; 47,32]	[44,80; 50,83]	[42,24; 48,15]	[45,67; 51,79]	[44,80; 51,08]	[47,73; 54,29]	[47,92; 54,71]	[47,52; 54,52]	[47,26; 54,52]	[50,51; 57,99]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	20	18	17	13	12	11	43	40	40	33	28	20	22	20						
		Anteil in %	1,07	1,13	1,21	1,06	1,06	1,04	3,93	3,90	4,12	3,70	3,36	2,55	3,01	2,93						
		CI Anteil in %	[0,60; 1,54]	[0,61; 1,65]	[0,64; 1,78]	[0,49; 1,64]	[0,46; 1,66]	[0,43; 1,66]	[2,78; 5,09]	[2,71; 5,08]	[2,87; 5,36]	[2,46; 4,94]	[2,13; 4,58]	[1,45; 3,66]	[1,77; 4,25]	[1,67; 4,20]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	682	636	582	533	489	493	451	460	426	422	400	380	350	350						
		Anteil in %	36,45	40,03	41,48	43,62	43,35	46,77	41,26	44,83	43,83	47,31	47,96	48,47	47,88	51,32						
		CI Anteil in %	[34,27; 38,63]	[37,62; 42,43]	[38,90; 44,06]	[40,84; 46,40]	[40,46; 46,24]	[43,76; 49,79]	[38,34; 44,18]	[41,79; 47,88]	[40,71; 46,95]	[44,03; 50,59]	[44,57; 51,35]	[44,97; 51,97]	[44,26; 51,50]	[47,57; 55,07]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1169	935	804	676	627	550	599	526	506	437	406	384	359	312						
		Anteil in %	62,48	58,84	57,31	55,32	55,59	52,18	54,80	51,27	52,06	48,99	48,68	48,98	49,11	45,75						
		CI Anteil in %	[60,29; 64,67]	[56,42; 61,26]	[54,72; 59,89]	[52,53; 58,11]	[52,68; 58,49]	[49,17; 55,20]	[51,85; 57,76]	[48,21; 54,33]	[48,92; 55,20]	[45,71; 52,27]	[45,29; 52,08]	[45,48; 52,48]	[45,48; 52,74]	[42,01; 49,49]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	25	21	15	13	12	7	39	30	22	25	24	25	17	11						
		Anteil in %	1,34	1,32	1,07	1,06	1,06	0,66	3,57	2,92	2,26	2,80	2,88	3,19	2,33	1,61						
		CI Anteil in %	[0,82; 1,86]	[0,76; 1,88]	[0,53; 1,61]	[0,49; 1,64]	[0,46; 1,66]	[0,17; 1,15]	[2,47; 4,67]	[1,89; 3,96]	[1,33; 3,20]	[1,72; 3,89]	[1,74; 4,01]	[1,96; 4,42]	[1,23; 3,42]	[0,67; 2,56]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	923	775	676	568	514	467	475	410	413	344	322	300	296	250						
		Anteil in %	49,33	48,77	48,18	46,48	45,57	44,31	43,46	39,96	42,49	38,57	38,61	38,27	40,49	36,66						
		CI Anteil in %	[47,07; 51,60]	[46,31; 51,23]	[45,57; 50,80]	[43,68; 49,28]	[42,66; 48,48]	[41,31; 47,31]	[40,52; 46,40]	[36,96; 42,96]	[39,38; 45,60]	[35,37; 41,76]	[35,30; 41,92]	[34,86; 41,67]	[36,93; 44,05]	[33,04; 40,28]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5	1	2	3	1	3	6	3	2	1	1	1	1	3						
		Anteil in %	0,27	0,06	0,14	0,25	0,09	0,28	0,55	0,29	0,21	0,11	0,12	0,13	0,14	0,44						
		CI Anteil in %	[0,03; 0,50]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,61]	[0,11; 0,99]	[0,00; 0,62]	[0,00; 0,49]	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,94]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	216	138	111	92	100	73	79	83	69	67	59	58	45	48							
	Anteil in %	11,54	8,68	7,91	7,53	8,87	6,93	7,23	8,09	7,10	7,51	7,07	7,40	6,16	7,04							
	CI Anteil in %	[10,10; 12,99]	[7,30; 10,07]	[6,50; 9,32]	[6,05; 9,01]	[7,21; 10,52]	[5,39; 8,46]	[5,69; 8,76]	[6,42; 9,76]	[5,48; 8,71]	[5,78; 9,24]	[5,33; 8,82]	[5,56; 9,23]	[4,41; 7,90]	[5,12; 8,96]							
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>2626</b>	<b>2293</b>	<b>1953</b>	<b>1721</b>	<b>1604</b>	<b>1507</b>	<b>1407</b>	<b>1315</b>	<b>1218</b>	<b>1137</b>	<b>1054</b>	<b>995</b>	<b>935</b>	<b>870</b>						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1937	1664	1473	1343	1242	1153	1074	998	929	878	816	765	714										
	auswertbar	Anzahl	1704	1467	1224	1156	1080	1107	1040	963	904	853	795	740	689										
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	594	592	532	515	511	496	507	450	438	423	376	391	368										
		Anteil in %	34,86	40,35	43,46	44,55	47,31	44,81	48,75	46,73	48,45	49,59	47,30	52,84	53,41										
		CI Anteil in %	[32,60; 37,12]	[37,84; 42,87]	[40,69; 46,24]	[41,68; 47,42]	[44,34; 50,29]	[41,87; 47,74]	[45,71; 51,79]	[43,58; 49,88]	[45,19; 51,71]	[46,23; 52,95]	[43,82; 50,77]	[49,24; 56,44]	[49,68; 57,14]										
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	20	16	15	20	16	43	38	27	23	20	28	21	24										
		Anteil in %	1,17	1,09	1,23	1,73	1,48	3,88	3,65	2,80	2,54	2,34	3,52	2,84	3,48										
		CI Anteil in %	[0,66; 1,69]	[0,56; 1,62]	[0,61; 1,84]	[0,98; 2,48]	[0,76; 2,20]	[2,75; 5,02]	[2,51; 4,79]	[1,76; 3,85]	[1,52; 3,57]	[1,33; 3,36]	[2,24; 4,80]	[1,64; 4,04]	[2,11; 4,85]										
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	574	576	517	495	495	453	469	423	415	403	348	370	344										
		Anteil in %	33,69	39,26	42,24	42,82	45,83	40,92	45,10	43,93	45,91	47,25	43,77	50,00	49,93										
		CI Anteil in %	[31,44; 35,93]	[36,76; 41,76]	[39,47; 45,01]	[39,97; 45,67]	[42,86; 48,81]	[38,02; 43,82]	[42,07; 48,12]	[40,79; 47,06]	[42,66; 49,16]	[43,89; 50,60]	[40,32; 47,22]	[46,40; 53,60]	[46,19; 53,66]										
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1110	875	692	641	569	611	533	513	466	430	419	349	321										
		Anteil in %	65,14	59,65	56,54	55,45	52,69	55,19	51,25	53,27	51,55	50,41	52,70	47,16	46,59										
		CI Anteil in %	[62,88; 67,40]	[57,13; 62,16]	[53,76; 59,31]	[52,58; 58,32]	[49,71; 55,66]	[52,26; 58,13]	[48,21; 54,29]	[50,12; 56,42]	[48,29; 54,81]	[47,05; 53,77]	[49,23; 56,18]	[43,56; 50,76]	[42,86; 50,32]										
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	23	20	16	17	16	35	26	25	23	21	10	15	16										
		Anteil in %	1,35	1,36	1,31	1,47	1,48	3,16	2,50	2,60	2,54	2,46	1,26	2,03	2,32										
		CI Anteil in %	[0,80; 1,90]	[0,77; 1,96]	[0,67; 1,94]	[0,78; 2,16]	[0,76; 2,20]	[2,13; 4,19]	[1,55; 3,45]	[1,59; 3,60]	[1,52; 3,57]	[1,42; 3,50]	[0,48; 2,03]	[1,01; 3,04]	[1,20; 3,45]										
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	879	699	556	526	468	468	408	414	375	333	344	280	256										
		Anteil in %	51,58	47,65	45,42	45,50	43,33	42,28	39,23	42,99	41,48	39,04	43,27	37,84	37,16										
		CI Anteil in %	[49,21; 53,96]	[45,09; 50,20]	[42,63; 48,22]	[42,63; 48,37]	[40,38; 46,29]	[39,37; 45,19]	[36,26; 42,20]	[39,86; 46,12]	[38,27; 44,70]	[35,76; 42,31]	[39,82; 46,72]	[34,34; 41,33]	[33,54; 40,77]										
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	9	3	6	1	2	7	4	4	4	4	4	4	5										
		Anteil in %	0,53	0,20	0,49	0,09	0,19	0,63	0,38	0,42	0,44	0,47	0,50	0,54	0,73										
		CI Anteil in %	[0,18; 0,87]	[0,00; 0,44]	[0,10; 0,88]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,44]	[0,17; 1,10]	[0,01; 0,76]	[0,01; 0,82]	[0,01; 0,88]	[0,01; 0,93]	[0,01; 1,00]	[0,01; 1,07]	[0,09; 1,36]										
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	199	153	114	97	83	101	95	70	64	72	61	50	44											
	Anteil in %	11,68	10,43	9,31	8,39	7,69	9,12	9,13	7,27	7,08	8,44	7,67	6,76	6,39											
	CI Anteil in %	[10,15; 13,20]	[8,86; 11,99]	[7,68; 10,94]	[6,79; 9,99]	[6,10; 9,27]	[7,43; 10,82]	[7,38; 10,89]	[5,63; 8,91]	[5,41; 8,75]	[6,57; 10,31]	[5,82; 9,52]	[4,95; 8,57]	[4,56; 8,21]											
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>2328</b>	<b>1992</b>	<b>1753</b>	<b>1596</b>	<b>1467</b>	<b>1357</b>	<b>1271</b>	<b>1177</b>	<b>1093</b>	<b>1037</b>	<b>966</b>	<b>905</b>	<b>847</b>										

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1558	1385	1228	1107	1027	952	868	825	776	731	697	653							
	auswertbar	Anzahl	1354	1190	1048	957	976	918	837	785	750	703	666	625							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	560	544	482	476	462	472	387	391	347	356	317	299							
		Anteil in %	41,36	45,71	45,99	49,74	47,34	51,42	46,24	49,81	46,27	50,64	47,60	47,84							
		CI Anteil in %	[38,73; 43,98]	[42,88; 48,55]	[42,97; 49,01]	[46,57; 52,91]	[44,20; 50,47]	[48,18; 54,65]	[42,86; 49,62]	[46,31; 53,31]	[42,70; 49,84]	[46,94; 54,34]	[43,80; 51,39]	[43,92; 51,76]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	18	17	11	18	43	35	30	24	23	22	17	22							
		Anteil in %	1,33	1,43	1,05	1,88	4,41	3,81	3,58	3,06	3,07	3,13	2,55	3,52							
		CI Anteil in %	[0,72; 1,94]	[0,75; 2,10]	[0,43; 1,67]	[1,02; 2,74]	[3,12; 5,69]	[2,57; 5,05]	[2,32; 4,84]	[1,85; 4,26]	[1,83; 4,30]	[1,84; 4,42]	[1,35; 3,75]	[2,07; 4,97]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	542	527	471	458	419	437	357	367	324	334	300	277							
		Anteil in %	40,03	44,29	44,94	47,86	42,93	47,60	42,65	46,75	43,20	47,51	45,05	44,32							
		CI Anteil in %	[37,42; 42,64]	[41,46; 47,11]	[41,93; 47,96]	[44,69; 51,02]	[39,82; 46,04]	[44,37; 50,84]	[39,30; 46,00]	[43,26; 50,24]	[39,65; 46,75]	[43,82; 51,20]	[41,26; 48,83]	[40,42; 48,22]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	794	646	566	481	514	446	450	394	403	347	349	326							
		Anteil in %	58,64	54,29	54,01	50,26	52,66	48,58	53,76	50,19	53,73	49,36	52,40	52,16							
		CI Anteil in %	[56,02; 61,27]	[51,45; 57,12]	[50,99; 57,03]	[47,09; 53,43]	[49,53; 55,80]	[45,35; 51,82]	[50,38; 57,14]	[46,69; 53,69]	[50,16; 57,30]	[45,66; 53,06]	[48,61; 56,20]	[48,24; 56,08]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	11	8	8	5	23	23	24	25	18	21	23	14							
		Anteil in %	0,81	0,67	0,76	0,52	2,36	2,51	2,87	3,18	2,40	2,99	3,45	2,24							
		CI Anteil in %	[0,33; 1,29]	[0,21; 1,14]	[0,24; 1,29]	[0,07; 0,98]	[1,40; 3,31]	[1,49; 3,52]	[1,74; 4,00]	[1,96; 4,41]	[1,30; 3,50]	[1,73; 4,25]	[2,07; 4,84]	[1,08; 3,40]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	639	555	473	408	418	365	376	305	332	284	279	271							
		Anteil in %	47,19	46,64	45,13	42,63	42,83	39,76	44,92	38,85	44,27	40,40	41,89	43,36							
		CI Anteil in %	[44,53; 49,85]	[43,80; 49,47]	[42,12; 48,15]	[39,50; 45,77]	[39,72; 45,93]	[36,59; 42,93]	[41,55; 48,29]	[35,44; 42,27]	[40,71; 47,82]	[36,77; 44,03]	[38,14; 45,64]	[39,47; 47,25]							
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4	3	3	2	3	2	2	2	1	2	1	0								
	Anteil in %	0,30	0,25	0,29	0,21	0,31	0,22	0,24	0,25	0,13	0,28	0,15	0,00								
	CI Anteil in %	[0,01; 0,58]	[0,00; 0,54]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,50]	[0,00; 0,65]	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,39]	[0,00; 0,68]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,00]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	140	80	82	66	70	56	48	62	52	40	46	41								
	Anteil in %	10,34	6,72	7,82	6,90	7,17	6,10	5,73	7,90	6,93	5,69	6,91	6,56								
	CI Anteil in %	[8,72; 11,96]	[5,30; 8,15]	[6,20; 9,45]	[5,29; 8,50]	[5,55; 8,79]	[4,55; 7,65]	[4,16; 7,31]	[6,01; 9,79]	[5,11; 8,75]	[3,98; 7,40]	[4,98; 8,83]	[4,62; 8,50]								
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1891	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1675	1508	1369	1266	1151	1044	953	891	828	771	708							
	auswertbar	Anzahl	1489	1362	1205	1192	1087	985	905	840	783	722	658							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	598	632	602	575	557	482	457	434	423	380	342							
		Anteil in %	40,16	46,40	49,96	48,24	51,24	48,93	50,50	51,67	54,02	52,63	51,98							
		CI Anteil in %	[37,67; 42,65]	[43,75; 49,05]	[47,13; 52,78]	[45,40; 51,08]	[48,27; 54,21]	[45,81; 52,06]	[47,24; 53,76]	[48,29; 55,05]	[50,53; 57,52]	[48,99; 56,28]	[48,16; 55,80]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	14	14	16	56	43	35	30	28	30	19	23							
		Anteil in %	0,94	1,03	1,33	4,70	3,96	3,55	3,31	3,33	3,83	2,63	3,50							
		CI Anteil in %	[0,45; 1,43]	[0,49; 1,56]	[0,68; 1,97]	[3,50; 5,90]	[2,80; 5,12]	[2,40; 4,71]	[2,15; 4,48]	[2,12; 4,55]	[2,49; 5,18]	[1,46; 3,80]	[2,09; 4,90]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	584	618	586	519	514	447	427	406	393	361	319							
		Anteil in %	39,22	45,37	48,63	43,54	47,29	45,38	47,18	48,33	50,19	50,00	48,48							
		CI Anteil in %	[36,74; 41,70]	[42,73; 48,02]	[45,81; 51,45]	[40,72; 46,36]	[44,32; 50,26]	[42,27; 48,49]	[43,93; 50,44]	[44,95; 51,71]	[46,69; 53,70]	[46,35; 53,65]	[44,66; 52,30]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	891	730	603	617	530	503	448	406	360	342	316							
		Anteil in %	59,84	53,60	50,04	51,76	48,76	51,07	49,50	48,33	45,98	47,37	48,02							
		CI Anteil in %	[57,35; 62,33]	[50,95; 56,25]	[47,22; 52,87]	[48,92; 54,60]	[45,79; 51,73]	[47,94; 54,19]	[46,24; 52,76]	[44,95; 51,71]	[42,48; 49,47]	[43,72; 51,01]	[44,20; 51,84]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	12	10	10	43	30	22	30	25	21	18	16							
		Anteil in %	0,81	0,73	0,83	3,61	2,76	2,23	3,31	2,98	2,68	2,49	2,43							
		CI Anteil in %	[0,35; 1,26]	[0,28; 1,19]	[0,32; 1,34]	[2,55; 4,67]	[1,79; 3,73]	[1,31; 3,16]	[2,15; 4,48]	[1,83; 4,13]	[1,55; 3,81]	[1,35; 3,63]	[1,25; 3,61]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	712	623	511	501	428	411	353	327	296	278	249							
		Anteil in %	47,82	45,74	42,41	42,03	39,37	41,73	39,01	38,93	37,80	38,50	37,84							
		CI Anteil in %	[45,28; 50,36]	[43,09; 48,39]	[39,62; 45,20]	[39,23; 44,83]	[36,47; 42,28]	[38,64; 44,81]	[35,83; 42,19]	[35,63; 42,23]	[34,40; 41,20]	[34,95; 42,06]	[34,13; 41,55]							
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5	1	1	2	5	3	0	2	0	3	2								
	Anteil in %	0,34	0,07	0,08	0,17	0,46	0,30	0,00	0,24	0,00	0,42	0,30								
	CI Anteil in %	[0,04; 0,63]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,40]	[0,06; 0,86]	[0,00; 0,65]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,89]	[0,00; 0,72]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	162	96	81	71	67	67	65	52	43	43	49								
	Anteil in %	10,88	7,05	6,72	5,96	6,16	6,80	7,18	6,19	5,49	5,96	7,45								
	CI Anteil in %	[9,30; 12,46]	[5,69; 8,41]	[5,31; 8,14]	[4,61; 7,30]	[4,73; 7,59]	[5,23; 8,38]	[5,50; 8,87]	[4,56; 7,82]	[3,89; 7,09]	[4,23; 7,68]	[5,44; 9,45]								
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2002	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1322	1208	1096	1002	909	847	785	726	676	637											
	auswertbar	Anzahl	1176	1058	1051	962	885	807	757	702	654	612											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	507	522	505	438	432	397	397	360	308	292											
		Anteil in %	43,11	49,34	48,05	45,53	48,81	49,19	52,44	51,28	47,09	47,71											
		CI Anteil in %	[40,28; 45,94]	[46,32; 52,35]	[45,03; 51,07]	[42,38; 48,68]	[45,52; 52,11]	[45,74; 52,65]	[48,88; 56,00]	[47,58; 54,98]	[43,27; 50,92]	[43,75; 51,67]											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	14	14	34	27	26	23	18	18	15	13											
		Anteil in %	1,19	1,32	3,24	2,81	2,94	2,85	2,38	2,56	2,29	2,12											
		CI Anteil in %	[0,57; 1,81]	[0,63; 2,01]	[2,16; 4,31]	[1,76; 3,85]	[1,82; 4,05]	[1,70; 4,00]	[1,29; 3,46]	[1,39; 3,73]	[1,15; 3,44]	[0,98; 3,27]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	493	508	471	411	406	374	379	342	293	279											
		Anteil in %	41,92	48,02	44,81	42,72	45,88	46,34	50,07	48,72	44,80	45,59											
		CI Anteil in %	[39,10; 44,74]	[45,00; 51,03]	[41,81; 47,82]	[39,60; 45,85]	[42,59; 49,16]	[42,90; 49,79]	[46,50; 53,63]	[45,02; 52,42]	[40,99; 48,62]	[41,64; 49,54]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	669	536	546	524	453	410	360	342	346	320											
		Anteil in %	56,89	50,66	51,95	54,47	51,19	50,81	47,56	48,72	52,91	52,29											
		CI Anteil in %	[54,06; 59,72]	[47,65; 53,68]	[48,93; 54,97]	[51,32; 57,62]	[47,89; 54,48]	[47,35; 54,26]	[44,00; 51,12]	[45,02; 52,42]	[49,08; 56,73]	[48,33; 56,25]											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	13	11	31	22	14	6	9	11	11	19											
		Anteil in %	1,11	1,04	2,95	2,29	1,58	0,74	1,19	1,57	1,68	3,10											
		CI Anteil in %	[0,51; 1,70]	[0,43; 1,65]	[1,93; 3,97]	[1,34; 3,23]	[0,76; 2,40]	[0,15; 1,34]	[0,42; 1,96]	[0,65; 2,49]	[0,70; 2,67]	[1,73; 4,48]											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	532	455	447	419	372	344	295	277	283	250											
		Anteil in %	45,24	43,01	42,53	43,56	42,03	42,63	38,97	39,46	43,27	40,85											
		CI Anteil in %	[42,39; 48,08]	[40,02; 45,99]	[39,54; 45,52]	[40,42; 46,69]	[38,78; 45,29]	[39,21; 46,04]	[35,49; 42,45]	[35,84; 43,08]	[39,47; 47,07]	[36,95; 44,75]											
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	1	3	1	0	0	1	1	0											
		Anteil in %	0,09	0,09	0,10	0,31	0,11	0,00	0,00	0,14	0,15	0,00											
		CI Anteil in %	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,66]	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,42]	[0,00; 0,45]	[0,00; 0,00]											
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	123	69	67	80	66	60	56	53	51	51												
	Anteil in %	10,46	6,52	6,37	8,32	7,46	7,43	7,40	7,55	7,80	8,33												
	CI Anteil in %	[8,71; 12,21]	[5,03; 8,01]	[4,90; 7,85]	[6,57; 10,06]	[5,73; 9,19]	[5,62; 9,25]	[5,53; 9,26]	[5,59; 9,51]	[5,74; 9,85]	[6,14; 10,52]												
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1553</b>	<b>1419</b>	<b>1288</b>	<b>1173</b>	<b>1064</b>	<b>983</b>	<b>907</b>	<b>841</b>	<b>784</b>	<b>738</b>											

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1190	1050	956	851	783	723	681	637	600									
	auswertbar	Anzahl	1037	997	913	827	754	705	657	618	571									
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	438	447	448	387	380	365	352	318	305									
		Anteil in %	42,24	44,83	49,07	46,80	50,40	51,77	53,58	51,46	53,42									
		CI Anteil in %	[39,23; 45,25]	[41,75; 47,92]	[45,82; 52,31]	[43,39; 50,20]	[46,83; 53,97]	[48,08; 55,46]	[49,76; 57,39]	[47,51; 55,40]	[49,32; 57,51]									
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	5	41	40	25	24	25	18	18	19									
		Anteil in %	0,48	4,11	4,38	3,02	3,18	3,55	2,74	2,91	3,33									
		CI Anteil in %	[0,06; 0,90]	[2,88; 5,35]	[3,05; 5,71]	[1,86; 4,19]	[1,93; 4,44]	[2,18; 4,91]	[1,49; 3,99]	[1,59; 4,24]	[1,86; 4,80]									
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	433	406	408	362	356	340	334	300	286									
		Anteil in %	41,76	40,72	44,69	43,77	47,21	48,23	50,84	48,54	50,09									
		CI Anteil in %	[38,75; 44,76]	[37,67; 43,77]	[41,46; 47,91]	[40,39; 47,16]	[43,65; 50,78]	[44,54; 51,92]	[47,01; 54,66]	[44,60; 52,49]	[45,98; 54,19]									
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	599	550	465	440	374	340	305	300	266									
		Anteil in %	57,76	55,17	50,93	53,20	49,60	48,23	46,42	48,54	46,58									
		CI Anteil in %	[54,75; 60,77]	[52,08; 58,25]	[47,69; 54,18]	[49,80; 56,61]	[46,03; 53,17]	[44,54; 51,92]	[42,61; 50,24]	[44,60; 52,49]	[42,49; 50,68]									
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	13	42	27	31	23	15	12	11	8									
		Anteil in %	1,25	4,21	2,96	3,75	3,05	2,13	1,83	1,78	1,40									
		CI Anteil in %	[0,58; 1,93]	[2,97; 5,46]	[1,86; 4,06]	[2,45; 5,04]	[1,82; 4,28]	[1,06; 3,19]	[0,80; 2,85]	[0,74; 2,82]	[0,44; 2,37]									
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	485	431	383	348	302	278	251	251	229									
		Anteil in %	46,77	43,23	41,95	42,08	40,05	39,43	38,20	40,61	40,11									
		CI Anteil in %	[43,73; 49,81]	[40,15; 46,31]	[38,75; 45,15]	[38,71; 45,45]	[36,55; 43,55]	[35,82; 43,04]	[34,49; 41,92]	[36,74; 44,49]	[36,08; 44,13]									
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	5	6	6	2	2	2	4	2										
	Anteil in %	0,19	0,50	0,66	0,73	0,27	0,28	0,30	0,65	0,35										
	CI Anteil in %	[0,00; 0,46]	[0,06; 0,94]	[0,13; 1,18]	[0,15; 1,30]	[0,00; 0,63]	[0,00; 0,68]	[0,00; 0,73]	[0,01; 1,28]	[0,00; 0,84]										
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	99	72	49	55	47	45	40	34	27										
	Anteil in %	9,55	7,22	5,37	6,65	6,23	6,38	6,09	5,50	4,73										
	CI Anteil in %	[7,76; 11,34]	[5,61; 8,83]	[3,90; 6,83]	[4,95; 8,35]	[4,51; 7,96]	[4,58; 8,19]	[4,26; 7,92]	[3,70; 7,30]	[2,99; 6,47]										
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1441</b>	<b>1266</b>	<b>1152</b>	<b>1018</b>	<b>932</b>	<b>861</b>	<b>811</b>	<b>758</b>	<b>718</b>									

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	692	635	560	506	478	450	416	386														
	auswertbar	Anzahl	692	619	545	488	464	435	398	367														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	313	302	254	251	218	220	197	185														
		Anteil in %	45,23	48,79	46,61	51,43	46,98	50,57	49,50	50,41														
		CI Anteil in %	[41,52; 48,94]	[44,85; 52,73]	[42,41; 50,80]	[47,00; 55,87]	[42,44; 51,53]	[45,87; 55,28]	[44,58; 54,42]	[45,29; 55,53]														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	23	25	21	19	15	16	13	11														
		Anteil in %	3,32	4,04	3,85	3,89	3,23	3,68	3,27	3,00														
		CI Anteil in %	[1,99; 4,66]	[2,49; 5,59]	[2,24; 5,47]	[2,18; 5,61]	[1,62; 4,84]	[1,91; 5,45]	[1,52; 5,01]	[1,25; 4,74]														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	290	277	233	232	203	204	184	174														
		Anteil in %	41,91	44,75	42,75	47,54	43,75	46,90	46,23	47,41														
		CI Anteil in %	[38,23; 45,59]	[40,83; 48,67]	[38,59; 46,91]	[43,11; 51,98]	[39,23; 48,27]	[42,20; 51,59]	[41,33; 51,14]	[42,30; 52,53]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	379	317	291	237	246	215	201	182														
		Anteil in %	54,77	51,21	53,39	48,57	53,02	49,43	50,50	49,59														
		CI Anteil in %	[51,06; 58,48]	[47,27; 55,15]	[49,20; 57,59]	[44,13; 53,00]	[48,47; 57,56]	[44,72; 54,13]	[45,58; 55,42]	[44,47; 54,71]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	30	17	13	8	12	8	7	7														
		Anteil in %	4,34	2,75	2,39	1,64	2,59	1,84	1,76	1,91														
		CI Anteil in %	[2,82; 5,85]	[1,46; 4,03]	[1,10; 3,67]	[0,51; 2,77]	[1,14; 4,03]	[0,57; 3,10]	[0,47; 3,05]	[0,51; 3,31]														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	277	248	238	193	192	166	158	157														
		Anteil in %	40,03	40,06	43,67	39,55	41,38	38,16	39,70	42,78														
		CI Anteil in %	[36,38; 43,68]	[36,20; 43,93]	[39,50; 47,84]	[35,21; 43,89]	[36,89; 45,87]	[33,59; 42,73]	[34,89; 44,51]	[37,71; 47,85]														
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	6	6	5	5	6	3	4	3														
		Anteil in %	0,87	0,97	0,92	1,02	1,29	0,69	1,01	0,82														
		CI Anteil in %	[0,18; 1,56]	[0,20; 1,74]	[0,12; 1,72]	[0,13; 1,92]	[0,26; 2,32]	[0,00; 1,47]	[0,02; 1,99]	[0,00; 1,74]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	66	46	35	31	36	38	32	15															
	Anteil in %	9,54	7,43	6,42	6,35	7,76	8,74	8,04	4,09															
	CI Anteil in %	[7,35; 11,73]	[5,36; 9,50]	[4,36; 8,48]	[4,19; 8,52]	[5,32; 10,20]	[6,08; 11,39]	[5,37; 10,72]	[2,06; 6,12]															
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>826</b>	<b>748</b>	<b>656</b>	<b>588</b>	<b>551</b>	<b>519</b>	<b>481</b>	<b>448</b>														



EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1013	883	797	725	678	625	578													
	auswertbar	Anzahl	1013	863	776	708	658	612	556													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	458	427	402	364	377	319	269													
		Anteil in %	45,21	49,48	51,80	51,41	57,29	52,12	48,38													
		CI Anteil in %	[42,15; 48,28]	[46,14; 52,82]	[48,29; 55,32]	[47,73; 55,10]	[53,51; 61,08]	[48,16; 56,09]	[44,22; 52,54]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	33	31	21	14	15	17	10													
		Anteil in %	3,26	3,59	2,71	1,98	2,28	2,78	1,80													
		CI Anteil in %	[2,16; 4,35]	[2,35; 4,83]	[1,56; 3,85]	[0,95; 3,00]	[1,14; 3,42]	[1,47; 4,08]	[0,69; 2,90]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	425	396	381	350	362	302	259													
		Anteil in %	41,95	45,89	49,10	49,44	55,02	49,35	46,58													
		CI Anteil in %	[38,91; 45,00]	[42,56; 49,21]	[45,58; 52,62]	[45,75; 53,12]	[51,21; 58,82]	[45,38; 53,31]	[42,43; 50,73]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	555	436	374	344	281	293	287													
		Anteil in %	54,79	50,52	48,20	48,59	42,71	47,88	51,62													
		CI Anteil in %	[51,72; 57,85]	[47,18; 53,86]	[44,68; 51,71]	[44,90; 52,27]	[38,92; 46,49]	[43,91; 51,84]	[47,46; 55,78]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	34	25	17	12	6	4	8													
		Anteil in %	3,36	2,90	2,19	1,69	0,91	0,65	1,44													
		CI Anteil in %	[2,25; 4,47]	[1,78; 4,02]	[1,16; 3,22]	[0,74; 2,65]	[0,19; 1,64]	[0,01; 1,29]	[0,45; 2,43]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	417	340	300	284	234	247	232													
		Anteil in %	41,16	39,40	38,66	40,11	35,56	40,36	41,73													
		CI Anteil in %	[38,13; 44,20]	[36,14; 42,66]	[35,23; 42,09]	[36,50; 43,73]	[31,90; 39,22]	[36,47; 44,25]	[37,62; 45,83]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	9	3	3	4	1	3	2														
	Anteil in %	0,89	0,35	0,39	0,56	0,15	0,49	0,36														
	CI Anteil in %	[0,31; 1,47]	[0,00; 0,74]	[0,00; 0,82]	[0,01; 1,12]	[0,00; 0,45]	[0,00; 1,04]	[0,00; 0,86]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	95	68	54	44	40	39	45														
	Anteil in %	9,38	7,88	6,96	6,21	6,08	6,37	8,09														
	CI Anteil in %	[7,58; 11,17]	[6,08; 9,68]	[5,17; 8,75]	[4,44; 7,99]	[4,25; 7,91]	[4,44; 8,31]	[5,82; 10,36]														
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1266</b>	<b>1098</b>	<b>984</b>	<b>894</b>	<b>834</b>	<b>772</b>	<b>717</b>													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	794	707	632	582	539	495														
	auswertbar	Anzahl	794	695	615	570	522	480														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	353	347	275	274	248	240														
		Anteil in %	44,46	49,93	44,72	48,07	47,51	50,00														
		CI Anteil in %	[41,00; 47,92]	[46,21; 53,65]	[40,78; 48,65]	[43,96; 52,18]	[43,22; 51,80]	[45,52; 54,48]														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	19	27	18	19	12	16														
		Anteil in %	2,39	3,88	2,93	3,33	2,30	3,33														
		CI Anteil in %	[1,33; 3,46]	[2,45; 5,32]	[1,59; 4,26]	[1,86; 4,81]	[1,01; 3,59]	[1,73; 4,94]														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	334	320	257	255	236	224														
		Anteil in %	42,07	46,04	41,79	44,74	45,21	46,67														
		CI Anteil in %	[38,63; 45,50]	[42,33; 49,75]	[37,89; 45,69]	[40,65; 48,82]	[40,94; 49,48]	[42,20; 51,13]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	441	348	340	296	274	240														
		Anteil in %	55,54	50,07	55,28	51,93	52,49	50,00														
		CI Anteil in %	[52,08; 59,00]	[46,35; 53,79]	[51,35; 59,22]	[47,82; 56,04]	[48,20; 56,78]	[45,52; 54,48]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	26	17	14	14	17	14														
		Anteil in %	3,27	2,45	2,28	2,46	3,26	2,92														
		CI Anteil in %	[2,04; 4,51]	[1,30; 3,60]	[1,10; 3,46]	[1,18; 3,73]	[1,73; 4,78]	[1,41; 4,42]														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	315	272	268	227	215	181														
		Anteil in %	39,67	39,14	43,58	39,82	41,19	37,71														
		CI Anteil in %	[36,27; 43,08]	[35,51; 42,77]	[39,66; 47,50]	[35,80; 43,85]	[36,96; 45,41]	[33,37; 42,05]														
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	8	1	2	3	2	1															
	Anteil in %	1,01	0,14	0,33	0,53	0,38	0,21															
	CI Anteil in %	[0,31; 1,70]	[0,00; 0,43]	[0,00; 0,78]	[0,00; 1,12]	[0,00; 0,91]	[0,00; 0,62]															
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	92	58	56	52	40	44															
	Anteil in %	11,59	8,35	9,11	9,12	7,66	9,17															
	CI Anteil in %	[9,36; 13,81]	[6,29; 10,40]	[6,83; 11,38]	[6,76; 11,49]	[5,38; 9,95]	[6,58; 11,75]															
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>950</b>	<b>847</b>	<b>758</b>	<b>693</b>	<b>640</b>	<b>587</b>														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	864	763	688	613	561														
	auswertbar	Anzahl	864	744	662	595	546														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	389	365	337	298	293														
		Anteil in %	45,02	49,06	50,91	50,08	53,66														
		CI Anteil in %	[41,70; 48,34]	[45,46; 52,65]	[47,10; 54,72]	[46,06; 54,11]	[49,48; 57,85]														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	24	18	24	18	15														
		Anteil in %	2,78	2,42	3,63	3,03	2,75														
		CI Anteil in %	[1,68; 3,87]	[1,31; 3,52]	[2,20; 5,05]	[1,65; 4,40]	[1,37; 4,12]														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	365	347	313	280	278														
		Anteil in %	42,25	46,64	47,28	47,06	50,92														
		CI Anteil in %	[38,95; 45,54]	[43,05; 50,23]	[43,47; 51,09]	[43,04; 51,07]	[46,72; 55,11]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	475	379	325	297	253														
		Anteil in %	54,98	50,94	49,09	49,92	46,34														
		CI Anteil in %	[51,66; 58,30]	[47,35; 54,54]	[45,28; 52,90]	[45,89; 53,94]	[42,15; 50,52]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	26	26	17	15	14														
		Anteil in %	3,01	3,49	2,57	2,52	2,56														
		CI Anteil in %	[1,87; 4,15]	[2,17; 4,82]	[1,36; 3,77]	[1,26; 3,78]	[1,24; 3,89]														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	359	290	257	219	198														
		Anteil in %	41,55	38,98	38,82	36,81	36,26														
		CI Anteil in %	[38,26; 44,84]	[35,47; 42,49]	[35,11; 42,54]	[32,93; 40,69]	[32,23; 40,30]														
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	10	6	4	1	0														
		Anteil in %	1,16	0,81	0,60	0,17	0,00														
		CI Anteil in %	[0,44; 1,87]	[0,16; 1,45]	[0,01; 1,20]	[0,00; 0,50]	[0,00; 0,00]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	80	57	47	62	41															
	Anteil in %	9,26	7,66	7,10	10,42	7,51															
	CI Anteil in %	[7,33; 11,19]	[5,75; 9,57]	[5,14; 9,06]	[7,96; 12,88]	[5,30; 9,72]															
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1055</b>	<b>926</b>	<b>835</b>	<b>739</b>	<b>676</b>														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	834	749	656	594																
	auswertbar	Anzahl	834	741	650	571																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	382	367	311	284																
		Anteil in %	45,80	49,53	47,85	49,74																
		CI Anteil in %	[42,42; 49,19]	[45,93; 53,13]	[44,00; 51,69]	[45,63; 53,84]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	28	26	21	16																
		Anteil in %	3,36	3,51	3,23	2,80																
		CI Anteil in %	[2,13; 4,58]	[2,18; 4,83]	[1,87; 4,59]	[1,45; 4,16]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	354	341	290	268																
		Anteil in %	42,45	46,02	44,62	46,94																
		CI Anteil in %	[39,09; 45,80]	[42,43; 49,61]	[40,79; 48,44]	[42,84; 51,03]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	452	374	339	287																
		Anteil in %	54,20	50,47	52,15	50,26																
		CI Anteil in %	[50,81; 57,58]	[46,87; 54,07]	[48,31; 56,00]	[46,16; 54,37]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	26	18	11	11																
		Anteil in %	3,12	2,43	1,69	1,93																
		CI Anteil in %	[1,94; 4,30]	[1,32; 3,54]	[0,70; 2,68]	[0,80; 3,05]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	336	287	259	224																
		Anteil in %	40,29	38,73	39,85	39,23																
		CI Anteil in %	[36,96; 43,62]	[35,22; 42,24]	[36,08; 43,61]	[35,22; 43,24]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	9	6	7	3																	
	Anteil in %	1,08	0,81	1,08	0,53																	
	CI Anteil in %	[0,38; 1,78]	[0,16; 1,46]	[0,28; 1,87]	[0,00; 1,12]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	81	63	62	49																	
	Anteil in %	9,71	8,50	9,54	8,58																	
	CI Anteil in %	[7,70; 11,72]	[6,49; 10,51]	[7,28; 11,80]	[6,28; 10,88]																	
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1015</b>	<b>904</b>	<b>788</b>	<b>719</b>																

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	838	738	657																	
	auswertbar	Anzahl	838	728	639																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	379	366	311																	
		Anteil in %	45,23	50,27	48,67																	
		CI Anteil in %	[41,85; 48,60]	[46,64; 53,91]	[44,79; 52,55]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	27	25	19																	
		Anteil in %	3,22	3,43	2,97																	
		CI Anteil in %	[2,03; 4,42]	[2,11; 4,76]	[1,66; 4,29]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	352	341	292																	
		Anteil in %	42,00	46,84	45,70																	
		CI Anteil in %	[38,66; 45,35]	[43,21; 50,47]	[41,83; 49,56]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	459	362	328																	
		Anteil in %	54,77	49,73	51,33																	
		CI Anteil in %	[51,40; 58,15]	[46,09; 53,36]	[47,45; 55,21]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	21	12	15																	
		Anteil in %	2,51	1,65	2,35																	
		CI Anteil in %	[1,45; 3,56]	[0,72; 2,57]	[1,17; 3,52]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	338	279	262																	
		Anteil in %	40,33	38,32	41,00																	
		CI Anteil in %	[37,01; 43,66]	[34,79; 41,86]	[37,19; 44,82]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	10	6	5																		
	Anteil in %	1,19	0,82	0,78																		
	CI Anteil in %	[0,46; 1,93]	[0,17; 1,48]	[0,10; 1,47]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	90	65	46																		
	Anteil in %	10,74	8,93	7,20																		
	CI Anteil in %	[8,64; 12,84]	[6,86; 11,00]	[5,19; 9,20]																		
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1045</b>	<b>907</b>	<b>794</b>																	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	723	632																		
	auswertbar	Anzahl	722	617																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	304	294																		
		Anteil in %	42,11	47,65																		
		CI Anteil in %	[38,50; 45,71]	[43,71; 51,59]																		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	25	21																		
		Anteil in %	3,46	3,40																		
		CI Anteil in %	[2,13; 4,80]	[1,97; 4,84]																		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	279	273																		
		Anteil in %	38,64	44,25																		
		CI Anteil in %	[35,09; 42,20]	[40,32; 48,17]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	418	323																		
		Anteil in %	57,89	52,35																		
		CI Anteil in %	[54,29; 61,50]	[48,41; 56,29]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	23	22																		
		Anteil in %	3,19	3,57																		
		CI Anteil in %	[1,90; 4,47]	[2,10; 5,03]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	309	246																		
		Anteil in %	42,80	39,87																		
		CI Anteil in %	[39,19; 46,41]	[36,00; 43,74]																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	7	0																			
	Anteil in %	0,97	0,00																			
	CI Anteil in %	[0,25; 1,68]	[0,00; 0,00]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	79	55																			
	Anteil in %	10,94	8,91																			
	CI Anteil in %	[8,66; 13,22]	[6,66; 11,16]																			
	<b>Patienten insgesamt</b>	<i>Anzahl</i>	<i>926</i>	<i>784</i>																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	726																	
	auswertbar	Anzahl	725																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	317																	
		Anteil in %	43,72																	
		CI Anteil in %	[40,11; 47,34]																	
	Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	22																	
		Anteil in %	3,03																	
		CI Anteil in %	[1,78; 4,28]																	
	Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	295																	
		Anteil in %	40,69																	
		CI Anteil in %	[37,11; 44,27]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	408																	
		Anteil in %	56,28																	
		CI Anteil in %	[52,66; 59,89]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	25																	
		Anteil in %	3,45																	
		CI Anteil in %	[2,12; 4,78]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	298																	
		Anteil in %	41,10																	
		CI Anteil in %	[37,52; 44,69]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	7																		
	Anteil in %	0,97																		
	CI Anteil in %	[0,25; 1,68]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	78																		
	Anteil in %	10,76																		
	CI Anteil in %	[8,50; 13,02]																		
	<b>Patienten insgesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>920</b>																	

In Tabelle C.3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für - - Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei - - mmHg, der Median bei - - mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei - - und der Median bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	602	483	416	363	317	288	258	233	223	212	203	197	188	180	173	162	149	140
	auswertbar	Anzahl	602	437	407	356	312	286	258	225	216	202	194	193	186	176	168	158	146	138
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	145,32	141,03	141,55	140,85	138,77	138,20	137,41	137,05	137,06	136,75	136,34	135,71	134,17	134,93	135,72	136,11	135,90	136,43
		CI Mean	[143,92; 146,72]	[139,50; 142,57]	[139,89; 143,22]	[139,11; 142,59]	[137,01; 140,53]	[136,33; 140,07]	[135,36; 139,46]	[134,70; 139,40]	[134,95; 139,17]	[134,68; 138,83]	[134,26; 138,41]	[133,46; 137,96]	[131,68; 136,66]	[132,56; 137,29]	[133,16; 138,28]	[133,64; 138,57]	[133,31; 138,49]	[133,38; 139,48]
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	139,00	138,00	135,00	136,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	130,00	135,00	135,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>741</i>	<i>596</i>	<i>500</i>	<i>428</i>	<i>372</i>	<i>335</i>	<i>303</i>	<i>274</i>	<i>260</i>	<i>245</i>	<i>236</i>	<i>226</i>	<i>214</i>	<i>205</i>	<i>198</i>	<i>186</i>	<i>172</i>	<i>163</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1504	1272	1015	859	767	673	613	571	540	522	506	481	452	431	412	390	369	
	auswertbar	Anzahl	1504	1132	960	839	738	665	566	528	510	509	495	473	445	429	408	385	357	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	145,34	142,24	141,18	139,67	138,92	139,06	139,12	138,14	137,59	137,28	137,53	137,07	136,74	137,08	135,91	137,88	136,48	
		CI Mean	[144,38; 146,29]	[141,15; 143,32]	[140,01; 142,35]	[138,54; 140,80]	[137,62; 140,23]	[137,66; 140,45]	[137,66; 140,59]	[136,58; 139,70]	[136,10; 139,09]	[135,82; 138,74]	[136,08; 138,98]	[135,54; 138,59]	[135,20; 138,28]	[135,59; 138,57]	[134,21; 137,61]	[136,14; 139,63]	[134,72; 138,24]	
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	135,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,50	135,00	135,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1900</i>	<i>1600</i>	<i>1278</i>	<i>1069</i>	<i>951</i>	<i>833</i>	<i>755</i>	<i>710</i>	<i>676</i>	<i>649</i>	<i>627</i>	<i>587</i>	<i>556</i>	<i>527</i>	<i>505</i>	<i>480</i>	<i>454</i>		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2452	2033	1664	1396	1209	1073	1027	971	912	859	804	743	702	661	623	590		
	auswertbar	Anzahl	2452	1862	1605	1352	1159	1020	981	938	886	836	781	726	680	650	609	579		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	144,15	141,27	140,81	139,12	139,78	138,39	139,39	137,01	138,40	138,10	137,13	136,21	137,45	136,76	137,01	136,32		
		CI Mean	[143,41; 144,89]	[140,47; 142,08]	[139,94; 141,68]	[138,20; 140,04]	[138,77; 140,79]	[137,36; 139,43]	[138,29; 140,48]	[135,86; 138,15]	[137,30; 139,49]	[136,97; 139,24]	[135,91; 138,36]	[134,94; 137,48]	[136,21; 138,70]	[135,43; 138,08]	[135,74; 138,29]	[134,98; 137,67]		
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	135,00	140,00	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	136,00	135,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3009</i>	<i>2474</i>	<i>2012</i>	<i>1697</i>	<i>1468</i>	<i>1311</i>	<i>1251</i>	<i>1179</i>	<i>1105</i>	<i>1036</i>	<i>968</i>	<i>900</i>	<i>853</i>	<i>809</i>	<i>767</i>	<i>728</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1675	1413	1212	1051	941	876	822	785	731	686	639	608	578	551	524			
	auswertbar	Anzahl	1675	1353	1158	1029	895	829	783	757	706	662	619	597	562	542	508			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	144,10	140,99	139,90	139,34	139,30	139,59	137,86	138,49	139,09	137,39	137,79	138,30	137,20	138,94	137,31			
		CI Mean	[143,20; 144,99]	[140,07; 141,90]	[138,90; 140,91]	[138,30; 140,39]	[138,18; 140,41]	[138,37; 140,82]	[136,61; 139,11]	[137,23; 139,75]	[137,84; 140,34]	[136,13; 138,66]	[136,50; 139,09]	[136,88; 139,72]	[135,84; 138,56]	[137,54; 140,35]	[135,82; 138,80]			
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	140,00	135,00	135,00	136,00	135,00	140,00	135,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2057</i>	<i>1731</i>	<i>1484</i>	<i>1286</i>	<i>1155</i>	<i>1075</i>	<i>1004</i>	<i>958</i>	<i>894</i>	<i>840</i>	<i>784</i>	<i>740</i>	<i>703</i>	<i>663</i>	<i>633</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2163	1887	1601	1411	1304	1220	1141	1068	996	921	855	807	755	704				
	auswertbar	Anzahl	2163	1761	1525	1331	1225	1155	1094	1027	973	893	835	785	732	683				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	142,30	140,39	139,54	138,74	139,88	137,89	138,85	138,04	138,12	137,10	137,60	137,17	137,54	136,50				
		CI Mean	[141,51; 143,10]	[139,58; 141,20]	[138,67; 140,40]	[137,85; 139,64]	[138,86; 140,89]	[136,91; 138,86]	[137,84; 139,85]	[136,93; 139,15]	[137,02; 139,22]	[135,94; 138,26]	[136,42; 138,79]	[135,99; 138,35]	[136,30; 138,78]	[135,18; 137,82]				
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	136,00	139,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2626</i>	<i>2293</i>	<i>1953</i>	<i>1721</i>	<i>1604</i>	<i>1507</i>	<i>1407</i>	<i>1315</i>	<i>1218</i>	<i>1137</i>	<i>1054</i>	<i>995</i>	<i>935</i>	<i>870</i>					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1937	1664	1473	1343	1242	1153	1074	998	929	878	816	765	714					
	auswertbar	Anzahl	1937	1605	1352	1251	1161	1108	1041	964	904	853	796	740	689					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	143,65	141,25	140,30	139,96	139,10	139,21	138,85	138,15	138,14	137,89	137,84	136,41	137,00					
		CI Mean	[142,82; 144,48]	[140,35; 142,15]	[139,35; 141,25]	[139,00; 140,93]	[138,09; 140,12]	[138,15; 140,28]	[137,75; 139,94]	[137,05; 139,25]	[137,01; 139,26]	[136,71; 139,07]	[136,63; 139,04]	[135,12; 137,70]	[135,72; 138,28]					
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	139,00	140,00	139,00	137,00	138,00	135,00	135,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2328</i>	<i>1992</i>	<i>1753</i>	<i>1596</i>	<i>1467</i>	<i>1357</i>	<i>1271</i>	<i>1177</i>	<i>1093</i>	<i>1037</i>	<i>966</i>	<i>905</i>	<i>847</i>						



EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1558	1385	1228	1107	1027	952	868	825	776	731	697	653						
	auswertbar	Anzahl	1558	1311	1142	1039	976	918	837	785	750	703	666	625						
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,75	138,61	138,55	138,16	137,84	137,30	138,08	137,44	138,56	137,05	137,38	137,42						
		CI Mean	[139,87; 141,64]	[137,72; 139,51]	[137,57; 139,53]	[137,14; 139,19]	[136,79; 138,89]	[136,21; 138,40]	[136,95; 139,21]	[136,24; 138,63]	[137,38; 139,74]	[135,79; 138,30]	[136,17; 138,59]	[136,15; 138,68]						
		Median	140,00	140,00	140,00	137,00	140,00	135,00	140,00	136,00	140,00	135,00	138,00	137,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1891</i>	<i>1674</i>	<i>1476</i>	<i>1329</i>	<i>1228</i>	<i>1134</i>	<i>1037</i>	<i>983</i>	<i>927</i>	<i>873</i>	<i>825</i>	<i>776</i>							
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1675	1508	1369	1266	1151	1044	953	891	828	771	708							
	auswertbar	Anzahl	1675	1472	1307	1193	1089	987	906	841	784	723	659							
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,10	138,13	137,50	137,58	137,05	137,62	136,68	136,47	135,34	136,65	137,12							
		CI Mean	[140,22; 141,98]	[137,26; 139,00]	[136,58; 138,41]	[136,66; 138,50]	[136,08; 138,02]	[136,59; 138,64]	[135,56; 137,80]	[135,38; 137,57]	[134,21; 136,47]	[135,48; 137,82]	[135,88; 138,36]							
		Median	140,00	140,00	135,00	138,00	135,00	136,00	135,00	135,00	132,00	134,00	135,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2002</i>	<i>1786</i>	<i>1617</i>	<i>1493</i>	<i>1357</i>	<i>1236</i>	<i>1133</i>	<i>1060</i>	<i>990</i>	<i>920</i>	<i>849</i>								
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1322	1208	1096	1002	909	847	785	726	676	637								
	auswertbar	Anzahl	1322	1170	1051	962	885	807	757	702	654	612								
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,62	137,52	138,07	138,57	138,03	137,71	137,32	136,98	138,31	137,40								
		CI Mean	[139,64; 141,61]	[136,55; 138,49]	[137,07; 139,06]	[137,52; 139,62]	[136,95; 139,11]	[136,56; 138,64]	[136,07; 138,57]	[135,70; 138,27]	[137,01; 139,60]	[136,03; 138,77]								
		Median	140,00	137,00	138,00	140,00	138,00	137,00	135,00	135,00	140,00	137,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1553</i>	<i>1419</i>	<i>1288</i>	<i>1173</i>	<i>1064</i>	<i>983</i>	<i>907</i>	<i>841</i>	<i>784</i>	<i>738</i>									
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1190	1050	956	851	783	723	681	637	600									
	auswertbar	Anzahl	1190	1000	913	828	755	705	658	619	572									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,98	138,53	136,66	137,83	136,07	136,65	136,01	136,44	135,89									
		CI Mean	[138,94; 141,02]	[137,46; 139,59]	[135,58; 137,73]	[136,67; 138,98]	[134,87; 137,28]	[135,41; 137,88]	[134,76; 137,26]	[135,18; 137,71]	[134,59; 137,20]									
		Median	140,00	140,00	136,00	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1441</i>	<i>1266</i>	<i>1152</i>	<i>1018</i>	<i>932</i>	<i>861</i>	<i>811</i>	<i>758</i>	<i>718</i>										
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	692	635	560	506	478	450	416	386										
	auswertbar	Anzahl	692	619	545	488	464	435	398	367										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,03	138,38	138,13	137,57	138,32	138,03	136,72	136,74										
		CI Mean	[138,60; 141,45]	[136,92; 139,85]	[136,62; 139,64]	[136,02; 139,12]	[136,78; 139,86]	[136,36; 139,69]	[134,95; 138,49]	[135,09; 138,40]										
		Median	140,00	138,00	140,00	135,00	138,00	135,00	135,00	135,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>826</i>	<i>748</i>	<i>656</i>	<i>588</i>	<i>551</i>	<i>519</i>	<i>481</i>	<i>448</i>											
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1013	883	797	725	678	625	578											
	auswertbar	Anzahl	1013	863	776	708	658	612	556											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,51	137,58	136,38	136,85	135,43	136,30	137,98											
		CI Mean	[138,35; 140,66]	[136,37; 138,79]	[135,20; 137,56]	[135,62; 138,09]	[134,13; 136,74]	[134,99; 137,61]	[136,46; 139,50]											
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	130,00	134,00	138,50											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1266</i>	<i>1098</i>	<i>984</i>	<i>894</i>	<i>834</i>	<i>772</i>	<i>717</i>												
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	794	707	632	582	539	495												
	auswertbar	Anzahl	794	695	615	570	522	480												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,06	137,66	139,11	138,38	137,76	138,22												
		CI Mean	[138,72; 141,39]	[136,34; 138,98]	[137,60; 140,63]	[136,86; 139,91]	[136,21; 139,31]	[136,64; 139,81]												
		Median	140,00	135,00	140,00	138,00	139,00	135,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>950</i>	<i>847</i>	<i>758</i>	<i>693</i>	<i>640</i>	<i>587</i>													
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	864	763	688	613	561													
	auswertbar	Anzahl	864	744	662	595	546													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,11	137,76	136,60	137,31	135,99													
		CI Mean	[137,85; 140,37]	[136,52; 139,00]	[135,28; 137,92]	[135,80; 138,81]	[134,58; 137,41]													
		Median	140,00	135,50	135,00	135,00	135,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1055</i>	<i>926</i>	<i>835</i>	<i>739</i>	<i>676</i>														

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	834	749	656	594														
	auswertbar	Anzahl	834	741	650	571														
		Mean	140,08	137,64	138,28	137,84														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[138,78; 141,38]	[136,32; 138,95]	[136,87; 139,68]	[136,40; 139,27]														
		Median	140,00	135,00	136,00	135,00														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1015</i>	<i>904</i>	<i>788</i>	<i>719</i>														
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	838	738	657															
	auswertbar	Anzahl	838	728	639															
		Mean	140,30	137,95	137,98															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[139,04; 141,57]	[136,53; 139,38]	[136,61; 139,36]															
		Median	140,00	135,50	136,00															
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1045</i>	<i>907</i>	<i>794</i>															
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	723	632																
	auswertbar	Anzahl	723	618																
		Mean	140,05	138,25																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[138,67; 141,42]	[136,81; 139,69]																
		Median	140,00	138,00																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>926</i>	<i>784</i>																
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	726																	
	auswertbar	Anzahl	726																	
		Mean	140,51																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[139,14; 141,88]																	
		Median	140,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>920</i>																	

In Tabelle C.3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutraf:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für - - Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei - - mmHg, der Median bei - - mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für - - der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei - - und der Median bei - -.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	602	483	416	363	317	288	258	233	223	212	203	197	188	180	173	162	149	140
	auswertbar	Anzahl	602	437	407	356	312	286	258	225	216	202	194	193	186	176	168	158	146	138
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,37	79,02	79,87	79,13	78,58	78,52	77,86	77,80	77,28	77,17	76,98	75,99	75,89	75,65	75,10	75,93	74,47	75,12
		CI Mean	[80,58; 82,16]	[78,24; 79,81]	[78,97; 80,76]	[78,22; 80,05]	[77,62; 79,54]	[77,55; 79,49]	[76,82; 78,89]	[76,73; 78,88]	[76,18; 78,37]	[76,00; 78,35]	[75,67; 78,29]	[74,66; 77,33]	[74,57; 77,22]	[74,48; 76,82]	[73,78; 76,41]	[74,49; 77,37]	[72,94; 76,00]	[73,61; 76,62]
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	78,00	79,50	80,00	77,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>741</i>	<i>596</i>	<i>500</i>	<i>428</i>	<i>372</i>	<i>335</i>	<i>303</i>	<i>274</i>	<i>260</i>	<i>245</i>	<i>236</i>	<i>226</i>	<i>214</i>	<i>205</i>	<i>198</i>	<i>186</i>	<i>172</i>	<i>163</i>	
2004-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1504	1272	1015	859	767	673	613	571	540	522	506	481	452	431	412	390	369	
	auswertbar	Anzahl	1504	1132	960	839	738	665	566	528	510	509	495	473	445	429	408	385	357	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,77	79,79	79,27	79,07	78,14	77,74	77,93	77,88	77,55	77,73	77,66	78,00	76,69	77,15	76,81	77,06	76,34	
		CI Mean	[80,29; 81,26]	[79,24; 80,34]	[78,68; 79,87]	[78,45; 79,69]	[77,49; 78,79]	[77,01; 78,47]	[77,16; 78,69]	[77,09; 78,68]	[76,78; 78,32]	[76,94; 78,53]	[76,88; 78,44]	[77,11; 78,89]	[75,85; 77,53]	[76,32; 77,99]	[75,95; 77,67]	[76,17; 77,96]	[75,39; 77,29]	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1900</i>	<i>1600</i>	<i>1278</i>	<i>1069</i>	<i>951</i>	<i>833</i>	<i>755</i>	<i>710</i>	<i>676</i>	<i>649</i>	<i>627</i>	<i>587</i>	<i>556</i>	<i>527</i>	<i>505</i>	<i>480</i>	<i>454</i>		
2004-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2452	2033	1664	1396	1209	1073	1027	971	912	859	804	743	702	661	623	590		
	auswertbar	Anzahl	2452	1862	1605	1352	1159	1020	981	938	886	836	781	726	680	650	609	579		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,95	79,92	79,35	78,52	78,88	78,30	78,46	77,72	78,44	77,86	77,50	77,14	77,51	76,59	77,06	77,15		
		CI Mean	[80,56; 81,33]	[79,50; 80,33]	[78,89; 79,81]	[78,02; 79,01]	[78,37; 79,40]	[77,75; 78,84]	[77,87; 79,05]	[77,13; 78,32]	[77,86; 79,02]	[77,26; 78,45]	[76,84; 78,16]	[76,52; 77,77]	[76,84; 78,19]	[75,89; 77,29]	[76,36; 77,76]	[76,40; 77,89]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3009</i>	<i>2474</i>	<i>2012</i>	<i>1697</i>	<i>1468</i>	<i>1311</i>	<i>1251</i>	<i>1179</i>	<i>1105</i>	<i>1036</i>	<i>968</i>	<i>900</i>	<i>853</i>	<i>809</i>	<i>767</i>	<i>728</i>			
2005-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1675	1413	1212	1051	941	876	822	785	731	686	639	608	578	551	524			
	auswertbar	Anzahl	1675	1353	1158	1029	895	829	783	757	706	662	619	597	562	542	508			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,35	79,96	79,30	78,94	78,57	78,68	77,96	78,50	78,30	78,18	78,05	78,17	77,56	77,89	77,60			
		CI Mean	[80,88; 81,81]	[79,49; 80,44]	[78,78; 79,81]	[78,40; 79,47]	[77,98; 79,17]	[78,05; 79,32]	[77,30; 78,61]	[77,85; 79,15]	[77,59; 79,01]	[77,48; 78,87]	[77,29; 78,82]	[77,44; 78,90]	[76,79; 78,33]	[77,10; 78,68]	[76,78; 78,42]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2057</i>	<i>1731</i>	<i>1484</i>	<i>1286</i>	<i>1155</i>	<i>1075</i>	<i>1004</i>	<i>958</i>	<i>894</i>	<i>840</i>	<i>784</i>	<i>740</i>	<i>703</i>	<i>663</i>	<i>633</i>				
2005-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	2163	1887	1601	1411	1304	1220	1141	1068	996	921	855	807	755	704				
	auswertbar	Anzahl	2163	1761	1525	1331	1225	1155	1094	1027	973	893	835	785	732	683				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,76	79,61	79,61	78,94	79,34	78,66	78,63	78,20	78,82	78,37	78,49	77,85	78,23	78,33				
		CI Mean	[80,36; 81,16]	[79,19; 80,02]	[79,15; 80,07]	[78,46; 79,42]	[78,82; 79,85]	[78,13; 79,19]	[78,10; 79,17]	[77,62; 78,79]	[78,24; 79,41]	[77,77; 78,97]	[77,87; 79,11]	[77,23; 78,46]	[77,59; 78,86]	[77,64; 79,03]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2626</i>	<i>2293</i>	<i>1953</i>	<i>1721</i>	<i>1604</i>	<i>1507</i>	<i>1407</i>	<i>1315</i>	<i>1218</i>	<i>1137</i>	<i>1054</i>	<i>995</i>	<i>935</i>	<i>870</i>					
2006-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1937	1664	1473	1343	1242	1153	1074	998	929	878	816	765	714					
	auswertbar	Anzahl	1937	1605	1352	1251	1161	1108	1041	964	904	853	796	740	689					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,02	80,26	79,11	79,28	79,49	78,87	78,38	78,04	78,04	77,73	77,64	77,37	77,20					
		CI Mean	[80,60; 81,45]	[79,81; 80,71]	[78,63; 79,59]	[78,75; 79,81]	[78,97; 80,00]	[78,32; 79,41]	[77,84; 78,92]	[77,43; 78,64]	[77,38; 78,70]	[77,13; 78,33]	[76,96; 78,32]	[76,69; 78,06]	[76,48; 77,93]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2328</i>	<i>1992</i>	<i>1753</i>	<i>1596</i>	<i>1467</i>	<i>1357</i>	<i>1271</i>	<i>1177</i>	<i>1093</i>	<i>1037</i>	<i>966</i>	<i>905</i>	<i>847</i>						

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1558	1385	1228	1107	1027	952	868	825	776	731	697	653								
	auswertbar	Anzahl	1558	1311	1142	1039	976	918	837	785	750	703	666	625								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,17	79,38	78,69	78,41	78,60	78,33	78,11	77,52	78,35	77,33	78,14	77,76								
		CI Mean	[79,69; 80,64]	[78,91; 79,86]	[78,16; 79,22]	[77,85; 78,97]	[78,04; 79,16]	[77,75; 78,91]	[77,50; 78,73]	[76,88; 78,16]	[77,72; 78,99]	[76,62; 78,04]	[77,42; 78,85]	[77,01; 78,51]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1891</i>	<i>1674</i>	<i>1476</i>	<i>1329</i>	<i>1228</i>	<i>1134</i>	<i>1037</i>	<i>983</i>	<i>927</i>	<i>873</i>	<i>825</i>	<i>776</i>									
2007-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1675	1508	1369	1266	1151	1044	953	891	828	771	708									
	auswertbar	Anzahl	1675	1472	1307	1193	1089	987	906	841	784	723	659									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,49	79,00	78,62	78,92	78,59	78,88	78,11	78,09	77,73	78,63	78,28									
		CI Mean	[80,03; 80,94]	[78,54; 79,46]	[78,12; 79,12]	[78,41; 79,44]	[78,07; 79,11]	[78,34; 79,42]	[77,51; 78,71]	[77,49; 78,68]	[77,09; 78,37]	[77,98; 79,28]	[77,60; 78,96]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2002</i>	<i>1786</i>	<i>1617</i>	<i>1493</i>	<i>1357</i>	<i>1236</i>	<i>1133</i>	<i>1060</i>	<i>990</i>	<i>920</i>	<i>849</i>										
2007-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1322	1208	1096	1002	909	847	785	726	676	637										
	auswertbar	Anzahl	1322	1170	1051	962	885	807	757	702	654	612										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,76	78,33	78,73	78,79	78,30	77,90	77,88	77,33	78,19	77,37										
		CI Mean	[79,23; 80,30]	[77,78; 78,88]	[78,18; 79,29]	[78,18; 79,39]	[77,68; 78,92]	[77,29; 78,52]	[77,20; 78,56]	[76,63; 78,03]	[77,43; 78,95]	[76,58; 78,16]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1553</i>	<i>1419</i>	<i>1288</i>	<i>1173</i>	<i>1064</i>	<i>983</i>	<i>907</i>	<i>841</i>	<i>784</i>	<i>738</i>											
2008-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1190	1050	956	851	783	723	681	637	600											
	auswertbar	Anzahl	1190	1000	913	828	755	705	658	619	572											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,93	79,43	78,26	78,47	77,48	77,99	77,86	78,11	77,65											
		CI Mean	[79,38; 80,48]	[78,86; 80,00]	[77,69; 78,83]	[77,85; 79,09]	[76,82; 78,15]	[77,30; 78,69]	[77,15; 78,56]	[77,39; 78,82]	[76,93; 78,37]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1441</i>	<i>1266</i>	<i>1152</i>	<i>1018</i>	<i>932</i>	<i>861</i>	<i>811</i>	<i>758</i>	<i>718</i>												
2008-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	692	635	560	506	478	450	416	386												
	auswertbar	Anzahl	692	619	545	488	464	435	398	367												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,67	79,01	78,93	79,11	79,39	78,79	77,46	77,99												
		CI Mean	[78,90; 80,45]	[78,25; 79,77]	[78,16; 79,70]	[78,25; 79,98]	[78,56; 80,22]	[77,87; 79,70]	[76,48; 78,44]	[77,06; 78,93]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>826</i>	<i>748</i>	<i>656</i>	<i>588</i>	<i>551</i>	<i>519</i>	<i>481</i>	<i>448</i>													
2009-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	1013	883	797	725	678	625	578													
	auswertbar	Anzahl	1013	863	776	708	658	612	556													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,95	79,15	78,46	78,58	77,82	78,44	78,52													
		CI Mean	[79,35; 80,55]	[78,53; 79,76]	[77,82; 79,10]	[77,94; 79,23]	[77,11; 78,54]	[77,71; 79,18]	[77,71; 79,33]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1266</i>	<i>1098</i>	<i>984</i>	<i>894</i>	<i>834</i>	<i>772</i>	<i>717</i>														
2009-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	794	707	632	582	539	495														
	auswertbar	Anzahl	794	695	615	570	522	480														
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,90	79,79	79,94	79,94	78,79	79,05														
		CI Mean	[80,17; 81,63]	[79,03; 80,55]	[79,17; 80,71]	[79,05; 80,84]	[77,98; 79,60]	[78,22; 79,87]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>950</i>	<i>847</i>	<i>758</i>	<i>693</i>	<i>640</i>	<i>587</i>															
2010-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	864	763	688	613	561															
	auswertbar	Anzahl	864	744	662	595	546															
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,80	79,71	78,98	79,51	78,37															
		CI Mean	[80,09; 81,51]	[78,99; 80,44]	[78,19; 79,76]	[78,70; 80,31]	[77,59; 79,16]															
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1055</i>	<i>926</i>	<i>835</i>	<i>739</i>	<i>676</i>																

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2010-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	834	749	656	594														
	auswertbar	Anzahl	834	741	650	571														
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,48	79,47	79,41	79,16														
		CI Mean	[79,79; 81,17]	[78,74; 80,20]	[78,65; 80,16]	[78,34; 79,99]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1015</i>	<i>904</i>	<i>788</i>	<i>719</i>															
2011-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	838	738	657															
	auswertbar	Anzahl	838	728	639															
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,53	79,00	79,04															
		CI Mean	[79,85; 81,20]	[78,26; 79,74]	[78,26; 79,81]															
		Median	80,00	80,00	80,00															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1045</i>	<i>907</i>	<i>794</i>																
2011-2	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	723	632																
	auswertbar	Anzahl	723	618																
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,67	79,07																
		CI Mean	[79,90; 81,45]	[78,24; 79,91]																
		Median	80,00	80,00																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>926</i>	<i>784</i>																	
2012-1	<b>Kollektivmitglieder insgesamt</b>	Anzahl	726																	
	auswertbar	Anzahl	726																	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,98																	
		CI Mean	[80,22; 81,74]																	
		Median	80,00																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>920</i>																		

### C.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensivierete Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

In Tabelle C.3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - - %; der Median lag bei - - %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich - - %; der Median lag bei - - %, der dafür auswertbaren Patienten.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Mean	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Median	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Fallbasis mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Mittlere Differenz zur ED	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Median mittlere Differenz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	741	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	163	
	auswertbar	Anzahl	741	532	486	419	367	329	303	265	252	235	224	222	212	201	193	182	168	160	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,44	7,24	7,23	7,22	7,11	7,24	7,24	7,21	7,17	7,17	7,16	7,16	7,18	7,22	7,25	7,35	7,25	7,19	
		CI Mean	[7,35; 7,53]	[7,14; 7,34]	[7,13; 7,33]	[7,11; 7,32]	[7,00; 7,22]	[7,12; 7,35]	[7,11; 7,37]	[7,08; 7,33]	[7,04; 7,30]	[7,04; 7,31]	[7,03; 7,29]	[7,02; 7,29]	[7,06; 7,30]	[7,09; 7,34]	[7,12; 7,38]	[7,20; 7,50]	[7,11; 7,39]	[7,03; 7,34]	
		Median	7,20	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,10	7,20	7,20	7,10	7,15	
		Fallbasis mittlere Differenz		532	486	419	367	329	303	265	252	235	224	222	212	201	193	182	168	160	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,16	-0,12	-0,24	-0,11	-0,09	-0,07	-0,06	-0,01	-0,02	0,00	0,03	0,09	0,14	0,27	0,15	0,10	
		CI mittlere Differenz		[-0,22; -0,06]	[-0,24; -0,07]	[-0,22; -0,03]	[-0,35; -0,13]	[-0,23; -0,02]	[-0,21; -0,04]	[-0,20; -0,07]	[-0,16; -0,14]	[-0,17; -0,14]	[-0,15; -0,15]	[-0,13; -0,20]	[-0,06; -0,24]	[-0,02; -0,29]	[0,10; 0,44]	[-0,03; 0,33]	[-0,09; 0,28]		
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,10			
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454		
	auswertbar	Anzahl	1900	1407	1203	1044	917	821	703	660	639	634	613	578	546	524	500	475	440		
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,45	7,24	7,31	7,19	7,26	7,23	7,26	7,20	7,24	7,17	7,27	7,25	7,30	7,24	7,34	7,31	7,38		
		CI Mean	[7,38; 7,51]	[7,18; 7,30]	[7,24; 7,37]	[7,12; 7,26]	[7,19; 7,34]	[7,15; 7,30]	[7,18; 7,35]	[7,12; 7,28]	[7,16; 7,33]	[7,09; 7,26]	[7,18; 7,36]	[7,17; 7,34]	[7,20; 7,39]	[7,14; 7,33]	[7,25; 7,44]	[7,21; 7,41]	[7,27; 7,49]		
		Median	7,20	7,00	7,10	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10	7,20	7,20	7,20		
		Fallbasis mittlere Differenz		1407	1203	1044	917	821	703	660	639	634	613	578	546	524	500	475	440		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,07	-0,16	-0,09	-0,10	-0,06	-0,11	-0,07	-0,12	-0,01	0,00	0,02	-0,04	0,07	0,05	0,16		
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,11]	[-0,13; 0,00]	[-0,23; -0,09]	[-0,16; -0,01]	[-0,19; -0,02]	[-0,15; -0,03]	[-0,20; -0,02]	[-0,17; -0,02]	[-0,21; -0,02]	[-0,11; -0,09]	[-0,10; -0,09]	[-0,08; -0,13]	[-0,15; -0,06]	[-0,05; -0,18]	[-0,08; -0,17]	[0,03; 0,29]		
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728			
	auswertbar	Anzahl	3007	2261	1932	1644	1411	1241	1188	1132	1069	1002	939	877	828	795	748	715			
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,41	7,28	7,13	7,17	7,12	7,20	7,15	7,13	7,13	7,13	7,21	7,17	7,24	7,20	7,30	7,25	7,29		
		CI Mean	[7,36; 7,46]	[7,23; 7,33]	[7,08; 7,19]	[7,12; 7,23]	[7,06; 7,17]	[7,14; 7,26]	[7,08; 7,21]	[7,07; 7,19]	[7,07; 7,20]	[7,14; 7,27]	[7,10; 7,24]	[7,17; 7,31]	[7,13; 7,27]	[7,23; 7,38]	[7,17; 7,32]	[7,21; 7,37]			
		Median	7,20	7,10	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,10	7,20	7,10	7,20			
		Fallbasis mittlere Differenz		2259	1930	1642	1409	1239	1187	1131	1067	1001	939	877	828	795	748	715			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,11	-0,19	-0,13	-0,16	-0,08	-0,13	-0,14	-0,13	-0,04	-0,07	0,01	-0,04	0,07	0,01	0,05			
		CI mittlere Differenz		[-0,15; -0,07]	[-0,24; -0,14]	[-0,19; -0,08]	[-0,22; -0,10]	[-0,14; -0,01]	[-0,19; -0,06]	[-0,21; -0,07]	[-0,19; -0,06]	[-0,12; -0,03]	[-0,15; -0,01]	[-0,08; -0,09]	[-0,12; -0,04]	[-0,02; -0,16]	[-0,08; -0,10]	[-0,05; -0,14]			
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633				
	auswertbar	Anzahl	2054	1655	1415	1253	1099	1018	953	923	865	814	758	728	683	651	615				
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,49	7,14	7,18	7,12	7,16	7,15	7,15	7,15	7,20	7,19	7,24	7,23	7,34	7,29	7,32				
		CI Mean	[7,43; 7,56]	[7,08; 7,20]	[7,12; 7,25]	[7,05; 7,18]	[7,09; 7,23]	[7,07; 7,22]	[7,08; 7,22]	[7,08; 7,22]	[7,13; 7,28]	[7,11; 7,27]	[7,17; 7,32]	[7,15; 7,31]	[7,25; 7,43]	[7,20; 7,38]	[7,23; 7,41]				
		Median	7,20	6,90	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10				
		Fallbasis mittlere Differenz		1653	1413	1251	1097	1016	951	921	863	812	757	727	682	650	614				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,31	-0,22	-0,27	-0,19	-0,22	-0,19	-0,18	-0,11	-0,13	-0,06	-0,08	0,06	0,01	0,04				
		CI mittlere Differenz		[-0,36; -0,26]	[-0,28; -0,16]	[-0,34; -0,21]	[-0,26; -0,12]	[-0,30; -0,14]	[-0,26; -0,11]	[-0,27; -0,10]	[-0,19; -0,02]	[-0,22; -0,04]	[-0,15; -0,03]	[-0,18; -0,02]	[-0,04; -0,16]	[-0,10; -0,11]	[-0,07; -0,14]				
Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10						

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2626	2293	1953	1721	1604	1507	1407	1315	1218	1137	1054	995	935	870					
	auswertbar	Anzahl	2626	2140	1849	1622	1500	1430	1344	1262	1185	1101	1028	966	903	843					
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,41	7,34	7,26	7,28	7,22	7,26	7,24	7,29	7,21	7,32	7,30	7,37	7,40	7,45					
		CI Mean	[7,35; 7,46]	[7,29; 7,40]	[7,21; 7,32]	[7,22; 7,34]	[7,16; 7,28]	[7,20; 7,33]	[7,17; 7,30]	[7,22; 7,36]	[7,15; 7,27]	[7,25; 7,39]	[7,23; 7,37]	[7,30; 7,44]	[7,32; 7,48]	[7,36; 7,53]					
		Median	7,10	7,10	7,10	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,20	7,10	7,20	7,20	7,20					
		Fallbasis mittlere Differenz		2140	1849	1622	1500	1430	1344	1262	1185	1101	1028	966	903	843					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,04	-0,07	-0,05	-0,08	-0,04	-0,05	-0,01	-0,07	0,05	0,02	0,10	0,12	0,17					
		CI mittlere Differenz		[-0,08; 0,01]	[-0,12; -0,02]	[-0,10; 0,01]	[-0,15; -0,02]	[-0,11; 0,02]	[-0,12; 0,01]	[-0,08; 0,06]	[-0,14; 0,00]	[-0,03; 0,12]	[-0,06; 0,10]	[0,02; 0,18]	[0,03; 0,21]	[0,07; 0,26]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20					
2006-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2328	1992	1753	1596	1467	1357	1271	1177	1093	1037	966	905	847						
	auswertbar	Anzahl	2323	1920	1614	1489	1371	1306	1234	1139	1064	1009	942	876	816						
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,40	7,19	7,23	7,15	7,19	7,12	7,19	7,19	7,19	7,29	7,28	7,37	7,31	7,37					
		CI Mean	[7,34; 7,46]	[7,13; 7,24]	[7,17; 7,29]	[7,09; 7,21]	[7,13; 7,25]	[7,06; 7,18]	[7,12; 7,25]	[7,12; 7,26]	[7,22; 7,36]	[7,20; 7,35]	[7,30; 7,45]	[7,23; 7,39]	[7,28; 7,45]						
		Median	7,10	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10					
		Fallbasis mittlere Differenz		1918	1612	1488	1370	1305	1233	1138	1063	1008	942	876	816						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,08	-0,14	-0,10	-0,17	-0,08	-0,09	0,02	0,00	0,09	0,03	0,10						
		CI mittlere Differenz		[-0,20; -0,10]	[-0,14; -0,03]	[-0,19; -0,08]	[-0,16; -0,04]	[-0,24; -0,11]	[-0,15; -0,01]	[-0,16; -0,01]	[-0,05; 0,10]	[-0,08; 0,08]	[0,01; 0,17]	[-0,06; 0,11]	[0,01; 0,19]						
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,10	0,10						
2006-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1891	1674	1476	1329	1228	1134	1037	983	927	873	825	776							
	auswertbar	Anzahl	1887	1583	1377	1252	1163	1095	997	939	896	834	790	739							
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,37	7,26	7,23	7,20	7,19	7,25	7,23	7,30	7,31	7,35	7,32	7,38							
		CI Mean	[7,30; 7,43]	[7,20; 7,33]	[7,16; 7,30]	[7,14; 7,27]	[7,12; 7,26]	[7,18; 7,32]	[7,16; 7,31]	[7,23; 7,38]	[7,23; 7,39]	[7,27; 7,44]	[7,23; 7,40]	[7,29; 7,47]							
		Median	7,10	7,00	7,00	6,90	6,90	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10						
		Fallbasis mittlere Differenz		1580	1376	1251	1162	1094	997	939	896	834	790	739							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,10	-0,13	-0,12	-0,12	-0,02	-0,01	0,06	0,07	0,14	0,09	0,14							
		CI mittlere Differenz		[-0,15; -0,06]	[-0,18; -0,07]	[-0,18; -0,06]	[-0,18; -0,05]	[-0,09; 0,05]	[-0,08; 0,06]	[-0,02; 0,13]	[0,00; 0,15]	[0,06; 0,22]	[0,01; 0,18]	[0,05; 0,23]							
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,10	0,10	0,10	0,20							
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2002	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849								
	auswertbar	Anzahl	1999	1737	1541	1396	1280	1166	1074	999	930	860	788								
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,38	7,19	7,13	7,10	7,20	7,11	7,23	7,19	7,25	7,24	7,28								
		CI Mean	[7,31; 7,44]	[7,13; 7,25]	[7,07; 7,18]	[7,03; 7,16]	[7,13; 7,27]	[7,04; 7,17]	[7,15; 7,30]	[7,11; 7,26]	[7,18; 7,33]	[7,16; 7,32]	[7,20; 7,36]								
		Median	7,10	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	7,10	7,10	7,10	7,10								
		Fallbasis mittlere Differenz		1735	1540	1394	1278	1165	1073	998	929	859	787								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,20	-0,19	-0,08	-0,16	-0,04	-0,07	-0,01	-0,03	0,05								
		CI mittlere Differenz		[-0,20; -0,10]	[-0,26; -0,15]	[-0,25; -0,13]	[-0,15; -0,01]	[-0,23; -0,13]	[-0,12; 0,03]	[-0,15; 0,00]	[-0,09; 0,07]	[-0,11; 0,06]	[-0,04; 0,14]								
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10								
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1553	1419	1288	1173	1064	983	907	841	784	738									
	auswertbar	Anzahl	1550	1376	1225	1123	1034	932	871	810	757	701									
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,33	7,17	7,13	7,19	7,16	7,23	7,21	7,31	7,31	7,29	7,33								
		CI Mean	[7,26; 7,40]	[7,10; 7,23]	[7,07; 7,20]	[7,12; 7,26]	[7,09; 7,23]	[7,15; 7,31]	[7,13; 7,28]	[7,22; 7,39]	[7,20; 7,38]	[7,24; 7,43]									
		Median	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	7,00	7,10	7,10	7,10									
		Fallbasis mittlere Differenz		1373	1222	1120	1032	930	869	809	756	701									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,16	-0,05	-0,07	0,02	-0,02	0,07	0,05	0,12									
		CI mittlere Differenz		[-0,20; -0,09]	[-0,22; -0,10]	[-0,11; 0,02]	[-0,13; 0,00]	[-0,06; 0,09]	[-0,10; 0,06]	[-0,02; 0,16]	[-0,04; 0,14]	[0,02; 0,22]									
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10									
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1441	1266	1152	1018	932	861	811	758	718										
	auswertbar	Anzahl	1440	1202	1100	989	899	839	783	735	686										
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,38	7,05	7,13	7,09	7,11	7,08	7,16	7,13	7,18										
		CI Mean	[7,30; 7,45]	[6,98; 7,11]	[7,06; 7,20]	[7,02; 7,16]	[7,04; 7,18]	[7,00; 7,15]	[7,08; 7,24]	[7,05; 7,22]	[7,09; 7,27]										
		Median	7,00	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90										
		Fallbasis mittlere Differenz		1202	1100	989	899	839	783	735	686										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,27	-0,19	-0,24	-0,22	-0,24	-0,13	-0,18	-0,14										
		CI mittlere Differenz		[-0,34; -0,21]	[-0,26; -0,12]	[-0,31; -0,16]	[-0,30; -0,13]	[-0,34; -0,15]	[-0,23; -0,03]	[-0,29; -0,08]	[-0,25; -0,03]										
		Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	826	748	656	588	551	519	481	448										
	auswertbar	Anzahl	822	727	636	567	534	500	461	426										
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,33	7,10	7,10	7,13	7,06	7,16	7,10	7,11										
		CI Mean	[7,22; 7,43]	[7,01; 7,20]	[7,01; 7,20]	[7,03; 7,23]	[6,96; 7,15]	[7,06; 7,26]	[7,00; 7,20]	[7,00; 7,21]										
		Median	6,90	6,80	6,80	6,80	6,85	7,00	6,90	6,90										
		Fallbasis mittlere Differenz		725	634	566	533	499	460	425										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,15	-0,11	-0,12	-0,02	-0,06	-0,03										
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,07]	[-0,26; -0,05]	[-0,22; 0,00]	[-0,23; 0,01]	[-0,14; 0,10]	[-0,19; 0,06]	[-0,16; 0,10]										
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1266	1098	984	894	834	772	717											
	auswertbar	Anzahl	1265	1075	959	871	808	752	692											
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,55	7,23	7,24	7,26	7,28	7,22	7,31											
		CI Mean	[7,47; 7,64]	[7,16; 7,31]	[7,16; 7,32]	[7,18; 7,35]	[7,19; 7,36]	[7,13; 7,31]	[7,22; 7,41]											
		Median	7,20	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10											
		Fallbasis mittlere Differenz		1074	958	870	807	751	691											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,27	-0,19	-0,18	-0,19	-0,23	-0,14											
		CI mittlere Differenz		[-0,34; -0,20]	[-0,28; -0,11]	[-0,27; -0,09]	[-0,28; 0,09]	[-0,33; 0,12]	[-0,25; 0,03]											
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00													
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	950	847	758	693	640	587												
	auswertbar	Anzahl	949	834	738	678	616	570												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,56	7,34	7,29	7,30	7,28	7,30												
		CI Mean	[7,46; 7,65]	[7,25; 7,43]	[7,19; 7,38]	[7,21; 7,40]	[7,18; 7,37]	[7,20; 7,40]												
		Median	7,20	7,00	7,00	7,10	7,10	7,00												
		Fallbasis mittlere Differenz		833	737	677	615	569												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,20	-0,18	-0,19	-0,15												
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,08]	[-0,30; -0,10]	[-0,28; -0,08]	[-0,30; -0,08]	[-0,26; -0,04]												
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1055	926	835	739	676													
	auswertbar	Anzahl	1052	902	805	718	655													
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,56	7,17	7,20	7,12	7,13													
		CI Mean	[7,45; 7,66]	[7,09; 7,26]	[7,11; 7,28]	[7,03; 7,20]	[7,04; 7,23]													
		Median	7,10	6,90	6,90	6,80	6,90													
		Fallbasis mittlere Differenz		901	804	718	655													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,34	-0,25	-0,32	-0,32													
		CI mittlere Differenz		[-0,44; -0,24]	[-0,35; -0,15]	[-0,43; -0,21]	[-0,44; -0,19]													
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	-0,10															
2010-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1015	904	788	719														
	auswertbar	Anzahl	1011	892	781	694														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,59	7,33	7,20	7,24														
		CI Mean	[7,50; 7,69]	[7,24; 7,41]	[7,11; 7,29]	[7,15; 7,34]														
		Median	7,20	7,05	6,90	6,95														
		Fallbasis mittlere Differenz		888	778	691														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,23	-0,33	-0,26														
		CI mittlere Differenz		[-0,32; -0,15]	[-0,42; -0,24]	[-0,36; -0,16]														
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10																
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1045	907	794															
	auswertbar	Anzahl	1042	895	773															
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,63	7,22	7,18															
		CI Mean	[7,53; 7,73]	[7,13; 7,31]	[7,09; 7,27]															
		Median	7,20	6,90	6,90															
		Fallbasis mittlere Differenz		893	771															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,39	-0,40															
		CI mittlere Differenz		[-0,47; -0,30]	[-0,50; -0,29]															
Median mittlere Differenz		-0,20	-0,20																	

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	926	784																			
	auswertbar	Anzahl	925	766																			
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,53	7,24																			
		CI Mean	[7,43; 7,64]	[7,15; 7,34]																			
		Median	7,00	6,90																			
		Fallbasis mittlere Differenz		765																			
		Mittlere Differenz zur ED			-0,28																		
		CI mittlere Differenz			[-0,36; - 0,19]																		
		Median mittlere Differenz			-0,10																		
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	920																				
	auswertbar	Anzahl	917																				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,65																				
		CI Mean	[7,54; 7,76]																				
		Median	7,10																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
		Median mittlere Differenz																					

In Tabelle C.3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalb-jahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalb-jahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalb-jahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halb-jahr - - Patienten in das Programm eingeschrieben. Für - - Patienten lagen auswertbare Daten vor. - - Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalb-jahr wurden dieser Kategorie - - Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

**Tabelle C.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten**

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	auswertbar	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	CI Anteil in %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2003-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	741	596	500	428	372	335	303	274	260	245	236	226	214	205	198	186	172	163	
	auswertbar	Anzahl	741	532	486	419	367	329	303	265	252	235	224	222	212	201	193	182	168	160	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	75	63	43	38	45	33	39	30	29	26	25	16	20	17	17	9	12	14	
		Anteil in %	10,12	11,84	8,85	9,07	12,26	10,03	12,87	11,32	11,51	11,06	11,16	7,21	9,43	8,46	8,81	4,95	7,14	8,75	
		CI Anteil in %	[7,95; 12,29]	[9,09; 14,59]	[6,32; 11,38]	[6,32; 11,82]	[8,90; 15,62]	[6,78; 13,28]	[9,09; 16,65]	[7,50; 15,14]	[7,56; 15,46]	[7,04; 15,08]	[7,03; 15,29]	[3,80; 10,62]	[5,49; 13,38]	[4,60; 12,31]	[4,80; 12,82]	[1,79; 8,10]	[3,24; 11,05]	[4,36; 13,14]	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	387	300	300	252	224	193	163	154	142	144	138	147	122	114	109	109	100	96	
		Anteil in %	52,23	56,39	61,73	60,14	61,04	58,66	53,80	58,11	56,35	61,28	61,61	66,22	57,55	56,72	56,48	59,89	59,52	60,00	
		CI Anteil in %	[48,63; 55,83]	[52,17; 60,61]	[57,40; 66,05]	[55,45; 64,84]	[56,04; 66,03]	[53,33; 63,99]	[48,17; 59,42]	[52,16; 64,06]	[50,21; 62,48]	[55,04; 67,52]	[55,22; 67,99]	[59,98; 72,45]	[50,88; 64,22]	[49,85; 63,58]	[49,46; 63,49]	[52,75; 67,03]	[52,08; 66,97]	[52,39; 67,61]	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	149	99	98	91	71	65	69	61	60	46	45	43	59	51	50	39	35	34	
		Anteil in %	20,11	18,61	20,16	21,72	19,35	19,76	22,77	23,02	23,81	19,57	20,09	19,37	27,83	25,37	25,91	21,43	20,83	21,25	
		CI Anteil in %	[17,22; 23,00]	[15,30; 21,92]	[16,59; 23,74]	[17,77; 25,67]	[15,30; 23,39]	[15,45; 24,07]	[18,04; 27,50]	[17,94; 28,10]	[18,54; 29,08]	[14,49; 24,66]	[14,83; 25,35]	[14,16; 24,58]	[21,78; 33,88]	[19,34; 31,40]	[19,71; 32,10]	[15,45; 27,41]	[14,67; 26,99]	[14,89; 27,61]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	103	56	31	30	17	33	23	15	17	15	13	14	10	19	16	24	20	14	
		Anteil in %	13,90	10,53	6,38	7,16	4,63	10,03	7,59	5,66	6,75	6,38	5,80	6,31	4,72	9,45	8,29	13,19	11,90	8,75	
		CI Anteil in %	[11,41; 16,39]	[7,92; 13,14]	[4,20; 8,55]	[4,69; 9,63]	[2,48; 6,79]	[6,78; 13,28]	[4,60; 10,58]	[2,87; 8,45]	[3,64; 9,85]	[3,25; 9,52]	[2,73; 8,87]	[3,10; 9,51]	[1,86; 7,58]	[5,40; 13,51]	[4,39; 12,19]	[8,26; 18,12]	[6,99; 16,82]	[4,36; 13,14]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	27	14	14	8	10	5	9	5	4	4	3	2	1	0	1	1	1	2		
	Anteil in %	3,64	2,63	2,88	1,91	2,72	1,52	2,97	1,89	1,59	1,70	1,34	0,90	0,47	0,00	0,52	0,55	0,60	1,25		
	CI Anteil in %	[2,29; 4,99]	[1,27; 3,99]	[1,39; 4,37]	[0,60; 3,22]	[1,06; 4,39]	[0,20; 2,84]	[1,06; 4,89]	[0,25; 3,53]	[0,04; 3,13]	[0,04; 3,36]	[0,00; 2,85]	[0,00; 2,15]	[0,00; 1,40]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,53]	[0,00; 1,63]	[0,00; 1,76]	[0,00; 2,98]		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1900	1600	1278	1069	951	833	755	710	676	649	627	587	556	527	505	480	454	
	auswertbar	Anzahl	1900	1407	1203	1044	917	821	703	660	639	634	613	578	546	524	500	475	440	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	229	184	139	127	99	95	78	76	67	74	59	65	60	52	45	45	37	
		Anteil in %	12,05	13,08	11,55	12,16	10,80	11,57	11,10	11,52	10,49	11,67	9,62	11,25	10,99	9,92	9,00	9,47	8,41	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[10,59; 13,52]	[11,32; 14,84]	[9,75; 13,36]	[10,18; 14,15]	[8,79; 12,81]	[9,38; 13,76]	[8,77; 13,42]	[9,08; 13,95]	[8,11; 12,86]	[9,17; 14,17]	[7,29; 11,96]	[8,67; 13,82]	[8,36; 13,61]	[7,36; 12,49]	[6,49; 11,51]	[6,84; 12,11]	[5,81; 11,01]	
		Anzahl	923	772	658	614	513	478	406	387	370	379	356	322	305	309	280	263	246	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	48,58	54,87	54,70	58,81	55,94	58,22	57,75	58,64	57,90	59,78	58,08	55,71	55,86	58,97	56,00	55,37	55,91	
		CI Anteil in %	[46,33; 50,83]	[52,27; 57,47]	[51,88; 57,51]	[55,83; 61,80]	[52,73; 59,16]	[54,85; 61,60]	[54,10; 61,41]	[54,88; 62,40]	[54,07; 61,73]	[55,96; 63,60]	[54,17; 61,98]	[51,66; 59,76]	[51,69; 60,03]	[54,75; 63,19]	[51,64; 60,36]	[50,89; 59,84]	[51,26; 60,55]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	409	274	246	201	201	162	141	127	132	118	120	115	105	105	106	113	93	
		Anteil in %	21,53	19,47	20,45	19,25	21,92	19,73	20,06	19,24	20,66	18,61	19,58	19,90	19,23	20,04	21,20	23,79	21,14	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[19,68; 23,37]	[17,40; 21,54]	[18,17; 22,73]	[16,86; 21,65]	[19,24; 24,60]	[17,01; 22,46]	[17,09; 23,02]	[16,23; 22,25]	[17,52; 23,80]	[15,58; 21,64]	[16,43; 22,72]	[16,64; 23,15]	[15,92; 22,54]	[16,61; 23,47]	[17,61; 24,79]	[19,96; 27,62]	[17,32; 24,96]	
		Anzahl	247	137	123	69	77	73	61	58	56	51	63	66	64	47	60	47	54	
		Anteil in %	13,00	9,74	10,22	6,61	8,40	8,89	8,68	8,79	8,76	8,04	10,28	11,42	11,72	8,97	12,00	9,89	12,27	
		CI Anteil in %	[11,49; 14,51]	[8,19; 11,29]	[8,51; 11,94]	[5,10; 8,12]	[6,60; 10,19]	[6,94; 10,84]	[6,59; 10,76]	[6,63; 10,95]	[6,57; 10,96]	[5,93; 10,16]	[7,87; 12,68]	[8,82; 14,01]	[9,02; 14,42]	[6,52; 11,42]	[9,15; 14,85]	[7,21; 12,58]	[9,20; 15,34]	
		Anzahl	92	40	37	33	27	13	17	12	14	12	15	10	12	11	9	7	10	
		Anteil in %	4,84	2,84	3,08	3,16	2,94	1,58	2,42	1,82	2,19	1,89	2,45	1,73	2,20	2,10	1,80	1,47	2,27	
		CI Anteil in %	[3,88; 5,81]	[1,97; 3,71]	[2,10; 4,05]	[2,10; 4,22]	[1,85; 4,04]	[0,73; 2,44]	[1,28; 3,55]	[0,80; 2,84]	[1,06; 3,33]	[0,83; 2,95]	[1,22; 3,67]	[0,67; 2,79]	[0,97; 3,43]	[0,87; 3,33]	[0,63; 2,97]	[0,39; 2,56]	[0,88; 3,67]	
		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	3009	2474	2012	1697	1468	1311	1251	1179	1105	1036	968	900	853	809	767	728	
2004-2	auswertbar	Anzahl	3007	2261	1932	1644	1411	1241	1188	1132	1069	1002	939	877	828	795	748	715		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	369	273	280	214	178	137	155	137	126	110	109	92	77	62	70	70		
		Anteil in %	12,27	12,07	14,49	13,02	12,62	11,04	13,05	12,10	11,79	10,98	11,61	10,49	9,30	7,80	9,36	9,79		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[11,10; 13,44]	[10,73; 13,42]	[12,92; 16,06]	[11,39; 14,64]	[10,88; 14,35]	[9,30; 12,78]	[11,13; 14,96]	[10,20; 14,00]	[9,85; 13,72]	[9,04; 12,91]	[9,56; 13,66]	[8,46; 12,52]	[7,32; 11,28]	[5,93; 9,66]	[7,27; 11,45]	[7,61; 11,97]		
		Anzahl	1497	1228	1088	942	852	728	677	661	641	572	540	502	497	467	437	401		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	49,78	54,31	56,31	57,30	60,38	58,66	56,99	58,39	59,96	57,09	57,51	57,24	60,02	58,74	58,42	56,08		
		CI Anteil in %	[48,00; 51,57]	[52,26; 56,37]	[54,10; 58,53]	[54,91; 59,69]	[57,83; 62,94]	[55,92; 61,40]	[54,17; 59,80]	[55,52; 61,26]	[57,02; 62,90]	[54,02; 60,15]	[54,34; 60,67]	[53,96; 60,52]	[56,69; 63,36]	[55,32; 62,17]	[54,89; 61,96]	[52,44; 59,72]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	622	450	359	301	257	249	231	226	199	206	202	191	182	178	155	165		
		Anteil in %	20,69	19,90	18,58	18,31	18,21	20,06	19,44	19,96	18,62	20,56	21,51	21,78	21,98	22,39	20,72	23,08		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[19,24; 22,13]	[18,26; 21,55]	[16,85; 20,32]	[16,44; 20,18]	[16,20; 20,23]	[17,84; 22,29]	[17,19; 21,70]	[17,63; 22,29]	[16,28; 20,95]	[18,06; 23,06]	[18,88; 24,14]	[19,05; 24,51]	[19,16; 24,80]	[19,49; 25,29]	[17,82; 23,63]	[19,99; 26,17]		
		Anzahl	378	245	157	150	88	92	101	89	84	102	67	75	61	73	76	62		
		Anteil in %	12,57	10,84	8,13	9,12	6,24	7,41	8,50	7,86	7,86	10,18	7,14	8,55	7,37	9,18	10,16	8,67		
		CI Anteil in %	[11,39; 13,76]	[9,55; 12,12]	[6,91; 9,35]	[7,73; 10,52]	[4,97; 7,50]	[5,96; 8,87]	[6,92; 10,09]	[6,29; 9,43]	[6,24; 9,47]	[8,31; 12,05]	[5,49; 8,78]	[6,70; 10,40]	[5,59; 9,15]	[7,17; 11,19]	[7,99; 12,33]	[6,61; 10,74]		
		Anzahl	141	65	48	37	36	35	24	19	19	12	21	17	11	15	10	17		
		Anteil in %	4,69	2,87	2,48	2,25	2,55	2,82	2,02	1,68	1,78	1,20	2,24	1,94	1,33	1,89	1,34	2,38		
		CI Anteil in %	[3,93; 5,44]	[2,19; 3,56]	[1,79; 3,18]	[1,53; 2,97]	[1,73; 3,37]	[1,90; 3,74]	[1,22; 2,82]	[0,93; 2,43]	[0,98; 2,57]	[0,52; 1,87]	[1,29; 3,18]	[1,03; 2,85]	[0,55; 2,11]	[0,94; 2,83]	[0,51; 2,16]	[1,26; 3,50]		
		<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2057	1731	1484	1286	1155	1075	1004	958	894	840	784	740	703	663	633		
	2005-1	auswertbar	Anzahl	2054	1655	1415	1253	1099	1018	953	923	865	814	758	728	683	651	615		
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	231	261	189	175	142	132	121	112	105	96	78	79	66	65	58			
		Anteil in %	11,25	15,77	13,36	13,97	12,92	12,97	12,70	12,13	12,14	11,79	10,29	10,85	9,66	9,98	9,43			
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5		CI Anteil in %	[9,88; 12,61]	[14,01; 17,53]	[11,58; 15,13]	[12,05; 15,89]	[10,94; 14,90]	[10,90; 15,03]	[10,58; 14,81]	[10,03; 14,24]	[9,96; 14,32]	[9,58; 14,01]	[8,13; 12,45]	[8,59; 13,11]	[7,45; 11,88]	[7,68; 12,29]	[7,12; 11,74]			
		Anzahl	1028	922	795	730	653	591	555	548	497	478	435	427	370	365	352			
erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5		Anteil in %	50,05	55,71	56,18	58,26	59,42	58,06	58,24	59,37	57,46	58,72	57,39	58,65	54,17	56,07	57,24			
		CI Anteil in %	[47,89; 52,21]	[53,32; 58,10]	[53,60; 58,77]	[55,53; 60,99]	[56,51; 62,32]	[55,02; 61,09]	[55,10; 61,37]	[56,20; 62,54]	[54,16; 60,75]	[55,34; 62,11]	[53,87; 60,91]	[55,07; 62,23]	[50,43; 57,91]	[52,25; 59,88]	[53,32; 61,15]			
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0		Anzahl	404	271	261	229	184	199	174	174	167	147	160	136	150	136	127			
		Anteil in %	19,67	16,37	18,45	18,28	16,74	19,55	18,26	18,85	19,31	18,06	21,11	18,68	21,96	20,89	20,65			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0		CI Anteil in %	[17,95; 21,39]	[14,59; 18,16]	[16,42; 20,47]	[16,14; 20,42]	[14,53; 18,95]	[17,11; 21,99]	[15,80; 20,71]	[16,33; 21,38]	[16,67; 21,94]	[15,41; 20,70]	[18,20; 24,02]	[15,85; 21,51]	[18,85; 25,07]	[17,77; 24,02]	[17,45; 23,85]			
		Anzahl	264	155	124	84	91	63	85	62	79	72	69	70	77	64	60			
		Anteil in %	12,85	9,37	8,76	6,70	8,28	6,19	8,92	6,72	9,13	8,85	9,10	9,62	11,27	9,83	9,76			
		CI Anteil in %	[11,41; 14,30]	[7,96; 10,77]	[7,29; 10,24]	[5,32; 8,09]	[6,65; 9,91]	[4,71; 7,67]	[7,11; 10,73]	[5,10; 8,33]	[7,21; 11,05]	[6,89; 10,80]	[7,05; 11,15]	[7,47; 11,76]	[8,90; 13,65]	[7,54; 12,12]	[7,41; 12,10]			
		Anzahl	127	46	46	35	29	33	18	27	17	21	16	16	20	21	18			
		Anteil in %	6,18	2,78	3,25	2,79	2,64	3,24	1,89	2,93	1,97	2,58	2,11	2,20	2,93	3,23	2,93			
		CI Anteil in %	[5,14; 7,22]	[1,99; 3,57]	[2,33; 4,18]	[1,88; 3,71]	[1,69; 3,59]	[2,15; 4,33]	[1,02; 2,75]	[1,84; 4,01]	[1,04; 2,89]	[1,49; 3,67]	[1,09; 3,13]	[1,13; 3,26]	[1,66; 4,19]	[1,87; 4,58]	[1,59; 4,26]			



EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	2002	1786	1617	1493	1357	1236	1133	1060	990	920	849								
	auswertbar	Anzahl	1999	1737	1541	1396	1280	1166	1074	999	930	860	788								
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	251	259	233	230	175	168	133	131	92	94	83								
		Anteil in %	12,56	14,91	15,12	16,48	13,67	14,41	12,38	13,11	9,89	10,93	10,53								
	CI Anteil in %	[11,10; 14,01]	[13,24; 16,59]	[13,33; 16,91]	[14,53; 18,42]	[11,79; 15,55]	[12,39; 16,42]	[10,41; 14,35]	[11,02; 15,21]	[7,97; 11,81]	[8,84; 13,02]	[8,39; 12,68]									
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	1028	948	879	774	710	681	600	546	533	486	428								
		Anteil in %	51,43	54,58	57,04	55,44	55,47	58,40	55,87	54,65	57,31	56,51	54,31								
	CI Anteil in %	[49,23; 53,62]	[52,23; 56,92]	[54,57; 59,51]	[52,84; 58,05]	[52,74; 58,19]	[55,57; 61,24]	[52,89; 58,84]	[51,57; 57,74]	[54,13; 60,49]	[53,20; 59,83]	[50,83; 57,80]									
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	378	308	266	244	246	198	223	216	198	191	176								
		Anteil in %	18,91	17,73	17,26	17,48	19,22	16,98	20,76	21,62	21,29	22,21	22,34								
	CI Anteil in %	[17,19; 20,63]	[15,94; 19,53]	[15,37; 19,15]	[15,49; 19,47]	[17,06; 21,38]	[14,83; 19,14]	[18,34; 23,19]	[19,07; 24,18]	[18,66; 23,92]	[19,43; 24,99]	[19,43; 25,24]									
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	243	167	113	120	108	89	88	80	83	64	83									
	Anteil in %	12,16	9,61	7,33	8,60	8,44	7,63	8,19	8,01	8,92	7,44	10,53									
CI Anteil in %	[10,72; 13,59]	[8,23; 11,00]	[6,03; 8,63]	[7,13; 10,07]	[6,91; 9,96]	[6,11; 9,16]	[6,55; 9,83]	[6,32; 9,69]	[7,09; 10,76]	[5,69; 9,20]	[8,39; 12,68]										
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	99	55	50	28	41	30	30	26	24	25	18									
	Anteil in %	4,95	3,17	3,24	2,01	3,20	2,57	2,79	2,60	2,58	2,91	2,28									
CI Anteil in %	[4,00; 5,90]	[2,34; 3,99]	[2,36; 4,13]	[1,27; 2,74]	[2,24; 4,17]	[1,66; 3,48]	[1,81; 3,78]	[1,61; 3,59]	[1,56; 3,60]	[1,78; 4,03]	[1,24; 3,33]										
2007-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1553	1419	1288	1173	1064	983	907	841	784	738									
	auswertbar	Anzahl	1550	1376	1225	1123	1034	932	871	810	757	701									
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	178	201	186	140	133	120	102	90	86	85									
		Anteil in %	11,48	14,61	15,18	12,47	12,86	12,88	11,71	11,11	11,36	12,13									
	CI Anteil in %	[9,90; 13,07]	[12,74; 16,47]	[13,17; 17,19]	[10,53; 14,40]	[10,82; 14,90]	[10,72; 15,03]	[9,57; 13,85]	[8,95; 13,28]	[9,10; 13,62]	[9,71; 14,54]										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	884	777	692	642	598	523	516	460	429	369									
		Anteil in %	57,03	56,47	56,49	57,17	57,83	56,12	59,24	56,79	56,67	52,64									
	CI Anteil in %	[54,57; 59,50]	[53,85; 59,09]	[53,71; 59,27]	[54,27; 60,06]	[54,82; 60,85]	[52,93; 59,30]	[55,98; 62,51]	[53,38; 60,20]	[53,14; 60,20]	[48,94; 56,34]										
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	250	224	217	206	193	178	153	149	135	140									
		Anteil in %	16,13	16,28	17,71	18,34	18,67	19,10	17,57	18,40	17,83	19,97									
	CI Anteil in %	[14,30; 17,96]	[14,33; 18,23]	[15,58; 19,85]	[16,08; 20,61]	[16,29; 21,04]	[16,57; 21,62]	[15,04; 20,09]	[15,73; 21,06]	[15,10; 20,56]	[17,01; 22,93]										
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	155	128	98	106	89	81	78	85	81	80										
	Anteil in %	10,00	9,30	8,00	9,44	8,61	8,69	8,96	10,49	10,70	11,41										
CI Anteil in %	[8,51; 11,49]	[7,77; 10,84]	[6,48; 9,52]	[7,73; 11,15]	[6,90; 10,32]	[6,88; 10,50]	[7,06; 10,85]	[8,38; 12,61]	[8,50; 12,90]	[9,06; 13,77]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	83	46	32	29	21	30	22	26	26	27										
	Anteil in %	5,35	3,34	2,61	2,58	2,03	3,22	2,53	3,21	3,43	3,85										
CI Anteil in %	[4,23; 6,48]	[2,39; 4,29]	[1,72; 3,51]	[1,65; 3,51]	[1,17; 2,89]	[2,09; 4,35]	[1,48; 3,57]	[2,00; 4,42]	[2,14; 4,73]	[2,43; 5,28]											
2008-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1441	1266	1152	1018	932	861	811	758	718										
	auswertbar	Anzahl	1440	1202	1100	989	899	839	783	735	686										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	202	204	136	141	115	120	99	98	80										
		Anteil in %	14,03	16,97	12,36	14,26	12,79	14,30	12,64	13,33	11,66										
	CI Anteil in %	[12,23; 15,82]	[14,85; 19,09]	[10,42; 14,31]	[12,08; 16,44]	[10,61; 14,98]	[11,93; 16,67]	[10,31; 14,97]	[10,87; 15,79]	[9,26; 14,07]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	751	668	652	586	533	506	450	438	405										
		Anteil in %	52,15	55,57	59,27	59,25	59,29	60,31	57,47	59,59	59,04										
	CI Anteil in %	[49,57; 54,73]	[52,76; 58,38]	[56,37; 62,18]	[56,19; 62,32]	[56,07; 62,50]	[57,00; 63,62]	[54,01; 60,94]	[56,04; 63,14]	[55,36; 62,72]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	236	202	197	162	165	128	148	113	120										
		Anteil in %	16,39	16,81	17,91	16,38	18,35	15,26	18,90	15,37	17,49										
	CI Anteil in %	[14,48; 18,30]	[14,69; 18,92]	[15,64; 20,18]	[14,07; 18,69]	[15,82; 20,89]	[12,82; 17,69]	[16,16; 21,65]	[12,76; 17,98]	[14,65; 20,34]											
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	158	96	85	76	69	67	64	70	60											
	Anteil in %	10,97	7,99	7,73	7,68	7,68	7,99	8,17	9,52	8,75											
CI Anteil in %	[9,36; 12,59]	[6,45; 9,52]	[6,15; 9,31]	[6,02; 9,35]	[5,93; 9,42]	[6,15; 9,82]	[6,25; 10,09]	[7,40; 11,65]	[6,63; 10,86]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	93	32	30	24	17	18	22	16	21											
	Anteil in %	6,46	2,66	2,73	2,43	1,89	2,15	2,81	2,18	3,06											
CI Anteil in %	[5,19; 7,73]	[1,75; 3,57]	[1,76; 3,69]	[1,47; 3,39]	[1,00; 2,78]	[1,16; 3,13]	[1,65; 3,97]	[1,12; 3,23]	[1,77; 4,35]												

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2008-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	826	748	656	588	551	519	481	448											
	auswertbar	Anzahl	822	727	636	567	534	500	461	426											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	96	109	87	76	72	56	55	52											
		Anteil in %	11,68	14,99	13,68	13,40	13,48	11,20	11,93	12,21											
	CI Anteil in %	[9,48; 13,88]	[12,40; 17,59]	[11,01; 16,35]	[10,60; 16,21]	[10,58; 16,38]	[8,43; 13,97]	[8,97; 14,89]	[9,09; 15,32]												
		CI Anteil in %	[53,67; 60,44]	[54,46; 61,64]	[56,57; 64,18]	[57,01; 65,04]	[57,86; 66,11]	[58,15; 66,65]	[57,83; 66,69]	[55,44; 64,75]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	469	422	384	346	331	312	287	256											
		Anteil in %	57,06	58,05	60,38	61,02	61,99	62,40	62,26	60,09											
	CI Anteil in %	[12,64; 17,53]	[13,42; 18,77]	[12,60; 18,22]	[11,24; 16,98]	[12,12; 18,21]	[12,23; 18,57]	[13,29; 20,11]	[14,85; 22,24]												
		CI Anteil in %	[12,64; 17,53]	[13,42; 18,77]	[12,60; 18,22]	[11,24; 16,98]	[12,12; 18,21]	[12,23; 18,57]	[13,29; 20,11]	[14,85; 22,24]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	124	117	98	80	81	77	77	79											
		Anteil in %	15,09	16,09	15,41	14,11	15,17	15,40	16,70	18,54											
	CI Anteil in %	[7,93; 12,03]	[5,89; 9,80]	[6,18; 10,48]	[6,17; 10,76]	[4,77; 9,08]	[6,14; 11,06]	[4,80; 9,51]	[4,22; 8,93]												
		CI Anteil in %	[7,93; 12,03]	[5,89; 9,80]	[6,18; 10,48]	[6,17; 10,76]	[4,77; 9,08]	[6,14; 11,06]	[4,80; 9,51]	[4,22; 8,93]											
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	82	57	53	48	37	43	33	28												
	Anteil in %	9,98	7,84	8,33	8,47	6,93	8,60	7,16	6,57												
CI Anteil in %	[7,93; 12,03]	[5,89; 9,80]	[6,18; 10,48]	[6,17; 10,76]	[4,77; 9,08]	[6,14; 11,06]	[4,80; 9,51]	[4,22; 8,93]													
	CI Anteil in %	[7,93; 12,03]	[5,89; 9,80]	[6,18; 10,48]	[6,17; 10,76]	[4,77; 9,08]	[6,14; 11,06]	[4,80; 9,51]	[4,22; 8,93]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	51	22	14	17	13	12	9	11												
	Anteil in %	6,20	3,03	2,20	3,00	2,43	2,40	1,95	2,58												
CI Anteil in %	[4,55; 7,85]	[1,78; 4,27]	[1,06; 3,34]	[1,59; 4,40]	[1,13; 3,74]	[1,06; 3,74]	[0,69; 3,22]	[1,07; 4,09]													
	CI Anteil in %	[4,55; 7,85]	[1,78; 4,27]	[1,06; 3,34]	[1,59; 4,40]	[1,13; 3,74]	[1,06; 3,74]	[0,69; 3,22]	[1,07; 4,09]												
2009-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1266	1098	984	894	834	772	717												
	auswertbar	Anzahl	1265	1075	959	871	808	752	692												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	123	147	146	106	98	103	89												
		Anteil in %	9,72	13,67	15,22	12,17	12,13	13,70	12,86												
	CI Anteil in %	[8,09; 11,36]	[11,62; 15,73]	[12,95; 17,50]	[10,00; 14,34]	[9,88; 14,38]	[11,24; 16,16]	[10,37; 15,36]													
		CI Anteil in %	[8,09; 11,36]	[11,62; 15,73]	[12,95; 17,50]	[10,00; 14,34]	[9,88; 14,38]	[11,24; 16,16]	[10,37; 15,36]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	643	595	506	467	446	420	370												
		Anteil in %	50,83	55,35	52,76	53,62	55,20	55,85	53,47												
	CI Anteil in %	[48,07; 53,59]	[52,38; 58,32]	[49,60; 55,92]	[50,30; 56,93]	[51,77; 58,63]	[52,30; 59,40]	[49,75; 57,19]													
		CI Anteil in %	[48,07; 53,59]	[52,38; 58,32]	[49,60; 55,92]	[50,30; 56,93]	[51,77; 58,63]	[52,30; 59,40]	[49,75; 57,19]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	241	183	172	184	163	135	132												
		Anteil in %	19,05	17,02	17,94	21,13	20,17	17,95	19,08												
	CI Anteil in %	[16,89; 21,22]	[14,78; 19,27]	[15,51; 20,36]	[18,41; 23,84]	[17,40; 22,94]	[15,21; 20,70]	[16,15; 22,00]													
		CI Anteil in %	[16,89; 21,22]	[14,78; 19,27]	[15,51; 20,36]	[18,41; 23,84]	[17,40; 22,94]	[15,21; 20,70]	[16,15; 22,00]												
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	170	108	104	83	74	69	74													
	Anteil in %	13,44	10,05	10,84	9,53	9,16	9,18	10,69													
CI Anteil in %	[11,56; 15,32]	[8,25; 11,84]	[8,88; 12,81]	[7,58; 11,48]	[7,17; 11,15]	[7,11; 11,24]	[8,39; 13,00]														
	CI Anteil in %	[11,56; 15,32]	[8,25; 11,84]	[8,88; 12,81]	[7,58; 11,48]	[7,17; 11,15]	[7,11; 11,24]	[8,39; 13,00]													
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	88	42	31	31	27	25	27													
	Anteil in %	6,96	3,91	3,23	3,56	3,34	3,32	3,90													
CI Anteil in %	[5,55; 8,36]	[2,75; 5,07]	[2,11; 4,35]	[2,33; 4,79]	[2,10; 4,58]	[2,04; 4,61]	[2,46; 5,35]														
	CI Anteil in %	[5,55; 8,36]	[2,75; 5,07]	[2,11; 4,35]	[2,33; 4,79]	[2,10; 4,58]	[2,04; 4,61]	[2,46; 5,35]													
2009-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	950	847	758	693	640	587													
	auswertbar	Anzahl	949	834	738	678	616	570													
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	90	96	88	72	70	63													
		Anteil in %	9,48	11,51	11,92	10,62	11,36	11,05													
	CI Anteil in %	[7,62; 11,35]	[9,34; 13,68]	[9,58; 14,26]	[8,30; 12,94]	[8,86; 13,87]	[8,48; 13,63]														
		CI Anteil in %	[7,62; 11,35]	[9,34; 13,68]	[9,58; 14,26]	[8,30; 12,94]	[8,86; 13,87]	[8,48; 13,63]													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	485	467	407	378	345	326													
		Anteil in %	51,11	56,00	55,15	55,75	56,01	57,19													
	CI Anteil in %	[47,92; 54,29]	[52,62; 59,37]	[51,56; 58,74]	[52,01; 59,49]	[52,08; 59,93]	[53,13; 61,26]														
		CI Anteil in %	[47,92; 54,29]	[52,62; 59,37]	[51,56; 58,74]	[52,01; 59,49]	[52,08; 59,93]	[53,13; 61,26]													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	201	142	146	138	134	112													
		Anteil in %	21,18	17,03	19,78	20,35	21,75	19,65													
	CI Anteil in %	[18,58; 23,78]	[14,47; 19,58]	[16,91; 22,66]	[17,32; 23,39]	[18,49; 25,01]	[16,38; 22,91]														
		CI Anteil in %	[18,58; 23,78]	[14,47; 19,58]	[16,91; 22,66]	[17,32; 23,39]	[18,49; 25,01]	[16,38; 22,91]													
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	94	91	64	70	48	42														
	Anteil in %	9,91	10,91	8,67	10,32	7,79	7,37														
CI Anteil in %	[8,00; 11,81]	[8,79; 13,03]	[6,64; 10,70]	[8,03; 12,62]	[5,67; 9,91]	[5,22; 9,52]															
	CI Anteil in %	[8,00; 11,81]	[8,79; 13,03]	[6,64; 10,70]	[8,03; 12,62]	[5,67; 9,91]	[5,22; 9,52]														
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	79	38	33	20	19	27														
	Anteil in %	8,32	4,56	4,47	2,95	3,08	4,74														
CI Anteil in %	[6,57; 10,08]	[3,14; 5,97]	[2,98; 5,96]	[1,68; 4,22]	[1,72; 4,45]	[2,99; 6,48]															
	CI Anteil in %	[6,57; 10,08]	[3,14; 5,97]	[2,98; 5,96]	[1,68; 4,22]	[1,72; 4,45]	[2,99; 6,48]														

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2010-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1055	926	835	739	676																	
	auswertbar	Anzahl	1052	902	805	718	655																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	114	127	96	92	98																	
		Anteil in %	10,84	14,08	11,93	12,81	14,96																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[8,96; 12,72]	[11,81; 16,35]	[9,69; 14,17]	[10,37; 15,26]	[12,23; 17,70]																	
		Anzahl	540	515	465	420	362																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	51,33	57,10	57,76	58,50	55,27																	
		CI Anteil in %	[48,31; 54,35]	[53,86; 60,33]	[54,35; 61,18]	[54,89; 62,10]	[51,46; 59,08]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	193	152	155	125	122																	
		Anteil in %	18,35	16,85	19,25	17,41	18,63																	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,01; 20,69]	[14,41; 19,30]	[16,53; 21,98]	[14,63; 20,19]	[15,64; 21,61]																	
		Anzahl	115	81	63	67	56																	
		Anteil in %	10,93	8,98	7,83	9,33	8,55																	
		CI Anteil in %	[9,05; 12,82]	[7,11; 10,85]	[5,97; 9,68]	[7,20; 11,46]	[6,41; 10,69]																	
	Anzahl	90	27	26	14	17																		
	Anteil in %	8,56	2,99	3,23	1,95	2,60																		
	CI Anteil in %	[6,86; 10,25]	[1,88; 4,11]	[2,01; 4,45]	[0,94; 2,96]	[1,38; 3,81]																		
	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1015	904	788	719																		
2010-2	auswertbar	Anzahl	1011	892	781	694																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	81	105	85	83																		
		Anteil in %	8,01	11,77	10,88	11,96																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[6,34; 9,69]	[9,66; 13,89]	[8,70; 13,07]	[9,54; 14,38]																		
		Anzahl	545	490	470	397																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	53,91	54,93	60,18	57,20																		
		CI Anteil in %	[50,83; 56,98]	[51,67; 58,20]	[56,74; 63,61]	[53,52; 60,89]																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	171	161	128	118																		
		Anteil in %	16,91	18,05	16,39	17,00																		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[14,60; 19,23]	[15,52; 20,57]	[13,79; 18,99]	[14,21; 19,80]																		
		Anzahl	132	96	72	66																		
		Anteil in %	13,06	10,76	9,22	9,51																		
		CI Anteil in %	[10,98; 15,13]	[8,73; 12,80]	[7,19; 11,25]	[7,33; 11,69]																		
		Anzahl	82	40	26	30																		
Anteil in %		8,11	4,48	3,33	4,32																			
	CI Anteil in %	[6,43; 9,79]	[3,13; 5,84]	[2,07; 4,59]	[2,81; 5,84]																			



EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	1045	907	794																	
	auswertbar	Anzahl	1042	895	773																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	99	120	123																	
		Anteil in %	9,50	13,41	15,91																	
		CI Anteil in %	[7,72; 11,28]	[11,17; 15,64]	[13,33; 18,49]																	
		Anzahl	524	526	426																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	50,29	58,77	55,11																	
		CI Anteil in %	[47,25; 53,33]	[55,54; 62,00]	[51,60; 58,62]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	198	126	124																	
		Anteil in %	19,00	14,08	16,04																	
		CI Anteil in %	[16,62; 21,39]	[11,80; 16,36]	[13,45; 18,63]																	
		Anzahl	126	84	70																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	12,09	9,39	9,06																	
		CI Anteil in %	[10,11; 14,07]	[7,47; 11,30]	[7,03; 11,08]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	95	39	30																		
	Anteil in %	9,12	4,36	3,88																		
	CI Anteil in %	[7,37; 10,87]	[3,02; 5,70]	[2,52; 5,24]																		
2011-2	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	926	784																		
	auswertbar	Anzahl	925	766																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	89	113																		
		Anteil in %	9,62	14,75																		
		CI Anteil in %	[7,72; 11,52]	[12,24; 17,26]																		
		Anzahl	496	403																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	53,62	52,61																		
		CI Anteil in %	[50,41; 56,84]	[49,07; 56,15]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	140	131																		
		Anteil in %	15,14	17,10																		
		CI Anteil in %	[12,82; 17,45]	[14,43; 19,77]																		
		Anzahl	124	87																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	13,41	11,36																		
		CI Anteil in %	[11,21; 15,60]	[9,11; 13,61]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	76	32																			
	Anteil in %	8,22	4,18																			
	CI Anteil in %	[6,45; 9,99]	[2,76; 5,60]																			

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2012-1	<b>Patienten insgesamt</b>	Anzahl	920																	
	auswertbar	Anzahl	917																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	109																	
		Anteil in %	11,89																	
		CI Anteil in %	[9,79; 13,98]																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	435																	
		Anteil in %	47,44																	
		CI Anteil in %	[44,20; 50,67]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	165																	
		Anteil in %	17,99																	
		CI Anteil in %	[15,51; 20,48]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	125																	
		Anteil in %	13,63																	
		CI Anteil in %	[11,41; 15,85]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	83																		
	Anteil in %	9,05																		
	CI Anteil in %	[7,19; 10,91]																		

## Anhang D: Risikoadjustierter Berichtsteil

In den folgenden Kapiteln werden risikoadjustierte Werte zu einigen bislang ausgewiesenen Werten berechnet, z.T. sind für die Risikoadjustierung aber auch gänzlich neue Auswertungen vorzunehmen. Im Gegensatz zu den vorigen Berichtsteilen, in denen die Auswertungsergebnisse nach Beitrittskohorten und Teilnahmehalbjahren am Programm getrennt ausgewiesen wurden, wird bei den Berechnungen für die Risikoadjustierung nicht nach Kohorten und Halbjahren differenziert. Für jede Auswertung wird jeweils ein einziger (risikoadjustierter) Mittelwert ausgewiesen. Eine Entwicklung über die Zeit – sei es über die Teilnahmehalbjahre oder über das Halbjahr des Beitritts in ein DMP – lässt sich daher aus den risikoadjustierten Werten nicht ablesen. Dagegen geben die risikoadjustierten Werte darüber Aufschluss, ob für das betrachtete Programm insgesamt die medizinischen und ökonomischen Werte über- oder unterdurchschnittlich ausfallen, wenn diejenigen statistischen Einflüsse herausgerechnet werden, die sich aus der unterschiedlichen Risikostruktur der Teilnehmer der unterschiedlichen Kassen in den DMPs ergeben. Bei der Interpretation der Daten ist allerdings zu beachten, dass in die Risikoadjustierung nur diejenigen Variablen eingehen können, die in den Datensätzen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Werten und den Leistungsausgaben vorliegen. Sozioökonomische Variablen wie Bildungsstand, Erwerbsstatus oder (Haushalts-) Einkommen sind in den genannten Datensätzen nicht enthalten; die Erkrankungsdauer vor Einschreibung ist seit eDMP nicht mehr enthalten. Welche Variablen bzw. Risikofaktoren in den jeweiligen Modellen für die Risikoadjustierung zu berücksichtigen waren, wurde vom Bundesversicherungsamt definiert und ist in Anhang E.4 ausführlich dargestellt.

### 1. Mittel der beobachteten Werte (O):

Hierzu wird das arithmetische Mittel (Mean) über *alle* für das Programm beobachteten Werte gebildet, unabhängig davon, in welcher Kohorte und in welchem Halbjahr diese Werte beobachtet wurden. Die Berechnung erfolgt dabei in zwei Schritten: Zunächst werden unabhängig von der Kohortenzugehörigkeit pro Patient die Durchschnitts- oder Anteilswerte über alle Halbjahre gebildet, bzw. pro Patient erfolgt anhand der Werte aller Halbjahre die Zuordnung zu einer interessierenden Kategorie (z.B. Patient mit mindestens einer neuen Inzidenz während seiner Programmteilnahme). Anschließend wird ein Gesamtdurchschnitts- bzw. Gesamt-Anteilswert über alle Patienten gebildet. Die neben dem Mittelwert ausgewiesene Fallbasis gibt demnach die Anzahl Patienten (bzw. streng genommen: die Anzahl der Fälle) ein, die in die Mittelwertberechnung einfließen, und *nicht* die Anzahl der beobachteten Werte.

### 2. Mittel der erwarteten Werte (E):

Die beobachteten medizinischen Werte bzw. Leistungsausgaben werden durch die Risikofaktoren der Patienten (z.B. Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen) determiniert. Bei unterschiedlicher Risikostruktur der Teilnehmer der unterschiedlichen Kassen in den DMPs ist daher das Mittel der beobachteten Werte nicht vergleichbar.

Deshalb ist es notwendig, für alle Patienten ergänzend zu ihren beobachteten Werten zunächst einen erwarteten Wert pro Halbjahr zu berechnen. Dieser Werte gibt an, welcher Wert bei gegebenem Risikoprofil des jeweiligen Patienten statistisch zu erwarten gewesen wäre.

Das arithmetische Mittel wurde wiederum in dem geschilderten zweistufigen Verfahren über alle erwarteten Werte gebildet, unabhängig davon, für welche Kohorte und in welchem Halbjahr diese Werte berechnet wurden. Zusätzlich wird die Fallbasis ausgewiesen. Die Berechnung der erwarteten Werte erfolgte dabei folgendermaßen:

- Seien  $x_1 \dots x_m$  die unabhängigen Variablen (Risikofaktoren) der Modelle und  $b_1 \dots b_m$  jeweils die zugehörigen Koeffizientenvektoren, dann werden die erwarteten Werte E für jeden Patienten und jedes Halbjahr in Abhängigkeit von der Art des Zielwertes berechnet über:

#### Lineare Zielwerte:

$$E = b_0 + b_1x_1 + \dots + b_mx_m$$

#### Binäre Zielwerte:

$$E = \frac{\exp(b_0 + b_1x_1 + \dots + b_mx_m)}{1 + \exp(b_0 + b_1x_1 + \dots + b_mx_m)}$$

#### Ereigniszeiten:

Für alle Kalenderhalbjahre nach dem Beitrittsjahr  $t = 1, 2, 3, \dots$  in denen ein Ereignis stattfinden kann, wird für jeden einzelnen Patienten berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis eintritt:

$$E(t) = 1 - (S_0(t))^{\exp(b_1x_1 + \dots + b_mx_m)}$$

wobei die Baseline-Survivalfunktion  $S_0(t)$  der im Modell geschätzten Baseline-Survivalfunktion gegeben alle Kovariaten = 0 entspricht.

Im Modell geschätzte Baseline-Rate (1-S <sub>0</sub> (t)) für die drei Zielgrößen: ,Primärer Endpunkt', ,Sekundärer Endpunkt' und ,Tod' (inkl. Beitrittsjahr, t=0)			
Zeitpunkt	Primärer Endpunkt	Sekundärer Endpunkt	Tod
t <sub>0</sub>	---	---	0,00061
t <sub>1</sub>	0,00339	0,01160	0,00120
t <sub>2</sub>	0,00273	0,00828	0,00109
t <sub>3</sub>	0,00270	0,00847	0,00111
t <sub>4</sub>	0,00267	0,00862	0,00119
t <sub>5</sub>	0,00293	0,00906	0,00127
t <sub>6</sub>	0,00282	0,01003	0,00131
t <sub>7</sub>	0,00307	0,01110	0,00143
t <sub>8</sub>	0,00331	0,01339	0,00145
t <sub>9</sub>	0,00312	0,01019	0,00169
t <sub>10</sub>	0,00325	0,00987	0,00188
t <sub>11</sub>	0,00323	0,01037	0,00202
t <sub>12</sub>	0,00323	0,01134	0,00206
t <sub>13</sub>	0,00403	0,01010	0,00248
t <sub>14</sub>	0,00341	0,00942	0,00248
t <sub>15</sub>	0,00420	0,01068	0,00252
<b>Mittlere Baseline-Rate</b>	<i>0,00309</i>	<i>0,01004</i>	<i>0,00133</i>

### 3. Risikoadjustierter Mittelwert (RA):

Der risikoadjustierte Wert wird bei binären Zielwerten berechnet als das Verhältnis von beobachtetem und erwartetem Durchschnittswert, multipliziert mit dem Gesamtmittelwert aller DMPs, der mit dem gepoolten Datensatz geschätzt wurde: (O/E)\*G. Bei den linearen Zielwerten wird der risikoadjustierte Wert berechnet als Differenz von beobachtetem und erwartetem Durchschnittswert und anschließender Addition des Gesamtmittelwertes aller DMPs, der mit dem gepoolten Datensatz geschätzt wurde: (O-E)+G. Der risikoadjustierte Wert ist trotz der unterschiedlichen Risikostruktur der Teilnehmer der unterschiedlichen Kassen über alle DMPs (bedingt) vergleichbar. Es gelten die Einschränkungen, die sich aus der Nicht-Berücksichtigung sozioökonomischer Variablen ergeben, siehe oben.

Um ein Gegenüberstellen der risikoadjustierten Werte mit den beobachteten Werten zu erleichtern, die in den regulären Evaluationsberichten – nach Kohorten und Auswertungshalbjahren differenziert – ausgewiesen werden, wurde in den folgenden Kapiteln für inhaltlich vergleichbare Auswertungen eine analoge Nummerierung verwendet. Da Risikoadjustierungen nur zu den Auswertungskapiteln 3 und 5 der regulären Berichte vorzunehmen waren, sind dazu keine Kapitel D.1, D.2, D.4 und D.6 enthalten.

Eine Übersicht über die Zielvariablen, die Kollektivabgrenzung und die Gesamtmittelwerte (G) findet sich in Tabelle D.1 (s.u.). Eine ausführliche Beschreibung der Modellbildung erfolgt im Anhang zur Methodik und Datengrundlage in Kapitel E.4.

**Tabelle D.1 Übersicht über die Zielwerte, Kollektivabgrenzung und die zugehörigen Gesamtmittelwerte<sup>15</sup>**

\* Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Tab.-Nr.	Zielwert	Gesamt- mittelwert
D.3.1.1	<b>Body-Mass-Index 1:</b> Durchschnittlicher BMI während der Programmteilnahme pro Erwachsenen über alle Erwachsene	30,5464
	<b>Body-Mass-Index 2:</b> Anteil der Halbjahre mit BMI-Kategorie „stark adipös“ pro Erwachsenen über alle Erwachsene	0,4797
	<b>Raucheranteil 1:</b> Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über alle Patienten	0,1321
	<b>Raucheranteil 2:</b> Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über ursprüngliche Raucher *	0,8071
	<b>Hypertonieverlauf (Hypertoniker zur Erstdokumentation):</b> Anteil der Halbjahre mit erhöhtem Blutdruckwert pro Patient bei ursprünglichen Hypertonikern laut Anamnese	0,5028
D.3.2.1	<b>HbA1c-Wert 1:</b> Durchschnittlicher HbA1c-Wert während der Programmteilnahme pro Patient über alle Patienten	7,0216
	<b>HbA1c-Wert 2:</b> Anteil der Halbjahre mit einem HbA1c-Wert > 7,5 % pro Patient über alle Patienten	0,2359
	<b>Serum-Kreatinin-Wert:</b> Anteil der Halbjahre mit einem Serum-Kreatinin-Wert > 1,4 mg/dl pro Patient über alle Patienten	0,0899
D.3.4.1	<b>Diabetesschulung 1:</b> Patientenanteil mit Empfehlung(en) zur Schulungsteilnahme, der mindestens einmal unbegründet nicht teilgenommen hat *	0,3062
	<b>Diabetesschulung 2:</b> Patientenanteil mit mindestens einer durchgeführten Schulung über alle Patienten *	0,2593
	<b>Hypertonieschulung 1:</b> Hypertonikeranteil laut Erstdokumentation (Anamnese) mit Empfehlung(en) zur Schulungsteilnahme, der mindestens einmal unbegründet nicht teilgenommen hat *	0,5564
	<b>Hypertonieschulung 2:</b> Hypertonikeranteil laut Erstdokumentation (Anamnese) mit mindestens einer durchgeführten Schulung über alle Patienten *	0,0811
	<b>Ophthalmologische Netzhautuntersuchung:</b> Anteil der Jahre mit Netzhautuntersuchung pro Patient über alle Patienten (Teilnehmer und mit Doku im gesamten Jahr) *	0,6437
D.3.5.1	<b>Herzinfarkt:</b> Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0114
	<b>Schlaganfall:</b> Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0260
	<b>erheblich auffälliger Fußstatus (Wagner 2-5 oder Armstrong C-D):</b> Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne beschriebene Inzidenz zur ED*	0,0114
	<b>diabetische Nephropathie:</b> Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0761
	<b>diabetische Retinopathie:</b> Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0374
D.3.6.1	<b>Nierenersatztherapie:</b> Patientenanteil mit mindestens einer Therapie über Patienten ohne Therapie zur ED*	0,0040
D.3.7.1- D.3.7.7	<b>Endpunktfreiheit:</b> Wahrscheinlichkeit, dass Patienten im jew. Folgehalbjahr noch ohne primären Endpunkt sind, bezogen auf Patienten, bei denen Endpunkte noch auftreten könnten*	0,9802
D.5.1	<b>Ausgaben f. ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege:</b> Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	494,20
	<b>Ausgaben für Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation:</b> Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	718,83
	<b>Ausgaben für Arzneimittel:</b> Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	566,97
	<b>Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel sowie Dialyse-Sachkosten:</b> Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	144,89
	<b>Ausgaben für Krankengeld:</b> Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	82,54
	<b>Leistungsausgaben insgesamt:</b> Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	2.000,05

<sup>15</sup> Die mit dem gepoolten Datensatz berechneten Mittelwerte als Schätzer für die Gesamtmittelwerte für das jeweilige Kollektiv wurden als Mittelwerte der Mittelwerte auf Versicherten-Ebene und nicht als Mittelwerte über alle Berichtshalbjahre berechnet.

### D.3 Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Die Auswertungskapitel 1 und 2 des Hauptteils im vorliegenden Evaluationsbericht sind für die Risikoadjustierung nicht relevant. Um den Vergleich mit den vorausgegangenen Berichtsteilen über eine analoge Nummerierung zu erleichtern, wird der Anhang zur Risikoadjustierung daher direkt mit dem Kapitel D.3 fortgesetzt.

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet. Die risikoadjustierten Tabellen weisen die Ergebnisse für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

#### Risikofaktoren

- Body-Mass-Index (BMI)
- Raucherstatus
- Hypertonus

#### Laborwerte

- HbA1c-Werte
- Serum-Kreatinin-Werte

#### Prozessparameter

- Diabetes-Schulungen
- Hypertonieschulungen
- Ophthalmologische Netzhautuntersuchung

#### Neu auftretende Begleit- und Folgeerkrankungen

- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Erheblich auffälliger Fußstatus
- diabetische Nephropathie
- diabetische Retinopathie

#### Therapien

- Nierenersatztherapie

#### Kumulierte Überlebensraten nach Kaplan-Meier

- primäre Endpunkte (einschließlich Tod)
- sekundäre Endpunkte
- Tod

#### Endpunktfreiheit

- Endpunktfreiheit während DMP-Teilnahme

Anteilswerte werden in den folgenden Tabellen in Prozent ausgewiesen.

### D.3.1 Risikofaktoren

In der folgenden Tabelle werden Auswertungen zu drei Variablen dargestellt. Zunächst wird der Body-Mass-Index (BMI) dargestellt. Der BMI wird durch den Quotienten aus Körpergewicht in kg und Körpergröße in m im Quadrat errechnet ( $\text{kg:m}^2$ ). BMI-Werte unter  $25 \text{ kg/m}^2$  sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und  $30 \text{ kg/m}^2$  als leicht übergewichtig und BMI-Werte über  $30 \text{ kg/m}^2$  als übergewichtig (stark adipös) zu werten.

Anschließend werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortality ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

**Tabelle D.3.1.1 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Risikofaktoren: Body-Mass-Index 1 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Body-Mass-Index 1</b>				
Durchschnittlicher BMI während der Programmteilnahme pro Erwachsenen über alle Erwachsene	Wert	30,80	30,68	30,43
	Fallbasis	164355	164355	164355

**Tabelle D.3.1.2 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Risikofaktoren: Body-Mass-Index 2 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Body-Mass-Index 2</b>				
Anteil der Halbjahre mit stark adipöser BMI-Kategorie pro Erwachsenen über alle Erwachsene	Anteil in %	49,96	49,04	47,09
	Fallbasis	164351	164351	164351

**Tabelle D.3.1.3 Risikofaktoren: Rauchen 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Risikofaktoren: Rauchen 1 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr; nur ursprüngliche Raucher ohne ED		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Raucheranteil 1</b>				
Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über alle Patienten	Anteil in %	14,79	13,14	11,74
	Fallbasis	164244	164244	164244

**Tabelle D.3.1.4 Risikofaktoren: Rauchen 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Risikofaktoren: Rauchen 2 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr; nur ursprüngliche Raucher ohne ED		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Raucheranteil 2</b>				
Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über ursprüngliche Raucher	Anteil in %	80,62	79,78	79,87
	Fallbasis	17798	17798	17798

**Tabelle D.3.1.5 Risikofaktoren: Hypertonie - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Risikofaktoren: Hypertonie Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Hypertoniker laut Blutdruckwert</b>				
Anteil der Halbjahre mit bestehender Hypertonie pro Patient bei ursprünglichen Hypertonikern (lt. Anamnese)	Anteil in %	53,90	54,51	50,84
	Fallbasis	119524	119524	119524

### D.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung von erhöhten Blutzucker- / Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykosiliertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. Gut eingestellte Diabetiker, die HbA1c-Werte unter 6,5% aufweisen, haben gute Chancen, Folgeschäden an

z.B. Augen, Nieren oder Herz zu verzögern oder zu verhindern. Umgekehrt gilt, dass Patienten mit deutlich erhöhten HbA1c-Werten (> 7,5%) ein größeres Risiko haben, Komplikationen oder Folgeerkrankungen zu erleiden. Eine etwaige Beeinträchtigung der Filter- bzw. Klärfunktion der Nieren kann durch die so genannte Kreatinin-Clearance beurteilt werden. Für deren Berechnung wird der Kreatininwert im Blut (Serum) des Patienten ermittelt. Ein erhöhter Kreatininwert kann eine Funktionsverschlechterung der Nieren anzeigen.

**Tabelle D.3.2.1 Laborwerte: HbA1c 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Laborwerte: HbA1c 1 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>HbA1c-Wert 1</b>				
Durchschnittlicher HbA1c-Wert während der Programmteilnahme pro Patient über alle Patienten	Wert	7,19	7,14	6,97
	Fallbasis	164457	164457	164457

**Tabelle D.3.2.2 Laborwerte: HbA1c 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Laborwerte: HbA1c 2 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>HbA1c-Wert 2</b>				
Anteil der Halbjahre mit einem HbA1c-Wert > 7,5 % pro Patient über alle Patienten	Anteil in %	29,43	27,19	21,79
	Fallbasis	164457	164457	164457

**Tabelle D.3.2.3 Laborwerte: Serum-Kreatinin - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr**

Laborwerte: Serum-Kreatinin Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Serum-Kreatinin-Wert</b>				
Anteil der Halbjahre mit einem Serum-Kreatinin-Wert >1,4 mg/dl pro Patient über alle Patienten	Anteil in %	9,96	10,10	9,12
	Fallbasis	157711	157711	157711



### D.3.4 Prozessparameter: Durchgeführte Schulungen und Untersuchungen

Zur Erhöhung der Lebensqualität der Patienten sowie zur Erhaltung ihrer Autonomie ist eine Schulung über die Ursachen, Auswirkungen und Therapiemodalitäten eines Diabetes mellitus empfehlenswert. Zum einen, weil hierdurch oftmals bei den Diabetikern dauerhafte Verhaltens- und Verhältnisänderungen in den Bereichen Ernährung und Bewegung eingeleitet werden können, die positive Effekte auf den Krankheitsverlauf ausüben. Zum anderen aber auch, weil vor allem bei der Insulintherapie eine kontinuierliche Kontrolle der verzehrten Lebensmittel (Broteinheiten) sowie der zu injizierenden Insulinmenge durch wiederholte Blutzuckerselbstmessungen erfolgen muss. Hierzu ist ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit der Betroffenen erforderlich, welches u.a. in den Schulungen intensiv erlernt wird. Gefürchtete Langzeitkomplikationen des Diabetes bestehen in der Schädigung von kleinen Gefäßen (sog. Mikroangiopathien). Betroffen sind grundsätzlich alle Gefäße, besonders gravierend sind jedoch Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retina) des Auges mit der Gefahr der Erblindung, der Nieren mit der Gefahr des Nierenversagens sowie des Herzens mit der Gefahr des Herzinfarktes.

In der folgenden Tabelle wird zunächst ausgewiesen, welcher Anteil der Patienten, denen ein- oder mehrmals eine **Diabetes- bzw. Hypertonieschulung** empfohlen worden war, trotz dieser Empfehlung(en) mindestens einmal unbegründet nicht an dieser Schulung teilgenommen hat. Davon wird ausgegangen, wenn bezüglich der Teilnahme an einer empfohlenen Schulung ein „nein“ dokumentiert ist. Weitere Dokumentationsmöglichkeiten waren „ja“ und „Wahrnehmung aktuell nicht möglich“. Ferner wird ausgewiesen, welcher Anteil der Patienten im Programmverlauf mindestens einmal an einer (empfohlenen) Schulung teilgenommen hat. Anschließend wird dargestellt, in welchem Anteil der Berichtsjahre pro Patient im Durchschnitt eine durchgeführte **ophthalmologische Netzhautuntersuchung** dokumentiert wurde. Veranlasste Netzhautuntersuchungen fließen nicht in diese Betrachtung ein.

**Tabelle D.3.4.1 Prozessparameter: Diabetesschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Prozessparameter: Diabetesschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Diabetesschulung 1</b>				
Anteil der Patienten die mindestens einmal unbegründet nicht an einer Diabetesschulung teilgenommen haben, bezogen auf die Patienten, denen eine Schulung empfohlen wurde	Anteil in %	19,45	37,05	58,33
	Fallbasis	60814	60814	60814

**Tabelle D.3.4.2 Prozessparameter: Diabetesschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Prozessparameter: Diabetesschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Diabetesschulung 2</b>				
Patientenanteil mit mindestens einer durchgeführten Schulung über alle Patienten	Anteil in %	12,50	24,57	50,95
	Fallbasis	135400	135400	135400

**Tabelle D.3.4.3 Prozessparameter: Hypertonieschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Prozessparameter: Hypertonieschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Hypertonieschulung 1</b>				
Hypertoniker laut ED (Anamnese, Blutdruck) die mindestens einmal unbegründet nicht an einer Hypertonieschulung teilgenommen haben, bezogen auf Hypertoniker laut ED, denen eine Schulung empfohlen wurde	Anteil in %	34,36	61,75	100,00
	Fallbasis	34485	34485	34485

**Tabelle D.3.4.4 Prozessparameter: Hypertonieschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Prozessparameter: Hypertonieschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Hypertonieschulung 2</b>				
Hypertonikeranteil laut ED (Anamnese) mit mindestens einer durchgeführten Schulung, bezogen auf Hypertoniker laut ED, denen eine Schulung empfohlen wurde	Anteil in %	4,27	8,07	15,34
	Fallbasis	99769	99769	99769

**Tabelle D.3.4.5 Prozessparameter: Ophtalmologische Netzhautuntersuchung - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr**

Prozessparameter: Ophtalmologische Netzhautuntersuchung - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Ophtalmologische Netzhautuntersuchung</b>				
Anteil der Jahre mit Netzhautuntersuchung pro Patient über alle Patienten mit DMP-Teilnahme und Dokumentation im gesamten Jahr	Anteil in %	61,83	65,35	68,03
	Fallbasis	112631	112631	112631

### D.3.5 Begleit- und Folgeerkrankungen

Die durch langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachten Begleit- oder Folgeerkrankungen des Diabetes sind durch Makro- und Mikroangiopathie sowie Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven, bedingt und können zu schweren Organschädigungen bzw. Organversagen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Therapie kann die Progredienz deutlich verlangsamen. Eine gefürchtete Folge des Diabetes mellitus besteht in der Schädigung der Nieren durch Veränderung der Nierengefäße in Form der diabetischen Nephropathie, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion bis hin zur Dialysepflichtigkeit führen kann. Eine weitere Schädigung besteht in Form des diabetischen Fußes, der sich durch Auffälligkeiten (Wunden, Infektionen, Ischämien, Nekrosen) manifestiert und bei dessen fortgeschrittenen Stadien Amputationen von Zehen, des Vorfußes oder gar des Unterschenkels notwendig werden können. Ein weiteres von Gefäßveränderungen betroffenes Organ ist das Herz, bei dem es in ausgeprägten Stadien zu so genannten (durch die gleichzeitige Schädigung der

Nerven) „stummen Infarkten“, bei denen die Patienten keine oder kaum Schmerzen verspüren, kommen kann. Durch ausgeprägte Schädigung der Gefäße des Zentralnervensystems können weiterhin Schlaganfälle verursacht werden. Fortschreitende Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retinopathie) können bis zur Erblindung des betroffenen Auges führen.

In der folgenden Tabelle wird für ausgewählte Begleit- und Folgeerkrankungen dargestellt, bei welchem Anteil derjenigen Patienten, die bei Programmeintritt von diesen Erkrankungen noch nicht betroffen waren, im weiteren Programmverlauf mindestens eine Inzidenz auftritt. Aufgrund der geringen Prävalenzen bei den Zielwerten „Amputationen“ und „Erblindung“ war keine Modellbildung möglich; entsprechend können dazu keine Ergebnisse ausgewiesen werden.

**Tabelle D.3.5.1 Begleit- und Folgeerkrankungen: Herzinfarkt - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Begleit- und Folgeerkrankungen: Herzinfarkt - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Herzinfarkt</b>				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	1,03	1,38	1,53
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	127842	127842	127842

**Tabelle D.3.5.2 Begleit- und Folgeerkrankungen: Schlaganfall - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Begleit- und Folgeerkrankungen: Schlaganfall - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Schlaganfall</b>				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	0,92	2,94	8,32
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	128446	128446	128446

**Tabelle D.3.5.3 Begleit- und Folgeerkrankungen: Erheblich auffälliger Fußstatus- Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Begleit- und Folgeerkrankungen: Erheblich auffälliger Fußstatus - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>erheblich auffälliger Fußstatus (Wagner 2-5 oder Armstrong C-D)</b>				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	0,81	1,44	2,02
Patienten ohne beschriebene Inzidenz zur ED	Fallbasis	134443	134443	134443

**Tabelle D.3.5.4 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Nephropathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Nephropathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>diabetische Nephropathie</b>				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	6,97	7,77	8,48
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	127801	127801	127801

**Tabelle D.3.5.5 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Retinopathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Retinopathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>diabetische Retinopathie</b>				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	3,43	3,93	4,29
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	130230	130230	130230

### D.3.6 Therapien

Die Beeinträchtigung der Nierenfunktion oder sogar die Schädigung der Nieren ist - wie oben beschrieben wurde - ebenfalls eine gefürchtete Begleiterkrankung der Diabetes-Erkrankung.

In der folgenden Tabelle wird dokumentiert, welcher Anteil der Patienten im Durchschnitt aller Kohorten und Auswertungshalbjahre eine **Nierenersatztherapie** erhielt.

**Tabelle D.3.6.1 Therapien: Nierenersatztherapie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr**

Therapien: Nierenersatztherapie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Nierenersatztherapie</b>				
Patientenanteil mit mindestens einer Therapie über Patienten ohne Therapie zur ED	Anteil in %	0,33	0,49	0,60
	Fallbasis	134914	134914	134914

### D.3.7 Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier

In den folgenden Tabellen sind **kumulierte „Raten der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Diese geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass für die Patienten zum jeweiligen Halbjahr (noch) keines der aufgeführten Ereignisse dokumentiert war, bezogen auf die Patientengruppe, bei denen diese Ereignisse noch auftreten könnten. Hierbei wird jeweils nur das erste Auftreten eines Endpunktes betrachtet.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Für die Analyse der vorliegenden Ergebnisse ist zu beachten, dass der Zähler „t“ über die Folgehalbjahre läuft. Da in den medizinischen Erstdokumentationen das Erstauftreten der dokumentierten Endpunkte zeitlich nicht zugeordnet werden kann, können die Ereigniszeitanalysen erst ab dem 1. Folgehalbjahr beginnen, d.h. t=1, 2, ..., x. Für die in den PM-Daten enthaltenen Angaben über Todesfälle gilt diese Einschränkung nicht. Die Ereigniszeitanalysen bezüglich Tod können daher bereits im Beitrittsjahr beginnen, d.h. t=0, 1, 2, ..., x.

Die ermittelten Raten der ereignisfreien Zeit werden in Prozent ausgewiesen. Bei der Interpretation der Werte ist zudem zu beachten, dass es aufgrund der – in den ersten Jahren der Evaluationsphase zwangsläufig – geringen Anzahl von Messzeitpunkten zu verzerrten Parameterschätzungen kommen kann.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Auf diese Problematik hatte infas frühzeitig hingewiesen. Nach den Vorgaben des Bundesversicherungsamtes war dennoch von Beginn an das Auftreten von Endpunkten mit Ereigniszeitanalysen zu modellieren, da mit zunehmender Follow-up-Zeit in dieser Hinsicht keine gravierenden methodischen Probleme mehr zu erwarten seien.

**Tabelle D.3.7.1 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=4, Tod t=5): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>primäre Endpunkte, t=4</b>				
	Rate in %	93,69	94,15	95,21
	Fallbasis	73692	73692	73692
<b>sekundäre Endpunkte, t=4</b>				
	Rate in %	85,27	85,77	86,60
	Fallbasis	67075	67075	67075
<b>Tod, t=5</b>				
	Rate in %	95,78	96,31	97,13
	Fallbasis	82805	82805	82805

**Tabelle D.3.7.2 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=5, Tod t=6): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>primäre Endpunkte, t=5</b>				
	Rate in %	92,16	92,73	94,08
	Fallbasis	64067	64067	64067
<b>sekundäre Endpunkte, t=5</b>				
	Rate in %	81,85	82,49	83,85
	Fallbasis	58350	58350	58350
<b>Tod, t=6</b>				
	Rate in %	94,79	95,48	96,52
	Fallbasis	72108	72108	72108

**Tabelle D.3.7.3 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=6, Tod t=7): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>primäre Endpunkte, t=6</b>				
	Rate in %	90,60	91,30	93,03
	Fallbasis	56648	56648	56648
<b>sekundäre Endpunkte, t=6</b>				
	Rate in %	78,35	79,17	81,00
	Fallbasis	51664	51664	51664
<b>Tod, t=7</b>				
	Rate in %	93,76	94,62	95,94
	Fallbasis	63824	63824	63824

**Tabelle D.3.7.4 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=7, Tod t=8): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>primäre Endpunkte, t=7</b>				
	Rate in %	89,04	89,90	91,94
	Fallbasis	49064	49064	49064
<b>sekundäre Endpunkte, t=7</b>				
	Rate in %	74,90	75,88	77,99
	Fallbasis	44757	44757	44757
<b>Tod, t=8</b>				
	Rate in %	92,63	93,69	95,34
	Fallbasis	55356	55356	55356

**Tabelle D.3.7.5 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte (t=8, Tod t=9): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>primäre Endpunkte, t=8</b>				
	Rate in %	87,43	88,46	90,80
	Fallbasis	43389	43389	43389
<b>sekundäre Endpunkte, t=8</b>				
	Rate in %	71,09	72,25	74,58
	Fallbasis	39552	39552	39552
<b>Tod, t=9</b>				
	Rate in %	91,58	92,84	94,76
	Fallbasis	48956	48956	48956

**Tabelle D.3.7.6 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=9, Tod t=10): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>primäre Endpunkte, t=9</b>				
	Rate in %	85,99	87,27	89,85
	Fallbasis	36481	36481	36481
<b>sekundäre Endpunkte, t=9</b>				
	Rate in %	67,94	69,70	72,71
	Fallbasis	33198	33198	33198
<b>Tod, t=10</b>				
	Rate in %	90,38	91,91	94,14
	Fallbasis	41157	41157	41157

**Tabelle D.3.7.7 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=10, Tod t=11): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>primäre Endpunkte, t=10</b>				
	Rate in %	84,58	86,15	88,95
	Fallbasis	29914	29914	29914
<b>sekundäre Endpunkte, t=10</b>				
	Rate in %	65,13	67,40	71,00
	Fallbasis	27143	27143	27143
<b>Tod, t=11</b>				
	Rate in %	89,12	90,99	93,55
	Fallbasis	33725	33725	33725

**Tabelle D.3.7.8 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=11, Tod t=12): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=11				
	Rate in %	83,08	84,84	87,99
	Fallbasis	23313	23313	23313
sekundäre Endpunkte, t=11				
	Rate in %	62,69	65,34	69,20
	Fallbasis	21050	21050	21050
Tod, t=12				
	Rate in %	87,72	89,84	92,84
	Fallbasis	26265	26265	26265

**Tabelle D.3.7.9 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=12, Tod t=13): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=12				
	Rate in %	81,65	83,70	87,17
	Fallbasis	17774	17774	17774
sekundäre Endpunkte, t=12				
	Rate in %	60,53	61,91	65,97
	Fallbasis	15985	15985	15985
Tod, t=13				
	Rate in %	86,41	87,63	86,60
	Fallbasis	20001	20001	20001

**Tabelle D.3.7.10 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=13, Tod t=14): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=13				
	Rate in %	68,18	82,30	86,34
	Fallbasis	12548	12548	12548
sekundäre Endpunkte, t=13				
	Rate in %	58,38	61,91	65,97
	Fallbasis	11255	11255	11255
Tod, t=14				
	Rate in %	84,68	87,63	91,70
	Fallbasis	14093	14093	14093

**Tabelle D.3.7.11 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=14, Tod t=15): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier**

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=14				
	Rate in %	66,91	81,02	85,42
	Fallbasis	7514	7514	7514
sekundäre Endpunkte, t=14				
	Rate in %	56,16	60,06	64,74
	Fallbasis	6740	6740	6740
Tod, t=15				
	Rate in %	83,03	86,45	91,16
	Fallbasis	8427	8427	8427

### D.3.8 Endpunktfreiheit

In der folgenden Tabelle wird der Anteil derjenigen Patienten ausgewiesen, für die zu Beginn der DMP-Teilnahme noch kein primärer Endpunkt, aber mindestens ein sekundärer Endpunkt dokumentiert war und die im Verlauf der DMP-Teilnahme ihren Status „ohne primäre Endpunkte“ behalten haben.

**Tabelle D.3.8.1 Endpunktfreiheit**

Endpunktfreiheit		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Endpunktfreiheit	Anteil in %	100,00	84,77	77,74
	Fallbasis	20283	20283	20283



### D.5 Leistungsausgaben

Das Auswertungskapitel 4 der regulären Evaluationsberichte ist für die Risikoadjustierung nicht relevant. Um den Vergleich beider Berichte über eine analoge Nummerierung zu erleichtern, wird der vorliegende Bericht mit dem Kapitel 5 fortgesetzt.

Ein Grundziel der Evaluation ist laut Kriterien des BVA die Überprüfung der Kosten der Versorgung der DMP-Patienten. Entsprechende Auswertungen werden in diesem zweiten Teil des Evaluationsberichtes vorgenommen. Hierzu werden anhand von Zufallsstichproben die durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patient berechnet. Diese werden in Euro ausgewiesen. In diese Betrachtung fließen alle Ausgaben für die betrachteten Leistungsbereiche ein, nicht nur die diabetesspezifischen Ausgaben. Differenziert wird nach folgenden Bereichen:

- ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege,
- Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation,

- Arzneimittel,
- Heil- und Hilfsmittel sowie Dialyse-Sachkosten,
- Krankengeld (im Gegensatz zur Auswertung im Berichtsteil II ist die Auswertungen hier nicht auf Patienten mit Krankengeldanspruch bezogen, sondern ist für alle Patienten vorzunehmen).

Für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege liegen die Leistungsausgaben erst ab dem 1. Halbjahr 2006 vor.

Die Angaben zu den Leistungsausgaben liegen für eine Stichprobe aller evaluierten Patienten vor.

**Tabelle D.5.1 Leistungsausgaben: Ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre**

Leistungsausgaben: Ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Ausgaben f. ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege</b>				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	576,26	609,11	527,06
	Fallbasis	7448	7448	7448

**Tabelle D.5.2 Leistungsausgaben: Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre**

Leistungsausgaben: Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Ausgaben für Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation</b>				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	1059,16	1140,38	800,05
	Fallbasis	7829	7829	7829

**Tabelle D.5.3 Leistungsausgaben: Arzneimittel - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre**

Leistungsausgaben: Arzneimittel - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Ausgaben für Arzneimittel</b>				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	646,98	732,08	652,08
	Fallbasis	7829	7829	7829

**Tabelle D.5.4 Leistungsausgaben: Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre**

Leistungsausgaben: Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten</b>				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	175,22	198,44	168,11
	Fallbasis	7448	7448	7448

**Tabelle D.5.5 Leistungsausgaben: Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre**

Leistungsausgaben: Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Ausgaben für Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten</b>				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	111,69	79,90	50,75
	Fallbasis	7829	7829	7829

**Tabelle D.5.6 Leistungsausgaben: Insgesamt - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre**

Leistungsausgaben: Insgesamt - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
<b>Leistungsausgaben insgesamt</b>				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	2550,12	2741,79	2191,72
	Fallbasis	7829	7829	7829

## Anhang E: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Evaluationsbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um drei Arten von Datensätzen, die jeweils für einen Patienten erhoben wurden:


- Patientenmerkmale
- Medizinische Daten
- Ökonomische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung E.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Diabetes mellitus Typ 2 von AOK, Seekrankenkasse und Knappschaft.

### E.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung eines Patienten in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten. Zu beachten ist, dass es durch die 9. RSA-ÄndV zu einer Änderung in der Dokumentation kam.

Abb. E.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP DM2 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP



Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) ab Juli 2008 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen **medizinischen Behandlungsdaten** sowie die **personenbezogenen Merkmale** enthält.<sup>18</sup> Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Diabetes mellitus Typ 2 finden die Satzartbeschreibungen SA100EA/FA und SA100ED/FD<sup>19</sup> Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA100ED/SA100FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 100EA/FA übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2008-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA100ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jedem Patienten vorhandenen **Patientenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patienten fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 100 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass ein Patient in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für ihn eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt. Sobald dem Evaluator die Patientenmerkmale vorliegen, zieht er eine Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit der Programmteilnehmer für die **Evaluation** der ökonomischen Daten. Der Stichprobenumfang beträgt dabei jeweils 10 Prozent der Ist-Größe einer Kohorte, jedoch mindestens 100 und höchstens 500 Patienten. Falls an einem Programm zwischen 10 und 100 Patienten teilnahmen, wird eine Vollerhebung durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als 10 Teilnehmer umfasst, da in diesem Fall aus Gründen der Wahrung der Anonymität auf eine Auswertung verzichtet wird. Der Evaluator übermittelt der Krankenkasse eine Liste mit den Pseudonymen der Stichprobe. Die Kasse spielt diesen Pseudonymen die mit der medizinischen Behandlung verbundenen Leistungsausgaben zu und erstellt daraus einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 100 OD. Ferner liefert sie Angaben zu den Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. („**ökonomische Daten**“).

Der damit beschriebene Datenfluss ist schematisch in Abbildung E.1.1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Ab der Kohorte 2008-2 wurden die Auswertungen darüber hinaus um die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung zur Veränderung der subjektiven Lebensqualität ergänzt. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen.

Befragt wird grundsätzlich die bereits oben beschriebene Stichprobe von Patienten. Die Kasse ermittelt dazu, für die vom Evaluator übermittelte Pseudonymliste, die zugehörigen Adressdaten und versendet an diese Patienten den Fragebogen. Die Patienten senden die ausgefüllten Fragebögen direkt an den Evaluator zurück, wo sie ausgewertet werden.

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmern“ und „Patienten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientenbezogenen Auswertung würde hingegen der Patient weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Der Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschrieben werden mussten und sich in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP ein Teilnehmer der Kohorte 2006-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit Sicherheit geschlossen werden, dass er sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat der betreffende Patient „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patienten dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergibt sich eine Besonderheit. Die Patienten werden verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen.

<sup>18</sup> Bis zum 30.06.2008 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patienten bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

<sup>19</sup> Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „A“ (alt) und „D“ wird unterschieden, ob sich die Dokumentation auf die Zeit vor oder nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen bezieht.

## E.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung der Datenverarbeitung kam es zu Abweichungen bei der erwarteten Datenqualität. Diese Abweichungen traten insbesondere zu Beginn der Programmlaufzeit, z.B. aufgrund der allgemeinen Anlaufschwierigkeiten, auf. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Rücklaufkontrolle (OD-Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf (PM-Datensätze)

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.<sup>20</sup> Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln und den medizinischen Plausibilitätskriterien des BVA (siehe Tabelle 0.1.2) folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen kein Regelverstoß vorlag und die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen Regelverstöße vorlagen oder die gemäß Rechenregeln nicht auswertbar waren, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden **„Komplett-Dubletten“** aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden **„Auswertungsdubletten“** aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze, Ökonomische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung (**„Matching“**) von Personenmerkmalen, medizinischen Daten und ökonomischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patienten ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei den ökonomischen Datensätzen war eine Überprüfung auf Verknüpfbarkeit entbehrlich. Da sie durch das Zuspielen der Leistungsausgaben zu denjenigen Pseudonymnummern generiert wurden, die in einer Stichprobe aus den PM-Datensätzen gezogen worden waren, war für die zugespielten Leistungsausgaben eine Verknüpfbarkeit mit den PM-Datensätzen in jedem Fall gegeben. Dennoch konnten auch hier drei Arten von Problemfällen auftreten:

- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen keine Leistungsausgaben zugespielt worden waren
- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen die Leistungsausgaben doppelt und mit teils unterschiedlichen Werten zugespielt worden waren
- In der Stichprobe nicht gezogene Pseudonymnummern, die dennoch um Leistungsausgaben ergänzt geliefert wurden

Im Rahmen einer **Rücklaufkontrolle** wurde daher ein Abgleich vorgenommen zwischen denjenigen Pseudonymnummern, die der Evaluator in der Stichprobe gezogen hatte, und denjenigen Pseudonymnummern, für welche die Krankenkasse die zugehörigen Leistungsausgaben zugespielt hatte. Damit wurden – differenziert nach Kassen, Eintrittskohorte und Antragsregion – die Problemfälle identifiziert. Da es sich bei der letztgenannten Art von Problemfällen um nicht auswertungsrelevante Informationen handelt, wurden die entsprechenden Datensätze bei der Auswertung ignoriert. Analog wurde vorgegangen, wenn den Pseudonymnummern Leistungsausgaben für Halbjahre zugespielt wurden, in denen die entsprechenden Patienten nicht mehr Programmteilnehmer waren.

Dass die Krankenkassen nicht allen gezogenen Pseudonymnummern die Leistungsausgaben für die erwarteten Berichtshalbjahre zuspielten, lag zum Teil daran, dass die entsprechenden Patienten rückwirkend aus dem Programm ausgeschrieben worden waren, diese Information zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung aber noch nicht vorlag. Lagen andere Gründe dafür vor, wurden die Daten ggf. von Kassen ergänzt und eine Neulieferung der überarbeiteten ökonomischen Datensätze an den Evaluator vorgenommen. Lagen in einer Datenlieferung für eine Pseudonymnummer zwei oder mehr ökonomische Datensätze mit unterschiedlichen Leistungsausgaben vor, floss der ökonomisch ungünstigste Wert in die Evaluation ein.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis waren die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (je nach Antragsregion bis zum Berichtshalbjahr 2012-1)
- Sie wurden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung werden auch dann berücksichtigt, wenn sie sich auf bereits veröffentlichte Kohorten bzw. Halbjahre beziehen.

Der letzte Punkt stellt eine Änderung gegenüber den bisherigen Berichten dar, die gemäß der Abstimmung mit dem BVA zum 30.09.2013 sowohl für die medizinischen als auch für die stichprobenbasierten Auswertungen umzusetzen war. Im Kern wird dabei zugunsten einer aktuelleren Datenbasis die Reproduzierbarkeit der Berichte aufgehoben. Durch die rückwirkende Bereinigung der Datenbasis kann es im Vergleich zu den bisherigen Berichten insbesondere zu folgenden Änderungen kommen: Die Restkohorte kann durch die rückwirkende Bereinigung im Zeitverlauf stärker absinken als in bisherigen Berichten. Da diese Bereinigung im Wesentlichen Patienten ohne medizinische Dokumentation betrifft, ist in der Regel jedoch mit keinen oder nur geringen Auswirkungen auf die **Anzahl der auswertbaren Patienten und ihre Auswertungsergebnisse** (Durchschnittswerte, Patientenanteile) zu rechnen. Dagegen ist davon auszugehen, dass der **Anteil** der auswertbaren Patienten an allen Patienten steigt, wenn die Restkohorte als Bezugsgröße kleiner ausfällt als in bisherigen Berichten. Analog ist in diesem Fall auch ein Anstieg der Anteilswerte aus anderen Auswertungen zu erwarten, deren Bezugsgröße die Restkohorte darstellt.

<sup>20</sup> Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

### E.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für einen DMP-Teilnehmer für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kam es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu Abweichungen von diesem Schema. Im Folgenden wird beschrieben, wie bei diesen Sonderfällen in der Auswertung vorgegangen wurde:

- **1. Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**  
Liegen für das Beitrittsjahr eines Patienten eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führt dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugerechnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle E.3.1.
- **2. Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**  
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **3. Mehrere Folgedokumentationen in einem Halbjahr**  
Lagen für ein Halbjahr mehrere Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle E.3.1 Anwendung.
- **4. Mehrere Erstdokumentationen im Beitrittsjahr**  
Lagen für das Beitrittsjahr zwei oder mehr Erstdokumentationen vor, wurde grundsätzlich diejenige mit dem frühesten Unterschriftsdatum des Arztes herangezogen. Sofern zwei oder mehr Erstdokumentationen mit diesem Datum vorliegen, werden die auszuwertenden medizinischen Werte gemäß Tabelle E.3.1 festgelegt.
- **5. Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später**  
Lagen Erstdokumentationen für Halbjahre nach dem Beitrittsjahr vor, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die beiden letztgenannten Punkte wurden im Herbst 2010 neu in die Berechnungsvorschriften aufgenommen.<sup>21</sup> In den Fällen, in denen die Datenlage widersprüchlich ist, kann es dadurch zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen. Da in einer chronologisch ersten Erstdokumentation nicht zwangsläufig alle Parameter gleich dokumentiert sind, wie in etwaigen weiteren Erstdokumentationen im Beitrittsjahr, kann es aufgrund der Neuregelung in Punkt 4 zu einer Änderung medizinischer Parameter im *Beitrittsjahr* und infolgedessen auch zu Änderungen der Basis von kollektivbasierten Auswertungen kommen. Die Neuregelung unter Punkt 5 kann zu einer Änderung medizinischer Parameter in den *Folgehalbjahren* führen.<sup>22</sup> Darüber hinaus wurden die Berechnungsvorschriften bezüglich Tabelle E.3.1 dahingehend geändert, dass bei den Laborparametern/Messwerten nicht mehr der letzte chronologisch verfügbare, sondern der letzte *plausible* Wert zu verwenden ist. Dadurch kann es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen.

<sup>21</sup> Zuvor war in den Berechnungsvorschriften des BVA nur definiert, wie bei Sonderfällen bezüglich der Folgedokumentationen zu verfahren ist (mehrerer Folgedokumentationen in einem Halbjahr, Folgedokumentationen im „falschen“ Halbjahr). Die Handhabung von Sonderfällen bei den Erstdokumentationen war nicht geregelt. Sie wurden bislang weitestgehend analog zu den Sonderfällen bei den Folgedokumentationen in die Auswertung einbezogen.

<sup>22</sup> Da medizinische Informationen aus Erstdokumentationen in den Folgehalbjahren explizit zu ignorieren sind, entfällt nun in den betroffenen Fällen und Halbjahren ein medizinischer Wert. Sofern im betroffenen Halbjahr aus einer oder mehreren Folgedokumentationen abweichende Werte vorliegen, kann es – je nach Auswahl gemäß Tabelle E.3.1 – zu veränderten medizinischen Parametern führen. Sofern im betroffenen Halbjahr keine Folgedokumentationen vorliegen, kommt es durch die Neuregelung zu fehlenden Angaben.

**Tabelle E.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr**

Parameter	Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr
BMI	Jeweils <b>letzter</b> vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres
Definition „Raucher“	Für das betreffende Halbjahr als „Raucher“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Hypertonus	Jeweils <b>letztes</b> vorliegendes plausibles <b>Blutdruck-Wert-Paar</b> des Auswertungshalbjahres*
HbA1c	Jeweils <b>letzter</b> vorliegender plausibler HbA1c-Wert des Auswertungshalbjahres*
Serum-Kreatinin	Jeweils <b>letzter</b> vorliegender plausibler Kreatinin-Wert des Auswertungshalbjahres*
Medikation	Jeweils <b>letzter</b> vorliegender Wert des Auswertungshalbjahres**
Empfohlene Diabetes-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“).
Empfohlene Hypertonie-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“).
Herzinfarkt	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Schlaganfall	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Amputation	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Erblindung	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Nierenersatztherapie (ab 2004-2)	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Nephropathie	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Diabetische Retinopathie	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Diabetischer Fuß (Wagner/Armstrong)	Jeweils die höchste (pathologischste) dokumentierte Kategorie für Wagner und Armstrong ist zu werten (s.u.)***
Ophthalmologische Netzhautuntersuchung	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde****

\* Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit plausiblen Angaben vorliegen, wird der ungünstigste (höchste) Wert verwendet.

\*\* Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit Angaben zur Medikation vorliegen, sind alle Informationen zu verwenden. Bei Widersprüchen (z.B. Medikament X ja und nein) ist von der Anwendung des Medikamentes auszugehen.

\*\*\* DFS (Wagner/Armstrong): Beim Vorliegen mehrerer FD ist aus allen vorliegenden FD das Maximum für das Wagner-Stadium UND das Maximum für das Armstrong-Stadium zu werten, unabhängig davon, aus welcher FD die beiden höchsten Angaben entstammen. Dadurch wird sichergestellt, dass für beide Angaben (Wagner und Armstrong) in einem Halbjahr die jeweils höchste dokumentierte Kategorie in die Auswertung einfließt. Laut Ausfüllanleitungen zu SA100EA/FA und SA100ED/FD sind KEINE Angaben zum DFS für Kinder unter 18 Jahren zu machen. Sofern dennoch in den Daten der Datenstellen Angaben bei Kindern enthalten sein sollten, werden diese Angaben für die Evaluation nicht berücksichtigt (auf „missing“ gesetzt).

\*\*\*\* Diese Parameter können halbjährlich pro Folgedokumentation dokumentiert werden, sie werden aber nicht halbjährlich sondern jährlich ausgewertet, so dass immer zwei aufeinanderfolgende Halbjahre ein Berichtsjahr ergeben. Berichtsjahre sind dabei nicht gleichzusetzen mit Kalenderjahren.



#### E.4 Modellbildung für die Risikoadjustierung

In den folgenden Ausführungen werden die Modellschätzungen für die Risikoadjustierung zentraler Werte im Rahmen der Evaluation der Disease Management Programme für das Krankheitsbild Diabetes Mellitus Typ 2 erläutert.

Allen Modellen liegt ein im Wesentlichen einheitlicher Kovariatenansatz zu Grunde, der im Rahmen hierarchischer Modelle mit jeweils zwei Ebenen („Patient“ und „DMP einer Krankenkasse in einer Region“) verwendet wurde. Die Modelle wurden mit einem Datensatz geschätzt, der sich aus jeweils einer Stichprobe aus dem Gesamtdatenbestand der beiden Evaluationsinstitute zusammensetzt. In beiden Instituten wurde dazu jeweils eine Stichprobe von 150.000 Patienten gezogen, die zwischen dem 2. Halbjahr 2004 und dem 1. Halbjahr 2012 in die Programme eingetreten sind. Die beiden Stichproben wurden zusammengeführt und anonymisiert (Vergabe zufällig generierter Werte für die DMP-Kennung und die Patientenkennung). Für jeden Patienten können in halbjährlichem Abstand mehrere Messzeitpunkte vorliegen, wobei der Beobachtungszeitraum bis maximal zum 1. Halbjahr 2012 reicht. Eintritte in die Programme erfolgten ab dem 2. Halbjahr 2004. Die maximale Anzahl an Beobachtungszeitpunkten und damit die maximale Anzahl an Records pro Patient in dem Datensatz beträgt demnach 16 (Eintritt in das DMP im 2. Halbjahr 2004 und das letzte Beobachtungshalbjahr ist das 1. Halbjahr 2012).

Insgesamt setzte sich der anonymisierte gepoolte Datensatz aus 300.000 Patienten und 1.859.583 Records zusammen. Enthalten waren 283 DMP, die allerdings zum Teil nur sehr gering besetzt waren. Deshalb wurden sieben DMP mit weniger als drei Patienten für die Modellschätzung aus dem Datensatz entfernt. Zusätzlich wurden Halbjahre ohne Erst- bzw. Folgedokumentation aus dem Datensatz entfernt. Der letztlich für die Modellschätzung der medizinischen Zielgrößen verwendete Datensatz setzte sich aus 276 DMP mit 299.927 Patienten und 1.770.063 auswertbaren Records zusammen.

Da die ökonomischen Werte nur für eine Stichprobe aller Patienten vorliegen, basieren auch die Modelle zur Schätzung der ökonomischen Zielgrößen auf einer kleineren Fallzahl. Insgesamt lagen in dem gepoolten Gesamtdatensatz für 112.899 Patienten mit 241.469 Records ökonomische Werte vor. Die Zahl der DMP lag bei 276. Von den 276 DMP mit Patienten mit ökonomischen Werten wurden drei DMP mit weniger als drei Patienten für die Modellschätzung aus dem Datensatz entfernt. Insgesamt verblieben also 273 DMP mit 121.894 Patienten und 241.464 Records für die Schätzung der ökonomischen Modelle.

In allen Modellen mit Ausnahme der Übergangsratenmodelle ist die Eintrittskohorte (kodiert von 1 bis 16) und das Kalenderhalbjahr (kodiert von 0 bis 15) enthalten. In den Übergangsratenmodellen ist nur die Eintrittskohorte als unabhängige Variable enthalten, da das Kalenderhalbjahr zum Zeitpunkt des Ereigniszeitpunkts die abhängige Variable definiert. Die letzte Eintrittskohorte ist bei den beiden Zielereignissen „primäre Endpunkte“ und „sekundäre Endpunkte“ dabei nicht enthalten, da für diese noch kein Ereignis beobachtet werden konnte, da noch keine Folgedokumentation vorhanden sein kann. Bei dem Zielereignis „Tod“ können für alle Halbjahre einschließlich des Beitrittsjahres Ereignisse auftreten, d.h. hier kann sich der Beobachtungszeitraum über 16 Halbjahre erstrecken.

Bei der Ausreißerbehandlung wurde auf die bereits vorhandenen medizinischen Wertebereiche zurückgegriffen. Falls die Werte außerhalb der gültigen Wertebereiche lagen, waren die Werte bereits im gepoolten Datensatz mit dem Code für fehlende Angaben (-1) abgelegt. Für alle anderen Variablen wurden keine gültigen Wertebereiche definiert.

Fehlende Angaben wurden grundsätzlich nicht ersetzt (imputiert), d.h. Records mit fehlenden Angaben sind in der Modellierung nicht enthalten. Auf Grund der sehr geringen Anzahl fehlender Werte bei DM2 wurden auch bei den beiden unabhängigen Variablen „BMI-Kategorie“ und „HbA1c-Kategorie“ fehlende Angaben nicht als gesonderte Kategorie in die Modelle aufgenommen (Anteil der fehlenden Werte < 0,5%).

Bei der unabhängigen Variable „auffälliger Fußstatus“ ergaben sich bei einer nennenswerten Anzahl der Fälle (rd. 20 Prozent) fehlende Werte. Da davon auszugehen ist, dass das Vorliegen eines erheblich auffälligen Fußstatus in der Erstdokumentation auch dokumentiert wäre, wurden die fehlenden Angaben auf den Wert für einen unauffälligen Fußstatus gesetzt.

#### Kollektivabgrenzung

Da im risikoadjustierten Berichtsteil die Werte aus den Rohberichten zu adjustieren sind, wurden grundsätzlich dieselben Abgrenzungen gewählt wie im Rohberichtsteil. Dies betrifft insbesondere die Abgrenzung der Kollektive. Deshalb wurden bei der Modellbildung für DM2 die Modelle über eine Selektion auch ausschließlich für die jeweiligen Kollektive geschätzt, für die auch die risikoadjustierten Werte berechnet werden sollen. Die anzuwendenden Koeffizienten wurden demnach nur an der jeweiligen Gruppe, die das Kollektiv bilden, bestimmt. Sie gelten insofern nicht für alle Programmteilnehmer.

Entsprechend wurden auch die mit dem gepoolten Datensatz berechneten Mittelwerte, als Schätzer für die Gesamtmittelwerte, nur für das jeweilige Kollektiv berechnet.

Mit der Kollektivabgrenzung einher geht in vielen Fällen eine Selektion der Eintrittskohorten und der Kalenderhalbjahre. Wenn beispielsweise nur die neu aufgetretenen Herzinfarkte bei den Patienten ohne Herzinfarkt zur ED betrachtet werden, müssen

folgerichtig alle Eintrittshalbjahre (Zähler des Kalenderhalbjahres = 0) und die letzte Eintrittskohorte (derzeit das 1. Halbjahr 2012) ausselektiert werden.

#### Modelle

Für die Schätzung wurden Random-Intercept-Two-Level-Modelle (hierarchische Modelle, Mehrebenen-Modelle, gemischte Modelle) berechnet. Level 1 bilden die Patienten, Level 2 bilden die DMP einer Krankenkasse in einer Region (DMP).

Bei diesen Modellen wird stochastische Variation (Heterogenität), d.h. Zufallseffekte auf der Ebene 2 (den DMP) angenommen. Die Modellierung eines Random-Intercept Modells erlaubt diese Zufallseffekte auf der Ebene der DMP in der Modellierung und damit der Schätzung der fixen Effekte, d.h. der Koeffizienten der unabhängigen Variablen auf der Ebene 1 (der Patienten) mit zu berücksichtigen .

Für die intervallskalierten Zielwerte wurden lineare Random-Intercept-Two-Level-Modelle geschätzt. Für die binären bzw. binomialen Zielwerte wurden Logit-Random-Intercept-Two-Level-Modelle geschätzt. Für die Übergangsratenmodelle wurden unter anderem auch aus Gründen der Rechenzeit Proportional-Hazardratenmodelle (Cox-Regressionsmodelle) with shared frailty (gemeinsamer unbeobachteter Heterogenität) geschätzt. Modelliert wird eine gammaverteilte gemeinsame unbeobachtete Heterogenität (der Zufallseffekt auf dem zweiten Level), die multiplikativ auf die Hazardfunktion wirkt.

Während die intervallskalierten Werte direkt modelliert werden (mit dem Modell wird der Wert der abhängigen Variablen geschätzt), gilt für die binären Werte, dass die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens des jeweiligen Ereignisses im Beobachtungszeitraum modelliert wird (mit dem Modell wird die Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 für das Ereignis vorhergesagt). Bei den Übergangsratenmodellen wird die Rate, d.h. die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Zensierungen geschätzt.

Für die Schätzungen der linearen und binären medizinischen Zielwerte wurde das Statistikprogramm „Stata“ (die Module xtmixed und xtlogit) verwendet.

„xtmixed“ verwendet für die linearen Modelle als Schätzmethode REML (Maximum Restricted Likelihood). Als Schätzmethode für die Logit-Modelle wird adaptive quadrature mit sieben Integrationspunkten verwendet.

**Zielwerte und Kollektive**

Für die folgenden Zielwerte wurden jeweils für die genannten Patientengruppen Modelle geschätzt:

**Tabelle E.4.1 Medizinische Zielwerte**

Zielwert	Betrachtete Patienten / Kollektivabgrenzung
Tod (Übergangsratenmodell)	alle Patienten
erster primärer Endpunkt (Übergangsratenmodell)	alle Patienten ohne primäre Endpunkte zur ED
erster sekundärer Endpunkt (Übergangsratenmodell)	alle Patienten ohne sekundäre Endpunkte zu ED
BMI 1: Mittelwert	erwachsene Patienten (18 Jahre und älter)
BMI 2: stark adipös	erwachsene Patienten (18 Jahre und älter)
Raucheranteil 1: Anteil Halbjahre Raucher	alle Patienten
Raucheranteil 2: Anteil Halbjahre Raucher	Raucher bei Einschreibung
Hypertonie	Hypertoniker zur ED laut Anamnese
HbA1c 1: Mittelwert	alle Patienten
HbA1c 2: Wert über 7,5%	alle Patienten
Serum-Kreatinin-Wert: über 1,4 mg/dl	alle Patienten
Diabetesschulung 1: Non-Compliance	Patienten mit empfohlener Schulung laut Dokumentation
Diabetesschulung 2: durchgeführte Schulungen	alle Patienten
Hypertonieschulung 1: Non-Compliance	Hypertoniker zur ED laut Anamnese mit empfohlener Schulung laut Dokumentation
Hypertonieschulung 2: durchgeführte Schulungen	Hypertoniker zur ED laut Anamnese
ophthalmologische Netzhautuntersuchung (Jahresauswertung)	Patienten, die in jeweils beiden betrachteten Halbjahren Teilnehmer waren und für die in beiden Halbjahren medizinische Dokumentationen mit Angaben zur Netzhautuntersuchung vorlagen
Herzinfarkt: neu aufgetreten	Patienten ohne Herzinfarkt zur ED
Schlaganfall: neu aufgetreten	Patienten ohne Schlaganfall zur ED
erheblich auffälliger Fußstatus: neu aufgetreten	Patienten ohne erheblichen auffälligen Fußstatus zur ED
Nephropathie: neu aufgetreten	Patienten ohne Nephropathie zur ED
Diabetische Retinopathie: neu aufgetreten	Patienten ohne diabetische Retinopathie zur ED
Nierenersatztherapie: neu aufgetreten	Patienten ohne Nierenersatztherapie zur ED
Endpunktfreiheit: ohne primären Endpunkt	Patienten ohne primären, aber mit mindestens einem sekundären Endpunkt zur ED

**Tabelle E.4.2 Ökonomische Zielwerte**

Zielwert	Betrachtete Patienten / Kollektivabgrenzung
Kosten für ärztliche Behandlung u. häusliche Krankenpflege (ambulant) (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation (stationär) (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Arzneimittel (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Heil-, Hilfsmittel und Dialyse (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Krankengeld (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Leistungsausgaben insgesamt (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe

Bei einigen der medizinischen Zielwerte handelt es sich um Ereignisse, die korrekterweise unter Berücksichtigung der Rechtszensierungen (d.h. Berücksichtigung der zeitlichen Begrenzung des Beobachtungszeitpunkts) berechnet werden sollten. Da allerdings die Ereignishäufigkeit (Inzidenz) im Beobachtungszeitraum z. T. sehr gering ist und zudem in den Evaluationsberichten ebenfalls auf die Berücksichtigung von Zensierungen verzichtet wurde, wurde für die genannten Zielwerte die Auftretenswahrscheinlichkeit im Beobachtungszeitraum modelliert.

In allen drei Übergangsratenmodellen, auch bei den primären und den sekundären Endpunkten, wurde nur das erste Auftreten eines Zielergebnisses analysiert. Zweit- und Mehrfachereignisse wurden auch bei den primären und sekundären Endpunkten nicht berücksichtigt.

Da die nur halbjahresgenaue Messung der Verweildauern bzw. Ereigniszeiten für die Übergangsratenmodelle vergleichsweise unpräzise ist, treten in den Daten viele Endpunkte mit gleicher Zeit, d.h. gleiche Messwerte (Ties, Bindungen) auf, was zu verzerrten Parameterschätzungen führen kann. Allerdings wird mit zunehmender Follow-up-Zeit die Zahl der Bindungen sinken. Auf der anderen Seite können aber nur im Rahmen von Übergangsratenmodellen Rechtszensierungen überhaupt adäquat berücksichtigt werden, so dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt Übergangsratenmodelle geschätzt wurden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zahl der Bindungen bei den drei Zielwerten zum gegebenen Beobachtungszeitraum.

**Tabelle E.4.3 Gemessene Ereigniszeiten und Zahl der Bindungen bei primären Endpunkten, sekundären Endpunkten und Tod**

Zeitpunkt (Zähler Kalenderhalbjahr)	Zensierungen	Ereignisse	Gesamt
<b>Primäre Endpunkte</b>			
Beitrittsjahr	43.566	0	43.566
1. Folgehalbjahr = 1	33.056	3.664	36.720
2. Folgehalbjahr = 2	26.418	2.443	28.861
3. Folgehalbjahr = 3	20.570	2.029	22.599
4. Folgehalbjahr = 4	18.027	1.708	19.735
5. Folgehalbjahr = 5	14.446	1.591	16.037
6. Folgehalbjahr = 6	13.775	1.314	15.089
7. Folgehalbjahr = 7	11.880	1.209	13.089
8. Folgehalbjahr = 8	13.873	1.094	14.967
9. Folgehalbjahr = 9	11.812	819	12.631
10. Folgehalbjahr = 10	11.107	658	11.765
11. Folgehalbjahr = 11	8.276	491	8.767
12. Folgehalbjahr = 12	7.993	363	8.356
13. Folgehalbjahr = 13	6.325	307	6.632
14. Folgehalbjahr = 14	6.812	175	6.987
15. Folgehalbjahr = 15	5.631	96	5.727
<i>Gesamt</i>	<i>253.567</i>	<i>17.961</i>	<i>271.528</i>
<b>Sekundäre Endpunkte</b>			
Beitrittsjahr	40.065	0	40.065
1. Folgehalbjahr = 1	29.634	9.880	39.514
2. Folgehalbjahr = 2	23.144	5.574	28.718
3. Folgehalbjahr = 3	17.667	4.598	22.265
4. Folgehalbjahr = 4	15.125	3.849	18.974
5. Folgehalbjahr = 5	11.793	3.311	15.104
6. Folgehalbjahr = 6	11.056	3.025	14.081
7. Folgehalbjahr = 7	9.275	2.720	11.995
8. Folgehalbjahr = 8	10.285	2.650	12.935
9. Folgehalbjahr = 9	8.464	1.499	9.963
10. Folgehalbjahr = 10	7.846	1.080	8.926
11. Folgehalbjahr = 11	5.697	808	6.505
12. Folgehalbjahr = 12	5.295	631	5.926
13. Folgehalbjahr = 13	4.052	371	4.423
14. Folgehalbjahr = 14	4.339	218	4.557
15. Folgehalbjahr = 15	3.417	108	3.525
<i>Gesamt</i>	<i>207.154</i>	<i>40.322</i>	<i>247.476</i>

Zeitpunkt (Zähler Kalenderhalbjahr)	Zensierungen	Ereignisse	Gesamt
<b>Tod</b>			
Beitrittsjahr	47.443	1.262	48.705
1. Folgehalbjahr = 1	36.437	2.072	38.509
2. Folgehalbjahr = 2	29.278	1.557	30.835
3. Folgehalbjahr = 3	22.926	1.314	24.240
4. Folgehalbjahr = 4	20.119	1.190	21.309
5. Folgehalbjahr = 5	16.267	1.077	17.344
6. Folgehalbjahr = 6	15.614	949	16.563
7. Folgehalbjahr = 7	13.571	868	14.439
8. Folgehalbjahr = 8	16.147	734	16.881
9. Folgehalbjahr = 9	13.844	682	14.526
10. Folgehalbjahr = 10	13.114	574	13.688
11. Folgehalbjahr = 11	9.842	459	10.301
12. Folgehalbjahr = 12	9.405	343	9.748
13. Folgehalbjahr = 13	7.469	278	7.747
14. Folgehalbjahr = 14	8.064	179	8.243
15. Folgehalbjahr = 15	6.768	81	6.849
<i>Gesamt</i>	<i>286.308</i>	<i>13.619</i>	<i>299.927</i>

**Unabhängige Variablen**

Der gemeinsame Kovariatensatz für die Modelle enthält die folgenden unabhängigen Variablen:

- Altersgruppe
- Geschlecht
- Kohortenzugehörigkeit
- Kalenderhalbjahr
- Interaktion: Kohortenzugehörigkeit x Kalenderhalbjahr
- Auswertungsjahr (nur für Jahresauswertung)
- Interaktion: Kohortenzugehörigkeit x Jahr (nur für Jahresauswertung)
- Raucherstatus bei Einschreibung
- BMI-Klassen bei Einschreibung
- Fußstatus bei Einschreibung
- HbA1c-Intervalle bei Einschreibung
- Schlaganfall bei Einschreibung
- Blindheit bei Einschreibung
- Hypertonus bei Einschreibung (anamnestisch)
- pAVK bei Einschreibung
- Diabetische Neuropathie bei Einschreibung
- Fettstoffwechselstörung bei Einschreibung
- Nephropathie bei Einschreibung
- Amputation bei Einschreibung
- KHK bei Einschreibung
- Nierenersatztherapie bei Einschreibung
- Herzinfarkt bei Einschreibung
- Diabetische Retinopathie bei Einschreibung
- Krankengeldanspruch (nur bei Zielwert „Krankengeld“)

In den Modellen enthalten sind also jeweils die in der folgenden Tabelle dargestellten Variablen, wobei keine zu den Zielvariablen sowie der Kollektivabgrenzung redundanten Variablen als unabhängige Variablen in das Modell aufgenommen wurden (z.B. wurde bei Zielwert „Herzinfarkt“ die unabhängige Variable „Herzinfarkt bei Einschreibung“ nicht in das Modell aufgenommen). Bei den Übergangsratenmodellen ist selbstverständlich auch das Kalenderhalbjahr nicht im Modell enthalten, da darüber die Verweildauer bestimmt wird.

Die kategorialen abhängigen Variablen wurden dummy-kodiert mit jeweils der niedrigsten Kategorie als Referenz in das Modell aufgenommen.

Der Interaktionseffekt von Beitrittskohorte und Kalenderhalbjahr wurde als linearer Interaktionseffekt modelliert, d.h. er wurde als Produkt aus der rekodierten Beitrittskohorte (1 - 12) und dem Zähler des Kalenderhalbjahres (0 – 11) gebildet.

**Tabelle E.4.4 Übersicht über den gemeinsamen Kovariatensatz für die Modellierung**

Unabhängige Variable	Kodierung	Variablenname im Modell
<b>Altersgruppe:</b> - bis 51 Jahre - 51 - 60 Jahre - 61 - 70 Jahre - 71 - 80 Jahre - 81 Jahre und älter	Indikator: 1 2 3 4 5	<b>radm_042</b> Referenz 2 3 4 5
<b>Geschlecht:</b> - Männer - Frauen	Dummy: 1 0	<b>radm043r</b> Referenz
<b>Kohortenzugehörigkeit:</b> - 2004-2 - 2005-1 - 2005-2 - 2006-1 - 2006-2 - 2007-1 - 2007-2 - 2008-1 - 2008-2 - 2009-1 - 2009-2 - 2010-1 - 2010-2 - 2011-1 - 2011-2 - 2012-1	Indikator: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	<b>radm044r</b> Referenz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<b>Kalenderhalbjahr:<sup>A)</sup></b> - Beitrittsjahr - 1. Folgehalbjahr - 2. Folgehalbjahr - 3. Folgehalbjahr - 4. Folgehalbjahr - 5. Folgehalbjahr - 6. Folgehalbjahr - 7. Folgehalbjahr - 8. Folgehalbjahr - 9. Folgehalbjahr - 10. Folgehalbjahr - 11. Folgehalbjahr - 12. Folgehalbjahr - 13. Folgehalbjahr - 14. Folgehalbjahr - 15. Folgehalbjahr	Indikator: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	<b>radm046</b> Referenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<b>Auswertungsjahr (nur für Jahresauswertung):</b> - Jahr 1 - Jahr 2 - Jahr 3 - Jahr 4 - Jahr 5 - Jahr 6 - Jahr 7	Indikator: 1 2 3 4 5 6 7	<b>jahr</b> Referenz 2 3 4 5 6 7
<b>Interaktionsterm:</b> - Kohortenzugehörigkeit x Kalenderhalbjahr	Metrisch: 0 .... 64	<b>intkohj</b>

Unabhängige Variable	Kodierung	Variablenname im Modell
<b>Interaktionsterm (nur für Jahresauswertung):</b> - Kohortenzugehörigkeit x Kalenderjahr	Metrisch: 1 .... 36	intkoj
<b>Raucherstatus bei Einschreibung:</b> - Nichtraucher - Raucher	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_047</b>
<b>BMI-Klassen bei Einschreibung:</b> - Normal - mäßig adipös - stark adipös	Indikator: 1 2 3	<b>radm_048</b> Referenz 2 3
<b>HbA1c (Intervalle) bei Einschreibung:</b> - $x \leq 6$ - $6 < x \leq 7,5$ - $7,5 < x \leq 8$ - $8 < x \leq 8,5$ - $8,5 < x \leq 10$ - $x > 10$	Indikator: 1 2 3 4 5 6	<b>radm_051</b> Referenz 2 3 4 5 6
<b>Schlaganfall bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_060</b>
<b>Blindheit bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_063</b>
<b>Hypertonus bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_075</b>
<b>pAVK bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_067</b>
<b>Diabetische Neuropathie bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_065</b>
<b>Fettstoffwechselstörung bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_069</b>
<b>Fußstatus bei Einschreibung<sup>B)</sup>:</b> - unauffällig - leicht auffällig - erheblich auffällig	Indikator: 1 2 3	<b>radm_fav</b> Referenz 2 3

Unabhängige Variable	Kodierung	Variablenname im Modell
<b>Nephropathie bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_064</b>
<b>Amputation bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_062</b>
<b>KHK bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_068</b>
<b>Nierenersatztherapie bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_061</b>
<b>Herzinfarkt bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_059</b>
<b>Diabetische Retinopathie bei Einschreibung:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_066</b>
<b>Krankengeldanspruch:</b> - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz <b>radm_025</b>

A) Bei den Zielwerten, bei denen auf Grund der Kollektivabgrenzung das Beitrittsjahr nicht in den Modellen enthalten ist, wurde das 1. Folgehalbjahr als Referenzkategorie verwendet.

B) Im Falle einer fehlenden Angabe beim Fußstatus wurde die Kategorie „unauffällig“ gesetzt.

### Besonderheiten

Für die Definition der Zielvariablen ist wesentlich, dass bei den Schulungen (Diabetes- und Hypertonieschulungen) eine unsystematische Dokumentation festzustellen ist, die dazu führt, dass für die Erwartungswerte zum Teil erheblich zu hohe Schätzwerte ermittelt werden. Die Ergebnisse sind hier nur sehr eingeschränkt verwendbar.

Dies liegt daran, dass die Dokumentationen häufig, aber offenbar nicht immer fortgeschrieben werden. In den Daten ist sichtbar, dass bei vielen Patienten in aufeinander folgenden Halbjahren bei den Schulungsvariablen eine 0, eine 1 oder eine 2 eingetragen ist. Vermutlich gab es hier also einmal die Empfehlung zur Schulung und in allen Folgehalbjahren wurde dann bei Nichtteilnahme eine 0 bzw. bei Teilnahme eine 2 eingetragen. Bei der 0 (nicht teilgenommen) kommt dies häufiger vor als bei der 2, weshalb bei der Non-Compliance (Zielwert = 0) die Schätzung der E-Werte im Verhältnis zu den O-Werten bzw. G-Werten noch stärker nach oben abweicht als bei der Teilnahme.

Diese Fortschreibung ist allerdings unsystematisch, d.h. es gibt auch viele Patienten, bei denen die Schulungswerte erwartungsgemäß aussehen (d.h. in einem Halbjahr ist ein Wert gesetzt, im Folgehalbjahr dann nicht mehr). Da die Aggregierungsfunktion bei den Schulungszielvariablen (Aggregation von Halbjahren auf Patienten) eine Summenbildung über die Halbjahre ist, wird das Problem mit zunehmender Zahl der Halbjahre größer.

Das Problem lässt sich auf Grund der vermutlich unsystematischen Dokumentation nur über eine Änderung der Zielvariablen lösen. Würde in der Zielvariablen nur das "Erstauftreten" bei der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an empfohlenen Schulungen und nicht alle empfohlenen Schulungen betrachtet, würde also pro Patient nur das erste Halbjahr, in dem ein Wert bei den Schulungen eingetragen ist, modelliert, hätten fortgeschriebene Werte bei den Schulungen keinen Einfluss auf die Schätzung der Erwartungswerte.

Eine detaillierte Darstellung der Modellergebnisse findet sich in infas (2013): DMP-Evaluation DM2: Bericht zur Modellbildung für die Risikoadjustierung. September 2013.



## Anhang F: Glossar

**ACE-Hemmer** sind Hemmstoffe (Inhibitoren) des Angiotensin-konvertierenden Enzyms (Angiotensin Converting Enzyme = ACE)

**Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung)** – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

**Antragsregion** – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

**arithmetisches Mittel** – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

**Armstrong-Klassen** – Die Armstrong-Klassen werden in der Beschreibung des diabetischen Fußsyndroms ergänzend zu den Wagner-Stadien verwendet. Armstrong-Stadium A: Keine zusätzliche Komplikation; Stadium B: Mit Infektion (Besiedlung mit Krankheitserregern); Stadium C: Mit Ischämie (Minderdurchblutung); Stadium D: mit Ischämie und Infektion.

**auswertbare Patienten** – Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

**Auswertungs(halb)jahr** – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmer erfolgen.

**Beitritts(halb)jahr** – Kalenderhalbjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

**Bluthochdruck** – Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

**BMI (Body-Mass-Index)** – Verhältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts, berechnet durch Körpergewicht in kg dividiert durch Körpergröße in m zum Quadrat.

**Body-Mass-Index** – siehe BMI

**CI (confidence interval)** – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

**diastolischer Blutdruck** – Der sich während der Erschlaffung der Herzkammer (Diastole) ergebende niedrigste Punkt der Blutdruckkurve (auch als unterer Blutdruckwert bezeichnet). Da dieser Druck während des größten Teils des Herzzyklus auf den Gefäßwänden lastet, ist er für die Langzeitprognose bedeutend.

**Diabetes mellitus** – Diabetes mellitus - Zuckerkrankheit, die häufigste endokrine Störung. Es wird vor allem zwischen den beiden wichtigsten Gruppen, dem Typ 1 und dem Typ 2 unterschieden. Allen Typen ist ein absoluter oder relativer Mangel an Insulin gemeinsam. Gefürchtet sind vor allem die Spätfolgen des Diabetes, die Makro- und Mikroangiopathie sowie die Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven.

**DMP (Disease-Management-Programm[e])** – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

**ED** – siehe Erstdokumentation

**Erstdokumentation** – Mit der Einschreibung des Patienten in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

**Erstmanifestation** – Erstmaliges Erkennbarwerden z.B. einer Erkrankung oder einer Erbanlage.

**EZ** – Eintrittszeitpunkt bzw. Halbjahr, in das der Programmeintritt fiel.

**FD** – siehe Folgedokumentation

**Folgedokumentation** – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

**Fußstatus, auffälliger** – Unter einem „auffälligen Fußstatus“ werden gefäß- (angiologische), nerven- (neurologische) und/oder knochen- bzw. gelenkbedingte (osteoarthropathische) Auffälligkeiten verstanden. Die Spätkomplikation diabetischer Fuß kann sich in Form schmerzloser Geschwüre (Ulzera) oder sogar Gewebstod (Nekrose, diabetische Gangrän) manifestieren. Liegt eine Polyneuropathie vor, so sind die Füße durch unbemerkte Verletzungen besonders gefährdet. Bereits kleine Verletzungen, bei der Fußpflege oder durch Druck der Schuhe zugezogen, können sich entzünden und damit den Fuß gefährden. Veränderungen können mittels der Klassifikation nach Wagner/Armstrong klassifiziert werden.

**Fußsyndrom** – Das diabetische Fußsyndrom oder umgangssprachlich auch der "diabetische Fuß" steht für einen Komplex von nervlich (neuropathischen) und/oder gefäßbedingten (angio-pathischen) Symptomen wie Infektionen, Geschwürbildungen (Ulzerationen) und/oder Destruktionen tiefen Gewebes (Knochen, Knorpel, Sehnen) der unteren Extremitäten als Folge eines Diabetes mellitus. Die Schädigungen werden u.a. anhand der Klassifikation nach Wagner klassifiziert.

**Glomeruläre Filtrationsrate** - Die über eine Million Nierenkörperchen oder Glomeruli sind die kleinsten Funktionseinheiten der Niere mit einer wichtigen Filterfunktion. Die Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) gibt das Gesamtvolumen des Primärharns an, das von allen Glomeruli beider Nieren gefiltert wird. Dies sind bei einem Menschen etwa 120 Milliliter pro Minute bzw. etwa 180 Liter pro Tag.

**Glibenclamid** – Arzneimittel zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus, das zur Gruppe der Sulfonylharnstoffe gehört. Glibenclamid fördert die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. B-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

**Glukosidase** – Die Kohlenhydratspaltung erfolgt durch eine Reihe von Enzymen (Glucosidasen) im Magen-Darm-Trakt. Diese Enzyme werden durch eine Gruppe von oralen Antidiabetika, sog. Glukosidase-Hemmer gehemmt, wodurch sich die Resorption von Kohlenhydraten verlangsamt und dadurch der Blutzuckeranstieg nach Nahrungsaufnahme (postprandial) geglättet wird.

**Häusliche Krankenpflege** – In der Wohnung der Patienten erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungspflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

**Hemmer** – siehe Inhibitoren

**HbA1c** – Ein Derivat aus der Gruppe des sog. Glykohämoglobins. In roten Blutkörperchen binden sich Zuckermoleküle (Glukose) an die Moleküle des Blutfarbstoffs (Hämoglobin). Der Anteil des HbA1c am Gesamthämoglobin bei Gesunden beträgt 4-6. Mit steigendem Blutzuckerspiegel steigt sein Anteil und bleibt bis zu acht Wochen lang erhöht, auch wenn der Blutzucker zeitweise wieder auf normale Werte absinkt. Die Bestimmung von HbA1c dient als Qualitätskontrolle der Blutzuckereinstellung (sog. Blutzuckergedächtnis).

**Heilmittel** – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen oder einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) und Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

**Herzinfarkt** – Der Herzinfarkt oder Myokardinfarkt ist eine akute und lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens. Es handelt sich dabei um Absterben oder Gewebsuntergang von Teilen des Herzmuskels auf Grund einer Minderversorgung des Gewebes mit Sauerstoff bedingt durch den Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße. Im Laufe der diabetesbedingten Gefäßschädigungen und gleichzeitiger Nervenschädigungen kann es zu sog. „stummen Infarkten“ ohne jegliche Schmerzsymptome kommen.

**Hilfsmittel** – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

**Hypertoniker** – Patienten mit dauerhaft erhöhten Blutdruckwerten.

**Hypertonus (Hypertonie)** – Bluthochdruck, Hochdruckkrankheit. Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

**Inhibitoren** – Es handelt sich um Substanzen, die chemische Reaktionen beeinflussen. Inhibitoren sind Zusatzstoffe, die Reaktionen verschiedenster Art zu verlangsamen oder zu verhindern suchen. Die gegenteilige Eigenschaft zeichnet einen Katalysator aus - dieser beschleunigt chemische Reaktionen.

**Insulin** – Blutzuckersenkendes Hormon, das in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gebildet wird. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Blutzuckers und der Therapie des Diabetes mellitus. Bei der Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus kommt v.a. dem Humaninsulin, das gentechnisch hergestellt wird, eine herausragende Bedeutung zu. Insuline werden zumeist in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme oder den Blutzuckermesswerten mittels (Selbst-)Injektion ins Unterhautfettgewebe (subkutan) oder halbautomatisch mittels Insulinpumpe verabreicht. Es stehen verschiedene Darreichungsformen mit langer und kurzer Wirkdauer zur Verfügung. Insulinanaloga sind Insuline mit veränderter Wirkungsweise (insbes. Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung im Organismus und damit auch der Wirkdauer aufgrund einer gentechnisch gegenüber dem Humaninsulin veränderten Aminosäurezusammensetzung).

**Kohorte bzw. Halbjahreskohorte** – Gesamtheit der Teilnehmer eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patienten, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

**Kollektiv** – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

**Konfidenzintervall** – siehe CI

**Koronare Herzkrankheit (KHK)** – Die KHK ist die Manifestation einer Arteriosklerose an den Herzkranzgefäßen. Bei höhergradigen Einengungen resultiert ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot in der Herzmuskulatur. Die Koronare Herzkrankheit ist in den Industrieländern die häufigste Todesursache

**Krankengeld** – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstaufschlag ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

**Lasertherapie** – Bei der Laser-Therapie - auch Laser-Koagulation oder Photo-Koagulation genannt - werden gezielte Lichtstrahlen auf die geschädigte Netzhaut gerichtet, die diabetesbedingte Blutgefäß-Wucherungen zerstören. Dadurch wird auch die Bildung weiterer Gefäßveränderungen unterdrückt.

**Makroangiopathie** – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die großen Gefäße (Arterien) durch Arteriosklerose geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie koronare Herzkrankheit (KHK), Herzinfarkt, Schlaganfall und arterielle Verschlusskrankheit (AVK) auftreten können.

**Mean** – siehe arithmetisches Mittel

**Median** – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

**Medizinische Datensätze** – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 100 EA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 EN sowie für die Folgedokumentationen die SA 100 FA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 FN.

**Metformin** – Der einzige heute noch in Deutschland zugelassene Wirkstoff aus der Gruppe der Biguanide ist das Metformin. Diese Substanzklasse der oralen Antidiabetika, entsteht aus zwei Molekülen Guanidin unter Abspaltung von Ammoniak. Der blutzuckersenkende Effekt ist auf mehrere, zum Teil noch unklare, Mechanismen zurückzuführen. Es wird die körpereigene Glucoseproduktion (Gluconeogenese), die Glucosefreisetzung (Glykogenolyse) aus der Leber und auch die Aufnahme (Resorption) der Kohlenhydrate aus dem Darm gehemmt. Durch den letztgenannten Wirkmechanismus ist Metformin auch besonders gut für die Therapie übergewichtiger Diabetiker geeignet. Eine verbesserte Glucoseaufnahme in den Muskel führt zu einer Zunahme der Glykogenkonzentration und trägt dadurch ebenfalls zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei.

**Mikroangiopathie** – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die die kleinen und kleinsten Gefäße (Kapillaren) geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie Netzhautschädigung (Retinopathie) oder Nierenschädigung (Nephropathie) mit den Endstadien Erblindung und Nierenversagen auftreten können.

**Monotherapie** – Unter einer Monotherapie versteht man die Behandlung mit einem Medikament, das nur eine Wirksubstanz enthält. Eine Kombinationstherapie arbeitet dagegen mit Medikamenten mit zwei oder mehr Wirksubstanzen.

**Nephropathie, diabetische** – Eine durch Diabetes mellitus verursachte Veränderung der Nierengefäße, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Erstes Anzeichen für eine diabetische Nephropathie ist die Ausscheidung von kleinsten Eiweißmengen mit dem Urin (Mikroalbuminurie). Nimmt die Nierenfunktion weiter ab, können bestimmte Stoffwechselprodukte nicht mehr in ausreichendem Maße über die Niere ausgeschieden werden. Man spricht dann von einer Niereninsuffizienz, die in ihrem Endstadium eine Blutwäsche (Dialyse) notwendig macht.

**Neuropathie (Polyneuropathie)** – Nervenerkrankung, die zu den diabetischen Folgeerkrankungen zählt. Man unterscheidet zwischen der häufigeren peripheren Neuropathie und der selteneren autonomen Neuropathie. Die periphere Neuropathie (z.B. nervenbedingte Störungen des Temperatur- und Schmerzempfindens an den Extremitäten) tritt meist als Empfindungsstörung an beiden Füßen auf. Der Gefühlsverlust wird von einem Fehlen der Sehnenreflexe begleitet. Häufig ist auch eine motorische Störung festzustellen, die sich in einer Schwäche und Rückbildung der kleinen Fußmuskulatur zeigt. Dadurch kommt es zu Veränderungen des Fußes mit Fehlstellungen. Unangenehm ist die schmerzhaft Polyneuropathie, die sich vornehmlich in der Nacht mit einem Gefühl von Pelzigkeit, Spannung, Fußsohlenbrennen oder starkem Kribbeln äußert. Die autonome Polyneuropathie gehört ebenso zu den Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus und äußert sich in Funktionsstörungen der inneren Organe. Von den häufig unspezifischen Symptomen können alle Organsysteme betroffen sein, wie z.B. Magen-Darm-Trakt (Magenentleerungsstörungen, Übelkeit), Herz (Verringerung der Herzfrequenzvariabilität), Sexualorgane (erektile Dysfunktion), Blase (Entleerungsstörungen). An den Füßen kann es als Folge einer verminderten Schweißbildung zu erhöhter Austrocknungsgefahr der Fußhaut, starker Hornhautbildung und Rissen kommen. Außerdem gibt es vermehrt Veränderungen in der Haut (Pergamenthaut) und den Nägeln (eingerissene, brüchige Nägel).

**Nierenersatztherapie** – Verlieren als Folge des Diabetes die Nieren ihre Ausscheidungs- und Filterfunktion, muss mittels Blutwäsche (Dialyse) oder gar Nierentransplantation eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

**Niereninsuffizienz** – Sind die Nieren durch eine Erkrankung derart geschädigt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die bei normaler Ernährung anfallenden Stoffwechselprodukte vollständig auszuschleiden bzw. ihre Filterfunktion auszuüben, so spricht man von Nierenversagen oder Niereninsuffizienz. Im Endstadium der terminalen Niereninsuffizienz muss eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

**OAD** – Unter dem Begriff orale Antidiabetika werden Tabletten aus verschiedenen Substanzklassen zusammengefasst. Dazu zählen Glucosidase-Hemmer, Biguanide, Sulfonylharnstoffe bzw. deren Derivate und Repaglinide. In der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 sind sowohl Kombinationen zwischen oralen Antidiabetika untereinander als auch zwischen dem nicht oral applizierbaren Insulin und oralen Antidiabetika möglich. Die Therapie ist in jedem Fall an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anzupassen.

**OD-Daten** – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmer verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmer vor. Diese Daten werden als Satzart 100 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patient und Jahr vor.

**ophthalmologische Netzhautuntersuchung** – Vom Augenarzt zur frühzeitigen Erkennung und Therapie von Mikroangiopathien (Erweiterungen, Neubildungen, Blutungen etc.) der Netzhaut (Retina) durchgeführte Untersuchung des Augenhintergrunds.

**orale Antidiabetika** – siehe OAD

**Osteoarthropathie** – Das Absterben von Knochengewebe (Knochennekrosen) kann bei Diabetes-Patienten z.B. im Vor- und Rückfuß zu schmerzlosen Destruktionen, Statikverlust und Geschwürbildungen (Ulzerationen) mit nachfolgenden schwerwiegenden Infektverläufen und Schädigung der Gewölbefunktion des Fußes führen.

periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) – Durch verengende (stenosierende) bzw. verschließende (obliterierende) Veränderungen an Arterien verursachte Erkrankung, die zu Störungen der arteriellen Durchblutung an den Extremitäten durch Einengung der Gefäßlichtung führt. Verschlüsse peripherer Arterien sind oft multipel und langstreckig und betreffen zumeist Arterien der unteren Extremität (Beine). Beschwerden an den Beinen, die zum Stehenbleiben zwingen, werden als Schaufensterkrankheit bezeichnet.

**PM-Daten** – Patientenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientenmerkmale wie Geschlecht und Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

**Programtteilnehmer** – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

**Restkohorte** – Gesamtheit der Patienten einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programtteilnehmer sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

**Retinopathie** – Die diabetische Retinopathie ist eine durch Diabetes mellitus hervorgerufene Erkrankung der Netzhaut des Auges. Die Schädigung kleiner Blutgefäße (Mikroangiopathie) verursacht eine Minderung der Sehschärfe sowie Einschränkung des Gesichtsfelds und kann im Verlauf zur Erblindung führen. Eine schlechte Diätführung bzw. Blutzuckereinstellung begünstigt die Entstehung des Krankheitsbilds. 30% aller Erblindungen in Europa sind auf die diabetische Retinopathie zurückzuführen

**Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV)** – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidität) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

**Schlaganfall** – Als Schlaganfall (medizinisch auch Apoplex oder Insult), wird eine plötzlich oder innerhalb kurzer Zeit auftretende Erkrankung des Gehirns bezeichnet, die zu einem anhaltenden Ausfall von Funktionen des Zentralen Nervensystems führt und durch kritische Störungen der Blutversorgung des Gehirns (Gefäßverschluss oder Einblutung) verursacht wird.

**Serum-Kreatinin** – Kreatinin ist ein Produkt des Muskelstoffwechsels. Ein Anstieg seiner Konzentration im Blut (Serum-Kreatinin) kann ein Hinweis auf eine Nierenschädigung (Nephropathie) sein.

**Subkohorte** – Untergruppe der Patienten einer Kohorte. Alle Patienten werden zum Zeitpunkt der Erstdokumentation nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen in drei Subkohorten unterteilt. Diese Einteilung bleibt über den gesamten Berichtszeitraum bestehen, auch wenn sich der Schweregrad der Begleit- oder Folgeerkrankungen im Zeitverlauf ändert.

**subkutan** – bedeutet "unter der Haut" oder "unter die Haut verabreicht". Die subkutane Verabreichung von Medikamenten ist einfach zu handhaben. Dadurch eignet sich dieses Verfahren gut, um vom Patienten selbst angewandt zu werden.

**Sulfonylharnstoffe** – Arzneimittelgruppe zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus (z.B. Glibenclamid) Sie fördern die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. Beta-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

**systolischer Blutdruck** – Der sich während des Zusammenziehens bzw. der Kontraktion der Herzkammer (Systole) ergebende höchste Punkt der Blutdruckkurve (auch als oberer Blutdruckwert bezeichnet).

**Statin** ist im allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch ein Arzneistoff, der der pharmakologischen Substanzklasse der 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase-(HMG-CoA-Reduktase-)Inhibitoren angehört. Da HMG-CoA ein Zwischenprodukt der menschlichen Cholesterinsynthese ist, werden Statine bislang hauptsächlich bei Fettstoffwechselstörungen als Cholesterinsenker eingesetzt

**Thrombozyten-Aggregationshemmer** – Diese Arzneimittel, wie z.B. Acetylsalicylsäure, verhindern das Zusammenkleben von Blutplättchen (Thrombozyten) und senken dadurch die Blutgerinnungsneigung, wodurch in den Blutgefäßen seltener Blutgerinnsel (Thrombosen) entstehen.

**Urin-Albumin** – Albumin ist das häufigste Eiweiß im Blutplasma. Während die Filterfunktion gesunder Nieren nur geringe Albuminmengen im Primärharn zulässt, die außerdem fast vollständig rückgewonnen (resorbiert) werden, erhöht sich bei zunehmender Nierenfunktionsstörung die Menge von Albumin im Primärharn. Dieses Albumin wird bei Überschreitung der Rückresorptionskapazität zunächst in geringen Mengen (Mikroalbuminurie), dann auch in größeren Mengen (Makroalbuminurie, Eiweißverlustniere) mit dem Urin/Harn ausgeschieden.

**Wagner-Stadien** – Zur klinischen Einteilung des Schweregrads des diabetischen Fußsyndroms hat sich die Einteilung nach Wagner in 5 Stadien bewährt (Stadium 0: Risikofuß ohne Läsion [ggf. Fußdeformation], 1: oberflächliches Geschwür (Ulcus) [mit potentieller Infektion oder mit Infektion nur im Wundbereich], 2: tiefes, gelenknah infiziertes Ulcus, 3: penetrierende Infektion mit Knochenbeteiligung, Knochenmarksentzündung (Osteomyelitis) oder Abszess, 4: Begrenzte Vorfuß- oder Fersennekrose, 5: Nekrose (Zelltod) des Fußes.